



湯科選粹目錄

第七卷

諸腫第八十二

犀角飲

熨風散二條

水澄膏

石癰石疽第八十三

犀角湯

黃連散

沉香湯

丹毒第八十四

四色散

搨毒方

漏蘆湯

五香湯

十二種單方

赤白遊風第八十五



八仙散
金花散
丹溪風丹方

單方十五條

紫白癩風第八十六 附白駃 癩瘍風

龍蛇丸
何首烏丸
烏頭丸

胡麻丸
單方十條
白駃方

單方二條
癩瘍風烏蛇散

烏白癩第八十七
大黑神膏
白花蛇散

雄黃散
單方二條
苦參酒

惡瘡第八十八
連翹飲
麝香輕粉散

乳香消毒散
蛇纏瘡方
良方治元蛇頭

黃芪散
加減四物湯
拔毒散

紫花地丁散
神効方
乳香散

洗方
桃花散

人面瘡第八十九

翻花瘡第九十

藜蘆膏
芩粉丸
單方五條

驢涎馬汗瘡第九十一

單方七條

流注第九十二

瘡科流氣飲 敗毒流氣飲 方脉流氣飲

癭瘤第九十三

玉壺散 化癭丹 海藻丸

白頭翁丸 木通散 寶金散

海帶丸 消癭散 合化丸

清上消鬱丸 解下除溼丸 木香猪鬃散

一井散 小黃膏 枯溜法

五灰膏 南星膏 縮溜法

繫瘤法 麻藥 止血方

桃花散 單方六條

疣子第九十四 附痣

磨堅丹 點痣藥 單方二條

汗斑第九十五

單方七條

體氣第九十六

單方二條 雜傳八方

浸淫瘡第九十七

升麻湯 香辦瘡方 單方三條

凍瘡第九十八

單方十二條

漆瘡第九十九

單方三修

金瘡第一百 附箭瘡

保赤膏 定痛乳香散 生金散

蚕蛾散 王不留行散 洗藥

麻藥 單方三條 地黃散

蒲黃散 又單方三條 湧鐵膏 下箭瘡

神應丹 單方十一條

骨鯁第一百一

沙糖丸 野狸丹 倒拔龍

釣鰲丸 化骨丹 三僊湯

蜀仙丹 神仙釣骨丹 烏龍丹

治骨鯁 單方二條 呪符二道

湯火傷第一百二

保生救苦散 獨聖散 俱東垣 黑白散

解毒行血膏 清涼膏 單方十二條

杖瘡第一百三

行血解毒湯 散血瓜萋散 乳香散

乳香膏 椒鰲丸 胎骨丸

八釐丸

牡鼠丹

石灰散

血竭散

芸臺散

單方十二條

行血救苦散

生肌保膚膏

諸毒咬害第一百四

關毒丹

逐毒丹

單方五條

蛇咬方十八條

蜈蚣毒方十四條

蝎螫方十條

蜘蛛毒五方

刺毛螫三方

蚯蚓毒一方

螻蛄毒一方

蜂毒七方

壁鏡咬二方

蚕咬二方

金蚕咬一方

風狗咬第一百五

扶危散

定風散

單方十一條

家犬咬十方

雜獸咬第一百六

馬咬三方

虎咬四方

熊咬一方

猫咬一方

鼠咬三方

雜治第一百七

瘡內疽一方

雞眼肉刺一方

鐵刺入肉四方

竹木刺入肉九方

走起脚泡

誤吞銅錢五方

誤吞金銀一方

誤吞竹木二方

誤吞水蛭二方

誤吞鐵鍼一方

一丸

癰科選粹卷第七

革

繡水陳文治 輯

東吳繆希雍 叅校

諸腫第八十二

無名腫毒不拘於頭面手足胸腹諸處焮赤腫硬無頭無面者是惡寒發熱頭痛拘急宜表散之以荆防敗毒散腫勢盛表裏俱實者追疔奪命湯若暴發赤腫切不可用鍼刺破只宜以洗腫方淋洗以八仙膏解毒丸等藥塗之

消一切腫毒未成者用黃蜀葵花子不拘多少研細

滴水令稀稠得所將絹帕子裹定旋澁所餘汁撲腫處四畔大効

丹溪治卒腫大痛用芫青大者杵之和苦酒如泥煮三沸包腫處

風毒腫用三年陳酒濃煎葱白以布包熨腫上一切無名腫毒痛不可忍搗草麻仁敷之立効

蒲公英治腫毒取莖內白汁傅之多塗立効
熬腫水研山豆根濃汁塗之

腫毒疼痛以赤小豆為末水調塗頻換或以香白芷水調敷効

又方用白芙蓉葉晒乾同皂角為末水調傅

犀角飲 治諸風腫

犀角 壹錢

玄參

連翹

柴胡 各伍錢

升麻

木通 各柒錢伍分

芒硝 生用

麥門冬 各壹兩

沉香

檀香

射干

甘艸 各貳錢伍分

右每服五錢水一盞半煎八分食後服晚再服

熨風散 治諸瘡因風致腫神効 方見葱熨第十四

蠶沙熨方

治如熨風散用晚蠶沙同食鹽和炒熱如法熨之

水澄膏 治諸腫大痛極効 方見圍藥第十六

石癰疔疽第八十三

犀角湯 治癰疽腫硬如石久不作膿口乾煩悶

犀角 木香各七錢五分 連翹 梔子仁

射干 當歸 赤芍藥 升麻

玄參 枳殼 甘草生各壹兩 大黃貳兩

右每服叁錢水煎

黃連散 治石癰結硬發熱毒氣攻衝不定疼痛

黃連 川大黃 白欽 馬牙硝

黃檗各壹兩 血竭 青鹽各五錢 赤小豆半合炒

杏仁四十九粒浸去皮尖

右為末蜜水調塗乾即易之

沉香湯 治石疽腫痛口乾煩熱四肢拘急

沉香七錢五分 防風七錢五分 木香七錢五分 麥門冬

當歸 枳殼 羚羊角 升麻

玄參 地骨皮 赤芍藥 甘草生各壹兩

大黃炒貳兩

右每服四錢水煎至七分服

丹毒第八十四

人之身體忽然變赤如丹之狀故謂之丹毒皆風熱惡毒所致或發手足或發腹上小兒得之最為急

症大約皆血熱肌虛風邪所搏而發宜消風散夾
 黑神散酒調風熱者赤色風冷者白色今人但呼
 赤為丹白為瘻用酒調土朱服之得愈蓋脾主肌
 肉土能入脾各從其類也赤丹可用烏藥順氣散
 白瘻消風散酒調服俱宜藿香正氣散此方乃治
 脾之藥

治一切丹毒惡氣攻刺痛不可忍用車前子益母草
 地膽草等分爛研塗之

又以大蒜杵如泥厚塗之乾即易之

又以羊角燒灰五錢赤小豆壹升為末同雞白和塗

四色散

治熱瘡遍身發出膿血赤爛如火丹或如火

黃連

黃栢

各叁兩

赤小豆

菜豆粉

各壹兩

紫艸

寒水石

漏蘆

各七錢

右為末香油調搽一日三次

又治火丹用鱧頭血塗即愈如無以螺螄肉搗爛絞
 汁塗之

治遍身虛痒用四物湯加黃芩煎調紫背浮萍末一
 錢或凌霄花末一錢尤妙

搨毒方

升麻

漏蘆

芒硝

各貳兩

梔子

貳拾枚

黃芩兩參

蒴藋兩五

右以水三升浸良久煮汁二升以布搦再服漏蘆湯

漏蘆湯 非裏實症不可用

漏蘆

白欽

黃芩

麻黃

白薇

枳殼

升麻

白芍藥

甘艸

大黃各參兩

右水一斗煮三升分三服快下之

五香湯 治熱毒卒腫痛結核似癰疽頭疼寒熱氣

青木香

藿香

沉香

丁香

薰陸香各壹兩

一方治火丹蟻螬虫取汁敷之

十二種單方 治丹毒但得一味即瘥

水苔

生地黃

生松毛

蒴藋葉

慎火艸

浮萍

豆豉和水

大黃和水

梔子和水

黃芩和水

硝石

豆葉

右但用一味二味搗和貼之即瘥

丹毒痛者為丹毒痒者為風丹方雜赤白遊風選用

赤白遊風第八十五

凡人之皮膚忽起赤暈如霞或發熱作痒或搔破出

水謂之赤白遊風又謂之丹毒自腹生出四肢者
 易治自四肢生入腹者難治其因起于脾肺氣虛
 腠理不密風熱相搏或風熱血熱所致治法若風
 熱相搏用荆防敗毒散風熱用小柴胡湯加防風
 連翹血熱用四物湯加柴胡山梔牡丹皮臨症斟
 酌惟涼血消風清肝養血之劑則火息痒止矣慎
 不用祛風之劑反燥肝血使元氣愈虛他証復出
 也若原有病之人面上忽見紅點者多死

八仙散

治遊風腫痒疥癬等瘡

細辛

荆芥

白芷

川芎

黃芩

防風

甘艸

地骨皮

各參錢

右搗為粗末用水煎浴洗患處

金花散

治一切丹毒

鬱金

黃芩

甘艸

山梔

大黃

黃連

糯米

各等分

右各生為末每服二三錢蜜水調敷

一丹溪方治因酒而得風丹遍身痒者

浮萍

錢五

防風

黃耆

羌活

各參錢

當歸

錢貳

乾葛

麻黃

各壹錢

生甘草

五分

右藥量疾重輕分二三貼水煎服

一方治冷風丹用防風甘草白殭蚕蟬蛻川芎白芷
白茯苓荆芥陳皮厚朴蒼耳子人參各等分爲末
豆淋酒調服貳錢

一方治風丹以穿山甲洗去腥在瓦上焙過存性每
壹兩入甘草參錢爲末米飲調敷

一方治血風疙瘡取浮萍自然汁豆淋酒下或四物
湯料溲酒下

一方治丹發疼痛取扁畜汁服壹升貳合立瘥未瘥
再服神効

一方治諸腫丹毒以伏龍肝不拘多少爲末雞子清
調服一日三次甚妙

一方烟火丹發從背起或兩脇及兩足其亦如火用
景天草真珠各壹兩搗和如泥塗之

一方治螢火丹從頭起慎火草搗和苦酒塗之

一方治諸丹毒以靛敷熱卽易

一方治丹毒之惡者以苧根三斤水三斗煮汁每日
塗之

一方治赤遊丹以蚯蚓糞水和敷

一方治赤遊丹以括婁末醎醋調敷

一方治痒丹以韭葉摻鹽加香油手摩熱擦丹上卽

止

一方遍身風痒癢疹凌霄花細末酒下壹錢立止

一方治皮膚風熱遍身生癢疹牛旁子浮萍等分以

薄荷調酒下貳錢日用二次

一方遍身癢疹疼痛成瘡用白殭蠶少許焙黃研為

末酒服貳錢立愈

紫白癜風第八十六 附白駝 瘰癧風

龍蛇丸 治風虛頑麻遍身紫白癜風癢疹痛者

白花蛇 去骨焙 黑花蛇 去骨焙 蕁蘇 天麻

黃耆 金毛狗脊 自然銅 骨碎補

楓香 地骨 草烏頭 鹽水浸剉 各壹兩

乳香 沒藥 各叁錢 麝香 貳錢

右為末酒糊丸梧子大每服十五丸酒下

加減何首烏丸 治紫白癜風筋骨疼痛四肢少力眼

裂睡臥不安 斷瞳人鼻梁崩塌皮膚疥癬手足皴

何首烏 蔓荆子 石菖蒲 荆芥穗

苦參 葳靈仙 甘菊花 枸杞子 各壹兩

右為末每服三錢蜜茶調下

烏頭丸 治紫白癜風遍身俱有

草烏頭壹斤以水浸透在竹籬內擦洗去大皮及

尖控起待乾以麻油四兩鹽四兩入銚子內炒令深黃色傾出油只留鹽并烏頭再炒令黑色烟出為度取一枚劈破心內如米一點白者為佳如白多再炒趁熱為末醋糊丸如梧子大早晚俱于食前服三十九丸久之肌體悅澤脚力强健視聽不衰諸風疥俱瘥蓋其熱性因炒而去故其効如神

胡麻丸

治紫白癩風

胡麻

壹兩 貳錢

荆芥

苦參

各八錢

何首烏

甘草

葳靈仙

各壹錢

右為末酒糊丸如梧子大每服五十九丸白湯送下

服後以浮萍煎湯頻洗

一方硫黃黃丹各五錢研以生絹袋盛之蘸生姜自然汁擦點處日十次

一方硫黃一兩醋浸一日海蝶蛸三個共為末洗浴後以姜蘸擦患處

一方用白蘿蔔汁調生礬末三錢先以布擦損塗之

一方防風荆芥白芷各壹兩硫黃姜黃各壹錢俱為末以獨核肥皂搗為丸擦洗之

一方雄黃貳錢枯礬貝母白附子各壹錢僵蚕五分信三分為末以布割小包浸生姜汁中擦患處

一方雄黃五錢燒酒半鍾共貯磁罐中封煮湯內酒乾爲末生姜蘸擦患處

一方黑礬膽礬川烏草烏知母貝母各貳錢巴豆七粒信五分各爲末銀朱壹錢水銀壹錢用錫死之亦爲末與前藥和勻將茄柴燒灰存性淋水入鍋熬滾入各末再煎數沸收磁器內手擦患處勿誤入眼

一方貝母爲細末洗浴後以核桃肉蘸擦患處一方杜太黃飛礬肥皂爲丸擦之

白駮者面及頸項身體皮肉色變與肉色不同不痛不痒此乃風邪搏于皮膚血氣不和所致

又云肺風流注皮膚之間久之不去卽成駮不早治之而致浸淫也

白駮方

硫黃

草决明

半夏

槲樹皮

各壹兩

蛇蛻

壹條貳味燒灰

爲末以清漆和之薄塗患處先用巴豆一粒中截摩擦白處然後用藥

又方

硫黃

雄黃

附子

生各壹兩

右為末醋調塗

一方用川烏頭硫黃各壹兩為末醋調塗

癩瘍風亦風邪積熱居之肺腑久之不散流溢皮膚令人頸項胸前腋下自生斑點相連色微白而圓或紫亦不痛不痒謂之癩瘍風凡此皆風熱伏留肌皮氣血不和之故

烏蛇散 治癩湯風

烏蛇 叁兩

犀角 壹兩

防風

羌活

黃芩

苦參 各貳兩

人參

丹參

玄參

沙參

桂心

秦艽

川芎

梔子仁

白蘚皮

川升麻

通草

白蒺藜

枳殼 各壹兩

石為末每服貳錢溫酒下

一方烏蛇末每服貳錢用熱豆淋酒調下日三服

烏白癩第八十七

癩疾皆是惡風及犯觸忌害所待初覺皮毛變黑或苦痒如虫行或眼前見物如垂絲言語無定心常驚恐皮肉之中或如菘李癩疹赤黑手足頑麻刺之不痛身體生瘡痛痒如有虫行名曰烏癩又有黑癩治亦略同

殺虫雄黃散

治身癩皮膚變黑生瘡腫痛

雄黃

金星石

銀星石

紫石英

白石英

玄精石

馬牙硝

白礬

各壹兩

右為末入瓷盒中用白土泥固候乾炭火煨通紅即止以上罨藥合來日取出於溼地上紙襯出火壽三伏時研如粉以楓樹膠煮汁和調每日塗之

大黑神膏

治身癩及諸癩遍身生瘡及多膿血

川烏頭

芎藭

升麻

防已

黃檗

藜蘆

黃連

白礬

雄黃

雌黃

胡粉

各伍錢

巴豆

杏仁

各十四粒

松脂

亂髮

各如雞子大一塊

右剉如豆用猪脂貳升并藥同煎以髮泮為度綿濾去粗入雌雄黃胡粉白礬攪勻收瓷器中每用塗瘡一日三四次每用藥以熱鹽湯洗過然後塗

之藥毋及口眼

白癩語聲嘶啞目視不明四肢頑痛身體發熱手足緩縱背脊拘急或生癰疹往往正白在皮肉之內

白花蛇散

治癩語嘶聲啞

白花蛇

酒浸

晚蚕蛾

去頭足翅

天麻

槐子

羌活

防風

蔓荊子

歲靈仙

白蘚皮

枳殼

各壹兩

甘草

炙五錢

為末每服貳錢溫酒下日進二次不拘時

一方用天麻壹斤天蓼木叁斤剉如豆大用水叁斗石鍋中熬至壹斗貳升濾淨再加慢火熬如稀膏每服壹匙荆芥湯下或薄荷酒

一方用馬鞭草為末以荆芥薄荷湯送下每壹錢

苦參酒

治白癩偏身白屑痒攢或痛

苦參

五斤

露蜂房

五兩

蝟皮

壹具

右剉用水三斗煮取一斗去粗浸細麵五斤炊飯叁斗如常作酒溫飲一二盃

惡瘡第八十八

諸痛痒瘡皆屬於心諸溼腫滿皆屬於脾心主血脾主肉血熱肉溼溼熱相搏潰散肌膚浸淫不休不可定名故曰惡瘡然有辨焉

如氣血鬱于皮膚腠理可以表而散者如疥癬疹之類是也內經曰汗之則瘡已

若氣血鬱于肌肉之分外連皮膚作寒發熱而生膿或七情所招或膏粱所傷皆宜內解張仲景所謂瘡家不可發汗汗之成瘻是也宜汗不宜汗皆因病有淺深故也

故瘡成于皮膚則因其輕而揚之汗之浴之外用殺虫潤燥之藥傳塗

瘡或在肌肉之內當因其重而減之瀉經絡之熱清涼氣血外以化膿生肌膏燻之瘡在頭巔則射而取之用酒製寒涼劑更以風藥升而上之外以殺虫解熱藥敷之明此三者其于治瘍思過半矣

乳香消毒散 專治惡瘡

大黃 煨

黃芪

牛蒡子 炒

金銀花

各五兩

甘草

參兩

牡礪

鹽泥煨燒五兩

乳香

沒藥

懸箕

各五錢

右為末每服五錢水煎分上下部服

連翹飲

治惡瘡紅赤痛痒心煩口乾婦人血風斑

連翹

當歸

瓜萋根

生地黃

荆芥

黃芩

赤芍藥

麥門冬

瞿麥

木通

牛蒡子 炒

山梔子

防風

川芎

粉草

各等分

右每服四錢水煎加燈心甘莖

麝香輕粉散

增瘡

治血疔瘡陰蝕瘡耳疔瘡一切惡

麝香

乳香

白礬

各壹兩

輕粉

五分

沒藥

五分

右為末量瘡乾溼敷貼

黃芪散 專治惡瘡

黃芪 當歸 白芍藥 瓜萼根

甘草 各壹兩 五錢 瓜萼 貳個 金銀花 貳兩 熟地黃 壹兩

皂角刺

右每服五錢無灰酒壹升入瓶內封固放鍋內以

對鍋口盆蓋定再以黃泥封口煮至聞香氣為度

取出澄冷飲清汁粗再添酒如法煎飲照上下部

法靈應如響以五月五日合妙

縫瘡方 良方

用雄黃研末以醋調塗仍用酒調服治一切蛇傷

蜂蠆等毒

良方治天蛇頭 增

用水蛇一條去頭尾用中一段如手指長刮去骨

肉不令病者見以皮包指再以紙裹之覺半體透

涼至瘡處而愈愈後急扯去蛇皮指上有一溝如

小蛇形頭眼俱全

紫花地丁散 治諸般惡瘡腫痛如神

紫花地丁 當歸 大黃 赤芍藥

金銀花 黃芪 各五錢 甘草節 貳錢

右用壹兩水酒煎依上下部服

加減四物湯 治一切無名瘡腫

川芎 當歸 芍藥 地黃

防風 荆芥 甘草 各等分 鳳尾草 壹握

右水煎服

拔毒散 治諸般惡瘡消腫去毒

天花粉 無名異 黃栢 黃芩

木鱉子 大黃 牡礪

等分爲末醋調敷

洗方

貫衆 川芎 茵陳 地骨皮

荆芥 獨活 防風 地扁蓄

當歸 甘草 各貳錢

右水煎洗之

神効方 治一切不識惡瘡一上卽瘥治疥尤効

水銀 黃栢 黃連 松脂 透明者

膩粉 土蜂窠 着壁者 甘草

各等分水銀以唾津殺爲泥入磁器中以生麻油

和研絹濾如錫入藥末再研如稠錫溫水洗瘡拭

乾塗之一切黃水及大痛不可忍者立効

乳香散 治遠年惡瘡

乳香 五分 膩粉 五分 黃栢 錢參 龍骨 錢參

大黃 錢參 麝香 字一

為末先以苦竹瀝洗瘡拭乾摻之

桃花散 治一切惡瘡生肌活血

烏魚骨 兩壹 虎骨 兩壹 龍骨 兩壹 寒水石 八兩

白石脂 錢五 赤石脂 錢五 白欵 錢五 黃丹 兩壹

右入白芨末五錢同為末敷摻

人面瘡第八十九

人面瘡多生於膝上或臂間狀如人之面眼口鼻俱

全相傳因冤業所致殊不可曉宜服十六味流氣

飲久者大苦參丸腎氣丸外用貝母為末敷之方

聚眉閉口仍用生肌散欵口

十六味流氣飲 方見乳岩條

大苦參丸 方見脫疽條

腎氣丸 方見掌疽條

翻花瘡第九十

潰瘡從中翻出努肉狀如翻花或如蛇頭長短不一

故以為名雜瘡間有楊梅瘡則多也癰疽亦間有

之蓋由肝經血燥所致宜內服清肝火養血氣之

藥用十全大補湯或八物湯倍參耆歸朮若出血乃肝不能藏脾不能約也宜補中益氣湯加五味子麥門冬或腎氣丸有怒火者逍遙散若誤用風藥是速其亡也外塗藜蘆等膏元氣復而肉自平誤用刀鍼者血出不止為患不可勝言

十全大補湯 方見脫疽條

補中益氣湯 方見掌疽條

八物湯 方見乳癰條

逍遙散 方見耳瘡條

藜蘆膏 治一切瘡疽努肉

藜蘆

右為細末以生豬脂和研如膏塗患處一日一易

步粉丸 治諸瘡努肉一方無川芎天花粉

川芎 五錢 天花粉 五錢 輕粉 貳錢五分 雄黃 壹錢貳分五厘

辰沙 壹錢貳分五厘 麝香 五分

右為末蒸餅糊丸如棗豆大每服八分日用三服

一方治諸瘡努肉雖出數寸者以硫黃研細末敷之

即縮

一方瘡肉突出烏梅燒灰為末敷之立愈

一方瘡肉突出以白毒肉杵細入蜜作餅貼之甚効

一方翻花瘡以馬齒莧燒灰研猪脂調敷

一方瘡突寸許用花脚蜘蛛絲纏其根則漸乾脫

驢涎馬汗瘡第九十一

一凡驢涎馬汗入瘡其腫漸甚可急治之遲則毒深

不治用生烏頭末敷瘡口上良久黃水出立安

一方驢涎馬汗入瘡用遠志去心爲末酒調塗

一方以冬瓜青皮陰乾爲末貼瘡上

一方馬汗入肉毒氣引入如紅線者急用烏梅肉嚼

爛塗瘡上

一方烏梅和核搗爛以好醋和成膏先將瘡口鍼破

出盡紫黑血拭乾敷上以布纏定

一方白礬飛過黃丹炒令紫色各等分相合貼患處

一方馬齒莧專主馬毒瘡水煎服一升仍以一半塗

瘡上

流注第九十二

流注之症或因飲食勞倦脾胃傷損或因房勞陰虛

陽氣湊襲或因營氣不從逆于肉理或因腠理不

密外邪客之或暴怒傷肝或鬱結傷脾或溼痰流

注或跌撲血滯或產後惡露皆因氣血凝滯而成

或生於四肢關節或生於胸腹腰髻或結塊或漫

腫或作痛皆元氣虧損所致並宜葱熨法及用益氣養榮湯固其血氣則未成者自消已成者自潰若久而不斂佐以豆豉餅灸之琥珀膏祛散寒邪接補陽氣若內有膿管而不斂者用針頭散腐化之經云形傷痛氣傷腫又曰真氣奪則虛邪氣盛則實若不補氣血節飲食慎起居而專用寒涼剋伐不死亦幸也

入有馬瘕申名走散流注外形微腫骨肉疼因風熱走散四肢治當疎風散熱不可用火鍼烙之

傷寒餘邪未盡者和解之用人參敗毒散次用小柴

胡合二陳加羌活當歸白朮川芎枳殼 暴怒所

致胸膈不利者調氣爲主宜方脉流氣飲 抑鬱

所致而不痛者宜調經脉補氣血宜益氣養榮湯

腫硬作痛者行氣和血宜瘡科流氣飲 潰而不斂

者益氣血宜人參養榮湯十全大補湯 脾氣虛

溼熱凝滯于肉理而致者但腫一塊不痛肉色亦

不變宜健脾除溼六君子加芎歸黃芪白芍肉桂

寒邪所襲筋攣骨痛或遍身痛宜溫經絡養氣

血宜大防風湯及五積散合敗毒散加牛膝杜仲

或獨活寄生湯次以四物湯加黃芪羌活杜仲

馬瘕串名不一種但有熱者用去熱散有表者用荆
防敗毒散有裏者用內疎黃連湯有表復有裏
者用追疔奪命湯却用水金鳳搗爛敷核堆上卽
効

馬瘕有熱未成服藥退之已成者但出膿其熱方退
若生堆核四五必盡出膿方退若潰爛者依潰瘍
法治之

瘡科流氣飲

主志怒氣結堆核腫硬及風寒溼熱搏
結經絡或血氣不和結成腫塊漫腫木

悶者
神効

桔梗

人參

當歸

肉桂

甘草

黃芪

厚朴

紫蘇

白芍藥

烏藥

防風

枳殼

檳榔

川芎

白芷

木香

右加生姜煎痛加乳沒 流注加羌獨活 氣滯
加香附 胃虛加陳皮此乃行氣散血之劑服之
過多致氣血虛耗不可成膿矣

敗毒流氣飲

治流注初發此藥疎邪利氣

羌活

獨活

青木香

赤芍藥

當歸

紫蘇

陳皮

香附

白芷

三稜

蓬莪茂

枳殼

川芎 桔梗 柴胡 半夏
赤茯苓 甘草 生地黃

右加生姜煎熱加大黃黃虛加參芪

方脉流氣飲

治陰發流注癰瘰及鬱結腫聚走注疼
痛心胸痞悶腹脹不食氣喘咳嗽

紫蘇 青皮 白芍藥 當歸

白茯苓 烏藥 桔梗 半夏

黃芪 川芎 枳實 陳皮

防風 南木香 大腹皮 甘草

檳榔 枳殼

右加生姜煎流注加羌獨活白芷 小便澀加木

通梳子 浮腫加猪苓澤瀉 氣滯加香附 血

滯加肉桂 瀉吐加藿香 癰瘰加夏枯草此亦

行氣耗血之劑服毋過二三劑

癰瘤第九十三

凡癰瘤之起必因怒動肝火血涸筋攣或外邪所搏

而致內經云肝統筋而藏血若自筋腫起按之如

筋聚之狀久而或有赤縷名曰筋瘤屬於肝也用

六味地黃丸四物湯加山梔木瓜之類主之若自

肌肉腫起久而有赤縷或皮色俱赤名曰血瘤屬

於心也用四物湯加茯苓遠志之類主之若自肌

肉腫起按之實軟名曰肉瘤屬於脾也用歸脾湯
補中益氣湯主之若自皮膚腫起按之浮軟名曰
氣瘤屬於肺也用補中益氣湯之類主之若自骨
腫氣按之堅硬名曰骨瘤屬於腎也用地黃丸及
補中益氣湯主之

仁齋曰筋脉呈露曰筋瘦赤脉交絡曰血瘦皮色不
變曰肉瘦隨憂愁消長曰氣瘦堅硬不可移曰石
瘦瘦多着于眉項瘤則隨氣凝結瘦瘤二者雖異
其名然皆內應乎五臟惟瘦之皮寬有似乎櫻桃
故以瘦爲名又名瘦氣卽影袋是也瘤之皮急又
似乎石榴故以瘤爲名又名瘤贅初起宜十六味
流氣飲單蜘蛛方外敷南星膏戒食厚味自然可
消且去之以漸斯無他患苟忘本取末妄用敷點
絲纏等法曾見有流血不止而死者治者審之
此疾宜補脾肺滋心腎令木得水而敷華筋得血
而滋潤多有可生

破結散

方見瘰癧條

玉壺散

治五癭

海燥

洗

海帶

洗

昆布

雷丸

各壹兩

青鹽

廣茂

各伍錢

右為細末陳火酒丸如榛子大噲化

化瘦丹 海帶 洗 海蛤 昆布 以上俱焙

澤瀉 炒 連翹 各五錢 猪鬃 羊鬃 各十枚

右為末蜜丸如雞豆大臨臥噲化一二丸忌油膩

海藻丸 治瘦瘤通用

海藻 川芎 當歸 官桂

白芷 細辛 藿香 白欵

昆布 明礬 壹兩 海蛤 松蘿 各七錢五分

右為末蜜丸如彈子大每服一丸

白頭翁丸 治氣瘦氣瘤

白頭翁 五錢 昆布 壹錢 通草 海藻 各七分

連翹 玄參 各八分 桂心 三分 白欵 六分

右為末蜜丸酒下

寶金散 治瘦氣無不神効

猪羊鬃 十對洗去脂膜 曬乾杵為細末 海藻 洗 海帶 洗 各貳兩

丁香 木香 琥珀 研 麝香 各壹錢

珍珠 研五錢

右先將丁香木香海藻海帶杵為細末入四味再研細至夜臨臥時熱酒調服未婚男女十服必効

已婚者一月効孕婦忌之此方前三味允宜木香
行氣琥珀破癥結用之是矣丁香甚無味珍珠則
重其方而加之者有何益哉

木通散 治頸下生結囊欲成癭

木通 松蘿 桂心 蛤蚧酥炙

白欵 琥珀 海藻 昆布各壹兩

為末每服二錢酒送下

海帶丸 治癭氣久不消

海帶 海藻 貝母 青皮

陳皮 各等分

右為細末蜜丸彈子大食後嚼化壹丸大効此方

尤勝寶金散

消癭散 治癭氣

海藻 海帶 昆布 海馬酒炙

海紅蛤煨 石燕煨 海螵蛸各壹兩

右為末清茶下兼服含化丸

含化丸

海藻 海蛤煨 海帶 昆布

瓦龍子煨 文蛤即花蛤有斑者 訶子 五靈脂各壹兩

猪臙 十四個焙乾另研

右蜜爲丸臥時含化再用灸法助之

清上消鬱湯

治痰火氣結鬱結作核成瘰在上部者

昆布

玄明粉

陳皮

半夏

黃連

海藻

莪朮

川芎

香附

青黛

白芥子

薄荷

右煎服

解下除溼湯

治溼熱鬱結血氣凝結作核在下部者

海藻

黃栢

三稜

香附

青皮

梔子

連翹

檳榔

木通

薄荷

右水煎

木香猪穎散

治項下大癭

南木香

青木香

孩兒茶

海螵蛸

朱砂

各壹錢

雄黃

五分

右研細入猪穎子七個搗勻臨卧酒煎乘熱呷下

一并散

塗瘰

雄黃

粉霜

硃砂

各貳錢

輕粉

乳香

沒藥

各壹錢

土黃

叁錢

麝香

少許

右爲細末津唾調塗瘰頂以溼紙蓋之後用小黃

膏塗四圍間日一度上藥土黃乃造作所成方

用雄黃貳兩木鱉仁五錢去油巴豆五錢硃砂貳

錢各另為末和勻以石腦酒和成一塊油紙包裹埋於地坑四十九日取出劈作小塊子磁石器內裝盛聽用

小黃膏 涼肌退腫

黃栢 黃岑 大黃 各等分

為細末水調為糊塗於一井散四圍間一日一度枯瘤方

砒 礪砂 黃丹 雄黃

輕粉 各壹錢 硃砂 乳香

沒藥 蟹螯 三十個生用

右研為細末糯米粥調捏作棋子大曝乾先灸破瘤頂以藥餅蓋上用黃栢為末以水調敷之數日

枯落

五灰膏 點瘤贅神効

桑灰 棗柴灰 荊芥灰 桐子殼灰

蕎麥桿灰

右燒灰各用五兩以沸湯淋汁五碗澄清入班猫四十枚穿山甲五片煎作二碗磁器裝盛用時入新出窰石灰一兩加乳香水片少許調成膏敷瘤上如稠加清水稀稀用之神効

南星膏

治頭面生瘤大者如拳小者如粟或軟或硬不疼不痛宜用此藥不可輒入鍼灸

天南星

大者一枚

右細研稠粘入好醋調如膏先將小鍼刺腫處令氣通却以膏攤紙上如瘤大小貼之覺痒則頻貼取効亦有以攢鍼刺瘤通竅而以新南星醋磨加麝少許日敷二次任如碗大半月全消

縮瘤法

用甘草煎膏以淨筆蘸塗瘤之四圍乾則又塗凡三次之後以大戟莞花甘遂等分爲末醋調另以別筆粧點其中不得近甘草如是而漸漸收小中點悉如舊法自然焦縮

繫瘤法

用莞花根淨洗帶溼不得犯着鐵器於木石器中搗取汁用線一條浸一宿取出繫瘤經宿卽落如未落再換一二次落後以龍骨訶子末傳瘡口自合用之屢効如無根用花泡浪汁浸線亦妙

麻藥

塗瘤上用手不痛

南星

川椒

半夏

川烏

石灰

草烏

六味爲末醋調塗

止血藥

好墨假

百草霜

等分揆血處以手按之

桃花散

止百般出血

石灰

十兩

麻油

半盞

大黃

壹兩煎汁半盞

右將石灰炒紅入麻油大黃汁和勻慢火炒如挑花色磁器聽用神妙

一方治癭氣以昆布一兩洗去鹹搗為末每用一錢綿裹於好醋中浸過含之津液咽下

一方治項下瘤以海藻壹斤浸酒飲之

一方治項下癭以猪穎壹個入海藻昆布各叁錢每夜飯後臨臥酒調服貳錢

一方以蜘蛛絲繫瘤根二三日自然退落

一方治翻花瘤以馬齒莧壹斤燒灰研細猪脂調服

一方治手背生瘤或如雞距或如羊角向明照之如桃

膠相似名曰膠瘤昔戴人治此以排鍼十字刺破

按出黃膠膿二三匙立平

生於面者曰粉瘤

瘰子第九十四

附點痣藥

瘰之為患不痒不疼惟不雅觀耳味者獨治其外而致腐潰翻突反成他患盖自取之也殊不知此屬

肝經血燥宜清肝滋腎如逍遙散清肝益榮湯柴胡清肝散之類不可不服外用擦藥不數劑自平矣

磨堅丹

取雞真肉黃皮不下水止去渣滓擦數次自消其皮即埋土內以物壓之

一法但聞老鷹即振雞者叫即暗以手拂其疣三下數次自消

一法以鹽傳上舌甜三次即脫

點痣藥

糯米

百粒

石灰

大指大一塊

巴豆

三粒去殼

右為細末入磁瓶同窰三日以竹簽挑粟大一此點上自然蝕落

汗斑第九十五

一方牙皂雄黃半夏川椒萹澄茄白附子各等分硫黃信少許為末醋調布擦三次見効

一方海鰾鮓參個硫黃白礬焰硝各參錢為末以生姜醋擦患處立効

一方硫黃白附子等分為末生姜汁拌勻茄蒂擦患處

一方姜一塊剉孔入信壹錢溼紙包泥固封火煨切
開取信擦患處

一方硫黃壹錢芫蔚子葉參錢蜜陀僧雄黃各貳錢
俱爲細末燒酒調勻生姜蘸擦患處

一方夏枯草濃煎水日洗數次

一方雄黃白礬代赭石各等分白附子白丁香減半
爲末雞子清調刷粗布兩面上晒乾洗浴後用以
擦患處

體氣第九十六

體氣又名狐臭以其氣之相類而名也無痛無痒不

膿不血人故渺之但爲人所厭耳醫方中罕載丹
溪心法有六方亦不言所致之因按二腋屬手厥
陰心包絡經係極泉血之處凡臭者必有細眼又
云必是油耳所傳舊方未必的中病因悉用擦洗
之藥殊失抽薪止沸之義原夫五臭皆屬心之所
主而臊臭獨出于肝必也瀉心肝二經而用柴胡
草龍膽車前子黃連之類庶標本不至于偏廢云
丹溪六方

一方用礪砂蜜陀僧明礬銅青白附子辰砂各等分
爲末先以皂角水洗二三次後傳此藥不過二二三

次全愈或加黃丹水銀以白梅肉爲丸擦之

一方礪砂五分蜜陀僧銅青白附子各壹錢白礬貳錢辰砂七分爲末夜淨時先用皂刺煎水洗淨又以皂刺煎濃汁調前藥搽擦兩腋至七日將大甘草壹兩煎濃汁食後服之外用甘遂末四錢猪油調搽腋下晝夜拔出身內臭物再將枯礬壹兩蛤粉五錢樟腦壹錢爲末每以少許擦之永去病

根

此方近理

一方黃丹蜜陀僧明礬等分爲細末以熱蒸餅蘸擦一方用田螺一枚水中養之俟其口開以去殼巴豆

壹枚置於螺內拭乾平放夏月一宿冬月五七宿

自然成水搽患處可以除根

此方恐未必然

一方先用胭脂搽腋下患處必黃色如前製田螺去

靨掩於臭處絹帛緊勒其毒從大便出矣

此方恐未必然

一方用熱蒸餅一個劈開摻蜜陀僧末壹錢乘熱夾在腋下略睡少時餅冷棄之卽除根

雜傳八方

一方用蜜陀僧壹兩皂礬柒錢礪砂麝香各少許爲

細末皂角煎湯洗後敷上神効

此方用麝香合宜

一方用夜明砂爲末豆豉汁調塗立効

一方洗淨腋下以輕粉末摻過又將好銅青醋調成膏塗上立効

一方以黃泥赤石脂搗羅極細入鹽少許杵爲一窠入大蜘蛛一個做合火煨通紅放冷剖開將蜘蛛研細臨臥入輕粉一字醋調成膏敷腋下明日登厠必瀉下臭穢之物如墨汁相類空埋遠處方不染人

一方用去殼巴豆一粒豆大膽礬一塊麝香少許各爲細末取田螺一個水養去泥揭起靨入三味於內以線縛住放磁器內次日化成水五更自以其水不住手擦患處直待腹內行動卽藥之効也在空地大解極臭黑糞以土掩藏如尚不盡再加前法螺水搽盡又以枯白礬壹兩蛤粉五錢樟腦壹錢爲末研勻常搽少許

一方水銀壹錢貳分甘遂五錢白芷五錢猪脂一塊糯米一撮研爲麪同水銀等研至不見星洗浴換去舊穿臭氣衣搽患處立効以後忌葱蒜

一方用白礬銅青水銀鉛各三錢麝香三分先將鉛溶化在粗碗內入水銀研成粉後入白礬銅青麝香研爲極細末洗浴後擦數次極効

一方五月五日採有露水草百種陰乾燒灰用井水
和成團復煨至白研為細末醋調作餅夾腋下乾
而又易直待腋下覺痛或瘡出乃止以小便洗之
三度而愈

浸淫瘡第九十七

浸淫瘡初如疥搔之轉生汁相連着者是也運氣浸
淫皆屬火多起於心

升麻湯 治心內風熱生浸淫瘡

升麻

大黃 炒

黃芩

枳實

白芍藥

各壹兩

當歸

甘草

各五錢

右每服五錢加燈心一握煎服

香辦瘡方

治面上耳邊生浸淫瘡出黃水不止

殺羊鬚

荆芥

乾棗

去核各貳錢

右燒灰存性研勻入膩粉五分同研細末每用少
許清油調搽先以溫湯洗淨拭乾塗藥又治大人
小兒兩吻生瘡

一方以猪膽汁調蘆薈塗之膿水即乾

一方以雞冠血和黃連末敷之日三四次

一方用伏龍肝七錢五分亂髮燒七錢五分以猪脂
調塗

凍瘡第九十八

凡凍傷之人不宜卽置煖處嘗見嚴冬大雪時口外
走回被擄男婦一人坐熱坑卽死一人坐草地上
卽生一人以新汲井水浸二足漸至回煖無恙一
人以溫水浸二足後俱潰脫其將死之人惟以布
囊盛沙溫灰熨心坎亦有得生者稍過於煖則危
矣至於因凍成瘡者所錄十方皆平時稱効者各
從其便以用之自無不可惟戴人之心火降則寒
消自非醫之神者不能言後之効輦者恐不能無
誤也

一方治凍瘡用淡酒溫洗雀腦塗之

一方取野外淨土與大蒜同研照瘡口大小作餅如
錢厚以艾灸之泥乾再易不拘艾數以知痛痒爲
止然後口含熱水吐瘡上以雞翎刷淨軟帛拭乾
用生肌藥敷之膏藥亦可

一方煎桐油調蜜陀僧搽

一方凍瘡痛者橄欖核燒灰存性爲末香油調塗

一方五倍子煎湯洗

一方凍瘡皮爛痛不可忍用大黃不拘多少爲細末
新汲水調敷瘡上立効

一方茄根濃煎湯洗

一方冬瓜皮乾茄根二味煎湯熱洗不三四次即愈

一方取雄鼠油煎至爛去粗再熬成膏塗之

一方羊糞焙乾爲末清油調搽

一方瀝青末貳兩黃蠟壹兩香油貳兩溶和一處搽
一戴人醫一女使足上凍瘡與服舟車丸濬川散大
下而愈或疑而問答曰心火降則寒消何疑之有
此醫法之異者故附錄

漆瘡第九十九

聞漆氣而成瘡者其方不一因驗錄之惟乘便擇用
斯不至於束手矣

一方芒硝泡冷洗又貫衆煎湯洗又川椒煎湯洗又
韭菜水洗又乾荷葉壹斤水壹斗煮貳升洗

共五方

一方蟹黃塗又人乳汁敷又銀朱點患處又龍泉粉
塗之又羊乳汁塗又椰漆刷患處又生紫蘇摩擦

共七方

一方白礬煎湯洗又杉木煎湯洗

金瘡第一百

凡臨陣致傷輕重不同集載諸方皆治其外者莫非
南北陣中已試之法以塗抹固無不可但交鋒之

人呼吸生死兼之被傷神思不免迷亂若出血過多因至昏憤者則大劑參耆歸朮芎地之藥必要多服安得專治其外而忘其內哉若至變證又當於惡候各條參酌焉

少保戚公保赤膏 治金瘡

當歸 生地 熟地 劉寄奴

合權木皮 男子黑髮 洗淨各壹兩 乳香

沒藥 血竭 各五錢 黃蠟 白蠟 各八錢

龍骨 煨童便漬壹錢

右用麻油八兩煎前六味至髮溶盡濾去粗復油

入鍋下二蠟不住手攪離火仍攪至溫將乳香等四味極細末細細投之攪勻候冷收磁鉢臨陣携之遇有傷者塗之傷處以帛包裹不可見風

生金散 治刀斧初傷

用千年石灰研細六月六日搗韭汁拌成餅陰乾收貯臘月復研細以牛胆汁拌勻裝入膽中懸挂陰乾臨陣時每灰六錢血竭四錢研極細遇有傷者雖皮開肉裂敷之包裹罔不即聯

定痛乳香散 治金瘡并傷折打撲

乳香 沒藥 各貳錢 敗龜板 壹兩 紫金皮 貳兩

當歸稍五錢 骨碎補五錢 虎骨酥炙五錢 穿山甲火炮貳錢

半兩錢五枚火煨醋淬

右為末每服壹錢甚者貳錢好酒下分上下部服

鼠灰散治金瘡

陳灰六兩 大黃壹兩 童子髮灰 乳香

沒藥平石入蒲黃略炒各參錢

右石灰大黃同炒至石灰紫色為度研為細末和

勻取未眼開小鼠搗極爛和藥又搗極勻為餅布

包懸挂陰乾不拘刀斧鎗箭所傷研末敷之如神

以上三方金瘡之極効者

蚕蛾散治刀斧傷止血定痛生肌一上即愈

晚蚕蛾 白芷 當歸頭 陳石灰

右各等分為末敷傷處即愈

王不留行散治金瘡

王不留行八月八日採 蒺藜細葉七月七日採

桑根白皮三月三日採向東南行者俱陰乾百日用 甘草各壹兩

黃芩 川椒除目及開口者出汗 乾姜

白芍藥 厚朴

右前三味燒灰存性與甘草等各自研細和勻傷

輕止用乾摻傷重服四五錢酒調

洗藥

桑白皮

荆芥

黃連

黃柏

當歸

白芷

赤芍藥

連翹

生地黃

右水煎洗

麻藥

川烏

草烏

南星

半夏

川椒

右為末唾調搽

一方風化石灰同嫩韭葉搗勻入鷲血為餅陰乾為

末敷之

一華陀方降真香為極細末敷

一方用舊氈帽燒灰研細敷

地黃散

止血除疼痛去風續筋骨生肌肉

地黃苗

地松

青蒿

蒼耳苗

赤芍藥

搗自然汁為妙如無青苗各以枯者五兩剉碎煎取濃汁

生艾汁

三合

右於端午七夕將前汁拌陳石灰末八兩并洗淨炒過黃丹三兩同杵極勻陰乾遇有刀斧傷及折傷出血不止者用藥包封不動十日全愈且不腫

不潰

蒲黃散 治金瘡血出不止腹脹

蒲黃

生地

各壹兩五錢

黃芪

當歸

芳藜

白芷

續斷

各壹兩

炙草

右為末每服三錢空心酒下日三四服血化為水而下口噤者幹開與之

一方用男子黑髮燒灰為末摻上

一方晚蚕蛾炒為末敷之立愈

一方桑白皮四兩蜜陀僧二兩烏魚骨白礬灰煨過

龍骨各五錢洗淨炒過黃丹貳錢五分研末敷上

定血如神

一方用五倍子真降香各炒為末摻之

一方用半夏石膏鬱金為末摻上立止

箭鏃入骨

湧鐵膏

取箭頭及針刺入肉

鼯鼠頭

一個入油內熬

土消虫

十個

芫青

螻蛄

四十個

巴豆

信

馬肉內蛆

焙乾

醬蛆

焙乾

夏枯草

礪砂

磁石

黃丹

地骨皮

蘇木

蟻螂

各壹兩

石腦油

叁兩

蒿柴灰汁

叁升

右為細末將石腦油蒿柴灰汁文武火熬成膏入各

末攪勻磁瓶收貯遇有箭鏃入骨者以藥貼之良久自出

神應丹

出箭頭魚骨針麥芒等急患

葇宥科

即天仙
子苗也

右預於五月初四日持不語戒尋見此草擇枝葉實俱全者一窠即口道先生你却在這里道罷用柴灰自東南爲頭圍了用木籤橛起周圍土端午日未出時仍持不語戒往彼以木橛一橛取起水中洗淨不令婦人雞犬見持回淨室在石臼內搗如泥丸如彈子大或黃丹爲衣紙袋封懸高處陰

乾遇有箭頭不出者先以象牙末貼瘡上後以緋絹盛一丸放臍中用綿裹肚束定若瘡口生合以刀微刮破其鏃自出醫學綱目載此藥曾用有功文治按象牙末敷諸刺入肉者殊有神効天仙子則未聞其有出刺之功然箭鏃入骨槌鈴不能施其力牙末亦能無如之何此蓋借牙末之効以行天仙子之秘法耳

一方孫真人治箭鏃在咽喉胸膈不出者以螻蛄搗取汁滴三五度自出若在他處以螻蛄搗爛塗傷處立出

一方箭鏃不出以牙垢和鶴虱末敷之
一方以巴豆肉微炒與蜚螂虫研勻塗傷處痒極拔
出亦有止用蜚螂虫入麝香同研用者
一方治箭傷以女人月經或經布燒灰敷傷處卽愈
一方拔箭無血其人將死活取手心割一口子對傷
口吸住其血卽流

中藥箭

一凡交廣夷俚用焦銅作箭鏃纔傷皮肉便覺悶膿
沸爛而死惟服糞汁并塗可治愚意以爲用人中
黃或亦効

一方箭鏃中人者用藍汁大豆猪羊血解之

一方以靛青煎水服不死

一方以樟木煎水服不死

刀箭傷指將落

一方戰傷指頭皮聯未落用沉重蘇木爲細末敷斷
指間外用蚕繭包裹數日如故

一方戰傷腸出不損者急送入以生白麻線縫合肚
皮摻藥卽活不可包裹反作膿血舊方用桑白皮
作綿縫之以熱雞血塗上

骨哽第一百一

諸物之骨逆於咽喉不能吞吐勢誠急矣後開之方固皆已効者設或不効無如以物制物雞骨用狗涎魚骨用猫涎又如稻芒用鷺涎點入喉口甚近于理其他符呪又極簡易故並錄以俟用者取焉

砂糖丸 治魚骨哽

砂糖

白炭灰

紫蘇葉

滑石

各等分

右共為末和丸如芡實大含口中以唾津嚥下骨即下

野狸丹

治骨哽

野苧根

右洗淨搗爛如泥用龍眼大一塊隨所傷何骨即以其物作羹送下

倒拔龍

治魚骨哽

縮砂

甘草

各等分

右為末綿裹少許口噙徐徐嚥津久之隨痰吐出

釣鰲丸

葳靈仙根

右一味不拘多少釀醋浸二日晒乾為末醋糊為丸如梧桐子大每服一丸或二丸半茶半湯送下如覺要吐用砂糖銅青為末共半匙滴油一二點

同茶湯調服卽吐出原物如藥性來遲令患人兩
手伏地用清水一盆鷺翎攪亂卽吐出

化骨丹 治骨哽

山查樹根 向下者與玉簪花根同搗汁用竹管

直灌入喉中不可着牙着牙卽化

三仙湯 治骨哽

縮砂 葳靈仙 各壹錢 五分

右用無根水二鍾入砂糖半碗煎一鍾噙在口中

慢慢呷下四五次卽出

蜀仙丹 治骨哽 秀水人在蜀中遇仙得傳此

穿山甲 錢壹 金毛狗脊 錢壹 礪砂 錢壹 血竭 各五錢

磁石 自然銅 青礪石 龍骨 各壹錢

右爲細末黃蠟丸如桐子大朱砂爲丸先吃冷茶
貳碗後以茶送下二丸卽時吐出如遲以鷺翎攪

之

神仙鈞骨 骨隨藥出如神

朱砂 丁香 各壹錢 血竭 磁石

龍骨 各五錢

右爲末黃蠟三錢熔和各藥爲丸朱砂爲衣香油
煎好醋吞下

烏龍丹

治諸骨鯁垂危者

良方

烏梅肉

五倍子

取淨

貳味共打成膏丸如龍眼大含之或加礪砂一味此方驗過

治骨鯁

良方

倒提龍白者止取其尖研細糲為丸辰砂為衣吞下骨同藥出

一方取新汲水一茶鍾刮哽者大手指甲屑少許入水中吃下骨即化

一法取新汲水一茶鍾左手執定右手食中指空畫龍字七個令鯁者飲之骨即下

呪水治骨哽

用此呪水可以吞鐵鍼竹木刺

淨器盛新汲水壹盞捧之面東默念云謹請太上東流順水急急如南方火帝律令勅一氣念七遍即吹氣一口入水中如此七次以水與患人飲之其骨即化

骨哽神符

凡遇骨哽行法之人正面朝東放卓一張以淨器取水半碗在手執着呪云此碗化為東洋大海咽喉化為萬丈龍潭九龍歸洞吾奉太上老君急急

如律令勅念畢吸東方生炁三口吹入碗中放在
卓上左手執拿在胸前右手執劔訣在碗上書

黿 雞骨書此



鰓 魚骨書此

鰓 鰓 鰓 鰓 鰓 鰓 鰓 鰓 鰓 鰓

以下八字諸骨通用

鰓 猪骨書此

湯火傷第一百二

凡為湯火所傷者有重輕之別輕者治宜在外先用
鹽末摻之則肉不壞重者必內外兼治內用黃連
解毒湯度毒不內攻雖危而可倖生但此皆卒然
遭遇未有不為之耗散元神者涼血解毒劑中安
神之藥所不可免也

東垣保全救苦散

治火燒及為湯油所傷至脫肌肉者

生寒水石

大黃

火煨

黃栢

各等分

右為極細末麻油調乾摻臨時酌用

東垣獨勝散

湯火所傷破爛疼痛

生白礬

右為極細末芝麻油調敷破處

黑白散

治火燒皮爛大痛

寒水石 生

牡礪 燒

朴硝

青黛

輕粉

各等分

右為極細末新汲水或香油調塗其上立止

解毒行血膏 凡為湯火所傷肌肉既爛血必不行血既不行毒何從解宜酌用此膏

當歸 劉寄奴 頭髮 淨洗 生地黄 各壹兩

右用芝麻油六兩銅鍋內煎四味至髮溶藥黑濾

粗入白蠟八錢不住手攪候藥稍溫下生寒水石

煨大黃嫩黃栢生白礬各一兩輕粉貳錢俱為極

細末攪至藥冷埋土內出火毒收候患者塗之

清涼膏 治湯火傷解毒潤肌

梔子仁 黃連 白芷 各貳錢半 生地黄 貳兩

葱白 十莖 黃蟾 五錢 麻油 四兩

右以藥入油熬焦黑色綿濾去粗却入黃蠟慢火

再熬蠟傾出磁確收之用時以羽搵少許塗瘡

一消毒散可治湯火傷方見摻藥條

一凡湯火傷急宜向火炙之雖一時極痛少頃即止

若誤用冷物及塗以井底泥熱氣不出爛入肌肉

一凡火燒以好酒洗用研細鹽傅於上皮塌者以酒

熬牛皮膠敷之

一方以青槐枝一兩綠豆粉一兩炒黃輕粉一錢同

為細末油調

一方用當歸四兩生地一兩麻油四兩熬二味枯焦

去粗加黃占五錢白占貳錢半溶化作膏貼

一方用蛤蜊殼燒灰研細油調塗日三次

一方用丹參八兩爲細末調以羊脂貳斤煎三五沸敷之

一方用雞子黃熬油調胡粉敷之

一方治湯火傷以臘酒洗以拔其毒後用雞子十枚煮熟去白以黃煎雞油約一杯研大黃末二兩勻調敷之二三日全安

又雞蛋油同人髮一團同熬俟髮化將油敷小兒熱瘡神効

一方用未開眼鼠與秋葵花香油內同浸用時搗爲膏敷

一方以劉寄奴爲末油調敷或以糯米漿掃患處而以乾末摻上

一方湯傷用大麥燒灰壹兩綠豆粉壹兩炒黃片腦三分各爲細末香油調敷

一方火燒肉爛用榔樹皮一斤細茶四兩白水十碗煎極濃黃兼紅色去粗候冷將鷲翎蘸水不時掃上五七次住痛三五十次卽愈脫去粗皮其口自合若遍身燒爛恐火毒攻心將此藥水飲一二碗

一方以墻上白螺螄煨灰乾摻或香油調敷名白雲散

杖瘡第一百三 附夾傷

杖瘡之患本屬外因治法宜無不同矣然人之膽氣有勇怯稟賦有壯弱懷抱有開鬱敷貼之藥雖可同調理之藥則少異然亦不外乎大補氣血初杖者行血解毒三日後托裏排濃懷抱抑鬱者用香附開之有瘀血者以雞鳴散下之氣血虛弱者而有瘀血則以花蓋石散消之至於証候之變大略似癰疽之惡候參酌而用自是適宜矣

丹溪曰杖瘡痛用黃栢生地黃紫金皮敷此皆要藥也只是血熱作痛用涼血去瘀血為先須雞鳴散之類也

大抵虛弱者必以大補 主有鬱者必兼開鬱母膠泥於行血解毒也每見所傳之方率多附會但用珍貴之藥自奇考諸本草全與杖瘡無干今悉改

削

行血解毒湯 治初傷

人參 虛弱者倍之 白朮

黃耆 當歸尾

生地黃 熟地黃 各壹錢 羌活 獨活

川芎 白茯苓 陳皮 炙甘草 各八分

金銀花 錢貳 蘇木 紅花 各五分 杏

桃仁 各去皮尖及雙仁 各五分 俱研如泥 乳香 沒藥 各壹錢 俱研末

右水煎成入好酒壹盃童便壹盃以桃杏仁泥乳

沒末用藥汁調膏以藥送下粗再煎杏仁等四味

或分二服或另加一倍可也

散血瓜婁散 治初杖

黃瓜婁 一個 忍冬藤 乳香 各壹錢 蘇木 五錢

沒藥 參錢 甘草 貳錢 右水五碗煎至二碗分三次隔湯頓熱加童便一

盃服一日用盡粗為細末酒糊丸朱砂為衣服

乳香散 治初杖神効

乳香 沒藥 各三錢 茴香 四錢 當歸尾 五錢

自然銅 醋煨七次 貳錢 右為細末每服五錢温酒調下

乳香膏

大黃 黃連 黃檗 黃芩 各參錢

乳香 沒藥 另研各壹錢 腦 少許

右為末研勻冷水調攤緋帛貼之

椒鱉丸 治初杖消血散大有神効

胡椒八兩

木耳灰六兩

歸尾六兩

土鱉虫一百廿個

乳香

沒藥

杏仁

杏仁

髮灰

血竭各壹兩五錢

自然銅醋煨柒次貳錢

右為末另用胡椒三兩者煮濃汁調麵糊作丸如梧

子大每責十板服貳錢熱酒送下輕責者不必用

此方允空

胎骨散治初杖

胎骨灰貳兩

黃麻灰

紅花各壹兩

乳香伍錢

沒藥伍錢

血竭伍錢

胎髮灰伍錢

自然銅醋煨七次

杏仁去皮尖

桃仁去皮尖各貳錢

半黃五分

右各為細末每責十板用二錢好酒送下

八釐丸治初杖及夾傷

土鱉虫壹百個頭足俱全紙包焙燥參錢

硼砂甘草汁飛過四錢

沒藥參錢

血竭參錢

乳香參錢

當歸梢

自然銅

煨紅醋淬七次參錢

無名異參錢

巴豆十五粒去皮膜

心壓去油

右為末酒糊為丸溼重壹分乾重八厘諒所責之

數不過五丸

牡鼠丹治初杖

活雄鼠一隻

右活搗加乳香沒藥無名異自然銅煨極細末各五分敷上神効但恐活鼠未易得耳

石灰散 治初杖

陳石灰 八兩 黃栢末 壹兩 商陸根 去筋淨末貳兩

右爲末和勻油調敷

血竭散 治初杖

血竭 四兩 大黃 壹兩貳錢 自然銅 醋煨七次參錢

右爲細末和勻以生姜汁調塗

芸臺散 治夾傷惡血在骨節間

荆芥 藕節 陰乾各貳兩 馬齒莧 陰乾 芸臺子

芒硝 各壹兩

右爲細末每用蘇木五錢敲碎煎酒調服貳錢

一方初杖以韭菜同葱白搗爛炒熟貼傷處冷則頻

易

一方初杖以野苧根同鹽搗爛敷瘡上傷重多用鹽

一方初杖後以酒和童便飲二三鍾免血攻心仍用

豆腐煮熟切片貼於傷處冷則再換以紫黑散盡

爲度

一方以劉寄奴末六錢馬鞭草末四錢相合再研極

細蜜調敷傷處溼者乾摻

一方用老鴉藤搨根下大槌搗汁和酒服一二碗神妙

一方以柘蛇膽在傷處磨搽頃刻血散

方夾傷以初出地葱煨熟劈開取其涎頻塗傷處
夕以葱搗爛炒熟食之

一方夾傷以小蝦蟆四五個皮硝三分生姜一兩酒糟一碗腫者加紅肉消同搗爛敷傷處

一方夾傷以飛麵同山梔末拌勻水調敷傷處外護以紙死血自散

一方夾傷用綠豆粉炒令紫色以熱酒或熱醋調敷傷處如神

一方夾傷用小麥麵鍋煤各五分狗頭骨乳香五倍子各壹分為末熱酒調敷傷處破者不可用重者加天靈蓋末少許

一打傷宜雞鳴散夾傷宜補骨散

俱方見跌撲條

行血救骨膏

治初杖行血散毒以至腐肉去盡

當歸 六兩

金銀花 六兩

棗仁

杏仁

續斷

天名粉

蘇木

紅花

天花粉

劉寄奴 各叁兩

白芷

大黃

荆芥

白朮

敗醬

沙參

黃連

黃栢

黃耆

丹參

木鱉仁

皂角

南星

三稜

蓬木

牡丹皮

露蜂房

生地黃

熟地黃

姜黃

連翹

澤蘭

大楓子仁

羌活

赤芍藥

草麻子

白芨

白欵

五靈脂

兩頭尖

白芍藥

苦參

紫金皮

地榆

射干

烏藥

川芎

五加皮

各貳兩

阿魏

乳香

沒藥

血竭

蒲黃

生用行血消腫各五兩

麝香

通竅導引壹兩

右用芝麻油五斤煎當歸等四十八味至焦黑濾去粗稱淨油每斤入淘淨炒過黃丹八兩如法成膏俟溫入阿魏等五味細末膏冷方下麝香

四色膏藥

方見膏藥條

生肌保膚膏

杖瘡腐肉去盡肉珠漸生用此生肌止痛

當歸

熟地黃

白朮

黃耆

白芍藥

川芎

白芨

白欵

草麻子

白芷

金銀花

天花粉

合權皮

各六兩

男子髮

四兩

白蠟

黃蠟

各六兩

乳香

沒藥

血竭

赤石脂

醋炙七次

龍骨 煨

沒石子

各參兩

麝香

參錢

右當歸等十五味為咬咀乳香等各為極細末以芝麻油貳斤煎十五味至焦黑濾去粗如法下丹成膏入二蠟膏温入乳香等六味膏冷入麝香

諸毒咬害第一百四

諸毒虫所傷無如南方灰裡鞭赤練等蛇能殺人服藥固多妙方不若灸火之効為速文治昔參將燕河一尖哨口外為蛇所傷目即不見倉卒無藥用隔蒜灸法痛止目明試之蝎螫亦能止痛由此益驗灸火之功為大也雜集諸方皆諸家所稱効者各因其傷而錄之用者擇焉

關毒丹

治蛇蝎蜈蚣惡犬傷

細辛

白芷

各四分

雄黃

貳分

麝香

少許

右為細末好醋調服

逐毒丹

治蛇虫傷

貝母參錢為末酒調敷傷處然後盡醉一飲毒自傷處流出流盡仍以餘末敷上

一治蛇咬蝎螫不拘何物所傷預辦雄黃三錢信一錢皂角子巴豆各四十九粒耳塞麝香各少許於端午日持齋屏人不語研為極細末以杏核劈開

收貯仍閉合凡遇傷者敷之大有神效

一方端午日以白礬一塊自早晒至晚收之凡遇百

虫所傷敷之神效

一凡為惡虫咬以油浸紫草塗之

一凡為惡毒蛇咬及中射工砂虱等毒一時眼合口

禁手足僵直及毒攻心腹頃刻不救急用蒼耳嫩

葉一握研取汁温酒攪和灌之將粗厚罨傷處

一方凡為諸毒所傷急以白礬甘草末冷水調下

蛇咬方法十八條

雄靈散

治蛇毒所傷昏悶欲死者此為神方

雄黃

透明五錢

五靈脂

壹兩

右為末每服三錢好酒調服仍敷患處良久再一

服

金線却毒丹

金線重樓水磨少許敷咬處仍為細末酒調服

雄黃祛毒散

治蛇傷

雄黃

五靈脂

貝母

白芷

各六錢

右為末熱酒調服

一方先服好米醋一二盃即服白芷末仍以白水調

四五錢敷傷處黃水出愈

白芷末用麥門冬湯調服

一方先用艾火灸傷處十五壯後以大黃參錢甘草
貳錢雄黃壹錢細辛白芷各柒分蜈蚣三條焙燥
麝香少許各爲末和勻作五次好酒調服卽愈
一方用半枝蓮冬青花甘草共搗碎取汁和酒服粗
貼患處甚効

一方用大青小青青木香烏相葉火炊草山蕨肌過
山龍地蜈蚣天門冬白芍藥香薷白木香各爲末
生白酒調服五錢仍以數錢酒調敷患處累効
一方絲瓜根洗淨搗研和生酒飲一醉卽愈

五神丹 治蛇咬

柏樹葉

魚腥草

皺面艸

艸决明

地松節

右等分研細敷咬處

一凡遇蛇咬服白蠟丸二錢免毒攻心

一初被蛇咬口含男子陰毛二十莖嚥其津唾毒不
入腹

一法急用麻皮縛咬處上下重者刀割去傷肉以小
便洗淨燒烙烙之後填以蚯蚓泥末次研陳石灰
末摻上以絹扎住輕者刺傷口及四圍出毒血小
便洗淨亦以麻片扎住上下灸三五壯卽愈

一法用蜘蛛對瘡口吮其毒不拘幾遍以毒消為止

仍用水一碗浸吮過蜘蛛使不傷命設遇大毒之蛇非此可療

一方用自已耳垢搽之効此亦治小毒之方也

一方用窩苣汁和雄黃末作餅子候乾為末每用少

許貼傷口立効

一方以小便洗出毒血塗以唾津封以齒垢

一方以白礬滾水泡洗

一方雄黃和生姜汁調抹効

蜈蚣咬方法十四條

一方以雞冠血調蚯蚓泥敷之愈以唾津調泥亦可

一方自已頭垢搽之立効

一方取蝸牛汁滴咬處

一方以雄黃末唾調服

一方白雞糞塗

一方用頭髮烟薰

一方以白礬溶汁滴於傷處

一方自已耳垢唾粘傷處

一方滴醋調頭垢塗傷處

一方蜈蚣入口以熱雞血灌之即出

一方取蜘蛛如上法吮毒

一法手指寫乙字將勾剔寫在傷處

一法以活雞嘴撐開布在傷處立愈

一法手寫寅字於地將臨了一點及頭上一點土撮

起擦傷處即愈

蝎螫方

凡雄蝎螫人痛在一處雌蝎螫人諸處牽痛

雄黃消毒膏

治蝎螫

雄黃

信

各五錢

巴豆

參錢

白礬

生壹兩

右為末黃蠟壹兩五錢溶開入藥攪勻為錠子如棗大用時將錠子簽于燈上炙開滴螫處立効

一方以膽礬細末槎之太効

一方塗以齒垢

一方用半夏白礬末米醋調搽

一方用南星末醋調塗痛即止

一方端午日取猫兒眼草摘斷滴白漿和熱黃蠟團

作一塊遇有螫者火上烤蠟擦之即止

一方乾姜雄黃末調搽

一方用蝸牛塗

一方用蜘蛛如上法

禁蝎并蝎螫呪法

呪曰玉女傳仙攝

勅斬蚺蜥滅

右呪如有蝎螫之人來求治者於蝎螫處取氣一口默念七遍怒着吹螫處一口其痛卽止行法之人忌五厭肉

蜘蛛咬方五條

一方蜘蛛咬其毒有能殺人者取藍汁加麝香雄黃點傷處卽愈

一方蜘蛛咬遍身成瘡用青葱葉一莖摘斷小頭入蚯蚓一條控住兩頭不令透氣化爲水點咬處愈一方蜘蛛咬一身生絲飲羊乳自愈

一方黃花蜘蛛在草間人被咬之又被露溼所濡乃成天蛇毒似癩非癩以秦皮煮汁一斗飲盡乃愈一方蜘蛛咬以鹽豆炒乾爲細末油調塗之

刺毛螫方三方

一夏間樹上虫如大蚕身上紅綠各色毛又有小點名曰刺毛其芒刺隨風飄來沾人毫孔則痛南方極多北方僅有而未見刺人觸之者以蚯蚓泥乾搽

一方刺毛螫以伏龍肝酸醋捏成團在痛處搓轉其毛皆出此法甚妙

一方以蒲公英白汁敷之立愈
蚯蚓毒

一方凡被蚯蚓毒或腹大或鬚眉皆落或腎囊腫大
或身上蚯蚓鳴其狀不一俱鹽浸洗為佳或用鴨
血塗或以鴨蛋涎塗之皆効

螻蛄咬方二條

一方以泔水浸榭葉洗瘡拭乾仍用榭葉炒灰納少
許於瘡中

一方以醋和石灰塗之

黃蜂螫方七條

一方以尿洗頭上風屑敷

一方以灰莧菜嫩頭嚼爛搽

一方用油胭脂搽

一方用生姜汁塗

一方用苦苣汁塗

一方齒垢塗

一方搗芋根敷

壁鏡咬方二條

一方醋磨大黃塗

一方桑柴灰淋汁沸三次調白礬末塗

蚕咬方二條

一方研麝香調蜜敷

一方苧汁塗

金蚕咬

一金蚕其狀如蚕其色如金故以為名醫學正傳載採桑婦人被蚕咬腹中疔痛欲死用樟木屑濃煎湯與服即大吐出金絲如亂髮者一塊腹痛減十之七八又與甘草湯連進二三盞而安

風狗咬第一百五

扶危散 治風狗咬

兒胎髮 炒

新香附

野菊花

右各研細酒調盡醉而愈

定風散 治風狗咬

南星 生

防風

各等分

右為末以口噙漿水洗淨傷處用綿拭乾摻上此為神効之方

一方木鱉七分雄黃壹錢胡椒壹錢為末酒下如已服過班猫用菜豆糯米煎湯先服方服此藥

一方用核桃殼半邊填以曠野乾人糞或乾狗糞蓋以榆皮罨在傷處以艾在殼外灸十四壯即愈永

不再發

一凡風狗咬卽以狗糞塗仍拔去頂上紅髮

一凡風狗咬用雄黃貳錢麝香五分研勻酒調服得

睡爲佳醒後利下惡物再進一服但睡時不可驚

醒

一方斑猫七個去翅足同糯米一撮炒令米焦去米

爲末酒調服小便內下狗形爲効如無再服昔文

治任通州叅將千戶葉鳳岐年六十歲止有一子

年六歲爲風狗所傷用此一服而愈

一方用糯米一勺先同斑猫七個炒至米略焦又換

斑猫七個炒至斑猫色變又換斑猫七個炒至米

起青烟爲度去斑猫俱不用止以米研爲粉以冷

水入香油少許空心調服須臾又進一服以小

便利下惡物爲効如不利再進一服利後腹痛以冷

水調靛青服之不可便食熱物

按斑猫有大毒然爲風犬所傷者非

此無以解此方去斑猫而止用炒米恐慎重之太過也

一方用蝦蟆後二腿搗爛酒調服先於頭頂上拔血

髮二三根小便見衣沫爲効

一方韭菜汁三日吃一碗四五次自愈

一方蝦蟆破開連皮腹洗淨用好醋一大碗煮熟患

者併酒服之神効

一方用兒胎髮炒香傳野菊花研細酒調服盡醉而効

一方風狗咬而作狗叫病已極矣在燒入處取頂骨燒末敷身上骨燒末水調服二匙雖煩亂者亦治家犬咬十方

凡被犬咬倉卒無藥卽以水尿洗淨以芝麻油調百草霜敷或以葱搗爛貼之牛糞敷之蚯蚓糞敷之口嚼杏仁敷之皆能救急

一方紫蘇口嚼碎塗傷處

一方杏仁去皮尖同馬蘭根研細先用葱湯洗後敷傷處

一方草麻子五十粒去殼井花水研成膏鹽湯洗敷傷處

一方舊瓦上青苔屑罨之

一方浸椒水調茵草末塗

一方用紅蚯蚓搗爛嵌入傷處立愈

一方黃荊葉搗罨瘡上卽愈

一方狗咬成破傷風以人參在桑柴上燒灰爲末敷之愈

辟惡犬法

凡遇惡犬以左手大指拍寅上吹氣一口即順拍至戌上拍定犬即退服

雜獸咬第一百六

馬咬

一方以栗子細嚼敷傷處

一方馬咬毒入心馬齒莧湯飲之愈

一方以鞭稍燒灰香油調敷溼則乾摻

虎咬

一方以生姜汁服并洗傷處白礬末敷

一方以野菜搗爛塞所傷孔中滿不必更換自然新

肉長出而愈醫學綱目載有人被咬已死用此方

活之

一方虎咬毒發而痛水煮生鐵俟有鐵味飲之痛止

熊咬亦然

一方青布緊捲燒一頭入竹筒內以烟燻瘡口熊咬亦然

熊咬

一方葛根煮濃汁洗之一日十餘次仍研葛根為散

用前汁調服二匙一日五服仍照虎咬二條

猪咬

癩科選料
雜醫
一方服雄黃酒

猫咬

一方川椒少許甘草壹錢各爲末濃煎薄荷汁調服
鼠咬

一方以猫毛燒灰入麝少許唾津調搽

一方以麝香敷包裹卽愈

一方以猫糞研細津液調敷

雜治第一百七

瘡内生咀

一方綠礬摻之卽化爲水

雞眼肉刺

一方以黃丹枯礬朴硝等分爲末浴後擦之二三次
卽愈

鍼入肉不出

一方用螻蛄腦子同硫黃研細調敷以紙貼上如覺
痒其鍼自出

一方用烏鴉翎三四條火炙焦黃色研爲細末好醋
調成膏子塗在瘡上紙蓋一二時其鍼自出甚者
以翎燒灰存性爲末調壹錢

一方用杏仁雙者搗爛以猪脂調勻貼在瘡上其鍼

自出

一方鍼折肉中用瓜婁根壹兩磁石五錢共搗爛敷之三次自出

竹木刺入肉

一方以蟻螬虫研敷立出

一方革麻子搗爛塗卽出

一方白茅根搗碎之卽出

一方嚼牛膝根罨之卽出

一方烏羊糞搗爛水和罨於傷處厚敷之曾有人脚心被刺不出苦痛欲死者黃昏敷之四更卽出而

安若刺出而痛用螻蛄搗罨妙

一方羌螂巴豆同研塗之立効

一方蘆葦刺入肉細嚼栗子罨傷處

一生象牙主諸物刺入肉凡遇此者刮取屑細研和

水敷瘡上其刺立出刺在咽中水調飲之若用舊

梳屑尤佳

一方魚刺入肉者水煮白梅肉研爛調象牙厚敷刺

處其刺自軟

走起脚泡

以生麵爲糊貼過夜卽平乾飯粘紙貼亦効

誤吞銅錢

一方以炭皮研細篩過湯調日三四服瀉下物如烏梅狀卽炭灰裏錢而出也

一方紅豆搗碎與江茶和勻湯調服

一方生茨菰汁呷飲自銷

一方悉食荸薺或核桃自銷

一方桑柴炭淘淋水綠豆粉吃下則從大便出

誤吞金銀

一方用石灰硫黃各如皂角子大一塊研末酒調服或用羊脛灰米湯下或用肥豬肉與葵葉作羹俱

効

誤吞竹木

一方用苦絲瓜燒灰酒下立消

一方用舊鋸燒紅投酒中熱飲或用貫衆煎湯呷服

誤吞水蛭

一方以泥漿水澄清飲之

一方以醃靛缸浸水飲

誤吞鐵鍼

一方用木炭燒紅急搗成灰米湯調下三盃或用艾湯調服或用蚕豆煮熟同韭菜吃下鍼從大便出

湯科選粹目錄

第八卷

跌撲傷損第一百八

接骨丹

乳沒散

當歸導滯湯

雞鳴散

失笑散

續骨丹

接丹九煉丹

人中白散

當歸鬚散

乳香定痛散

夜合散

破血消痛散

復元羌活湯

乳香神應散

巴戟湯

補骨散

丹溪接骨散

活血和氣飲

聯骨散

接骨神方

神仙接骨丹

接骨紫金丹

接骨如神丹

東垣地龍散

麻藥

整骨麻藥

草烏散

葱菴法

定痛膏

經驗方

消毒定痛散

散血膏

截血膏

活血散

一赤散

一黃散

洗藥荆葉散

接骨敷貼藥

接骨丹

消腫紫金皮散

地黃膏

消腫膏

芙蓉膏

紫金膏

退腫膏

一紫散

澤蘭散

內服藥方

疎風敗毒散

交加散

羌活乳香湯

清上瘀血湯

消下破血湯

大紫金皮散

破血藥

花蕊石散

破血消痛湯

二十五味藥

清心藥

下瘀血方

止痛藥

急救方

散血定痛補損丹

定痛當歸飲

活血順氣何首烏散

活血丹

黃末子

紅末子

黑末子

白末子

橘木四物湯

黑神散

當歸補血湯

復元通氣飲

定痛紫金丹

金瘡白藥

理傷膏

封口藥

末藥散 生肌止血立効方

丹皮散 定痛乳香神應散

單方十三條 跌面青傷 傷齒

傷腎囊 傷耳鼻 擔子傷肩

薛氏外傷分證主治論第一百九

脇肋脹痛 小柴胡湯 腹痛

加味承氣湯 小腹引陰莖作痛

肌肉作痛 創口痛 瘀血作痛

青腫不消 腐肉不潰 新肉不生

出血 瘀血流注 昏憤

眩暈 煩躁 發熱

胸腹痛悶 作嘔 嘔吐黑血

百合散 喘咳 二味參蘇飲

十味參蘇飲 作渴

膏藥方第一百十

神異膏 血竭膏 清涼膏

碧油膏 太乙膏 當歸膏

十香膏 白龍膏 東垣熱瘡膏

水澄膏 雲母膏 善應膏

長肌膏 金絲萬應膏 神聖膏

熱瘡寒膏 寒瘡熱膏 風溼氣膏

蜜膏 白玉膏 萬靈膏

遇仙膏 拔毒膏 火線膏

棒瘡膏 萬金水澄膏 萬靈膏

清涼膏 黃蠟膏 銅青膏

玄玄膏 呼膿長肉比天膏

神膏 淮安狗皮膏 拔毒膏

風氣痛膏 造化爭雄膏 消息向導丸

中和丸 用藥法 千金不易助陽膏

無價寶膏 紫金膏 阿魏膏

參藥丹丸錠子方第一百十一

鯽魚散 聖効散 檳榔散

蚣蝎散 乳香定痛散 桃花散

追毒散 翠霞散 搜膿散

引膿散 乳香散 釣苓散

白龍散 又桃花散 金黃散

消毒散 平肌散 烏金散

神僊萬應解毒丸 即紫金錠 見用藥論 一粒金丹

萬應針頭丸 針頭散 奪命丹 見瘰癧

勝金丹 寸金丹 時効針頭散

奪命丹

千金托裏散

奪命丹

去腐散

金形如聖散

金銀地丁散

桃花活血散

惡瘡錠子

解毒如聖丹

鹵水圍藥

金箍散

圍藥方

諸般敗毒散

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

瘍科選粹卷之八目錄終

瘍科選粹卷第八

繡水陳文治輯

東吳繆希雍叅校

跌撲傷損第一百八

脉經曰從高顛仆內有瘀血腹脹滿其脉堅強者生

小弱者死

金瘡出血太多其脉虛細者生數實

而大者死

破傷有瘀血停積者其脉堅強實則生虛細澀則死

若亾血過多者其脉虛細澀則生堅強實則死皆

以脉病不相應故也

顛撲迷悶者酒調蘇合香丸灌之顛撲損傷宜逐其惡血酒煎蘇木調蘇合香丸或雞鳴散或和氣飲加大黃入醋少許煎或童便或蘇木煎酒調黑神散烏藥順氣散亦可用傷損疼痛酒調琥珀散佳大法固以血之或瘀或失分虛實而爲補瀉亦當看損傷之輕重輕者頓挫氣血凝滯作痛此當導氣行血而已若重者傷筋折骨若欲續接非數月不瘥若氣血內停沮塞真氣不得行者必死急瀉其血通其氣庶可施治

損傷寒涼一毫俱不可用蓋血見寒則凝若飲冷致血入心卽死唯看有外傷者當內外兼治若外無所傷內有死血唯用蘇木等治血之藥可下者下之雞鳴散是也

亦有血迷心竅而致昏沉不知人事者宜花蓋石散童便調服有神魄散失一時不省人事者唯在臨期斟酌大抵跌撲之病全在補氣行血若自然銅之類雖有接骨之功而燥散之害甚於刀劍丹溪備言之矣

跌撲脇痛血歸肝也破血消痛湯復元羌活湯乳香神應散皆可用

凡腦骨傷破輕手搏捺平正不破者用退腫膏敷貼若皮破肉損者先用封口藥捺之外以散血膏貼之血流不止用止血散捺之不可見風恐作破傷風

凡腦骨傷損在硬處可治傷在太陽穴不可治須依上用藥若欲洗宜以煎油和藥水洗或溫茶洗之諸處法略同

面傷青黑用一紫散敷或紫金膏貼之傷重者補肉膏敷貼腦兩角及眉稜耳鼻大約同以上數法施治

凡牙齒跌磕傷損用補肌散摻及封口藥捺再服破血藥用水煎勿用酒凡傷齒未動者用芙蓉膏未摻已動者蒺藜根燒存性爲末揩捺卽固

凡手足骨折斷中間一縛可帶緊兩頭放寬庶乎氣血流蔭若如截竹斷却要兩頭緊中間放寬使氣血來聚斷處俱用定痛膏接骨膏敷貼夾縛

凡手指跌撲或刀斧打碎用雞子黃油潤之次捺封口藥外以散血膏敷貼絹片縛定咬傷者用澤蘭散敷之若有寒熱者用退熱散敷之寒熱已卽去之

凡胸脯骨爲拳搥所傷外腫內痛外用定痛膏敷貼
內用破血藥利去瘀血或用消血草搗汁酒服或
爲刀劍所傷仍用封口藥搽口外用補肌散以雞
子清調敷內服補損藥活血丹

凡胸骨筋斷先用破血藥後用定痛膏接骨膏敷貼
皮破者用補肉膏貼

凡脇筋傷重血不通者用菘豆汁生姜和服以壯力
人在後擠住自吐血後用破血藥

傷肚腸出以麻油潤瘡口輕手納入以通關散少許
吹其鼻令噴嚏其腸自入用桑白皮線向皮內縫

合後以封口藥塗傷處外用補肌散用雞子清調
勻敷貼或用散血膏尤妙線上用花蓋石散敷之
凡肚內被傷急利大小腸不可令秘恐致重患
腰腿脚骨等傷甚難整當臨時相度隨其傷處用法
整頓歸元先用麻藥與服令不知痛然後用手全
用酒佐氣血藥俱加杜仲

脚有六曰四折骨凡脚板上交胛處或挫出白須用
一人拽正自摸其骨或突出在內或出在外須用
手力整歸窠若只拽不用手整便成痼疾正後用
定痛膏接骨丹敷貼四折骨用正副夾縛六出白

只以布包不可夾手臂骨出臼與足骨同治法手足筋脉最多時時要曲直不可定放又時時看顧恐再致出窠

凡脚大腿根出臼此處身上骨是臼腿根是杵或前出或後出須用一人手把住患人身一人拽脚用手盡力掬令歸窠或是剝開可用軟綿繩從脚縛倒吊起用手整骨節從上墜下自然歸窠却用接骨膏定痛膏敷貼夾縛凡出臼急與接入臼中若血漬白中卽難治

凡手脚骨被壓碎者以麻藥與服或用刀刮開尖骨用剪刀剪去骨鋒或粉碎者去之免膿血之禍後用大片桑皮以補肉膏定痛膏糊在桑皮上夾貼骨肉上莫令不正致有差錯三日一洗勿令臭穢徐用藥治

凡骨斷皮破者不可用酒煎藥或損在內而破皮者可加童便在破血藥內和服若骨斷皮不破可全用酒煎藥若只傷而骨不折肉不破者用消腫膏或定痛散

凡皮裏有碎骨只用定痛膏接骨膏敷貼夾縛如十分傷自然爛開肉其碎骨自出然後摻補肌散外

以補肉膏敷貼

凡損傷平處骨斷骨碎皮不破者用接骨定痛等膏敷貼夾縛若手足曲直伸縮處只用包裹令時時轉動指骨碎者只用苧麻夾縛腿上用苧繩夾縛冬月用熱縛夏冷縛餘月溫縛

束縛處須藥水以時泡洗春三夏二秋三冬四日洗

去舊藥須仔細勿驚動損處洗訖仍用前膏敷縛

束縛之法用杉木浸軟去粗皮皮上用蕉葉或薄紙攤藥移至傷處杉木為夾再用竹片去黃用青為副夾疎排周匝以小繩三度縛縛時相度高下遠近使損處氣血相續有緊有寬說見前條二三日一次換藥一月之後方以補益膏貼之仍用正夾夾住令損處堅

固

凡敷貼疼痛不止可量加乳沒楓香白芷肉桂南星獨活等味令溫暖痛即止刀斧傷去肉桂南星獨活

凡換藥不可生換用手巾打溼搨潤逐片取脫隨手盪洗換上又不可停畱一時預先攤貼隨手換上凡傷重者麻而不痛須拔伸捺正或用刀開皮二三日方知痛且先勻氣

凡杖傷痛腫未破先用稜鍼刺出血若破者不必只用撒地金錢山薄荷生地黃薄荷豬鬃葉澤蘭

藥血見愁葉搗敷若成杖瘡用黑膏藥紅膏藥白膏藥太乙膏貼之

凡刀斧傷看輕重用藥輕者只用補肌散揆重者宜用封口藥揆縛住外用散血膏藥貼之

顛撲壓墜傷專怕惡心必有惡血在內先用清心藥打血藥及通利大小腸次第服之每服加童便一盃入藥立効

顛撲傷重者先服清心藥次可服清小便藥三服去血藥令血從瘡口出或結在內則打入大腸而泄或惡血未積者打入四肢或歸臟腑或歸上膈從口出或歸中膈入大腸出用此急救隨服止痛藥卽二十五味藥中加減

凡跌撲等傷先用清心藥加童便重傷者姜湯燈心湯調二十五味藥立効若發熱體實之人用疎風敗毒散惡寒體弱者五積交加散後用黃白紅黑四味末子補損丹活血丹調治

凡折骨出臼不可用下瘀血之藥及通利藥只宜疎風順氣勻血定痛補損而已

凡跌撲所傷瘀血攻心不能言語者用獨聖散及清上瘀血湯消下破血藥次以復元活血湯調理

凡傷損出血太多頭目暈眩先用川當歸大川芎煎水服次加白芍熟地續斷防風荆芥羌獨活南星煎加童便服不可用酒煎如血出少內有瘀血以生料四物湯一半加獨聖散一半皮肉未破者煎成加酒服

凡墮傷內有瘀血者腹必脹滿而痛或胸脇痛宜用破血藥清心藥及通利之劑痛不止者獨聖散効乳香沒藥極散血住痛傷損藥中不可缺

酒煎蘇木和童便服跌撲傷損單方止痛兼補宜當歸補血湯若皮肉不破損者瘀血停滯先用獨聖散次服破血藥隨宜加減

凡刀斧傷重者破處先揆封口藥或補肌散四圍用截血膏箍任使新血不潮最是秘訣

凡損傷最要補氣血初傷只用蘇木活血黃連降火白朮當歸和中補血加童便妙

老人跌墮不可轉側先用蘇木人參黃芪芎歸陳皮甘草煎服次以前藥調紅黃黑白四末子補損丹活血丹

凡服損藥不可食冷物若服草藥所生之骨必大又損藥必熱能生氣血以接骨忌用火灸

敷貼等草藥必新採鮮的為効平時採取末之聽用
傷損藥內用酒忌灰酒然重傷便用酒反承其氣作
腹脹胸滿稍定方用酒或酒水煎

小兒跌撲止用蘿蔔子煎服最能順氣 以上用藥

施治之法皆專科更要詳究薛氏分證處治法

接骨丹

沒藥

乳香

當歸

川椒

龍骨

自然銅

火煨醋
淬三次

川芎

赤芍藥

骨碎補

酒
炙

敗龜板

酥
炙

白芷

千金藤

即郁李仁
各壹錢

右為細末化黃蠟五錢丸如彈子大每服一丸以

好酒一碗化開向東南攪散熱服

乳沒散

治跌撲損傷痛不可忍

白朮

當歸

甘草

炙

白芷

沒藥

各叁錢
研勻

乳香

另
研

肉桂

各貳
錢

右為細末和勻再研極細每服叁錢温酒調下

東垣當歸導滯湯

治跌撲損傷瘀滯不行

大黃

當歸

傷在上中下部用分頭身
尾酒浸洗焙乾各五錢

右酒煎

鷓鴣散

治從高墜下及木石所壓瘀血凝積痛不可
忍並用此藥用杏仁者因血入氣故也此用

馬牙選粹

失笑散

紫雲石間

卷八

九

藥妙處

大黃壹兩

杏仁

貳拾壹粒去毛尖及雙仁另研

右研為末酒煎去粗雞鳴時服至曉下瘀血而愈

失笑散

治瘀血在內

蒲黃

隔紙炒

五靈脂

研去砂各壹錢五分

右酒煎二沸服

續骨丹

治跌傷足骨不至皮破重者一日三服不過九服便能立起旬日全愈此得之秘傳屢試

有効

老鸛腿

北方謂之本分類其叢頗似芍藥

右取梗比中指中節男左女右照指節取去心留

皮生姜三片共搗爛取汁和熱酒服睡下再吃酒

至醉取微汗為効能立起行動方止此藥

接骨九煉丹

治手足骨折

糞窖內多年丸片

南方乃有

用長流水洗淨炭火煨通

紅好米醋內漬九次碗覆於地上去火毒研末一

兩加五加皮末男子髮灰麻皮灰各五錢和勻用

好醋調每一歲一分好酒調下以身之上下分食

之前後患處竹四片竹青向肉夾定勿令擅動若

皮破者勿用摻藥

人中白散

治閃挫跌撲傷骨極重者

人中白火煨醋淬為末每五分酒調服

當歸鬚散 治打撲氣凝血結

當歸尾 壹錢五分 赤芍藥 烏藥 香附

蘇木 各壹錢 紅花 捌分 桃仁 七分 官桂 六分

甘草 五分

右水酒各半煎腰脇痛者加青皮木香脇痛加柴

胡川芎

乳香定痛散 治打撲墜墮傷損一切疼痛

乳香 當歸 白朮 白芷

沒藥 甘草 羌活 人參 各壹錢

右為末每服貳錢溫酒童便調服如血虛去羌活

人參加川芎白芍藥生地黃牡丹皮

夜合散 治打撲損傷此藥專能接骨有效

夜合樹皮 去粗皮炒 芥菜子 壹兩

右為細末酒調貳錢澄清臨臥服以粗粗罨瘡上

扎縛住

破血消痛湯 治跌破脊骨惡血流於脇下作痛

羌活 防風 官桂 各壹錢 蘇木 壹錢五分

柴胡 貳錢 連翹 貳錢 當歸稍 貳錢 麝香 少許

水蛭 參錢炒烟

右麝蛭另研如泥七味用水酒各半煎成去粗熱
調二味二服立愈

復元活血湯 治從高墜下血流脇下疼痛難忍

大黃 酒浸 壹兩 柴胡 五錢 當歸 穿山甲

瓜婁根 各叁錢 甘草 紅花 各貳錢 桃仁 去皮尖 五十個

右桃仁另研各藥俱為末和勻每服一兩水一酒

二煎服以得利為度利後痛未盡除再服乳香神

應散

乳香神應散 治跌撲後脇下痛

乳香 沒藥 雄黑豆 桑白皮

獨顆栗子 破故紙 炒 當歸 各壹兩 水蛭 五錢 炒 烟盡

右為末每服五錢醋一盞煎六分入麝少許溫服

巴戟湯

巴戟 去心 大黃 各五錢 當歸 地黃

白芍藥 川芎 各壹兩

右為末每服一兩水煎以利為度

補骨散 治跌傷夾傷神効

古銅錢二百銅絲併穿以活桑木為柴燒錢至紅

在米醋一大碗內淬之再燒再淬七八十次取碗

底沉下銅秀屑就以醋洗淨炭灰磁瓶收貯用時

以黑雄雞一隻清水煮熟去肉用骨以醋炙酥為末加乳香沒藥各壹兩為細末銅屑亦研極細和勻取患人頂心髮一縷燒灰和前末二分五釐好酒調止一服如吐再一服痛止不可再用但終身忌食葷薺但成藥止用二分五釐乳沒安用各一兩盞若用骨末一分乳沒末各六釐銅屑三釐為是或作丸臨時酒化用之可也

丹溪接骨散

沒藥

乳香

各貳錢五分

自然銅

五錢醋淬七次

滑石

壹兩

龍骨

赤石脂

白石脂

各壹錢

右為細末以好醋浸沒者煮乾炒燥臨服入麝香少許挑一小茶匙在舌上溫酒送下如骨已接而痛猶不止者去龍骨石脂多服儘好

活血和氣飲

因跌撲瘀血入內

川芎

叁錢

青皮

貳錢

炙甘草

白芍藥

滑石

各壹錢

牡丹皮

五分

桃仁

去皮尖七粒研

右水煎

聯骨散

治跌碎骨頭

天靈蓋

孩兒者焦燒存性壹兩

雞毛

燒存性七錢

右好酒調服五六分以熱手摩患處不已其骨自

合外用杉木皮夾之

接骨神方

小骨一付

用壹歲者酒燒九次每用叁錢

沒藥

乳香

各壹兩

雄黃

五分

血竭

貳錢

孩兒茶

尿臍

蛇含石

各叁錢

右為末酒調服三錢或五錢若皮破用燈心貼上
箏箬裹之夾住以沒藥摻之

神仙接骨丹

自然銅

燒紅醋淬七次

古塚銅錢

火煨醋淬

右等分為細末傷重者服一二分多服則骨突出

矣

接骨紫金丹

治跌打損傷骨折瘀血攻心發熱昏暈不省人事此藥神効

土鱉

不拘多少取來焙乾去足淨稱末壹錢

乳香

沒藥

自然銅

壹錢醋淬七次

骨碎補

大黃

血竭

硼砂

歸稍

各壹錢

右各製度為末磁罐收之每服七八釐好熱酒調服其骨自接又方加紅花一錢

接骨如神丹

半夏

每一枚對土鱉一個二味一處搗爛鍋內炒黃色用一兩

自然銅

貳錢

古銅錢

三錢二銅俱火燒紅醋淬三次

乳香

沒藥

各五錢

骨碎補 七錢 去皮

右為極細末每服三分用導滯散二錢攪勻熱酒服服藥到患處其痛即止次日再進一服仍用藥三分導滯散五分重者三服輕者一二服全愈

東垣地龍散

或跌撲或打損惡血在太陽經以致腰脊或脛膈臂股中痛兼鼻塞不通

當歸稍

肉桂

地龍 各四分

麻黃 五分

蘇木 六分

獨活

黃栢

甘草 各壹錢

羌活 貳錢

桃仁 六個 去皮尖

麻藥

凡跌閃骨出窩怕痛者先用此

猪牙皂角

木鱉子

紫金度

白芷

半夏

烏藥

土當歸

川芎

川烏 各伍錢

草烏

小茴香

坐挈草 酒煮 熟各

壹錢

木香 三分

右為末如傷重手近不得者再加坐挈草草烏蔓它羅花各五錢俱無煨製凡遇骨碎骨折骨出窩者每服貳錢好酒調下即麻倒不識痛處任意用手箭簇入骨者服此亦可鈐鑿取出後用鹽湯服之即醒

整骨麻藥

草烏 叁錢

當歸

白芷 各貳錢 五分

右每服五分熱酒調下即麻木不知痛然後用手
草烏散 治傷骨節不歸窠者用此麻之

白芷 川芎 木鱉子 猪皂

烏藥 半夏 紫金皮 當歸

川烏 各貳兩 茴香 草烏 各壹兩 木香 五錢

右為末諸骨碎折出臼者每服壹錢好酒下即麻
倒然後開皮剪骨整頓安平用夾板束縛然後醫
治或箭入不出亦用此麻之庶可鉗鑿出箭若欲
麻醒用鹽湯或鹽水灌之

葱罨法

凡跌傷出血痛不可忍乃風寒所着宜用葱杵碎入
鹽少許炒熱罨之痛即止冷則再溫之凡傷痛取
大葱新折者入灰火煨擘葱內臍汁罨傷處續續
多罨只要熱者三四易即痛止搗爛仍封損處
跌殺等傷氣未絕者取葱白炒大熱徧傳傷處頃
再易其痛自止

定痛膏 治跌撲損動筋折骨

芙蓉葉 貳兩 紫金皮 獨活 南星

白芷 各五錢

右為末生採馬藍菜墨斗菜各一兩杵爛和末相

勻用生葱汁老酒和炒熱罨縛

經驗方 治瘀血作痛及筋骨痛

黃栢 壹兩 半夏 五錢

右為末薑汁調塗患處以紙貼之如乾以薑汁潤之一日一易

消毒定痛散 治跌撲腫痛

無名異 炒 木耳 炒 大黃 炒各五分

右為末蜜水調塗若腐處用當歸膏敷之

散血膏

耳草葉 又名猪紐 又各虎 聯藤生 澤蘭葉

右各生採搗爛冷敷傷處先用金毛狗春毛薄薄

鋪于患口次揆封口藥再貼此膏四圍用截血膏

敷貼令血不潮

截血膏 治刀斧傷能化血破瘀退腫止痛

天花粉 叁兩 薑黃 赤芍藥 白芷 各壹兩

右為末茶清調勻敷瘡口四邊 若傷頭面血不

止急以此調敷頸上周圍傷手者敷臂傷足塗腿

傷各處塗瘡口周圍能截住其血令不來潮 若

瘡口肉硬不消者此被風所襲也可加獨活以熱

酒調敷如又不消則風毒已甚肌肉結實加紫金

皮和敷必消

活血散 跌打傷折

用菜豆粉在鐵銚內炒令紫用熱酒同熱醋調成膏傳貼損處用紙蓋貼以杉木一二片縛定神効

一赤散 治傷損敷藥後起泡以稜針挑破摻之

大黃 赤石脂 石脂 煨各等分

一黃散单大黃一味為末薑汁調温傳

洗藥荆葉散 治從高墜下及一切傷損瘀血凝滯

頑荆葉 壹兩 白芷 細辛 蔓荆子

桂心 川芎 丁皮 防風

羌活 各五分

右入鹽一匙連根葱五根醬水五升煎三升去粗淋洗冷即再易要避風處

接骨丹敷貼藥

天南星 木鱉子 各四兩 沒藥 乳香

官桂 壹兩

右為末姜壹斤去皮搗爛取自然汁米醋少許白麵為糊攤紙上貼傷處以帛纏之用杉木片夾定

縛之

接骨丹 治傷折出臼

身和連米 此物係打

南星 生四兩

木鱉子 參兩淨

紫金皮 芙蓉葉

獨活

白芷

官桂

松香

楓香 各壹兩

麥麩

乳香

沒藥 各五錢

右為末米醋生姜汁各三之一入老酒調勻攤貼

夾縛如法冬月熱縛夏月溫縛

消腫紫金皮散 治諸傷浮腫

紫金皮 醋炒

南星

半夏

當歸

黃栢

草烏

川烏 各炮

杜當歸

川芎

烏藥

破故紙

白芷 鹽炒

劉寄奴

川牛膝

桑白皮 各等分

為末生姜汁薄荷汁同水調塗腫處及傷處皮熱

甚加黃檗皮生地黃各五錢有瘡口者勿封瘡口

四圍敷之

地黃膏 治傷損及一切腫癰未破可以內消

生地黃 搗如泥不計數

木香 為末

右以地黃膏隨腫大小攤于紙上摻木香末一層

又再攤地黃膏貼患處不過三五換即愈

消腫膏 治胸脇跌傷腫痛或動筋骨

芙蓉葉

紫金皮 各五兩

白芷

當歸

骨碎補

獨活

何首烏

南星 各三兩

橙橘葉

赤芍藥

各貳兩

石菖蒲

肉桂

各五錢

右爲末以姜汁熱酒調乘熱塗腫用葱汁茶清調和溫縛若動筋折骨加山樟毛銀藤皮及葉各五兩同前爲末酒調暖敷縛定

芙蓉膏

治跌打傷損腫痛紫黑

紫金皮

南星

各壹兩

芙蓉葉

貳兩

獨活

白芷

赤芍藥

各五錢

右爲末生姜汁茶清調溫貼紫黑不退加肉桂五

錢

紫金膏

治腫赤焮熱

芙蓉葉

白者貳兩

紫金皮

壹兩

生採入生地黃同搗敷或爲末鷄子清和蜜勻調入生地同搗敷之

退腫膏

治一切破傷腫痛

芙蓉葉

白者

地薄荷

耳草葉

澤蘭葉

金桐葉

赤牛膝

大黃

另研各等分

右搗爛敷傷處中留一孔出氣

一紫散

治傷損眼胞青黑紫色腫痛

紫金皮

童便浸七日曬乾

生地黃

各等分搗爛茶清調勻傳餘處傷不必便製又

蓉葉生地黃同搗名一綠散同治眼傷

澤蘭散 治跌咬所傷及指傷

芙蓉葉 澤蘭葉 地薄荷 白佛桑葉

耳草葉

右搗爛冷敷傷處留口通氣

內服方藥

四季傷損脉浮緊發熱惡寒體痛屬有外邪宜發散春五積散香蘇散夏香薷飲五苓散秋正氣散冬和解散寒熱加柴胡前胡黃芩頭痛加川芎白芷脚氣加白芷檳榔木香痰加半陳等分葱白煎

服

疎風敗毒散 主治見論

當歸 川芎 白芍藥 熟地黃

羌活 獨活 桔梗 枳殼

柴胡 白茯苓 白芷 甘草

紫蘇 陳皮 香附 生地黃

右生姜煎入酒和服

交加散 宜體弱之人主治見論

當歸 川芎 白芍藥 生地黃

蒼朮 厚朴 陳皮 白茯苓

半夏 羌活 獨活 桔梗

枳殼 前胡 柴胡 乾姜

肉桂 甘草

加生姜煎有熱去姜桂

羌活乳香湯 治傷折筋骨發熱體痛挾外邪者

羌活 獨活 川芎 當歸

赤芍藥 防風 荆芥 牡丹皮

續斷 紅花 薤仁 陳皮

生地黃

右水煎有熱加柴胡黃芩

凡跌墮刀箭等傷而脇下痛不可忍屬裏證宜行瘀

血以上中下三焦別其部分上部犀角地黃湯中

部薤仁承氣湯下部抵當湯之屬下之或加小便

酒同煎 更有內加地黃當歸者有加大黃者虛

弱老人不禁下以四物湯加穿山甲煎亦有用花

藥石散加童便酒服若瘀血已行用復元通氣散

加當歸煎服

消上瘀血湯 主治上膈被傷

羌活 獨活 連翹 桔梗

枳殼 赤芍藥 當歸 梔子

黃芩

甘草

川芎

菝仁

紅花

蘇木

大黃

生地黃

水煎和老酒童便服

消下破血湯

主治下膈被傷

柴胡

川芎

大黃

赤芍藥

當歸

黃芩

五靈脂

桃仁

枳實

梔子

赤牛膝

木通

澤蘭

紅花

蘇木

右生地黃煎加老酒童便服

大紫金皮散

治跌打傷及肺肝

紫金皮

降真香

補骨脂

無名異

燒紅酒淬

七次

續斷

琥珀

另研

牛膝

酒浸炒

桃仁

去皮

當歸

蒲黃

各壹兩

大黃

溼紙裏煨

朴硝

另研各壹兩五錢

為末每服二錢煎當歸蘇木酒服

破血藥

主治皮肉不破瘀血積滯內攻不能言語發謔妄宜此攻利若皮破血流宜作金瘡止血

過多治之

柴胡

黃芩

五靈脂

枳實

當歸

赤芍藥

川芎

生地黃

大黃

朴硝

桃仁

紅花

蘇木

右水煎入童便酒服皮破血流者不用酒

花藥石散

治一切金刃箭簇打撲重傷死血瘀傷處以藥摻之其血化為水再摻血便活不痛了如損內血入臟腑煎童子便入酒少許調一大盞服之立効及一切牛舐傷或誤觸腸出不損命急內腸桑皮縫好不得封裏瘡口恐作膿血如瘡頭乾以津潤之然後摻藥婦人產後敗血不盡血迷血暈急以童便調一盞取下惡物如肝片終身不犯血風血氣證若膈上有血化為黃水即時吐出

石硫黃

兩四

花藥石

兩貳

右二味拌合先用紙筋和鹽泥封固瓦子一個候乾入藥于內再用泥封口候乾放在磚上上書八

卦及五行等字用炭一秤龍疊周匝自己巳午着火

漸漸上徹直至經宿火盡又放一宿取出細研羅

淨磁器安放依法用治

破血消痛湯

治跌傷脊骨脇痛

羌活

防風

官桂

各壹錢

蘇木

連翹

當歸

各貳錢

麝香

一字

水蛭

參錢炒令烟盡

研另

右為細末作一服酒兩大碗水一盞煎一大碗另

研香蛭二味稍熱調服立止

二十五味藥

治跌撲損傷至骨碎折筋斷刺痛並皆治之

白芷醋炒

紫金皮醋炒

破故紙醋炒

劉寄奴

川當歸

赤芍藥

黑牽牛

川牛膝

生地黄

川芎

乳香

沒藥

木通

自然銅骨不碎不用

草烏醋炒孕婦不用

木香

藿香

川烏火煨孕婦不用

骨碎補

木賊草

官桂

羌活

獨活已上各壹兩

熟地黄炒

杜牛膝各五錢炒

金刀傷挫白者去自然銅唯骨碎骨折者用之然

此方須于臨好時用之蚤用或生他故 右

為末蜜丸如彈子大每服一丸酒磨下金刀所傷

內損重者以薄荷湯或木瓜湯姜湯皆可服

清心藥治打撲傷損腹皮破傷損折重者

牡丹皮

當歸

川芎

赤芍藥

生地黄

黃芩

黃連

連翹

梔子

薤仁

甘草

右燈心薄荷煎入童便和服

下瘀血方

歸稍

川芎

赤芍藥

烏藥

蒼朮

青皮

陳皮

枳殼

蘇木

紅花

桃仁

肉桂

大黃

水煎服

止痛藥

治打撲傷損折骨出臼及金瘡破傷

當歸

牛膝

川芎

淮生

赤芍

白芷

羌活

獨活

杜仲

續斷

肉桂

茴香

八角

乳香

沒藥

各五分

南木香

丁皮

沉香

血竭

各貳錢五分

右爲末老酒調服

急救蘇合方

凡跌墜暈死急用蘇合香丸火上焙去腦麝用酒煎

蘇木調灌之

散血定痛補損丹

治諸般傷損腫痛

當歸

川芎

赤芍藥

生地

白芍藥

牛膝

杜仲

續斷

白芷

骨碎補

五加皮

羌活

獨活

南星

防風

各壹兩半

官桂

乳香

沒藥

各壹兩

南木香

丁皮

角茴香

各五錢

右爲末酒調服

定痛當歸散 治諸損傷腫痛

當歸 川芎 赤芍藥 白芍藥

熟地 羌活 獨活 牛膝

續斷 白芷 杜仲 各貳兩 川烏 炮

乳香 沒藥 肉桂 各壹兩 南木香

大蘘香 丁皮 各伍錢

右為末酒調服

活血順氣何首烏散 治跌打折傷初時宜服此

何首烏 當歸 赤芍藥 白芷

烏藥 枳殼 防風 甘草

川芎 陳皮 香附 紫蘇

羌活 獨活 肉桂

右薄荷生地黃煎入酒和服痛甚加乳沒

活血丹 打撲跌傷刀斧傷諸般風癱頑麻婦人血風

青桑炭 壹斤 當歸 牛膝 川芎

赤芍藥 熟地 黑豆 煮酒 何首烏

南星 製 白芷 松節 燒 杜仲

破故紙 羌活 獨活 蒼朮

防風 荆芥 骨碎補 桔梗

續斷 各四兩 草烏 醋煮 川烏 炒 肉桂

木鱉子

大茴

地龍

白欵

白芨

細辛

降真香

檀香

松香

楓香

五靈脂

京墨

血竭

乳香

沒藥

栗間

為末醋煮秫米糊為丸彈子大晒乾以生漆抹手
上搨漆為衣陰乾以袋盛挂當風久而不壞用時
以當歸酒磨下

黃末子

治同上

川烏

炮

草烏

醋煮炒

降香

楓香

肉桂

松香

姜黃

乳香

沒藥

細辛

各五錢

當歸

赤芍藥

羌活

獨活

川芎

蒲黃

白芷

五加皮

桔梗

骨碎補

蒼朮

何首烏

牛膝

姜黃

右為末酒調下將好之際如骨折者加自然銅一

兩

紅末子

治同上

獨活

何首烏

南星

白芷

當歸

羌活

骨碎補

蘇木

牛膝

赤芍藥

紅花

川芎

各參兩

細辛

川烏炮

桔梗

降真香

楓香

血竭

乳香

沒藥各壹兩

右爲末酒調下加法如上

黑末子治同上

雄鷄毛燒

桑炭

松節炒爲末 松心

側柏葉醋煮各四兩

當歸 牛膝

何首烏

黑豆煮酒

南星 骨碎補

熟地

羌活

獨活 赤芍藥

川芎

白芷各貳兩

細辛 肉桂

川烏炮

草烏

木鱉子 南木香

五靈脂

降真香

乳香 沒藥

楓香各壹兩

百草霜五錢

右爲末酒調下加法如上

白末子治證同上

白芷

南星

白朮

何首烏

桔梗

羌活

獨活

白芍藥

白楊皮

川芎

白茯苓

白欵

當歸

米仁

骨碎補

牛膝

續斷

川烏

細辛

肉桂

楓香

乳香

沒藥各壹兩

服法加法同前

橘木四物湯

治跌閃滯血疼痛

當歸

川芎

白芍藥

淮生

陳皮

白朮

紅花

棗仁

右生地黃煎服骨節大痛加羌獨活不止再加乳沒

黑神散

黑豆

去皮炒半升

熟地黃

酒浸

當歸

酒浸

肉桂

乾姜

甘草

白芍藥

蒲黃

各四兩

右為末每服貳錢酒半盞童便半盞煎服

當歸補血湯

治金刀跌磕所傷去血太多服此妙若皮肉不破宜作瘀血停積治

當歸

川芎

白芍藥

熟地

防風

連翹

羌活

獨活

乳香

沒藥

白芷

續斷

杜仲

右生地黃煎入童便和服不可用酒 按補血須

用參芪此止用四物乃活血非補血也况以羌獨

防芷之耗散乎用者審之

復元通氣飲

治打撲傷痛及乳癰便毒初起氣滯作痛

木香

大茴香

青皮

穿山甲

酥炙

陳皮

白芷

甘草

漏蘆

貝母

各等分

右為末每服壹錢五分溫酒下

按前方治打撲

閃到或怒氣滯血作痛之良劑

經云形傷作痛

氣傷作腫又云先腫後痛者形傷氣也先痛後腫

者氣傷形也凡人元氣素弱或因傷叫號血氣損

傷或傳寒涼之藥血氣凝結者審前條大法用溫

補氣血為善

定痛紫金丹

可吞

紅娘子

沒藥

各壹錢半

烏藥

地龍

藿香

陳皮

青皮

各貳錢五分

川烏

草烏

炮各壹兩

五靈脂

五錢

木鱉子

去殼五錢

黑牽牛

生五分

骨碎補

葳靈仙

金毛狗脊

防風

自然銅

醋淬七次各五錢

禹餘糧

四錢

右為末醋糊為丸如桐子大每服二十九酒下分

上下部服

金瘡白藥

黃檗

黃芩

當歸

赤芍藥

黃芪

丹皮

生地黃

木鱉子

黃連

地骨皮

桑皮

甘草

各壹錢五分

白芷

馬藜

稍葉

生者壹錢火煨

右桐油叁兩同煎黃色去粗再煎入細白松香壹斤慢火煎頻以柳枝攪勻却入乳沒黃丹各七錢煎數沸下火以少綿鋪紙上先着清水于磁鉢中濾藥于鉢頻頻抽洗愈洗愈白故名白藥五七日一換水養之一應傷損量大小取一塊入創口以白紙護住一日一換如筋斷加杜仲續斷各貳錢同煎收口加龍骨五錢碎了入藥打損只作貼子貼之

理傷膏

治刀撲刀斧傷

黃蠟

猪油

各四兩

乳香

沒藥

各壹兩

松節

麻油

各壹斤

右以折傷木皮壹兩搗碎入油煎數沸濾去粗入蜜陀僧黃丹慢火熬成膏次入松蠟融化再熬滴水成珠却入乳沒自然銅末攤貼

封口藥

乳香

沒藥

兒茶

當歸

杉皮炭

各壹錢

麝香

五厘

片腦

壹分

虎睛葉

壹錢如無

以葛葉代之

右各研秤合和勻入麝次入腦勻之磁器收貯一

應耳斷唇缺俱可隨方施補用此藥摻之每日輕水洗去搽油換藥

洗藥

麻藥 俱見金瘡

末藥散 刀箭藥止血定痛

定粉 風化炭 各壹兩 枯礬 叁錢 乳香 五分

沒藥 一字

右各另研為末和勻摻之

生肌止血立効方

石灰 貳升搗生地黃青蒿汁和作團火煨赤細研 狗頭灰 黃丹

芎藭 艾葉 地松

蜜陀僧 血竭

右為末遇傷處敷之

丹皮散 治跌撲閃剝傷損滯血疼痛

牡丹皮 當歸 骨碎補 紅花 酒浸

續斷 乳香 沒藥 菝仁

川芎 赤芍藥 生地黃

右水和酒煎服用林米飯乘熱罨縛患處冷又蒸

換

定痛乳香神應散 跌撲所傷疼痛不可忍并腹中痛

乳香

沒藥

雄黑豆

桑白皮

獨科栗子

當歸

各壹錢

水蛭

五錢

破故紙

炒貳兩

右為末每服五錢醋一鍾石器內煎入麝香一字服

一方旋覆根搗汁塗傷處能續筋骨

一方跌撲傷損以活蟹取肉并黃焙燥為末入傷處

續筋骨

一方用生地壹斤搗碎藏瓜姜糟一斤生姜四兩細

切拌勻炒熱罨傷處以布裹之冷則再易此方昔

年有患者取活龜將欲製藥夢龜授此方用之神

効

出醫綱目

一方治跌傷六傷旋取地中大葱火內煨熟劈開取

沉敷傷處頻頻易之仍用有涎熱葱裹纏神効

一方凡骨傷碎折用土鱉虫炙乾為末壹錢自然銅

火煨醋淬五分乳香沒藥各五分酒調服

一方未展荷葉陰乾一味為末以熱童便一小盞調

下參錢治惡血攻心名水仙散

一方骨傷碎折用土鱉虫及壁上蟾虫一個對一個

同研為末酒送下其骨自接有聲

一方凡接骨預以古爛錢投醋內浸數年愈久愈佳

用時取起於新鍋內上下用炭火煨黑色研細每用參釐酒送下重者日服二三次不痛方止

一方白香膠為末塗傷筋處以金沸草根搗汁塗筋封口便續

一方治跌撲傷骨搗生蟹極爛用滾熱酒傾入連飲數碗即以蟹粗敷患處半日間骨肉淅淅有聲自合

一方跌打傷重將危用新鮮松節敲碎煎湯服下則愈極重者次日再服一碗煎濃方可

一方跌打損傷以黃麻葉為末入白酒糟搗爛敷之

雖骨折者亦愈若無麻葉以麻子代之

一方跌撲損傷用肥皂去核搗爛好醋煮麵糊搽之跌磕面傷青腫

用茄子種通黃極大者切作一指厚片新瓦上焙乾為末臨臥時酒調服貳錢一夜消盡無痕

跌撲傷齒

點椒

錢五

天靈蓋

紅肉消

白芷

各貳錢

右為末搽動傷處即安或已落有血絲未斷搽齒齦間亦可復牢

跌打傷腎囊

一人騎馬墜落被帶鎖匙傷破腎囊二丸脫落尚
爲筋膜懸繫或以線縫外貼膏藥不三五日線爛
復脫金谿龔氏以爲治刀傷出血但敷壁錢而効
且敏遂令人慢慢托上多取壁錢敷貼破傷處漸
愈如故

傷落耳鼻

凡誤傷脫落耳鼻者急以頭髮入瓦罐內鹽泥固
濟煨過爲末以所落耳鼻蘸灰綴上用軟絹縛定
甚効

擔傷肩皮

剪貓頭上毛睡醒時以不語唾粘之卽愈

斗傷分證主治第一百九

脇肋脹痛 凡此若大便通和喘咳吐痰者肝火侮
肺也小柴胡湯加青皮山梔清之 若胸腹痛大
便不通咳喘吐血者瘀血停滯也當歸導滯散通
之如肝火之證本脉必大兩脇熱脹但令飲童便
小柴胡湯加黃連山梔歸尾紅花 又左關脉浮
而無力以手按其腹反不脹者此血虛而肝脹也
當以四物參苓青皮甘草之類治之若左關脉洪
而有力胸脇脹痛按之亦痛此怒氣傷肝以小柴

胡芎歸青皮芍藥桔梗枳殼主之此證不論受害輕重去血曾否但被扭按甚重恚怒努力傷其氣血瘀血歸肝多致此證甚則胸脇脹滿氣逆不通或致血溢口鼻而危

小柴胡湯

治撲跌所傷肝膽經火盛作痛發熱潮熱咳嗽

柴胡

貳錢

黃芩

壹錢伍分

半夏

人參

各壹錢

炙甘草

五分

右加姜煎

腹痛 凡此若大便不通按之甚痛瘀血在內也用加味承氣湯下之既下而痛不止瘀血未盡也以

加味四物湯行之

若腹痛按之不痛血氣傷也

用四物湯加參芪白朮補而和之

若下之而胸

脇及痛肝血傷也用四君子芎歸補之或既下而

發熱陰血傷也以四物參朮補之既下而惡寒陽

氣虛也以十全大補湯補之既下而惡寒發熱氣

血俱傷也八珍湯補之既下而嘔胃氣傷也以六

君子當歸補之既下而泄瀉脾腎傷也以六君子

肉菓破故紙補之

若下後手足俱冷昏憤汗出

陽氣虛寒也急用參附湯若手足冷指甲青者脾

腎虛寒之甚急用大劑參附湯甚至口噤手撒遺

尿痰壅唇青體冷虛極之壞證也急投大劑參附湯

一患者跌墜腹停瘀血用紅花大黃等藥不下反胸膈脹痛喘促薛用肉桂木香末各二錢熱酒調服而下黑血再服前所服藥而愈此因寒藥凝滯而不行故須以辛溫之劑散之

加味承氣湯 治瘀血內停胸膈脹痛大便不通

大黃 各貳錢 枳實 厚朴

當歸 各壹錢 紅花 各壹錢 甘草 五分

水酒各一鍾煎一盞服加減藥味量虛實

小腹引陰莖作痛 凡此或小便如淋此係肝經鬱火用小柴胡湯加大黃黃連山梔飲之再用養血藥不可誤認為寒投以熱劑或致二便不通諸竅出血

肌肉間作痛 凡此皆榮衛氣滯也用復元通氣散筋骨作痛肝腎之氣傷也用六味丸內傷下血作痛脾胃之氣虛也用補中益氣湯外傷出血作痛脾肺之氣虛也用八珍湯大凡下血不止皆脾胃氣脫吐瀉不食脾胃氣敗也須預調脾胃
創口痛 凡此或痛至四五日不減或一二日方痛

欲作膿也用托裏散若兼頭痛時作時止氣虛也
再兼眩屬痰當生肝血補脾氣

瘀血作痛 凡此或腫痛發熱作渴為陰血受傷宜

砭去惡血後用四物柴胡黃芩山梔丹皮骨碎補

以清肝火 凡瘀血腫痛不消以蘿蔔自然汁調

山梔末敷之或破處以當歸膏貼之更服活血之

劑 凡患處腫黑重墜即係瘀血法當重砭去惡

血看證用藥大補氣血為主十全湯補中湯八珍

湯詳前條

血虛作痛或熱渴煩悶頭暈此陰血內熱之證用八

珍湯加丹皮麥冬五味骨碎補肉桂兼服地黃丸

青腫不消 凡青腫不消須補中益氣湯加肉桂以

補氣腫黯不消須加味逍遙散以散血若焮腫脹

痛瘀血作膿也以八珍湯加白芷托之若膿潰反

痛氣血虛也以十全大補湯補之若骨髁接而復

脫肝腎虛宜地黃丸腫不消青不退氣血虛也內

用八珍湯外用葱熨法若一味行血破血脾胃愈

虛衛氣愈滯若敷貼涼藥則瘀血益凝內腐益深

難以收拾

腐肉不潰 或惡寒而不潰用補中益氣湯發熱而

不潰用八珍湯若服尅伐藥而不潰用六君子湯加當歸外皮堅黑不潰內火蒸炙也內服八珍湯外塗當歸膏凡死肉不潰新肉不生皆失於預先補脾胃耳

新肉不生 若患處天白脾氣虛也用六君子加芎歸患處緋赤陰血虛也四物加參木惡寒發熱氣血虛也用十全大補湯膿滯白而不生脾肺氣虛也用東垣聖愈湯寒熱而不生肝火動也用加味逍遙散哺熱而不生肝血虛也用八珍湯加牡丹皮食少體倦胃氣虛也用六君子湯膿穢者陰虛邪火也六味丸四肢困倦精神短少元氣內傷也用補中益氣湯夏月用調中益氣湯作瀉者清暑益氣湯

出血 若患處或諸竅出血皆肝火熾盛血熱錯行用加味逍遙散清熱養血若中氣虛弱血無所附而妄行用加味四君子湯補中益氣湯或元氣內脫不能攝血獨參湯加炮姜以回陽不應急加附子或內有蘊血而嘔吐用四物加柴芩 凡傷損勞碌怒氣肚腹脹悶誤服大黃等藥傷陽絡則有吐血衄血便血尿血等證傷陰絡則爲血積血塊

肌肉青黯此皆臟腑虧損經墜失職急補脾肺亦有得生者

瘀血流注腰脊兩足至黑宜飲童便酒砭出舊血投以小柴胡湯去半夏加山梔連芩骨碎補以清肝火用八珍湯加茯苓以壯脾胃

昏憤傷重昏憤急以獨參湯灌之雖有瘀血切不可用花藥石散內化之恐因瀉而亡陰也元氣虛者尤不可凡瘀血在內大小便不通用大黃朴硝不下者用大香肉桂末二三錢以熱酒灌之血下乃生假其熱以行寒也

眩暈有失血過多而眩者宜十全大補湯有真元不足不能攝氣歸源者用參芪茯苓陳皮芎歸熟地山藥山茱萸五味麥冬炙艸等藥

煩躁有血虛發躁用當歸補血湯或日晡發熱用四物加柴胡丹皮地骨知柏治之

發熱或出血太多或潰膿之後脈洪大而虛按之如無此陰虛發熱也用當歸補血湯脈沉微按之軟弱此陰盛發熱也用四君子湯加姜附若因亡血者聖愈湯汗不止用獨參湯

胸腹痛悶凡跳躍搥胸舉重閃挫而胸腹痛悶喜

手摸者肝火傷脾也用四君子加柴胡山梔 畏

手摸者肝經血滯也四物加柴胡山梔紅花菔仁

若胸脇作痛發熱晡熱肝經血傷也用加味道

遙散如此而不思飲食肝脾氣傷也四君子加芎

歸柴梔丹皮若胸腹脹滿不思飲食脾胃氣滯也

用六君子加柴胡芎歸 若胸腹不利食少不寐

脾氣鬱結也加味歸脾湯若痰氣不利脾肺氣滯

用二陳白木芎歸梔子青皮

作嘔 或因瀉甚或因尅伐傷胃用四君子歸半生

姜或因忿怒肝傷用小柴胡湯加山梔茯苓 若

因痰火用二陳姜炒黃連山梔 若胃氣虛用補

中益氣湯加生姜半夏 若因出血太多或潰後

六君子加當歸 因胃火用清胃散加山梔黃芩

甘艸

嘔吐黑血 因打撲傷損敗血入胃嘔吐黑血如豆

汁

芎藭

當歸

白芍

百合

水浸半日

荆芥

各貳錢

右水酒各半煎

百合散

治如上

川芎

赤芍

當歸

百合

生地黃

側柏葉炒

荆芥

犀角

丹皮

黃芩

黃連

梔子

鬱金

大黃

右水煎加童便一盃 大便利者去大黃

喘咳 凡出血過多面黑胸脹膈痛發喘乃氣虛瘀

血乘于肺也急用二味參蘇飲若欬血衄血者乃

氣逆血蘊于肺也急用十味參蘇飲加山梔芩連

蘇六

二味參蘇飲

人參壹兩

蘇木貳兩

右水煎

十味參蘇飲加法如上

人參

紫蘇

半夏

茯苓

陳皮

桔梗

前胡

葛根

枳殼各壹錢

甘草炙五分

加姜三片

作渴 若因出血過多用四物參木不應用參耆以

補氣當歸熟地養血若潰後用八珍湯若因胃熱

傷津液用竹葉黃芪湯因胃虛津液不足補中益

氣湯因胃火竹葉石膏湯若煩熱小便淋瀝乃腎經虛熱非地黃丸不救

膏藥方第一百十

神異膏

潰瘍用此解毒生肌

露蜂房

蜂多者佳

蛇蛻

鹽水洗

亂髮

用男子髮

杏仁

各壹兩

玄參

五錢

黃耆

七錢五分

右用芝麻油壹斤同亂髮于銅鍋內煎髮已熔方下杏仁煎黑濾粗然後入黃耆玄參煎一二時少頓冷乃下蜂房蛇蛻煎至純黑濾粗稱淨油每兩用飛煮過黃丹五錢聽候仍以油入鍋徐徐下丹

不住手攪待沫起烟發看油泡四邊無紅圈即離火此火候若在火一曉若待滴水成珠則軟者必須再熬終不得法若火候太過者却入少蠟添麻油略熬收入磁器出火毒用此膏神効

血竭膏

治瘡疽毒氣未盡癩惡尚存用此以毒攻毒若生肌續筋所不用也

當歸

酒洗

白芷

大黃

生用

黃連

黃栢

木鱉子

皂角

杏仁

露蜂房

男子亂髮

各壹兩

右量藥用芝麻油先熬亂髮已熔後下九味煎黑濾去粗照上法下丹膏成下乳沒血竭各五錢

清涼膏 治一切瘡瘍膿去後用之

當歸 兩貳

白芷

白芨

木鱉子

去殼

黃栢

白欵

去皮各五錢

右用芝麻油十二兩入藥煎黑去粗照上法下丹

膏成入乳香白膠末各五錢

碧油膏 止痛排膿灸後宜用

菴枝

柳枝

桑枝

槐枝

各五錢

右用芝麻油十兩煎四枝焦黑去粗照上法下丹

成膏後入乳香血竭末各五錢

太乙膏

治癰疽疔瘡癰貼之神効若內癰以此作丸用引經藥作湯送下見肺癰條

當歸膏

凡瘡疽湯火等證此膏能去舊生新補血止痛勿以其藥品易而忽之也

當歸 兩壹

淮生地黃

兩壹 黃蠟

白蠟 錢伍

右用芝麻油四兩煎當歸生地至黑濾去粗再以

油入鍋煎沸入二蠟不住手攪至冷乃勻收磁罐

候用

十香膏

治五發惡瘡結核癰癰疔瘡痔瘡用細帛攤貼若係內癰作丸如梧桐子大每服七丸食

前温酒下

當歸

川芎

黃耆

木通

白芍藥

細辛

升麻

白欵

獨活

川椒

藁本

菖蒲

厚朴 木鱉子 官桂 商陸根 各貳兩

杏仁 杏仁 栢子仁 松子仁 各伍錢

槐枝 桑枝 柳枝 松枝 各貳兩

右用芝麻油三斤入鍋熬熟方入前藥熬黑濾粗

入 猪脂 羊腎脂 真酥 各貳兩

再上火煎數沸俟猪羊脂俱化以布濾淨照上法

下丹膏成候火氣稍退入 沒藥

輕粉 雄黃 朱砂 雲母石 製

生尸角 男子髮灰 枯白礬 各細末 貳兩

再候藥溫入 沉香 麝香 各壹錢

廣木香 丁香 乳香 甘松

白芷 安息香 藿香 零陵香 各細末 五錢

白龍膏

治頭面五發惡瘡及火燒湯泡凍裂潰爛貼此能止痛生肌涼血消毒散腫退氣神効且無癢痕

白薇 白芷 白欽 黃耆

商陸根 柳白皮 桑白皮 各壹兩

右用杏子油壹斤浸三日於木炭火上煎令各藥

黑色濾去粗再上火下煮淨黃蠟八兩研淨乳香

貳兩候熔開下火不住手攪膏微冷下研細真正

輕粉五錢研細定粉八兩急攪至冷磁確收貯聽用

東垣貼熱瘡膏方

當歸身

水浸焙乾壹兩

杏仁

湯浸去皮尖壹百粒

桃枝

肥嫩壹兩寸切水洗陰乾

柳枝

肥嫩叁兩五錢寸切水洗陰乾

右用芝蔴油熬熱先下桃柳枝熬半焦後下歸杏

煎黑照上法下丹若貼寒瘡當歸易身為尾桃李

枝分兩倒過

水澄膏

治熱毒腫痛

方見圍藥條

雲母膏

治諸惡疔瘡瘍無名毒疔疽惡毒刀斧跌傷方見肺癰條

善應膏

治諸惡瘡腫毒疽癰打撲等傷瘡癰可貼婦人乳吹可服二三十丸腸癰亦服無不應効

上等黃丹

半斤飛砂

白膠香

沒藥

乳香

另研

大當歸

白芷

杏仁

大黃

草烏頭

川烏頭

赤芍藥

檳榔

乾生地

土芎

亂髮

滴青

另研各壹兩

右除乳沒外將沙石銚盛香麻油一斤浸藥一宿

慢火熬各藥焦黑再入葱白亂髮煎少時用濾淨

去粗畱下藥油兩許所濾油慢火再熬却入黃丹

柳槐條不住攪候有微烟起卽下火滴水成珠方

妙不然再熬成膏了下火俟無烟氣入乳沒白膠
 香攪勻傾磁器中將留下兩許油一併收器內以
 新汲水一桶將藥器坐于中一日一換水三日出
 火毒方用如膏硬量加黃蠟香油入膏攪勻

長肌膏

治年久諸般爛瘡

白燭油

錢四

黃蠟

錢八

香油

錢八

大楓子

去殼研五

錢

黃連

錢參

番木鱉

錢貳

黃栢

錢參

枯礬

錢參

輕粉

錢參

蜜陀僧

五分另研

右將前七味先煎去粗入礬粉僧三味拌勻俟凝
 看瘡口大小做薄餅簪穿小孔十數貼瘡日易之

鹽茶湯洗了再貼

金絲萬應膏

治跌撲損傷寒溼脚氣痛不可忍
 小兒脾疳瀉痢咳嗽不肯服藥

瀝青

貳斤半

歲靈仙

黃蠟

各貳兩

木鱉子

二十枚

去殼

草麻

壹百枚去殼

沒藥

乳香

各壹兩另研

麻油

夏貳兩春秋參兩冬四兩

先將瀝青同靈仙下鍋熬化以槐柳枝攪焦黑色
 濾起傾瀝青入水盆成塊足称貳斤再下鍋鎔開
 下麻油黃蠟蓖麻子木鱉子泥不住攪之令滴水
 成珠不粘手可扯拔如絲樣如硬少加麻油如軟
 加瀝青得法了方下乳沒二味再以槐柳枝攪數

百次濾入水盆內扯拔如金絲頻換水浸一日收
起如跌撲勢重烘膏火熱貼傷處以透骨肉為妙
連以熱水數次浴之則熱血自行小兒脾疳貼患
處泄利貼肚上

神聖膏

治一切惡瘡

當歸

藁本

各五錢

沒藥

乳香

各貳錢

白芨

琥珀

各貳錢五分

黃丹

黃蠟

各貳兩

白膠香

參兩

巴豆

十五枚去油

木鱉子

五十枚去皮

粉霜

蟾酥

各壹錢

清油

槐枝

柳

各壹百二十段

右先將槐柳枝入青油熬焦取出復下餘藥熬勿
至為瀘出却將油澄清下黃丹再熬膏成火定入
沒乳

熱瘡寒膏

當歸

壹兩

杏仁

壹百枚去皮尖

黃丹

飛炒六兩

麻油

壹斤

肥嫩柳枝

參兩五錢

嫩桃枝

壹兩俱切寸許

右先熬麻油下桃柳枝熬令半焦以綿裹當歸杏
仁同煎至柳枝焦黑為度去粗澄定抹淨銚中查
滓再上沸之旋入黃丹熬成滴水不散為度

寒瘡熱膏

與寒膏藥同只當歸用稍桃柳分兩倒轉卽是
風溼氣膏 兼治跌打損傷

川烏

草烏

各壹兩

當歸

貳兩

紅花

官桂

白芷

赤芍藥

桃仁

防風

補骨脂

穿山甲

羌活

各壹兩

右剉用麻油貳斤入前藥煎枯以布絞去渣取油
另煎滴水成珠爲度聽用

又用松香十斤煎銷以夏布濾下流於水內又沸
去小取出松香又將葱姜汁各一碗燒酒一斤入
松香內和勻略煎過方入前油慢火熬成膏住火

加乳香沒藥各壹兩阿魏壹兩麝香壹錢和勻攤
用

蜜膏

專治諸般瘡腫惡毒膿瘡溼毒瘰癧楊梅結毒下疳久不收斂者

松香

壹斤四兩醋葱汁煮過爲末篩淨壹斤

黃蠟

白蠟

各壹兩

輕粉

壹兩

乳香

沒藥

獐腦

象牙末

炒

竹蛀末

龍骨

火煨

赤石脂

醋煨

海螵硝

去殼

人中白

煨

面粉

炒各五錢

孩兒茶

叁錢

血竭

六錢

白蜜

壹兩

桐油

十三兩

右十八味先用松香溶化次下桐油次下黃白二
蠟次下龍骨五味以下輕粉次下象牙末次下乳

沒藥次下獐腦次下白蜜

白玉膏

專治諸般腫毒惡瘡膿瘡溼毒久不收斂者及湯火傷先用花椒葱白甘草煎燒猪蹄濃湯洗去惡肉用無灰綿紙作膏貼之

臘月臘日用鮮猪肥肉板油不下水不入鹽入鍋內熬去渣用磁器收貯每油一斤化開入白蠟半斤化勻又下好獐腦四兩攪勻磁器收藏勿令出氣此方傳自內府不可輕易

萬靈膏

血余兩貳

皂角兩壹

黃蠟兩壹

松香兩壹

當歸兩四

大黃兩四

玄參兩四

白芷兩貳

黃芩兩貳

生地兩四

赤芍藥兩貳

乳香錢伍

沒藥錢五

葳靈仙兩貳

蜜陀僧斤壹

飛丹斤半

赤煉

烏稍

蜂房

癩廝

油參斤料貼諸瘡

遇僊膏

治無名腫毒癰疽發背疔塊瘡瘍等症

當歸

白芷各四兩

兩頭尖卽白附四兩

穿山甲二十個

巴豆研

草麻子各壹百二十粒研

土木鱉二十個去殼

沒藥

麻油斤壹

黃丹十兩水飛炒

乳香

沒藥

輕粉

血竭

麝香

各四錢

右兩頭尖等俱剉入香油一斤內浸春五夏三秋
 七冬十日入鍋內熬白芷焦色將鍋取下溫冷用
 生絹濾去渣再文武火熬下黃丹用桃柳枝不住
 手攪滴水不散不老不嫩入松香五兩攪勻取鍋
 下冷乃下輕粉麝香血竭乳香沒藥攪勻用水一
 桶將藥傾下水中一日換水一次浸七週時去火
 力用時以滾水化開攤貼用火烘手熨膏藥上一
 百餘手出汗妙 若痢疾及二便秘貼臍中咳喘
 貼臍俞穴

拔毒膏 可膿長肉

草麻子肉 壹兩

銅青 壹兩同研

大薊汁 壹碗

豆油 春夏三兩秋冬

四兩

松香

壹斤水煮過濾淨

先將油煎滾下松香溶盡下大薊汁沸水盡下水
 缸內如絞糖法入草麻銅青絞勻以器盛之如用
 夾湯煮化攤貼

火線膏

治諸般腫毒初起三四日內一點即退

當歸

赤芍藥

三稜

蓬朮

各壹兩俱燒灰

存性

草麻子肉

十五粒研爛

乳香

叁錢

沒藥

貳錢

麝香

叁分

蟾酥

五分

血竭

貳錢

巴豆

拾貳粒以針刺燈上燒烟盡為度

右為末先將黃蠟二兩溶化入歸芍稜朮巴草用
 柳枝攪勻取出離火下乳沒麝酥蝎攪勻撚作長
 條如筋大長三寸重一錢臨用燈火上燒點焯毒
 上周圍四五十點再用煎藥消之

棒瘡膏

香油 叁斤

大黃 壹斤半

頭髮 壹斤四兩 血竭 壹兩五錢

孩兒茶 壹兩

冰片 五錢

乳香 沒藥

輕粉 各貳兩

阿魏 五錢

真珠 定粉 壹斤半

右將血竭等九味研為細末又將芝麻油熬熟將
 大黃切作片煎枯去查後入頭髮熬枯去查候滴

水成珠再加定粉又熬一刻將前九味藥徐徐下
 之攪勻為度極驗

萬金水澄膏

治一切無名腫毒發背癰疽已潰未潰即散

乳香

沒藥 用燈心撚去油

廣木香 不見火各叁錢

輕粉 壹錢

雄黃

辰砂 各四錢以上俱另為末

白芨 八兩

黃藥子 貳兩黃色者是

烏骨雞骨 貳錢

六分要白毛烏骨烏肉的一隻生刮去腿肉用腿骨晒稱如前數以火煨存性另研和內不許煮熟之用

右藥研末用冷井水半鍾以藥少許調化候藥澄
 鍾底隨以鍾內餘水濾去聽用將底藥敷紅腫處

空一頂再用綿紙貼于頂紙穿一孔以散毒氣候
紙乾將前藥水浸潤紙外勿令乾病輕一日二次
病重日夜三四次

萬靈膏

兩尖

白芷

赤芍藥

大黃

人參

黃連

白芍藥

草烏

苦參

川芎

生地

川椒

胎髮

穿山甲

熟地

槐子

杏仁

各壹兩

當歸

貳兩

革麻

壹百二十去皮

巴豆

壹百二十去皮

黃柏

壹兩去皮

香油

四斤

木鱉

五十個去皮

槐柳桃榴椿杏楮

各貳枝

右兩尖等二十二味俱咬咀如麻豆大入香油內

浸春五夏三秋七冬十日

黃香

十二兩

黃丹

貳斤水飛澄火焙七次

阿魏

沉香

丁香

麝香

血竭

壹兩

乳香

沒藥

冬參兩

木香

壹兩

右阿魏等八味俱為細末先將香油并藥入銅鍋
內熬焦將藥鍋取溫冷用生絹過淨將藥再熬下
黃丹用槐柳等枝不住手攪燒火宜慢常滴藥在
水中成珠不散入黃香將鍋取下冷片時滅火性

乃下阿魏等八味攪勻用涼水一大桶將藥投下
水中一日換水一次浸七日七夜去火力用時以
滾水化開量疾大小以真綿厚紙貼効如神

治癰疽發背瘡毒瘰癧及一應無名腫毒

諸瘡於初發一二日間用此膏貼之火烘雙手熨
一百五十餘次務要出汗其瘡即日消散如瘡出
四五日已成腫硬內已有膿亦用此膏貼之拔出
膿淨其瘡自然生肌平滿

治乾淫疥癬諸般瘙痒諸般風癩一切瘡節諸症俱
用此膏貼于臍中火烘雙手熨出汗

治膀胱腫硬肩背寒溼腰腿兩脚寒溼等痛及脚氣
穿心疼痛諸症俱用此膏貼之火烘雙手熨出汗
治男子陽痿不起遺精白濁下元虛冷女人陰痿赤
白帶下子宮冷閉及男婦赤白痢疾諸症俱用此
膏內加搗細木鱉一個貼丹田火烘雙手熨出汗
治男女五癆七傷俱貼肺膺肩井三里曲池等穴烘
熨如上

治男女痞塊用麩作圈圍痞處內放皮硝壹兩上用
重紙蓋熨斗熨紙上令內熱去其硝麩用此膏內
加搗細木鱉一個貼之火烘熨出汗

治左癱右瘓用此膏內加搗細木鱉一個貼丹田穴
烘熨患處仍服此藥三丸好酒下

治偏正頭疼男女俱貼臍內

治冷積攻心照依積症大小攤貼火烘

治舌脹用此膏貼心中肺膈并心坎下二寸火烘手
熨

消酒積酒後嘔吐轉食暗風俱用此膏貼肺膈兼心
坎下二寸許火烘手熨

治風寒咳嗽風熱咳嗽瘍病咳嗽用此膏貼肺膈火
烘手熨

治打撲血凝用此膏貼疼處如打撲虛腫火烘手熨
覺熱即止

治胸膈不止氣喘不止俱用此膏貼肺膈火熨如前

治月經不通用此膏貼陶康二穴骨上火烘手熨

治犬咬蛇傷蝎螫用此膏貼之不用手烘

又治一切四時傷寒及赤白痢疾俱貼心坎及臍中
火烘手熨

又此膏爲丸如梧子大隨病每服三丸各用後法
引下

發背瘡 冷水下

血氣未通 酒下

咳嗽 綿裏噙化

纏喉風 綿裏噙化

喉閉 綿裏噙化

風赤眼 山梔湯下

打撲傷損 橘皮湯下

腰膝疼痛 鹽湯下

吐血 桑白皮湯下

赤痢 甘草湯下

白痢 生姜湯下

產後諸疾 當歸湯下

赤白帶下 當歸湯下

清涼散 治湯溼火燒此藥止痛解毒潤肌生肉

梔子仁 白芷 各壹兩

葱白 十莖 石膏 貳兩

清麻油 四兩 黃連 去鬚

生地 貳兩 黃蠟 伍錢

右細剉於油鍋中煎地黃至焦黑色綿濾去滓澄

清却於鍋內入蠟慢火熬候蠟消傾於磁盒內用

時以雞羽搵少許塗瘡上以瘥為度

黃蠟膏 治冬月手足折裂

右用清油五錢盞內慢火煎沸入黃蠟一塊同煎

溶入光粉五倍子魚膠白芨末少許熬令稠紫色

為度先以熱湯洗火上烘乾即用藥敷以紙貼之

其痛立止入水亦不落若合藥入粉多則硬而成

塊旋以火灸動挑轉不妨

銅青膏

好片子松香一斤用淨草麻肉二兩杏仁一兩五

錢研極爛將松香化開投三味攪清用布濾在水缸內銅青二兩用醋研極細將松香和勻揉抽干遍妙矣

玄玄膏

專治男婦諸般風氣寒溼手足拘攣骨節酸疼麻木不仁走氣刺痛腰疼脇痛結核轉筋痰核血瘕痞積肚腹疼痛九種心疼小腸氣跌打挫閃損傷一切疼痛俱用姜擦貼患處

癰疽發背痔漏疔瘡癩癰便毒杖丹諸般無名腫毒頑癬溼毒賺瘡楊梅結毒已上初起未破者俱貼患處如破久者用花椒葱白甘草煎湯洗去惡肉如之日洗三四次換膏一次毒蛇風犬一切所傷惡虫及風中牙痛俱貼患處凡貼膏先用生姜

煨熱切開擦患處將膏火邊離遠烘揉貼之貼後以火烘手熨三百度為止覺皮膚發痒即揭去膏藥久則要起紅壘忌食雞鶩羊肉魚鮮椒蒜辛辣發毒之物

番木鱉

兩頭尖

石菖蒲

五靈脂

骨碎補

穿山甲

淮生地

真五加皮

金釵草

白芷稍

赤芍藥

金銀花

吳茱萸

牡丹皮

威靈仙

劉寄奴

猪牙皂角

甘松

山柰

紫蘇

蛇床子

良姜

艾葉

厚朴

三稜

降香

蒼朮

羌活

紅花

蘇木

菝葜

當歸尾

防風

麻黃

草烏

烏藥

甘草

牛膝

漢防已

藁本

枳殼

白欬

荆芥

續斷

巴豆

猪苓

澤瀉

川椒

大椒

乾姜

南星

半夏

檳榔

姜黃

乾漆

香附

藿香

前胡

蓬朮

茵陳

巴戟

石斛

常山

獨活

風藤

黃連

山梔

連翹

黃柏

已上共七十味各選道地精製洗去砂土蘆頭各
淨壹兩判碎用真正麻油十五斤浸春五秋七夏
三冬十日槐柳枝文武火熬成藥枯黑色滴水成
珠為度住火瀘去渣聽用

蒜頭

葱各伍斤

千里光草十斤

三味打碎取汁查加水煎汁慢火熬膏聽用

生姜五斤

廣木香

大川烏

北細辛

大茴香

小茴香

自然銅

面蒲黃

山茨菰

明天麻

官桂

姜蚕

玄胡

大黃

乳香

沒藥

全蝎

牙皂

雄黃

已上十七味各參兩

右為極細末聽用嫩白上好松香六十斤用醋煮過為末篩過好窰煤三斗聽用先用松香下淨鍋內溶化後下蒜頭葱頭汁次下藥油候冷定下細藥末入水缸中令人抽扯色如黑漆為度收貯大缸內以井水浸一月可用每藥片五兩用生油一斤蒸熟濾過淨油十兩每熟油一斤下松香十七兩細藥五兩煤一兩為則

呼膿長血比天膏

治諸般癰疽腫毒痔漏惡瘡便毒

瘡結毒已破者先用花椒葱白甘草煎猪蹄濃汁洗淨去惡肉貼之日洗三四次換膏一次

金銀花

合懽皮

荆芥穗

白芷稍

赤芍藥

當歸尾

淮生地

皂角刺

番木鱉

革麻子

山茨菰

金線重樓

烏梅肉

杜木鱉

紫蘇葉

骨碎補

金釵草

劉寄奴

玄胡素

穿山甲

麻黃

玄參

桃仁

防風

羌活

獨活

連翹

黃芪

白芨

蘇木

紅花

川芎

烏藥

甘草

蒼耳

南星

蟬脫

蜈蚣

五蓓

蒲黃

降香

大黃

石斛

草烏

蓬朮

半夏

肉桂

川烏

姜黃

漏蘆

象皮

黃連

黃栢

山梔

敗龜板

牙皂

川椒

白欵

蒼朮

苦參

殭蠶

杏仁

蜂房

血餘

蛇脫

雞肫皮

貳兩

已上共六十六味揀選道地精製者洗去土蘆頭

製度淨各壹兩

葱汁

千里光汁

姜汁

金燈光汁

以上四汁熬膏聽用

象牙末

血竭

獐腦

木香

各壹兩

麝香

貳錢

共九味另研極細末無聲者聽用

上好山東飛丹

貳斤水飛過炒過篩淨二十兩

上好面粉

貳斤

炒過篩淨二十八兩

龍骨

醋煨

無名異

海鰾硝

去殼煨

赤石脂

煨各四兩

共為極細末無聲者聽用

上好黃蠟壹斤白蠟四兩

菜油十三斤麻油更妙

嫩松香半斤

將藥片入油浸春五夏三秋七冬十日取出入鍋內文武桑柴火熬至藥焦油黑為度用鐵線細眼杓取出查冷定竹蘿濾過用槐枝一尺比大筋者頻頻攪之次下四味草膏次下黃占白蠟次下龍骨等四味攪次下黃丹頻頻攪之面粉用絹篩篩下滴水成珠候冷定方下乳香等九味細篩下頻頻攪之候成膏入缸內埋土一日水浸一日方可

用熬藥之時宜空閒去處切忌婦女及僧尼童穉帶孝之人及雞犬不聞之處火色太早則藥嫩太遲則老嫩則油散不成膏老則藥耗而難化切忌火發仔細如遇泛起用鍋蓋蓋之切不可澆水澆水反使火氣上衝最宜慎之每生藥片五兩用生油一斤每生油一斤熬熟藥油十兩每藥油一斤點丹六兩每飛丹一斤水飛九兩每粉一斤可炒至十四兩

神膏

治諸般腫毒跌打損傷癰疽發背俱効

唐魏六錢

麝香九分

甘草三兩

川烏

草烏 各參兩

甘賴 參兩

雄黃 參錢

硃砂 參錢

桐油 參斤

胡椒 壹兩

蜜陀僧 壹斤參兩研極細末取淨末六

七兩

先將桐油熬至三四滾下甘草以草烏甘松山賴再煎一二滾漉出查次下細藥末一滾即止

淮安狗皮膏

川芎

白芷

生地

熟地

當歸

白朮

陳皮

香附

枳殼

烏藥

半夏

青皮

細辛

知母

杏仁

桑白皮

黃連

黃芩

黃柏

梔子

蒼朮

大黃

柴胡

薄荷

赤芍藥

木通

薤仁

玄參

猪苓

澤瀉

桔梗

前胡

升麻

麻黃

牛膝

杜仲

山藥

遠志

續斷

良姜

何首烏

甘草

連翹

藁本

茵陳

地榆

防風

荆芥

羌活

獨活

金銀花

白蒺藜

苦參

僵蚕

天麻

南星

川烏

威靈仙

白蘚皮

五加皮

青風藤

益母草

兩頭尖

五倍子

大楓子

巴豆

穿山甲

芫花

蜈蚣

二十條

蒼耳頭

七個

桃柳榆槐桑棟楮枝

各三

根十

右藥共七十二味每味五錢各為粗片用真麻油

十二斤浸藥在內夏浸三日冬浸半月煎至黑枯

色為度麻布濾去粗將油再稱如十二斤加飛過

黃丹五斤如八斤加四斤依數稱起將油再下鍋

熬黃丹徐徐投下用槐柳棍不住手攪火先文後

武熬至滴水成珠為度春夏硬些秋冬軟些外加

乳香沒藥龍骨輕粉各三兩研極細末貯磁器內

臨用時加入

拔毒膏

歸尾

川芎

赤芍藥

紅花

烏藥

穿山甲

蜈蚣

蛇脫

草烏

官桂

僵蚕

大黃

白芷

威靈仙

防風

荆芥

羌活

獨活

松香收之香油煎

風氣痛膏

葱汁

蒜汁

生姜汁

鳳仙花汁

烏藥

草烏

乾姜

官桂

紅花

當歸

燒酒浸藥片收乾入油麻油煎松香收

附造化爭雄膏

此藥能養精神益氣血存真固精龜健不因腎海常盈返老還童又名五養保真膏以其能養精養氣養血養神養身故也又兼治咳嗽吐痰色慾過度腰膝疼痛兩腿酸辛行步艱難下元不固胞冷

精寒小便頻數遺精白濁吐紅鼻衄等症又治婦人下寒赤白帶下子宮冷痛久不胎孕又治惡毒癰疽頑瘡一切無名疔腫貼之三日可愈
修合宜忌

一選時日擇取上巳端午重陽甲子庚申天醫天赦天德月德天喜生喜等吉日

二定藥室擇潔淨明亮之處照依時候方向之室尤妙

三辨藥品審擇真正道地

四製藥性照依服食之劑製度得宜

五淨身心用事之人俱要能誠其心外潔其體明
淨衣服焚香致敬

六慎聞見忌婦人雞大胡臭不具足人僧尼孝子
等人見之

七看火候火要緊慢文武得宜藥要老嫩適中有
法

八謹收藏藥成之後忌犯鐵器忌見烘熬
九審施用看人老少壯弱量病內外久近九者得
宜用無不驗

一煉松香用小竹甌一個用粗麻布一層用明肥

松香放其上安水鍋上蒸之俟松香溶化淋下清
淨者初傾入冷水中又以別水煮二三滾又傾入
水中如此數次後復用酒如前者煮之俟其不苦不
澁為度二次煉不用鐵鍋尤妙

一飛黃丹用好丹入水中淘去底下砂石取淨候
乾炒之

一起手先熬藥油後入細料

真麻油

參斤

粉甘草

四兩先熬數沸後下藥

官桂

去粗皮

兔絲子

淘去砂酒煮極爛搗成餅為末六錢

遠志

酒浸一宿去心焙乾為末六錢

川牛膝

去蘆酒浸一宿曬乾為末

虎骨

酥炙黃

鹿茸

去毛酥炙黃

蛇床子 揀淨酒浸一宿焙乾

瑣陽 炙酥

厚朴 去皮

玄參 去蘆頭

淮生地 酒浸一宿焙乾

淮熟地 同上

天門冬 去心

麥門冬 去心

防風 去蘆

赤芍藥 酒洗

白芍藥 同上

當歸 酒洗

白芷

北五味子

穀精草

杜仲 去皮剉鹽酒拌炒去絲

葶撥

南木香

車前子

紫稍花

川續斷

良姜 已上各六錢

黃蜂

穿山甲 剉以竈灰

炒為末 貳錢

地龍 去土炙 四錢

草麻子 貳百粒 去殼

骨碎補 貳錢

杏仁 去皮尖 四錢

大附子 貳個重貳兩麵裹火煨去皮臍

木鱉子 去殼四十個研 紙裏壓去油

肉蓯蓉 紅色者酒浸 去甲焙七錢

桑槐桃李嫩枝 各七寸

一方有紅青蜓 十隻

右藥各依法製度完備剉入油內用銅鍋桑柴火慢煎候枯黑取起濾以生絹去渣鍋亦拭淨其藥油亦須滴水成珠為度每藥油一斤用飛過黃丹八兩徐徐加入慢火煎熬用桑槐柳枝不住手攪勿使沉底候青烟起膏已成看老嫩得中住火入煉過松香半斤黃蠟六兩此亦以一斤油為率攪勻放冷膏凝結後連鍋覆泥土上三日取起用別鍋燒滾水頓藥鍋在上隔湯泡融以桑槐柳枝不住手攪三五百遍出火毒入後藥

麝香 蟾酥 霞片疑鴉片 陽起石雲頭者

白占各六錢 丁香 乳香 廣木香

雄黃 龍骨 沉香 晚蚕蛾

倭硫黃 血竭 赤石脂 桑螵蛸

沒藥各四錢 黃芪去皮頭蜜炙為末參錢

右件須選真正道地者各製度過為極細末子以

漸投入藥中攪極勻和即投膏入冷水中捏成五

錢一餅如遇用時入熱水泡軟以手掌大紵絲一

方攤藥在上不用火烘

消息嚮導丸

肉桂 蛇床子 川烏 馬蘭花

良姜各伍錢 丁香 韶腦 木鱉子去殼各貳

錢伍分

右為極細末煉蜜丸如彈子大黃丹為衣每用一

丸以生姜汁化開先將腰眼溫水洗淨後將此藥

塗腰腎上令人以手搓摩往來千遍藥盡方止然

後將膏藥貼上即用兜肚護住初貼時忌七日不

得行房事如入房再用三錢貼臍上又服中和丸

一丸然後行事妙不可言縱泄亦不多 如種子

者候女人經後一三五日將腰腎上膏藥俱揭去

早上用車前子爲末一錢溫湯調服至晚交合方得全泄成孕

中和丸

粉甘草

用橫紋大者湯泡炙黃去皮

上一味爲細末煉蜜丸如彈子大每服一丸將交合三個時辰之前細嚼以無灰酒送下

用藥法

夫造化爭雄膏者得之秘傳用各不同効亦有異方下已具矣未能盡述大都能通二十四道血脉透三百六十骨節男子則固精益陽久戰不泄貼

前心則養血貼後心則養氣貼兩腿腰眼則益腎固元輸精華於兩足助戰射宮以廣螽斯之慶婦人貼臍下亦助發生之氣至於外科之用亦無不宜

一消息向導丸與中和丸依前所具之法交相互用如車前子散則欲種子之時不可不用也

一膏忌鐵器火烘將膏照依後開數目多寡入熱水內化開攤紵絲上待用擦藥畢卽貼之忌七日不行房事以後欲行又以膏參錢攤紵絲於是早間封臍上妙不可述事畢去臍上膏至於腰腎者

則常貼之兩月一換
 一氣有衰壯用有不同凡人二十三十者血氣強壯腰上用藥四錢臍上用藥二錢四十五十者血氣稍弱腰上用藥五錢臍上用藥三錢六十五十者血氣太弱腰上用藥七錢臍上用藥五錢然此三等亦不能拘泥一定要在變通合宜量人施用可也

千金不易比天助陽補精膏

真香油 壹斤 四兩 甘草 貳兩 遠志 去心 牛膝 去苗
 虎頸骨 炙酥 川續斷 去苗 熟地黃 焙乾 肉蓯蓉

鹿茸 炙 蛇床子 天門冬 生地黃

兔絲子 肉苳蔻 煨麵 川練子 去核 紫稍花 去草

杏仁 去皮尖 大附子 去皮臍 官桂 去皮 谷精草

右咬咀入香油內煎至黑色去渣方下飛過黃丹八兩松香透明者四兩柳條不住手攪不散為度再下雄黃硫黃龍骨赤石脂各貳錢再沸又下沉香蟾酥木香沒藥母丁香陽起石 煨 阿芙蓉為末再沸即住火將茶匙挑藥滴水不散為度又下黃蠟五錢將膏子收貯磁罐盛之封口嚴密入水五日去火毒然後用紅絹攤每個重七錢貼六十日

方換其効如神不可盡述

無價寶膏

治衰年龜弱補助真陽返老還童

甘草 壹兩

遠志

牛膝 去蘆

肉蓯蓉 去鱗

虎骨 炙酥

川續斷 去蘆

鹿茸 炙酥

蛇床子 揀淨

天門冬 去心

生地黃

熟地黃

肉苳蔻 煨麩

川練子 炒黑

麥門冬 去心

紫稍花

木鱉子 去殼

杏仁 去皮尖

官桂 去皮

大附子 去皮

谷精草 各伍錢

兔絲子

金墨

鵝鴿油 各五錢

以上用真香油壹斤四兩煎至黑色為度去滓用飛過黃丹八兩用柳條不住手頻攪不散為度再

下四味

雄黃

龍骨

硫黃

赤石脂 再熬一次

又下十一味

乳香

沒藥

麝香

木香

阿芙蓉

海馬 二對

石燕子 二對

沉香 叁錢

陽起石

蟾酥

丁香 各貳錢

右為細末方入膏內攪勻出火入磁器盛之或緞皮攤貼小腹用三個五日一換共九日時常飲酒引谷道腎經氣通再用錢大一個貼臍

紫金膏

吳白芷

兩頭尖

穿山甲

五靈脂

研各五錢

生地黃

熟地黃

各壹兩

木鱉子

巴豆

草麻子

各壹百二十粒

血竭

壹兩

黃丹

水飛過壹斤

香油

貳斤

乳香

沒藥

各壹兩

槐柳枝

每九十六

根每根長一寸

右各咬咀用前香油浸春孟夏三秋七冬十日於

銅器中文武火熬白芷等黑色濾出粗如紫色下

黃丹仍用槐枝一根攪成膏滴水成珠方下乳沒

二味盛磁器中放溼地下去火毒用之

專治男女大人小兒五積六痞腹中氣塊血塊酒

疾癥瘕以絹帛或厚紙攤之臨貼時又用木鱉子

仁一個皮硝一撮同研細先放痛處乃以膏藥貼

上以火烘熱手運百餘下以病處覺熱為度二日

一換或三日一換厥効如神功不盡述

阿魏膏

治一切痞塊更服胡連丸

羌活

獨活

玄參

官桂

赤芍藥

穿山甲

生地

兩頭尖

大黃

白芷

天麻

各五錢

紅花

四錢

槐柳桃枝

各叁錢

木鱉子

二十個去殼

亂髮

如雞子大一團

右用香油二斤四兩煎黑去粗入髮煎髮化仍去粗徐下黃丹煎軟硬得中入芒硝阿魏蘇合油乳香沒藥各五錢麝香三錢調勻即成膏矣攤貼患處內服丸藥黃丹須用真正者効凡貼膏藥先用朴硝隨患處鋪半指厚以紙蓋用熱熨斗熨良久如硝耗再加熨之二時許方貼膏藥

油紙法

桐油一斤入甘草末八錢浸七日煎十數沸入香油七錢無名異二錢再煎數沸淨澄清用

摻藥第一百十一

鱗魚散

治背疽大潰臙腑僅隔一膜用此大有神法出外科精義須候膿少欲收斂時方可用此

鯽魚

壹尾去腸不用水洗

羯羊糞

填滿魚腹為度

右用炭火烘焦為極細乾摻

聖効散

潰瘍毒氣已盡以蛇床子湯洗之用此

黃栢

炒黑

穿山甲

炒黃壹兩

檳榔

木香

雞內鳴

右為末用少許搽瘡口日用五七次方効

檳榔散

大斂瘡口凡膏梁熱瘡潰後惡肉已去宜用此若係寒瘡不宜用

檳榔

黃連

木香

各五錢

白芷

叁錢

右為細末蠟油調搽

蜈蚣散

疽口緊小而硬因風毒所勝也宜用此搽瘡口外貼神異膏

赤足蜈蚣

一條去頭足

全蝎

三個去足生用

右為末猪蹄湯洗淨搽之

乳香定痛散

瘡疽潰爛疼痛

乳香

沒藥

各五錢

寒水石

壹兩

冰片

壹錢

右為細末搽患處痛即止

桃花散

治一切疽生肌

白芨

白欵

黃栢

黃連

乳香

另研

麝香

黃丹

水洗淘極淨炒過各等分

右為極細末摻於瘡上二三日生肌平滿

追毒散

治一切惡瘡膿水不快者

全蝎

五錢

五靈脂

去砂與祖

川烏頭

炮

白乾姜

炮各壹兩

右為極細末用少許摻瘡口深者紙撚蘸藥紙之

外貼膏藥或以蒸餅浸透搗去水和藥搜勻撚作

錠子紙入瘡口名追毒錠子

翠霞散

治諸般惡瘡去毒生肌

滑石

壹兩

銅綠

五錢

輕粉

貳錢

片腦

麝香

各叁分

粉霜

貳分五厘

右為極細末紙入瘡口內以膏貼之

搜膿散

治年深不斂惡瘡

白芷 壹兩

川芎 貳兩

白芍藥 三兩 輕粉 三錢

右為極細末摻瘡口深者絛之

引膿散 治年深不斂惡瘡

無心草根

狼毒

鈞苓根

白丁香 各五錢

麝香 貳分五厘

右為極細末摻瘡口深者絛之

乳香散 治年深不斂惡瘡

白乾姜 五錢

苦丁香 五錢

草烏頭 五錢 鈞苓根

狼毒

乳香 各壹兩

右為極細末乾摻瘡口或唾調作錠子絛入瘡口

鈞苓散 治年深不斂惡瘡口

井鹽 壹兩

無心草

乾姜 各貳兩 鈞苓根 壹兩

右為極細末乾摻瘡口或唾調少許塗在膏上貼

之

白龍散 生肌止痛兼治耳中卒然大漏

礪砂 參錢

寒水石 四兩燒半白研

烏賊魚骨 研

滑石 研各壹兩

輕粉 壹錢

右為極細末乾摻瘡口耳中痛者以油調如糊滴

入

桃花散 生斂瘡口生肌內定定僻風邪此出外科精義與前名同藥異

滑石

兩四

寒水石

兩炒

貳

小豆粉

兩壹

乳香

輕粉

錢各壹

右為極細末乾摻若血不止者和燈草貼瘡口上以膏藥封之

金黃散

消腫散毒生肌止痛

黃連

大黃

黃耆

黃芩

黃栢

鬱金

兩各壹

甘草

錢五

龍腦

另五錢研

右為極細末入龍腦和勻乾摻若治溫毒丹腫新水調摻患處或蜜水調如稀糊塗上用紙外護之小油亦可其熱毒瘡或乾摻或水調俱可

精要生肌散

主斂瘡大効

方見潰瘍條

消毒散

諸般惡瘡生肌止痛消毒散腫及火燒湯泡腫瘡風濕疥癬

滑石

兩五

黃栢

兩貳

乳香

錢五

輕粉

錢參

黃丹

淘洗淨炒壹兩

右為極細末乾摻瘡口火燒等瘡油調塗之

平肌散

治諸瘡久不斂

蜜陀僧

色煨赤

花藥石

色煨赤

白龍骨

兩各壹

黃丹

淘洗淨炒

乳香

另研

黃連

各貳錢半

輕粉

錢壹

右為極細末和勻再研乾摻

烏金散

治疔毒無名毒

牙皂

四分

人言

製

蟾酥

麝

各五

血餘

煨

蛇脫

煨

蜂房

煨各壹錢

蟬脫

血竭

乳香

僵蚕

炒去絲各貳錢

辰砂

雄黃

穿山甲

炙各貳錢五分

全蝎

參錢湯泡七次

天龍

四錢去頭足

川烏尖

沒藥

右爲末準秤和勻每服三錢赤沙糖調葱頭酒送

下取汗

神仙萬病解毒丸

卽玉樞丹又名紫金錠見用藥論條

一粒金丹

治一切惡瘡癰腫無名毒

沉香

乳香

木香

各五分

巴豆霜

壹錢五分

右各爲末照分數和勻用大黑棗去皮搗爲丸如

芡實大每服一丸量人虛實先呷水一口行一次

胃氣實者只可呷水三四口後用水一口送下一

丸行數次以米飲補之

萬應針頭丸

一切惡疽生于腦背毒大欲死者一粒卽愈

麝香

貳錢

血竭

如蠟壹塊者

輕粉

蟾酥

辣者

硃砂

各叁錢

片腦

壹錢

蜈蚣

壹對全用

右爲末煉蜜丸如瘡有頭者用針挑破見血以藥

一黍米大放瘡口內用紙花周圍唾津溼之貼瘡

罨定頃刻可愈

鍼頭散

治瘡瘍癩腫木硬

以乳香蟾酥各壹錢研勻以見乳汁和如泥入磁合安放每用以唾調一些點瘡處上以膏藥貼之毒氣自消即發亦輕

奪命丹

治諸般惡毒疔疽

方見瘡瘍條

蟾酥丸

治疔黃及一切惡毒

見瘡瘍條

勝金丹

治症同上

麝香

白砒

製各五分

蟾酥

壹錢

雄黃

辰砂

乳香

沒藥

血竭

各壹錢五分

全蝎

炮

天龍

炙去頭足

穿山甲

炙各參錢

殭蠶

炒五錢

右秤勻服法同前烏金散

寸金丹

一名返魂丹一名追命丹治極重腫毒癰疔四肢壯熱沉重者即噤口不開幹開化三九

灌下立活

麝香

壹分

乳香

烏金石

輕粉

雄黃

狗寶

沒藥

各壹錢

蟾酥

貳錢

粉霜

黃蠟

各參錢

礞砂

五錢

鯉魚膽

狗膽

各貳個陰乾

金頭蜈蚣

柒條全用酥炙

頭生男兒乳

壹合

右為末以黃蠟乳汁熬成膏子和為丸如菜豆大

小兒丸如芥子大每服一九重者加至三九以白丁香七粒研爛新汲水調下用重衣蓋汗出為度勿透風不過三服効

保生錠子

以下四方治一切惡瘡疔瘡癩癧俱羅謙甫方見疔瘡條

神聖膏

托裏散

破棺丹

飛龍奪命丹

治惡瘡疔瘡神効

見疔瘡條

賽奪命丹

治同上

方見疔瘡條

拈膿散

治癰疽腹脹脉滑或裏急後重

見腸癰條

時効鍼頭散

追蝕惡瘡及肉兼治癩癧

赤石脂

五錢

乳香

貳錢

白丁香

貳錢

砒霜

生

黃丹

各壹錢

輕粉

麝香

各五分

蜈蚣

壹條

右為末摻些些于瘡口惡肉自去

千金托裏散

治一切腫毒

黃芪

壹兩五錢

連翹

貳兩貳錢

防風

參錢

沒藥

參錢

厚朴

貳兩

木香

貳錢

桔梗

貳兩

乳香

貳錢

當歸

五錢

白芷

官桂

甘草

各壹兩

川芎

人參

芍藥

右為末每服三錢水一大盞煎二三沸和滓温服

奪命丹

治諸腫毒

乳香

沒藥

白芷

赤芍藥

當歸尾

皂角刺

炒土色

天花粉

穿山甲

蛤粉炒

陳皮

甘草節

防風

各壹錢

貝母

壹錢五分

金銀花

三錢

用陳煮酒二碗煎至七分煎時以紙封瓶口勿令

泄氣忌婦人雞犬瘡癬在上食後服在下食前服

不能飲者酒水相半

去腐散

治腫毒

麻虫

指甲

輕粉

飛麵

各五分

蟾酥

俱為細末津液調丸如麻子大每用三四丸八毒

內外以膏藥封好去敗生新神効

金形如神散

治一切跌打損傷墜馬落車等疾

當歸

貳錢酒蒸

骨碎補

貳錢

川芎

壹錢

甘草

壹錢蜜炙

澤蘭

壹錢炒

附子

壹錢

桂心

壹錢

蜀椒

壹錢炒

血竭

五分

乳香

沒藥

各壹錢

人參

五分

自然銅

半兩錢

各五分俱火煨醋淬

黃芪

壹錢蜜炙

麝香

五分

右為末每服壹錢臨臥無灰酒調下量人大小添

減忌魚腥麵食如丸藥照此煉為丸如桐子大每服十九丸依前服

金銀地丁散 治諸惡瘡腫毒痛服之如神

金銀花 當歸 赤芍藥 人參

桔梗 黃連 黃芪 紫花地丁

甘草節 大黃 各五錢 白檀香 沒藥

子苓 玄參 各貳錢 前胡 連翹 各叁錢

梔子仁 麥門冬 去心 甘草 微炙各壹兩

右哎咀每服五錢水一盞酒壹盞煎至八分去滓隨病上下溫服

桃花活血散 治一切惡瘡金瘡去風

烏魚骨 龍骨 各壹兩 白石脂 白欵 各五錢

虎骨 寒水石 半斤煨 赤石脂 黃丹 少許

右入白芨麵五錢同為細末量瘡大小敷貼

惡瘡錠子

信 壹錢 麝香 五分 歸尾 五分 惡味 五分

蟾酥 壹錢 草烏 壹錢 輕粉 貳錢 川烏 壹錢

硼砂 五分 血竭 壹錢 全蝎 貳個 礞砂 壹錢

銅綠 五分 銀硃 五分 雄黃

共為細末用人乳化蟾酥拌成錠子如大麥樣一

錠分作兩段治二人將瘡用針刺破見血納入藥粒用紙貼在瘡上內成膿去藥洗淨為度

解毒如神散

治諸般腫毒疥瘡及小兒痘疹

大甘草不拘多少去皮為極細末用竹筍一個刮去青兩頭留節開一孔入粉草在內滿用油灰塞孔勿令泄氣五月底午時入糞坑中以磚縛在竹上墜沉糞底四十九日取出長流水洗淨埋土中七日去其糞氣陰乾為末砂糖調服一錢陰瘡金瘡乾敷如乾水調服敷一云立冬日放糞中立春前一日取起

鹵水圍藥

治一切惡瘡腫毒

麝香

壹錢

沒藥

雄黃

血竭

各一錢

蟾酥

壹錢

五倍子

壹兩

麻黃

伍錢

右多用蕎麥幹灰淋濃汁七八碗文武火煎至二三碗之數以前藥研極細末候冷下之復煎二三沸磁罐藏之若遇瘡毒用新筆蘸汁周圍塗之自消

金箍膏

此方江南無二每用醫人腫毒百發百中應驗神効

鳳仙花子

大黃

五倍子

十兩為細末

人中白

如無皮硝壹兩五錢代之

陳小粉

十三兩三年者共入鐵鍋內炒

至黃
焦色

右為末米醋為膏腫毒初起圍之

圍藥方

專治一切癰疽發背便毒橫痃吹乳諸般及風溼
疼痛小兒熱毒火丹無名腫毒如初起者圍之即
散已成者圍之即生頭出膿定痛散毒之勝藥每
用加白蜜猪膽醋三味和勻圍紅腫處中留一孔
綿紙蓋之如紙乾用醋以刷子刷上

五倍子

炒焦黑

陳小粉

炒黃黑色各五斤

龜板

燒灰

白芨

白歛

朴硝

榆樹皮

各一兩

大黃

白芷稍

南星

黃栢

半夏

各八兩

黃連

牙皂

草麻子

各四兩

右為末陳米醋糊勻入瓦甕內慢火熬成膏

諸般敗毒散

綿紋大黃四兩剉碎先以當歸壹兩剉碎用好酒
二碗煎至八分將大黃片拌溼一宿晒乾為末聽
用每服時以白芷一錢連翹六錢酒煎八分露一
宿調服大黃三錢其毒盡從大便中出出毒若盡
則以溫粥止之

服法上部飽肚服下部空心服用連翹酒丸服亦

彙編選粹

林業

可



國立中央圖書館
藏書

一七五



