

陸清潔編撰 陸士譔校訂

# 萬病自療 醫藥顧問大全

第十册

## 急救科

### 總目

燒	論	吞火藥頭證	藥物卡喉證
毒	證	百藥毒證	吞金銀銅鐵毒證
溺	證	中水毒證	急救百毒入耳證
吞生	證	氣火咬傷證	獨一電
煤	證	凍	湯火傷證
多	證	誤吞綠水玻璃碎	中二味並食毒證
急救	證	抽耳垢證	中禽獸毒魚毒證

世界書局

41  
39

萬病自療

醫藥顧問大全

陸清潔編輯 陸士諤校訂

第一冊	第二冊	第三冊	第四冊	第五冊	第六冊	第七冊	第八冊	第九冊	第十冊	第十一冊	第十二冊	第十三冊	第十四冊	第十五冊	第十六冊
內科	內科	內科	外科	婦人科	小兒科	小兒科	皮膚科	皮膚科	皮膚科	皮膚科	皮膚科	耳鼻喉科	耳鼻喉科	齒科	齒科

世界書局印行

## 夏序

醫藥之有顯聞。發於居家之間。律也。夫人無貴賤智愚賢不肖。孰能避免大淫之外。侵七情之內。傷以及飲食起居。金刃蟲獸房室之戕害。則災疾不能避。而民衆醫藥。實處於重要之地位焉。嗚呼。昔之醫者。務奇守秘。不輕示人。其於著述。亦驚高立異。但求逞己。人民之疾苦。必叩戶搥。預防之方法。非習俗所知。故屢僅傳於子孫。次僅惠於同。頃。其次而及於呻吟之病夫。亦限於一時一地而已。夫病而治之。醫之事也。未病而圖之。上工之所爲也。然則醫。臨診之外。信亦參知指示社會以健康之徑乎。陸君庸傑。秉承家學。早露醫學。有鑒於此。輯成醫藥顧問大全。多二百萬言。折內外各科爲十六門。每病分病源。症狀。變症。療法。調養五項。方後復列方解一篇。意在貢獻於一般民衆。使不知醫者。無病時得圖醫。以充常識。有病時得參考。以供急需。不守秘。不立異。於是而其利博。其惠厚。豈限於一時一地所可比擬哉。僕時隨老矣。孽殖久荒。處此國難。危亡之際。人心惶惑之時。意欲有爲。力備未逮。所願青年英秀之士。昌明提倡。豈徒浴國紙貴。春遍人間。行看紹學重光。萬世攸賴。因樂而爲之序。

中華民國二十二年十月應堂夏紹庭序於九芝山館

## 丁序

吾國醫籍。自古迄今。可謂博且廣。多且繁矣。汗牛充棟。五車不能載也。金匱玉函。靈樞素問。其最著者。東垣十書。丹藥心法。豈爲倣倣者。其中或以辭意深奧。而未得其解。或以語理偏僻。而未切實用。然皆未足病也。往往提一己之

盡。語他人之短。屬一得之長。爲得有之秘。屬隱莫言。說來頭頭是道。斧鑿大觀。語多疑撼動聽。以爲可以獻於子提。末世者矣。而實不然。究其所言。豈非大言以惑人。強詞以奪理者也。願聽察深思之士。徒覺其爲廢言而已。爾固執。務斂之人。則難免爲其所困矣。然後以其所學而問世。所得而治病。其不情事者幾希。又應論其下焉。而不讀書不師理者哉。大醫雖小道。職掌司命。所關係者。至重且大。豈容一毫成見。偏於其間。雖然。論理周詳。立法精確。固可以濟後世之病。幸爲圭臬者。亦不爲少也。此固未可一擬抹煞之耳。又在乎讀者之心。領得台矣。吾友陸子庸。好學士也。承家學之淵源。能笑談以克紹。所得者自廣。而所用者自異。早歲斐聲。已博得譽滿春申。英年碩學。尤企望冀。慈將不。診餘聞暇。好提管爲文。會業數年之經驗。持一己之偉論。俾有益於實用。將徵信於來慈。日積月推。藥爲成。名曰醫學顧問大全。眉目清晰。層次井然。使人一覽瞭然。既無持強尋牙之虞。又絕辭複意瑣之弊。於什劑。其尊翁士蔭先生。徵序於余。囑爲數言。用以爲介。將以使後世之人。讀是書者。得其所法。備若所謂。願從子提末世者。則予豈敢信。而陸子又未敢望焉。是爲序。

歲甲戌季秋中甸海上丁嶺舊題於建臺山房之西楹

### 戴序

夫編纂醫籍。要以便利後學。深切實用爲大宗。近幾年來。我國醫書之出版。如雨后春筍。不可勝計。究其內容。大都毫無精彩。不堪卒讀。更見夫近時醫刊。其標名。有所謂性病研究。在柳指南者。是尤失我國醫之價值。貶醫籍之劣痕。吾深憐之。陸子庸。秉家學之淵源。得長砂之真傳。所著醫書。皆切實用。不尚虛偽。庚午春。編輯萬病方大全。搜

經之言。說愈大觀。子女德被漢海。咬傷。據國醫方與脈。時見奇效。手畫之。且喜其有裨於民間。疾病與醫藥自療。會佩其於國醫界有偉大之功。李復以所編醫藥願問大全問世。內外各科咸備。每病必詳述病源、病狀、變症、療法、調養、名理。精心編輯。都凡二百萬言。誠醫藥全書也。嗚呼。近世醫籍其矣。然其中能有如斯書之切於實用。並復於後學者乎。雖曰有之。恐不若是之備也。然則此醫藥願問大全一書。固宜人手一編。以資應用。吾謂醫家閱是書。不啻獲一良好之導師。民家閱是書。不啻得一家庭之顧問。實醫界後學之津梁。社會人士之寶筏也。老子云。得其寔中。應運無窮。吾於是書亦云。是為序。

民國二十三年秋蘇達夫序于上海市國醫學會

## 贊序

我國醫學之發明。於世界為最早。溯自秦黃以來。代有專家。而所著書籍。亦汗牛充棟。不能備述。願管理至深。立論者每多高瞻。睥而期之。蓋亦難言。若求淺顯之書。而搜羅各病之方劑。並循醫學之顧問者。實未多見。陸子清撰醫界之有心人也。特著醫藥願問一書。舉凡內外各科診治之法。無不詳加闡述。則之為十六門。而每一病之病源、病狀、變症、療法、調養五項。一一備舉。俟借鑒。且各附以方解一篇。其便於研討。實有獨到之慮。昔人有言。為人子者。不可不知醫。因此可見盡人皆須具醫學常識。而是書一出。必將萬人爭讀。即不知醫者。亦得有途徑可尋。豈特有功醫界而已哉。余與陸女士。為忘年交。同為上海市國醫公會、上海市國醫學會服務有年。肅愼君即其首領。家學淵源。其家有自。今題畫於垣。願著令譽。行知本其所學。為國醫界爭光。是書特其發軔初試耳。是為序。

中華民國二十三年國慶後十日古曲河賀芸生書於新魏齋

### 俞序

陸君清樞。性謹厚。工屬文。其尊翁士謬先生。為青雒珠街開名醫。精岐黃術。為人治病。常切中病情。十全八九。又擅長文學。所著醫學商榷。傳誦醫林。許天士靈胎後第一人。也。清樞幼承庭訓。學有淵源。而於醫學進益尤深。與方論。病。廣博精澁。深得其尊翁醫學之神髓。茲所編醫藥顧問大全一書。計二百萬言。分類一十六大門。按羅既富。選擇又精。而每方後。又有方解一篇。使學者從煩。簡。一目了然。讀方書之最善者也。雖然。方之經證可憑。病之變化不一。醫之所及有限。心之所逮無窮。吾願清樞歷刻不一刻。以廣惠醫林。且望讀是書者。心知其意。神而明之。變而通之。庶所謂小用則小效。大用則大效。無所不用則無所不效。其有功於世。豈有涯哉。

中華民國二十三年十月澄紅俞同芳謹序

### 蔡序

語云。君子集思廣益。蓋所以周智慮以達用也。醫藥為生命所寄託。安能不求智慮之周。以達功用之宏。大哉。然觀富室貴家。幸與疾苦。必廣集醫術。會診於一堂。宜乎可收集思廣益之效。而可治之病無不治矣。庸知結果。僅得其反。多有本不死之病。竟誤於醫藥而死者。此其故又安在。豈集思廣益。反足以為害乎。夫投鈔可以得金。為鈔中之有金也。未有求寶珠於魚目中者。然則聚醫醫於一堂。而可治之病。竟不治者。非集思廣益之害。蓋魚目中之

亦之通也。欲以愈病。不亦難哉。余嘗論會診之弊有三。(一)醫與醫學。不齊。意見難融恰也。(二)互相推諉。各不任怨也。(三)衆說紛紜。無人爲定探尋也。夫如是。宜乎難收廣益之效。而不免以性命探試醫藥矣。聚名醫以會診。其害尙如此。况貪清無力延醫。雖延醫而無從知醫之優劣哉。是以欲求集眾醫之精思。而廣醫藥之宏益。是尤難乎其難。吾友陸子清。爲海上名醫。士誇先生哲。淵深。思。理。清。醫。學。識。者。莫。不。傾。其。家。學。傳。德。其。來。有。自。而。清。強。殊。不。以。其。學。自。滿。於。診。務。之。暇。乃。復。勤。搜。古。籍。博。覽。衆。書。能。融。洽。古。今。學。術。於。一。道。而。獨。參。以。經。融。巧。思。於。其。間。較。其。短。長。定。其。去。取。積。久。而。成。醫。藥。類。問。一。書。其。書。置。列。內。外。各。科。總。別。爲。十。六。類。每。病。又。列。一。病。源。一。病。狀。一。變。症。一。療。法。一。調。養。五。項。綱。舉。目。張。秩。序。井。然。所。謂。集。醫。藥。之。大。成。無。論。知。醫。與。不。知。醫。者。苟。一。覽。是。書。靡。不。見。病。知。源。因。症。證。病。因。病。知。方。無。絲。毫。眩。迷。外。錯。之。弊。讀。是。書。者。設。之。無。力。求。醫。無。論。知。醫。與。不。知。醫。名。醫。會。診。於。一。室。者。乃。爲。之。定。去。取。採。擇。焉。乃。爲。之。負。指。導。之。責。任。焉。則。其。集。思。廣。益。之。功。用。証。不。啻。且。僮。耶。則。其。活。人。壽。世。之。心。又。詎。不。深。且。切。耶。余。喜。其。集。思。廣。益。而。成。是。書。因。推。闡。其。旨。趣。如。此。清。潔。與。余。有。通。家。之。好。余。知。其。書。將。付。剞。劂。爰。贅。述。數。語。於。前。

民國二十三年十月廿一日雲陽蔡陸仙序於海上醫館

## 汪序

清潔同志。英敏多才。因醫先進。陸士壽先生哲詞也。幼承庭訓。家學淵源。宜乎頭角早。矯然特異。其編書是書。二百萬言。閱十寒暑始成。實績功。狗鉅製也。伏而讀之。內外兼備。婦幼不遺。其於病理之敘述。推闡極。而於診

醫治。則多殺人所未發。護護乎康仲聖之醫。醫醫家而上之。附方分解。以明方藥效驗。絕非鑿拾鉅釘者所可比。特願國醫一門。俾病者於斯愈時。知所避忌。其努力以發揮國醫。功效。德微備至。是開醫學之新紀元。尤足為本書生色。國醫當此存亡絕續之交。得是書而振起之。同道可藉作他山石。後進得幸為指南針。豈僅社會羣衆之顧問而已哉。

民國二十三年十月新安任晉巖序於滬江醫寓



## 楊序

陸子清潔。仁心人也。於學無所不覽。無所不精。晚近社會問題。日益複雜。生活競爭。無時或息。懦弱之輩。不堪忍辱。偷生。出於自殺一途。其志也潔。而其行也愚。清潔先生。以多年之搜考。與名醫之方治。成此急救一書。凡吞鴉片。火柴頭等毒。俱有靈方效治。泰西不能專美於前矣。從此拯人於苦海。拔人於地獄。使執迷不悟之輩。毋以一時之消極。而喪其身。豈特陸君個人之仁德。亦整個國醫之光榮。並能挽回頹廢之民族也。

民國廿四年五月楊福增三辰敬序於朱家角百草室

## 自序

急救一科。國醫素乏專書。經編者多年搜求。與實地試驗。更證以名醫方治。而成是書。凡一十九證。二十萬言。五易其稿。時經六年。方方有效。更附入西法。使世人以科學化之國醫自我。而我惟以愈病爲職。法不問中西。方不分夷夏。則中西醫之界限。可以溝通。而世界醫學。或可燦爛光輝也。

中華民國廿四年五月陸清潔序於杭州板橋路醫廬

## 編輯大意

- 一 本書所述。係急救部分之病。故曰醫藥顧問急救科。
- 二 本書關於瘋犬咬傷。中百藥毒。俱有確切之療法。與靈異之功效。

三 人工呼吸法。急救益死。溺死。及一切窒息死。俱有神效。不可忽也。

四 吞生鴉片。火柴頭。及其他毒物。以吐法爲主。使胃中積毒。盡行傾出。卽無危險。然此種救治。以愈早愈妙。遲則每令毒隨血化。漫延臟腑。而不可救。近日發明之洗胃器。對於此症。頗有功效。可以施用也。

五 預防中毒。隔夜食物。必須煮過。水宜潔淨。非沸不飲。如此則毒菌消滅。自無中毒之憂矣。

六 本書各方。方方有解。每一藥味。都明其藥性。屬寒屬熱。屬溫屬平。辨其味。是酸是甜。是苦是辛。明其用。入何經。走何絡。治何病。使毫無醫學知識之人。閱之。都能了解。醫者閱此。可更明白。

七 本書所載各方。俱有神效。俱經實地試驗。始得錄入。鄭重萬分。以醫學爲人生性命之學。急救尤屬生死攸關。刻不容緩。一有不當。其人卽亡。故尤當以極效之方治之。方能起死回生也。

八 歷來醫書。言其病源。卽不言病狀。言其病狀。卽不言療法。言其療法。卽不言調養。或但有病狀療法。而無病源。支離破裂。無有系統。本書一洗此弊。每一病各分「病源」「病狀」「變症」「療法」「調養」五項。羅列清楚。使不知醫者。一翻此書。卽知病之所在。治法如何。變症如何。調養如何。明如燃犀。毫無錯誤。

九 本系瘋犬咬傷調養之法。俱有至理。萬勿以迷信神祕視之。以婦人臨經時月經之氣。平人聞之。固不感覺。如係病人。則異臭觸鼻。萬難忍受。猶吾人身體強時。聞人香煙氣味。不覺可厭。一有不適。偶聞其氣。卽頭昏而脹。胸中欲嘔。同一理也。切宜注意。

十 急救一科。吾國素無善本。總者費多年之心力。將海內效方。古今醫集。遍搜博考。復經試驗。凡六年而書成。雖不足云盡美。然以此療治。或無遺憾也。

413.08  
393=2  
212



# 目次

總論	.....	一
人工呼吸須知	.....	一
瘋犬咬傷須知	.....	一
急救瘋死須知	.....	一
急救蛇咬須知	.....	一
望色要訣	.....	二
聞聲要訣	.....	三
問證要訣	.....	三
切脈要訣	.....	三
總訣	.....	四
吊死證	.....	七
總綱	.....	七
結論	.....	七
吊死證各方淺解類	.....	八
溺死證	.....	八
總綱	.....	八
結論	.....	八
溺死證各方淺解類	.....	四
吞生鴉片證	.....	五
總綱	.....	五
結論	.....	五
吞生鴉片證各方淺解類	.....	七
煤毒證	.....	九
總綱	.....	九
結論	.....	九
煤毒證各方淺解類	.....	〇
夢魘死證	.....	〇
總綱	.....	一
結論	.....	一
夢魘死證各方淺解類	.....	二
急救人畜蛇蟲咬傷證	.....	二
總綱	.....	二
人咬傷類	.....	三
熊虎狼咬傷類	.....	三
家犬咬傷類	.....	四
馬咬傷類	.....	四
豬咬傷類	.....	五
急救人畜蛇蟲咬傷證	.....	五
總綱	.....	六
人咬傷類	.....	六
熊虎狼咬傷類	.....	六
家犬咬傷類	.....	七
馬咬傷類	.....	七
豬咬傷類	.....	七
猴猴咬傷抓傷類	.....	八
貓咬傷類	.....	八
鼠咬傷類	.....	九
蛇咬傷類	.....	九
毒蛇纏身不脫類	.....	〇
蜈蚣咬傷類	.....	一
蠍螫傷類	.....	一
射工傷類	.....	二
蜘蛛咬傷類	.....	二
壁蝨咬傷類	.....	三
蚯蚓咬傷類	.....	三
蠶咬傷類	.....	三
烏龍刺傷類	.....	四
蠶咬傷類	.....	四
各種毒蟲咬傷類	.....	五
急救人畜蛇蟲咬傷證各方淺解類	.....	六
總綱	.....	六
結論	.....	七
急救人畜蛇蟲咬傷證各方淺解類	.....	七

一	總綱	五七
二	結論	五八
三	吞火柴頭證各方淺解類	五九
百藥毒證	六六	
一	總綱	六一
二	吞砒霜類	六二
三	吞水銀類	六三
四	吞蒙汗藥類	六四
五	吞斷腸草類	六五
六	吞水莽草類	六六
七	吞輕粉類	六七
八	中鉛粉毒類	六八
九	中硫磺毒類	六九
一〇	中巴豆毒類	六九
一一	中木蠟毒類	七〇
一二	中木瓜毒類	七一
一三	中野菌毒類	七一
一四	中杏仁毒類	七二
一五	中鹽鹵毒類	七三
一六	中半夏毒類	七三

一七	中楓登毒類	七四
一八	中橡乳毒類	七五
一九	中野葛毒類	七五
二〇	中野草毒類	七六
二一	中水萇毒類	七六
二二	中附子烏頭天雄毒類	七七
二三	中芫花毒類	七八
二四	中狼毒毒類	七八
二五	中嗎啡毒類	七九
二六	中砒砂毒類	七九
二七	中冰片毒類	八〇
二八	中斑貓毒類	八一
二九	中花椒毒類	八二
三〇	中桐油毒類	八三
三一	結論	八三
三二	百藥毒證各方淺解類	八四
中水毒證	九八	
一	總綱	九八
二	結論	九九
三	中水毒證各方淺解類	九九

瘋犬咬傷證類	九九	
一	總綱	一〇二
二	結論	一〇二
三	瘋犬咬傷證各方淺解類	一〇六
凍死證	一〇六	
一	總綱	一〇〇
二	結論	一一〇
三	凍死證各方淺解類	一一一
誤吞錫水玻璃洋油耳垢證	一一一	
一	總綱	一一三
二	誤吞錫水類	一一三
三	誤吞玻璃類	一一三
四	誤吞洋油類	一一四
五	誤吞耳垢類	一一五
六	結論	一一六
七	誤吞錫水玻璃洋油耳垢證各方淺解類	一一六

諸物卡喉證	一	九
總綱	一	九
諸獸骨卡喉類	二	九
田螺卡喉類	三	〇
稻穀卡喉類	四	一
竹葉卡喉類	五	二
竹木卡喉類	六	二
桃杏卡喉類	七	三
諸豆卡喉類	八	四
鐵鉤卡喉類	九	五
鐵鈎卡喉類	一〇	六
頭髮卡喉類	一一	七
蜈蚣卡喉類	一二	七
碗片卡喉類	一三	八
雞鵝鴨骨卡喉類	一四	九
魚骨卡喉類	一五	〇
錫鉛卡喉類	一六	一
結論	一七	二
諸物卡喉證各方淺解類	一八	三
吞金銀銅鐵器證	一	三

總綱	一	四
吞金器類	二	一
吞金箔類	三	一
吞銀器類	四	二
吞銅器類	五	三
吞鐵器類	六	三
結論	七	四
吞金銀銅鐵器證各方淺解類	八	五
急救百蟲入耳證	一	八
總綱	二	八
結論	三	九
急救百蟲入耳證各方淺解類	四	九
燭電證	一	〇
總綱	二	〇
火工燭電類	三	〇
天然燭電類	四	一
結論	五	二
燭電證各方淺解類	六	二
湯火傷證	一	五

總綱	一	四
湯火傷類	二	四
湯火燻傷眼類	三	五
結論	四	六
湯火傷證各方淺解類	五	六
中二味並食毒證	一	九
總綱	二	九
中蟹柿並食毒類	三	〇
中葱蜜並食毒類	四	〇
中荊魚並食毒類	五	一
中人參五靈脂並食毒類	六	一
中蟹榴並食毒類	七	二
中甘遂大戟芫花與甘草並食毒類	八	三
中鱉苋並食毒類	九	四

九	中鳥藥苗香並食毒類	一六五
一〇	二味不可同食表類	一六六
一一	結論	一六八
一二	中二味並食毒證	一六八
	各方淺解類	一六八
	中禽獸蟲魚毒證	七二
一	總綱	七二
二	中鳩毒類	七三
三	中鴉毒類	七四
四	中雞毒類	七四
五	中野雞毒類	七五
六	中鴿毒類	七六
七	中犬肉毒類	七七
八	中馬肉毒類	七八
九	中牛肉毒類	七九
一〇	中羊肉毒類	八〇
一一	中豬肉毒類	八一
一二	中豬肝毒類	八二
一三	中蛇毒類	八三

四	中蜈蚣毒類	八四
五	中螞蟻毒類	八四
六	中田螺毒類	八五
七	中蟹毒類	八六
八	中黃白蟻毒類	八七
九	中蝦蟆毒類	八七
一〇	中沙蟲毒類	八八
一一	中各種蟲毒類	八八
一二	中河豚毒類	八九
一三	中各種魚毒類	八九
一四	中鯊魚毒類	九〇
一五	中鯊魚毒類	九一
一六	中游波蟲毒類	九二
一七	結論	九三
	中禽獸蟲魚毒證	九三
	各方淺解類	九四

## 總論

### 人工呼吸須知

凡溺死、經死、夢魘死、中煤毒死、俱宜以人工呼吸法治之。

人工呼吸者是催起已經停止的眞呼吸。在一時的呼吸窒息時。行之有效。其法先使受術人平臥牀上。於其背部墊一軟枕。施術人遂將受術人的胸部強壓。同時另由一人將受術人的兩手。屈折於胸廓上部。如是將肺內的空氣驅出。隨後即將受術人胸部的壓迫鬆弛。同時舉其兩手至頭部外側。這時肺臟擴張。空氣遂又流入。依此反覆行之。可使受術人吸入多量的空氣。而促起其自然的

呼吸。凡窒息者。都可用此法急救。並無流弊。

施術時。此一呼一吸的。手術。宜自緩而急。行之不息。直至窒息者回復其眞呼吸而止。惟窒息者。急須新鮮空氣。故必須在曠地中行之。若在室內多人之處。空氣污濁。不易見效。

### 瘋犬咬傷須知

凡被瘋犬咬傷。速將傷處之肉割去。或以繮絹緊縛兩頭。使毒不遊走。再以拔法拔之。或用灸法。均可。內宜服萬年青方。或煙油方。便可獲救。此病救治宜速。遲多不救。

百日內忌鹽醬。一年內忌豬肉、魚腥。三年內忌食一切毒物及房事。終身忌食狗肉、蠶蛹、紅飯豆。忌見麻物。

忌飲酒。

平時宜常食

謹慎。方得保全。

有九死。切宜注意。

急救經死須知



急救經死。不可割斷繩索。急以衣裹手。緊抵囊門。若係婦女。則連前陰抵住。緩緩抱住解下。安穩放倒。速用人工呼吸法救之。法宜一人踏其兩肩。以手緊提其髮。不可使頭垂下。一人微微推摩喉嚨。一人按擦心胸。又輕輕摩其肚腹。一人摩擦手足。緩緩變動。若已硬直。但漸漸強彎曲之。又用腳裹衣緊抵囊門前陰。勿使洩氣。以兩用竹管。吹其兩耳。不可住口。如此一飯之久。即有氣從口出。不可

手少頃。以滾盞湯或清粥湯灌之。令潤咽喉。漸漸能動乃止。

凡縊死從早至晚。雖已冷可活。自夜至早。稍覺難救。總之凡身體稍軟。心下微溫者。雖死一日以上。依此法多吹多摸。皆可復活。勿謂已冷。忽略不救。

### 急救蛇咬須知

凡被毒蛇咬傷。毒勢延蔓。立見危殆。初被咬傷。能急以利刀割去所咬之肉最妙。否則立將傷處用繩稍兩頭紮定。(見圖)再飲好醋一二碗。使毒氣不能遊走。速取竹木桿煙筒內煙油。其色如醬。用冷水洗出飲一二碗。受毒重者。其味必甜而不辣。以多飲為佳。傷口痛甚者。內有蛇涎。多

用煙油擦搽必出。此為蛇咬第一神方。至有功效。

經日望而知之謂之神。是以目察



色也。聞而知之謂之聖。是以耳識音也。問而知之謂之工。是以言審病也。切而知之謂之巧。是以指別脈也。神聖、工、巧、四者。乃診病要道。醫者明斯。更能互相參合。則可識萬病根源。以之療治。自萬舉而萬當矣。

### 望色要訣

凡見其人面如土色。口中有生鴉片氣。呼吸急促。呻吟欲絕。此必吞服生鴉片也。

其人猝病嘔吐。嘔出之物。在黑暗處觀之。可見微光。此必吞服火柴頭也。

其人患皮膚病。初瘡次痛。勢如火燎。久則外癢內痛。骨肉皆爛。此射工傷也。

其人腳背頃刻腫大。麻木而痛。遊走極速。此烏龍刺傷也。

凡遇病人。惡風甚。如天本無風。病者自覺風大。入帳蒙頭躲避。長聞金鑼之聲。四肢麻木。口吐白沫。此必瘋犬咬傷也。

其人忽然腹中絞痛。口吐白沫。會



食野草者。此中野草毒也。

其人忽然吐血。衄血不止。不能言語。面赤如丹。有烏藥氣味者。此中烏藥。茴香二味。並食毒也。

凡此皆望色之要訣。苟能隨機應變。可應用無窮矣。

### 聞聲要訣

其人言語無次。胸中悶滿。發熱。腹脹口渴。煩躁面赤。曾食馬肉者。此中馬肉毒也。

其人不能言語。指甲青紫。口吐白沫。手足冷。腹痛如割。曾食蟹柿者。此中蟹柿並食毒也。

其人呼吸急迫。面色灰白。鼻煽。喉中有物梗住者。此竹葉。卡喉也。

其人言語躁煩。面色青黑。口吐白

沫。冷汗如雨。腹中絞痛。曾食野草者。此中野草毒也。

其人口中作犬吠聲。逢人便咬。此被瘋犬咬傷也。

其人呻吟痛楚。肌肉潰爛。好肉暴傷。此被人畜蛇蟲咬傷也。

其人呼吸短促。面如土色。口中有生鴉片煙氣者。此吞生鴉片也。

凡此皆聞聲之要訣。苟能隨機應變。可應用無窮矣。

### 問證要訣

其人猝然腹中絞痛。面色青白。口吐白沫。必當問其曾食何物。以明是吞中毒。

凡問之不容。其人按腹呼痛。搖頭者。此中大毒。腹中痛極也。

凡診瘋犬咬傷。必當問其何時被咬。大抵七日內者。其病易治。七日外者。其病難醫。

凡問之言語顛倒。答非所問。此乃神昏。毒勢沉重也。

凡問之不容。其喉間呼痛。此有物卡於喉間也。

### 切脈要訣


一、診脈手法。經曰。脈者血之府也。周身血脈運行。莫不由此貫通。難經曰。十二經中。皆有動脈。獨取寸口。以決死生。寸口者。左右寸關尺。手太陰肺經動脈也。為脈之大要會也。

凡診人之脈。令仰其手。視掌後有高骨隆起。即是關部脈也。醫者覆手取之。先將中指取定關部。方下前後

二指於寸尺之上。病人長。則下指宜疎。病人短。則下指宜密。因其界乎尺寸二部之間。故命名曰關。



寸關尺所主部位圖



寸關尺所主部位

以寸候胸中。主上焦也。關候膈中。主中焦也。尺候腹中。主下焦也。

二、一呼一吸。醫者一呼一吸。病者脈來四至。為和平無病之脈也。五至六至。為太過。三至二至。為不及。不及太過。均屬病脈。

三、脈學大綱。切脈之法。全在識其大綱。大綱不違。是浮沉遲數四個字。浮沉是審其起伏。遲數是察其至數。浮沉之間。遲數寓焉。凡脈一見浮沉遲數之象。即是病脈。若是無病之人。其脈必不浮不沉而在中。不遲不數而四至。是謂平脈。是有胃氣。病脈則浮象在表。應病亦為在表。浮者輕按乃得。重按不見之謂也。急救科得

此脈。主毒在皮毛。輕淺之候也。沉象在裏。應病亦為在裏。沉者輕按不得。重按乃得之謂也。急救科得此脈。主毒勢在裏。沉重之候也。一息五六至者曰數脈。數為陽。陽主熱。而數有浮沉。浮而數。應表熱。沉而數。應裏熱。急救科得此脈。主毒勢壅盛。呼吸促迫也。一息三至二至者曰遲。遲為陰。陰主寒。而遲有浮沉。浮而遲。應表寒。沉而遲。應裏寒。急救科得此脈。主毒勢微小。正氣受傷也。脈狀種種。總該括於浮沉遲數四個字。然四者之中。又當以獨沉獨浮。獨遲獨數為準。則病獨見於何部。即知其病之所在。則病無遁情矣。

總 訣

急救凍死。切不可驟令近火。見火必大笑而死。

誤吞蠟水。速以肥皂水。或蘇打水服下。均可解救。

中百藥毒。一時不及備藥。速飲地漿湯。便可無礙。

百蟲入耳。切禁叫喊。速以手掩耳竅。右耳入者。掩左耳竅。左耳入者。掩右耳竅。其蟲即出。

凡燙傷。不可以冷水淋之澆之。犯之逼毒內攻。立成險候。

吞火柴頭。速服皮絲煙湯。

凡夢魘死。其室中原有燈者。存其燈。切不可吹滅。無燈者。切不可用燈照之。亦不可近前大聲呼喊。但痛咬其腳根。頻呼其名。以口水唾其面。再

以生薑湯灌之。必甦。

中煤毒死者。速擡出室外。令仰臥地上。用涼水洗頭部。並用人工呼吸法。神效。

吞生鴉片煙。以生鴉血多多灌之。最有效。



# 吊死證

## 總綱

一、吊死之至要急救法如何。

急救吊死。切不可割斷繩索。誤斷則不救。此至要知道之法。訣。切記切記。

二、抵住前陰之法如何。

急救吊死。急以衣裹手。緊抵糞門。

若係婦女。則連前陰抵住。毋令洩氣。

三、雞冠血灑鼻中。其效如何。

急救吊死。宜以雞冠血灑鼻中。男

左女右。男用雄雞。女用雌雞。如此一

飯之久。即有氣從口出。不可鬆手。

四、急救吊死。宜用灸法否。

急救吊死。宜以其兩手大拇指。並

吊死證

排平正。以小帶縛定。從兩指縫中。離

指甲角一分半之處。名鬼哭穴。用艾

火燒三七次。並繞兩腳心三次。即活。

凡無故中邪。或吊死者。以多燒鬼哭

穴為要。

五、吊死急救後。有痰上下。宜如何

施治。

吊死者。將救活時。有痰上下。仍頗

危殆。宜以炒熟生鹽二大包。從頸喉

壓至臍下。冷則隨換。不可住手。其痰

盡下。並用人對口以氣灌之。效驗如

神。

【病原】

氣機窒塞。吊死多由繩縛喉間。

呼吸阻滯。全身氣機窒塞。血管爆裂。

遂令致死。

【病狀】

目突舌伸。吊死者。將死未死之

時。全身血管爆裂。氣機窒塞。張目向

外望時。但覺黑影重重。佈於眼前。再

隔片時。氣機愈益窒塞。呼吸停止。目

突舌伸。渾身紫硬而死。

【療法】

一、不可割斷繩索。急救吊死。不

可割斷繩索。急以衣裹手。緊抵糞門。

若係婦女。則連前陰抵住。緩緩抱住

解下。安穩放倒。一人踏其兩肩。以手

緊提其髮。不可使頭垂下。一人微微

推摩喉嚨。一人按擦心胸。又輕輕摩

其肚腹。一人摩擦手足。緩緩變動。若

已硬直。但漸漸強彎曲之。又用腳裹

衣緊抵糞門前陰。勿使洩氣。以兩用

竹管吹其兩耳。不可住口。或用雞冠

血灌鼻中。男左女右。男用雞冠。女用

雌雞。如此一飯之久。即有氣從口出。

不可鬆手。少頃以淡薑湯。或清粥湯

灌之。令潤咽喉。漸漸能動乃止。

二、人工呼吸 吊死近世多用人工

呼吸法。亦頗有效。法詳溺死證。宜

參閱之。

【調養】 一、多以艾火燒鬼哭穴。吊死如

用前法。已救活。而未及一小時。忽又

死去者。宜將死者兩手大拇指。並排

平正。以小帶縛定。從兩指縫中。離指

為要。

二、生鹽熨運 吊死用上急救法

將救活時。而喉間有痰上下。仍頗危

殆。宜以炒熟生鹽二大包。從頸喉腋

至臍下。冷則隨換。不可住手。其痰盡

下。並用人對口以氣灌之。效驗如神。

三、宜服逍遙散 吊死救活後。氣

機自覺不舒達。胸滿脇痛者。調養之

法。宜服逍遙散。自可痊愈也。

結 論

吊死救治宜早。遲則不救。總之從

早至晚。雖已冷可活。自夜至早。稍覺

難救。若身體稍軟。心下微溫者。雖一

日以上。苟以上急救法救之。無不活

者。勿謂無望。忽略不救。至要至要。

吊死證各方法淺解類

(一)雞冠血方(驗方)

以雞冠血。(女用雌雞冠血)

灌於鼻中。男灌左鼻孔。女灌右

鼻孔。如欲速效。二鼻孔俱灌亦

可。

〔淺解〕 本方雞冠血味鹹性平。

得至高純陽之氣。故能辟陰邪。治中

惡五絕等症。並可通達竅門。以接垂

絕之氣。吊死者用此灌鼻。即此忘也。

(二)淡薑湯(驗方)

生薑六厚片。以百沸水泡。蓋片

時。即與服。自能痰氣下達。緩緩

活動而瘥。

〔淺解〕 本方生薑味辛性散。吊

死者服此。自能痰氣下降。咽喉潤澤

而瘥。

(三) 清粥湯 (仲景法)

以范志粥湯。少少與服。不可過多。

〔淺解〕 此乃潤澤咽喉之意也。

(四) 艾壯灸法 (鍼灸大成)

以艾絨圍成小三角形。上須尖。下須平。二十七枚。從兩指縫中

離指甲角一分半之處。名鬼哭

穴。用火燒二十一枚。並燒兩腳

心各三枚。即活。

〔淺解〕 此係通達陽氣之意也。

(五) 鹽熨方 (單方大全方)

以炒熱生鹽二大包。從頸喉熨至臍下。冷則隨換。不可住手。其

痰自下。

〔淺解〕 此係行痰舒氣順氣之

意。

(六) 逍遙散 (局方)

芍藥三錢。(酒炒) 當歸三

錢。白朮三錢。(炒) 白茯

苓三錢。炙甘草三錢。柴胡

三錢。生薑四片。薄荷一錢。

右以水八碗煮。取二碗。分二

次溫服。

〔淺解〕 本方以芍藥、當歸、和血。

白朮、茯苓、甘草、和氣。柴胡、生薑、薄荷、

舒氣。吊死救活後。宜以此方調理。最

佳。

# 溺死證

## 總綱

一 溺死之急救法如何。

溺水死者。撈起時急急將口撬開。橫置筷子一根於其中。使可出水。再以竹管吹其兩耳。

二 溺死者如何可使水自流出。

溺死者如在夏月。可將溺人肚腹橫覆牛背之上。兩邊使人扶住。牽牛緩緩而行。腹中之水。自能從口中並大小便流出。如在冬月。即將濕衣更換。一面炒鹽用布包熨臍。一面厚鋪被褥。取窰內草灰多多鋪於被褥之上。令溺人覆臥於上。臍下墊以棉枕一個。仍以草灰將渾身厚蓋之。灰上

再加被褥。不可使灰墜於眼內。即可甦醒。

按灰性燥而能拔水。凡蒼蠅溺水死者。以灰埋之。少頃即活。此明徵也。

三 溺死者竅門不開。宜用何法以開其竅。

溺死者用右救治法救後。已微有氣。胸前亦燥。惟竅門不開。昏迷如故。宜以粗紙燃燒取煙。熏其鼻竅。稍熏片時。即用皂角研細末。吹入鼻竅。但有微嚏。竅門即開。生命無憂矣。

四 溺死者救治後。有痰上下。仍未脫危險期。宜以何法治之。

溺死者救治後。有痰上下。仍未脫危險期。速以生薑湯灌之。痰氣自能下達也。神效。

五 溺死者救治後之調養法如何。

溺死救活後冬天宜少飲湯酒。夏天宜少飲粥湯。

### 【病源】

飲水過多。溺死由於飲水過多。塞住空氣進路。以致氣機窒滯所致。

### 【病狀】

肚腹膨脹。溺死者於將死未死之時。呼吸窒塞。無可奈何。乃從事吸水。不知水吸愈多。氣機愈益窒塞。循至肚腹膨脹。目突口張。無可奈何而死。

### 【療法】

一 將口撬開。溺死者撈起時。宜急將口撬開。橫置筷子一根於其中。使可出水。以竹管吹其兩耳。碾生半



夏取汁或末。吹其鼻孔。又用皂角末置管中。吹其穀道。如係夏月。可將溺人肚腹橫覆牛背之上。兩邊使人扶住。牽牛緩緩而行。腹中之水。自能從口中並大小便流出。再用生薑湯調蘇合丸灌之。或生薑汁灌之。並用生薑擦牙。若無牛用一人覆臥躬腰。令溺人如前。將肚腹橫覆於活人身上。令活人微微搖動。水亦可出。如係冬月。即將濕衣更換。一面炒鹽用布包熨臍。一面厚鋪被褥。取窻內草灰。多鋪於被褥之上。令溺人覆臥於上。臍下墊以棉枕一個。仍以草灰將渾身厚蓋之。灰上再加被褥。不可使灰塵於眼內。其餘口置篋。灌蘇合丸。生薑湯。吹耳鼻。穀道等事。俱照夏天


法。

二、人工呼吸。凡溺死、縊死、夢壓死等。近世多用人工呼吸法治之。亦頗有效。附錄於此。以供參考。

使肺中之水流出




人工呼吸法。是催起已經停止的真呼吸。在呼吸一時窒息時。行之有效。其法先使受術人平臥牀上。而於其背部墊一軟枕。施術人遂將受術人的胸部強壓。同時另由一人。將受術人的兩手屈折於胸廓上部。如是



將肺內的空氣驅出。隨後即將受術人胸部的壓迫鬆弛。同時舉其兩手至頭部外側。這時肺臟擴張。空氣遂又流入。依此反復行之。可使受術人吸入多量的空氣。而促起其自然的呼吸。凡窒息者。都可用此法急救。並無流弊。施術時。此一呼一吸的手術。宜自緩而急。行之不息。直至窒息者回復其真呼吸而止。惟窒息者急須新鮮的空氣。故必須在曠地中行之。若在室內多人之處。空氣污濁。不易見效。


上述係通用之普通法。近一八九六年。Rouch 氏又公表一新法。是法據著者之記載。可分 1. 受術者之體位。2. 施術者之位置。3. 吸氣法操

作。4. 吸氣運動。5. 呼氣法操作。6. 呼氣運動六項。先用長一尺闊一尺半




之枕。受術者取背位。橫枕於胸廓後方。兩肩不可超出枕之邊緣。其後端又不可達腰推。頭自在垂下。兩腕於肘關節部強屈。安置於胸部。施術者

伸張兩腳。左右展開。跨受術者頭部。而俯瞰其胸部。右足先端抵枕之腳部。左足先端約隔一尺。施術者以雙手把握受術者肘關節之內側。此際施術者之手取最強度之內轉位。於是將受術者兩腕在水平面上畫半圓形。可及的接近頭之兩側。施術者右足。去原有位置。而變為左右對稱




之位置。於兩腕水平面運動時。強向  
上方壓迫。身體中惟肩着於枕部。跟  
骨觸地。此時施術者膝部稍屈。由是  
施術者漸次伸膝。將手掌當肘關節  
外向右足漸進。壓受術者肘關節。使  
接近胸廓之中央線。施術者乃徐徐  
將上體向受術者屈曲。作俯下狀。再



溺  
死  
證

屈膝漸向胸部加壓力。壓之方向須  
垂直。吸氣呼氣於此告一段落。乃將  
兩腕復歸枕上原位置。更反覆行前  
次同樣操作。



【調養】

一、少飲湯酒。溺死救活後。在冬  
天者當少飲湯酒。在夏天者當少飲

粥湯。

二、宜以煙熏其鼻。溺死者如以  
上急救法施救後。微有呼吸。心下微  
溫。而竅門不開。昏迷如故。仍未脫危  
險期者。宜用粗紙燃燻煙熏其鼻竅。  
稍熏片時。即以皂角研細末吹入鼻  
竅。但得微有噴嚏。即可得生。

三、宜飲淡薑湯。溺死者如以上  
急救法施救後。微有呼吸。心下微溫。  
而喉嚨間有痰上下。仍未脫危險期  
者。宜速飲淡薑湯。痰自降而氣自利  
也。

結 論

溺死救治宜早。遲則身體僵硬。每  
無生望。然亦不可棄而不治。茲有一  
極效之法。述之於後。即身體已經僵

硬。苟急以此法救之。亦多生望。法先打壁泥一堆置地上。以溺人仰臥其上。更以壁土覆之。祇露口眼。水氣為泥土所吸收。其人即甦。雖身殭氣絕。用此法亦多可救。

初救起時。尚有微氣。速宜脫去濕衣。即以活人貼身熱衣脫下。與之更換。然後再用上急救法救之。每得獲救。此最為重要。不可忽略也。

溺死證各方淺解類

(一) 生半夏汁方 (金鑑方)

以生半夏六錢。甚者一兩。取汁。(或研為末亦可。然不及汁之效力速) 灌入鼻孔中。

〔淺解〕 本方生半夏善行痰通竅。溺死取汁灌入鼻孔。亦此意也。

(二) 皂角末方 (金鑑方)

以皂角末四錢。研為細末。置管中。吹其數道。

〔淺解〕 本方皂角開關利竅。導滯行痰。吹入穀道。通其氣機。使水由此下達。可以無礙也。

(三) 生薑湯 (驗方)

即淡薑湯。見吊死證各方淺解。

(四) 蘇合香丸 (局方)

蘇合香油五錢。(入安息香內) 安息香一兩。(另為末。用無

灰酒半斤熬膏) 丁香一兩。青木香一兩。白檀香一兩。沉香一兩。藁撥一兩。香

附子一兩。訶子一兩。(煨去肉) 踳烏犀一兩。硃砂一

兩。(水飛) 薰陸香五錢。片

腦五錢。(研) 麝香七錢半。右研為細末。入安息香膏。煉蜜和劑。圓如芡實大。每服四九。空心用沸湯化下。溫酒下亦可。

〔淺解〕 本方乃一派辛香走竅

辟穢通竅之品。溺死將救活時。以此丸與生薑湯同服。自可漸漸清醒也。

(五) 鹽熨方 (單方大全)

見吊死證各方淺解類。

(六) 煙薰方 (金鑑方)

以粗紙燃燒取煙。熏其鼻竅。自能通竅也。

〔淺解〕 本方粗紙煙薰鼻竅。取其通竅之意。且能收水燥濕。溺死施此。最著功效。

# 吞生鴉片證

## 總綱

- 一 吞生鴉片之急救法如何。  
吞生鴉片煙者。其毒直攻腸胃。往往致人死命。解救之法。速以生鴉片血多多灌之。最有神效。
  - 二 急救吞生鴉片煙者。有何禁忌。  
吞生鴉片煙者。救時不可見日光。一見日光。即不可救。此最宜注意。
  - 三 吞生鴉片煙死者。如何為可救。  
如何為不可救。請一一道其詳。
- 凡吞生鴉片者。雖四肢已冷。而身體尚軟。無不可救。以身體柔軟。則臟腑經絡之氣。尚在流通。實未死也。此時苟以急救法救之。無不可活。若身

吞生鴉片證

體已硬。則雖有神丹。無能為力矣。  
四 吞生鴉片死者救活後。其調養法如何。

吞生鴉片死者救活後。餘毒未盡。腹中時時作痛。宜多服白糖水。及生棗豆粉。以開水沖服。自能清其餘勢也。

五 吞生鴉片後。欲急救之。但牙關緊閉。無從灌藥。宜用何法。

吞生鴉片後。牙關緊閉。無從灌藥。速以筷子撬開。或用烏梅擦之。亦開。若用銅鐵等物。反不能開矣。

### 【病源】

中毒 生鴉片毒力甚強。能使神經麻痺。故食者多失去知覺。甚至手足青黑而死。

### 【病狀】

呼吸短促 吞生鴉片煙後。最初症候。為頭重眩暈。顏面潮紅。瞳孔縮小。呼吸短促。脈象頻數。漸至失去知覺。陷於昏迷狀態。

### 【變症】

面如土色 吞生鴉片煙後。失於救治。其毒益深。口吐白沫。面如土色。呻吟欲絕。末後必面黑。手足青黑而死。

### 【療法】

一 呼吸短促之療法 吞生鴉片煙後。最初症候。為頭重眩暈。顏面潮紅。瞳孔縮小。呼吸短促。脈象頻數。漸至失去知覺。陷於昏迷狀態。急救之法。速以生鴉片血多多灌之。最為神效。

如牙齒緊閉。可用筷子撬開。或用烏梅擦之。亦開。若用銅鐵等物。反不能開矣。救時不可見日光。一見日光。即不可救。三四日後。鴉片之氣散盡。即生。如身體不硬。即七日之內。亦可回生。切不可為無救。遂行棺殮。

二、桐油吐法 吞生鴉片煙後。宜用明雄黃二錢。雞蛋清兩個。生桐油一兩。若和燒酒吞下者。加入葛花三錢。炒黃為末。各味均用河水調和服下。即吐。如未和燒酒吞食者。不可用葛花。服藥後。或微吐未暢。煙毒未盡。或不肯速吐。可用硬鴨毛。或硬雞毛。蘸桐油掃咽喉。必令其煙毒吐盡。然後進以稀粥。如胃氣未和。食之又必作吐。再吐之後。即用生甘草五錢。食

鹽五分。明白礬五分。金銀花五錢。土茯苓五錢。煎湯服之。以追餘毒。愈後宜多食柿餅。以解桐油之毒。

三、棉花吐法 法以木棉花六錢。

倉卒不可得。可於廣東香牛皮墊褥內取之。然以預蓄為妙。撕鬆。用潔淨大瓦鉢。將鐵火鉗又開。架於鉢口。加食鹽二錢。同煨成灰。出火氣。再用木棍搗灰。並鹽。成極細末。開水半碗。沖入鉢內。用手將鉢內四面之灰。洗入湯內。復用箸在鉢內調勻。連灰帶湯。全行服下。不吐再服之。以多吐為妙。片刻之間。煙毒可盡吐出矣。間有不吐者。則從大便瀉出。煙毒亦自解去。神效。

四、洋皮皂吐法 用洋皮皂化水

服之。大吐後。即愈。

五、礬砂散 用真南礬砂五錢。（黃色如膠者為真）冷沸水調服。可以立解。屢試有效。

【調養】

一、忌灌醬油 吞生鴉片煙者。切忌灌服醬油。恐受鹽滷之毒。反致誤事。亦不可倉皇無措。雜藥亂投。慎之。  
二、宜服白糖水 吞生鴉片煙者。救活後。宜多服白糖水。及以生棗豆粉開水沖服。清其餘毒。可以安泰。  
三、人工呼吸 吞生鴉片煙。用右列各方急救。嘔吐既暢。後即扶持病者。使走。若不能走。而呼吸困難時。則使安臥牀上。急施人工呼吸法。自可脫離危險期。（人工呼吸法詳溺死

證)

### 結論

吞生鴉片者救治宜早。遲則毒攻腸胃。每難獲救。若與燒酒同吞者。其毒尤烈。救治尤難。本證諸方。雖俱極靈驗。然必早施。遲則正氣衰弱。毒熱猖獗。雖有神丹。不能獲救也。

### 吞生鴉片證各上方淺

#### 解類

#### (一) 鮮鴨血方(驗方)

以活鴨一隻殺之。取其血。多多灌之。

#### (淺解) 本方鴨血味鹹性冷。善

解丹石。砒霜。鴉片諸毒。

#### (二) 烏梅擦牙方(驗方)

以真烏梅二三枚。擦於牙關。其

吞生鴉片證

### 牙即開。

〔淺解〕 本方烏梅味極酸。擦於牙根。酸不能忍。不得不張開也。

#### (三) 雄黃桐油方(驗方)

明雄黃二錢。雞蛋白兩個。生桐油一兩。若和燒酒吞下者。加入葛花三錢。炒黃爲末。

右以冷沸水一碗。調和。頓服。以服

下即吐爲效。如未和燒酒吞食者。去

葛花不用。若服藥後微吐不暢。或不

肯速吐。可用硬鴨毛。或硬雞毛。蘸桐

油掃咽喉。必令其煙毒吐盡。然後進

以稀粥。微和胃氣。

#### (淺解) 本方以雄黃解煙毒。雞

子清煙熱。桐油取吐。葛花解酒。吞

生鴉片服此方後。必以吐盡煙毒爲

效。否則必須以硬雞毛引吐。始可無礙也。

#### 〔附註〕 服此方後。以煙毒吐盡

而吐猶不止者。此中桐油毒也。宜多食柿餅解之。或以蓮蓬四隻。以水五碗煮。取二碗。分二次溫服。亦頗有效。

#### (四) 銀花生甘草湯(驗方)

金銀花五錢。生甘草五錢。土茯苓五錢。食鹽五分。白礬五分。

右以水五碗煮。取二碗。去渣。分二

次溫服。

#### (淺解) 本方銀花。生甘草。食鹽。

以解未盡之煙毒。白礬。茯苓。以收未盡之濕氣。吞生鴉片者。服桐油方大吐後。而餘毒未盡。不可再投。宜接服

此方自能解毒止吐。如吐猶不止者。當服柿餅以止之。

(五) 木棉花湯 (驗方)

以木棉花六錢。搗鬆。用潔淨大瓦鉢。將鐵火鉗叉開。架於鉢口。加入食鹽二錢。同煨成灰。出火氣。再用木棍搗灰鹽成極細末。開水半碗沖入鉢內。用手將鉢內四面之灰洗入湯內。復用箸在鉢內調勻。連灰帶湯全行服下。以吐為妙。不吐再服之。片刻之間。煙毒盡行吐出。可以無礙。間有不吐者。則從大便瀉出。煙毒亦自解去。神效。

〔淺解〕 本方以木棉花取吐而解煙毒。佐以食鹽。其功益著。

(六) 洋皮皂方 (驗方)

以洋皮皂二錢。(劇者三錢)化為水服之。使大吐煙毒。吐盡即可無憂。

〔淺解〕 本方洋皮皂善使人吐。

煙毒吐盡。便可無憂。與雄黃桐油方。木棉花湯。俱有異曲同工之妙。

(七) 真南礶砂方 (驗方)

以真南礶砂五錢。(黃色如膠者真)冷沸水調服。煙毒立解。神效。

〔淺解〕 本方礶砂味苦辛性溫。善消痰行積。溶解鴉片毒。



# 煤毒證

## 總綱

### 一 何謂煤毒。

煤氣中毒的原因。由於煤氣中含  
有少量一氧化碳。此氣吸入人體以  
後。能吸出血液中的氧氣。而成碳酸  
氣。故能使人窒息。而現中毒現象。是  
謂煤毒。

### 二 急救煤毒死。有何妙法。

中煤毒死者。速擡出室外。令仰臥  
地上。用涼水洗頭部。並用人工呼吸  
法。神效。

### 三 中煤毒者救活後。應如何調養。

中煤毒者救活後。其人頭暈咽痛  
胸悶。殊覺不適。宜以白蘿蔔汁開水

沖服。各恙俱瘥。神效。

### 四 中煤毒死者。以何時最多。

中煤毒死者。以嚴寒時最多。

### 五 預防中煤毒。有何妙法。

預防中煤毒。宜裝有煙囪之煤爐。  
並於爐中投菓子青果等物。房中宜  
常置冷水一盆。並使窗戶有透氣處。  
則煤氣不佈。此種弱變。自可避免。

### 【病源】

碳酸氣太多 煤氣的種類甚多。

如煤窰的煤氣。燃燈用的煤氣。以及  
汽車放出的煤氣等。均能使人中毒。

煤氣中毒的原因。由於煤氣中含

有少量一氧化碳。此氣吸入人體以  
後。能吸出血液中的氧氣。而成碳酸  
氣。故能使人窒息。而現中毒現象。

### 【病狀】

頭痛眩暈 中煤毒者。其人呼吸

困難。脈息急速。頭痛眩暈。中毒深者。

則呼吸窒塞。昏然睡去不醒。

### 【變症】

面白身軟 中煤毒後。失於救治。

久之呼吸斷絕。面白身軟。與夢魘死  
者相似。

### 【療法】

一 人工呼吸 中煤毒後。急救者。

應先把患者離開煤氣處。但此時救  
護者。亦宜自己留心。勿吸煤氣。最好

用特製的面罩。罩住口鼻。把患者扶  
出之後。宜即移入溫暖而通空氣的

室內。施以人工呼吸法。(人工呼吸  
法詳溺死證)如中毒不深。只須使

患者靜臥。飲以熱茶、咖啡等與香劑。

二、涼水洗頭。中煤毒後。一法以涼水洗頭部。亦頗有效。如牙關緊閉。以竹篾撬開。以鮮蘿蔔汁灌之。即可清醒。

【調養】

一、預防法。我國社會上。在冬季。因煤爐而起中毒的甚多。每使闔家之人。皆瀕危險。其因燃燈用的煤氣而中毒者。亦有之。故臥室中無換氣裝置的。絕對不可置無煙囪的煤爐。燃燈用的煤氣管。宜時時檢查。勿使漏氣。汽車廠棧亦須有適當的換氣裝置。總之空氣流通。為預防煤氣中毒的最好方法。故居室的換氣裝置。實為必要的。

二、宜服白蘿蔔汁、橄欖汁。中煤毒者救活後。其人頭暈、咽痛、胸悶。殊覺不適。宜以白蘿蔔汁、橄欖汁開水沖服。諸恙悉瘥。神效。

結論

本證中煤毒之急救法。俱極靈驗。惟此證意外一面宜救治得早。一面須着重預防法。則煤毒雖烈。不能為害。否則單靠驗方。仍無功也。此最宜注意。

煤毒證各方淺解類

(一) 鮮蘿蔔汁方 (驗方)

以鮮白蘿蔔一枚。(劇者須大者一枚) 打取汁。如汁太濃。加入些許冷開水亦可。

〔淺解〕 本方鮮蘿蔔味辛性散。

能解煤毒而化痰氣。

(二) 蘿蔔橄欖方 (王孟英方)  
鮮蘿蔔汁、鮮橄欖汁各一小盅。以開水沖成一碗。頓服。

〔淺解〕 本方橄欖一名青果。清肝治咽痛。兼解煤毒。佐以蘿蔔。功效益著。

# 夢魘死證

## 總綱

### 一 何謂夢魘死。

其人入睡後。做有惡夢。覺有人直壓其身。不能發聲動作。殊為困苦。甚者氣機窒塞而死。是謂夢魘死。

### 二 夢魘死何由而生。

其人日中異常辛苦勞倦。或肝火旺盛。大怒之後。及其入睡。均有夢魘發生。

### 三 急救夢魘死。有何妙法。

夢魘死者。其室中原有燈者。存其燈。切不可吹滅。無燈者。切不可用燈照之。亦不可近前大聲呼喊。但痛咬其腳根。頻呼其名。以口水唾其面。再

以生薑湯灌之。必甦。

### 四 預防夢魘死。有何妙法。

預防夢魘死最佳之方法。即臥時宜側臥。切不可仰臥。蓋側臥胸部無衣被之壓迫。氣機調達。此種意外之變。自不發生也。

### 五 夢魘死救活後之調養法如何。

夢魘死救活後。宜舒達其氣機。當服逍遙散四五劑。自可完全痊愈也。

### 【病源】

日中辛苦。其人日中異常辛苦勞倦。或肝火旺盛。大怒之後。及其入睡。遂有夢魘死之意外發生。劇者氣機窒塞而死。是謂夢魘死。

### 【病狀】

不能呼吸。夢魘死其人入睡後。

做有惡夢。覺有人直壓其身。不能發聲動作。殊為困苦。掙扎久之。仍不清醒。而氣分益阻。不能呼吸。遂氣窒而死。

### 【療法】

一 咬其腳根。夢魘死其人入睡後。做有惡夢。覺有人直壓其身。不能發聲動作。殊為困苦。掙扎久之。仍不清醒。而氣分益阻。不能呼吸。遂氣窒而死。急救之法。不可近前大聲呼喊。但痛咬其腳根。頻呼其名。以口水唾其面。或以雞冠血搽面上。乾則再搽。即醒。醒後如有痰上下。宜服淡薑湯。〔附註〕 走進夢魘死者房室時。如死者室內原有燈火。不可吹滅之。如無燈火。不可點之。此最宜注意。反

此每無醒望。

二、生半夏吹入鼻中 夢魘死後。

以右急救法救之。如仍未清醒者。急以生半夏末吹入鼻中。或用竹管吹其兩耳。以皂角末如豆大許吹兩鼻。得噴嚏則氣通。苟施此法。雖氣絕一二日。如胸尚溫。亦可救活也。

三、人工呼吸 夢魘死近世多用人工呼吸法。亦頗有效。法詳溺死證。宜參閱之。

【調養】

一、睡時不可仰臥 預防夢魘死最佳之法。即睡時宜側臥。切不可仰臥。蓋側臥胸部無衣被之壓迫。氣機調達。此種意外之變。自不發生也。

二、服逍遙散 夢魘死者救活後。

宜舒達其氣機。當服逍遙散五劑。自可完全痊愈。

三、切戒怒鬱 預防夢魘死。其人平時性情常宜和悅。切戒鬱怒。如此肝氣調達。魂魄安舍。此種病自可避免。

結 論

夢魘死閩女尼姑寡婦生此者最多。以此輩成孤苦無告。心中拂鬱。肝氣不舒。魂不安舍。入睡遂生此病。故治法一面須用右急救法救之。一面宜調達氣機。悅其情志。是乃根本之計也。

夢魘死證各方淺解類

(一) 築冠血搽面方 (驗方)

以雄雞冠血搽於面上。乾則再搽。即可清醒。

〔淺解〕 本方雄雞冠血。味鹹性平。得至高純陽之氣。辟陰邪。治中惡五絕等症。並可通達壅塞之氣。故能治夢魘死也。

(二) 淡薑湯 (驗方)

見吊死證各方淺解類。

(三) 生半夏末方 (千金方)

見凍死證各方淺解類。

(四) 皂角末方 (金鑑方)

以皂角末如豆大許。吹兩鼻。得噴嚏則氣通。

〔淺解〕 本方皂角善開關利竅。

(五) 逍遙散 (局方)

見吊死證各方淺解類。

# 急救人畜蛇蟲咬傷

## 證

### 總綱

一 何謂人畜蛇蟲咬傷。  
 凡被人、虎、狼、熊、家犬、蛇、蜈蚣、壁虎、等咬傷，傷處腐爛腫痛，膿水淋漓，是謂人畜蛇蟲咬傷。

二 急救人畜蛇蟲咬傷證共分幾類。

- 一、人咬傷類。
- 二、熊虎狼咬傷類。
- 三、家犬咬傷類。
- 四、馬咬傷類。
- 五、豬咬傷類。
- 六、猴咬傷抓傷類。

急救人畜蛇蟲咬傷證

### 共二分

三 急救人畜蛇蟲咬傷證各病之

- 七、貓咬傷類。
- 八、鼠咬傷類。
- 九、蛇咬傷類。
- 一〇、毒蛇纏身不脫類。
- 一一、蜈蚣咬傷類。
- 一二、蠍螫傷類。
- 一三、射工傷類。
- 一四、蜘蛛咬傷類。
- 一五、壁蟻蛛咬傷類。
- 一六、蚯蚓咬傷類。
- 一七、蠶咬傷類。
- 一八、烏龍刺傷類。
- 一九、蠟燭咬傷類。
- 二〇、毒蚊咬傷類。
- 二一、各種毒蟲咬傷類。

### 主要治法如何。

- 一、人咬傷 童便浸傷處。
- 二、熊虎狼咬傷 葛根洗方。
- 三、家犬咬傷 胡椒末方。
- 四、馬咬傷 栗子嚼爛敷患處。
- 五、豬咬傷 生龜板敷方。
- 六、猴咬傷抓傷 金狗脊散。
- 七、貓咬傷 陳薑頭嚼爛敷方。
- 八、鼠咬傷 荔枝敷方。
- 九、蛇咬傷 煙油方。
- 一〇、毒蛇纏身不脫 令其人在地上轉滾。
- 一一、蜈蚣咬傷 雞口內涎水方。
- 一二、蠍螫傷 蝸牛方。
- 一三、射工傷 豆豉清油敷方。
- 一四、蜘蛛咬傷 藍靛雄黃湯。

一五、壁蟻蛛咬傷 桑枝白礬散。

一六、蚯蚓咬傷 鹽湯洗方。

一七、蠶咬傷 芋蕪葉汁塗方。

一八、烏龍刺傷 糞坑壘敷方。

一九、蠅咬傷 鹽湯綿濕瘡上。

二〇、毒蚊咬傷 紫金錠。

二一、各種毒蟲咬傷 二味拔毒散。

散。

四 人畜蛇蟲咬傷證之調養法如何。

凡被人畜蛇蟲咬傷。俱當忌食發

物。如雞鵝牛羊蝦蟹海腥等。

凡被毒蚊咬傷。速以紫金錠塗於

傷處。否則毒氣壅盛。變為疔瘡。有生

命危險也。

五 人畜蛇蟲咬傷證各病失治。有

何變症。

人畜蛇蟲咬傷證各病失治。或膿

水淋漓。痛入骨髓。或則傷處腐爛。久

久不已。或毒氣壅盛。變為疔瘡。或毒

攻臟腑。危害生命。故此種病。宜一起

即治。切不可延擱也。

人咬傷物類

【病源】

齒垢最毒 人牙齒常食炙爆之

物。漸漬污垢。有劇毒。故一經咬傷。傷

處即腫痛臭爛。異於尋常。是謂人咬

傷病。

【病狀】

腫痛臭爛 人咬傷傷處高腫臭

爛。異於尋常。黃水淋漓。疼痛如刺。

【變症】

時流臭膿 人咬傷失治。傷處腫

爛益劇。熱如火燒。時流臭膿。疼痛如

刺。臥不安席。

【療法】

一、腫痛臭爛之療法 人咬傷。高

腫臭爛。異於尋常。黃水淋漓。疼痛如

刺。初咬傷時。急令眾人撒熱尿浸傷

處。洗淨牙垢瘀血。上以蟾酥餅貼之。

漸漸出微膿而愈。如初咬時。未用此

法。致腫痛不已者。速以薑便洗淨搥

乾。以粗紙捻蘸麻油點火。以煙熏傷

處。以解其毒。良久仍以蟾酥條插入。

太乙膏蓋之。候腫消時。換敷玉紅膏。

便可全愈。

二、時流臭膿之療法 人咬傷失

治。傷處腫爛益劇。熱如火燒。時流臭

腫、疼痛如刺。臥不着席。速以童便洗之。人糞塗之。腫潰時人中黃熬湯時洗。以蟾酥條插入。太乙膏蓋之。候腫消時。換敷玉紅膏。便可收功。

【調養】

一、宜以銀花泡飲。人咬傷宜以銀花連翹泡飲代茶。則傷處易瘡。以其既能清熱。又可解毒故。

二、忌食雞鵝。人咬傷忌食雞鵝羊肉。辛辣香燥。蚌蛤河豚。蝦蟹海腥。煎炒炙爆。膏粱厚味等物。

三、宜以人糞塗。人咬傷傷處疼痛。速以人糞塗之。其痛立止。腫即消。最著功效。初起卽以此治。可不致臭爛也。

熊虎狼咬傷類

養教人畜蛇蟲咬傷證

【病源】

牙毒內侵。熊虎狼齒牙有劇毒。誤被咬傷。其毒卽由傷處內侵。而使肌肉腫痛腐爛或血流不止。是謂熊虎狼咬傷病。

【病狀】

出血腫痛。熊虎狼咬傷其人血必大出。傷口立時潰爛。疼不可當。周圍紅熱高腫。

【變症】

爛見骨節。熊虎狼咬傷失治。傷處腫痛益甚。血肉糜爛。深可見骨。呻楚欲絕。以獸類齒牙殊毒。失治後牙毒內侵。故糜爛無已也。

【療法】

一、牙毒內侵之療法。熊虎狼咬

傷其人血必大出。傷口立時潰爛。疼不可當。周圍紅熱高腫。急以生豬肉貼之。隨貼隨化。隨化隨換。兼以地榆一觔爲細末。加入三七末三兩。苦參末四兩。和勻摻之。隨濕隨搽。血卽止而痛卽定。奏效如神。

熊虎狼咬傷傷處如腐爛不已者。宜以葛根濃煎內服一二碗。外洗日十度。或煮生鐵有味者洗之。又以青布急捲爲繩。燃着納竹筒中。注瘡口薰之。出毒水。次宜獨窠栗子。生嚼塗於傷口。神效。

二、爛見骨節之療法。熊虎狼咬傷失治。傷處腫痛益甚。血肉糜爛。深可見骨。呻楚欲絕。以獸類齒牙殊毒。失治後牙毒內侵。故糜爛無已也。速

以生鐵水方洗之。洗後以青布急捲為繩。燃着納竹筒中。注瘡口薰之。出毒水。以糖酥餅貼之。漸漸出微膿。腫消換敷玉紅膏。便可收功。

【調養】

一、忌食蝦蟹 熊虎狼咬傷忌食魚腥蝦蟹。膏粱厚味。雞鵝羊肉。蚌蛤河豚。辛辣香燥。煎炒炙爆等物。

二、一味葛根涼泄 熊虎狼咬傷忌服辛熱溫劑。恐助火益毒。增其痛爛。若初起即以一味葛根泡飲代茶。清涼泄毒。每能止爛定痛而愈。

三、切戒房慾 熊虎狼咬傷宜切戒房慾。以一犯房戒。瘡口迸裂。毒氣延蔓。不能痊可。

家犬咬傷類

【病源】

齒有劇毒 家犬（非瘋犬）齒牙有劇毒。偶被咬傷。傷處腫痛。是謂家犬咬傷病。

【病狀】

腫痛腐爛 家犬咬傷傷處腫痛。腐爛。血流不止。

【變症】

疼痛如刺 家犬咬傷失治。傷處腐爛益甚。疼痛如刺。血水淋漓。久而不已。至為困苦。

【療法】

一、腫痛腐爛之療法 家犬咬傷傷處腫痛。腐爛。血流不止。先須忍痛。以河水洗淨血水。再刮生虎骨末。搽之。或以胡椒研細末敷之。雖傷重亦

不過數日收功。惟初敷必痛而且腫。少刻。痛止腫消。

二、疼痛如刺之療法 家犬咬傷

失治。傷處腐爛益甚。疼痛如刺。血水淋漓。久而不已。至為困苦。速以生甘草煎成濃湯洗淨毒氣。再以熱牛糞敷之。即時痛止爛定而癒。

【調養】

一、忌食發物 家犬咬傷忌食發物。如雞鵝羊肉。蚌蛤河豚。蝦蟹海腥等。

二、氣血虛弱 家犬咬傷其人因病中血水滲漏過多。痊愈後。面黃肌瘦。精神疲憊。此氣血俱虛也。調養之法。宜服八珍湯。

三、切戒房慾 家犬咬傷愈後。其



人須戒絕房慾百日。否則瘡口迸裂。病重作也。

### 馬咬傷類

#### 【病源】

馬齒有毒。馬之齒牙有劇毒。偶被咬傷。傷處即高腫紅熱。時時疼痛。是謂馬咬傷病。

#### 【病狀】

時時疼痛。馬咬傷處高腫紅熱。時時疼痛。血水淋漓。劇則糜爛。

#### 【變症】

心神昏憤。馬咬傷失治。毒氣內攻。心神昏憤。煩悶嘔吐。最為危急。

#### 【療法】

一時時疼痛之療法。馬咬傷傷處高腫紅熱。時時疼痛。血水淋漓。劇

愈救人畜蛇蟲咬傷證

則糜爛。宜即以粟子嘔爛敷之。自癒。

二、心神昏憤之療法。馬咬傷失

治。毒氣內攻。心神昏憤。煩悶嘔吐。最為危急。速以馬齒草煎湯飲之。即效。

外以馬鞭子挽手及鞭穗煙灰存性研末。豬脂搗合貼之。俱效。

#### 【調養】

一、忌食發物。馬咬傷忌食動風

發物。如雞鵝羊肉。蚌蛤河豚。蝦蟹海腥。膏粱厚味。辛辣香燥。煎炒炙爆等。

二、久不收口。馬咬傷紅腫已消。而久不收口。時流膿水。調養之法。宜

以腐盡生肌散撒之。自能完全收功也。

三、瘡口癢時不可抓。馬咬傷瘡

口將滿。新肉生長時必奇癢。此時宜

百般忍耐。不可抓之。以誤被抓破。必致翻疤也。

### 豬咬傷類

#### 【病源】

齒牙有毒。豬之齒牙有毒。誤被咬傷。傷處腐爛。血水淋漓。是謂豬咬傷病。

#### 【病狀】

傷處腐爛。豬咬傷傷處腐爛。血水淋漓。周圍紅腫。疼痛如刺。不能片刻忍。

#### 【變症】

臥不着席。豬咬傷失治。傷處腐爛益劇。血水益多。紅腫益甚。熱如火燒。疼痛如刺。臥不着席。

#### 【療法】

一、傷處腐爛之療法

豬咬傷傷處腐爛。血水淋漓。周圍紅腫。疼痛如刺。不能片刻忍。速以生龜板炙研細。麻油調搽即愈。藥店多以熬過龜板假充。必不見效。須用生的自炙為要。或以熟松香貼傷處。數日便愈。

二、臥不着席之療法

豬咬傷失治。傷處腐爛益劇。血水益多。紅腫益甚。熱如火燒。疼痛如刺。臥不着席。速以生龜板末麻油調搽。便可減輕。如腫勢已消。瘡不收口。宜以腐盡生肌散撒之。玉紅膏蓋貼。便可收功。

【調養】

一、忌食羊肉。豬咬傷忌食發物。如雞鵝牛羊肉。蚌蛤河豚。蝦蟹海腥。膏粱厚味。辛辣香燥。煎炒炙爆等。

二、生肌藥施用不宜過早

豬咬傷若紅腫不消。是毒氣壅盛也。此時切不可施用生肌藥。苟勉施之以圖收口。則毒勢內蘊。漫無出路。一旦爆發。無可收拾。最宜注意。

三、宜以生甘草泡飲代茶

豬咬傷其人口渴心煩。百般不如意。是毒氣壅盛也。調養之法。宜以生甘草泡飲代茶。自有奇效。

猿猴咬傷抓傷類

【病原】

牙爪有毒。猿猴齒牙有毒。爪亦有毒。誤被咬傷抓傷。傷處腐爛。疼痛難忍。是謂猿猴咬傷抓傷病。

【病狀】

疼痛難忍。猿猴咬傷抓傷。傷處

腐爛。周圍紅腫。疼痛難忍。血水淋漓。

【變症】

傷處熱如火燒。猿猴咬傷抓傷失治。傷處腐爛益劇。紅腫益甚。熱如火燒。血水淋漓。或流臭膿。疼痛如刺。不能片刻忍。

【療法】

一、疼痛難忍之療法。猿猴咬傷抓傷。傷處腐爛。周圍紅腫。疼痛難忍。血水淋漓。速以金毛狗脊焙研末。麻油拌調。搽敷患處立愈。

二、傷處熱如火燒之療法

猿猴咬傷抓傷失治。傷處腐爛益劇。紅腫益甚。熱如火燒。血水淋漓。或流臭膿。疼痛如刺。不能片刻忍。急以金狗脊麻油調和敷之。若紅腫已消。瘡口不

飲者。以腐盡生肌散搽之。玉紅膏蓋貼。便可全愈。

【調養】

一、忌食發物 猿猴咬傷忌食發物。如雞鵝羊肉。蚌蛤河豚。蝦蟹海腥。膏梁厚味。辛辣香燥。煎炒炙爆等。  
二、以麻油時塗 猿猴咬傷傷處熱似火燒。愈增其痛。調養之法。宜以麻油時塗。燒熱即瘥。以能清熱解毒也。

貓咬傷類

【病源】

齒牙有毒 貓之齒牙有毒。誤被咬傷。傷處高腫疼痛。是謂貓咬傷病。

【病狀】

腫痛流膿 貓咬傷傷處高腫。疼

痛。時流膿水。

【變症】

腐爛不已 貓咬傷失治。傷處膿水益多。漸增腐爛。疼痛倍加。

【療法】

一、腫痛流膿之療法 貓咬傷傷處高腫疼痛。時流膿水。速以薄荷煎成濃湯。乘熱洗之。洗後以陳薑頭曬爛敷之。次日結痂。神效。

二、腐爛不已之療法 貓咬傷失治。傷處膿水益多。漸增腐爛。疼痛倍加。速以薄荷湯洗之。洗後以陳薑頭曬爛敷之。敷後腫痛全除。猶未收口者。當換敷腐盡生肌散。以玉紅膏蓋貼。便可全愈。

【調養】

一、忌食發物 貓咬傷忌食發物。如雞鵝羊肉。蚌蛤河豚。蝦蟹海腥。膏梁厚味。辛辣香燥。煎炒炙爆等。

二、生肌藥施用不宜過早 貓咬傷若紅腫未消。是毒氣壅盛也。此時切不可用生肌藥。苟勉施之以圖收口。則毒勢內蘊。漫無出路。一旦爆發。無可收拾。最宜注意。

三、宜以銀花泡飲 貓咬傷其人。心煩口渴。傷處高腫紅熱。此毒勢壅盛也。調養之法。宜以銀花泡飲代茶。自可無礙。

鼠咬傷類

【病源】

鼠齒上有毒黃 鼠齒細長。上有毒黃。偶被咬傷。傷處即腫痛腐爛不

已傷及筋骨。最爲難愈。是謂鼠咬傷病。

【病狀】

腫痛腐爛。鼠咬傷處漫腫。疼痛腐爛不已。膿血時流。久不愈。必傷筋骨。

【變症】

傷及筋骨。鼠咬傷失治。久久不愈。腐爛不已。毒黃內攻。必傷筋骨。成爲廢疾。或因膿血滲漏過多。氣血大虧。而成瘡癤。

【療法】

一、腫痛腐爛之療法 鼠咬傷傷處漫腫疼痛。腐爛不已。膿血時流。久不愈。必傷筋骨。宜以荔枝枝嚼融敷之。神效。或以貓尿洗去毒血。再以貓尿

填傷處。亦頗有效。

二、傷及筋骨之療法

鼠咬傷失治。久久不愈。腐爛不已。毒黃內攻。必傷筋骨。成爲廢疾。宜於未傷筋骨之前。速內服香椿樹皮汁方。使宿毒全消。再以貓尿洗去毒血。洗後以貓尿塗之。若腫勢已消。腐爛已止。久不收口者。宜換敷腐盡生肌散。以玉紅膏蓋貼。便可全愈。

鼠咬傷失治。其人因膿血滲漏過多。氣血大虧。而成瘡癤。速宜內服琥珀蠟礬丸。參茸膏。待正氣健旺。自能漸漸收口也。

【調養】

一、忌食發物 鼠咬傷忌食膏粱厚味。煎炒炙燥。辛辣香燥。雞鵝羊肉。

蝦蟹海腥。蚌蛤河豚等物。

二、宜服香椿樹皮汁

鼠咬傷預防傷勢漫大。宜於咬傷時卽服香椿樹皮汁一酒杯。和黃酒服下。則毒氣自消。根盤收小。易痊愈也。

三、宜補氣血

鼠咬傷愈後。其人因病中膿血滲漏過多。氣血大虛。精神疲憊。調養之法。宜常服八珍湯。自能漸漸復元也。

蛇咬傷類

【病源】

蛇齒毒甚。蛇齒最毒。其人行竹園內。及多草之處。誤被咬傷。傷處掀腫。腹脹如箕。是謂蛇咬傷病。

【病狀】

頭暈目昏 蛇咬傷。傷處掀腫疼

痛劇則腫勢蔓延。頭暈目昏。腹脹如箕。毒輕者三日內可治。毒重者片刻即死。

【變症】

心神昏憤。蛇咬傷失治。毒氣蔓延。攻入心胸。心神昏憤。口吐白沫。頭眩目花。舌強。不能言語。腹脹如箕。危在頃刻。

【療法】

一、頭暈目昏之療法。蛇咬傷傷處。焮腫疼痛。劇則腫勢蔓延。頭暈目昏。腹脹如箕。毒輕者三日內可治。毒重者片刻即死。初起能急以利刀割去所咬之肉。最妙。否則立將傷處用繩絹兩頭紮定。再飲好醋一二碗。使毒氣不能遊走。速取竹木桿煙筒內

煙油。其色如醬。用冷水洗出。飲一二碗。受毒重者。其味必甜而不辣。以多飲為佳。傷口痛甚者。內有蛇牙。多用煙油揉擦。必出。此為蛇咬第一神方。至有功效。

又方。初被咬傷。即飲好醋一二碗。使氣不隨血走。再以五靈脂五錢。雄黃二錢五分。共為末。酒調二錢飲之。少時咬處出黃水。水盡則腫消。外以雄黃末搽之。口合而愈。

又方。初被咬傷。無論傷勢如何劇烈。速宜內服太乙紫金錠。即能無礙。凡鄉僻之處。藥肆稀少。此藥宜常備。可救急也。

又方。雞蛋四五个敲破。頭合在蛇咬之處。聽蛋內有聲。顏色變黑。再換

一個。俟其蛋色不變。則毒氣盡矣。即痛止而愈。神效。

二、心神昏憤之療法。蛇咬傷失治。毒氣蔓延。攻入心胸。心神昏憤。口吐白沫。頭眩目花。舌強。不能言語。腹脹如箕。危在頃刻。速以白芷麥冬煮飲。良久有黃水自傷口出。俟水盡。腫消皮合。以藥渣搗爛敷之。可全愈也。

蛇咬傷失治。毒氣攻心。心神昏憤。腹脹如箕。危在頃刻。速以煙油灌之。亦可獲救。

【調養】

一、忌行卑濕之處。預防蛇咬傷。忌行卑濕之處。凡污穢竹園內及多草之地。俱不可行走。恐內伏毒蛇。誤蹴之。必傷人也。

蜈蚣咬傷類

二、忌食蝦蟹。蛇咬傷忌食動風發物。如雞鵝羊肉。蚌蛤河豚。蝦蟹海腥。煎炒炙爆等。

三、切戒房慾。蛇咬傷愈後。切戒房慾百日。否則病復發也。

毒比蛇纏身不脫類

【病源】

誤被蛇纏。其人行多草卑濕之地。誤踏伏蛇。蛇怒起立。圍繞人身。愈纏愈緊。必致氣機窒塞。是謂毒蛇纏身不脫。

【病狀】

氣機窒塞。毒蛇纏身不脫。愈纏愈緊。其人必面色灰白。全身骨節疼痛如斷。呼吸促迫。氣機窒塞而死。

【療法】

氣機窒塞之療法

毒蛇纏身不脫。其人不可掙扎。愈掙扎纏繞愈緊。最難脫解。宜急就地翻身轉滾。蛇骨自軟而釋放也。或以草刺蛇尾上小眼。亦極神效。

【調養】

一、忌行卑處。預防毒蛇纏身。忌行卑濕之處。凡污穢竹園內及多草之地。俱不可行走。

二、宜用按摩法。毒蛇纏身不脫脫後。其人骨節時痛。此骨格受傷也。調養之法。宜用古法按摩。使氣血調和其痛自除。

三、切戒房慾。毒蛇纏身不脫脫後。切戒房慾一月。否則骨痛永難痊。可或成痼疾。或變廢人。切記切記。

【病源】

齒有劇毒。蜈蚣齒有劇毒。伏於陰濕之地。誤被咬傷。立刻紅腫疼痛。是謂蜈蚣咬傷病。

【病狀】

掀腫刺痛。蜈蚣咬傷。傷處掀熱而腫。痛如鍼刺。

【變症】

變為疔瘡。蜈蚣咬傷失治。其毒不解。腫處堅硬。日久即麻木癢痛。變為疔瘡。宜速治。

【療法】

一、掀腫刺痛之療法。蜈蚣咬傷傷處掀熱而腫。痛如鍼刺。急以雄雞倒控。少時以手蘸雞口內涎沫搽傷

處。其痛立止。劇者以生雞血乘熱飲之。或塗傷處立效。

二、變爲疔瘡之療法 蜈蚣咬傷失治。其毒不解。腫處堅硬。日久卽麻木痠痛。變爲疔瘡。宜速以蟾酥丸汗之。便可無憂。

【調養】

一、忌食海腥 蜈蚣咬傷。患者忌食動風發物。如雞鵝羊肉。蚌蛤河豚。蝦蟹海腥。辛辣香燥。煎炒炙爆等。

二、雄黃塗患處 蜈蚣咬傷。如急切不得雄雞涎。速以雄黃塗患處。亦可解毒止痛。

三、潮濕之處宜慎 蜈蚣咬傷預防法。潮濕黑暗之處。操作宜慎。恐內伏蜈蚣。誤觸之。卽遭咬傷也。

急救人畜蛇蟲咬傷法

蜈蚣螫傷類

【病源】

蠍之齒尾有毒。蠍之齒尾。俱含毒質。生息於塵芥中。誤被螫傷。必痛不可忍。是謂蠍螫傷病。

【病狀】

痛不可忍 蠍螫傷處紅腫。痛不可忍。必聞雞聲。痛方漸止。然其痛有雌雄之不同。爲雄螫者。痛在一處。爲雌螫者。痛牽全身。

【變症】

變爲疔瘡 蠍螫傷失治。其毒不解。痛處堅硬。卽漸增麻木。變爲疔瘡。或毒氣內攻。心神昏憤。煩悶譫語。口吐白沫。危在頃刻。

【療法】

一、痛不可忍之療法 蠍螫傷處紅腫。痛不可忍。必聞雞聲。痛方漸止。然其痛有雌雄之不同。爲雄螫者。痛在一處。爲雌螫者。痛牽全身。治療之法。亦分雌雄。雄蠍螫傷。以井底泥塗之。乾則再易。雌蠍螫傷。以瓦溝下

泥塗之。乾則再易。俱有神效。又法。不論雌雄。初起俱以大蝸牛一個搗爛塗之。其痛立止。神效。一時如不得蝸牛。卽將螫處搗去毒水。以二味拔毒散調塗患處。亦能拔毒止痛。

二、變爲疔瘡之療法 蠍螫傷失治。其毒不解。痛處堅硬。卽漸增麻木。變爲疔瘡。速以蟾酥丸汗之。便可無憂。若毒氣內攻。心神昏憤。煩悶譫語。

口吐白沫。危在頃刻。速以七星劍湯灌之。若神次較清。再服疔毒復生湯。或可挽救。

【調養】

一、忌食動風發物。蠍螫傷忌食動風發物。如雞鵝羊肉。蚌蛤河豚。蝦蟹海腥。辛辣香燥。煎炒炙爆等。

二、以雄黃塗患處。蠍螫傷如急切不得螞牛。或二味拔毒散。速以明雄黃塗患處。亦可解毒止痛。

三、宜服地漿湯防毒內攻。蠍螫傷預防毒氣內攻。宜服地漿湯一碗。

射工傷類

【病源】

蟲毛射入皮膚。射工即樹間雜毛蟲也。又名瓦刺蟲。人觸着。則能放

毛射入人膚。初癢次痛。勢如火燎。是謂射工傷病。

【病狀】

外癢內痛。射工傷蟲毛入人膚。初癢次痛。勢如火燎。久則外癢內痛。骨肉皆爛。諸藥罔效。

【變症】

肉爛見骨。射工傷失治。其毛不出。其毒日深。瘡極難忍。搔之則皮開肉爛。痛徹心肺。久之糜爛益甚。深可見骨。血水淋漓。殊為痛苦。

【療法】

一、外癢內痛之療法。射工傷蟲毛射入人膚。初癢次痛。勢如火燎。久則外癢內痛。骨肉皆爛。諸藥罔效。速以豆豉清油搗敷痛癢之處。少時則

毛出可見。去豆豉。用白芷煎湯洗之。如肉已爛。用海螵蛸末搽之即愈。

二、肉爛見骨之療法。射工傷失

治。其毛不出。其毒日深。瘡極難忍。搔之則皮開肉爛。痛徹心肺。久之糜爛益甚。深可見骨。血水淋漓。殊為痛苦。宜以海螵蛸末搽之。或以熱蜜塗之。自有神效。

【調養】

一、忌食羊肉。射工傷忌食膏粱厚味。辛辣香燥。煎炒炙爆。蚌蛤河豚。蝦蟹海腥。雞鵝羊肉等物。

二、切戒手搔。射工傷瘡極時。切

戒手搔。以指甲有毒。搔則毒侵入內。最易腐爛。如癢極不可忍時。宜以白芷湯時洗。則既能殺癢。又能解毒。



三、宜和氣血 射工傷愈後。其人因病中血水滲流過多。面黃肌瘦。精神疲憊。調養之法。宜和氣血。俾速復元。當服八珍湯。

### 蜘蛛咬傷類

#### 【病源】

蜘蛛齒端有毒腺。蜘蛛口部有顎二對。其大顎一對。末端有齒。與毒腺通。人若誤被咬傷。毒液侵入皮肉。必腹大如鼓。是謂蜘蛛咬傷病。

#### 【病狀】

體生蛛絲 蜘蛛咬傷毒氣蔓延。令人知覺全失。遍體生絲。腹大如鼓。證最危險。

#### 【療法】

體生蛛絲之療法 蜘蛛咬傷毒

毒教人畜蛇蟲咬傷類

氣蔓延。令人知覺全失。遍體生絲。腹大如鼓。證最危險。速以藍靛汁一碗。入雄黃麝香少許。點患處。並服其汁。神效。若以蜘蛛投入藍汁。即化為水。故有此奇效也。若患者已瀕死境。姑以白羊乳灌之。外以生白羊肝。適體擦之。或可獲救。或以大劑藍靛雄黃湯灌之。亦可得救。或服竹木桿煙油一二碗。亦能痊愈。

#### 【調養】

一、忌食蝦蟹 蜘蛛咬傷忌食蝦蟹海腥。雞鴨牛肉。蚌蛤河豚。煎炒炙爆。辛辣香燥等物。終身忌食羊肉。否則病復發難救。  
二、宜服雄黃 蜘蛛咬傷病勢危急。如一時不得藍汁。或羊乳羊肝。速

以明雄黃冷沸水調服。並塗患處。亦頗有效。

三、切戒房慾 蜘蛛咬傷愈後。切戒房慾三月。否則病復發。每不可救。切記切記。

### 壁蟻咬傷類

#### 【病源】

壁蟻咬有劇毒。壁蟻卵生蟲類。體扁平。黑褐色。八足而長。作窠壁上。大如錢。窠幕光白如菌。此物咬人最毒。傷處紅腫高痛。是謂壁蟻咬傷病。

#### 【病狀】

紅腫疼痛 壁蟻咬傷傷處紅腫疼痛。如鍼刺。宜速治。失治則毒隨血走。內攻臟腑。令人心神昏憤。知覺

全失。渾身浮腫。死不治。

【療法】

紅腫疼痛之療法 壁蟾蛛咬傷  
傷處紅腫疼痛。如鍼刺。宜速治。急以  
線縛傷處兩頭。服好醋一二碗。使毒  
不隨血走。再以桑樹枝燒枯煎濃汁。  
調白礬末敷之。極效。或以刀燒紅置  
白礬於上。汁出乘熱滴之。神驗之至。  
若毒已內攻臍腑。人已瀕於危殆。  
可姑以大劑藍靛雄黃湯灌之。或可  
獲救。若以竹木桿煙油冷沸水沖服  
一二碗。無論毒氣如何深重。必能解  
救。

【調養】

一、忌食發物 壁蟾蛛咬傷忌食  
發物。如雞鵝牛羊肉。蝦蟹海腥。蚌蛤

河豚等物。

二、宜以十指甲磨水敷 壁蟾蛛  
咬傷毒氣壅盛。而一時不得桑枝白  
礬等藥。速以十指甲磨水敷。立效。  
三、切戒房慾 壁蟾蛛咬傷愈後。  
切戒房慾三月。否則病復發。每不可  
敘。慎之慎之。

此蚯蚓咬傷類

【病源】

蚯蚓有毒 蚯蚓有毒。誤被咬傷。  
令人眉鬚脫落。是謂蚯蚓咬傷病。

【病狀】

眉鬚脫落 蚯蚓咬傷令人眉鬚  
脫落。遍身發腫。狀如大麻瘋病。但夜  
則蚯蚓鳴於體中為異耳。

【變症】

毛髮不澤 蚯蚓咬傷失治。其毒  
不去。久留體中。久之眉鬚盡落。毛髮  
不澤。夜則蚯蚓鳴體中。肌膚麻木。

【療法】

一、眉鬚脫落之療法 人殺蚯蚓  
咬傷。每眉鬚脫落。遍身發腫。狀如大  
麻瘋病。但夜則蚯蚓鳴於體中為異  
耳。宜用鹽湯頻洗之。再以白鴨血  
搽之。或以白鴨糞和雞蛋清調搽更  
妙。

二、毛髮不澤之療法 蚯蚓咬傷  
失治。其毒不去。久留體中。久之眉鬚  
盡落。毛髮不澤。夜則蚯蚓鳴體中。肌  
膚麻木。速以鹽湯頻洗之。洗後以  
白鴨糞和雞蛋清調搽。自能漸漸痊  
愈。

〔附註〕 此病之毛髮不澤。若服養陰潤髮之藥。毛髮非特不澤。反增枯槁。以有毒故也。但治其毒。毒盡則毛髮自潤。治病必求其本。即此之謂。

【調養】

一、忌食雞鵝 蚯蚓咬傷忌食雞鵝羊肉。蚌蛤河豚。蝦蟹海腥。煎炒炙爆。辛辣香燥。生冷硬物等類。

二、切戒飲酒 蚯蚓咬傷患者切戒飲酒。以酒能動風發毒也。

三、不可誤作風治 蚯蚓咬傷切不可誤作風治。虛其正氣。傷其陰液。病必不除。變為痼疾。慎之慎之。

毒蟲咬傷類

【病源】

咬時放入毒汁 蠶咬時能放毒

急殺人毒蠶咬傷

汁。毒入肉中。令人生病。是謂蠶咬傷病。

【病狀】

惡寒發熱 蠶咬傷毒入肉中。令人惡寒發熱。

【變症】

心煩口渴 蠶咬傷失治。毒氣壅盛。其人寒熱益劇。心煩口渴。小溲短赤。

【療法】

一、惡寒發熱之療法 蠶咬傷毒入肉中。令人惡寒發熱。宜以苧麻葉搗汁塗之。或以蜜調麝香敷之。俱有功效。

二、心煩口渴之療法 蠶咬傷失治。毒氣壅盛。令人寒熱益劇。心煩口

渴。小溲短赤。速以苧麻根搗汁服之。兼塗患處。可以無礙。

【調養】

一、忌食羊肉 蠶咬傷忌食雞鵝羊肉。蚌蛤河豚。蝦蟹海腥。煎炒炙爆。辛辣香燥等物。

二、宜以焦山梔泡飲代茶 蠶咬傷其人心煩熱。夜眠不安。調養之法。宜以焦山梔泡飲代茶。效驗如神。以其既能清解鬱熱。又可解去蠶毒也。

三、不可誤作風寒治 蠶咬傷其人寒熱往來。形如感冒。惟不可作感冒治。誤治重虛其表。益其熱也。

烏龍刺傷類

【病源】

刺入泥中。烏龍刺即烏龍翅刺入泥中。人若足上踐踏。比蛇咬更毒。從腳腫至大腿可救。若至肚腹則死。是謂烏龍刺傷病。

【病狀】

腳背頃刻腫大。烏龍刺傷其人。腳背頃刻腫大。麻木而痛。此毒最烈。善於遊走。若腫至大腿。猶可救也。

【發症】

腫至肚腹。烏龍刺傷失治。腫勢自腳延至肚腹。毒氣直攻臟腑。心神昏憤。躁煩譎語。殊為危重。死不治。

【療法】

一、腳背頃刻腫大之療法。烏龍刺傷其人。腳背頃刻腫大。麻木而痛。此毒最烈。善於遊走。若腫至大腿。猶

可救也。急以蠅蟲數條。搗爛敷之。腫消刺出而愈。若一時不得蠅蟲。以糞蛆蟲代之。亦有神效。

又方。烏龍刺傷初起。即以繩絹兩頭繫定。再飲好醋一二碗。使毒氣不能遊走。速取竹木桿煙筒內煙油。其色如醬。以冷水洗出。飲一二碗。受毒重者。其味必甜而不辣。以多飲為佳。傷口痛甚。或麻甚者。內有刺未出也。多用煙油搽擦必出。其效如神。

二、腫至肚腹之療法。烏龍刺傷失治。腫勢自腳延至肚腹。毒氣直攻臟腑。心神昏憤。躁煩譎語。殊為危重。死不治。姑以煙油多多灌之。或可獲救也。

【調養】

一、忌食蝦蟹。烏龍刺傷忌食動風發物。如雞鴨羊肉。蚌蛤河豚。蝦蟹海腥。煎炒炙爆等。

二、宜著厚底鞋。預防烏龍刺傷。行路時宜著厚底鞋。切不可赤足或著草鞋。否則最易被刺傷也。

三、切戒房慾。烏龍刺傷愈後。切戒房慾百日。否則病復發也。

【病源】

蠅蝮口有毒汁。蠅蝮一名多腳蟲。藏於壁間。口有毒汁。尾有毒尿。若誤被咬傷。或被尿射着。俱中其毒。令人皮膚起炮。是謂蠅蝮咬傷病。

【病狀】

痛如火烙。蠅蝮咬傷其人皮膚

上起瘰癧水皰。初如飯糰。次如豆大。終至遍及全身。搔癢不休。痛如火烙。

【療法】

痛如火烙之療法 蠅螻咬傷其

人皮膚上起瘰癧水皰。初如飯糰。次如豆大。速以鹽湯綿濕瘡上。數換即消。若已遍及全身搔癢不休。痛如火烙。速以二味拔毒散敷之。便可痊愈。

【調養】

一、忌食海腥 蠅螻咬傷忌食蝦蟹海腥。膏粱厚味。雞鵝羊肉。蚌蛤河豚。辛辣香燥。煎炒炙爆等物。

二、切戒手搔 蠅螻咬傷如癢極時。切戒手搔。以指甲有毒。搔則毒侵入肉。病益劇也。

三、宜塗雄黃 蠅螻咬傷劇者以

鹽湯治之。不能見效。宜加入雄黃調勻。用塗立效。

毒蚊咬傷類

【病源】

蚊咬含毒質。蚊乃咬人小飛蟲也。其幼蟲為污水中之孑孓。老則變形為蚊。如蛹之成蛾。全體為灰褐色。隊為細管。中含毒質。隔年之蚊。其毒尤烈。人被咬後。肌膚必紅腫成塊而作癢。若毒氣壅結。塊不散而麻木。則變為疔瘡。是謂毒蚊咬傷病。

【病狀】

紅腫成塊 毒蚊咬傷其入肌膚紅腫成塊而作癢。

【變症】

變為疔瘡 毒蚊咬傷失治。毒氣

壅盛。硬塊不散。由癢而麻木。是變為疔瘡也。宜速治。

【療法】

一、紅腫成塊之療法 毒蚊咬傷其人肌膚紅腫成塊而作癢。速以絲瓜葉一把搗汁。以紫金錠磨水和之。敷於傷處。立刻見效。

二、變為疔瘡之療法 毒蚊咬傷失治。毒氣壅盛。硬塊不散。由癢而麻木。是變為疔瘡也。宜速以蟾酥丸汗之外。以鍍針刺入瘡心四五分。搽斷疔根。令出惡血。隨用立馬回疔丹。或蟾酥條插入孔內。外以巴膏蓋之。便可無憂。

【調養】

一、忌食雞鵝 毒蚊咬傷防成疔

瘡。必須忌口。一切雞鴨牛羊肉。蚌蛤河豚。蝦蟹海腥。煎炒炙燻。辛辣香燥等物。俱勿食之。

二、宜以煙油塗之。毒蚊咬傷。傷處麻木。於未成疔瘡前。速以竹木桿煙油塗之。或以冷開水沖服一碗。便可無礙。

三、牀上宜設蚊帳。預防毒蚊咬傷。凡污穢積水。必須排除潔淨。使孑孓不生。蚊蟲滅跡。牀上必設蚊帳。使不能飛入。黑暗處多草處。係彼等聚集地。不可多坐。如此謹慎。當不致咬傷也。

各種毒蟲咬傷類

【病源】

毒蟲含毒。各種無名毒蟲。俱含

毒汁。誤被咬傷。即中其毒。是謂各種毒蟲咬傷病。

【病狀】

咬處腫痛。各種毒蟲咬傷。傷處腫痛。周圍紅熱。猶如火燎。宜速治也。

【變症】

變成疔瘡。各種毒蟲咬傷。失治。毒氣壅結。傷處堅硬。不痛而麻木。有時作癢。成疔瘡也。

【療法】

一、咬處腫痛之療法。各種毒蟲咬傷。傷處腫痛。周圍紅熱。猶如火燎。宜速以二味拔毒散敷之。或以竹木桿煙油塗之。俱有神效。

二、變為疔瘡之療法。各種毒蟲

咬傷。失治。毒氣壅結。傷處堅硬。不痛

而麻木。有時作癢。成疔瘡也。宜速以蟾酥九汗之外。以鉸針刺入疔心。四五分。挑斷行根。令出惡血。隨用立馬回疔丹。或蟾酥條插入孔內。外以巴齊蓋之。便可無憂。或急以竹木桿煙油。冷沸水洗服一二碗。再以塗於瘡頂。便可痊愈。神效。

【調養】

一、忌食發物。各種毒蟲咬傷。忌食雞鴨羊牛肉。蚌蛤河豚。蝦蟹海腥。煎炒炙燻。辛辣香燥等物。

二十指甲磨水敷。各種毒蟲咬傷。傷勢凶險。而一時無二味拔毒散。或煙油。速以十指甲磨水敷之。其效如神。萬無一失。

三、生甘草泡飲。各種毒蟲咬傷

毒勢壅盛。調養之法。可以生甘草泡飲代茶。自能解毒如神。可佐藥之不及。

### 結論

人畜蛇蟲咬傷。傷勢重者。往往有生命進出。傷勢輕者。雖無生命危險。然痛苦難言。或腐爛不已。或膿水淋漓。或腫痛如刺。故此皆不可視為小病。俱宜速治。切勿延擱。

人畜蛇蟲咬傷證各病中。以烏龍刺傷。壁蝟蛛咬傷。蜘蛛咬傷。蛇咬傷。四類毒勢最凶。失治往往毒攻臟腑。無藥可治。故四病初起。如一時不及備藥石。速以繩絹繫傷處兩頭。隨飲好醋一二碗。使毒不隨血走。然後以煙油塗之。再以冷沸水沖服一二

急救人畜蛇蟲咬傷

碗。受毒深者。飲之必甜。並不覺辣。頗易上口。服後毒氣輕者。便可消解。重者亦可減輕不少。再以各病之主要藥方投之。無不獲效。此法誠救苦救難之唯一神方也。務須切記。

人畜蛇蟲咬傷證中。以毒蚊咬傷。各種毒蟲咬傷。蜈蚣咬傷。蠍咬傷。四種為最嚴重。如失治。則毒氣壅結。最易變成疔瘡。療養之法。初當謹慎。忌口。否則必致走黃。若已變成疔瘡。宜速以蟾酥丸汗之。外以鍍針刺入瘡心四五分。挑斷疔根。令出惡血。隨以立馬回疔丹。或蟾酥條插入孔內。外以巴膏蓋之。再以冷沸水沖服煙油一碗。決可高枕無憂。

急救人畜蛇蟲咬傷

### 各上方淺解類

#### 【人咬傷類各方】

(一) 人尿浸洗方(驗方)

以人尿乘熱浸傷處。洗淨牙垢瘀血。

〔淺解〕 本方人尿味鹹走血。清熱解毒。善去瘀血。

#### (二) 蟾酥餅方(外科正宗方)

即以蟾酥丸作成餅也。(蟾酥丸原方見中水毒證各方淺解類)

(三) 童便洗方(驗方)

以童便乘熱浸傷處。洗淨牙垢瘀血。

〔淺解〕 本方與人尿方意義完全相同。可以參閱。

(四)粗紙熏方(驗方)

以粗紙燃蘸麻油點火。以煙熏傷處良久。以解其毒。

(淺解) 此拔毒法也。使毒隨煙散。

(五)蟾酥條方(外科正宗方)

即以蟾酥丸搓成條也。(蟾酥丸原方見中水毒證各方淺解類)

(六)太乙膏(外科正宗方)

白芷二兩。當歸二兩。赤芍二兩。元參二兩。柳枝一百寸。槐枝一百寸。肉桂二兩。沒藥三錢。大黃二兩。木鱉二兩。輕粉四錢。(研不見星) 生地二兩。阿魏三錢。

黃丹四十兩。(水飛) 乳香五錢。血餘一兩。

右將白芷、當歸、赤芍、元參、肉桂、大黃、木鱉、生地、八味併槐柳枝。用真麻油足稱五觔。將藥浸入油內。春五、夏三、秋七、冬十。入大鍋內。慢火熬至藥枯浮起為度。住火片時。用布袋濾淨藥渣。將油稱準。用細舊絹。將油又濾入鍋內。要清淨為佳。將血餘投入。慢火熬至血餘浮起。以柳枝捺看。似膏溶化之象。方算熬熟。淨油一觔。將飛過黃丹六兩五錢。徐徐投入。火加大些。夏秋元熱。每油一斤。加丹五錢。不住手攪。候鍋內先發青煙。後至白煙。盡盡旋起。氣味香覆者。其膏已成。即便住火。將膏滴入水中。試軟硬得中。

如老加熱油。如稀加炒丹。每各少許。漸漸加火。務要冬夏老嫩得所為佳。候煙盡。撥下鍋來。方下阿魏。切成薄片。散於膏上。化盡。次下乳沒輕粉攪勻。傾入水中。以柳棍搗成一塊。再換冷水浸片時。乘溫每膏半斤。扯拔百轉成塊。又換冷水浸。隨用時。每取一塊。銅杓內復化。隨便攤貼至妙。

(淺解)

本方乳香、沒藥、舒氣止痛。歸、芍、血餘、行瘀活血。白芷、二枝、疏風化濕。肉桂、阿魏、溫寒行滯。輕粉、黃丹、去腐生肌。大黃、木鱉、清熱解毒。生地、元參、清血涼血。總之此方為去腐生肌之劑。人咬傷傷處臭爛。以此貼之。至有神效。

(七)生肌玉紅膏(金鑑方)



當歸二兩。白芷五錢。白蠟二兩。輕粉四錢。甘草一兩二錢。紫草二錢。瓜兒血竭四錢。麻油一觔。

右將當歸、白芷、紫草、甘草、四味入油內浸三日。大杓內慢火熬微枯色。細精濾清。將油復入杓內煎滾。入血竭化盡。次下白蠟。微火亦化。用茶鍾四個。預放水。將膏分作四處。傾入鍾內。候片時方下研極細粉。各投一錢。攪勻。候至一日夜。用之極效。

〔淺解〕 本方當歸、紫草、血竭、和血活血。輕粉、白蠟、化腐生肌。白芷宣滯。麻油潤燥。人咬傷後。傷處腫勢已消。毒氣已清。用搨挑膏於掌中。塗化遍搨新肉上。外以薄紙貼之。或以

太乙膏蓋之。便可收功。乃外症收斂藥中之神方也。

〔八〕人糞塗方〔驗方〕

以人糞塗於患處。

〔淺解〕 本方人糞鹹苦甘寒。能除一切熱。解一切毒。

〔九〕人中黃洗方〔驗方〕

人中黃二兩。

右一味以水八碗。煮取三碗。乘熱時洗傷口。

〔淺解〕 本方人中黃味甘性寒。能除一切熱。解一切毒。

〔一〇〕銀花連翹泡飲方〔冰玉堂驗方〕

金銀花四錢。連翹四錢。右二味以百沸水泡飲代茶。

〔淺解〕 本方銀花味甘。連翹味苦。性俱寒涼。能清熱解毒。苟常飲。傷處易瘥也。

〔熊虎狼咬傷類各方〕

〔一〕生豬肉貼方〔千金方〕

以生豬肉切成薄片。隨傷口之大小。以定大小。貼於傷處。隨貼隨化。隨化隨換。

〔淺解〕 本方善拔熊虎狼齒牙毒也。

〔二〕地榆三七散〔沈氏方〕

地榆一觔。三七末三兩。苦參末四兩。

右研為細末。和勻。搽之。隨濕隨滲。血即止而痛即定。奏效如神。

〔淺解〕 本方以苦參清解熊虎

狼齒牙之毒。地榆三七止血歛血。

(三)一味葛根湯(驗方)

生葛根七錢。

右一味以水七碗煮。取二碗。去渣。

分二次溫服。取微汗。

〔淺解〕 本方葛根味甘性寒。善

於升散。使狼齒牙之毒一齊由

汗而泄。神效。

(四)葛根洗方(驗方)

生葛根一兩。(病重者二兩亦

可)

右一味以水九碗煮。取三碗。乘熱

時洗患處。日洗十次。

〔淺解〕 本方生葛根味甘性寒。

善拔熊虎狼齒牙毒也。

(五)生鐵洗方(驗方)

生鐵有味者四兩。

右一味以水十二碗煮。取三碗。乘

熱時時洗之。

〔淺解〕 本方生鐵洗方。善解熊

虎狼齒牙之毒。

(六)青布熏方(驗方)

以青布急捲為繩。燃着。納竹筒

中。注瘡口熏之。拔出毒水。

〔淺解〕 此乃拔毒法也。有神效。

(七)栗子敷方(單方大全方)

以獨窠生栗子八九枚。照瘡口

大小嚼塗之。

〔淺解〕 本方善拔熊虎狼齒牙

毒。

(八)玉紅膏(金鑑方)

見本證人咬傷類各方淺解。

(九)蟾酥餅(外科正宗方)

見本證人咬傷類各方淺解。

(一〇)葛根泡飲方(冰玉堂驗

方)

葛根三錢。

右一味以百沸水泡飲代茶。

〔淺解〕 本方與上葛根湯。意義

完全相同。可以參閱。惟泡服後。藥力

輕淡。不及煎劑也。

【家犬咬傷類各方】

(一)虎骨散(金鑑方)

以生虎骨刮下細末六七錢。時

時搽之。

〔淺解〕 本方虎骨末善解家犬

齒牙之毒。

(二)胡椒末敷方(沈氏方)

胡椒七錢。

右一味研為細末。敷之。雖傷重亦不過數日收功。惟初敷必痛而且腫。少刻痛止腫消。

〔淺解〕 本方胡椒味辛性熱。善消家犬齒牙之毒。初敷必腫痛者。其燥熱之性爆發也。少刻痛止腫消者。齒毒滅盡也。

〔三〕生甘草洗方（驗方）

生甘草一兩。

右一味以水八碗煮。取三碗。乘熱淋洗患處。

〔淺解〕 本方生甘草善解一切毒也。

〔四〕牛糞敷方（李氏方）

以熱牛糞敷於患處。即時痛定

毒散人畜蛇咬傷

爛止而痊。

〔淺解〕 本方牛糞味苦性寒。善解家犬齒牙毒。且能收濕生肌。故能止爛定痛如神也。

〔五〕八珍湯（六科準繩方）

見百藥毒證各方淺解類。

【馬咬傷類各方】

〔一〕粟子敷方（單方大全方）

見本證熊虎狼咬傷類各方淺解。

〔二〕馬齒莧湯（金鑑方）

馬齒莧一兩。

右一味以水八碗濃煮。取二碗。去渣。分二次服。

〔淺解〕 本方馬齒莧專能行血

滑竅。潤利大腸。馬咬傷毒氣內攻。心

神昏憤。即以此服。使毒由大便而洩。則各恙自癒。

〔三〕馬鞭鞭穗貼方（金鑑方）

以馬鞭子挽手及鞭穗煨灰存性。研為末。豬脂搗合貼之。俱效。

〔淺解〕 本方治馬咬傷者。同氣

相求之意也。

〔四〕腐盡生肌散（金鑑方）

見中水毒證各方淺解類。

【豬咬傷類各方】

〔一〕生龜板敷方（千金方）

生龜板一兩。炙。研成細末。麻油調搽即愈。（附註。此物藥店多以熬過龜板假充。必不見效。以滋膏業被熬盡也。必須以生者

自炙為要）

【淺解】 本方龜板味甘鹹性寒。善解豬齒牙毒。

(二) 熟松香貼方(金鑑方)

以熟松香貼於傷處。數日便愈。

【淺解】 本方松香味苦甘性潤。能活血止痛。消解豬牙毒。

(三) 腐蝕生肌散(金鑑方)

見中水毒證各方淺解類。

(四) 玉紅膏(金鑑方)

見本證人咬傷類各方淺解。

(五) 生甘草泡飲方(驗方)

見中禽獸蟲魚毒證各方淺解類。

【猴猴咬傷抓傷類各方】

(一) 金狗脊敷方(本草綱目方)

金狗脊一兩。(煨)

右一味。研爲細末。麻油拌調。搽敷患處。立愈。

【淺解】 本方金毛狗脊苦中氣

甘。性溫而燥。色紫。治猴猴咬傷抓傷。

有不可思議之奇效。大抵天地間有其病。必有其藥。醫神祕之極。不可以學理解也。

(二) 腐蝕生肌散(金鑑方)

見中水毒證各方淺解類

(三) 玉紅膏(金鑑方)

見本證人咬傷類各方淺解。

(四) 麻油塗方(驗方)

以麻油時塗傷處。燒熱即瘥。

【淺解】 本方麻油味甘性平。潤燥滋陰。且能清熱解毒。

【貓咬傷類各方】

(一) 薄荷洗方(單方大全方) 薄荷五錢。

右一味以水八碗煮。取三碗。乘熱洗之。

【淺解】 本方薄荷辛溫香竅。體溫而用涼。長於發散。以洗貓之傷口。使其齒毒盡行透泄也。

(二) 陳薑頭敷方(驗方)

陳薑頭五錢。

右一味。嚼爛敷於傷口。次日結痂。神效。

【淺解】 薑音叫。本草曰。薤一名薤。善解貓齒牙毒。

(三) 腐蝕生肌散(金鑑方)

見中水毒證各方淺解類。

(四) 玉紅膏(金鑑方)

見本證人咬傷類各方淺解類。

(五) 銀花泡飲方(冰玉堂驗方)

見中禽獸蟲魚毒證各方淺解類。

類。

【鼠咬傷類各方】

(一) 荔枝敷方(金鑑方)

荔枝五錢。

右一味嚼融。敷於傷口。神效。

〔淺解〕 本方荔枝味甘性溫。善

消鼠咬毒。

(二) 貓尿洗方(金鑑方)

以貓尿洗去傷口毒血也。

〔淺解〕 本方貓尿解毒如神。非

特能解鼠咬毒。即一切癩蝨蠍螫毒。

亦能解也。

〔附註〕 取貓尿法。以葦或蒜擦

紫散人畜諸蟲咬傷散

貓牙鼻。或生葱紅鼻中。即退出。

(三) 貓屎塗方(驗方)

以貓糞填於傷口也。

〔淺解〕 本方貓糞善解蠍螫鼠

咬諸毒。最著功效。

(四) 香椿樹皮汁方(金鑑方)

香椿樹皮汁一碗。

右一味順服之。

〔淺解〕 本方香椿樹皮味苦性

溫。善消鼠咬毒也。

(五) 腐盡生肌散(金鑑方)

見中水毒證各方淺解類。

(六) 玉紅膏(金鑑方)

見本證人咬傷類各方淺解。

(七) 琥珀蠟攀丸(外科正宗方)

琥珀一錢。(另研極細) 黃

蟻一兩。白礬一兩二錢。雄

黃一錢二分。硃砂一錢二分。

蜂蜜二錢。

右先以琥珀、白礬、雄黃、硃砂、研為

細末。另將蜂蜜入銅杓內熔化。離火

片時。候蠟四邊稍凝。方將藥末入內

攪勻。共成一塊。將藥火上微烘。急作

小丸。如菉豆大。硃砂為衣。瓷罐收貯。

每服二三十丸。食後熱湯送下。毒甚

者早晚服。其功最速。

〔淺解〕 本方琥珀、硃砂、鎮心。雄

黃、白礬、辟穢。黃蠟固滑止漏。蜂蜜潤

燥滋陰。瘡潰後成漏。用此止漏。殊有

神效。

(八) 參朮膏(證治準繩方)

人參半筋。(切片。用水五大碗。

沙鍋慢火熬至三碗。將渣再煮汁一碗。共用密絹濾淨。復熬稠厚。磁碗內收貯。聽用。雲片白朮六兩。懷慶熟地六兩。(俱熬

同上法)

右三膏各熬完畢。各用磁罐盛之。入水中。待冷取起。密蓋。勿令泄氣。如

患者精神短少。懶於言動。短氣自汗者。以人參膏三匙。白朮膏二匙。地黃

膏一匙。俱用無灰好酒一杯。燉熱化服。如脾胃虛弱。飲食減少。或食不知

味。或食後不化者。用白朮膏三匙。人參膏二匙。地黃膏一匙。熱酒化服。如

腰膝痠軟。腿腳無力。皮膚枯槁者。用地黃膏三匙。參朮膏各二匙。化服。如

氣血脾胃相等。無偏勝者。三膏每各

二匙。熱酒化服。此膏用於清晨。及臨睡時各進一次。自然強健。精神頓生。氣血新肉易長。瘡口易合。一切瘡形危險勢大。膿多者服之。自無變證也。夏天炎熱。恐膏易變。令作二次熬用亦好。愈後常服。能鬚髮變黑。返老還童。

【淺解】本方人參、白朮、補氣、熱地補血。人參、白朮、補脾。脾為後天。熱地補腎。腎為先天。先後天俱補。氣血俱旺。瘡癆可救也。

(九)八珍湯(六科準繩方)

見百藥書證各方淺解類。

【蛇咬傷類各方】

(一)醋飲(驗方)  
以好醋一二碗冷飲之。

【淺解】本方酸醋味酸微苦。性溫。善收斂。被蛇咬傷後。立飲一二碗。使毒氣不能隨血遊走也。

(二)煙油方(本草綱目方)  
見中禽獸蟲魚毒證各方淺解類。

(三)煙油擦擦方(本草綱目方)  
以竹木桿煙油擦擦傷處也。

【淺解】本方煙油味極辣。善殺一切蟲虺。解一切毒。

(四)五靈脂雄黃散(驗方)

五靈脂五錢。雄黃二錢五分。右研為細末。酒調二錢服下。少時

咬處出黃水。水盡則腫消。

【淺解】本方五靈脂味甘苦鹹。性溫。善殺蟲虺。雄黃味辛性熱。辟穢

解毒。蛇咬傷初起。速服此方。傷處卽出黃水。水盡卽腫消而愈。神效。

〔五〕雄黃敷方（驗方）

以雄黃末摻於傷口。口合而愈。

〔淺解〕 本方雄黃最善殺蟲蛇。

蟲一見卽逃避之。用摻傷處。效驗如神。

〔六〕太乙紫金錠（驗方）

山茨菰二兩。（去皮洗淨焙）

川文蛤二兩。（一名五倍子。

搗破洗刮內粹） 千金子三

兩。（去殼。用紙包裹。換紙研數

十次。去盡油。無油成霜） 麝

香三錢。（細研盡） 紅牙大

戟一兩。（洗焙）

右各研細末和勻。以糯米粥爲劑。

救殺人書此處收錄

每料分作四十粒。於端午。七夕。重陽。合。如欲急用。辰日亦得。於木臼中杵數百下。不得令婦人孝服人不具手足人。及雞犬之類見之。

〔淺解〕 此祕藥中之第一方也。

用藥之奇。不可思議。功效之神。出乎意外。蛇咬傷無論傷勢如何劇烈。速服此錠。便可無憂。凡鄉僻之處。藥肆稀少。此藥宜常備。可救急也。

〔七〕雞子拔毒方（單方大各方）

雞子四五個。敲破頭。合在蛇咬

之處。雞蛋內有聲。顏色變黑。再

換一個。俟其蛋色不變。則毒氣

盡矣。卽痛止而愈。神效。

〔淺解〕 此拔毒法也。使毒氣盡

拔於蛋中。故蛋黃變黑。若蛋色不變。

則毒氣盡矣。

〔八〕白芷麥冬湯（證治準繩方）

香白芷五錢。 麥冬五錢。（去

心）

右以水二碗。酒二碗。同煮。取碗半

頓服。良久有黃水自傷口出。俟水盡。腫消皮合。仍將藥渣搗爛敷。

〔淺解〕 本方白芷味辛性溫。麥

冬味甘苦性寒。俱善解蛇咬毒。

【毒蛇纏身不脫類各方】

〔一〕草刺蛇尾法（驗方大各方）

以細長堅硬之草。向蛇尾上小

眼刺之。蛇覺癢極難忍。自脫解

也。

〔淺解〕 此法最屬靈穩。凡蛇入

七竅。慎不可用手拔。因蛇有逆骨也。

宜用此法。當可得救。

【蜈蚣咬傷類各方】

(一)雄雞涎方(驗方)

以雄雞倒控。少時以手齧雞口內涎。抹搽傷處。其痛立止。

【淺解】雞善吸蜈蚣毒。故雞涎亦善解蜈蚣毒也。

(二)生雞血方(驗方)

活雞一隻殺之。取其血。乘熱飲之。或塗傷處。俱有神效。

【淺解】本方與雞涎方意義完全相同。可以參閱。惟雞血之力。比雞涎更速更效也。

(三)蟾酥丸(外科正宗方)

見中水毒證各方淺解類。

(四)雄黃塗方(外科正宗方)

雄黃三錢。黃酒調敷患處。

【淺解】本方雄黃味辛性熱。善解一切蜈蚣蛇虺之毒。

【蠍螫傷類各方】

(一)井底泥塗方(沈氏方)

以井底泥塗於傷處。乾則再易。

【淺解】本方井底泥。善解雄蠍毒也。

(二)瓦溝泥塗方(沈氏方)

以瓦溝下泥浸濕塗之。乾則再易。

【淺解】本方瓦溝泥善解雌蠍毒也。

(三)蝸牛塗方(沈氏方)

大蝸牛一個。搗爛。塗於傷處。其痛立止。

【淺解】本方蝸牛善拔蠍毒。

(四)二味拔毒散(金鑑方)

見中水毒證各方淺解類。

(五)蟾酥丸(外科正宗方)

見中水毒證各方淺解類。

(六)七星劍湯(外科正宗方)

蒼耳頭三錢。野菊花三錢。

豨薟草三錢。地丁香三錢。

半枝連三錢。蚤休二錢。麻黃一錢。

右以好酒一觔。煎至一碗。澄去渣。

熱服。被蓋出汗為度。

【淺解】本方菊花、豨薟、半枝連清熱解毒。蒼耳、麻黃宣風取汗。使疔毒透出。蚤休、地丁、活血行瘀。使結者流。聚者散。凡疔毒走黃。癰疽內攻。神



亂昏憤。惡心乾嘔。此方治之。每可獲救。

〔七〕疔毒復生湯（金鑑方）

金銀花三錢。生梔子三錢。

地骨皮三錢。牛蒡子三錢。

（炒研）連翹三錢。（去心）

木通三錢。（炒）牡蠣三

錢。生川軍三錢。皂刺三錢。

天花粉三錢。沒藥三錢。

乳香三錢。

右以水七碗煮。取三碗。溫服一碗。

服藥後飲酒一杯。如病瘥。餘藥勿服。

服後病不減。服三碗盡。

〔淺解〕本方銀花、連翹、地骨、清

營、消血、山梔、木通、生川軍、牛蒡、清衛

清氣、牡蠣、軟堅、皂刺、透毒、乳沒、破積。

參數人畜蛇蟲咬傷

花粉潤津。瀉疽疔瘡。火毒將欲攻裏。非此方不能挽救。

〔八〕雄黃塗方（驗方）

見本證蜈蚣咬傷類各方淺解。

〔九〕地漿湯（串雅方）

見百藥毒證各方淺解類。

【射工傷類各方】

（一）豆豉清油方（驗方）

以豆豉研末。香油拌和。敷於痛

癢之處。少時則毛出可見。

〔淺解〕本方豆豉善拔毒。毛出

可見者。使拔毒於外也。

（二）白芷洗方（驗方）

香白芷五錢。

右一味以水四碗煮。取一碗。乘熱

時時洗於患處。

〔淺解〕本方白芷泄風拔毒。用以洗瘡。引毒外出也。

（三）海螵蛸搽方（驗方）

海螵蛸五錢。

右一味研為細末。時時搽於患處。

〔淺解〕本方海螵蛸即烏賊魚

骨。燥膿收水。斂瘡止爛。

（四）熱蜜塗方（千金方）

以熱蜜塗於傷口也。

〔淺解〕本方熱蜜能調和傷口。

使不腐爛。且能解毒止痛。

（五）八珍湯（六科準繩方）

見百藥毒證各方淺解類。

【蜘蛛咬傷類各方】

（一）藍靛汁方（沈氏尊生書方）

藍靛汁一碗。

右一味頓服之。

〔淺解〕 本方藍錠善解一切毒。

尤善解蜘蛛毒。凡蜘蛛投入盞汁。卽化爲水。故治蜘蛛咬傷有特效也。

〔二〕藍錠雄黃麝香點方（沈氏生書方）

雄黃三錢。麝香五釐。以藍錠汁調和敷患處。

〔淺解〕 本方藍錠、麝香、雄黃俱能辟穢解毒。敷蜘蛛咬傷處。功效神速。

〔三〕白羊乳方（驗方）

以白羊乳多多灌之。

〔淺解〕 本方白羊乳善解蜘蛛毒也。

〔四〕白羊肝擦方（驗方）

以生白羊肝遍體擦之。能拔蜘蛛毒。

〔淺解〕 本方白羊肝善拔蜘蛛毒也。

〔五〕大劑藍錠雄黃湯（沈氏生書方）

藍錠汁一碗半。雄黃三錢。二味調和頓服之。

〔淺解〕 本方藍錠雄黃最善解蜘蛛毒。今重其量。挽救危症也。

〔六〕煙油方（本草綱目方）

見中禽獸蟲魚毒證各方淺解類。

〔七〕雄黃散（驗方）

見中禽獸蟲魚毒證各方淺解類。

見中禽獸蟲魚毒證各方淺解類。

〔壁蟻咬傷類各方〕

〔一〕醋飲方（驗方）

見本證蟻咬傷類各方淺解。

〔二〕桑枝白礬散方（金鑑方）

桑樹枝六錢燒枯。右一味。以水五碗煮。取半碗。調白礬末敷傷處。極效。

〔淺解〕 本方桑枝白礬善解壁蟻毒。

〔三〕白礬汁滴方（金鑑方）

以刀燒紅。置白礬於上。汁出乘熱滴之。神驗之至。

〔淺解〕 本方白礬汁解壁蟻毒。最有功效。

〔四〕大劑藍錠雄黃湯（沈氏生書方）

見本證蜘蛛咬傷類各方淺解。

【五】煙油方（驗方）

見中禽獸蟲魚毒證各方淺解類。

類。

【六】十指甲磨水敷方（驗方）

十指甲磨水敷於咬處。有神效。

【淺解】本方十指甲善解壁蝨

蛛毒。

【蚯蚓咬傷類各方】

【一】鹽湯洗方（單方大全方）

食鹽六錢。

右一味以水三碗煮。取一碗。頻頻

洗於咬處。

【淺解】本方鹽湯善解蚯蚓蟻

蝨等毒。

【二】白鴨血搽方（單方大全方）

以白鴨血搽於咬處。

【淺解】本方白鴨血善解蚯蚓

毒。

【三】白鴨糞雞蛋清搽方（單方

大全方）

白鴨糞雞蛋清調和。搽於患處。

【淺解】本方白鴨糞雞蛋清。俱

善拔蚯蚓毒也。

【蠶咬傷類各方】

【一】芋麻葉汁方（千金方）

以芋麻葉六錢。搗汁塗於傷處。

【淺解】本方芋麻葉涼血解毒。

善治蠶咬毒。

【二】蜜麝敷方（金鑑方）

麝香五釐。以蜜調敷患處。

【淺解】本方蜜與麝香。俱能消

解蠶毒。

【三】芋麻根服方（千金方）

芋麻根一兩。搗汁服之。

【淺解】本方芋麻涼血解毒。滑

竅通淋。蠶咬傷失治。寒熱益劇。心煩

口渴。小溲短赤。速服此方。寒熱自退。

小水自利。毒解神清。可以無礙。

【四】焦山梔泡飲方（冰玉堂驗

方）

焦山梔四錢。

右以百沸水泡飲代茶。

【淺解】本方山梔味苦性寒。清

除鬱熱。解去蠶毒。

【烏龍刺傷類各方】

【一】蝟蟲敷方（驗方）

蝟蟲四五條。

右一味搗爛。敷於傷處。

〔淺解〕 本方蛔蟲性大寒。善解

烏龍刺毒。

(二) 糞蛆蟲敷方(驗方)

糞蛆蟲四錢。

右一味搗爛。敷於傷處。

〔淺解〕 本方糞蛆性寒。善解烏

龍刺毒。

(三) 煙油方(本草綱目方)

見中禽獸蟲魚毒證各方淺解

類。

(四) 煙油搽擦方(本草綱目方)

見本證蛇咬傷類各方淺解。

【蠅蝮咬傷類各方】

(一) 鹽湯洗方(單方大全方)

見本證蚯蚓咬傷類各方淺解。

(二) 二味拔毒散(金鑑方)

見中水毒證各方淺解類。

(三) 鹽湯雄黃塗方(金鑑方)

雄黃三錢。以鹽湯調勻塗患處。

立效。

〔淺解〕 本方鹽與雄黃俱係解

毒之品。二味相和。解毒之力殊強。蝨

蝮咬傷。傷處劇烈。若但以鹽湯治之。

不能見效。必當敷此。始克有功。

【毒蚊咬傷類各方】

(一) 絲瓜葉汁紫金錠方(名醫

類案方)

絲瓜葉一把。搗成汁。以紫金錠

(見本證蛇咬傷類各方淺解)

磨水和之。敷於傷處。立刻見效。

〔淺解〕 本方絲瓜葉、紫金錠俱

善解蚊咬毒。

(二) 蟾酥丸(外科正宗方)

見中水毒證各方淺解類。

(三) 立馬回疔丹(金鑑方)

輕粉一錢。蟾酥一錢。(酒化)

白丁香一錢。硃砂一錢。

乳香六分。雄黃三分。硃砂

三分。麝香三分。蜈蚣一條。

(炙) 金頂砒五分。(另註)

右爲細末。麪糊搗如麥子大。凡遇

疔瘡。以鍼挑破。用一粒。插入孔內。外

以符蓋。追出膿血。疔根爲要。

〔淺解〕 本方蟾酥、輕粉、拔毒消

癰。頂砒、硃砂。化去疔根。乳丁、麝香。舒

氣行滯。硃砂、雄黃。辟穢解毒。蜈蚣散

腫行瘀。疔瘡以鍼挑破。用此插入。即

能追出膿血疔根。殊有神效。

〔註〕煉金頂砒法（金鑑方）

鉛一觔。小罐內炭火煨化。投白砒二兩於焯鉛上。煉煙盡爲度。取起冷定。打開金頂砒結在鉛面上。取下聽用。

〔四〕蟾酥條（外科正宗方）

見本證人咬傷類各方淺解。

〔五〕巴膏方（金鑑方）

象皮六錢。穿山甲六錢。山梔子八十個。人頭髮一兩二錢。血竭一錢。（另研極細末）

兔茶二錢。（另研極細末）

硝砂二錢。（另研極細末）

黃丹二十四兩。（飛）香

油四觔。桑枝五十寸。槐枝

五十寸。桃枝五十寸。柳枝

五十寸。杏枝五十寸。

右將桑槐桃柳杏五枝用香油四觔。將五枝燥枯撈出。次入象皮穿山甲。人頭髮。煤化。再入山梔子燥枯。用絹將藥渣濾去。將油復入鍋內煎滾。離火少頃。每油一觔。入黃丹六兩攪勻。用慢火熬至滴水成珠。將鍋取起。再入血竭。兒茶。硃砂等末攪勻。用涼水一盆。將膏藥傾入水內。用手扯藥千餘遍。換水數次。拔去火氣。破罐收貯。用時不宜見火。須以銀杓盛之。重湯燉化。薄紙攤貼。

〔淺解〕此膏貼一切癰疽發背疔瘡。化腐生肌。甚效。

〔六〕煙油方（本草綱目方）

見中禽獸蟲魚毒證各方淺解類。

〔七〕煙油搽擦方（本草綱目方）

見本證蛇咬傷類各方淺解。

〔各種毒蟲咬傷類各方〕

〔一〕二味拔毒散（金鑑方）

見中水毒證各方淺解類。

〔二〕煙油搽擦方（本草綱目方）

見本證蛇咬傷類各方淺解。

〔三〕蟾酥丸（外科正宗方）

見中水毒證各方淺解類。

〔四〕立馬回疔丹（金鑑方）

見本證毒蚊咬傷類各方淺解。

〔五〕蟾酥條（外科正宗方）

見本證人咬傷類各方淺解。

〔六〕巴膏方（金鑑方）

見本證毒蚊咬傷類各方淺解。

(七)十指甲磨水敷方(驗方)

見本證壁蟻蛛咬傷類各方淺解。

(八)生甘草泡飲方(驗方)

見百藥毒證各方淺解類。

# 吞火柴頭證

## 總綱

一 吞火柴頭後之主要急救法如何。

吞火柴頭後之主要急救法。以皮絲煙湯灌之。最有神效。

二 吞火柴頭後。勢將爆發。欲服皮絲煙湯。恐煎藥時間過久。必不可及。宜以何法。先遏止其爆性。

宜速以生雞蛋白。儘多傾入。蛋白涼滑糕膩。火柴頭經其包裹。不能發展炎毒。接服皮絲煙湯。使盡情傾吐。便可起死回生。

三 吞火柴頭者。服皮絲煙湯後。宜如何動作。

吞火柴頭者。服皮絲煙湯後。宜如何動作。

吞火柴頭證

吞火柴頭者。服皮絲煙湯後。宜扶其人行走。不使停住。則患者胃中攪擾。殊為難過。不得不吐。吐出盡是毒。再灌再吐。至吐出之物。在黑暗處不見微光為止。

四 吞火柴頭者救活後。胃氣虛弱。嘔吐不止。宜以何法調養。

調養之法。宜以生穀芽一兩。煎湯緩緩呷之。自能止嘔止吐。調和胃氣。

五 吞火柴頭者。服皮絲煙湯後。磷毒大吐。然猶有餘留。而其人精神疲憊。再服皮絲煙湯。必將不支。不服又有性命之憂。此時宜如何善其後。

此時宜速以銀花生甘湯主之。自能解其餘毒。而和胃氣。殊為穩妥。

【病源】

中磷毒 火柴頭係磷所製造。磷有劇毒。誤服之。每能致人死命。蓋中其毒也。

## 【病狀】

胃部疼痛 吞火柴頭後。磷毒爆發。目赤如火。口熱如焚。胃部疼痛。並發嘔吐。其嘔吐物。在暗處可見微光。故易辨識。

## 【變症】

七竅流血 吞火柴頭後。失於救治。磷毒發作。莫可遏止。反覆躁擾。至為痛苦。目赤如鳩。口熱如焚。末後必七竅流血而死。死後殮身紫黑。為狀至慘。

## 【療法】

一宜飲皮絲煙湯 吞火柴頭後。

燒毒爆發。目赤如火。口熱如焚。胃部疼痛。並發嘔吐。其嘔吐物。在暗處可見微光。故易辨識。急救之法。速以生雞蛋白儘多傾入。蛋白涼滑。糝賦。火柴頭經其包裹。不能發展炎毒。再以皮絲煙四兩。先將清水一大鍋。燒至滾而不沸之時。將皮絲煙如下麵一般。攪入鍋內。約十分鐘。勿令過性。擦在夏布上。漚出其湯。以冷水冰之。去其熱氣。俟溫和適口。即將此湯灌入。扶其人行走。不使停住。即能吐出毒機。再灌再吐。至吐出之物。在黑暗中不見微光為止。

二、宜服膽礬湯。急救吞火柴頭。又方以膽礬末五盞。溶化於一茶杯清水中。每五分鐘服一次。連服四五

次。必能將火柴頭吐出。再用陳松節油二錢半。蛋黃一枚。溫水二兩半。加白糖兩匙調勻。每隔半時服一匙。因膽礬之成分。為硫酸銅。與火柴頭之磷質相遇。即擁護於磷之表面。使不易爆發。

〔附註〕 此方雖亦有效。然總不及皮絲煙湯之神速也。

【調養】

一、穀芽煎湯飲。吞火柴頭者救活後。胃氣虛弱。嘔吐不止。調養之法。宜以生穀芽一兩。煎湯徐徐呷之。自能止嘔和胃也。

二、不可驟食飯。吞火柴頭者救活後。其人胃中覺飢。不可驟與飯。宜以薄稀粥微和胃氣。其他牛乳及食

有油質的物質。俱當禁之。犯之有傷胃氣。變端滋多也。

三、解其餘毒。吞火柴頭者。服皮絲煙湯後。若磷毒猶未吐盡。尚有餘留。宜速以銀花生甘草湯主之。或祇生甘草銀花二味各三錢。泡飲代茶亦可。自能解其餘毒而和胃氣。殊為穩妥。

結論

吞火柴頭死者。為狀至慘。以臟腑焦灼。痛如鍼刺。跳躍狂奔。莫能遏止。夫以可貴之身軀。不自珍惜。稍有意氣。即以此種毒質自裁。不問其死狀如何之慘。即反躬自省。父母之期望。責任之重要。前程之遠大。亦當愧悔交併。懸崖勒馬。勿再作此懦弱之行。



爲矣。嗟嗟。服毒男女乎。本證各方。雖能挽若危命。然經此波折。精神消耗。不復如前。心灰意懶。不復振作矣。苟萬事以忍耐爲主。目前之失敗。卽將來之成功。勿自餒。勿自賤。則精誠所至。金石可開也。

### 吞火柴頭證各方淺

#### 解毒類

#### (一) 雞蛋白方 (驗方)

以生雞蛋白。儘多灌入。服毒人口。

#### (淺解) 本方生雞蛋白性涼滑

樑。火。柴。頭。經。此。裏。住。炎。性。不。能。發。展。再。以。皮。絲。煙。湯。服。之。自。可。有。效。

#### (二) 皮絲煙湯 (驗方)

以皮絲煙四兩。先將清水一大

吞火柴頭證

鍋。燒。至。將。滾。時。將。皮。絲。煙。如。下。麵。一。般。攪。入。鍋。內。約。十。分。鐘。勿。令。過。性。擦。在。夏。布。上。瀝。出。其。湯。以。冷。水。冰。之。去。其。熱。氣。俟。溫。和。適。口。卽。將。此。湯。灌。入。扶。其。人。行。走。不。使。停。住。卽。能。吐。出。毒。燐。再。灌。再。吐。至。無。紅。頭。顏。色。而。止。此。方。百。發。百。中。屢。試。屢。驗。

#### (淺解) 本方皮絲煙善消燐毒

且能使人嘔吐。乃吞火柴頭者之救星也。

#### (三) 膽礬湯 (驗方)

法以膽礬末五釐。溶化於一茶杯清水中。每五分鐘服一次。連服四五次。必能將火柴頭吐出。再以陳松節油二錢半。蛋黃一

枚。溫水二兩半。加白糖兩匙。調勻。每隔半時服一匙。

#### (淺解) 本方膽礬之成分。爲硫

酸銅。與火柴頭之燐質相遇。卽擁護於燐之表面。使不易爆發。再佐以松節油。蛋黃。白糖。自能消解燐毒也。

#### (四) 穀芽湯 (冰玉堂驗方)

生穀芽一兩。

右一味以水八碗煮。取三碗。徐徐呷之。

#### (淺解) 本方穀芽能止嘔。而和

胃。吞火柴頭者救活後。胃氣虛弱。嘔吐不止。宜以此方調養。最爲佳妙。

#### (五) 銀花生甘草湯 (冰玉堂驗方)

金銀花四錢。生甘草四錢。

鮮地栗四錢。

右以水七碗煮。取二碗。去渣。分二次冷服。

〔淺解〕 本方銀花、生甘、地栗、均清熱解毒之品。吞火柴頭者。服皮絲煙湯後。癩毒大吐。然猶有餘留。而其人精神疲倦。再服皮絲煙湯。必將不支。不服又有性命之憂。此時也。速服本方。即可清其餘毒而保胃氣。殊爲穩妥。

# 百藥毒證

## 總綱

一、何謂百藥毒。

藥類中如砒霜、水銀、水莽、斷腸、輕粉、等品，俱含毒質。吞服後，有生命危險。

二、百藥毒證共分幾類。

- 一、吞砒霜類。
- 二、吞水銀類。
- 三、吞蒙汗藥類。
- 四、吞斷腸草類。
- 五、吞水莽草類。
- 六、吞輕粉類。
- 七、中鉛粉毒類。
- 八、中硫黃毒類。

百藥毒證

## 共九類

- 九、中巴豆毒類。
- 一〇、中木鱉毒類。
- 一一、中木瓜毒類。
- 一二、中野菌毒類。
- 一三、中杏仁毒類。
- 一四、中鹽鹵毒類。
- 一五、中半夏毒類。
- 一六、中楓草毒類。
- 一七、中橡乳毒類。
- 一八、中野葛毒類。
- 一九、中野草毒類。
- 二〇、中水蜜若毒類。
- 二一、中附子烏頭天雄毒類。
- 二二、中芫花毒類。
- 二三、中狼毒毒類。

何。三

百藥毒證各病之主要治法如

- 二四、中嗎啡毒類。
- 二五、中硃砂毒類。
- 二六、中冰片毒類。
- 二七、中斑貓毒類。
- 二八、中花椒毒類。
- 二九、中桐油毒類。
- 一、吞砒霜 防風湯。
- 二、吞水銀 真川椒鋪席下。
- 三、吞蒙汗藥 速飲冷水。
- 四、吞斷腸草 活羊血方。
- 五、吞水莽草 黑豆湯。
- 六、吞輕粉 川椒湯。
- 七、中鉛粉毒 麻油蜂蜜餡糖方。
- 八、中硫黃毒 活羊血熱飲。

九、中巴豆毒 芭蕉葉搗汁服。

一〇、中木鱉毒 肉桂湯。

一一、中木瓜毒 醋糖含口中。

一二、中野菌毒 綠豆湯。

一三、中杏仁毒 杏樹皮湯。

一四、中鹽鹵毒 豆腐漿湯。

一五、中半夏毒 生薑汁方。

一六、中楓藟毒 地漿湯。

一七、中橡乳毒 蟹方。

一八、中野葛毒 白鴨血方。

一九、中野草毒 甘草湯。

二〇、中水蓼若毒 甘草湯。

二一、中附子烏頭天雄毒 防風

湯。

二二、中羌花毒 防風湯。

二三、中狼毒毒 鹽水方。

二四、中嗎啡毒 酸柑汁方。

二五、中砒砂毒 藍靛韭汁。

二六、中冰片毒 地漿湯。

二七、中斑貓毒 玉簪花根湯。

二八、中花椒毒 地漿湯。

二九、中桐油毒 乾柿餅。

四 中百藥毒救活後之調養法如何。

中百藥毒救活後。患者宜靜自調

養。切不可食飯過飽。亦不可服酒辛

否則傷及胃氣。變症百出也。

五 中百藥毒失治。有無危險。

中百藥毒後。宜速救治。遲則毒延

臟腑。面黑指青。無可救藥也。

吞砒霜類

【病源】

被人謀害 砒石出於信州。乃錫

之苗。一云近銅山處亦有之。夫地之

生石也。稟賦有良毒之不齊。出產有

寒溫之各異。昆蟲草木皆然。不獨石

也。砒石大熱大毒。經火煨為霜。則其

性更烈。每見有人被人謀害。誤食置

有砒霜之食物。臟腑熱灼。腹中絞痛。

七竅流血而死。

【病狀】

腹中絞痛 砒霜味辛酸兼苦。其

人誤吞後。熱極。畏見陽光。面紅而紫。

目赤如鳩。腹中絞痛。口大渴。

【變症】

七竅流血 吞砒霜後。失於救治。

熱極。臟腑焦灼。腹中絞痛。反覆顛倒。

口渴甚。飲不解渴。至為困苦。未被必

七竅流紅。腐腸爛胃而死。

【療法】

腹中絞痛之療法 砒霜味辛酸 兼苦。其人誤吞後。熱極。畏見陽光。面 紅而紫。目赤如鳩。腹中絞痛。口大瀉。 急救之法。防風四兩。(重者八兩) 煎湯冷服。如牙關緊閉。須撬開灌下。 愈多愈妙。惟服後須扶病人行走。令 其作吐。如不吐。加服冷開水數大碗。 卽吐。吐後再灌。至毒盡爲度。

又方。以生桐油兩茶杯灌下。令其 大吐。使砒毒吐盡。卽可無憂。

又方。以食鹽兩匙。防風末四錢。開 水一大碗服。使其嘔吐。及毒物大半 吐出。乃用生雞子清四五枚吞下。則 雞子清自與腹中餘剩之砒毒化合。

使不能消化。再以鹽防風湯服下。使 其吐盡。便可無憂。

又方。以柏子壳三錢。紅土泥三錢。 (紅泥可向顏料店內購之)用研 爲末。以生雞蛋白調和。用冷滾水沖 服。服後卽作寒顫。則其毒自解。重者 兩服。無不愈者。

如服久。砒已入腹。則不能吐出。若 勉用吐藥。非特不吐。反傷胃氣。每每 不效。此時速以黑鉛四兩。用井水於 石上磨出黑汁。旋磨旋灌。盡則愈。卽 先吐出之後。亦宜再用鉛水服之。以 盡餘毒。始無後患。

【調養】

一、穀芽煎湯 誤吞砒霜救活後。 當忌煙酒椒薑百日。若其人胃氣虛

弱。嘔吐不止。調養之法。宜以生穀芽 一兩。煎湯徐徐呷之。自能止嘔和胃 也。

二、餘毒未清之調養法 誤吞砒 霜者救活後。其人精神疲憊。胃氣虛 弱。而猶有餘毒逗留未清。此時不可 再與防風湯以傷其正。宜以銀花、菘 豆、生甘、三味泡飲代茶。自能清其餘 毒而保胃氣。殊爲穩妥。

三、不可驟食飯 誤吞砒霜者救 活後。其人大飢。思食飯。此時切宜謹 慎。不可驟與飯。恐不易消化。傷其胃 氣。變端滋多。宜以薄稀粥緩緩與呷 之。是能養胃止飢。最易使胃氣復元。

吞水銀類

【病源】

誤吞水銀 水銀用硃砂燒煉而  
出。沉寒大毒。得人氣薰蒸。則入骨  
筋。絕陽蝕腦。其禍至烈。人誤吞之。即  
筋攣腹脹。有性命之憂。

【病狀】

筋攣腹脹 誤吞水銀後。其人筋  
脈攣急。腹中脹墜。不思飲食。

【變症】

損蝕臟腑 誤吞水銀。失於救治。  
水銀必鑽筋入骨。絕陽蝕腦。兼損蝕  
臟腑而死。

【療法】

筋攣腹脹之療法 誤吞水銀後。  
其人筋脈攣急。腹中脹墜。不思飯食。  
速揀開口花椒二兩吞下。即藥水銀  
從大便出。再以真川椒數斤炒熱鋪

席下。令患者脫衣蓋被臥之。過一夜。  
水銀從毛孔中鑽入川椒內矣。神效。  
凡誤吞水銀。以此方救活者。不知多  
少。誠神方也。

〔附註〕 凡水銀誤入耳內。莫之

能出。蝕腦鑽骨。有性命之憂。速以黃  
金枕耳邊自出。若入肉內。令人筋攣。  
以金物熨之。亦可出。

【調養】

一、不可驟食飯 誤吞水銀救活  
後。其人大飢。思食飯。此時切宜謹慎。  
不可驟與飯。恐不易消化。傷其胃氣。  
變端滋多。宜以薄稀粥緩緩呷之。是  
能養胃止飢。最易使胃氣復元。  
二、宜以炭煎湯服 誤吞水銀者  
以上方救活後。餘毒留滯未盡。腹脹

墜。猶未全瘥。不可再服花椒。宜以木  
炭煎湯服之。自能肅清餘毒也。

在蒙汗藥類

【病源】

被匪人謀害 蒙汗藥大抵以天  
仙子為君。加入狐心等物。匪人多用  
之人。誤服下。頭重足輕。口吐涎沫。是  
謂中蒙汗藥毒病。

【病狀】

口吐涎沫 中蒙汗藥毒其人頭  
重足輕。口吐涎沫。目腫。不能言語動  
作。

【變症】

胸悶痰多 中汗蒙藥毒失治。雖  
無性命之憂。然亦不宜任其久迷不  
醒。如久迷不醒。則痰氣湧盛。即愈後

亦必痰多胸悶。變爲癘疾。至爲困苦。

【療法】

一、口吐涎沫之療法 中蒙汗藥毒其人頭重足輕。口吐涎沫。目暈。不能言語動作。速以止迷湯解之。若飲冷水。雖亦可解。但恐水停心下。致變停飲病。非良法也。

二、胸悶痰多之療法 中蒙汗藥毒失治。雖無性命之憂。然亦不宜任其久迷不醒。如久迷不醒。則痰氣湧盛。即愈後亦必痰多胸悶。變爲癘疾。至爲困苦。宜常服指迷茯苓丸。自可漸漸痊愈也。

【調養】

一、忌食辛辣 中蒙汗藥毒者。救醒後。其人忌酒辛厚味。生冷硬物。雞

鵝羊肉。蚌蛤河豚等味。恐引動痰氣。變痰飲證也。

二、宜以陳皮泡飲代茶 中蒙汗藥毒者救醒後。其人胸中時覺不舒。此係痰氣凝滯。調養之法。宜以廣陳皮泡飲代茶。徐徐呷之。自能使胸中舒適也。

三、預防蒙汗藥毒 預防中蒙汗藥毒之法。凡赴可疑之宴會。宜備銀篋一雙。凡有毒物下於食物內者。則其篋措後。必變黑色。速勿食之。自可避免中毒。

【附註】 此法最佳。凡各種砒霜藥毒俱可如此預防。惟此篋如措皮蛋或臭乳腐。則亦能變黑。不可不知。

吞斷腸草類

【病源】

誤食斷腸草 斷腸草與飛鸞草相似。多生於幽暗處。仰見一線天光。光中即見此草。有頭有翅。并有三尾。根如老薑。惟飛鸞草。雪時開五色花。中抽一莖。直上著花。葉形似金絲荷葉草。面綠而背銀紅色。其光潤。斷腸草則始終不開花。葉有尖圓二種。不光潤而有黑毛。俱極毒。如係尖葉尤毒。圓葉毒性稍緩。誤食之。胸中隱隱痛。久之氣機閉塞腸斷而死。

【病狀】

腹痛便秘 中斷腸草毒者。其人胸中隱隱作痛。久則氣不能通。腹痛便秘。最後腸斷而死。

【療法】

腹痛便秘之療法 中斷腸草毒

者。其人胸中隱隱作痛。久則氣不能通。腹痛便秘。至為困苦。有性命之憂。

急以活羊血灌一二碗即活。或服羊

油二三兩亦妙。以此草惟羊食之最

肥。故飲羊血羊油即解。愈後如腹中

猶有餘痛者。此毒未清也。宜接服通

腸解毒湯。

【調養】 一、不可驟食飯 中斷腸草毒者

救活後。其人大飢。思食飯。此時切宜

謹慎。不可驟與飯。恐不易消化。傷其

胃氣。變端滋多。宜以薄稀粥緩緩呷

之。是能養胃止飢。最易使胃氣復元。

二、宜以大黃銀花泡飲代茶 中

斷腸草毒者救活後。其人腹中時痛。

是餘毒未清也。調養之法。宜以大黃銀花。泡飲代茶。則氣味輕清和平。去病而不傷正。自可緩緩收功也。

三、忌食膏粱厚味 中斷腸草毒

者救活後。飲食至要謹慎。宜食清淡

之品。戒食膏粱厚味。雞鴨羊肉。蝦蟹

海腥。蚌蛤河豚。麵食生冷硬物等品。

否則引動病根。腸必受傷。禍變不測也。

天在水莽草類

【病源】

誤吞水莽 水莽草有劇毒。人誤

吞之。必腹中絞痛。失治則致人死命。

是謂中水莽草毒病。

【病狀】

口渴難忍 中水莽草毒者。其人

口渴難忍。心中煩亂。精神恍惚。腹中絞痛。失治則毒攻臟腑。必指甲青黑。面色灰白而死。

【療法】

口渴難忍之療法 中水莽草毒

者。其人口渴難忍。心中煩亂。精神恍惚。腹中絞痛。速以黑豆一兩。煮濃汁。

候冷透飲之立解。或以地漿水灌之亦效。

【調養】

一、忌食魚腥 中水莽草毒者救

活後。忌食膏粱厚味。魚腥蝦蟹。蚌蛤

河豚。雞鴨羊肉。麵食等物。

二、不可驟食飯 中水莽草毒者

救活後。其人大飢。思食飯。此時切宜

謹慎。不可驟與飯。恐不易消化。傷及



胃氣。變躁滋多。宜以薄稀粥緩緩呷之。是能養胃止飢。最易使胃氣復元。

三、宜以生甘草泡飲代茶。中水

莽草毒者救活後。其人腹中時痛。不思飲食。是毒氣餘留。未行廓清也。調養之法。宜以生甘草泡飲代茶。自能解其餘毒而扶正氣。法至善也。

### 五、輕粉粉類

#### 【病源】

環境惡劣。輕粉性最燥烈。有劇毒。其人因環境惡劣。事事不如意。心存厭世。遂吞輕粉自殺。不知中毒之後。面現青色。腹中墜痛。求生不能。求死不得。困苦萬狀。是謂中輕粉毒病。

#### 【病狀】

腹中墜痛。中輕粉毒者。其人面

現青色。腹中墜痛。求生不能。求死不得。反覆顛倒。躁煩不眠。飲食不思。

#### 【變症】

一、損蝕臟腑。中輕粉毒者。失於救治。其毒必鑽入筋骨。糜爛口齒。兼損蝕臟腑而死。

二、遍身疼痛。中輕粉毒者。失於救治。其毒鑽入筋骨。至年老血衰時。遍身疼痛。或生子癡呆。身體發瘡。

#### 【療法】

一、腹中墜痛之療法。中輕粉毒者。其人面現青色。腹中墜痛。求生不能。求死不得。反覆顛倒。躁煩不眠。飲食不思。宜以川椒去目。不拘多少。清晨白湯送下。日中宜以麻油黃蜜紅沙糖攪勻服之。

二、損蝕臟腑之療法。中輕粉毒者。失於救治。其毒必鑽入筋骨。糜爛口齒。兼損蝕臟腑而死。救治之法。速於其口齒糜爛。出血腫脹。臟腑未損之時。以黃連貴衆湯漱口。兼服生葶

藶。自可無礙。

#### 【調養】

一、宜食蘿菔葶藶。中輕粉毒者。調養之法。宜多食蘿菔葶藶。自可無礙。

二、忌食發物。中輕粉毒者。忌食發物。如膏粱厚味。雞鴨羊肉。魚腥蝦蟹。蚌蛤河豚。煎炒炙爆等物。

三、宜多服麻油。中輕粉毒者。其人大便時時不通。調養之法。宜多服麻油。自能潤腸通便而解粉毒。

中鉛粉毒類

【病源】

多孕怕育 婦人多孕怕育。遂吞鉛粉以打胎。不知此粉有劇毒。吞入大腸後。腹中墜痛不可忍。有生命之憂。是謂中鉛粉毒病。

【病狀】

面現青色 中鉛粉毒者。其人面現青色。腹中墜痛。不可忍。口吐涎沫。反覆顛倒。煩躁不眠。

【癡症】

一、口角流血 中鉛粉毒者。失於救治。其毒壅盛。損蝕臟腑。口角流血而死。

二、身體多發瘡毒 中鉛粉毒者。失於救治。其毒鑽入筋骨。至年老血

衰時。遍身疼痛。時發時愈。不能斷根。至爲困苦。

【療法】

一、面現青色之療法 中鉛粉毒者。其人面現青色。腹中墜痛。不可忍。口吐涎沫。反覆顛倒。煩躁不眠。速以活鴨血乘熱飲之。其毒立解。神效。或以白沙糖三四兩。冷沸水調服。或以蘿蔔鰓汁飲之。亦效。

二、口角流血之療法 中鉛粉毒者。失於救治。其毒壅盛。損蝕臟腑。口角流血而死。若尸身雖硬。而心口尚溫。猶可救也。速以艾絨作丸形。如黃豆大。生薑一片。將艾絨放於薑片上。用香火燃着艾絨灸之。其穴名氣海。在肚臍下一寸五分。肚腹兩旁。二人

用手推運。不可稍停。灸十數次。須俟受毒之人。手足微動。腹內作響。則回生矣。回生後。再以鴨血湯灌之。自可全愈。如此救法。效驗如神。

【調養】

一、忌食雞鴨 中鉛粉毒者。忌食發物。如膏粱厚味。雞鴨羊肉。蚌蛤河豚。煎炒炙燥等物。

二、宜飲蘿菔湯 中鉛粉毒者。救活後。其人胸中時覺悶塞不舒。此餘毒未清也。調養之法。宜以白蘿菔煎湯飲之。自有奇效。

三、毋聽邪說 預防中鉛粉毒。其人須立定主意。毋聽邪說。用此打胎。以此藥有劇毒。服後胎非特不能打去。且本身反有極大危險。生子多癡。

呆。身體多發瘡毒。遺害無窮。

### 中硫黃毒類

#### 【病源】

服以壯陽。其人平時喜服丹石硫黃。以壯陽道。希性交時能持久。不知此藥有毒。多服後。牙齒出血。雙目出血。有生命危險。是謂中硫黃毒病。

#### 【病狀】

雙目出血。中硫黃毒者。其人熱極。陽具強舉不衰。雙目出血。牙齒出血。躁擾不眠。脈弦浮大。

#### 【變症】

血流不止。中硫黃毒者失治。其毒不解。火氣愈旺。雙目牙齒。血愈流愈多。躁擾不眠。額紅如血。目亦如鳩。有生命危險也。

#### 【療法】

一、雙目出血之療法。中硫黃毒者。其人熱極。陽具強舉不衰。雙目出血。牙齒出血。躁擾不眠。脈弦浮大。速以白羊生熱血飲一碗。神效。臨臥以烏梅肉（焙乾）五錢。白沙糖五錢。水煎服。其血自止。

二、血流不止之療法。中硫黃毒者失治。其毒不解。火氣愈旺。雙目牙齒。血愈流愈多。躁擾不眠。額紅如血。目亦如鳩。有生命危險也。速以白羊血湯灌之。臨臥再服烏梅黑鉛湯。或可有救。

#### 【調養】

一、忌食發物。中硫黃毒者愈後。忌食發物。如膏粱厚味。雞鵝羊肉。蚌

蛤河豚。蝦蟹海腥等品。

二、切戒房慾。中硫黃毒者愈後。切戒房慾。否則陰精虧耗。孤陽亢熾。不免死亡也。

三、宜補陰液。中硫黃毒者愈後。宜補陰液。俾遠復元。當常服地黃芍藥湯。

### 中巴豆毒類

#### 【病源】

誤食巴豆。其人誤食巴豆。而中其毒。遂洩痢不止。是謂中巴豆毒病。

#### 【病狀】

洩痢不止。中巴豆毒者。其人洩痢不止。精神委頓。言語音低。若痢猶不止。有生命危險。

#### 【變症】

冷汗如雨 中巴豆毒者失治。其人痢下不止。元氣大傷。冷汗如雨。目光暗淡。四肢逆冷。危在頃刻。

【療法】

一、洩痢不止之療法 中巴豆毒者。其人洩痢不止。精神委頓。言語音低。若痢猶不止。有生命危險。速以黃連。菴豆煎湯服之。其瀉即止。或食冷粥一碗。亦能止瀉。神效。

二、冷汗如雨之療法 中巴豆毒者失治。其人痢下不止。元氣大傷。冷汗如雨。目光暗淡。四肢逆冷。危在頃刻。速以獨參湯冷服。待痢止後。再服參附湯以回其陽。始有生望。

【調養】

一、宜服參湯 中巴豆毒者愈後。

正氣大虛。宜補元氣。當服人參湯。貧者以黨參代之。是可漸漸復元。

二、忌食生冷硬物 中巴豆毒者愈後。忌食生冷硬物。及一切不易消化之物。如海腥蝦蟹。蚌蛤河豚等。

三、宜食冷粥 中巴豆毒者。其人痢下不止。元氣虛弱。危在頃刻。苟服黃連。菴豆等解毒之品。則尅伐元氣。病必加劇。如不服此種藥。則病不痊。可進退兩難。此時也。當速食冷粥。其瀉即止。以其既能解巴豆之毒。又可扶助正氣也。

中木鱉子毒類

【病源】

服此避孕 木鱉子在一般人口中看來。以為是一種絕妙的避孕藥。

往往於產後服下。以為從此可不致受孕。不知此藥性極寒。且有有毒。服後必渾身抖戰而死。危險極大。且也。即使能不受孕。而乘產後血虛之時。服下。其寒直襲子宮。以後必生痛經之症。而每次經來時。腹中必作劇痛。苦楚難言。

【病狀】 身發抖戰 中木鱉子毒者。其人渾身抖戰。不能自主。

【變症】 指甲青黑 中木鱉子毒者失治。其人抖戰不已。牙關緊閉。指甲青黑。目光失神。無藥可治也。

【療法】 一身發抖戰之療法 中木鱉子

一身發抖戰之療法 中木鱉子

毒者。其人渾身抖戰。不能自主。急以肉桂二錢煎湯服之。可以立愈。

二、指甲青黑之療法 中木蠶子

毒者失治。其人抖戰不已。牙關緊閉。指甲青黑。目光失神。無藥可治也。姑與肉桂烏藥湯服之。或可有救。如牙關緊閉。不可灌藥。速以竹篾撬開。或擊去一齒均可。

【調養】

一、忌食生冷 中木蠶子毒者愈後。當忌食生冷硬物。

二、宜服烏藥木香 中木蠶子毒

者愈後。其人腹中時痛。殊為困苦。調治之法。宜服烏藥木香湯。便可痊愈。

三、切戒怒鬱 中木蠶子毒者愈後。其人宜靜自調養。情志悅樂。切戒

怒鬱氣結。致變端叢生。遠感無窮。

中木瓜毒類

【病源】

多食木瓜 木瓜其味酸澀。多食後。中其毒。是謂中木瓜毒病。

【病狀】

舌大滿口 中木瓜毒者。其人舌大滿口。飲食言語。俱感不便。

【變症】

時時吐涎 中木瓜毒者失治。舌大滿口。時時吐涎。久不愈。至為困苦。

【療法】

舌大滿口之療法 中木瓜毒其人舌大滿口。飲食言語。俱感不便。宜以好醋調黃糖（紅糖亦可）含口中。吐出涎水數次。即愈。

【調養】

一、宜含冰糖 中木瓜毒者愈後。其人口中時覺酸苦。調養之法。宜含冰糖數塊。自能漸漸痊可。

二、忌食石榴 中木瓜毒者愈後。

其人忌食生冷水果。尤不可食石榴。以其味酸澀。與木瓜同。誤食後。病復發也。

中野菌毒類

【病源】

誤食野菌 野菌味殊鮮美。惟有毒。人誤食之。中其毒。必腹中絞痛。口吐白沫而死。

【病狀】

腹中絞痛 中野菌毒者。其人腹中絞痛。口吐白沫。危在頃刻。

【變症】

兩目失神 中野菌毒者。失於救治。其人腹痛益劇。白沫益多。兩目失神。此毒攻臟腑。無可救藥。

【療法】

一、腹中絞痛之療法 中野菌毒者。其人腹中絞痛。口吐白沫。危在頃刻。速以藜豆生研。新汲水攪之。澄清卽解。或掘地穴。深數尺。注水攪之。澄清名地漿。取漿飲之。其毒亦可自解。神效。

二、兩目失神之療法 中野菌毒者。失於救治。其人腹痛益劇。白沫益多。兩目失神。此毒攻臟腑。無可救藥。雖然。不可棄而不治。姑與地漿湯服之。或可有救。

【調養】

一、宜服生甘湯 中野菌毒者。救活後。其人腹中時痛。此餘毒未清。宜服生甘草湯。自能清解也。

二、忌食雞鵝 中野菌毒者。其人忌食膏粱厚味。雞鵝羊肉。蚌蛤河豚。蝦蟹海腥等品。

三、救治宜速 中野菌毒者。救治宜速。如生藜豆湯塊漿湯等。均宜及早預備。遲緩每不獲救。

中杏仁毒類

【病源】

食半生半熟杏仁 杏仁生熟食之。都不爲害。惟半生半熟者。服十數粒卽死。

【病狀】

肚腹絞痛 中杏仁毒者。其人肚腹絞痛。口瘡不能言。

【變症】

指現青色 中杏仁毒者。失治。必毒攻臟腑。心神昏迷而死。死後。口唇耳竅。手足十指。俱現青色。肚腹有青色塊。

【療法】

肚腹絞痛之療法 中杏仁毒者。其人肚腹絞痛。口瘡不能言。速宜取吐。吐出可解。用杏樹皮煎湯飲之。雖迷亂將死。亦可救。或用麝香一分。開水沖服。亦效。

【調養】

一、忌食發物 中杏仁毒者。忌食膏粱厚味。雞鵝羊肉。蚌蛤河豚。蝦蟹

海腥等物。

二、杏仁宜炒熟。預防中杏仁毒。食杏仁時。杏仁宜炒熟透。或即生食。

切不可食半生半熟者。致中其毒。

三、宜接服杏樹皮湯。中杏仁毒者。服杏樹皮湯。救活後。而餘毒未清。腹中猶有餘痛者。宜再服此湯。自可全愈。

中鹽瀆毒類

【病源】

誤食鹽瀆。鹽瀆。即鹽廐水之別名。鹽廐水者。鹽初熟時。槽中瀝下之黑水也。鹹苦大毒。人誤食之。必中毒而死。

【病狀】

口鹹作渴。中鹽瀆毒者。其人初

則口鹹作渴。渴極。飲不解渴。漸至腹痛身蹠。

【變症】

足縮腸結。中鹽瀆毒者。失治。其人血脈俱經。凝滯而不流。結果必足縮腸結而死。

【療法】

口鹹作渴之療法。中鹽瀆毒者。其人初則口鹹作渴。渴極。飲不解渴。漸至腹痛身蹠。急搗肥皂汁灌之。使吐。如吐未盡。用熟豆腐漿灌之。如再不吐。以鵝翎探喉。務使吐盡毒質。又方。以黃豆搗碎。沖冷水服之。或以活鵝鴨血。多多灌之。

【調養】

一、忌食鹹味。中鹽瀆毒者。初愈。

忌食鹹味。以血脈初告流利。復經鹹物。恐重行凝滯。病復發也。

二、宜飲豆腐漿一月。中鹽瀆毒者。初愈。豆腐漿不可間斷。宜繼續服之。服完一月。痼根全除。不復作矣。

三、忌食發物。中鹽瀆毒者。忌食發物。如雞鵝羊肉。蚌蛤河豚。蝦蟹海腥等物。

中半夏毒類

【病源】

誤食生半夏。其人誤食生半夏。遂中其毒。而變瘡啞。是謂中半夏毒病。

【病狀】

聲音變啞。中半夏毒者。其人猝然變為瘡啞。雖竭力叫喊。亦無聲音。

發出。至為困苦。

【變症】

時吐白沫 中半夏毒者失治。其人瘡啞不瘥。久之時吐白沫。

【療法】

一、聲音變啞之療法 中半夏毒者。其人猝然變為瘡啞。雖竭力叫喊。亦無聲音發出。至為困苦。速以生薑汁灌之。即可痊愈。

二、時吐白沫之療法 中半夏毒者失治。其人瘡啞不瘥。久之時吐白沫。速以生薑製半夏湯服之。自可無憂。

〔附註〕 中半夏毒病而服以半夏湯。讀者必疑此係矛盾之方。必無效驗。不知中半夏毒者。係生半夏。治

半夏毒者。係熟半夏。生半夏有毒。熟半夏無毒。以無毒之熟半夏。治有毒之生半夏。同氣相求。同類相應。自能效如桴鼓也。

【調養】

一、忌食生冷 中半夏毒者。忌食生冷硬物水果。

二、宜以陳皮泡飲 中半夏毒者。痰多。調養之法。宜以陳皮泡飲代茶。自能化痰利氣。病易痊可。

三、戒食生半夏 預防中半夏毒。凡生半夏及半生半熟之半夏。均不宜食。

中楓藟毒類

【病源】 誤食楓藟 楓藟有毒。誤食之。令

人笑不止。是謂中楓藟毒病。

【病狀】

笑不止 中楓藟毒者。其人笑不止。不能自主。

【變症】

汗出而死 中楓藟毒者失治。其人笑不止。不能自主。久之傷及心氣。心氣耗散。汗出而死。

【療法】

笑不止之療法 中楓藟毒者。其人笑不止。不能自主。速煮黑豆汁或地漿汁飲之。便可痊愈。

【調養】

一、忌食發物 中楓藟毒者。忌食發物。如雞鵝羊肉。蝦蟹海腥。蚌蛤河豚麩食等味。



二、不宜多笑。中楓葶毒者愈後。其人當時時留意。不宜多笑。恐傷心氣也。

中橡乳毒類

【病源】

橡汁流入井中。南洋羣島。以橡乳爲出產大宗。人居橡園。難免受毒。以橡乳汁流入井中故也。

【病狀】

腹痛吐沫。中橡乳毒者。其人腹中絞痛。口吐白沫。久之。必指甲青黑而死。

【療法】

腹痛吐沫之療法。中橡乳毒者。其人腹中絞痛。口吐白沫。宜速以鹽煮食。其毒立解。神效。惟切不可與酸

醋同食。否則每不可救。

【調養】

一、忌食酸醋。中橡乳毒者。忌食酸醋。腎梁厚味。雞鴨羊肉。蝦豚海腥等物。

二、常食生蟹。預防中橡乳毒。凡居橡園之人。宜常食生蟹。自可免中其毒。

三、救治宜速。中橡乳毒救治宜速。否則毒延臟腑。無可救藥。

中野葛毒類

【病源】

誤食野葛。野葛一名鈞吻。有大毒。誤食中其毒。腹中絞痛。口吐白沫。有生命危險。是謂中野葛毒病。

【病狀】

口吐白沫。中野葛毒者。其人腹中絞痛。口吐白沫。心神昏憤。躁煩譫語。久之。必血冷指甲青黑而死。

【療法】

口吐白沫之療法。中野葛毒者。其人腹中絞痛。口吐白沫。心神昏憤。躁煩譫語。急以白活鴨血乘熱灌入。即活。屢試如神。惟切不可遲延。遲則血冷。恐難見功。

【調養】

一、終身戒食鴨。中野葛毒者愈後。終身戒食鴨。否則病必復發。無藥可治。

二、忌飲冷水。中野葛毒者。忌飲冷水。誤飲必死。  
三、宜飲生甘草湯。中野葛毒者

愈後。而腹中猶有餘痛者。宜以生甘草泡飲代茶。自能完全痊可。

中野草毒類

【病源】

誤食不知名之野草。誤食不知名之各種野草而中其毒。其人腹中絞痛。冷汗如雨。面色青黑。是謂中野草毒病。

【病狀】

冷汗如雨。中野草毒者。其人腹中絞痛。冷汗如雨。面色青黑。口吐白沫。躁煩譫語。如失治。則其毒壅滯不解。延及臟腑。必血脈凝習。指甲青黑而死。

【療法】

冷汗如雨之療法。中野草毒者。

其人腹中絞痛。冷汗如雨。面色青黑。口吐白沫。躁煩譫語。速飲生甘草湯或地漿湯。自可無礙。

【調養】

一、忌食蝦蟹。中野草毒者。忌食發物。如雞鵝羊肉。蚌蛤河豚。蝦蟹海腥等。

二、餘毒未清之調養法。中野草毒者救活後。其人餘毒未清。腹中時有餘痛。調養之法。宜再飲生甘草湯。自能完全痊可也。

三、預防中毒。預防中野草毒。凡各種不知名之野草。切不可冒險嘗試。自可免中其毒。

中水葇蓉毒類

【病源】

誤食水葇蓉。菜中有水葇蓉者。葉圓而光。有毒。誤食之。遂中其毒。令人狂亂。狀如中風。劇者吐血不止。是謂中水葇蓉毒病。

【病狀】

狂亂如中風。中水葇蓉毒者。其人狂亂飛奔。跳踉不能遏止。狀如中風。劇者吐血不止。有生命危險。

【變症】

喘汗欲脫。中水葇蓉毒者失治。其人吐血不止。氣喘如牛。冷汗如雨。必欲脫也。

【療法】

一、狂亂如中風之療法。中水葇蓉毒者。其人狂亂飛奔。跳踉不能遏止。狀如中風。劇者吐血不止。有生命

危險。速飲生甘草湯或地漿湯。即可無憂。

二、喘汗欲脫之療法 中水菘若毒者失治。其人吐血不止。氣喘如牛。冷汗如雨。此欲脫也。速以獨參湯灌之。待喘定汗止。再以生甘草湯灌之。

【調養】

一、忌食雞鵝 中水菘若毒者。忌食雞鵝羊肉。蝦蟹海腥。蚌蛤河豚。鱧食辛辣等物。

二、宜服參三七末 中水菘若毒者。飲生甘草湯後。發狂已瘥。而血猶未止者。調養之法。宜以參三七研末吞之。即能止血神效。

三、宜服八珍湯 中水菘若毒者。愈後。而精神疲乏。面黃肌瘦。氣血俱

虛者。調養之法。宜服八珍湯。

中附子烏頭天雄毒

類

【病源】

服食過多 附子烏頭天雄。均辛温大毒。服食過多。遂中其毒。是謂中附子烏頭天雄毒病。

【病狀】

衄血不止 中附子烏頭天雄毒者。其人狂亂。飛奔跳踉。不能遏止。狀如中風。劇者吐血衄血不止。有生命危險。

【變症】

煩躁不眠 中附子烏頭天雄毒者失治。其毒壅盛。陽火炎旺。病者兩目盡赤。吐血衄血不止。煩躁不眠。殊

為危殆。

【療法】

一、衄血不止之療法 中附子烏頭天雄毒者。其人狂亂。飛奔跳踉。不能遏止。狀如中風。劇者吐血衄血不止。有生命危險。速服犀角菘豆薑便湯。

二、煩躁不眠之療法

中附子烏頭天雄毒者失治。其毒壅盛。陽火炎旺。病者兩目盡赤。吐血衄血不止。煩躁不眠。殊為危殆。速與大劑菘豆犀角薑便湯。或可望救。

【調養】

一、忌食辛辣 中附子烏頭天雄毒者。忌食辛辣香燥。煎炒炙爆。蝦蟹海腥。雞鵝羊肉等物。

二、宜飲菘豆湯。中附子烏頭天雄毒者救活後。而兩目紅赤。煩躁猶未瘥者。此餘毒未清也。調養之法。宜飲菘豆湯。

三、宜服參三七末。中附子烏頭天雄毒者救活後。各恙俱瘥。惟血猶未止者。調養之法。宜以參三七研末吞之。即能止血神效。

中、元花毒類

【病源】

過食芫花。芫花苦溫有大毒。煎時不可近眼。近眼則盲。食之過多。中其毒。是謂中芫花毒病。

【病狀】

四肢掣急。中芫花毒者。其人四肢掣急。土氣喘急。腹痛。如失治則口

吐白沫。目直視。腸斷而死。

【療法】

四肢掣急之療法。中芫花毒者。其人四肢掣急。上氣喘急。腹痛。速以生甘草湯服之。或服地漿湯亦可。

〔附註〕 芫花與甘草相反。故二味同用。每每失其功效。若中其毒。則正藉其相反之力以解之。殊有神效也。

【調養】

一、忌食雞鵝。中芫花毒者。忌食發物。如雞鵝羊肉。蚌蛤河豚。蝦蟹海腥等物。

二、宜服八珍湯。中芫花毒者救活後。其人精神疲弱。面黃肌瘦。調養之法。宜養補氣血。當服八珍湯。

三、宜接服生甘草湯。中芫花毒者救活後。其人餘毒未清。腹中猶有餘痛者。調養之法。宜再服生甘草湯。自能完全痊可也。

中、狼毒毒類

【病源】

過食狼毒。狼毒產北方山谷中。莖葉有毛。結實甚重。有大毒。人食之過多。遂中其毒。是謂中狼毒毒病。

【病狀】

腹痛欲死。中狼毒毒者。其人腹中疼痛欲死。

【變症】

指甲青黑。中狼毒毒者。失治。其毒壅滯不解。腹中疼痛。猶如刀割。指甲青黑。口吐白沫。有生命危險也。

【療法】

腹痛欲死之療法 中狼毒毒者 其人腹中疼痛欲死。急救之法。速飲鹽水。便可無礙。

【調養】

一、忌食發物 中狼毒毒者。忌食發物。如雞鵝羊肉。蝦蟹海腥。蚌蛤河豚等。

二、餘毒未清之調養法 中狼毒毒者。救活後。其人餘毒未清。腹中猶有餘痛。調養之法。宜服地漿湯。

三、不可雜藥亂投 中狼毒毒者。救治宜早。遲則毒延臟腑。無可救藥。而中毒後。尤當立定主意。速服鹽水。自可無礙。切不可雜藥亂投。

中嗎啡毒類

【病源】

吞食嗎啡 嗎啡係有毒之品。吞食中其毒。是謂中嗎啡毒病。

【病狀】

腹中絞痛 中嗎啡毒者其人腹中絞痛。面色灰黑。

【變症】

指甲青黑 中嗎啡毒者失治。其毒壅滯不解。腹中絞痛益劇。面色灰黑。指甲青黑。人事不省。此毒氣深結。無藥可救也。

【療法】

腹中絞痛之療法 中嗎啡毒者其人腹中絞痛。面色灰黑。速以酸柑汁一盅服之。力能收縮嗎啡。使其毒性不能發作。若不省人事者。再用酸

柑汁濃厚灌入。可保無性命之憂。

【調養】

一、忌食發物 中嗎啡毒者。忌食發物。如雞鵝羊肉。蝦蟹海腥。蚌蛤河豚等。

二、宜多服酸柑汁 中嗎啡毒者救活後。餘毒未清。腹中時時作痛。調養之法。可多飲酸柑汁。便可全愈。

三、不可驟食飯 中嗎啡毒者救活後。其人腹中大飢。宜與薄稀粥以和胃氣。不可驟食飯。恐傷胃氣。變端滋多。

中砒砂毒類

【病源】

服食燥過砒砂 服食火煉過之砒砂。遂中其毒。令人心熱悶而痛。

是謂中硃砂毒病。

【病狀】

心中悶痛 中硃砂毒者。其人心  
中悶熱而痛。指甲青黃。手冰足冷。如  
失治則其毒壅盛。心中劇痛。手足冷  
至節。死不治。

【療法】

心中悶痛之療法 中硃砂毒者。  
其人心中心悶熱而痛。指甲青黑。手冰  
足冷。速以蓋錠韭汁飲之即解。或服  
鹽湯亦效。

【調養】

一、忌食發物 中硃砂毒者。忌食  
發物。如雞鴨羊肉。蝦蟹海腥。蚌蛤河  
豚等。

二、宜飲竹葉心湯 中硃砂毒者

救活後。其人心時有餘痛者。此毒  
未清也。調養之法。宜以鮮竹葉泡飲  
代茶。自能痊可。

三、宜服遠志丸

中硃砂毒者救  
活後。其人呆笨。不能如前聰穎。此心  
氣塞結之故也。調養之法。宜常服遠  
志丸。

中冰片毒類

【病源】

服食冰片過多 冰片稟火金之  
氣而生。陽中之陽。氣味芳烈。為諸藥  
之冠。性升善竄。能直透骨髓。服食過  
多。中其毒。令人口渴心煩。是謂中冰  
片毒病。

【病狀】

口渴心煩 中冰片毒者。其人口

大渴。心中煩熱。劇者目昏。吐血衄血。  
或目中出血。

【變症】

吐血不止 中冰片毒者失治。其  
人正氣耗散。血脈破裂。吐血衄血不  
止。冷汗如雨。危在頃刻。

【療法】

一口渴心煩之療法 中冰片毒  
者。其人口大渴。心中煩熱。劇者目昏。  
吐血衄血。或目中出血。速以地漿湯  
或新汲冷水灌之。即可得救。

二、吐血不止之療法 中冰片毒  
者失治。其人正氣耗散。血脈破裂。吐  
血衄血不止。冷汗如雨。危在頃刻。速  
以獨參湯冷灌之。待汗止氣回。便可  
無憂。

【調養】

一、宜服參三七。中冰片毒者救活後。其人血猶未止者。可速以參三七研細末。冷開水吞下。其血即止。神效。

二、忌食海腥。中冰片毒者。忌食雞鵝。羊肉。蝦蟹海腥。蚌蛤河豚。鱸魚。辛辣香燥。煎炒炙爆等物。

三、宜補正氣。中冰片毒者愈後。其人正氣虛弱。面黃肌瘦。調養之法。當大補正氣。俾速復元。宜常服八珍湯。

中斑貓毒類

【病原】

過食斑貓。斑貓係昆蟲類。多生豆葉上。長五六分。至寸許。甲作紫綠

色。帶金屬光澤。背上有黃黑二色條紋。噴尖處。有一小赤點。食豆花。喜飛

行人前。捕食害蟲。有益農事。惟味辛性寒有毒。服食過多。即中其毒。是謂中斑貓毒病。

【病狀】

腹中劇痛。中斑貓毒者。其人腹中劇痛。牙關緊閉。口吐白沫。

【變症】

不省人事。中斑貓毒者。失治。毒壅不解。腹痛猶如刀割。口吐白沫。不省人事。指甲青黑。此毒攻臟腑。無藥可救也。

【療法】

一、腹中劇痛之療法。中斑貓毒者。其人腹中劇痛。牙關緊閉。口吐白

沫。速以篋撬開牙關。再灌大豆汁。藍汁。便可消解。

二、不省人事之療法。中斑貓毒者。失治。毒壅不解。腹痛猶如刀割。口吐白沫。不省人事。指甲青黑。此毒攻臟腑。無藥可救也。雖然。未可棄而不治。速以篋撬開牙關。再以生雞卵開孔。灌入口中。連灌五六枚。得吐即活。醒後接服大豆汁藍汁。便可全愈。

三、驗方二則。中斑貓毒者。服以上二方。無論中毒如何深重。總可得救。茲復附錄驗方二則。均極靈驗。以供參考。俾患此病者。個個痊可。不走枉死之城。則編者所願也。

(1) 涼水調六一散七錢。服二三次。必痛止而愈。

(2) 玉簪花根煎湯。冷服即解。

【調養】

一、忌食發物。中斑貓毒者。忌食發物。如雞鴨羊肉。蚌蛤河豚。蝦蟹海腥麵食等。

二、餘毒未清。中斑貓毒者救活後。餘毒未清。腹中猶有餘痛。調養之法。宜再服大豆汁。便可全愈。

三、不可驟食飯。中斑貓毒者救活後。其人腹中大飢。宜與薄稀粥以和胃氣。不可驟食飯。恐傷胃氣。變端滋多。

中花花椒毒類

【病原】

誤食閉口椒。花椒為椒之一種。係落葉灌木。山野自生。高丈許。有刺。

香氣甚烈。葉為羽狀。複葉對生。春日開小花。黃綠色。雌雄異株。秋末結實。極繁衍。形圓小。熟則色赤。裂開。黑子外現。名花椒紅。味辛。性溫有毒。閉口者。其毒尤烈。誤食之。戟刺咽喉。常令人口吐白沫。是謂中花椒毒病。

【病狀】

身體痺冷。中花椒毒者。其人咽喉。被毒刺戟。口吐白沫。身體痺冷。中氣欲絕。

【變症】

心神昏憤。中花椒毒者失治。其毒壅結不解。攻及臟腑。心神昏憤。身體痺冷。白沫時吐。指甲青黑。此血脈停凝。臟氣阻塞。死不治。

【療法】

一、身體痺冷之療法。中花椒毒者。其人咽喉被毒刺戟。口吐白沫。身體痺冷。中氣欲絕。速以地漿湯飲之。或以大蒜搗汁。豆豉搗汁。頻頻灌之。自解。

二、心神昏憤之療法。中花椒毒者失治。其毒壅結不解。攻及臟腑。心神昏憤。身體痺冷。白沫時吐。指甲青黑。此血脈停凝。臟氣阻塞。死不治。雖然。未可棄而不治。姑與大蒜肉桂湯。頻頻灌之。或可望救。

【調養】

一、忌食辛辣。中花椒毒者。忌食辛辣香燥。煎炒炙爆。雞鴨羊肉。蚌蛤河豚。蝦蟹海腥麵食等。

二、宜和營衛

中花椒毒者救活



後。其人時惡寒。肢體痺冷。此營衛不和也。法當和其營衛。宜服桂枝湯。

三、預防法 預防中花柳毒。凡閉口之花椒。切勿入口。

### 中桐油毒類

#### 【病源】

誤食桐油 桐油味甘辛性寒。有大毒。其人誤食之。或服此取吐。遂中其毒。令人吐不止。至爲困苦。是謂中桐油毒病。

#### 【病狀】

嘔吐不止 中桐油毒者。其人嘔吐不止。劇則自覺有胃底上翻之狀。精神疲憊。困苦難言。

#### 【變症】

胃陰大傷 中桐油毒者。失治。其

人嘔吐不止。最後黑汁盡行吐出。此爲胃底瀾陰。吐去則有生命危險。即使痊愈。而胃陰大傷。變爲翻胃病。

#### 【療法】

一、嘔吐不止之療法 中桐油毒者。其人嘔吐不止。劇則自覺有胃底上翻之狀。精神疲憊。困苦難言。速以酒燉熱飲之。其毒即解。或食乾柿餅亦可。或以蓮蓬煎湯飲之。亦能解毒止嘔。

二、胃陰大傷之療法 中桐油毒者。失治。其人嘔吐不止。最後黑汁盡行吐出。此爲胃底瀾陰。吐去則有生命危險。即使痊愈。而胃陰大傷。變爲翻胃病。宜服大半夏湯。或依內科病翻胃證各方治之亦可。

#### 【調養】

一、宜食泡糯米 中桐油毒者愈後。其人胃氣虛弱。時或作嘔。宜以糯米蒸熟曬乾。炒泡食之。以和胃補中。

二、忌食生冷水果 中桐油毒者忌食生冷水果。及一切不易消化。尅伐胃氣之品。如栗子、魚翅、油魚等。

三、宜施蜜槌 中桐油毒失治。變爲翻胃。其人大便艱難。切不可服尅伐攻逐之品。如大黃、巴豆等。宜施蜜煎導法。惟此係古法。施用時殊覺麻煩。今藥房有做就之蜜槌。殊爲便利。法以此槌插入糞門。使肛中潤澤。大便自通。若妄用攻逐尅伐之品。則大便非特不通。且胃氣大傷。有生命危險。慎之慎之。

結論

百藥毒證各病。均宜救治得早。乘其臟腑未傷。正氣未虛。速以解毒之品救之。則十中可全其十。若遲治失治。臟腑已傷。正氣已虛。雖有神丹。十中難全一二。此最宜注意。治病如救火。切不可絲毫延擱也。

預防中毒。凡不知名之藥草。切勿試嚼。各種毒草。必須明其毒之所在。如生半夏有毒。苟製熟後即無毒。杏仁生半熟者有毒。苟炒熟後即無毒。花椒閉口者有毒。開口者即無毒。諸如此類。可舉一反三。如此謹慎。不輕嘗試。自無中毒之憂也。

凡赴可疑之宴會。宜備銀筷一雙。若食物內有毒。則其筷拮後必有黑

色。速勿食之。自可避免中毒。惟此筷如拮皮蛋或臭乳腐等。則亦能變黑。不可不知。

百藥毒證各上方淺解類

【吞砒霜類各方】

(一)防風湯(證治準繩方)

防風四兩(重者八兩)

右一味以水十二碗煮。取五碗。去渣。冷服。如病者牙關緊閉。須撬開灌下。愈多愈妙。惟服後須扶病人行走。令其作吐。如不吐。加服冷開水數大碗。即吐。吐後再灌。至毒盡爲度。

(淺解) 本方防風辛散之力最

強。吞砒霜後。服此使砒毒外泄。盡行消溶。即可無憂。

(二)生桐油吐方(驗方)

以生桐油兩茶杯灌下。令其大吐。使砒毒吐盡。即可無憂。

(淺解) 本方生桐油味甘辛性

寒。有大毒。吞砒霜者服此。使其大吐。則砒毒盡行吐去而瘥。惟此方須早用。若吞砒已久。毒已入腹。難以吐出。勉用吐藥。非特不吐。反傷胃氣。每不效。此時當速灌黑鉛汗。始能獲救。

(三)鹽防風湯(驗方)

食鹽兩匙。防風末四錢。

右二味以冷開水一大碗沖服。使其嘔吐。及毒物大半吐出。乃用生雞子清四五枚吞下。則雞子清自與腹中餘剩之砒毒化合。使不能消化。再以鹽防風湯服下。使其吐盡。便可無

憂。

〔淺解〕 本方食鹽解砒熱。開鹽結而探吐。防風消溶砒毒。佐以雞子清。使與砒毒化合。不能發展其毒性。然後緩緩灌之。使毒吐盡。便可無憂。惟此方亦宜早施。如服砒已久。毒已入腹。則勉強使吐。反傷胃氣。當服黑鉛汁救之。

〔四〕 柏子紅泥方（驗方）

柏子壳三錢。紅土泥三錢。

（紅泥可向顏料店內購之）

右二味研爲末。以生雞蛋白調和。用冷滾水冲服。服後卽作寒顫。則其毒自解。重者兩服。無不愈者。

〔淺解〕 本方柏子壳、紅土泥、生

雞蛋白均係消解砒毒之品。服後作

寒顫者。砒毒消解之兆也。切勿驚惶。

〔五〕 黑鉛汁方（驗方）

黑鉛四兩。

右一味用井水於石上磨出黑汁。

旋磨旋灌。盡則愈。

〔淺解〕 本方黑鉛味甘性涼。有

鎮墜之力。善消砒毒。如服砒已久。毒已入腹。則不可使吐。勉用吐藥。非特不吐。反傷胃氣。每每不效。此時速投

本方。自有神效。如已服吐藥吐過。而

餘毒未清。亦當服此方以盡餘毒。方

無後患。

〔六〕 生穀芽湯（冰玉堂驗方）

生穀芽一兩。

右一味以水九碗煮。取二碗。去渣。

徐徐呷之。自能止嘔和胃。

〔淺解〕 本方穀芽味甘性溫。善

和脾胃。吞砒霜者救活後。其人時時

嘔吐。此胃氣虛弱也。用止嘔藥。嘔不

能止。此當和胃氣。胃氣得和。中氣得

健。嘔自止。當服本方。

〔七〕 銀花茶豆生甘方（冰玉堂

驗方）

金銀花四錢。萁豆四錢。生

甘草四錢。

右三味以百沸水泡飲代茶。

〔淺解〕 本方銀花、菜豆、生甘、均

清熱解毒之品。吞砒霜者救活後。其

人精神疲憊。胃氣虛弱。而猶有餘毒

逗留。此時不可再與防風湯以傷其

正。宜服本方。清其餘毒。而保胃氣。殊

爲穩妥。

【吞水銀類各方】

(一)川椒內服方(驗方)

以開口花椒二兩。緩緩吞下。即裹水銀從大便出。神效。

〔淺解〕 本方川椒係辛熱香燥

之品。善解水銀陰寒之毒。吞水銀者。速服此方。每得獲救。

(二)川椒外治方(串雅方)

以川椒數斤。炒熱。鋪席下。令患者脫衣蓋被臥之。過一夜。水銀從毛孔中鑽入川椒內矣。

〔淺解〕 此方與上方意義略同。

均善解水銀毒也。

(三)木炭湯(證治準繩方)

木炭五錢。

右以水七碗煮。取二碗。去渣。分二

次服。

〔淺解〕 本方木炭味辛性熱而燥。善解水銀毒。誤吞水銀者救活後。

餘毒未清。接服此方。自能肅清餘毒。且藥性和平。不若花椒之辛燥毒烈也。

【吞蒙汗藥類各方】

(一)止迷湯(瘍醫大全方)

白茯苓五錢。生甘草二錢。瓜蒂七個。陳皮一錢。

右以水七碗煮。取二碗。去渣。分二次服。服後即大吐而醒。其從前事。斷不遺忘。不似涼水之解而神志不清也。

〔淺解〕 本方茯苓。陳皮。化痰。瓜

蒂。涌痰。甘草為和。服此方後大吐者。

瓜蒂之力也。中蒙汗藥毒者。其人痰必壅盛。速服此方。即大吐而醒。此方較服冷水為佳。服冷水雖亦解毒。而神志必不清楚。且流弊至多也。

(二)指迷茯苓丸(千金方)

製半夏四兩。白茯苓三兩。枳殼三兩(麩炒)。風化硝三錢。

右共研細末。河水煮。米糊和丸。如梧桐子大。每服二錢。白滾水送下。

〔淺解〕 本方半夏。茯苓。枳殼。化痰利氣。風化硝開結行痰。中蒙汗藥毒者失治。其人痰多。胸悶。此痰氣凝結也。常服此方。自漸痊愈。

(三)陳皮湯(冰玉堂驗方)

廣陳皮三錢。

右以水七碗煮。取二碗。去渣。分二

右一味以百沸水泡飲代茶。

【淺解】 本方陳皮味辛性散。善化痰行氣。寬中開胸。

【香斷腸草類各方】

(一) 活羊血方(驗方)

以活羊血漿熱灌一二碗。即活。

【淺解】 本方羊血味鹹性平。善

解各種毒。其能解斷腸草毒者。亦此意也。且此草羊食之最忌。故用此解毒。其效尤著。

(二) 羊油方(千金方)

以活羊油二三兩服之。

【淺解】 此方與上方意義略同。功效亦同。惟殊難下咽。不若羊血之好上口也。

(三) 通腸解毒湯(瘍醫大千方)

金銀花五錢。 生甘草五錢。

大黃三錢。

右以水三碗煮。取一碗。去渣。頓服。能一瀉而愈。

【淺解】 本方大黃、銀花、清熱解毒。生甘為和。中斷腸草毒者。服活羊

血後。病勢已減。而腹中猶有餘痛者。此熱毒未清也。當接服此方。

(四) 大黃銀花湯(瘍醫大千方)

大黃三錢。 金銀花三錢。

右二味以百沸水泡飲代茶。

【淺解】 本方與上方意義略同。

惟泡後則氣味輕清和平。不若煎劑之暴烈。中斷腸草者救活後。餘毒未清。宜接服此方。去病而不傷正。自可緩緩收功也。

【香水莽草類各方】

(一) 黑豆湯(沈氏尊生書方)

大黑豆一兩。

右一味以水九碗煮。取二碗。去渣。候冷透飲之。其毒立解。

【淺解】 本方黑豆味甘性平無

毒。善解各種金石藥毒。中水莽草毒者。速服此方。便可得救。

(二) 地漿湯(串雅方)

掘地上黃土作坎。深約三尺。

(牆陰處尤佳)以新汲水灌

入。攪濁。俟其沈澱。取清者用之。

【淺解】 地漿湯甘寒無毒。善解一切藥物魚肉果菜閉口椒諸菌之毒。中水莽草毒者。速服之。毒立解。神效。

【三】生甘草湯（驗方）

生甘草三錢。

右一味以百沸水泡飲代茶。

【淺解】本方生甘草善解百草之毒。而扶正氣之弱。

【吞輕粉類各方】

（一）川椒內服方（驗方）

見本證吞水銀類各方淺解。

（二）麻油黃蜜紅沙糖方（驗方）

麻油三錢。黃蜜三錢。紅沙

糖三錢。

右三味攪勻。如覺太厚。可加入冷

開水沖服。

【淺解】本方係潤腸之劑。使輕

粉毒由大便中瀉出。

（三）黃連貫衆湯（沈氏尊生書

方）

貫衆三錢。黃連三錢。

右以水八碗煮。取三碗。去渣。服一碗。餘二碗。用以時時漱口。

【淺解】本方黃連、貫衆、均係清

熱解毒之品。中輕粉毒者。口齒糜爛。出血腫脹。此熱毒壅盛也。速服此方以清解之。自可無礙。

（四）葶薺方（王孟英方）

生葶薺五兩。

右一味時時取服。即能消解輕粉

之毒。

【淺解】本方葶薺味甘性寒。善

消丹石輕粉之毒。

（五）生蘿服方（王孟英方）

生蘿葶五兩。

右一味時時取服。即能消解輕粉之毒。

【淺解】本方蘿葶味甘性溫。

善消丹石輕粉之毒。

【中鉛粉毒類各方】

（一）活鴨血方（驗方）

以活鴨血乘熱灌之。一二碗即活。

【淺解】本方活鴨血味鹹性寒。

善消丹石鉛粉之毒。

（二）白沙糖方（驗方）

白沙糖三兩或四兩。

右一味以冷沸水調服。

【淺解】本方白沙糖善消鉛粉

之毒。

（三）蘿蔔汁方（王孟英方）

以生蘿藤三四枚。搥汁飲之。此方意義與生蘿藤方略同。可以參閱。(方見本證吞輕粉類各方淺解)

〔四〕艾絨灸法(鍼灸大成)

以艾絨作丸。形如黃豆大。生薑一片。將艾絨放於薑片上。用火燃着艾絨灸之。其穴名氣海。在肚臍下一寸五分。肚腹兩旁。二人用手推運。不可稍停。灸十數次。須俟受毒之人。手足微動。腹內有響聲。則回生矣。回生後。再以鴉血湯灌之。自可全愈。

〔淺解〕此法係溫運通陽之意。

乃挽命之妙法也。

【中硫黃毒類各方】

(一)活羊血方(驗方)

見本證吞斷腸草類各方淺解。

(二)烏梅沙糖湯(沈氏尊生書方)

烏梅肉五錢。(焙乾) 白沙糖五錢。

右二味以水八碗煮。取二碗。去渣。

冷服。

〔淺解〕本方以烏梅之酸澀。欲

血止血。白沙糖之甘涼。解毒消毒。

(三)烏梅黑鉛湯(驗方)

烏梅五錢。黑鉛一兩。

右二味以水八碗煮。取二碗。去渣。

分二次服。

〔淺解〕本方烏梅、黑鉛。均善解

硫黃之毒。不特此也。烏梅兼能斂離

經之血。黑鉛兼能潛上越之陽。故此方服後。牙齒出血。躁擾不眠。均可痊愈也。

(四)地黃芍藥湯(張潔古方)

生地黃五錢。熟地黃五錢。

生白芍五錢。全當歸五錢。

酸棗仁五錢。

右以水九碗煮。取二碗。去渣。分二次溫服。

次溫服。

〔淺解〕本方二地、當歸、補陰補

血。棗仁、白芍。斂陰補陰。中硫黃毒者

愈後。以血去過多。陰分大虧。當常服

此方。自能漸漸復元。

【中巴豆毒類各方】

(一)黃連菜豆湯(癩醫大全方)

黃連三錢。菜豆三錢。

右二味以水六碗煮。取碗半。去渣。分二次冷服。

〔淺解〕 本方黃連、黑豆善解巴豆之毒。

(一) 獨參湯 (張景岳方)

人參五錢。(病重者七八錢均可)

右一味以水六碗煮。取一碗。去渣冷服。

〔淺解〕 本方以人參挽回其將絕之元氣。冷服者。能解巴豆之毒。且止瀉也。

(三) 參附湯 (世醫得效方)

人參五錢。(貧者以黨參代之)

附子三錢。

右二味以水九碗煮。取二碗。去渣。

分二次溫服。

〔淺解〕 本方以人參扶正。附子回陽。中巴豆毒者。痢下不止。四肢逆冷。此亡陽也。速服此方。若痢止肢溫。始有生望。

(四) 人參湯 (冰玉堂驗方)

人參三錢。(貧者以黨參代之)

黃耆三錢。白朮三錢。

右三味以水九碗煮。取二碗。去渣。分二次溫服。

〔淺解〕 本方人參、黃耆、白朮均和中補正之品。中巴豆毒者愈後。其人正氣大虛。當服此方。白可復元也。

【中木繁毒類各方】

(一) 肉桂湯 (驗方)

肉桂二錢。(貧者以桂枝代之)

右一味以水五碗煮。取一碗。去渣。頓服。

〔淺解〕 本方肉桂味辛甘性大熱。善散寒凝之邪。解木繁之毒。中木繁毒者。渾身抖戰。非服此方。不能挽救。

(二) 肉桂烏藥湯 (驗方)

肉桂三錢。(貧者以桂枝代之)

烏藥三錢。

右二味以水七碗煮。取二碗。去渣。分二次溫服。

〔淺解〕 本方肉桂味辛甘性大熱。烏藥味辛性溫。均善散寒邪。解木繁毒。

(三) 烏藥木香湯 (證治準繩方)

烏藥三錢。木香二錢。



右二味。以水七碗煮。取二碗。去渣。分二次溫服。

【淺解】 本方烏藥、木香、味辛性溫。均善散太陰厥陰之寒邪。中木藥毒者愈後。其人腹中時有餘痛者。此餘毒未盡。餘寒猶存。接服此方。自可完功。

【中木瓜毒類各方】

(一) 醋糖湯 (單方大全方)

以好醋一杯。調黃糖三錢。(紅糖亦可) 含口中。吐出涎水。數次即愈。

【淺解】 木瓜之毒毒在澀。本方醋糖合化。專解澀味。故能收效如神。

(二) 冰糖方 (驗方)

以冰糖數塊。含在口中。

【淺解】 本方與上方意義略同。惟較簡便。

【中野菌毒類各方】

(一) 菘豆湯 (驗方)

以菘豆五錢。生研。新汲水搗之。澄清服。

【淺解】 本方菘豆味甘性寒。善

解一切丹石草藥之毒。故能解野菌毒也。

(二) 地漿湯 (串雅方)

見本證吞水莽草類各方淺解。

(三) 生甘草湯 (驗方)

見本證吞水莽草類各方淺解。

【中杏仁毒類各方】

(一) 杏樹皮湯 (本草綱目方)

杏樹皮五錢。(重者七八錢)

兩均可)

右一味以水七碗煮。取一碗。去渣。

頓服。

【淺解】 本方杏樹皮最善解杏

仁之毒。雖迷亂將死。苟服此方。亦可救。蓋地無廢物。有一病必有一藥。醫

生尅之道。至爲玄妙。我於此方。益信。

(二) 麝香散 (本草綱目方)

麝香末一分。

右一味以開水沖服。

【淺解】 麝形似壁。小而色黑。麝

香即其臍也。其所居之處。遠近草木皆香。然其地草木枝葉不茂。瓜果不實。以辛溫香竄之極。各種草木咸失

其營養之性。善消一切瓜果之毒。故

治杏仁毒有神效也。

【中鹽瀉毒類各方】

(一)肥皂汁方(單方大全方) 卽洋皮皂方。見吞生鴉片證各方淺解類。

(二)熱豆腐漿方(驗方)

以熱豆腐漿二三碗。灌於病人口中使吐。

【淺解】本方熱豆腐漿。係由黃豆製成。善解鹽瀉毒也。

(三)黃豆湯(本草綱目方)

黃豆七錢。

右一味搗碎。以新汲水二碗沖服。

【淺解】此與豆腐漿方意義略同。均善解鹽瀉毒也。

(四)活鵝血方(千金方)

以活鵝一隻殺之。取其血乘熱

飲之。

【淺解】本方活鵝血善解鹽瀉毒之毒。

(五)活鴨血方(單方大全方)

見吞生鴉片證各方淺解類。

【中半夏毒類各方】

(一)生薑汁方(本草綱目方)

生薑搗出汁二匙。

右一味以開水沖開服之。

【淺解】本方生薑味辛性溫。善

解半夏南星諸菌之毒。

(二)生薑製半夏湯(沈氏方)

生薑五錢。製半夏四錢。

右二味。以水七碗煮。取二碗。去渣

分二次溫服。

【淺解】本方生薑解半夏之毒。

用半夏以化痰利氣。

【附註】 中半夏毒者。而服以半

夏湯。讀者必疑此係矛盾之方。必無

效驗。不知中半夏毒者。係生半夏。治

半夏毒者。係熟半夏。生半夏有毒。熟

半夏無毒。以無毒之熟半夏。治有毒

之生半夏。同氣相求。同類相應。故有

桴鼓之效也。

(三)陳皮湯(冰玉堂驗方)

見本證吞蒙汗藥類各方淺解。

【中楓藟毒類各方】

(一)黑豆湯(沈氏尊生書方)

見本證吞水莽草類各方淺解。

(二)地漿湯(串雅方)

見本證吞水莽草類各方淺解。

【中橡乳毒類各方】

【(一)蟹方(金鑑方)】

以蟹二三隻加入紫蘇生薑同煮待熱即取食。

【淺解】

本方蟹味鹹性寒。通經絡。散瘀血。續筋骨。解漆毒。橡乳膠凝似漆。故食蟹能解其毒。而蟹之功。尤妙在黃。蟹黃遇橡乳。即化為水。亦物之相制也。

【中野葛類各方】

【(一)活鴨血方(單方大千方)】

見吞生鴉片證各方淺解類。

【(二)生甘草湯(驗方)】

見本證吞水莽草類各方淺解。

【中野草毒類各方】

【(一)生甘草湯(驗方)】

見本證吞水莽草類各方淺解。

【(二)地漿湯(串雅方)】

見本證吞水莽草類各方淺解。

【中水荑若毒類各方】

【(一)生甘草湯(驗方)】

見本證吞水莽草類各方淺解。

【(二)地漿湯(串雅方)】

見本證吞水莽草類各方淺解。

【(三)獨參湯(張景岳方)】

見本證中巴豆毒類各方淺解。

【(四)參三七末方(本草綱目方)】

參三七三錢。(重者六錢)

右一味研為細末。開水吞下。

【淺解】本方參三七味甘苦性

溫。止血有神效也。

【(五)八珍湯(六科準繩方)】

川芎三錢。全當歸三錢。白

芍三錢。生地三錢。人參三

錢。白朮三錢。白茯苓三錢。

炙甘草三錢。

右八味以水九碗煮。取三碗。去渣。

分三次溫服。

【淺解】本方以芍、歸、地、芎、補血

參、朮、苓、草、補氣。中水荑若毒愈後。氣

血大虛。宜服此方。調補之。

【中附子烏頭天雄毒類各方】

【(一)犀角菴豆薑便湯(驗方)】

烏犀角三錢。菴豆三錢。薑

便一碗。(後入)

右以水七碗。先煮烏犀角菴豆二

味。取二碗。去渣。加入薑便。復煮一滾。

即可取服。

【淺解】本方犀角、薑便、解附子

烏頭天雄毒。而清血止血。菜豆則純解附烏天雄之毒。而不能止血也。

〔二〕大劑菜豆犀角童便湯（驗方）

即於上方犀角菜豆童便湯內。各味分量加重一倍。

右以水十碗。先煮犀角菜豆二味。取二碗。去渣。加入童便。復煮一滾。即可分二次取服。

〔淺解〕 本方與上方意義完全相同。分量加重一倍者。因其病勢沉重。非如此不能收效也。

〔三〕菜豆湯（李氏方）  
時以菜豆煮湯服。

〔淺解〕 本方菜豆善解附子烏頭天雄之毒。藥性和平。功效卓著。中

附子烏頭天雄毒者救活後。餘毒未清。正氣虛弱。不可再施重劑者。接服此方。自能收功。

〔四〕參三七末方（本草綱目方）

見本證中水菖若毒類各方淺解。

【中芫花毒類各方】

〔一〕生甘草湯（驗方）

見本證吞水莽草類各方淺解。

〔二〕地漿湯（串雅方）

見本證吞水莽草類各方淺解。

〔三〕八珍湯（六科準繩方）

見本證中水菖若毒類各方淺解。

【中狼毒毒類各方】

〔一〕鹽水方（驗方）

食鹽五錢。

右一味。以開水碗半沖服。

〔淺解〕 本方食鹽善解狼毒之毒。

〔二〕地漿湯（串雅方）

見本證吞水莽草類各方淺解。

【中嗎啡毒類各方】

〔一〕酸柑汁方（單方大全方）

以酸柑搗出汁一盅頓服。

〔淺解〕 本方酸柑最善消解嗎啡之毒。藥性和平。可稍多服。不妨專

也。

【中硃砂毒類各方】

〔一〕鹽酸韭汁飲（金鑑方）

鹽酸汁一盅。韭汁一盅。

右二汁和勻頓服。

【淺解】 本方監龍韭汁善解砂毒也。

(二) 鹽湯 (驗方)

即鹽水方。見本證中瘋毒毒類

各方淺解。

(三) 竹葉心湯 (冰玉堂驗方)

鮮竹葉捲心五錢。

右一味以百沸水池飲代茶。

【淺解】 本方竹葉味甘淡性寒。

清心解毒。藥性和平。中硃砂毒者救

活後。餘毒未盡。其人心中猶有餘痛。

撲服此方。自能痊可。

(四) 遠志丸 (證治準繩方)

遠志一兩。石菖蒲一兩。白

茯苓一兩。白茯苓一兩。

右四味共研細末。煉白蜜爲丸。如

梧桐子大。每服三錢。食前開水送下。日二服。

【淺解】 本方遠志、菖蒲、化痰開

心。茯苓、茯神、和心補心。中硃砂毒者

救活後。其人呆笨。不能如前之聰穎。

此心氣塞結也。速以此方調養。自能

清明神志。

【中冰片毒類各方】

(一) 地漿湯 (串雅方)

見本證吞水莽草類各方淺解。

(二) 新汲水湯 (千金方)

以新汲冷水灌服。

【淺解】 冰片氣味芳烈。服後血

脈破裂。致令吐血衄血。服新汲水後。

血脈得冷則凝。走竄遇涼即住。故能

收效如神。

(三) 獨參湯 (張景岳方)

見本證中巴豆毒類各方淺解。

(四) 參三七末方 (本草綱目方)

見本證中水食苦毒類各方淺

解。

(五) 八珍湯 (六科準繩方)

見本證中水食苦毒類各方淺

解。

【中斑貓毒類各方】

(一) 大豆汁藍汁方 (單方大全

方)

大黑豆汁一盞。藍汁一盞。

右二味和勻。頓服。

【淺解】 本方大黑豆汁藍汁。善

解丹石藥毒。故治斑貓毒病。有神效

也。

(二)生雞卵方(千金方)

生雞卵開孔灌入病人口中。連灌五六枚。得吐即活。

〔淺解〕 本方生雞卵能解斑貓毒。且能採吐。

(三)六一散(劉河間方)

桂府滑石六兩。(水飛過淨)

甘草一兩。(去皮)

右研爲細末和勻。每服七錢。涼沸水調服。服二三次。痛止而愈。

〔淺解〕 本方滑石利水通淋。生甘解毒和氣。故善消斑貓毒也。

(四)玉簪花根湯(本草綱目方)

玉簪花根五錢。

右一味以水七碗煮。取一碗半。去渣。分二次冷服。

〔淺解〕 本方玉簪花根味辛性寒。善解斑貓之毒。

(五)黑豆湯(沈氏尊生書方)

見本證吞水莽草類各方淺解。

【中花椒毒類各方】

(一)地漿湯(串雅方)

見本證吞水莽草類各方淺解。

(二)大蒜汁豆豉汁方(驗方)

大蒜搗汁一盞。豆豉搗汁一盞。

右二味和勻頓服。

〔淺解〕 本方大蒜味辛性熱。豆豉味甘苦性溫。二味均能宣滯行氣。

善解花椒之毒。

(三)大蒜肉桂湯(驗方)

大蒜三錢。肉桂三錢。(貧者以桂枝代之)

右二味以水九碗煮。取二碗。去渣。頻頻灌之。

〔淺解〕 本方大蒜、肉桂均善解

花椒毒也。

(四)桂枝湯(傷寒論方)

桂枝三錢。(去皮) 芍藥三

錢。甘草二錢。(炙) 生薑

三錢。大棗十二枚。(劈)

右五味以水七碗微火煮。取三碗。去渣。分三次溫服。

〔淺解〕 本方桂枝、芍藥、生薑、調

和營衛。甘草、大棗、和中補虛。中花椒毒者救活後。其人時時惡寒。肢體痺

冷。此營衛不和也。速服此方。和其營衛。各恙自瘥。

【中桐油毒類各方】

(一) 乾柿餅方 (串雅方)

乾柿餅七枚。

右一味可時時食之。食完其毒自解。神效。

〔淺解〕

本方乾柿餅味甘澀性寒。善解桐油之毒。

(二) 蓮蓬湯 (串雅方)

鮮蓮蓬七枚。(如無鮮者以乾者代之亦可)

右一味以水五碗煮。取二碗。去渣。分二次溫服。

〔淺解〕 本方蓮蓬味苦澀性溫。善解桐油之毒。

(三) 大半夏湯 (金匱要略方)

製半夏三碗。人參三錢。白蜜一碗。

右三味以水十二碗和蜜燀之二百四十遍。煮藥。取二碗半。溫服一碗。餘分再服。

〔淺解〕 本方以半夏止嘔治翻胃。人參、白蜜、補脾養胃陰。

(四) 蜜煎導方 (傷寒論方)

以蜜煎老葱作指大一條。納穀道中。以手按之。大便自通。

# 中水毒證

## 總綱

一 何謂中水毒。

田澗山溪。往往有蛇蟻遺毒在內。

一切隔夜未蓋之茶水。必有蜈蚣蠅

螻等遺毒。飯落水缸中。日久生毛。有

劇毒。瓶內水插過花枝者。其毒最甚。

屋漏水至不潔淨。有毒。凡此諸水。若

誤飲之。必中其毒而成病。是謂中水

毒。

二 中水毒後之病狀如何。

中水毒後。其人必心腹攪痛。嘔吐

泛噦。胸中難過。頭目眩暈。或生瘡

癩等症。

三 中水毒證共分幾種。

一 中田澗山溪水毒類。

二 中隔夜水毒類。

三 中飯落水缸毒類。

四 中花瓶水毒類。

五 中屋漏水毒類。

共分五類

四 中水毒之主要治法如何。

中水毒雖分多種。而治法則一。

大抵均以雄黃散地漿湯為主。

五 中水毒者失治。有無危險。

中水毒後。宜速救治。失治則毒氣

壅盛。令人眼目昏花。口吐白沫。心神

昏憤而死。或變生重大惡瘡。膿水淋

漓。腐爛不已。亦有生命危險。

【病源】

誤飲濁水。田澗山溪。往往有蛇

蟻遺毒在內。一切隔夜未蓋之茶水。

必有蜈蚣蠅螻等遺毒。飯落水缸中。日久生毛。有劇毒。瓶內水插過花枝者。其毒最甚。屋漏水至不潔淨。有毒。凡此諸水。均係濁水。若誤飲之。必中其毒而成疾病。是謂中水毒病。

【病狀】

心腹攪痛。中田澗山溪水毒。中

隔夜水毒。中飯落水缸毒。中花瓶水

毒。中屋漏水毒。俱令人心腹攪痛。嘔

吐泛噦。胸中難過。頭目眩暈。

【變症】

眼目昏花。中水毒者。救治宜速。

失治則毒氣壅盛。令人眼目昏花。口

吐白沫。心神昏憤而死。或變生重大

惡瘡。膿水淋漓。腐爛不已。亦有生命

危險。



若係中飯落水缸毒。失治後必生疔瘡。

【療法】

一、心腹攪痛之療法 中田洞山溪水毒。中隔夜水毒。中飯落水缸毒。中花露水毒。中屋漏水毒。俱令人心腹攪痛。嘔吐泛噁。胸中難過。頭目眩暈。速以雄黃散服之。或煎地漿湯亦可。

二、眼目昏花之療法 中水毒者。救治宜速。失治則毒氣壅盛。令人眼目昏花。口吐白沫。心神昏憤而死。速於未死之前。始以雄黃散或大瀉地漿湯灌之。或可挽救。

三、生重大惡瘡之療法 中水毒

善夫台。戊。健。巨。大。其。字。長。水。木。野。

腐爛不已。亦有生命危險。速以黃靈藥敷之。圍敷二味拔毒散。以琥珀膏貼之。待腐肉已盡。宜敷腐蝕生肌散。即可痊愈。

四、生疔瘡之療法 若係中飯落水缸毒。失治後必生疔瘡。速以蟾酥丸汗之。便可無憂。

【調養】

一、勿飲澗水 預防中水毒。凡一切澗水毒水。俱宜勿飲。日常飲水。必取自大河潔流。水缸中宜放生薑明礬。缸蓋宜常蓋好。茶湯必須百沸。則毒不侵也。

二、忌食雞鵝 中水毒者。忌食一切發物。如雞鵝牛羊等肉。蚌蛤河豚。

聖。及。第。百。五。十。五。

三、餘毒未清之調養法 中水毒者愈後。其人心腹猶有餘痛者。此毒未清也。不可再服雄黃散。恐藥味峻烈。傷其正也。調養之法。宜以生甘草泡飲代茶。則既可解毒。又能和正。誠屬兩全之法。

結論

鄉村人家。不知衛生之法。各種汚湯澗水。隨意取飲。輒中其毒。釀成大病。而自已不知病源。委諸鬼神。醫者亦不探本求原。敷衍塞責。開一不痛不痒之方了事。致亡於枉死城者。不知多少人。願讀此篇者。盡力宣傳。說明其害。則功德無量。

中水毒證各十方後解

百。

(一)雄黃散(證治準繩方)

見中禽獸蟲魚毒證各方淺解類。

(二)地漿湯(串雅方)

見百藥毒證各方淺解類。

(三)大劑地漿湯(串雅方)

見中禽獸蟲魚毒證各方淺解類。

(四)黃蠶藥(金鑑方)

食鹽五錢。黑鉛六錢。枯白礬二兩。枯皂礬二兩。水銀二兩。火硝二兩。

右先將鹽鉛溶化。入水銀。結成砂子。再入二礬火硝。同炒乾。研細。入鉛汞再研。以不見星爲度。入罐內泥固濟封口。打三炷香。不可太過不及。一

宿取出視之。其白如雪。約有二兩。爲火候得中之靈藥。復加明雄黃五錢。同拌。卽成黃蠶藥。

〔淺解〕本方黑鉛、白礬、皂礬、水銀、化濕去腐、食鹽、火硝、清熱解毒。雄黃辟穢扶正。凡瘰癧諸瘡已潰。餘腐不盡。新肉不生。撒之最效。

(五)二味拔毒散(金鑑方)

明雄黃三錢。白礬三錢。

右二味爲末。用茶清調化。鵝翎蘸掃患處。痒痛自止。紅腫卽消。

〔淺解〕本方雄黃、白礬、化濕辟穢。善拔毒氣。中水毒者失治。變成惡瘡。用此圍敷。使瘡頂高起。瘡根縮小。重病變爲輕病。殊有功效。

(六)琥珀膏(金鑑方)

定粉一兩。血餘八錢。輕粉四錢。銀朱七錢。花椒十四粒。黃蠶四兩。琥珀末五分。麻油十二兩。

右將血餘、花椒、麻油、煤焦。撈去渣。下黃蠶溶化盡。用夏布濾淨。傾入磁盤內。預將定粉、銀朱、輕粉、琥珀四味。各研極細末。共合一處。徐徐下入油內。用柳枝不時攪之。以冷爲度。綿燕脂攤貼。紅綿紙攤貼亦可。

〔淺解〕本方定粉、輕粉、銀朱、花椒、黃蠶、化腐化濕。血餘、琥珀、活瘀活血。麻油清熱解毒。故用此膏貼於患處。自能遮蔽一切風寒。且能化腐生肌。效用至神。

(七)腐盡生肌散(金鑑方)

兒茶三錢。乳香三錢。沒藥三錢。冰片一錢。麝香二分。血竭三錢。早三七三錢。

右研爲細末撒之。

〔淺解〕 本方乳香、沒藥、冰片、麝香、舒氣止痛。血竭、三七行瘀活血。兒茶定痛生肌。中水毒病者失治變成惡瘡。其腐肉已盡。久不收口。速以此撒。便見功效。

(八) 蟾酥丸 (外科正宗方)

蟾酥二錢。(酒化) 輕粉一錢。銅絲一錢。枯礬一錢。寒水石一錢。(煨) 麝香一錢。乳香一錢。沒藥一錢。麝香一錢。硃砂三錢。雄黃二錢。蝸牛二十一箇。

中水毒

右研爲末。稱準。於端午日午時。在淨室中。先將蝸牛研爛。同蟾酥和研調黏。方入各藥。共搗極勻。丸如菘豆大。每服三丸。用葱白五寸。令患者嚼爛。吐於手心中。男用左手。女用右手。將藥丸裹入葱泥內。用無灰熱酒一茶鍾送下。被蓋約人行五六里路。病者出汗爲度。甚者再用一服。如外用之法。搓條作餅。隨證用之。修合時忌婦人雞犬等見之。

〔淺解〕 本方用蟾酥、輕粉、拔毒消腫。銅絲、二礬、化腐消堅。乳、沒、麝香、舒氣行滯。硃砂、雄黃、辟穢辟邪。寒水蝸牛、退熱解毒。凡一切疔毒癰疽。皆可用之。此方外治能化腐消堅。內服可驅毒發汗。誠奇方也。

# 瘋犬咬傷證

## 總綱

一 何謂瘋犬咬傷。

每年驚蟄後。桃花正開。蟲蛇出洞。霜降後。梅花正開。蟲蛇入洞。甚出也。必呼氣。其入也。必吸氣。吐納之毒氣。常流於洞口。犬性喜嗅。適感觸其毒。從口鼻吸入。遂病瘋。春夏日名桃花瘋。秋冬日名梅花瘋。犬性義而善守。瘋則不識人。逢人便咬。若被咬傷。至為危重。救治得法。十中或可幸全。三四否則多不救。乃至險之症也。

二 瘋犬咬傷。有何辨別方法。

欲知是否被瘋犬咬傷。是否中毒。可以蒲扇向病人重扇。或對之急鳴。

鐘。凡見風即身縮戰慄。或聞聲即心驚。傷不安者。必中瘋犬毒無疑。同樣。驗犬是否病瘋。亦可以蒲扇風。或鑼聲試之。凡見風即戰慄。或聞聲即亂竄者。確是瘋犬無疑。

三 瘋犬咬傷後。急於求治。服藥後。病勢大瘥。如不知內毒是否已完全肅清。當以何法辨之。

服藥後。欲知內毒是否已清。可以生黃豆試之。如嚼豆時。口中作生氣。令人心惡欲嘔。是毒已盡除。不必再服藥。恐傷元氣。若嚼豆時。口中不作生氣。一如食熟豆。亦不惡心作嘔。此毒未清也。可再服藥。直服至嚼豆覺惡心欲嘔為度。此最重要。切記切記。

四 瘋犬咬傷之主要治法如何。

初被瘋犬咬傷。急就咬處。刺出血。然後以拔法拔之。或以人尿淋洗。拭乾。即用核桃殼半邊。以人糞填滿。悉在咬處之上。著艾灸之。殼焦糞乾。再灸。灸至五十壯。以玉真散唾津調敷。次日再灸五十壯。於初灸時。即服扶危散。逐惡物血片。從小水中出。若毒物血片堵塞壅塞中。致小水澀滯。若淋者。即服琥珀碧玉散以通利之。又被咬之人頂心。必有紅髮一根。速當拔去。如此救治。十中可救八九。靈驗無比。

五 瘋犬咬傷失治。有無危險。

瘋犬咬傷病須急治。救治愈早。毒氣輕淺。殊易痊可。大抵被咬傷一日內即治者。十中可全八九。二日者十

中可全六七。三日者十中可全四五。四日者十中可全二三。五日六日者十中祇救一二。若失治。毒氣發作。其人心腹絞痛。如刀割裂。神智不清。痛劇中心無賴。自抓其胸膈。嚼其舌。齧其指。咬其膚。甚至嚼衣服破瓦。口吐白沫。肢麻。作犬吠聲。不過三時卽死。慘狀難言。

【病源】

大病瘋。每年驚蟄後。桃花正開。蟲蛇出洞。霜降後。梅花正開。蟲蛇入洞。其出也。必呼氣。其入也。必吸氣。吐納之毒氣。常流於洞口。犬性喜嗅。適感觸其毒。從口鼻吸入。遂病瘋。名瘋犬。春夏日曰桃花瘋。秋冬日曰梅花瘋。犬性義而善守。瘋則不識人。不守

家。頸硬頭低。耳落尾緝。直向前行。不能返身顧後。闖入人家。不拘生熟。遇人便咬。被咬傷成病者。是謂瘋犬咬傷病。

又因大寒後。一切蛇蟲毒物口中必含泥一丸。埋伏地中。驚蟄後。地面溫和。卽自泥土中出。放此口毒泥於地上。犬誤嗅之。卽中其毒而成瘋犬。逢人便咬。經其咬傷。卽成重病。是謂瘋犬咬傷病。

【病狀】

一、將發未發前之病狀 瘋犬咬傷。急則七日發作。緩則七日至百日定當發作。於將發未發之前。必先見惡風之症。如天本無風。病者自覺風大。入帳蒙頭躲避。長聞金鑼之聲。

四肢麻木。口吐白沫。此非吉兆也。

二、已發之病狀 瘋犬咬傷已發時。心腹絞痛。如刀割裂。肢麻。口吐白沫。或作犬吠聲。神智不清。中心煩亂。自抓其胸膈。嚼其舌。齧其指。咬其膚。甚至嚼衣服破瓦。慘狀難言。

【變症】

毒攻臟腑力盡而死 瘋犬咬傷。須急治。救治愈早。毒氣輕淺。愈易痊。可。大抵被咬傷一日內卽治者。十中可全八九。二日者。十中可全六七。三日者。十中可全四五。四日者。十中可全二三。五日六日者。十中祇救一二。若失治。毒攻臟腑。神智不清。逢人便咬。遇物卽嚼。目神露白。直視無情。自抓其胸膈。鮮血淋漓。不忍卒視。口吐

白沫。肢麻。或作犬吠聲。末後必力盡神疲而死。

【療法】

一、初傷時之療法 瘋犬咬傷。當乘其毒氣未發。未見若何症時。急速治之。每得獲救。若必待已發而後治。則猶火已冒頂。焦頭爛額。收效必微。此最宜注意也。茲將初傷時之療法述之於左。

(1) 繩縛兩頭 初傷時。急就傷處。以繩縛兩頭。使毒不遊走。刺出血。再以拔法拔之。或以人尿淋洗拭乾。

(2) 灸法 洗後拔後。即用核桃殼半邊。以人糞填滿。罨在咬處之上。著艾灸之。殼焦糞乾再易。病輕

人弱者。灸至五十壯已足。若病重人強。必當灸百壯。次日再灸如數。漸灸至病愈為度。

(3) 敷法 每次灸後。以玉真散唾津調敷。

(4) 灸時內服方 於初灸時。即服扶危散。逐惡物血片。從小水中出。於初灸時。或內服大黃盤盤湯。使惡物血片或由小便中出。或由大便而下。故服藥後必須設糞桶。以驗大小便之毒。大便必有惡物如魚腸豬肝之類。小便如蒜木汁。此皆惡物攻下之驗也。次早再服再瀉。直服至瀉下黃糞而無紫黑塊。小便清長為度。此時毒氣已盡。可不必多服。恐傷正氣也。如不放

心。嚼生黃豆試之。(試法詳調養法內)

此方服後。如其人小便中堵塞。若淋。痛難忍者。此因惡物攻下過多。小便中一時不及送出所致。不必慌張。不必疑惑。速多服琥珀碧玉散。便可通暢如流。一無苦楚。他種方書。言此非良方者。因但知其堵塞小便之苦。不知我另有通小便之藥救之。瘋犬咬傷病苟在七日內。無論如何沉重。速服此方。無不得生。

(5) 拔去頂心紅髮 又被咬之人。頂心必有紅髮一根。此為毒根。速當拔去。此外又有兩方。一、瘋犬咬傷病初起。速以萬年青連根搗

汁約一碗。重者二三碗服之。以渣塗傷處。無不可救。(此方孕婦小兒俱可服) 二、瘋犬咬傷病一二月間。乘其毒未發。速以煙油方多服之。無不痊可。

二、毒氣將發時之療法 瘋犬咬傷。毒氣將發。見惡風。長鑼聲。肢麻。口吐白沫等症。速與虎牙。虎頭骨虎脛骨散服之。立效。或與萬年青汁。亦有神效。

(1) 點眼法 外宜用點眼法。法以己戌丹點眼兩角。點後閉目靜坐片時。視傷處有黃水流出。流淨即愈。其妙非常。真神方也。

(2) 豆豉搗法 外兼以豆豉研末。香油調稠。丸如彈子大。常拭搽。

所咬處。搽開看。致丸內若有狗毛茸茸然。此係毒氣已出。易丸再搽。至無茸毛方止。神效。

三、毒氣已發之療法 瘋犬咬傷。病毒氣已發。見心腹絞痛。如刀割裂。肢麻口吐白沫。或作犬吠聲。神智不清。中心煩亂。自抓其胸膈。嚼其舌。齧其指。咬其膚。甚至嚼衣服。破死。慘狀難言。此本不治。姑以虎頭骨虎牙虎脛骨散服之。或服萬年青汁。或可得救。

【調養】

一、百日內忌鹽醋 瘋犬咬傷愈後。百日內忌鹽醋。一年內忌豬肉魚腥。三年內忌食一切毒物及房事。終身忌食狗肉。蠶蛹。紅飯豆。忌見麻物。

忌飲酒。平時宜常食杏仁以防其毒。如此謹慎。方得保全。否則病必復發。十有九死。切宜注意。

二、病者必須與好人隔離 瘋犬咬傷。患者必須與好人隔離。否則病發作時。昏不識人。逢人便咬。誤被咬傷。或啣衣。必致傳染。

三、忌與有孝服之人及臨經之婦人近 瘋犬咬傷愈後。最宜謹慎。凡有孝服之人。臨經之婦。切勿使近。偶聞其氣。每不可救。慎之慎之。

四、不可使聞鑼聲及搗扇 瘋犬咬傷若已知確中瘋犬毒後。千萬不可使聞鑼聲或搗扇。否則病必大發。無可救藥。慎之慎之。

五、嚼生黃豆試探之 瘋犬咬傷

服藥後。病勢大瘥。如不知內毒是否已完全肅清。可嚼生黃豆試探之。頗靈驗。法以生黃豆嚼之。如嚼豆時口中作生氣。令心惡欲嘔。是毒已盡除。不必再服藥。恐傷元氣。若嚼豆時口中不作生氣。一如食熟豆。亦不惡心作嘔。此毒未清也。可再服。直服至嚼豆覺惡心欲嘔為度。此最重要。切記切記。

### 結論

瘋犬咬傷。其症至為危重。十有九死。自編者細考治法。親自試驗。定此數方後。驚患此者。可十有九生。總有把握。並悉先其所以不治者。乃由病者延誤失治。毒氣攻臟。或詞差不得其法。愈後復發。故編者將此病之調

養法。特別詳明。蓋欲使患者有所驚惕。免致功敗垂成也。

### 急救瀕上入隊人傷證各方法淺解類

#### (一) 硬刺出血法 (金鑑方)

用三稜扁鍼。形如錐挺者。向傷之紫黑處。勿論穴道。量黑之大。小鍼一分深。或十鍼或二十鍼俱可。務令黑血流出。外以牛肉割片貼鐵眼並黑處。次日再看。如黑處未退。仍鍼仍貼。以鍼出鮮血色不黑為度。

〔淺解〕 此泄毒法也。使黑血流盡。則毒氣自輕。不致內攻矣。

#### (二) 拔法 (金鑑方)

以砂燒酒壺兩個。成多半壺燒

酒。先以一壺上火令滾無聲。傾去酒。即按在咬處。拔出黑血。水滿則自落。再以次壺按咬處。輪流提拔。以盡為度。其證立愈。

〔淺解〕 此法藉燒酒之力。拔瘋犬咬毒氣。最著功效。

#### (三) 人尿洗方 (金鑑方)

見急救人畜蛇蟲咬傷證各方淺解類。

#### (四) 人糞核桃殼灸法 (金鑑方)

以核桃殼半邊。用人糞填滿。罨在咬處之上。著艾灸之。殼焦糞乾。再易再灸。病輕人弱者。灸至五十壯已足。若病重人強。必當灸百壯。

〔淺解〕 此法藉艾火人糞之力。



以消毒解毒。至有功效。

(五)玉真散(金鑑方)

白芷一兩。南星一兩。白附子一兩。天麻一兩。羌活一兩。防風一兩。

右共研細末。瘋犬咬傷後。宜唾津調服。數次處。

〔淺解〕 本方均泄風透邪之品。

蓋亦拔毒法之類也。

(六)大黃蟄發湯(驗方)

大黃五錢。木鼈子三個。(切片陳土炒) 蟄發七個。(去麩足加糯米同炒。去米。如七日以外。宜依日數加一個。如八日八個。九日九個。餘可類推) 桃仁五錢。雄黃三錢。麝香

瘋犬咬傷證

一分。

右以水七碗煮。取二碗。去渣。分二次服。毒輕者服後毒氣熱氣全解。下紫黑血塊無數而愈。毒重者二三服始愈。必以見下黃糞為度。咬七日內者。皆能建功。過七日外。必須多服數劑。亦無不可救。神方也。小兒患者分量減半。孕婦不可服。

〔淺解〕 本方大黃、木鼈、蟄發均係峻烈之品。直走精宮。專行血室。使瘋犬臟毒。一廓而清。佐以桃仁、雄黃、麝香活血行滯。解毒辟穢。瘋犬咬傷病其毒至烈。殺人俄頃。非此方不能挽救。方中藥味分量。慎勿輕自加減。至要至要。

(七)扶危散(金鑑方)

蟄發(按目數用之。如犬咬已

經七日。用七個。十日用十個。去麩足加糯米同炒。去米) 滑石一兩。(水飛) 雄黃一錢。麝香二分。

右共研細末。每服三錢。溫酒調下。不飲酒者。米湯調下。日一服。服完病愈。不必再服。不愈。可再合一料。

〔淺解〕 本方蟄發直走精宮。專行血室。攻瘋犬之毒積。瀉下竅之惡血。佐以雄滑。清熱而解毒。使以麝香行滯而破結。二方相較。上方性烈。此方性平。體虛邪實。不堪峻攻。此方為宜。

(八)琥珀碧玉散(金鑑方)

琥珀五錢。滑石六兩。生廿

一〇七

草一兩。青黛八分。

右共研細末。每服三錢。燈芯煎湯

調下。

〔淺解〕 本方琥珀通結逐惡物。

滑石、生甘、青黛、清熱解毒。瘋犬咬傷

病若毒物血片堵塞壅中。致小水澀

滯若淋。速服此方。

〔九〕豆豉措法（金鑑方）

豆豉四錢。

右一味研細末。香油調稠。丸如彈

子大。常措拭所咬處。稍開看豉丸內

若有狗毛茸茸然。此係毒氣已出。易

九再措。至無茸毛方止。甚效。

〔淺解〕 本方豆豉善拔瘋犬毒。

用以措拭。使毒氣盡出。則可無礙。

〔一〇〕虎牙虎頭虎脛方（金鑑

方）

虎牙三錢。虎頭骨三錢。虎

脛骨三錢。

右焙脆研為細末。每服二錢。黃酒

送下。

〔淺解〕 本方虎頭骨、虎脛骨、虎

牙、善解瘋犬毒。瘋犬咬傷病失治。犬

毒入心。煩亂腹脹。口吐白沫。速服此

方。可以解救。

〔一一〕加味人參敗毒散（驗方）

真紋黨三錢。羌活三錢。獨

活三錢。前胡三錢。白茯苓

三錢。炙甘草三錢。生薑三

錢。柴胡三錢。枳殼二錢。

〔妙〕 川芎二錢。生地榆

一兩。紫竹根一大握。

右以水十碗煮。取一碗。去渣。頓服。

如病人牙關已閉。須用槌擊去門牙。

服後神智即清。兩劑病若失。

〔淺解〕 本方以羌活、獨活、前胡、

柴胡、泄毒。地榆、紫竹根、解毒。參、甘、和

氣。川芎和血。方極平穩。瘋犬咬傷。若

係瘦弱人小兒孕婦。不宜服大黃蟄

蟄湯。當服此方。亦頗有效。

〔一二〕煙油方（本草綱目方）

見中禽獸蟲魚毒證各方淺解

類。

〔淺解〕 本方煙油最能解毒消

毒。緣犬因嗅蛇毒而瘋。故以治瘋犬

咬傷。有神效也。

〔一三〕萬年青方（全生集方）

花盆內栽種之萬年青。連根搗

融絞汁約一碗（重者可服二碗）灌之。腹中毒氣變成蟹塊。由大便而出。不論日久。皆可治。一切不忘。真仙方也。（萬年青其葉寬約一二寸。高約八九寸。老而且厚者是）

〔淺解〕 本方萬年青汁味甘苦性寒。清血解毒。最善解瘋犬毒。最妙在初被咬傷時。卽以其汁服。用渣敷咬處。雖已毒發。眼紅腹痛。服之無不響應如神也。

（一四）點眼神方（名曰戊丹）

當門子三錢七分五釐。製甘石五錢四分。淡牙硝四錢九分八釐。（卽西瓜霜） 雄精一兩五錢九分六釐。犀牛黃

一錢五分。飛月石三錢四分五釐。梅冰片三錢三分。茅菇六錢。

右分量稱準。不可增減。研極細末。密藏。毋洩氣。患者將藥點兩眼角。閉目靜坐片時。視傷處有黃水流出。流淨卽愈。其效非常。真神方也。

〔淺解〕 本方雄黃、當門、冰片、辟穢解毒。甘石、月石、牛黃、牙硝、茅菇、清熱解毒。

# 凍死證

## 總綱

一 凍死之急救法如何。

冬寒凍死之人。雖人事不知。但胸前覺有微溫。皆可施救。倘或微笑。則急掩其口。如不掩。則笑不止。心氣外散。不可救治矣。

二 急救凍死。宜近火乎。

冬寒凍死之人。切不可驟合近火。因見火必大笑而死。

三 熱水盆置臥具之四面。

急救凍死。宜以熱水盆置臥具之四面。俟稍能活動。用溫酒徐徐潤其口。

四 凍死救活後。心下時覺冷。宜以

何法善其後。

凍死救活後。心下覺冷。宜以生薑汁和陳皮煎服。自能氣機舒暢。冷氣頓除。

五 落水凍死之急救法如何。

冬寒河水冰裂。人誤失足落水。致遭凍斃。救起時。急須脫去濕衣。換他人貼身暖衣包之。然後再以其餘凍死急救法救之。自能有命。

### 【病源】

血脈凝滯 天氣嚴寒。風雪交加。衣服過單。不能禦寒。全身血脈。為之凝滯。結而不流。遂遭凍死。

### 【病狀】

渾身強僵 凍死者渾身強僵。涕涎外流。若胸尚微暖。有生望也。

### 【變症】

大笑不止 凍死者如胸尚微溫。微有呼吸。此時救治得法。倘有生望。乃不知者急以炭火溫之。以為此治凍死之最妙方法。殊不知凍死者一見炭火。必大笑不止。心氣外散。無可救藥而死。此最宜注意。

### 【療法】

以棉被裹身 冬寒凍死之人。雖人事不知。但胸前覺有微溫。皆可施救。倘或微笑。則急掩其口。如不掩。則笑而不止。心氣外散。不可救治矣。且不可近火。因見火必大笑而死。救法以棉被或毛氈裹身。再以生半夏末吹入鼻內。再用灰炒熱布包熨心腹上。冷則更換。更以熱水盆置臥具之

四面。俟稍能活動。用溫酒徐徐潤其口。再用生薑汁和陳皮煎服。自可救活也。

### 【調養】

一、宜服桂枝湯。凍死救活後。營氣未和。時時惡寒。調養之法。宜服桂枝湯以和營氣。而散寒邪。

二、忌食冷物。凍死救活後。忌食冷物。恐觸動冷氣。病復劇也。

三、衣服宜厚。凍死救活後。至要之法。即衣服宜加厚。否則寒邪侵襲。無時或已。必遭覆轍也。

### 結論

凍死者多係貧窮之輩。天氣嚴寒。衣服過單。不足禦寒。致遭凍斃。故救此輩者。一方救其命。一方必須施與

衣服。不然仍恐凍斃也。

### 凍死證各方淺解類

(一) 生半夏末方 (驗方)

生半夏四錢。

右一味研為細末。吹入鼻內。

(淺解) 本方生半夏善行痰通

竅。凍死用此吹入鼻內。亦此意也。

(二) 生薑陳皮湯 (洗冤錄方)

生薑四錢。(連皮搗碎) 陳

皮三錢。

右二味以水六碗煮。取一碗半。去

渣。分二次溫服。或以溫酒煮亦可。服

時宜頻頻掺入。不可過急。致胃中不

能承受。

(淺解) 本方生薑散寒行痰。陳

皮化痰利氣。凍死者其人昏然不醒。

由寒痰膠結中焦也。速服此方。自能挽救。

(三) 桂枝湯 (傷寒方)

桂枝三錢。(去皮) 芍藥三

錢。甘草二錢。(炙) 生薑

三錢。大棗十二枚。(劈)

右五味咬咀。以水七碗微火煮。取

三碗。去渣。適寒溫服一碗。須臾。歎熱

稀粥一碗。餘。以助藥力。溫覆令一時

許。通身發熱。微似有汗者。益佳。不可

令如水淋漓。病必不除。若一服汗出

病瘥。停後服。不必盡劑。若不汗。更服。

依前法。又不汗。後服。當小促役其間。

半日許。令三服盡。若病重者。一日一

夜服。周時觀之。服一劑盡。病證猶在

者。更作服。若汗不出者。乃服至二三

劑。禁生冷黏滑。肉麵五辛。酒酪臭惡等物。

〔淺解〕 本方桂枝、生薑、散寒行痰。甘草、芍藥、大棗、和正達邪。凍死救活後。營氣未和。時時惡寒。宜服此方調養。自能漸漸痊可也。

# 誤吞鎰水玻璃洋油

## 耳垢證

### 總綱

一 何謂誤吞鎰水玻璃洋油耳垢。鎰水、洋油、耳垢。俱係有毒之品。若誤吞之。必中其毒。有生命危險。玻璃入腹。傷及臟腑。亦殊危險。

二 誤吞鎰水、玻璃、洋油、耳垢證共分幾類。

- 一、吞鎰水類。
  - 二、吞玻璃類。
  - 三、吞洋油類。
  - 四、吞耳垢類。
- 共分

三 誤吞鎰水、玻璃、洋油、耳垢證之主要治法如何。

誤吞鎰水玻璃洋油耳垢證

- 一、誤吞鎰水 肥皂水方。
- 二、誤吞玻璃 赤豆煎粥方。
- 三、誤吞洋油 海帶湯。
- 四、誤吞耳垢 川連人中黃湯。
- 四 誤吞鎰水、玻璃、洋油、耳垢證之調養法如何。
- 一、誤吞鎰水 忌食雞、鴨、牛、羊肉。
- 二、誤吞洋油 等發物。
- 三、誤吞玻璃 忌食一切不易消化之品。
- 四、誤吞耳垢 忌食辛辣、香燥、煎炒、炙、爆、等物。犯之。必致聲啞。
- 五 誤吞鎰水、玻璃、洋油、耳垢失治。有何變症。
- 一、誤吞鎰水失治 糜爛臟腑而死。

二、誤吞玻璃失治 傷破臟腑而死。

三、誤吞洋油失治 其人胸中泛噁。心中煩熱。猶如火燒。面色紫赤。反覆顛倒。至為困苦。

四、誤吞耳垢失治 腹脹如鼓。終身瘖啞。

### 誤吞鎰水類

#### 【病源】

鎰水有毒。鎰水有毒。人誤吞之。令人咽喉糜爛。小舌脫去。危在頃刻。小孩以小輕氣球嬉戲。失慎破碎。後以之含於口中。吐出吐進。不知此種球內有鎰水。每令中毒。而成危候。天下為父母者。切宜注意及之。

#### 【病狀】

**咽喉糜爛** 誤吞鏹水後。其人咽喉糜爛。小舌脫去。疼痛猶如刀割。此毒最烈。能頃刻間致人死命。切宜速救。萬萬不可延擱。失治則毒氣瀰漫。必糜爛臟腑而死。

**【療法】**

**咽喉糜爛之療法** 誤吞鏹水後。其人咽喉糜爛。小舌脫去。疼痛猶如刀割。此毒最烈。能頃刻間致人死命。宜急以肥皂水或蘇打水（西藥房內有）服下。均可解救。如無此二物。即用刀將牆上石灰刮下一二酒杯。沖水一碗服下。亦能起死回生。蓋鏹水屬酸性。肥皂蘇打水均是鹼性。酸性之毒。一遇鹼性之藥。即中和而毒解也。

**【調養】**

一、宜敷珍珠兒茶散 誤吞鏹水者愈後。其人咽喉腐爛未痊。飲食時痛不可忍。調養之法。宜敷珍珠兒茶散。自能漸漸痊可。

**二、忌食發物**

誤吞鏹水者。忌食辛辣香燥。煎炒炙燥。雞鴨牛羊肉。蝦蟹海腥等物。凡茶湯宜溫飲。切不可過熱。恐傷咽喉也。

**三、口渴舌紅之調養法**

誤吞鏹水者愈後。其人口渴。唇燥舌紅。此陰液受傷也。調養之法。宜常服麥冬阿膠飲。自能漸漸痊可。

**誤吞玻璃類**

**【病源】**

誤吞玻璃 玻璃以碳酸鉀石灰

白砂等製成。質堅難鎔。若誤吞入腹。則截傷腸胃。令人痛如刀割。是謂誤吞玻璃病。

**【病狀】**

痛如刀割 誤吞玻璃。初則咽喉梗痛。漸及胸中。最後至腹。痛如刀割。片刻不可忍。宜速治。失治則漸漸截傷腸胃臟腑。難救治矣。

**【療法】**

痛如刀割之療法 誤吞玻璃後。初則咽喉梗痛。漸及胸中。最後至腹。痛如刀割。片刻不可忍。宜以赤豆煎粥盡量食之。玻璃即隨赤豆而出。真奇方也。

**【調養】**

一、忌食一切不易消化之物 誤



吞玻璃者。忌食一切不易消化之品。如芋、芳、栗子、海參、魚翅、及一切生冷硬物等。

二、宜和傷處 誤吞玻璃者愈後。其人心腹間時有隱痛者。此傷處未和也。法宜和其傷處。當服白芨三七和傷湯。

三、宜食薄粥 誤吞玻璃者愈後。宜食薄粥。以和胃氣。不可驟食硬飯。恐傷及創處。變生他症也。

### 誤吞洋油類

#### 【病源】

誤吞洋油 洋油一名火油。性大熱。有劇毒。不可吞也。若誤吞之。令人心中煩熱。猶如火燒。是謂誤吞洋油病。

誤吞蠟水玻璃洋油耳垢類

#### 【病狀】

心中煩熱 誤吞洋油者。其人面色紫赤。胸中泛噁。心中煩熱。猶如火燒。反覆顛倒。至爲困苦。宜速治。否則必毒攻臟腑。變爲危候。

#### 【療法】

心中煩熱之療法 誤吞洋油者。其人面色紫赤。胸中泛噁。心中煩熱。猶如火燒。反覆顛倒。至爲困苦。速以海帶（南貨店內有）煎汁盡量飲之。便可痊愈。若已毒攻臟腑。亦可速以大劑海帶汁灌之。或可有救。

#### 【調養】

一、忌食發物 誤吞洋油。忌食辛辣香燥。煎炒炙爆。雞鵝牛羊肉。蝦蟹海腥等物。

二、宜以銀花泡飲 誤吞洋油者愈後。其人心猶有餘熱者。此毒未清也。調養之法。宜以銀花泡飲代茶。自能完全痊愈。

三、夜眠不安之調養法 誤吞洋油者解後。其人夜眠不安者。此心火上炎。毒未全清也。調養之法。宜以蓮子心湯服之。即可安眠達旦。

### 誤吞耳垢類

#### 【病源】

誤吞耳垢 耳垢耳內之皮垢也。味鹹苦。性溫。有毒。若其人誤吞之。或伶人互相嫉妒。暗以耳垢置於茶湯內。吞之。必致陡然腹脹聲啞。失其嗓音。是謂誤吞耳垢病。

#### 【病狀】

陡然腹脹音啞 誤吞耳垢者。其人陡然腹脹。輕者越數日。然後腹微痛而膨脹。同時聲音變為瘖啞。宜速治。否則其毒不解。雖無生命危險。然聲啞終身。亦大苦事也。

【療法】

陡然腹脹音啞之療法 誤吞耳垢者。其人陡然腹脹。輕者越數日。然後腹微痛而膨脹。同時聲音變為瘖啞。宜速服黃連人中黃湯。便可痊愈。愈後聲音如昔。可免聲啞之患。

【調養】

一、忌食辛熱 誤吞耳垢者。忌食辛熱香燥之物。否則必致聲啞。其他雞鴨羊肉。蝦蟹海腥等物。亦須禁忌。二、宜以蘆根花粉泡飲代茶 誤

吞耳垢者愈後。其人心中心中覺熱。口中乾燥者。此餘毒未清也。調養之法。當以蘆根花粉泡飲代茶。

三、聲啞之調養法 誤吞耳垢者。若救治稍遲。聲音已變瘖啞。調養之法。宜以蟬衣湯常飲。即能恢復原狀。

結 論

誤吞蠟水、玻璃、洋油、耳垢證各病。惟吞耳垢病無生命危險。餘均能致人死命。而其中尤以誤吞蠟水為最險。救治略遲。即臟腑糜爛。無藥可救。

吞耳垢。多由伶人互相嫉妒。暗箭傷人。使對方因此受重大打擊。其手段最辣。其心至狠。實非人類也。緝者感然心傷。故將此病之療法。特別精細研究。有非常之功效。彼等心雖狠。

手段雖辣。無所施其技矣。

誤吞蠟水、玻璃、洋油、耳垢證各方淺解類

【誤吞蠟水類各方】

(一) 肥皂水方(驗方)

洋肥皂三錢。

右一味。以開水一碗。化開頓服。

〔淺解〕 本方肥皂係鹼性之藥。

凡酸性之毒。一遇鹼性之藥。即中和而失其毒性。是故以肥皂治蠟水毒。有神效也。

(二) 蘇打水方(驗方)

蘇打三錢。(西藥房內有)

右一味。以開水沖服一碗。頓服。

〔淺解〕 同前方淺解。

(三) 牆上石灰方(單方大全方)

牆上石灰刮下一二酒杯。

右一味。以開水沖成一碗。頓服。

〔淺解〕 本方與上二方意義略同。可以參閱。

〔四〕珍珠兒茶散（瘍醫大全方）

珍珠五分。兒茶八分。熊膽

五分。（如無以鯉魚膽代之）

銅青五分。牛黃二分。

右研細末。儲好瓶中。先以泔水洗

淨咽中腐爛處。然後吹藥。即能去腐

生肌。神效。

〔淺解〕 本方能臍。牛黃。銅青。清

熱去腐。珍珠。兒茶。生肌。長肉。吞鍛水

者愈後。其人咽喉腐爛未瘥。飲食時

痛不可忍。速以此方吹之。即能收功。

〔五〕麥冬阿膠飲（證治準繩方）

麥冬五錢。炒阿膠五錢。

天花粉五錢。西洋參五錢。

金石斛五錢。玉竹五錢。竹

茹三錢。生穀芽五錢。

右以水九碗煮。取二碗。去渣。分二

次溫服。

〔淺解〕 本方麥冬。阿膠。花粉。洋

參。石斛。玉竹。生津潤燥。和陰止渴。微

用竹茹。以通絡行滯。略用穀芽。以和

胃生津。

【誤吞玻璃類各方】

（一）赤豆煮粥方（驗方）

赤豆二升。

右一味。以水煮成粥樣。盡量食之。

玻璃即隨赤豆而出。

〔淺解〕 此奇方也。大凡一病。必

有一藥救之。此生尅之道。不可思議

者也。在國醫之玄秘處。大率如此。

（二）白芨三七和傷湯（風氏方）

白芨三錢。三七錢半。（研末

另吞） 蓮竹茹六錢。

右除三七另吞外。餘藥以水七碗

煮。取二碗。去渣。分二次服之。

〔淺解〕 本方白芨色白味甘苦

兼辛。氣平微寒。性滑有汗極黏膩。能

止血生肌。和傷補虛。參三七味甘性

溫。善和創傷。如漆之黏物。二物相得。

和傷補虛。有立竿見影之效。故以爲

君。略佐竹茹者。恐白芨黏性太過。弊

端叢生。故用此以爲監軍。則方力平

均。藥性醇厚。效驗立見。毫無弊端矣。

【誤吞洋油類各方】

(一)海帶方(本草綱目方)

海帶七錢。(南貨店內有)

右以水八碗煮。取三碗。分二次服

完。便可痊愈。

〔淺解〕 本方海帶味鹹性寒。善

下水祛風。解洋油毒。

(二)大刺海帶方(本草綱目方)

即於右原方內分量加重一倍。

煎服各法。概依原方。

(三)銀花泡飲方(冰玉堂驗方)

見中禽獸蟲魚毒證各方淺解

類。

(四)蓮子苳湯(冰玉堂驗方)

蓮子苳三錢。川連錢半。

右二味。以水七碗煮。取二碗。去渣。

分二次溫服。

〔淺解〕 本方川連、蓮子苳、降火

解毒。安神定心。可安眠達旦也。

【誤吞耳垢類各方】

(一)黃連人中黃湯(驗方)

川黃連三錢。人中黃一錢。

右二味。以水五碗煮。取碗半。去渣。

分二次溫服。

〔淺解〕 本方黃連、人中黃、味苦

性寒。清熱解毒。尤善解耳垢毒。

(二)蘆根花粉泡飲方(冰玉堂

驗方)

鮮蘆根三尺。天花粉四錢。

右二味。以百沸水。泡飲代茶。

〔淺解〕 本方花粉味甘性寒。能

生津止渴。蘆根味甘性寒。能清熱通

氣。誤吞耳垢者愈後。其人心覺熱。

口中乾燥者。此餘毒未清。津液枯少

也。調養之法。當服此方。

(三)蟬衣湯(千金方)

蟬衣三錢。

右一味。以水三碗煮。取一碗。去渣。

頓服。

〔淺解〕 本方蟬衣味鹹性寒。可

泄餘熱。而愈聲啞。

# 諸物卡喉證

## 總綱

一 何謂諸物卡喉。

各種鐵鉤、碗片、豆粒、骨等物。卡於喉間。不進不出。痛如刀割。飲食不下。是謂諸物卡喉病。

二 諸物卡喉證共分幾類。

一、諸獸骨卡喉類。

二、田螺卡喉類。

三、稻穀卡喉類。

四、竹葉卡喉類。

五、竹木卡喉類。

六、桃杏卡喉類。

七、諸豆卡喉類。

八、鐵鉤卡喉類。

共分五類

諸物卡喉證

九、鐵鉤卡喉類。

一〇、頭髮卡喉類。

一一、蜈蚣卡喉類。

一二、碗片卡喉類。

一三、雞鵝鴨骨卡喉類。

一四、魚骨卡喉類。

一五、錫鉛卡喉類。

三 諸物卡喉證之主要治法如何。

一、諸獸骨卡喉 鴨涎方。

二、田螺卡喉 鴨涎方。

三、稻穀卡喉 鴨涎方。

四、竹葉卡喉 牛涎方。

五、竹木卡喉 魚膽飲。

六、桃杏卡喉 魚膽飲。

七、諸豆卡喉 土狗蟲方。

八、鐵鉤卡喉 蝦蟆血方。

九、鐵鉤卡喉 佛珠法。

一〇、頭髮卡喉 舊木梳方。

一一、蜈蚣卡喉 生豬血方。

一二、碗片卡喉 羊脛骨散。

一三、雞鵝鴨骨卡喉 山查湯。

一四、魚骨卡喉 鴨涎方。

一五、錫鉛卡喉 羊脛骨散。

四 諸物卡喉證之調養法如何。

諸物卡喉愈後。其人飲食宜緩。一切滾湯茶水。俱不可飲。否則必傷咽喉。

五 諸物卡喉失治。有無危險。

諸物卡喉失治。其物不去。飲食不進。必致餓傷胃氣。變為逆證。

諸獸骨卡喉類

【病源】

食物驟急。其人食獸肉時。過於驟急。致骨卡咽喉。不進不出。涕淚交流。疼痛難忍。至為痛苦。是謂諸獸骨卡喉病。

【病狀】

疼痛難忍。諸獸骨卡喉。其人咽中疼痛。梗硬。不進不出。涕淚交流。至為苦楚。宜速治。否則其人飲食不能進。腹中飢甚。久之。餓倒胃氣。形消瘦。立死不治。

【療法】

疼痛難忍之療法。諸獸骨卡喉。其人咽中疼痛。梗硬。不進不出。涕淚交流。至為苦楚。速以狗一隻。倒掛。取涎。緩緩嚥下。其骨即化。屢試如神。以狗善食諸骨。故有此功效也。如已餓

倒胃氣。速以狗涎方灌之。待骨已化。痛已止。再以薄粥緩緩呷之。切不可驟與飯食。以久餓已傷之胃。驟與飯。胃中不能消化。必反致受傷。而生重大變端也。此最宜注意。若薄粥已受。胃氣稍和。而形羸未痊者。再與四君子膏服之。自能漸漸復元。

【調養】

一、飲食宜緩。諸獸骨卡喉愈後。飲食宜緩。以咽喉新經創傷。飲食驟急。必痛如割也。  
二、不可飲過熱過冷湯水。諸獸骨卡喉。不可飲過熱過冷湯水。以過熱過冷。均富有刺激性。經過傷處。痛不可忍也。

三、宜服四君子膏。諸獸骨卡喉

愈後。其人胃氣虛弱。精神疲憊。調養之法。宜大補中氣。常常服四君子膏。自可漸漸復元。

田螺卡喉類

【病源】

食田螺過急。其人食田螺過急。偶一不慎。卡於喉中。不進不出。不上不下。是謂田螺卡喉病。

【病狀】

疼痛難忍。田螺卡喉。其人咽中梗痛難忍。不進不出。不上不下。涕淚交流。至為苦楚。宜速治。否則飲食不能進。腹中飢甚。久之。餓倒胃氣。形消瘦。立死。殊為難治。

【療法】

梗痛難忍之療法。田螺卡喉。其

人咽中梗痛難忍。不進不出。不上不下。涕淚交流。至爲苦楚。速以鴨一隻。以水灌口。少頃。將鴨倒吊。取涎。與服。卽化。若已餓。倒胃氣。速以鴨涎方灌之。待螺已化。痛已止。再以薄粥緩緩呷之。若薄粥已受。胃氣稍和。而形羸未瘥者。再與四君子膏服之。自能漸漸復元。

【調養】

一、忌食硬物 田螺卡喉。忌食一切硬物。及不易消化之物。如魚翅、海參、山芋、芋艿、栗子、等品。

二、不可飲過燙茶水 田螺卡喉愈後。飲食最宜謹慎。切不可飲過燙茶水。以其富有刺激性。咽喉新經創傷。受其刺激。必致痛如刀割。飲食不

植物卡喉

下。變爲危候也。此最宜注意。

三、當和胃氣 田螺卡喉愈後。其人胃氣虛弱。精神疲憊。調養之法。當和胃氣。宜常服四君子膏。

稻穀卡喉類

【病源】

稻芒刺於咽門 稻芒滯於咽門。不能傳化。又爲風熱壅聚。與血氣相搏。遂令刺肺。令咳嗽不已。不急治。能殺人。是謂稻穀卡喉病。

【病狀】

咳嗽不已 稻穀卡喉。咽中梗痛。令人咳嗽不已。宜速治。否則其人咳逆益劇。無暫息之時。目直視。氣喘如牛。額上冷汗。此肺將絕也。危在目前。

【療法】

咳嗽不已之療法 稻穀卡喉。咽中梗痛。令人咳嗽不已。急以鴨涎灌之。卽化。或鴨涎亦可。

稻穀卡喉。宜速治。遲則殺人。茲復有二方。俱頗靈驗。併錄於此。以供參考。

又方。紫花地丁細嚼吞之。或糯米糖化亦下。

若症已臨危境。宜速以鴨涎方灌之。待咳止喘稍已。卽接服人參救肺湯。自能汗止喘定。完全痊可。

【調養】

一、宜服人參杏仁湯 稻穀卡喉愈後。其人因病中咳劇。致傷肺氣。無端自汗。氣往上升。不能自主。調養之法。當補肺潤肺。宜服人參杏仁湯。

二、忌食發物。稻穀卡喉。忌食發物。如雞鵝牛羊等肉。蝦蟹海腥。蚌蛤河豚等物。

三、不可大聲呼喊。稻穀卡喉愈後。其人宜靜自調養。不可大聲呼喊。恐傷肺氣。以致失血。萬事以忍耐為主。不可動怒。並戒房慾百日。

### 竹葉卡喉類

#### 【病源】

誤吞竹葉。小孩以竹葉嬉戲。含於口中。偶一不慎。囫圇咽於喉間。不上不下。不進不出。最易閉塞喉管。令人呼吸急迫。是謂竹葉卡喉病。

#### 【病狀】

呼吸急迫。竹葉卡喉。其葉卡於喉中。不上不下。不進不出。令人呼吸

急迫。面色灰白。鼻煽。此最宜速治。否則必致喉管閉塞而死。

#### 【療法】

呼吸急迫之療法。竹葉卡喉。其葉卡於喉中。不上不下。不進不出。令人呼吸急迫。面色灰白。鼻煽。此最宜速治。否則必致喉管閉塞而死。速以牛涎一盅。滾水半盅沖服。便可無憂。

#### 【調養】

一、忌食生冷硬物。竹葉卡喉。忌食蝦蟹海腥。蚌蛤河豚。雞鵝牛羊肉等發物。並忌食一切生冷硬物。不易消化壅滯之物。

#### 二、救治宜早

竹葉卡喉。救治宜早。牛涎必須速備。遲則必致喉管閉塞。如一時不得牛涎。以魚膽飲服之。

取吐。亦可獲救。然終不及牛涎之平穩神效。

### 竹木卡喉類

#### 【病源】

竹木刺卡於喉中。其人偶一不慎。將竹刺或木刺卡於喉中。咽中梗痛。飲食不下。至為困苦。是為竹木卡喉病。

#### 【病狀】

咽中梗痛。竹木卡喉。其人咽中梗痛。百般不適。飲食不能下。勉強嚥下。則痛如針刺。不可忍。宜速治。失治則其刺不去。梗疹益劇。數日粥飯不進。精神疲憊。胃氣受傷。目眶深陷。形體消瘦。殊為難治。

#### 【療法】



下勉強嚥下則痛如針刺不可忍速以魚膽飲吐之或以芝麻不拘黑白炒熟泡湯飲之再以乾芝麻嚼食幾口自愈。

又有分開療法述之於下。

(1)竹卡喉以燈草炙成炭開水送下外以燈草灰摻薄荷膏藥上貼喉痛處一夜即消。

(2)竹卡喉或以舊籬笆竹燒灰沖水服亦有神效。

(3)木卡喉以鐵鋸置炭火內燒紅淬黃酒中(或甜酒亦可)取酒服之便解。

(4)木卡喉或以鐵斧磨水服之。

粥飯不進精神疲倦胃氣受傷目脷深陷形體消瘦速以芝麻泡湯飲之待竹木已下痛已止再以薄粥緩緩呷之切不可驟與飯食以久餓已傷之胃驟與飯胃中不能消化必反致受傷而生重大變端也此最宜注意者薄粥已受胃氣稍和而形羸未瘥者再與四君子膏服之自能漸漸復元。

【調養】

一、飲食宜緩 竹木卡喉愈後飲食宜緩以咽喉新經創傷飲食驟急必痛如割也。

二、不可飲過熱過冷湯水 竹木

可忍也

三、宜和胃氣 竹木卡喉愈後其人胃氣虛弱精神疲倦調養之法宜大補中氣當常服四君子膏。

桃杏卡喉類

【病源】

食桃杏過急 其人食桃杏過急偶一不慎卡於喉中不進不出不上不下咽喉梗痛粥飯不下是謂桃杏卡喉病。

【病狀】

粥飯不下 桃杏卡喉其人咽喉梗痛粥飯不下腹中飢甚欲食不得食至為困苦宜速治失治則其物不

去梗痛益劇。數日粥飯不進。精神疲憊。胃氣受傷。目眶深陷。形體消瘦。至為難治。

【療法】

粥飯不下之療法 桃杏卡喉。其人咽喉梗痛。粥飯不下。腹中飢甚。欲食不得食。至為困苦。速以魚膽飲吐之。便可痊癒。或以芝麻湯飲之。亦有神效。

若失於救治。其物不去。梗痛益劇。數日粥飯不進。精神疲憊。胃氣受傷。目眶深陷。形體消瘦。速以芝麻湯飲之。待桃杏已下。痛已止。再以薄粥緩緩呷之。若薄粥已受。胃氣稍和。而形羸未瘥者。再與四君子膏服之。自能漸漸復元。

【調養】

一、不可驟食硬物 桃杏卡喉愈後。飲食宜緩。以咽喉新經創傷。飲食驟急。必痛如割也。亦不可驟食硬飯。宜食薄粥。以養胃氣。而和傷處。

二、不可飲過熱過冷湯水 桃杏卡喉。不可飲過熱過冷湯水。以過熱過冷。均富有刺激性。經過傷處。痛不可忍也。

三、預防法 預防桃杏卡喉。凡食桃杏時。宜緩緩嚥之。不可匆急。則病自免。其他食物。亦當如此謹慎。則俱不卡喉也。此法最佳。雖屬平淡。必須注意。

諸豆卡喉類

【病源】

誤吞豆子 小孩以豆玩弄。含於口中。偶一不慎。卡於喉間。不進不出。不上不下。梗痛難忍。是謂諸豆卡喉病。

【病狀】

梗痛難忍 諸豆卡喉。咽中梗痛難忍。飲食不下。嘔哭不已。喉外腫脹。宜速治。失治則其物不去。梗痛益劇。喉外脹腫益盛。數日粥飯不進。精神疲憊。胃氣受傷。目眶深陷。形體消瘦。至為難治。

【療法】

梗痛難忍之療法 諸豆卡喉。咽中梗痛難忍。飲食不下。嘔哭不已。喉外腫脹。速以土狗蟲四五枚。(即蝮蝱)搗爛。敷喉外腫處。其豆即下。神

效。或以魚膽飲取吐亦效。或服芝蔴湯。兼以乾芝蔴嚼食。俱有神效。

若失於救治。其物不去。梗痛益劇。喉外腫脹益盛。數日粥飯不進。精神疲憊。胃氣受傷。目眶深陷。形體消瘦。速以活蟻蝓四五隻。搗爛塗喉腫處。其豆卽下。然後以薄粥緩緩呷之。切不可驟與飯食。以久餓已傷之胃。驟與飯。胃中不能消化。必反致受傷。而生重大變端也。此最宜注意。若薄粥已受。胃氣稍和。而形最未痊者。再與四君子膏服之。自能漸漸復元。

### 【調養】

一、飲食宜緩。諸豆卡喉愈後。飲食宜緩。以咽喉新經創傷。飲食驟急。必痛如割也。

二、不可飲過熱過冷湯水。諸豆卡喉不可飲過熱過冷湯水。以過熱過冷。均富有刺激性。經過傷處。痛不可忍也。

三、預防法。預防諸豆卡喉。凡爲父母者。必須留意小孩之玩物。一切豆粒、銅錢、鐵錢、鐵鈞。俱不可使彼玩弄。以偶一不慎。卡於喉間。有生命危險也。

### 鐵錢卡喉類

### 【病源】

小孩以鐵錢嬉戲。小孩以鐵錢嬉戲。含於口中。偶一不慎。卡於喉間。咽喉脹腫。刺痛如割。有生命危險也。是謂鐵錢卡喉病。

### 【病狀】

咽喉脹腫。鐵錢卡喉。咽喉脹腫。刺痛如割。飲食不下。腹中飢甚。時時啼哭。殊爲危急。宜速治。失治則其錢不去。疼痛益劇。不可片刻忍。胃氣餒倒。聲嘶。形體消瘦。目眶深陷。啼哭無淚。危在頃刻。

### 【療法】

咽喉脹腫之療法。鐵錢卡喉。咽喉脹腫。刺痛如割。飲食不下。腹中飢甚。時時啼哭。殊爲危急。速以癩蝦蟆數個將頭剝去。倒垂流血。以盪接之。得一杯許。灌入喉中。移時連錢吐出。鐵自彎曲。一方用舊筴籬笆竹煨存性研末。每服三錢。黃酒調服。亦能化錢。或用鉛糖一觔。食盡便出。俱有神效。若已臨危境。速以癩蝦蟆血灌之。

或服飴糖待鹹化去。以薄粥緩緩呷之。切不可驟與飯食。若薄粥已受。胃氣稍和。而形羸未瘥者。再與四君子膏服之。自能漸漸復元。

【調養】

一、不可飲過熱過冷湯水。鐵鉤卡喉。不可飲過熱過冷湯水。以過熱過冷。均富有刺激性。經過傷處。痛不可忍也。

二、忌食栗子山芋 鐵鉤卡喉愈後。飲食至宜謹慎。一切生冷、水果、硬物、栗子、山芋、芋芳、魚翅、魷魚等物。俱不可食。否則必傷胃氣。變為胃病。遺憾終身。

三、形羸未瘥之調養法 鐵鉤卡喉愈後。各恙皆除。惟形羸未瘥。精神

疲憊依然。此胃氣受傷。未曾復元也。調養之法。可常服四君子膏。不能間斷。久久自可全愈。

鐵鉤卡喉類

【病源】

誤吞鈎鈎 小兒作釣魚之戲。以鈎含於口中。不知不覺。卡於喉間。若牽鈎線一扯。則傷及喉管。片時頸如斗大。飲食不下。痛如刀割。是謂鐵鉤卡喉病。

【病狀】

頸如斗大 鐵鉤卡喉。喉管受傷。片時頸如斗大。飲食不下。痛如刀割。宜速治。失治則其鈎不去。咽喉脹腫。益劇。粥飯不下。腹中飢甚。欲食不得。食五六日後。胃氣餓倒。精神疲憊。形

體消削。目眶深陷。啼哭無淚。危在頃刻。

【療法】

頸如斗大之療法 鐵鉤卡喉。喉管受傷。片時頸如斗大。飲食不下。痛如刀割。速以佛珠一枚。或以大香珠亦可。穿入鈎線。漸漸將珠挨進。直至喉管。輕輕將珠向內一推。其鈎已脫出在珠上。緊緊執着珠繩。抽出即安。

〔附註〕

此法極佳。抽出時。鈎藏珠內。皮肉可不致受傷。若是但有鈎卡喉而無線者。則右佛珠導法。不能施用。速以癩蝦蟆血方灌之。或食飴糖一觔。俱有神效。若失治。症已臨危境。如有鈎線者。

速以佛珠導法導出如無鈎線急以  
蝦蟆血或餡糖方服之使鈎化去然  
後再以薄粥緩緩呷之切不可驟與  
飯食若薄粥已受胃氣稍和而形羸  
未瘥者再與四君子膏服之自能漸  
漸復元。

【調養】

一、不可飲過熱過冷湯水 鐵鈎  
卡喉不可飲過熱過冷湯水。

二、忌食生冷 鐵鈎卡喉愈後飲  
食至宜謹慎一切生冷水果硬物如  
栗子山芋芋芳魚翅鮫魚等物俱不  
可食否則必傷胃氣變為胃病遺憾  
終身。

三、胃氣受傷之調養法 鐵鈎卡  
喉愈後各恙皆除惟形羸未瘥精神

疲憊此胃氣受傷未曾復元也調養  
之法可常服四君子膏不能間斷久  
久自可全愈。

頭髮卡喉類

【病源】

誤吞頭髮 其人誤吞頭髮繞喉  
不出咽中時痒自覺百般不舒適是  
謂頭髮卡喉病。

【病狀】

咽中時痒 頭髮卡喉其人咽中  
時痒自覺百般不舒適飲食言語俱  
感不便。

【變症】

變為髮瘕 頭髮卡喉失治其髮  
直入腹中與痰凝結變為髮瘕心腹  
作痛咽間如有蟲行欲得油飲。

【療法】

一、咽中時痒之療法 頭髮卡喉  
其人咽中時痒自覺百般不舒適飲  
食言語俱感不便速以自亂髮燒灰  
開水調服一錢惟髮灰燒時須令燒  
盡如有生髮未經燒盡而誤服之則  
非特不愈且加劇也。

又方以舊木梳燒枯為末酒沖服  
二錢亦有神效。

二、變為髮瘕之療法 頭髮卡喉  
失治其髮直入腹中與痰凝結變為  
髮瘕心腹作痛咽間如有蟲行欲得  
油飲速以香澤油塗於口鼻等處待  
瘕來食即拔出之便可痊愈或以白  
馬尿飲一二碗即化。  
頭髮卡喉失治變為髮瘕宜速治。

若復失治。則其瘰益大。食血益多。必致面黃肌瘦。血枯而死。茲復有二方。俱頗靈驗。併錄於此。以供參考。

又方。以雄黃五錢。清油半碗調服。其瘰卽化。

又方。以膽礬一分五釐爲末。溫酒送下。卽化。

【調養】

一、忌食油類 頭髮卡喉。其人喜食油類。而此病。切忌食油。若誤食之。則油膠髮上。牢固不化。必成髮瘰。切須注意。

二、不可哈吐 頭髮卡喉。其人因咽喉不舒。時思哈吐出之。不知多哈有傷肺絡。髮既未出。反致吐血。不可不慎也。

三、預防法 預防頭髮卡喉。凡各食物俱宜留意。不可過急食之。以內或有髮。誤吞必釀大病。

婦女理髮後。必須收拾潔淨。不可使亂髮遺留。燒飯菜時。不可理髮。恐髮落其內也。

蜈蚣卡下喉類

【病源】

蜈蚣爬入口中 其人臥熟後。口張開。蜈蚣爬入口中。其人醒覺。不知何物。誤嚥下。卽卡於喉間。蜈蚣入咽後。活而不死。亂咬其喉。痛不可忍。外則腫脹如斗。飲食不下。有生命危險。是謂蜈蚣卡喉病。

【病狀】

腫脹如斗 蜈蚣卡喉。蜈蚣入咽

後。活而不死。亂咬其喉。痛不可忍。外則腫脹如斗。飲食不下。宜速治。失治則毒氣壅盛。令人頭項腫脹。眼目昏花。心神昏憤。口吐白沫。此毒攻臟腑。至爲危重。

【療法】

腫脹如斗之療法 蜈蚣卡喉。蜈蚣入咽後。活而不死。亂咬其喉。痛不可忍。外則腫脹如斗。飲食不下。急取生豬血飲之。少頃。以清油灌口中。蜈蚣浸在血中。卽吐出。後以雄黃末水調服。以解其毒。

若已臨危境。速以豬血方灌之。再以清油灌之。蜈蚣卽出。復服雄黃散。便可無憂。

【調養】

一、忌食發物 蜈蚣卡喉愈後。忌食一切發物。如蝦蟹海腥。牛鵝羊肉等物。

二、餘毒未清之調養法 蜈蚣卡喉愈後。其人喉外猶有餘腫。按之微痛。此毒未清也。調養之法。宜以明雄黃酒調敷患處。便可腫消。

三、預防法 預防蜈蚣卡喉。室內必須灑掃潔淨。潮濕之處。不可居住。牀必當有蚊帳。如此謹慎。則蜈蚣不來。此病不生。

### 碗片卡喉類

#### 【病源】

誤吞碗片 小孩以碗片嬉戲。含於口中。偶一不慎。卡於喉間。疼痛如刀割。是謂碗片卡喉病。

#### 【病狀】

喉痛如刀割。碗片卡喉。喉間疼痛。如刀割。飯食不下。腹中飢甚。宜速治。失治則其人喉間疼痛益劇。腹中飢甚。粥飯不下。欲食不得食。必致餓倒胃氣。形體消瘦。目眶深陷。精神疲倦。難以行動。

#### 【療法】

喉痛如刀割之療法 碗片卡喉。喉間疼痛如刀割。飯食不下。腹中飢甚。速以羊脛骨炙灰研末。開水沖服。其碗片即化。從大便出。

若失治。其人喉間疼痛益劇。腹中飢甚。粥飯不下。欲食不得食。以致餓倒胃氣。形體消瘦。目眶深陷。精神疲倦。難以行動。速以羊脛骨散服之。待

碗片化去。以薄粥緩緩呷之。若薄粥已受。胃氣稍和。而形羸未痊者。再與四君子膏服之。自能漸漸復元。

#### 【調養】

一、忌食生冷硬物 碗片卡喉愈後。飲食宜慎。忌食生冷水果硬物。如栗子。山芋。芋芳。魚翅。魷魚等物。以其皆不易消化。誤食後必傷胃氣。變為胃病。遺憾終身也。

二、宜和胃氣 碗片卡喉愈後。其人胃氣虛弱。久不復元。調養之法。當常服四君子膏。

三、不可飲過熱過冷湯水 碗片卡喉。不可飲過熱過冷湯水。以過熱過冷。均富有刺激性。經過傷處。痛不可忍。必致受創。難於復元。

### 雞鵝鴨骨卡喉類

#### 【病源】

食時過急 其人食雞鵝鴨時過於匆急。偶一不慎。將骨卡喉中。梗痛難忍。是謂雞鵝鴨骨卡喉病。

#### 【病狀】

梗痛難忍 雞鵝鴨骨卡喉。其人咽喉梗痛難忍。涕淚交流。粥飯不下。困苦難言。宜速治。失治則其骨不化。梗痛益劇。不能片刻忍。五六日粥飯不下。腹中飢甚。胃氣餓倒。精神疲憊。形體消瘦。至為危重。

#### 【療法】

梗痛難忍之療法 雞鵝鴨骨卡喉。其人咽喉梗痛難忍。涕淚交流。粥飯不下。困苦難言。速以山查湯服之。

即化神效。

又方。以芋藤根搗融為丸。如桂圓大。雞骨卡喉。以雞湯送下。鵝骨用鵝湯送下。鴨骨用鴨湯送下。或以芋藤根搗汁飲之。則更神效。

若失治。其骨不化。梗痛益劇。不能片刻忍。五六日粥飯不下。腹中飢甚。胃氣餓倒。精神疲憊。形體消瘦。變為危症。速以狗一隻倒吊取涎。緩緩嚥下。其骨即化。或以隔年竈糖食之。亦有神效。以胃氣已餓倒。若再用前山查湯。或芋藤根方。是雪上加霜。病未愈正愈傷。有生命危險。故用此二法。病可去而正不傷。法至善也。若骨已化。喉痛已瘥。宜以薄粥緩緩呷之。切不可驟與飯食。若薄粥已受。胃氣稍

和。而形羸未瘥者。再與四君子膏服之。自能漸漸復元。

#### 【調養】

一、忌食不易消化之品 雞鵝鴨骨卡喉。忌食硬物。及一切不易消化之品。如山芋、芋芳、栗子、魚翅、鮭魚等物。

二、腸中枯燥之調養法 雞鵝鴨骨卡喉愈後。其人大便艱難。腹中脹急。此乃腸中枯燥。不可服攻滌之品。否則胃氣益虛。腸中益枯。變生不測。調養之法。當多服白蜜。則潤燥補虛。利腸和胃。大便自通。殊屬平穩。

三、食物宜細嚼 預防雞鵝鴨骨卡喉。凡各食物。俱宜細嚼。不可匆急。則此種病決不發生。此點雖屬平淡。



切宜注意。

魚骨卡喉類

【病源】

食魚匆急。其人食魚匆急。偶一不慎。骨卡喉中。不進不出。不上不下。梗痛難忍。涕淚交流。是謂魚骨卡喉病。

【病狀】

喉間梗痛難忍。魚骨卡喉。骨卡喉中。不進不出。不上不下。梗痛難忍。涕淚交流。粥飯不能下。宜速治。失治則必致餓倒胃氣。形體消瘦。目眶深陷。死不治。

【療法】

喉間梗痛難忍之療法。魚骨卡喉。骨卡喉中。不進不出。不上不下。梗

諸物卡喉類

痛難忍。涕淚交流。粥飯不下。速以鷓鴣

鷓或鴿子倒掛。取垂涎。令患人仰臥。

時時灌下。其骨盡化。或以烏梅擦貓

口。貓涎即淋出。取灌喉中。立消。神效。

又方。凡卡某魚之骨。即用某魚生

眼珠。以豆腐皮包好。拚命吞之。無不

神效。

又方。多食青果。或以青果核磨汁

嚥之。其骨立軟。

又方。魚骨在腹。腹內刺痛。速以吳

茱萸二錢。煎濃汁飲一碗。其骨立化。

痛立止。

又方。以冰硼散吹之。骨立化。至有

功效。

又方。灰麪四兩。用冷水調稠。敷兩

膝頭上。一時之久。其骨即化。真奇方

也。一切禽魚獸骨皆可治。

若症已臨危境。可姑以鷓鴣涎方灌

之。待骨已化。痛已止。再以薄粥緩緩

呷之。若胃氣稍和。而形羸未痊者。可

再與四君子膏服之。自能漸漸復元。

【調養】

一、腹內刺痛之調養法。魚骨卡

喉愈後。其人腹內時時刺痛者。此骨

留腹中。未嘗化去也。調養之法。宜以

吳茱萸二錢半。以水三碗。濃煎取半

碗。乘熱頓服。其骨即化。痛立止。神效。

二、忌食硬物。魚骨卡喉。忌食硬

物。及一切不易消化之物。如山芋。芋

芳。栗子。魚翅。魷魚等物。

三、咽喉腫痛之調養法。魚骨卡

喉愈後。其人咽喉腫痛腐爛。此為魚

骨卡傷之故。調養之法。宜以真甫調砂真梅冰片珍珠粉。和勻吹入。不數次。便可收功。

錫鉛卡喉類

【病源】

誤吞錫鉛。小孩以錫鉛嬉戲。含於口中。偶一不慎。卡於喉間。咽喉脹腫。是謂錫鉛卡喉病。

【病狀】

咽喉脹腫。錫鉛卡喉。咽喉脹腫。腐爛疼痛。粥飯不下。宜速治。失治則咽喉脹腫益劇。腐爛益甚。疼痛如割。粥飯不下。腹中飢甚。欲食不得。必致餓倒胃氣。精神疲憊。形體消削。目眶深陷等症畢現。至為危重。

【療法】

咽喉脹腫之療法。錫鉛卡喉。咽喉脹腫。腐爛疼痛。粥飯不下。啼哭不已。速以羊脛骨散服之。待骨已化。而腐爛未瘥者。宜以冰硼珍珠兒茶散吹之。便可完全痊愈。

若失治。胃氣餓倒。精神疲憊。形體消削。目眶深陷等症畢現。可姑以羊脛骨散服之。服後其人因腸中枯燥。大便不通者。可多服白蜜。物即由大便而出。然後以薄粥緩緩養之。

【調養】

一、忌食生冷硬物。鉛錫卡喉愈後。切宜注重胃氣。不可再使受傷。恐變翻胃。不得永年。調養之法。一切生冷水果。俱能尅伐生生之氣。有礙脾胃。切勿食之。一切硬物如山芋、芋莖、

栗子、魚翅、鮫魚等。俱不易消化。必傷胃氣。切勿食之。

二、大便不通之調養法。錫鉛卡喉愈後。其人大便秘難。腹中脹急者。此腸中陰液枯少。不得潤澤。故使澀結。切不可用攻瀉之品。誤用必亡。調養之法。可多服白蜜。則既能潤腸。又可和陰。效驗最神。一舉而兩善備。妙方也。

三、不可飲過熱過冷湯水。錫鉛卡喉初愈。咽傷未曾復元。一切過熱過冷之湯茶俱宜勿飲。

結論

諸物卡喉。俱由飲食不慎所致。或食時過急。不遑吞嚥。遂致卡喉。或小孩以物嬉戲。含於口中。偶一不慎。遂

致卡喉。初以為小病。不急求治。漸致胃氣餒倒。始求醫藥。則為時已遲。難於設法。編者目擊心傷。故每遇此症。雖已無可挽救。亦必盡力為之。因此挽回者。不知幾許人。固知天下病。雖甚危殆。未有不可醫者。而所以不救者。一方雖由病家之耽誤。一方實由醫家之不努力也。此證各病。雖遇無可挽救之時。亦必設有治法。不忍藥而不治。苟勉力為之。金石可開。焉有不能愈者哉。讀者鑒此一片苦心。細細推究。熱心診救。我敢信此證各病。無死候也。

諸物卡喉證各方淺

解類

【諸獸骨卡喉類各方】

諸物卡喉證

(一) 狗涎方 (驗方)

狗一隻。倒掛取涎。緩緩嚥下。其骨即化。

〔淺解〕 狗善食諸獸骨。頰其涎

以化之。故治骨卡有神效。

(二) 四君子膏 (局方)

人參三兩。生白朮三兩。白茯苓三兩。炙甘草三兩。

右以水煮。加入阿膠三兩以收膏。

每服一匙。開水沖下。日二服。

〔淺解〕 本方參朮苓草俱補中

氣。而和脾胃。

【田螺卡喉類各方】

(一) 鴨涎方 (驗方)

以鴨倒吊取涎。灌之。即化。

〔淺解〕 本方鴨涎味甘性寒。善

化田螺魚骨。

(二) 四君子膏 (局方)

見本證諸獸骨卡喉類各方淺解。

【稻穀卡喉類各方】

(一) 鵝涎方 (金鑑方)

以鵝倒吊接其涎灌之。穀即化。

〔淺解〕 本方鵝涎善化稻穀芒

刺。

(二) 鴨涎方 (驗方)

見本證田螺卡喉類各方淺解

(三) 紫花地丁方 (本草綱目方)

紫花地丁五錢。

右一味。細嚼嚥下。

〔淺解〕 本方紫花地丁味苦性寒。善化稻穀芒刺。

〔四〕糯米糖方（驗方）

以糯米製成糖。

右以糖合於口中。徐徐烱盡。稻芒自化。

〔淺解〕 本方糯米糖味甘性溫。善化稻穀芒刺。

〔五〕人參救肺湯（冰玉堂驗方）

人參三錢。五味子二錢。甜杏仁五錢。

右三味。以水七碗煮。取二碗。去渣。分二次溫服。

〔淺解〕 本方以人參補肺救肺。

五味斂肺納肺。杏仁降肺順肺。稻穀卡喉失治。其人咳逆益劇。無暫息之時。目直視。氣喘如牛。額上冷汗。此肺將絕也。速服此方。補肺納肺順肺。三

路並進。挽回其將絕之肺元。便可獲救。

〔六〕人參杏仁湯（冰玉堂驗方）

人參三錢。甜杏仁五錢。

右二味。以水七碗煮。取二碗。分二次溫服。

〔淺解〕 本方以人參補肺。杏仁

降肺。稻穀卡喉愈後。其人因病中咳劇。致傷肺氣。無端自汗。氣往上升。此皆肺氣虛弱。不能行使其肅降之權之現象。調養之法。當補肺順肺。宜服此方。

【竹葉卡喉類各方】

（一）牛涎方（驗方）

牛涎一盅。以水洗老牛之口。以鹽塗之。少頃。其涎即出。或以

荷葉包牛口。使耕田。待力乏。涎出取之。

右一味。以滾水半盅沖服。其葉便化。

〔淺解〕 本方牛涎善化竹葉。

（二）魚膽飲方（千金方）

冬天取鱈魚膽懸掛。陰乾。遇有各骨卡喉。即取一個。（大者半個亦可）

右一味。以水三碗煮。取一碗。溫溫服下。少時。嘔吐。骨即隨出。如尚未吐。再服溫酒。以吐爲度。酒隨量飲。若再未出。再服必能吐出。如各骨在腹內。日久刺痛。黃瘦者。服之皆出。如無鱈魚膽。以草魚鱈魚膽代之亦可。竹木卡喉服之。亦極有效。存心濟人者。宜

收斂以救急也。

〔淺解〕 本方鯁魚膽。味苦極。善使人吐。吐劇時則一切卡喉之物。自吐出矣。惟性極剋伐。體強者。或病暴起者。俱可服之。若胃氣餒弱。正氣已虛。則決不可用。切須注意。

【竹木卡喉類各方】

(一) 魚膽飲方 (千金方)

見本證竹葉卡喉類各方淺解。

(二) 芝蔴湯 (本草綱目方)

芝蔴不拘黑白炒熟六錢。

右一味。以百沸水泡飲。

〔淺解〕 本方芝蔴味甘性平。潤

燥滑腸。使咽喉間得潤澤。則物自脫落。

(三) 芝蔴嚼食方 (本草綱目方)

以黑芝蔴五六錢。隨意嚼食。

〔淺解〕 本方與上方意義完全

相同。俱在使其咽喉間得潤澤也。

(四) 燈草灰方 (驗方)

燈草六錢。

右一味炙成炭。開水送下。

〔淺解〕 本方燈草味甘性寒。能

通氣。利水道。治急喉痺。故能化竹卡喉也。

(五) 燈草灰敷方 (驗方)

以燈草灰若干。摻於薄膏藥上。

貼於喉痛處。一夜即消。

〔淺解〕 本方與右方意義完全

相同。能化竹卡喉也。

(六) 舊籬笆竹灰方 (金鑑方)

舊籬笆竹燒灰得五錢。以開水

沖服。

〔淺解〕 本方舊籬笆竹燒成灰。

善化竹卡喉。同氣相求也。

(七) 鐵鑄酒方 (金鑑方)

以鐵鑄置炭火內燒紅。淬黃酒

中。(或甜酒亦可) 取酒服之。

便解。

〔淺解〕 本方功力殊大。能化一

切竹木卡喉。

(八) 鐵斧磨水方 (驗方)

以鐵斧磨水服之。

〔淺解〕 本方鐵斧水善化木卡

喉也。

(九) 四君子膏 (局方)

見本證諸獸骨卡喉類各方淺

解。

【桃香卡喉類各方】

(一) 魚膽飲方(千金方)

見本證竹葉卡喉類各方淺解。

(二) 芝蔴湯(本草綱目方)

見本證竹木卡喉類各方淺解。

(三) 四君子膏(局方)

見本證諸獸骨卡喉類各方淺解。

【諸豆卡喉類各方】

(一) 蟻蛭方(驗方)

蟻蛭四五枚。(一名土狗)

右搗爛。敷喉外腫處。

〔淺解〕 本方蟻蛭味鹹性寒。有

毒。達下竅。逐水通淋。有猛力。今藉其

力。以化豆粒卡喉。有殊功也。

(二) 魚膽飲方(千金方)

見本證竹葉卡喉類各方淺解。

(三) 芝蔴湯(本草綱目方)

見本證竹木卡喉類各方淺解。

(四) 四君子膏(局方)

見本證諸獸骨卡喉類各方淺解。

解。

(五) 芝蔴嚼食方(本草綱目方)

見本證竹木卡喉類各方淺解。

【鐵鉞卡喉類各方】

(一) 瀨蝦蟆血方(金鑑方)

瀨蝦蟆四五個。

右將蝦蟆頭剝去。倒垂流血。以盤

接之。得一杯許。灌入喉中。移時連鉞

吐出。鐵自輒曲。

〔淺解〕 本方瀨蝦蟆血味甘性

溫。能軟鐵器。且可使吐。

(二) 簪管籬芭竹灰方(金鑑方)

見本證竹木卡喉類各方淺解。

(三) 飴糖方(驗方)

飴糖一斤。

右一味盡量食之。食盡便出。

〔淺解〕 本方飴糖味甘性溫。化

喉除痰。

(四) 四君子膏(局方)

見本證諸獸骨卡喉類各方淺

解。

【鐵鈎卡喉類各方】

(一) 佛珠道法(驗方)

以佛珠一枚。(或以大香珠亦

可) 穿入鈎線。漸漸將珠揆進。

直至喉管。輕輕將珠向內一推。

其鈎已脫出在珠上。緊緊執着

珠繩抽出即安。

〔淺解〕 此法極佳。抽出時鈎藏珠內。皮肉可不致受傷。

(二) 癩蝦蟆血方(金鑑方)

見本證鐵鉞卡喉類各方淺解。

(三) 飴糖方(驗方)

見本證鐵鉞卡喉類各方淺解。

(四) 四君子符(局方)

見本證諸獸骨卡喉類各方淺解。

解。

【頭髮卡喉類各方】

(一) 自亂髮灰方(千金方)

自亂髮燒成灰存性得五錢。

右一味。以開水調服一錢。

〔淺解〕 本方髮灰消瘀血。利水道。治血滲力至猛。故能消解頭髮卡

喉也。

喉也。

(二) 舊木梳灰散(千金方)

舊木梳二三隻。燒成灰。存性。

右一味。以酒沖服二錢。

〔淺解〕 本方舊木梳。善化髮。

(三) 香油塗方(名醫類案方)

以香油塗於口鼻等處。

〔淺解〕 生髮癩之人。必喜食油。

今以油塗口鼻。是引誘法也。使癩聞

油香而出。即可拔去。神效。

(四) 白馬屎方(本草綱目方)

見中禽獸蟲魚毒證各方淺解類。

類。

(五) 雄黃方(驗方)

雄黃五錢。

右以清油半碗調服。

〔淺解〕 本方雄黃味辛性溫。化痰消涎。殺蟲治癩。

痰消涎。殺蟲治癩。

(六) 膽礬散(驗方)

膽礬一分五釐。

右研爲末。溫酒送下。癩立化。

〔淺解〕 膽礬生銅礬中。石類也。

磨於鐵上。卽成銅色。得火煨則色紅

而無汁者真也。味酸苦。性寒。有小毒。

專化風痰。善消癩疾。

【蜈蚣卡喉類各方】

(一) 生豬血方(名醫類案方)

生豬血一碗。

右一味。乘熱頓服之。

〔淺解〕 本方生豬血味鹹性平。

無毒。善化蜈蚣。蜈蚣卡喉。勢甚危急。

速服此方。卽浸在血中吐出。神效。

(二) 雄黃散 (證治準繩方)

見中禽獸蟲魚毒證各方淺解類。

(三) 清油方 (驗方)

以清油一碗或半碗。灌於口中。  
【淺解】 本方清油使咽喉潤澤而探吐。

(四) 雄黃塗方 (驗方)

明雄黃三錢。

右一味。以酒調勻。敷患處。

【淺解】 本方雄黃善殺蜈蚣蛇虺。

虺。

【碗片卡喉類各方】

(一) 羊脛骨散 (金鑑方)

見吞金銀銅鐵證各方淺解類。

(二) 四君子膏 (局方)

見本證諸獸骨卡喉類各方淺解。

【雞鵝鴨骨卡喉類各方】

(一) 山查湯 (驗方)

焦山查六錢。

右一味。以水五碗煮。取一碗。去渣。頓服。

【淺解】 本方山查味酸甘。性溫。

化肉積。行瘀結。且消一切骨骸。

(二) 苧麻根丸方 (本草綱目方)

苧麻根一兩。

右一味。搗融為丸。如桂圓大。每服

二丸。雞骨卡喉。以雞湯送下。鵝骨用

鵝湯送下。鴨骨用鴨湯送下。

【淺解】 本方苧麻根味甘性寒。

長於滑竅。善於通淋。今藉其達下之

力。以治雞鵝鴨骨卡喉。有神效也。

(三) 苧麻根汁方 (本草綱目方)

鮮苧麻根七錢。

右一味。搗取汁。頓服之。

【淺解】 本方與右方意義完全相同。取汁飲者。欲其藥力急速也。

(四) 狗涎方 (驗方)

見本證諸獸骨卡喉類各方淺解。

解。

(五) 糯米糖方 (驗方)

見本證諸獸骨卡喉類各方淺解。

(六) 四君子膏 (局方)

見本證諸獸骨卡喉類各方淺解。

解。

(七) 白蜜服方 (千金方)

見吞金銀銅鐵器證各方淺解



類。

【魚骨卡喉類各方】

(一) 鷓鴣涎方 (驗方)

以鷓鴣倒吊。接其涎。濃服。

〔淺解〕 本方鷓鴣善食魚類。故

其涎水。善化魚骨也。

(二) 鴨涎方 (驗方)

見本證田螺卡喉類各方淺解。

(三) 貓涎方 (驗方)

以烏梅擦貓口。貓涎即淋出。取

灌喉中。立消。神效。

〔淺解〕 貓善食魚類。取其涎水。

化魚骨也。

(四) 魚眼方 (驗方)

凡卡某魚之骨。即用某魚生眼

珠。以豆腐皮包好。拚命吞之。無

不神效。

〔淺解〕 本方魚眼善化魚骨。有

奇效。

(五) 橄欖方 (驗方)

鮮橄欖多多食之。或以橄欖核

磨汁嚥之。其骨立軟。

〔淺解〕 本方橄欖一名青果。味

甘澆。性溫。善解一切魚毒。魚骨卡喉。

皆可食此化之。

(六) 吳茱萸湯 (證治準繩方)

吳茱萸二錢。

右一味以水三碗煮。取一碗。去渣。

頓服。

〔淺解〕 本方吳茱萸味辛苦性

溫。能宣散鬱結。散寒化濕。兼能消化

魚骨。

(七) 冰硼散 (外科正宗方)

冰片五分。硼砂五錢。

右研為極細末。以蘆筒吹於喉中。

立效。

〔淺解〕 本方硼砂味鹹辛苦性

寒。化痰垢。消骨鯁。佐以冰片。藉其香

透之力。功效益著。

(八) 灰麵敷方 (驗方)

灰麵四兩。

右一味。以冷水調稠。敷兩膝頭上。

一時之久。其骨即化。真奇方也。一切

禽魚獸骨。皆可治。

〔淺解〕 此奇方。故有奇效。

(九) 四君子膏 (局方)

見本證諸獸骨卡喉類各方淺

解。

(一〇)冰硼珍珠散(正宗方)

真南硼砂五錢。珍珠粉三錢。

冰片五分。

右各研極細末。和勻。以蘆筒吹於

喉中。日吹三四次。便可收功。

〔淺解〕 本方以冰硼治喉腫痛。

珍珠化腐生肌。

【錫鉛卡喉類各方】

(一)羊脛骨散(金鑑方)

見吞金銀銅鐵器證各方淺解

類。

(二)冰硼珍珠兒茶散(金鑑方)

真南硼砂五錢。珍珠粉三錢。

真梅冰片五分。兒茶五錢。

右各研極細末。和勻。以蘆筒吹於

喉中。日吹三四次。便可收功。

〔淺解〕 水方冰硼治喉腫痛。珍珠、兒茶化腐生肌。

(三)白蜜服方(千金方)

見吞金銀銅鐵器證各方淺解

類。

(四)四君子膏(局方)

見本證諸獸骨卡喉類各方淺

解。

# 吞金銀銅鐵器證

## 總綱

- 一、何謂吞金銀銅鐵器。  
吞金銀銅鐵器後。腸胃薄弱。不能消化。傷及臟腑。每致人死命。
- 二、吞金銀銅鐵器證共分幾類。

- 共分五類
- 一、吞金器類。
  - 二、吞金箔類。
  - 三、吞銀器類。
  - 四、吞銅器類。
  - 五、吞鐵器類。

三、吞金銀銅鐵器之主要治法如何。

- 一、吞金器 雞蛋清棉花方。
- 二、吞金箔 活羊血方。

吞金銀銅鐵器證

- 三、吞銀器 羊脛骨散。
- 四、吞銅器 葶薺汁方。
- 五、吞鐵器 炭末散。

四、吞金銀銅鐵器之病狀如何。

吞金銀銅鐵器後。其人心腹間梗痛。猶如錐刺。反覆顛倒。面色青紫。呼吸急促。若不接續。求死不得。欲生不能。至為困苦。

五、吞金銀銅鐵器失治。有無危險。

吞金銀銅鐵器後。救治宜速。遲則其物深下。令人心腹切痛。至無可奈何之狀。口吐白沫。目直視。呼吸斷續。此時臟腑受傷。無藥可治矣。

### 吞入金銀銅鐵類

#### 【病源】

誤吞金器 金器其質重墜。堅硬

無比。吞入後不易消化。傷及臟腑。每致人死命。

#### 【病狀】

心腹錐痛 吞金器後。其人喉間梗痛。漸及心腹。猶如錐刺。反覆顛倒。心中懊懣。面色青紫。呼吸急促。若不接續。欲死不得。欲生不能。至為困苦。宜速治。失治則其金深下。必致傷及臟腑。令人口吐白沫。目直視。呼吸斷續而死。

#### 【療法】

心腹錐痛之療法 吞金器後。其人喉間梗痛。漸及心腹。猶如錐刺。反覆顛倒。心中懊懣。面色青紫。呼吸急促。若不接續。欲死不得。欲生不能。至為困苦。速以多量葶薺搗汁飲之。即

能消解。或以雞蛋清五枚。用新棉花  
撕碎。攪入蛋清內灌下。則金從大  
便而出。極效。

又方。以韭菜一把。滾水煮熟。不切  
斷。淡食之。少頃。即吐出。或從大便出。

又方。以巴豆去壳。西月石。礬紅三  
味。共研末爲丸。每服七八粒。用開水  
送下。即從大便而出。神效。

又方。以羊脛骨用炭炙灰。米湯送  
下。其羊脛骨灰約以三錢爲度。服後  
其物即從大便而出。

【調養】

一、宜補氣血 吞金器者救活後。  
其人精神疲憊。形體羸瘦。此氣血俱  
虛也。調養之法。宜常服八珍湯。

二、忌食生冷硬物 吞金器者救

活後。食物最宜謹慎。凡諸生冷硬物。  
如魚翅。海參。水果。栗子等。俱宜戒食。  
否則必傷胃氣。變爲痼疾。遺憾終身。

三、宜服白蜜 吞金器者救活後。  
其人大便艱難。腹中脹硬。此腸中枯  
燥。故便結也。切不可用攻瀉之品。

(如大黃。巴豆。芒硝等)宜多服白  
蜜。外用蜜煎導法。使腸得潤澤。大便  
自通。殊屬穩妥。

吞金箔類

【病源】

誤吞金箔 金箔有毒。誤吞後。每  
令肺管閉塞。呼吸促迫而死。

【病狀】

呼吸促迫 吞金箔後。令人肺管  
閉塞。心胸間煩悶異常。反覆顛倒。有

無可奈何之狀。呼吸促迫。脈象促澀。  
鼻煽。宜速治。失治則必成險候。

【療法】

呼吸促迫之療法 吞金箔。令人  
肺管閉塞。心胸間煩悶異常。反覆顛  
倒。有無可奈何之狀。呼吸促迫。脈象

促澀。鼻煽。急以活羊一隻殺之。取其  
血。乘熱灌之。即可痊愈。極效。

【調養】

一、宜以甜杏仁泡飲代茶 吞金  
箔愈後。其人肺氣猶未全舒。時時促  
塞。調養之法。宜以甜杏仁泡飲代茶。

殊有神效。

二、忌食雞鶉 吞金箔。忌食辛辣

香燥。煎炒炙爆。蝦蟹海腥。雞鵝牛羊  
等肉。

三、宜服穀麥芽湯。吞金箔愈後。其人胃納不佳。胸中悶滿。調養之法。宜服穀麥芽湯。

### 五、吞銀器類

#### 【病源】

誤吞銀器。銀器其質重墜。堅硬無比。吞下後。不易消化。傷及臟腑。每致人死命。

#### 【病狀】

心腹錐痛。吞銀器後。初令人喉間梗痛。漸及心腹。猶如錐刺。反覆顛倒。心中懊懣。宜速治。失治則其銀深下。必損及臟腑。令人呼吸促迫。痛不可忍。口吐白沫。目直視。死不治。

#### 【療法】

心腹錐痛之療法。吞銀器後。初

令人喉間梗痛。漸及心腹。猶如錐刺。反覆顛倒。心中懊懣。速以羊脛骨三錢。重者五錢。用炭炙灰米湯送下。服後物即從大便而出。神效。或以羊脂紫蘇子湯服之。亦極效。

#### 【調養】

一、忌食生冷硬物。吞銀器者救活後。食物最宜謹慎。凡諸生冷硬物。如水果。栗子。魚翅。海參等。均宜戒食。否則必傷胃氣。變為胃病。遺憾終身。  
二、宜服八珍湯。吞銀器者救活後。其人精神疲憊。形體羸瘦。此氣血俱虛也。調養之法。宜常服八珍湯以補血氣。

三、腸中枯燥之調養法。吞銀器者救活後。其人大便秘難。腹中脹硬。

此腸中枯燥。故便秘也。切不可用攻蕩之品。(如大黃巴豆芒硝等)宜多服白蜜。外用蜜煎導法。使腸得潤澤。大便自通。殊屬穩妥。

### 六、吞銅器類

#### 【病源】

誤吞銅器。銅器其質重墜。堅硬。吞下後。不易消化。傷及臟腑。每致人死命。此種事件。以小孩為最多。蓋小孩多喜以銅錢嬉戲。含於口中。偶不經心。遂吞入肚中。故為父母者。切不可與兒玩弄也。

#### 【病狀】

面色青紫。吞銅器後。令人喉間梗痛。漸及胸腹。猶如刀割。呼吸促迫。面色青紫。小孩則兼見啼哭不已。飯

食不思等證。宜速治。失治則其銅深下。必致傷及臟腑。無藥可治也。

【療法】

面色青紫之療法 吞銅器後。令人喉間梗痛。漸及胸腹。猶如刀割。呼吸促迫。面色青紫。小孩則常見啼哭不已。飯食不思等證。宜多食荸薺。即能化堅為軟。再多食青菜豬油。自然送入大腸與糞同出。甚效。

【調養】

一、宜食薄粥 吞銅器者愈後。不可驟食飯。宜食薄粥以養胃氣。而和傷處。食時宜緩。不可匆急。否則傷及創處。疼痛倍增也。

二、忌食硬物 吞銅器者。愈後。忌食硬物。及一切不易消化之品。如魚

翅、海參、栗子、芋芳等物。

三、宜補氣血 吞銅器者愈後。其人精神疲憊。形體羸瘦。此氣血俱虛也。調養之法。宜常服八珍湯。以補血

氣。

天石鐵器類

【病源】

誤吞鐵器 鐵器其實重墜堅硬。吞下後。不易消化。損傷臟腑。每每致人死命。

【病狀】

胸腹痛如刀割 吞鐵器後。其人胸腹疼痛。猶如刀割。面色青。呼吸促迫。宜速治。失治則其鐵深下。必致傷及臟腑。令人心腹間疼痛。至無可奈何之狀。口吐白沫。目直視。呼吸斷續。

無藥可治矣。

【療法】

胸腹痛如刀割之療法 吞鐵器後。其人胸腹疼痛。猶如刀割。面色青。呼吸促迫。速以木炭研末調粥二三碗食之。炭末即裹鐵器由大便而出。極效。或其人腸中枯燥。不能轉送者。更多食青菜豬油。均有神效。

【調養】

一、食物最宜謹慎 吞鐵器愈後。食物最宜謹慎。諸凡生冷硬物。如水果、栗子、魚翅、海參等。均宜戒食。否則必傷胃氣。變為痼疾。遺憾終身。

二、宜服八珍湯 吞鐵器者愈後。其人精神疲憊。形體羸瘦。此氣血俱虛也。調養之法。宜常服八珍湯。以補

血氣。

三、宜多食豬油。吞鐵器者愈後。其人大便艱難。此腸中乾枯也。不可用攻打之藥。調養之法。宜多食豬油。自有神效。

### 結論

金銀銅鐵。俱係堅硬之物。吞入肚中。每每傷及腸胃臟腑。無藥可救。故這種病救治宜速。乘其物未深下。投與藥散。即可無礙。

吞金銀銅鐵器者愈後。其人每大飢思食。而不知衛生術者。即與大量硬飯。不知食時固快。食後則痛苦難言。百病叢生。以腸胃新經創傷。未曾復原。驟進大宗不易消化之物。則傷處重傷。其痛自不待言。且因此而得

吞金銀銅鐵器證

胃病者比比皆是。故此種病新愈時。宜食薄粥調養。既和胃氣。又易消化。其功殊多。

吞金銀銅鐵器者愈後。其人大便秘甚艱難。此因腸胃新經創傷。陰液極少。乾枯澀結也。切不可用攻蕩之品。否則陰液愈枯。腸中愈燥。而精神疲憊。形容枯槁。禍變不測。故如遇此種病情。速多食白蜜或豬油。補其陰液。潤其枯竭。其便自通。萬妥萬當。切宜取法。

吞入金銀銅鐵器與毒證各  
方淺解類

### 【吞金器類各方】

(一) 荸薺汁飲(驗方)

鮮野荸薺十五枚。(重者二十

枚)

右搗取汁。頻頻飲之。便能消解。

〔淺解〕 本方荸薺味甘。性寒滑。入肺胃大腸。合銅錢食之。其錢立化。寒滑之性。概可見矣。故兼能消解金器也。

(二) 雞蛋棉花方(驗方)

生雞蛋清五枚。(重者七枚)  
新棉花三錢。撕極碎。攪入蛋清  
內。灌下。則金從大便而出。

〔淺解〕 本方雞蛋清與棉花攪  
合吞下。則能柔金器。裹金器由大便  
而出。

(三) 韭菜方(驗方)

韭菜一把。

右一味。不切斷。以滾水煮熟。淡食

之少頃。即吐出。或從大便出。

〔淺解〕 本方非菜。味辛酸性溫。

善化金器。

〔四〕巴豆西月石礬紅方（驗方）

巴豆三錢。（去壳） 西月石

一兩。礬紅一兩。

右三味。研細末。飯湯泛爲丸。梧桐

子大。每服七八粒。用開水送下。即從

大便而出。

〔淺解〕 本方係攻蕩之意。惟藥

味峻急。形體虛羸者。切忌投之。

〔五〕羊脛骨散（金鑑方）

羊脛骨三錢。（重者五錢）

右一味。用炭炙灰米湯送下。服後

其物即從大便而出。

〔淺解〕 本方羊脛骨。味甘性溫。

善化金、銀、銅物。並善化一切骨體咽  
喉。

〔六〕八珍湯（六科準繩方）

見百藥毒證各方淺解類。

〔七〕蜜煎導方（傷寒論方）

見百藥毒證各方淺解類。

〔八〕白蜜服方（千金方）

白蜜三錢。

右一味。每日開水沖服。

〔淺解〕 本方白蜜味甘性潤。能

和陰潤燥。通大便。最忌與葱同食。誤

食必致斷腸。最宜注意。

【吞金箔類各方】

〔一〕活羊血方（驗方）

見百藥毒證各方淺解類。

〔淺解〕 本方羊血味鹹性平。善

解一切金石毒也。

〔二〕甜杏仁泡飲方（驗方）

甜杏仁三錢。

右一味。以百沸水泡飲代茶。

〔淺解〕 甜杏仁味甘性平。善降

氣順氣。舒達肺氣。兼能和陰。

〔三〕殺麥芽湯（冰玉堂驗方）

見中禽獸蟲魚毒證各方淺解

類。

【吞銀器類各方】

〔一〕羊脛骨散（金鑑方）

見本證吞金器類各方淺解。

〔二〕羊脂紫蘇子湯（金鑑方）

羊脂五錢。紫蘇子五錢。

右二味。以水五碗煮。取一碗。頓服。

〔淺解〕 本方羊脂。紫蘇子。能柔



銀器。兼能潤腸。服後可使從大便中出。

(三)八珍湯(六科準繩方)

見百藥毒證各方淺解類。

(四)白蜜方(千金方)

見本證吞金器類各方淺解。

(五)蜜煎導方(傷寒論方)

見百藥毒證各方淺解類。

【吞銅器類各方】

(一)葶藶方(驗方)

以葶藶多多食之。

〔淺解〕 本方葶藶味甘性寒。善

化銅器。

(二)青菜豬油方(驗方)

青菜燒熟。豬油熬熟。

右二味。不拘多少。盡量食之。

吞金銀銅鐵器證

〔淺解〕 本方青菜。豬油滑利腸胃。使腸得潤澤。則銅由大便中瀉出矣。

(三)八珍湯(六科準繩方)

見百藥毒證各方淺解類。

【吞鐵器類各方】

(一)炭末散(驗方)

木炭六錢。

右一味。研細末。調粥二三碗食之。

炭末即裹鐵器由大便而出。

〔淺解〕 本方木炭末專治誤吞

金銀銅鐵入腹。有特殊功效。

(二)青菜豬油方(驗方)

見本證吞銅器類各方淺解。

(三)八珍湯(六科準繩方)

見百藥毒證各方淺解類。

(四)豬油方(單方大全方)

熬熟豬油一兩。

右一味。每服三錢。開水沖服。或拌

飯中食。亦可。服至便通爲度。

〔淺解〕 本方豬油味甘性潤。能

補陰液。潤腸枯燥。乃陰虧便難之良

方也。

# 急救百蟲入耳證

## 總綱

一 何謂百蟲入耳。

百蟲偶入耳中。耳中雷鳴。是謂百蟲入耳病。

二 百蟲入耳之主要治法如何。

百蟲入耳。如係蠅蚊小蟲。以麻油數點。滴入耳竅。蟲即死。如係蝨等物。以肉炙香置於耳旁。蟲聞香即出。夜間暗入者。宜端坐。點燈光向耳竅。其蟲見光自出。若對面有人。其蟲不出。人皆旁避方效。

三 百蟲入耳。有無禁忌。

百蟲初入耳。患者每於夢魂中驚覺。大聲呼喊。蟲聞聲則拚命內鑽。致

深入不出。遺患無窮。故覺蟲入耳。雖在夢覺。亟宜鎮靜。切禁叫喊。

四 百蟲入耳。病狀如何。

百蟲入耳。其人耳中雷鳴。頭腦昏然。

五 百蟲入耳失治。有無危險。

百蟲入耳失治。蟲向內走。直至腦戶。時時腦痛。殊為危險。以蟲蝕腦也。

### 【病源】

百蟲入耳。百蟲偶然誤入耳中。耳中雷鳴。是謂百蟲入耳病。

### 【病狀】

耳中雷鳴。百蟲入耳。耳中雷鳴。頭腦昏然。宜速治。失治則蟲向內走。直至腦戶。變為危症。

### 【療法】

耳中雷鳴之療法。百蟲入耳。耳

中雷鳴。頭腦昏然。如係蠅蚊小蟲。以麻油數點滴入耳竅。蟲即死。取出。如係蝨等物。以肉炙香。置於耳旁。蟲聞香自出。夜間暗入者。切勿驚慌喊叫。逼蟲內攻。宜端坐。點燈光向耳竅。蟲見光自出。若對面有人。其蟲不出。必皆旁避方效。

又方。百蟲入耳。蟲由右耳入者。以手掩左耳竅。在左耳者。反之。其蟲即出。

### 【調養】

一 須用蚊帳。百蟲入耳。六七月間最多。以此時天氣炎熱。人多露宿。每使蟲入耳也。故此病之預防法。切勿露臥潮濕之處。臥時必用蚊帳。

二、切勿叫喊。百蟲入耳。蟲初入耳。患者每於夢魂中驚覺。大聲呼喊。蟲聞聲則拼命內進。致深入不出。遺患無窮。故覺蟲入耳。雖在夢覺。亟宜鎮靜。切勿叫喊。

三、宜速治。百蟲入耳。宜速治。遲則蝕腦不救。須知星星之火。足以燎原。螻蟻之穴。可以潰隄。勿以小患輕視之也。

### 結論

百蟲入耳。雖係小病。然有蝕腦之憂。故不可輕視。當速治之。

### 急救百蟲入耳證各

#### 方淺解類

#### (一) 麻油方 (驗方)

以麻油數點。滴入耳竅。蟲即死。

急救百蟲入耳證

〔淺解〕 各種小蟲。經麻油一浸便死。故能治百蟲入耳也。

#### (二) 炙肉誘方 (驗方)

大肉一塊。

右炙香置於耳旁。蟲聞香即出。

〔淺解〕 此誘敵法也。蓋蟲聞肉香。必爬出也。

#### (三) 燈光誘法 (驗方)

以燈點着。使患者端坐。不可作

聲。光向耳中射。旁人避開。其蟲

即出。

〔淺解〕 此亦誘法也。以蟲、蛇等物。極喜火光。故以此誘。蟲自爬出。

#### (四) 掩耳法 (驗方)

蟲由右耳入者。以手掩左耳竅。

在左耳者。反之。其蟲即出。

〔淺解〕 以手掩耳後。則此耳之氣不通。蟲悶塞難忍。不能前進。祇得退出矣。

# 觸電證

## 總綱

一、何謂觸電。

電觸人身。令人肢體麻木。知覺失去。是謂觸電。

二、觸電證共分幾類。

共分二類。一、人工觸電類。  
二、天然觸電類。

三、二類觸電何由而生。

人工觸電。大抵其人不謹慎。以潮濕之手。觸及電機。或誤觸將走電之電機而成。天然觸電。由大雷雨之時。其人誤居大樹下。或牆角邊。致電觸其身而死。俗呼雷擊死者是也。

四、觸電之主要治法如何。

人工觸電。其人手足一部麻木。不能活動。急取黃土泥與水調和。將觸

電之手或足伸入泥中。設電已通行全體。不省人事。急取沙土泥鋪地。用

水灑之。使濕。令觸電者臥其上。再將濕沙鋪身上。自然蘇醒。

天然觸電死。其人並不焦黑。心口微溫。此可救也。急以蚯蚓（俗名曲蟾）搗融敷臍上。半日即活。或以回

生丹灌之。亦可活。

五、觸電施救時。有何禁忌。  
觸電後施救時。無病人不可手觸

有病人。否則電即過來。亦觸電。最宜注意。

### 人工觸電類

#### 【病源】

潮濕之手觸及電機。其人不謹

慎。以潮濕之手。觸及電機。或誤觸將走電之電機。遂致觸電。肢體麻木。知

覺失去。是謂人工觸電。

#### 【病狀】

肢體麻木。人工觸電。其人肢體麻木。知覺失去。面色青紫。指甲青黑。

宜速治。不可刻延。否則電氣通行全身。必致不省人事。變為危證。

#### 【療法】

肢體麻木之療法。人工觸電。其

人肢體麻木。知覺失去。面色青紫。指甲青黑。急取黃土泥與水調和。將觸

電之手或足伸入泥內。即可解。如急切之間。不得泥。則速附木板上。亦可解。

若當時失治。電已通行全身。宜急取沙土泥鋪地上。用水灑之。使濕。令觸電者。臥其上。再將濕沙土鋪身上。自然蘇醒。

〔註〕 人工觸電施救時。無病人不可手觸有病人。否則電即過來。亦觸電。最宜注意。

【調養】

一、濕手不可開燈 預防觸電。凡屬濕手。不可開電燈。將走電之電機。不可觸之。燈無燈泡。機關開着。內中有電。不可誤觸。犯之。必觸電。

二、宜以銀花泡飲 人工觸電救活後。其人胸中時覺悶熱。此餘毒未清也。調養之法。宜以銀花泡飲代茶。並忌食一切辛辣香燥。煎炒炙爆。雞

鴨牛羊肉等物。

天然觸電類

【病源】

大雷雨時居大樹下 大雷雨之時。其人誤居大樹下。或牆角邊。遂致觸電。肢體麻木。知覺失去。是謂天然觸電。

【病狀】

面色青黑 天然觸電。其人面色青黑。肢體麻木。心神昏憤。至爲危重。宜速治。不可刻延。否則電氣通流全身。必致血脈停凝。生氣斷絕。無可救藥。

【療法】

面色青黑之療法 天然觸電。其人面色青黑。肢體麻木。心神昏憤。至

爲危重。速以蚯蚓（又名地龍俗名曲蟾）搗融敷臍上。半日即活。或以回生丹灌之。亦可活。

【調養】

一、不可居大樹下 預防觸雷電。凡大雷雨時。大樹之下。牆角屋角。均有潮氣。最易收電。不可居之。否則必致觸電。

二、宜以銀花泡飲 天然觸電救活後。其人胸中時覺悶熱。此餘毒未清也。調養之法。宜以銀花泡飲代茶。三、忌食發物 天然觸電。病人忌食一切辛辣香燥。煎炒炙爆。雞鴨牛羊肉等物。四、切戒飲酒 天然觸電救活後。其人須切戒飲酒。不可同房。否則病

復發。無可救藥。

結論

觸電之事。多發生於無科學知識之愚夫愚婦。事前不知預防。事後迷信天神。故遭此不救。亡於枉死城者。不知幾何人。緝者目擊心傷。故特編觸電一證。於預防法。尤三致意。善攝生者。依此防備。此種禍變。決不發生也。

觸電證各方淺解類

【人工觸電類各方】

(一)黃土方(驗方)

黃土泥若干。與水調和。將觸電之手或足伸入泥內。即可解。

【淺解】本方黃土與水調和後。

善收電氣。

(二)手附木板法(驗方)

觸電後。急切之間。不得泥。速以麻木之手或足附於木板上。即可解。

【淺解】木料善收電氣。故可解觸電。

(三)沙土鋪身方(驗方)

觸電後。電流全身。至為危重。速以沙土泥鋪地。用水灑之。使濕。令觸電者臥其上。再將濕沙土鋪身上。自然蘇醒。

【淺解】本方與上黃土方意義完全相同。

完全相同。

(四)銀花泡飲方(冰玉堂驗方)

見中禽獸蟲魚毒證各方淺解類。

【天然觸電類各方】

(一)蚯蚓方(驗方)

蚯蚓四五條。(重者六七條)右一味。搗融。敷臍上。半日即活。

【淺解】本方蚯蚓味鹹性寒。專食泥土。故能收電拔電也。

(二)回生丹(金鑑方)

黑豆三升。(煮熟取汁三碗去

豆) 紅花三兩。(炒黃色入

醇酒一大壺。煮三五沸。去紅花

取汁) 蘇木二兩。(剉碎。河

水五碗煎汁三碗。去滓) 大

黃一斤。(研末。以好米醋三四

碗攪勻。文武火熬成膏。如此二

遍。次下紅花酒。蘇木湯。黑豆汁。

共熬成膏) 當歸二兩。熟

地黃二兩。川芎二兩。白茯苓二兩。延胡索二兩。烏藥二兩。香附二兩。蒲黃二兩。牛膝二兩。桃仁二兩。(另研) 蒼朮二兩。(米泔水浸炒) 白芍藥五錢。(酒炒) 甘草五錢。(炙) 羌活五錢。山茱萸肉五錢。(酒浸) 三稜五錢。陳皮五錢。地榆五錢。木香五錢。五靈脂五錢。人參三錢。白朮三錢。(土炒) 青皮三錢。木瓜三錢。高良薑四錢。乳香一錢。沒藥一錢。

右研爲細末。以大黃膏和丸。如彈子大。每服一丸。開水化開。送下。

〔淺解〕 本方以黑豆爲主。解毒毒也。餘均係通經活血。行氣宣滯之品。燭電後氣血凝滯。行其氣血。宣其阻結。則電自解。治病必求其本也。

(二) 銀花泡飲方(冰玉堂驗方)  
見中禽獸蟲魚毒證各方淺解類。

# 湯火傷證

## 總綱

一 何謂湯火傷。

其人偶不經心。被湯燙火燒。好肉暴傷。皮膚疼痛。外起燎皰。雖屬外因。然形勢必分輕重。輕者易愈。重者防

火毒熱氣攻裏。凡此皆曰湯火傷病。

二 湯火傷證共分幾類。

共分二類。一、湯火傷類。二、湯火傷傷眼類。

三 湯火傷初起。若以冷水澆之。其反應如何。

湯火傷初起。雖痛極難忍。亦必耐之。倘用冷水淋之澆之。則熱氣內逼。輕則爛人筋骨。手足攣縮。纏綿難愈。

重則直攻入心。致人死命。

四 湯火傷初起之主要治法如何。

湯火傷初起。急用冷燒酒一鍾。於無意中。向患者胸前一潑。彼吃一驚。其氣必一吸一呵。則熱毒隨呵而出。可保無憂。是為湯火傷之主要治法。

五 湯火傷以燒酒潑後。病勢雖減。然心中仍時覺煩悶。宜用何法救治。

湯火傷以燒酒潑後。病勢雖減。然心中仍時覺煩悶。此毒未全出也。速以熱薑便灌下。以免火毒攻心。或以白沙糖熱水調服。或以好蜂蜜調熟水灌之。均可。

六 湯火傷失治。有無危險。

湯火傷。急病之一也。若受傷重。復失治。則火毒攻心。煩躁神昏。無可救。

藥。

## 湯火傷類

### 【病源】

湯燙火燒。其人偶不經心。被湯燙火燒。好肉暴傷。皮膚疼痛。外起燎皰。是謂湯火傷。

### 【病狀】

傷處痛如鉞刺。湯火傷。好肉暴傷。皮膚疼痛。劇如鉞刺。外起燎皰。重者火毒攻裏。令人躁煩作嘔。二便秘塞。

### 【變症】

神昏悶絕。湯火傷初起。務令二便通利。則毒熱必解。若就延失治。或誤以冷水并泥浸塗傷處。則毒伏於內。寒束於外。皮肉臭爛。神昏便秘。煩



躁閉絕。疎肩氣喘。多致不救。

【療法】

痛如鍼刺之療法 湯火傷。好肉暴傷。皮膚疼痛。劇如鍼刺。外起燎皰。重者火毒攻裏。令人煩躁作嘔。二便秘塞。治法宜於初起時。以冷燒酒一鍾。於無意中。望患者胸前一潑。彼吃一驚。其氣必一吸一呵。則內之熱毒。隨呵而出。若呵後病勢雖減。然心中仍時覺煩悶。此毒未全出也。速以熱童便灌下。以免火毒攻心。或以白沙糖熱水調服。或以好蜂蜜調熱水灌之均可。外以真麻油敷之。再以糯米淘水去米。取汗。加真麻油一碗。用篋子順攪一二千下。(切莫少攪)可

以挑起成絲。用舊筆蘸油搽上。立刻

止痛。愈後並無疤痕。神效無比。

又方。湯火傷初起。即以清涼膏塗之。可解毒止痛。不致臭爛。次以罌粟膏塗之。痛止生膿時。換黃連膏貼之收功。

二、神昏悶絕之療法 湯火傷初起。務令二便通利。則毒熱必解。若就

延失治。或誤以冷水井泥浸塗傷處。則毒伏於內。寒束於外。皮肉臭爛。神昏便秘。煩躁悶絕。疎肩氣喘。多致不救。姑以四順清涼飲服之。務令二便

通利。始有生望。外以清涼膏塗之。可解毒止痛。不致臭爛。次以罌粟膏塗之。痛止生膿時。換黃連膏貼之收功。

【調養】

一、忌食動風發物 湯火傷。忌食

動風發物。如雞鵝羊肉。蚌蛤河豚。蝦蟹海腥。香梁厚味。辛辣香燥。煎炒炙爆。生冷硬物等類。

二、宜以麻油塗之 湯火傷。痛如鍼刺。急不得藥。速以麻油塗之。其痛立止。以其既能潤燥。又可解毒也。

三、宜以連翹銀花泡飲 湯火傷。宜日以連翹五錢。銀花五錢。泡飲代茶。自能清營解毒。庶免火毒內攻。

湯火燥傷眼類

【病源】

湯火燥眼 其人偶不經心。被湯燙火燥。傷及眼。令目閉不張。痛甚。是謂湯火燥傷眼病。此須速治。否則其目必盲。

【病狀】

目閉不張。湯火爆傷眼。其人目中痛甚。閉不能張。時時流淚。此宜速治。失治則必致變為盲目。

【療法】

目閉不張之療法。湯火爆傷眼。其人目中痛甚。閉不能張。時時流淚。宜以三七葉搗汁點入數次即愈。或以三七磨水滴入亦可。屢試屢驗。又方。以南瓜水葵花油點入。亦極有效。

【調養】

一、不可煩躁。湯火爆傷眼。患者切宜鎮定。不可煩躁。否則眼痛益劇。不能痊可也。

二、忌食雞鴨。湯火爆傷眼。忌食發物。如雞鴨羊牛肉。蚌蛤河豚。蝦蟹

海腥等類。

三、宜早眠早起。湯火爆傷眼愈後。其人宜常早起早眠。則目力易復元也。

結 論

湯火傷至為苦楚。每致皮肉臭爛。痛如鐵刺。宜速以麻油塗之。使得潤澤。燥痛自止。昧者不知此法。以為火湯者必熱。多以冷水并水淋之。澆之。致毒為冷過。無有出路。遂致內攻。多成敗症。此最宜注意。

湯火爆傷眼。眼中痛甚。性急者每暴躁煩擾。不能自已。結果其目必盲。以目疾最忌煩躁。煩則肝火怒旺。躁烈難制。益其痛。傷其眼。故使盲也。是患此病者。必須鎮定靜養。自得痊愈。

湯火傷證各方淺解

【湯火傷類各方】

(一) 冷燒酒撥方 (驗方)

冷燒酒一鍾。於無意中。望患者胸一撥。彼吃一驚。其氣必一吸。一呵。則內之熱毒。隨呵而出。

(淺解) 本方燒酒。味辛性熱。善

拔毒也。

(二) 重便灌方 (驗方)

以重便一二碗。乘熱灌之。

(淺解) 本方重便。味鹹性寒。善

解熱毒。

(三) 白沙糖方 (驗方)

白沙糖七錢。熱水調服一碗。

(淺解) 本方白沙糖。味甘性寒。

善解火毒。

〔四〕蜂蜜服方（驗方）

好蜂蜜七錢。以開水沖服。

〔淺解〕 本方蜂蜜味甘性平。能

解火毒。且可止痛。

〔五〕麻油敷方（驗方）

以真麻油敷於傷處。

〔淺解〕 本方麻油味甘性涼。能

潤燥。能解毒。能清熱。又可止痛。乃治

湯火傷之良方也。

〔六〕糯米汁麻油搽方（驗方）

以糯米淘水。去米取汁。得一杯。

加真麻油一碗。用筷子順攪一

二千下（切莫少攪）可以挑

起成絲。用舊筆蘸油搽上。立刻

止痛。愈後並無疤痕。神效無比。

〔淺解〕 本方清火解毒。且能使肌膚潤澤。故搽上即能止痛。乃濕可潤燥之義也。

〔七〕清涼膏（金鑑方）

水潑開石灰末一升。加水四碗。

攪淨。澄清汁一碗。加香油一碗。

以筭順攪數百轉。使稠黏如糊。

用雞翎蘸掃傷處。

〔淺解〕 本方石灰解毒止痛。敷

於傷處。不致臭爛。此方之妙。尤在香

油一味。以其能潤澤肌膚。使不燥痛。

〔八〕罌粟膏（金鑑方）

罌粟花十五朵。無花以殼代之。

右以香油四兩。將罌粟煤枯濾淨。

入白蠟三錢。溶化盡。傾入碗內。待將

凝之時。下輕粉二錢。攪勻。燉水中令

冷。取出。臨用時。搥腳挑膏。手心中。搽化。搽於傷處。綿紙蓋之。日換二次。其痛自止。次日用輕帛搥淨腐皮。再搽之。

〔淺解〕 本方罌粟止痛。白蠟生

肌。輕粉提膿。湯火傷用此敷之。止痛

提膿。待痛止生膿時。換黃連膏敷之。

〔九〕黃連膏（金鑑方）

黃連三錢。當歸尾五錢。生

地一兩。黃柏三錢。薑黃三

錢。

香油十二兩。將藥煤枯。搥去渣。下

黃連四兩。溶化盡。用夏布將油濾淨。

傾入磁盤內。以柳枝不時攪之。候凝

為度。

〔淺解〕 本方黃連。黃柏。清氣熱。

生地清血熱。歸尾破血行瘀。莖黃破  
氣行氣。黃蠟生肌收口。湯火傷病。若  
痛止生膿時。當換敷此膏。漸可生肌  
收功也。

(一〇)四順清涼飲(金鑑方)

防風三錢。梔子三錢。連翹

三錢(去心)。生甘草梢三

錢。當歸三錢。赤芍三錢。

羌活三錢。大黃三錢。燈芯

五十寸。

右以水五碗煮。收二碗。去渣。分二  
次服。

〔淺解〕本方防風、羌活、清透肌  
表。使火毒由表而解。大黃、山梔、連翹、  
清泄裏熱。使火毒由大便而去。甘草  
梢、燈芯、清達小腸。使火毒由小便而

洩。湯火傷失治。火毒內攻。二便秘塞。  
神智昏迷。最為危重。速服此方。務令  
二便通利。始有生望。

(一一)銀花連翹泡飲方(冰玉

堂驗方)

見急救人畜蛇蟲咬傷證各方

淺解類。

【湯火爆炸眼類各方】

(一)三七葉搗汁方(驗方)

三七葉搗成汁。點入眼中。數次

即愈。

〔淺解〕本方三七味甘苦性溫。

能行肝和傷。故取其汁能治眼爆傷

也。

(二)三七磨水滴入方(驗方)

以三七磨成汁。滴入眼內。

〔淺解〕本方與上方意義完全  
相同。可以參閱。

(三)南瓜水葵花油方(驗方)

以南瓜汁葵花油。拌和。點入眼

中。

〔淺解〕本方南瓜汁、葵花油。能

和傷潤燥。明目清熱。治湯火爆炸眼。

有神效。

# 中二味並食毒證

## 總綱

一 何謂中二味並食毒。

食物中有二味不可同時並食者。食之則必中其毒。如蟹與柿蟹與石榴等是也。

二 誤食二味相反之物。何以能致人死命。

二味相反之物。同時並食。因其性質互異。各不相能。戰爭不已。遂使人臟腑受傷而死。如葱之與蜜。甘遂芫花大戟之與甘草。人參之與五靈脂。荊芥之與魚類是也。

或因二味同屬寒性。同時並食。互相凝結不解。遂致寒邪壅盛。臟腑受

中二味並食毒證

傷而死。如蟹之與柿與石榴是也。

或因二味同屬燥性。同時並食。燥性大發。血脈爆裂。吐血衄血不止而死。如烏藥之與茴香是也。

三 中二味並食毒證。共分幾類。

一 中蟹柿並食毒類。

二 中葱蜜並食毒類。

三 中荊魚並食毒類。

四 中人參五靈脂並食毒類。

五 中蟹榴並食毒類。

六 中甘遂大戟芫花與甘草並食毒類。

七 中紫莧並食毒類。

八 中烏藥茴香並食毒類。

九 中烏藥茴香並食毒類。

十 中烏藥茴香並食毒類。

四 中二味並食毒證各病之主要

治法如何。

一 中蟹柿並食毒 紫蘇桂枝湯。

二 中葱蜜並食毒 地漿湯。

三 中荊魚並食毒 地漿湯。

四 中人參五靈脂並食毒 甘草

汁方。

五 中蟹榴並食毒 紫蘇生薑桂

枝湯。

六 中甘遂芫花大戟與甘草並食

毒 地漿湯。

七 中紫莧並食毒 白馬尿方。

八 中烏藥茴香並食毒 犀角石

膏三七湯。

五 中二味並食毒證之主要調養

法如何。

中二味並食毒證各病之主要調

養法。必須戒食其中毒之物三年。  
(如食蟹柿中毒者。三年內不可食蟹。亦不可食柿。否則病必復發。餘倣此。)

中蟹柿並食毒類

【病源】

寒氣凝滯 蟹性大寒。柿性亦寒。二味同時並食。寒氣凝滯。令人心腹間大寒痛。指甲青。是謂中蟹柿並食毒病。

【病狀】

心腹間大寒痛 中蟹柿並食毒。其人心腹間大寒痛。刻不可忍。指甲青。口吐白沫。寒戰不已。

【變症】

不能言語 中蟹柿並食毒失治。

毒氣壅盛。腹痛如割。心中如結。不能言語。指甲青紫。口吐白沫。手足冷至節。此寒毒攻臟。無藥可治也。

【療法】

一、心腹間大寒痛之療法 中蟹柿並食毒。其人心腹間大寒痛。刻不可忍。指甲青。口吐白沫。寒戰不已。速以紫蘇桂枝湯服之。必可救。

二、不能言語之療法 中蟹柿並食毒失治。毒氣壅盛。腹痛如割。心中如結。不能言語。指甲青紫。口吐白沫。手足冷至節。此寒毒攻臟。無藥可治也。雖然。不可棄也。速以艾絨管膺灸之。待手足溫。再與紫蘇桂枝乾薑湯。或可挽救。

【調養】

一、三年內不可食蟹柿 中蟹柿並食毒。忌食發物。如雞鵝牛羊肉。蝦魚海腥。蚌蛤河豚等。三年內不可食蟹。亦不可食柿。否則病必復發。

二、宜服溫中健脾湯 中蟹柿並食毒愈後。其人腹中時有餘痛。大便時澇者。此寒氣未盡除也。調養之法。宜服溫中健脾湯。

三、預防法 預防中蟹柿並食毒。凡食蟹後。二十四小時內。不可食柿。食柿後亦如之。

中葱蜜並食毒類

【病源】

葱蜜相爭 葱與蜜性質相反。不可同時並食。若誤食之。二味相爭。腹中急痛。其毒如砒。必致斷腸。是謂中

葱蜜並食毒病。

【病狀】

腹中急痛 中葱蜜並食毒。其人腹中急痛。刻不可忍。

【變症】

面色慘白 中葱蜜並食毒失治。毒氣壅盛。腹痛如割。極力叫喊。呼聲殊慘。面色白。此必斷腸。無藥可救。

【療法】

腹中急痛之療法 中葱蜜並食毒。其人腹中急痛。刻不可忍。速服地漿湯。必能得救。

【調養】

一、一年內不可食葱蜜 中葱蜜並食毒。忌食雞鵝羊肉。蝦蟹海腥。蚌蛤河豚等發物。一年內不可食葱。亦

不可食蜜。否則病必復發。

二、宜和腸胃

中葱蜜並食毒愈後。宜和腸胃。當常以生甘草泡飲代茶。則既能和中。又可解毒。法至善也。

三、時時嘔吐

中葱蜜並食毒愈後。其人時時嘔吐者。此胃氣未和也。調養之法。宜服半夏和胃湯。

【病源】

中荊魚並食毒類

荊芥與魚蝦等物相反。荊芥與魚蝦等物。性質相反。若二物同時並食。下腹後。必致相爭。傷及臟腑。有生命危險。其中毒成病者。謂之中荊魚並食毒病。

【病狀】

腹中疼痛 中荊魚並食毒。其人

腹中疼痛。心中如刺。

【變症】

心神昏憤 中荊魚並食毒失治。毒氣壅盛。攻入臟腑。心神昏憤。不言不語。氣息若斷若續。危在頃刻。

【療法】

一、腹中疼痛之療法 中荊魚並食毒。其人腹中疼痛。心中如刺。速以地漿湯服之。必可得救。

二、心神昏憤之療法

中荊魚並食毒失治。毒氣壅盛。攻入臟腑。心神昏憤。不言不語。氣息若斷若續。危在頃刻。姑以大劑地漿湯灌之。聊盡人事。

【調養】

一、一年內不可食魚類及荊芥

中荆魚並食毒愈後。忌食雞鵝牛羊  
肉。一年內不可食魚類。亦不可食荆  
芥。否則病必復發。

二、當和胃氣 中荆魚並食毒愈  
後。其人胃氣不和。時時嘔吐。胸中悶  
滿。調養之法。宜服半夏和胃湯。

三、預防法 預防中荆魚並食毒。  
凡食魚後。二十四小時內。不可食荆  
芥。食荆芥後。亦如之。

### 中人人參五靈脂並食

#### 毒類

#### 【病源】

人參與五靈脂相反。人參與五  
靈脂。性質完全相反。二物同時服下。  
必致相爭。有傷臟腑。胃中攻痛。心中  
懊懣。是謂中人人參五靈脂並食毒病。

#### 【病狀】

胃中攻痛 中人人參五靈脂並食  
毒。其人胃中攻痛。心中懊懣。二便秘  
塞。

#### 【變症】

痛引腹中 中人人參五靈脂並食  
毒。失治。毒氣壅盛。胃中攻痛益劇。連  
引腹中。心中懊懣。反覆顛倒。二便秘  
塞。至為困苦。

#### 【療法】

一、胃中攻痛之療法 中人人參五  
靈脂並食毒。其人胃中攻痛。心中懊  
懣。二便秘塞。速以生甘草汁灌之。便  
可無礙。  
二、痛引腹中之療法 中人人參五  
靈脂並食毒。失治。毒氣壅盛。胃中攻

痛益劇。連引腹中。心中懊懣。反覆顛  
倒。二便秘塞。至為困苦。速與生甘地  
漿湯服之。

#### 【調養】

一、忌食雞鵝 中人人參五靈脂並  
食毒。忌食雞鵝牛羊肉。蚌蛤河豚。蝦  
蟹海腥等發物。

二、宜以生草梢泡飲代茶 中人  
參五靈脂並食毒愈後。其人小便猶  
未十分通利。調養之法。宜以生草梢  
泡飲代茶。自有奇效。

三、宜和胃 中人人參五靈脂並食  
毒愈後。其人心時時作噁。胃納不  
佳。此胃氣不和也。調養之法。宜服半  
夏和胃湯。

### 中蟹櫛並食毒類



【病源】

寒氣凝滯。蟹性大寒。石榴性亦寒。二味同時並食。寒氣凝滯。令人心腹間大寒痛。指甲青。是謂中蟹榴並食毒病。

【病狀】

口吐白沫。中蟹榴並食毒。其人心腹間大寒痛。刻不可忍。指甲青。口吐白沫。寒戰不已。

【變症】

腹痛如割。中蟹榴並食毒失治。毒氣壅盛。腹痛如割。心中如結。不能言語。指甲青紫。口吐白沫。手足冷至節。此寒毒攻厥。無藥可治也。

【療法】

一、口吐白沫之療法 中蟹榴並

中二味並食毒候

食毒。其人心腹間大寒痛。刻不可忍。指甲青。口吐白沫。寒戰不已。速以紫蘇生薑桂枝湯服之。必可救。

二、腹痛如割之療法 中蟹榴並食毒失治。毒氣壅盛。腹痛如割。心中如結。不能言語。指甲青紫。口吐白沫。手足冷至節。此寒毒攻厥。無藥可治也。雖然。不可棄也。速以艾絨當臍灸之。待手足溫。再與紫蘇桂枝乾薑湯。或可挽救。

【調養】

一、三年內不可食蟹榴 中蟹榴並食毒。忌食發物。如雞鵝牛羊肉。蝦魚海腥。蚌蛤河豚等。三年內不可食蟹。亦不可食石榴。否則病必復發。

二、腹中時有餘痛之調養法 中

蟹榴並食毒愈後。其人腹中時有餘痛。大便時溏者。此寒氣未盡除也。調養之法。宜服溫中健脾湯。

三、預防法 預防中蟹榴並食毒。凡食蟹後。二十四小時內。不可食石榴。食石榴後。亦如之。

中甘遂大戟芫花與甘草並食毒類

【病源】

三味與甘草相反。甘遂味苦性寒。芫花味苦辛性溫。大戟味辛苦而沉寒。俱有大毒。俱善利水。俱與甘草相反。若三味中有一味與甘草同時並食。即中其毒。令人腸腹絞痛。劇則斷腸。是謂中甘遂芫花大戟與甘草並食毒病。

【病狀】

腸腹攻痛。中甘遂芫花大戟與甘草並食毒。其人腸腹絞痛。面色灰白。利下膿水。四肢逆冷。宜速治。失治則毒氣壅盛。腸腹疼痛。猶如絞割。極力叫喊。呼聲殊慘。面色灰白。痢下膿水不止。此必腸斷。無藥可救。

【療法】

腸腹攻痛之療法。中甘遂芫花大戟與甘草並食毒。其人腸腹絞痛。面色灰白。痢下膿水。四肢逆冷。速以大劑地漿湯灌之。卽痛定痢止。神效無比。

【調養】

一忌食海腥。中甘遂芫花大戟與甘草並食毒。忌食雞鵝牛羊肉。蚌

蛤河豚。蝦蟹海腥等發物。

二宜服人參和中湯。中甘遂芫花大戟與甘草並食毒愈後。其人因病中痢下過甚。中氣受傷。致精神疲憊。形容枯槁。腹中自覺有下墜之勢。調養之法。宜常服人參和中湯。

三、大便燥結之調養法。中甘遂芫花大戟與甘草並食毒愈後。其人因痢下過甚。致腸中陰液枯少。大便燥結。此不可服攻逐藥。愈攻愈虛。必致不救。調養之法。宜服白蜜。則既能通便。又可潤燥。一舉而兩善備也。  
中蠶莖芫花並食毒類

【病源】

性俱陰滯。莧菜味甘性涼。利大小腸。性極陰滯。蠶肉味甘性平。多食

滯脾。二味俱屬陰滯之物。若同時並食。則胃中陰寒。不能消化。遂中其毒。令人腹內生小蠶。是謂中蠶莖並食毒病。

【病狀】

胃納不佳。中蠶莖並食毒。其人胃納不佳。腹中攻痛。時時膨脹。形體消瘦。面色萎黃。二便時通時閉。此腹內生小蠶也。

【變症】

腹中膨脹。中蠶莖並食毒失治。其蠶日以長大。腹中愈益膨脹。攻痛益劇。最後必咬斷肚腸而死。

【療法】

一、胃納不佳之療法。中蠶莖並食毒。其人胃納不佳。腹中攻痛。時時

膨脹形體消瘦。面色萎黃。二便時通時閉。此腹內生小瘰也。速飲白馬尿。方可盡化也。

二、腹中膨脹之療法 中瘰莧並食毒失治。其瘰日以長大。腹中愈益膨脹。攻痛益劇。此時瘰已長成。若復失治。惟有坐以待斃耳。白馬尿係有毒之品。不可多服。然少服必不見效。此時進退兩難。無法之法。不治之治。仍以多服白馬尿為主。惟必當加入生甘草。以解尿毒。且和其正。待腹痛全止。膨脹全消。此瘰已盡化也。即止勿服。

【調養】

一、忌食生冷硬物 中瘰莧並食毒。忌食生冷水菓硬物。及一切不易

消化之物。如山芋、芋芳、栗、棗、魚翅、海參、鮫魚等。

二、宜補脾陽 中瘰莧並食毒愈後。其人脾陽虛弱。胃納不佳。食不消化。久不復元。調養之法。宜常服白朮補脾膏。

三、終身戒食瘰莧二物 中瘰莧並食毒愈後。終身戒食瘰莧二物。否則病必復發。

中烏藥莖茴香並食毒類

【病源】

血脈爆裂 烏藥味辛性溫。茴香味辛性溫。二味俱屬辛香走竄之品。若同時並食。燥性大發。血脈爆裂。吐血衄血不止。有生命危險。是謂中

烏藥茴香並食毒病。

【病狀】

吐血衄血 中烏藥茴香並食毒。其人血脈爆裂。吐血衄血不止。不能言語。面赤如丹。

【變症】

手足不溫 中烏藥茴香並食毒失治。其人吐血衄血不止。陰陽俱竭。面色灰白。手足不溫。脈如遊絲。呼吸細微。是命氣將絕。無可救藥也。

【療法】

一、吐血衄血之療法 中烏藥茴香並食毒。其人血脈爆裂。吐血衄血不止。不能言語。面赤如丹。速以犀角石膏三七湯服之。  
二、手足不溫之療法 中烏藥茴香

香並食毒失治。其人吐血衄血不止。陰陽俱竭。面色灰白。手足不溫。脈如遊絲。呼吸細微。是命氣將絕。無藥可救也。姑與人參三七湯。聊盡人事。

【調養】

一、忌飲發茶 中烏藥苗香並食毒愈後。一切發湯茶水。切勿飲之。以過熱之物。富有刺激性。經過傷處。必復爆裂。血復大吐大瀉。無藥可治。  
二、忌食海腥 中烏藥苗香並食毒。忌食雞鵝牛羊肉。蚌蛤河豚。蝦蟹海腥。煎炒炙燥。辛辣香燥等物。  
三、宜大補血 中烏藥苗香並食毒愈後。其人因病中血去過多。致面黃肌瘦。精神短少。調養之法。宜大補血。當常服四物補血膏。

一、味不可同食表類

一、豬肉不可與蕎麥食。犯之。落毛髮。患痲病。合葵菜食。少氣。合百合及吳茱萸食。發痢疾。合胡荽食。爛脚。合牛肉食。生蟲。合生薑食。生面黴。發風。合蒼耳食。令人動風。合鱸肉食。得霍亂。合羊肝食。悶心。合雞子。鯽魚。豆。黃食。滯氣。合龜。蟹肉食。傷人。反烏梅。桔梗。黃連。胡黃連。犯之。令人瀉痢。合莧食。令人生小瘡。  
二、羊肉反半夏。菖蒲。同蕎麥。豆。醬食。發瘡疾。同醋食。傷人心。同生魚。酪食。能害人。  
三、牛肉不可與栗子。韭菜。薑子。犬肉。豬肉。黍米。同食。  
四、犬肉反商陸。畏杏仁。不可同蒜。

食。損人元氣。不可同菱食。令人發癩。五、蠶肉同鼻衄食。令人筋急。合豬肉食。或霍亂。食肉後飲荊芥茶。則殺人。

六、兔肉合白雞肉食。及肝心食。令人面黃。合獺肉食。令人病遁尸。合葷橘同食。令人心痛霍亂。又不可同荊芥食。  
七、雞肉不可與黃蠟食。犯之必死。如同葫。蒜。芥。李。及犬肝。犬腎食。令人洩痢。同兔食。則成痢。同魚汁食。則成心瘕。同鯉魚食。則成癰癩。同獺肉食。則成遁尸。同生葱食。則生蟲痔。同糯米食。則生疥蟲。  
八、鴉不可與葛。蠟同食。  
九、鴉。鴉不可與菌子。木耳。豬肉。同

食。

一〇、雀肉不可與李、薺、牛肝、鰾同食。

一一、諸色魚不可與荊芥同食。犯之必死。

一二、鯽魚不可與豬肝、芥菜、蒜、糖同食。

一三、鰲不可與莧菜同食。食之必死。或腹生小鰲。亦不可與豬、雞、雞蛋、鴨、兔、雀、桃、李、薄荷、芥菜等同食。

一四、蟹不可與柿、榴、荆芥、橘、棗等同食。

一五、諸瓜不可與油餅同食。

一六、蕎麥不可與豬、羊、鯉魚同食。

一七、菜豆不可與樞子同食。犯之必死。亦不可與鯉魚、鮮魚同食。

一八、核桃不可與酒、雞同食。

一九、筍不可與糖、鯉魚、羊心、肝等同食。

二〇、葱不可與蜜同食。犯之令人斷腸而死。亦不可與雞、犬、棗、楊梅等同食。

二一、花生（俗名長生果）不可與黃瓜同食。犯之令人寸白蟲。

二二、人參不可與五靈脂同食。

二三、芫花、甘遂、大戟、海藻。不可與甘草同食。

二四、半夏、梧蕪、貝母、白芨、白蘇。不可與烏頭同食。

二五、人參、芍藥、細辛、沙參、苦參、丹參。不可與藜蘆同食。

二六、硫黃不可與朴硝同食。

二七、水銀不可與砒霜同食。

二八、狼毒不可與密陀僧同食。

二九、巴豆不可與牽牛同食。

三〇、丁香不可與鬱金同食。

三一、牙硝不可與京三稜同食。

三二、川烏、草烏不可與犀角同食。

三三、官桂不可與赤石脂同食。

三四、麻黃、細辛不可與油膩之品同食。

三五、地黃不可與葱同食。

三九、豬肝與魚膺不可同食。犯之令人生癰疽。

四〇、魚鮮不可與蜜同食。

四一、人參、地黃、首烏不可與蔞藤同食。犯之令人髮白。

凡此四十一條禁忌，必須熟記。於衛生上，有無限量處，小則無瘡無疽，無病無痛，大則可不致有性命危險。重要非凡，切不可忽略也。

### 結論

中二味並食毒證各病，俱由患者不知禁忌，妄自吞食。中毒深者，每不及治，中毒淺者，幸而得救。然正氣大傷，非靜養數月，不克復原。困苦殊甚。編者有鑒於此，將二味並食有毒之物，立表一類，無論何種食物，凡不可

同食者，均詳細載明。一無遺漏，俾有所預防，不致中毒。上工治未病也。

本證各病，俱係各種重要之中毒，立有神效之治法。完備之調養法。使患此者，均得獲救。無一枉死。其他各種不重要之中毒，一概不收。統歸於禁忌表內，以省篇幅，而示鄭重。閱者諒之。

### 中二味並食毒證各

#### 方淺解類

【中蟹柿並食毒類各方】

(一)紫蘇桂枝湯(千金方)

紫蘇葉三錢。炙桂枝三錢。

右二味，以水五碗煮，取二碗，去渣。

分二次溫服。

〔淺解〕 本方紫蘇味辛性溫，桂

枝味辛甘性熱，二味俱能散陰寒之邪，解蟹、柿之毒。

(二)艾絨灸法(鍼灸大成)

以生薑切成片約三錢厚，在臍下三寸關元穴，或當臍灸之。俱可。艾絨須用陳者，灸時將艾團成上尖下圓之形，則易着火。受毒輕者，灸完十枚，手足便溫。受毒重者，須灸二十枚始效。

〔淺解〕 本法藉艾火之力，以溫

通腹內寒凝之氣，受毒重者，必當施用此法，方可得救，不可忽也。

(三)紫蘇桂枝乾薑湯(證治準

繩方)

紫蘇葉三錢。炙桂枝三錢。

炙乾薑三錢。

右三味，以水六碗煮，取二碗，去渣，分二次溫服。

〔淺解〕 本方以紫蘇、桂枝解散蟹、柿寒凝之毒，並用乾薑者，溫補脾陽，以起沉冷，則手足自溫，腹痛自瘥。

〔四〕溫中健脾湯（冰玉堂驗方）

潞黨參三錢 生白朮三錢

炙乾薑三錢 炙甘草三錢

炙桂枝三錢

右以水八碗煮，取三碗，去渣，分三次溫服。

〔淺解〕 本方以乾薑溫中，桂枝散寒，參、朮、甘草和中健脾，中蟹、柿並食毒愈後，其人腹中時有餘痛，大便時澇者，此寒氣未盡除，調養之法，宜服此方。

服此方。

【中葱薑並食毒類各方】

（一）地漿湯（串雅方）

見百藥毒證各方淺解類。

（二）生甘草湯（驗方）

見百藥毒證各方淺解類。

（三）半夏和胃湯（冰玉堂驗方）

見中禽獸蟲魚毒證各方淺解類。

類。

【中荊魚並食毒類各方】

（一）地漿湯（串雅方）

見百藥毒證各方淺解類。

（二）大劑地漿湯（串雅方）

見中禽獸蟲魚毒證各方淺解類。

類。

（三）半夏和胃湯（冰玉堂驗方）

見中禽獸蟲魚毒證各方淺解類。

類。

【中人參五靈脂並食毒類各方】

（一）生甘草汁方（驗方）

以生甘草一兩，搗成汁頓服。

〔淺解〕 本方生甘草善解百藥毒，故能消解人參、五靈脂並食毒也。

（二）生甘地漿湯（驗方）

見中禽獸蟲魚毒證各方淺解類。

類。

（三）生草榴池飲方（驗方）

生甘草梢三錢

右一味，以百沸水泡飲代茶。

〔淺解〕 本方生甘草梢既能解毒，又可通小便。

（四）半夏和胃湯（冰玉堂驗方）

見中禽獸蟲魚毒證各方淺解類。

見中禽獸蟲魚毒證各方淺解類。

類。

【中蟹榴並食毒類各方】

(一)紫蘇生薑桂枝湯(沈氏尊生書方)

紫蘇三錢。生薑三錢。炙桂枝三錢。

右以水六碗煮。取二碗。去渣。分二次溫服。

【淺解】本方紫蘇味辛性溫。桂枝味辛甘性熱。生薑味辛性溫。三味俱能散陰寒之邪。解蟹、榴之毒。

(二)艾絨灸法(鍼灸大成)

見本證中蟹柿並食毒類各方淺解。

(三)紫蘇桂枝乾薑湯(證治準繩方)

見本證中蟹柿並食毒類各方淺解。

淺解。

(四)溫中健脾湯(冰玉堂驗方)

見本證中蟹柿並食毒類各方淺解。

【中甘遂芫花大戟與甘草並食毒類各方】

(一)大劑地漿湯(串雅方)

見中禽獸蟲魚毒證各方淺解類。

(二)人參和中湯(冰玉堂驗方)

人參三錢。白朮三錢。炙甘草三錢。炙綿耆三錢。山藥三錢。炙升麻三錢。

右以水八碗煮。取二碗。去渣。分二次溫服。

次溫服。

【淺解】本方以人參、白朮、甘草、山藥、和中健脾。黃耆、升麻、升提脾氣。

中甘遂、芫花、大戟與甘草並食毒愈後。其人因痢下過甚。中氣受傷。致精神疲憊。形容枯槁。腹中自覺有下墜之勢。調養之法。宜常服此方。漸能復元也。

(三)白蜜服方(千金方)

見中禽獸蟲魚毒證各方淺解類。

類。

【中蠶甚並食毒類各方】

(一)白馬尿方(本草綱目方)

見中禽獸蟲魚毒證各方淺解類。

(二)白馬尿生甘草方(驗方)

生甘草五錢。



右一味。以水五碗煮。取一碗。去渣。和入白馬尿頓服。

【淺解】 本方以白馬尿消滅腹

中小熱。而此係有毒之品。不可多服。若少服則病勢沉重者。必不見效。此時進退兩難。故加入生甘草以解尿毒。且和其正。則可多服。而無妨礙矣。

(三)白朮補脾膏(冰玉堂驗方)

生白朮三兩。 潞黨參三兩。

懷山藥三兩。 炙甘草三兩。

製半夏三兩。 廣陳皮三兩。

右煎成膏。貯有蓋瓷器中。每服三錢。開水下。日二服。

【淺解】 本方白朮、山藥、黨參、甘

草、和中補脾。半夏、陳皮、運中助化。中驚、葛並食毒愈後。其人脾陽虛弱。胃

納不佳。食不消化。久不復元。調養之法。宜常服本方。自有奇效。

【中烏藥茴香並食毒類各方】

(一)犀角石膏三七湯(冰玉堂驗方)

烏犀角三錢。(貧者以臘雪水代之) 石膏一兩。 參三七

四錢。

右三味。(若係雪水。則宜冷服。切不可煮)以水七碗煮。取二碗。分二

次服之。

【淺解】 本方以犀角大清血熱。

石膏大清氣熱。重用三七以止血。中

烏藥、茴香並食毒。其人熱極燥極。血

脈爆裂。吐血衄血不止。速服此方。便能得效。

(二)人參三七湯(冰玉堂驗方)

人參三錢。 參三七四錢。

右二味。以水六碗煮。取一碗。頓服。

【淺解】 本方以人參挽回將絕之元氣。三七止血。中烏藥、茴香並食毒失治。其人吐血衄血不止。陰陽俱竭。脈如遊絲。面色灰白。此危在目前。姑投此方。聊盡人事。不敢必效也。

(三)四物補血膏(局方)

川芎三兩。 當歸三兩。 生白

芍三兩。 大熟地三兩。

右四味煮成膏。貯有蓋瓷器中。每

服三錢。開水下。日二服。

【淺解】 本方係補血和血之劑。

病後血虛。可服此調養。漸能復元也。

# 中禽獸蟲魚毒證

## 總 綱

一 何謂中禽獸蟲魚毒。

禽中如鳩、野雞等俱有毒。獸中如犬、馬等俱有毒。蟲中如蛇、蜈蚣等俱有毒。魚中如河豚、異形魚等俱有毒。中此等毒者。每成重病。是謂中禽獸蟲魚毒。

二、中禽獸蟲魚毒證共分幾類。

- 一、中鳩毒類。
- 二、中鵝鴨毒類。
- 三、中雞毒類。
- 四、中野雞毒類。
- 五、中鷓鴣毒類。
- 六、中犬肉毒類。

### 共 分 四 類

- 七、中馬肉毒類。
- 八、中牛肉毒類。
- 九、中羊肉毒類。
- 一〇、中豬肉毒類。
- 一一、中豬肝毒類。
- 一二、中蛇毒類。
- 一三、中蜈蚣毒類。
- 一四、中螞蟥毒類。
- 一五、中田螺毒類。
- 一六、中蟹毒類。
- 一七、中黃白蠟毒類。
- 一八、中蝦蟆毒類。
- 一九、中沙蟲毒類。
- 二〇、中各種蟲毒類。
- 二一、中河豚毒類。
- 二二、中各種魚毒類。

- 二三、中鱉魚毒類。
- 二四、中游波蟲毒類。

三 中禽獸蟲魚毒證各病之主要治法如何。

- 一、中鳩毒 犀角磨汁服。
- 二、中鵝鴨毒 糯米水方。
- 三、中雞毒 地漿湯。
- 四、中野雞毒 犀角散。
- 五、中鷓鴣毒 薑湯。
- 六、中犬肉毒 豆豉杏仁方。
- 七、中馬肉毒 人乳方。
- 八、中牛肉毒 稻草汁方。
- 九、中羊肉毒 栗子壳湯。
- 一〇、中豬肉毒 豬牙煨灰方。
- 一一、中豬肝毒 地漿湯。
- 一二、中蛇毒 雄黃散。

- 一三、中蜈蚣毒 雞血湯。
- 一四、中螞蝗毒 雄黃田中泥方。
- 一五、中田螺毒 冰片散。
- 一六、中蟹毒 蘇葉生薑湯。
- 一七、中黃白蠟毒 藍靛汁。
- 一八、中蝦蟆毒 白馬尿方。
- 一九、中沙蟲毒 蒿苣菜汁。
- 二〇、中各種蟲毒 白鴉血方。
- 二一、中河豚毒 橄欖汁蘆根汁。
- 二二、中各種魚毒 橄欖汁。
- 二三、中鱉魚毒 豆豉汁。
- 二四、中游波蟲毒 酸醋方。
- 四 中禽獸蟲魚毒證各病之調養法如何。

中禽獸蟲魚毒病愈後調養之法。忌食一切發物。如雞鵝羊肉。蝦蟹海

中禽獸蟲魚毒證

腥。蚌蛤河豚等物。否則病復發也。  
 五 中禽獸蟲魚毒失治。有無危險。中禽獸蟲魚毒。病勢最凶。宜速治。失治則毒氣壅盛。蔓延臟腑。無藥可救也。

中鴆毒類

【病源】

鴆有大毒。鴆似雁而大。狀如鴉。紫黑色。喙赤眼黑。頸長七八寸。雄者鳴則晴。雌者鳴則雨。蜈蚣及橡實。其肉氣腥而有毒。食之立死。毛亦大熱大毒。與砒相近。入咽便五臟潰爛而死。

【病狀】

白眼朝天 中鴆毒。其證白眼朝天。身發寒戰。忽忽不知。狀如大醉。心

中明瞭。但不能言。宜速治。失治則毒氣壅盛。糜爛臟腑。其人必腹中劇痛。指甲青黑。口吐鮮血。反覆顛倒。最後目鼻齊出血而死。

【療法】

白眼朝天之療法 中鴆毒。其證白眼朝天。身發寒戰。忽忽不知。狀如大醉。心中明瞭。但不能言。蓋鴆毒極熱。善閉人氣也。急以大劑犀角汁灌之。必可獲救。如係貧困之家。不能得犀角。速以金銀花寒水石湯大劑投之。一時後。目不上視。口能言。再以前方減半煎服。二劑全愈。

【調養】

一、忌食發物 中鴆毒。忌食發物。如雞鵝羊肉。蚌蛤河豚。蝦蟹海腥麵

食等。並忌食一切辛辣香燥煎炒炙爆等物。

二、宜以銀花泡飲代茶。中鴉毒

愈後。其人腹中覺熱。時時煩躁。此餘毒未清也。調養之法。宜以金銀花百沸水泡飲代茶。直服至毒清為度。

三、切戒房慾。中鴉毒愈後。其人須切戒房慾百日。方得無礙。否則病復發。無藥可治也。

中鴉鴉毒類

【病源】

多食鴉鴨肉。鴉肉味甘性平。有毒。嫩者尤毒。鴨肉味甘性寒。有毒。惟少食均不妨事。多食每中其毒。是謂中鴉鴉毒。

【病狀】

胸中脹滿。中鴉鴉毒。其人腹中絞痛。胸中脹滿。心中煩熱。口渴。

【變症】

二便不通。中鴉鴉毒失治。其毒壅盛。腹痛益劇。胸滿益甚。二便不通。躁擾不眠。反覆顛倒。至為困苦。

【療法】

一、胸中脹滿之療法。中鴉鴉毒。其人腹中絞痛。胸中脹滿。心中煩熱。口渴。宜以糯米八兩。淘水去米。溫服一碗。即愈。

二、二便不通之療法。中鴉鴉毒失治。其毒壅盛。腹痛益劇。胸滿益甚。二便不通。躁擾不眠。反覆顛倒。至為困苦。速服糯米湯。待毒一解。各恙自瘥。治病必求其本也。若餘勢未盡者。

宜改服秫米湯。自能收功。

【調養】

一、忌食海腥。中鴉鴉毒。忌食發物。如雞牛羊肉。蚌蛤河豚。蝦蟹海腥麪食等。半年內尤不可食鴉鴨。

二、宜服秫米湯。中鴉鴉毒。服糯米湯後。病勢大瘥。而猶有餘毒。逗留未清。若再服糯米湯。勢必胸中脹滿。胃納不佳。不服毒不能清。斯時也。宜改服秫米湯。自能清其餘毒。而和胃氣。殊有神效。

三、預防法。預防中鴉鴉毒。凡一切鴉鴨肉。俱不可多食。而嫩鴉鴨肉尤不可食。否則必中其毒。

【病源】

中雞毒類

誤食毒雞肉。雞有五色。若玄雞白首。及有六指者。有四距者。死而足曲者。均不可食。如同葫蒜芥李及犬

肝犬腎食。令人洩痢。同兔肉食。則成痢。同魚汁食。則成心瘕。同鯉魚食。則成癰癤。同黃白蠟獾肉食。則成遁尸。同生葱食。則生蟲痔。同糯米食。則生蠹蟲。孃妊食之。令子無音。中其毒。則心腹絞痛。口吐白沫。目上翻。至為可怖。是謂中雞毒。

【病狀】

目上翻。中雞毒。其人腹中絞痛。延及心口。如錐刺。刻不可忍。口吐白沫。目上翻。手足掣動。

【變症】

心神昏憤。中雞毒失治。毒氣壅

盛。攻陷臟腑。必心神昏憤。躁煩。口吐白沫。兩目上翻。手足掣動。指甲青。有生命危險也。

【療法】

一、目上翻之療法。中雞毒。其人腹中絞痛。延及心口。如錐刺。刻不可忍。口吐白沫。目上翻。手足掣動。宜服地漿湯。

二、心神昏憤之療法。中雞毒失治。毒氣壅盛。攻陷臟腑。必心神昏憤。躁煩。口吐白沫。兩目上翻。手足掣動。

指甲青。有生命危險也。急以大劑地漿湯灌之。待目翻瘥。手足掣定。神志清。始有生望。

【調養】

一、忌食蝦蟹。中雞毒。忌食發物。

如牛、羊、鵝肉。蚌蛤河豚。蝦蟹海腥。麵食等。半年內尤不可食雞。否則病必復發。

二、餘毒未清之調養法

中雞毒愈後。而餘毒未清。腹中猶痛者。宜再服地漿湯。自可全愈。

三、預防法

預防中雞毒。凡雞年老者。玄身白頭者。有四距者。死而足曲者。俱不可食。否則必中其毒。

中野雞毒類

【病源】

多食野雞肉。野雞肉味極鮮美。惟稍有毒。多食後。輒中其毒。令人腹中絞痛。上吐下瀉。是謂中野雞毒病。

【病狀】

上吐下瀉。中野雞毒。其人心腹

煩悶而脹。至為難忍。一時後。遂上吐下瀉。吐瀉不止。精神疲憊。手足逆冷。

【變症】

冷汗如雨。中野雞毒失治。其毒壅盛。吐瀉不止。手足逆冷。劇則冷汗如雨。目陷音啞。此正虛邪實。有生命危險也。

【療法】

一、上吐下瀉之療法。中野雞毒。其人心腹煩悶而脹。至為難忍。一時後。遂上吐下瀉。速以犀角散解之。資者以銀花寒水石湯代之。

二、冷汗如雨之療法。中野雞毒失治。其毒壅盛。吐瀉不止。手足逆冷。劇則冷汗如雨。目陷音啞。此正虛邪實。有生命危險也。速與參犀湯。資者

以參銀湯代之。或可挽回。

【調養】

一、忌食麵食。中野雞毒。忌食發物。如牛羊雞鵝肉。蚌蛤河豚。蝦蟹海腥麵食等。半年內尤不可食野雞。否則病必復發。

二、宜服銀花湯。中野雞毒愈後。而餘毒未清。其人心腹時時脹悶。調養之法。宜以銀花泡飲代茶。久之。自能肅清餘毒也。

三、預防法。預防中野雞毒。凡野雞烹煮時。宜加入紫蘇葱薑等品。自能滅其腥毒。而尤以少食為佳。切不可貪味也。

中鵝鵝毒類

【病源】

多食鵝鵝肉。鵝鵝肉味甘性溫。有毒。不宜多食。與竹筍同食。令人小腹脹。自死者尤忌食之。

【病狀】

少腹脹悶。中鵝鵝毒。其人少腹脹悶。心中煩熱。或苦腦痛。或咽喉間生瘰。

【變症】

煩躁不眠。中鵝鵝毒失治。其毒壅盛。少腹脹悶益甚。心中熱甚。煩躁不眠。若腦痛者。則其痛如劈。不可忍。若喉間生瘰者。則潰流膿血不止。至為困苦。

【療法】

一、少腹脹悶之療法。中鵝鵝毒。其人少腹脹悶。心中煩熱。宜服生甘

地漿湯。若係腦痛。宜服生甘草湯。若係咽喉間生癰。當服甘草生薑湯。

二、煩躁不眠之療法 中鷓鴣毒

失治。其毒壅盛。少腹脹悶益盛。心中熱甚。煩躁不眠。速與大劑生甘地漿湯。若係腦痛。則其痛如劈。不可忍。速與大劑生甘草湯。若係咽喉間生癰。則潰流膿血不止。至爲困苦。速與大劑甘草生薑湯。均可獲效。

【調養】

一、忌食雞鵝 中鷓鴣毒。忌食發物。如牛羊雞鵝肉。蚌蛤河豚。蝦蟹海腥麪食等。三年內尤不可食鷓鴣。否則病必復發。

二、宜以生甘泡飲代茶 中鷓鴣毒愈後。其人少腹時作脹。此餘毒

未清也。調養之法。宜以生甘草泡飲代茶。苟能常飲。自可斷根。藥性和平。去病而不傷正也。

三、預防法 預防中鷓鴣毒。凡鷓鴣

身白首。及自死者。切勿食之。即平常鷓鴣。亦不可多食。自可免中毒。

中犬肉毒類

【病源】

誤食毒犬肉 犬肉味鹹酸。性溫無毒。惟不可炙食。否則令人消渴。又不可同蒜食。否則損人元氣。又不可同菱食。否則令人發癩。又不可於妊娠時食。否則易發熱毒。又白狗不可合海鮪（小魚名）食。否則必得惡病。又九月不可食狗。否則令人傷神。又瘦犬有內病。獾犬有狂病。自死犬

有毒。懸蹄犬傷人。赤股而躁者氣脹。

及目赤之犬。白犬自死不出舌者。均不可食。誤食輒中其毒。令人腹脹口

渴。發熱亂言。是謂中犬肉毒病。

【病狀】

發熱亂言 中犬肉毒。令人腹脹

滿。口渴。發熱亂言。

【變症】

棄衣狂走 中犬肉毒失治。其毒壅盛。腹脹滿益劇。口大渴。身壯熱。語言顛倒。煩躁不眠。目赤面赤。棄衣狂走。登高而呼。不能自主。

【療法】

一、發熱亂言之療法 中犬肉毒。令人腹脹滿。口渴。發熱亂言。速與雪羹湯。毒即消。神效。若服雪羹湯。病勢

已減。而猶有餘毒者。改與茅蘆湯。自可全愈也。

再者。中犬肉毒初起。即服豆豉杏仁散。亦頗有效。

二、棄衣狂走之療法 中犬肉毒失治。其毒壅盛。腹脹滿益劇。口大渴。身壯熱。語言顛倒。煩躁不眠。目赤面赤。棄衣狂走。登高而呼。不能自主。速與大劑雪羹湯。便可無礙。

【調養】

一、忌食煎炒 中犬肉毒。忌食煎炒炙爆。辛辣香燥。雞鴨羊肉。蚌蛤河豚。蝦蟹海腥等味。三年內尤不可食犬肉。否則病必復發。

二、宜以蘆根泡飲代茶 中犬肉毒愈後。其人腹中微脹。心中微熱者。

此餘毒未清也。調養之法。宜以蘆根泡飲代茶。苟能常飲。自可斷根。藥性和平。去病而不傷正也。

三、預防法 預防中犬肉毒。凡瘦犬。獾犬。自死犬。懸蹄犬。赤腰犬。赤目犬。自死不出舌犬。此皆有毒。均不可食。不可炙食。不可與菱蒜海鮑食。即單食亦不可多食。自可免中毒也。

中馬肉毒類

【病源】

誤食毒馬肉 馬肉味辛苦。性寒有毒。煮時先以清水浸漬。搗洗血令淨。再加冷水燉煮。不可蓋釜。否則其毒不出。食之令人內增胸悶。外生疔瘡。不可熟食。否則傷人心。又孕婦不可食。否則令子過月難產。又乳母不

可食。否則令子疳瘦。又患痢生疥者不可食。否則令病難愈。又不可和生薑食。否則令人氣嗽。又不可和豬肉食。否則令人霍亂。又不可和倉米烹耳食。否則令人生難治惡疾。食酸肉不飲酒。則殺人。至馬生角者。無夜眠者。白身青蹄者。白身黑頭者。黑脊斑臂者。馬鞍下肉色黑。及自死者。均有毒。皆不可食。誤食輒中其毒。令人腹脹口渴。發熱亂言。是謂中馬肉毒。

【病狀】

腹脹口渴 中馬肉毒。其人胸中悶滿。腹脹口渴。煩躁面赤。目赤。發熱亂言。

【變症】

煩躁不眠 中馬肉毒失治。其毒



壅盛。胸滿腹脹益劇。口大渴。身大熱。語言無序。煩躁不眠。目赤面赤。棄衣狂走。登高而呼。不能自主。

【療法】

一、腹脹口渴之療法 中馬肉毒。其人胸中悶滿。腹脹口渴。煩躁。面赤目赤。發熱亂言。宜服淡豆豉杏仁散。或與雪羹湯亦可。若服雪羹湯後。病勢已減。而猶有餘毒。改與茅蘆湯。自可全愈。

或於初起時。即服人乳汁。其毒亦立解。神效。

二、煩躁不眠之療法 中馬肉毒失治。其毒壅盛。胸滿腹脹益劇。口大渴。身大熱。語言無序。煩躁不眠。目赤面赤。棄衣狂走。登高而呼。不能自主。

速與大劑豆豉杏仁散。或與大劑雪羹湯。便可無礙。

【調養】

一、忌食煎炒 中馬肉毒。忌食煎炒炙爆。辛辣香燥。雞鴨羊肉。蚌蛤河豚。蝦蟹海腥等味。三年內尤不可食馬肉。否則病必復發。

二、宜以蘆根泡飲代茶 中馬肉毒愈後。其人腹中微脹。心中微熱者。此餘毒未清也。調養之法。宜以蘆根泡飲代茶。苟能常飲。自可斷根。藥性和平。去病而不傷正也。

三、預防法 預防中馬肉毒。凡馬生角者。無夜眼者。白身青蹄者。白身黑頭者。黑脊斑臂者。馬鞍下肉色黑。及自死者。此皆有毒。均不可食。不可

熱食。不可和薑食。不可和豬肉食。不可和倉米臬耳食。即單食亦不可過多。自可免中毒也。

中牛肉毒類

【病源】

誤食毒牛肉 牛肉味甘性平無毒。惟煮牛肉時。宜稻草燒煮。或稍入杏仁蘆葉於內。則易爛。不可和豬肉同食。否則腹內生寸白蟲。不可以楮木桑木燃煮。否則腹內亦生蟲。又自死牛及病死牛。有毒。不可食。誤食必中其毒。令人腹脹胸滿。心煩。是謂中牛肉毒。

【病狀】

腹脹胸滿 中牛肉毒。其人腹脹胸滿。飲食不思。二便不通。心中煩熱。

【變症】

反覆顛倒 中牛肉毒失治。毒氣壅滯。腹中脹滿益劇。至為難忍。心中煩熱。反覆顛倒。不得安眠。

【療法】

一、腹脹胸滿之療法 中牛肉毒。其人腹脹胸滿。飲食不思。二便不通。心中煩熱。速與稻草湯服之。或服消肉化毒丹亦可。

二、反覆顛倒之療法 中牛肉毒失治。毒氣壅滯。腹中脹滿益劇。至為難忍。心中煩熱。反覆顛倒。不得安眠。速與甘草稻草湯。或服大劑消肉化毒丹亦可。

【調養】

一、忌食雞鶩 中牛肉毒。忌食煎

炒炙爆。辛辣香燥。雞鶩羊肉。蚌蛤河豚。蝦蟹海腥等味。半年內。尤不可食牛肉。否則病必復發。

二、宜飲人乳 中牛肉毒愈後。其人胸腹間猶有餘脹。此毒未清也。調養之法。宜飲人乳。自可緩緩收功。

三、不可多食 預防中牛肉毒。凡一切痛死自死之牛。俱不可食。即無病之牛肉。亦不可多食。自能中不中毒。

中牛肉毒類

【病源】

多食羊肉 羊肉味苦甘。性大熱。無毒。惟同蕎麥豆腐食發瘡疾。同醋食傷人心。同生魚酪食能害人。以銅器煮食。男子損陽。女子暴下。亦不可以楮木桑木蒸炙。食之令人腹內生

蟲。至其羊白身黑頭。或黑羊白頭。及獨角四角者。皆有毒。均不可食。誤食

輒中其毒。即平常羊肉。亦不可多食。否則亦能中毒。中其毒者。令人消渴煩熱。胸腹脹悶。是謂中羊肉毒病。

【病狀】

煩熱消渴 中羊肉毒。令人煩熱消渴。胸悶腹脹。面赤目赤。夜不能眠。

【變症】

口大渴身大熱 中羊肉毒失治。其毒壅盛。令人身大熱。口大渴。目赤如鳩。面赤似火。語言無序。腹脹如鼓。胸悶如壓巨石。至為困苦。

【療法】

一、煩熱消渴之療法 中羊肉毒。令人煩熱消渴。胸悶腹脹。面赤目赤。

夜不能眠。宜服栗子壳湯。或與生甘草湯亦可。

二、口大瀉身大熱之療法 中羊肉毒失治。其毒壅盛。令人身大熱。口大渴。目赤如鳩。面赤似火。語言無序。腹脹如鼓。胸悶如壓巨石。至為困苦。速服大劑栗子壳湯。或大劑生甘草湯。均得獲救。

【調養】

一、忌食麩食 中羊肉毒。忌食芋。芳山芋。麩食。雞鶉牛肉。蚌蛤河豚。蝦蟹海腥等味。半年內尤不可食羊肉。否則病必復發。

二、餘毒未清之調養法 中羊肉毒愈後。其人胸腹間猶有餘悶。此毒未清也。調養之法。宜以生甘草百沸。

水迫飲代茶。苟能常飲。自可收功。三、宜和蒜同煮 煮羊肉時。宜和蒜薤同煮。則腥毒之氣完全消除。可免中毒也。

中豬肉毒類

【病源】

誤食有毒豬肉 豬肉味甘性寒。有小毒。合蒼耳食。令人動風。合生薑食。生面野發風。合蕎麥食。落毛髮。患風病。合葵菜食。少氣。合百合及吳茱萸食。發痢疾。合胡荽食。爛臍。合牛肉食。生蟲。合驢馬肉食。得霍亂。合羊肝食。悶心。合雞子。鮑魚。黃豆食。滯氣。合龜蟹肉食。傷人。不得以桑木。椿木。蒸炙。否則令人腹內生蟲。其他落水浮者。不可食。自死者。不可食。病死者。不可食。

可食。誤食。輒中其毒。令人胸腹脹滿。四肢困倦。煩躁不眠。是謂中豬肉毒病。

【病狀】

胸腹脹滿 中豬肉毒。令人胸腹脹滿。煩躁不眠。四肢困倦。氣不通。時嘆氣。

【變症】

氣機悶塞不通 中豬肉毒失治。毒氣壅滯。胸腹脹滿益甚。渾身氣機悶塞不通。時時嘆氣。煩躁不眠。至為困苦。

【療法】

一、胸腹脹滿之療法 中豬肉毒。令人胸腹脹滿。煩躁不眠。四肢困倦。氣不通。時時嘆氣。速服礮牙灰散。或

服大黃山查湯亦可。

二、氣機悶塞不通之療法 中豬肉毒失治。毒氣壅滯。胸腹脹滿益甚。渾身氣機悶塞不通。時時嘆氣。煩躁不眠。宜速服大劑大黃山查湯。或服杏仁汁方。便可無礙。

【調養】

一、忌食悶氣之品 中豬肉毒。忌食悶氣之品。如山芋、芋艿、栗子等。並忌食發物。如雞鵝羊肉。蚌蛤河豚。蝦蟹海腥麵食等。

二、宜以山查泡飲代茶 中豬肉毒愈後。其人胸腹間猶有餘脹。此毒未清也。調養之法。宜以山查泡飲代茶。苟常飲之。化消肉積。便可斷根。

中豬肝毒類

【病源】

誤食有孔豬肝 豬肝味苦性溫無毒。惟與魚膈同食。則生癰疽。合鱈魚腸子食傷人神。合鴉鶉食生面癩。凡豬隱殺驚氣入心。絕氣歸肝。俱不可多食。有孔者不可食。誤食中其毒。令人身面青腫。腹痛胸脹。是謂中豬肝毒。

【病狀】

身面青腫 中豬肝毒。其人身面青腫。腹痛胸脹。目難遠視。食即吐出。煩躁。夜不能眠。

【變症】

胸中脹滿如壓巨石 中豬肝毒失治。毒氣壅滯。身面青腫益甚。腹劇痛。胸中脹滿。如壓巨石。煩躁。夜不能

眠。食入即吐出。有生命危險。

【療法】

一、身面青腫之療法 中豬肝毒。其人身面青腫。腹痛胸脹。目難遠視。食即吐出。煩躁。夜不能眠。速與地漿湯服之。或以熟豬油一斤拌飯。或炒飯亦可。分作二三日食盡。勿食別物。

二、胸中脹滿如壓巨石之療法

中豬肝毒失治。毒氣壅滯。身面青腫益甚。腹劇痛。胸中脹滿。如壓巨石。煩躁。夜不能眠。食入即吐出。有生命危險。速與大劑地漿湯服之。或服大劑大黃山查湯。均有神效。

【調養】

一、忌食悶氣發物 中豬肝毒。忌食悶氣之品。如山芋、芋艿、栗子等。並

忌食發物。如雞鵝羊肉。蚌蛤河豚。蝦蟹海腥麵食等。一年內。尤不可食豬肝。否則病必復發。

二、宜以山查泡飲。中豬肝毒愈後。其人胸腹間。猶有餘脹。此毒未清也。調養之法。宜以山查泡飲代茶。苟常飲之。餘毒自清。便可斷根。

三、預防法。預防中豬肝毒法。煮豬肝時。不可用桑木椿木。不可與魚膽鯉魚腸子鷄鴨等同食。有孔者切勿食之。平常者亦以少食為妙。可免中毒也。

### 中蛇毒類

#### 【病源】

蛇有毒。蛇係爬蟲類。有毒。其毒在頭尾骨三處。如食蛇肉時。遺其骨

於肉內。誤食之。立中其毒。或蛇遺毒在水中。誤飲。中其毒者。均令人兩目昏花。四肢無力。心神昏迷。口吐白沫。是謂中蛇毒病。

#### 【病狀】

兩目昏花。中蛇毒。其人兩目昏花。四肢無力。心神昏迷。口吐白沫。

#### 【變症】

毒延臟腑。中蛇毒失治。毒氣蔓延。攻陷臟腑。必臨煩詭語。心神迷亂。口角流涎而死。

#### 【療法】

兩目昏花之療法。中蛇毒。其人兩目昏花。四肢無力。心神昏迷。口吐白沫。速以開水沖服雄黃散。使可無礙。

又方。以煙油（又名煙屎。即旱煙桿中煙氣結成如醬者是。煙桿以用過多年者佳）用冷水洗出二三碗飲之。凡受蛇毒。飲之其味必甜。並不難飲。屢試如神。或蛇遺毒在食物內亦效。

#### 【調養】

一、忌食發物。中蛇毒。忌食發物。如雞鵝羊肉。蝦蟹海腥。蚌蛤河豚麵食等。

二、宜飲沸水。預防中蛇毒。凡飲水必取沸者。小河溝水。及一切不潔淨之水。俱不可取飲。食蛇肉時。宜收拾潔淨。切不可雜入蛇骨蛇涎。即潔淨蛇肉。亦以少食為妙。

三、救治宜速。中蛇毒。最為危急。

救治宜速。遲則毒攻臟腑。每不可救。切須注意。

### 中蜈蚣毒類

#### 【病源】

食物中遺蜈蚣毒。蜈蚣味辛性溫。有毒。若食物中遺有蜈蚣毒。或誤吞蜈蚣入腹。令人腹痛如絞。冷汗如雨。是謂中蜈蚣毒病。

#### 【病狀】

腹痛如絞。中蜈蚣毒。令人腹痛如絞。冷汗如雨。

#### 【變症】

目上翻。中蜈蚣毒失治。毒攻臟腑。腹痛如絞。刻不可忍。目上翻。有生命危險。

#### 【療法】

一、腹痛如絞之療法。中蜈蚣毒。令人腹痛如絞。冷汗如雨。速以樟樹葉煎湯冷服。極效。或以生公雞血乘熱飲之。

又方。以十指甲磨冷水多多飲之。又方。速飲地漿湯。

誤吞蜈蚣入腹。急吞生雞子二枚。次日蛋白即裹蜈蚣出。或於吞雞子後。略遲片時。飲生油一盞。即吐出。或以生公雞熱血灌之。均有神效。

二、目上翻之療法。中蜈蚣毒失治。毒攻臟腑。腹痛如絞。刻不可忍。目上翻。有生命危險。速飲大劑樟樹葉湯。或服二三碗熱雞血。始得出險。

【調養】

一、勿飲隔夜茶水。預防中蜈蚣

毒。一切隔夜之茶水。切勿飲之。凡食物必須以罩罩住。切勿露於外面。自可免中其毒也。

#### 二、忌食海腥

中蜈蚣毒。忌食蠶蟹海腥。牛羊鵝肉。蚌蛤河豚麩食等。

三、宜食生雞子。中蜈蚣毒愈後。其人腹中猶有餘痛。此毒未清也。調養之法。宜食生雞子。連服三四日。自可完全痊可。

#### 【病源】

### 中蜈蚣毒類

誤吞蜈蚣。蜈蚣。一名水蛭。係卵生蟲類。味鹹苦。性平有毒。產於池溝

溜水之中。體黃褐色。有黑線。形略似蚯蚓。有輪紋甚多。口隆有緣如鋸齒。

好附人畜而吮其血。江蘇、浙江、山東

諸省。產生最多。誤吞生者入腹。則生子嘔血。腸痛肌瘦。是謂中螞蝗毒病。

【病狀】

腹痛難忍。中螞蝗毒。螞蝗入腹。化生日多。食人肝血。腹痛難忍。面黃肌瘦。

【發症】

肌肉消削。中螞蝗毒失治。為日既久。化生益多。食血益劇。其人面色枯白。肌肉消削。若大肉陷下。大骨枯槁。死不治也。

【療法】

腹痛難忍之療法。中螞蝗毒。螞蝗入腹。化生日多。食人肝血。腹痛難忍。面黃肌瘦。速以田中泥一兩。雄黃二錢為丸。分四服。開水下。螞蝗即鑽

中禽獸蟲魚毒錄

入泥中。隨大便而出。外以麻油塗肛門。誘蟲聞香而出。

又方。以桂圓肉（荔枝肉亦可）包煙油吞之。螞蝗即從大便出。

又方。以活小魚數條。豬脂二兩。加田泥共搗為丸。涼水下。

又方。以青靛調水飲。即瀉出。

又方。以藜蘆炒末。水調一錢下。即吐出。

又方。以白靈頻類食之。至三斤即效。

又方。以羊肉頻類食之。

【調養】

一、忌食蝦蟹。中螞蝗毒。忌食蝦蟹海腥。雞鴨羊肉。蚌蛤河豚麵食等。

二、大便艱難之調養法。中螞蝗

毒。其人大便艱難。調養之法。宜時服白蜜。螞蝗火燒為末。見水即活。惟以蜜浸之。即化為水。故服蜜最佳。以多為妙。少則不效。如食蜜不愈。更食羊肉可化。

三、救治宜速。中螞蝗毒救治宜速。遲則病根深伏。化生日多。血分益耗。必無藥可救也。

中田螺毒類

【病源】

多食田螺。田螺味甘。性大寒。多食後。令人腹中絞痛。口吐白沫。是謂中田螺毒病。

【病狀】

腹中絞痛。中田螺毒。其人腹中絞痛。延及心胸。痛不可忍。口吐白沫。

一八五

飲食不思。宜速治。失治則毒毒壅盛。腹內劇痛。連及心胸。宛轉呼號。刻不可忍。手足逆冷。若冷至節。死不治。

【療法】

腹中絞痛之療法 中田螺毒。其人腹中絞痛。延及心胸。痛不可忍。口吐白沫。飲食不思。速以鴉涎灌之。或服冰片散。均有神效。

【調養】

一、忌食生冷 中田螺毒。忌食生冷水果硬物。及一切悶氣滯氣之品。如山芋、芋芳、栗子、麵食等。  
二、宜以陳皮泡飲 中田螺毒愈後。其人胸腹間猶有餘悶。此寒氣未盡解也。調養之法。宜以陳皮泡飲代茶。自能行氣散寒。漸漸斷根。

三、宜和薑椒同煮 煮田螺時。宜加入薑椒同煮。可辟寒氣。而尤宜少食。可免中毒。

中蟹毒類

【病源】

誤食毒蟹 蟹味鹹性寒。有小毒。不可和柿及荊芥食。有六足者名虵。四足者名牝。螯小如石者名蚌江。居於蚌腹者名蟻奴。又名蟹奴。又名寄居蟹。能飛者名飛蟹。色紅者名紅蟹。以及獨目獨螯。兩目相向。腹下有毛。腹中有骨。頭背有星點。足斑目赤者。均有毒。不可食。誤食中其毒者。心腹絞痛。口吐白沫。是謂中蟹毒病。

【病狀】

心腹絞痛 中蟹毒。其人心腹絞

痛。口吐白沫。四肢逆冷。

【變症】

指甲青紫 中蟹毒失治。寒毒壅盛。心腹絞痛益劇。口吐白沫。四肢厥冷。指甲青紫。此毒攻臟腑。無藥可治也。

【療法】

一、心腹絞痛之療法 中蟹毒。其人心腹絞痛。口吐白沫。四肢逆冷。速與紫蘇生薑湯。

二、指甲青紫之療法 中蟹毒失治。寒毒壅盛。心腹絞痛益劇。口吐白沫。四肢厥冷。指甲青紫。此毒攻臟腑。無藥可治也。雖然。未可棄而不治。姑與大劑紫蘇生薑湯。或可挽回。

【調養】



一、忌食生冷 中蟹毒、忌食生冷  
水果硬物。及一切悶氣滯氣之品。如  
山芋、芋莠、栗子、麵食等。

二、宜以陳皮泡飲 中蟹毒愈後。  
其人胸腹間猶有餘悶。此寒氣未盡  
解也。調養之法。宜以陳皮泡飲代茶。  
自能行氣散寒。漸漸斷根。

三、切宜少食 煮蟹時。宜加入紫  
蘇生薑同煮。可辟解毒。不可和柿  
及荊芥食。有毒者。切勿入口。即平常  
無毒者。亦以少食爲妙。可免中毒也。

### 中黃白鱉毒類

#### 【病原】

食鱉後復食荊芥 黃白鱉肉。味  
甘性大溫。無毒。惟食鱉後。又食荊芥。  
必中其毒。若黃鱉白鱉。昂頭出水者。

中食獸毒魚毒類

此係毒蛇所發。有大毒。誤食之必死。

#### 【病狀】

心腹絞痛 中黃白鱉毒。其人心  
腹絞痛。口吐白沫。面脫色。目直視。不  
能言語。

#### 【變症】

指甲青黑 中黃白鱉毒失治。毒  
攻臟腑。心腹疼痛。猶如刀割。口吐白  
沫。目直視。不能言語。指甲青黑。此毒  
氣深陷。無藥可救也。

#### 【療法】

心腹絞痛之療法 中黃白鱉毒。  
其人心腹絞痛。口吐白沫。面脫色。目  
直視。不能言語。速以藍靛汁灌之。或  
服地漿湯。均有神效。

又法。以生螃蟹搗融。沖冷水飲之。

立可獲救。以鱉性大溫。鱉性大寒。寒  
能制熱。且善行散。故能解毒如神也。

#### 【調養】

一、忌食海腥 中黃白鱉毒。忌食  
蝦豚海腥。雞鵝牛羊肉。麵食等。並不  
可食荊芥。

二、胃納不佳之調養法 中黃白  
鱉毒愈後。其人胃口不開。納穀不平。  
調養之法。當服穀麥芽湯。以運中開  
胃。

三、調和氣血 中黃白鱉毒愈後。  
其人氣血大傷。而黃肌瘦。精神不振。  
調養之法。當服八珍湯。

### 中蝦蟇毒類

#### 【病原】

中蝦蟇之寒毒 蝦蟇。似蟾蜍而

一八七

小。(其大者曰田父。幼蟲曰蝻蚪)

居波澤中。體暗褐色。背有黑點。亦有  
斑如蟾蜍。味辛性寒。有毒。誤食之。中  
其毒。令人噎膈吐食。胸腹絞痛。是  
謂中蝦蟇毒病。

【病狀】

噎膈吐食。中蝦蟇毒。令人噎膈  
吐食。胸腹絞痛。口吐白沫。不能言語。

【癡症】

目直視。中蝦蟇毒失治。毒氣壅  
盛。攻陷臟腑。令人神智昏迷。目直視。  
不知痛癢。不言語。危在頃刻。

【療法】

一、噎膈吐食之療法。中蝦蟇毒  
令人噎膈吐食。胸腹絞痛。口吐白沫。  
不能言語。速飲白馬尿。或服淡豆豉

湯。均有神效。

二、目直視之療法。中蝦蟇毒失  
治。毒氣壅盛。攻陷臟腑。令人神次昏  
迷。目直視。不知痛癢。不言語。危在頃  
刻。速灌大劑淡豆豉湯。或可有救。如  
牙關緊閉。宜以竹篾撬之。忌用鐵器。

【調養】

一、忌食水果。中蝦蟇毒。忌食生  
冷水果硬物。麵食。山芋。芋。栗。子。魚  
鱉等。

二、宜和胃氣。中蝦蟇毒愈後。其  
人時時吐呃者。此胃氣未和也。宜和  
胃氣。當服半夏和胃湯。

三、宜以香櫞泡飲。中蝦蟇毒愈  
後。其人胸腹間時時作痛。此寒毒未  
盡也。調養之法。宜以陳香櫞泡飲代

茶。苟常飲。自可斷根。

中沙蟲毒類

【病原】

誤吞沙蟲。沙蟲。湘。較。上游。多有  
之。生毒蛇鱗甲中。有劇毒。蛇被其擾。  
苦極。每入急流中。衝濯。將其衝出。人  
誤吞之。中其毒。是謂中沙蟲毒病。

【病狀】

眼花心亂。中沙蟲毒。其人眼花  
心亂。口吐白沫。昏昏沉沉。不能言語。  
宜速治。否則三日內必死。

【療法】

眼花心亂之療法。中沙蟲毒。令  
人眼花心亂。口吐白沫。昏昏沉沉。不  
能言語。宜以萹蓄菜(即蕎麥菜)  
搗汁飲之。

【調養】

一、宜飲沸水。預防中沙蟲毒。飲水首要注意。凡一切小河濁水。俱勿取飲。凡各茶湯。俱宜煮沸。毒物被煮死。此種病自不生矣。

二、忌食生冷。中沙蟲毒。忌食生冷水果硬物。麵食。山芋。芋艿。栗子。魚鱉等。

三、宜和胃氣。中沙蟲毒愈後。其人時時嘔吐者。此胃氣受傷。未復元也。調養之法。宜服半夏和胃湯。

中各種蟲毒類

【病原】

誤吞各種無名之蟲。其人誤吞各種無名之蟲。而中其毒。是謂中各種蟲毒。

【病狀】

飯食不思。中各種蟲毒。令人心腹絞痛。飯食不思。面色脫。口吐白沫。

【變症】

指甲青紫。中各種蟲毒失治。毒氣壅滯。心腹痛益劇。猶如刀割。口吐白沫益多。指甲青紫。此毒氣攻臍。無藥可救也。

【療法】

飯食不思之療法。中各種蟲毒。令人心腹絞痛。飯食不思。面色脫。口吐白沫。速以白鴨（如無白鴨他種鴨亦可）殺之。取其血漿熱飲之。毒立解。神效。

【調養】

一、忌食魚鱉。中各種蟲毒。忌食

生冷水果硬物。麵食。山芋。芋艿。栗子。魚鱉等。

二、胃納不佳之調養法。中各種蟲毒愈後。其人胃納不佳。精神不振。此胃氣受傷之故。法宜和胃。當服香櫛和胃湯。

三、不可飲濁水。小河濁水。毒蟲最多。不宜取飲。取必大河潔流。且須百沸。則此種病自可免也。

中河豚毒類

【病原】

誤食河豚子。河豚產於水之鹹淡相交處。小口大腹。無鱗。背淡蒼色。有濃黑斑文。腹白色。有物觸之。則腹大如球。浮於水面。其肉味極美。然其卵巢中含有毒質。食之往往令人昏

沉腹脹而死。是謂中河豚毒病。

【病狀】

四肢麻木 河豚血令人麻。子令人眼。眼令人昏。中其毒者。四肢麻木。腹脹如鼓。心神昏憤。口渴。

【變症】

毒攻臟腑 中河豚毒宜速治。遲則毒攻臟腑。腹脹欲死。每不可救。

【療法】

四肢麻木之療法 中河豚毒。令人四肢麻木。腹脹如鼓。心神昏憤。口渴。速多食鮮青橄欖。(如無鮮青橄欖以其陳核磨水服亦可)或服蘆根汁亦可解救。

又方。中河豚毒如病勢危急。一時不得橄欖汁或蘆根汁。速取人糞汁

或金汁灌之。亦得解救。

又方。槐花煎濃汁服之。

又方。地漿汁多多灌之。

又方。槐花微炒。同乾胭脂等分。搗成粉。冷水調服。如加入橄欖生甘尤佳。

又方。飲真麻油一二杯。

又方。口渴不止者。宜飲小便坑中水一杯。

【調養】

一、忌食麵食 中河豚毒。忌食一切悶氣滯氣之品。如山芋、芋莠、栗子、麵食、硬物等。

二、餘毒未清 中河豚毒愈後。其人腹中猶有餘脹。此毒未清也。調養之法。可再食五六枚橄欖。自可完全

斷根。

三、預防法 預防中河豚毒。魚子、魚血、魚眼。必須完全收拾潔淨。不可使絲毫存留。烹時宜收拾椽塵。使不能墜於釜中。自可不中毒也。

中各種魚毒類

【病源】

誤食有毒之魚 凡魚之投地不污塵土者。狗不食。鳥不啄者。頭中無腦者。頭似有角者。頭正白如連珠。至脊上者。目合者。均不可食。肉臭者。食之傷人。無腸膽者。食之男子三年陽不舉。女子絕產。不可合雞肉及鷓鴣肉食。以上毒魚。人誤吞之。每中其毒。是謂中各種魚毒。

【病狀】

心中煩亂 中各種魚毒。令人心  
中煩亂。腹中脹滿。面色黃。

【變症】

口吐白沫 中各種魚毒失治。毒  
氣壅盛。心煩益劇。夜不得眠。腹中脹  
悶。口吐白沫。至爲困苦。

【療法】

一、心中煩亂之療法 中各種魚  
毒。令人心煩亂。腹中脹滿。面色黃。  
速宜多食檸檬。並以橄欖核磨水  
服之。或以紫蘇煎濃汁冷服。俱有神  
效。

二、口吐白沫之療法 中各種魚  
毒失治。毒氣壅盛。心煩益劇。夜不得  
眠。腹中脹悶。口吐白沫。至爲困苦。速  
以魚鱗燒灰研末。臨臥冷沸水調服

二錢。朝以紅麴煮爛服。則毒自大便  
出。

【調養】

一、三年內不可食魚 中各種魚  
毒。忌食生冷水果硬物。雞鴨牛羊肉  
麪食等。三年內不可食魚類。否則病  
必復發。

二、胃納不佳之調養法 中各種  
魚毒愈後。其人胃口不開。納穀平平。  
面色萎黃。此脾胃不和也。調養之法。  
宜服穀麥芽湯。

三、預防法 預防中各種魚毒。凡  
一切異類奇形之魚。切勿食之。即平  
常無毒之魚。煮時亦宜和入紫蘇蔥  
薑等物。則可解去寒氣。且防中毒也。

中鱉魚毒類

【病源】

誤食有毒鱉魚 鱉魚味甘性平。  
宜取產沙河中者。斷頭去血。桑灰湯  
煮熟。去骨甲。後換水煮。入蔥薑食。忌  
豬兔鴨諸肉。及苜蓿。芥子。薄荷。凡三  
足者。兩頭者。赤足者。獨目者。頭足不  
縮者。其目凹陷者。腹下有王字卜字  
或蛇紋者。生山上者。均有毒。不可食。  
且性冷難化。若脾胃虛弱。及冷勞癥  
瘕。婦人妊娠。均忌之。凡誤食毒鱉中  
毒者。令人心腹絞痛。噎膈翻胃。口吐  
白沫。是謂中鱉魚毒病。

【病狀】

噎膈翻胃 中鱉魚毒。令人心腹  
絞痛。猶如刀割。噎膈翻胃。口吐白沫。  
牙關咬緊。不能言語。

【變症】

痰如水雞聲 中鰲魚毒失治。毒氣益盛。攻陷臟腑。其人心腹痛如刀割。刻不可忍。口吐白沫益多。牙關緊閉。不能言語。喉中痰如水雞聲。指甲青黑。死不治也。

【療法】

一、噎膈翻胃之療法 中鰲魚毒。令人心腹絞痛。猶如刀割。噎膈翻胃。口吐白沫。牙關咬緊。不能言語。宜以竹篾撬開牙關。(切不可用鐵器)速以淡豆豉一合。槌爛。冷水沖入。取汁服。或飲白馬尿一碗。均有神效。若毒氣壅盛。速服白芷雄黃湯。亦頗有效。

二、痰如水雞聲之療法 中鰲魚

毒失治。毒氣益盛。攻陷臟腑。其人心腹痛如刀割。刻不可忍。口吐白沫益多。牙關緊閉。不能言語。喉中痰如水雞聲。指甲青黑。死不治也。雖然。未可棄也。速以竹篾撬開牙關。然後灌以白芷雄黃湯。待痰除痛止。便可無礙。

【調養】

一、忌食生冷 中鰲魚毒。忌食生冷水果硬物。雞鵝牛羊肉麪食。魚腥蝦蟹等。三年內不可食鰲肉。否則病復發也。

二、宜服半夏和胃湯 中鰲魚毒愈後。其人胃氣受傷。時時嘔吐。納穀不佳。調養之法。宜服半夏和胃湯。

三、宜和葱薑同煮 凡煮鰲。宜加入葱薑紫蘇等同煮。則既辟寒氣。又

可防毒。一切異類奇形之鰲。切勿食之。即平常鰲肉。亦以少食為佳。自可免中毒也。

中游波蟲毒類

【病原】

誤食游波蟲 游波蟲形似海蛤。其殼骨相似。惟面上無光為辨。有毒。若誤食。每令人狂走。是謂中游波蟲毒病。

【病狀】

似有祟狀 中游波蟲毒。令人狂走。若欲投水。似有祟狀。

【變症】

面赤目赤 中游波蟲毒失治。毒氣壅盛。其人面赤目赤。狂走投水。無所不作。或登高而呼。或棄衣而奔。不

能遏制。

【療法】

一、似有祟狀之療法 中游波蟲毒。令人狂走。若欲投水。似有祟狀。速飲酸醋一小杯。其毒立解。

二、面赤目赤之療法 中游波蟲毒失治。毒氣壅盛。其人面赤目赤。狂走投水。無所不作。或登高而呼。或棄衣而奔。不能遏制。速飲酸醋一中杯。或服海蛤湯。均有神效。

【調養】

一、忌食煎炒 中游波蟲毒。忌食煎炒炙燥。辛辣香燥。雞鶉牛羊肉。河豚蝦蟹等物。

二、夜眠不安之調養法 中游波蟲毒愈後。其人夜眠不安。肝火自升。

調養之法。宜和肝平火。當服蛤壳平肝湯。

三、口渴之調養法 中游波蟲毒愈後。其人時時口渴。舌無苔。光紅。此陰液傷也。調養之法。宜服洋參花柳湯。

結論

中禽獸蟲魚毒證各病。俱由誤食有毒之物而成。如鴉係有毒之品。則大衆所知者。而鴉鵲亦有毒。則大衆所不知者。鴉肉之毒。毒在嫩肉。鴉肉之毒。毒在多食。雞肉亦有毒。毒在有特殊之形。如五色者。玄身白首者。六指者。有四距者。死而足曲者。此皆有毒。不可食。野雞係野味。自然多毒。鴿鵝本係毒品。犬肉雖無毒。然有特殊

之形態者亦有毒。如懸蹄犬。赤股而躁者。目赤者。瘦者。死而不出舌者。此皆有毒者不可食。馬肉本係有毒之品。而生角者。無夜眼者。白身青蹄者。白身黑頭者。黑脊斑臂者。馬鞍下肉色黑。及自死者。其毒尤烈。切不可食。牛肉雖屬無毒。然自死者。病死者。則有劇毒。切不可食。羊若係白身黑頭。黑身白頭。及獨角四角者。皆有毒。不可食。豬有小毒。而落水浮者。自死者。病死者。則有大毒。均不可食。豬肝有孔者。不可食。蛇之毒。毒在頭尾骨三處。蜈蚣有毒。切不可食。螞蝗善吮血。田螺性大寒。雖無毒。惟不可多食。蟹有小毒。若六足者。四足者。蟹小如石者。居於蚌腹者。飛者。色紅者。獨目者。

獨螫者。兩目相向者。腹下有毛者。腹中有骨頭者。背有星點者。足斑目赤者。此俱有劇毒。不可誤食。黃白鱗中有昂頭出水者。此係毒蛇所變。不可誤食。蝦蟇性寒有毒。不可食。沙蟲係毒蛇鱗甲內物。自然有劇毒。各種不知名之蟲類。必有毒質。決不可誤吞。河豚之毒。毒在血眼子。不可遇垂塵。魚類中如有投地不染污塵者。狗不食。鳥不啄者。頭中無腦者。頭似有角者。頭正白如連珠至脊上者。目合者。肉臭者。無腸膽者。俱有劇毒。切不可食。鱉魚中凡三足者。兩頭者。赤足者。獨目者。頭足不縮者。其目凹陷者。腹下有王字卜字者。或有蛇紋者。生山上者。此皆毒蛇所化。有大毒。切不可

食。游波蟲形似海蛤。惟面上無光。有毒。不可食。以上在有毒之處。細細注意。不輕吞食。自可免中毒也。

中禽獸蟲魚毒證各

方淺解類

【中鳩毒類各方】

(一)犀角汁方(千金方)

真烏犀角三錢。(重者可用五

六錢)

右一味。以冷湯水磨汁服。

【淺解】本方犀角味鹹苦性大

寒。善解各種毒熱。

(二)金銀花寒水石湯(證治準

繩方)

金銀花八兩。白礬三錢。寒

水石三錢。天花粉三錢。石

蒼蒲二錢。麥冬五錢。

右以水十二碗。先煮金銀花。取五碗。再加入白礬。寒水。花粉。蒼蒲。麥冬。同煮。取一碗。去渣。待冷頓服。

【淺解】本方以金銀花為全方

之主。解鳩毒也。佐以寒水。花粉之清熱。白礬。蒼蒲之辟穢。麥冬之和陰。則搭配平均。功力益著。

此方為貧窮者設。以上方雖極有效。然價值奇昂。終非窮措大所能辦到也。

(三)銀花泡飲方(冰玉堂驗方)

金銀花五錢。

右一味。每日以百沸水泡飲代茶。

直服至毒清為度。

【淺解】本方銀花味甘性寒。善



解鴆毒。淹飲而不煎。則氣味輕清。更較和平也。

【中鴉鴉毒類各方】

(一) 糯米湯 (驗方)

糯米八兩。

右一味。以沸水淘之。去米。用水。溫

服一碗。

【淺解】 本方糯米味甘性溫。善

解鴉鴉之毒。

(二) 秫米湯 (沈氏尊生書方)

北秫米六錢。

右一味。以水五碗煮。取一碗。去渣。

待溫順服。

【淺解】 本方秫米味甘性涼。善

解鴉鴉之毒。惟藥性和平。故能善後

而不能治病劇時也。

【中雞毒類各方】

(一) 地漿湯 (串雅方)

見百藥毒證各方淺解類。

(二) 大劑地漿湯 (串雅方)

見百藥毒證各方淺解類。

【中野雞毒類各方】

(一) 犀角散 (千金方)

即犀角汁方。見本證中鴉鴉毒類

各方淺解。

(二) 銀花寒水石湯 (證治準繩

方)

見本證中鴉鴉毒類各方淺解。

(三) 參犀湯 (冰玉堂驗方)

人參三錢。真烏犀角三錢。

(重者) 人參五錢。真烏犀角六

錢。

右二味。先以水五碗煮人參。取一

碗。去渣。再以犀角磨成汁。和入湯中

頓服。

【淺解】 本方以犀角解野雞毒。

用人參挽回將絕之元氣。

(四) 參銀湯 (驗方)

人參三錢。金銀花八錢。

右以水七碗。先煮銀花。取三碗。去

渣。加入人參再煮。取一碗。去渣。頓服。

【淺解】 本方以銀花解野雞毒。

用人參挽回將絕之元氣。意義與上

方略同。而藥價則較廉。

(五) 銀花泡飲方 (冰玉堂驗方)

見本證中鴉鴉毒類各方淺解。

【中鴉鴉毒類各方】

(一) 生甘地漿湯 (驗方)

生甘草三錢。

右以水五碗煮取一碗。去渣。待冷和入地漿湯頓服之。(地漿湯見百藥毒證各方淺解類)

〔淺解〕 本方生甘草地漿俱能消解百毒。故治鴉鴉毒病。有神效也。

(二)生甘草湯(驗方)  
生甘草四錢。

右一味。以水五碗煮。取一碗。去渣。待冷頓服。

〔淺解〕 本方生甘草善解百藥之毒。且能解鴉鴉毒。

(三)甘草生薑湯(驗方)  
生甘草四錢。生薑四錢。

右二味。以水八碗煮。取二碗。去渣。待冷。分二次服之。

〔淺解〕 昔有人喜食鴉鴉。後喉間生癰潰爛。膿血不止。百藥不效。一僧令先用老薑一斤。陸續煎水服完。然後下生肌藥治之。遂愈。蓋鴉鴉喜食半夏苗。人食其肉後。半夏毒發。故中毒。而薑善解半夏毒。故以薑治愈也。今祖其法。復加入甘草。則解毒之力愈善。效愈速矣。

(四)大劑生甘草地漿湯(驗方)  
即於上生甘草地漿湯內分量加重一倍。煎服各法。概依原方。

(五)大劑生甘草湯(驗方)  
即於上生甘草湯內分量加重一倍。煎服各法。概依原方。

(六)大劑甘草生薑湯(驗方)  
即於上甘草生薑湯內。分量加

重一倍。煎服各法。概依原方。

【中大肉毒類各方】  
(一)雪羹湯(王孟英方)  
陳海蜆四兩。(漂淡) 鮮地 粟六枚。

(七)生甘草泡飲方(驗方)  
即百藥毒證之生甘草湯。

右以水七碗。先煮海蜆。待焯盡。加入地栗再煮。取一碗。去渣。待冷頓服。

〔淺解〕 本方海蜆味鹹性寒。地栗味甘性寒。俱能化痰清熱。寬胸利膈。最善解犬肉毒。

(二)茅蘆湯(王孟英方)

白茅根六錢。(去心) 鮮蘆

根六錢。(去節)

右二味以水八碗煮。取二碗。去渣。

分二次冷服。

【淺解】 本方蘆根茅根。俱係清

熱解毒之品。善解犬肉毒也。

(三)豆豉杏仁散(驗方)

淡豆豉二兩。杏仁三兩。

右二味。同蒸。搗爛服之。日二三

【淺解】 本方豆豉味甘苦。性微

溫。杏仁味苦。性溫。俱善解犬肉毒也。

(四)大劑雪羹湯(王孟英方)

陳海蜆八兩。(漂淡) 鮮地

粟十二枚。

右以水十六碗。先煮海蜆。待蜆盡。

加入地栗再煮。取二碗。去渣。待冷分

二次服。

【淺解】 本方即雪羹湯原方。分

量加重一倍者。欲其藥力峻急。挽回

危症也。

(五)蘆根泡飲方(冰玉堂驗方)

鮮蘆根五錢。

右一味。以百沸水泡飲代茶。

【淺解】 本方蘆根味甘性寒。清

熱通氣。治犬肉毒有特效。

【中馬肉毒類各方】

(一)豆豉杏仁散(驗方)

見本證中犬肉毒類各方淺解。

(二)雪羹湯(王孟英方)

見本證中犬肉毒類各方淺解。

(三)人乳汁方(王孟英方)

人乳時時飲之。

【淺解】 人乳味甘性平。善解馬

肉毒。

(四)茅蘆湯(王孟英方)

見本證中犬肉毒類各方淺解。

(五)大劑豆豉杏仁散(驗方)

即將豆豉杏仁散原方分量加

重一倍服。

(六)大劑雪羹湯(王孟英方)

見本證中犬肉毒類各方淺解。

(七)蘆根泡飲方(冰玉堂方)

見本證中犬肉毒類各方淺解。

【中牛肉毒類各方】

(一)稻草湯(本草綱目方)

旱稻草六錢。

右一味。以水八碗煮。取二碗。去渣。

分二次溫服。

〔淺解〕 本方早稻草消牛肉積而解毒。

(二) 消肉化毒丹(證治準繩方)

山查三錢。神麩三錢。大黃

三錢。雷丸三錢。枳壳一錢。

厚朴一錢。

右以水七碗煮。取一碗。去渣。一次溫服。

〔淺解〕 本方山查、神麩、大黃、枳

壳、厚朴、消化肉積以解毒。雷丸殺蟲

毒而辟邪。

(三) 甘草稻草湯(李氏方)

生甘草四錢。早稻草六錢。

右二味。以水九碗煮。取二碗。去渣。

分二次溫服。

〔淺解〕 本方稻草消牛肉積。生

甘解牛肉毒。

(四) 大劑消肉化毒丹(證治準

繩方)

山查六錢。神麩六錢。大黃

六錢。雷丸六錢。枳壳二錢。

厚朴二錢。

右以水十二碗煮。取三碗。去渣。分二次溫服。

〔淺解〕 本方即消肉化毒丹原

方。分量加重一倍。藥力峻急。挽救危

難。

【中羊肉毒類各方】

(一) 栗子壳湯(李氏方)

栗子壳五錢。

右一味。以水六碗煮。取一碗。去渣。

順服。

〔淺解〕 本方栗子壳味辛甘。性溫燥。善消羊肉積。且能解毒。

(二) 生甘草湯(驗方)

見本證中鷓鴣毒類各方淺解。

(三) 大劑栗子壳湯(李氏方)

即栗子壳湯原方。分量加重一

倍。煎服各法。概依原方。

(四) 大劑生甘草湯(驗方)

見本證中鷓鴣毒類各方淺解。

(五) 生甘草泡飲方(驗方)

見本證中鷓鴣毒類各方淺解。

【中豬肉毒類各方】

(一) 豬牙灰散(千金方)

豬牙燒灰爲末。

右每服一錢。開水調下。

〔淺解〕 本方豬牙灰善消豬肉

毒。

(二)大黃山查湯(沈氏方)

大黃三錢。山查三錢。神麩

三錢。枳壳二錢。檳榔二錢。

右以水五碗煮。取一碗半。去渣。分二次溫服。

〔淺解〕 本方大黃、山查、神麩、枳壳、均善消肉積而利氣。

(三)杏仁汁方(李氏方)

光杏仁六錢。

右一味。搗汁飲之。

〔淺解〕 本方杏仁味苦性溫。寬胸潤腸。善解豬肉毒。

(四)山查泡飲方(冰玉堂驗方)

焦山查四錢。

右一味。以百沸水泡飲代茶。

中禽獸蟲魚毒證

〔淺解〕 本方焦山查味酸甘。性溫。善消豬肉積而解毒。泡飲則藥味

輕清。去病而不傷正。可以常飲。

(五)大劑大黃山查湯(沈氏方)

大黃六錢。山查六錢。神麩

六錢。枳壳四錢。檳榔四錢。

右以水八碗煮。取二碗。二次溫服。

〔淺解〕 本方即大黃山查湯原方。分量加重一倍者。欲其藥力峻急。挽救危難也。

【中豬肝毒類各方】

(一)地漿湯(串雅方)

見百藥毒證各方淺解類。

(二)熟豬油拌飯方(驗方)

熟豬油一斤。

右一味。以拌飯食。或炒飯食。分作

一二日食盡。勿食別物。

〔淺解〕 本方豬油善滑腸。消肉積。解肝毒。

(三)大劑大黃山查湯(沈氏方)

見本證中豬肉毒類各方淺解。

(四)山查泡飲方(冰玉堂驗方)

見本證中豬肉毒類各方淺解。

【中蛇毒類各方】

(一)雄黃散(證治準繩方)

雄黃三錢。

右一味。以冷沸水調之。頓服。

〔淺解〕 本方雄黃味辛性熱。善殺蛇虺。解一切毒。

(二)煙油方(本草綱目方)

煙油(又名煙屎。即旱煙桿中

煙氣結成如糞者是。煙桿以用

過多年者佳)

右一味。以冷沸水洗出二三碗飲之。

〔淺解〕 煙油爲五行之氣相合而生。外丹用以點藥金。可益金色。燃燈代油。則一切毒蟲皆不敢近。投入水中。能毒水族蟲蛇至死。雖蛟龍之強。亦多畏避。故殺蟲解毒之功。尤屬擅長。以舊竹桿撈取者良。梅條、藤條、紫椴、烏木、老鶴草、及純銅、純銀桿中者次之。在象牙桿中者。可殺蟲毒。橄欖木桿中者。可以毒魚。但其力量又各隨所吸煙質而高下。以純葉不雜之原料所集成者爲上品。如雜有素馨葉。或以礬紅鑲成絲。再加薑黃末。以和其色者。則油力甚薄。不堪用也。

【中蜈蚣毒類各方】

(一) 樟樹葉湯 (本草綱目方)

樟樹葉五錢。

右一味。以水五碗煮。取一碗。去渣待冷頓服。

〔淺解〕

本方樟樹葉。味辛性溫。

善解蜈蚣毒。

(二) 生公雞血方 (驗方)

以活公雞一隻殺之。取其血。乘熱飲之。

〔淺解〕

雞與蜈蚣。爲互相刑尅之物。二物不能相居一處。故雞生時

欲食蜈蚣。雞死後亦被蜈蚣食也。今藉其相制之性。用以解毒。自有不可思議之功效。

(三) 指甲方 (串指方)

十指甲以冷沸水磨。多多飲之。

〔淺解〕

本方指甲味甘鹹。善解蜈蚣毒。

(四) 地漿湯 (串雅方)

見百藥毒證各方淺解類。

(五) 雞子方 (驗方)

以生雞子二枚吞之。次日毒即裏出。或於吞雞子後。略遲片時。飲生油一盞。毒即吐出。

〔淺解〕

本方與生公雞血方意義略同。藉其相制之力。以收功效。服後復飲生油者。蓋欲使咽喉潤澤。毒物易於吐出也。

〔淺解〕

本方與生公雞血方意義略同。藉其相制之力。以收功效。服後復飲生油者。蓋欲使咽喉潤澤。毒物易於吐出也。

(六) 大劑樟樹葉湯 (本草綱目方)

樟樹葉一兩。

以生公雞一隻殺之。取其血。乘熱飲之。

以生雞子二枚吞之。次日毒即裏出。或於吞雞子後。略遲片時。飲生油一盞。毒即吐出。

〔淺解〕

本方與生公雞血方意義略同。藉其相制之力。以收功效。服後復飲生油者。蓋欲使咽喉潤澤。毒物易於吐出也。

(六) 大劑樟樹葉湯 (本草綱目方)

樟樹葉一兩。

以生公雞一隻殺之。取其血。乘熱飲之。

以生雞子二枚吞之。次日毒即裏出。或於吞雞子後。略遲片時。飲生油一盞。毒即吐出。

〔淺解〕

本方與生公雞血方意義略同。藉其相制之力。以收功效。服後復飲生油者。蓋欲使咽喉潤澤。毒物易於吐出也。

(六) 大劑樟樹葉湯 (本草綱目方)

樟樹葉一兩。

以生公雞一隻殺之。取其血。乘熱飲之。

以生雞子二枚吞之。次日毒即裏出。或於吞雞子後。略遲片時。飲生油一盞。毒即吐出。

右一味。以水七碗煮。取碗半。分二次冷服。

〔淺解〕 本方即樟樹葉湯原方。分量加重一倍者。欲其藥力峻急。以挽危難也。

【中螞蟥毒類各方】

(一) 田中泥雄黃丸(驗方)

田中泥一兩。雄黃二錢。

右爲丸。如梧桐子大。分作四服。開水下。其蟲卽入泥中。隨大便而出。有時螞蟥行至鼻孔。血流不止。可用田泥泡水一碗。放鼻孔前。必乘泥而下。

〔淺解〕 本方田中泥雄黃善殺螞蟥。

(二) 麻油塗方(驗方)

以麻油若干。塗於肛門。蟲聞香

卽出。

〔淺解〕 本方麻油味甘性微寒。氣芬芳。塗於肛門。蟲聞其香。卽爬出。

(三) 桂圓煙油方(驗方)

桂圓肉(荔枝肉亦可)包煙油吞之。螞蟥卽從大便出。

〔淺解〕 本方之效。效在煙油。以其善殺蟲也。然其味辣甚。故用桂圓肉包吞。則易於上口。

(四) 活小魚田泥方(本草綱目方)

活小魚四條。豬脂二兩。田中泥一兩。

右共搗爲丸。冷沸水調下。每服三錢。

〔淺解〕 本方以活小魚田中泥。

誘螞蟥來食。而以豬脂潤之。則從大便出矣。

(五) 青鮓方(串雅方)

青鮓六錢。

右一味。以涼沸水調服。螞蟥卽瀉出。

〔淺解〕 本方青鮓性寒涼。善殺一切蟲。解一切毒。

(六) 藜蘆散(本草綱目方)

藜蘆一錢。(炒透)

右一味。研細末。涼沸水調下。蟲卽吐出。

〔淺解〕 本方藜蘆味辛苦。性大寒。專可湧吐。善殺蟲毒。

(七) 白蜜方(沈氏方)

白蜜三斤。

右一味類類食之。

〔淺解〕 本方白蜜味甘性潤。善

殺蟲。服至三斤。則所生蟊蠹。盡從大便下矣。

〔八〕羊肉方（驗方）

每日晨晚宜以羊肉食之。

〔淺解〕 本方羊肉味甘性溫。善

殺蟲。能解毒。

【中田螺毒類各方】

（一）鴨涎方（單方大全方）

以鴨倒懸。鴨嘴內即有涎出。以

碗接服。

〔淺解〕 本方鴨涎。善化田螺而

解毒。

（二）冰片散（單方大全方）

冰片三分。

右一味。以溫水化服。

〔淺解〕 本方冰片味辛性溫。香

燥走竈。善解田螺之毒。

（三）陳皮泡飲方（冰玉堂驗方）

陳皮三錢。

右一味。以百沸水泡飲代茶。

〔淺解〕 本方陳皮味辛性溫。能

行氣散寒。寬胸利膈。

【中蟹毒類各方】

（一）紫蘇生薑湯（沈氏尊生書

方）

紫蘇四錢。生薑四錢。

右二味。以水七碗煮。取碗半。分二

次溫服。

〔淺解〕 本方紫蘇生薑味辛性

散。善解蟹之寒毒。

（二）大劑紫蘇生薑湯（沈氏尊

生書方）

紫蘇六錢。生薑六錢。

右二味。以水七碗煮。取碗半。分二

次溫服。

〔淺解〕 本方與上方意義完全

相同。各味分量加重二錢者。欲其藥

力峻急。以挽危難。

（三）陳皮泡飲方（冰玉堂驗方）

見本證中田螺毒類各方淺解。

【中黃白蟻毒類各方】

（一）藍錠汁方（本草綱目方）

藍錠汁一盅。

右一味。以涼沸水沖成一碗。頓服。

〔淺解〕 本方藍錠汁善解一切

蛇蟲之毒。



(二)地漿湯(串雅方)

見百藥毒證各方淺解類。

(三)生螃蟹方(金鑑方)

生螃蟹一隻。(小者二隻)

右一味搗融。以冷沸水冲服。立可獲救。

獲救。

〔淺解〕 蠶性大溫。蟹性大寒。寒能制熱。且善行散。故能解毒如神也。

(四)穀麥芽湯(冰玉堂驗方)

熟穀芽四錢。焦麥芽四錢。

右二味。以水六碗煮。取二碗。去渣。分二次温服。

〔淺解〕 本方穀芽、麥芽、善運中開胃。中黃白蠟毒病愈後。其人胃口不開。納穀平平。宜服此方調養。最屬平正。

平正。

(五)八珍湯(六科準繩方)

見百藥毒證各方淺解類。

【中蠟毒類各方】

(一)白馬尿方(本草綱目方)

白馬尿一碗。頓服。

〔淺解〕 本方白馬尿味辛。性微寒。善殺蟲。解蠟毒。

(二)淡豆豉湯(本草綱目方)

淡豆豉一合。

右一味搗爛。以冷沸水調服。

〔淺解〕 本方豆豉味甘苦。性微温。善解蠟毒。

(三)大劑淡豆豉湯(本草綱目方)

即淡豆豉湯原方。分量加重一倍。服法依前。

方)

方)

(四)半夏和胃湯(冰玉堂方)

製半夏三錢。廣陳皮三錢。

白茯苓三錢。生穀芽三錢。

右以水五碗煮。取一碗。去渣。頓服。

〔淺解〕 本方半夏、陳皮運中和胃。茯苓、穀芽和胃養胃。

(五)陳香櫞泡飲方(冰玉堂驗方)

陳香櫞三錢。

方)

右一味。以百沸水泡飲代茶。

〔淺解〕 本方香櫞運中和胃。利膈寬胸。

方)

方)

【中沙蟲毒類各方】

(一)萹苳菜方(本草綱目方)

萹苳菜六錢。(重者一兩)

右一味搗汁飲之。

〔淺解〕 本方高荳蔻味苦性寒。功同白芷。有毒。能解百蟲蛇虺毒。觸之則目瞑。不能見物。故解沙蟲毒有特殊功效。

(一)半夏和胃湯(冰玉堂驗方)  
見本證中蝦蟇毒類各方淺解。

【中各種蟲毒類各方】

(一)活鴨血方(驗方)

見百藥毒證各方淺解類。

(二)香櫞和胃湯(冰玉堂驗方)

陳香櫞四錢。生穀芽四錢。

右二味。以水五碗煮。取一碗半。去渣。分二次溫服。

〔淺解〕

本方以香櫞寬中化濕。穀芽和胃養胃。中各種蟲毒病愈後。其人胃納不佳。精神不振。此胃氣受

傷之故。宜服此方調養。

【中河豚毒類各方】

(一)鮮青橄欖方(驗方)

以鮮青橄欖頻頻服之。直服至毒解爲度。(如無鮮者以其陳核磨水服亦可。)

〔淺解〕 本方橄欖味酸性澆。專解河豚之毒。

〔淺解〕

(二)蘆根汁方(驗方)

蘆根二兩。(重者三兩)

右一味。搗成汁灌之。

〔淺解〕 本方蘆根味甘性寒。善通氣清熱。能解河豚毒。

〔淺解〕

(三)人糞汁方(驗方)

以人糞汁二三碗灌之。服至毒解爲度。

(四)金汁方(驗方)

以金汁二三碗灌之。服至毒解爲度。(金汁用人糞瀝清汁。裝入罇內。封好。埋於人行處地下。年久取出。清者泉水。全無穢氣。愈久愈佳。)

〔淺解〕 右二味。俱鹹苦甘寒。無毒。除一切熱。解一切毒。尤善解河豚魚毒。

〔淺解〕

(五)槐花湯(本草綱目方)

槐花八錢。

右以水五碗煮。取一碗。去渣。待冷。

〔淺解〕

頭服。

〔淺解〕 本方槐花味辛性寒。色黃質輕。善解河豚毒。

(六)地漿湯(串雅方)

見百藥毒證各方淺解類。

(七)槐花胭脂方(單方大全方)

槐花四錢。(微炒) 乾胭脂

四錢。鮮橄欖四錢。生甘草

四錢。

右四味。同搗成粉。冷沸水調服。

〔淺解〕 本方槐花、胭脂、生甘、橄

欖。俱善解毒。四味相和。藥力平均。解

河豚毒。有特殊功效。

(八)飲真麻油方(驗方)

真麻油一二杯。頓服之。

〔淺解〕 本方麻油味甘。性微寒。

氣芬芳。善解河豚毒。

(九)坑中水方(驗方)

小便坑中水一杯。頓服。

〔淺解〕 中河豚毒病。其人口渴

不止者。速飲此方。以其味鹹性寒。清

熱降火。且善解河豚毒也。

【中各種魚毒類各方】

(一)鮮青橄欖方(驗方)

見本證中河豚毒類各方淺解。

(二)紫蘇湯(單方大全方)

紫蘇四錢。

右一味。以水五碗煮。取一碗。去渣。

待冷。頓服。

〔淺解〕 本方紫蘇味辛性溫。行

經絡。宣氣滯。消解魚毒。

(三)魚鱗燒灰方(千金方)

魚鱗一兩。

右一味。燒灰研末。臨臥冷沸水調

服二錢。

〔淺解〕 本方魚鱗灰善消魚積。

並解魚毒。

(四)紅麴方(金鑑方)

紅麴五錢。

右一味。以水煮爛。運渣服下。則毒

從大便而出。

〔淺解〕 本方紅麴味甘性溫。消

解魚毒。是所專長。

(五)穀麥芽湯(冰玉堂驗方)

見本證中黃白蟬毒類各方淺

解。

【中鱉魚毒類各方】

(一)淡豆豉湯(本草綱目方)

見本證中蝦蟇毒類各方淺解。

(二)白馬尿方(本草綱目方)

見本證中蝦蟇毒類各方淺解。

(三)白芷雄黃湯(單方大全)

白芷三錢。雄黃三錢。丹砂一錢。山查一錢。枳實一錢。

白茯苓五錢。

右以水六碗煮。取二碗。去渣。分二次溫服。

〔淺解〕 本方白芷、雄黃、丹砂、辟穢解毒。山查、枳實、消積。茯苓和中。

〔四〕 半夏和胃湯（冰玉堂驗方）

見本證中蝦蟇毒類各方淺解。

〔中游波蟲毒類各方〕

〔一〕 酸醋方（驗方）

酸醋一小杯。冷頓服。

〔淺解〕 本方酸醋最善解游波

蟲毒。

〔二〕 海蛤湯（冰玉堂驗方）

海蛤八錢。龍骨八錢。煨牡

蠣八錢。青黛五錢。

右以水九碗煮。取二碗。去渣。分二次冷服。

〔淺解〕 本方海蛤、牡蠣、龍骨、鎮肝平肝。青黛清肝解毒。中游波蟲毒。

其人面赤目赤。狂走投水。登高而呼。棄衣而奔。此均屬肝陽上浮。火邪上炎。速服此方。即能火平肝靜而瘥。

〔三〕 蛤壳平肝湯（冰玉堂驗方）

生白芍四錢。煨蛤壳八錢。

煨牡蠣八錢。煨龍骨八錢。

青黛五錢。酸棗仁四錢。石

決明八錢。

右以水九碗煮。取二碗。去渣。分二

次溫服。

〔淺解〕 本方棗仁、白芍、味酸性

斂。補肝和肝。蛤壳、牡蠣、龍骨、決明、性

重善鎮。平肝降火。青黛清熱解毒。中

游波蟲毒愈後。夜眠不安。肝火自升。此肝臟不和之故。宜服此方調養。自

有奇效。

〔四〕 洋參花粉湯（冰玉堂驗方）

西洋參三錢。炒阿膠五錢。

生白芍五錢。天花粉五錢。

天麥冬各三錢。鮮竹茹三錢。

右以水八碗煮。取二碗。去渣。分二


次溫服。

〔淺解〕 本方

粉、天麥冬、俱屬和

陰傷口渴。然養陰

易望塞。故微用。故



表期到借書  
名醫陸士編著

國醫基  
本必讀  
醫學南針

上下集  
合訂本

全書用仿宋字排印

清晰醒目

自來習醫之人，無不感讀書之苦，如靈素之文，傷寒之論，文既古奧，理又精深，初學之士，何能一蹴即幾？編者有鑒于斯，本其精湛之學理，豐富之證驗，擷取精英，攷據古籍，撰成是書，俾初學者有所問津，而獲登堂入室之門。

上集編次

- |         |          |
|---------|----------|
| 1. 臟腑南針 | 2. 切脈南針  |
| 3. 望色南針 | 4. 聞聲南針  |
| 5. 問證南針 | 6. 病機南針  |
| 7. 論藥南針 | 8. 釋方南針  |
| 9. 運氣南針 | 10. 讀法南針 |

下集編次

- |          |
|----------|
| 1. 治病總論  |
| 2. 營衛論   |
| 3. 辨證南針  |
| 4. 用藥南針  |
| 5. 用藥禁忌法 |
| 6. 讀法南針  |

▼上下集合訂

一巨册

定價大洋一元九角

特價九角

(七分半)

世 界 書 局 發 行

(包149)


中華民國二十四年六月再版

醫學類問大全  
第十册

急救科 (全一册)

定價大洋五角

(外埠酌加運費匯費)



版權所有  
不准翻印

編輯者 陸清潔

校訂者 陸士謨

發行所 上海大連路  
世界書局

出版者 世界書局

發行所 上海及各省 世界書局

本書頁數校對者何衡孫

三  
人及...



醫藥顧問大全 第十册

81