

新刊仁齋直指附遺方論卷之十

# 漏濁

漏濁方論

精之主宰在心精之藏制在腎凡人酒色無度思慮過情心腎氣虛不能管攝往往小便頻數漏濁之所由生也因小便而出者曰尿精因見聞而出者曰漏精心不足而挾執者為赤濁心不足而腎冷者為白濁陰不升陽不降上下乖悞是以有清濁不分之證藥法品量條列于下要必體認之精而後發用之審驗外此又有脾精不禁小便漏濁淋瀝不止手足力乏腰背酸疼盍用白濁等劑以斂脾精斂脾謂何精生於穀也

漏濁證治

白濁治小便中泄精不止

白龍骨研細新韭子冬霜後種者壹斤

右末酒調糯米為糊圓桐子大每服叁拾圓空心鹽湯下

**蓮子六**湯治心熱赤濁

甘草 炙壹兩

右末每服貳錢食後燈心壹小撮煎湯調下

**清心蓮子飲**治心中客熱煩躁赤濁肥脂

石蓮肉

白伏苓

益智仁

遠志 水浸取肉

麥門冬

人參

石昌蒲

車前子

白朮

澤瀉

甘草 各壹分

右剉散每服叁錢添燈心壹握煎服有熱加**薄荷**

**辰砂妙香散**

方見前門

**礞石圓**

方見前門

治小便赤濁又

**苓散**

方見水飲門

可夾和

**辰砂妙香散**每服壹錢用燈心并去

**心麥門冬**煎湯調下男女通用

**雞清圓**便濁通用

圓白半夏 生

右為末用雞子清圓桐子大稍乾以**木梢**末夾和慢火同

炒圓子裂為度留**木梢**末養藥磁器密收每叁拾圓食前

**白伏苓**煎湯下或用鹽湯

**三志膏**調平心氣赤白濁通用方見心寒門

**十四天圓**治心虛便濁方見驚悸門

**妙藥圓**赤白濁通用

真龍骨

辰砂

厚牡蠣 以高草鞋重包

石昌蒲

白伏苓

益智仁

石蓮肉

縮砂仁

川練子

桑螵蛸

兔絲子

右末以山藥碎妙末為糊圓桐子大每伍拾圓日間煎

**酸棗仁**湯下臨卮

**遠志圓**治心氣不足遺精白濁

遠志

山藥

地黃

天門冬

龍齒

麥門冬

北五味子

車前子

白茯苓

伏神 去木

地骨皮 去骨 桑寄生 杜仲 鹿茸 菟絲子

右末煉蜜圓桐子大每伍拾圓食前粳米湯下

伏兔 赤白濁通用

方見消渴門

赤濁 前湯下 白濁 白伏

本煎湯下

治腎虛心熱小便急而數澀而瀝如水質欲溼之狀又

且油濁方見消渴門兼用辰砂 佐之 方見通門

在囑圓治精氣不禁白濁夢遺

圓白半夏

壹兩 鹽洗 拾次 每筒作兩片 以 去皮 煮 兩 為 雞 屎 同 半 夏 煨 火 炒 黃 乾 地 出 火 煎 壹 煮

右不用宋楮 入 煨 過 厚 香 瀉 壹 兩 同 末 以 山 藥 糊 圓 桐

子大留宋楮 養 藥 磁 器 密 收 每 叁 拾 圓 依 前 湯 下

金櫻子圓治諸虛精白濁

真龍骨

厚牡蠣 煨

桑螵蛸 各壹兩

右以雄黑豆壹盞淘洗指前叁件置瓦上蒸半日去瓦焙參

件為末入白伏壹兩末金櫻子肆拾玖枚去刺并穢者先

淨搗碎磁器內入水一盞煮濃汁濾清調末為糊圓桐

子大每三十圓食前用伍枚連殼搗碎五味甘干粒

三箇煎湯下

用五子前湯下治諸虛白濁方見通門

桑螵蛸治心腎不和小便白濁或如米泔或為夢泄

人參 白伏神 當歸 龍骨 別研

石菖蒲 麥汁和

熟地 各半兩 甘草 炙 貳 錢

右為末每服貳錢 前湯調下 夜臥服

每服貳錢用燈心壹撮同煎服治小便白濁

治諸虛不足虛熱潮來心神驚惕腫卧不寧小便

油濁

龍齒 版別研 人參 當歸 熟地 黃 乾 結

龍齒 版別研 人參 當歸 熟地 黃 乾 結

北梗焙

酸棗仁炒

白茯苓

白伏神去木

遠志水浸取肉曬

枳殼法燻

麥門冬去心

半夏麩

白木

甘草炙

肉桂去粗皮

綿黃耆七錢半

右鹿末每服三錢水盞半薑五片梗米壹小撮同煎不時服

臨臥服

**治漏精白濁**

雪白鹽入磁瓶內築十分實以瓦蓋頂黃泥塗封

白茯苓

山藥各壹兩

右為末入鹽壹兩研和用沸湯浸末取肉研夾煉蜜再研

圓桐子大每服叁拾圓空心漿湯下蓋欲其以濟鹹脾腎兩

得也

**山藥圓**

乾山藥二兩北五味子酒浸菴蓉酒浸兔絲子酒浸

牛膝酒浸焙澤瀉

熟地黃洗

山茱萸

伏神去木

巴戟去心

赤石脂各壹兩

杜仲酒浸

右末煉蜜圓桐子大常服叁拾圓鹽湯下

**安腎圓**

方見水飲門

**白圓**

方見身疼門

**山藥圓**

方見前

夾和每服柒拾圓食前煎黃和湯送下方見虛勞門治虛勞羸

瘦浮臃白濁

**還少丹**治心腎俱虛漏精白濁方見虛勞類

**鹿茸益精圓**治心虛腎冷漏精白濁

鹿茸去皮酥

肉苁蓉

當歸

巴戟去心

兔絲子酒浸

杜仲酒浸

禹餘糧酒浸

川練子酒浸

益智仁

山茱萸

韭子酒浸

故紙炒

山茱萸

赤石脂

龍骨別研

滴乳香壹分

右細末酒調糯米糊圓桐子大每柒拾圓食前煎白圓煎湯下

**家韭子** 治陽氣衰敗白濁遺精

家韭子陸兩 鹿茸四兩 茯苓酒浸焙 牛膝

熟地黄洗曬 當歸各二兩 巴戟去心 兔絲子酒浸焙

杜仲剉薑 石斛 桂心 乾薑各壹兩

石末酒調糯米為糊圓桐子大每服柒拾圓空心鹽湯下亦治胞冷遺尿

**震靈丹** 治腎經虛憊漏濁不止 方見馮門用 **二便湯** 如 **白茯苓**

送下 方見瘡癰

**白圓子** 治陰陽不調清濁相干小便渾濁 方見身寒門用 **因令**

煎湯下

**分清飲** 治思慮過度清濁相干小便白濁

益智仁壹兩 川草薢 石菖蒲去毛

天台烏藥 白伏苓略壹 甘草四錢

右為末每貳錢搗少許同煎食前服

**蒼朮難名丹** 治元陽氣衰脾精不禁漏濁淋瀝腰痛力疲

蒼朮料去龜皮壹斤米 舶上茴香炒 川練子蒸去皮取肉

川烏炮去皮 故紙炒 白伏苓 龍骨別研

右末酒麩糊圓桐子大朱砂為衣每服伍拾圓空心縮砂煎

湯下 **瘦米** 湯下 **蒼朮** 收斂脾精

**附諸方**

**妙應圓** 治赤白濁

真龍骨 辰砂 石菖蒲各貳錢半 川練子取肉

白茯苓 益智仁 石蓮肉 縮砂仁各壹錢半

桑螵蛸瓦上 兔系子酒浸一宿焙 牡蠣破草鞋包火煨

右以 **山藥** 碎炒為糊丸如梧桐子大每服伍十九間日煎入

**參酸棗仁** 湯下 臨臥 **瘦米** 飲湯下

**逐志圓** 治因事有驚心神不定夜夢驚墮小便白濁

逐志去心 石菖蒲各貳錢 茯苓去木 白茯苓去皮

人參

龍齒 各壹兩

右為末煉白先梧子大以辰砂為衣每服米拾九熟湯下

一方治心經伏暑小便赤濁

人參

白木

赤茯苓去皮香薷

澤瀉

木猪苓去皮蓮肉

麥門冬去心分

右咬咀每服肆錢水一盞煎服

一方治小便白濁出髓條

酸棗仁炒

白木

白茯苓

破故紙

人參

益智洗淨

大茴香

左顧牡蠣童便分

右為末如青鹽酒丸如梧子大每服三十九溫酒米飲任下

金鎖固本

治男子嗜慾過多精氣不固澀以去脫之劑

蓮花蕊十兩

雙無毒藥心忌犯黃蘗

石連子十兩

味苦平溫無毒能飲正黑火水者忌之

鷄頭實十兩

味甘平無毒益精氣強志取其實

右以公龍子三斤取霜後半黃者木臼中轉杵却刺勿損擊

為兩片夫水淘淨爛搗入大鍋以水煎不絕火約水耗半取

出濾過重煎如稀餚帝肆乾者焙之用水浸軟去子煎令如

法入前藥末和九桐子大每服參拾九空心湯下

論灸法 陰交一穴在臍下氣海一穴在臍下關元三指下

# 夢泄

夢泄方論

邪客於陰神不守舍故心有所感夢而後泄也其候有三年少

氣盛際曠矜持強制情然不自覺知此泄如瓶之漏而溢者也

人或有的是為無病勿藥可矣心家氣虛不能主宰或心受熱

陽氣不收此泄如瓶之側而出者也人多有之其病猶輕合用

和乎之劑臟腑積弱其元久虧心不攝念腎不攝精此泄如瓶

之罅而漏者也人少有之其病最重須當大作補湯或謂夢泄

不甚於房勞此世俗習聞其說也獨不觀證候之有重輕乎外  
此又有一輩神氣消磨怪異橫生風邪乘其虛鬼氣干其空往往  
徃與奸魅交通是又厄運之不可曉者也法藥相助誠哉是言

夢泄證治

依方圓治心虛夢泄

白茯苓

右為末每服肆錢粳米湯調下間用溫熱水調下空心食前

臨卧日三服

鹽字六一湯雞骨圓方見瀉瀉門辰砂妙香散方見煎門治心

熱夢泄並用燈心一握煎湯下

鹿角散治臟腑久虛夢泄

鹿角屑

鹿茸錢皮鱗白茯苓三分人參

白伏神

桑螵蛸蒸焙芎藭

故紙炒

龍骨別研新韭子酒浸炒兩

栝子仁去殼甘草二分

右末每服三錢半姜五片棗三枚粳米百粒食後煎服

覆以布方見虛勞門

鹿茸益精丸

栝子仁

方見瀉瀉門大補

虛損夢遺用十補湯送下方見瘧疾門間用酒乳香未泡湯下

嚴靈丹封固下佳治夢泄不止方見瀉瀉門空心人參地五味子

煎湯下

諸方

龍骨續精冊

白龍骨兩半牡蠣兩二

知母五升

黃柏六升

猪苓五升

人參五兩

遠志心半兩湯煮去

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服四五十九空心酒

或湯送下

固精丸治心神不安腎虛自泄精

知母炒

黃柏酒炒各牡蠣煨

龍骨煨

交實

蓮盞

茯苓

遠志去心

山茶更

內各

右為末煮

**山藥**糊丸梧子大

**硃砂**為衣服五十九

**失寶花**

補生方

治思慮傷心疲勞傷腎心腎不交精元不固面

少顏色驚悸健忘小便赤澀遺精白濁足脛酸軟耳聾目暗

芡實燒去

蓮花鬚二兩茯神去木

山茱萸肉

龍骨生用

五味子

枸杞子

熟地黃酒蒸

菹子炒

肉蓯蓉酒洗

川牛膝酒洗

紫石英

各一兩

右為末

**麝香**

為丸如梧子大每服七十九空心

**玉鎖丹**

御藥院方

治精氣虛滑遺泄不禁

龍骨

蓮花蕊

雞頭實

烏梅內各等分

米飲下

右為末用熱

**山藥**

去皮為膏和丸小豆大每服三十九空心

**秘傳金鎖思仙丹**

採藥均

並見滬海門

十卷終

新刊仁壽直指附遺方補卷十一

# 眩暈

眩暈方論

眩言其黑運言其轉冒言其昏眩運之與冒眩其義一也其狀目閉眼暗身轉耳聾如立舟舩之上起則欲倒蓋虛極乘寒得之亦不可一塗而取軌也風則有汗寒則掣痛暑則熱悶濕則重滯此四氣乘虛而眩暈也喜怒哀樂悲恐憂思鬱而生痰隨氣上厥此七情攻虛而眩暈也淫慾過度腎家不能納氣歸元便諸氣逆奔而上此眩暈之出於氣虛也明矣吐衄漏崩肝家不能收攝營氣使諸血失道妄行此眩暈之生於血虛也又明矣以致新產之後血海虛損或瘀滯不行皆能眩暈是不可不推尋致病之因乎治法隨機應敵其間以升降鎮墜行焉最不可妄施汗下然而眩暈欲解自汗則有之若諸逆發汗刺者言亂



目眩與夫少陰病下利止而頭眩時時自冒者此虛極而脫也  
識者將有采薪之憂 肝脈溢大多作眩運者風痺眩皆屬於肝

眩運證治

茯苓桂枝白朮甘草湯 治氣上衝胃戰搖眩運

伏苓 壹兩

桂枝 三分

白朮

甘草 炙各半兩

右剉散每服肆錢新水煎服風證加 芎藭 濕證加 附子

蒼朮 寒證加 附子 良薑

理中湯 方見瀉門 治寒濕眩運仍吞 來儀此 方見暑門 甚者

正升 方見痢冷門

芎藭除眩湯 治感濕感寒頭重眩運

附子 生

白朮

川芎 各半兩

官桂

甘草 炙各貳錢半

右剉每服三錢薑桑厚片同煎食前服

附子理中湯 方見瀉門 附子理中湯 方見寒類 並至虛寒眩運

桂苓圓 治暑證眩暈

肉桂

伏苓 等分

右細末煉密圓每兩作捌圓每服一圓用 香薷散調下

香薷散 通用 方並見暑門

十四友圓 方見驚悸門 方見水飲門 二藥夾和用 和劑

七氣湯 送下方見氣門 治七情相干眩運欲倒仍間用 香泡

湯下

羚羊湯 方見頭風門 治痰飲厥逆眩運

千金五苓圓 方見脾疾門 治痰飲結聚胃脘眩運欲嘔

香薷飲 治氣虛眩運

木香

白朮

半夏 麩

橘皮

白伏苓

縮砂 各半兩

丁香

甘草 炙各一分

右剉散每服三錢薑五厚片同煎卷 蘇合香圓 方見嗽門 本

方加 香薷 各三分 薑 半兩 治血虛眩運

蘇沈沈壽園治一切血運每服宣圓研開用酒乳香泡湯調下  
宣壽湯方見血類加細辛宣壽湯治婦人血運眩員不省人事  
次用和劑七氣湯佐之

五苓散方見水飲門加赤茯苓治停飲眩員心下悸氣

養正丹方見虛冷門來復丹方見暑門升降陰陽用之養正丹

夾和震雷丹以乳香泡湯下升降鎮墜功用兩全

震雷丹方見瀉門生陽丹方見瀉門鎮墜眩運用之

陳湯方見瀉門加生乾薑治因氣鬱痰眩運及酒食所傷眩

運及酒食所傷眩運吞酸嘔吐充勝

正彈丸治風證眩運及血證眩運

新白芷善大聖湯益流三次日乾

右為末煉蜜圓彈子大每服一圓荆芥煎湯嚥下

与末子圓治風痰上厥眩運頭疼

白附子炮 南星炮 半夏 益柴火 旋覆花

甘菊 天麻 川芎 橘紅

僵蚕炒酥 乾薑銜一兩全蝎半兩研

右末用生薑半斤取汁打麩糊小圓每五十圓食後開水湯下

人參前胡湯治風痰頭運目眩

前胡 橘紅 半夏曲 木香

枳殼製 紫蘇葉 赤茯苓 南星炮

甘草炙 各半兩 人參 參錢

右釐末每三錢薑菜厚片慢火炒煎服

宣壽湯方見身熱門用三十圓蘇合香圓三粒全蝎一箇

多為末三件研和以酒送下前湯入生薑打少許調下治諸

風眩運搗碎語紐囉吐

敬馬悖

敬馬悖

敬馬悖

敬馬悖

人之所主者心之所養者心血一虛神氣不守此驚悸之所肇端也曰驚曰悸其可無辯乎驚者恐怖之謂悸者怔忡之謂心虛而驚悸則耳聞大聲目擊異物遇險臨危觸事喪志心為之忤使人有傷惕之狀是則為驚心虛而停水則胸中滲漉虛氣流動水既上乘心火照之心不自安使人有快快之狀是則為悸驚者與之豁痰定驚之劑悸者與之逐水消飲之劑所謂扶虛不過調養心血和平心氣而已若一切以剛燥用工或者心火自炎又有熱生風之謬

驚悸證治

養心湯治心虛血少驚悸不寧

黃耆

白茯苓

半夏麩

當歸

川芎

遠志

栝子仁

酸棗仁

北五味子

人參 當歸 甘草 炙 建饅

右倉末每服參錢壹伍片棗貳枚煎食前服如<sup>附</sup>亦伏本治停水怔悸

養心湯治心虛血虛多驚

人參

白茯苓

伏神

栝子仁

琥珀

當歸

酸棗仁

遠志

遠志

石菖蒲

乳香

朱砂

右末煉蜜圓桐子大每參拾圓食後棗湯下

乳圓治心氣不足怔忡自汗

人參

當歸

乳香

右末山藥黃糊圓桐子大每參肆拾圓食後棗湯下

十四交圓治心血俱虛怔忡驚惕

栝子仁

遠志

酸棗仁

湯浸去皮隔紙炒香

紫石英

熟乾地黄

川當歸

白茯苓

白伏神

人參

黃耆

阿膠

辣桂

龍齒

朱砂

右細末煉蜜圓桐子大每參肆拾圓食後棗湯下

伏神圓 治心病怔忡不止

白伏神

貳兩半

沉香

半兩

右細末煉蜜圓小豆大每參拾圓煎湯下

伏神散 治大驚入心敗血頑痰填塞心竅暗不能言

蜜陀僧

即是鹽底研細

右每服挑壹大錢已無熱者用熱酒調下有熱者沸湯泡

香調下亦治瘡風頗有奇效 出夷聖志

白龍湯 治心膽虛怯觸事多驚亦治水氣怔忡

半夏

製

枳殼

製

白茯苓

各壹兩

橘紅

壹兩半

甘草

炙半兩

右剉每服叁錢半薑滓片棗貳枚刮青竹皮壹塊如錢大煎

根或如 尤妙

加味四七湯 治心氣鬱滯豁痰散驚

半夏

製

白茯苓

厚朴

各壹兩

伏神

紫蘇葉 略壹遠志 薑汁 薑煎 兩各

甘草 炙各半兩

右剉每服肆錢薑滓片 薑圓 半寸棗貳枚煎服

伏苓甘草湯 治心下停水忪悸

伏苓

桂枝

各貳兩

甘草

炙壹兩

生薑

叁兩

右剉每服肆錢水煎服

薑湯 治虛證停飲怔忡

白薑

生

白朮

伏苓

炙

半夏

麴

各半兩

辣桂

甘草

炙各壹分

右剉每服叁錢薑棗煎服

半夏伏苓湯 五苓散 並主水氣心下怔忡 方見水飲門

代  
芩草 灸壹兩 人參 半兩 生乾地黃 兩 桂枝 參分

麻仁 麥門冬 各壹分 生薑 參分 大棗 八枚

右麤末每椀參大錢水壹盞半酒半盞煎至捌分入膏明

寧志膏 治因驚失心

人參 酸棗仁 湯浸去皮 各壹兩

辰砂 半兩 滴乳香 壹錢 乳鉢 坐水研

右末煉蜜和杵圓如彈子每壹圓薄荷湯化下

附諸方

硃砂安神丸 治血虛心煩懊懷驚悸怔忡胸中氣亂

加味定志圓 治痰迷心隔驚悸怔忡

遠志 貳兩 人參 壹兩 高蒲 貳兩 白茯苓 參兩

琥珀 欒金

右為末煉丸如梧子大每服二十九湯下

健忘

舟溪云精神短少者多亦有痰者戴云健忘者為事有始無終言談不知首尾此以為病之名非此生成之愚頑不知人事者

歸脾湯 治思慮過制勞傷心脾健忘怔忡

白木 扶神 去木 黃芪 龍眼肉

酸棗仁 去殼 人參 去芦 各 木香 半兩 甘草 錢半

右以咀每服肆錢水一鍾 伍片 一椀煎七分溫服

參遠志圓 治氣不足驚悸健忘神思不寧

天門冬 去心 白茯苓 苝蒲 各 七 人參 去芦

遠志 去心 酸棗仁 黃芪 各 半兩 桔梗

冊砂 官桂 去皮 各 半兩

右為末丸如豆大每服貳拾丸至參拾丸湯下

治心神恍惚一時健忘方見前

新刊仁齋直指附遺方論卷之十二

# ○ 痰瘧

痰瘧方論

風寒暑濕邪自外來飲食居處邪由內作此痰瘧感受之胚胎也豈特夏傷於暑秋必爲瘧哉古人蓋以其受病最多者言之耳瘧候何如始而呵欠繼而足冷面色青黃身體拘急寒慄鼓頷腰脊俱疼寒去未幾內外皆熱頭痛而渴但欲飲冷嘔惡妨滿而不嗜食者其候也或內伏寒痰寒從背起冷如掌大瘧之寒熱其豈非陰陽二氣更相勝負而作邪邪併於陰則寒邪併於陽則熱陰盛則寒多陽盛則熱熾其寒也湯火不能溫其熱也冰水不能寒衛氣與邪氣相值故邪正交爭而病以作衛氣與邪氣相離故汗出乃解而病以休衛氣晝行陽夜行陰得陽而外出故發於日間得陰而內搏故發於暮夜若乃邪氣內搏

於五臟橫連抃募原其道遠其行遲不能與衛氣交併故有隔日發有三四日一發衛氣之行疾行遲病作之有發有晏甚者內外失守真邪不分陰陽迭勝寒熱互起則休作無定時矣瘧有數種

**風瘧**自感風而得惡風自汗煩燥頭眩轉而為瘧風類或

**瘧**大畧則同熱多寒少

**瘧**一証亦先熱後寒此為傷寒壞病與

**瘧**自感寒而得無汗惡寒寧痛面慘轉而為瘧寒陰

氣也故先寒後熱可與發散寒邪

**暑勝**挾麥得之一名

不泄煩渴且嘔肌肉消銹蓋用

加生姜溫服下

暑証最便

煩疼嘔逆脹滿蓋用

多不挾氣虛而泄悽慘振

施之為當

啞生冷鹹藏蕪塩肥膩中脫生痰皆為食瘧其狀苦飢而不能食上則中痛嘔逆腹瀉青皮陳皮

或回散

致然也自嶺以南地毒善交燥濕不常人

焦病欲來時令人迷困甚則發燥狂妄亦有啞不能言者皆由敗血聚於心毒涎聚於脾披仙指為脾胃實熱所致又有甚於

傷暑之瘧耳治之須用涼膈疎通大腸

猶存則有所謂

勞後來謂之

法當調養氣

加

加

加

加

加

加

加

加

加

加

加

加

加

加

加

加

加

加

加

加

加

加

加

加

加

加

加

加

加

加

加

加

不可無○瀕年閏歲經吐汗下榮衛虧損和氣伏藏腸間結為  
 數癰謂之癰此証未可直攻急作癰以扶其裏使  
 其內氣已充繼此癰或癰下之取愈大癰之初  
 得三數日間如火燎原不可向通波濤洶湧未易回瀾當俟其  
 稍定而圖之經所謂其盛者可待衰而已癰方來與正發及將  
 解不可投藥耗其真氣按癰當於未發以前兩時之先或過發  
 日凌晨空心與之諸癰之脈大約又寸俱弦或浮數或緊實或  
 緩澹或虛遲或左手濡而右手盛或尺寸盛而關中濡不可定  
 名以為弦也總前治法弦數多熱者寒之弦遲多寒者溫之浮  
 弦浮緊浮數其邪在表者可汗弦實沉實數實其邪在裏者可  
 下若夫調胃氣利痰水分陰陽行三焦是又治法之綱領也渴  
 飲水漿藥入吐癰煎湯交加猶有說焉癰讀三廣攝生見  
 其論議若癰癰若暑毒每用踈轉之劑取下根源里有先傷暑  
 後發癰滯年餘者度其腹中有癰水磨癰下癰

血如沈洲下極臭由是獲命因知諸癰皆有根在治法之外又  
 當隨輕重而利導之實者與癰虛者用癰單不然  
 於癰每作效何耶蓋瘡家多蓄黃水癰為能破其癰  
 而下其水也

瘰癧證治

麻黃白湯治感風發瘰

麻黃去節 官桂

青皮 陳皮

川芎 白芷

半夏麩 紫蘇

茯苓 白朮

北梗 甘草炙

加細辛 檳榔

右剉散每服三錢薑肆片棗貳枚空心煎服

五癰感寒發瘰初作以此解散

蒼木抄 北梗壹兩

麻黃去節 枳殼製

陳皮各六錢 乾薑

厚朴製 川芎



當歸

白芍藥

白芷

甘草炒

半夏製

官桂

伏苓各三錢

右到散每服參錢水盞半葱白參寸薑叁片煎半空心服

大青湯加治感寒發瘧

厚朴製

蒼木炒

半夏各壹兩人參

伏苓

草果

藿香各半兩橘紅三分

甘草炙壹分

右到散每服參錢水盞半薑伍片烏梅半筒煎半溫服

解毒桂枝湯方見補熱門

養正丹 王寒瘧方見前冷門 實理中湯 王寒瘧方見

草果飲 諸瘧通用加治寒瘧

草果

白芷

良薑

青皮

川芎

紫蘇葉

甘草炒等分

右到散每參錢煎服

此藥湯治暑瘧純熱方見血類 或寒熱等則加桂

香需四兩 厚朴製 扁豆各貳兩

香需

厚朴

扁豆

右到散每參錢烏梅壹筒水煎臨熟入薑汁壹匙溫服

五物香需湯治傷暑發瘧 正王暑證方見暑類

常山治傷暑發瘧

嫩黃川常山

知母

草果仁

甘草各壹兩 良薑六錢 烏梅肉半兩

右到散每參錢水壹枕薑伍片棗叁枚煎半稍冷服

七寶到散 治暑瘧諸瘧

川常山

雞心檳榔

青皮剉白

甘草各半兩

草果仁貳錢半

右到散每參錢各柒寸烏梅壹筒水大枕煎半稍冷

空心服

五苓散 治傷濕發瘧及小便不利 方見水飲篇

加劑除濕湯 治主濕瘧或加 方見濕類

柴胡桂薑湯 治牝瘧但寒或寒多微熱

甘草 炙 杜蘅 各半兩 黃芩 三錢 內加半夏 麩半兩

右剉散每服參錢薑棗煎服

陳皮 半斤 伏苓 各五兩 甘草 炙 當歸

右咬咀每服參錢薑芍片烏梅半箇煎服寒多者加 草果 熟

多者加 前胡 如 青皮 積殼 白豆蔻 之類 隨意增用

四獸湯 治食瘧諸瘧和胃消痰

半夏 雙 人參 伏苓 白朮

橘紅 草果 生薑 烏梅

大棗 各等分 甘草 炙 戟半

右咬咀以縮少許淹食頃濕紙厚裹慢火燻香熟每服四錢 水壹椀煎半溫服

治食瘧食積氣滯腹脹

京三稜 水浸破黃碎 蓬莪朮 青皮

陳皮 各伍兩 胡椒 乾薑 炮 各三兩

右為末米醋煮米粉糊圓桐子大礬紅為衣每伍拾圓 二陳

四獸湯 皆可下

治久瘧但久瘧但寒及脾寒發瘧或寒重執輕

大川烏頭 一個 水浸七日 以鹽水浸再

右細剉分貳服每服壹七厚片末七箇葱白三寸水大碗煎

半先喫東稍冷服

又方用 壹枚 修梨 一同 牙能溫脾挾風則用

寒甚則用 固子

治瘧水香圓

牽牛一斤去毒雞心褚柳各二兩

青木香人參厚朴製

官桂去蘊皮京三稜羌活獨活

乾薑冠甘草炙川芎川大黃剉

芍藥各半兩肉豆蔻麝香

右為末磁器密收臨用秤牽牛末壹兩諸藥末共壹兩研和

煉蜜圓桐子大每服貳拾圓前瀉下以通利為度

**地龍飲**治瘴瘧諸瘧大執煩燥

生地龍三條研細細

右入生薑汁薄荷汁生蜜各少許新汲水調下如熱熾加鹽

子少許

**觀音圓**取下暑毒瘴毒

圓白半夏生烏梅肉母丁香川巴豆不去油每升各十枚

右為末薑麩糊圓麻子大上下以厚紙蓋貼有油又再易紙

每服伍圓臨卧冷水下此方舟人於海魚遇一白末投之

**醫歸醫軍散**治勞瘵寒熱

當歸川芎芍藥青皮

陳皮茯苓半夏製鱉甲半兩

右剉散每三錢薑伍片東貳箇小烏梅壹箇水煎服執多加

**柴胡**寒多加白圓

**五勞圓**治勞瘵瘧疾久病

嫩黃當山三兩半桃仁去皮尖炒

辣桂去蘊皮淡豉三兩烏梅肉去核半

右日乾為末煉蜜圓梧子大每三四十圓空心溫酒下不飲

者熱水入些酒下

**效厚**治瘵母結癖寒熱無已

真阿魏雄黃各等朱砂一錢半

右沸湯泡阿魏研散為末和之稀麩糊圓桐子大每壹

圓人參煎湯候冷空心服瘴癘前湯冷服臨發磨壹圓傳鼻頭口畔

瘴癘圓治瘴丹停水結癖腹脇堅痛

芫花炒

朱砂研細等分

右為末煉蜜圓小豆許每拾圓濃煎束湯下去癖須用器也

大戟破水之劑下後即與藥圓湯

驅瘴湯治諸瘴又瘴

草果仁

青皮

陳皮

人參

茯苓

半夏製

厚朴製

蒼木炒

雞心檳榔

白木

甘草各半兩

良薑一分

右到散每三錢薑伍片束貳枚烏梅壹箇空心煎服

生說治脾寒發瘴及寒多熱少

草果

肉豆蔻

各兩許薑壹兩壹生

川厚朴方寸許

生薑貳塊半生半濕紙裹

甘草貳寸半生半炙

右到散分貳服每服壹椀水貳束吉烏梅前半空心服

蘇丹圓截瘴消痰

葦丹煨

穿山甲煨灰中炮生

土硫半兩

七物湯前湯下

右為末以獨頭蒜煨去皮研膏圓桐子大每拾圓生薑烏梅

常山酒浸煮

檳榔

草果

青皮

陳皮

川厚朴製

甘草炒等分

右到細每服三錢薑伍片烏梅貳箇水壹椀煎半露壹宿來

早溫服之如熱多加藥

鳳凰冊臻志修合

土朱式兩半

真綠豆粉式兩一兩生入信砒有鋒生者半

右用編糊黍和叁件圓如麻子每服止貳圓新汲水研

挑破空心服是日飲食微和而已

雞心攢榔 壹兩日乾 川常山 酒浸蒸焙四兩

雞心攢榔治一切瘧寒熱不一嘔惡頭疼煩渴喘息痰聚中滿  
右為末水麩糊圓桐子大每服叁拾圓於未發前半日冷酒  
下便睡不得喫熱湯飲次日又用冷酒下二十圓仍不得喫  
熱飲食又次日飲食無拘

貳枚烏梅 貳枚水壹椀煎陸分微冷吞前件 柒圓次  
日吞叁圓

不物湯治久瘧不已寒少熱多

雞心攢榔

嫩常山 貳錢 柴胡

甘草 錢一錢半

青皮 鈇珀 草果仁 右到分叁服每服大軟烏梅貳箇好夏酒準壹啜許新水貳  
蓋煎半隔宿露空以紗蓋之次早沸明服若寒熱等加製厚  
朴貳錢略煖服是日飲食皆勿用熱

白虎加桂枝湯

治瘧疾但熱不寒及有汗者

知母

甘草 桂枝

枳實 石膏

右吹咀每服伍錢水壹半煎至壹盞去滓溫服

大柴胡湯治瘧熱多寒少日痛多汗脉大以此湯微利為度餘  
邪未盡以 芩連 以盡其邪方見傷食門

清脾散 治瘧瘵脉來弦數但熱不寒或熱多寒少口苦  
咽熱小便赤澀

青皮 厚朴 白朮 半夏 黃芩

草果仁 羌胡 茯苓 甘草 枳實

右吹咀每服四錢水壹半 伍片煎七分溫服不拘時

正氣散 徐同知方 退寒瘧止胃寒進食

藿香 厚朴 草果 半夏 陳皮 砂仁 甘草

右制為散臣黃子煎服如瘧未至俟發入早服

六和湯

人參 草果 知母 具母 烏梅

白芷 檳榔 柴胡 龍子常山 芍藥

右咬咀臣杏仁臣一枚酒水同煎露一宿臨發前二時服

瘧疾方例

王節齋曰瘧是風暑之邪有一日一發有二日一發有三日一發有間日連二日發有日與夜各發有有汗有無汗有上半日發有下半日發有發於夜者治法邪從外入宜發散之然以扶持胃氣為本又須分別陽分陰分而用藥邪瘧及新發熱者可散可祇虛瘧及久者宜補氣血若過服截藥致傷脾胃則必延綿不休

主方

柴胡去苗 白朮 蒼朮米泔浸 肥土三味 麩必用之

陳皮七分 甘草炙 乾葛一分

若一日一發及午前發者邪在陽分加黃芩 芍藥 知母 石膏 芒硝 各

錢執其頭痛加川芎 羌活 獨活 各 口渴加石膏 知母 麥冬 各

若間日或三日發午後或夜發者邪在陰分加芍藥 黃芩 知母 芒硝 酒

炒芍藥 黃芩 酒炒 知母 錢 酒洗 芍藥 酒炒 黃芩 各 提起陽分可截之

若間一日連發二日或日夜各發者氣血俱病加人參 黃芩 芍藥 知母 芒硝 酒

白朮錢 以補氣川芎 當歸 白芍藥 羌活 獨活 各 以補

若陽瘧多汗用黃芩 人參 白朮 以斂之無汗柴胡 芍藥 白朮

黃芩乾 以發之

若陰瘧多汗用柴胡 芍藥 白芍藥 當歸 黃芩 知母 以斂之無汗

柴胡 芍藥 大川芎 羌活 獨活 以發之故曰有汗者要無汗

正氣為主無汗者要有汗散邪為主  
若病人胃氣弱飲食少或服截藥傷脾胃而少食者加

桂枝酒炒

芍藥

各壹錢

各壹錢

各壹錢

若傷食痞悶或有食積者加

枳實

厚朴

各壹錢

各壹錢

各壹錢

各壹錢

各壹錢

各壹錢

若痰盛加

製

各壹錢

各壹錢

各壹錢

各壹錢

各壹錢

各壹錢

各壹錢

若欲截之加

各壹錢

各壹錢

各壹錢

各壹錢

各壹錢

各壹錢

各壹錢

各壹錢

若日又虛瘡寒熱不多或無寒而但微熱者邪氣已無只用

四君子

合四物湯

加柴胡

加黃芩

加芍藥

加甘草

以滋補氣血

以滋補氣血

新刊仁齋直指附遺方論卷之十二終

新刊仁齋直指附遺方論卷之十二



霍亂吐瀉

吐瀉方論

乾上坤下其卦為否陽隔陰而不降陰無陽而不升此否之所  
以痞而不通也人其此陰陽搏霍變亂結搏於中卒然吐瀉或  
瀉而不吐或吐而不瀉大抵心腹擾悶煩疼其視天地不交之  
否異乎否乎霍亂之證心腹卒痛嘔吐下利發熱憎寒頭痛眩  
暈先心痛則先吐先腹痛則先瀉心腹俱痛則吐瀉俱作甚則  
轉筋類頓特及掌間蓋足陽明屬胃以養宗筋暴吐暴下津液  
驟亡宗筋失其所養故學急甚則舌卷縮囊危甚風獨矣然亦  
何以致此哉曰胃傷暑毒露卧甲濕當風取涼風冷邪氣入於  
腸胃加以嗜好肥腥飲啖生冷君更不節激而發焉於是邪正  
相干中脘即閉氣不得通吐利暴作所謂脾胃受賊邪不來勝土

者此也治法霍亂正氣散加鹽豉在胃為上不惟可以溫散風邪抑亦可以調理吐瀉其若傷暑所致未可遽投霍亂散沉冷之劑自合先治中脘如陳湯猶皮半夏湯軍次則以藿香溫服散暑解煩昧者指為脾胃虛冷選用參白朮芍藥散之屬以壯胃滋腸不思風冷未散輒以參朮前湯攔補寒邪和氣得之愈盛愈作縱得淹延或下利或久瀉或腹脹虛浮或中瀉不食變證百出矣抑猶有說焉濕霍亂死者少乾霍亂死者多許仁則嘗有是言矣蓋謂所傷之物因吐利而出泄泄盡則止猶可幸免若上不得吐下不得利所傷之物擁閉正氣關隔陰陽燥擾喘脹其能生乎則知揮霍交亂如人被髮交爭必有以撲之可也古方用參復正取陳利之意但多則太溫莫若薑湯下霍亂圖為愈霍亂氣息劣不斂言者不治

又論

治嘔吐莫先於助胃既助胃而復嘔吐者中脘挾風寒也治喘嗽莫先於調肺既調肺而復喘嗽者風寒在表或在裏也高邪之疾固腸斷下終不作效非腸胃間留蓄風寒邪氣之所致乎故必隨其感受解散於其先則其病其藥度乎其對證矣解散風寒不換金正氣散為上其間曾益則清氣散也霍亂圖用最良若欲其清解則參朮芍藥散等輩則重可也惟暑亦然每每隱伏作病或為熱嘔或為佳煩或為腹痛或泄痢不止暑中類多有之炎燥蘊隆念慮又當及此此說雖詳于卷首敬用申之

吐瀉證治

霍亂正氣散治霍亂吐瀉通用腹痛者加鹽小便利者加

五苓散治霍亂熱多發渴方見霍吐明此藥能溫散風寒濕氣若暑證加

良薑治霍亂神效

良薑

霍香

陳皮 各一兩 甘草 炙三分



右劉細每三錢水煎服

又方

霍香葉 良薑 木瓜

右同煎治霍亂水瀉效

治要除濕湯

半夏麴 川厚朴製 蒼木各二兩 霍香葉

陳皮 茯苓各壹兩 甘草炙七錢

右劉散每服內錢薑七片寒不昏投煎服霍亂瀉而不吐者加

桂吐而不瀉者去薑不加桂吐瀉俱作兼腹痛者加桂

胡椒湯 治霍亂吐瀉

胡椒七粒 生綠豆去拾壹粒

右末煎宣木瓜湯溫和調下

治飲食居處不節以致霍亂方見霍吐門本方宣木瓜

能散風冷

治傷暑霍亂方見霍吐門

治吐瀉不已轉筋攪悶

酸木瓜壹兩 尚香壹兩 甘草炙 具采黃半兩

右劉散每四錢伍片十葉空腹急煎服

四順附子湯 治吐瀉過多手足逆冷六脉沉細氣小不語急服

生附子 白薑炮 人參 甘草炙

右劉每服四錢水試壹壹壹空腹服腹痛加小便不利加

仍用炒薑燻或用方見寒類

治乾霍亂欲吐不吐欲瀉不瀉痰壅腹脹

生薑半兩切

右同炒令色赤以童尿兩盞煎壹盞分為貳服

治霍亂心腹絞痛欲吐不吐欲下不下

先以塩湯壹盞頓服候吐出令透不吐再服續以判湯

倍加湯與之或霍香正氣散加湯倍加湯或

用散

方見諸書用

一分宋瓜半分煎湯調下治乾

霍亂不吐不瀉氣痞于中心腹絞痛此證最惡

治霍亂吐瀉心腹作痛

炒藍貳梳紙包紗護頸其背則十分無事

透則蘇縵又以炒藍熨其背則十分無事

霍亂吐瀉臨時無藥以研細塗心下及兩脚心即止

附錄左

不換金正氣散治霍亂轉筋嘔吐泄瀉頭疼方見醫類

六和湯治心脾不調氣不升降霍亂吐瀉暑天瀉痢方見暑門

理中湯治中寒霍亂吐瀉方見寒門

七氣湯三因方治七氣鬱結五臟之間互相刑剋陰陽不和揮

霍變亂吐利交作

半夏洗五厚朴姜製桂心各三兩白芍藥

茯苓破各紫蘇葉

右咬咀每服四錢水一盞酒半盞煎服

溫服

加減理中

人參

白朮

乾姜

甘草各等分

若為寒氣溫氣所于者加附子一兩名

亂吐瀉如腹皮黃皮各壹兩名治中湯

痛先以鹽湯少許頻服候吐出令透即進此藥

於治中湯內加丁香半兩一兩每服生薑十片同煎

瀉者加附子各一兩名瀉中湯

中湯內加附子一兩

若霍亂吐下腹竹稱手足逆冷於本方內

加附子名瀉中湯

若傷寒結胃先以瀉中湯

方煎服不愈者及諸吐和後胃痞欲絕心膈高起急痛于不

# 泄瀉

泄瀉方論

可近者加**枳實** **茯苓** 各一兩名 **枳實** **中湯** ○若渴者再於  
**枳實** **中湯** 內加 **芍藥** 一兩 ○若霍亂後轉筋者理中湯  
內加大棗 **白朮** 一兩 ○若臍上築者腎氣動也去 **芍藥** 加 **白朮**  
一兩半腎惡燥故去 **芍藥** 惡作奔豚故加 **白朮** ○若悸多加 **茯苓**  
一兩 ○若渴欲飲水者添加 **茯苓** 一兩 ○若腹滿者去 **白朮**  
加 **附子** 一兩 ○若飲酒過多及啖炙煖熱食發為鼻衄加 **附子**  
一兩若傷胃吐血以此藥能理中脫分利陰陽安定血脉

胃為水穀之海其精英則流布以養臟腑其糟粕則傳送以歸  
大腸腸胃虛弱或挾風挾寒或傷暑傷濕停食畜熱冷熱不調  
泄瀉諸證皆能致之挾風者自汗惡風痛引腰背挾寒者筋節  
拘急身軀怯寒傷暑者面垢燥渴泛引水漿傷濕者肌肉虛浮  
肢軀重著冷則腸鳴肚冷而手足清熱則煩燥肚熱而手足溫  
冷熱不調者由熱積於內不能去其積徒以冷藥求之熱氣無  
所發泄故冷與執搏而下注其或冷積於中不能去其積徒以  
熱藥壓之冷積不得宣行故執與冷干而成泄或虛或實裏急  
後重是其候也外此則傷食一證失飢傷飽胃不能消心腹膨  
脹所下酸臭可驗蓋治法當究其感受之源然後為之固實不  
室其源吾恐決潰四出莫知其終者矣雖然脾胃合氣以消水  
穀水穀既分安有所謂泄人皆以泄為脾恙而不知腎病有泄  
焉腎泄何如曰腹痛無定處似痢非痢骨節面黃脚下時冷者  
是也前件諸方條列寸后若泄利之後腹滿身疼是則為表  
裏俱病先當溫裏急與 **四逆散** 然後解表急以 **桂枝湯** 與之活  
人書言之詳矣抑猶有錯餘之論焉用者脾之賦本能勝土古  
人慮之固也經曰用腎氣虛為病泄瀉亦孰知腎者所以守司  
於下而肝者又門戶要束之具束則不泄也不然泄瀉而面色

青慘者古書謂肝經受寒所致特設當歸湯以主之果何  
意哉下利惡露且或病人體弱

泄瀉證治

調中湯治腸胃虛弱滲瀉有泄泄瀉頻併

參

白朮

乾薑

甘草

如茯苓

川厚朴

右劉細每服三錢空心煎服

調中湯治腸虛泄瀉止嘔進食

霍香葉

縮砂

蓬朮

乾薑

肉桂

茴香炒

草果

麥牙炒

益智仁

橘紅各三分

蒼朮炒

神麩炒

右末每服一錢薑棗并少鹽煎服

兩劑散治脾虛腸鳴泄瀉不食

大肉豆蔻一枚剉小餅丁入酒中煮  
在內以麩棗煎數熟為度去麩

右末每壹錢米飲調下

加木香方見吐瀉門  
香靈散方見暑門治傷暑泄瀉更增茯苓

橘紅

厚朴 礮烙三 蒼朮 炒 五兩半 甘草 錢二兩

右劉細每服三錢薑棗煎服

又法以五苓散對火

平胃散用陳米煎著湯瀉為證

黃連白朮圓治暑濕熱瀉方見吐瀉門

又洞泄方見吐瀉門末米飲下

藥皮三兩 黃芩二兩 黃連一兩

右劉每服回錢水大盞煎七分入

白朮末半錢再煎少煎

藥皮三兩 黃芩二兩 黃連一兩

右劉每服回錢水大盞煎七分入

白朮末半錢再煎少煎

薑湯治冷溢泄瀉方見寒類  
見濕類通用

大已藥圓治虛冷腸鳴滑泄

良薑 乾薑 各六兩 桂 薑椒各四兩

右末麩糊圓桐子大每五十圓米飲下

已已圓治冷熱不調泄瀉

吳茱萸 炒 黃連 去鬚 白芍藥 等分

右末米糊圓桐子大每三十圓空心米飲下

胃人養臟湯治冷熱不調泄瀉裏急後重

墨栗殼 去穢 炙 木香 白芍藥 各八分

訶子肉 六分 人參 白木 當歸 各三分

甘草 炙 肉桂 各四分

右鹿末每服二錢薑棗煎食前服先用縮砂煎湯下

方見脈滿門候其寒濕清然後服此

雞骨散治飧食生冷久瀉冷積

良薑 辣桂 香附 炙 益智仁

天台烏藥 各一兩 杜草 炙 半兩

右末每式錢入少鹽沸湯點吞

三鞭散酒食傷積用此

京三稜 炮 蓬莪 木炮 益智仁

杜草 炙 青皮 銹 白 附 白 伏 苓 四兩

右末每二錢少鹽煎吞

服固腸散止之

固腸散治冷瀉腸滑及下痢煩併

罌粟殼 去腸等一兩 薑 炙 陳米 炒 一兩 乾薑 炮

甘草 炙 各半 肉豆蔻 生 木香 一分

右末每式錢薑棗煎食前服

實腸散治泄瀉不止

川厚朴 製 一兩 肉豆蔻 訶子 炮

縮砂 橘紅 蒼木砂 伏苓各一兩

木香半兩 甘草炒四錢

右籠末每叁錢薑寒煎服手足冷加炒

安腎圓 方見水使門 治腎泄腹痛無定處似痢非痢骨痛面黃

腰脚時冷用 送下方見氣門

震靈丹 治腎泄盜候同煎

禹餘糧 火煨得碎不計過丁頭代赭石 如上修製

赤石脂 紫石英 并碎以上各四兩入甘錫中以瓦蓋

通紅火 入為度入地坑 的乳香 別研 沒藥

五靈脂 各去砂石研 朱砂一兩研

右並為細末糯米粉糊圓小雞頭大風乾每服三圓用炒

入東煎湯調 少許空心送下小兒腎泄白膿濁汁

面黧齒脫猥人怯寒 末入些 以東煎炒

取熱汁調下

木香 治水土不服

木香散 治脾腎俱虛泄瀉

肉豆蔻 故紙 白木 白伏苓 各半兩

木香 甘草炙各一分

右剉細每三錢食前薑蔥煎服

二神圓 治脾腎俱虛泄瀉不食 肉豆蔻 各兩生

破故紙 四兩炒

右末用肥兒蒸爛取肉研膏夾和柞圓桐子大每服四十圓

清柴湯 下若飯食後常一泄服此頗愈

當歸厚朴湯 治肝經受寒面色青慘厥而泄利

當歸 厚朴 各二兩 官桂 三兩 良薑 五兩

右剉散每三錢食前服

附錄方

白朮芍藥湯 治太陰脾經受濕水泄注下躄重微痛困

若無力不欲飲食暴泄無數水穀不化

白木

芍藥略一

甘草 五斤

右咬咀每服一兩水煎

**升陽除濕湯**

按辨方 治脾胃虛弱不思飲食腸鳴腹瀉泄瀉無

度小便黃色四肢困弱

升麻

柴胡

防風

神麴

澤瀉

猪苓略半

蒼木一兩

陳皮

甘草炙

大麦芽略三

右咬咀水煎食後熱服

**升陽除濕防風湯**

東垣方

如大便閉塞或裏急後重數至圍而不能便或有白膿或血慎勿利之利之則必致重病及鬱結

而不通也又此道峯其陽則陰氣自降矣

蒼木米泔浸四日 防風二斤

白木

白茯苓

白芍藥略一

右咬咀除舊木

另作片子水一碗半煎至二盞內諸藥同煎

第一 大盞食前熱服

**益胃湯**

按辨方

治頭悶勞動則微痛不喜飲食四肢怠惰燥熱短氣口不知味腸鳴大便微澹黃色身躰皆悶口乾不喜飲

冷

黃芪

甘草

半夏湯泡各壹錢

柴胡

人參

白木

益智略三

當歸稍

升麻略半

陳皮秤

蒼木半斤

右咬咀水盞半煎八分食前通口服

**胃本湯**

治感暑夾食泄瀉煩渴即

蒼木

陳皮

厚朴姜製 甘草

白木

茯苓

猪苓

澤瀉

桂

右咬咀水煎入鹽少許服如作末藥湯服亦可

**胃本湯** 分理陰陽治瀉解熱

柴胡

黃芪

半夏

甘草略半

人參 猪苓 白朮 茯苓 澤瀉各等

水二鍾 三片煎服

養胃湯 治脾胃虛寒嘔逆惡心腹脇脹痛腸鳴泄瀉方見靈苑

五苓散 益元散 並見暑門

丹溪方 治一老人奉養太過飲食傷脾常常泄瀉亦是脾泄

黃芩 炒半兩 白朮 炒二兩 白芍 藥酒洗半兩 半夏 泡多

神麴 炒 山查 炒各一兩 藿香 一兩

右為末 白朮散 包飯饒熟研丸如梧子大食前白湯下

錢氏白朮散 治氣血俱虛神弱之人或吐瀉

人參 白茯苓 白朮 木香

甘草 藿香 略一 乾姜 半兩

右為粗末每服伍錢水一鍾煎七分食前溫服

參苓白朮散 治脾胃氣虛飲食不進或致吐瀉 方見靈苑

溫膽止瀉散 治大人小兒久瀉滑脫不止

乾姜 微炒 白芷 附子 生各一兩

右為細末用生白朮丸如彈子大按入內一二日即止

世瀉治痢 出明醫雜著

王節齋曰世本屬濕熱多因飲食不節致傷脾胃而作瀉者時令分寒執新久而施治治法補脾消食燥濕利小便亦有升提下陷之氣用風藥以勝濕亦有久泄腸胃虛滑不禁者宜收澀之

至方

白朮 二兩 白茯苓 白芍藥 炒各一兩 薤白 炒 三兩

陳皮 一兩 炙甘草 法炒 分

若傷食泄黃或食積加 大麥冬 山查子 各一兩 炒 黃連 炒

消之腹中窄狹飽悶再加 厚朴 枳實 各一兩 炒 黃連 炒

若小便赤澀短少加 澤瀉 茯苓 各一兩 以分利之夏月再

加 黃連 炒 山查子 四分



若口渴引飲加**葛根**半各一**人參****麥門冬**各一**升麻****滑石**各四  
**烏梅肉**二各

若夏秋之間濕熱大行暴注水泄加炒**黃連****蒼朮****澤瀉**各一  
**升麻****木通**各五**發熱燥渴加****乾薑****石膏**各一**黃連****小便黃**

亦加**茵陳****山梔****木通**各五  
若飲酒便泄吐酒積熱瀉也加炒**黃連****茵陳****乾薑**各一**木香**  
五分**神曲****麥芽**各八

若寒月唐泄清冷腹痛或傷生冷飲食加**神曲****麥芽****炙乾姜**  
各一**砂仁****益智****木香**各七

若久泄胃氣下陷服利小便之藥而不效宜加**人參****黃芪**各  
錢以補中氣**升麻****柴胡**各四以升提之加**羌活****防風****黨參**

**白芷**等風藥各分助風以平之更加多**乾姜****芍藥**以固之  
若久泄脾胃虛弱食少難化加多**黃芪****人參**各一**神曲****麥芽**  
各一**木香**服過**乾薑**各五

若久瀉腸胃虛滑不泄加**黃芪****人參****何十皮****赤石脂****紅櫻**

**木香****炙乾姜**各位

**針灸法**脾脘二穴在十一椎下兩傍中脘一穴在脐上四寸

關元一穴在脐下三寸天樞二穴在脐傍各開三寸

大腸俞二穴在十六椎下各開一寸半灸三