



中春禘
既宗癸酉

鄭錄對

禮記卷之

室田畝典纂

門 5
903
1

75

室町温興纂輯

製劑備考

明治癸酉
仲春新鐫

應機樓藏

例言

一此書ハ彼ノ紀元一千八百六十七年刊行ノ倫敦局方ニ就テ當今一般採用スル所ノ方法ヲ抄譯シ從テ諸書ヲ參考シ其遺缺ヲ補フ亦傍ラ東京醫學校教頭繆爾羅兒忽布滿二氏并ニ偉理士抱獨英諸君ノ實驗セシ所ノ新方ヲ記載セル者ナリ今自ラ蕪陋ヲ揣ラズ同志ノ需メニ應メ之ヲ上梓ス然レ唯藥劑製劑ノ便覽ニ備ヘント欲スルノミ覽者恕セヨ

一書中下符ヲ記スル者ハ篤麻斯藥方書合ハ合



新印氏

製劑備考 例言

水一升ハ
大凡六十
汚

衆國局方カハガルロト氏藥劑書ニハ繆爾羅
兜氏ホハ忽布滿氏抱ハ抱獨英氏偉ハ偉理士
氏ノ藥方ヲ標記ス

一編中載スル所ノ服量ハ總テ一度ノ量トス秤
量一比ハ十六多、液量一巴ハ二十汚、一瓦ハ八
巴ヲ以テス

一藥名ノ冗長ナル者本条ニハ謹テ本名ヲ舉レ
凡次条ニ往々略記スル所アリ例之蘆薈越幾
斯ヲ蘆薈越ト記スルガ如シ餘ハ之ニ推ス

明治六癸酉二月

室町温興 識

製劑備考上篇目次

煎劑

複方蘆薈煎 一丁	依蘭苔煎 一丁
幾那煎 二丁	柘榴根皮煎 二丁
大麥煎 二丁	罌粟殼煎 二丁
檉皮煎 二丁	撒兒沙煎 三丁
複方撒兒沙煎 三丁	蒲公英煎 三丁
悉多滿煎 三丁	舍電華謨白煎 四丁
鹿角煎 五丁	沙列布煎 五丁
蜀葵根煎 五丁	支麻爾巴煎 六丁

荅麻林度煎 六丁

七葉樹皮煎 六丁

水楊皮煎 六丁

木類煎 六丁

徽毒煎 七丁

木類煎 七丁

○浸劑

加蜜列浸 八丁

橙皮浸 八丁

複方橙皮浸 八丁

彌箇浸 八丁

格倫僕浸 八丁

丁子浸 九丁

葛私加栗浸 九丁

阿仙藥浸 九丁

キレテ一浸 十丁

幾那浸 十丁

安屈斯黥刺浸 十丁

屈蘓浸 十丁

實芟多里斯浸 十丁

蜀羊泉浸 十一丁

麥奴浸 十一丁

複方健智安那浸 十一丁

刺荅尼浸 十一丁

亞麻仁浸 十二丁

忽布浸 十二丁

麻知古浸 十二丁

大黃浸 十二丁

玫瑰浸 十三丁

遠志浸 十三丁

旃那浸 十三丁

攝爾扁太里亞浸 十三丁

烏華宇兒失浸 十四丁

纈草浸 十四丁

サルヒヤ浸 十四丁

亞兒尼加花浸 十四丁

括失亞浸 十五丁

海葱浸 十五丁

薄荷浸 十五丁

吐根浸 十五丁

○丁幾劑

雙蘭菊丁幾 十六丁

蘆薈丁幾 十六丁

亞兒尼加丁幾 十六丁

阿魏丁幾 十七丁

橙皮丁幾 十七丁

荖若丁幾 十七丁

複方安息香丁幾 十七丁

罌箇葉丁幾 十八丁

格倫僕丁幾 十八丁

複方羯布羅丁幾 十八丁

大麻丁幾 十九丁

羌菁丁幾 十九丁

蕃椒丁幾 十九丁

複方益智丁幾 十九丁

葛斯加栗刺丁幾 二十丁

葛斯多僕謨丁幾 二十丁

阿仙藥丁幾 二十丁

幾列太丁幾 二十丁

複方哥囉呀丁幾 廿二丁

複方幾那丁幾 廿二丁

幾那丁幾 廿二丁

桂皮丁幾 廿二丁

哥攝尼兒丁幾 廿二丁

格兒失屈謨丁幾 廿二丁

失鳩荅丁幾 廿二丁

雜夫蘭丁幾 廿二丁

華澄茄丁幾 廿二丁

實莖多利斯丁幾 廿三丁

麥奴丁幾 廿三丁

醋酸鈣丁幾 廿三丁

過格魯兒酸鈣丁幾 廿四丁

沒食子丁幾 廿四丁

複方健智亞那丁幾 廿四丁

瘡瘡木脂丁幾 廿四丁

菲沃斯丁幾 廿五丁

沃顛丁幾 廿五丁

藥刺巴丁幾	廿五丁	吉納丁幾	廿六丁
刺達尼丁幾	廿六丁	復方刺賢埕兒丁幾	廿六丁
杓椽皮丁幾	廿六丁	魯弊里亞丁幾	廿七丁
亞的兒精魯弊里亞丁幾	廿七丁		
沒藥丁幾	廿七丁	忽布丁幾	廿七丁
阿片丁幾	廿八丁	番木鱉丁幾	廿八丁
ピレトリエ丁幾	廿九丁	安母尼亞阿片丁幾	廿八丁
規尼涅丁幾	廿九丁	括失亞丁幾	廿九丁
薩毘那丁幾	三十丁	大黃丁幾	廿九丁
遠志丁幾	三十丁	海葱丁幾	三十丁

梅那丁幾	三十丁	攝兒扁答利亞丁幾	三十二丁
蔓陀羅華丁幾	三十一丁	麝香丁幾	三十一丁
拔兒撒謨篤隆丁幾	三十一丁	纈草丁幾	三十一丁
譜母尼亞纈草丁幾	三十一丁	緣藜蘆丁幾	三十二丁
姜丁幾	三十二丁	強姜丁幾	三十三丁
香窟丁幾	三十三丁	健胃丁幾	三十三丁
水製大黃丁幾	三十三丁	龍動鍊丁幾	三十四丁

○精劑

濃酒	三十五丁	淡酒	三十五丁
亞的兒精	三十五丁	甘硝石精	三十五丁

芳香硃砂精 三十六丁

硃砂加阿魏精 三十六丁

複方沙羅藤精 三十七丁

加耶布的精 三十七丁

龍腦精 三十七丁

哥羅叻精 三十七丁

杜松子精 三十八丁

刺賢埜兒精 三十八丁

薄荷精 三十八丁

肉豆蔻精 三十八丁

迷迭香精 三十九丁

耶麻依加胡椒精 三十九丁

硃砂加過泥子精 三十九丁

複方刺賢埜兒精 三十九丁

複方杜松子精 四十丁

忽布滿鎮痛液 四十丁

民埜列里精 四十丁

稀硃砂精 四十丁

葛縷子精 四十一丁

茴香精 四十一丁

過喀順 四十二丁

○酒劑

蘆薈酒 四十三丁

安質母尼酒 四十三丁

橙酒 四十三丁

格兒失屈謨酒 四十三丁

錢酒 四十四丁

杓椽酸錢酒 四十四丁

吐根酒 四十四丁

阿片酒 四十四丁

規尼涅酒 四十五丁

大黃酒 四十五丁

海葱酒 四十五丁

香竈阿片酒 四十六丁

麥奴酒 四十六丁

香竈酒 四十六丁

アルロー酒 四十六丁

卵ブランデー酒 四十七丁

製劑備考上篇

常陽 益室町温興 纂輯

煎劑

複方蘆薈煎

デコクチユム、アロエス、コムボスチユム、
コムボウシンド、デコクシユニ、オスアルース英

蘆薈越幾斯 一 没藥 雜夫蘭 各一 半

炭酸剥篤亞斯 一 甘草越幾斯 一 複

方益智丁幾 八 汚 水 適 宜

右蘆薈越没藥炭酸剥甘草越ノ四品ヲ蓋器

ニ入レ水一巴ヲ以テ煮ル_一七分時火ヨリ
下シ雜夫蘭ヲ浸出シ后チ、益智_一丁、ヲ加ヒ瀝
過シ之レニ水ヲ加ヒ全量三十汚ヲ取ル
〔服量〕半汚至二汚腸ノ遲慢ニ因セル便秘、及
ヒ胃弱ニ宜シ

依蘭苔煎

デコクチユム、セトラリア甸
デコクシユン、オス、アイスマラント、モス英

依蘭苔 一汚 水一巴

右苔ヲ洗ヒ水ヲ加ヒ蓋閉メ煮ル_一十分時
瀝過メ一巴ヲ取ル

〔服量〕半汚至二汚經久慢性咳嗽、肺勞、及ヒ疫

咳ニ用フ

幾那煎

デコクチユム、シシコ子甸
デコクシユレ、シシコナ英

黄幾那 粗末一汚ニ_一汚 水一巴

右煮ル_一十分時ニメ瀝過シ全量一巴ヲ取
ル

〔服量〕一汚至二汚胃弱、及ヒ病ノ恢復期ニ用

フ

柘榴根煎

デコクチユム、ガラナチ一甸
デコクシユン、オフ、ホームカ
ラチ一ト英

柘榴根皮 一汚 水一巴

右煮テ一巴ニ至リ瀝過ス

服量 一汚至二汚 帶狀蟲痢疾ニ宜シ

大麥煎 デコクチュム、ホルデー甸
デコクシユン、オフ、バルレー英

大麥 二弓 水 一巴半

右大麥ヲ冷水ニテ洗ヒ水ヲ加ヒ煮ル一二十分時ニメ濾過ス

勞瘵、衰弱、胸腹ノ痙攣、痙衝性ノ諸病ニ用フ

罌粟殼煎 デコクチュム、ババーウエル甸
デコクシユン、オフ、ホッピ一英

罌粟殼 二弓 水 一巴半

右煮ル一二十分時ニメ濾過シ一巴ヲ取ル
洗劑、蒸漏劑ニ用井テ良シ

檨皮煎 デコクチュム、ケルキユス甸
デコクシユン、オフ、オグバーク英

檨皮 一弓半 水 一巴

製法 同前、収斂、含嗽、或ハ注射藥トス買ハ敷

撒兒沙煎 デコクチュム、サルセ甸
デコクシユン、オフ、サルサパリルラ英

撒兒沙根 二弓半 沸湯 一巴半

右煮ル一二十分時ニメ濾過シ、全量一巴ヲ取
ル

服量 二汚至十汚、第二期、黴毒、慢性、癩、麻質斯

ニ用ス

複方撒兒沙煎 デコクチュム、サルセ、コム、ホスチュム甸
コム、ポウニド、デコクシユン、オフ、サルサパリルラ英

撒兒沙根ニ号半 薩沙布刺斯 癒瘡木

甘草 各半号 瑞香皮 一号 水 一巴半

右煮ル₁十分時ニ₁濃過シ₁一巴ノ液ヲ取

服量ニ汚至十汚₁主治同前

蒲公英煎 デコククナム、タラクサシ甸
デコクシユン、オフ、ダンテリウシ英

蒲公英根 一号 水 一巴

右煮ル₁十分時濃過メ₁一巴ノ量ヲ取ル

服量ニ汚至四汚₁黃疸、肝ノ慢性焮衝、胃ノ慢

性病或ハ水腫等ニ用フ

悉多滿煎 ミットマ 濃煎

撒兒沙根 一号半 水 三十六汚

右煮ル₁十分時ニ₁メ₁今煎₁入₁銀朱

甘瀕 三十八 明礬 白糖 各九十八

右四品布囊ニ盛リ煎液中ニ入ル量イ入

旃那葉ニ号 甘草 一号半 遏泥子 胡蘆

巴子 各三十八

右四味ヲ加ヒ煮テ二十四汚ノ液ヲ取り、玻

璃瓶ニ入レ濃煎ノ二字ヲ記ス

○薄煎方 煎₁入₁水₁ニ₁十六汚

濃煎滓 撒兒沙根 各六分 水 三十六分

右煮テ 杓椽皮末 桂末 益智 各二十分

甘草 四十五分

右四味ヲ加ヒ煮テ二十四分ノ液ヲ取り、玻

璃瓶ニ入レ薄煎ノ二字ヲ記ス

右ハ本方八分ノ一ニノ一日ノ服量トス

用法 初日早朝ニ瀕葯九十六丸ヲ頓服シ、二

日ヨリ五日至八、毎日午前ニ濃煎一瓶ヲ温

服シ、午後ニ薄煎一瓶ヲ冷服ス、第六日又瀕

葯丸ヲ服シ、七ヨリ十日至、又毎日濃薄二

煎ヲ服スル、初ノ如シ、尚ホ委クハ密篤兒

藥性論ヲ見ルベシ

主治 第三期梅毒、慢性癩麻質斯ニ良シ

合電華 謨白煎 デコクチユム、コルニユセルヒ、コムホスチユム旬

鹿角屑 蒸餅心 各二分 水 三廿

右煎ノ二比ニ至リ白糖半分ヲ混和ス

眼量 一汚至二汚熱病后、衰弱、胃腸過敏、下利

腹痛ニ良シ

鹿角煎 デコクチユム、コルニユセルヒ、旬

鹿角屑 一分 水 一巴

右煮ル一時間ニノ瀝過ス

服量一汚至二汚主治同前

沙列布煎 テコクチユム、サレツフ、旬

沙列布一汚 沸湯十汚

右末ニ水適宜ヲ加、溶シ后沸湯ヲ入攪和ス

服量一汚至二汚呼吸器聖京屈、咳嗽、泄瀉諸

臟ノ焮衝、疝痛ニ良シ

蜀葵根煎 テコクチユム、アルター、旬

蜀葵根ニ汚 水適宜

右煎メ六汚或ハ十二汚ノ液ヲ取ル

支麻爾巴煎 テコクチユム、シマルバ、旬

支麻爾巴皮一汚 水十二汚 蜜二汚

右煎メ十二汚ノ液ヲ取ル

服量一汚至二汚胃弱及ヒ痢疾ニ用フ

荅麻林度煎 テコクチユム、タマリシチユス、旬

荅麻林度半汚 水十二汚

右煮テ八汚ノ液ヲ取ル

服量一汚至二汚痢疾及ヒ熱病、殊ニ膽液令

泌增多ト腐敗症ヲ合候セル者ニ宜シ

七葉樹皮煎 デコクチユム、ヒボカスターニ一旬

七葉樹皮 一弓 水 十二汚

右煎ノ八汚ノ液ヲ取ル

服量 半汚至二汚 經久白帶下、粘液漏泄、虚性

諸失血、下利等ニ用フ

水楊皮煎 デコクチユム、サリキヌ旬

水楊皮 半弓 水 十二汚

右煎ノ十汚ノ液ヲ取ル

服量 一汚至二汚 七葉樹同効アリ

抱木類煎

支那根 蜀羊泉 癒瘡木 各半弓 大黃

甘草 各二弓 水 三十汚

右煎ノ二十四汚ノ液ヲ取ル

服量 一汚至二汚

黴毒煎 デコクチユム、シナ、コムホシチユム旬、複方支那煎

支那根 二弓 癒瘡木 撒兒沙根 各一弓

水 四十八汚

右煎ノ二十四汚ノ液ヲ取リ左ノ二品ヲ浸

出ス 薩沙布刺斯 一弓 梅那葉 半弓

右濃過ス

〔服量〕一汚至二汚

木類煎

撒兒沙根 十四汚
癒瘡木 七汚
薩沙布刺

斯 三汚

右二十八包トシ、一包ヲ水七十二汚ヲ以テ煎シ、四十八汚ノ液ヲ取り、之ヲ玻璃瓶ニツニ入レ、汚宛 朝一瓶ヲ温服セシメ、残りノ一瓶ヲ晚ニ冷服セシム、朝温服ノ後被覆ヲ汗ヲ取ル、毎五日氏姆藥刺巴散ヲ與フ、此日ハ温服セシメズ、

○浸劑

加蜜列浸 インヒュシヨム、アンセミキヌ、インヒュシヨム、オス、カモマイル、英

加蜜列花 半汚 沸湯 十汚

右蓋閉ノ浸漬スルヲ十五分時ニ濃過ス

〔服量〕一汚至四汚、胃弱、聖京、屈熱、及ヒ經久漬

瘍ニ洗溺藥トス

橙皮浸 インヒュシヨム、オス、オラニキ、ペール、英

橙皮 半汚 沸湯 十汚

製法同前

〔服量〕一汚至二汚、緩強壯、驅風、健胃劑トス

浸劑

複方橙皮浸

イニヒュシユム、オーランチー、コムボウト、イニヒュシユン、オスオーレンヂ、ペール英

橙皮 半号

杓椽皮 六十八

丁子 三十八

沸湯 十号

右蓋閉メ浸ス一四十分時ニノ瀝過ス

服量一汚至二汚主治同前

弼箇浸

イニヒュシユム、ビュキ一旬、イニヒュシユン、オフ、ビユコ英

ビツコ葉 半号

沸湯 十号

右蓋閉メ浸ス一一時ニノ瀝過ス

服量一汚至四汚膀胱粘膜ノ慢性焮衝ニ用

格倫僕浸

イニヒュシユム、コロム、イニヒュシユン、オス、カルム、バ英

格倫僕 半号

沸湯 十号

右蓋閉メ浸漬スル一一時ニノ瀝過ス

服量一汚至二汚胃弱及ヒ霍乱ノ嘔吐其他

ノ嘔吐症ニ良シ

丁子浸

イニヒュシユム、カリ、オヒルリ旬、イニヒュシユン、オス、カロープス英

丁子 半号

沸湯 十号

右蓋閉浸出スル一半時ニノ瀝過ス

服量一汚至四汚痛風ノ胃ヲ胃ス者及ヒ風

氣疝ニ用フ

浸劑

葛私加栗浸 イシヒユシユム、カマカリルレ甸
イシヒユシユム、カマカリルレ甸

葛私加栗 一芍 沸湯十芍

右蓋閉浸ス一一時ニノ瀝過ス

〔服量〕一芍至二芍 神經諸熱後、精力虚脱、胃腸

衰弱スル者ニ用フ

阿仙藥浸 イシヒユシユム、カテキユ一甸
イシヒユシユム、オスカテキユ一甸

阿仙藥 百六十片 桂皮 三十片 沸湯十芍

右蓋閉浸出スル一三十分時ニノ瀝過ス

〔服量〕一芍至二芍 下利、下血、子宮漏血ニ用フ

幾列太浸 イシヒユシユム、キレテ一甸
英甸

キレテ一 半芍 沸湯十芍

製法同前

〔服量〕一芍至二芍 強壯藥トシ用フ

幾那浸 イシヒユシユム、シシコ子甸
イシヒユシユム、オフ、シシコ子甸

黄幾那 半芍 沸湯十芍

右蓋閉浸出スル一二時ニノ瀝過ス

〔服量〕一芍至二芍 胃弱及ヒ病ノ恢復期ニ用

安偃斯點刺浸 イシヒユシユム、アシダスチユラ甸
イシヒユシユム、オフ、コトバリア甸

安偃斯點刺 半芍 水十芍

製法同前

服量 一汚至二汚 胃弱慢性下利 風氣疝 二用

フ

屈蘇浸

インヒユシユム、コツソ、旬
インヒユシユム、オフ、コソ、英

コツソ 半汚 沸湯 八汚

右蓋閉浸ス 一十五分時ニ用フ

服量 四汚至八汚 帶狀蟲ニ宜シ

實芟多里斯浸

インヒユシユム、チキタリス、旬
インヒユシユム、オフ、ホキマ、グロフ、英

チキタリス葉 三十八 沸湯 十汚

右蓋閉浸漬スル 一 一時ニ用過ス

服量 半汚至二汚 心悸元進 水腫 痙攣性喘息

ニ用フ

蜀羊泉浸

インヒユシユム、ガユルカマレ、旬
インヒユシユム、オフ、ウーヂー、ナイトセート、英

蜀羊泉 一汚 沸湯 十汚

製法同前

服量 一汚至二汚 癩麻質斯 皮膚病及ヒ水腫

ニ用フ

麥奴浸

インヒユシユム、エルコタ、旬
インヒユシユム、スビユールド、ライ、英

麥奴 半汚 沸湯 十汚

右蓋閉浸ス 一 一時ニ用過ス

服量一汚至二汚子宮機能衰弱白帶下子宮出血ニ用ス

複方健智安那浸 インヒュシユム、ゲンチアナ、コムホシチコム、コムホウウド、インヒュシユン、オス、センチヤン、英

ゲンチアナ根 橙皮 各一汚 杓楨皮 半汚

沸湯 十汚

右蓋閉浸出スル一汚ニメ瀝過ス

服量一汚至二汚胃弱喜斯的里黄疽ニ用フ

刺答尼浸 インヒュシユム、カラメリア、英

ラタニ一汚根 半汚 沸湯 十汚

製法同前

服量一汚至二汚胃弱及ヒ赤痢ニ宜シ

亞麻仁浸 インヒュシユム、リニユム、英

亞麻仁 二汚四十八 甘草 一汚 沸湯 十汚

右蓋閉浸漬スル一汚四時ニメ瀝過ス

服量一汚至二汚聖京低痢疾及ヒ淋疾ニ用

忽布浸 インヒュシユム、リニユム、オホツツ、英

忽布 半汚 沸湯 十汚

右浸漬スル一汚二時ニメ瀝過ス

服量一汚至二汚樓麻質斯及ヒ痛風ニ用フ

麻知古浸 イニヒュシユム、マチコ旬英

麻知古 半号 沸湯 十号

右蓋閉浸スル 一時ニノ瀝過ス

服量 一汚至四汚 胃弱 驅風 及ヒ止血ニ用フ

大黃浸 イニヒュシユム、レー旬

大黃 半号 沸湯 十号

右蓋閉浸漬スル 一時ニノ瀝過ス

服量 一汚至二汚 便秘 及ヒ芳香藥ト伍ノ腸

ノ衰弱 下利ニ用フ

玫瑰浸 イニヒュシユム、ロセー、アシゲユム旬

玫瑰花 半号 稀硫酸 一号 沸湯 十号

右酸ヲ湯ニ加ヒ之ニ花瓣ヲ浸スル 一時ニ

ノ瀝過ス

服量 一汚至二汚 肺勞ノ盗汗 及ヒ咯血ニ用

遠志浸 イニヒュシユム、セ子ゲ旬

遠志 半号 沸湯 十号

右浸漬スル 一時ニノ瀝過ス

服量 一汚至二汚 水腫 痺麻質斯 及ヒ喘息ニ

用ス

旃那浸

インヒユシユム、セシ子、旬
インヒユシユム、オフ、セシナ、英

旃那葉

一 匁

生姜

三十 匁

沸湯

十 匁

製法同前

服量 一 匁至二 匁、便秘及ヒ急性病ニ於テ下

泄トシ用ス

撰爾扁太里亞浸

インヒユシユム、セルペンタリア、旬
インヒユシユム、オフ、セルペンタリ、英

セルペンタリ根

半 匁

沸湯

十 匁

右浸出スル一 二時間ニシテ瀉過ス

服量 一 匁至二 匁、泰衰土及ヒ虚勞病ニ用フ

烏華字兒失浸

インヒユシユム、ユラア、ユルシ、旬
インヒユシユム、ビエール、ベルリ、英

ウワウルシ葉

半 匁

沸湯

十 匁

製法同前

服量 一 匁至二 匁、慢性下利及ヒ痢疾白帶下

蜜尿ニ用フ

纈草浸

インヒユシユム、ハレリア、旬
インヒユシユム、オフ、ハレリア、英

纈草根

二 匁

沸湯

十 匁

右浸出スル一 二時間ニシテ瀉過ス

服量 一 匁至二 匁、喜斯の里癩癩及ヒ萎黃病

ニ用ス

サルヒヤ浸

インヒユシユム、サルヒヤ、旬
インヒユシユム、オフ、セー、英

サルヒヤ一弓 沸湯一巴

右浸出スル一半時ニノ濃過ス

〔服量〕半汚至二汚蜂蜜明礬ヲ加ヒ含嗽藥ト

ス

アルニカ浸 インヒュシユム、アルニカ甸
インヒュシユン、オフ、リヲバルドス英

亞兒尼加花一弓 沸湯一巴

製法同前

〔服量〕半汚至一汚黒障眼、僂麻質斯、痛風、麻痺

水腫ニ用ヒ打撲ニ外用トス

括失亞浸 インヒュシユム、クツシア甸

括失亞一弓 沸湯十汚

右浸出スル一半時間ニノ濃過ス

〔服量〕半汚至二汚下利及ヒ病後ノ衰弱ニ宜

シ

海葱浸 インヒュシユム、スキレラ甸
インヒュシユン、オフ、スクサル英

海葱三十五瓜 餹水六汚

右浸出スル一小時ニノ濃過ス

〔服量〕半汚至二汚粘液性喘息及ヒ水腫ニ用

フ

薄苛浸 インヒュシユム、ノシタ。ヒペリタ甸
インヒュシユン、オフ、ベツアルミント英

薄苛葉 半匁 沸湯 十匁

右浸出スル一時間ニシテ濾過ス

服量 半匁至二匁 胃脘及ヒ風氣痛ニ用フ

吐根浸 インヒュシユム、イヘカコアナ旬

吐根 粗末 十二匁 餹水 六匁

右浸出スル一時間ニシテ濾過ス

服量 每二字一食匙 肺臟病殊ニ祛痰ニ用フ

○丁幾劑

雙蘭菊丁幾 ラシクテラ、アコニチ旬、チンクチール、オスアコナイト英

雙蘭菊根 二匁半 濃酒 一匁

右雙蘭菊ヲ濃酒十五匁ヲ取り固封シ浸ス

一ニ日其間時々振蕩シ布ニテ濾過シ其滓

ニ残りノ濃酒五匁ヲ加ヒ復タ濾過メ之ニ

濃酒ヲ加ヒ全量一匁トス

服量 二十匁至三十匁 慢性癩麻質斯頭痛、搦

搦、神經痛、ニ用フ

蘆薈丁幾 チンクテラ、アロエス旬、チンクチール、オスアロエス英

丁幾

蘆薈 ソコツライン産半ヲ

甘草越幾斯 一ヲ半

淡酒 一巴

右蘆薈ト越幾斯ヲ壘ニ内レ淡酒十五汚ヲ加ヒ固封シ其間時々振蕩シ浸ス₁七日瀝過メ淡酒ヲ加ヒ全量一巴トス

服量 一汚至二汚腸ノ遲慢ニ因セル便秘、經閉及ヒ胃弱ニ用フ

亞兒尼加丁幾

チンクチュラアルニケ甸
チンクチュールオスアルニカ英

亞兒尼加根 一ヲ 濃酒 一巴

製法 雙蘭菊丁幾ニ同シ

服量 一汚至二汚神經性頭痛、麻痺ニ内用シ

及ヒ挫傷ニ外用ス

阿魏 丁幾

チンクチュラ、アサフエチア甸
チンクチュールオス、アサフエチア英

阿魏 二ヲ半 濃酒 一巴

製法 蘆薈丁幾ニ同シ

服量 半汚至一汚喜斯的里、喘息、疫咳、及ヒ蛔

虫ニ宜シ

橙皮 丁幾

チンクチュラ、オリランチイ甸
チンクチュールオス、オリレンジペール英

橙皮 二ヲ 淡酒 一巴

右壘ニ内レ固封シ時々振蕩シ浸ス₁七日

ニメ濃過シ淡酒ヲ加テ全量一巴トス

服量一乃至二乃至緩強壯驅風健胃劑トシ用

莨菪丁幾

チンクチュラ、ベルラドン子甸
チンクチュール、オフ、ベルラドン子甸

莨菪葉 一多

淡酒 一巴

製法雙蘭菊丁幾ニ同シ

服量五乃至二十乃至顔面神經痛、麻痺、癩癧、痛

風、痺、麻、質、斯、水、腫、等ニ用フ

複方安息香丁幾

チンクチュラ、ベンソイン、コムボシテ甸
コムボウ、チンクチュール、オフ、ベンソイン

安息香 二多

精製蘇合香 一多半

拔兒撒

謨篤隆 半多

蘆薈 ソコツライン産百六十

濃酒 一巴

右壘ニ内レ固封ノ時々振蕩シ浸ス一七日

慮過ノ濃酒ヲ加ヒ全量一巴トス

服量半乃至一乃至慢性聖京傷、經久喘息、肺勞

ノ血行怠慢ナル者ニ用フ

彌箇葉丁幾

チンクチュラ、ビュキユー甸
チンクチュール、オフ、ビュキユー甸

彌箇葉 二多半

淡酒 一巴

製法雙蘭菊丁幾ニ同シ

服量一乃至二乃至水腫、粘液病、膀胱聖京傷ニ

用フ

格倫僕丁幾

チンクチユラ、コロムホ甸
チンクチユール、オスカリユムベ英

格倫僕 二 多 半

淡酒 一 巴

製法同前

服量 半乃至二 乃胆液性ノ嘔吐及ヒ妊婦胃

弱霍乱ニ傍發スル嘔吐ニ用フ

複方羯布羅丁幾

チンクチユラ、カムボレ、コムホシテ甸
コムボウソド、チンクチユール、オスカムボル英

羯布羅 三十 瓦

阿芙蓉

安息香酸

各 四十

過泥子油 半 瓦

淡酒 一 巴

右壘ニ内レ固封メ時々振蕩シ淹ス 一 七日

瀉過ノ濃酒ヲ加ヒ全量一巴トス

服量 十ml至一 乃僕麻質斯痛及ヒ他ノ疼痛

ニ用フ

大麻丁幾

チンクチユラ、カンナビス、エニヂケ甸
チンクチユール、オプ、インジヤン、ヘムフ英

大麻越幾斯 一 瓦

濃酒 一 巴

右調勻

服量 五ml至二十ml 水腫及ヒ神經痛ニ用フ

莞菁丁幾

チンクチユラ、カンタリヂス甸
チンクチユール、オスカンタリヂス英

莞菁末 半 瓦

淡酒 一 巴

右固封シ浸ス 一 七日 其間時々振蕩シ瀉過

ノ淡酒ヲ加ヒ全量一巴トス

〔服量〕五ml至二十ml後淋、卵巢水腫、及ヒ白帶

下ニ用フ

蕃椒丁幾 チンクチユラ、カプシシー、
チンクチユール、オス、カプシキユム英

蕃椒 六ヲ 濃酒 一巴

製法 雙蘭菊丁幾ニ同シ

〔服量〕十ml至二十ml慢性痛風、胃弱家ノ風氣

ニ内用シ惡性咽喉焮衝ニ含嗽藥トス

複方益智丁幾 チンクチユラ、カルタモニ、コムボシタ、
コムボウニド、チンクチユール、オス、カルタモム英

益智 細割 葛縷子 細割 各ニヲ 干葡萄 仁

去者ニヲ 桂皮 半ヲ 哥摺尼兒末 一ヲ

淡酒 一巴

製法 同前

〔服量〕半汚至一汚驅風健胃劑トシ用フ

葛斯加栗刺丁幾 チンクチユラ、カスカリルラ、
チンクチユール、オス、カスカリルラ英

葛斯加栗刺 二ヲ半 淡酒 一巴

製法 同前

〔服量〕半汚至二汚經久下利、胃弱及ヒ風氣疝

ニ用フ

葛斯多儂謨丁幾 チンクチユラ、カストリ、
チンクチユール、オス、カストル英

葛斯多僕謨 一 勺 濃酒 一 巴

製法 橙皮丁幾 二 同シ

服量 半 勺 至 一 勺 神經病、喜斯的里及 疝瘻

病 二 用フ

阿仙藥丁幾

チンクチユラ、カチキユ一 甸
チンクチユール、オフ、カチキユ一 英

阿仙藥 粗末 二 勺 半

桂皮 一 勺

淡酒 一 巴

製法 同前

服量 半 勺 至 一 勺 慢性痢疾及 白帶下等 二

用フ

幾列太丁幾

チンクチユラ、キレテ一 甸
チンクチユール、オス、キレター 英

キレテ一 細割 二 勺 半 淡酒 一 巴

製法 雙蘭菊丁幾 二 同シ

服量 半 勺 至 二 勺 強壯藥 トシ 用フ

複方 哥囉叻丁幾

チンクチユラ、コロ、ホルマイ、コムホシタ 甸
コムボウシド、チンクチユール、オフ、コロ、ホルム 英

哥囉叻 二 勺

濃酒 八 勺

複方 益智丁幾 十

勺

右調勻

服量 二十 丸 至 一 勺 疼痛劇甚ノ 諸症 二 用フ

複方 赤幾那丁幾

チンクチユラ、シンコ子、コムホシタ 甸
コムボウシド、チンクチユール、オフ、シンコ子 英

幾那末 二 勺

橙皮 一 勺

揆兒扁荅里 半 勺

雜夫蘭 六十八
一巴
哥樓尼兒末 三十八
淡酒

製法雙蘭菊丁幾 = 同シ

服量半汚至二汚主治幾那煎 = 同シ

幾那丁幾

チンクチュラ、シンコ子、フレウエ甸
チンクチュール、オフ、イルロー、シンコナ英

黃幾那末 四号 淡酒 一巴

製法同前

服量半汚至二汚主治如前

桂皮丁幾

チンクチュラ、シンナモミ甸
チンクチュール、オフ、シンナモン英

桂皮 粗末ニ号半 淡酒 一巴

製法同前

服量半汚至二汚慢性下利及ヒ胃弱ニ用フ

哥樓尼兒丁幾

チンクチュラ、コッキ甸
チンクチュール、オフ、コチニール英

哥樓尼兒末ニ号半 淡酒 一巴

製法橙皮丁幾ニ同シ、諸飲劑ヲ著色マルニ

用フ

格兒失屈謨丁幾

チンクチュラ、コルシニ、セミニム甸
チンクチュール、オフ、コルシキム、シード英

格兒失屈謨子末ニ号半 淡酒 一巴

製法雙蘭菊丁幾ニ同シ

服量十汎至三十汎水腫、痛風、僂麻質斯神經

川本判音 廿二

告不齋傳者

痛及_レ猩紅熱ニ用フ

失鳩谷丁幾

チンクチユラ、コニール、ヘムロット 英

失鳩谷 二弓半

淡酒 一巴

製法同前

服量 二十丸至一_レ汚瘰癧、硬結腫及_レ癌腫ノ

疼痛ニ用フ

雜夫蘭丁幾

チンクチユラ、コロクス、チンクチユール、オフ、サフロニ英

雜夫蘭 一弓

淡酒 一巴

製法同前喜斯的里及_レ他ノ神瘰症ニ宜シ

華澄茄丁幾

チンクチユラ、キユベール、チンクチユール、オフ、キユベール 英

華澄茄 二弓半

濃酒 一巴

製法同前

服量 半汚至二_レ汚麻疾、白帶下及_レ健胃驅風

劑トシ用フ

實芟多利斯丁幾

チンクチユラ、ジキタリス、チンクチユール、オフ、ジキタリス 英

實芟多利斯葉 二弓半

淡酒 一巴

製法同前

服量 十丸至三十丸、_レ嗽衝性諸病、急性出血及

心悸亢進、水腫等ニ用フ

麥奴丁幾

チンクチユラ、エルゴタ、チンクチユール、オフ、エルゴト 英

製法同前

一

廿三

麥奴粗末五勺 淡酒一巴

製法同前

服量十ml至一汤分 晚ニ臨テ陣痛緩慢ニメ
子宮機能衰弱セル者及ヒ白帶下、子宮出血
ニ用フ

醋酸鋳丁幾 チニクナユラ、ヘユルリ、アセクチヌ句
チニクチユル、オスマセターテオフ、アイロニ英

過酸硫酸鋳液ニ湯半 醋酸剥篤亞斯ニ多

濃酒適宜

右醋酸剥ヲ濃酒十湯ニ溶解シ又鋳液ヲ濃
酒八湯ニ加ヒニ液ヲ合メニ巴容ノ壺ニ内

レ數々振蕩スル一時間、濾過ノ液ヲ取り
其滓ニ濃酒適宜ヲ灌キ再ヒ濾過ノ全量一巴
ヲ得ル

服量五ml至三十ml

過格魯兒酸鋳丁幾 チニクキユラ、ヘユルリ、コロジニ句
チニクチユル、オスマ、ベルコライテ、オスマ、アイロニ英

過格魯兒酸鋳液五湯 濃酒十五湯

右混合壺ニ内レ固封シ貯フ

服量十ml至三十ml 主治醋酸鋳丁幾ニ同シ
其他出血症ニ宜シ

沒食子丁幾 チニクチユラ、ガルニ句
チニクチユル、オスマ、ゴールヌ英

沒食子 粗末ニ多半 淡酒一巴

製法雙蘭菊丁幾ニ同シ

服量半汚至二汚下血尿血及ヒ慢性下利ニ

用フ

複方健智亞那丁幾 チンチユラ、グニチア、云ホシテ、
コムホウ、チンチユラ、オフゼンチア、英

健質亞那一多半 橙皮六多 益智 茨皮ヲ

去ニ多 淡酒一巴 但シ重光格見十八度モ、
七多

製法同前

服量半汚至二汚強壯健胃ノ効アリ

癒瘡木脂丁幾 チンクチユラ、グワヤシー、アムモニア、
アムモニエ、チンクチユラ、グワヤキユム、英

癒瘡木脂 四多 礪砂香竄精 適宜

右脂ヲ壘ニ内レ精十五汚ヲ加ヒ固封ノ時

々振蕩シ淹ス一七日濾過シ精適宜ニ加テ

全量一巴トス

服量半汚至一汚 風濕質斯痛風ニ用フ

菲沃斯丁幾 チレクチユラ、ヒオシアミ、
チンクチユラ、オス、ヒオス、シア、ミ、英

菲沃斯葉 二多半 淡酒一巴

製法雙蘭菊丁幾ニ同シ

服量半汚至一汚 癩癩喜斯的里心悸亢進痛

風 風濕質斯等ニ用ス

沃顛丁幾

チンクチユラ、ヨヂユイ、甸
トシクチユール、オフ、アイネダイ、英

沃顛 半多

沃顛刺篤亞斯 二三

濃酒 一巴

右濃酒ニ溶解ス

服量 五川至二十川、此丁幾十一川中沃顛一

氏、沃剝半氏ヲ含ム、瘰癧腺ノ腫大及ヒ萎黃

病ニ用ス

葯刺巴丁幾

チンクチユラ、ヤラツ、甸
チンクチユール、オフ、シヤラツ、英

葯刺巴 二三半

淡酒 一巴

製法 雙蘭菊丁幾ニ同シ

服量 半汚至二汚、便秘症ニ他、下泄藥ニ配

伍ニ用フ

吉納護謨丁幾

チンクチユラ、キノ甸
チンクチユール、オスキノ英

吉納ゴム 粗末ニ多

濃酒 一巴

製法 複方安息香丁幾ニ同シ

服量 半汚至二汚、痢疾、白帶下等ニ用フ

刺達尼丁幾

チンクチユラ、カラメリア甸
チンクチユール、オスラタニ、英

刺達尼根 二三半

淡酒 一巴

製法 雙蘭菊丁幾ニ同シ

服量 半汚至二汚、痢疾、血便及ヒ胃弱ニ用フ

複方刺賢埤兎丁幾

チンクチユラ、ラウエンヂユレ、コムボシユタ甸
コムボウンド、シクチユール、オス、ラウエンヂユレ、英

刺賢堉兒油 一汚半 迷迭香油 十ル 桂皮

肉豆蔻 各百五十ル 赤檀 三百ル 濃酒

二巴

右桂皮、肉豆蔻、赤檀、ヲ壘ニ内ニ濃酒ヲ加ヒ

固封メ數々振蕩シ淹ス一七日絞リ瀝メニ

油ヲ加ヒ復タ之ヲ瀝シ濃酒ヲ加テ全量ニ

巴トス

服量半汚至二汚喜斯的里及ヒ眩暈頭痛胃

弱ニ用ル

杓櫟皮丁幾

チシクチユラ、レモンヌ甸
チシクチユール、オス、レモン、ペール英

杓櫟皮 二汚半 淡酒 一巴

製法橙皮丁幾ニ同シ

服量半汚至二汚失苟兒倍苦痢疾及ヒ疝痛

ニ用ル

魯弊里亞丁幾

チシクチユラ、ロベリエ甸
チシクチユール、オス、ロリア英

魯弊里亞葉 二汚半 淡酒 一巴

製法雙蘭菊丁幾ニ同シ

服量十ル至半汚喘息格魯布及ヒ疫咳ニ用

ヲ

亞的兒精魯弊里亞丁幾

チシクチユラ、ロベリエ、アテリエ甸
チゼリアル、チシクチユール、オス、ロリア英

製法

魯弊里亞葉ニ弓半 亞的兒精一巴

製法橙皮丁幾ニ同シ

服量十凡至半汚主治同前

忽布丁幾

チンクチユラ、リコリコ、
チンクチユール、オフホソフ英

忽布 弓半 淡酒 一巴

製法雙蘭菊丁幾ニ同シ

服量半汚至二汚樓麻質斯及ヒ痛風ニ用フ

沒藥丁幾

チンクチユラ、ミールレ、
チンクチユール、オフ、メル、英

沒藥 ニ弓半 濃酒 一巴

製法同前

服量半汚至一汚不潔ノ潰瘍腐骨疽ニ外附

シ及ヒ含嗽藥トス

番木鱈丁幾

チンクチユラ、ニキス、ホミカ、
チンクチユール、オス、ニキス、ウラミカ、英

番木鱈電ニ弓 濃酒 一巴

右番木鱈ヲ蒸氣ニ能ク融ケ急ニ之ヲ乾シ

テ末トナシ壘ニ内レ濃酒十五汚ヲ加ヒ固

封シ數々振蕩シ淹ス一ニ日瀝テ其滓ニ濃

酒五汚ヲ灌キ復々瀝過シ濃酒適宜ニ加テ

全量一巴トス

服量十凡至二十凡痛風、樓麻質斯、胃弱及ヒ

下肢ノ麻痺症ニ用フ

阿片丁幾

チニクナコラ、オピウム、チニクチニール、オス、オピウム

阿片 粗末一匁半 淡酒一巴

製法 橙皮丁幾ニ同シ、此液一匁中阿片三十

三氏ヲ含ム

服量 五匁至四十匁、諸般ノ疼痛、下利、痢疾、間

歇熱等ニ用フ

安母尼亞阿片丁幾

チニクナコラ、オピウム、アムモニエート、チニクチニール、オス、オピウム

阿片 百氏 雜夫蘭 安息香酸 各百八十氏

遇泥子油一匁 確砂精四匁 濃酒十六匁

製法 同前、此液一匁中阿片五氏ヲ含ム

服量 半匁至一匁、主治同前

ピレトリエ丁幾

チニクチニール、ピレトリエ、チニクチニール、オス、ピレトリエ

ピレトリ根 四匁 濃酒一巴

製法 雙蘭菊丁幾ニ同シ

主治 扁桃腺腫、及ヒ齒痛ニ用フ

枯失亞丁幾

チニクチニール、オス、クワツミア

枯失亞木屑 六匁 淡酒一巴

製法 同前

服量 半匁至二匁、胃弱、及ヒ病后ノ衰弱ニ用

規尼涅丁幾

チンクチユラ、クサニエー、甸
チンクチユール、オス、クサニエー、英

硫酸規尼涅 百六十

橙皮丁幾 一巴

右調勻文火ニ上セ溶シ、壘ニ内レ固封スル

一三日、其間數々振蕩シ、瀝過シ貯フ

服量 半汚至二汚、消化機ノ衰弱、及ヒ間歇熱

ニ用フ

大黃丁幾

チンクチユラ、レイ、甸
チンクチユール、オス、ル、ゾ、英

大黃 粗末ニ

益智 莢皮ヲ去

胡隨子

雜夫蘭 各ニ

淡酒 一巴

製法 雙蘭菊丁幾ニ同シ

服量 健胃ハ一汚至二汚、下泄ハ四汚至八汚

胃腸衰弱、風氣疝、下利及ヒ便秘ニ用フ

薩毘那丁幾

チンクチユラ、サビナ、甸
チンクチユール、オス、セー、ウ、英

薩毘那葉 二

淡酒 一巴

製法 同前

服量 二十汚至一汚、月經閉、痿麻質斯、痛風ニ

用フ

海葱丁幾

チンクチユラ、スキル、甸
チンクチユール、オス、ク、イ、英

海葱 二

淡酒 一巴

製法 同前

服量 十匁至三十匁 粘液性喘息、疫咳、水腫ニ
用フ

遠志 丁幾

チンクキユラ、ゼ子ゲ、甸
チンクキユール、オフ、ゼ子カ、英

遠志 根ニ 弓半 淡酒 一巴

製法 同前

服量 半匁至二匁 主治 同前 其他 慢性 痿麻質

斯ニ用フ

旃那 丁幾

チンクキユラ、セン子、甸
チンクキユール、オフ、センナ、英

旃那ニ 弓半 干葡萄ニ 弓 葛縷子、胡隨

子 各半 弓 淡酒 一巴

製法 同前

服量 一匁至四匁

摺兒 扁荅利亞 丁幾

チンクキユラ、セルペンタリ、甸
チンクキユール、オフ、セルペンタリ、英

摺兒 扁荅利亞 粗末ニ 弓半 淡酒 一巴

製法 同前

服量 半匁至二匁 腐敗熱、痛風、及ヒ 間歇性頭

痛ニ用フ

蔓陀羅華 丁幾

チンクキユラ、ストラモニー、甸
チンクキユール、オフ、ストラモニー、英

蔓陀羅華 子ニ 弓半 淡酒 一巴

製法 同前

服量十匁至三十匁、喘息、痰咳、神經痛、癌腫、瘰
麻質斯ニ用フ

麝香丁幾

チンクチュラ、シユムビユル甸
チンクチュール、オフ、ソムフル、英

麝香根

粗末ニ弓半

淡酒一巴

製法同前

服量十匁至三十匁

拔兎撒謨篤隆丁幾

チンクチュラ、トリタナ甸
チンクチュール、オフ、トローヤー、英

拔兎撒謨篤隆

ニ弓半

濃酒適宜

右篤隆ニ濃酒十五匁ヲ加ヒ固封メ數々振
蕩スル一六時篤隆全ク溶和スルニ至リ濾

過ノ濃酒適宜ニ加テ全量一巴トス

服量二十匁至四十匁慢性ノ咳嗽ニ用フ

纈草丁幾

チンクチュラ、ハレリアナ甸
チンクチュール、オフ、ウエレリアン、英

纈草

ニ弓半

淡酒一巴

製法雙蘭菊丁幾ニ同シ

服量一匁至二匁神經性及ヒ痙攣性疾患ニ

用ス

諸母尼亞纈草丁幾

チンクチュラ、ハレリアナ、アムモニア甸
コムボウソド、チンクチュール、オフ、ウエレリアン、英

纈草ニ弓半

芳香硝砂精一巴

製法橙皮丁幾ニ同シ

服量半乃至一乃至主治同前

綠藜蘆丁幾

チンクチュラオス、グレイニ、ヘルレボリー、英
チンクチュラ、ヘラトリ、ヒリヤス、匈

綠藜蘆根 四寸

濃酒 一巴

製法雙蘭菊丁幾ニ同シ

服量五乃至二十水腫、月經閉ニ用フ

姜丁幾

チンクチュラ、ジンギベリス、匈
チンクチュール、オス、ジンジル、英

姜 二乃至半

濃酒 一巴

製法同前

服量十五乃至一乃至風氣疝及ヒ下劑ニ配伍

シ用フ

強姜丁幾

チンクチュラ、ジンギベリス、フルネユール、匈
ストロンダ、チンクチュール、オス、ジンジル、英

姜 細末十寸

濃酒 適宜

右末ヲ濾器ニ内レ濃酒半巴ヲ取り徐々ニ

灌キ置ク一二時間ニ復タ濃酒ヲ加ヒ濾

過メ全量一巴トス

服量五乃至二十虚性痛風ノ胃ヲ冒ス者

風氣疝及ヒ下劑ノ腹痛ヲ防ク為ニ用フ

下

香竈丁幾

コムポウ、チンクチュール、オス、シンナモン、英

桂皮 一寸

益智 半寸

生姜 三寸

淡酒 二

巴

右浸出スル一十四日間ニシテ瀝過ス

服量六十匁至二匁

卜

健胃丁幾

コムポウソド、チンクキョール、オフ、シンナモン、英

桂皮 細剉一匁 丁香 細剉 肉豆蔻 細剉

雜夫蘭 各半匁 菖蒲根 細剉一匁 荳蔻花

二匁 杓椽皮 橙皮 各一匁 淡酒 一巴半

右浸漬スル一三日間ニシテ瀝過シ、滓ニ淡酒

ヲ灌キ復々瀝メ全量一巴半ヲ取ル

水製大黃丁幾

チンクキョウ、レイ、アキユアサウ

大黃 一匁半 沸湯 十二匁

右浸出スル一十二時間ニシテ瀝過ス此液十

匁中ニ桂水ニ汚ヲ加フ

服量二十匁至一匁頻服ス、小兒ハ一茶匙宛

用フ、小兒ノ酸敗液ニ緩下劑トシ用フ

抱

龍動錢丁幾 ロンドン丁幾

錢線 一匁 桂皮 肉豆蔻 各二匁 設里酒

一巴

右浸漬スル一十四日時々振蕩シ瀝過ス

服量十匁至一匁全軀ノ衰弱喜斯的里及ヒ

白帶下等ヲ用ス

右調和蒸餾ノ七巴ノ液ヲ取ル

異童。八七。

服量半汚至一汚麻痺眩暈及ヒ神經衰弱ニ
用フ

砒砂加阿魏精 スヒリキユス、アムモニエ、フーチゲユス句
右トドスヒリット、オズアムモニア英

阿魏 一多半 強砒砂精 二汚 濃酒適宜

右先ツ阿魏ヲ器ニ入レ濃酒十五汚ヲ注キ
蓋閉浸漬スル一二十四時ニメ蒸餾シ精ヲ
取り之ニ砒砂精ヲ混和シ更ニ濃酒ヲ加テ
全量一巴トス

服量半汚至一汚喜斯的里痛風及ヒ瘰癧性
喘息ニ用フ

複方沙蘿根精 スヒリキユス、アルモラシア、コムホシテユス句
コムホウシド、スヒリット、オアホルメラテシ英

沙蘿根 各二十多 肉豆蔻 半多

淡酒 一瓦 水 二巴

右混和蒸餾ノ一瓦ノ液ヲ取ル

服量一汚至二汚失苟兒倍苦儂麻質斯水腫
及ヒ胃弱ニ用フ

加耶布的精 スヒリキユス、カガユヒユス句
スヒリット、オズゲジュット、英

加耶布的油 一汚 濃酒 四十九汚

右溶和ス

〔服量〕半汚至一汚、癩癩、麻痺、慢性、癩麻質、斯胃腸、痙攣、霍乱ニ用フ

龍腦精

スピリチュス、カムホラ、
スピリット、オスカムホル、英

龍腦 一汚

濃酒 九汚

右溶解ス

〔服量〕十汚至三十汚、癩麻質痛、及ヒ他ノ疼痛ニ外用ス

哥羅叻精

スピリチュス、コロ、ホルミ、
スピリット、オスコロ、ホルム、英

哥羅叻 一汚

濃酒 十九汚

右混和ス

異重。八七一

〔服量〕二十汚至四十汚、諸疼痛ニ宜シ

杜松子精

スピリチュス、ジュニベリ、
スピリット、オスジュニベリ、英

杜松子油 一汚

濃酒 四十九汚

右溶和ス

〔服量〕半汚至一汚、水腫、或ハ風氣疝ニ用フ

刺賢埵児精

スピリチュス、ラーヘンチ、
スピリット、オフラウエンドル、英

刺賢埵児油 一汚

濃酒 四十九汚

右溶和ス

服量半汚至一汚喜斯的里及ヒ神經性頭痛
ニ用フ

薄荷精 スピリチュス、ノンテール、ペリテール、
スピリット、オス、ヘツフルミント、英

薄荷油 一汚 濃酒 四十九汚

右溶和ス

服量半汚至一汚風氣疝、及ヒ消化失宜ニ用
フ

肉豆蔻精 スピリチュス、ミールスチケ、
スピリット、オス、ノットング、英

肉豆蔻油 一汚 濃酒 四十九汚

右溶和ス

服量半汚至一汚嘔吐、下利ニ用フ

迷迭香精 スピリチュス、ロスマリニー、
スピリット、オス、ルースマリ、英

迷迭香油 一汚 濃酒 四十九汚

右溶和ス

服量半汚至一汚虚衰ヒル者ニ内用シ、疼痛
及ヒ挫傷ニ外用ス

耶麻依加胡椒精 スピリチュス、ロメント、
スピリット、オス、ロメント、英

耶麻依加胡椒油 一汚 濃酒 四十九汚

右溶和ス

服量一汚至二汚風氣疝、虚性痛風等ニ用フ

下

硝砂加過泥子精

スピリチユス、サリス、アムモニア、アサチユス

稀硝砂精 三汚

過泥子油 半汚

濃酒 十二

汚

右混和振蕩ノ堅口ノ瓶ニ貯フ

〔服量〕十汎至二十汎 虛性ノ肺臟粘液諸症ニ

用テ痰飲ヲ稀豁ス

複方刺賢埴兒精

スピリチユス、ライヘンヂユレ、コムボシチユス、
コムボウソド、スピリット、オスライエンソドル英

刺賢埴兒油 一汚半 迷迭香油 十汎

桂皮 細

剉 肉豆蔻 細剉 各ニ汚半

赤檀 三百汎

濃酒 二巴

右浸漬スル一七日間濾過ノ刺賢埴兒油、迷

迭香油ヲ入レ溶和シ濃酒適宜ヲ加ヒ全量

二巴ヲ取ル

〔服量〕半汚至二汚 眩暈及ヒ經久ノ衰弱ニ宜

シ

複方杜松子精

スピリチユス、ジニペリー、コムボシチユス、
コムボウソド、スピリット、ジエーニアル英

杜松子油 一汚半

葛縷子油 十汚

茴香油

十汚 淡酒 七巴 四汚

右溶和ス

〔服量〕一汚至一汚 利尿藥ニ伍メ水腫ニ用フ

令

忽布滿鎮痛液

スヒリチユス、ニユルヒユリシ、コハホシチユス、
コムハウンド、スヒリット、オプ、エーゼル、英

硫酸亞的兒 八汚

濃酒 十六汚

亞的兒油

三汚

右混和ス

服量 半汚至二汚、窒扶斯熱喜斯的里、及ヒ疼

痛多キ諸病ニ用ス

民埤列里精

リギユラル、アムモニエ、アセタチユス、
ソリユトリジユシ、オス、アセテート、オプ、アムモニエ、英

強醋酸 五汚

炭酸安母尼亞 適宜

餹水ニ

十五汚

右醋酸ニ炭酸安母尼亞ヲ入レ沸騰止ムニ

至リ、試験紙ヲ以テ酸徴ナキニ至リ、紙ニテ

瀝過シ餹水ヲ混和ス

服量 二汚至六汚、熱性病、及ヒ炊衝性諸病ニ

用ス

稀碯砂精

リギユラル、アムモニエ、
ソリシユシ、オプ、アムモニエ、英

強碯砂精 一巴

餹水ニ巴

右混和シテ固封シ貯フ

異重。九五九

葛縷子精

スヒリチユス、カリユイ、
スヒリット、オスカレウ、
オス、英

葛縷子油 一汚

濃酒 四十九汚

右溶和ス

服量半汚至一汚

苗香精

スヒリヂニス、フリーニキユム旬
スピリット、オフ、フエニ子ル英

苗香油一汚

濃酒 四十九汚

右溶和ス

服量半汚至一汚

過落

コルロヂニム旬
エロロヂニム旬 英

火綿一汚

亜的児 三十六汚

濃酒 十二汚

右亜的児ト濃酒ヲ混和シ之ニ火綿ヲ浸シ
溶解シテ上澄ヲ取り固封シ貯ス

主治剥脱ニ塗布メ人工ニ表皮ヲ造成ス

火綿製法

綿一汚

硫酸

硝酸

各五汚

右酸ヲ混和シ之ニ綿ヲ浸入シ硝子ノ棒ニ
テ振蕩スル一三分時酸ノ全ク滲入スルニ
至リ他器ニ水ヲ入レ置キ之ニ綿ヲ移シ屢
々水ヲ灌テ能ク灑シ格魯兎抜利母ヲ加テ
沈澱ヲ生ゼガルニ至リ漉紙ニ移シ水ヲ抜
キ重湯煎ニテ乾カス

本草綱目卷之...

Blank columns for text on the right page.

酒劑

蘆薈酒

ヒニユム、アリス句
ソイニ、オス、アローフ英

蘆薈

一 多半

益智 皮ヲ去

生姜

各 八十 匁

設里酒

ニ 巴

右壘ニ内レ屢々振蕩シ浸ス 7 七日ニメ慮

過ス

服量

一 汚至ニ汚 胃弱及ヒ萎黄病ニ用フ

安質母尼酒

ヒニユム、アニチモニアル句
ソイニ、オス、アニチモニアル英

吐酒石

四十 匁

設里酒 一 巴

右能ク溶解ス、此液一汚中吐酒石ニ匁ヲ會

本草綱目

卷之...

酒劑

〔服量〕五匁至一匁熱性病及ヒ嗽衝病ニ用フ

橙酒 ヒニム、オーランド、ウイニ、ウイニ、ウイニ、ウイニ

糖水ニ苦橙皮ヲ投シ、壺中ニ釀沸セシムルナリ、此液葡萄酒様ニメ、黄金色設里酒ノ如シ、苦味芳香ナリ、此液百分中亜兒箇兒十二分ヲ含ミ、僅ニ酸氣ヲ保ツ

格兒失屈謨酒 ヒニム、コルニシ、ウイニ、オース、コルニキ、ム、英

格兒失屈謨子末四匁 設里酒一匁
右浸漬スル_一七日其間數々振蕩メ瀝過ス
〔服量〕十匁至三十匁痛風、痺麻質斯、及ヒ諸嗽

衝疾患ニ用フ

錢酒 ヒニム、ヘルリ、ウイニ、オース、アイロニ、英

錢線一匁 設里酒一匁
右酒中ニ淹ス_一三十日ニメ瀝過ス

〔服量〕一匁至四匁全軀衰弱、胃弱、喜斯的里、萎黃病ニ用フ

杓櫟酸鋇酒 ヒニム、ヘルリ、シトラス、ウイニ、オース、サートレート、オース、アイロニ、英

杓櫟酸鋇安母尼亞 百六十八
橙酒一匁
右溶解シ固封ノ時々振蕩シ淹ス_一三日ニメ瀝過ス

諸病ニ用フ

大黄酒 ヒニユム、レイ甸
ワイニオス、エルバトプ英

大黄 一 弓半 桂皮 一 弓 設里酒 一 巴

右浸漬スル 一 七日其間時々振蕩シテ瀝過

シ酒適宜ニ加テ全量一 巴トス

服量 一 汚至二 汚胃腸衰弱及ヒ粘液下利ニ

用フ

ト 海葱酒 ヒニユム、スキレラ甸
ワイニオス、スクサキル英

海葱 一 弓 設里酒 十 六 汚

右浸漬スル 一 十二日ニメ瀝過ス

服量 半 汚至一 汚粘液性喘息痰咳若クハ水腫ニ用フ

ト 香竈阿片酒 ヒニユム、オピ、アロマチキユム甸
舍電阿芙蓉液

阿芙蓉 二 弓 雜夫蘭 一 弓 桂皮末 丁香

末 各 一 弓 設里酒 一 巴

右浸漬メ瀝過ス此液十二 汚中阿片一 瓜ヲ

含ム

服量 四 汚至三十 汚

合 麥奴酒 ヒニユム、エルゴテ甸
ワイニオス、エルコトト英

麥奴 二 弓 設里酒 一 巴

右浸漬スル_一十四日ニ_レ漉過ス

服量 分挽ニハ二汚至三汚

香竈酒 ヒニユム、アロマチキユム旬

亞兒蘇 泥菖根 益智 桂皮 丁香 肉

豆蔻 各細剉、二十ガラン_一ノ 十即ニ五瓜 赤葡萄

酒 一千ガラン_一ノ 三即ニ汚

右浸漬スル_一十四日ニ_レ漉過ス

服量 一汚至二汚

アルロ_一酒 ワイニ、スプ

アルロ_一煎 六汚 白糖 半_一 赤葡萄酒 半

汚

右調和ス、消食不良、或ハ熱病后快復期ニ飲
料トシ用ス

傳 卵ブランヂ_一酒

卵黄 二十四箇 白糖 四十_一 ブランヂ_一

酒 餚水 各二十四汚

右卵黄ヲ攪攪シ、ブランヂ_一ヲ注キ、復タ攪

和メ糖ト水ヲ加ヘ悉ク混和メ漉過ス

服量 一汚至四汚、全軀衰弱スル者ニ用フ

製劑備考上篇終

東
官板御用所

軍醫寮
官板御用所
新村淳庵

海軍病院
官板御用所



發行書肆

英蘭堂

島村利助

東京
馬喰町三丁目



