

DISSERTATIO
PHILOLOGICO-MEDICA
INAUGURALIS,
EXHIBENS
LIBRUM XLIV
COLLECTANEORUM MEDICINALIUM
ORIBASII,
NUPER AB ANGELO MAJO ROMAE GRAECE EDITUM,
CUM ADJUNCTA VERSIONE LATINA
ADNOTATIONIBUSQUE,

QUAM,

FAVENTE SUMMO NUMINE,
EX AUCTORITATE
RECTORIS MAGNIFICI,
JACOBI HERMANNI PHILIPSE,
Jurr. Viri Doct. in Facult. Jurid. Prof. Ordin.

AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI CONSENSU,
NOBILISSIMAE FACULTATIS MEDICAE DECRETO,
PRO GRADU DOCTORIS,
SUMMISQUE IN MEDICINA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS
IN ACADEMIA GRONINGANA
RITE AC LEGITIME CONSEQUENDIS,

PUBLICO OMNIUM EXAMINI OFFERT
ULCO CATS BUSSEMAKER,
AMSTELODAMENSIS.

A. D. xx Junii MDCCCXXXV. Hora XII.

GRONINGAE,
Apud W. VAN BOEKEREN.



ἐν ὁ λόγοις διέξεισιν Ὀριβάσιος ἃ ἀπαγγέλλε-
ται καὶ δεύτερα μὲν ἐστὶ τῷ χρόνῳ, προτερεύει
δὲ τῇ χρείᾳ, ἅτε μὴ μόνον ὅσα Γαληνὸς ὀρθῶς
ἔγραψε περιέχουσα, ἀλλὰ καὶ ὅσα αὐτῷ παρῆ-
ται, ἄλλοις δὲ εἰς διδασκαλίαν προστίθεται.

PHOTIUS *Biblioth. Cod.* 217.

GRONINGEN
W. J. VAN DER KAMMEN

MATRI OPTIMAE CARISSIMAE

SACRUM.

MATRI OPTIMAE CARISSIMAE

SECRET

PRAEFATIO.

Jamdiu cogitaveram atque perpenderam, quidnam eligerem, de quo conscripta dissertatione studiis meis Academicis finem imponerem. Multa certo adhuc supererant in scientia medica adeo late patenti, quae vel sedula perscrutatione vel ulteriori accuratiorique elaboratione indigebant, atque hoc modo mihi materiam praebere poterant, de qua dissererem, verum non omnia pertractari possunt a juvene, qui ante tres quatuorve demum annos medicinae studere coepit, neque omnia omnibus aequae placent omnesve iisdem aequae semper delectantur. Sic mihi semper maxime arridebant omnia, quae veterem Graecorum spectabant medicinam, quare cum praecceptore meo viro Cl. SEBASTIANO COMMINUCATA, ille mihi nuntius fuit, Romae ab ANGELO MAJO Graece editos esse nonnullos Orisbasii Libros, antea plane incognitos, quos vertere et explicare mihi proposuit eaque versione uti tamquam specimine inaugurali, quod conscribere me jubebat lex. Primum laboris difficultas mihi horrorem fere incussit, sed tandem Cl. praecceptoris consiliis et adhortationibus

eo perductus sum, ut opus aggredi auderem, quo semel inchoato adeo delectatus sum, ut illud non absolvere non possem, licet saepe in illo pertractando animadverterem, quanta mihi deessent; ne itaque obliviscaris, B. L., quicumque huncce libellum pervolveris, illum non a viro linguae Graecae peritissimo esse conscriptum, verum a juvene, qui inter gravissima medicinae studia paucas solummodo horas linguae Graecae studio quantumvis a se dilecto impendere potuit.

Inter libros Oribasii autem ab ANGELO MAJO editos duos priores vel XLIV et XLV Collect. Medic. elegi ob rationes infra in prolegomenis explicandas; cum tamen animadverterem, hos libros, si saltem omnia, quae iis continentur, rite explicarentur, adeo multa requirere, ut eorum editio vulgares dissertationis inauguralis limites longe excederet impediretque, quominus ante hujus anni ferias aestivas lauream doctoralem petere possem, unicum solummodo Lib. XLIV cum versione et adnotationibus adjunctis nunc edere decrevi, alterius vero Libri editionem aliquantulum distuli; simulac tamen vacabit, mox etiam illum edere mihi proposui, additis fortasse et fragmentis librorum Oribasii ab ANGELO MAJO editis.

Restat adhuc mihi, ut de ordine loquar, quem in edendo hocce Oribasii libro secutus sum, de ordine illo valde simplici, quo con-

textum Graecum integrum ex ANGELI MAJI Auctorum Classicorum e Vaticanis codicibus editorum Tom. IV transtuli in dissertationem meam, apposita versione nihilque in eo mutavi, cujus non in adnotationibus mentionem feci, exceptis tamen nonnullis accentibus, quos male collocatos esse vitio typographi non erat dubium. Ubi vero translatio accentus ab alia litera ad aliam significationem verborum aliquo modo immutabat, hanc translationem etiam in adnotationibus memoravi. Adnotationes autem ad calcem contextus reposui, ne illi, quibus pleraeque res in adnotationibus legendae jam satis sunt cognitae, vel qui illas omnino omittere malunt, in legendo contextu perturbarentur. Tandem monendum est, me saepius brevitatis causa nomine Hippocratis vel Galeni citasse etiam illos libros, qui in plerisque horum auctorum editionibus leguntur, licet a permultis criticis jure merito spurii habeantur.

Priusquam tamen hancce Academiam relinquam, non possum, quin vobis omnibus, viri Cl., quos cum in Athenaeo Darentriensi, tum in hacce alma Musarum sede, praeceptores habui, gratias agam publicas pro omnibus egregiis scientiarum praeceptis, quae mihi tradidistis, nec non pro urbana et miti agendi ratione, qua semper erga me usi estis.

Inprimis vobis, viri Cl. S. R. STRATINGH et J. BAART DE LA FAILLE, plura debeo, quam verbis

enuntiare possum; vos enim me docuistis gravissimam illam artem, quae versatur circa hominum vitam atque sanitatem; vestra etiam institutione nisus hanc artem exercere non refugiam; quidcunque igitur in illa praestitero, id vobis semper me acceptum relaturum esse credatis; liceat itaque mihi hic mea quoque vota effundere pro vestra vestrorumque salute et incolumitate!

Ante omnia vero tua erga me merita, vir Cl. A. A. SEBASTIAN, innumera sunt, nam tu mihi studiorum dux exstitisti, mihi hanc dissertationem conscribere suasisti nec unquam in illa elaboranda opem ferre negasti; quominus tibi itaque tantas gratias referam, quantas tibi debere me sentio, vitae impedibit brevitatis; si tamen preces meae exaudiantur, diutissime in hujus Academiae ornamentum, scientiarum et doctrinarum decus atque universam hominum salutem incolumem te servabit D. O. M.

Neque tu, doct. WIJNNE, inter fautores meos infimum occupas locum, cum mihi occasionem praebuisti, qua saepissime praeceptorum dicta ad aegrotorum lectulos comprobata vidi et pro qua tibi gratum animum obtestor, quem imo pectore semper me servaturum esse hic profiteor.

Te quoque, Doct. F. G. NOURY, hic memorare dulce me jubet officium, qui mihi anatomes principia tradidisti, quibus omnia superstruxi, qualiacunque de medicina perspecta

habui quique amica et benevola ratione mihi
viam saepius ostendisti, qua tutius scopum
attingere possem; haec beneficia semper me re-
cordaturum esse, neque res meas mihi tuis
magis cordi esse credas precor.

Vobis tandem etiam valedicendum est, com-
militones amicissimi, res sane moeroris plenis-
sima; per nonnullos annos amicitiae vinculis
conjuncti dulcem agebamus vitam et curarum
expertem tempusque fulguris celeritatem adep-
tum esse videbatur; mox vero rerum vicissitu-
dinibus diremti sollicitam aggrediemur vitam
aegritudinum plenam, ad quas perferendas
certo multam opem feret recordatio amicitiae,
quae nos jungit quamque nullum nostrum
umquam obliturum esse vix est quod dubitem.
Valete igitur resque omnes vobis prospere suc-
cedant.

PROLEGOMENA.

Jam per multa saecula viguit mos, et adhuc a plerisque huic rei operam dantibus religiose observatur, quo scriptis cujuscunque auctoris, post ejus mortem in lucem si prodirent, praemittebatur brevior vel longior ejus vitae enarratio, consilio profecto non improbando, si consideremus, quantum quivis homo debeat patriae, aetati, qua vixerit, educationi, parentibus, amicis non solum, verum et rebus secundis aut adversis, quae durante ejus vita vel patriae vel illi ipsi acciderint, quantumque haec omnia saepe conferant ad omnes ejus animi dotes formandas vel commutandas. Sic enim nonnunquam, siquid nimis acriter vel nimis leviter vel alio saltem modo ac a ceteris auctoribus pertractetur, causam invenire possumus, quare ita neque aliter scripserit. Quae cum accurate perpenderem, lectoribus haud inutilem nec ingratum me fore putavi, si, antequam ad ipsum meum propositum transeam, pauca de Oribasii vita et scriptis referrem, ut, hisce perlectis, cum majori fructu et oblectamento legerentur omnia, quae hocce Oribasii libello continentur, inter quae, me saltem judice, haud pauca invenientur lectu dignissima.

Oribasius natus est Pergami (1) in prima saeculi quarti parte ex parentibus nobiles, qui cum liberaliter educari curarunt juvenemque illum dimiserunt in scholas magni Zenonis, quas simul frequentavit cum Magno. His vero relictis, medicinam exercuisse videtur in patria sua et, ut ait Eunapius, quantum licet homini Deum imitari patrium Deum Aesculapium imitatus est. Postea cum a Juliano ad aulam imperatoris ductus esset, tantum ibi auctoritatem nactus est, ut post mortem principis patrono suo multam opem ferret in imperio capessendo. Ab illo inde tempore artissimo amicitiae vinculo inter se conjuncti fuere hi duo viri et Julianus Oribasium honoribus muneribusque adeo cumulavit, ut amico etiam munus quaestoris Constantinopolitani offerret mitteretque illum Delphos ad oraculum sciscitandum, ubi illi celebre illud responsum datum est, oraculum jam deficere et nullum amplius esse (2). Juliano tamen vita defuncto ejus successores sive invidia sive nimio falsoque ad defendendam religionem Christianam ardore permoti, omnibus muneribus et opibus Oribasium privarunt eumque ex imperio Romano ejecerunt inter barbaros, verum illic quoque mox ob medicinae peritiam tantam sibi conciliavit laudem, ut instar Dei cole retur, alios ex morbis diuturnis servans, alios a

(1) Eunapius vitae sophist. ed. Boissonnadii et Wyttenbachii pag. 99—102. Suidas tamen (Tom. II. pag. 711.) refert, illum Sardibus natum fuisse, sed huic auctori eandem fidem habere non possumus ac Eunapio, Oribasii aequali.

(2) Georg. Cedrenus Chronic. pag. 304 (ed. Fabrit. fol. Paris. 1647).

mortis a porta subripiens. Tandem ab imperatore revocatus uxorem duxit cum stirpe sua tum divitiis spectabilem bonaque ei ex aerario publico restituta sunt. Ex inde semper opibus et auctoritate viguisse videtur, saltem usque ad initium saeculi quinti, quando Eunapius haec de illo conscripsit simulque testatus est, illum tunc adhuc cum quatuor suis filiis superstitem fuisse (1).

Durante hoc longo et satis fausto vitae decursu multos libros conscripsit, quorum maxima pars tamen adhuc desideratur.

1°. A Photio (2) laudantur Libri IV *περὶ πραγμάτων ἰατρικῆς*, et Lib. VII ad eandem normam editi Julianoque imperatori dedicati, quibus libris imprimis Galeni scripta breviori sermone contrahere conatus est (3). Hos libros autem, e quibus nihil nobis superest, citare videtur ipse Oribasius in Praefatione ad LXX Libros.

2°. Jussu Juliani ex omnibus medicis antiquioribus quae sibi maxime mentione digna videbantur collegit et inde LXX libros (4) contextuit sub nomine *συναγωγῶν ἰατρικῶν*. Ex his libris primum Graece in lucem prodierunt Lib. I et Lib. V capita priora sex simul cum Lib. I ad Eunapium cap. 14 de aquis et Galeni, Rufi, Dioclis et Athenaei medicorum fragmentis de eodem argumento cum interpre-

(1) Eunapius l. l. pag. 101.

(2) Biblioth. Cod. 216.

(3) Photius l. l.

(4) Photius l. l. cod. 217. Suidas tamen (l. l.) illum LXXII Libros conscripsisse testatur.

tatione Latina cur. Augustino Riccio Romae 1543 4^o; dein Joh. Bapt. Rasarius Latine edidit Lib. I—XV. et XXIV—XXV cum praefatione Oribasii ad Julianum imperatorem Basil. 1557. 8^o. Teste Fabritio in Bibliothecae Bigotianae Catalogo Tom. II. pag. 147 etiam memorantur Oribasii Collectaneorum medicinalium quaedam Graece edita Paris. 1556. 8^o. et Antonius Verderus narrat se Gallicam vidisse versionem scriptorum Oribasii auctore Adamo de la Vallée in Bibliotheca Gallica (1). Praeterea Guil. Dundass seorsum edidit Oribasii Anatomica sive Libr. XXIV et XXV. Lugd. Bat. 1735. 4^o. et in hujus opusculi praefatione testatur se adhibuisse editionem Graecam scriptorum Oribasii cur. Morelio (2), forsitan eandem, quae memoratur in Bibliothecae Bigotianae Catalogo. (Vide Supra). Graece etiam nuper prodierunt XV priores *ὑποαγωγῶν ἰατρικῶν* Libri cur. Friderico Matthaeio publico in urbe regia Moscuæ professore (3). Praeter hos libros Latine prodierunt Libri XLVIII sive de laqueis capita priora duodeviginti et Lib. XLIX sive de machinamentis e versione Vidi Vidii in Collectione scriptorum Chirurgorum Tigurina Gesneri 1555. fol., quamvis in hac editione non inveniri videatur numerus Librorum (4). Hos libros autem omnes edidit quoque.

(1) Fabritius Biblioth. Graeca Tom. XII. pag. 641.

(2) Oribasii Anatomica ex Lib. Galeni cum vers. Latina J. B. Rasarii cur. G. Dundass. Praef. pag. 3.

(3) Classicorum auctorum e vaticanis codicibus editorum cur. Angelo Majo Tom. IV. Romae 1831. 8^o. Praef. pag. 6.

(4) Fabritius l. l.

Henr. Stephanus inter medicae artis principes post Hippocratem et Galénium Paris 1567. fol. Insuper vero in Collectione veterum Chirurgorum Nicetae ab Antonio Cocchio octoginta fere abhinc annis edita adhuc inveniuntur Lib. XLVI et XLVII sive de fracturis et de articulis excidentibus (1). Nuper tandem Angelus Majus Graece edidit Lib. XLIV, XLV, XLVIII, XLIX, partem priorem Libri L cum titulis capitum, quae adhuc desiderantur, et duo fragmenta, alterum ex Libro LI, alterum ex incerto collectaneorum Libro in Classicorum auctorum e codicibus vaticanis editorum Tom. IV. Romae 1831, 8°. pag. 1—198 et 276—278; ex his autem Lib. XLIV et XLV sive de abscessibus et de variis tumoribus vertere et quantum possem explicare decrevi; tempus tamen mihi defuit ad alterum in lucem edendum; Libr. XLVIII et XLIX omisi, quia pro maxima parte jam Latina edita erant et argumentum mihi minus jucundum utileque videbatur, Lib. L de morbis genitalium vero quoque omisi, quoniam nimis erat mutilum, licet argumentum mihi ceteroquin satis placeret.

3°. Ex magno illius opere, quod modo memoravi, compendium excerpit in gratiam filii Eustathii Oribasius, ita ut inde orti sint Lib. IX. nomine Synopseos cogniti (2), qui Latine prodierunt ex eadem versione Rasarii simul cum ceteris Oribasii libris, uti et inter medicae artis principes H. Stephani.

(1) Angelus Majus l. l. pag. 7.

(2) Photius l. l. cod. 218.

4°. Tandem scripsit Oribasius Euporiston sive de medicamentis facile parabilibus Lib. IV. ad Euna-
pium (1) (verisimiliter eundem, qui ejus vitam con-
scripsit), qui Latine prodierunt ex versione anonymi
simul cum Caelii Aureliani Libris tardarum passio-
num cur. J. Sichardo, Basil. 1529. fol. (2) et cum
ceteris Oribasii libris ex interpretatione Rasarii, uti
et inter artis medicae principes Henr. Stephani. Hos
libros tamen Cl. Sprengel spurios existimat, quam-
vis rationem non addat (3).

5°. Scholia in Aphorismos Hippocratis, quae
Oribasio tribuuntur, a plerisque viris doctis spuria
habentur (4). Prodiere autem cur. J. Guintero An-
dernaco Basil. 1535. 8°. recusa Paris. ac Venet. 1553
et Patav. 1658. 8°. (5).

Praeter haec omnia Oribasii fragmentum de victus
ratione per quodlibet anni tempus utili verisimili-
ter, ut mihi saltem videtur, ex aliquo supra lau-
datorum operum depromptum, cum Plinio Valeriano
vulgavit Albanus Torinus Basileae 1528. fol. Inci-
pit: Optimum etiam fuerit per singula anni tem-
pora victus rationem observare (6). Hujus fragmenti
autem eandem editionem quoque in Bibliotheca Aca-
demica Ulro-Trajectina prostare testatur Doctiss. C.

(1) Photius l. l. cod. 219.

(2) Fabritius l. l.

(3) Versuch einer pragmat. Geschichte der Medizin, Tom.
II. pag. 261.

(4) Sprengel l. l. et Fabritius l. l. pag. 646.

(5) Fabritius l. l.

(6) Fabritius l. l. pag. 646.

J. van Cooth (1) additque illud circa veneris usum praecepta habere notatum dignissima. — Oribasius de simplicibus, haud dubie etiam ex Collect. Medic. petitus, cum Octavii Horatiani Euporiston Lib. IV Physica Hildegardis de Pingua sive Libri IV de elementorum, fluminum aliquot Germaniae, metallorum, leguminum, fructuum et herbarum, piscium denique volatilium et animantium terrae naturis et operationibus, Theodori Physici Diaceta et Aesculapii de morborum causis, descriptione et cura prodierunt Argentor. 1533 et 1544 fol. (2). — Ex Oribasii scriptis tandem prostant excerpta de aquis et balneis Augustino Gadaldino Mutinensi interprete in opere Veneto de balneis 1553 fol. (3).

Variae fuerunt ab omni tempore de Oribasio ejusque scriptis auctorum sententiae; alii enim, uti Eunapius (4), illum laudibus extollunt cumulantque; alii putant, qui quoque esse imputandum crimen (5), ejus non insones fuisse videntur omnes philosophi in aula Juliani degentes (6), quos illos nempe hunc imperatorem ceteroquin jam satis in superstitionem proclivem etiam supersticiosiorem reddidisse putant in anibus ritibus et magiamoniis totus se traderet; alii, uti Clericus ex illo et Aëtio hausta esse

(1) Diatribe in Diabeticam veterum, Trajecti ad Rhenum 1835. pag. 64 adnot. (2).

(2) Fabritius l. l. pag. 647.

(3) Fabritius l. l.

(4) Eunapius l. l. passim.

(5) Sprengel l. l. pag. 240 et 256.

(6) Eunapius vita Maximi pag. 51—53. Libanius Epitaph. pag. 289, 291 et 318. (Tom. II. ed. Morellii. Parisi 1628. fol).

putant omnia, quae in praxi ac theoria mentione sunt digna ac praesertim in re Anatomica et Chirurgica (1); alii vero eum vocant simiam Galeni (2), quod nomen certo non meruit, nam licet Lib. XXIV et XXV Collect. Medic. fere integri ex Galeno sint desumpti et ipse Oribasius Galenum semper tamquam omnium medicorum principem citet et nonnisi summa cum reverentia de illo loquatur (3), multa quoque ex Heliodoro, Posidonio, Antyllo, Dieuche, Apollonio, Philumeno, Rufo Ephesio, Megete aliisque depromsit haud contemnenda ac nonnumquam etiam paucas observationes ipse adjecit, alii tandem illum Galeno aequiparant vel etiam praeferre videntur (4): hinc ego lubenter assentiar Freindio dicenti (5: « Ita scriptor ille, quamquam « collectoris praecipue nomen mereatur, observatio-
« nes aliquas nobis in medicina suppeditat recentes
« nec inutiles; quique hoc proposito ejus opera per-
« volverit, is similia nonnulla apud antiquiores frus-
« tra quaerenda inveniet.» quam rem inprimis libros nuper ab Angelo Majo editos probaturos esse puto.

(1) J. Freind *Historia medicinae a Galeni tempera usque ad initium saec. XVI. pars I. pag. 8.*

(2) J. Freind l. l.

(3) Conf. Praefatio Libr. IV ad Eunapium.

(4) Photius l. l. Cod. 217.

(5) Freind l. l. pag. 17.

This report was prepared by the
 Department of the Interior
 Geological Survey
 Washington, D. C.
 1900

- (1) ...
- (2) ...
- (3) ...
- (4) ...
- (5) ...

YUIZSUINO

NO 127812 5091008

18 11 18 29 18 2

18 11 18 29 18 2

EX
ORIBASHI

COLLECTANEORUM MEDICINALIUM

LIBRO LXIV.

ὍΡΙΒΑΣΙΟΥ

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΓΩΓΩΝ

ἘΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑ.

Ι. Ἐκ τῶν Ἀντέλλου καὶ Ἡλιοδώρου χειρουργία
ἀποστημάτων (1).

ρ. 15. Ι. Εἰ μὲν κατὰ τὴν κεφαλὴν γένοιτο ἐπιπολλῆς
ἀπόστημα, ἀπλοτομήσομεν τάττοντες τὴν διαί-
ρεσιν, οὐ κατὰ τὴν εὐθύτητα τῶν τριχῶν, ἀλλ'
ἐπικάρσιον καὶ ὑποβεβλημένην τῇ τριχώσει· ὅπως
ἢ οὐλὴ μετὰ ταῦτα κρύπτοιο ὑπὸ τῆς τῶν τριχῶν
ἐπιπτώσεως· εἰ δὲ βύθιον κατὰ τὸν περικράνιον
ὑμένα τὸ ὑγρὸν ὑποπίπτοι, ὥστ' ἢ διαφθαρῆναι
μέρος τι αὐτοῦ, ἢ διαγανακτῆσαι καὶ συμπαθῆσαι,
τῆς μὲν εὐμορφίας ἥττονα ποιησόμεθα λόγον, τοῦ
δὲ ἀσφαλοῦς προνοούμενοι, δύο διαιρέσεις ἐμβα-
λοῦμεν συμμέτρους, ὡς πρὸς τὸ ἀπόστημα, τὴν
μὲν εὐθυτενῆ, τὴν δὲ ἐπικαρσίαν, τεμνοῦσας κατὰ
μεσότητα ἀλλήλας· ὡς τὸ σχῆμα αὐτῶν παραπλή-
σιον εἶναι τῷ χι γράμματι· οὕτω γὰρ ὁ περικρά-
νιος οὐ διαγανακτῆσει πανταχόσε διαιρούμενος· εἰ
δὲ κατὰ μέτωπον ἀπόστημα γένοιτο, ἐπικαρσίως
διαιροῦμεν μιμούμενοι τὰς Φυσικὰς ἐν τῷ μετώ-
πῳ γραμμὰς· εἰ δὲ κατὰ ρίνα, τὴν τομὴν εὐθυτε-
νῆ τάξομεν, κατὰ τὸ μῆκος τῆς ρίνος· εἰ δὲ κατὰ

(1) Ἀπὸ τοῦ α τῶν Ἀντέλλου χειρουργουμένων κεφα-
λαίων τοῦ ὁμοίου.

EX

ORIBASII

COLLECTANEORUM MEDICINARUM
LIBRUS XLII

EX ANTYLLI ET NICOLAI CHIRURGIA
ABSCISSUM



I. **S**i autem in capite superficialis adest abscessus, secabimus incisuram facientes, non secundum longitudinem capillorum, sed transversam subjectam capillitio; ut integra dein latescat capillis in illam cadentibus; si autem profunde sub membrana pericranio humor occurrit, ita ut pars ejus vel corrupta sit vel male affecta vel aliquid simul passa sit, pulchritudinis quidem minorem rationem habebimus, sed saluti prospicientes, duas incisuras injiciemus aequales, alteram quod ad abscessum attinet, rectam, alteram vero transversam, se invicem in medio decussantes, ita ut figura earum similis sit literae X; sic enim pericranium facile feret se ab omni parte dissecari; si autem in fronte abscessus adest, transverse secabimus imitantes naturalia in fronte lineamenta; si autem in naso, plagam recte dirigemus secundum longitudinem nasi; si vero in genis, sub ipsis quidem oculis, lunata incisura utemur, plagae convexitatem deorsum vertentes, ut ad naturalem palpebrarum curvaturam effor-

(1) A. M. pag. 1. Cod. pag. 15.

μῆλα, εἰ μὲν ὑπ' αὐτοῖς τοῖς ὀφθαλμοῖς, μνηοειδεῖ
 διαιρέσει χρυσόμεθα, τὸ κύρτωμα τῆς διαιρέσεως
 κάτω στρέφοντες, ἵνα ταῖς φυσικαῖς τῶν ἐποποι-
 ῶν περιφερείαις σχηματισθῇ· εἰ δὲ κατωτέρω, κα-
 τὰ τὰ λεπτὰ καλούμενα τῆς γνάθου, εὐθυτηνῆ
 τομῆν διελοῦμεν· ἐπεὶ καὶ ἡ ῥυσότης ἢ κατὰ φύσιν
 τῶν παρεῶν κατ' εὐθύτητά ἐστίν· ὅπισθεν δὲ τοῦ
 ὠτός ὑγροῦ γενομένου, μνηοειδῶς περιγράψομεν,
 μιμούμενοι τὴν βᾶσιν τοῦ ὠτός· τραχήλα δ' ἐπὶ
 ἀποστήματος τεμνομένη, ἐπὶ μὲν τῶν ὅπισθεν
 εὐθυτηνῆ· διαιρέσεις ἀρμόδιος, ἐπὶ δὲ τῶν ἔμ-
 προσθεν, ἐπεὶ λιπαρὸν τὸ δέρμα διὰ τὰς ἐπικύ-
 ψεις καὶ πολλὴν ἐπίδοσιν ἔχει, περιελοῦμεν· ἐκ
 γὰρ τῆς εὐθυτομίας οὐ πάνυ τί προσπίπτει τὰ
 σώματα, οἷα δὴ τοῦ δέρματος ἐγχαλωμένου καὶ
 ἀφισταμένου τῶν συνεχῶν σωμάτων.

p. 16. 2. Ταῦτα δὲ ποιοῦμεν | καὶ ἐπὶ μασχάλης καὶ
 βουβῶνος καὶ δακτυλίου, διὰ τὴν ὁμοειδεῖαν τοῦ
 δέρματος πρὸς τὸ τοῦ τραχήλου δέρμα· ἐπὶ δὲ
 μαστῶν (1), παχέων μὲν ὄντων τῶν ἐπικειμένων
 τῷ πύφω σωμάτων, ἀπλοτομία γιγνέσθω· λεπτῶν
 δὲ καὶ ἀνεπιτηδείων πρὸς κίλλησιν, ἐκτεμνέσθω·
 τὰ μὲν οὖν ἄλλα μέρη τοῦ τιτθοῦ ἀδεῶς περιαι-
 ρείσθω· ὃ δὲ πλησίον τῆς θηλῆς τόπος, πεφρον-
 τισμένως μνηοειδεῖ περιαιρέσει συντηρουμένης τῆς
 θηλῆς· ἐν δὲ τοῖς βραχίοσι καὶ τοῖς ἀγκῶσιν, ἐν
 τε ταῖς χερσὶ καὶ δακτύλοις καὶ τοῖς ἀπὸ τῶν
 βουβῶνων κατωτέρω πᾶσιν, εὐθείας κατὰ μῆκος

(1) Ἀπὸ τοῦ γ τῶν Ἡλιοδώρου χειρουργουμένων· κεγά-
 λαιον περὶ φλεγμονῆς καὶ τοπικῶν ἀποστημάτων.

metur. Si vero magis inferiora versus in parte malae tenui dicta, rectam incisuram ducemus; quoniam et rugae naturales genarum rectae sunt; pone aurem humor cum adsit, lunata plaga illam circumdabimus, imitantes basin auris; in collo vero si abscessus secatur, in parte posteriori quidem incisura recta convenit, in anteriori vero, cum pinguis sit cutis ob plicas et facillime cedat, extirpabimus; si enim recte secemus, nullo modo occurrunt corpora, quippe quum relaxatur cutis et recedit a proximis partibus.

2. Eadem facimus et in axilla et in inguine et in ano, quia cutis structura convenit cum ea cutis colli; in mammis autem, crassae cum sint partes puri impositae, simplex fiat plaga; si vero tenues neque conglutinationi aptae, excidantur; ceterae quidem partes manimae tute extirpantur; proximus vero papillae locus prudenter lunata incisura servata papilla; in brachiis autem et cubitu manibusque atque digitis omnibusque sub inguinibus positis, rectas secundum longitudinem plagas facimus; si autem sub scapula infra clavulas abscessus oritur, obliqua figura incisurarum adhibenda est ad normam eminentiae ossium harum partium; si vero in spina, recte scabimus, sicut musculi decurrunt; si autem in clunibus, in rotundis quidem et posterioribus partibus, rectis incisuris utimur; in partibus vero femo-

διαίρεσεις ἐγχαράσσομεν· εἰ δὲ κατ' ὠμοπλάτην ὑπὸ κλεῖς ἀπόστημα συμβαίῃ, λοξὸν τὸ εἶδος τῶν τομῶν παραληπτέον κατὰ μίμησιν τῆς ἐξοχῆς τῶν ὀστέων τούτων· εἰ δὲ κατὰ ῥάχιν, εὐθυτενῶς διαιροῦμεν, ὡσπερ οἱ μῦες ἐπιπεφύκασιν· ἐπὶ δὲ πυγῶν, κατὰ μὲν τὰ περιφερῆ καὶ ὀπίσω μέρη, διαιροῦμεν εὐθείαις τομαῖς· κατὰ δὲ τὰ ὑπεσταλμένα καὶ συνεγγίζοντα τοῖς μηροῖς, περιελοῦμεν· συριγγοῦται γὰρ ῥαδίως, εἰ μὴ περιαιροῖτο ἐκ πλάτους· ὁμοίως δὲ εἰ καὶ περὶ τὸν σφικτήρα ὑγρὸν γένοιτο τὸ εἶδος τῆς διαίρεσεως ἐπικάρσιον ἐπιτηδεύσθω· ταύτη γὰρ αἰ στολίδες πεφύκασιν.

3. Δεῖ δὲ (1) ἐν τῷ καιρῷ τῆς κατουλώσεως κασσιτέρινον σωλῆνα κυκλοτερῆ ἐντιθέσθαι, ἕξωθεν μὲν, ἀχανῆ· εἰς δὲ τὸ βάθος, περιφερῆ τρῆμα μέσον ἔχοντα πρὸς τὰς τῶν πνευμάτων ἀποδόσεις· μέχρι τέλους δὲ τῆς θεραπείας ἐγκείσθω ὁ σωλῆν πρὸς τὴν ἐν διαστολῇ κατούλωσιν· ἐπὶ δὲ πλευρῶν καὶ στέρνων τὸ εἶδος τῆς διαίρεσεως ἐπικάρσιον ἐπιτηδεύεσθαι· ταύτη γὰρ καὶ αἰ πλευραὶ πεφύκασιν· ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ ἐπιγαστρίου, διὰ τὸ τὰς Φυσικὰς στολίδας αὐτοῦ πάσας ἐπικαρσίους εἶναι· ἐπὶ δὲ ὀσχεοῦ καὶ καυλοῦ, τομαῖς εὐθυτενέσι χρηστέον· καὶ τὸ σύνολον, εἰδέναι χρὴ ὅτι τὰ σχήματα τῶν διαίρεσεων διδασκόμεθα ἐκ τῆς ἐπι-

p. 17. βλέψωμεν τῆς πρόσθεν πρὸς τὸ ἀσφαλές καὶ τὸ εὐμορφον· γραμμάς μὲν γὰρ Φυσικὰς ἀπομιμούμενοι διὰ τῆς τομῆς, ἐπὶ τὸ εὐμορφον ποιούμεθα

(1) Ἀπὸ τοῦ ὁ τῶν Ἡλιοδώρου χειρογραφουμένων· κεφάλαιον περὶ τῶν ἐν τῇ ἰδρῶν ἐπαγάδων καὶ κοῦδλωμάτων.

ribus subjectis iisque proximis, extirpabimus; facile enim fistulae oriuntur, nisi late extirpetur; eodem modo autem si et circa sphincterem humor adest, directio incisurae transversa paretur; hac ratione enim plicae decurrunt.

3. Oportet autem tempore cicatricis formationis, stanneum tubum circula rem immittere, a parte externa quidem, clausum, ab interna vero, rotundum foramen habentem in medio ad flatus evacuandos; usque ad finem curae loco maneat tubus, ut cicatrix inducatur sine contractione; in costis et sterno figura incisurae transversa convenit; eadem enim directione costae decurrunt; eodem modo et in epigastrio, quod naturales ejus plicae omnes sunt transversae; in scroto autem et in pene incisuris rectis utendum; et in univ ersum scire oportet figuras plagarum nos discere ex praegressa consideratione salutis et decoris; lineamenta enim naturalia incisione imitantes, decoris rationem habemus; recte autem secantes, uti in artubus et tendinibus, saluti prospicimus, ne quid nervorum vel vasorum propter transver sau incisionem dissecare cogamur; oportet nem-

τὴν ἀναφορὰν εὐθυτενῶς δὲ τέμνοντες, οἷον ἐπὶ τῶν κώλων καὶ τῶν τερόντων, τῆς ἀσφαλείας προνοούμεθα, ἵνα μὴ τῶν νεύρων καὶ τῶν ἀγγείων ἐκ τῆς ἐπικαρσίας διαιρέσεως ἀναγκασθῶμεν διελεῖν τίς χρὴ μέντοι γινώσκειν ὡς οὐκ ἐπίσης ὀφειλόντων ἀποβλέπειν ἡμῶν πρὸς τε τὸ ἀσφαλές καὶ τὸ εὐπρεπές· πανταχοῦ γὰρ προσεχέστερον τὸ τῆς ἀσφαλείας τίθημι.

4. Πάλιν ἐπὶ μὲν τῶν μικρῶν ἀποστιμημάτων, μιᾷ διαιρέσει χρῆσόμεθα, καθὼ λεπτότατα αὐτὰ ἑαυτῶν εὐρίσκεται τὰ σώματα· ἐπὶ δὲ τῶν μειζόνων, πλείοσι διαιρέσεσι χρώμεθα· τέμνοντες γὰρ ἢ λεπτότατον τὸ δέρμα, καὶ τὸ ὑγρὸν ἐκκρίνοντες, καθίεμεν τὸν λιχανὸν δάκτυλον τῆς ἀριστερᾶς χειρὸς διὰ τῆς διαιρέσεως εἰς τὸν κόλπον ἔπειτα πανταχῇ περιάγοντες αὐτὸν, τὸ μέγεθος τοῦ κόλπου κατανοοῦμεν· εἰ μὲν οὖν ἔφ' ἔν τι μέτρος ὀδηγεῖτο ὁ δάκτυλος, τῶν πέριξ ἀπαθῶν ὄντων, καθ' ὁπότερα ὑγιᾶς ἢ τοῦ κόλπου, κατὰ ταῦτα κυρτώσαντες αὐτὸν καὶ περιτείναντες τὴν σάρκα, δευτέραν ἐμβαλοῦμεν διαίρεσιν, τὸ αὐτὸ σχῆμα ἔχουσαν τῇ προτέρᾳ· εἰ δὲ ὁ κόλπος ὁ περιέχων τὸ ὑγρὸν εὐθυτενῆς μὲν εἴη, τύχη δὲ πολὺ ἐπιμηκέστερος τοῦ δακτύλου, μετὰ τὴν δευτέραν διαίρεσιν κομισάμενοι τὸν δάκτυλον, πάλιν διὰ τῆς δευτέρας αὐτὸν καλήσομεν καὶ τρίτην ἄλλην ἐμβαλοῦμεν ἐπὶ τῇ δευτέρᾳ παραπλησίως· εἰ δὲ πλατὺς εἴη καὶ περιφερῆς, στομῶσομεν ἢ λεπτότατος ὑποπίπτει καθέντες δὲ τὸν δάκτυλον, τὴν μὲν τινὰ διαίρεσιν κατωτέρω τῆς πρώτης ἐμβαλοῦμεν, τὴν δὲ ἀνωτέρω, εἰ τύχη κἀνταῦθα τίς

διασημαίνειν ὑποφορά· ἄλλας δὲ ἐκ πλαγίων τῆς
 πρώτης καὶ τῆς μετὰ τὴν πρώτην, πάσας μὲν
 p. 18. τοιαύτας ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἐκτεινομένας μέρος.

5. Στοχασμὸς δὲ γινέσθω μάλιστα τοῦ τὰς
 ὑστάτας διαιρέσεις τὰς πρὸς τοῖς πέρασι τοῦ κόλ-
 πω παρ' αὐτὴν τὴν ὑγιαίνουσαν καὶ μὴ ἀφεστηκυῖ-
 αν σάρκα ἐμβάλλεσθαι· εἰ μὴ γὰρ τοῦτο γένοι-
 το, ἀλλ' ὑπολείποιτό τις χώρα κεκολλημένη,
 δυναμένη φυλάττειν ὑγροῦ τι μέρος ἐν ἑαυτῇ,
 μείζων ὁ κόλπος γενήσεται· τῶν ὑγρῶν διασηπόν-
 των ἐκεῖνα τὰ μέρη, καθ' ἃ ἂν ὑφίστασθαι τύ-
 χοι· εἰ μὲν οὖν ὑπόπλατυ τὸ ἀπόστημα τύχοι
 καὶ μὴ πάνυ ἐξογκώμενον, εὐθυτομήσομεν· εἰ δὲ
 κυρτὸν ἰσχυρῶς εἴη καὶ περίογκον εἰς ὀξειάν τε
 ἀνατεῖνον κορυφὴν, περιαιρέσει χρησόμεθα· μεγά-
 λη μὲν, εἰ καὶ αὐτὸς ὁ τόπος προκαλοῖτο τὴν
 περιαιρέσιν, ὡς μασχάλη καὶ βουβῶν καὶ τὰ πε-
 ρὶ τὸν δάκτυλον· εἰ δὲ μὲν τέρας, ὅσον ἐφ' ἑαυ-
 τῷ, παραιοῖτο τὴν περιαιρέσιν, τὸ δὲ ἀπόστη-
 μα διὰ τὸ ἰσχυρῶς κεκολλημένον, τὴν τῆς περι-
 αιρέσεως ἀνάγκην ἀνάχοι μικρὰ χρησόμεθα.

6. Χρὴ δὲ περιδιαίρειν τὸν τρόπον τοῦτον με-
 τὰ τὸ σημειώσασθαι τὸν περιαιρευθῆσομενον τόπον,
 διαγράψομεν τὸ βάθος μυστινοειδῶς εἴτ' ἀγκι-
 στρον καταπέραντες εἰς μέσον τὴν περιγεγραμ-
 μένην σάρκα, καὶ ἀνατείναντες ἰσχυρῶς διὰ τῆς
 ἀριστερᾶς χειρὸς, πᾶν τὸ περιχαραχθὲν ἐκτε-
 μοῦμεν· ταῦτα δὲ ποιήσομεν, κἂν τὰ ἐπεστορε-
 σμένα σώματα τῷ ἀποστήματι λεπτὰ ἢ νενεκρω-
 μένα εἶναι τύχοι· εὐδόκιμος γὰρ ἐφ' ἀμφοῖν τού-
 τοιν ἡ περιαιρέσις ἐστὶ μέτρον δὲ τῆς περιαιρέ-

ras ad latera primae et sequentis , omnes quidem eodem modo ad eandem partem tendentes.

5. Quam maxime autem curandum , ut ultimae incisurae quae fiunt in finibus sinus ad ipsam sanam usque et non abscedentem carnem perducantur ; nisi enim haec fiant , verum relinquatur aliqua plaga sinu excavata , quae aliquam humoris partem intus servare potest , major sinus fiet , humoribus putredinem excitantibus in illis partibus , ubi desident ; si autem latiusculus sit abscessus neque valde tumeat , recte secabimus ; si vero valde sit convexus turgeatque et ad acutum evehatur cacumen , extirpatione utemur ; magna quidem , si et ipse locus praecipit extirpationem , uti axilla et inguen et quae anum circumdant ; si vero locus per se dissuadet extirpationem , abscessus tamen , quod tam graviter turget , extirpationis necessitatem adducit , parva utemur.

6. Oportet autem extirpare sequenti ratione ; postquam designatus est locus extirpandus ; circumscribemus illum ad formam myrtei folii , deinceps defigentes in media circumscripta carne illumque fortiter sinistra manu attrahentes , omne circumscriptum excidemus ; eadem et faciemus , si corpora abscessui superstrata tenuia sint et emortua ; probanda enim in ambobus his casibus extirpatio ; finis autem extirpationis sit ip-

σεως, αὐτὸ τὸ λελεπτυσμένον ἢ νενεκρωμένον ἔστω σῶμα· τὸσαῦτα περὶ τῆς χειρουργίας τῶν ὑποπιπτόντων ἀποστημάτων· ἐξῆς δὲ περὶ τῆς θεραπείας λεκτέον.

II. Ἐκ τῶν Ἡλ:οδώρου περὶ τῶν ἐν κατακαλίψει ἀποστημάτων. (1)

Ἐάν μὲν οὖν ὁ πεπονηθὼς τόπος ὑποπίπτῃ χειρουργία, συνεργεῖν δεῖ τῇ πρὸς τὴν ἐπιφάνειαν ροπῇ τοῦ ἀποστήματος διὰ πυριῶν θερμῶν καὶ ἐπιστατικῶν καταπλασμάτων τε καὶ ἐμπλάστρων· τοῦ δὲ ἀποστήματος || — ὑπὸ σύρρηξιν ἀγομένῃ, τὰναντία δεῖ ποιεῖν, καὶ συνεργεῖν τῇ εἰς βάθος ὀρμῇ πρὸς τὴν ἀναστόμωσιν· τῇ μὲν ἐπιφανείᾳ προσάγοντας τῶν στυφόντων καταπλασμάτων τῶν διὰ φοινίκων γε καὶ θαλλίας φύλλων καὶ σιδίων καὶ μήλων· πόματα δὲ δίδοντας θερμαίνοντα οἷα τὰ διὰ πεπέρεος σμύρνης πιγάνῃ ὅπου· ἵνα τῆς ἐπιφανείας στελλομένης καὶ τοῦ βάθους θερμαινομένης καὶ ἐρεθιζομένης λεπτυνθῆν τὸ ἀπόστημα ἀναστομωθῇ. ἐπὶ δὲ τῶν ὑποπιπτόντων ἀποστημάτων τοῖς τῆς χειρουργίας ἔργοις τελείας ἐκπύσεως γενομένης, ἐπὶ τὴν χειρουργίαν ἵκειν δεῖ.

(1) Ἀπὸ τοῦ γ τῶν χειρουργουμένων κεφάλαιον, τίνες τῶν ἀφισταμένων τόπων ὑποπίπτουσιν χειρουργία, καὶ τίνας διαίτη καὶ φαρμακεία.

sum attenuatum et emortuum corpus; tantum de chirurgia occurrentium abscessuum; deinceps de therapia dicendum.

II. *EX HELIODORI LIBRO DE OCCULTIS ABSCESSIBUS.*

Si affectus quidem locus Chirurgiae est subjectus, favere oportet motui abscessus exteriora versus balneis calidis et impositis cataplasmatibus et emplastris; abscessus vero rupturae cum sit propior, contraria facere convenit motuique inferiora versus favere quo facilius fiat apertura; ad superficiem quidem attrahentes abscessum ope adstringentium cataplasmatum ex palmarum et thalliae foliis et ex malicorio malisque; potus dantes calidos ex pipere, myrrha et rutae succo; ut, dum superficies contrahitur et fundus calefit et irritatur, attenuatus abscessus aperiatur; in abscessibus autem, qui chirurgiae auxilium postulant, perfecta suppuratione, ad chirurgiam transire oportet.

III. Τῶν ἐν μεσοπλευρίῳ ἀποστημάτων
χειρουργία. (1)

1. Σχηματιζέσθω ὁ κάμνων κεκλιμένος ἐπὶ τὸ ὑγιὲς πλευρόν· πρὸς δὲ τὴν διαίρεσιν αἰρεῖσθαι δεῖ μεσοπλεύριον τὸ μεσαίτατον τοῦ ὄγκου καὶ τῶν ἄλλων πλατύτερόν τε καὶ ἐκτικώτερον· ἡ δὲ διαίρεσις διδῶσθω πλαγία μὲν ὑπόλοξος δὲ πρὸς τὸ τοῦ μεσοπλευρίου σχῆμα· τεμνέσθω δὲ πρῶτον μὲν τὸ δέρμα· καὶ πρὸ τῆς τοῦ ἀποστήματος στομώσεως διὰ τῶν τῆς διαιρέσεως χειρῶν ἀγκυτῆρες ραμμάτινοι διεκβαλλέσθωσαν τέσσαρες, δύο καὶ δύο· δίκαιον δὲ χρεῖαν ὕστερον εἶσεσθαι. μετὰ τὴν τῶν ἀγκυτῆρων διεκβολὴν τῷ τοῦ σμιλαρίου κόρακι στομούσθω τὸ ἀπόστημα· ἅμα δὲ καὶ τῷ δακτύλῳ διαρτάσθω τὸ καταλελειμμένον συνεχῆς σῶμα· μέγεθος δὲ τῆς τομῆς σύμμετρον ἔστω ὡς διδάκτυλον ἢ καὶ ἔτι μεῖζον· τῇ δὲ πρώτῃ ἐνεργείᾳ· μὴ ὅλον ἐκλαμβανέσθω τὸ πύον· ἡ γὰρ ἀθρόα ἐκκρισις τετήρηται τὸν κατὰ λειποθυμίαν κίνδυνον ἐπιφέρουσα.

2. Ἐκληφθέντος (2) δὲ τοῦ ὑγροῦ, σπύγγον μάλα μὲν λιπῶ διαδεδεμένον ἐπὶ τὴν διαίρεσιν ἐντιθέσθω, ἵνα δι' αὐτοῦ τὸ καταλελειμμένον ὑγρὸν ἐπέρχηται· εἶτα τιλοῖς μότοις χρηστέον καὶ πτυγματίῳ διπτύχῳ ἢ τριπτύχῳ τῷ καθεμένῳ μο-
 p. 18^b. νοφύλακι· κατὰ δὲ τούτῃ οἱ ἀγκυτῆρες | ἀμματιζέσθωσαν τοπικοῦ κρατήματος χάριν· εἶτα ἔξωθεν ἐπιμοτούσθω ἢ τομῇ τιλοῖς οἰνελαίῳ βεβρεγ-

(1) Ἀπὸ τοῦ γ τῶν χειρουργουμένων κεφ. τοῦ ὁμοίου.

(2) Ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ.

III. DE ABSCESSU INTER DUAS

COSTAS CHIRURGIA.

1. **D**ecumbat aegrotus in sanum latus versus; ad incisionem autem eligere oportet locum inter duas costas medium in media tumoris parte ceteris ampliorem et aptiorem; incisura autem fiat transversa et paululum obliqua ad formam spatii inter duas costas; secetur autem primum cutis; et antequam abscessus aperiatur, per plagae labia trajiciantur fibulae sutoriae quatuor, per quodvis labium duae. Licébit postea harum utilitatem perspicere; in fibulis immisis scalpelli mucrone aperiatur abscessus; simul digito diducantur contiguae relictae partes; plaga autem magnitudine aequalis sit duobus digitis vel et adhuc major; prima operatione né omne excernatur pus; integrum enim effluvium periculum animi deliqui afferre observarunt.

2. **E**xcreto autem humore, spongia firmiter filo adligata plagae imponatur, ut per illam reliquus humor transeat; dein linamentis carptis utendum et linteo bis vel ter plicato motophylace dicto; dein fibulae connectantur ut loco fulcimentum praebeant; dein exterius circumdetur plaga linamentis carptis, vino oleo mixto imbutis extraque imponatur communis motophylax et toti pectori lana vino oleo mixto madefacta;

μένοις· καὶ ἔξωθεν ὁ κοινὸς μοτοφύλαξ ἐπιτιθέσθω, καὶ ὄλω τῷ θώρακι ἔριον οἰνελαίῳ βεβρεγμένον· τῇ δὲ δευτέρῃ ἢ τρίτῃ λυέσθω· καὶ πάλιν μέρος τοῦ ὑγροῦ αὐτάρκες κενούσθω· γινέσθω τε ταῦτα καὶ τὰς ἐξῆς, ἵνα τρισὶν ἢ πλείοσιν ἐπιβολαῖς τὸ τοῦ ὑγροῦ πλῆθος πᾶν κομισθῆ.

3. Ἄλλ' ἐπεὶ τὰ ἀποστήματα ταῦτα κινδυνώδη ἐστὶ, τὸν ἀριστὸν ἰατρὸν χρὴ προγινώσκειν τὸν ὀλεθρίως ἔχοντα καὶ τὸν σωτηριῶδες· ὀλεθρίως μὲν οὖν ἔχων ὁ πάσχων μετὰ τὴν τοῦ ὑγροῦ ἔκκρισιν ἀσώδης ἐστὶ, καὶ δυσόρεκτος καὶ δύσπνευς καὶ ποτε καὶ βῆσσει μετ' ἀγρυπνίας καὶ ἀσθενείας τῆς δυνάμεως· καὶ τοῦ ὑγροῦ κενεμένε καθ' ἡμέραν πάλιν συλλέγεται διψιλὲς δυσῶδες καὶ φθειρομένε τοῦ ὑπεζωκότος ὑμένος καὶ ἀπολύματα φανήσεται ἐμφερόμενα· τῷ ὑγρῷ σωτηρίως δὲ διακειμένε τοῦ νοσοῦντος, τὰ ἐναντία συνεδρεύει καὶ χρὴ μετὰ τὴν παντελῆ τοῦ ὑγροῦ ἔκκρισιν τὸν λιχανὸν δάκτυλον καθιέναι, καὶ σκοπεῖν πότερον γυμναὶ εἰσὶν αἱ πλευραὶ ἢ λελιπασμέναι ἢ σκέπονται ὑπὸ σωμαίων· ἐὰν οὖν ἔτι σκέπων τῷ ὑπεζωκότι ὑμένι γινέσθω κατάντλησις δι' ὕδατος εὐκράτη· εἴτ' ἐγκλυζέσθω τὸ βάθος μελικράτῳ· καὶ κλινέσθω ὁ πάσχων πρὸς τὸ πάσχον μέρος· τὸ δ' ἐναπομείναν ἐρίῳ περὶ μηλωτρίδα εἰλημμένῳ ἀναρπαζέσθω· εἴτ' ἐγχυματιζέσθω μέλι λεῖτον ὤμων ἢ μετρίως ἀτεζεσμένον· φάρμακα γὰρ λιπαίνοντα ἐπὶ τῶν ἀποστημάτων τούτων ἐστὶν ἀθέατα· τὸ δὲ μέλι διὰ βαρύτητα ὑποτρέχον καὶ τὸ ὑγρὸν ἀνακρυφίζον πρὸς ἔκκρισιν ἄγει.

secundo aut tertio die solvantur fasciae et rursus sufficiens humoris quantitas evacuetur; fiat illud et sequentibus diebus, ita ut tribus vel pluribus tota humoris copia sit evacuata.

3. Sed cum hi abscessus sint periculosi, optimum medicum statim distinguere oportet perniciosum et qui bonum habebit exitum. Pernicies autem si imminet, aegrotus post humoris effusionem nausea laborat, difficulter se erigit et respirat atque subinde tussit insomnia eum virium languore correptus; et humore evacuato quotidie rursus colligitur magna copia mali odoris; atque destructa succingenti membrana ejus reliquiae quoque apparebunt humori innatantes; si vero ad sanitatem perducetur aegrotus, contraria obtinent; et oportet omni omnino humore evacuato indicem digitum imponere et inquirere num costae nudae sint an pinguedine coopertae an corporibus tegantur; si igitur etiam quid adest illas tegens, in succingentem membranam fiat infusio aquae purae; dein in fundum injiciatur mulsum; et decumbat aegrotus in latus affectum; reliquus autem humor lana circa specillum contorta extrahatur; dein instilletur mel leniter crudum vel paululum coctum; medicamenta enim pinguefacientia his abscessibus non sunt imponenda; mel autem propter gravitatem humorem subiens et sublevans eum excerni curat.

4. Μετὰ τὴν τοῦ μέλιτος ἔκχυσιν, λημνίσκοι καθιέσθωσαν· καὶ τότε ἡ τομὴ τιλοῖς μότοις διαστελλέσθω· καὶ οὕτως οἱ ἀγκιτῆρες ἀμματιζέσθωσαν· περιμοτούσθω δὲ τὰ πλησίον μέρη || — καὶ κατ' αὐτοῦ ὄλα τοῦ πλευροῦ σπλήνιον κεκαρωμένον ἐπιτιθέσθω· τοῦ δὲ βάρους ρευματιζομένη, κατάπλασμα στιπτικὴν ἔχον δύναμιν ἔξωθεν ἐπιτιθέσθω τοῦ σπληνίου· ταῦτα γινέσθω ταῖς ἐξῆς ἡμέραις ἕως οὗ καθαρῆ καὶ σαρκωτῆ τὸ βάρος· ἐν δὲ τῷ μέσῳ τῆς θεραπείας χρόνῳ οἱ ἀγκιστῆρες διακοπτόμενοι κομιζέσθωσαν· οὗτος ἐστὶν ἄριστος τρόπος τῆς θεραπείας ἐν αὐτῷ τῷ ὑμένι συλλεγέντος τοῦ ὑγροῦ· μετὰ δὲ τῶν πλευρῶν καὶ τοῦ ὑμένος συλλεγέντος μετὰ τὴν ἀσφαλῆ τοῦ ὑγροῦ ἔκκρισιν, ὀρμῆσαι δεῖ ἐπὶ τὴν τῶν πλευρῶν ἐκκοπὴν· ἐκθήσομαι δ' αὐτὴν ἐπομένως.

IV. (III.) Περί ἐκκοπῆς πλευρῶν.

1. Ἐκτεμνέσθω τὰ σκέποντα τὴν πλευρὰν, ἢ τὰς πλευρὰς σώματα, ὑπὸ τε τετραγώνῃ τῆς ἐκτομῆς ὑπὸ μήκους σχηματιζομένης· πρὸς δὲ τὴν περιχάραξιν, δίδόσθω μία πρώτη πλαγία διαίρεσις κατὰ μεσοπλευρίῃ ὑπὸ τὴν δεομένην ἐκκοπῆς πλευρὰν λελοξωμένη πρὸς τὸ τοῦ μεσοπλευρίῃ σχῆμα, εἰς δὲ καταπειρέσθω ἀγκιστρον, καὶ ἀναταθὲν ἐκτεμνέσθω· καὶ οὕτως αἱ πλευραὶ ψιλοῦσθωσαν· καὶ τῇ δεομένη πλευρᾷ ἀναιρέσεως

4. Post mellis instillationem, linamenta oblonga imponantur et tum incisura linamentis carptis diducatur; et dein fibulae connectantur; linamentis autem carptis circumdentur proximae partes et toti lateri imponatur emplastrum somniferum; fundo autem fluxione affecto, cataplasma stipticam vim habens extra imponatur emplastro; eadem fiant sequentibus diebus donec purgatus et carne tectus sit fundus; in medio autem curationis tempore fibulae quippe secantes, educantur; haec est optima curandi ratio in ipsa membrana collecto humore; inter costas vero et membranam collectus cum adsit tuto excreto humore transeandum est ad costarum excisionem; hanc autem mox explicabo.

IV. (III.) *DE EXCISIONE COSTARUM.*

1. **E**xcidantur quaecunque costam sive costas tegunt corpora, incisura ad figuram quadrati in longitudinem porrecti efformata; ut illa autem circumscribatur, fiat primum una incisio transversa in spatio inter duas costas oblique sub excidenda costa directa ad formam hujus spatii, in quod defigatur uncus et pars extensa excidatur; et sic costae denudentur; et costae exstirpandae specilli lati vel meningophylacis lamina suppo-

πλατυμήλης ἢ μνηιγγοφύλακος ἔλασμα ὑπερι-
 δέσθω ἕδρας χάριν· καὶ ἡ ἀκμὴ τοῦ τρυπάνου
 στηριζέσθω κατὰ τὸ ἐψιλωμένον μέρος τῆς πλευ-
 ρᾶς πρὸς τοῖς κατὰ Φύσιν σώμασι· καὶ γινέσθω ἡ
 ἐνέργεια· κἂν ὑποπέσῃ τῷ ἐνεργοῦντι κενεμβατή-
 σαι, τὸ ἔλασμα τῆς μήλης παραωαγέτω ὑπὸ τὸ
 τετρημένον μέρος· ὅλον δὲ δι' ὅλα τὸ τῆς πλευ-
 ρᾶς πάχος τετράσθω· καὶ ἦτοι δύο τὰ πάντα
 διδύσθω τρήματα, ἐν καὶ ἐν στενῆς οὔσης τῆς
 πλευρᾶς· ἡ δὴ δύο καὶ δύο, πλατυτέρας οὔσης.

2. Τὸν δὲ τρόπον τῆς τῶν τρημάτων δόσεως
 ἐκτίθεμεν ἐν τῷ περὶ τῶν τοῦ κρανίου λόγῳ· καθά-
 'Απὸ τοῦ περ * καὶ τὸν τρόπον τῆς ἐκκοπῆς· διακοπτέσθω
 αὐτοῦ. δὲ τῆς πλευρᾶς καθ' ἐν μέρος τὸ πλεῖον πάχος,

p. 20.

καὶ λεπτὴ συνέχεια καταλιπέσθω· εἶτα | τότε τὸ
 ἕτερον διὰ τῶν ἐκκοπέων διαιρείσθω ὅλον· τούτῃ
 γενομένη, δακτύλοις ἢ ὀστέγρας συνεχέσθω ἡ
 πλευρὰ, ἵνα ἡ καταλελειμμένη λεπτὴ συνέχεια
 μιᾶ ἐπιβολῇ τῇ τοῦ σμιλίου τοῦ ἐκκοπέως ἀκμῇ
 διακοπῇ· κἂν μὲν ἢ ἀπαλὰ τὰ τῆς πλευρᾶς ἄκρα,
 ἀρκεῖσθαι δεῖ· ἀνώμαλα δὲ ὄντα, ῥίγη ὀμαλίζειν·
 ταῦτα ποιοῦμεν ἐπὶ τῶν ὀστωδῶν πλευρῶν.

3. Ἐπὶ δὲ τῶν χονδρωδῶν, ἐκτέμνειν χρὴ καὶ
 ἀναυρεῖσθαι διὰ ἰσμιλίου βαρυτάτη ἢ κατὰ ἐνέρ-
 γειαν ἀκμῇ σμιλίου τοῦ ἐκκοπέως· οὔτε γὰρ ἀν-
 τέρεισις ἐπὶ χονδρώδους πλευρᾶς παραλαμβάνεται,
 οὔτ' ἐκκοπὴ διὰ τὴν ἀπαλότητα τῆς οὐσίας· ἐκ-
 τεμνέσθω δὲ μὴ μόνον τὸ λελιπασμένον μέρος τοῦ
 χόνδρου, ἀλλὰ καὶ τινὰ τῶν κατὰ Φύσιν τῆς
 πλευρᾶς· μετὰ δὲ τὴν τῶν πλευρῶν ἀναίρεσιν,
 λημνίσκοις ἀναπληροῦσθω τὸ τῆς ἐκτομῆς κούλω-

natur ad fulciendum; et mucro terebrae figatur in parte denudata costae prope naturalia corpora; et fiat operatio; atque si accidat chirurgum ad locum vacuum pervenire, lamina specilli adducatur sub perforatam partem; in universum autem totius costae crassities perforetur; et sane duo omnino parentur foramina a quovis latere unum, si angusta sit costa; vel a quovis latere duo, si latior sit.

2. Rationem autem qua foramina formentur, exponimus, ubi de morbis calvariae agimus, uti et excidendi rationem; dissecetur autem in altera costae parte maxima crassitiei pars atque tenuis relinquatur cohaerentia; dein tunc altera pars scalpris dissecetur tota; hoc facto digitis vel forcipe teneatur costa, ut relicta tenuis cohaerentia una applicatione mucronis scalpri excisorii dissecetur; atque si quidem laeves sunt costae margines, finem operationi imponere oportet; si vero inaequales, lima laevigare; haec facimus in costis osseis.

3. In cartilagineis autem, excidere oportet et extirpare ope scalpri gravissimi vel mucrone scalpri excisorii fortiter adhibiti; neque enim fulcimentum in cartilagineis costis adhibetur, neque eadem excidendi ratio ac in osseis propter mollitiem substantiae; ne autem exsecetur solummodo pinguefacta pars cartilaginis verum et nonnullae partes costae sanae; post costarum excisionem oblongis linamentis implea-

μα' και τὰ πρόχειρα μέρη τιλοῖς μότοις ἀνα-
 πληρούσθω' και κατὰ τοῦ μοτοφύλακος ὄλα τοῦ
 θώρακος ἔριον οἶνελαίω βεβρεγμένον ἐπιτιθέσθω'
 εἴτ' ἐπιδρύσθω' μετὰ δὲ τὴν κάθαρσιν πρὸς τὴν
 σάρκωσιν ἐγκρίνειν δεῖ ἐμπλάστρους κεφαλικάς
 ἀνισμέναις ῥοδίνω' τὰ γὰρ λιπαινόντα φάρμακα
 ἀνοίκεια σύνεστιν, ὅτι πλευρῶν ἄκρα γεγύμνω-
 ται' και λιπαινόμενα πρὸς τοῖς ἐσχάτοις τῆς θε-
 ραπείας συριγγοῖ τοὺς τόπους μετὰ τὴν σάρκω-
 σιν' ὑπτία οὖσα ἰσόπεδος ἢ ἔλκωσις κατελούσθω.

V. (IV.) Περὶ περιτοναίς, και τοῦ μεταξὺ ἐπιγαστρίας
 και περιτοναίς ἀποστήματος.

Ἐπὶ τοῦ περιτοναίς τόπου τὲ τοῦ μεταξὺ ἐπι-
 γαστρίας και περιτοναίς, ἢ αὐτὴ χειρουργία γιγ-
 νέσθω' διαιρεῖται γὰρ ἕως τοῦ πύθ τὰ σκέποντα
 σώματα, τοῦ πάσχοντος ὑπτίς σχηματισμένα'
 και τᾶλλα γίνεται, ὡς ἐπὶ θώρακος' ἄμεινον
 δ' ἔστι μετὰ τὴν παντελῆ τοῦ ὑγροῦ ἔκκρισιν τὸν
 δάκτυλον εἰς βάθος καθιέναι, και διαίρεσιν εἰς
 ὑπόρρυσιν δίδοναι' ὀλίγη δ' ὄντος τοῦ συλλεχθέν-
 ρ. 21. τος ἢ ὑγροῦ, κατὰ μίαν ἐπιβολὴν ἢ ἔκκρισιν τοῦ
 παρακειμένης γινέσθω, ὡς ἐπὶ τῶν ἐν ἐπιφανείᾳ
 ἀποστημάτων.

tur cavum excisione formatum; et proximae partes linamentis carptis repleantur; atque super motophylace toti pectori imponatur lana vino oleo mixto imbuta; dein firmetur; post depurationem autem imponere oportet emplastra capitalia roseo mixta ut caro inducatur; pinguefacientia enim medicamenta omnia non conveniunt, quoniam costae margines sunt denudatae; et pinguefacientia sub finem curationis fistulis origineum praebent in illis locis post carnis inductionem; superior ulceratio cum sit plana, cicatrix inducatur.

V. (IV.) *DE PERITONAEI ET SPATII INTER
EPIGASTRIUM ET PERITONAEUM
ABSCESSU.*

In peritoneo et spatio inter epigastrium et peritoneum eadem sit chirurgia; dissecentur nempe integumenta usque ad pus, aegroto resupino decumbente; et cetera fiunt uti in pectore; melius autem est post universam humoris detractio-
nem digitorum fundo imponere et incidere super loco unde pus defluxit; parcus cum sit humor collectus una vice effluvium reperti fiat sicut in superficialibus abscessibus.

VI. (V.) Περὶ ἥπατος καὶ σπληνὸς ἀποστήματος.

Ἐπὶ τῶν ἐν ἥπατι καὶ σπληνὶ ἀποστημάτων δοκεῖ μοι δεῖν τέμνειν ἢ καίειν, διαιρείσθω δὲ τὰ ἐπικείμενα τῷ σπλάγχνῳ σώματα ἐπιγάστριον καὶ περιτόναιον· καὶ πλείστης οὔσης συλλογῆς διεκβαλλέσθωσαν ἀγκυτῆρες διὰ τῶν τοῦ ἐπιγαστρίας χειλῶν· τότε τὸ ἀπόστημα διαιρείσθω, πάλιν πρὸς δύναμιν ἐκκρινομένε τοῦ ὑγροῦ· πρὸς δ' ἐποχὴν τοῦ καταλελειμμένου, ὡς δ' ἤδη ἐρρέθη, σπογγίᾳ μαλακοῦ ἐντιθεμένε· γιγνέσθω δὲ καὶ τὰ ἐξῆς οἷα ἐπὶ τοῦ θώρακος εἴρηται· ὀλίγον δὲ ὄν τὸ ὑγρὸν, σύμπαν κατὰ μίαν ἐπιβολὴν ἐκκρινέσθω· εἴωθε μὲν οὖν σαρκωμένης τῆς ἐν τῷ βάθει ἐλκώσεως, συνσαρκοῦσθαι καὶ τὰ χεῖλη τοῦ ἐπιγαστρίας καὶ τοῦ περιτοναίου, ὥστε μὴ συνούλωσιν τῆς τομῆς γίνεσθαι· ἔαν δὲ φθάσῃ ἐπουλωθῆναι ἢ τοῦ σπλάγχνου ἔλκωσις, ἀναιμασσέσθω τὰ τῆς τομῆς χεῖλη, καὶ ραπτέσθω πρὸς κόλλησιν· ἔαν δὲ ποτε τὸ ἐν ἥπατι καὶ σπληνὶ ἀπόστημα ἀναστομωθῇ, ὡς τὸ ὑγρὸν προχεόμενον ὑποδραμεῖν τὸ περιτόνιον καὶ περιχυθῆναι τοῖς σπλάγχνοις, ἔαν μὲν ἢ πλῆθος τὸ προκεχυμένον, ὡς ἀναλογεῖν πλήθει τῷ ἐπὶ ὕδρωπος, παρακεντήσει χρώμεθα· ὀλίγε δ' ὄντος τοῦ κεχυμένου, τοπικὴ γινέσθω διαίρεσις τοῦ ἐπιγαστρίας καὶ τοῦ περιτοναίου· εἶτα ὅταν φθανῇ τοῦ σπλάγχνου στόμωσις, ἐπιδιαίρεισθω πρὸς τὴν τοῦ ἀποστήματος ἀνασκευῆν· καὶ τότε τὰ ἀκόλουθα γιγνέσθω, ὅσα μικρῶ πρόσθεν εἴρηται.

VI. (V.) DE HEPATIS ET LIENIS ABSCESSU.

In hepatis vel lienis abscessibus, ut mihi videtur, oportet secare vel urere, dissecentur autem primum visceri imposita corpora epigastrium et peritonaeum; et copiosa cum sit collectio, trahantur fibulae duae epigastrii labiis; dein abscessus secetur rursus pro copia humoris qui excernitur; ut autem suscipiatur pars relicta, uti jam dictum, spongia imponatur mollis; fiant autem et sequentia qualia in pectore dicta sunt; parcus cum sit humor, omnis una vice excernatur; solent enim dum caro inducitur ulcerationi in fundo, labia epigastrii et peritonaei etiam carne conjungi, ita ut cicatrix induci nequeat plagae; si autem primum cicatrix inducatur visceris ulcerationi, rursus cruenta reddantur labia incisurae et consuantur, ut dein glutinentur; si autem quando hepatis vel lienis abscessus aperiat ut humor profusus subeat peritonaeum et circumfundatur visceribus, si magna quidem sit copia profusa, ita ut aequet copiae humoris in hydrope collectae, paracentesi utimur; si vero parca sit copia humoris effusi localis fiat incisura epigastrii et peritonaei; dein si primum claudatur viscus, rursus fiat incisio ad restituendum abscessum; et tunc congrua fiant quantia paulo ante dicta sunt.

VII. (VI.) Περὶ ἀπευθυσμένῃς ἐντέροις ἀποστήματος
καὶ τῶν ἐν ἄλλοις μορίοις.

Τοῦ ἀπευθυσμένῃς ἐντέροις ἀποστάματος, ποτὲ μὲν χειρουργεῖν δεῖ, ποτὲ δὲ συνεργεῖν τῇ κατὰ βάθος συρρήξει· χειρουργεῖν μὲν, ἐν τοῖς προχείροις τόποις τοῦ ἀποστήματος ὄντος, πλησιάζοντος | τῷ σφιγκτήρι ἀΦῆ ὑποπίπτοντος· συνεργεῖν δὲ συρρήξει, ἐν βάθει γινομένη· πρὸς δὲ τὴν χειρουργίαν ὑπίτιος σχηματιζέσθω ὁ πάσχων ἐπὶ παρέδρῃ δίφρου πρὸς αὐγῇ λαμπρᾷ, συνημμένα ἔχων τὰ σκέλη πρὸς τὸ ἐπιγαστριον, καὶ τοὺς μηρούς διεστῶτας ἀπ' ἀλλήλων· ἔστωσαν δὲ καὶ οἱ πῆχεις ταῖς ἰγνύαις ὑποβεβλημένοι, καὶ πρὸς τὸν τένοντα διὰ τῶν ἀνισοτόνων βρόχων ἀνελημμένοι· μετὰ τὸν δεδηλωμένον σχηματισμὸν, τοῖς δακτύλοις ἐκτρεπέσθωσαν αἱ πρόχειροι τοῦ δακτυλίου στολίδες· εἶτα ἄγκιστρον τῷ λιχανῷ δακτύλῳ συγκαθιέσθω εἰς τὸ τῆς ἕδρας βάθος, καὶ καταπειρέσθω εἰς τὸν ὄγκον, δι' οὗ ἀποτεινόμενον τὸ ἀπόστημα ἐκτρεπέσθω, καὶ ἐπιδιαιρέσθω παχέων ὄντων τῶν ἐπικειμένων τῷ πύω σωμάτων.

2. Ταῦτα τὰ ἔργα δύναται γενέσθαι ἐπὶ παιδικῶν καὶ γυναικείων σωμάτων τῶν ἀπαλοσυγκρίτων· ἐπὶ δὲ νέων περὶ σκλήρων ἀκμαζόντων ἀνθρώπων, ἐὰν μὴ δύνηται ἐκτρεπέσθαι ἡ ἕδρα, συγκαθιέσθω εἰς τὸ βάθος τῷ λιχανῷ δακτύλῳ ἢ τοῦ ἡμισπαθίῃς ἀκμῇ, ἢ στενῆς κατιάδος (1)

(1) Ὅτι κατιάδα φλεβότομον καλεῖ ἐν τῷ ἰα τῶν χειρ-

VII. (VI.) DE INTESTINI RECTI ABSCESSU
 UTI ET ALIARUM PARTIUM.

1. Intestino recto abscedente, modo quidem manu curare oportet, modo autem rupturae internae favere. Manu autem curandum est, cum in locis aptis adsit abscessus prope sphincterem attingique possit. Favendum vero rupturae, cum profunde situs sit; ad curam manualementem autem supinus collocetur aegrotus in parva sella ad lucem claram, cruribus versus epigastrium colligatis et femoribus a se invicem distantibus; maneant et cubiti poplitibus subjecti et versus cervicem laqueis inaequaliter tensis attollantur; delineatam positionem cum adsumserit aegrotus, digitis producantur proximae ani plicae; dein uncus digito indice fundo ani imponatur et tumori infigatur, ut illius opeensus abscessus protrahatur et incisio fiat crassa cum sint corpora puri imposita.

2. Hae operationes fieri possunt in infantilibus et muliebribus corporibus quibus mollis est structura; in juvenilibus vero rigiditate pollentibus hominibus, si nequeat protrahi podex, fundo imponatur ope digiti indicis semispatulae cuspis vel tenuis catiadis (1) lamina; et ope cuspidis ab

(1) Quoniam instrumentum ad venam secundam *κατιάδα*

ἔλασμα· καὶ διὰ τῆς ἀκμῆς ἔσωθεν ἔξω ἀγομένης
 διαιρείσθω ὅλον τὸ ἀποστήμα· μετὰ δὲ τὴν τοῦ
 πύε ἐκκρισιν λημνίσκῳ καθεθέντι, ἀναπληρούσθω
 ὁ τοῦ ἀποστήματος κόλπος, καὶ τὰ ἄλλα τὰ
 ἀκόλουθα γιγνέσθω τῇ δὲ τρίτῃ καθεξέσθω εἰς
 λεκάνην πεπληρωμένην ὕδατος θερμοῦ, καὶ προσ-
 αντλείσθω μετὰ περιχύσεως ἑλαίου, καὶ θερα-
 πευέσθω λημνίσκῳ πυοποιῶ Φαρμάκῳ κεχρημέ-
 νῳ, πάντων καὶ τῶν ἄλλων ἀκολουθῶς γιγνομέ-
 νων· μετὰ δὲ τὴν πύωσιν ἢ ἔλκωσις καθαιρέσθω
 μέλιτι ἢ ἄλλῳ τινὶ Φαρμάκῳ καὶ ἐπουλούσθω
 τῇ διὰ καδμείας· οἷωθε δὲ πριαπίσκον περιπλάσ-
 σειν τῷ Φαρμάκῳ καὶ εἰς τὴν ἕδραν ἐντιθέσθαι
 σημεῖα δ' ἐστὶ τῆς ἐπελώσεως ἀνωδυμία, καὶ ὅταν
 p. 23. μηκέτι πύον ἐκκρίνηται. ||

3. Τοῦ δὲ ἀποστήματος ἐν τῷ βάθει γεγενη-
 μένου, καὶ τῇ ἀφῆ μὴ ὑποπίπτοντος, συνεργεῖν
 δεῖ τῇ ῥήξει, τοῖς δρυμυτέροις κλυσμοῖς, δι' ἀφε-
 ψύματος ὑσώπου ὀριγάνου μετὰ ἰσχάδων, καὶ
 τῆς ὀσφύος ἅμα καταπλασσομένης μετὰ τὴν σύρ-
 ῥηξιν· κατ' ἀρχὰς μὲν ἐγκλύζειν κρατέστερον τὸ
 μελίκρατον· ὕστερον δὲ τὸ τοῦ Φαρμάκου ἢ τῶν
 ῥόδων ἀφέψημα· εἰ δὲ (1) ἐν τῷ διαφράγματι τῶν

οιουμένων· κεφαλῆν περὶ φλεβοτομίας, καὶ τὴν ἀκμὴν
 τῆς κατιάδος κόρακα· εἶπε γὰρ ἐν ἐκείνοις ὅσα ὀφείλει γί-
 νεσθαι πρὸς τὴν παρασκευὴν τοῦ φλεβοτομουμένου ἐπά-
 γειν· μετὰ δὲ ταῦτα τῷ κόρακι τῆς κατιάδος διαιρείσθω
 ἢ μᾶλλον διογκωμένη φλέψ· ὁ μόντος Ρουφός ἐν τῷ δια-
 τρίβῳ κατ' ἰτρείους μονοβίβλῳ δξινβελές καλεῖ τὸ φλεβο-
 τομον.

(1) Ἀπὸ τοῦ γ τῶν χειρουργουμένων· κεφάλαιον περὶ
 φλεγμονῆς διαφράγματος τῶν μυζωτήρων.

interna parte extrorsum tractae dissecetur totus abscessus; post puris effluvium autem linamento oblongo imposito impleatur abscessus cavum et cetera fiant uti decet; tertio autem die imponatur aegrotus in pelvim aqua calida repletam et foveatur adfuso oleo et curetur linamento oblongo remedio suppurationi favente illito, omnia alia dum fiant uti convenit; post suppurationem autem ulceratio depuretur melle vel alio quodam remedio et cicatrix inducatur emplastro ex cadmia; solent et lignum oblongum illinere medicamento et podici imponere; cicatricem autem induci indicant et doloris defectus et ubi non amplius pus excernitur.

3. Abscessus autem profunde positus cum sit neque attingi possit, favere oportet rupturae acrioribus clysmatibus ex decocto hyssopi, origani cum caricis, dum simul coxa illinitur post rupturam; initio quidem melius est aquam mulsam injicere; dein autem clyisma ex his medicamentis vel decoctum rosarum; si autem in septo narium parvus abscessus oriatur, incisio fiat et dein exstir-

vocat in libro XI chirurgicorum capite de venaesectione et cuspidem hujus instrumenti corvum; narrat enim in illis quaenam fieri debeant ut paratus sit ille qui venam secabit; posthac apice catiadis secetur magis tumens vena; Rufus quidem in libro unico cui titulus est: disputationes de officina medici: acutam cuspidem habens dicit instrumentum ad venas secandas.

μυξωτῆρων ἀποστημάτιον γένοιτο, διαιρείσθω, καὶ τότε ἔκτεμνέσθω· ἔπειτα ἂν μὲν κατὰ φύσιν ἔχη ὁ χόνδρος, ἑάσθω· λελιπασμένος δὲ περιτεμνέσθω· καὶ τότε οἱ ἔλλυχνιωτοὶ μῶτοι εἰς τοὺς μυξωτῆρας ἐντιθέσθωσαν· εἴτ' ἕξωθεν ὄλη τῇ ῥινὴ ἐλαιοβραχῆς ἔριον ἐντιθέσθω, συνανακεκομμένης λιβανωτοῦ μάννης· ταῖς δ' ἔξῃς ἡμέραις πυριάσθω, καὶ τὸ ἐλκῦδριον θεραπευέσθω.

4. Ἐν δὲ (1) τοῖς παρισθμίσις ἀποστήματος συστάντος, διελεῖν χρὴ διαστείλαντα τὸ στόμα τῷ στοματοδιαστολεῖ, ἢ σφηνάριον πρίνινον τάξαντα μεταξὺ τῶν μύλων, καὶ τὴν γλῶσσαν καταστείλαντα σπαθομήλη ἢ τῷ γλωσσοκατόχῳ· εἰ δὲ ἐν τῷ ὄσχεφ, ἂν μὲν ἢ παχέα (2) τὰ περιέχοντα τὸ ὑγρὸν σώματα, τοῖς κατὰ ἀπλοτομίαν ἔργοις χρῆσόμεθα πρὸς τὸ τοῦ ἀποστήματος μέγεθος· ἢ μιᾶ διαιρέσει ἢ δυσὶν ἢ τρισὶν ἀρκούμενοι, λημνίσκου τε διεκβολῆ χρῶμενοι καὶ τῇ λοιπῇ διαμοτώσει· λελεπτοποιημένων δὲ τῶν σωμάτων τὴν ἔκτομὴν αὐτῶν δοκιμάσωμεν.

(1) Ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ κεφαλαίου περὶ τῆς ἐν τοῖς παρισθμίσις φλεγμονῆς.

(2) Ἀπὸ τοῦ ε τῶν χειρουργουμένων κεφάλαιον περὶ τῆς τοῦ ὄσχεου φλεγμονῆς.

petur; deinceps quidem si sana est cartilago, sibi relinquatur; pinguedine vero cum tecta sit, circumcidatur; et tum linamenta carpta ad formam funalis convoluta naribus imponantur; dein exterius toti naso imponatur lana oleo madida simul impleta mica turis comminuta; sequentibus diebus fovéatur et ulcusculum sanetur.

4. In tonsillis autem si oriatur abscessus, incisuram facere oportet apertum tenentem os ope instrumenti ad id facti vel parvum cuneum iligneum ponentem inter dentes molares et linguam deprimentem ope specilli lati vel singularis instrumenti ad id facti; cum autem in scroto, si crassa quidem sint corpora humorem circumdantia eandem adhibebimus agendi rationem ac in simplici incisione; pro abscessus magnitudine vel una incisura vel duabus vel tribus contenti, lineamento oblongo imposito utentes uti et linamentis carptis; tenuia autem cum facta sint corpora; eorum excisionem probemus.

VIII. (VII.) Ἐκ τῶν Ῥούφου περὶ βεβῶνος.

ρ. 30. Βεβῶν ὁ μὲν ἐπὶ ταῖς τυχοῦσαις αἰτίαις Φα-
νεραῖς πρὸς τράχηλον καὶ μασχάλης καὶ μηροῦς
ἀνιστάμενος ἄνευ τοῦ πυρετοῦ καὶ σὺν πυρετῷ
ἀνάγκη, δὲ τὸν ἐπὶ βεβῶνι πυρετὸν Φρικώδη εἶ-
ναι καὶ εἰ μὴδὲν ἄλλο συναίτιον ἤ, λύεσθαι ῥα-
δίως ἄνευ κινδύνου· περὶ τούτου Δημόκριτος Φησὶν
ὅτι μολίβδου (1) μετὰ Φοινικίᾳ περιεφθέντος ἢ
τὸ παράπαν ἀφλέγματος γίνεται ἢ πολλῶν δὴ
ρήξει· οἱ δὲ λοιμώδεις κλούμενοι βεβῶνες θανα-
τωδέστατοι καὶ ὀξύτατοι· οἱ μάλιστα περὶ Λιβύ-
ην καὶ Αἴγυπτον καὶ Συρίαν ὄρανται γιγνόμενοι·
ἧν μνημονεύκασιν οἱ περὶ τὸν Διονύσιον τὸν κυρ-
τόν (2). Διοσκορίδης δὲ καὶ Ποσειδώνιος πλείστα
διεληλύθατι ἐν τῷ περὶ τοῦ κάτ' αὐτοῦ γενο-
μένῳ λοιμῷ ἐν Λιβύῃ· παρακολοῦθον δὲ ἔφασαν
αὐτῷ πυρετὸν ὀξύν, καὶ ὀδύνην, καὶ σύστασιν
ὅλων τοῦ σώματος, καὶ παραφροσύνην, καὶ βε-
βῶνων ἐπανάστασιν μεγάλων τε καὶ σκληρῶν καὶ
ἀνεκπυήτων, οὐ μόνον ἐν τοῖς εἰθισμένοις τόποις
ἀλλὰ κατὰ ἰγνύας καὶ ἀγκῶνας· καὶ τοὶ ἐνταῦθα

(1) Ἐν τῷ ἕξ βιβλίῳ, κεφαλαίῳ Ῥούφου περὶ λιθιά-
σεως εὐρήσεις κοκκίῳ βάπτονσι τὰ φοινίκια.

(2) Ὁ Φίλων ἐν τῷ θ' περὶ βιβλιοθήκης κτήσεως καὶ
Ἐρμηπος (Ἐρμιππος) ἐν τῷ ε' περὶ τῶν ἐνδόξων ἀνδρῶν
ιατρῶν, καὶ ὁ Σωρανὸς ἐν ταῖς τῶν ιατρῶν διαδοχαῖς,
φασὶ ὅτι καὶ ὀξυτόνος εἴρηται κυρτός, ὡς φοξὸς διὰ σωμα-
τικὴν ἀσθένειαν· βαρυτόνος δὲ ὡς ἵππος πύργος, ἐπὶ ἐκ
μεσογαίου πόλεος τῆς Αἰγύπτου λεγομένης Κύρτου ὑπήρ-
χεν· ἢ ὡς φασὶ τινες διὰ τὸ ἀλίσκεσθαι τοὺς ἀντιλίγοντας
αὐτοῦ, ὅσπερ τοὺς ἰχθῦς ὑπὸ τῶν ἀλιευτικῶν κυρτῶν.

VIII. (VII.) EX RUFII LIBRO DE BUBONE.

Bubo quidem propter fortuitas causas in collo vel in axilla vel in femoribus conspicua fit et sine febre et cum febre; oportet autem febrem buboni accedentem comitari horripilationem; atque si nulla alia causa adsit, facile solvi sine periculo illam oportet; de illo Democritus (1) dicit ejus inflammationem annexo ei plumbo cum palmula vel omnino cessare vel multum sane emendari; pestilentes vero qui dicuntur bubones quam maxime letales sunt et acuti, qui maxime circa Libyam et Aegyptum et Syriam observantur; quos meminerunt aequales Dionysii gibberis (2). Dioscorides autem et Posidonius plurima de hac re enarrant libro de peste quae eorum aetate in Libya adfuit; illi autem accedere dixerunt febrem acutam, dolorem, perturbationem totius corporis et delirium et bubonum apparitionem magnorum et durorum qui in suppurationem non transiebant, non solum in solitis locis verum et in poplitibus et cubitis; quamvis illic omnino tales inflammationes non soleant

(1) In libro LXV, in capite Rufi de calculorum inventione: cocco tingunt palmulas.

(2) Philo in libro IX de bibliothecae acquisitione et Hermippus (Hermippus) in libro V de illustribus viris medicis et Soranus in medicorum successionibus dicunt illum et vocari *κέρτος* cum accentu acuto, quia facie erat distorta ob corporis debilitatem; cum accentu gravi autem uti *ἴππος πύργος*, cum ex urbe in media regione Aegypti Cyrtos dicta originem petierit; vel uti dicunt nonnulli quod ejus adversarii ab illo capiebantur uti pisces a nassis (*κέρτος*) piscatoriis.

μη πάντι γιγνομένων τῶν τοιούτων Φλεγμονῶν.
 τάχα δὲ καὶ τὸ παρὰ Ἱπποκράτους βιβλωνῶδες
 πάθος τὴν εἰρημένην διάθεσιν δηλοῖ γένοιτο δ' ἂν
 ποτε καὶ ἐν αἰδοίῳ ὁ τοιοῦτος βιββών, ὡσπερ καὶ
 τὸ ἔλκος τὸ λοιμῶδες, καὶ ὁ πυρετὸς δὲν λοιμώ-
 δη καλοῦσι τὸ πλείστον ἐπιδήμια τὰ τοιαῦτα
 p. 31. ἐστὶ, ὥστε κοινὰ εἶναι ἡλικιῶν καὶ φύσεων || ἐν
 τισὶν ὥραις ἐξαιρέτως ἀπαντῶντα· ἢ δ' ἱστορία
 πάντος τοῦ τοιοῦτε χρησίμη, ἵνα τὸν μὲν συν-
 ἦθη βιββῶνα θεραπεύωμεν, ὡς οὐδὲν δύσκολον
 ἔχοντα· τὸν δὲ λοιμώδη, μετὰ προαγορεύσεως
 καὶ προσοχῆς ἀκριβεστέρας.

IX. (VIII.) Περὶ τερμίνθου.

Εἶδος τί φύματος καὶ ἡ καλεμένη τέρμινθος
 ἐστὶν· ἀλλὰ τοῖς νυνὶ ἰατροῖς οὐ πάντι σύνηθες τὸ
 ὄνομα. Πραξαγόρας δὲ καὶ τὰ συμπύπτοντα αὐ-
 τῷ γράφει· ὡσαύτως δὲ καὶ ὁ μαθητὴς αὐτοῦ Ξε-
 νοφῶν· Φασὶ δὲ ἀνωτάτω μὲν ἐπικεῖσθαι τῷ ἔλ-
 κει Φλυκταῖναν μέλαιναν ὡς τὸ πολὺ. ἧς ἐκτραγεί-
 σης τὸ ὑποκάτω ὅμοιον ἀποσεσυρμένῳ εἶναι· τού-
 τε δὲ διαιρεθέντος πύον εὐρίσκεται· τάχα δὲ
 τέρμινθος ἐκλήθη διὰ τὸ ποικίλον τῆς χροιάς, ὅτι
 καὶ ὁ καρπὸς (1) τῆς τερμίνθου ποικίλος· εἶ γε ἡ
 μὲν Φλυκταῖνα μέλαινα, τὸ δὲ τῷ ἀποσύρματι
 ἔοικὸς ἐνερευθὲς· καὶ τὸ πύον ἡσυχῆ λευκόν· μέ-

(1) Οὕτω καὶ ὁ Γαληνὸς βοῖλεται ἐν τῷ περὶ χυμῶν
 Ἱπποκράτους τμήματι.

observari; fortasse autem buboniformis morbus Hippocratis constitutionem dictam indicat; adirit autem nonnumquam et in genitalibus talis bubo, uti et ulcus pestilens et febris quam pestilentem dicunt; plerumque epidemica talia sunt, ita ut communia sint omnibus aetatibus et constitutionibus in nonnullis anni temporibus praecipue occurrentia; inquisitio autem omnium hujus generis est utilis ut vulgarem quidem bubonem curemus, tamquam nihil periculosi habentem; pestilentem autem, cum praedictione et attentione accuratori.

IX. (VIII.) DE TERMINTHO.

Species quaedam tuberculi etiam est ita dictus terminthus; sed hujus aetatis medicis non valde usitatum est hoc nomen. Praxagoras autem et quae in illa accidunt describit; eodem modo et ejus discipulus Xenophon; dicit autem superne ulceri incumbere vesiculam nigram plerumque illaque abrasa fundum similem esse plagae desquamatae; hoc autem disrupto pus invenitur; fortasse autem terminthus dicitur ob variegatum colorem, quoniam et fructus terebinthini variegatus est (1); si quidem vesicula sit nigra, pars plagae desquamatae similis rubra; et pus fere album; memorat et Hippocrates in Epide-

(1) Eandem sententiam quoque profert Galenus in sectione de humoribus Hippocratis.

μνηται δὲ καὶ Ἰπποκράτης ἐν ἐπιδημιαῖς τοῦ ἔλκους, ὡς πιστὸν ἐν ποσὶ γεγενημένον· εἰ δὲ ποδῶν μόνων ἐστὶν, ἢ οἶόν τε καὶ ἄλλη γενέσθαι τοῦ σώματος, τοῦτο οὔτε ἐκεῖνος οὔτε ἄλλος τίς διωρίσατο.

X. (IX.) Ἐκ τῶν Διοκλέους περὶ φλυκταινίδων.

Τῶν δὲ Φλυκταινίδων τῶν ἀπὸ μῆδὲ μιᾶς προφάσεως ἔξωθεν ἀξιολόγη γινομένων, τὸ μὲν καλεῖται τέρμιθος, τὸ δὲ σταφυλὸν, τὸ δὲ ἐπινυκτίς· ἐστὶ δὲ ἢ μὲν τέρμιθος, Φλυκταινίδιον μικρὸν πελιδνόν· ἢ δὲ σταφυλὴ, μέλαινα· ἢ δ' ἐπινυκτίς, ὀρφνώδες· (1) ταχὺ πυούμενα πάντα.

XI. (X.) Ἐκ τῶν Ρούφου περὶ ἐπινυκτίδος (2).

Αἱ δὲ ἐπινυκτίδες ἐλκύδρια εἰσὶν ἀπὸ ταυτομάτου ἔξανθοῦντα, Φλυκταινοειδῆ, ὑπέρυθρα ὧν ἐκρηγνυμένων, ἰχώρ ὑφαιμος ἀπορρέει· ταῦτα μὲν ἡμέρας οὐ πᾶν ἐνοχλεῖ, νυκτός δὲ ἐπώδυνα ἐστὶ· διόπερ καὶ οὕτως ὠνομάσθη· καὶ ὀδύνα μείζους ἢ κατὰ τὸ μέγεθος τοῦ ἔλκους· ὁπὸν σιλφίω ὕδατι διεὶς ἐπιτίθει· ἀναξηραίνει καὶ οὐκ ἀναδάκνει· ἢ αἱματικὴν λίθον μεθ' ὕδατος τρίψας, ἐπιχρεῖ· ἔαν δὲ Φλεγμάνη, τρίψον μετὰ ὄνη ἢ κώρειον λεάνας, ἐπιτίθει.

(1) Ὄρφνώδες, σκοτινὸν λέγεται ἢ σκοτία.

(2) Ἀπὸ τοῦ περὶ τῶν ἐκτὸς παθῶν.

miis hoc ulcus tamquam in nonnullorum pedibus
occurrent; num vero in solis pedibus observetur an
etiam in aliis corporis partibus occurrere possit
neque ille neque alius quisquam definivit.

X. (IX.) *E DIOCLIS LIBRO DE PHLYCTAE-
NIDIBUS.*

Inter phlyctænidæ quæ sine ulla causa ex-
terna mentione digna occurrunt, alia quidem
vocatur terminthus, alia autem staphylon, alia
vero epinyctis; terminthus quidem phlyctænis
est parva livida; staphyle vero nigra; epinyctis
autem obscuri coloris (1) cito in suppurationem
convertens omnia.

XI. (X.) *E RUFII LIBRO DE EPINYCTIDE.*

Epinyctides sunt ulcuscula sponte efflorescen-
tia, pustulaeformia, subrubra, quibus ruptis
ichor sanguinolentus effluit; haec quidem per-
dium non multum gravant, noctu vero dolent;
unde et nomen petierunt; et dolores majores
sunt quam pro magnitudine ulceris expectan-
dum esset; succum laserpitii aqua dilutum im-
pone; exsiccatur et non mordet; vel lapidem he-
matiten cum aqua tritum inunge; si autem in-
flammatum, cum vino tere vel cicutam comminu-
tam impone.

(1) Ὀρφῶδες tenebricosus. Ὀρφρη saltem dicuntur tenebrae.

XII. (XI.) Περὶ φύγεθρος (1).

p. 32. Καὶ τὸ Φύγεθρον ἐν τοῖς εἶδεσι τῶν Φυμάτων
 τίθενται οἱ περὶ τὸν Πραξαγόραν· Φασὶ δὲ συν-
 εδρεύειν αὐτῷ ἔρευθος μετὰ οἰδήματος· ὥσπερ
 καὶ τῷ Φύματι καὶ οὐκ ἔλασσον ἔμπυον τοῦ Φύ-
 ματος γίνεσθαι· ἐπὶ δὲ τοῦ δέρματος Φλυκτανίαν
 ἀνίστασθαι ὁμοίαν τοῖς πυρिकाύτοις· προστίθησι
 δὲ ὅτι ὁ μολύδικος ὅτι οὐδὲ πεπαίνεται ῥαδίως,
 ἀλλὰ μόγις, καὶ ὅτι χρονίζει, καὶ ὅτι κακόηθες
 ποτὲ γίνεται, καὶ μᾶλλον παιδίσι· τὸ δὲ περὶ
 βουβῶνας συνίστασθαι τὸ ἔλκος, πάντες ὁμοίως
 λέγουσιν.

XIII. (XII.) Ἐκ τῶν Ἀντύλλου περὶ συρίγγων (2).

1. Αἱ σύριγγες γίνονται τὰ πολλὰ ἐξ ἀπο-
 στημάτων μὴ κατὰ τρόπον θεραπευθέντων· διαφο-
 ραὶ δ' αὐτῶν εἰσὶν αἱ γε μείζους καὶ ἐπιστροφῆς

(1) Ἀπὸ τοῦ περὶ τῶν ἐκτὸς παθῶν. Ὁ Ἡλιόδωρος
 ἐν τρίτῳ χειρουργουμένων κεφαλαίῳ περὶ τῶν κατὰ τοὺς
 βουβῶνας ἀποστημάτων φησὶν, ὡς οἱ μὲν φύγεθρα, οἱ δὲ
 φύματα προσηγόρευσαν· φύγεθρα μὲν ὡσανεὶ φύματα· ἐρυ-
 θρὰ φύματα δὲ διὰ τὴν τῶν ἀλγημάτων ἐπίτασιν, ὁμοίον
 τι φερέει πασχόντων τῶν ἀνθρώπων.

(2) Ἐκ τῶν περὶ συρίγγων κεφαλαίων. Φησὶν ὁ Ἀντύλ-
 λος ὡς κατὰ μεταφορὰν ὀνομάσθαι ἀπὸ τῶν συρίγγων τῶν
 ἐκ τοῦ καλάμου πεπονημένων· εὐρυχωρία γὰρ τις ἐστὶν πα-
 ραπλησία ταῖς ἐν τοῖς καλάμοις κοιλότησι· ἔστι δὲ κόλπος
 τετυλωμένος, καὶ μὴ δυνάμενος χωρὶς χειρουργίας ἢ φαρ-
 μακίας πεθεῖν.

XII. (XI.) *DE PHYGETHRO* (1).

Phygethrum quoque ad species tuberculorum recensent Praxagorae discipuli; dicunt autem in illo ruborem conjunctum esse cum tumore, quemadmodum et in tuberculo; et aequè pus illud continere ac tuberculum; in cute autem vesiculam oriri similem illis quae in partibus igne adustis occurrunt; addit autem illud sordidam habere indolem neque facile maturescere sed aegre illudque diutius durare malamque nonnunquam acquirere indolem, magis etiã in infantibus; in ambitu autem inguinis ulcus oriri omnes uno ore fatentur.

XIII. (XII.) *EX LIBRO ANTYLLI DE FISTULIS* (2.)

1. **F**istulae oriuntur plerumque ex abscessibus non rite tractatis; differentiae autem earum maximae et mentione dignae sunt secundum figu-

(1) Ex libro de morbis externis. Heliodorus in tertio chirurgicorum capite de abscessibus in inguine dicit alios quidem illos *φύγεθρα* vocare, alios vero *φύματα*; *φύγεθρα* quidem eadem sunt ac *φύματα*; rubra autem sunt *φύματα* sub dolorum incrementa, dum aliquid tostioni simile patiuntur homines.

(2) E capitibus de fistulis. Dicit Antyllus metaphorice illos sic vocari a fistulis ex arundine confectis; spatium enim quoddam adest cavitati in arundinibus simile; est autem sinus callo circumdatus, qui absque chirurgia vel medicamenti evanescere non potest.

ἄξια παρὰ τὸ σχῆμα, παρὰ τὸν τόπον, παρὰ τὸ εἶδος τοῦ σώματος· παρὰ μὲν τὸ σχῆμα, ἔπει αἱ μὲν αὐτῶν εἰσὶν εὐθυτενεῖς. αἱ δὲ σκολιαὶ καὶ τῶν εὐθυτενῶν· αἱ μὲν, κυκλοτερῆ περιειλήφασιν πόρον· αἱ δὲ, ὑπόπλατυν καὶ τῶν σκολιῶν, αἱ μὲν μίαν καμπὴν ἔχουσιν· αἱ δὲ, πλείους· παρὰ δὲ τὸν τόπον, ἔπει αἱ μὲν ἐν κεφαλῇ, αἱ δ' ἐν τραχήλῳ, αἱ δ' ἐν μασχάλαις ἢ ἐν ἄλλῳ τινὶ μέρει τοῦ σώματος γίνονται· παρὰ δὲ τὸ εἶδος, ἔπει αἱ μὲν εἰς ὀστέα τὴν ἀποτελευτήν ποιοῦνται· αἱ δὲ καταλήγουσιν εἰς μῦν ἢ νεῦρον ἢ φλέβα ἢ ἀρτηρίαν, ἢ ἕτερόν τι τῶν ἀπλῶν ἢ τῶν συνθέτων.

2. Σημειωσόμεθα δὲ τὰς μὲν εἰς ὄστοῦν ἀποληγούσας, ἐκ τῆς ἀντιτυπίας καθιέντες πλατυμήλεις, ἐπὶ τῶν εὐρυτέρων· ἐπὶ δὲ τῶν στενοχώρων, μηλωτίδα ἀντιληψόμεθα γὰρ σκληροῦ σώματος ἀντιπίπτοντος καὶ ὀστώδους· πρὸς δὲ καὶ ἔχει τινὸς ὁποῖος ἂν γένοιτο, συγκρούοντος ὄστοῦ πρὸς χαλκόν· καὶ οὐ μόνον γε διὰ τῆς μηλώσεως γνωσόμεθα τὸ εἰς ὄστοῦν περατοῦσθαι τὴν σύριγγα, ἀλλὰ καὶ τὸ ἀδιάφθορον εἶναι τὸ ὄστοῦν ἢ διεφθορέναι, καταληψόμεθα παράγοντες μὲν γὰρ τὴν μηλωτίδα πανταχοῦ, ἂν μὲν αἰσθανώμεθα πάντοθεν ἀπολισθαίνεσθαι αὐτὴν, ὥσπερ ἀπὸ τοῦ λείψ τινὸς σώματος, ἐροῦμεν ἀδιάφθορον εἶναι τὸ ὄστοῦν· ἂν δὲ κατὰ τὴν παραγωγὴν ἢ μηλωτὶς ἐνίσχηται τισὶ μέρεσιν, ἀνωμαλίας καὶ τραχύτητας ὑποσημαίνεσθαι, διεφθορέναι τὸ ὄστοῦν ἀπο-

p. 33. Φανόμεθα· ἐπὶ μὲν τοῖς τῶν εὐρυστόμων || συρίγγων τολλάκις καὶ τῇ ὄψει ὑποπίπτει τὸ ὄστοῦν,

ram, secundum locum et secundum habitum parietum canalis; secundum figuram quidem; cum aliae quidem inter illas sint rectae; aliae vero tortuosae; et inter rectas aliae quidem circularem cingunt canalem; aliae vero latiusculum; et inter tortuosas, aliae quidem unam curvaturam habent; aliae vero plures; secundum locum autem, cum aliae quidem in capite, aliae autem in collo, aliae vero in axilla vel in alia quadam parte corporis adsint; secundum habitum vero, cum aliae quidem ossibus terminantur; aliae vero desinunt in musculum vel nervum vel venam vel arteriam, vel aliud quid simplicium aut compositarum partium.

2. Certi autem fitemus illas osse terminari ex renixu immissi specilli, in latioribus; in angustioribus autem, auriscalpii; percipiemus enim durum corpus resistere osseumque; praeterea et sonum quemdam qualis fiet osse et aere inter se collisis; neque specilli introductione tantummodo cognoscemus fistulam ad os penetrare, verum et discemus, os esse incorruptum vel corruptum; admoventes enim auriscalpium quaqua versus, si animadvertamus quidem illud undique delabi, tamquam a laevi quodam corpore, dicemus os esse incorruptum; si vero admotum specillum retineatur nonnullis partibus, indicans inaequalitatem asperitatemque, corruptum esse os declarabimus; in fistulis quidem ampla apertura instructis saepe et visui se offert os, ita ut nulla opus sit specilli introducti-

ὥστε μηδὲ μηλώσεως δεῖσθαι· εἰ δὲ σκολιὰ τυγ-
χάνει, καμπὴν μίαν ἢ πλείους ἔχουσα ἢ σύριγξ,
ὥστε μὴ δύνασθαι παραδεύειν, μηλωτίδα μολυβ-
δίνην χρῆ ποιεῖν ἢ κασιτηρίνην· εὐκαμπῆς γὰρ
οὔσα ἢ τοιαύτη, βραδίως συσχηματίζεται ταῖς
σύριγξι· χρησόμεθα δὲ καὶ υἷα τριχί.

3. Εἰ δὲ μηδὲν τῶν τοιοῦτων κατασκευασμά-
των διὰ τὴν σκολιότητα ἢ σύριγξ παραδέχοιτο,
ἐξ αὐτοῦ τοῦ φερομένου ὑγροῦ τὴν εἰς ὄστον
ἀπόληξιν κατανοήσωμεν· ὡς ἐπίπαν γὰρ ἀπὸ τῶν
τοιοῦτων λεπτὸν καὶ ἐλαιῶδες τὸ ἐκκρινόμενον
ὑγρὸν ἐστίν· εἰ δὲ εἰς νεῦρον τὸ τέρμα * τῆς σύ-
ριγγος περαίνοιτο, πρῶτον μὲν ἐκ τῆς ὀδύνης ση-
μειωσόμεθα· νηκώδης γὰρ ἔσται καὶ νυγματώ-
δης, ἢ τε κίνησις ἢ ὑπὸ τοῦ νεύρου συντελεσμένη
χείρων καὶ δυσεργεστέρα· ἐν τε τῇ μηλώσει ψευ-
όμενον τὸ νεῦρον, αἰσθησιν δριμυτέραν καὶ ὀξυ-
τέραν παρέχεται· τὸ δὲ ὑγρὸν τὸ φερόμενον λεπ-
τὸν μὲν ἔσται παραπλησίως, ὡς καὶ ἀπὸ τῶν
ὄστων, ἀλλ' οὐκ ἐλαιῶδες οὐδὲ λιπαρόν, ἀλλ'
ἰχωρῶδες τὸ καὶ χολῶδες· τὰ δὲ αὐτὰ παρακο-
ληθῶν καὶ ταῖς εἰς μῦν καθηκούσαις σύριγξι· ἐπὶ
δὲ τῶν ἐν σαρκὶ τὴν ἀποπεράτωσιν ἔχόντων, τὸ
ὑγρὸν παχύτερον καὶ ἀργότερον εὐρίσκεται· εἰς
φλέβα δὲ τῆς σύριγγος κατεῤῥιζωμένης, τὰ αὐ-
τὰ σημεῖα παρακοληθῶν, ὅσα καὶ εἰς νεῦρον· πλὴν
ἀμυδρὰ πάντα καὶ τὰ τῶν ἀναλγημάτων· κίνη-
σις τὲ οὐδὲ μία ἐμποδισθήσεται· τὰ αὐτὰ καὶ εἰς
ἀρτηρίαν ἀπολύγοντα παρακοληθήσει· εἰ δὲ ἀνά-
βρωσις γένοιτο ὑπὸ τῆς σύριγγος, εἰ μὲν φλεβὸς,
αἷμα πολὺ καὶ παχὺ ἐνεχθήσεται· εἰ δ' ἀρτηρία

Γρ. τὸ τέ-
λος.

one; si vero tortuosa fistula unam habeat flexuram vel plures ita ut per illam transire non possit, auriscalpium plumbeum conficere oportet vel stanneum; facile enim cum flectitur tale, facile et fistulis sese accommodat; utemur autem et seta suilla.

3. Si autem nullum hujus generis instrumentum admittit fistula ob tortuosum tramitem ex ipso educto humore intelligemus ejus terminationem in os; in universum enim ab illis tenuis et oleosus est excretus humor; si ad nervum vero penetrat finis fistulae, primum quidem ex dolore illud cognoscemus; surdus enim est et pungens motusque qui a nervo perficitur est minor et difficilior; atque sub specilli introductione attactus nervus sensum acriorem et acutiorem praebet; humor autem eductus tenuis quidem est eodem modo ac ex ossibus, verum non oleosus nec pinguis sed ichorosus et biliosus; eadem comitantur et fistulas ad musculum devenientes; in illis vero quae carne terminantur, humor crassior et magis albidus invenitur; venae autem insidente fistula, eadem signa illam comitantur ac nervo praeter hebetudinem omnem et quae dolorem spectant; atque motus nullus impeditur; eadem et fistulam in arteriam desinentem comitabuntur; si autem erosio oriatur sub fistula, si venae quidem, sanguis multus et crassus efferetur; si vero arte-

ἀναβρωθείη, λεπτόν καὶ ξανθὸν μετὰ πνεύματος πολλοῦ καὶ συριγμοῦ.

XIV. (XIII.) Ἐκ τῶν Ἀντιλλῶν καὶ Ἡλιοδώρου
χειρουργῶν συρίγγων.

1. Εἰ μὲν τοι πλάγια εἶεν ὥστε ὑπ' αὐτὸ τὸ δέρμα τείνειν κατὰ μῆκος εὐθυτενῶς ἢ κατεσκολιωμένως· εἰ μὲν εὐρύστομοι τυγχάνοιεν, τὸν λιχανὸν καθέντες τῆς ἀριστερᾶς χειρὸς, καὶ ἐπάραντες τὸ δέρμα τέμνομεν παρὰ τὸν δάκτυλον ὥστε ἀπλοτομηθῆναι τὴν σύριγγα· κὰν μὲν ᾗ βραχεῖα, μία κάθεσις τοῦ δακτύλου ἐξαρκέσει· ἂν δ' ἐπιμήκης μετὰ τὸ τεμεῖν τοσοῦτον διάστημα | ὅποσον ὁ δάκτυλος ἐφικνεῖται, πάλιν ἐπικαθήσομεν αὐτὸν, καὶ πάλιν ἐπιτεμοῦμεν· τὸ δ' αὐτὸ ποιήσομεν ἐκ τρίτη, εἰ τοῦτο ἀπαιτοῖ τὸ μῆκος τῆς σύριγγος· μετὰ δὲ τὸ ἀπλοτομηθῆναι τοὺς τύλλας τοὺς αἰτίους τῆς συριγγώσεως, ἂν μὲν ὧσιν ἐπὶ πολλῆς, τοῖς ὄνυξιν ἀναξάναντες νεαροποιήσομεν τὸ ἔλκος· ἂν δὲ βελύτερον, προσαναξύσομεν ἀκμῆ σμιλίᾳ· ἂν δὲ μεγάλοι τὲ καὶ διὰ βάθος ὑποπίπτωσι, περιελοῦμεν ὅλας· ἔπειτα τῇ ἐξῆς ἀποθεραπείαν ὁμοίαν ποιησόμεθα, οἷαν καὶ ἐπὶ τῶν χειρουργηθέντων ἐλέγομεν.

2. Εἰ δὲ μετὰ τὴν ἀνάπτυξιν, τῆς σύριγγος εὐρυτέρας καθεστῶσης, ἀπαιωροῖτο τοῦ δέρματος, περιελοῦμεν τὰ ἀφεστῶτα τῆς συμφυοῦς σαρκὸς· ἐπὶ δὲ τῶν σφῆδρα στενοστόμων, εἰ μὴ παραδέ-

ria est corrosa, tenuis et flavus cum spiritu multo sibiloque.

XIV. (XIII.) *EX ANTYLLI ET HELIODORI CHIRURGORUM FISTULARUM LIBRIS.*

1. Si obliquae quidem sint, ita ut sub ipsam cutem tendant in longitudinem recte vel tortuose; si latam quidem habeant aperturam indicem imponentes digitum sinistrae manus et elevantes cutem secamus secundum digitum ita ut findatur fistula; atque si brevis quidem sit, digitum semel imponere sufficiet; si vero longa, postquam incidimus tantum spatium, quantum digitus attingit, rursus imponemus illum iterumque incisuram faciemus; idem faciemus tertia vice si illud postulat longitudo fistulae; post incisionem autem callum fistulae formationis causam, si superficialis quidem est unguibus radentes, recens reddemus ulcus; si vero profundior, insuper scalpemus apice scalpelli; si autem magnus profundissimusque occurrit, extirpabimus totum; dein subsequentem curam secundariam eandem faciemus quam etiam in manu tractatis diximus.

2. Si autem post aperturam, fistula latiori facta, illa dependeat a cute, extirpabimus partes recedentes a cohaerenti carne; in illis autem quae valde angustam habent aperturam, si digi-

χοιντο τὸν δάκτυλον τὸ πλατὺ μήλης καθήσομεν ἢ τὸν πυρίνα· τὰ δε ἄλλα ὁμοίως ποιήσομεν· πρόδηλον δὲ, καὶ ὁ ἐπὶ τῶν σκολιωμένων σύριγγων τρόπος τῆς χειρουργίας· καθεκάστην γὰρ καμπὴν ἀρξάμενοι ἀπὸ τῆς πρώτης, καθήσομεν τὸν δάκτυλον, ἢ τὸ πλατὺ τῆς μήλης· κάπειτα διελοῦμεν οὕτως· εἰ δὲ μὴ πλάγιον τὸ σχῆμα τῆς σύριγγος, ἀλλ' ἄντιον, τετέστιν εἰς βάθος τείνοι, περιελοῦμεν κατὰ κύκλον τὴν σύριγγα, τοσοῦτον περιγράφοντες τῆς κύκλω σαρκὸς, ὥστε τοὺς τύλας ὅλας ἐκκοπῆναι· εἰ δὲ τοιοῦτον εἴη τὸ βάθος ὥστε εἰς ὀστέον καταλήγειν, ἐκτυλώσομεν ὁμοίως· καὶ ἐὰν μὲν αὐτὸ μόνον γεγυμνωμένον ἢ τὸ ὄστουν, μετὰ τὴν περιαίρεσιν τῆς σαρκὸς ξύσομεν· ἐὰν δὲ λελιπασμένον ἢ ετεριθορισμένον ἢ ἄλλως πως διεφθαρμένον ὑποπίπτει, μέχρι σύριγγος ἐκκόψομεν.

3. Τὴν δὲ ἐκκοπὴν ἐπὶ μὲν τῶν μικρῶν ὀστέων διὰ μόνων τῶν τετραγώνων ἐκκοπέων καλεσμένων ποιησόμεθα, παραξέοντες τὸ ὄστουν οὐκ ἐξεπιπολλῆς τὸ ἐφθορὸς, ἀλλὰ μέχρι σύριγγος κατῖοντες, ἵνα σαρκὸς ἀναβλάστησις ἐκ τῆς σύριγγος γένηται· εἰ δέ τι τῶν μειζόνων ὀστέων, οἷον βραχίον ἢ μηρὸς ἢ πῆχυς ἢ κνήμη πεπονθὸς ὑποπίπτει, τρήσαντες τρυπάνη μέχρι σύριγγος, οὕτως τοῖς ἐκκοπεύσιν ἀναλαβοῦμεν τὰ μέσα τῶν περιτρή || σεων. εἰ δὲ μέχρι μυελοῦ συμβαίη πεπονθέναι τὸ ὄστουν, καὶ τὴν ἐκκοπὴν μέχρι μυελοῦ ποιησόμεθα· οὐκ αὐτὸ μόνον τὸ πεπονθὸς ἐκκοπέντες, προσπεριλαμβάνοντες δὲ καὶ τι τοῦ ἀπαθοῦς, εἰς τὸ ραδίαν τὴν μετ' αὐτοῦ σάρκω-

tum non admittunt, latam specilli partem immittemus vel capitulum; cetera autem eodem modo faciemus; perspicua autem quoque methodus qua manu sanantur fistulae tortuosae; cuique enim flexurae incipientes a prima imponemus digitum vel latam specilli partem; et dein sic incisionem faciemus; si vero non obliqua est figura fistulae, verum adversa, id est, si deorsum tendat illa, extirpabimus ad figuram circuli fistulam, tantum carnis circulo circumscribentes, quantum requiritur, ut totus callus excidatur; si autem tam profunda est, ut in os desinat, eodem modo callum excidemus; atque si ipsum os denudatum quidem solummodo sit, post extirpationem carnis scalpemus; si vero pinguedine sit tectum vel teredine affectum vel alio quodam modo corruptum, quo usque tendit fistula, excidemus.

3. Excisionem autem in parvis quidem ossibus solis scalpris quadratis dictis faciemus, non leviter perstringentes superficiem ossis corrupti sed quo usque penetrat fistula descendentes, ut carnis regeneratio ex fistula fiat; si vero majus quoddam os, uti brachium vel femur vel cubitus vel crus forte sit affectum, perforantes terebra quo usque tendit fistula sic scalpris tollemus partes medias inter foramina sitas; si vero accidit os usque ad medullam esse affectum excisionem quoque usque ad medullam faciemus; non solum ipsam morbosam partem excidentes, sed in-

σιν γενέσθαι· εἰ δὲ δι' ὅλη τὸ ὄστουν διανταίως πάθοι, χρὴ τὴν μεσότητα πᾶσαν ἀναιρεῖν.

4. Ὁ δὲ τῆς ἐκκοπῆς τρόπος τοίος δέ τις ἐστίν· ἐκκοπέα χρὴ τῶν στενῶν καὶ πάχος ἰκανὸν ἔχόντων, οἷοι εἰσὶν οἱ καλούμενοι γομφωτῆρες, ἐρείσαντας κατὰ τὴν μεσότητα τοῦ διεφθορότος ὄστου, ἰσχυρότερον ἐπικρούειν ἢ περ ἐν ταῖς ἄλλαις περιστάσεσιν, ἵνα καταβάς εἰς τὸ βάθος, διαλύσῃ τὴν συνέχειαν τοῦ ὄστου· καὶ ἂν μὲν εἰς ἐκκοπέας ἐξαρκέσῃ, τὰ ἐξῆς συντελεῖν· ἂν δὲ μὴ δύνηται ἀποκυλισθῆναι ὑπὸ ἐνός, καὶ δευτέρον παραληπτέον· κἄν δὲ ποτὲ, καὶ τρίτον· διακοπέντος δὲ τοῦ ὄστου, τὸ ἕτερον τῶν μερῶν αὐτοῦ κατὰ τὸ πέρασ τῶν ἀντεχόντων σωμάτων γυμνωτέον· καὶ μετὰ τοῦ γυμνωθῆναι τοσοῦτον, ὅσον παραλλάξαι προελοῦμεθα, δύο ληπτέον τελαμώνας στενοῦς * εὐτόνου· τοῦ μὲν οὖν ἐνός τὴν μεσότητα περιβλητέον περὶ ἄκρον τὸ ὄστουν πρὸς τὸ ἐπισπάσασθαι τὲ καὶ ἐξάγειν αὐτὸ τῆς σαρκὸς δύνασθαι· τοῦ δὲ ἐτέρου τὴν διπλόην τῆ σαρκὶ τοῦ βραχίονος περιθετέον πρὸς τὸ ἐπὶ θάτερα τείνειν· ἔπειτα μνηιγγαφύλακα ὑποβάλλοντες ἢ σπάθην τῶν ξυλίνων τούτων· ἢ καὶ τι ἕτερον ὁμοιοειδὲς τούτοις σῶμα κατ' ἐπικόπη (1) τούτων τινὸς πρίονι ἀποπρίσομεν πᾶν τὸ ἐφθορὸς τε καὶ ὑπερέχον ἔξω τῆς σαρκὸς τοῦ ὄστου· ἀκώλυτος γὰρ ὁμοῦ καὶ ἀβλαβὴς ἢ πρίσις ἔσται διὰ τὰς τῶν τελαμώνων

Γρ. λεπ-
τούς.

(1) Κατ' ἐπικόπου φασὶ δταν τι ὑποβληθῆ καὶ κατ' αὐτοῦ ἢ τομὴ γένηται.

super etiam aliquid sanæ partis comprehendentes, ut facilis sit hæc ratio carnis generatio; si autem in uniuersum per totam crassitudinem patiatur os, oportet mediam partem totam auferre.

4. Ratio autem excidendi talis quodammodo est; scalprum oportet tenuem et idoneam crassitatem habentem, quales sunt qui *compactores* dicuntur; defigentes in medio corrupto osse, validius impellere quam in aliis circumstantiis, ut ad fundum descendens soluat coherentiã ossis; atque si unus quidem scalper sufficit, quæ dein conveniunt simul facere; si vero nequeat ab uno extorqueri, adsumendus et secundus; atque si forte opus est, et tertius; perforato osse altera ejus pars in fine integumentorum illud retinentium denudanda; et postquam denudata est tanta pars quantam a statu sano aberrasse statuemus, duae fasciæ exiguæ firmæque sunt adhibendæ; alterius quidem media pars circumjicienda est intimo ossi, ut illud extrahere et e carne educere possimus, altera vero duplicata brachii carni est circumducenda, ut ad alteram partem trahatur; dein meningophylacem subjicientes vel spatham ex ligneis illis vel etiam aliud quoddam corpus ejusdem generis ac hæc ut fulcramento (1) illorum quodammodo inserviat, terebra serrata excidemus omne os corruptum et extra car-

(1) Κατ' ἐπιλόπῳν dicunt, quando aliquid subjicitur et in illo incisio fit.

περιβολὰς καὶ τὴν τῆς σπάθης ἢ τὴν τοῦ μη-
νιγγοφύλακος ὑποβολήν· οὔτε τῆς σαρκὸς ὑπὸ
τοῦ πρίονος ἐνοχλημένης, οἷα δὴ ὑπὸ τοῦ τε-
λαμώνος ἀφελκομένης· οὔτε τοῦ ὀστοῦ ἐγκρυπ-
τομένῃ τῇ σαρκί, ἅτε ἀνατεινομένη διὰ τῆς ἐτέ-
ρας ταινίας.

p. 36. 5. Ἀποκριθέντος δὲ τοῦ ἐτέρου μέρους, πά-
λιν ἐπὶ τὸ ἕτερον διαβατέον· καὶ τὸν αὐτὸν τρό-
πον καὶ ἐκεῖνου τὸ διεφθορὸς καὶ ἐψιλωμένον,
ἀπολυτέον· τὰ δ' αὐτὰ ποιητέον καὶ εἰ μὴ
διεφθορέναι τὸ ὀστέον τύχοι περιπλεῖσθαι· δὲ
πάντοθεν ὑπὸ τῆς σύριγγος· οὐδενὶ γὰρ τρόπῳ τὰ
κατὰ κύκλον περιπλεόμενα σαρκωθῆναι δυνήσεται·
διὸ καὶ ἐπὶ τούτων διακοπτέον πρότερον, καὶ
τὰ ὀστέα ἀποκυλιστέον (1)· εἶτα οὕτως πᾶν τὸ
περιπλεόμενον καὶ γεγυγνυμένον ἐκπριστέον· ἦν
δὲ ἢ σύριγξ μὴ εἰς μέσον τὸ μῆκος τοῦ ὀστοῦ
τύχοι καθήκει, ἀλλ' εἰς τὸ πέρασ, ὥστε λύσαι
τὸ ἄρθρον, πᾶν τὸ πρὸς τῷ ἄρθρῳ τοῦ ὀστοῦ
μέρος ἐκκοπτέον· εἰ δὲ ὅλον τὸ τοῦ βραχίονος
ὀστοῦν διαφθαρεῖν μελανθὲν ἢ λιπανθὲν ἢ τερηδο-
νισθὲν, ἀπλοτομήσαντες μεγάλην διαιρέσει, πᾶν
τὸ ὀστοῦν κομισόμεθα.

6. Εἰ δὲ εἰς μέσον ἄρθρον ἢ σύριγξ καθήκοι,
ὥστε ἐκατέρῃ ὀστοῦ τὸ πέρασ φθεῖραι καὶ λύσαι
τὴν σύνδεσιν, δυσσεργεστέρα μὲν ἤδη καὶ οὐ πά-
νυ τί εὐκατόρθωτος (2) ἢ χειρουργία· χρὴ δὲ

(1) Γρ. ἀποκυλιστέον.

(2) Γρ. δυσσεργεστέρα μὲν τὴν καὶ οὐ πάντῃ δυσκατόρ-
θωτος.

nem eminens; non impedita enim simul et innocua erit terebrae applicatio ob fascias circumjectas et meningophylacem subjectam; dum neque caro a terebra gravatur, quippe quae a fascia retrahitur, neque os sub carne latet, quippe quod extractum est ab altera fascia.

5. Ope terebrae autem sublata altera parte, rursus ad alteram transeundum; et eadem ratione quoque ejus corrupta et denudata pars solvenda, atque eadem facienda, etiamsi non corruptum esset os; verum undique fistula illud ambiret; nulla enim ratione quae in ambitu fistula circumdata sunt carne tegi poterunt; ideo et in illis dissecandum est prius et ossa extorquenda (1); dein omne circumdatum et denudatum terebra extirpandum; si fistula non ad mediam ossis longitudinem sed ad extremam perveniat, ita ut solvat articulum, tota ossis pars circa articulum est excidenda; si vero totum brachii os corruptum esset vel nigrefactum vel pinguefactum vel teredine affectum simplici magnaue sectione usi, totum os amputabimus.

6. Si autem ad medium articulum fistula deveniat, ita ut utriusque ossis extrema pars sit vitiata atque cohaerentia soluta, difficilior jam quidem neque omnino peractu facilis (2) est chirur-

(1) Gr. αποκαυλιστίον i. e. evellenda.

(2) Difficilior maneret neque omnino peractu difficilis.

ὁμοίως ἐγχειροῦντας ἑκατέρῃ τοῦ ὀστού τὸ πέρασ
τὸ ἐφθορὰς ἅπαν κομίσασθαι ἐπὶ μὲν τοῖ γε μη-
ροῦ κατὰ κοτύλην λελυμένου καὶ συνδιεφθορείας,
καὶ τῆς ἐν τῷ ἰσχύϊ κοτύλης, παραιτητέον τὴν
χειρουργίαν, διὰ τὸ μέγεθος τῶν σωμάτων πα-
ραιτητέον δὲ καὶ εἰ εἰς τινα τῶν τοῦ νωτιαίου
σπονδύλων ἢ σύριγγα καθήκοι, φθείρασαι τὸν σπόν-
δυλον· εἰ δὲ εἰς πλευρὰν, οὕτω ποιήσομεν ὡς ἐν
τοῖς περὶ ἀποστημάτων εἰρήκαμεν (1).
7. Ὅταν δ' ἐν τῷ πῆχει συστή, τὰ αὐτὰ
γινέσθω τοῖς ἐπὶ βραχίονος· ἀλλ' ὁ μὲν βραχί-
ων μόνουσιδὲς ὀστέον ἔχει· ὁ δὲ πῆχυς διζυγῆς
ἐστὶ μέσης οὖν τῶν δυοῖν ὀστέων τῆς ὑποφθορᾶς
οὐσης, ἀνάγκη ἔχει ὁ ἐνέργων τὸ ἕτερον ὀστέ-
ον ἐκκόψαι· ἐκκόπτεσθαι δὲ τὸ λεπτότερον, ἐὰν
μὲν κάτω γένηται πρὸς καρπὸν ὑποφθορὰ τοῦ πῆ-
χεως· ἐὰν δὲ ἄνω, πρὸς ἀγκῶνι τὸ τῆς κερκίδος
ἀντιθέτως γὰρ ἔχει τὰ τοῦ πῆχεως ὀστά· εἰ
δὲ (2) εἰς μακχάλην καθήκοι, καὶ δέος εἶν μή-
πως ἐν τῇ περιαιρέσει ἦν ἡξιούμεν ἐπὶ τῶν ἀντί-
ων συρίγγων παραλαμβάνειν, ἀρτηρίαι τῶν εὐ-
ρώστων ἢ φλέβες ἢ καὶ νεῦρα ὑποπέσωσι, τῆς
μὲν περιαιρέσεως ἀποστησόμεθα· πλὴν εἰ μὴ τις
ἐθέλοι τὴν ἐπιφάνειαν μόνην περικόπτειν, καθ-
ήσομεν || δὲ τι τῶν ἐκτύλωτικῶν Φαρμάκων, ἐν
ἢ χρεία τῆς περιαιρέσεως ὑπαντήσῃ.

p. 37.

(1) Ἀπὸ τοῦ γ' τῶν Ἡλιοδώρου χειρουργουμένων, κε-
φάλαιον περὶ τῶν κατὰ τὸν πῆχυν παθῶν.

(2) Ἀπὸ τοῦ α' Ἀντίλλου, κεφάλαιον περὶ συρίγγων.

8. Τὰ δὲ αὐτὰ ποιητέον καὶ ἦν κατὰ βεβῶ-
 νος ἢ τραχήλου ἢ σύριγγς ὑποπίπτῃ καὶ μὲν τοὶ
 κἂν εἰς ὄστουν ἐνερείδοι, δέοι δὲ ἐκκόπτειν τὸ
 ὄστουν, ἀγγεῖα δὲ ἢ νεῦρα ἐμπελάζοι τινὰ, οὐ
 πρότερον τὴν ἐκκοπὴν ποιητέον, πρὶν διαπυῆσαι
 περιαιρεθεῖσαν τὴν σύριγγα· μετὰ γὰρ τὴν δια-
 πύησιν, καὶ ἀναίμακτος καὶ ἀκίνδυνος ἡ ἐκκοπὴ
 τῶν ὀστέων γίνεται· εἰ δὲ μεταξὺ ὠμοπλάτης καὶ
 τοῦ ὑπ' αὐτῇ σωμαίων ἢ σύριγγς πλάγεια γέ-
 νοιτο, τῶν ἀρχαίων ἀπηγορευκότων τὴν θερα-
 πείαν ἡμεῖς ἐγχειροῦμεν τόνδε τὸν τρόπον· κα-
 θίβωμεν διὰ τοῦ στομίου τῆς σύριγγος πλατυμή-
 λης, ἐφ' ὅσον οἶόν τε προβῆναι αὐτὴν· ἔπειτα
 καθ' ἃ μέρη ὁ πυρὴν πλάγιος, πρὸς ἅπαντα
 στοχαζόμενοι καὶ ταῦτα χιεζοῦμεν τὰ ἐστορι-
 σμένα σώματα τῆς ὠμοπλάτης· καὶ εἰ μὲν ἀναί-
 μακτος ὁ χιεσμὸς γένοιτο, ἐκκόπομεν τὸ κατ'
 αὐτὸ μέρος τῆς ὠμοπλάτης· ἐκκόψαντες γὰρ ἐν-
 τευξόμεθα τῷ πυρὴν τῆς μήλης· καὶ οὕτως ἀν-
 ακολουθεῖντες ἐκτυλώσομεν τὴν σύριγγα· εἰ δὲ
 ὑπὸ αἰμορραγίας ἐπὶ τῷ χιεσμῷ γενομένης, ἐμ-
 ποδισθεῖν παραυτίκα ἐκκοπῆναι ἢ ὠμοπλάτη, δεῖ
 τὴν διαπύησιν περιμείναντας, οὕτως ἐκκόπτειν.

9. Τὰς δὲ εἰς τὸ ἄρθρον τῆς γένυος ἀποτε-
 λευτώσας ἀπαγορεύειν ἄξιον· ἢ γὰρ γειννίαισι
 τῶν τε μασσητήρων καὶ τῶν κροταφιδῶν μυῶν,
 οὐδαμῶς ἀκίνδυνον τὴν χειρουργίαν ὑπογράφει· τὰ
 δὲ κάτω μέρη τῆς γένυος ὑπὸ σύριγγος φθαρέν-
 τα εὐθεράπευτα· ὁ δὲ τρόπος τῆς ἐγχειρήσεως,
 ὁ αὐτὸς τῷ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὀστέων εἰρημένῳ·
 εἰ δὲ κατὰ τὴν ὑπερώαν ἐκ τῶν ἐνδοθεν μερῶν

8. Eadem autem et facienda, si in inguine vel in collo fistula occurrat; atque si ossi quidem innitatur oporteatque excidere os et vasa aut nervi quaedam sint in propinquo, non prius excisio est perficienda quam suppuratio orta sit in circumcisa fistula; post suppurationem enim et sine sanguinis effusione et sine periculo fit excisio ossium; si autem inter scapulam eique supposita corpora fistula adsit obliqua, antiquis sanationem negantibus, nos manus admovemus sequenti ratione; imponimus per fistulae aperturam specillum latum quo usque progredi potest illa; dein in illis partibus versus quas capitulum specilli tendit, omnia spectantes, in illis etiam incisura decussata findemus corpora scapulae imposita; atque si cruenta quidem non sit incisura, excidimus suppositam scapulae partem; excidentes enim incidemus in capitulum specilli, atque sic quae dein conveniunt facientes, callum delebimus fistulae; si autem sanguinis effusione sub incisione superveniente impediatur quominus statim excidatur scapula, oportet suppurationem expectantes, tunc demum excidere.

9. In articulum autem maxillae desinentes dignae sunt ut sanatio recusetur; vicinitas enim musculorum maseterum et temporalium haudquam periculi expertem praebet curationem; inferiores autem maxillae partes a fistula corruptae facile curantur; ratio autem agendi eadem est quam in aliis ossibus memoravimus; si autem in palato ab internis partibus orta fistula corrupe-

συστάσα ἢ σύριγξ φθείρει τὸ ὄστουν, εἰ μὲν διὰ πάχους ἐκ τῶν ἕξωθεν μερῶν καὶ τὰ μῆλα χιάσαντες οὕτως ἐκκόψομεν τὸ ὄστέον· εἰ δὲ μὴ πᾶν φθαρείη τὸ ὄστουν, μόνη δὲ ἢ ἔνδοθεν ἐπιφάνεια, τὸ μὲν ἐκκόπτειν ἀνεπιτήδειον. οὔτε γὰρ ὄλον αἰρεῖν ἐκεῖνο οὐ μέρος ὀλίγον πέπονθε, εὐλογον· οὔτε αὐτὸ το πεπονθὸς ἐκκόπτειν, δυνατόν· πῶς γὰρ ἂν τις διὰ τοῦ στόματος ποιοῖτο τὴν ἐκκοπὴν;

p. 38. 10. Χρὴ τοίνυν ἐκ τῶν ἔνδοθεν μερῶν περι-
 λόντας τὴν σάρκα καὶ γυμνώσαντας τὸ πεπον-
 θὸς ὄστουν καίειν, ὅπως ἀποστῆ λεπὴ καίειν δὲ
 | τὸν τρόπον τοῦτον χαλκοῦν αὐλίσκον κατασκευ-
 ασθαι χρὴ παραπλήσιον κατὰ τὴν κοιλότητα
 τοῖς καλαμίσκοις καλεμένοις τετρήσθω διανταίῳ
 τρήματι, καὶ μὴ προσκείσθω πυθμὴν· ἐχέτω δὲ
 καὶ καμπὴν ὁ αὐλίσκος μὴ γαμμοειδῆ· τὸ γὰρ
 τοιοῦτο σχῆμα πρὸς τὴν χρεῖαν ἄθετον· ἀλλὰ
 μνηοειδῶς πᾶς ἐπινενεύεσθω πρὸς τὸ ἐντιθεμένῃ
 τῷ στόματι τὸ στομίον αὐτοῦ ἐνερείδειν εἰς τὴν
 ὑπερώαν ἄνω· μῆκος δὲ τοῦ αὐλίσκου τοσοῦτον
 ὥστε τοῦ ἑτέρου πέρατος ἐνερείδοντος εἰς τὸ πε-
 πονθὸς μέρος τῆς ὑπερώας, τὸ ἕξωθεν τῶν ὀδόντων
 ὑπερέχειν δακτύλοις τρισὶ· ἔπειτα καυτήριον κα-
 τασκευαστέον ὁμοίωσχημον τῷ αὐλίσκῳ, πρὸς τὸ
 διοδεύειν δύνασθαι δι' αὐτοῦ· κατὰ δὲ τὸ ἄκρον
 τὸ καυτήριον μὴ πυρῆνα ἐχέτω, ἀλλὰ βάσιν ἐπί-
 πεδον ἐξ ἀποτομῆς· ἐπὶ τῆς χρεῖας οὖν ἐνθετέον
 τὸν αὐλίσκον εἰς τὸ στόμα· καὶ ἀνανεύσαντες αὐ-
 τοῦ τὴν καμπὴν εἰς τὴν ὑπερώαν, ὥστε ἐφιδράσ-
 θαι τῷ πεπονθότι τοῦ ὄστέου, πυρακτώσαντες

rit os, si profunde quidem, ab externis partibus decussata incisione fissis malis, sic excidemus os; si autem non totum corruptum sit os, verum unica interna superficies, excisio quidem non convenit; neque enim totum illud tollere idoneum est, cujus exigua pars affecta est, neque affecta pars excidi potest; quomodo enim quis per os faciet excisionem?

10. Oportet itaque ab internis partibus circumcidentes carnem et denudantes affectum os, sic urere, ut abscedat crusta; urere autem sequenti ratione; tubulum aeneum parare oportet similem quod ad cavitatem attinet illis qui parvi calami dicuntur; perforetur foramine pervio neque adsit fundus; habeat autem et curvaturam tubulus non ad figuram literae γ ; talis enim figura usui non est apta; sed ad figuram lunatam totus incurvetur ut ejus apertura ori impositi palato nitatur superne; longitudo autem tubuli tanta sit ut altera ejus extremitate affectae palati parti innitente; altera exterior extra dentes promineat tribus digitis; dein cauterium parandum ejusdem figurae ac tubulus, ut per eum transire possit; summum autem cauterium non habeat capitulum; sed fundum planum a resectione; sub usu igitur tubulus imponendus est ori; atque sursum vertentes ejus curvaturam ad palatum, ut incidat in affectum os, candefacientes cauterium, illud imponemus trans tubulum; et ossi illud applicantes uremus; sic enim nullum circumjacens corpus ab ustione gravabitur; non

τὸ καυτήριον καθήσομεν διὰ τοῦ αὐλίσκου· καὶ
προσαρμόσαντες τῷ ὀστέῳ καύσομεν· οὕτως γὰρ
οὐδὲν τῶν πέριξ σωμάτων ὑπὸ τῆς πυρώσεως ἐνο-
χληθήσεται· οὐ μόνον δὲ ἐπὶ ὑπερώας ἐστὶν οὗ-
τος ὁ τρόπος ὁ τῆς ὀριγανοποιΐας εὐθετος, ἀλλὰ
καὶ ἐπὶ πάντων ὀστέων, ὅσα δεῖται μὲν καύσεως,
γεινιᾶ δὲ νεύροις ἢ ἄλλοις κυρίοις τισὶ σώμασιν.

11. Ὅσαι δὲ εἰς βρόχον καθήκουσι σύριγγος
ἔξωθεν τὴν ἀρχὴν ἐκ τοῦ τραχήλου λαβοῦσαι, οἱ μὲν
ἀρχαῖοι ἰατροὶ ἀπηγόρευον, ἡμῖν δὲ ἀρέσκει μυρσι-
νοειδῶς περιελόντας αὐτάς, καὶ τοῦ βρόγχου πε-
ριγλύψαντας τὸ ἐφθορὸς, ἀπάγειν τὸ δέρμα καὶ
ζυγοῦν. ἐνίοτε γὰρ εὐστοχεῖται τὰ περὶ τῆς κολ-
λήσεως· τὰς δ' εἰς τὴν εὐρυχωρίαν τοῦ θώρακος
κατιούσας, καὶ ταύτας ἀπηγόρευσαν οἱ παλαιοί·
ἡμεῖς δὲ εἰ μὲν ὁ πνεύμων ἰσχυρῶς ὑπὸ τῆς σύ-
ριγγος ἐνοχληθῆναι τύχοι, ἢ καὶ τοῦ ὑπεζωκότος
ὑμένοσ πολὺ τι μέρος, καὶ αὐτοὶ παραιτησόμεθα
εἰ δ' ὀλίγον ὁ ὑπεζωκῶς πάθοι, ὥστε αὐτῷ μόνῳ
σύντρησιν γενέσθαι, παραπλησίως ἐγχορήσομεν
ὡσπερ καὶ ἐπὶ || τῶν εἰς βρόχον κατατεινυσῶν.

12. Ἐπὶ δὲ τῶν εἰς ἔντερα, εἰ μὲν καὶ αὐ-
τῶν τι τῶν ἐντέρων ἀναστομωθῆι, δηλονότι ἀπα-
γορεύσομεν· εἰ δὲ μόνον τὸ περιτόναιον, περιελόν-
τες, εἰ μὲν ἐνδέχοιτο, μυρσινοειδῶς, ἐναίμως
ἄξομεν, χρησάμενοι τῷ τῆς γαστρορραφίας τρό-
πῳ, ἧς τὸ εἶδος ἐν οἰκείῳ τόπῳ παραδείξομεν·
εἰ δὲ μὴ ἐπιδέχοιτο τὸ σχῆμα τῆς σύριγγος μυρ-
σινοειδῆ περιαιρέσειν κυκλωτερῆ, περιγράψαντες
τὸν κατὰ συνσάρκωσιν τῆς θεραπείας ἐπάξομεν
τρόπον· περὶ δὲ τῶν εἰς Φλέβαν ἢ ἀρτηρίαν, εἰ

solum autem in palato haec ratio instrumenta adhibendi est probanda, verum et in omnibus ossibus; quaecunque uestione indigent et vicina sunt nervis aliisque magni momenti corporibus.

11. Quaecunque autem ad asperam arteriam deveniunt fistulae extra a collo initium capientes, illarum sanationem quidem prisci medici denegabant; nobis vero sufficit ad formam myrtei folii illas circumcidentes et asperae arteriae circumscribentes corruptam partem, retrahere cutem et conjungere; nonnunquam enim bene succedunt quae ad conglutinationem pertinent; ad cavum autem pectoris devenientium, illarum quoque sanationem recusabant antiqui; nos autem si pulmo quidem graviter a fistula laesus sit, vel etiam substratae membranae magna quaedam pars, sanari illas posse negabimus; si parum vero substrata patiatur, ita ut solummodo sit perforata, eodem modo manus admovebimus ac fistulis ad asperam arteriam tendentibus.

12. In illis quae ad intestina penetrant, si ipsorum quidem intestinorum etiam aliquid sit apertum, certo sanationem recusabimus; si vero unicum peritoneum, circumcidentes; si liceat quidem, sub forma myrtei folii, eruenta ratione agemus, utentes gastrorrhaphiae ratione, cujus formam idoneo loco indicabimus; si autem figura fistulae non admittit circumcisuram sub figura myrtei folii, circulari incisura illam circumscribentes, adhibebimus curandi rationem carnis in-

μὲν εἶη μεγάλη, παρεδείξαμεν ἤδη ὅτι διὰ Φαρμακείας ἐκτυλοῦν καὶ ἀποθεραπεύειν χρὴ τὰς τοιαύτας· ἐπὶ δὲ τῶν μικρότερων, ἕξεστι μὲν καὶ περιαιρέσει. βέλτιον δὲ καὶ καύσει χρῆσθαι· οἱ τε γὰρ τύλοι ὑπὸ τῆς καύσεως ἐκδαπανῶνται· καὶ ἐν τῷ παραυτίκα μεταβάλλουσιν εἰς ἐσχάραν, ἀναίμακτός τε ἢ ἀποθεραπεία γίνεται.

13. Τὰς δὲ εἰς νεῦρον (1) περαιωμένας πάσας διὰ Φαρμακείας θεραπευτέον· τὰ δ' ἐν τοῖς οὖλοις συρίγγια ἐπιδιαίρεισθαι χρὴ· ἕξαπλωθέντα γὰρ θεραπεύεται ὡς ἔλκη· ἂν δὲ δυσανασχετῆ ὁ πάσχων, ἕξαιρείσθω ὁδούς· ἅμα γὰρ τῇ τοῦ ὀδόντος ἕξαιρέσει τὸ συρίγγιον ἀνασταλήσεται καὶ τὸ οὖλον συμπεσεῖται· ἐπὶ δὲ τῆς ἕδρας (2) Φανεράς μενούσης τῆς σύριγγος ἔξω τοῦ στομίου παρὰ τῷ δακτυλίῳ, ἔνδοθεν δὲ τοῦ δακτυλίου συντετριμένα, ὁ τῆς μηλωτρίδος πυρὴν εἰς τὸ στόμιον ἐντιθέσθω καὶ διωθεῖσθω τὸ ἔλασμα, ἕως κενεμβατήσῃ εἰς τὸν τῆς ἕδρας πόρον· εἴτ' ἐπικαθιέσθω εἰς τὴν ἕδραν ὁ λιχανὸς δάκτυλος τῆς ἀριστερᾶς χειρὸς, καὶ δι' αὐτοῦ ἐκλαμβανέσθω ὁ τῆς μηλωτρίδος πυρὴν, καὶ ἀποτεινέσθω, καὶ τότε ἐκτεμνέσθω πάντα τὰ σεσυριγγωμένα, ὅλα τὰ ἐξηλειμμένα· κἂν Φανῆ τύλος ὑποκείμενος, ἀπὸ τῶν ὑγειῶν ἐντεμνέσθω.

14. Ἐὰν δὲ ἦ βαθυτέρα ἢ σύριγγξ, συντετρι-

(1) Ἀπὸ τοῦ ἧ τῶν Ἡλιοδώρου χειροῦργουμένων, κεφάλαιον περὶ τῶν ἐν οὖλῳ συρίγγων.

(2) Ἀπὸ τοῦ θ' τῶν Ἡλιοδώρου χειροῦργουμένων, κεφάλαιον περὶ τῶν ἐν ἕδρᾳ συρίγγων.

ductioni faventem; de fistulis ad venam vel arteriam penetrantibus, si magnae quidem sint, ostendimus jam tales ope medicaminum a callo purgari et sanari oportere; in minoribus vero licet quidem et circumcisuram uti; melius autem us- .04 .q
tionem adhibere; callus enim ab ustione deletur et confestim mutatur in crustam et sine sanguinis effusione fit cura secundaria.

13. Ad nervum autem penetrantes omnes ope medicaminum sunt sanandae; exiguas vero in gingivis fistulas findere oportet; plana enim facta sanantur uti ulcera; si autem aegre ferat aegrotus, extrahatur dens; simul enim cum dentis extractione fistula dilatabitur et gingiva concidet; in sede autem cum appareat fistula extra aperturam prope anum infusque anus sit perforatus, specilli capitulum aperturae immit- tatur; atque trajiciatur lamina, donec in vacuum perveniat sedis canalem; dein sedi imponatur digitus index sinistrae manus et ejus ope educatur specilli capitulum et attrahatur atque tunc omnia fistulosa quae sunt exsecentur, tota educta pars; atque si subjacens appareat cal- lus, inde a sanis partibus in illo fiant incisurae.

14. Si autem profundior est fistula, perforato constrictore, vel sine intestini recti, si fieri qui- dem possit, specillo educatur ulceratio; atque

-κμ ἢ τ ἢ εἰς ἀποδότην τοῦ ἀποφροπῆ ἢ ἀποδῶν ὅτ

μένῃ τοῦ σφιγκτῆρος, ἢ τοῦ πέρατος τοῦ ἀπευ-
 θυσμοῦ, ἔαν μὲν ἢ δυνατὸν, τῇ μηλωτρίδι ἐκλαμ-
 βανέσθω ἢ ὑποφορά· καὶ τότε ὁ μὲν σφιγκτῆρ ἀπο-
 τεινέσθω· ὁ δὲ δακτύλιος περιαιρείσθω· σφιγκτῆρ γάρ
 P. 40. ὅλος διὰ βάθους περιαιρεθεὶς, οὐ συμφύεται, ἀλλὰ
 τῆς τοῦ σκυβάλλε ραιάδος αἴτιος γίνεται· ἔαν δὲ
 ἐκτρέπεσθαι μὴ δύνηται ὁ σφιγκτῆρ σὺν τῷ δακτυ-
 λίῳ διὰ πάχος καὶ τὴν ἀπῆνειαν τῶν σωμάτων,
 καθιέσθω ἢ μηλωτρίς εἰς τὸ βάθος ἕως οὗ κενεμ-
 βατήσῃ, καὶ τῷ δακτυλίῳ καθεσθέντι γυμνὸν
 προσπέσῃ τὸ τῆς μηλωτρίδος ἔλασμα· ἐπικόπη
 δ' ὄντος τοῦ ἐλάσματος, τὸ τῆς ὑποφορᾶς βάθος
 ὑποδαιρείσθω, τοῦ ἀπευθυσμένῃ λέγω καὶ σφιγ-
 κτῆρος.

15. Πρὸς δὲ τὴν ἐπιδιαίρεσιν, τῷ λιχανῶ
 δακτύλῳ συγκαθιέσθω ἢ τοῦ ἡμισπάθῃ ἀκμῇ τοῦ
 ὑπὸ τινῶν κατεσκευαζομένην συριγγοτόμῃ· καὶ ἔσω-
 θεν ἔξω ἀγομένη ἢ ἀκμῇ, διαιρείτω τὸ τῆς ὑπο-
 φορᾶς βάθος· ἐπιδιαιρεθέντος δὲ τοῦ σφιγκτῆρος,
 κομιζέσθω μὲν ἢ ἀκμῇ· τῷ δὲ λιχανῶ δακτύλῳ
 ἐκλαμβανέσθω ἔσωθεν ἔξω τὸ τῆς μηλωτρίδος
 ἔλασμα· ἵν' ὁ σεσυριγγωμένος δακτύλιος κατὰ
 τὴν μεσότητα γένηται τοῦ τῆς μηλωτρίδος ἐλάσ-
 ματος, καὶ πάλιν γένηται ἢ ἐκτομῇ κατὰ τὸν
 ἱστορημένον τρόπον· ἀσυντήρητα δ' οὔσης τῆς ὑπο-
 φορᾶς, τὸ τῆς μηλωτρίδος ἔλασμα καθιέσθω· καθιέ-
 σθω δὲ καὶ εἰς τὴν ἕδραν ὁ λιχανὸς, ἵν' ἐκ διαδόσεως
 τῆς ἀφῆς γινώσκῃ ὁ σημειούμενος τὸ πάχος τῶν
 σωμάτων· κὰν μὲν ἢ λεπτὰ, συντητράσθω κατὰ
 τὸ πέρασ ἢ ὑποφορά· συντητράσθω δὲ ἢ τῇ μη-

λωτρίδι, ἢ τῆ ὀξείᾳ· καὶ μετὰ τὴν σύντριψιν,
ἐκλαμβάνεσθω τὰ εἰρημένα.

16. Ἐὰν δὲ ἢ παχέα τὰ μετὰ τῆς ἕδρας
καὶ τῆς ὑποφορᾶς σώματα, τοπικὴ γινέσθω τῆς
σύριγγος ἀναστολή. παχύτατα γὰρ σώματα ἐκ-
τεμνόμενα αἰμορραγίαν δυσκράτητον ἐμποιοεῖ. ἅμα
δὲ καὶ διὰ τὸ βάθος τῆς ἐκτομῆς, δυσχερὲς συσ-
σάρκωσιν γενέσθαι. ὅταν δὲ ἢ κεχωρισμένη ἢ
σύριγξ τῆς ἕδρας πλησιάζουσα τῷ ἰσχύῳ, πρό-
* Cod. δε. τερὸν αὐτὴν ἰπποτηρίῳ ἀνευρύνειν δεῖ*, καὶ τότε
ὅλον ἀπὸ τῆς ἐπιφανείας ἕως τοῦ βάθους ἀνα-
στέλλειν, ἐκτέμνειν τὰ χεῖλη ὑφ' ὅσον γὰρ
ὑγιάζεται ἢ ἀναστολὴ μεμυρισμένη κατὰ τὸ βά-
θος, ἐπὶ τοσοῦτον συντομωτέρα γίνεται ἢ συσ-
σάρκωσις· ταῦτα φρονοῦμεν ἐπὶ τῶν εὐθειῶν συ-
ρίγγων.

p. 41. 17. Ἄνω δὲ τῆς σύριγγος ἐσχηματισμένης
κατὰ τὸ σχῆμα καὶ τὸ βάθος τῆς ὑποφορᾶς ἢ
ἢ ἀναστολὴ γινέσθω· ἔαν δὲ πλησιάξῃ ἢ ὑποφο-
ρὰ τῷ τῆς κύστεως τραχήλῳ, ἐγκειμένης τῆς
μηλωτρίδος τὴν σύριγγα, καθιέσθω διὰ τῆς οὐρή-
θρας πρὸς τὴν ἡλικίαν καθετῆρ, ἴν' ἐν τῇ χειρ-
εργίᾳ διὰ τῆς ἀφῆς ἐκ διαδόσεως τοῦ καθετη-
ρίου, ἀντιλαμβάνομενοι τοῦ τῶν σωμάτων πάχους,
ἀσύντριpton φυλάξωμεν τὸν τῆς κύστεως τράχη-
λον· κάτω δὲ τῆς σύριγγος ἐσχηματισμένης, καὶ
τοῦ ἱεροῦ ὅστέε λελιπασμένα ἢ τετεριθονισμένα,
οὐ δεῖ αὐτὸ δεδοικέναι διὰ τὸ ὄνομα· οὐ γὰρ
ἐστὶ κύριον, ἀλλ' ἔαν ἐπιζητῆ ἐκκοπὴν ἐνεργεῖν,
καθὼς ἐδηλώθη ἐπὶ τῶν ἄλλων τετεριθονισμένων
ὀστέων. κρυπτῆς δὲ σύριγγος γενομένης ἐν δακ-

mento acuto; et post perforationem, educantur dicta.

16. Si autem crassa sunt corpora sedi et ulcerationi interposita, localis fiat fistulae explanatio; crassissima enim corpora sanguinis effluvio devictu difficili causam praebent; simul autem propter profunditatem excisionis, aegre se habet carnis inductio; quando separata fistula sedis vicina est coxae, prius illam ope hippoterii dilatare oportet atque tunc integram illam inde a superficie usque ad fundum explanare et exsecare labia; quanto enim magis sensim contrahitur apertura in fundo durante sanatione, eo brevior est carnis inductio; haec cogitamus de rectis fistulis.

17. Cum autem sursum figurata sit fistula, secundum figuram et profunditatem ulcerationis fiat explanatio; si autem vicina sit ulceratio vesicae collo, specillo fistulae imposito, immittatur per urethram pro aetate catheter, ut sub operatione dum tactus ope sentiamus catheterem, de crassitie corporum certiores facti, imperfossum servemus vesicae collum; deorsum autem cum figurata sit fistula osque sacrum pinguefactum vel teredine affectum, non illi timere oportet ob nomen; non enim magnum habet momentum sed si illud requirat, excisionem instituere, sicut descripta est in aliis ossibus teredine affectis; abdita autem cum sit fistula in ano apertura intus sita, ulce-

τυλίω τοῦ μὲν στομίω ἔνδον ὄντος· τῆς δ' ὑποφορᾶς πλάτος τοῦ βάθους προσαναμετρηθέντος ἔσωθεν ἀπὸ τοῦ στομίω, ἀγκίστροις ἀποτείνας δεῖ τὴν σύριγγα καὶ ὄλκω ἐκτέμνειν.

18. Ταῦτα μὲν οὖν δύναται γίνεσθαι ὅταν ἢ ἔξωθεν τοῦ δακτυλίου ἢ κρυπτῇ σύριγγι. ὅταν δὲ βαθεῖα τυγχάνῃ, τὸν σφιγκτήρα σесυριγγωκυῖα, ἢτοι ἀπὸ τοῦ δακτύλου ἀρξαμένη, καὶ ἐπὶ πολὺ κεχωρηκυῖα, ἢ ἐν τῷ σφιγκτήρι κατεσκευασμένη, μετὰ τὴν δεδηλωμένην σημείωσιν τῷ ἔδρودιαστολεῖ (1) διοπτρίῳ λέγω, διαστεῖλαι δεῖ τὴν ἔδραν, ὡς γυναικεῖον κόλπον εἶθ' ὅταν φανερὸν γένηται τὸ τῆς σύριγγος στόμιον, δι' αὐτὸ καθιέσθω ὁ τῆς μηλωτρίδος πυρῆν, καὶ διωθείσθω εἰς τὸ βάθος ἐπικόπη τε ὄντος τοῦ ἐλάσματος, ὄλη διαρεῖσθω ἢ σύριγγι τῷ ἡμισπαθίῳ ταῦτα γινέσθω ἐπὶ τῶν μονοστόμων καὶ μονοσχιδῶν σύριγγων· τῆς δὲ σύριγγος πολυστόμου καὶ μονοσχιδοῦς οὔσης, πρότερον ἐκτεμνέσθω πάντα τὰ φαινόμενα στόμια· γυμνωθεῖσα γὰρ ἢ τοῦ κόλπου ἀρχῇ, μονοστόμιον καὶ μονοσχιδῆ σύριγγα ἐνδείξεται· ὥστε πάλιν ἡμᾶς κατὰ δευτέρων ἐπιβολὴν τοῖς αὐτοῖς ἔργοις χρήσασθαι τοῖς μικρῷ πρόσθεν εἰρημένοις· ἐπὶ δὲ τῆς μονοστόμου καὶ πολυκόλου τῆ δυνάμει ταῦτα ἐστὶν ἔργα· ἐκτμηθέντος γὰρ τοῦ στομίω, γυμνωθεῖσαι αἱ τῶν κόλπου ἀρχαὶ, πολυστόμιον καὶ πολυσχιδῆ σύριγγα ἐνδείξεται.

(1) Ἐν τούτῳ τὸν ἔδρودιαστολεῖα μικρὸν διοπτριον καλεῖ.

rationis plagam integram, profunditatem cum demetiti simus, intus inde ab apertura, fistulam nempe uncis detrahere oportet et tractu excidere.

18. Haec igitur fieri quidem possunt si vel extra anum sita vel occulta est fistula; si vero profunda sit, sphincterem perforans vel quidem ab ano incipiens et multum procedens vel in constrictore sit formata, post descriptam distinctionem instrumento ad anum dilatandum (1) speculo nempe, dilatare oportet sedem, uti pudendum muliebre; dein conspicua si sit fistulae apertura, per illam immittatur specilli capitulum et impellatur usque ad fundum; fulcimento dum inservit lamina, tota dissecetur fistula ope semispatulae; haec fiant in fistulis unica apertura unicoque canali instructis; fistula vero multas aperturas cum habeat verum unicum canalem, prius exsecentur omnes aperturae conspicuae; denudatum enim sinus initium fistulam praebebit unica apertura unicoque canali instructam; ut rursus nos secunda operatione eandem adhibeamus agendi rationem ac paulo ante descripsimus; in fistula vero unica apertura verum multis sinibus instructa quantum fieri potest haec sunt facienda; excisa enim apertura, denudata sinuum initia fistulam praebebunt multis aperturis multisque canalibus instructam.

(1) Hic instrumentum ad anum dilatandum parvum speculum vocat.

19. Κοινότερον δὲ ἐπὶ τούτων ἐξετάσαι δεῖ,
 p. 42. πότερον τὰ μεταξύ τῶν | ὑποφορῶν σώματα λεπ-
 τὰ ἐστὶν ἢ παχέα· ἵνα ἔαν ἦ λεπτὰ, συντημη-
 θῆ πάντα καὶ γένηται μία ἕλκωσις· ἔαν δὲ πα-
 χέα, ἐκάστη ὑποφορὰ καθ' ἑαυτὴν ἀνασταλῆ.
 ἔαν δ' ἢ μὲν τις ὑποφορὰ ἄνω ἢ ἐσχηματισμέ-
 νη, ἢ δὲ κάτω ἄλλη δὲ πλαγία κεχωρισμένη,
 κατὰ πολὺ τῶν συρίγγων παχέων ὄντων τῶν
 μεταξύ σωμάτων, ἐκάστη ὑποφορὰ καθ' ἑαυτὴν
 ἀναστέλλεσθαι ὀφείλει· αἱ χειρουργαὶ εἰσὶν αὐ-
 ται· μεθ' ἧς θεραπείαι ἐγκρινέσθωσαν ἀναξηραί-
 νησαι μὲν ὁστέον γεγυμνωμένον, λιπαίνησαι δὲ
 ὅταν ἦ ἐσκεπασμένα τὰ ὀττᾶ· τοῦ δὲ δακτυλίου
 κατὰ πλείονα μέρη καθ' ὄλον τὸν κύκλον περιη-
 ρημένα, ἵνα μὴ Φιμὸς γένηται· ἐν μὲν ταῖς πρῶ-
 ταις ἡμέραις πριαπίσκος ἐντιθέσθω· ἐν δὲ ταῖς
 ἐσχάταις πρὸς τὴν κατούλωσιν σωλὴν μολύβης
 ἢ κασσιτήριος γινέσθω, καὶ ἐντιθέσθω μέχρι
 κατούλωσεως· καὶ μετὰ τὴν κατούλωσιν δὲ συμ-
 φέρει βραδύναι τὴν τοῦ σωλήνος ἔνθεσιν πρὸς
 ἀσφαλῆ καὶ βεβαίαν θεραπείαν (1)· καὶ ἐν δακ-
 τύλοις ἀποστηματικὰ συρίγγια γίνονται, ὡς ἐπί-
 παν ἐν ταῖς συναρθρώσεσιν· ἐφ' ὧν δεῖ, ἦτοι τὸ
 ἀποστημάτιον, ἦτοι τοῦ συριγγίου τὸ στόμιον
 κατὰ τετράγωνον σχῆμα τέμνειν· κἄν μὲν ἦ
 ἀλιπῆ τὰ ὀστάρια, μηδὲν περιεργάζεσθαι· λι-
 πασμοῦ δὲ ὄντος, ἐκκόπτειν τὰς τῶν σκυταλί-
 δων κεφαλίδας σμιλωτοῖς ἐκκοπεῦσι· εἴτ' ἐντι-

(1) Περὶ τῶν γιγνομένων κατὰ τοὺς δακτύλους· αὐτοῦ
 ἐκ τῶν Λεονίδου κεφαλαίων.

19. Magis generaliter autem in his inquirendum est, num corpora ulcerationibus interposita sint tenuia an crassa; ut, tenuia cum sint, simul omnia incidantur et fiant unica ulceratio; crassa vero cum sint, quaeque ulceratio seorsum explanetur; si autem alia ulceratio quidem sursum sit figurata, alia vero deorsum, alia autem oblique decurrens valdeque crassa sint corpora fistulis interposita, quaeque ulceratio seorsum explanari debet; operationes sunt hae; post quas curationes adoptentur exsiccantes quidem os denudatum, pinguefacientes vero si tecta sint ossa; ano autem pro maxima parte in toto ambitu circumsecto, ne impervius fiat; primis quidem diebus lignum oblongum imponatur; ultimis vero versus cicatricis inductionem tubus sit plumbeus vel stanneus et imponatur usque ad cicatricis inductionem; post cicatricis autem inductionem confert quoque tubi impositionem proferre, ut tuta sit curatio validaque; in digitis etiam parvae oriuntur fistulae abscessibus similes, ut in universum in articulis; in quibus oportet aut parvum abscessum aut ostiolum fistulae, ad figuram quadratam secare; atque si sicca quidem sint ossicula, nihil facere; pinguedo vero cum adsit, excidere ossiculorum longorum capitula ope scalpellorum excisoriorum vulgaribus scalpellis similium; dein imponere exigua linamenta carpta; et tunc motophylacem parvum vino

θέναι μοτάρια τιλά' και τότε μοτοφυλάκιον οί-
νελαίω βεβρεγμένον και επίδειν δεσμιδίω στενώ·
συνεπιδείν δε τον πλησίον δάκτυλον, ίνα στηρί-
ζιται ο κεχειρουργημένος· τῷ δε μεγάλῳ τῷ ἀν-
τίχειρι ναρθήκιον η̄ Φιλύριον σανίδιον συνεπιδεδέσ-
θαι στηριγμοῦ χάριν.

20. Τῶν (1) δε ἐν τῷ ὀσχέῳ συρίγγων, η̄
μὲν κατὰ τὰ ἐμπρόσθια μέρη βαρυνθεῖσα (2)
συντετρήσει τον ἐλυτροειδῆ χιτῶνα· η̄ δε κατὰ
τὰ ὀπίσθια, τὰ κατὰ τὴν πρόσφυσιν· τοῦ μὲν
οὖν ἐλυτροειδοῦς χιτῶνος συντετρημένε, ἅμα τῇ
καθέσει διὰ τῆς συντρήσεως κετεμβατεῖ η̄ μηλω-
τρίς· ὅταν δε ἐπεραιοθῇ τῷ διδύμῳ, νύξασα τοῦ-
τον, σφοδροτάτην ποιεῖ ὀδύνην· ἐπὶ δε τῆς κατὰ
ὀπισθεν μέρη ὁμοίως νυσσομένε τοῦ διδύμου,
γίνεται ἀλγηδών· σχιμωτιζέσθω δε ὑπτίος ὁ πά-
p. 43. σχων ἐν τῇ χειρουργίᾳ· ἔπειτα διαθείσθω || τὸ
ἔλασμα· ἐπικόπῳ τὲ χρώμενος αὐτῷ, ὅλην τὴν
σύριγγα ἐξάπλη και ἐκτύλε· τῆς δε σύριγγος
κατὰ τὰ ὀπίσθια μέρη γεγενημένης, και τοῦ δι-
δύμου κεκομμένε, ἀνάγκην ἔχομεν τῇ τῶν σκε-
πόντων σωμάτων ἀναστολῇ· και τον κεκακωμέ-
νον διδύμον ἀφελεῖν, διακρίσεως τῆς αὐτῆς γινο-
μένης, και τῆς τῶν ἀγγείων ἀποσφίγγεως, ὡς
πρόσθεν ἐδηλώθη.

(1) Ἐκ τοῦ αὐτοῦ.

(2) Γρ. βαρυνθεῖσα.

oleo mixto imbutum et adligare fasciola angusta; simul autem adligare proximum digitum ut fulciatur qui a nobis tractatur; magno autem pollicis assiculum ferulaceum vel tiliagineum simul adligare fulcimenti causa.

20. E fistulis in scroto alia in anterioribus partibus invadens (1) perforabit vaginalem tunicam; alia vero in posterioribus partibus, partes juncturae vicinas; vaginali quidem tunica igitur perforata, simulac per foramen immittitur, in vacuum locum pervenit specillum; si autem testiculo insideat; laedens illum, vehementissimum efficit dolorem; in fistula autem posteriores partes afficiente eodem modo laeso testiculo, dolor adest; decumbat supinus aegrotus sub operatione; dein inducatur lamina; tamquam fulcimento autem illo utens, totam fistulam explana et a callo purga; fistula vero cum adsit in posterioribus partibus testiculusque affectus, necessitas nobis incumbit tegentia corpora explanandi; et vitiatum testiculum extirpandi, diremptione eadem adhibita eademque vasorum constrictione, uti antea indicatum est.

(1) Gr. βαθυθρεσσα i. e. excavans.

XV. (XIV.) Ἐκ τῶν Μέγητος (1) περὶ συρίγγων.

1. Θεραπεία δὲ τῶν συρίγγων ἢ μὲν διὰ Φαρμάκων, ἢ δὲ διὰ χειρουργίας, τρίτη δὲ ἢ διὰ τῶν βρόχων· χρήσις δὲ Φαρμάκων ξηρῶν ἢ κολυρίων ἢ ἐγχύτων ἢ ἐμπλαστῶν ἀποτήκειν δυναμένων, ἢ κυστικῶν· χειρουργία δὲ δύναται τεμεῖν, καῦσαι, περιελεῖν, ξύσαι, ὄστουν ἀνελεσθαι, τὸν χόνδρον ἐκλύψαι· τούτων δὲ τὸ μὴ καθ' αὐτὴν αὐτάρκης καὶ περιαιρέσις καὶ καύσις· τὰ δὲ ἄλλα ἐπὶ τούτοις ποιητέα, ἢ Φαρμάκοις γυμνώσαι τὸ πεπονθὸς ὄστουν δυναμένοις, ἢ τὸν χόνδρον· οἱ δὲ βρόχοι τὰς ἐνέδρας ἀπλάσ οὔσας ἰῶνται, καὶ τινὰς τῶν πολυσχιδῶν ὀπίστας μὲν οὖν τῶν συρίγγων ἀπλάι τε εἰσὶ, καὶ ἐν σαρκὶ μὴ ἐνερουσσωμένη μὴδὲ κοίλῃ καὶ ἀκινήτῳ, ἢ ἐπ' ὀλίγον συγκινεμένη, καλῶς ἂν θεραπεύοιντο Φαρμάκῳ· κἄν μὲν τύχῳσιν ἐξ ὀλίγου τοῦ χρόνου ἐγγινόμεναι, ἐμπλαστοῖς· ὅσαι τραυματικαὶ εἰσι, δι' ἀλόης ἢ στυπτηρίας ἢ ἰοῦ καὶ λεπίδος, καὶ τῶν μεταλλικῶν λεγομένων· τοῦ γὰρ ἐμπλαστοῦ Φαρμάκου σκωλήκιον ἀναπλάττοντα ἐντιθέναι, ὅσον μὲν (2) διασφινῶσαι, μέχρι αἷμα καθαρὸν ἀπέιη· εἶτα τὸ αὐτὸ Φάρμακον σπλήνιον ποιήσαντα ἐπιτιθέναι καὶ σπόγγον ὑπὲρ αὐτὸ ὄξει διά-

(1) Ὁ Γαληνὸς ἐν τῷ 5 τῆς Θεραπευτικῆς αἰδώμιον τὸν Μέγητα εἶναι φησί· ἄλλοι δὲ μαθητὴν αὐτὸν εἶναι Θεμισίωνος ἀναγράφουσι.

(2) Γρ. μή.

XV. (XIV.) *E MEGETIS* (1) *LIBRIS DE FISTULIS.*

1. Cura autem fistularum partim fit ope medicaminum, partim ope manus, tertio autem ope laqueorum; adhibentur autem vel medicamenta sicca vel collyria vel infusa vel emplastra consumere quae possunt vel urentia; chirurgia autem potest secare, urere, exstirpare, scalpere, os remove, cartilaginem exscalpere; eorum autem per se non sufficiunt et exstirpatio et ustio; reliqua vero insuper sunt facienda medicamentis quae vel os affectum denudare possunt vel cartilaginem; laquei autem fistulas ani simplices sanant et nonnullas multifidas; quaecunque sane quidem fistulae simplices sunt et in carne sitae non rugosa neque cava et immobili vel quae parum tantummodo movetur, pulcre sanabuntur medicamentis; atque si paulo ante quidem natae sint, emplastris; quae a vulnere originem petunt ope aloës vel aluminis vel violae et squamae aeris vel illorum quae metallica dicuntur; ex illinendo enim medicamento vermiculum formans imponere oportet quantum quidem (2) ad instar cunei partes ambientes findit, donec sanguis purus exeat; dein idem medicamentum linamento illinentem super-

(1) Galenus in Libro VI de methodo medendi Sidonium vocat Megetem; alii autem illum discipulum esse Themisonis memoriae tradunt.

(2) Gr. $\mu\eta$ i. e. non.

βροχόν· λύειν δὲ διὰ πέμπτης, καὶ διαιτῶν κρέας ὀπτὸν καὶ ἄρτον πεπονημένον, οἶνον δὲ πίνειν σάρκα αὐξῆσαι δυνάμενον, καὶ κατακείμενον προαλείφεσθαι· ἀρμόσει δὲ ἂν πόρρω τοῦ θώρακος ἢ σύριγγι γένηται, δι' ἡμερῶν νηστις ἔμετος, καὶ διὰ βραφανίδων ἐπιτηδευόμενος.

2. Ἄριστον δὲ φάρμακον σύριγγι τὸ ἔμδον κολλύριον· ἔστι δὲ ἰοῦ ξυστοῦ δραχμαὶ δύο, καὶ θυμιάματος ἀμμωνιακοῦ ὄβολοι δύο· ὁ μὲν ἴδς ξηραίνεται· τὸ δὲ ἀμμωνιακὸν ὄξει διεθὲν, ὡς κόμμι ἐπιχυθὲν τῷ ἰῷ, καὶ μιγὲν ἀναπλάττεται· καθιέναι δὲ χρὴ μέχρι αἷμα σταθῆρὸν ἀποκρίθῆναι· ἀπαντᾶ δὲ ὁ τύλος περὶ τῷ κολλυρίῳ· |
 p. 44. χρὴ δὲ τὸ κολλύριον ἐνιέντα καταπλάσσειν τοῖς ἀνωτέρω γεγραμμένοις, ὅσα ψύχειν δύναται ἢ στύφειν ἡρέμα· τὰ γὰρ πλησίον τῆς σύριγγος, φλεγμαίνειν ποιεῖ· ποιεῖ δὲ καὶ τὸ καυστικὸν φάρμακον, ὅταν βρέξας τίς ἔτι αὐτὸ πάπυρον ἢ σπόγγον ἐσκελετευμένον καθῆ· παρελθὼν γὰρ ἔκαυσε τὴν σύριγγα· ἐπ' ἀμφοῖν δὲ, κολλυρία τε καὶ τοῦ καυστικοῦ, ἐγκλύζειν χρὴ τοῖς ἀνακαθαρτικοῖς περὶ ὧν εἴρηται. (Σ)

3. Ἀποτίκει δὲ καὶ σκίλλα τιλτὸν ἐνεψεθεῖσα κονία, ἣ χρῶνται οἱ τοὺς πηλοὺς ἐργαζόμενοι· τῆκει γὰρ ἑρρωμένως καὶ αἰμάττει (1)· καὶ φάρμακα ὑγρὰ ἐκχεόμενα, τὰ μὲν ὡς ἔχει, τὰ

(1) Γρ. καὶ αἰματεῖ.

imponere et spongiam super illud aceto madidam; solvere autem quinto quovis die et vesci carne assa et pane elaborato, bibere autem vinum carnem augere quod potest et insuper ungere quae jam adest; convenit autem si porro pectoris adsit fistula, quovis die vomitus jejunos et ope radicalium excitatus.

2. Optimum autem medicamentum in fistulis est meum collyrium; constat vero ex violarum rarsarum drachmis duabus et suffimenti ammoniaci obolis duobus; violae quidem exsiccantur; ammoniacum autem aceto dilutum tamquam gummi violis infusum et mixtum figuratur; demittere autem oportet donec sanguis firmus excernatur; undique enim callus collyrio obviam venit; oportet autem collyrium immittentem illinere medicamentis supra enumeratis quanta refrigerare et adstringere possunt sensim; in partibus enim fistulae vicinis inflammationem excitat; facit autem illud et causticum medicamentum, si quis madefaciens etiam ipsam chartam vel spongiam siccata demittat; praeteriens enim adurit fistulam; praeter utrumque autem et collyrium et causticum injectiones facere oportet depurantium de quibus jam dictum est.

3. Consumit autem et squilla vulsa cocta in pulvere, quo utuntur qui lutum tractant; consumit enim valide et sanguinem educit; et medicamenta liquida effusa alia quidem uti se habent, alia vero cum vino, nonnulla autem cum aceto, cum diuturnae sint et callo obductae fis-

δ' οἴνω, ἔστι δ' ὅτε ὄξει, χρονίων καὶ διατύλων
 οὐσῶν τῶν σύριγγων καὶ ξηρὰ δὲ Φάρμακα ὅταν
 προαιούξη τίς ἵπποτηρίῳ τὴν σύριγγα, ἔμφυ-
 σόμενα διὰ καλάρη, τὰ μὲν τήκει, ἅ δὲ ἐκά-
 θάρην ἔστι δὲ ἅ στεγνωτικὰ ὄντα τὸ ρεῦμα ἐπέ-
 σχεῖ ξηρανθὲν δὲ τὸ ἔλκος κατούλωσεν. οἶδα
 δὲ καὶ τοῖς σηπτοῖς Φαρμάκοις, ὡσπερ καὶ τοῖς
 καυστικοῖς, τύλης ἀφανισθέντας ἔχριον δὲ τὸ
 σεπτὸν περὶ τρύχας υείας συνδῶν αὐτάς, ἢ ἀλί-
 σχοιονον χρίων, παρήγον εἰς τὴν σύριγγα τέλος
 γὰρ, τὸ μὴ ὑγιὲς τῆς σαρκὸς μηδὲ οἰκείον, ἐξα-
 γαγεῖν τὴν δὲ συγγενῆ ἀνακαθήραντες εἶσαι
 συνελθεῖν τὸ δὲ λινὸν ἐπιτήδειον ταῖς ἐνέδραις
 σύριγγιν ἀμφιστόμοις ἢ ἐν στόμα ἔχούσαις.

4. Χρὴ δὲ αὐτὸν διατρήσαι ἔστω δὲ σοι μη-
 λωτρίς ἐπ' ἄκρου τρήμα ἔχουσα, οἷον αἰ βελό-
 ναι, τὸ κύαρ (1), ἢ οἷον ἔλικα πρὸς τῷ περάτι,
 καὶ εἰς σχῆμα κοχλίας ῥινοθήτω· εἰ γὰρ διὰ τοῦ
 στόματος διεῖραι χρὴ τὸ λινὸν, καὶ ἔρρωμένως,
 ἔστραμμένον, ὅσον δίστροφον ἢ τρίστροφον· κἄν
 μὲν ἀμφίστομος ἦ, καθιέναι διὰ τοῦ ὀρώμενου
 στόματος τὴν μηλωτρίδα σὺν τῷ λινῷ, καὶ διὰ
 θατέρου, καὶ ἐντὸς εἰς τὸ περατοῦται ἢ σύριγγε,
 στόματος ἐκλαβόντα τὸ ἄκρον τῆς μηλωτρίδος
 σὺν τῷ λινῷ, καὶ διὰ θατέρου, καὶ ἐντὸς εἰς
 τὸ περατοῦται ἢ σύριγγε, τὴν μὲν ἀρχὴν τῆς
 ἀριστερᾶς χειρὸς τοῖς δυσὶ δακτύλοις, λιχα-

(1) Κἴαρ ἢ αὐτὸ τῆς βελόνης τμήμα, ὡς Ἑλλάδιος, ὁ
 τῆς πολλῆν χρῆσιν συναγαγεῖν δείκνυσιν ἐν τῷ στοιχείῳ·
 ἢ χρῆσιν δὲ Ἰαπωνοῦ τῆς τῆς λέξεως.

tulae; sicca autem medicamenta quoque si prae-
 vie quis hippoterio fistulam aperuerit, inflata ope
 calami, alia quidem consumunt, alia vero depu-
 rant; adsunt autem quae adstringentia cum sint
 fluxionem cohibent; exsiccatum autem ulcus ci-
 catrice tegunt; scio autem et callum sublatum
 esse adhibitis medicamentis putrefacientibus uti et
 urentibus; illinebam autem putrefaciens circum
 setas suillas colligans illas vel mariscum illinens
 adducebam in fistulam; finis enim erat ut par-
 tem carnis non sanam neque idoneam educerent;
 normalem vero depurantes coalescere sinerent;
 filum autem convenit in fistulis, ani duabus vel
 unica apertura instructis.

4. Oportet autem illud perforare; sit autem
 tibi specillum in apice foramen habens, quale
 acus, aperturam (1) nempe, vel quale annulus in
 fine, etiam sub forma conchae nasum tuentis;
 si quidem per illud foramen adnectere oportet
 filum et fortiter contortum, ita ut his vel ter
 sit contortum; atque si utrimque habeat aper-
 turam, demittere trans conspicuam aperturam
 specillum cum filo et trans alteram, et intus quo
 usque penetrat fistula, educentem per apertu-
 ram apicem specilli cum filo et trans alte-
 ram et intus quo usque penetrat fistula; initi-
 um quidem ipsum sinistrae manus duobus di-

(1) *Kύα* vel acus foramen, uti Helladius, quod multam uti-
 litatem afferre ostendit in vicesimo libro; Utitur et Hippocra-
 tes vocabulo.

p. 45.

νῶ τε καὶ μεγάλῳ, κατασχεῖν μηδὲν ἐφελ-
κώμενον, μὴ ὄλον σοι τὸ λινὸν διεκπέσῃ διὰ
τοῦ || ἐντὸς τρήματος· τὸ δὴ μετὰ τοῦτο
καθ' ἐκάστην μηλωτρίδα ἀνακομίζον· ἔσται γὰρ
σοι τοῦ λινοῦ τὸ μὲν ἔξω ἀπαιωρούμενον ἄ-
κρον· τὸ δὲ, διὰ τοῦ ἐντὸς καὶ τῆς ἕδρας ἐξη-
λειμμένον· σύνδει οὖν αὐτὰ πρὸς ἀλλήλα ἀγκύλη·
τὴν σάρκα μὲν σφίγγων χαλαρώτατα χρῆσθαι
τῷ λινῷ· περιπατεῖτω δὲ, καὶ λθέσθω διὰ ἡμε-
ρῶν· μὴ πολλὰ δὲ ἐσθιέτω, μηδὲ ὡσπερὲ μὴδὲν
κακὸν εἶχε διαιτάσθω.

5. Χρῆ δὲ τὸ λινὸν ἅπαξ ἢ δις τῆς ἡμέρας
διέλκειν, μὴ λυομένου τοῦ βρόχου· προσέχειν
δὲ τὸν νοῦν ὡς μὴ λάθῃ σαπὲν τὸ λινὸν, ἀλλὰ
διὰ τρίτης αὐτὸ ἀλλάττειν· λύσαντα γὰρ χρῆ
τὴν ἀγκύλην, λινὸν νεαρὸν τῇ ἔξω ἀρχῇ τοῦ πω-
λαιοτέρου προσθεῖν, καὶ τὸ ἐντὸς ἔλκειν, μέχρι
παρελθόν τὸ νεαρὸν διὰ τῆς σύριγγος ὄλης τὴν
ἐτέραν ἀρχὴν διὰ τῆς ἕδρας περιβάλη· εἶτα συν-
δεῖν ὁμοίως καὶ ταῦτα ποιεῖν· δύναται δὲ τὸ λι-
νὸν καὶ ὁ περίπατος τὴν πρὸ τῆς σύριγγος ἐπι-
φάνειαν ἅμα τὲ διαιρεῖν, καὶ τὸ διαιρεθὲν ἐπό-
μενον καταλοῦται· οὗτος ὁ τρόπος μακρὸς μὲν
ἐστὶν ἐν θεραπείᾳ, ἄλλως δὲ ἀνώδυνος· τοῖς δὲ
βυλομένοις θάττον τῷ λινῷ θεραπεύεσθαι προσή-
κει· πρίζειν τὴν σάρκα· ἐμπρίζεται γὰρ, ἀλλὰ
μετ' ὀδύνης· καθιέναι δὲ εἰς τὴν νύκτα σπόγγια
ἐσκελετευμένα, ὑφ' ὧν τεινόμενον τὸ δέρμα λεπ-
τὸν ἔσται· τὸ δὲ λινὸν εὐπετῶς δι' αὐτοῦ καὶ τῆς
σαρκὸς αἰσθήσεται· ἂν δὲ ἐπιταχύνει βυληθείης,

gitis, indice et magno, retinere nullo modo attrahentem, ne totum tibi filum excidat per interius foramen; posthac sane quovis die specillum educ; erit enim tibi fili altera extremitas extra dependens; altera vero per interiores partes et per anum exterius relicta; colliga igitur illa inter se ope lori; carnem enim adstringens laxissime utere filo; decambulet et lavetur quovis die; ne autem multum edat neque degat ac si nihil mali haberet.

5. Oportet autem filum semel vel bis de die transducere, non soluto laqueo; animum autem attendere, ne occulte putrefiat filum, sed tertio quovis die illud mutare; soluto enim loro oportet filum novum extremitati extra sitae veterioris adligare et intus sitam attrahere, donec praeteriens per fistulam ab altera ejus parte ano circumdetur novum; dein colligare eodem modo ac eadem facere; potest autem filum et ambulatio partes ante fistulam conspicuas incidere; simul et pars locum incisum sequens cicatrice obtegatur; illa quidem methodus longa est in arte sanandi, ceteroquin autem dolore caret; illis vero, qui citius filo curari volunt convenit carnem quasi serra secare; hac ratione enim secat sed cum dolore; immittere autem noctu spongas exsiccatas a quibus tensa cutis tenuis erit; filum autem facile per illam et carnem percipitur; si vero accelerare velis, illine

χρίε τῶν γεγραμμένων τινὶ Φαρμάκων τὸν σπόγγον· ἅμα δὲ τῷ πάχει καὶ τῇ ὀδύνη προσθήσεις.

XVI. (XV.) Ἐκ τῶν Ἀρχιγένης περὶ γαγγραιῶν (1).

p. 48. 1. Τὸ μὲν γαγγραινούμενον αὐτὸ μὲν ἐστὶ πελιδνόν· ἔχει δὲ κύκλω μηλίζοντα, καὶ πελιούμενα, τρεπόμενά τε εἰς τὸ χλωρόν· τὸ δὲ περὶ τῷ χλωρῷ λευκὸν τὲ καὶ ῥυσσόν, καὶ τὸ περὶ τούτοις μετέωρον καὶ ἀτρέμα ὑπερυθρόν· μετέπειτα δὲ τὸ μὲν χλωρὸν πελιοῦται, τὸ δὲ λευκὸν χλωρὸν γίνεται, τὸ δ' ἐρυθρὸν ἀπολευκαίνεται, τὸ δὲ πελιδνὸν κατὰ τὴν ἀφὴν ἀναίσθητον καὶ ξηρὸν γίνεται· ἔπειτα μελαίνεται καὶ σήπηται· ἐπὶ δὲ μεγέθει Φλεγμονῆς καὶ τραύματος συμφοῦτος τε καὶ ψόφος οἶονεὶ πνεύματος ὑπίνοντος γίνεται· ἀτὰρ καὶ Φλυκτίδες ἐπαίρονται· καὶ ἡ μὲν ἐπινέμεται κατὰ τὸ συνεχές, ἡ δὲ διεσπαρμένη εἰ μὲν οὖν ἐκ βάθους προηγησαμένη περιωδυνία γίνηται, πολλὴν δ' ἔχει συμφοῦτητα καὶ οἷς ἀνωθεν εἰς βάθος κάτεισιν· οἷς δ' ἐν ἐπιφανείᾳ μένει, ψόφος μὲν οὐδὲ εἰς Φλυκτίδες δ' ἐπαίρονται· πᾶσα δ' ἐστὶ χαλεπὴ καὶ δυσκράτητος.

p. 49. 2. Ὡς ἐν τοιαύτῃ οὖν διαθέσει τὴν ἔμφασιν ἀπολειπύσαν πόσης σωτηρίας ἐκληπτέον ὅσον || τὴν ἐπιφάνειαν ἐν νεωτέρῳ σώματι καὶ μὴ γηραλαίῳ· καὶ τὴν ἐν σαρκώδεσιν ἢ βεβῶσιν ἢ μα-

(1) Ἀπὸ τοῦ α βιβλίου τῆς συνόψεως τῶν χειρουργομένων, μετὰ τὸ β βιβλίον, κεφάλαια τοῦ ὁμοίου.

spongiam aliquo ex enumeratis medicamentis ; simul et celeritatem et dolorem augebis.

XVI. (XV.) *EX ARCHIGENIS DE GANGRAENIS.*

1. **G**angraena affecta pars ipsa quidem est livida ; habet autem in ambitu circum se partes malorum colorem referentes et livescentes vergentesque in colorem viridem ; circum virides partes autem positae sunt albae et rugosae et circum has tumentes et paulatim leviter rubescentes ; dein autem pars viridis quidem fit livida ; alba vero viridescit rubraque albescit ; livida autem ad tactum fit insensilis et sicca ; dein nigrescit putrefitque ; magna autem si sit inflammatio vulnusque conditio fungosa et sonus qualis spiritus subeuntis adest ; sed vesiculae quoque exsurgunt ; atque alia quidem distribuitur in partibus proximis ; alia vero disperse ; si igitur e fundo quidem progressa sit gravis dolor adest et conditio valde fungosa uti et apud illos quibus a superioribus partibus ad fundum descendit ; apud quos vero in superficie manet , sonus quidem nullus ; vesiculae vero exsurgunt ; quaevis autem gravis est et sanatu difficilis.

2. Sic in tali conditione eligenda est explicatio omnem fere salutis spem rejiciens, quatenus non affecta sit superficies in corpore juniori neque senili ; etiam illae quae in partibus carnosae vel

σχάλαις ἢ ἐν κυρίοις σύνεγγυς τόποις δύσκολος, καὶ ἢ ἐπὶ πλέον πελιωμένη· βραδύ δὲ μεταβάλλουσα εἰς μέλαν· χαλεπὸν δὲ καὶ τὸ μηδὲν ἐν ταῖς κατασχέσεσιν αἷμα ρεῖν, ἀλλ' οἷον ἐξυδατωμένον, σομφότης τὲ ἐν ταῖς πιέσεσι γινομένη· οὕτως δὲ τὸ πάθος ὄξύ καὶ χαλεπὸν ἔστιν, ὡς τε μήτε ἀρχᾶς μήτε μεσότητος εὐρίσκεισθαι θεραπείας· πλὴν κοινῶς πάντας φλεβοτομητέον· ἐστεγνωμένης δὲ κοιλίας, κενωτέον καὶ κατασχαστέον, τό τε νεκρωμένον περιχαρακτέον, οὗ τὸ βάθος ἢ τοῦ αἵματος μὴνύει ρύσις· τὸ δὲ κατασχασθὲν ἀλλ' λεπτῶ καὶ ἐλαίῳ ἀνατριπτέον σφοδρῶς καὶ ἐφ' ἰκανόν· ἔπειτα καταπλάσσειν φλοιῶν ῥαφάνῃ σὺν αἰρίνῳ ἀλεύρῳ ἢ θερμίνῳ ἀλεύρῳ, μετὰ νίτρῳ ἀφροῦ· καὶ τοῦ μὲν ἀλεύρου δύο μοῖραι, μία δὲ τοῦ νίτρου· μετὰ δὲ ὄξους δριμυτάτου καταπλαστέον, καὶ πύρινον δὲ ἄλευρον σὺν δαφνίσι καθαραῖς· περίχρηστοι δὲ ἢ τε σφραγίς διεθεῖσα ὄξει, καὶ ἢ διὰ τῶν οἰστυπηρῶν, καὶ πᾶσα ἢ ταύταις ἀνάλογος· κατάντλημα δὲ συνεχῆς οὖρον δριμύ θερμόν· ῥαφάνῃ ἀφέψημα ἢ πράσον ἢ ἀγριελαίων ἢ βάτερ ἢ κορίνθον ἢ ὄξος σκιλιτικῶ· ἐνεργεῖ δὲ μᾶλλον θερμόν.

3. Στάσιν δὲ λαβούσης τῆς νομῆς, ἐπὶ τὰς ἀνακαθαιρούσας δυνάμεις βαδιστέον· πάμπολλαι δ' εἰσὶν, ἐξ ὧν παραδείγματος χάριν ὀλίγας παραθήσω· φακὸς γὰρ ἐφθός καὶ κατ' ἰδίαν καὶ σὺν ῥοᾶς, λεπυχάνοις· λείοις· σὺν μέλιτι ὀρόβου τὲ ἄλευρον ὁμοίως σκευάσθην, καὶ αἶραι, καὶ πρά-

inguinibus vel axillis vel propriores nobilibus partibus inveniuntur graves sunt, atque illa quae valde est livida uti et quae lente mutatur in colorem nigrum; grave autem quoque est si nullus in retentionibus sanguis effluit, sed fere dissolutus fungosaque conditio sub pressione adsit; adeo autem vitium acutum et grave est, ut neque initium neque media pars curae inveniri possit; praeterquam quod generaliter omnibus vena est secanda; adstricta autem alvo, evacuandum est et laxandum et emortua pars circumscribenda, cujus profunditatem indicat sanguinis effluxus; pars autem scarificata sale tenui et oleo fricanda vehementer et diu; dein cataplasma imponere e cortice brassicae cum farina loliacea vel farina e lupinis cum spuma nitri; atque farinae quidem duae partes, una vero nitri; cum aceto autem acerrimo est illinendum et farina triticea cum baccis laurinis puris; omnino autem adhibenda sphragis aceto diluta et medicamentum ex lana succida et quodvis his simile; fomentum autem cum his maxime conveniens est urina acris calida; brassicae decoctum vel porri vel oleastrorum vel rubi vel coriandri vel aceti squillitici; magis autem agit calidum.

3. Ubi autem sisti incipit incrementum morbi, ad depurantes potentias transeundum; permultae autem adsunt, e quibus exempli gratia paucas apponam; lens enim cocta et seorsum et cum malo Punico, in tunicis cepae detritis siccis melleque; et farina ervi eodem modo parata et lolia et marrubium

σιον καὶ σταφίς ἐκγεγαρτισμένη, καὶ μαλάχης ἀγρίας φύλλα, μετὰ μελικράτου ἀρνόγλωσσον, ἢ τε αἰγυπτία, πάντα τὲ χλωρὰ δύναμις ῥοδίνη διεθείσθαι μετὰ δὲ τὴν ἔκπτωσιν τῶν ἀπαλλοτριωθέντων, ταῖς πυσποιαῖς καὶ πληρωτικαῖς χρηστέον· καὶ τὰ μὲν ὑπὲρ τὸ ἔλκος καταπλαστέον τοῖς ἀποκρουομένοις, | τὰ δὲ ἔλκη ἀδήκτοις θεραπευτέον.

p. 52. XVII. (XVI.) Ἐκ τῶν Ῥούφου, περὶ ἔρυσιπέλατων. | (1)

p. 53. "Ὅσα δὲ ἐπὶ ἔλκεσιν ἔρυσιπέλατα γίνεται, κακῆθη πάντα· καὶ τὰ ἀφανιζόμενα ὡσαύτως, καὶ οἷς πυρετοὶ συνεδρεύουσιν· οὐκ ἀγαθὸν δὲ οὐδὲ τοῦ στήθεος κατακεχυμένον ἀφανίζεσθαι μετὰ δυσπνοίας καὶ νυσταγμοῦ καὶ μήλων ἐρέυθους· εἰς γὰρ περιπνευμονίαν τὰ τοιαῦτα ὄρμα, καὶ διὰ ταχέων ἀποκτείνει.

p. 62. XVIII. (XVII.) Ἐκ τῶν Ἀπολλωνίου πρὸς δοθιήνας.

Νίτρον λεῖον ἀναλαβὼν ῥητίνη, εἰς ὀθόνιον ἐμπλάσσω, ἐπιτίθει. Ἄλλο. Μάνναν ἀναλαβὼν ῥητίνη, καὶ εἰς ὀθόνιον ἐμπλάσσας, ἐπιτίθει. Ἄλλο. Ἰσσωπον τρίψας μετ' ἀλφίτη ἐν ὕδατι βεβρεγμένου κατάπλατσε. Ἄλλο. Σταφίδας ἐγ-

(1) Ἀπὸ τοῦ περὶ τῶν ἐκτὸς καθῶν.

et uva passa nucleo privata, et malvae agrestis folia, cum mulso plantago et Aegyptia omnisque copia herbarum virentium oleo rosaceo diluta; postquam autem exciderunt partes degeneratae remediis puris facientibus et implentibus utendum; partes quidem supra ulcus illinendae remediis repellentibus; ulcera vero remediis haud mordacibus sunt curanda.

XVII. (XVI.) *E RUFII LIBRIS DE ERYSIPELATIBUS.*

Quaecunque autem in ulceribus crysipelata oriuntur, malae indolis omnia; et evanescencia eodem modo et quibus febres accedunt; neque bonum vero si in pectore diffusum evanescat cum respirandi difficultate et somnolentia et genarum rubore; ad peripneumoniam enim haec ducunt et cito necant.

XVIII. (XVII.) *EX APOLLONII ADVERSUS FURUNCULOS.*

Nitrum contusum cohibitum resina, linteo illitum impone. Aliud. Micamthuris cohibitam resina et linteo illitam impone. Aliud. Hysso-pum tritum cum polenta aqua madida, illine. Aliud. Uvas passas nucleo privatas et tritas, salis

γυγαρθήσας καὶ τρίψας, μίξον ἀλός λείου τὸ ἴσον, καὶ κατάπλασσε τοῦτο, ἢ διαχεῖ ἢ ρήσσει.

- p. 63. Ἄλλο. Στέαρ αἴγειον ἢ βόειον μεθ' ἀλός τρίψας, ἐπιτίθει. || Ἄλλο. Ὄριγανον καὶ ἕλας λεάνας σμύρνη μίξον, καὶ ἐπιτίθει, παραχρῆμα δὲ πεπαί-
νει σμύρνα καὶ ὄριγανον ἴσα μίξας, καὶ ὕδωρ παρὰ χέας, χρῶν. Ἄλλο. Ἰσχάδας ἐφθὰς τρί-
ψας, καὶ ῥητήνη μίξας, ἐπιτίθει. Ἄλλο. Μυρί-
κης καρπὸν μετ' ὀρνιθίου στέατος λεάνας ἐπιτίθει.

contusi aequali parti misce et illine illud, vel dissipat vel frangit. Aliud. Adipem caprinum vel bubulum cum sale tritum impone. Aliud. Origanum et sal comminuta myrrhae mixta impone, confestim ad maturitatem perducit. Myrrhae et organi aequales partes mixtas et aqua adfusas adhibe. Aliud. Caricas coctas et resinae mixtas impone. Aliud. Tamaricis fructum cum avium adipe comminutum impone.

The first of these is the fact that the
 number of cases of this disease has
 increased in the last few years. This
 is due to the fact that the disease
 is now being carried by the
 mosquito. The second is the fact
 that the disease is now being
 carried by the mosquito. The third
 is the fact that the disease is now
 being carried by the mosquito.

ADNOTATIONES

IN

ORIBASII

COLLECTANEORUM MEDICINALIUM

LIB. XLIV.



Pag. 2. in titulo Ex Oribasii cet. Nonnemo fortasse mirabitur, hic non legi Lib. XLIV sed e Lib. XLIV, verum in hac re Angelum Majum sum secutus, qui in hac librorum Oribasii editione omnia, quae e Galeno erant desumpta, omittens, quia videlicet jam edita erant, hunc titulum adhibere maluit. Hinc etiam in paginis codicis, quas in margine adnotavi, nonnunquam lacuna observabitur, ut e. g. pag. 32 ubi pag. 23 Cod. sequitur pag. 30.

Ibid. *Ἀντίλλου καὶ Ἠλιοδώρου*. Antyllus erat chirurgus ex secta pneumatica, qui, quantum ex fragmentis superstibus concludere possumus, haud mediocrem laudem meretur et multum contulit ad chirurgiam et diaeticam emendandam. Praeter varia fragmenta ab Oribasio, Aëtio et Paulo Aegineta nobis servata, omnia ejus opera interierunt,

nisi excipias Librum *περὶ ὑδροκεφάλων* in collect. veter. chirurg. Nicetae legendum. Omnia vero, quae ex ejus scriptis supersunt, collegit et seorsum edidit C. Sprengel sub titulo: *Antylli veteris chirurgi τὰ λείψανα* praeside Curtio Sprengel, ventilanda exhibet Panagiota Nicolaïdes 4°. Halae 1799.

Heliodorus quoque chirurgus erat ex secta pneumatica, vixit Trajano regnante; loquitur enim de illo Juvenalis sat. 6. vs. 372. Maxima pars ejus operum desideratur; nonnulli tamen libri hujus auctoris servantur in collect. veter. chirurg. Nicetae, nempe: *περὶ τῶν ἐν κεφαλῇ τραυμάτων*, *περὶ τεղηδονισμοῦ κρανίου*, *περὶ ὀστέδους ἐκφύσεως*, *περὶ ἀκρωτηριασμοῦ*, *περὶ τῶν κατὰ τοὺς δακτύλους συμβαινόντων*. Insuper adhuc in edit. operum Hippocratis et Galeni cur. Renat. Charterio invenitur ejus Liber *περὶ ἐπιδέσμων*.

Pag. 2. lin. 1. *ἀπόστημα*. Quo melius intelligatur hocce verbum, hic addam definitiones ejus apud alios veteres auctores inveniendos; Galenus de meth. med. ad Glaucanem Lib. II. cap. 9 dicit: *ὀνομάζουσι δ' οὕτω τὰς διαθέσεις ἐκείνας, ἐν αἷς ἀλλήλων ἀφίσταται τὰ πρότερον ἀλλήλων ψάνοντα σώματα*; in Definit. med. vero N°. 387: *ἀπόστημα ἐστὶ μεταβολὴ σαμάτων ἐκ φλεγμονῆς εἰς πύον*. Paulus Aegin. autem Lib. IV. cap. 18: *ἀπόστημα τοίνυν*, inquit, *ἐστὶ φθορὰ καὶ μεταβολὴ σαρκῶν ἢται σαρκώδων, ὀδον μυῶν, φλεβῶν, ἀρτηριῶν*. Ceterum ex eodem fonte, ex quo Oribasius omnia petiit, quae hoc capite continentur, hausisse videtur Paulus Aegin. Lib. VI.

cap. 4: περι ἀποστήματος, sed illa, quae hoc capite continentur, etiam multum conveniunt cum Celsi Lib. VII. cap. 2.

Pag. 4. lin. 2. ἐποποιῶν. Hic pro ἐποποιῶν legi ἐπωποιῶν quoniam ἐπόποιος ab ἔπος et ποιέω hic mihi nequaquam convenire videtur; ἐπόποιος vero vel ἐπόποιον derivari possit ab ἐπι et ὤψ ideoque significet partes oculos tegentes, i. e. palpebras, quamvis ceteroquin, quantum scio, tale verbum nusquam alibi occurrat.

Ibid. 2. lin. 6. κίλλησιν. Hic pro κίλλησιν legi κόλλησιν.

Pag. 6. lin. 10. σφικτήρα. Hic pro σφικτήρα haud dubiè legendum est σφιγκτήρα.

Ibid. 3. lin. 2. σωλήνα. Vulgo quidem ab antiquis auctoribus, qui de chirurgia egerunt, verbo σωλήν indicatur instrumentum rotundum, oblongum, cavum, in quod membrum fractum, crus, aut femus imponitur eoque continetur, uti dicit Anut. Foësius in Oecon. Hippocr. ad vocem σωλήν, atque eo sensu occurrit apud Hippocratem Lib. de officina medici et de fracturis variis in locis, apud Galenum de meth. med. Lib. VI. Cap. 5, apud Paul. Aegin. Lib. VI. Cap. 106 et apud Celsum Lib. VIII. Cap. 10. § 5, ubi tale instrumentum accuratius describit sub nomine canalis; verum quoniam illud in abscessu circa anum adhiberi nequit, vix dubitavi, quin hic vox σωλήν significatione sua magis generali sit interpretanda ideoque vertenda voce Latina *tubus*. Ceterum cum hoc loco omnino

conf. Aëtius Tetrab. IV. II. 9. de abscessibus sedis quod caput, licet ex Leonida petatum, tamen ex hoc capite fere ad verbum transscriptum videtur.

Pag. 10. 5 lin. 15. δάκτυλον. Nisi δάκτυλος hic idem significet ac δάκτυλιος, certo legendum est δάκτυλιον, cum jam auctor § 2 inter loca, quae extirpationem abscessuum postulant, enumeraverit nates et vicinium ani, nihil vero dixerit de digitis.

Ibid. 6. lin. 13. μυρσινοειδῶς. Aëtius Tetrab. IV. II. 32 (e versione Jani Cornarij) sequenti modo circumscribit hanc plagae formam: »Resectio autem ad myrtei folij formam fiat, longa videlicet »et angusta” quam ceteroquin in iisdem casibus commendat ac Oribasius hoc loco.

Pag. 12. II. lin. 4. καταπλάσμάτων τε καὶ ἐμπλάστων. Quid intersit inter Cataplasma, emplastrum aliaque hujus generis verba, satis dilucide nos docent, quae de hac re apud Celsum, Oribasium et Actuarium leguntur. Celsus enim Lib. V. Cap. 17. § 2: »Malagmata vero, inquit, atque emplastra »pastillique, quos τροχίσκους Graeci vocant, cum »plurima eadem habeant, differunt eo, quod malagmata maxime ex floribus eorumque etiam surculis, emplastra pastillique magis ex quibusdam »metallicis fiunt. Deinde malagmata contusa abunde »mollescunt: nam super integram cutem injiciuntur: laboriose vero conteruntur ea, ex quibus »emplastra pastillique fiunt, ne laedant vulnera, »cum imposita snnt. Inter emplastrum autem et »pastillum hoc interest, quod emplastrum utique

» liquati aliquid accipit: in pastillo tantum arida
 » medicamenta aliquo humore junguntur.” et in fine
 ejusdem: » Tum emplastrum imponitur, pastillus
 » illinitur, aut alicui molliori, aut cerato miscetur.”
 Oribasius Collect. Medic. Lib. X. cap. 31 (e versione
 Rasarii) » Empasmata, ait, cataplasmata et diapas-
 » mata differunt. Empasmata enim sunt quae, ut
 » immoderati sudores, aut alia per halitum digestio
 » cohibeatur, aut ut cutis extremitas scarificetur, aut
 » pruritu tentetur, adhibentur: cataplasmata autem
 » dicuntur, quae ulceribus superdantur: diapasmata
 » vero, quae ad suavem odorem cuti conciliandum,
 » aut toti corpori tribuendum, aut partibus, ut alis
 » et feminibus, accommodata sunt.” Actuarius de
 » meth. medendi Lib. V. Cap. 1 (e versione Junii
 » Alexandrini Tridentini) » Eorum vero, inquit,
 » quae extus admoventur, quaedam sunt unguenta,
 » suntque quae illita tantum opem ferre feruntur:
 » alia sunt emplastra, quae linteis expansa, vel
 » tenuibus pellibus inducta, imponuntur: alia ap-
 » pellantur *ἐπιθέματα*, quae nequaquam proprio
 » lentore, sed externis fasciis constricta adhaerent:
 » alia sunt velut triturae, quae pulveres (et *ξηρία*
 » Graecis) dicuntur.”

Ibid. lin. 9. *Φοινίκων γε καὶ θαλλίας φύλλων καὶ
 σιδίων καὶ μῆλων. Φοινικες* haud dubi sunt palmae,
 quarum multas species enumerat Theophrastes Hist.
 Plant. Lib. II. cap. 8, dum Dioscorides Mat. med.
 Lib. I. cap. 149 et 150 seorsum agit *περὶ Φοίνικος
 Θηβαϊκοῦ* et *Φοίνικος ἐλάτους*; loquitur et Aelianus

περὶ Φοινίκων τῶν χαμαιζήλων quae esculentae erant (De Nat. Animal. Lib. XIV. cap. 13). Quid vero fuerit θαλλία, determinare non audeo; vulgo quidem vox θαλλία significat ramum virentem, verum hoc loco mihi peculiarem plantae speciem indicare videtur. Σιδία vel σίδας (Lat. malicorium) sunt putamina malorum Punicorum vel granatorum (Graece σίδη vel ῥοιὰ Punica Granatum Linn.); μήλα sunt fructus μηλέας mali (Pyrus Malus Linn). De proprietatibus adstringentibus horum medicamentorum etiam agunt Theophrastes l. l. multisque aliis in locis, Dioscorides Lib. I. cap. 148—151 et 153 Plinius Hist. Nat. Lib. XXII. cap. 5 et 6. Galenus de Simpl. medicam. temper. ac facult. Lib VIII. cap. 17. § 8. Oribasius Collect. Medic. Lib. XV. cap. I. Euporist Lib. II. cap. I. Aëtius Tetrab. I. I. et Paulus Aegin. Lib. VII. cap. 3, quin etiam malicorio vim adeo adstringentem tribuit Galenus Lib. de succedaneis medicam., ut illud in locum aluminis scissilis succedere posse putet. De malis Dioscorides Lib. I. cap. 159. Plinius Nat. Hist. Lib. XXIII. cap. 7. Galenus de simplic. medicam. temper. ac facult. Lib. VII. cap. 12. § 16. Oribasius, Aëtius et Paulus Aegin. l. l. omnes uno ore affirmant illorum facultates differre pro variis speciebus, quarum nonnullae enumerantur a Plinio l. I. et a Celso Lib. IV. cap. 19.

Ibid. γε. Pro γε mihi hic legendum esse videtur τε.

Ibid. lin. 11. τὰ διὰ πεπέρεως, σμύρνης, πίγανον ὀποῦ. Nisi hic πίγανον idem significet ac apud

alios auctores *πήγανον* (saepe enim a Graecis scriptoribus aevi serioris commutantur literae η et ε) haud dubie legendum est *πήγανου*. Ceterum de his tribus medicamentis conf. Theophrastes Hist. Plant. Lib. IX. cap. 4 et 22, Dioscorides Lib. I. cap. 77, II. cap. 189 et III. cap. 51 et 53, Plinius Hist. Nat. Lib. XII. cap. 7, XX. cap. 13 et XXIV. cap. 16, Galenus de simplic. medicam. temper. ac facult. Lib. VIII. cap. 16. § 11 et 18 et cap. 17. § 30, Oribasius, Aëtius et Paulus Aegin l. l.

Πεπέρεως plerique hi auctores tres distinguunt species *longum*, *album* et *nigrum*, quas tamen ab eadem arborē proficisci putant. Cl. Dierbach vero (Die Arzneimittel des Hippocrates pag. 156) putat piper antiquorum, illud saltem quod in libris revera ad magnum Hippocratem referendis memoratur, non esse fructum illarum plantarum, unde piper hodiernum petimus, verum Piperis Aethiopicæ vel Unonæ Aethiopicæ Dunal.

Πήγανον cujus duae species *ἀγρίον* et *ἡμέρον* recensentur a Galemo est Ruta hortensis Linn. De *πηγάνω ἀγρίω* etiam agit Dioscorides Lib. III. cap. 53.

Σμύρνη (myrrha) omnibus est cognita, verum adhuc dissentiant de planta, unde originem petit; Dierbach (l. l. pag. 224) autumat illam ab Amyris Kataf Forsk. oriri. Galenus praeter myrrham vulgarem etiam memorat *σμύρνην βοϊκήν*.

Ὅπως hic verti significatione sua magis generali, licet teste Galeno de simplic. medic. temper. ac

facult. Lib. VIII. cap. 15. § 12 saepius magis in specie hoc verbo indicetur succus Cyrenaeus vel Medicus vel Syriacus i. e. laser vel succus variarum specierum Laserpitii (σιλφίου); apud Aelianum De Nat. Anim. Lib. IX. cap. 32. ὀπός significat opium vel Papaveris succum, testante Schneidero in adnot. sua ad hunc locum.

Pag. 14. l. 14. τῇ δὲ πρώτῃ ἐνεργείᾳ μὴ ὄλον ἐκλαμβανέσθω τὸ πύον. Hic male, ut mihi videtur, invenitur colon post vocem ἐνεργείᾳ.

Pag. 14. lin. 17. λειποθυμίαν. Quo melius intelligatur, quid sit λειποθυμία, hic afferam nonnulla, quae de hac re apud Aretaeum et Aëtium exstant. Aretaeus de causis et signis morb. diurn. Lib. I. cap. 7. Ἐκλυσιν δὲ, inquit, γοννάτων καὶ αἰσθησίου πρόσκαιρον νάρκην καὶ ἀψυξίην καὶ κατάπτωσιν λειποθυμίην καλέομεν. Aëtius vero discrimen inter lipothymiam et syncopen sequenti modo describit Tetrab. II, I, 101: »Differt autem lipothymia a »syncopa, quod lipothymia derepente incidit, sensu »et motu hominem privans; et omnino non sudant: »syncope vero et vigilantes et dormientes invadit et »omnino cum sudoribus qui syncoptici appellari »solent.»

Ibid. 2. lin. 4. τιλοῖς μόντοις. Ab Hesychio (ed. Alberti Tom. II. pag. 624.) sequenti modo circumscribitur verbum μοτά, pro quo apud reliquos auctores legitur μοτοί. τὰ πληροῦντα τὴν κοίλην τῶν τραυμάτων ῥάκη, dum Auctor Isagoges, quae Galeno adscribitur, cap. 20 quinque recenset species μοτῶν

apud medicos usurpari solitas: στρεπτός, ξυστός, τιλτός, έλλυχνιωτός et πριαπισκωτός, ex quibus tamen tres priores frequentius occurrunt quam reliquae, et maxime cum carpia nostra convenire videntur. Ab hac voce μοτός etiam nonnullae aliae formantur, uti μότωσις (Hippocr. de artic. pag. 806 ed. Foësi) linamentorum impositio; έμμοτος, qui curatione ope linamentorum indiget (Hippocr. de artic. pag. 822 Epidem. Lib. V. pag. 1149 et multis aliis in locis) vel linamenta madefaciens (Paul. Aegin. Lib. VI. cap. 34) multaeque aliae. Parum autem a μοτός differre videtur άχνη όθονίου, quae ab Erotiano sequenti modo circumscribitur: τὸ παρ' ημῶν λεγόμενον ξύσμα, έξ ου γίνεται μοτός ό καλωμένος ξυστός et ex qua etiam pessi conficiebantur (Hippocr. De morbis mulierum Lib. II. pag. 665); forsitan voce άχνη όθονίου in universum indicabant ramentum lintei, dum variae species μοτών significabant varias figuras penicillorum, in quos illud ramentum contorquebatur. Praeterea apud Hippocratem (Epidem Lib. VI. sect. 7. Aphorism. 3.) μοτώματος ξυστροφή laudatur ad haemorrhagias sistendas. Libro tamen de morbis pag. 477 et 483 vox μοτός alio sensu occurrit, nam hic μοτός κασσιτέρινος κοίλος dicitur tubus stanneus ad pus e pectoris cavitate educendum, ibid. vero pag. 482 μοτός κασσιτέρινος στερεός instrumentum stanneum ad canalem quemdam occludendum.

Ibid. lin. 6. μονοφυλακι. Nisi hic μονόφυλαξ opponatur τῷ κοινῷ μοτοφυλακι, haud dubie hic legendum est μοτοφυλακι, quae vox etiam occurrit

apud Paulum Aegin. Lib. VI. cap. 34, dum *μονόφυλαξ*, quantum scio, apud nullum alium auctorem reperitur. Ceterum cum hac § omnino conferri merentur Paulus Aegin. l. l. et Aëtius Tetrab. IV. II. 32.

Pag. 16. 3. lin. 9. τοῦ ὑπεζωκότης ὑμένος. Ὑπεζωκῶς ὑμὴν est membrana serosa, quae hodie dicitur pleura, cujus descriptio anatomica invenitur apud Galenum de anatom. administ. Lib. VII. cap. 2, quem excerspit Oribasius Collect. Medic. Lib. XXXIV. cap. 12; eadem vero membrana a Caelio Aureliano Chron. V. cap. 10 dicitur hypozygos.

Ibid. lin. 14. λελιπασμένα. Vox λελιπασμένος hoc loco, uti et saepius infra, aliquam ossium vel cartilaginum degenerationem significat, de qua conf. infra adnot. ad pag. 50. 5 lin. 15.

Ibid. lin. 15. εἰάν οὖν ἔτι σκέπων. Hic inter voces ἔτι et σκέπων interpolavi vocem τι et vocem σκέπων mutavi in σκέπον vel σκεπῶν.

Ibid. lin. 17. μελικράτω. Quamvis μελικρητον apud Hippocratem semper significet aquam mulsam, hic tamen verti mulsum, quoniam me latebat, an hic subintelligeretur οἶνω vel ὕδατι vel γάλακτι; in aliis tamen locis, ubi apposita particula τὸ satis patebat, substantivum neutrum subintelligi, verti aquam mulsam.

Ibid. lin. 22. Φάρμακα λιπαίνοντα. Ni fallar, φάρμακα λιπαίνοντα, quae hic memorantur, nullo modo differunt a φάρμακοῖς vel ἐμπλαστοῖς λιπαροῖς i. e. medicamentis vel emplastris pinguibus sive leni-

bus, quae pinguibus rebus constant, cujusmodi emplastra enumerantur a Galeno de medicam. Composit. secundum loca Lib. I. cap. 8. Celso Lib. V. cap. 19 § 25—28. Scribonio Largo Lib. de composit medicam cap. 222 et 223 et Marcello Empirico Lib. de medicam. cap. 31, dum illa etiam memorat Plinius Lib. XXIII. cap. 6 et Lib. XXXIII. cap. 9.

Pag. 18. 4 lin. 1. *λήμισκοι*. *Λήμισκος* erat species *μότων*, uti patet ex Galeno τῶν Ἰπποκράτους γλωσσῶν ἐξηγήσεις in voce *ἐμπύους μοτούς*. Celsus (Lib. VII. cap. 28) *λήμισκον* Latine nuncupat implicitum in longitudinem linamentum, quem sequitur Janus Cornarius in versione sua Pauli Aegin. Lib. VI. Cap. 62.

Ibid. lin. 5. *σπληνιον*. *Σπληνιον* est panniculus, cui medicamenta illinuntur ad emplastra formanda. Quomodo autem se habere debeant haec splenia, nobis enarrat Hippocrates de offic. medici pag. 745.

Ibid. in titulo IV (III). Hoc caput, uti et omnia sequentia, duos numeros in titulo habet, quorum alter parenthesi continetur et numerum indicat, quo apud Angelum Majum capita designantur; ibi vero duo occurrunt cap. III, quia totum fere cap. III hujus editionis cum ultima cap. II. parte e codice exciderat, ita ut editor in praefatione sua (pag. 7) Oribasii Lib. XLIV etiam mutilum et laciniatum dicat; sexto tamen post cetera impressa mense folia, quae codici deerant, rursus invenit et pag. 276 sqq. Tom. IV. Classicorum auctorum e

codicibus vaticanis editorum inseruit. Ceterum cum toto hoc capite conf. Celsus Lib. VII. cap. 4. § 2.

Ibid. l. lin 8. ἀναταθέν. Ante hanc vocem inserendam esse putavi particulam τὸ.

Pag. 20. lin. 1. μηνιγγοφύλακος. De hoc instrumento conf. Celsus Lib. VIII. cap. 3.

Ibid. lin. 2. τρυπάνον. Jam Hippocrates (Lib. de capitis vulneribus pag. 912 et 913.) duas enumerat terebrarum species *πρίονα χαρακτῶν* vel *χοινικίδα* et *πρίονα*, quarum illum idem instrumentum dicit Sprengel (Pragmat. Gesch. der Medizin Tom. I. pag. 416) ac noster *trepan*, hanc vero idem ac nostra *tryphine*. Hic vir Cl. porro refert *πρίονα* idem esse instrumentum ac *τρύπανον περιητήριον*, quod memoratur Lib. de internis affectionibus pag. 544 quodque ibi commendatur ad costam perforandam, si saltem vera sit conjectura Foësi (Oecon. Hippocr. ad vocem *τρύπανον*) hic pro *τρύγλητήριον* legendum esse *περιητήριον*, quae jam inde valde fit verisimilis, quod ceteroquin explicatio vocis *περιητήριον* (*τρύπανον τῷ εὐθεῖ καὶ ὀξεί*) apud Galenum in Exegesi ad nullum Hippocratis locum referri possit. Hoc instrumentum autem ego potius idem esse putem, ac alterum genus terebrarum Celsi, de quo dicit (Lib. VIII. cap. 3.) illud simile esse ei, quo fabri utuntur, cum ob ejus usum, tum ob explicationem Galenicam hujus vocis, quam modo attuli. Celsus vero l. l. primum describit modiolum sive *χοινικιον*, quod magis et cum hodiernis terebris et cum *πρίονι χαρακτῶ* Hippocratis convenire videtur, dein transit ad duas

alias *τρύπανον* species, quarum alteram supra memoravimus; altera vero a Galeno de meth. med. Lib. VI. cap. 90 dicitur *τρύπανον ἀβάπτιστον*; omnem tamen sive modiolii sive terebrarum sive *πρίονος* usum operationi ope scalprorum postponendum esse dicit Galenus l. l.; Paulus Aegin. autem refert illam methodum a recentibus vituperari.

Ibid. lin. 6. *μήλης*. Vox *μήλη* mihi in universum omnes specilli species significare videtur, quemadmodum et hic auctor *μήλην* idem vocat instrumentum, quod supra lin. 1 *πλατυμήλην* dixerat, licet Galenus Comment. II. in Hippocr. Lib. de articulis tamquam species *ὕπαλειπτρον* enumeret *τὰς μίλλας, τὰς σπαθομίλλας καὶ τὰ διαπύρινα* et Erotianus (*τῶν παρ' Ἱπποκράτει λέξεων συναγωγή* ad vocem *μήλην*) *ὕπαλειπτρον* (sic enim legendum esse cum Foësio putem, non vero *ὕπαλιπτρον*) Hippocratis dicat *ἢν ἡμεῖς μήλην καλοῦμεν*. Apud Hippocratem autem quatuor occurrunt *μήλης* species:

1°. *τὴν μήλην διαστομοτρίδα*, quam vocem Galenus in Exegesi explicat *διαστολέα* i. e. specillum dilatans vel speculum uteri.

2°. *τὴν μήλην ἰσχυρὴν*, quam vocem Galenus l. l. explicat *τὴν τραυμάτικὴν μήλην*.

3°. *τὴν μήλην ἐξωτίδα*, quam vocem Galenus l. l. explicat *μηλωτίδα* quae etiam dicitur *μηλωτρὶς*. Licet cum ex etymologia vocis, quippe quae a *μήλη* et *οῦς* derivatur, tum ex Galeni Lib. III. de medicam. compos. secund. locos cap. I. satis appareat, hanc speciem revera nihil aliud esse, nisi specillum auri-

culare, saepissime tamen in multarum aliarum partium affectionibus adhibetur ac in aurium, ubi nempe requiritur specillum tenue vel angustum, quemadmodum et a Celso Lib. VII. cap. 30 § 3. specillum oriculare et a Scribonio Largo de composit. medic. cap. 227 auriscalpium memoratur in cura haemorrhoidum. *ἡμῖν δὲ ἰσχυρὰ καὶ πικρὰ καὶ πικρὰ καὶ πικρὰ*
πυρ 4°. τὴν μῆλην πλατεῖαν, quam vocem Galenus in Exegesi explicat *τὴν σπάθομῆλην*, quaeque mihi idem videtur ac *πλατυμῆλη*, *ὑπάλειπτρον*, *μῆλη ὑπάλειπτρις* i. e. specillum latum vel specillum ad illinendum; huc mihi quoque pertinere videtur illa species, quae a Galeno et Erotiano *κατ' ἐξοχὴν* dicitur *μῆλη*.
 Ibid. 2. lin. 6. *ἐκκοπέων*. *Ἐκκοπέως* est scalper excisorius, cuius tres species distinguit Galenus de meth. med. Lib. VI. cap. 6. *τοὺς κοίλους ἐκκοπέεις*, *αὐτὸς κωνίσκους ἀνομάζουσι*, quos vero Paulus Aegin. Lib. VI. cap. 90. dicit *κωνίσκωτους*, *τοὺς φακωτάς*, i. e. lenticulares et *τοὺς στένοὺς ξυστήρας*. Praeterea Paulus Aegin. l. l. adhuc memorat *τοὺς ἀντιθέτους* et *τοὺς μῆλωτους ἐκκοπέεις*. *ἰσχυρὰ καὶ πικρὰ*
 Ibid. lin. 7. *ὀστάγρα*. Tale instrumentum citat quoque Galenus de meth. med. Lib. VI. cap. 6 et Paulus Aegin. Lib. VI. cap. 90. atque hic praeterea refert illius loco etiam adhiberi posse *ὀδοντάγραν* vel *τριγλαβίδα*. Memorat illud et Celsus Lib. VIII. cap. 4. sub nomine forcipis. *ἰσχυρὰ καὶ πικρὰ*
 Pag. 22. lin. 5. *ἐμπλάστρους κεφαλικάς*. Galenus de meth. med. Lib. VI. cap. 6 dicit medicamenta sicca ita vocari, quoniam in affectionibus capitis

emplastra sicca plerumque conveniebant; hujusmodi autem emplastra multa eorumque vires descripsit Aëtius Tetrab. IV. III. 13.

Ibid. lin. 6. *ζοδίνα*. Hac voce indicatur oleum rosaceum, sive oleum ex floribus Rosae Centifoliae Linn., cujus variam confectionem nos docent Dioscorides Lib. I. cap. 53. Galenus de medicam. composit. secund. loca Lib. III. cap. 1. Oribasius Collect. Medic. Lib. V. cap. 33. Euporist Lib. IV. cap. 130 et Nicolaus Myrepsicus de composit. medic. sect. XXXIX. cap. 7. Ceterum de rosae virtutibus et proprietatibus conf. Theophrastus Hist. Plant. Lib. I. cap. 22. Lib. VII. cap. 7 et Lib. VI. cap. 6, ubi nonnullas enumerat Rosae species, inter quas Centifolia erat pulcherrima, Cyrenaïca vero odoratissima, Dioscorides Lib. I. cap. 130. Plinius Nat. Hist. Lib. XXXI. cap. 4. Galenus de Simpl. medic. temper. ac facult. Lib. VIII. cap. 17. § 5, Oribasius Collect. Medic. Lib. XII, XIV. cap. 10 et XV. cap. 1 et Euporist. Lib. II. cap. 1. Aëtius Tetrab. I-I et Paulus Aegin. Lib. VII. cap. 3. Ibid. V. in titulo *ἐπιγαστρίου καὶ περιτοναίου*, *Ἐπιγαστρίον* sequenti modo circumscribit Rufus Ephesius: *ἐπιγαστρίον* super ventrem posita cutis appellatur; eum autem exscripsit Oribasius Collect. Medic. Lib. XXV. cap. 1. *Περιτοναίου* vero descriptio anatomica et physiologica invenitur apud Galenum de usu partium Lib. IV. cap. 9, quem sequitur Oribasius Collect. Medic. Lib. XXIV, cap. 20. Pag. 24. VI. in tit. *Ἡπατος καὶ σπληνὸς ἀποστή-*

ματος. Multa de his abscessibus memoratu digna, praecipue quod ad prognosin attinet, exstant apud Aretaeum de sign. et curat. diuturn. morb. Lib. I. cap. 13 et 14.

Ibid. lin. 3. σπλάγγω. Hic haud dubie legendum est σπλάγγω.

Pag. 26. lin. 6. ἡμισπαθίου et paulo ulterius κατιάδος. Instrumentum κατιάς vel καθιάς dictum etiam occurrit apud Paulum Aegin. Lib. VI. cap. 73 et 74 ibique hanc vocem vertit Janus Cornarius voce Latina acicula; cap. 73 autem adhibetur illud ad abscessum uteri aperiendum; cap. 74 vero ad infantis hydrocephalo affecti calvariam perforandam in utero sub partu, et hoc loco in eadem operatione adhiberi posse πολυπικόν σπάθιον vel σκολοπομαχαίριον dicit auctor; Lib. VI. cap. 40 tamen, ubi de venaesectione agit, κατιάδος nullam mentionem facit. Si contextum nostrum cum his locis Pauli conferamus, verosimile mihi videtur, κατιάδα fuisse instrumentum ab altera parte (έλασμα) latius et obtusum, ab altera vero in mucronem acutum et pungentem desinens, neque huic opinioni repugnat, quod illud instrumentum hic in adnotatione vocatur φλεβότομον ideoque ad venaesectiones instituendas adhibitum est, nam apud Oribasium Medic. Collect. Lib. VII. cap. 10 et Aëtium Tetrab. I. III. 13 disertis verbis legimus, venam secari vel punctim vel caesim. A κατιάδος autem mihi omnino differre videtur κατειάδιον, quod memorat Aretaeus De curat. diuturn. morb. Lib. I. cap. 1. cujusque loco

etiam adhiberi posse dicit *στορνύνην* vel pennae anserinae caulem crassiorem quodque eo inserviebat, ut narium venae internae quasi serra discinderentur et sic sanguis ex iis emitteretur ad dolorem capitis sedandum; ex his igitur patet illud instrumentum fuisse serratum.

De *ήμισπαθίω* Conf. infra adnotatio ad vocem *συριγγότομον*.

Pag. 28. lin. 3. *λημνίσκω καθεθέντι, αναπληρούσθω τοῦ ἀποστήματος κόλπος*. Pro *καθεθέντι* hic legendum esse puto *κατατεθέντι* et praeterea comma, quod hic pone *καθεθέντι* invenitur, delevi.

— Ibid. lin. 12. *καδμεία*. *Καδμεία* est materia, quae in fornacibus ope ignis ex lapidibus et terris aes continentibus parabatur, quando parietibus et camerae fornacis adhaerebat (Plinius Hist. Nat. Lib. XXXIV. cap. 10); teste Galeno (de simplic. medic. temper. ac facult. Lib. IX. cap. 3. § 11) in insula Cypro etiam occurrebat in montibus nulla artis ope parata atque haec species omnibus aliis erat praeferenda; licet Dioscorides (Lib. V. cap. 84) dicat illos, qui hoc putant, decipi similitudine inter cadmiam et nonnullos lapides. Enumerat hic etiam sequentes cadmiae species *βοτρυίτην, ὀνυχίτην, ζωνίτην, πλακώδην, ὄστρακίτην, ἀκροσίδην* et speciem, quae parabatur cremando lapide Pyrite; praeterea Plinius et loquitur de capnitide. Ceterum de omnium harum specierum virtute conf. Dioscorides, Plinius et Galenus l. l., Oribasius Collect. Medic.

Lib. XIII. cap. 1. Aëtius Tetrab. I. II. cap. 57.
et Paulus Aegin. Lib. VII. cap. 3.

Ibid. οἶωθε. Hic haud dubie legendum est εἶωθε.

Ibid. *πριαπίσκον*. Quo melius intelligatur haec vox, liceat mihi hic afferre verba Oribasii Collect. Medic. Lib. XLIX. cap. 5. § 3 invenienda, ubi *πριαπίσκον* ejusque utilitatem sequenti modo describit: *Πριαπίσκος λέγεται ὁ αὐτὸς καὶ στυλίσκος, ἔτι τὲ σκαλμὸς γέγονε οὗτος πρὸς ἀντρέεισιν τοῦ περιναίου τῆς ἐν τοῖς καθαρτισμοῖς γενομένοις ἔστι δὲ ὁ πριαπίσκος ξύλον ὀκτωδακτυλῆϊον περιφερὲς κατὰ τὸ πλεῖον αὐτοῦ μέγεθος, κατὰ δὲ τὸ λοιπὸν μέρος εἰς τετράγωνον.*

Ibid. Not. lin. 6. *ιτρείοις*. In hac voce vitium irrepsisse jam exinde mihi patere videtur, quod praepositio *κατὰ* hic cum dativo usurpatur ideoque non nimis audacem me esse putem, si *ιτρείοις* mutem in *ιατρείον*, quod hic optime convenit; in univ-
ersum autem et haec nota et sequentes mihi non magnam lucem contextui afferre videntur.

Ibid. 3. lin. 3. *κλυσμοῖς*. Vix dubium videtur, quin *κλυσμός* hic idem significet quod apud alios auctores vulgo dicitur *κλύσμα*.

Ibid. *δρυμντέροις*. Haud dubie pro *δρυμντέροις* hic legendum est *δρυμντέροις*.

Ibid. lin. 4. *ὄσώπου*, *ὀρίγανου*, *ισχάδων* et pag. 30. lin. 7. *λιβανωτοῦ*. Quaenam planta fuerit *ὄσωπος* antiquorum inter pharmacologos nondum constat; *ὀρίγανον* verisimiliter erat *Origanum Creticum* Linn. vel *Origanum Heracleoticum* Ghini (Dier-

bach die Arzneim. des Hippokr. pag. 174). Galenus (de simplic. medic. temper. ac facult. Lib. VIII. cap. 15. § 13) quatuor hujus medicamenti species enumerat: *Ἡρακλειοτικήν*, de qua etiam loquitur Dioscorides Lib. III. cap. 32, *ἀγρίαν* vel *πάνακες* *Ἡράκλειον* vel *κονίλην*, ex qua etiam conficiebatur *ὀποπόναξ* (Galenus ib. cap. 16 § 4), *τραγορίανον* et *οἰνίτιδα*; *ισχάδες* sunt fructus siccae *Ficus Caricae* Linn. (Dierbach Flora Apiciana § 18.), licet Theophrastus Hist. Plant. Lib. IX. cap. 10 hac voce *πίρα* indicare videatur; Dioscorides autem Lib. I. cap. 182—184 praeter vulgarem ficum distinguit *συκὴν ἐν Κύπρῳ* et *συκὴν ἀγρίαν*; Plinius vero Nat. Hist. Lib. XV. cap. 18 viginti novem hujus arboris species enumerat. *Λιβανωτοῦ* quoque multae erant species, quae nomina petebant a regionibus, unde advehebantur (Plin. Nat. Hist. Lib. XII. cap. 15); omnes tamen hae species, uti videtur Cl. Dierbach (l. l. pag. 223) oriebantur ab *Amyris Kafal* Forsk. vel a *Boswellia serrata* Stackh. Ceterum de horum medicamentorum viribus et proprietatibus conf. Theophrastus Hist. Plant. Lib. II. cap. 7, IV. cap. 8, VI. cap. 2, IX. cap. 4 et de causis plant. Lib. I. cap. 21 et V. cap. 12 et 13, Dioscorides Lib. I. cap. 81—84 ubi seorsum agit de *φλοιῶ λίβανου*, de *μάννη λίβανου* et de *αἰθάλη λίβανωτοῦ*, et cap. 182—184 et Lib. III. cap. 30 et 32, Plinius l. l. uti et Lib. XXI. cap. 10, Galenus l. l. Lib. VIII. cap. 20. § 8. cap. 15. § 13. cap. 18. § 43 et 44, et

Lib. VII. cap. 11. § 13, Oribasius Collect. Medic. Lib. XII et XV. cap. 1, Euporist. Lib. II. cap. 1, et Paulus Aegin Lib. VII. cap. 3.

Pag. 30. 4. lin. 1. *παρισθμίσις*. De tonsillarum abscessibus conferantur Celsus Lib. VII. cap. 12. § 2, et Paulus Aegin Lib. VI. cap. 30; hicce etiam memorat *γλωσσοκάτοχον*, verum de *στοματοδι-αστολέως* apud nullum alium auctorem quidquam inveni; Paulus Aegin. praeterea adhibet singulare instrumentum ad hos abscessus incidendos, quod vocat *ἀγκυλότομον* qualiaque semper duo adesse debent, alterum pro tonsilla dextra, alterum pro sinistra.

Ibid. lin. 3. *πρίνινον*. *Πρίνος* est Quercus Ilex Linn., de cujus viribus conf. Theophrastus Hist. Plant. Lib. III cap. 17 Dioscorides Lib. I cap. 144 Galenus de simplic. medic. temper. ac facult. Lib. VI. cap. 4 § 11 et Paulus Aegin. Lib. VII. cap. 3.

Ibid. 4. lin. 7—10. *τοῖς κατὰ ἀπλοτομίαν ἔργοις χρησόμεθα πρὸς τὸ τοῦ ἀποστήματος μέγεθος· ἢ μία διαιρέσει ἢ δυσὶν ἢ τρισὶν ἀρκουμένοι*. Colon, quod hic invenitur pone *μέγεθος*, mihi tollendum esse videtur.

Pag. 32. in tit. *Ρουφου*. Haud dubie hic tractatus adscribendus est Rufo Ephesio, non vero Rufo Menio, de quo nihil compertum habemus, nisi quod citatur a Galeno (de composit. medicam. sec. genera Lib. VII. cap. 12.).

Rufus Ephesius autem medicus erat, qui praecipue tamen anatomen excoluit. De tempore, quo

vixerit, dissentiunt scriptores, cum Tzetzes eum medicum reginae Cleopatrae fuisse tradit (Chil. Lib. VI. sect. 44. vs. 300). Suidas vero (Tom. III. pag. 266) cum plerisque aliis eum ad Trajani tempora refert. Ex ejus operibus praeter nonnulla fragmenta in Collect. Nicetae invenienda adhuc supersunt:

I. De appellatione partium corporis humani Lib. III, quos primum edidit Graece Jac. Goupylus Paris. 1554. 8°. Latine vertit Junius Paulus Crassus et cum Aretaeo edidit Venet. 1552. 4°. recusus Paris. 1554 forma minori ex recensione ejusdem Goupyli. Prodierunt et inter artis medicae principes H. Stephani 1551. fol. et ex secunda Crassi recognitione 1555 et Basil. 1581. 4°.

II. De vesicae renumque affectionibus Liber ab extrema parte mutilus.

III. De medicamentis purgantibus. Hos Libros edidit cum ceteris Rufi Libris et Sorani de utero ac pudendo muliebri fragmento Goupylus Paris. 1554. 8°. atque eodem anno Latine forma minori. Prodierunt et inter artis medicae principes Stephani.

Novam editionem Graeco-Latinam Rufi ad MS. Bernense recensitam molitus est Martinus Bogdanus teste Thoma Bartholino (medic. epist. cent. IV. pag. 37). Testante Fabritio (Biblioth. Graeca Tom. III. pag. 103) Rufi. de venereis et de ossibus memorat Labbeus Biblioth. nova MSS. pag. 126.

Perierunt autem sequentes Rufi Libri:

- 1°. Libri V *περὶ διαίτης*, quos memorat Suidas l. l.
- 2°. Libri IV *περὶ βοτανῶν* carmine hexametro

conscripti, quos laudat Galenus de simplic. medic. temper. ac facult. Lib. VI in Praefat.

3°. Θεραπευτικά βιβλία, quae laudat Galenus ibidem.

4°. περι μελαγχολίας. Laudantur a Galeno Lib. de atra bile in initio.

A Suida l. l. adhuc memorantur.

5°. Lib. I. περι διαίτης πλείοντων.

6°. Lib. I. περι τραυματικῶν φαρμάκων.

7°. Lib. I. περι σύκων.

8°. Lib. I. περι ἀρχαίας ἰατρικῆς.

9°. Lib. I. περι γάλακτος.

10°. Lib. I. περι οἴνου.

11°. Lib. I. περι μέλιτος.

Ibid. βουβῶνος. Hac voce Galenus in universum

glandularum tumores acutos designasse videtur, uti

patet ex Lib. XIII. de meth. med. cap. 5: ὀνο-

μάσουσι δὲ τοὺς ἐξαρθέντας ἀδένας βουβῶνας; alio

loco tamen de meth. med. ad Glauconem Lib. II.

cap. 1. glandularum hos tumores distinxit in βου-

βῶνας, φύματα vel tubercula et φύγέθλα vel panos,

uti et Paulus Aegin. Lib. IV. cap. 22 et Actu-

arius de meth. med. Lib. II. cap. 12. qui tamen

non consentiunt, siquidem ab illo βουβῶν dicitur ἢ

φλεγμονή, φύμα vero ἢ πρὸς ἐκπύησιν ἐπιγενομένη

φλεγμονή τοῦ ἀδενός; ab hoc vero contrarium perhibetur.

Ibid. lin. 6. Δημόκριτος. Ut mihi videtur, De-

mocritus, qui hic citatur, est Abderitanus celebris

ille philosophus, qui paulo ante Hippocratem vel eo-

dem fere tempore ac ille vixit. Hicce Democritus

autem, licet praecipue philosophiae operam dedisset, tamen auctor fuit nonnullorum librorum medici argumenti, quapropter nonnulli eum quoque auctorem habent libri *περι γυμῶν*; qui vulgo Hippocratis operibus adnumeratur (Fabricius Biblioth. Graeca Tom. XIII. pag. 143.)

Ibid. lin. 7. *μολίβδον*. *Μολίβδον* est plumbum, de cuius virtutibus medicis conferantur Dioscorides Lib. V. cap. 95—98, ubi seorsum agit de *μολίβδω πεπλυμένω*, de *μολίβδω λελαμμένω*, de *μολίβδον σκωρία*, de *μολυβδοειδι λίθω* et de *μολιβδαίνω* (secundum Dierbach Die Arzneim. des Hippokr. molybdas plumbi oxydati) Galenus de simplic. medicam. temper. ac facult. Lib. IX. cap. 3. § 23. Oribasius Collect. Medic. Lib. XV. cap. 1. Aëtius Tetrab. I. I. et Paulus Aegin. Lib. VII. cap. 3.

Ibid. Not. (1). *Ἐν τῷ ξε' βιβλίῳ κεφαλαίῳ Πορφου περὶ λιθιάσεως εὐρήσεις κοκκίνω*. Ut mihi videtur, pro *εὐρήσεις* legendum est *εὐρήσεος* et punctum inserendum ante *κοκκίνω*.

Ibid. lin. 2. *κοκκίνω*. *Κόκκινον* conficiebatur e *κόκκοις*, quorum duae erant species: *κόκκοι Κνίδιοι* et *κόκκοι βαφικοί* (Dioscorides Lib. IV. cap. 48 et 173. Galenus de simplic. medic. temper. ac facult. Lib. VII. cap. 10. § 33 et 34. Aëtius Tetrab. I. I. et Paulus Aegin. Lib. VII. cap. 3). *Κόκκοι Κνίδιοι* autem, testibus Dioscoride et Paulo Aegin., erant fructus *θυμελαίας*, dum quicumque illos fructus dicunt *χαμελαίας* (foliorum similitudine decipiuntur; Plinius vero Lib. XIII. Nat. Hist. cap. 21. *θυμε-*

λαίαν et *χαμαιλαίαν* eandem esse fruticem dicit; teste Sprengel autem (Pragmat. Gesch. der Medizin (Tom. I. pag. 516) erant fructus *Daphnes Gnidii* externa cortice privati; de arbore vel frutice vero, unde *κόκκοι βαφικοί* petebantur, agit Dioscorides Lib. IV. cap. 48. eorumque varias species enumerat, quarum Galatiatica et Armeniaca erant optima, dein autem sequebantur Asiatica et Cilix, vilissima erat Hispanica. De virtutibus medicis autem *κόκκων* conferantur auctores supra laudati l. l.

Ibid. Not. (2) lin. 1. *φίλων*). Uti patet e Stephano Byzantino (de urbibus et populis ad vocem *κυρτός*) Philo, de quo hic mentio fit, est Herennius Philo Byblius Grammaticus, qui vixit Domitiano regnante et inter alia conscripsit Lib. XII. *περι κτήσεως και έκλογής βιβλίων* (Fabricius Biblioth. Graeca Tom. III. pag. 120), quos hic innuere videtur hujus adnotationis auctor. Hic Philo autem nequaquam confundendus est cum Philone Tarsensi medico, cujus celebre medicamentum anodynum ab illo *φιλωνείον* dictum versibus descriptum cum explicatione invenitur apud Galenum de medic. compos. sec. loc. Lib. IX. cap. 4.

Ibid. lin. 2. *Ἑρμῆπος* (*Ἑρμιππος*). Quisnam hoc nomen emendaverit, nescio ideoque haec mittam. Ni fallar autem, hic sermo est de illo Hermippo, qui, testante Fabricio, commentationes conscripsit in Homerum, Theophrastum aliosque et de quo (Biblioth. Graeca, Tom. II. pag. 174) dicit: Perierunt Hermippi aliique Jonsio laudati scriptores de sectis vitisve philosophorum.

Ibid. lin. 3. *Σωράνος*. Praeter Soranum Coëum, quem memorat Soranus junior in vita Hippocratis et Soranum Cilicem, quem memorat Suidas (Tom. III. pag. 354) quique multo sunt antiquiores, duo alii fuerunt Sorani medici ambo Ephesi nati:

1°. Soranus antiquior e secta methodica, a quo Hallerus putat Caelium Aurelianum omnia fere, quae scripsit, depromsisse, ita ut penè nihil fecisse videatur Caelius, nisi quod Sorani opera Latine vertisset (Praefat. ad editionem suam hujus auctoris pag. 12—14). Hicce Soranus autem primum Alexandriae versatus est, dein Romae medicinam exercuit, Trajano et Hadriano regnantibus, deque eo Suidas l. l. testatur, illum *πλεῖστα καὶ κάλλιστα* scripsisse. Ex hujus scriptis adhuc in collect. Nicetae nobis servantur: Libri *περὶ σημείων καταγμάτων τοῦ κρανίου* et *περὶ ἐπιθέσεων*, qui liber etiam invenitur in editione operum Hippocratis et Galeni cur. Renato Charterio. Praeterea a Caelio Aureliano citantur hujus auctoris Libri de adjutoriis (Acut. Lib. II. cap. 29). Lib. causarum quos *αιτιολογουμένους* appellavit (Chron. Lib. I. cap. 3) Lib. II de coenotetis (Chron. Lib. IV. cap. I) et Lib. de febribus (Acut. Lib. II. cap. 33), a Galeno vero (de composit. medicam. sec. loc. Lib. I. cap. 8) *μόνο-βιβλος φαρμακευτικός* et Lib. IV. *περὶ φαρμακείας*.

2°. Soranus junior, de quo hic sermo esse videtur, scripsit vitas medicorum et de sectis atque syntagmatis libris X distributa (Fabritius Biblioth. Graeca Tom. XII. pag. 684); illi quoque adscri-

benda est vita Hippocratis, quae in plerisque hujus auctoris editionibus legitur; citantur et a Suida l. l. IV. ejus Libri *περὶ γυναικείων*, unde fortasse depromptum est fragmentum Sorani de utero ac pudendo muliebri, quod adhuc exstat (Conf. supra Nota ad verbum *Ρουφου*), quod tamen Sprengel (Pragmat. gesch. der Medizin. Tom. II. pag. 50) Sorano methodico adscribere videtur; illi quoque tribuenda sunt quae ex Sorano inveniuntur apud Aëtium Tetrab. IV. 4.

Ibid. lin. 5 et 6. βαρυτόνος δὲ ὡς ἵππος πύργος, ἐπὶ ἐκ μεσογαίου πολέος τῆς Αἰγύπτου λεγομένης Κληροῦ ἀπήχεν. Vix dubium videtur, quin hic pro ἐπεὶ mendose legatur ἐπὶ.

Ibid. lin. 7 et 8. διὰ τὸ ἀλίσκεσθαι τοὺς ἀντιλέγοντας αὐτοῦ, ὅσπερ τοὺς ἰχθύς ὑπὸ τῶν ἀλιευτικῶν κυρτῶν. Vocem ὅσπερ hic in ὡσπερ mutandam esse putavi.

Ibid. VIII. lin. 17. παραφροσύνην. Haec vox significat omnem mentis perturbationem in exacerbatione febris vehementis, uti patet ex Galeni Comment. in Hippocr. Aphorism. 14 Lib. VII: ἡ μὲν γὰρ παραφροσύνη γνωρίζεται, φθεγγομένων τε καὶ πρᾶτοντων οὐδενός, ἐχόμενα λόγου et ex ejusdem Comment. in Hippocr. Prorrheth. Lib. I. l. 1, ubi variae species hujusmodi delirii vel desipientiae enumerantur: τὸ δ' ἐν ἀκμῇ σφοδροῦ πυρετοῦ παραφρονησαι παρακόψαι τε, καὶ παραχθῆναι, καὶ παραληρῆσαι, καὶ αὐτὸ δὴ τοῦτο παραφρονησαι καλοῦσι. Ex his παραληρησις videtur indicare delirium mite, uti patet ex

Arctaei de causis et signis diut. morb. Lib. I. cap. 6, ubi describitur discrimen inter λήρησιν et μανίην; ibi tamen λήρησις potius significare videtur amentiam senilem (Heinroth Lehrb. der Störungen des Seelenlebens. Tom. I. pag. 85): τῆδε τῆ μανίη οὐδέν τι ἴκλον ἢ λήρησις, γήραος ἢ ξυμφορῆ· αἰσθησιος γὰρ ἔστι νάρκη καὶ γνώμης νάρκωσις ἠδὲ τοῦ νοῦ ὑπὸ ψύξιος· μανίη δὲ θεομόν τι καὶ ξηρόν τῆ αἰτίη, καὶ παραχῶδες τῆσι προήξεισι· ἢ μὲν γε λήρησις ἀρχομένη ἀπὸ γήραος, οὔτε διαλείπει, καὶ ξυναποθνήσκει· μανίη δὲ καὶ διαλείπει καὶ μελεδῶνι ἐς τέλος ἀποπαύεται.

Pag. 34. lin. 12. Ad finem hujus capituli de bubone monere liceat, me ideo nullas adnotationes in illud conscripsisse, saltem in illius partem, quae de peste agit, quia ante hos duos annos de hac re libellum edidit F. Osann sub titulo: de loco Rufi Ephesii medici apud Oribasium servato, sive de peste Libyca disputatio, qua viro summo ac perillustri C. G. Hufeland gratulatur Gissae 1833. 4°. Illa autem disputatione vir doctiss. probare conatus est, pestem, de qua hic agitur, fuisse eundem morbum, qui adhuc fere quotannis in Aegypto aliisque regionibus Orientalibus grassatur, neque umquam in antiquitate exstitisse pestem, quam non comitabantur bubones communemque patriam pestibus, si non omnibus, certe plurimis Africam fuisse. Primum tamen percontatur, qua aetate regnaverit pestis, de qua hic loquitur Rufus, quique fuerint Posidonius et Dioscorides, qui hic memorantur. Asserit autem huncce Posidonium fuisse Posidonium Apameensem Stoï-

cum, qui in Rhodo philosophiam docebat, cujus que opera quae supersunt collegit ediditque Janus Bakius, quique (teste Strabone Geograph. Lib. XVII. pag. 830) refert, in Libya et Aethiopia saepe pestem oriri ab aestu et siccitate lacubus coenosis factis et locustis innumeris irruentibus; huncce virum enim doctrina insignem etiam medicinae haud imperitum fuisse credit indeque eundem illum esse putat ac ille Posidonius, qui citatur ab Apollonio Citiensi vel Mure in ejus praefatione Libri *τῆς περὶ ἀσθενῶν πραγματείας* in collect. Nicetae servati; Dioscoridem vero, de quo hic agitur, fuisse Dioscoridem Alexandrinum Phacam dictum Erasistrateum, qui, teste Suida (vol. I. pag. 604), aetate Cleopatrae vixit: ex his omnibus concludit vir doct., hic sermonem esse de illa epidemia, quae a. U. C. 628. Africae oras maritimas devastavit, de qua breviter mentio fit in Livii Epitomat. Lib. LX, de qua vero disertius egit Julius Obsequens De prodigiis 90, omnium tamen disertissime Orosius V. 10. ed. Paris. 1510 (Osann. l. 1.)

Hoc opusculum autem Doct. Osann. etiam laudatur in Diario Bibliothek der Praktischen Heilkunde von G. W. Hufeland dicto (Julius 1833) ibique versio invenitur hujus capituli Rufi inde a verbis *οἱ δὲ λοιμώδεις* usque ad verba *κατὰ ἰγνίνας καὶ ἀγκῶνας*, in qua versione auctor secutus est emendationem contextus a Doct. Osann. propositam, qua vocem *λοιμῶ* (pag. 32. lin. 14) mutavit in *λοιμοῦ*, quam et ego secutus sum. In hac versione tamen vitium

mihî irrepsisse videtur, quia ibi vox ἀνεκπιήτων
vertitur voce Germana *eiternde*, nam ego ἀν hic
loco non habui ἀποκοπήν praepositionis ἀνά, verum
solummodo ἀ privantem ideoque verti *quae in sup-
purationem non transeunt*, cui meae sententiae
etiam favet, quod plerique auctores, qui de peste
egerunt, cum antiqui tum recentiores suppurationem
bubonum inter bona signa recensent (Pro-
copius de Bello Persico Lib. I. cap. 79 ed. Hoe-
schelii, de Wolmar Abhandlung über die Pest mit
einer Vorrede von Hufeland, Berlin 1827.)

Mirum etiam mihî videtur, Doct. Osaun in supra
laudato ejus opusculo nullo modo investigare, quis
faerit Dionysius Cyrtos vel gibber; negari sane nequit,
Dionysium tali cognomine ornatum a nullo alio auctore
citari, nisi ab unico Stephano Byzantino (de urbibus
ac populis ad vocem κυρτός), ubi illum ab Herennio
Philone citari dicit, neque cognomen κυρτου illi datum
fuisse ob deformitatem corporis, verum ob urbem,
unde originem petebat, sed ab aliis auctoribus ci-
tantur varii Dionysii medici, inter quos, licet aliis
vel nullis cognominibus ornatos, tamen forsân unus
alterve ab hoc nullo modo differet. Lib. II enim
Antidot. cap. 11, quod caput, uti ex titulo patet,
ex Asclepiade petitum videtur, Galenus citat anti-
dotum, quod Dionysio Milesio auctori adscribitur;
Lib. IV vero de medic. composit. sec. gen. cap. 13,
qui locus etiam ex Asclepiade videtur transcriptus,
citat medicamentum Dionysii Samii adversus ulcera
sanatu difficilia; Comment. in Hippocr. Aphorism,

69 sect. IV. citatur Dionysius quidam, qui commentaria in eosdem aphorismos conscripsisse videtur; a Plinio Nat. Hist. Lib. XXV. cap. 2 mentio fit Dionysii Crateuae, qui librum conscripsit de usu herbarum effigiesque addidit, quemque idem Plinius citare videtur Lib. XV. cap. 11 et 20; memorat et Plinius (Lib. XXXII. cap. 7) Sallustium Dionysium; ab Athenaeo porro (Deipnosoph. XIV. pag. 648) laudantur Lib. IV. *περί γεωργικῶν* Dionysii cujusdam Itucaei; a Celso (Lib. VI. cap. 6) laudatur Dionysii collyrium et cap. 19 ejusdem medicamentum ad haemorrhoidas; a Caelio Aureliano (chron. Lib. II cap. 13) Dionysius articulorum constrictionem in haemorrhagiis commendasse dicitur; tandem a Scribonio Largo de composit. medicam. cap. 212 citatur medicamentum quiddam Dionysii chirurgi, nam hic sermo non esse potest de Dionysio methodico, Galeni aequali, de quo loquitur Galenus (de meth. med. Lib. I. cap. 7) et saepius in celebri illa Epistola ad Caecilianum de puero epileptico, quem primum tractaverat Dionysius ille. Si autem plura de his omnibus comperta haberemus, forsitan omnes Dionysii ad tres quatuorve redigi possent, quorum nonnulli uti Samius et Milesius certo vel ante Asclepiadem vel eodem tempore ac ille vixerunt, ideoque verosimiliter aetate non longe distabant ab aetate Posidonii et Dioscoridis, quae omnia si accuratius probari possent, exinde novum argumentum peteretur pro sententia Doct. Osann; vel, si hanc opinionem tamquam satis comprobata consideremus, accuratius determinari

posset. Dionysii aetas ea re, quod Rufus Ephesius ejus aequales vel discipulos (utroque modo enim verti posse verba οἱ περὶ τὸν Διονύσιον mihi videntur) pestem saepius jam memoratam meminisse vel ejus mentionem fecisse (nam et significatio verbi μνημονεύασιν mihi hic anceps videtur) refert, si solummodo constaret, ad quemnam Dionysium referri deberet cognomen κρητός.

Ne autem haec adnotatio nimis longa fiat, obiter tantummodo mentionem faciam Disputationis de origine pestis, quae legitur (Revue Médicale Janvier 1834) auctore Doct. Lagasquie, qui anno 1828 cum doct. Pariset, praeside hujus expeditionis, Doctiss. Dumon et Guilhou et Ornatiss. d'Arcet, Félix et Bosc in Aegyptum adjacentesque regiones missus est a Sereniss. de Martignac, tunc temporis rerum internarum in Gallia administrationi praefecto (*ministre de l'intérieur*), ut naturam pestis perscrutarentur et explorare tentarent, qua ratione ejus propagatio cohiberi vel potius universus morbus extirpari posset, qui dein per biennium in his regionibus degit, ut munere sibi oblato fungeretur; frustra tamen pestem quaesivit in Aegypto, verum illam invenit in urbe Syriaca Tripoli, ubi per tres annos vere saevit. In hac disputatione auctor, qui omnes viros Doctiss. Ornatissque supra enumeratos secum in Aegyptum missos secum etiam consentire dicit, vulgarem adhuc opinionem de origine pestis profert, morbum nempe, quem hodie pestem dicimus, numquam occurrisse ante illam epi-

demiam, quae anno p. Chr. n. 542 et sequentibus magnam orbis terrarum partem devastavit cuiusque historiam nobis enarrat Procopius de bello Persico Lib. I. pag. 77—80.

Pag. 32. VIII in tit. τετραίνθου ibid. lin. 1. φύματος ibid. lin. 6. φλυκταίναν pag. 36. IX. in tit. φλυκταινίδων ibid. lin. 3. σταφυλόν ibid. lin. 4. φλυκταινίδιον ibid. lin. 5. σταφυλή ibid. lin. 6. επι-
νοκίτις et pag. 38. XI. in tit. φυγέθρου. Magna confusio regnare videtur in significatione harum vocum apud varios auctores, ita ut definiiri fere nequeat, quid quaeque earum apud quemque auctorem significet.

Φύμα apud antiquiores e. g. Hippocratem in univ-
ersum omnem tumorem praeter naturam erumpen-
tem significat, atque hoc sensu etiam hanc vocem
adhibuisse videntur discipuli Praxagorae (pag. 38.
lin. 1). Hac ratione etiam vocem φύμα explicat
Galenus Comment. in Hippocr. Lib. VI Epidem.
sect. 1 Aphorism. 12: ἀπό τῶν ἐν τῇ γῆ φνομένων,
οἱ ἀνθρώποι φύματα κεκληκασιν τοὺς παρὰ φύσιν
δγκους ὅσοι τοῦπίπαν ἀνευ τῆς ἐξωθεν αἰτίας γίνονται,
μάλιστα οὖν ὀνομάζουσι οὕτω τὰ πρὸς τὸ ἐκτὸς τόπον
ἐπιγεγόμενα, Aliis tamen in locis φύμα peculiarem
affectionem glandularum significare videtur, uti apud
Hippocr. Aphor. 26. sect. III, ad quem locum
etiam Galenus in Comment. suo sequentia monet:
λέγονται δ' ἐξαιρέτως ἔνια φύματα φλεγμοναί τινες
αὐτομάται τάχιστα μὲν γεννώμεναι, τάχιστα δ' εἰς ὄψο
ὑψηλὸν ἀφρόμεναι, τάχιστα δὲ καὶ ἐκπυόσκομεναι, καὶ

πλείστη γε καὶ ἡ τοιούτων γένεσις ἐστὶν ἐν βουβῶνι,
καὶ μασχάλῃ, ὅτι καὶ ἀδέρες ἐνταῦθα πολλοὶ φύσιν
ἔχοντες, εἰς ἑαυτοὺς ἐτοίμως δέχεσθαι τὰ περιττά. Huc
quoque pertinent quae inveniuntur apud Actuarium
de meth. med. Lib. II. cap. 12 et Paulum Aegin. Lib.
IV. cap. 22, quae loca jam citavi ad vocem βουβῶν;
cum hoc autem omnino convénit Galenus de meth.
med. ad Glauconem Lib. II. cap. 1. Tertio loco
φύματα aliquando parvos abscessus significare vi-
dentur, quemadmodum apud Celsum Lib. II. cap.
8, ubi Latine vertit Hippocratis Aphor. 81 sectionis
IV: hic enim legitur: » minuti abscessus, quos
φύματα Graeci vocant; » alio loco vero Lib. VI. cap.
2 dicit: » Tubercula, quae φύματα Graeci vocant. »

Eadem significatione generali, qua Hippocrates E-
pidem. Lib. VI. sect. 1 Aphor. 12 adhibet vocem
φύμα Diocles in contextu nostro (cap. X) adhibere
videtur vocem φλυκταίναν; aliis locis vero φλυκ-
ταίνα indicare videtur vesiculas illis similes; quae
ustione oriuntur; Hesychius saltem (Tom. II. pag.
1514) vocem φλυκταίναν explicat: τὸ ἀπὸ πυρός φύ-
σημα γινόμενον ἐν τῷ σώματι; hoc sensu autem
occurrit apud Oribasium Euporist. Lib. III. cap. 23,
Actuarium de meth. med. Lib. VI. cap. 8 et Celsum
Lib. V. cap. 28. § 15. Ab his autem omnino differre
videntur φλυζάκια, quae Celsus l. l. sic circumscrit:
φλυζάκιον autem paulo durior pustula est subalbida,
acuta, ex qua ipsa, quod exprimitur humidum est.
De hoc φλυζάκιῳ etiam loquitur Hippocrates Coac.
Praenot. sect. II. No. 114. Seniores auctores vero

hancce affectionem ψυδράκις vel ψυδράκια dixisse videntur; Galenus enim (in Exeg. ad vocem) φλυζάκια explicat voce ψυδράκια; et illae pustulae, quae ab Alex. Trall. de arte medica Lib. I. cap. 5, Aëtio Tetrab. IV. I. cap. 128 et Actuario de meth. med. Lib. VI. cap. 1 memorantur sub nomine ψυδράκων vel ψυδρακίων eadem esse videntur ac Hippocratis et Celsi φλυζάκια. Willan tamen (Die Hautkrankheiten und ihre Behandlung übersetzt von L. Friese. Tom. I. pag. 9), ubi de pustulis agit, a se invicem distinguit phlyzadium et psydracium, phlyzadium dicens pustulam satis magnam cum fundo inflammato vivide rubro, quae tandem transit in crustam crassam coloris obscurioris; psydracia verò parvas eminentias, quae in crustas imbricatas (blatterig) transeunt quaeque plerumque acervatim occurrunt et confluent ruptaeque humorem tenuem, aquosum emittunt. Vix dubitandum videtur, quin φλυκτανία (nisi fortasse haec vox mendose legatur pro φλυκταίνα), φλυκταινίς et φλυκταινίδιον idem significant ac φλυκταίνα.

Τέρμινθοι a Galeno in Exeg. ad vocem dicuntur οἱ τῷ τοῦ τέρμινθου καρπῷ παραπλήσιοι κατὰ τὸ δέγμα συνιστάμενοι παρὰ φύσιν ὄγκοι. Ceterum hujus affectionis descriptiones, quae inveniuntur apud Oribasium Synops Lib. VII. cap. 46, Aëtium Tetrab. IV. II. cap. 62 et Paulum Aegin Lib. IV. cap. 24 parum a nostra differunt. Ultimo loco Paulus locum Oribasii, de quo hic agimus, innuere videtur, dum hoc caput sequenti modo incipit: Ὁ μὲν Ὁρειβάσιος ἑνός εἶδος φησὶ τὴν τέρμινθον.

Inter recentiores autem M. G. (Dictionnaire des sciences médicales Tom. XLIV. pag. 563) terminthum veterum habet affectionem scorbuticam vel syphiliticam, licet ante nostrae aerae saeculum XV nulla certa saltem scorbuti vel syphilidis vestigia demonstrari queant; Cl. Puchelt vero (Das System der Medizin in Umriss dargestellt Tom. II. pag. 103) illum nullo modo a carbunculo differre putat, fortasse quia descriptio terminthi parum differt a definitionibus *ἀνθρακος*, quae apud Galenum (Definit. med. N°. 384 et Comment. in Hippocr. Aphorism. 45. Sect. VI) occurrunt, nam *ἀνθραξ* veterum eadem affectio videtur ac anthrax vel carbunculus recentiorum. Paulus Aegineta tamen *ἀνθρακας* et *τερμίνθους* diversas habet affectiones, siquidem Lib. IV. cap. 24. de his agit, cap. 25. vero de illis.

Σταφυλήν vel *σταφυλίον* (sic enim mihi legendum esse videtur, non vero *σταφυλόν*, ita ut *σταφυλίον* sit diminutivum *σταφυλῆς*) unicus Diocles memorare videtur; omnes vero alii auctores Graeci hac voce designant vel uvulam inflammataam vel uvulam sanam; Rufus tamen Ephesius (de appell. part. corp. hum. Lib. I. cap. 8) et Galenus (de compos. medic. sec. loc. Lib. VI. cap. 8) hujus vocis usum in significatione uvulae sanae vituperant.

Ἐπινυκτίς, quae etiam memoratur ab Hippocrate Prorrheth. Lib. II. pag. 95 et a Plinio Nat. Hist. Lib. XX. cap. 6, fere eodem modo ac hic describitur a Celso Lib. V. cap. 8. § 15. Oribasio

Synops. Lib. VII. cap. 37. Aëtio Tetrab. IV. II. cap. 61 et Actuarius Lib. de meth. med. II. cap. 11. *Φυγέθλον* vel *φυγέθρον* (Latine panum) a Celso fere eodem modo describitur (Lib. V. cap. 8. § 10), praeter quam quod illud etiam in cervice et in aliis occurrere dicit. Galenus vero (de meth. med. ad Glauconem Lib. II. cap. 1) Paulus Aegin (Lib. IV. cap. 22) et Actuarius de meth. med. (Lib. II. cap. 12) *φυγέθλον* dicunt *ἀδένων τὸ λεγόμενον φλεγμονώδες ἐρυσίπελας ἢ ἐρυσίπελατώδης φλεγμονή*. Heliodorus tamen (uti patere videtur ex adnotatione (1) ad pag. 37) *φύμα* et *φυγέθλον* unam eandemque affectionem habet.

Pag. 34. IX. lin. 8. *Πραξαγόρας*. Praxagoras fuit medicus ex antiqua schola dogmatica, qui non ita longe inde ab Hippocrate interjecto temporis spatio floruit. Fuit praceptor Herophili, uti testatur Galenus (de differentiis pulsuum Lib. IV. cap. 3) et omnium primus voci *σφυγμῶ* (pulsus) illam tribuit significationem, qua illam nunc etiam adhibemus indeque primus quoque fuisse videtur, qui pulsatione arteriarum usus est tanquam signo prognostico vel diagnostico morborum (Galenus de placitis Hippocratis et Platonis Lib. VI. cap. 1). De ejus scriptis parum constat; a Caelio Aureliano tamen citantur. Libri IV curationum (Acut. Lib. III. cap. 4.)

Libri II peregrinarum passionum (Acut. Lib. II. cap. 10).

Libri III de morbis (Chron. Lib. V. cap. 2).

Ibid. lin. 4. *Ξενοφών*. Dubitari potest, num Xenophon Coüs, de quo hic verosimiliter sermo est,

et qui citatur a Diogene Laërtio (Lib. II. segm. 59) fuerit idem ac Xenophon Erasistrateus, qui citatur in Isagoge inter scripta Galeni quae recensetur cap. 10; si enim fuerit discipulus Praxagorae Xenophon simulque Erasistrati assecla, certo pertinet ad antiquissimos hujus viri sectatores, qui eodem tempore ac ille vel jam paulo ante illum vixerunt, quoniam eundem habuit magistrum ac Herophilus, qui etiam eodem tempore ac Erasistratus vel paulo ante illum floruit; inde Sprengel solummodo unum enumerat Xenophontem Coium Erasistrateum (Pragmat. Gesch. der Medizin Tom. I. pag. 571); Fabritius vero duos distinguit Xenophontes: Erasistrateum et Coium (Biblioth. Graeca Tom. XIII. pag. 45 et 46). Praeterea Xenophon etiam sine cognomine citatur a Galeno (de diebus decretoriis Lib. II. cap. 7) et Caelio Aureliano (Chron. Lib. II. cap. 13); ceterum de Xenophontis aut Xenophontum vita scriptisve vix aliquid mentione dignum memoriae traditum est.

Ibid. Not. (1). lin 2. *τμήματι*. Fortasse hic quidem legendum est *μνήματι* (Commentatione), nisi exciderit vox *τρίτω*; legitur enim in tertio Comment. ad Librum Hippocratis de humoribus, quae Galeno adscribitur: *terminthi vero sunt eminentiae in cute consistentes, rotundae, colore ex nigro et viridi, similes ciceris fructui. Haec explicatio tamen petita videtur ex Dioscoride Alexandrino, nam Paulus Aegin Lib. IV. cap. 24: Διοσκορίδης δὲ ὁ Ἀλεξανδρεὺς φησὶ: τερέβινθοι εἰσὶν ὑπεροχαὶ ἐπὶ τοῦ χρωτὸς συνίσταμεναι, ῥοστρογγύλαι, μελανόχλωροι, εἰκνυῖαι τερέ-*

βίνθου καρπόν. Ex hoc loco patere videtur, auctorem commentationis in Hippocr. lib. de humoribus hic pro *τερέβινθου* legisse *ερέβινθου* (Cicer).

Ibid. IX. lin. 10. *τερέβινθου.* Terebinthina vel certe Terebinthina Cypria Dioscoridis (Lib. I. cap. 91) erat resina, quae destillabat ex Pistacia Terebintho Linn.; Dierbach tamen (Die arzneimittel des Hippocr. pag. 220) dubitat, num Terebinthina, quam memorat Hippocrates, oriatur ab eadem arbore vel a Pino Abie. Ceterum de hujus arboris facultatibus conf. Theophrastus Hist. Plant. Lib. IV. cap. 5 et Lib. III. cap. 15, ubi distinguit inter Terebinthum masculam et feminam, Dioscorides l. l. Galenus de simpl. medic. temper. ac facult. Lib. VIII. cap. 17. § 4 et cap. 19. § 1. Oribasius Medic. Collect. Lib. XV. cap. 1. Euporist Lib. II. cap. 1. Aëtius Tetrabi. I. I. et Paulus Aegineta Lib. VII. cap. 3.

Pag. 36. lin. 1. *Ἰπποκράτης ἐν ἐπιδημιαῖς.* Rufus hic verosimiliter respicit Aphorism. 28. Sect. 3. Lib. VI, ubi fere eadem dicuntur ac loco supra memorato Libri de humoribus atque ubi fere eadem Galenus in Comment. sua ad hunc librum monet ad vocem *τέρεβινθος* ac Pseudo Galenus in Comment. ad Lib. de humoribus, praeter quam quod Galenus *τερέβινθον* non mutavit in *ερέβινθον*.

Ibid. X. in tit. *Διοκλέος.* Diocles erat medicus celebris ex antiqua schola dogmatica, qui brevi post Hippocratem vixit. Multos libros conscripsisse videtur, e quibus tamen nihil nobis superest, nisi Epistola ejus ad Antigonum regem, quae tamen a

Schulze (teste Sprengel Pragmat. Gesch. der Medizin Tom. I. pag. 484) nonnullisque aliis spuria habetur, quia parum differt ab Epistola ad Antiochum regem, quae sub nomine Hippocratis venit et Marcelli Libro de medicamentis praefigitur. Invenitur autem illa Epistola apud Paulum Aegin. Lib. I. cap. 100 et praeterea prodiit cum versione Librorum Alex. Tralliani Basil. 1541 fol.; Latine etiam vertit Nicolaüs Petrejus et ad calcem Meletii Philosophi de natura hominis vulgavit Venetiis 1552. 4°. Ex versione Antonii Mizaldi denique Paris. 1573. 8°. prodiit cum Arnoldi Villanovani ad regem Aragonum de salubri hortensium usu et variis ejusdem Mizaldi de Sena herba, de artificiosa comparatione hortensium fructuum, olerum, uvarum hortoque medico. Et ad scholae Salernitanae calcem Francof. 1612. 12°. atque Hagae Comitum 1683. Graece et Latine adhuc exstat ad calcem Syllogarum Physicarum Michaëlis Neanovi 1591. 8°. (Fabricius Biblioth. Graeca Tom. 12. pag. 462 sqq. et 585, ubi etiam ipsa illa epistola legitur).

Citantur autem a variis auctoribus sequentes Dioclis libri nunc deperditi:

- 1°. Libri *ὀργανῶν*. ad Plistarchum, quos citat Galenus de alimentorum facultatibus Lib. I. cap. 1.
- 2°. Lib. de passionibus, causis et curationibus. Citat illum Caelius Aurel. Acut. Lib. II. cap. 3. multisque aliis in locis.
- 3°. Anatomica, quos citat Galenus Comment. II. in Hippocratis Librum de natura hominis.

- 4°. *Ἀρχίδαμος*, quem citat Galenus de simplic. medicam. temper. ac facult. Lib. II. cap. 5.
- 5°. *περὶ τῶν κατ' ἰητρῆιον*, quem citat Erotianus in voce *ἄμβην*.
- 6°. *Ῥιζοτομικόν*, quem citat Scholiastes ad Nicandri theriaca vs. 647.
- 7°. *περὶ πυρίων*, quem citat Eutocius in Archimedem de Sphaera (teste Fabricio l. l.), nisi hic alium Dioclem respiciat.
- 8°. Prognosticon Liber, qui citatur a Caelio Aureliano Chron. Lib. IV. cap. 8.
- 9°. *περὶ γυναικείων* Librum, quem citat Galenus Comment. in Hippocratis de Epidem. Lib. I.
- 10°. De egestionibus, quem citat Caelius Aurelianus Chron. Lib. IV. cap. 8.
- 11°. *περὶ λαγάνων*, qui citatur a Galeno Comment. IV in Librum Hippocratis de articulis.
- 12°. *περὶ ἑβδομάδων*, qui citatur a Galeno eodem loco.
- 13°. *περὶ ἐπιδέσμων*, qui citatur a Galeno Comment. III in eundem Hippocrat. Librum.
- 14°. De febribus, qui citatur a Caelio Aurel. Acut. I. 12.
- 15°. De alimentorum praeparatione, quem citat Oribasius Collect. medic. IV. 3.
- 16°. *περὶ θανασίμων Φαρμάκων*, qui citatur ab Athenaeo Deipnosoph. XV. pag. 320.
- Non possum, quin tandem et hic referam singularem hujus viri opinionem tantam apud omnes medicos celebritatem nactam, quam nobis tradit

Galenus (de differentiis pulsuum Lib. III. cap. 6) omnem nempe sudorem esse signum conditionis praeternaturalis.

—Ibid. lin. 6. ὀρφνώδες. Nisi hic subintelligatur particula *τι*, haud dubie legendum est ὀρφνώδης.

—Ibid. Not. (1). Quoniam adnotatio haec, quemadmodum hic legitur, nullam fere explicationem patitur et eadem fere inveniuntur apud Erotianum ad vocem ὀρφνώδες, verisimile mihi videtur, illam ex Erotiano esse transscriptam cum omissione vocum ὀρφνη γέ: ibi enim legitur: Ὄρφνώδες) σκοτεινόν. Ὄρφνη γέ λέγεται ἡ σκοτία.

—Ibid. XI. lin. 6. σιλφίου lin. 8. αἱματικὴν λίθον pag. 9. κώνειον. Σίλφιον erat laser vel succus laserpitii; quatenam vero planta fuerit Laserpitium antiquorum, nondum inter viros doctos constat; uti testatur enim Cl. Dierbach, (Die Arzneim. des Hippokr. pag. 203) laserpitium Cyrenaicum multi oriri putant a Ferula tingitina vel Laserpitio gummifero, laserpitium Medicum vero a Ferula assa foetida; Dierbach ipse tamen credit, utramque speciem ab eadem arbore oriri atque secundum della Cella quidem a Thapsia Silphium, quae tamen a Gussone et de Candolle modo varietas habetur Thapsiae Garganicæ; nuper vero pro lasere antiquorum habuerunt Laserpitium Derias Pacho, quae forte eadem est (Dierbach Flora Apiciana pag. 74 et 75). Plinius (Nat. Hist. Lib. XIX. cap. 3) laserpitii refert species tres: Cyrenaicum, Medicum et Syriacum, quod et magydaris dicebatur, quocum consentit Theo-

phrastus, qui (Hist. Plant. Lib. VI. cap. 3) differentiam inter laserem et magydarin describit; Dioscorides vero tres supra laudatas species enumerat, verum etiam addit magydarin, quae in Libya nascitur (Lib. III. cap. 93).

Αιματιτῆς λίθος (sic enim legendum mihi videtur, non vero *αίματικῆν*) etiam ab aliis auctoribus commendatur, praecipue in oculorum morbis; a Plinio autem (Nat. Hist. Lib. XXXVI. cap. 16) species magnetis dicitur; an vero fuerit eadem materia, quae et hodie dicitur lapis haematitis, concludere non audeo.

Κώνιον vel *κόνιον* erat Conium maculatum Linn.; teste Dioscoride (Lib. IV. cap. 79) maxima efficacissimaque vis erat Creticae, Megareae, Atticae et quae in Chio ac Cilicia nascitur. De his tribus medicamentis autem conf. Theophrastus l. l. et Lib. VI. cap. 11. Lib. VIII. cap. 2 et Lib. IX. cap. 8 et 15 et Lib. de lapidibus, Dioscorides l. l. et Lib. V. cap. 44. Plinius l. l. et Lib. XXIV. cap. 13. Galenus de simplic. medic. temper. ac facult. Lib. VII. cap. 10. § 67, Lib. VIII. cap. 18. § 16, Lib. IX. cap. 2. § 2. Oribasius Collect. Medic. Lib. XII, XIII et XV. cap. 1 et Euporist. Lib. II. cap. 1. Aëtius Tetrab. I. l. et I. II. cap. 13. Paulus Aegin. Lib. VII. cap. 3.

Pag. 38. XII. lin. 3. φασὶ δὲ συνεδρῆσειν αὐτῷ ἔρευθος μετὰ οἰδήματος ὡσπερ καὶ τῷ φύματι καὶ οὐκ ἔλασσον ἔμπυον τοῦ φύματος γίνεσθαι. Colon ante ὡσπερ mihi hic delendum esse videtur.

Ibid. lin. 7. *ὅτι ὁ μολύδικος.* Vix dubium mihi videtur, quin hic vitium irrepserit atque *μολύδικον* sit legendum pro *μολύδικος* et *ὁ* vel *τὸ* pro *ὁ*, sed praeterea vox *μολύδικος* mihi plane est incognita; hanc ob rem illam derivari a *μολύνω* polluo et verti sordidae indolis.

Ibid. XIII. in tit. *συρίγγων.* Eodem modo fere ac in adnotatione ad hanc vocem definitur illa, definitur quoque ab Aëtio Tetrab. IV. II. cap. 55. Paulo Aegin. Lib. IV. cap. 49 et Actuario de meth. med. Lib. IV. cap. 16, eadem etiam adhibita comparatione; et totum Caput, de quo nunc agimus, fere iisdem verbis expressum invenimus apud Aëtium l. l. Galenus vero (de tumoribus praeter naturam cap. 5) *ἔτι δὲ καὶ ἡ σύριγξ*, inquit, *ὀνομαζομένη στενὸς καὶ προμήκης κόλπος, ὁμοίως τοῖς ἄλλοις κόλποις προστελλομένη τε καὶ αὐθις ἀφισταμένη δι' ἐπιρροήν περιττωμάτων, ὡσπερ ἐκείνοι;* Auctor vero Definit. med. N°. 421. *Σύριγξ ἐστὶν ὑποφορὰ τυλώδης, στενὴ καὶ ἐπιμήκης ἔσθ' ὅτε καὶ σκολιωμένη ἀναπούλωτον ἔχουσα τὸ στόμιον, δι' οὗ ὑγρὸν κατὰ τινὰς καιροὺς ἐκκρίνεται.* Celsus fistulam sequenti modo definit: id nomen est ulceri alto, angusto, calloso (Lib. V. cap. 28. § 12), qui locus omnino cum hoc capite conferri meretur.

Pag. 40. lin. 3. *ἐπεὶ αἱ μὲν αὐτῶν εἰσὶν εὐθυτενεῖς · αἱ δὲ σκολίαι καὶ τῶν εὐθυτενῶν · αἱ μὲν,* Punctum pone *εὐθυτενεῖς* mihi in comma mutandum esse videtur et colon pone *εὐθυτενῶν* tollendum.

Pag. 42. lin. 10. κατανοήσωμεν. Vix dubium videtur; quin hic pro κατανοήσωμεν legendum sit κατανοήσομεν. οὗ ἴσιν οὐδὲ κατανοήσωμεν ὅτι κατανοήσωμεν.

Ibid. lin. 12. in marg. Γρ • τὸ τέλος. Hujusmodi adnotationes infra saepius occurrunt variamque lectionem indicare vel explicationi codicis inservire et ab aliquo grammatico profectae esse videntur; plerumque tamen lectio harum notarum paulum a lectione contextus differt; nonnumquam etiam infra inveniuntur in margine adnotationes, quibus adscriptae sunt literae Cod.; has emendationes habui editoris.

Ibid. lin. 21. τὰ δὲ ἀντὶ παρακολουθῶν καὶ ταῖς εἰς μὴν καθηγουσῆαις σύριγξι. Hic pro παρακολουθῶν mihi legendum esse videtur παράκολουθεῖ, quemadmodum et infra lin. 26; licet mihi vix verisimile videatur sic legi ob vitium typographi vel illius, qui codicem transcripsit, quoniam bis idem nomen hic occurrit.

Ibid. lin. 22. σαρκί. Σάρξ apud Hippocratem fere semper significat musculos, uti patet ex Galeni Comment. II. in Hippocratis Lib. de fracturis: οὗς ἡμεῖς μὲν εἶπομεν, ἐν τῷ προγεγραμμένῳ λόγῳ τοὺς ὀνόμασι σάρκα, συνήθει χρώμενος τῇ πρόσσηροῖα. Rufus Ephesius vero huic voci tribuit significationem magis generalem; Lib. I. enim de appell. part. corp. hūm. cap. 35: Σάρξ autem, inquit, in visceribus illud est, quod inter vascula concretum reperitur, subtegmen quoddam ac veluti receptaculorum texturæ fartum, quo inania ejus spatia compleantur. In

musculis *σαρξ* pars fibrosa ac firma est et quae in ulceribus ossiumque cavis recens concrevit. Prima tamen significatio a Rufo voci *σαρκι* tributa tempore Galeni non amplius usitata fuisse videtur, nam Lib. X. de meth. med. cap. 11. sequentia dicit Galenus: *ἀλλὰ τὰ μὲν ἐν τοῖς σπλάγγνοις, οἷα ἥπατι καὶ νεφροῖς καὶ σπληνι καὶ πνεύματι, παρεγγύματα καλοῦσι· τὰς δ' ἐν ἐντέροις, καὶ γαστρὶ καὶ στομάχῳ καὶ μήτρα ἀγωνύμους ἀπολείπουσι.* Galenus igitur hac voce mihi magis indicare videtur telam cellulosa, cui sententiae favere videtur locus in Comment. I. Galeni ad Hippocratis librum de fracturis inveniendus, ubi describit texturam musculorum: *ὁ γὰρ τοι μῦς ὅλος ὑπὸ τῆς φύσεως γεννᾶται ταῖς ἴνεσι ταύταις, ἐπιπηγνυμένης ἐν κύκλῳ τῆς ἀπλῆς σαρκὸς, καὶ αὕτη τοῦ μύος ἐστὶν ἡ ἰδιὰ οὐσία* atque hac significatione etiam hic vox mihi adhiberi videtur, dum pus quod ex *σαρκὸς* effluit fistula dicitur *παχύτερον καὶ ἀργότερον.*

Pag. 44. XIV. § 1. Cum hac § omnino conferatur Celsus Lib. VII. cap. 4. § 1.

Ibid. lin. 33. *τυλλους*. Certo pro *τυλλους* hic legendum est *τιλους*.

Pag. 46. lin. 1. *τὸ πλατὺ μήλης*. (Vix dubium videtur, quin hic inter *πλατὺ* et *μήλης* inserendum sit *τῆς*. *Τὸ πλατὺ τῆς μήλης* autem erat cochlearculum in extremitate nonnullorum specillorum certae cujusdam mensurae capax, quo nonnumquam utebantur antiqui ad quantitatem medicaminum determinandam, uti patet ex Hippocr. Lib. de rat.

vict. in morb. acut. in fine, ubi adversus hydro-
pem anasarcam commendantur *λέπιδος μηλαί τρεῖς*
τῷ πλάτει. Galenus in Exeg. et hanc vocem expli-
cat *τῷ κναθίσκῳ τῆς ὀφθαλμικῆς μήλης*. *Κναθίσκος*
autem *μηλωτρίδος* etiam occurrit apud Nicol. Myreps.
Sect. XLVIII. Cap. 6., ubi tamen Leonhardus Fuch-
sius, qui hunc auctorem Latinitate donavit, hanc
vocem non rite intellexisse videtur, quoniam in ad-
notatione sua ad hunc locum dicit: »generatim ve-
ro *κναθίσκος* Graecis specillum significat.” Haec pars
autem Latine dicebatur aversum specillum vel auri-
scalpium, uti patet ex Marcelli de medicamentis Cap.
31: »Auriscalpio averso, quam partem *κναθίσκον*
Graeci vocant.”

Ibid. lin. 2. *πυρίνα*. Aliis in locis capitulum spe-
cilli etiam dicitur *πυρήν*.

Ibid. lin. 15. *τετερηδομισμένον*. *Τερηδών* erat mor-
bus ossium, qui sequenti modo a Galeno definitur in
Definif med. N°. 395: *τερηδών ἐστὶν ὀστού κατάτρησις*
ἀπὸ φθοράς · τὸ δὲ ὄνομα τῷ πάθει ἀπὸ τῶν συμβεβη-
κότων τρημάτων; οἷοι τὶς τρηδῶν οὔσα. *Τερηδών*
autem vel *τρηδών* significatione primaria indicabat
vermem ligna corrodens, uti patet ex Hesychio (Tom.
II. pag. 166) et Suida (Tom. III. pag. 449).

Ibid. 3. lin. 2. *τετραγώνων ἐκκοπέων*. Cujusmodi
fuerint hi *τετραγῶνοι ἐκκοπεῖς* uti et *γομφωτῆρες*, qui
infra pag. 48. lin. 5. memorantur, definire nequeo,
quoniam apud nullum alium auctorem occurrunt,
quantum scio; ob adjectivum *στένων* tamen conjicere licet *γομφωτῆρες* non multum differre a *ξυστήρες*,
de quibus supra diximus.

Pag. 48. lin. 15. μετὰ τοῦ γυμνωθῆναι. Hic, ut mihi videtur, pro τοῦ legendum est τὸ.

Ibid. lin. 22. σπάθην. Σπάθη apud Oribasium Collect. Medic. Lib. XLIV. Cap. 4., uti et apud Celsum Lib. VIII. cap. 15. significabat instrumentum oblongum, quo utebantur ad membra luxata reponenda; vel quod saltem partem constituebat machinamentorum ab antiquis ad hanc rem adhiberi solitorum; ideo hic mihi videtur instrumentum ejusdem figurae, verum multo brevius minusque.

Ibid. ἔπειτα μηνιγοφύλακα ὑπερβάλλοντες ἢ σπάθην τῶν ξυλίνων τούτων ἢ καὶ τι ἕτερον ὁμοιοειδές τούτοις σῶμα κατ' ἐπικόπου τούτων τινός. Colon post τούτων mihi tollendum esse videtur. Verba κατ' ἐπικόπου, duce adnotatione (2), verti ut *fulcimento inseruiat*; vulgo autem τὸ ἐπίκοπον dicitur mensa, in qua lanii carnes concidunt, quacum hic aliquo modo conferri videtur spatha vel meningophylax.

Pag. 50. lin. 15. μελανθέν ἢ λιπανθέν ἢ τερηδομισθέν. De his morbis ossium conferatur Celsus Lib. VIII. cap. 2; hicce auctor enim ibi distinguit duos ossium morbos; cariem vel teredinem et nigritiem, quorum uterque tamen eo incipiebat, quod os pingue fiebat. Ossa pinguefacta (λιπανθέντα) videntur igitur esse ossa carie vel necrosi in primo stadio affecta; caries veterum videtur idem esse morbus, qui et nunc dicitur caries, cum Celsus l. l. mollietiem semper tamquam princeps signum affert, quo ossa carie affecta a sanis distinguuntur; nigrities forsitan erat necrosis vel saltem illa species necrosis,

quae nigro colore est tincta; non semper certe mollia fuisse videntur ossa; quae ab antiquis *μελάνθεντα* dicebantur.

Ibid. Not. (2) *δυσσεργέστερα μένη τε καὶ οὐ πάντῃ δυσκατόρθωτος.* Haec lectio mihi lectioni contéxtus postponenda esse videtur.

Pag. 52. 7. lin. 16. *τῶν ἐκτυλωτικῶν φαρμάκων.* Talia medicamenta nonnulla enumerantur a Paulo Aegin. Lib. IV. cap. 49.

Pag. 54. lin. 9. *πλαγῆα.* Πλαγῆα hic videtur esse femininum cujusdam adjectivi *πλαγῆς* vel *πλάχειος*, quod idem significat ac *πλάγιος*, licet tale adjectivum nusquam alibi occurrat, nisi solummodo hic legendum sit *πλάγια* vel etiam *πλατεῖα*.

Ibid. lin. 12. *πλατυμήλης.* Hic haud dubie pro *πλατυμήλης* legendum est *πλατυμήλην* vel *τὸ πλατὺ τῆς μήλης*.

Ibid. lin. 15. *ἔστορισμένα.* Vix dubium videtur quin hic pro *ἔστορισμένα* legendum sit *ἔστορέσιμένα*.

Ibid. 9. lin. 3. *τῶν τεμασητήρων καὶ τῶν κροταφιδίων μύων.* De situ horum musculorum conf. Rufus Ephesius de appell. part. corp. hom. Lib. I. cap. 20.

Pag. 56. lin. 1. *εἰ δὲ κατὰ τὴν ὑπερώαν ἐκ τῶν ἐνδοθέντων μερῶν συστάσα ἢ σιρίγξ φθείρει τὸ ῥοστόν; εἰ μὲν διὰ πάχους ἐκ τῶν ἔξωθεν μερῶν καὶ τὰ μῆλα χιάσαντες, οὕτως ἐκκόπομεν τὸ ῥοστόν.* Hic mihi comma inserendum esse videtur pone *πάχους*.

Ibid. 10. lin. 6. *καλάμισσοις.* Quam figuram habuerint hi *καλάμισσοι*, definire non audeo, quia apud

nullum alium auctorem occurrere videntur, licet illam jam aliquo modo ex ipso nomine conjicere possumus.

Pag. 58. lin. 5. ὀριγανοποιΐας. Loco ὀριγανοποιΐας hic mihi legendum esse videtur ὀργανοποιΐας.

Ibid. 11. lin. 1. ὄσαι δὲ εἰς βρόχον καθήκουσι σύριγγος. Vix dubium mihi videtur, quin hic pro βρόχον legendum sit βρόγγον et pro σύριγγος σύριγγες.

Ibid. lin. 13. εἰ δ' ὀλίγον ὁ ὑπέζωκως πάθοι . . . παραπλησίως ἐγχορήσομεν ὡσπερ καὶ ἐπὶ τῶν εἰς βρόχον κατατεινουσῶν. Hoc loco vocem ἐγχορήσομεν mutavi in ἐγχειρήσομεν et colon ante ὡσπερ delevi.

Ibid. 12. lin. 5. γαστροῤῥαφίας. Hujus operationis methodus legitur apud Galenum de meth. med. Lib. VI. cap. 4., quem secutus est Paulus Aegin. Lib. VI. cap. 52.

Ibid. lin. 6. εἰ δὲ μὴ ἐπιδέχοιτο τὸ σχῆμα τῆς σύριγγος μυρσινοειδῆ περιαιρέσειν κυκλοτερῆ, περιγράψαντες, τὸν κατὰ συνσάρκωσιν τῆς θεραπείας ἐπάξομεν τρόπον. Comma pone κυκλοτερῆ mihi tollendum esse videtur.

Pag. 60. lin. 5. τῦλοι. Liceat mihi hic inserere definitionem τῦλου apud Paulum Aegin. Lib. VI. cap. 77. invenienda: ὁ δὲ τῦλος ναστὴ τις ἐστὶν καὶ λευκὴ καὶ ἄνικμος σὰρξ, διὸ καὶ ἀνώδυνος, μήτε φλεβὸς μήτε νεύρου διατείνοντος εἰς αὐτήν.

Ibid. 13. lin. 2. τὰ δ' ἐν τοῖς οὖλοις συρίγγια. De his fistulis conferatur Aëtius Tetrab. II. IV. cap. 26.

Ibid. lin. 7. ἐπὶ δὲ τῆς ἕδρας φανεράς μενούσης τῆς σφριγγος. De ani fistulis earumque incisione etiam legantur Aëtius Tetrab. IV. II. cap. 11, Paul. Aegin. Lib. VI. cap. 78 et Actuarius de meth. med. Lib. IV. cap. 6. Pag. 62. 15. lin. 3. σφριγγοτόμον. Instrumentum, de quo hic agitur, erat falcatum, uti patet ex Paulo Aegin. Lib. VI. cap. 78., ubi dicitur δρέπανον σφριγγόστομον et secundum Sprengel (Pragmat. Gesch. der Mediziu Tom. II. pag. 132) capitulo instructum; nisi tamen verba apud Paulum legenda cap. 52. (teste Jano Cornario in adnot. sua ad illud valde corrupta) sint depravata, omnia σφριγγότομα non erant falcata, nam illic sermo est de σφριγγώμασι ὀρθοῖς, licet apud Galenum de meth. med. Lib. VI. cap. 4., unde hoc Pauli caput exscriptum esse videtur, legatur τὰ καλούμενα σφριγγότομα; addit porro Galenus τὰ δ' ἀμφήκη τῶν μαχαίριων, ἢ κατὰ τὸ πέρας ὀξεία παντὶ τρόπῳ φευκτέα, unde colligere possumus σφριγγότομα neque ancipita fuisse, neque cuspidē acuta instructa; itaque ex his omnibus mihi etiam vero satis simile videtur, ἡμισπάθον vel ἡμισπάθιον in universum ab antiquis vocari scalprum acuta cuspidē carentem unaque acie instructum; videtur enim et in fine hujus capituli ἢ ὀξεία opponi τῷ ἡμισπάθῳ, subaudita fortasse voce σμίλη; ad fistulam ani occultam vero perviam reddendam Paulus adhibet κοπάριον, quod forte nullo modo ab ὀξείας differt.

Pag. 64. 16 lin. 8. ἱπποτηρίῳ. Vix mihi dubium videtur, quin hic de instrumento aliquo fiat sermo,

licet, quantum scio, apud nullum alium auctorem hoc nomine instrumentum quoddam indicetur ideoque ejus figura determinari non queat; apud Galenum tamen de medic. compos. sec. gen. Lib. IV. cap. 7 et Aëtium Tetrab. III. II. cap. 22. citatur malagma Ipoterium inscriptum, de quo sequentia Philagrii verba affert hicce: »Pharmacum accom-
» modatum ac prosperi successus, cujus periculum
» feci in hydropicis, splenicis et affectionibus inve-
» teratis: deprimit enim tumorem.”

Ibid. 17. lin. 6. *καθετήρ*. *Καθετήρ* erat instrumentum oblongum, cavum, rectum, incurvum, quod adhibebatur ad medicamenta in vesicam urinariam infundenda, uti colligere possumus ex Galeni de meth. med. Lib. V, ubi saepius hujus instrumenti fit mentio. Explicatio enim hujus vocis, quae hodie in Galeni Exeg. legitur, (teste Foësius Oecon. Hippocr. ad vocem *καθετήρ*) ad loca corrupta pertinere videtur, quoniam in illo loco Hippocr. (de morbis mulierum Lib. II. pag. 659), ad quem unice haec explicatio referri possit, in optimis MSS. non legitur *καθετήρ*, verum *καθετήριον*. Quomodo autem in vesicam immitti debeat illud instrumentum, nos docet Paulus Aegin. Lib. VI. cap. 59.

Ibid. lin. 9. *ἵνα ασύντρογον φυλάξωμεν τὸν τῆς κύστεως τράχηλον*. Varias erant partes, quas laedere aut incidere quam maxime verebantur antiqui quasque tamen satis tuto laedi vel incidi posse recentiorum docuit experientia. Ad has partes imprimis pertinet vesica urinaria, uti patet, cum ex hoc loco, tum ex variis

antiquorum locis, ubi de lithotomia agunt, quam vel plane rejiciunt ob metum, ne fistula remaneat, uti Aëtius Tetrab. III. III. cap. 5, vel nonnisi in gravissimis casibus, ubi mortis periculum imminet, instituere commendant, postquam prius tentaverant, an calculi etiam concussione totius corporis aegroti in urethram propelli et ex illa ope vulsellae extrahi possent, verum etiam in delineationibus hujus operationis, quae apud illos leguntur, ubique hunc metum deprehendimus. Celsus enim Lib. VII. cap. 26, de illa agens: » Neque vero festinanter in hac » re, inquit, agendum est; sed ita, ut quam ma- » xime id tuto fiat. Nam laesa vesica nervorum dis- » tentiones-cum periculo mortis excitat.” Nihilomi- nus tamen iucisuram ipsius vesicae calculo paulo majorem facere jubet, » quia calculus iter, cum vi » promitur, facit, nisi accipit. Ex quo et sanguinis » profusio et distentio nervorum fieri potest, quae » si quis evasit, multo tamen patientiorem fistulam » habiturus est, rupta cervice, quam habuisset, in- » cisa.” Paulus Aegin. autem, qui hanc operationem adeo negligenter describit, ut dubitemus, an cutem ceteraque integumenta seorsum, an simul cum collo vesicae findat, Lib. VI. cap. 60 valde metuit, ne nimis magnum vesicae infligat vulnus, dicens l. l.: *ὥστε τὴν τομὴν ἔξωθεν ἐνρυχωρίαν ἔχειν, ἔνδοθεν δὲ μὴ πλέον ἢ ὥστε τὸν λίθον δυνηθῆναι δι' αὐτῆς ἐκπεσεῖν.* Aretaeus de curat. acut. morb. Lib. II. cap. 9. modo obiter hujus operationis mentionem facit. Huic autem metui verisimiliter suam etiam

originem debet lithotomia ope apparatus magni. Porro ad partes, quibus incisus adeo timebant veteres, recensendus quoque est sphincter ani, uti patet ex § 14. hujus capituli et ex variis auctoribus; quos citavi ad pag. 60. § 13. lin. 7 l. l.

Ibid. lin. ult. et seqq. κρυπτῆς δὲ σύριγγος γενομένης cet. usque ad καὶ ὄλκῳ ἐκτέμνεται. Primo ad spectu sensus horum verborum aliquantulum videtur obscurus, verum si τὴν σύριγγα consideremus tamquam explicationem verborum τῆς δ' ὑποφορᾶς πλάτος ideoque haec referamus ad verbum ἀποτεῖναι, si porro colon pone ὄντος mutemus in comma, sensus, ut mihi videtur, multo fit clarior; vocem ὄλκῳ autem, quae mihi primum instrumentum quoddam significare videbatur, nunc consideravi tamquam rationem explicans, qua incisio fieri debeat; tale instrumentum enim apud nullum alium auctorem memoratum inveni.

Pag. 66. 18. lin. 4. δακτύλου. Vix dubium videtur, quin hic pro δακτύλου legendum sit δακτυλίου.

Ibid. lin. 5 ἤ. Si hoc loco pro ἤ legamus ἦ, haec verba mihi multo meliorem sensum praebere videntur.

Ibid. lin. 7. τῷ ἐδροδιαστολεῖ διοπτρίῳ λέγω. Tale instrumentum ad anum vel vaginam dilatandam explorandamque jam occurrit apud Hippocratem sub nomine κατοπτῆρος Lib. de fistulis pag. 884 et de haemorrh. pag. 893; Galenus enim in Exeg. ad vocem: τῷ καλουμένῳ ἐδροδιαστολεῖ, inquit, ὡσπερ

γε καὶ δίοπτρα ὁ γυναικῶν διαστολεὺς et Erotianus ad vocem κάτοπτρον (ubi fortasse legendum est κατοπτήρ) dicit τὴν μηλωτήν, ubi haud dubie de μήλη διαστομωτρίδι est cogitandum. Paulus Aegin. etiam variis in locis speculum ani vel vaginae dicit δίοπτραν, uti Lib. III. cap. 65, Lib. VI. cap. 73 et 78; erat autem forceps, cujus rami ope cochleae distendebantur (Sprengel Pragmat. Gesch. der Medizin Tom. II. pag. 131). Ceterum omnia, quae hac §. continentur usque ad verba ταῦτα γινέσθω ἐπὶ τῶν μονοστόμων cet., fere iisdem verbis expressa leguntur apud Paul. Aegin. Lib. VI. cap. 76, ubi citantur ex quodam Leonidae libro; dum etiam Aëtii Tetrab. IV. II. cap. 11, quod de fistulis ani agit, in titulo ex Leonida petitum dicitur, unde ego mihi satis tuto concludere posse videor, libros Heliodori vel Antylli, ex quibus Oribæsius haec depromsit, aetate Aëtii et Pauli Aeginetae jam deperditos vel saltem his auctoribus incognitos fuisse ideoque illos de fistulis ani Leonidam consuluisse, qui etiam sua de hac re scripta ex Antyllo vel Heliodoro exscripserat. Hinc etiam verba αὐτοῦ ἐκ τῶν Λεωνίδου κεφαλαίων ex adnotatione ad calcem hujus pag. excidisse et nescio quo casu fortuito ad notam ad calcem sequentis pag. translata esse videntur; verba enim ἐν τούτῳ, quae nunc satis inepta hic legi videntur, tunc a quolibet statim intelligentur, qui sciat, apud Paulum Aegin. l. l., ubi verba Leonidae citat, legi: τῷ ἐδροδιαστολεῖ, τῷ μικρῷ δίοπτρῳ λέγω. Haecce methodus ta-

men, sive ejus auctor fuerit Antyllus, sive Heliodorus, Paulo Aegin. non multum probanda videtur, quia ἔδροδιαστολεὺς saepius potius tenebras effundit, quam lucem affert. Erat autem Leonidas unus ex novissimis scholae pneumaticae sectatoribus Galeno etiam serior, quem citat in fragmento ab Aëtio l. l. nobis servato; citatur autem a Caelio Aureliano Acut. Lib. II. cap. 1. et ab auctore Isagoges, quae Galeno adscribitur, cap. 4. De ejus operibus nil nisi fragmenta exstant apud Aëtium et Paulum Aegin., inter quae multa inveniuntur lectu haud indigna.

Pag. 68. lin. 15. φιμός. Φιμός, uti dicit Galenus (Definit. Med. N°. 415), ἐστὶν ἡ τῶν πόρων φυσικῶν κατάκλεισις atque hoc sensu etiam vox occurrit apud Paulum Aegin. Lib. III. cap. 73, licet Lib. VI. cap. 55. hac voce indicetur atresia praeputii, quae alioquin, uti et hodie, dicitur φίμωσις.

Pag. 70. lin. 5. νάρθηκιον ἢ φιλέριον σανίδιον. Νάρθηξ erat Ferula communis Linn. vel Ferula glauca Linn; φιλορέα vero erat verosimiliter Tilia Europaea. De viribus ac proprietatibus autem harum plantarum egerunt Theophrastus Hist. Plant. Lib. VI. cap. 2. Lib. I. cap. 20. Lib. III. cap. 10. et Lib. VI. cap. 7. Dioscorides Lib. III. cap. 91. et Lib. I. cap. 125. Plinius Nat. Hist. Lib. XX. cap. 23. Galenus de simplic. medic. temper. ac facult. Lib. VIII. cap. 13. § 4. Oribasius Collect. Medic. Lib. XII. et Lib. XV. cap. 1. Aëtius Tetrab. I. I. et Paulus Aegin. Lib. VII. cap. 3.

Vox νάρθηξ tamen saepe alio sensu occurrit sig-

nificatque assiculum ad membra fracta fulcienda vel firmanda et in eodem situ retinenda, qui ad hunc usque diem etiam ferula dicitur, forsā quia antiquitus ex ligno ferulaceo confici solebat. Quomodo autem se habere debeant, legimus apud Hippocr. de offic. medici pag. 745.

Ibid. 20. lin. 3. τὸν ἐλυτροειδῆ χιτῶνα. De hac tunica, uti in universum de omnibus testiculi integumentis, conferantur Celsus Lib. VII. cap. 18. et Rufus Ephesius de appell. part. corp. hum. Lib. I. cap. 32 et Lib. II. cap. 15.

Ibid. lin. 16. τὸν κεκακωμένον δίδυμον ἀφελῆν. De exstirpatione testiculorum conf. Paulus Aegin. Lib. VI. cap. 78, qui duas hujus operationis tradit methodos, τὴν κατὰ θλάσιν et τὴν κατ' ἐκτομήν; hic tamen auctor mihi non agere videtur de exstirpatione ob morbum aliquem, uti patet ex initio hujus capituli: σκοπὸν ἐχούσης τῆς ἡμετέρας τέχνης, ἀπὸ τοῦ παρὰ φύσιν ἐπὶ τὸ κατὰ φύσιν ἐπανάγειν τὰ σώματα, τῆς ἐναντίας ὁ ἐννυχισμὸς ἐπαγγελλίας τετύχηκεν: ἀλλ' ἐπειδὴ καὶ ἄκοντες πολλοὶς ὑπὸ τινῶν ὑπερεχόντων ἐννουχίζειν ἀναγκαζόμεθα, uti et ratione, quare primam methodum vituperat: οἱ γὰρ τεθλασμένοι ποτὲ καὶ συνουσίας ὀρέγονται.

Pag. 72. in tit. Μέγητος. Meges erat chirurgus eruditissimus (uti dicit Celsus Lib. VII. Praef.) ex secta methodica, qui vixit ultimo ante aeram nostram saeculo; Sidonius dicitur a Galeno de meth. med. Lib. VI. cap. 6., qui locus verosimiliter respicitur in adnotatione ad calcem hujus pag. De ejus operibus

fere nihil amplius exstat; citatur tamen a Celso Lib. V. cap. 28. a Galeno de compos. medicam. sec. loc. Lib. V. cap. 3. a Plinio Lib. XXXII. cap. 7. et a Scribonio Largo de medicam. compos. cap. 202.

Ibid. Lin. 3. *κολλυρίων*. Collyrium Foësius (Oecon. Hippocr. ad vocem) dicit medicamentum longum, rotundum, et in oblongam formam compactum cohaerensque ex succis, liquoribus, seminibus, fructibus et metallicis compositum, quod in usum asservabatur. De illo autem hic afferre liceat mihi quae apud Oribasium leguntur Collect. Medic. Lib. X. cap. 23: » Quae collyria proprie dicuntur, ea » oculis adhibentur; laevigata vero quae communi- » ter integra nominantur, alia opponuntur, alia » imponuntur: apponuntur autem utero: imponun- » tur vero fistulis et sinibus; quaeque utero ad- » hibentur, purgationes provocant, et foetum edu- » cunt, » atque deinceps: » Debent autem collyria » longitudinis quatuor digitorum esse eorumque fi- » gura caudae muris esse similis. Sunt etiam li- » namentis aut filo oblongo appendenda, ut, quum » temporis quod satis sit permanserint, avelli foras » queant. » Conf. tamen et Paul. Aegin. Lib. VII. cap. 16.

Ibid. lin. 18. *ἀλόης ἢ στυπτηρίας ἢ ἰοῦ καὶ λεπιδός*. Aloë Hippocratis aetate nondum cognita fuisse videtur; Galenus etiam plantam, unde oritur, non noverat, (de medic. simpl. temper. ac facult. Lib. VI. cap. I. § 23) licet Plinius illam jam de-

scripsisset (Nat. Hist. Lib. XXVII. cap. 4); variae erant species hujus medicamenti, inter quas optima erat Indica; conf. autem Dioscorides Lib. III. cap. 25. Galenus et Plinius l. l. Oribasius synops. Lib. I. cap. 17 et VII. cap. 11. Medic. Collect. Lib. XI et Lib. XV. cap. 1. Euporist. Lib. II. cap. 1. Aëtius Tetrab. I. I. et I. II. cap. 196. Paulus Aegin. Lib. VII. cap. 3 et 4. Actuarius de meth. med. Lib. V. cap. 8 et Rufus Ephesius de medicam. purgant.

Στυπτηρία, cujus tres species *σχιστή*, *στρόγγυλη* et *ύγρα* enumerantur a Galeno (de medicam. simpl. temper. ac facult. Lib. IX. cap. 3. § 30) cujusque alias etiam species alii auctores memorant, etsi non iisdem semper nominibus utantur, erat Alumen nativum Waller (Dierbach Die Arzneim. des Hippokr. pag. 246); conf. autem de illo Dioscorides Lib. V. cap. 123. Plinius Hist. Nat. Lib. XXXV. cap. 15. Oribasius Collect. Medic. Lib. XIII. et Lib. XV. cap. 1. Aëtius Tetrab. I. II. cap. 74 et Paul. Aegin. Lib. VII. cap. 3.

Ίον erat Viola odorata Linn., cujus varietates colore distinguuntur ab antiquis; Theophrastus enim (Hist. Plant. Lib. VI. cap. 6 et 7) distinguit *λευκόν* et *μελάν*; Plinius vero (Nat. Hist. Lib. XXI. cap. 19) album et luteum et Oribasius Collect. Medic. Lib. XI. album, qui et *λευκοῖος* dicebatur, luteum et purpureum; ceterum de ejus viribus ac proprietatibus conf. Theophrastus l. l. Dioscorides Lib. IV. cap. 122. Plinius l. l. Galenus de simplic. medic. temper. ac facult. Lib. VI. cap. 9. § 3. Oribasius l. l. et Lib.

XV. cap. 1., uti et Euporist. Lib. II. cap. 1. Aë-
tius Tetrab. I. I. et Paulus Aegin. Lib. VII. cap. 3.

Αεπίς Latine dicitur *squama aeris*, a Cl. Dier-
bach vero (l. l. pag. 253) *Kupferschlacke*; de
ejus viribus ac proprietatibus egerunt Dioscorides
Lib. V. cap. 89. Galenus de simplic. medic. tem-
per. ac facult. Lib. IX. cap. 3. § 16. Oribasius
Collect. Medic. Lib. XIII. Aëtius Tetrab. I. I. et
Paulus Aegin. Lib. VII. cap. 3.

Ibid. lin. 23. *σπόγγον ὑπὲρ ὄξει* cet. *Σπόγγον*
erat spongia officinalis, de cujus proprietatibus, usu
atque viribus conf. Dioscorides Lib. V. cap. 138.
Plinius Nat. Hist. Lib. IX. cap. 45, ubi variae ejus
species enumerantur et Lib. XXXI. cap. 11. Ga-
lenus de simplic. medic. temper. ac facult. Lib. XI.
cap. 2. § 11. Oribasius Collect. Medic. Lib. IX.
cap. 23 et Lib. XIII. Euporist. Lib. II. cap. 1.
Aëtius Tetrab. I. II. cap. 73 et I. III. cap. 170
et Paulum Aegin. Lib. VII. cap. 3. De *ὄξους*
(aceti) viribus medicis vero conf. Dioscorides Lib. V.
cap. 21. Plinius l. l. Lib. XIV. cap. 21. Galenus l. l.
Lib. VIII. cap. 15. § 10. Oribasius Collect. Medic.
Lib. XIV. cap. 10. Lib. XV. cap. 1 et Euporist.
Lib. II. cap. 1. Aëtius Tetrab. I. I. Paul. Aegin.
l. l. et Actuarius de meth. med. Lib. VI. cap. 1.

Pag. 74. lin. 2. *ἄρτον πεπονημένον*. Haud incon-
gruens mihi videtur, hic nonnulla monere de variis
speciebus panis apud veteres usitatis, licet exinde
mihi nondum satis dilucide pateat, quid fuerit
ἄρτος πεπονημένος, quae species, quantum scio, apud

nullum alium auctorem occurrit ; haud dubie tamen pertinebat ad panis species aliqua cura paratas et fortasse quidem idem erat ac *ἄρτος κλιβανίτης*. Ordiar autem a pane triticeo atque in hac re Galeum (De Alimentorum facult. Lib. I. cap. 2) ducem sequar , qui varias species enumerat , quae , cum materie , unde conficiebantur , tum ratione , qua parabantur , a se invicem distinguebantur. Itaque , quod ad materiam attinet , memorat

1°. *ἄρτον σιλιγγίτην* , omnium purissimum , qui parabatur ex siligine , i. e. farina e praestantissima quadam tritici specie etiam siligine dicta , quae a Plinio (Nat. Hist. Lib. XVIII. cap. 8) dicitur tritici deliciae. Antiquis autem praeter hanc cognitae erant tres tritici species *πυρόν* sine cognomine Hippocratis vel similaceum Oribasio (Medic. Collect. Lib. I. cap. 2) ; *πυρόν τριμηνιαῖον* (Hippocr. de morbis mulierum Lib. I. pag. 623) et *πυρόν σιτάκιον* omnium praestantissimum. Has tres species autem Cl. Dierbach (Die Arzneim. des Hippokr. pag. 24) omnes oriri putat a Tritico vulgari Séringe , quod etiam patere videtur ex Oribasio l. l. , qui refert has species in se invicem transire pro ratione soli , in quo coluntur : Cl. Spengel tamen (Theophrastus Naturgeschichte der Gewächse II. 295) Triticum sitanium refert ad Triticum Gaertnerianum Clem.

2°. *ἄρτον σιμιδαλίτην* (panem similagineum) , qui ex similagine i. e. purissima et tenuissima farina parabatur quemque etiam laudat Hippocrates (de victus ratione Lib. II. pag. 356). Hae duae species autem dicebantur *καθαροί*.

3°. *ἄρτον αὐτοπυρίτην* vel *αὐτόπυρον* vel *συγκομιστόν* (panem cibarium vel confusaneum), qui fiebat ex farina a furfure non separata, quique sub utroque nomine etiam occurrit apud Hippocr. (de internis affect. pag. 542, de victus ratione Lib. II. pag. 356 multisque aliis in locis). Haec species vero medium tenebat inter *καθαροῦς* et *ἐνπαροῦς*.

4°. *ἄρτων ἐνπαρῶν* (panum sordidorum) species, quae nunc sequuntur, non seorsum pertractat Galenus; vilissima autem *ἄρτος πιτύρας* (panis furfuraceus), qui parabatur ex tritico tenuissima farina excussa.

5°. Superest *ἄρτος ἄζυμος* i. e. panis sine fermento, in quo parando etiam caseus addebatur; hoc autem festis diebus vescebantur rustici, verum decoctu adeo erat difficilis, ut urbanorum ventriculus illum omnino ferre non posset; hujus etiam mentionem facit Hippocrates (de victus ratione Lib. II. pag. 356.)

Quod vero ad parandi methodum attinet, distinguit Galenus

1°. *ἄρτον κλιβανίτην*. i. e. testu assatum, omnibus aliis speciebus praefendum, praecipue si ignis, ad quem parabatur, nec nimis ardens neque nimis remissus fuisset; laudatur et ab Hippocrate eodem loco.

2°. *ἄρτον ἱπνίτην* i. e. in furno coctum, *κλιβανίτην* inferiorem; memoratur ab Hippocrate ibidem; ille tamen a Dieuche (apud Oribasium Collect. Medic. Lib. IV. cap. 5) *κλιβανίτην* praefertur.

3°. *ἄρτον ἐσχαρίτην*, panis in foco aut craticula assatus, qui nunc sequitur, memoratur ab Hippocrate ibidem.

4°. *ἄρτον τῷ τῆς ἐστίας ὀστράκῳ ὀπηθέντα* i. e. panis qui super foci pavimento assabatur; *ἐσχαρίτη* erat aequiparandus.

5°. *ἄρτον ἐγκρυφίην* i. e. panem sub cineribus assatum, omnibus aliis speciebus postponendum, quem etiam memorat Hippocrates l. l. multisque aliis in locis. Teste Erotiano (ad vocem) parabatur ex aqua, palmulis pinguibus et farina.

Praeter has species autem Hippocrates etiam loquitur de

1°. *ἄρτω διπυρίτη* (pane bis ignem experto) (Lib. de internis affect. pag. 546), quem memorat etiam Oribasius (Collect. Medic. Lib. I. cap. 9).

2°. *ἄρτω ἐξόπτῳ* (pane exassato) (ibid. pag. 542 multisque aliis in locis).

3°. de *ἄρτω ὀβελιαίῳ* vel *ὀβελία* (pane vernu tosto vel assato) (Lib. II. de victus ratione pag. 356.)

4°. *ἄρτω πυρῶν σιτανίων τῷ γύλῳ τῶν πιτύρων ἐξυμωμένῳ* (pane ex sitanio tritico furfurum succo fermentato) (de victus ratione Lib. III. pag. 374.)

Porro Galenus l. l. cap. 5 agit de *ἄρτω πλυτῷ* (pane loto) qui cum lacte parabatur et in aqua supernatabat.

Praeter triticum autem antiqui ad panificia adhibebant hordeum, tipham, olyram et zeiam vel zeam; omnes tamen eo consentiunt, quod panis triticeus omnibus aliis speciebus praestabat, secundum vero locum occupabat panis hordeaceus.

Hordei autem jam Hippocrati tres species cognitae erant: *κριθή* sine cognomine, quae Cl. Dierbach (l. l. pag. 9) esse videtur Hordeum vulgare Linn.; *κριθή τριμηνιαίος*, quae eidem viro Cl. (l. l.) esse videtur Hordeum distichum Linnei; loquitur autem de illa specie Hippocrates de morbis mulierum Lib. I. pag. 608; *κριθή ἀχιλλήϊς*, quam memorat Hippocrates Lib. III. de morbis pag. 496, quaeque Cl. Dierbach videtur esse Hordeum Hexastichon Linn., Cl. Sprengel vero (Theophrast's Naturgeschichte der Gewächse II. 304) Hordeum nigrum Willd; ab Oribasio tamen (Collect. Medic. Lib. I. cap. 11) duae solummodo hordei species enumerantur; ex hordeo autem eadem fere diversae panis species conficiebantur ac e tritico (Galenus l. l. cap. 10).

Quod ad tipham, olyram et zeam attinet, non multum a se invicem differre videntur, quoniam auctores, qui de alimentis scripserunt ante Galenum, ut Diocles et Mnesitheus illas inter se confudisse videntur, uti ipse testatur (l. l. cap. 13); ipse tamen hoc discrimen inter illa adesse statuit, quod zea olyrae praestat, olyra vero tiphae; hinc fortasse Cl. Dierbach (l. l. pag. 16) et olyram et zeam originem petere putat a Tritico Spelta Linn. vel saltem a specie ab hac non multum differente; de Tiphā autem ne mentionem quidem facit; de hac tamen idem videtur esse dicendum. Praeter haec semina autem Galenus eodem loco quoque memorat *ζέοντρον*, unde in Bithynia et *γυμνόκριθον*, unde in Cappadocia panem conficiebant; quae vero fuerint

haec semina, plane ignoro. Hic locus mihi maxime idoneus videtur, ut loquar

De *ἄρτω χονδρίτη*, quem memorat Hippocrates (Lib. de victus ratione pag. 350). Erat autem panis, qui conficiebatur e *χόνδρου* (alica) i. e. (teste Foësius Oecon. Hippocr. ad vocem), »id, quod ex zea de-
»corticata et in grana plura contusa, leguminis loco
»cum jusculis coctum editur.“ Parabatur tamen alica nonnumquam etiam ex aliis seminum speciebus, uti patet ex Galeno (l. l. cap. 6) et Oribasio Collect. Medic. Lib. IV. cap. 1., ubi de proprietatibus et de confectione alicae agitur.

Tandem teste Galeno (l. l. cap. 14 et 15) in annonae caritate vel seminum supra enumeratorum penuria e *βρόμου* (avena) *κέγχρου* (milio) et *έλύμου* (panico) panis conficiebatur, ita tamen ut ex his tribus panis speciebus panis ex avena esset optimus, e panico vero vilissimus.

De *βρόμῳ* Cl. Dierbach (l. l. pag. 17) adhuc dubitat, num fuerit *Avena sativa* Linn. necne; illa saltem species, de qua agit Theophrastus, a Cl. Sprengel (l. l. II. pag. 303) habetur *Avena Orientalis* Schreber. Liceat autem mihi hic observare Plinium, quod ad panem ex avena paratum, a Galeno longe differre videri (Nat. Hist. Lib. XXII. cap. 25), nam de hoc pane loquens, »Panis hic ipse, inquit, innumeras pene continet medicinas.“

Teste Cl. Dierbach (l. l. pag. 18) *κέγχρος* ex vulgari sententia habetur semen *Panici miliacei* Linn. ipseque etiam hanc opinionem fovit, donec sibi oc-

currisset ingenio cultus quidam Graecus, qui forte fortuna sibi oblata planta ex specie Sorghum vulgare Persoon vel Holcus Sorgha Linn. statim: » Haec est κέγχρος, inquit, » qui frequenter colitur in insulis Archipelagi.”

”Ελνμος denique erant semina Panici Italici Linn.

De vino antiquorum ejusque proprietatibus, uti et de vitium cultura, conf. Plinius Nat. Hist. Lib. XIV. cap. 1—19. Oribasius Collect. Medic. Lib. V. cap. 6 et 7, quorum ille ex deperdito quodam Galeni libro est desumptum et Paulus Aegin. Lib. I. cap. 95.

De carne variorum animalium eorumque visceribus conf. Galeni de alimentorum facult. Lib. III. cap. 2 et sqq. Oribasius Collect. Medic. Lib. II. cap. 28 et sqq. et Paulus Aegin. Lib. I. cap. 84 et sqq.

Ibid. lin. 6. ραφανίδων. Ραφανίδες erant radices Raphani sativi Linn., quae Latine dicebantur radicae vel raphani. De harum proprietatibus et viribus autem conf. Theophrastus Lib. VII. Hist. Plant. cap. 9, ubi quatuor distinguit species, Corinthium, Cleonaeum, Liothalassum et Boeoticum, Dioscorides Lib. II. cap. 187 et 188, ubi seorsum agit de ραφανίδι αγρίω, ην Ρωμαϊου αρμορακίαν καλοῦσι, de quo etiam agunt sequentes auctores, Galenus de simplic. medic. temper. ac facult. Lib. VIII. cap. 17. § 2. Oribasius Collect. Medic. Lib. XV. cap. 1. Euporist Lib. II. cap. 1. Aëtius Tetrab. I. I. et Paulus Aegin. Lib. VII. cap. 3.

Ex accurata autem diaetae definitione, quam in fine hujus § legimus, jam satis tuto concludere potuissemus, Megetem scholae methodicae fuisse assecclam, si illud nobis ex aliorum auctorum testimoniis, nondum cognitum fuisset.

Ibid. 2. lin. 2. δραχμαί. lin. 3. ὀβολοί. Antiqui fere eadem ac nos pondera adhibebant vel certe eodem modo illa dividebant; nonnulla tamen pondera ab illis enumerantur, quae hodie non amplius in usu sunt (Galenus de ponderibus ac mensuris Lib. cap. 3 et 11. Paulus Aegin. Lib VII. cap. 25). Hi auctores enim unciam dicunt duodecimam librae partem, drachmam vel holcam octavam unciæ partem, scrupulum (γραμμα) quartam drachmae partem, obolum dimidium scrupulum, siliquam (κεράτιον) tertiam oboli partem vel secundum alios decimam octavam drachmae, granum (Graece σιτάριον) quartam siliquæ partem, areolum (χαλκόν) octavam oboli partem. Unicus locus, e quo aliquo modo, licet tamen non valde accurate, concludere possumus, an his nominibus idem pondus designarent, ac hodierni, est Q. Rhemii Fannii Palaemonis de ponderibus ac mensuris Carminis vs. 10 et sqq.

Semina sex alii siliquis latitantia curvis

Attribuunt scrupulo, lentis veraciter octo,

Aut totidem speltas numerant, tristesve lupinos.

Bis duo:

Non tamen semper idem horum seminum pondus fuisse videtur, uti ipse addit Fannius vs. sqq.

sed si par generatim his pondus inesset,

Servarent eadem diversae pondera gentes :

Nunc variant. Etenim cuncta non foedere certo Naturae, sed lege valent hominumque repertis.

Ibid. lin. 3. *θυμιάματος ἀμμωνιακού*. Erat Gummi ex quadam ferulae specie, quae ab antiquis *ἀγασυλλῆς* dicebatur; quae vero a recentioribus vulgo habetur *Ferula Orientalis* Linn. (Dierbach Die Arzneim. des Hippokr. pag. 200). Dioscorides (Lib. III. cap. 98) et Oribasius (Collect. Medic. Lib. XI) duas distinguunt species *θραύσμα* vel purum et *φυρᾶμα*, quod lapillis erat permixtum. De ejus viribus autem conf. Dioscorides l. l. Galenus de simplic. medic. temper. ac facult. Lib. VI. cap. 1. § 37. Oribasius l. l. Synops. Lib. II. cap. 56 et Euporist Lib. II. cap. 1. Aëtius Tetrab. I. I. et Paul Aegin. Lib. VII. cap. 3.

Ibid. lin. 5. *κόμμι*. *Κόμμι*, inquit Galenus, (de simplic. medic. temper. ac facult. Lib. VII. cap. 10. § 40) *δάκρυόν ἐστιν ἐπιπηγνύμενον τοῖς στελέχεσι τῶν γεννώντων αὐτὸ δένδρων*. Plinius autem (Nat. Hist. Lib. XIII. cap. 11) optimum peti dicit ex *Spina Aegyptiaca*. De gummi viribus et proprietatibus autem conf. Galenus l. l. Plinius l. l. uti et Lib. XXIV. cap. 11. Oribasius Collect. Medic. Lib. XV. cap. 1. Aëtius Tetrab. I. I. et I. II. cap. 196 et Paulus Aegin. Lib. VII. cap. 3.

Ibid. lin. 9. *ὅσα ψύχειν δύναται*. Remedia refrigerantia varia enumerata inveniuntur apud Oribasium Synops. Lib. I. cap. 7—11 et Collect. Medic. Lib. XIV. cap. 19—22.

Ibid. lin. 12. *πάπυρον*. *Πάπυρος* erat *Cyperus Papyrus* Linn., ex cujus foliis chartam conficiebant antiqui; de illa autem, uti et de ejus viribus medicis egerunt Theophrastus Hist. Plant. Lib. IV. cap. 9. Dioscorides Lib. I. cap. 115. Plinius Nat. Hist. Lib. XIII. cap. 4 et Lib. XXIV. cap. 12. Galenus de simplic. medic. temper. ac facult. Lib. VIII. cap. 16. § 3. Oribasius Collect. Medic. Lib. XV. cap. 1. et Paulus Aegin. Lib. VII. cap. 3.

Ibid. 3. lin. 1. *σκίλλα*. *Σκίλλα* est medicamentum usitatissimum e bulbis *Scillae maritimae* Linn.; de illo autem conf. Theophrastus Hist. Plant. Lib. VI. cap. 11 et 12, Dioscorides Lib. II. cap. 202. Plinius Nat. Hist. Lib. XX. cap. 9, Galenus de simplic. medic. temper. ac facult. Lib. VIII. cap. 18. § 23, Oribasius Collect. Medic. Lib. X. cap. 13. et Lib. XII, Euporist. Lib. II. cap. 1, Aëtius Tetrab. I. I. et Paul. Aegin. Lib. VII. cap. 3. Ex hoc medicamento autem parabant acetum squilliticum, de cujus confectione et usu egerunt Dioscorides Lib. V. cap. 25, Oribasius Collect. Medic. Lib. V. cap. 25, Actuarius de meth. med. Lib. V. cap. 7 et Nicolaüs Myreps. de composit. medic. Sect. XXXVII. cap. 13, uti et vinum squilliticum, quod memorant Dioscorides Lib. V. cap. 26 et Actuarius l. I. Lib. V. cap. 7.

Ibid. *τίλτον*. Quid auctor sibi velit hac voce, mihi non satis dilucide patet: verisimile tamen mihi videtur *τίλτον ἐνεψεθεῖσα* significare: adeo vehementer vel diu cocta, ut inde squillae tunicae divellantur.

Ibid. lin. 2. *κονία*. Vulgo quidem apud antiquos auctores medicos vox *κονία* significat lixivium, i. e. ut Galeni verbis (De simpl. medic. temper. ac facult. Lib. VII. cap. 10. § 41) utar: τὸ οἶόν περιπλυμῆς τῆς τέφρας, de quo conf. Galenus l. l., Oribasius Collect. Medic. Lib. XV. cap. 1 et Euporist. Lib. II. cap. 1, Aëtius Tetrab. I. I. et Paul. Aegin. Lib. VII. cap. 3; hujus autem lixivii variae erant species, inter quas usitatissima fuisse videtur *κονία τῆς συκῆς* (lixivium ficulnum), quod parabatur ex cinere ficuum et *τιθυμάλλων* (teste Cl. Dierbach *Die Arzneimittel. des Hippokr.* pag. 141. *Euphorbia Characias* Linn.), de quo egerunt Dioscorides Lib. I. cap. 186, Galenus l. l., Oribasius Collect. Medic. Lib. XIV. cap. 23. et Paulus Aegin. l. l.; hic auctor (Lib. III. cap. 2 et Lib. V. cap. 56) adhuc memorat *κονίαν πιλοποιίτην* (lixivium pileatorium), de cujus confectione tamen nihil refert et Lib. VII. cap. 3 *κονίαν πρωτόστακτον*, cui etiam calx admixta erat quodque praecipue in Clysteribus adhibebatur. Verum enimvero si vox *κονία* hic vertatur voce *lixivio*, vix aliquem sensum habere videntur verba: ἢ χρωῶνται οἱ τοὺς πηλοὺς ἐργαζόμενοι; possint quidem ita explicari, ut *κονία* partem constitueret materiae, qua intus vasa fictilia obducebant figuri (ὁ τ. π. ἔ.), quo melius resisterent rebus acerbis, quae in illis coqui vel torrerī continerīve deberent (*verglazen*), sed haudquaquam constat, antiquos figulos vasa fictilia tali materia obduxisse; Plinius certe (Nat. Hist. Lib. XXXV. cap. 12), ubi de fi-

gulis eorumque arte agit, talis materiae ne mentionem quidem facit. Hanc ob causam vocem *κονία* verti *pulvere* et *κονίαν* habui vel quandam terrae speciem, qua utebantur figuli ad vasa fictilia conficienda, vel materiem aut pulverem quemdam, quo obducebantur muri ex luto exstructi, quale parietum integumentum etiam ab Hippocrate (Epidem. Lib. VII. pag. 1212) dicitur *κονίημα*.

Pag. 76. lin. 7. *τοῖς σηπτοῖς φαρμάκοις* et lin. 8. *τοῖς κανστικοῖς*. De his medicamentis egit Galenus de simplic. medic. temper. ac facult. Lib. V. cap. 15, quem exscripsit Oribasius Collect. Medic. Lib. XIV. cap. 57. Multa autem hujusmodi medicamenta enumerantur a Celso Lib. V. cap. 8, Oribasius Synopsis Lib. II. cap. 44 et 48 et Aëtio Tetrab. IV. I. cap. 52.

Ibid. lin. 9. *σεπτόν*. Hic pro *σεπτόν* legi *σηπτόν*.

Ibid. *τρύχας*. Haud dubie pro *τρύχας* hic legendum esse videtur *τρίχας*.

Ibid. *άλισχοινον*. Quoniam, quantum scio, haec vox apud nullum alium auctorem occurrit, vocem *άλισχοινον* hoc loco mutavi in *όλόσχοινον*, quem inter species junci recensent Plinius Nat. Hist. Lib. XX. cap. 18, Galenus de simplic. medic. temper. ac facult. Lib. VIII. cap. 18. § 50, Oribasius Collect. Medic. Lib. XV. cap. 1, Aëtius Tetrab. I. I. et Paulus Aegin. Lib. VII. cap. 3, dum illud etiam ad apparatus piscatorium pertinere dicit Aelianus (Nat. Anim. Lib. XII. cap. 43), licet a Theophrasto (Hist. Plant. Lib. IV. cap. 13) et Dioscori-

de (Lib. I. cap. 16), ubi varias enumerant junci species, illius nulla fiat mentio, nisi hic alio nomine eadem planta indicetur.

De curandis fistulis autem ope medicaminum deque medicamentis huic rei accommodatis conf. Galenus de meth. med. ad Glaucnem Lib. II. cap. 10, Celsus Lib. V. cap. 28. § 12; Oribasins Synops. Lib. VII. cap. 30 et Euporist. Lib. IV. cap. 45. Aëtius Tetrab. IV. II. cap. 55 et Paulus Aegin. Lib. IV. cap. 49.

Ibid. lin. 13. τὸ δὲ λιγὸν ἐπιτήθειον. cet. De fistulis ani ope laquei curandis conferri merentur Hippocratis Lib. de fistulis et Paul. Aegin. Lib. VI. cap. 88.

Ibid. Not. (1) lin. 1. Κίλαρ cet. Haec adnotatio verisimiliter ideo conscripta est, quod vox κίλαρ eo tempore, quo vixit ejus auctor, jam erat obsoleta; Heychius saltem etiam (Tom. II. pag. 203) hujus vocis affert explicationem, quae eodem fere redit. Erat autem haud dubie Helladius Grammaticus alteruter eorum, quos citat Photius in Biblioth. quorumque antiquior erat

Helladius Besantinoüs Aegyptius, qui, Licinio et Maximiano regnantibus, floruit et de quo agit Photius l. l. Cod. 279, ubi ex ejus *χρηστομαθειῶν* excerpta leguntur quatuor, quae Latine versa et notis illustrata a Jo. Meursio edita sunt Trajecti 1686. 4° et recusa Tom. X. Antiquit. Graecarum Gronovian. (Fabr. Biblioth. Graeca Tom. VII. pag. 62.)

Recentior autem erat Helladius Alexandrinus, The-

odosii junioris temporibus clarus, cujus λέξιώς παντοίας χρήσιν κατὰ στοιχεῖον memorat Photius l. l. Cod. 145 et Suidas (Tom. I. pag. 707).

Ibid. τὸ τῆς βελόνης τρυπήμα, ὡς Ελλάδιος, ὁ τὴν πολλὴν χρήσιν συναγαγεῖν δείκνουσιν. Hic pro ὁ legi ὄ.

Ibid. 4. lin. 4. κοχλίου ῥινοθήτω. Hic pro ῥινοθήτω legendum esse putavi ῥινοθήτου, quia hoc adjectivum mihi pertinere videbatur ad vocem κοχλίου atque κόχλιον ῥινόθητον habui instrumentum quiddam, licet illud apud nullum alium auctorem, quantum scio, occurrat, neque ergo aliquid de ejus forma vel usu referre possim. Verti autem vocibus Latinis *concha nasum tuente*, quia vox ῥινόθητος mihi a nullis aliis vocibus melius derivari posse videbatur quam a ῥίς et ὀθέω.

Pag. 78. 5. lin. 9. ταῦτα. Hic pro ταῦτα mihi legendum esse videtur ταῦτά.

Pag. 80. XVI. in tit. Αρχιγένους. Archigenes erat medicus per totam antiquitatem celeberrimus, natione Syrus Apameënsis (Gal. Isagoge cap. 4) Philippi filius, discipulus Agathini atque Romae medicinam exercuit, Trajano regnante, (Suidas Tom. I. pag. 345); sectae pneumaticae erat adsecla (Galenus de diff. puls. Lib. III. cap. 1 et IV. cap. 11). Hicce auctor a Galeno dicitur obscurus, in verbis novator, et in definiendo nimis subtilis, ita ut ipse eum nonnumquam intelligere vix posset (de diff. puls. Lib. II. cap. 4 et 7 et Lib. IV. cap. 1); negligentius medicamenta describere solebat (de me-

pag. 780) adhuc MS. exstat Archigenis et Philagrū de calculis in renibus cum remediis ad calculosos.

— Ibid. γαγγραιῶν. Γαγγραινα (Definit. med. N^o. 436) dicitur μεταβολή τοῦ χρωτὸς τοῦ κατὰ φύσιν ἐκάστου ἐπὶ τὸ ἀλλότριον, καὶ νέκρωσις μεθ' ἐλκώσεως, καὶ δίχα ἐλκώσεως. Lib. de tumoribus praeter naturam ver o cap. 8 Galenus illam magnis inflammationibus accedere dicit; Comment. autem IV. in Hippocr. Lib. de articulis mediam affectionem inter magnam inflammationem et σφάκελον; Lib. de tumoribus praeter nat. cap. 11 illud discrimen inter sphacelum et gangraenam statuit, quod sphacelus ad ossa penetrat, gangraena vero non, licet Hippocr. (Libr. de artic. pag. 828) dicat: ἀτὰρ καὶ γαγγραινοῦσθαι ἰνέεται κνήμην καὶ τὸν πόδα. Actuarius vero (de meth. med. Lib. II. cap. 12) sequenti modo differre gangraenam et sphacelum dicit: » Ap-
» pellamus autem γαγγραιναν alicujus partis ob in-
» flammationis, qua conflictatur, magnitudinem,
» mortificationem, non quae jam confirmata sit,
» sed quae etiamnum fiat; nam quum jam pars
» emortua est, sideratio et σφάκελος Graecis affectus
» nominatur, qui est gangraenae terminus.” De gangraena autem ejusque cura, quae ab omnibus auctoribus, uti et hic ab Archigene, valde dicitur difficilis, conf. Galenus de tumor. praeter nat. Lib. cap. 8. Comment. IV. in Hippocr. Lib. de artic. et Comment. in Hippocr. Aphorism. 50. sect. VII, Celsus Lib. V. cap. 26. § 34, Oribasius Synops. Lib. VII. cap. 27, Paul. Aegin. Lib. IV. cap. 19 et Actuarius l. l. *

Ibid. 2. lin. 2. Ὡς ἐν τοιαύτῃ οὖν διαθέσει τὴν ἔμφρασιν ἀπολείπουσαν πόσης σωτηρίας ἐκληπτέον ὅσον τὴν ἐπιφάνειαν ἐν νεωτέρῳ σώματι καὶ μὴ γηραλαίῳ. Nisi haec verba valde sint corrupta, haud dubie de iis valet effatum Galeni de ratione dicendi Archigenis, quod supra attulimus (adnot. ad vocem *Αρχίγ*); si tamen πόσης mutemus in ποσῆς, ante vocem ἐπιφάνειαν inseramus particulam οὖ, si porro vocem ὅσον consideremus tamquam adverbium et in fine subintelligamus vocem πέπληγε, vel similem quandam, sensus, ut mihi videtur, multo fit clarior; eo modo certe confeci versionem meam horum verborum.

Ibid. lin. 4. καὶ τὴν ἐν σαρκώδεσιν . . . δύσκολος. Hic pro δύσκολος legendum esse putavi δύσκολον atque subintelligendam vocem θεραπευέσθαι vel similem quandam, nisi particula τὴν mutanda sit in ἡ.

Pag. 82. ἐν ταῖς κατασχέσεσιν. Quid sibi velit auctor hisce verbis, nondum mihi satis dilucide patet; habui illa explicationem verborum τὸ μηδὲν αἷμα εἶναι, ita ut aliquo modo redundare videantur.

Ibid. lin. 12. ἀλλὶ λεπτῶ καὶ ἐλαίῳ. Sal (sal culinare, murias sodae) antiquorum erat vel fossile vel petebatur ex lacubus salinis, in nonnullis regionibus obviis (Galenus de simplic. medic. temper. ac facult. Lib. XI. cap. 2. §. 4 et Plinius Nat. Hist. Lib. XXXI. cap. 7) vel etiam a nonnullis fluminibus, teste Plinio l. l., uti Oxo et Ocho in Bactria advehebatur; de eo autem ejusque usu conf. Dioscorides Lib. V. cap. 126—129, ubi seorsum agit de ἀλὸς ἄγνη, de ἀλμη et de ἀλὸς ἄνθους, Plinius

alim. facult. Lib. II. cap. 44.) Athenienses ante sexcentos annos brassicam *ζάφανον* vocasse refert, suo tempore vero illam dici *κράμβην*. Hoc olus autem ab omnibus fere antiquis maximis laudibus celebratur; sic Chrysippus (teste Plinio Nat. Hist. Lib. XIX. cap. 8) integrum librum de illo conscripsit, mirasque ejus laudes canit Porcius Cato, qui jam tres ejus species noverat, quibus multas adhuc addit Plinius, quae tamen omnia solummodo varietates esse videntur Brassicae oleraceae Linn. Praeter brassicam tamen esculentam antiqui etiam loquuntur de brassica sylvestri et de brassica marina, quarum utilitas solummodo erat therapeutica et Dioscorides Lib. IV. cap. 81 et 192, ubi illam etiam *κυνόμορον*, *κυν-αγγον*, *κυνίαν* et *λιπόζωστιν ἀγρίαν ὑρῆνα* vocari dicit, Plinius Nat. Hist. Lib. XXXII. cap. 5, Galenus de simplic. medic. temper. ac facult. Lib. VI. cap. 1. § 53; Oribasius Collect. Medic. Lib. XV. cap. 1. et Paul. Aegin. Lib. VII. cap. 3. praeterea agunt de *ἀποκύνῳ* sive *κυνοκράμβη* (brassica canina), quae et hominibus et canibus erat venenum. De omnium specierum usu autem cum diaetetico tum therapeutico, uti et de brassicae cultura conf. Theophrastus l. l., Dioscorides Lib. I. cap. 146—148, Galenus l. l. et de simplic. medic. temper. ac facult. Lib. VII. cap. 10. § 48—50, Plinius l. l. et Lib. XX. cap. 9, Oribasius l. l. et Eupor. Lib. II. cap. 1, Aëtius Tetrab. I. I. et Paulus Aegin. l. l. et Lib. I. cap. 74.

Ibid. *αἰρίνω ἀλεύρω ἢ θερμίνω ἀλεύρω*. *Αἶρα* erat

Lolium temulentum Linn., de quo conferri merentur Theophrastus Hist. Plant. Lib. VIII. cap. 7, Dioscorides Lib. II. cap. 122, Galenus de simplic. medic. temper. ac facult. Lib. VI. cap. 1. § 10, Oribasius Collect. Medic. Lib. XV. cap. 1 et Eupor. Lib. II. cap. 1, Aëtius Tetrab. I. I. et Paul. Aegin. Lib. VII. cap. 3.

Θέρμος erat Lupinus pilosus (Dierbach Die Arz-
neim. des Hippokr. pag. 38), de cujus proprietati-
bus et usu cum diaeteticum tum therapeutico conf.
Theophrastus Hist. Plant. Lib. VIII. cap. 11. Di-
oscorides Lib. II. cap. 132 et 133, ubi seorsum
agit de θερμῷ ἀγρίῳ, Plinius Nat. Hist. Lib. XVIII.
cap. 14. Galenus l. l. Lib. VI. cap. 8. § 3 et
4 et de alim. facult. Lib. I. cap. 23, Oribasius
l. l. et Collect. Medic. Lib. I. cap. 21, Aëtius l. l.
et Paul. Aegin. l. l. et Lib. I. cap. 79.

Nomen ἀλεύρον autem in universum adhibebatur
de farina tenuiori, farina crassiori κρήμνω dicta. (Ga-
lenus Exeg. verb. Hippocr. ad vocem ἀλφίτα.)

Ibid. lin. 15. νίτρον ἀφροῦ. Νίτρον vel λίτρον
veterum est Natrum nativum (Dierbach die Arz-
neim. des Hippokr. pag. 240), quod petebatur e lacubus
nitrosis in variis regionibus obviis, ut refert Plinius
(Nat. Hist. Lib. XXXI. cap. 10), ubi varias nitri
enumerat species; tenuissima autem nitri pars dice-
batur ἀφρός νίτρον; Galenus tamen (de simplic.
medic. temper. ac facult. Lib. IX. cap. 3. § 5)
praeterea distinguit inter ἀφρόνιτρον et ἀφρόλιτρον,
quorum illud farinae triticeae simile, hoc vero con-

gelatum et coactum dicit. De nitro autem et de spuma nitri conf. Dioscorides Lib. V. cap. 131 et 132, Plinius l. l. et Lib. XXXVI. cap. 26; Galenus l. l. Lib. IX. cap. 3. § 5 et 18 et Lib. XI. cap. 2. § 6, Oribasius Synops. Lib. II. cap. 56, Collect. Medic. Lib. XV. cap. 1., Eupor. Lib. II. cap. 1, Aëtius Tetrab. I. II. cap. 49, 50 et 61 et Paul. Aegin. Lib. VII. Cap. 3.

Ibid. lin. 17. *πίρινον*. De usu tritici diaeteticò jam diximus in adnot. ad vocem *ἄρτον*. De ejus usu therapeutico vero, uti et de cultura conf. Theophrastus Hist. Plant. per totum Lib. VIII., qui de frumentaceis et leguminosis agit, Caus. Plant. Lib. III. cap. 26 multisque aliis in locis, Dioscorides Lib. II. cap. 107, Plinius Nat. Hist. Lib. XVIII. cap. 10. et Lib. XXII. cap. 25, Galenus de simplic. medic. temper. ac facult. Lib. VIII. cap. 16. § 42, Oribasius Collect. Medic. Lib. XV. cap. 1., Eupor. Lib. II. cap. 1, Aëtius Tetrab. I. I. et Paul. Aegin. Lib. VII. cap. 3.

Ibid. lin. 18. *δαφνίσι*. *Δαφνίδες* erant fructus Lauri nobilis Linn. Hujus plantae autem Theophrastus variis in locis et Dioscorides Lib. II. cap. 106. praeter vulgarem speciem etiam distinguit *δάφνην Ἀλεξανδρείαν*, quae dicebatur et *Ἰδαία* vel *ὑπόγλωκτος* vel *ζάλειαν* vel *στεφάνην*; Plinius vero (Lib. XV. cap. 30) praeter has undecim adhuc enumerat species, quarum singulis vulgo plura erant nomina. In universum autem de hac planta ejusque usu medico conf. Dioscorides et Plinius l. l., Gale-

nus de simplic. medic. temper. ac facult. Lib. VI. cap. 4. § 4, Oribasius Collect. Medic. Lib. XI., Eupor. Lib. II. cap. 1., Aëtius Tetrab. I. I. et Paulus Aegin. Lib. VII. cap. 3.

Ibid. *σφραγίς*. *Σφραγίς* vel *σφραγίς αἰγός* (testibus Discoride Lib. V. cap. 113 et Galeno de simplic. medic. temper. ac facult. Lib. IX. cap. 1. § 2) erat species terrae in insula Lemno obvia, quae inde nomen petebat, quod sacerdotes illi sigillum Dianae imprimebant; dicebatur autem et *γῆ Ἀημνία* et *μῆλος Ἀημνία* ob colorem rubrum, qui secundum Dioscoridem l. l. oriebatur a sanguine hircino, qui huic terrae admiscebatur a sacerdotibus, quod cum referret Galenus (l. l.) in ipsa insula Lemno degens, omnes adstantes incolae illum irriserunt. De hujus terrae parandi ratione et virtutibus autem conf. Theophrastus Lib. de lapidibus pag. 399 (ed. Heinsii Lugd. Bat. 1613 fol.), Dioscorides et Galenus l. l., Oribasius Collect. Med. Lib. XV. cap. 1., Eupor. Lib. II. cap. 1, Aëtius Tetrab. I. II. cap. 4 et Paulus Aegin. Lib. VII. cap. 3. Aderant praeterea varia medicamenta composita, quae et *σφραγίδες* dicebantur, fortasse ob similem agendi rationem: sic Celsus Lib. V. cap. 20. § 2. citat sphragidem Polyidae, cap. 26. § 23. sphragidem Polybi et Marcellus Lib. de medicam. cap. 8. sphragidem Antigoni, Paulus Aegin. vero (Lib. VII. cap. 12) et Actuarius (de meth. med. Lib. VI. cap. 5) describunt sphragidem quamdam omisso nomine auctoris.

Ibid. lin. 19. *οἰσυπηρῶν* et lin. 21. *οὖρον*. *Οἰσυπηρά* erat lana succida vel lana non depurata, cui omnes ovium sordes adhuc adhaerebant, quod medicamentum a multis veteribus quam maxime laudatur. Egerunt autem de illa Dioscorides Lib. II. cap. 84, Galenus de simplic. medic. temper. ac facult. Lib. XI. cap. 1. § 29, Oribasius Eupor. Lib. II. cap. 1, Aëtius Tetrab. I. II. cap. 159 et Paulus Aegin. Lib. VII. cap. 3.

Quemadmodum stercus variorum animalium, sic etiam urinam tamquam medicamentum adhibebant veteres, de cujus viribus conf. Dioscorides Lib. II. cap. 99, Galenus l. l. Lib. X. cap. 2. § 15 et Paulus Aegin. l. l.

Ibid. ἡ πράσον ἢ ἀγριελαίων ἢ βάτου ἢ κορίου. *Πράσον* erat Allium Porrum Linn., de cujus virtutibus cum diaeteticis tum therapeuticis conf. Theophrastus Hist. Plant. Lib. VII. cap. 1 et 2, Dioscorides Lib. II. cap. 179, Plinius Nat. Hist. Lib. XIX. cap. 7 et Lib. XX. cap. 6, ubi distinguit inter porrum sectivum et porrum capitatum, Galenus de alim. facult. Lib. II. cap. 71, ubi etiam agit de ἀμπελοπράσω, Oribasius Collect. Medic. Lib. II. cap. 27, Aëtius Tetrab. I. I, Paulus Aegin. Lib. I. cap. 76 et Lib. VII. cap. 3. et Actuarius de spirit. anim. nutrit. Lib. cap. 6.

Ἀγριελαίον, qui dicebatur et κότινος vel ἐλαία *Αἰθιοπική* erat oleaster vel olea sylvestris, de cujus viribus egerunt Theophrastus l. l. passim, Dioscori-

des Lib. I. cap. 137, Plinius l. l. Lib. XXIII. cap. 4 et Oribasius l. l. Lib. XI.

Βάρος erat verisimiliter *Rubus Fruticosus* Linn. (Dierbach die Arzneim. des Hippokr. pag. 44); tamquam alimentio solummodo fructu, tamquam medicamento vero fere omnibus hujus plantae partitus utebantur antiqui, uti patet ex Theophrasto Hist. Plant. variis in locis, Dioscoride Lib. IV. cap. 37 et 38, ubi seorsum agit de *βάρου Ιδαίας*, Plinio Nat. Hist. Lib. XXIV. cap. 13 et 14, qui praeter *Ιδαίαν* etiam duas alias rubi species recenset, Galeno de alim. facult. Lib. II. cap. 13. et de simplic. medic. temper. ac. facult. Lib. VI. cap. 2. § 4, Oribasius l. l. Lib. XI et Eupor. Lib. II. cap. 1, Aëtius l. l. et Paul. Aegin. Lib. VII. cap. 3.

Κόριαν vel *κορίαννον* erat *Coriandrum sativum* Linn., de quo conf. Theoprastus l. l. passim, Dioscorides Lib. III. cap. 71, Plinius l. l. Lib. XX. cap. 20, Galenus de simplic. medic. temper. ac. facult. Lib. VII. cap. 10. § 43, Oribasius Collect. Medic. Lib. XI, Lib. XIV. cap. 10, Lib. XV. cap. 1 et Eupor. Lib. II. cap. 1, Aëtius et Paulus Aegin. l. l.

Ibid. 3. lin. 4. *φακός*. Hac voce vulgo apud veteres designatur lenticula palustris, dum *φακοί* in num. plurali significabant lentes (*Ervum Lens* Linn. vel *Cicer Lens* Willd). De horum vegetabilium proprietatibus cum diaeteticis tum therapeuticeis autem conf. Theophrastus Hist Plant. variis in

locis, Dioscorides Lib. II. cap. 129, Plinius Nat. Hist. Lib. XXII. cap. 25, Galenus de alim. facult. Lib. I. cap. 18 et de simplic. medic. temper. ac facult. Lib. VIII. cap. 21. § 1 et 2, Oribasius Collect. Medic. Lib. I. cap. 17 et Lib. XV. cap. 1, Eupor. Lib. II. cap. 1, Aëtius Tetrab. I. I, Paul. Aegin. Lib. I. cap. 79 et Lib. VII. cap. 3 et Actuarius de spir. anim. nutrit. Lib. cap. 5.

Ibid. lin. 5. ῥόαζ. De usu malorum Punicorum tamquam medicamento jam egimus supra in adnot. ad vocem *σιδίωv*, de eorum facultatibus autem tamquam alimenti egerunt Galenus de alim. facult. Lib. II. cap. 24 et Oribasius Collect. Medic. Lib. II. cap. 51.

Ibid. λεπυγάνοις. *Λεπύγανοι* erant tunicae detritae cepae (*κρομμύvου*), cujus multas species enumerat Theophrastus Hist. Plant. Lib. I. cap. 10 et Plinius Nat. Hist. Lib. XIX. cap. 6, quae omnes tamen, uti videtur Cl. Dierbach (*Die Arzneim. des Hippokr.* pag. 103), oriebantur ab Allio Cepa Linn. (Cepa rotunda Dodonaei) vel ab Allio Fistuloso Linn. (Cepa oblonga C. Bauhini). Plura autem de hac planta ejusque utilitate cum inter medicamenta tum inter alimenta leguntur apud Theophrastum l. l. et Lib. I. cap. 10, uti et Caus. Plant. Lib. VI. cap. 18 multisque aliis in locis, Dioscoridem Lib. II. cap. 181, Plinium l. l., Galenum de alim. facult. Lib. II. cap. 71 et de simplic. medic. temper. ac facult. Lib. VII. cap. 10. § 58, Oribasium Collect. Medio.

Lib. II. cap. 27 et Lib. XV. cap. 1, Eupor. Lib. II. cap. 1, Aëtius l. 1, Paulus Aegin. Lib. I. cap. 76 et Lib. VII. cap. 3. et Actuarius l. I. cap. 6. Ibid. μέλιτι. De melle ejusque eximiis facultatibus, uti et de apibus conf. Theophrastus fragm. de melle pag. 475, Dioscorides Lib. II. cap. 101—103, Plinius Nat. Hist. Lib. XI. cap. 5—21 et Lib. XXII. cap. 24, Galenus de alim. facult. Lib. III. cap. 39, de simplic. medic. temper. ac facult. Lib. VII. cap. 12. § 9, Oribasius Collect. Medic. Lib. II. cap. 62 et 63 et Lib. XV. cap. 1, Aëtius l. 1, Paul. Aegin. Lib. I. cap. 96 et Lib. VII. cap. 3 et Actuarius l. 1. cap. 8.

Ibid. ὀρόβου. Ὀρόβοι erant fructus Ervi Erviliae Linn. vel Viciae Erviliae Willd., quae, testibus Plinio (Nat. Hist. Lib. XVIII. cap. 15) et Galeno (de alim. facult. Lib. I. cap. 29), vulgò solummodo pecorum pabulo inserviebant, quibus tamen in annonae caritate etiam vesciebantur homines, licet egregium essent medicamentum, quod fere brassicae equiparabant; egerunt autem de illo Dioscorides Lib. II. cap. 131, Plinius l. 1. et Lib. XXII. cap. 25, Galenus l. 1. et de simplic. medic. temper. ac facult. Lib. VIII. cap. 15. § 14, Oribasius Collect. Medic. Lib. II. cap. 26, Lib. IV. cap. 8 et Lib. XV. cap. 1, Eupor. Lib. II. cap. 1, Aëtius l. 1. et Paul. Aegin. Lib. VII. cap. 3.

Ibid. λεπυράνοις λείοις σὺν μέλιτι ὀρόβου τε ἄλευρον ὁμοίως σκευασθέν. Melius mihi visum est, colori,

quod hic pone τε invenitur, ante ὀρόβου transferre; posset tamen et loco remanere, quando ἄλευρον significabit farina triticea.

Ibid. lin. 6. πράσιον. A quonam specie Marrubii peteretur πράσιον antiquorum, non constat (Dierbach Die Arzneim. des Hippokr. pag. 171). De eo autem ejusque proprietatibus conf. Theophrastus Hist. Plant. Lib. VI. cap. 2, ubi duas ejus species distinguit, Dioscorides Lib. III. cap. 119, Plinius Nat. Hist. Lib. XX cap. 22, qui illud et lino-strophon vel philopeda vel philochares dici refert, Galenus de simplic. medic. temper. ac facult. Lib. VIII. cap. 16. § 35, Oribasius Collect. Medic. Lib. XV. cap. 1, Epor. Lib. II. cap. 1, Aëtius et Paul. Aegin. l. l.

Pag. 84. lin. 1. σταφίς. Σταφίδες erant uvae passae vel fructus siccatae Vitis viniferae Linn., de quibus fructibus eorumque viribus cum diaeteticis, tum therapeuticis egerunt Dioscorides Lib. V. cap. 4, Plinius Nat. Hist. Lib. XIV. cap. 1 et sqq. et Lib. XXIII. cap. 1, Galenus de alim. facult. Lib. II. cap. 10 et 11, Oribasius Collect. Medic. Lib. I. cap. 41 et 42 et Lib. XV. cap. 1, Eupor. Lib. II. cap. 1, Aëtius l. l. et Paul. Aegin. Lib. I. cap. 81 et Lib. VII. cap. 3.

Ibid. μαλάχης ἀγρίας. Malva sylvestris verisimiliter erat eadem planta, quae et hodie adhuc dicitur Malva sylvestris Linn., malva vero sativa Malva rotundifolia Linn. (Dierbach l. l. pag. 73). Hac autem et inter medicamenta et inter alimenta ute-

bantur antiqui; illius vero usus unice erat therapeuticus; quae omnia accuratius descripta leguntur apud Theophrastum Hist. Plant. variis in locis, Dioscoridem Lib. II. cap. 144, Plinium Lib. XX. cap. 21, Galenum de alim. facult. Lib. II. cap. 42 et de simplic. med. temper. ac facult. Lib. VII. cap. 12. § 3, Oribasium Collect. Medic. Lib. II. cap. 1, Aëtium l. 1. et Paul. Aegin. Lib. I. cap. 74 et Lib. VII. cap. 3.

Ibid. lin. 2. *μελικράτου*. De mulso at aqua mulsa eorumque proprietatibus conferri merentur Dioscorides Lib. V. cap. 16 et 17, Plinius Nat. Hist. Lib. XXII. cap. 24 et Alex. Trall. Lib. II. cap. 6.

Ibid. *ἀρνόγλωσσον*. Jam Dioscorides Lib. II. cap. 153 duas enumerat plantaginis species: majorem et minorem; narrat autem Plinius Nat. Hist. Lib. XXV. cap. 8, Themisonem hanc plantam omnium primum in medicina adhibuisse integrumque de illa librum conscripsisse. De illa autem ejusque viribus et proprietatibus conf. Theophrastus Hist. Plant. Lib. VII. cap. 11, ubi illam et *στελεφεύρον* dicit, Dioscorides et Plinius l. 1., Galenus de simplic. medic. temper. ac facult. Lib. VI. cap. 1. § 60, Oribasius Collect. Medic. Lib. XI et Lib. XV. cap. 1, Eupor. Lib. II. cap. 1, Aëtius Tetrab. I. I. et Paulus Aegin. Lib. VII. cap. 3.

Ibid. lin. 3. *αιγυπτία*. Verisimiliter hic subauditur vox *γη*; de *γη* enim *Αιγυπτία* loquuntur etiam Galenus de simplic. medic. temper. ac facult. Lib. IX. cap. 1. § 2, Oribasius Eupor. Lib. II. cap. 1

et Aëtius Tetrab. I. II. cap. 3. Videtur sane eadem esse ac *κίανος Αιγύπτιος*, de quo agit Theophrastus Lib. de lapidibus pag. 399.

Ibid. lin. 5. *ταῖς πνοποιαῖς καὶ πληρωτικαῖς*. De hujusmodi medicaminum facultate egit Galenus de simplic. medic. temper. ac facult. Lib. V. cap. 3, 6, 9 et 16; ea vero enumerata invenias apud Celsum Lib. V. cap. 4 et cap. 26. § 30, Scribonium Largum de composit. medic. cap. 216—219, Aretaeum de curat. acut. morb. Lib. I. cap. 7, Oribasium Collect. Medic. Lib. XIV. cap. 37, Aëtium Tetrab. IV. II. cap. 34, Paul. Aegin. Lib. III. cap. 22 et Actuarium de meth. med. Lib. VI. cap. 9.

Ibid. lin. 7. *τοῖς ἀποκρονομένοις*. De his medicamentis egit Galenus l. l. cap. 17; enumerantur vero a Celso Lib. II. cap. 33, Scribonio Largo l. l. cap. 91 et 92, Oribasio Synopsis Lib. II. cap. 45, Aëtio Tetrab. I. II. cap. 230 et Paulo Aegin. Lib. IV. cap. 25.

Ibid. *ἀδήκτοις*. De his medicamentis conf. Galenus de medic. composit. sec. loc. Lib. IV. cap. I.

Ibid. XVII. in τίτ. *ἐρυσιπέλατων*. *Ἐρυσίπελας* (Definit. Med. N°. 383) dicitur *ἔρευθος μετὰ διαπίθρου φλογώσεως, ἔσθ' ὅτε πύρετον καὶ φρίκας ἐπιφέρων*, vel *ὄγκος ὀδυνηρός ἀπὸ χολώδους αἵματος ἔχων τὴν γένεσιν*; cum ultima autem definitione consentit Galenus de meth. med. ad Glanconem Lib. II. cap. I; de meth. med. vero Lib. XIV. cap. 1—3 et de tumoribus praeter naturam cap. 9 erysipelas a fluxione biliosa oriri dicit; ex Lib. autem de meth. med.

ad Glauconem l. l. et de meth. med. l. l., ubi discrimen describit inter *ερυσίπελας* et *φλεγμονήν* satis patet, illum erysipelas dicere eundem morbum, qui et hodie hoc nomine indicatur; dicit enim, colorem erysipelatis esse flavum vel pallidum, inflammationis vero rubrum; erysipelas esse affectionem solius cutis, inflammationem vero pro maxima parte suppositarum cuti partium; in erysipelate pulsationem decesse, in inflammatione vero semper adesse; in erysipelate pressione ruborem evanescere, verum mox redire, in inflammatione vero haec non fieri; erysipelatis duas esse species cum ulceratione et sine ulceratione, inflammationem vero uniformem esse morbum. Iisdem in locis Galenus etiam distinguit affectiones inter erysipelas et inflammationem intermedias, quas dicit *ερυσίπελας φλεγμονώδες* vel *φλεγμονήν ερυσίπελατώδην* vel *ερυσίπελας καὶ φλεγμονήν μεμίγμένα*, quemadmodum et Lib. de tumoribus praeter naturam l. l., ubi agit de differentia inter erysipelas, herpetem, oedema et scirrhum, loquitur de *σκιρῶν φλεγμονώδει* et de *φλεγμονῇ σκιρῶδει*, de *οιδήματι φλεγμονώδει*, et de *φλεγμονῇ οιδηματώδει* cet. Nomen tamen erysipelatis non unice de cutis affectione adhibitum fuisse, patet ex Aëtio Tetrab. II. II. cap. 26 et Paul. Aegin. Lib. III. cap. 7 de erysipelate cerebri; praeterea Paulus Aegin. Lib. III. cap. 46 etiam memorat erysipelas hepatis et Alex. Trall. Lib. V. cap. 2. erysipelas pulmonis et rursus (Definit. med. N°. 302) sermo est de erysipelate uteri. De erysipelate autem in universum legi me-

rentur Celsus Lib. V. cap. 26 § 31 et 33, Oribasius Synops. Lib. VII. cap. 32, Aëtius Tetrab. IV. II. cap. 59, Paulus Aegin. Lib. IV. cap. 17 et 21 et Actuarius de meth. med. Lib. II. cap. 12 et Lib. IV. cap. 16.

Ibid. lin. 3 πυρετοί. Quoniam omnes febris definitiones in libris veterum medicorum cum Graecorum tum Latinorum inde ab Hippocrate usque ad Actuarium obvias recensere omnesque febrium species ab illis enumeratas referre nimis longum foret (qui enim hanc materiem rite pertractare vellet, opus valde laboriosum nec brevi temporis spatio absolvendum suscepisset), unicam Galenicam febris definitionem Comment. ad Hippocr. Epidem. Lib. VI. Sect. I Aphor. 17, qui de discrimine febrium agit, inveniendam hic afferre sufficiat. Hic enim Galenus, ουσία δὲ πυρετῶν ἐστὶ, inquit, οὐ καθ' Ἱπποκράτην μόνον καὶ τοὺς ἀρίστους ἰατροὺς, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν κοινὴν πάντων ἀνθρώπων ἐννοίαν, ἢ παρὰ φύσιν θερμοσία, μάλιστα μὲν εἰς ὅλον ἐκτεταμένη τὸ ζῶον· εἰ δὲ μὴ, ἀλλὰ πάντως, ἤτοι γὰρ ἐν τοῖς πλείστοις μέρουσιν, ἢ ἐν τοῖς κυριωτάτοις.

Ibid. lin. 5. δυσπνοίας. Hanc vocem omnem respirandi difficultatem significare, jam indicat ipsa etymologia vocis, uti dicit Galenus (de respir. difficult. Lib. I. cap. 1) atque eo sensu de δυσπνοίας Lib. III. conscripsit Galenus, ubi in varias rationes inquit, qua respiratio laedi possit harumque laesionum causas investigat omniaque, quae apud Hippocratem de hac re inveniuntur, colligit explicatque. Nonnumquam tamen arctiori sensu adhibetur haecce

vox atque aliquam asthmatis speciem significare videtur, uti patet ex Galeno de medic. compos. sec. loc. Lib. VII. cap. 6: *καλοῦσι δὲ οὕτως (τοὺς ἰδίως δυσπνοικοὺς ὀνομαζομένους) ὅσοις ἐμπέπλησται τὰ βρόγχα τοῦ πνεύμονος ὑγρῶν παχέων τε καὶ γλίσχωρον*. De his dyspnoicis autem egerunt Celsus Lib. IV. cap. 4. § 2, Aëtius Tetrab. II. IV. cap. 57, Paul. Aegin. Lib. III. cap. 29 et Actuarius de meth. med. Lib. I. cap. 17. Utamque autem significationem hujus vocis complectitur Definit. 262. auctor Definit. medic. *Δυσπνοικοὶ εἰσὶν, ἐφ' ὧν οἶονεὶ στενοχωρούμενον ἐκπνεῖται τὸ πνεῦμα καὶ εἰσπνεῖται. ἢ, δυσπνοία βλάβη τις ἀναπνοῆς ἐστίν.*

Ibid. *νυσταγμοῦ*. *Νυστάζειν* proprie significat nictitare, verum, quia somniculosi vulgo capite nictitare solent, saepius jam apud Hippocratem (e. g. de prisca medic. pag. 12. Epidem. Lib. VII. pag. 1215) *νυσταγμὸς* in universum somnolentiam indicat.

Ibid. *περιπνευμονίαν*. *Περιπνευμονία* vel *περιπλευμονία* vel *πλευμονίς* (Hippocr. Lib. de intern. affect. pag. 533) ab antiquis, quemadmodum et hodie, dicebatur pulmonis inflammatio, uti patet ex Definit. med. N°. 259: *περιπνευμονία ἐστὶ φλεγμονὴ πνεύμονος μετὰ πυρετοῦ ὀξέος καὶ δυσπνοίας*, et Aretaeo de causis et signis acut. morb. Lib. II. cap 1; *ἣδε ἐστίν, ἣν καλέομεν περιπνευμονίην, φλεγμονὴ τοῦ πνεύμονος ξὺν ὀξείῳ πυρετῷ, εὔτε ξύνεστιν αὐτέοισι βάρος τοῦ θώρηκος, ἀπονίη, ἣν μούνος φλεγμὴν πνεύμων*. De hoc morbo autem egerunt Hippocrates multis in locis, quae collegit Foesius (Oecon. Hippocr. ad vocem *περιπνευμονία*), Celsus Lib. IV. cap. 7,

Caelius Aurel. Acut. Lib. II. cap. 26—29, Aretaeus l. 1., Aëtius Tetrab. II. IV. cap. 66 et Paulus Aegin. Lib. III. cap. 30.

Ibid. XVIII. in tit. Ἀπολλωνίου. Varii fuerunt Apollonii medici, variis cognominibus distincti, de quibus tamen adeo pauca nobis cognita sunt, ut nemo adhuc eos recte in ordinem digerere vel determinare potuerit, quot fuerint, quo tempore quisque eorum vixerit, quid scripserit quidve ad universam rem medicam augendam vel emendandam contulerit. Licet hac ratione sane uni viro permulta cognomina tribuantur, in Apollonium tamen, qui scripsit *περὶ ἐνπορίστων* et de quo hic etiam sermo esse videtur, mihi cognomina *βιβλάς*, Antiochenus (an pater vel filius, determinare non audeo), Pergamenus (uti enim dicit Fabritius (Biblioth. Graeca Tom. XIII. pag. 75), posset Antiochiae natum, verum diu Pergami versatum esse vel ratione inversa), Mus, Herophileus et Empiricus omnia competere videntur, quam conjecturam protulit jam Fabritius l. 1. Si enim Apollonium Biblam et Apollonium Murem a se invicem dirimamus, uti placuit Cl. Sprengel, cum illo quoque varia loca in Galeni libris de medic. composit. sec. loc. et sec. gen. obvia, ubi citatur Apollonius sine cognomine ex ejus Libris *περὶ ἐνπορίστων* modo Apollonio Biblae, modo Apollonio Muri, modo vero Apollonio Archistratori tribuere deberemus (Sprengel Pragmat. Gesch. der Medizin Tom. I. pag. 560 et 598 et Tom. II. pag. 76) et utrumque Apollonium Murem et Apollonium Archistratorem

auctorem habere Librorum *περὶ ἐμπρορίστων*, quam sententiam de illis profert Cl. Sprengel l. l., utroque loco eundem Galeni locum citans (de composit. medic. sec. loc. lib. I. pag. 167), ubi etiam nullum cognomen adhibet ille auctor. Mihi tamen vix credendum videtur, duos exstitisse Apollonios, qui *περὶ ἐμπρορίστων* scripserunt; illud enim si verum esset, miro modo illos inter se confundisset Galenus, quod sane de tali auctore expectandam non esset, verum ratio, quare Galenus semper reticeat cognomen auctoris *περὶ ἐμπρορίστων* Librorum mihi potius inde petenda videtur, quod ejus aetate cuivis satis notum erat, quisnam Apollonius hos Libros conscripsisset; Herophileus autem dicitur auctor hiece a Galeno (de medie. composit. sec. loc. Lib. III. cap. l. multisque alijs in locis); cognomen Herophilei parum a cognomine Empirici differre atque sectatores Herophili sensim magis magisque ad scholam empiricam versisse res est satis nota et praeterea patet ex loco Isagoges cap. 4, ubi proles scholae Herophileae dicitur Empirica; Apollonio autem Muri adscripsi Libros supra laudatos ob testimonium Celsi, qui Apollonium Murem de facultatibus medicamentorum scripsisse refert (Lib. V. Praef.); illum autem habui eundem ac alterum Antiochenum, quia Antiocheni ambo inter Empiricos recensentur (Isagoge l. l.). Secundum sententiam igitur Fabritii hujus auctoris sequentes libros varijs locis citatos videmus:

1°. Libr. *περὶ ἐμπρορίστων*, qui citantur a Galeno

(de medic. composit. sec. loc. et sec. gen. saepissime) et ab Oribasio (Praef. ad Euporist. Lib. I.)

2°. Libr. *περὶ χαρακτῆρων*, quos citat Galenus Comment. II in Hippocr. Epidem. Lib. III. aegrot. 8.

3°. Libr. XXIX de secta Herophili, quos citant Galenus (de different. pulsuum Lib. IV. cap. 10) et Caelius Aurel. (Acut. Lib. II. cap. 13).

4°. Forsan illi quoque tribuendus est Libr. *περὶ μύρων*, quem citat Athenaeus (Deipnosoph. Lib. XV. pag. 688).

5°. *προφυλακτικὰ θανασίμων* Apollonii Muris, quae citat Galenus, (Antidot. Lib. II. cap. 8) etiam ex quodam ejus Libro, de antidotis deprompta videntur.

Praeter huncce Apollonium autem adhuc sequentes a variis auctoribus citantur:

II. Alter Antiochenus, sive pater sive filius; pater autem, vel *ὁ πρεσβύτερος* memoratur ab Erotiano, (ad vocem *ἀμβην*); junioris vero fascia quaedam invenitur apud Galenum Lib. de fasciis cap. 101.

III. Appollonius Citiensis, cujus Liber *ἐκ τῆς περὶ ἄρθρων πραγματείας* adhuc servatur in Collecta Nicetae, idem Liber *περὶ ἄρθρων* fortasse, quem citat Erotianus, (ad vocem *ἀμβην*). Praeterea adhuc citantur:

1°. Libri XVIII ad explicandas Hippocratis voces, (Erot. Praef.)

2°. Libri II de Epilepticis (Cael. Aurel. Chron. Lib. I. cap. 4.)

Si autem nostra ratiocinatione dubium factum sit, num Apollonius Mus revera idem fuerit ac Citiensis, inde etiam labefactatur opinio Doctiss. Osann, pestem, de qua egit Rufus Ephesius, fuisse illam epidemiam, quae a. U. C. 628 in Africa grassata est, quoniam viri doctissimi integra argumentatio et computatio de aetate Posidonii ac Dioscoridis eo nititur, quod Apollonius Mus fuerit idem ac Citiensis, verumtamen nihilominus semper constabit, ante Rufi (i. e. ante Trajani) aetatem regnasse pestem, quae nullo modo ab hodierna peste differt symptomatibus suis (conf. ipsius Osann opusc. et supra adnot. nostra).

IV. Apollonius ὁ θῆρ, Herophileus, qui vulgo idem habetur ac ὁ ὀφίς. Citatur ab Erotiano (ad vocem ἀμβην et praef.) et Galeno (Lib. de fasciis cap. 104); illum autem respicere videntur Caelius Aurel. (Acut. Lib. II. cap. 28) et Oribasius (Synopsis. Lib. I. cap. 14). Scripsit hicce auctor excerpta ex Bacchii Tanagraei Lexico vocum Hippocraticarum (Erot. Praef.)

V. Apollonius Tyrius Herophileus, qui citatur a Strabone (Geograph. Lib. XVI. cap. 2. § 24. pag. 341) et teste Cl. Sprengel a Galeno (lib. de fasciis), ubi tamen in editione Renat. Charterii agitur de Apollonio τῷ θηρῶ, nisi haec vox emendatio sit Charterii, neque etiam absonum esset, conjicere, Apollonium τὸν θηρῶ et Apollonium Tyrium eundem fuisse. Quaeritur porro a Cl. Sprengel (l. l.), an hicce Apollonius sit idem, qui de sequelis morsuum serpentum scripsit (Scholiast. ad Nicandri Theriaca vs. 303.)

VI. Apollonius Memphites, idem ac Apollonius ὁ ἀπὸ Στρατώνος (quod cognomen Sprengel (Pragmat. Gesch. der Medizin Tom. I. pag. 570) explicat *discipulum Stratonis*, non vero, ut vulgo fit, *filium Stratonis*) erat Erasistrateus (Isagoge cap. 10) scripsitque de plantis (Scholiast. ad Nicand. Theriaca vs. 52 et 559), et περὶ ἀρθρῶν (Erot. ad vocem ἀμβην.); citantur porro ejus quatuor pulsus definitiones (Galenus de differ. pulsuum Lib. IV. cap. 17), ejus collyrium (Aëtius Tetrab. II. III. cap. 220) et ejus epithema auriculare (Nicol. Myreps. de composit. medicam. Sect. XLVIII. cap. 11).

Citatur et a Caelio Aurel. (Chron. Lib. III. cap. 8 et Lib. IV. cap. 8) et verisimiliter ab Oribasio (Collect. Medic. Lib. VII. cap. 19).

VII. Apollonius Archistrator, cujus pastillus citatur a Galeno (de composit. medicam. sec. loc. Lib. V. cap. 12); illum autem Cl. Sprengel auctorem dicit Librorum περὶ ἐμπορίστων (l. l. Tom. II. pag. 76) atque eundem habere videtur ac Apollonium Pergamenum, quem nos supra eundem diximus ac Apollonium Murem.

VIII. Claudius Apollonius, cujus medicamentum ad rabiosorum morsus citat Galenus (Antidot. Lib. II. cap. 11).

IX. Apollonius Glaucus, cujus Libros de interioribus citat Caelius Aurel. (Chron. Lib. IV. cap. 8.)

X. Apollonius Organicus, cujus medicamentum ad carbunculos citatur a Galeno (de composit. medic. sec. gen. Lib. V. cap. 15).

XI. Apollonius Pitanaeus, qui citatur a Plinio (Nat. Hist. Lib. XXIX. cap. 6.)

XII. Apollonius Thespius (Galenus apud Fabricium l. l. pag. 76.)

XIII. Quaeritur, num Apollonius, qui citatur ab Apulejo (Metamorph. Lib. IX. pag. 268. ed. Juliani Floridi) fuerit unus ex supra enumeratis vel alius quisquam omnium novissimus.

XIV. Autumat denique Fabricius (l. l. pag. 76) apud Galenum (Lib. I. de meth. med. cap. 7) loco *Apollonidae* legendum esse *Apollonii*, Apolloniumque Cyprium methodicum, de quo hic agitur, eundem esse putat ac Apollonius ille, qui bis citatur in Galeno adscripto Libro de virtute Centaureae.

Ibid. *δοθιήνας*. *Δοθιήν* a Paulo Aegin. (Lib. IV. cap. 23) dicitur *ὄγκος ἀποστήματώδης ἐκ παχέων χυμῶν, ἐν τοῖς σαρκώδεσι μάλιστα τόποις συνιστάμενός*. Celsus autem furunculum sequenti modo circumscibit: (Lib. V. cap. 28. § 8) » Furunculus vero » est tuberculum acutum cum inflammatione et dolore; maximeque ubi jam in pus vergit. Qui » ubi adaperitus est, subter apparet pars carnis in » pus versa, pars corrupta subalbida, subrubra, » quem ventriculum quidam furunculi nominant." Galenus vero (Lib. de tumor. praeter naturam cap. 16) illum refert ad affectiones *φλεγμονώδεις* et de medic. compos. sec. loc. Lib. V. cap. 3 duas distinguit furunculi species, quarum alteram constituunt varosi, duri et concoctu difficiles, alteram vero, quibus aliquando febres accedunt, tumor in

magnitudinem excrescit et in pus mutatur. Scripserunt etiam de furunculis Oribasius Synops. Lib. VII. cap. 41 et Euporist. Lib. III. cap. 53 et Actuarius de meth. med. Lib. II. cap. 12, Lib. IV. cap. 16 et Lib. VI. cap. 6.

Ibid. lin. 1. ἑτήνη. Resinam multarum arborum adhibebant antiqui; praeter Terebinthum autem, de qua jam locuti sumus, enumerat Plinius (Nat. Hist. Lib. XVI. cap. 10) scandulum, pinum, pinastrum, abietem, piceam, laricem, tedam et taxum, quae omnes ad genus Pinum pertinere videntur; passim tamen et occurrunt resina Lentiscina vel mastix (e Pistacia Lentiscus Linn.), Cyparissina (e Cupresso sempervirente Linn.) aliaeque species multae, de quibus omnibus plura leguntur apud Theophrastum Hist. Plant. Lib. VIII. cap. 2, Dioscoridem Lib. I. cap. 92 et 93, Plinium l. l., Lib. XIV. cap. 21 et Lib. XXIV. cap. 6, Galenum de simplic. medic. temper. ac facult. Lib. VIII. cap. 17. § 4, Oribasium Synops. Lib. II. cap. 61, Collect. Medic. Lib. XII et Lib. XV. cap. 1, Eupor. Lib. II. cap. 1, Aëtium Tetrab. I. I. et Paulum Aegin. Lib. VII. cap. 3.

Ibid. ὀθόνιον. Ὀθόνια in universum indicant lintea. Lintea autem, quae a medicis adhibentur (teste Hippocrate de medici offic. pag. 744) esse debent κοῦφα, λεπτά, μαλθακὰ, καθαρὰ, πλατέα, μὴ ἔχοντα συρράφας, μὴδ' ἐξεστίας, καὶ ὑγία ὥστε ταυτεῖν φέρειν, καὶ ὀλίγω κρέσσω.

Ibid. lin. 2. *μάνναν*. Quoniam medicamentum purgans manna dictum solummodo occurrit apud novissimos auctores Graecos, uti Actuarius (de meth. med. Lib. V. cap. 8), de illo hic haud dubie non est sermo; hinc putavi hic subaudiri vocem *λίβανου* ideoque verti *micam thuris* i. e. (ut dicit Actuarius l. l. Lib. VI. cap. 5) » quod ex confracto in » magnis oneribus thure succutitur: in ea siquidem » feruntur exigua confracta frustula corticis thuris." De hac mica thuris autem conf. Dioscorides Lib. I. cap. 83, Oribasius Collect. Medic. Lib. XI, Paulus Aegin. Lib. VII. cap. 3 et Actuarius l. l.

Ibid. lin. 4. *ἀλφιτον*. *Ἀλφιτον* apud Hippocratem omnem farinae speciem significare refert Galenus (Exeg. ad vocem), quia (Lib. de morbis mulierum pag. 607) memorantur *ἀλφιτα* triticea et (Lib. de intern. affect. pag. 545) *ἀλφιτα* e lentibus et ervis tostis. Apud alios auctores vero (e. g. Galenum de alim. facult. Lib. I. cap. 11) haec vox significat farinam hordei leviter tosti vel frixi, (Lat. *polenta*), licet tamen Dieuches (apud Oribasium Collect. Medic. Lib. IV. cap. 6) etiam loquatur de polenta ex avena hordeaceae postponenda. De polenta autem conf. Galenus l. l., Oribasius Collect. Medic. Lib. IV. cap. 1 et 6 et Lib. XI et Eupor. Lib. II. cap. 1, Aëtius Tetrab. I. I et Paulus Aegin. Lib. I. cap. 73 et Lib. VII. cap. 3.

Pag. 86. lin. 3. *στέαρ αἰγίων ἢ βόειον* et lin. 9 *ῥορνιθίου στέατος*. Antiqui multorum animalium

adipem inter medicamenta recensent: sic Galenus (de simplic. medic. temper. ac facult. Lib. XI. cap. 1. § 2) enumerat adipem suillum, bubulum, caprinum, anserinum, gallinaceum, vitulinum, leoninum, viperarum, ursorum, vulpium et piscium marinarum et fluviatilium; praeterea Plinius (Nat. Hist. Lib. XXIX. cap. 5) struthiocamelinum; Oribasius (Collect. Medic. Lib. XII.) ovillum, agninum et cervinum; Aëtius (Tetrab. IV. III. cap. 3) pantherinum et hyaenarum; Paulus Aegin. (Lib. IV. cap. 32) pardalium et phasianorum. De illis adipibus autem conf. Dioscorides Lib. II. cap. 88—94, Plinius l. l., Oribasius l. l. et ibid. Lib. XII, Lib. XIV. cap. 60 et Lib. XV. cap. 2, Eupor. Lib. II. cap. 1, Aëtius Tetrab. I. II. cap. 152 et Paul. Aegin. l. l. et Lib. VII. cap. 3. Praeterea omnes hi auctores etiam distinguebant adipem animalium marium et femininarum, juniorum et veterum, domesticorum et sylvestrium, uti et recentem adipem et veterem, ita ut Aëtius Tetrab. IV. II. cap. 44 commendet adipem quadraginta annorum cum oleo adversus ulcera maligna. De usu vero adipis inter alimenta scripserunt Galenus de aliment. facult. Lib. III. cap. 11, Oribasius Collect. Medic. Lib. II. cap. 38 et Paulus Aegin. Lib. I. cap. 85.

Ibid. lin. 8. *μυρίκη*. *Μυρίκη* erat Tamarix Gallica Linn. (Dierbach Die Arzneim. des Hippokr. pag. 94), de qua planta ejusque viribus egerunt Theophrastus Hist. Plant. variis in locis, Dioscorides Lib. I.

cap. 116, Plinius Nat. Hist. Lib. XXIV. cap. 9,
 Galenus de simplic. medic. temper. ac facult. Lib.
 VII. cap. 12. § 28, Oribasius Collect. Medic. Lib.
 XIV. cap. 10 et Lib. XV. cap. 1, Aëtius. Tetrab.
 I. I. et Paul. Aegin. Lib. VII. cap. 3.

TANTUM.



THESES.

I.

Omnium epidemiarum, quas nomine pestis (λοιμοῦ) memorant antiqui auctores Graeci et Latini, bubo constans erat syntoma.

II.

Perperam a Cl. SPRENGEL (Pragmat. Geschichte der Medizin Tom. II, pag. 76) APOLLONIUS ARCHISTRATOR dicitur auctor librorum περὶ εὐπορίστων.

III.

Syphilis propago vel mutata forma leprae (elephantiasis ARETAEI aliorumque antiquorum) est habenda, neque ejus origo aliunde est quaerenda.

IV.

Recte statuunt, qui virus gonorrhoeicum a syphilitico distinguunt.

THESES.

V.

Arteriae, durante circulatione normali, non contrahuntur.

VI.

Nutritio cartilaginum articularium non fit ope vasorum, verum absorptione ex ambienti synovia.

VII.

In arte rhinoplastica integumenta brachii melius ad novum nasum formandum adhibentur quam frontis.

VIII.

In ossium fracturis applicationem fasciarum, ferularum similiumque differre praestat, donec partium mollium inflammatio sit sedata.

IX.

Si in nova pupilla formanda iridectomia institui possit, haec operatio semper iridodialysi est praefenda.

X.

In partu facie praevia versio numquam est instituenda.

THESES.

XI.

Medico forensi incumbit officium cadavera etiam putrida secandi vel explorandi.

XII.

Ubi inquirendum est, an aliquis, epilepsiam prae se ferens, revera hoc morbo sit affectus, necne, numquam ad methodos dolorificas confugere necessarium est.

XIII.

Illa sensatio, qua homines, licet nullum dolorem nullamve molestiam vel aegrimoniam accurate definiendam percipiant, tamen aegrotos se esse sentiunt, residet in intestino tenui.

XIV.

In inflammationibus exsudativis dictis, uti in angina membranacea, in febre puerperali, cet. usus Mercurii dulcis omnibus aliis remediis est praeferendus.

XV.

Recte Hippocrates (Aphorism. 31 sect. II):
«*Si cui ex morbo cibum probe sumentis corpus*
«*nihil proficit, malum.*»

THESES.

XVI.

Embryotomia, quae in quocunque casu mortis infantem ponit certam, pertinet ad operationes rarissimas quidem, verum in hodierno quoque artis obstetriciae statu necessarias.

XVII.

Instrumentum illud, quod nuperrime Cl. BAUDELLOCQUE jun^r nomine cephalotribe proposuit quodque in casu indicatae excerebrationis, perforatorii vices adimpleret, melius mihi convenire videtur in casu infelicissimo, quo caput, avulso corpore infantis, in utero remanserit.

AD CONTEXTUM ET VERSIONEM.

ADDENDA ET EMENDENDA.

P. 5. 2. l. 14 pro spina l. *dorso* — P. 8. l. ult. pro *τίς* l. *τις* — P. 11. 6. l. 3 pro folii, l. *folii*; — P. 12. II. l. 1 pro *χει*- l. *χειρ*- — Ibid. l. 2 pro *ρουργία* l. *ουργία* — Ibid. l. 6 pro *ἦ* l. *τῆ* — P. 15. III. in tit. dele vocem *de* — P. 16. 3. l. 13 pro *καθιέν* l. *καθιέναι* — P. 17. 3. l. 17 pro *mulsum* l. *aqua mulsa* — P. 20. l. 8 pro *ἦτοι* l. *ἦτοι* — Ibid. in marg. pro *αυτοῦ* l. *αὐτοῦ* — P. 21. l. 6 pro *sane* l. *vel* — P. 22. V. l. 1 pro *τὲ* l. *τε* — P. 23. l. 6 pro *roseo* l. *oleo rosaceo* — P. 25. l. 17 pone vocem *aperiatur* insere vocem *ita* — P. 29. 3. l. 5 pro *Clyisma ex his medicamentis vel decoctum rosarum* l. *horum medicamentorum vel rosarum decoctum* — P. 30. l. 4 pro *τότε* l. *τότε* — P. 34. IX. l. 4 pro *μαθητῆς* l. *μαθητῆς* — P. 36. XI. l. 7 pro *ἀναδάκ-* l. *ἀναδάκ-* et *ibid.* l. 8 pro *νει* l. *κνει* — P. 39 in tit. pro *Libro* l. *libris* — P. 40. l. 8 pro *αὶ* l. *αί* — P. 44. XIV. l. 1. 16 pro *τὲ* l. *τε* — Ibid. 2. l. 2 pro *εὐρυτέρας* l. *εὐρυτέρας* — P. 46. l. 15 pro *ετερηδονισμένον* l. *τετερηδονισμένον* — Ibid. 3. l. 7 pro *μηρος* l. *μηρὸς* — P. 48. Not. (1) pro *ἔταν* l. *ἔταν* — P. 50. Not. (2) l. 1 pro *τὲ* l. *τε* — P. 52.

Not. (2) pro 'Απὸ l. 'Απὸ — P. 55. l. 12 pro illa
l. *illud* — P. 56. l. 3 pro πᾶν l. πᾶν — Ibid. 10.
l. 11 pro στομίον l. στόμιον — P. 58. 12. l. 1
pro ἔντερα l. ἔντερζ — P. 61. 13. l. 3 pro plana
l. *planæ* — Ibid. l. 4 pro facta l. *factæ* — P.
63. 15. l. 14 pro perforentur l. *perforetur* et eo-
dem modo ibid. l. 15 — P. 64. l. 1 pro ὑποφορᾶς
l. ὑποφορᾶς — P. 68. l. 25 pro κᾶν l. κᾶν — P.
70. 20. l. 10 pro σχηματιζέσθω l. σχηματιζέ-
σθω. — P. 74. 2. l. 14 pro σύριγγα, l. σύριγγα' —
P. 76. l. 4 pro ἐκά- l. ἐκαθ- et l. 5 pro θάρην l.
αρεν — P. 78. 5. l. 11 pro τὲ l. τε et eodem modo
P. 80. XVI. l. 4 — P. 80. 2. l. 2 pro ἀπολεί-
πουσαν l. ἀπολείπουσαν — P. 83. 3. l. 4 pro
lens l. *lenticula palustris* — Ibid. pro siccis l.
comminutis — P. 83. l. 18 pro sphragis l. *terra*
Lemnia — P. 85. l. 2 pro mulso l. *aqua mulsa* —
Ibid. pro Aegyptia l. *terra Aegyptiaca* — Ibid.
XVIII. l. 2 pro micamthuris l. *micam thuris* —
P. 87. l. 6 pro organi l. *origani*.

AD ADNOTATIONES.

P. 3. l. 19 pro femus l. *femur* — P. 5. l. 3
pro et in fine ejusdem l. *et in fine ejusdem cap.* —
Ibid. l. 26 pro dubi sunt palmae l. *dubie sunt*

palmulae et pone haec verba inserte *vel fructus Phoenicis Dactyliferae Linn.* — Ibid. l. 27 et saepius infra pro Theophrastes l. *Theophrastus* — P. 10. l. 10 pro XXXIV l. XXIV — Ibid. l. 20 et sqq. dele adnot. ad vocem *μελικράτω* — P. 11. l. 16 bis pro *σπληνίον* l. *σπλήνιον* — P. 13. l. 7 pro recentibus l. *recentioribus* — P. 17. l. 9 pro *ἀναπληρουσθω* l. *ἀναπληρούσθω* — P. 19. l. ult. pro § 8 cap. 15 § 13 cap. 18 l. § 8, cap. 15 § 13, cap. 18 — P. 26. l. 10 pro Tetrab. IV. 4 l. Tetrab. IV. IV. — P. 26. l. 14 pone vocem *ἐπὶ* inserte *et pro βαρυτόνως βαρυτόνος* — P. 38. l. 11 pro Abie l. *Abiete* — Ibid. l. 27 pro Διοκλέος l. *Διοκλέος* — P. 39. l. 20 pro Tom. 12 l. Tom. XII — P. 40. l. 13 pro Comment. in Hippocratis de Epidem. Lib. I l. *apud Fabritium l. l.* — P. 41. l. 11 et eodem modo l. 12 *ἔρφνη γὰρ* l. *ἔρφνη γε* — P. 43. l. 3 pone vocem *ὁ* inserte *nisi ὁ omnino sit delendum* — Ibid. l. 22 pro *τινας* l. *τινὰς* — P. 46. l. 19 pro Definit. l. Definit. — Ibid. l. 21 pro *τρημάτων*; l. *τρημάτων*, — Ibid. pone lin. ult. adde *ibid. lin. 7. βραχίον. Hic pro βραχίον mihi legendum esse videtur βραχίων* — P. 48. l. 4 pro *δυσεργέστερα* l. *δυσεργεστέρα* — P. 49 pone l. 23 inserte *ibid. lin. 10. φλέβαν. Haud dubie pro φλέβαν hic legendum est φλεβὰ* — P. 50 l. 26 pro *σμίλη* l. *σμίλη* — P. 56. l. 22 pone *et* inserte vocem *e* — Ibid. l. 23 pro vituperat l. *vituperet* — P. 59. l. 19 pro Paulum l. *Paulus* — P. 65. l. 8 pone vocem *conf.* inserte

*Theophrastus Hist. Plant. Lib. III. cap. 17, Lib. IV. cap. 15, Caus. Plant. Lib. III. cap. 16—22 et Lib. V. cap. 5 et 13 multisque aliis in locis — Ibid. l. 10 pro ille l. illud — Ibid. l. 14 pro Galeni l. Galenus — P. 71. l. 20 pro alte- l. alter- et l. 21 pro ruter l. uter — P. 74. l. 3 pro γαγγραίνων l. γαγγραίνων — P. 74. l. 5 pro ἄλλότριον l. ἀλλότριον — P. 76. l. 26 p. 4 l. 14 — P. 79. pone lin. 20 insere : *ibid. Hic pro πύρινον δὲ mihi legendum esse videtur πύρινόν τε* — P. 81. l. 1 pro οἰσυπηρα l. οἰσυπηρὰ — P. 82. l. 5 pro alimentio l. alimento — P. 88. l. 22. pro οἰδήματε l. οἰδήματι — P. 89. l. 17 pro ἔστι l. ἐστι — P. 92. l. 9 pro expectandam l. *expectandum.**

AD THESES.

Thes. XVI. l. 1 et 2 pro mortis infantem l. mortem infantis.