

T7903/1129(12)

CHINESE-JAPANESE LIBRARY
HARVARD-YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY

12

4 OCT 1951

小便黃赤

哈佛大學
哈佛藥宗
圖書館
珍藏印

諸病水液渾濁皆屬於熱。小便黃者少腹中有熱也。藏府小便黃有四。一屬肝熱經云肝熱病者小便先黃是也。二屬胃實經云胃足陽明之脈氣盛則身已前皆熱其有餘於胃則消穀善饑溺色黃是也。三屬肺虛經云肺手太陰之脈氣虛則肩背痛寒少氣不足以息溺色變是也。四屬腎虛經云冬脈者腎脈也冬脈不及則令人眇清脊痛小便變是也。運

氣小便黃有三 一屬風經云厥陰之勝眩勝
氣并化而爲熱小便黃赤是也 二屬熱經云
少陰司天熱淫所勝病溺色變又云少陽之勝
溺赤善驚又云陽明司天燥氣下臨暴熱至乃
暑陽氣鬱發小便變是也蓋暴熱謂地氣少陰
之熱也 邪之所在皆爲不足中氣不足溲便
爲之變補足外踝下留之用藥則補中益氣湯
是已 小便黃無如黃蘗知母効 脉經云尺
瀦足脛逆冷小便赤宜服附子四逆湯足太衝

補之遺精

丹溪書分夢遺精滑爲二門蓋夢與鬼交爲夢
遺不因夢感而自遺者爲精滑然總之爲遺精
也其治法無二故合之 或問精滑何因得之

曰金匱要畧胃虛冷之病尿孚大手足煩陰寒

精自出又謂取精太此名華亡血失精又謂

小腹弦急冷頭寒脉動微緊男失精女子夢交

通果氏病源以虛勞病分出五勞七傷六極二

一曰勞心 二曰勞力 三曰勞神 四曰勞氣 五曰勞血 六曰勞精 七曰勞志 八曰勞思 九曰勞慮 十曰勞傷 十一曰勞損 十二曰勞傷 十三曰勞傷 十四曰勞傷 十五曰勞傷 十六曰勞傷 十七曰勞傷 十八曰勞傷 十九曰勞傷 二十曰勞傷 二十一曰勞傷 二十二曰勞傷 二十三曰勞傷 二十四曰勞傷 二十五曰勞傷 二十六曰勞傷 二十七曰勞傷 二十八曰勞傷 二十九曰勞傷 三十曰勞傷 三十一曰勞傷 三十二曰勞傷 三十三曰勞傷 三十四曰勞傷 三十五曰勞傷 三十六曰勞傷 三十七曰勞傷 三十八曰勞傷 三十九曰勞傷 四十曰勞傷 四十一曰勞傷 四十二曰勞傷 四十三曰勞傷 四十四曰勞傷 四十五曰勞傷 四十六曰勞傷 四十七曰勞傷 四十八曰勞傷 四十九曰勞傷 五十曰勞傷 五十一曰勞傷 五十二曰勞傷 五十三曰勞傷 五十四曰勞傷 五十五曰勞傷 五十六曰勞傷 五十七曰勞傷 五十八曰勞傷 五十九曰勞傷 六十曰勞傷 六十一曰勞傷 六十二曰勞傷 六十三曰勞傷 六十四曰勞傷 六十五曰勞傷 六十六曰勞傷 六十七曰勞傷 六十八曰勞傷 六十九曰勞傷 七十曰勞傷 七十一曰勞傷 七十二曰勞傷 七十三曰勞傷 七十四曰勞傷 七十五曰勞傷 七十六曰勞傷 七十七曰勞傷 七十八曰勞傷 七十九曰勞傷 八十曰勞傷 八十一曰勞傷 八十二曰勞傷 八十三曰勞傷 八十四曰勞傷 八十五曰勞傷 八十六曰勞傷 八十七曰勞傷 八十八曰勞傷 八十九曰勞傷 九十曰勞傷 九十一曰勞傷 九十二曰勞傷 九十三曰勞傷 九十四曰勞傷 九十五曰勞傷 九十六曰勞傷 九十七曰勞傷 九十八曰勞傷 九十九曰勞傷 一百曰勞傷

遺精

丹溪書分夢遺精滑爲二門蓋夢與鬼交爲夢遺不因夢感而自遺者爲精滑然總之爲遺精也其治法無二故合之 或問精滑何因得之曰金匱要畧謂虛勞之病脉浮大手足煩陰寒精自出又謂脉弦而大此名革亡血失精又謂小腹弦急陰頭寒脉動微緊男失精女子夢交通巢氏病源以虛勞病分出五勞七傷六極二十三蒸之名於七傷中精連蒸病中玉房蒸男

則遺瀝漏精與尿精聞見精出及失精等候皆
混同仍類虛勞門爲腎主藏精故盡作腎氣衰
弱之病似若他藏無損焉豈其然哉夫五藏皆
藏精者也嘗攷靈樞本神篇首謂天之在我者
德也地之在我者氣也德流氣薄而生者也故
生之來謂之精兩精相搏謂之神如是者通言
一身主宰之精神也因心腎是水火之藏法天
地施化生成之道故藏精神爲五藏之宗主其
次言所以任物者謂之心心有所憶謂之意意

有所存謂之志因志而存變謂之思因思而遠
慕謂之慮因慮而處物謂之智如是者皆因心
神隨物所感變而分之是謂五志遂有五神藏
之名五神旣分則於德化政令性味各司其屬
者之用於是心腎之水火亦俯從五神之列然
而所主之精神則並行未始相離而五神五變
者分之如此則精亦從神之所變隨處與之合
矣故五藏各得藏其精神以行其用是之謂藏
真主所以屬本氣之生化者也苟有一藏之真

不得其正則一藏之病作矣苟一藏之精神傷之甚者則必害其心腎之主精神者也如所謂怵惕思慮則傷神神傷則恐懼流淫而不止喜樂恐懼則傷精精傷則骨痠痿厥而不舉喜樂者憚散而不藏恐懼者蕩燿而不收是故主藏精者不可傷傷則失守而陰虛陰虛則無氣無氣則死矣如是者精神之在五藏傷之則淫邪立至心之在志為喜在氣為火為熱腎之在志為恐在氣為水為寒於是怵惕思慮傷其精神

傷則火動不止火動不止則腎水恐懼之志者并矣恐甚不解則動中而腎自傷腎主藏精與所受五藏六府所輸至之精皆不得藏而時自下矣此乃以心腎主宰精神者言也至若他藏之精各得而泄有所據乎曰內經所謂思想無窮所願不得意淫於外入房太甚宗筋弛縱發為白淫其病筋痿筋痿者生於肝使內王註以白淫是白物淫衍如精之狀因溲而下雖云如精殆非將化未成之精而徑出者乎何以言之

精有謂生來之精者先身生之精也有謂食氣入胃散精於五藏者有謂水飲自脾肺輸腎而四布五經並行之精者此水穀日生之精也然飲食日生之精皆從生來元精之所化而後分布其藏盈溢則輸之於腎腎乃元氣之本生成之根以始終化之養之之道也若飲食之精遇一藏有邪則其藏之食味化之不全不得入與元精俱藏而竟泄出與夫所謂脾移熱於腎少腹冤熱而痛出白者義亦如之王註雖謂消脂

燍肉無乃消其腎所藏之精歟蓋使二藏無病則此白物其不爲精乎使二藏有病則所藏之精其不變爲白物而出之乎以此比例則肺脾二藏之精寧不有似肝藏之傷神動氣致精失守而走泄者乎然則治當何如曰獨腎泄者治其腎由他藏而致腎之泄者則兩治之在他藏自泄者治其本藏必察四屬以求其治大抵精自心而泄則血脉空虛本縱不收自肺而泄者皮革毛焦喘急不利自脾而泄者色黃肉消四

肢懈惰自肝而泄者色青而筋痿自腎而泄者
色黃黑髓空而骨清卽脉亦可辨也 或問夜
夢交接之理何如曰內經曰腎者主水受五藏
六府之精而藏之又曰主蟄封藏之本精之處
也又曰陰陽之要陽密乃固故陽強不能密陰
氣乃絕陰平陽秘精神乃治陰陽離決精氣乃
絕又曰陰陽總宗筋之會會於氣街靈樞淫邪
發夢篇曰厥氣客於陰器則夢接內蓋陰器者
宗筋之所繫也而足太陰陽明少陰厥陰之筋

皆結聚於陰器與衝任督三脉之所會然厥陰
主筋故諸筋皆統屬於厥陰也腎爲陰主藏精
肝爲陽主踈泄陰器乃泄精之竅是故腎之陰
虛則精不藏肝之陽強則氣不固若遇陰邪客
於其竅與所強之陽相感則精脫出而成夢矣
所謂陽強者非藏之真陽強也乃肝藏所寄之
相火強耳蓋木爲陰火爲陽故通言火爲陽然
分言之則爲二若火盛不已反消亡其藏之真
陽也肝乃魂之居藏之真陽虛則遊魂爲變變

則爲夢與肝虛病者多夢亡人無異曰如子所言夢遺則從肝腎得之乎曰不然病之初起亦有不在腎肝而在心肺脾胃之不足者然必傳於肝腎而後精方走也蓋有自然相傳之理存焉何則宗筋者上絡胸腹挾贛下合橫骨故內經謂其總陰陽之會會於氣衝主束骨而利機關也夫五藏俱有火其相火之寄於肝者善則發生惡則爲害獨甚於他火故平人肝氣之剛勇充於筋而爲罷極之本也其陰器既宗筋之

所聚乃強於作用皆相火充其力也若遇接內得陰氣與合則三焦上下內外之火翕然而下從百體玄府悉開其滋生之精盡趨會於陰器以躍出豈止腎之所藏者而已哉所謂厥氣客於陰器則夢者其厥氣亦身中陰分所逆之氣與接內之氣同是陰類故夢猶接內之精脫也若思欲不已精氣已客於陰器至卧故成夢而泄矣但夢者因真陽虛而得之故精脫之後其氣未能卒復未免形體衰憊不比平人接內之

氣一二時便可復也曰治法當何如曰病從他
藏而起則以初感病者爲本腎肝聚病處爲標
若由腎肝二藏自得者獨治腎肝由陰陽離決
水火不交通者則既濟之陰陽不相抱負者則
因而和之陽虛者補其氣陰虛者補其血陽強
者瀉其火火有正治反治從多從少隨其攸利
經曰思想無窮所願不得意淫於外入房太
甚宗筋弛縱發爲白淫夢遺等證先賢治法有
五其一用辰砂磁石龍骨之類鎮墜神之浮

游河間秘真丸本事八仙丹之屬是也其二
思想結成痰飲迷於心竅而遺者許學士用猪
苓丸之類導利其痰是也其三思想傷陰者
潔古珍珠粉丸海藏大鳳髓丹本事清心丸丹
溪用海蛤粉青黛香附黃蘗知母之類降火補
陰是也其四思想傷陽者謙甫鹿茸菴蓉兔
絲子等補陽是也其五陰陽俱虛者丹溪治
一形瘦人便濁夢遺作心虛治用珍珠粉丸定
志丸服之是也戴氏云遺精得之有四有用

心過度心不攝腎以致失精者有因思色欲不遂致精失位輸瀉而出者有色欲太過滑泄不禁者有年壯氣盛久無色欲精氣滿泄者然其狀不一或小便後出多不可禁者或不小便而自出或莖中出而痒痛常如欲小便者並宜先用辰砂妙香散吞玉華白丹佐以威喜丸或分清飲別以綿裹龍骨同煎或分清飲半貼加五倍牡蠣粉白茯苓五味子各半錢 失精夢泄亦有經絡熱而得者若以虛冷用熱劑則精愈

失本事方清心丸用黃蘗腦子者最良

大智禪師云夢

遺不可全作虛冷亦有經絡熱而得之者嘗治一男子至夜脊心熱夢遺用珍珠粉丸猪苓丸遺止終服紫雪脊熱始除又一男子脉洪腰熱遺精用沉香和中丸下之導赤散治其火而愈於此知身有熱而遺者皆熱遺也 若果是用心過度而得之宜

遠志丸用交感湯加蓮肉五味子吞下仍佐以

靈砂丹 若審是思色欲不遂得之且以四七

湯吞白丸子甚者耳聞目見其精即出名曰白

淫妙香散吞玉華白丹 初虞世方治清滑不禁用青州白丸子辰砂為

衣服之神効 若審是色欲過度下元虛憊泄滑無

禁宜正元飲加牡蠣粉肉苁蓉各半錢吞養氣丹或靈砂丹仍佐以鹿茸丸山藥丸大兔絲子

丸固陽丸之類按此項藥太儲燥若妄用過劑則陰水耗竭壯火獨炎枯脂消

肉骨立筋痿而成不救之疾矣用者審之若審是壯盛滿溢者本

事方清心丸 夢遺俗謂之夜夢鬼交宜溫膽

湯去竹茹加人參遠志蓮肉酸棗仁炒茯苓各

半錢吞玉華白丹固陽丸夢遺亦備前四證宜

審其所感用前藥 婁全善云愚壯年得夢遺

症每四五十日必一遺累用鳳髓丹河間秘真

丸雖少効終不除根後改用菖蒲遠志韭子桑

螵蛸益智酸棗仁牡蠣龍骨瑣陽等劑為丸服

之良愈又一中年男子夢遺以珍珠粉丸等藥

與服了無一効亦以遠志菖蒲等劑服之隨手

而愈 又云王元珪虛而泄精脉弦大累與加

減人物湯吞河間秘真丸及珍珠粉丸其泄不

止後用五倍子一兩茯苓二兩為丸服之良愈

此則五倍子溫脫之功敏於龍骨牡蠣也 又

云詳古治夢遺方屬鬱滯者居大半庸醫不知

其鬱但用龍骨牡蠣等澀劑固脫殊不知愈澀愈鬱其病反甚嘗治一壯年男子夢遺白濁少腹有氣衝上每日腰熱卯作酉涼腰熱作則手足冷前陰無氣腰熱退則前陰氣耕手足溫又旦多下氣暮多噫時振隔一旬二旬必遺脉旦弦滑而大午洪大予知其有鬱滯也先用沉香和中丸大下之次用加減八物湯吞滋腎丸百粒若稍與蛤粉等澆藥則遺與濁反甚或一夜二遺遂改用導赤散大劑煎湯服之遺濁皆止

漸安又一中年男子夢遺醫或與澆藥反甚連遺數夜愚先與神芩丸大下之却製猪苓丸服之皆得痊安又丹溪治鎮守萬戶蕭伯善便濁精滑不禁百藥不効與試倒倉法而安於此見夢遺屬鬱滯者多矣 葉氏云遺滑之證予累見人多作腎虛而用補澀之藥無効殊不知此因脾胃濕熱所乘飲酒厚味痰火之人多有此疾腎雖藏精其精本於脾胃飲食生化而輸於腎若脾胃受傷濕熱內鬱使中氣滯而不清則

所輸皆濁氣邪火擾動水不得而安靜故遺滑也治以蒼白二陳湯加黃蘗升麻柴胡俾清氣升濁氣降而脾胃健運則遺滑自止矣其有欲心太熾思想無窮而致者當從心治心清則神寧而火不妄起宜遠志丸茯神湯房勞無度致腎虛者必兼見怯弱等證方可用補腎藥故治有多端須當審察不可偏作腎虛治也 趙以德治鄭叔魯二十餘歲攻舉子業讀書夜至四鼓猶未已遂發此病卧間玉莖但着被與腿便

夢交接脫精懸空則不夢飲食日減倦怠少氣此用心太過二火俱起夜不得睡血不歸肝腎水不足火乘陰虛入容下焦鼓其精房則精不得聚藏而欲走因玉莖着物猶厥氣容之故作接內之夢於是上補心安神中調脾胃升舉其陽下用益精生陰固陽之劑不三月而病安矣 一老人年六十患瘡嗽自服四獸飲多積成濕熱乘於下焦幾致危困診其脉尺部數而有刀與補中益氣加涼劑三日與黃蘗丸次早診

之尺脉頓減問之曰夜來夢交接否曰然幸不
泄曰年老精衰固無以泄其火熱結於精房者
得泄火益陰之藥其火散走於陰器之竅病可
減矣再服二日又夢其瘡嗽全愈亦有鬼魅
相感者大全良方論婦人夢與鬼交者由藏府
虛神不守故鬼氣得爲病也其狀不欲見人如
有對晤時獨言笑或時悲泣是也脉息乍大乍
小乍有乍無皆鬼邪之脉又脉來綿綿不知度
數而顏色不變亦其候也夫鬼本無形感而遂

通蓋因心念不正感乃召其鬼附邪氣而入體與
相接所以時見於夢治之之法則朱砂雄黃麝
香鬼箭虎頭骨辟邪之屬是也 蔣右丞子每
夜有夢招以德治之連二日診脉觀其動止終
不舉頭但俯視不正當人知爲陰邪相着叩之
不肯言其所交之鬼狀其父遂問隨出之童僕
乃言一日至城隍廟見侍女以手於其身摩久
之二五日遂聞病此卽令法師入廟毀其像小
腹泥土皆濕其病卽安 試觀張仲景治下焦

真陽與精血兩虛病小腹弦急脉孔動微緊男子失精女子夢交通則用桂枝龍骨之屬溫之固之若陽浮上而不降作悸衄手足煩熱咽乾口燥陰獨居於內而為裏急腹中痛夢失精者小建中湯和之皆可取以為法也 醫家大法曰嘗治脫真不止者以澀劑收止之則不能收不能止不若瀉心火若瀉心火不能止之不若用升陽之劑加風藥之類止之非此能止之也舉其氣上而不下也

赤白濁

溺與精所出之道不同淋病在溺道故綱目列之肝膽部濁病在精道故綱目列之腎膀胱部今患濁者雖便時莖中如刀割火灼而溺自清唯竅端時有穢物如瘡膿目眵淋漓不斷初與便溺不相混濫猶河中之濟焉至易辨也每見時醫以淋法治之五苓八正雜投不已而增劇者不可勝數予每正之而其餘尚難以戶說也蓋由精敗而腐者什九由濕熱流注與虛者什

一 丹溪云屬濕熱有痰有虛赤屬血由小腸屬火故也白屬氣由大腸屬金故也或曰思慮過度嗜欲無窮俾心腎不交精元失守以為赤白二濁之患赤濁者為心虛有熱由思慮而得之白濁者為腎虛有寒因嗜欲而得之葉氏曰原病式以赤白濁均屬於熱其辨甚明然因於虛寒者不可謂無如上述所言是也但熱多寒少耳虛熱者清心蓮子飲虛寒者草薢分清飲白濁有濕痰流注宜燥中宮之濕赤者濕傷血也 有胃中濁氣下流滲入膀胱而白濁者蒼白二陳湯加升提之劑 虛

勞者用補陰藥胃弱者參朮加升麻柴胡心經伏暑赤濁者四苓散加香薷麥門冬人參石蓮肉 戴氏云有白濁人服玄兔丹不愈服附子八味丸即愈者不可不知 有小便如常停久纔方淀濁有小便出即如米泔若小兒疳病者宜分清飲加茯苓半錢 小兒絲子丸 如服藥未效宜四七湯吞青州白丸子及辰砂妙香散吞玄兔丹及小兒絲子丸山藥丸如白濁甚下涎如泥或稠粘如膠頻逆而澀痛異常此

非是熱淋此是精濁室塞竅道而結宜五苓妙
香散吞八味丸小兒絲子丸或葶藶分清飲
精者血之所化有濁去太多精化不及赤未變
白故成赤濁此虛之甚也何以知之有人天癸
未至強力好色所泄半精半血若溺不赤無
他熱症縱雖赤濁不可以赤為熱只宜以治白
濁法治之 若溺赤下濁亦赤口渴時發熱者
辰砂妙香散吞靈砂丹或清心蓮子飲發熱不
退口燥舌乾之甚者此乃精虧內燥腎枯不潤

四物湯吞玄兔丹和加減八味丸久服乃效

按

熱燥如此而用藥無一涼補濡潤之劑非其治也曷若以生地麥門冬五味鹽炒黃芪淡竹葉地骨皮山藥之類治之 或問丹溪云白濁之病因何與

前人所論不同將古今異也子能與我折衷乎
曰辨古今之得失必以內經證之是病自巢氏
病源候論曰白濁者由勞傷腎腎氣虛冷故也
由是歷代方論宗其說無異詞不唯白濁之理
不明所治之法亦誤不思內經本無白濁之名
唯言少陰在臬客勝溲便變少陽在臬客勝則

溲白又言思想無窮入房太甚發爲白淫與脾
移熱於腎出白二者皆隨溲而下夫如是非白
濁之源乎原病式因舉內經謂諸病水液渾濁
皆屬於熱言天氣熱則水渾濁寒則清潔水體
清火體濁又如清水爲湯則自然白濁也可謂
發聖人之旨以正千載之誤矣然不讀其書者
世猶未盡知斯道也予嘗聞先生論白濁多因
濕熱下流膀胱而成赤白濁卽靈樞所謂中氣
不足溲便爲之變是也必先補中氣使升舉之

而後分其藏府氣血赤白虛實以治與夫其他
邪熱所傷者固在瀉熱補虛設腎氣虛甚或火
熱亢極者則不宜峻用寒涼之劑必以反佐治
之要在權衡輕重而已 痿論曰思想無窮所
願不得意淫於外入房太甚宗筋弛縱發爲筋
痿及爲白淫夫腎藏天一以慳爲事志意內治
則精全而瀋若思想外淫房室太甚則固有淫
洩不守輒隨溲溺而下也然本於筋痿者以宗
筋弛縱也宜內補鹿茸丸茯苓丸金箔丸珍珠

粉丸

脈洪大而澹按之無力或微細或沉緊而澹為元氣不足若尺脈虛或浮者急疾者皆難治遲者易治

前陰諸疾

陰縮陰縱 陰冷陰痒

陰痿 陰腫痛

陰汗臊臭 陰吹

前陰所過之脈有二一曰肝脈二曰督脈經云足厥陰之脈入毛中過陰器抵少腹是肝脈所過也又云督脈者起於小腹以下骨中央女子入繫廷孔循陰器男子循莖下至篡與女子等是督脈所過也

陰縮陰縱

陰縮謂前陰受寒入腹內也陰縱

謂前陰受熱挺長不收也經曰足厥陰之筋傷於寒則陰縮入傷於熱則縱挺不收治在行水

清陰氣是也。丹溪治鮑兄二十餘歲玉莖挺長腫而痿皮塌常潤磨股不能行兩脇氣上手足倦弱先以小柴胡加黃連大劑行其濕熱畧加黃蘗降其逆上之氣其挺腫漸收漸減及半但莖中有堅塊未消遂以青皮爲君佐以散風之劑末服外以絲瓜汁調五倍子末傅而愈。平江王氏子年三十歲忽陰挺長腫而痛脉數而實用朴硝荆芥湯浸洗又用三一承氣湯太下之愈。內經刺灸前陰挺長之法有一經云

足厥陰之別名曰蠡溝去內踝五寸別走少陽其病實則挺長取之所別是也。內經診陰縮而死者皆屬肝傷經云肝悲哀動中則傷魂魂傷則狂妄不精不精則不正當陰縮而攣筋兩脇骨不舉毛悴色天死於秋又云厥陰終者喜溺舌卷卵上縮是也。

陰痿 陰痿皆耗散過度傷於肝筋所致經云足厥陰之經其病傷於內則不起是也。腎脉大甚爲陰痿。運氣陰痿皆屬濕土制腎經云

太陰司天濕氣下臨腎氣上從陰痿氣衰而不
舉是也 仲景八味丸治陽事多痿不振今依
前方夏減桂附一半春秋三停減一疾去精足
全減桂附只依六味地黃丸 此法可治傷於內者 陰痿
弱兩丸冷陰汗如水小便後有餘滴臊氣尻醫
并前陰冷惡寒而喜熱膝亦冷此肝經濕熱宜
固真湯柴胡勝濕湯 此法可治濕氣制腎者 腎脉大右
尺尤甚此相火盛而反痿宜滋腎丸或鳳髓丹
陰汗 脾臭陰冷陰淫 陰汗濕痒用大蒜煨剝

去皮爛研同淡豈豉末煨和丸桐子大朱砂為
衣每服三十九棗二枚燈心數莖煎湯空心送
下 陰汗不止內服青蛾丸外用爐甘石一分
真蛤粉半分乾撲或蜜佗僧和蛇牀子研末撲
之 東垣治一富者前陰間常聞臊臭又因連
日飲酒腹中不和夫前陰者足厥陰之脉絡陰
器出其挺末臭者心之所走散入於五方為臭
入肝為臊臭此其一也當於肝經中瀉行間是
治其本後於心經中瀉少衝以治其標如惡針

當用藥除之治法當求其本連日飲酒夫酒者
氣味俱能生濕熱是風濕熱合於下焦爲邪故
經云下焦如瀆又云在下者引而竭之酒者是
濕熱之水亦宜決前陰以去之是合下焦二法
治之宜龍膽瀉肝湯柴胡入所爲引用澤瀉車
前子木通其淡滲之味利小便亦除臊臭是謂
在下者引而竭之生地黃草龍膽之苦寒瀉酒
濕熱更兼車前子之類以徹肝中邪氣肝主血
用當歸以滋肝中血不足也 面色痿黃身黃

脚軟弱無力陰汗陰莖有天色宜溫腎湯 前
陰如冰冷并冷汗兩脚痿弱無力宜補肝湯
溺黃臊臭淋瀝兩丸如冰陰汗浸兩股陰頭亦
冷正值十二月天寒凜冽霜雪交集寒之極矣
宜清震湯 兩外腎冷兩髀樞陰汗前陰痿弱
陰囊濕痒臊氣宜柴胡勝濕湯 千金方有人
陰冷漸漸冷氣入陰囊癰滿恐死日夜痛悶不
得眠取生椒擇之洗淨以布帛裹着丸囊令厚
半寸須臾熱氣大通日再易之取出瘥 本事

方曾有人陰冷漸次冷氣入陰囊腫滿晝夜悶
疼不得眠者煮大薊汁服立瘥 前陰兩丸濕痒
秋冬尤甚冬月減宜椒粉散 腎囊濕痒先以
吳茱萸煎湯洗之後用吳茱萸半兩寒水石三
錢黃蘗二錢半樟腦蛇牀子各半兩輕粉一錢
白礬三錢硫黃二錢檳榔三錢白芷三錢爲末
摻之

陰通痛

風熱客於腎經腎虛不能宣散而腫
發歇疼痛聖惠沉香散沉香五錢檳榔一兩丹

參赤芍藥白蒺藜去刺炒製枳殼赤茯苓各七
錢半空心溫服 腫而有氣上下攻注脹悶聖
惠木香散木香半兩赤茯苓一兩牡丹皮澤瀉
各七錢半防風半兩檳榔一兩郁李仁一兩湯
浸去皮微炒爲末食前溫酒服 小蟠葱散五
苓散生料和四兩重依方加檳榔半兩茴香炒
八錢川練肉半兩薑葱煎空心服 腫痛不可
忍雄黃二兩研白礬二兩甘草二尺煮水三升
稍熱浴之又雞翅燒灰爲末空心粥飲調下三

錢患左取左翅患右取右翅又取伏龍肝以雞
子白和傅之又馬齒莧搗汁或桃仁去皮搗爛
或蛇牀子末雞子黃和三者各可傅之 痛用
苦練樹向陽根木香吳茱萸檳榔爲末醋糊丸
熱酒不拘時服 卒痛如刺大汗出小蒜一升
韭根一斤楊柳根一斤剉酒三升煎沸乘熱熏
之 木陰莖痛是厥陰經氣滯兼熱用甘草稍蓋
欲緩其氣耳若病淋而作痛似難一槩論之必
須清肺氣而清濁自分矣氣虛六君血虛四物

等各用黃蘗知母滑石石葦琥珀之類 婦人
陰腫腎痛枳實半斤切碎炒熱布裹包熨之冷
卽易 唯子和丹溪專主肝經而言其說不同何
陰吹 之胃氣下泄陰吹而正喧此穀氣之實也
膏髮煎導之 病二者自是不一昔人以小腸勞

疝

或問疝病古方有以爲小腸氣者有以爲膀胱
氣者唯子和丹溪專主肝經而言其說不同何
以辨之曰小腸氣小腸之病膀胱氣膀胱之病
疝氣肝經之病三者自是不一昔人以小腸膀
胱氣爲疝者誤也殊不知足厥陰之經環陰器
抵少腹人之病此者其發畢丸脹痛連及少腹
則疝氣之係於肝經可知矣小腸氣俗謂之橫
疝豎疝遶臍走注少腹攻刺而膀胱氣則在毛

際之上小腹之分作痛與疝氣之有形如瓜有聲如蛙或上於腹或下於囊者不同也但小腸膀胱因經絡並於厥陰之經所以受病連及於肝則亦下控引睪丸為痛然止是一經之病不可以為疝也 趙以德曰此條本為睪丸之症立名然內經以疝者痛也有腹中藏府之痛一以疝而名者故通敘於此其腹中五藏之疝得以就此而考焉有睪丸之痛內經謂任脉為病男子內結七疝女子帶下瘕聚衝脉為病逆氣

裏急然稱任脉有七疝名無疝之狀及按諸篇以雙字命其名者曰癰疝者以三陽為病發寒熱痿厥其傳為癰疝及陽明司天與之勝肝是動病足陽明筋病皆為癰疝謂厥疝者面黃脉之至大有虛有積氣在腹中厥氣名曰厥疝謂疝瘕以脾傳邪之間病名疝瘕少腹寬熱而痛出白一名曰蠱謂衝疝者以衝任督生病上衝心痛不得前後謂卒疝者邪客厥陰之絡則卒疝暴痛與厥陰別蠱溝氣逆亦睪丸卒痛謂癰

瘰癧者厥陰之陰盛而脉脹不通謂狐疝者肝
 所生病也殆非及此雙字之名者由任脉行諸
 經之會而有七疝者無此外獨稱一字疝者則
 有太陰在臬主勝寒氣厥陽甚則為疝有太陽
 在臬小腹控睪上引心痛有小腹痛不得大小
 便名曰疝得之寒有足太陰筋病陰器紐痛上
 引臍有心疝脉急小腸為使小腸當有形有腎
 脉大急深皆為疝心脉搏滑急為心疝肺脉沉
 搏為肺疝三陰急為疝靈樞有謂心疝肝脉滑

甚為瘰癧脾脉微大為疝氣腹中裹大膿血在
 腸胃之外滑甚為瘰癧瘰癧腎脉滑甚為瘰癧諸脉
 之滑者為陽氣甚盛微有熱夫如是者名為七
 疝中分邪氣之寒熱者也內經又云少陽脉滑
 病肺風疝太陰脉滑病脾風疝陽明脉滑病心
 風疝太陽脉滑病腎風疝少陽脉滑病肝風疝
 所言風者非外入之風由肝木陽藏動之風也
 故經云脉滑曰風然遠以疝稱者蓋腎肝同居
 下焦而足厥陰佐任脉之生化因肝腎之氣並

逆所以任之陰氣爲疝肝之陽氣爲風所以風疝連稱也李東垣謂脉滑者爲丙丁火熱併於下不勝壬癸從寒水之化故生癰疝亦用熱治內經初不見於尺部而言也豈不爲外寒鬱內熱之故乃曰熱火從寒化恐理未當而經更有莖垂者身中之機陰陽之候津液之道也或飲食不節喜怒不時津液內溢下流於羸血道不通日久不休俛仰不便趨翔不能此病榮然有水不上不下若此者亦癘疝之一也張仲景言

疝皆由寒邪得之亦同內經之云脉者當溫散之或曰內經言疝似若各從諸經脉所生今子何爲盡屬於任脉乎曰任脉是疝病之本源各經是疝病之支流何以言之蓋腎藏以四方分部者言則屬五行之寒水以居在下位者言則屬地道之陰陰形偶故腎有兩兩其形則地道之剛柔立焉包居兩形之間出納腎藏之精血以行坤土之化生成百骸萬象及夫生長壯者已之天癸與作強伎巧之用悉在於斯然而坤

土居尊不自司其職司其職者乃衝任二脉起於包中者行其化也是故五藏六府之經皆受氣於六脉因以海名之所以二脉貴乎流通而惡閉塞流通則天之陽氣下降與之從事故施化之道行閉塞則天之陽絕故地之陰亦結而百病作矣疝者是其二也所致任脉之病者若剛柔自相勝負與内外邪之感傷皆得使其陰陽不和陰偏勝則寒氣衝擊陽偏勝則熱氣內入陰反之外悉致任脉爲疝縱其邪不自任脉

而起初由各經所受而得者亦必與任脉相犯故也所犯者何或所勝之經脉相傳或受不以次所乘或任脉過處與受邪之經相會或六經受氣之際挾邪犯其海則皆足以感動任脉內舍結固不化之陰上擊藏府則爲腹中之疝下入厥陰會於陰器則爲辜丸之疝蓋疝自立名獨爲任脉所職在地之陰特然起擊者而命之也若諸經受邪不與任脉相干則不名爲疝矣不然何內經舉痛篇靈樞百病始生篇專爲發

明經脉腹中諸痛者乃無一宁名其疝也始可見任脉者是疝病之本源諸經所云疝者是其支流餘裔耳若夫巢氏所敘七疝者曰厥疝癥疝寒疝氣疝盤疝肘疝狼疝也其厥逆心痛諸飲食吐不下名曰厥疝腹中氣乍滿心下盡痛氣積如臂名曰癥疝寒飲食卽脇下腹中盡痛名曰寒疝腹中乍滿乍減而痛名曰氣疝腹中痛在臍旁名曰盤疝腹中臍下有積聚名曰肘疝小腹與陰相引而痛大便難名曰狼疝及言

諸疝之候止以陰氣積於內爲寒氣所加使榮衛不調血氣虛弱故風冷入於腹內而成疝也小兒瘕者陰核腫大由啼哭軀氣不止動於陰氣結聚不散所致者也觀於五疝皆是痛在心腹之疝也獨舉瘕疝屬小兒病者耳後人述其說更舉內經謂脾風傳之於腎名曰蠱疝瘕少腹窵而痛一名曰蠱者謂之蠱病又立陰疝條卽瘕疝也將以足七疝之數此言五條爲心腹痛者之治療則曰若因七情所傷者當調氣安

其五藏外邪所干者當溫散之治之不當內外
之氣交入於腎者爲腎氣入於膀胱者爲膀胱
氣入於小腸者爲小腸氣腎與膀胱一藏一府
其氣通於外腎小腸系於睪丸系會故也又謂
陰疝一名癰疝其種有四積腸癰氣癰卵脹水
癰是也若寒溫之氣有連於小腸者卽小腹控
睪丸而痛陰丸上下謂之腸癰寒氣客於經筋
足厥陰脉受邪脉脹不通邪結於睪卵謂之卵
脹腎虛之人因飲食不節喜怒不時津液內結

謂之水癰至張戴人非之曰此俗工所立謬名
也蓋環陰器上抵少腹乃屬足厥陰肝經之部
分是受疝之處也或在泉寒勝水氣攣縮鬱於
此經或司天燥勝木氣抑鬱於此經或忿怒悲
哀憂抑頓挫結於此經或藥淋外固閉尾縮精
壅於此經了不相干膀胱腎小腸之事乃厥陰
肝經之職也凡疝者非肝木受邪則肝木自甚
也由是於陰疝中亦立七疝之名曰寒疝水疝
筋疝血疝氣疝狐疝癰疝也寒疝其狀囊冷結

硬如石陰莖不舉或連控辜丸而痛得於坐卧
濕地及磚石或冬月涉水或值雨雪或風冷處
使內過勞宜以溫劑下之久而無子水疝其狀
腎囊腫痛陰汗時出或囊腫狀如水晶或囊痒
搔出黃水或小腹按之作水聲得之飲水醉酒
使內過勞汗出而遇風寒濕之氣聚於囊中故
水多令人爲卒疝宜以逐水之劑下之筋疝其
狀陰莖腫脹或潰或膿或痛而裏急筋縮或莖
中痛痛極則痒或挺縱不收或白物如精隨漉

而下得於房室勞傷及邪術所使宜以降心火
之藥下之血疝其狀如黃瓜在小腹兩傍橫骨
兩端約中俗云便癰得於春夏重感大燠勞於
使內氣血流溢滲入睪囊留而不去結成癰腫
膿少血多宜以和血之劑下之氣疝其狀上連
腎區下及陰囊或因號哭忿怒則氣鬱之而脹
怒哭號罷則氣散者是也宜以散氣之劑下之
或小兒亦有此疾俗曰偏氣得於父已年老或
年少多病陰痿精怯強力入房因而有子胎中

病也此病不治狐疝其狀如瓦卧則入小腹行立則出小腹入囊中狐則晝出穴而溺夜入穴而不溺此疝出入上下往來正與狐相類亦與氣疝大同小異令人帶鉤鈐是也宜以逐氣流經之藥下之癩疝其狀陰囊腫縋如升如斗不痒不痛是也得之地氣卑濕所生故江淮之間湫塘之處多感此疾宜以去濕之藥下之諸疝下去之後可調則調可補則補各量病勢勿拘俗法經所謂陰盛而腹脹不通者癩瘰疝也不

可不下其論如此戴人既曰用內經靈樞明堂之論要窮疝病之源而不及於任脉生病之源何也蓋因力辨陰器與小腸腎膀胱了不相干是屬足厥陰部分受病之原立說所以不及於任脉然已三見於論中矣其間引治疝之穴多與任脉所會一也又稱衝任督與厥陰會於曲骨環陰器二也復言凡精滑白淫皆男子之疝也血涸不月罷腰膝上熱嗑乾少腹有塊女子之疝也但女子不謂之疝而謂之瘕卽任脉內

結之病尤明者三也凡戴人辯論之詞強直專
主其一則不復顧其二在癩疝中有無六經外
證之可辨若果有膀胱小腸之證者又安得不
從之如靈樞謂小腸病者小腹痛腰脊控羣丸
而痛之類論治法亦然因病在下必先下之更
不問虛弱之人於首尾不可下者下之有不旋
踵之禍豈待下後始補而可回其生乎然而戴
人之書其詞直其義明讀之使人豁然以去胸
中之茅塞誠是諸醫書之冠及乎詳玩之則少

溫潤反覆之意且夫陰陽變化生病於無窮治
法亦無窮非一人所能究學者當因其已明益
其未至然後得爲善用其書者丹溪先生嘗論
羣丸連小腹急痛者或有形或無形或有聲或
無聲人皆以爲經絡得寒收引不行而作痛不
知此病始於濕熱鬱遏至久又感外寒濕熱被
鬱而作痛也其初致濕熱之故蓋大勞則火起
於筋醉飽則火起於胃房勞則火起於腎大怒
則火起於肝火鬱之久濕氣便盛濁液凝聚并

入血隧流於厥陰肝屬木性急速火性又暴烈
爲寒所束宜其痛甚而暴也此論亦就厥陰受
病處發明戴人之未至者也誠有功於後學蓋
癩疝不離此三者之邪熱則縱寒則痛濕則腫
須分三者多少而治之兩丸俱病固然也設有
偏於一者予又不能無其說焉腎有兩分左右
其左腎屬水水生肝木木生心火三部皆司血
統納左之血者肝木之職也其右屬火火生脾
土土生肺金三部皆司氣統納右之氣者肺金

之職也是故諸寒收引則血泣所以寒血從而
歸肝下注於左丸諸氣憤鬱則濕聚所以氣濕
從而歸肺下注於右丸且夫畢丸所絡之筋非
盡由厥陰而太陰陽明之筋亦入絡也往往見
人偏患於左丸者則痛多腫少偏於右丸者則
痛少腫多此便可驗也姑書治效者一二症以
明之予壯年啖柑橘過多積成飲癖在右脇下
隱隱然不敢復啖數年已一日山行大勞饑渴
甚遇橘芋食之橘動舊積芋復滯氣卽時右丸

腫大寒熱交作因而思之脾肺皆主右故積飲滯氣下陷太陰陽明之經筋俱傷其邪從而入於囊中著在畢丸筋膜而為腫脹張戴人有言病分上下治雖是不鬱為疝在下則不可吐亦當從下引而竭之竊念病有不同治可同乎今犯饑勞傷脾脾氣下陷必并舉之則胃氣不復下陷而積可行若用藥下之恐重陷胃氣也先服調胃劑一二貼次早注神使氣至下焦嘔逆而上覺肋下積動到中焦則吐而出之吐後癩

腫減半次早復吐吐後和胃氣疎通經絡二三日愈凡用此法治酒傷與飲水注右丸腫者皆効又治一人病後飲水患左丸痛甚灸大敦用摩腰膏內用烏附丁麝者以摩其囊上抵橫骨端灸温帛覆之痛卽止一宿腫亦全消矣

歷代獨治外束之寒發明云男子七疝痛不可忍者婦人瘕聚帶下皆任脉所主陰經也乃肝腎受病治法同歸於一宜丁香練實丸凡疝氣帶下皆屬於風全蝎治風之聖藥也川練茴

香皆入小腸經當歸玄胡索活血止痛疝氣帶
下皆積寒邪入於小腸之間故用附子佐之丁
香木香爲引導藥也 羅謙甫治火兒赤紐隣
久病疝氣復因七月間饑飽勞役過飲潼乳所
發甚如初面色青黃不澤臍腹陣痛擗撮不可
忍腰曲不能伸熱物熨之稍緩脉得細小而急
難經云任之爲病男子內結七疝皆積寒於小
腸之間所致也非大熱之劑卽不能愈遂製一
方名之曰沉香桂附丸 臍下撮急疼痛并臍

下周身一遭皆急痛小便頻數清其五脉急洪
緩瀋沉按之皆虛獨腎脉按之不急皆虛無力
名曰腎疝宜丁香疝氣丸 男子婦女疝氣臍
下冷痛相引腰膝而痛宜當歸四逆湯 發明
王台烏藥散川苦練散簡易木香練子散皆用
巴豆炒藥許學士云大抵此疾因虛而得之不
可以虎驟補邪之所湊其氣必虛留而不去其
病則實故必先滌去所蓄之邪熱然後補之是
以諸藥多借巴豆氣者蓋爲此也 金匱方寒

痲腹中痛逆冷手足不仁若身疼痛灸刺諸藥不能治祇當烏頭桂枝湯主之用烏頭一味以蜜二升煎減半去查以桂枝湯五合和之令得一升後初服二合不知再服三合又不知復加至五合其知者如醉狀得吐者為中病海藏以附子建中湯加蜜煎治痲卽此法也 腹痛脉弦而緊弦則衛氣不行卽惡寒緊則不欲食弦緊相搏卽為寒痲寒痲繞臍痛若發則自汗出手足厥冷其脉沉弦者大烏頭煎主之 衍義

云葫蘆巴本經云得茴香桃仁治膀胱氣甚効嘗合用桃仁麩炒各等分半酒糊丸半為散每服五七十九空心食前鹽酒下散以熱米飲調下與丸子相間空心各一二服効 寶鑑葫蘆巴丸

丹溪治內鬱之濕熱

煎方枳實

九粒

桃仁

十四

個

山梔仁

九個

吳茱萸

七粒

山查

四粒

生薑

如指

大

右六味

同入

搗盆搗細

取順流水

一鍾

入瓶

內煎至微沸帶查服如濕勝癩痲者加荔枝核

山

三

百

如痛甚者加鹽炒大茴香二錢如痛處可按者

加薄荷桂少許丸方山梔炒二兩山查炒四兩枳實

炒茴香二兩柴胡牡丹皮八角茴香各一兩桃仁

茱萸炒各半兩末之酒糊丸空心鹽湯下五六十九

陽明受濕熱傳入大腸發熱惡寒小腹連毛

際間悶痛不可忍用梔子仁炒桃仁炒枳實炒

山查各等分同研細入生薑汁半合用水一小鐘

盪起煎令沸熱服之一方加茱萸

寒熱兼施 靈樞云胃中熱腸中寒則疾饑小

腹痛脹 丹溪云愚見有用川烏頭梔子等分

作湯用之其効亦敏後因此方隨症與形加減

用之無有不効蓋川烏頭治外束之寒梔子仁

治內鬱之熱也 又云諸疝痛處用手按之不

痛者屬虛必用桂枝炒山梔細切川烏頭等分

為細末生薑自然汁打糊為丸如桐子大每服

三四十九空腹白湯下 羅謙甫云陰疝足厥

陰之脉環陰器抵少腹或痛因腎虛寒水涸竭

瀉邪補肝羨藜湯主之

補例 丹溪云痼有挾虛而發者其脈不甚沉
緊而大豁無力者是也然其痛亦輕唯覺重墜
牽引耳當以參朮爲君疏導藥佐之蓋疏導藥
卽桃仁山查枳實梔仁茱萸川練玄胡索丁香
木香之類是也 海藏云姬提領因疾服涼劑
數日遂病臍腹下大痛幾至於死與薑附等劑
雖稍蘇痛不已隨本方內倍芍藥服之愈 金
匱方寒疝腹中痛及脇痛裏急者當歸生薑羊
肉湯主之衍義云張仲景治寒疝用生薑羊肉
湯服之無不應驗有一婦人產當寒月寒氣入
產門腹臍以下脹滿手不欲犯此寒疝也師將
治之以抵當湯謂有瘀血非其治也可服仲景
羊肉湯二服遂愈

肝氣 肝足厥陰經之病必小腹引脇而痛經
云厥陰之復小腹堅滿裏急暴痛是風氣助肝
盛而然治法當瀉肝也又云歲金太過民病兩
脇下痛小腹痛又云歲木不及燥乃大行民病
中清眩脇痛少腹痛又云歲土不及風乃大行

民病腹滿復則胸脇暴痛下引小腹者是燥邪
攻肝虛而然治法當補肝瀉金也又云寒氣客
於厥陰之脣則血泣脈急故脇肋與小腹相引
痛又云肝病者兩脇下痛引小腹取其經厥陰
小腸又云邪客厥陰之絡令人卒疝暴痛刺足
大指爪甲上與肉交者各一疝男子立已女子
有頃已左取右右取左 瀉肝山梔川芎桂芍
之屬 補肝當歸生薑羊肉之屬

小腸氣 小腸之病小腹引臑丸必連腰脊而
痛經云少陰之脈心下熱善饑臍下痛又云少
陰之復燠熱內作小腹絞痛者是熱助小腸盛
而然治法當瀉小腸也又太陽在臍寒淫所勝
與太陽之復皆病小腹控臑引腰脊上衝心痛
及太陰司天大寒且至病小腹痛者是寒邪攻
小腸虛而然治法當補小腸瀉寒邪也 寶鑑
引至真大要論云小腹控臑引腰脊上衝心唾
出清水及爲噦噫甚則入心善悲善忘甲乙經
曰邪在小腸也小腸病者小腹痛引腰脊貫肝

肺其經虛不足則風冷乘間而入邪氣既入則厥之證上衝肝肺客冷散於胸結於臍控引羸丸上而不下痛而入腹甚則衝心胸蓋其經絡所屬所係也治之方茴香炒練實炒食茱萸陳皮馬藺花醋炒各一兩元花醋炒五錢右爲末醋糊丸如桐子大每服十丸至二十丸溫酒送下又方益智仁蓬朮各半兩茴香山茱萸肉牛膝續斷川芎葫蘆巴防風牽牛炒熟甘草各二錢半爲細末每服三錢水一盞二分煎兩三沸空心連滓

服白湯調下二錢七亦得

膀胱氣 膀胱之病小腹痛腫不得小便是也

經云太陰在臍病小腹痛腫不得小便是濕邪

攻膀胱虛而然治法當補膀胱瀉濕土邪也又

云膀胱病者小腹偏腫而痛以手按之卽欲小

便而不得取委中央又云小腹痛腫不得小便

邪在三陽取之足太陽大絡卽委陽穴許學士云

項在岳城日欬尉宋荀甫膀胱氣作疼不可忍

醫者以剛劑與之痛愈甚小便不通三日矣臍

下虛脹心悶予因候之見其面赤黑脉洪大予
曰投熱藥太過陰陽痞塞氣不得通爲之柰何
宋尚手持四神丹數粒云醫謂不止更服此予
曰若服此定斃後無悔渠求治予適有五苓散
一兩許分三服用連鬚葱一莖茴香一撮鹽一
錢水一盞半煎至七分令接續三服中夜下小
便如墨汁者一二升腰下寬得睡翌日診之脉
已平安矣續用礪砂丸與之數日瘥 婁全善
治謝人妻小腹疼痛小便不通先灸灸三陰交

以茴香丁香青皮檳榔桂茱萸玄胡索山查枳
實又倍用黃蘗煎服愈

心疝 心脉微滑爲心疝 心脉搏滑急爲心
疝 帝曰診得心脉而急此爲何病岐伯曰病
名心疝小腹當有形也心爲牡藏小腸爲之使
故曰少腹當有形也 木香散 廣藏煮散

癩疝

疝囊腫大如升如斗是也 丹溪云下

部癩氣不痛之方細思非痛斷房事與厚味不
可用藥唯促其壽若蒼朮神麴白芷山查川芎

積實半夏皆要藥人視其藥皆鄙賤之物已啓
慢心又不能斷欲以愛護其根本非惟無益而
反被其害者多矣且其藥宜隨時月寒熱更按
君臣佐使加減大抵癩疔屬濕多 蒼朮神麴
白芷散山查川芎枳實半夏南星有熱加山梔
一兩堅硬加朴硝半兩秋冬加吳茱萸二錢半
神麴糊丸 又方南星山查蒼朮各二兩白芷
半夏枳實神麴各一兩海藻昆布各半兩玄明
粉吳茱萸各二錢為末酒糊丸 又方治木腎

不痛南星半夏黃蘗酒洗蒼朮鹽炒枳實山查白芷
神麴炒滑石炒茱萸昆布酒糊丸空心鹽湯下
一治癩脹用香附子不拘多少為末每用酒一

盞海藻一錢煎至半盞先撈海藻細嚼用所煎
酒調末二錢服 楮葉雄者曬乾為末酒糊丸
空心鹽酒下無實者為雄 黎古海蛤丸 癩氣痛

者易治荔枝核散二層茴香丸宣胞丸地黄膏子
丸安息香丸念珠丸隨宜選用 陰囊腫脹大
小便不通宜三白散 偏墜初生用穿山甲茴

香二味爲末酒調下乾物壓之外用牡蠣煨良
薑各等分爲細末津唾調敷大者一邊須臾如
火熱痛卽安 丹溪治一人因飲酒後飲水與
水果偏腎大時作蛙聲或作痛炒枳實一兩茴
香鹽炒梔子炒各三錢研煎下保和丸 一人
膀胱氣下墜如蛙聲臭橘子核炒十枚桃仁二
十枚蘿蔔自然汁研下保和丸 一人左腎核
腫痛此飲食中濕墜下成熟以橘核五枚桃仁
七枚細研順流水一盞煎沸熱下保和丸 木

腎以枇杷葉野紫蘇葉蒼耳葉水晶葡萄葉濃
煎湯熏洗 雄黃一兩研礬二兩生甘草半兩
水五升煎洗 荆芥穗一兩朴硝二兩爲麤末
蘿蔔葱同煎湯淋洗 大黃末醋和塗之乾卽
易 馬鞭草搗塗 蔓菁根搗傅 經云陽明
司天燥淫所勝丈夫癩疔婦人小腹痛又云陽
明之勝外發癩疔是燥邪攻肝氣虛而然治法
當補肝瀉燥金也 又云厥陰所謂癩疔婦人
少腹腫者厥陰者辰也三月陽中之陰邪在中

故曰癩疔少腹腫也所謂癩疔膚脹者曰陰亦盛而脉張不通故曰癩癢疔也 三陽爲病發寒熱下爲癰腫及爲痿厥腠瘡其傳爲癩疔夫東垣曰陰陽別論云三陽爲病發寒熱下爲壅腫及爲痿厥腠瘡其傳爲索澤又傳爲癩疔夫熱在外寒在內則累垂此九夏之氣也寒在外熱在內則卵縮此三冬之氣也足太陽膀胱之脉逆上迎手太陽小腸之脉下行至足厥陰肝之脉不得伸其任脉並厥陰之脉逆則如巨川

之水致陽氣下墜是風寒濕熱下出囊中致兩臑腫大謂之曰疔太甚則爲癩足厥陰之脉與大腸膀胱寒水之脉同至前陰之末傷寒家說足厥陰肝經爲病煩滿囊縮急下之宜大承氣湯以瀉大熱靈樞經云足厥陰肝經筋中爲寒則筋攣卵縮爲大寒前說囊縮爲大熱此說爲大寒此說囊縮垂臑下引癩疔脚氣爲大寒風濕盛下垂爲寒與上二說不同何也曰以平康不病人論之夏暑大熱囊卵累垂冬天大寒急

縮收上與前三說又不同何也是相乖耶不相
乖耶答曰傷寒家囊卵縮大熱在內宜承氣湯
急下之與經筋說囊卵縮大寒在外亦是熱在
內與傷寒家同故再引平康人以證之冬天陽
氣在內陰氣在外人亦應之故寒在外則皮急
皮急則囊縮夏月陰氣在內陽氣在外人亦應
之故熱在外則皮緩皮緩則囊垂此癩疝之象
也三說雖殊其理一也用藥者宜詳審之已上
三論各有所主兼此攷訂則脉證陰陽寒熱虛

實之辨判然矣 內經刺灸癩疝有四法 其
一鉞石取罨囊中水液經云腰腎者身之大關
節也肢脛者人之管以趨翔也莖垂者身中之
機陰精之候津液之道也故飲食不節喜怒不
時津液內溢乃下流於罨血道不通日久不休
俛仰不便趨翔不能此病榮然有水不上不下
鉞石所取形不可匿常不得蔽命曰去瓜其法
今世人亦多能之罨丸囊大如斗者中藏穢液
必有數升信知此出古法也 其二取肝經云

足厥陰之脉是動則病丈夫癰疝婦人小腹腫是也是於足厥陰肝經視盛虛熱寒陷下而施補瀉留疾與灸也 其三取肝之絡經云足厥陰之別名曰蠡溝去內踝五寸別走少陽其別者徑脛上罽結於莖其病氣逆則罽腫卒疝取之所別是也是於內踝上五寸貼脛骨後近肉處蠡溝取之也 其四取足陽明筋經云足陽明之筋聚於陰器上腹其病轉筋髀前腫癢疝腹筋急治在燔針劫刺以知爲數以痛爲輸是也是於轉筋痛處用火針刺之也

狐疝

卧則入腹立則出腹偏入囊中者是也仲景方陰狐疝氣有大小時時上下者蜘蛛

散主之 內經刺灸狐疝但取足厥陰一經經云肝足厥陰之脉所生病者狐疝是也隨其經盛虛寒熱陷下取之也 耳後陷者腎下腎下則腰尻痛不可俛仰爲狐疝

通治 不問何證皆可用生料五積散每服一兩入鹽炒吳茱萸茴香各一錢生薑三片葱白

五寸煎空心熱服 服藥未効大痛攻刺不已
陰縮手足厥冷宜香附子仍炒鹽乘熱用絹裹
熨臍下若大小腑不甚通者五苓散加桂下青
木香丸 初發或頭疼身熱或憎寒壯熱並宜
參蘇飲加木香有逆上攻心下不覺痛而見心
疼者宜以生韭搗取自然汁和五苓散爲丸茴
香湯下有腎氣纔動心氣亦發上下俱疼者宜
異攻散吞茱萸內消丸或且專治下下痛定則
土痛定矣 神方治疝氣上衝如有物築塞心

胸欲死手足冷者二三服除根硫黃火中鎔化
卽投水中去毒研細荔枝切片炒黃陳皮各等
分右爲末飯丸桐子大每服十四五丸溫酒下
其疼立止患人自覺疼甚不能支持止與六丸
不可多也 食積與瘀血作痛者導積行血則

愈

於傷食畜血
二門求之

診 寸口弦緊爲寒痼弦則衛氣不行氣不行
則惡寒緊則不飲食 寸口遲緩遲爲寒緩爲
氣氣寒相搏轉絞而痛 沉緊豁大爲虛 弦

急搏皆疝視在何部而知其藏心脉微滑為心
疝肝脉滑為癩疝腎脉滑為癢癢大急沉為腎
疝肝脉大急沉為肝疝心脉搏急為心疝肺脉
沉搏為肺疝脾脉緊為脾疝 寸弦而緊弦緊
相搏為寒疝 趺陽虛遲為寒疝 肝脉滑甚
為癩疝腎肝滑甚為癢癢 東垣曰夫滑脉關以
上見者為大熱蓋陽
與陽併也故大熱滑脉尺部見為大寒生癩疝
滑脉者命門包絡之名也為丙丙丁熱火併於
下蓋丙丁不勝壬癸從
寒水之化也故生癩疝

交腸

交腸之病大小便易位而出或因醉飽或因大
怒遂致藏氣乖亂不循常道法當宣吐以開提
其氣使闌門清利得司泌別之職則愈矣宜五
苓散調氣散各一錢加阿膠末一錢湯調服或
研黃連阿膠丸為末加木香少許再以前煎藥送
下 八丹溪治馬希聖年五十餘性嗜酒常痛飲
不醉糟粕出前竅便溺出後竅六脉皆沉澀與
四物湯加海金沙木香檳榔木通桃仁服而愈

此人酒多氣肆酒升而不降陽極虛酒濕積久
生熱煎熬血乾陰亦大虛陰陽偏虛皆可補接
此人中年後陰陽俱虛時暫可活者以其形實
酒中穀氣尚在三月後其人必死後果然

腸鳴

內經腸鳴有五 一曰脾虛經云脾虛則腹滿
腸鳴餐泄食不化取其經太陰陽明少陰血者
是也 二曰中氣不足經云中氣不足腸爲之
苦鳴補足外踝下留之五分申脉穴也 三曰
邪在大腸經云腸中雷鳴氣上衝胸邪在大腸
刺育之原巨虛上廉三里是也 四曰土鬱經
云土鬱之發腸鳴而爲數後是也 五曰熱勝
經云少陰在臬熱淫所勝病腹中腸鳴氣上衝

胸治以鹹寒是也 東垣云如胃寒泄瀉腸鳴
於升陽除濕湯加益智仁五分半夏五分生薑
棗子和煎 丹溪云腹中水鳴乃火擊動其水
也二陳湯加苓連梔子一腹中鳴者病本於胃
也 婁全善云腸鳴多屬脾胃虛一男子腸鳴
食少臍下有塊耕動若得下氣多乃已已則復
鳴醫用踈氣藥與服半年不効予用參朮爲君
甘草連苓枳乾薑爲臣一貼腸鳴止食進又每
服吞厚朴紅豆丸其氣耕亦平經云脾胃虛則

腸鳴腹滿又云中氣不足腸爲之苦鳴此之謂
也經肺移寒於腎爲涌水涌水者按之腹不堅
水氣客於大腸疾行則鳴濯濯如囊裹水漿之
聲也河間葶藶丸主之而不能收況大腸有厚
薄與肺爲表裏肺藏蘊熱則閉虛則脫本草有

脫肛

難經云虛實出焉出者爲虛入者爲實肛門之脫非虛而何哉蓋實則溫溫則內氣充而有所蓄虛則寒寒則內氣餒而不能收況大腸有厚薄與肺爲表裏肺藏蘊熱則閉虛則脫本草有二云補可以去弱澀可以去脫若脫甚者旣補之必兼澀之設不澀於內亦須澀於外古方用五倍子末托而上之一次未收至五七次必收而不復脫矣久利婦人小兒老人有此疾者產育

及久痢用力過多小兒氣血未壯老人氣血已衰故肛易於出不得約束禁固也肛門爲大腸之候大腸受熱受寒皆能脫出當審其因證寒者以香附子荆芥等分煎湯洗之熱者以五倍子朴硝煎湯洗之亦用木賊燒灰不令煙盡入麝香少許大便了貼少許或以五倍子末攤紙上貼肛緩緩揉入有腸頭作痒卽腹中有蟲丈夫因酒色過度大腸者傳導之官腎者作強之官蓋腎虛而洩母氣肺因以虛大腸氣無所主

故自脫肛治法實元氣去蘊熱之劑外用前藥洗之醫治無不愈矣 大腸熱甚與腸風者涼血清腸散 瀉痢後大腸氣虛肛門脫出不腫不痛屬氣血虛宜補氣血爲主赤腫有痛宜涼血祛風爲主補氣血八珍湯十全散涼血生芩赤芍槐花槐角黃栝萸雞冠花踈風防風羌活荆芥 久瀉痢者補養脾胃宜參朮實脾湯用力過多者十全大補湯參朮芎歸湯訶子人參湯內加升提藥 大腸虛而挾熱脫肛紅腫

宜縮砂湯槐花散薄荷散 大腸虛而挾寒脫
肛不紅腫宜蝟皮散香荆散 日久不愈常宜
服收腸養血和氣湯 澀脫龍骨散澀腸散
外治陽證蟠龍散 陰證伏龍肝散 五倍子
末煎湯加白礬洗 五倍荆芥小便濃煎洗
荆芥龍腦薄荷朴硝煎湯洗 皂角槌碎煎湯
浸 生括蓐搗汁浸 葱湯洗軟芭蕉葉托上
生鐵三斤水一斗煮取五升出鐵以汁洗內
服磁石散 鼈頭燒灰塗

穀道痒痛

穀道痒多因濕熱生蟲欲成痔瘻宜以雄黃入
艾綿燒煙熏之并納蜣螂丸 蜣螂丸治肛門
痒或出膿血有蟲傍生孔竅內用蜣螂七枚五
月五日收去翅足炙爲末新牛糞半兩肥羊肉
一兩炒令香右共如膏丸如蓮子大炙令熟以
新綿薄裹納下部中半日少喫飯卽大便中蟲
出三五度永瘥 治穀道蠹赤腫或痒或痛用
杏仁搗作膏傅之或炒令黃以綿蘸塗穀道中

外臺治下部蟲齧杵桃葉一斛蒸之令極熱
內小口器中以下部榻上坐蟲立死治肛門
腫痛用木鼈子去殼取肉四五枚研如泥安新
瓦器或木盆以沸湯衝動洗了另用少許塗患
處

診

蠶蝕陰脫其脉虛小者生緊急者死

痔

巢氏病源有五痔之論云肛邊生鼠乳出在外
時時出膿血者牡痔也肛邊腫生瘡而出血者
牝痔也肛邊生瘡痒而復痛出血者脉痔也肛
邊腫核痛發寒熱而血出者腸痔也因便而清
血隨出者血痔也又有酒痔肛邊生瘡亦有血
出又有氣痔大便難而血出肛亦出外良久不
肯入諸痔皆由傷風房室不慎醉飽合陰陽致
勞損血氣而經脉流溢滲漏腸間衝發下部久

不瘥變爲瘦也聖濟總錄敘痔之形狀謂由五
府之所傳大腸之所受可謂得其始末矣若內
經所謂因而飽食筋脉橫解腸澀爲痔又謂少
陰之復爲痔註又以小腸有熱則戶外爲痔又
謂督脉生病瘡痔蓋督脉自會陰合篡間繞篡
後別繞臀是督脉者與衝任本一脉初與陽明
合筋會於陰器故屬於腎而爲作強者也由是
或因醉飽入房精氣脫舍其脉空虚酒毒之熱
乘之流着是脉或因姪極而強忍精不泄或以

藥固其精停積於脉流注篡間從其所過大腸
肛門之分以作痔也與靈樞所謂膀胱足太陽
之脉及筋皆抵腰中入絡腎其支者貫臀故主
筋生病者爲痔亦與督脉病痔之理同也自此
推之足厥陰之筋脉環前後二陰寧不爲痔乎
每見患鼠痔者其發則色青痛甚豈非因肝苦
急苦痛甚故本色見耶方論有謂五痔潰皆血
膿者獨爲熱甚血腐者言也至若潰出黃水者
則爲濕熱矣更宜於東垣方論求之 東垣治

濕熱風燥四氣 內經曰因而飽食筋脉橫解
腸澼爲痔夫大腸庚也主津本性燥清肅殺之
氣本位主收其所司行津液以從足陽明中州
戊土之化若旺則能生化萬物而衰亦能殞殺
萬物故曰萬物生於土而歸於土也然手足之
陽明同司其化焉既在西方本位爲之害蜚司
殺之府因飽食行房忍泄前陰之氣歸於大腸
以致木乘火勢而侮燥金以火就燥則大便閉
而痔漏作矣其疾甚者當以苦寒瀉火以辛溫

和血潤燥踈風止痛是其治也以秦艽當歸稍
和血潤燥以桃仁潤血以皂角仁除風燥以地
榆破血止血以枳實之苦寒補腎以下泄胃實
以澤瀉之淡滲使氣歸於前陰以補清燥受胃
之濕邪也白朮之苦甘以苦補燥氣之不足其
甘味以瀉火而益元氣也故曰甘寒瀉火乃假
枳實之寒也古人用藥爲下焦如瀆又曰在下
者引而竭之多爲大便秘澀以大黃推去之其
津血益不足以當歸和血及油潤之劑大便自

然與利矣宜作劉湯以與之是下焦有熱以急
治之之法也以地榆惡人而壞胃故宿食消盡
空心作丸服之曰秦艽白朮丸 又云痔瘡若
破謂之痔漏大便秘澀必作大痛此由風熱乘
食飽不通氣逼大腸而作也受病者燥氣也為
病者胃熱也胃刑大腸則化燥火以乘燥熱之
實勝風附熱而來是濕熱風燥四氣相合故大
腸頭成塊者濕也作大痛者風也大便秘結者
主病兼受火邪熱也當去此四者其西方肺主

諸氣其體收下亦助病為邪須當以破氣藥兼
之治法全矣不可作丸以劉湯與之效如神速
秦艽蒼朮湯主之 痔漏經年因而飽食筋脉
橫解腸澀為痔治法當補北方瀉中央宜紅花
桃仁湯 痔漏大便結燥疼痛秦艽當歸湯
痔漏大便硬努出大腸頭下血苦痛不能忍當
歸郁李仁湯 痔漏成塊下垂不任其痒秦艽
羌活湯 脉訣云積氣生於脾藏傍大腸疼痛
陣難當漸交稍瀉三焦火莫漫多方立紀綱七

聖丸主之 痔漏每日大便時發疼痛如無疼
痛者非痔漏也秦艽防風湯主之 丹溪專一
涼血爲主 人參黃連生地涼當歸和川芎和
槐角涼生條芩涼大枳殼寬升麻提右煎湯服
之外以澀藥蘆甘石童便煨牡蠣粉龍骨海蛤
蜜陀僧之類敷之 薛新甫云初起焮痛便秘
或小便不利者宜清熱涼血潤燥疎風若氣血
虛而寒涼傷損者調養脾胃滋補陰精若破而
久不愈多成痔漏有穿臀穿陰穿腸者宜養元

氣補陰精爲主大便秘澀或作痛者潤燥除濕
肛門下墜或作痛者瀉火除濕下墜腫痛或作
痒者祛風勝濕腫痛小便澀滯者清肝導濕若
有患痔而兼疝患疝而兼下疳皆屬肝腎不足
之變症但用地黃丸益氣湯以滋化源爲善若
專服寒涼治火者無不致禍 牡痔乳香散猪
蹄灰丸 牝痔檳榔散榼藤散麝香散 酒痔
赤小豆散乾葛湯 氣痔橘皮湯威靈仙丸熏
熨方 血痔地榆散椿皮丸猪臟丸 腸痔皂

角煎丸龍甲丸 脉痔刺蝟皮丸桑木耳散
痛甚秦艽當歸湯七聖丸能消丸地榆散試蟲
散龍腦散白聖散黑玉丹或用荔枝草煎湯入
朴硝洗之効 痒甚秦艽羌活湯外用槐白皮
濃煎汁安盆中坐熏之冷卽再暖良久欲大便
當蟲出或用水銀棗膏各二兩研勻捏如棗形
薄綿裹納之明日蟲出若痛者加粉草三大分
作丸或用威靈仙枳殼炒各一兩爲麤末熬水
熏洗冷卽再暖臨卧避風洗三次搥乾貼蒲黃

散或用艾入雄黃末燒煙熏之 下血不止等
歸丸黑丸子臭樗皮散二礬丸苦棟丸槐角地
榆湯槐角枳殼湯外敷血竭末 氣滯發痔荆
枳湯 血瘀作痛逐瘀血湯 血痔久痔潔古
用黑地黄丸主之云治痔之聖藥也 運氣痔
發皆屬寒經云太陽之勝痔瘡發治以苦熱是
也則痔固有寒者矣本事四方用桂附乃其治
乎 熏痔方用無花果果葉煮水熏少時再洗
又法燒新磚以醋沃坐熏良 洗藥方治番花

痔用荆芥防風朴硝煎湯洗之次用木鼈子五
倍子研細調傅如肛門腫熱再以朴硝末水調
淋之良 又方無花果葉七片五倍二錢皮硝
二錢水一碗煎八分砂鍋內乘熱熏洗 敷藥
雞內金蒲黃血竭各等分爲末濕則乾摻乾則
油調傅 又方茄蒂何首烏文蛤酥炙各等分
蜜薑汁雞子清攪勻調傅 膏藥杏仁去皮五
錢草麻子去殼七錢乳香二錢沒藥四錢血竭
六錢片腦一錢銅綠二錢瀝青三錢松香二兩

穿山甲灰炒研末二錢人乳一酒鍾先將草麻
杏仁搗如泥次入松香搗爛次第入諸藥量入
人乳搗令軟硬得所再搗五六百下收磁器中
封固臨時以手撚如錢攤厚紙或帛上拔腐去
膿生新肉

李防禦專科治痔九方朝貴用之屢効蓋其用
藥簡要有次第製造有法無苦楚而收効甚速
凡痔出外或番若蓮花復便血疼痛不可坐卧
甚者用下藥早上藥一次午一次晚又一次至

夜看痔頭出黃水膏如泉當夜不可再上藥且
令黃水出盡次日看痔消縮一半若更上藥一
二日爲好若年高人應外腎牽引疼痛可用人
以火烘熱手於大小便間熨之其痛自定黃水
未盡可再傅一日藥仍須勤用曉外科人早晚
看照黃水流至盡是病根已去也水澄膏係護
肉藥鬱金白芨二味各等分細末候痔出側卧
以鹽湯洗淨拭用新水和密蓋內調勻却入藥
末同敷在穀道四向好肉上留痔頭在外用紙

蓋藥仍用筆蘸溫水塗紙令常潤澤却用下
藥好白礬四兩通明生砒二錢半重朱砂一錢
生研如粉細三味先用砒末安建蓋中次用白
礬末蓋之用火煨令煙斷其砒盡從煙去止是
借砒氣在白礬中將枯礬取出爲細末先看痔
頭大小多寡將礬末抄上掌中加朱砂少許二
味以津唾調勻得所用篋子調塗痔頭上周遭
令徧日三上須仔細詳看痔頭顏色欲其轉焦
黑乃取落之漸至夜自有黃水膏出以多爲好

方是惡毒水切勿他疑中夜再上藥一次來日
依舊上三次有小疼不妨如換藥用新瓦器盛
新水或溫水在痔邊以筆輕手刷洗舊藥却上
新藥仍用前護藥老弱人用藥要全無疼痛只
增加朱砂末於礬末內自然力慢不可住藥但
可少徧敷直候痔頭焦枯方可住也次用荆芥
湯洗以荆芥煎湯入瓦器時洗之潤腸丸用大
黃煨淨製枳殼當歸各等分蜜丸每服二三十
丸白湯下以防肛門急燥欲大便出無澀痛而

已又龍石散用龍骨煨出火毒軟石膏煨出火
毒白芷黃丹作末摻瘡口又導赤散用生地黃
木通黃芩等分煎以防小便赤澀又雙金散用
黃連鬱金等分爲末用蜜水調敷痔頭有小痛
卽敷之若得腦子末傅尤佳又痔頭收斂卽可
服十宣散以生氣血又國老湯生甘草治痔本
藥也煎水熏洗生肌解石毒瘡極痒亦主之共
九方

周先生粘痔法明礬赤石脂五錢辰砂一錢黃丹一錢

右爲末先用鬱金末護肛門如無鬱金用薑黃末代之調塗四圍好肉如不就加棗荳粉打合却將枯藥傅上如肛門疼急濃煎甘草湯放溫拂四圍肛門上就與寬腸藥槐花大黃枳殼木通連翹瞿麥當歸右半酒半水煎 枯藥早晨上一次日午一次洗去舊藥申時又洗去又上一次如要急安至夜半子時又洗上一次至次日且看痔頭淡淡黑色兩三日如烏梅四五日內用竹篦子輕輕敲打痔頭見如石堅至七八

日便住更不須上枯藥且待自然如蘿蔔根乃脫去也洗用甘草荆芥槐花洗去舊藥方上新藥 凡醫痔之法且如明日要下手今日先與此藥所以寬大腸使大便軟滑不與痔相礙且不泄瀉痔頭未脫落者須要日日與之以大黃一兩煨枳殼炒當歸酒洗一兩同爲細末丸如桐子大好酒吞下 治枯痔頭慮生他症凡用枯藥或觸壞腎根或水道赤瀉痛與此方大黃木通生地各一兩滑石瞿麥各半兩同爲細末

每用四錢煎服。催痔方如枯盡未脫落以此
催之好磁石一錢白礬蠶生川烏五分同為細
末冷水調傅上立脫。凡用枯藥去盡乳頭恐
留痔硬頭損破肛門四圍成瘡用此藥龍骨一
錢石膏一錢沒藥五分膩粉五分同研十分細
先以荊芥湯洗次摻之切忌毒物生薑。痔脫
後用甘草湯豆豉湯洗再用荊芥五倍子煎水
洗便不生膿。治痔脫後肉痒方用大粉草濃
煎湯洗。收腸方凡用枯藥脫下乳頭隨即與

此以收其腸此方補氣又收膿去血生肉今痕
壯人參當歸各一兩川芎甘草白芷防風厚朴
桔梗桂枝黃芪右細末半酒半水煎如惡酒者
酒少水多煎之夏月減桂朴加苓檉

治痔切勿用生砒毒氣入腹反至奄忽忌喫生
冷硬物冷菜之類及酒濕麪五辣辛熱大料物
及乾薑之類犯之無効

灸法大蒜十片頭垢捏成餅子先安頭垢餅於
痔頭上外安蒜片以艾灸之。唐峽州王文顯

充西路安撫司判官乘驛入駱谷有痔疾因此
大作其狀如胡瓜貫於腸頭熱如澹灰火至驛
僵仆主驛吏云此病予曾患來須灸卽瘥用柳
枝濃煎湯先洗痔便以艾炷其上連灸三五壯
忽覺一道熱氣入腸中因轉瀉鮮血穢物一時
出至痛楚瀉後遂失胡瓜所在登驛馳去 秘
傳痔漏隔礬灸法皂礬一斤用新瓦一片兩頭
用泥作一壩先用香油刷瓦上焙乾却以皂礬
置瓦上煨枯去砂爲末穿山甲一錢入紫罐內

煨存性爲末木鼈子亦如前法煨過取末二錢
五分乳香沒藥各一錢五分另研右件和勻冷
水調量瘡大小作餅子貼瘡上用艾炷灸三四
壯灸畢就用熏洗藥先熏後洗日六度三五日
後如前法再灸以瘥爲度 熏洗方皂礬如前
製過約手規二把知母末一兩貝母末一兩葱
七莖先用水同葱煎三四沸傾入瓶內再入前
藥令患者坐瓶口上熏之待水溫傾一半洗患
處留一半俟再灸復熱熏洗以瘥爲度

