


疳

函	冊	架
101	15	101

内閣文庫	
番號	漢 13011
冊數	55 (55)
函號	301 63






醫學子集  
寮書新編之

幼科證治準繩集之八

金壇王肯堂宇泰甫輯

脾二



# 疳

內經曰數食肥令入內熱數食甘令人中滿蓋其病  
 因肥甘所致故命名曰疳若夫襁褓中之乳子與四  
 五歲之孩提乳哺未息胃氣未全而穀氣尚未充也  
 父母不能調將惟務姑息舐犢之愛遂令恣食肥甘  
 與夫瓜果生冷及一切烹飪調和之味朝飧暮噉漸  
 成積滯膠固以致身熱體瘦面色痿黃或肚大青筋

疳病因

幼科

蟲痛瀉利而諸疳之證作矣。錢諸疳皆脾胃之病。內亡津液之所作也。因大病或吐瀉後醫又以藥吐下致脾胃虛弱失津液且小兒病疳皆愚醫之所壞病假如潮熱是一臟虛一臟實而內發虛熱也法當補母而瀉本臟則愈假令日中發潮熱是心虛熱也肝爲心母法宜先補肝母肝實而後瀉心心得母氣則內平而潮熱自愈醫見潮熱妄謂其實乃以大黃牙硝輩諸冷藥利之利既多而不能禁則津液內亡漸成疳也又如癖病發作寒熱飲水脇下有形硬痛法當用藥漸消磨之醫反以巴豆礪砂輩駛藥下

之小兒易虛易實下之既過胃中津液耗損漸成疳瘦又有病傷寒五六日間有下證以冷藥下之太過致脾胃虛而津液少即便引飲不止而生熱也熱氣內耗肌肉外消他邪相干證變諸端亦成疳病又有吐瀉久病或醫妄下之其虛益甚津液煩躁亦能成疳也。小兒病癖由乳食不消伏在腹中乍涼乍熱飲水不止或喘而嗽與潮熱相類若不早治必成勞疳以其有癖癥則令兒不食致脾胃虛而發熱故引飲也飲多卽蕩滌脾胃亡失津液不能傳化水穀其脉沉細益不能飲食致脾胃虛衰四肢不舉諸邪遂

生羸瘦而成疖矣。楊兒童二十歲以下其病爲疖，二十歲以上其病爲癩。疖與癩皆氣血虛憊，腸胃受傷致之，同出而異名也。何者？小兒臟腑嬌嫩，飽則易傷，乳哺飲食一或失常，不爲疖者鮮矣。疖皆乳食不調，甘肥無節而作也。或嬰幼闕乳，粥飯太早，耗傷形氣，則疖之根生。或三兩晷後乳食稍多，過飽無度，則疖以傷得。或恣食甘肥粘膩，生冷鹹醋，以滯中脘，則疖因積成。或乳母寒暄失理，飲食乖常，喜怒房勞，卽與兒乳則疖因母患傳氣而入。此非病家不能調適之過乎？疖皆脾胃受病，內無津液而作也。有因吐瀉

之後妄施吐下，津液虛竭得之者，有因潮熱大下利，無禁約，胃中焦燥得之者，有因傷寒裏證冷厥太過，渴引冰漿，變而生熱，熱氣未散，復於他邪得之者，又有病癖，寒熱脇下痛硬，或者不能漸與消磨，遽以礪巴峻決津液，暴傷得之者，此非醫家輕藥壞病之過乎？疖之爲候，頭皮光急，毛髮焦稀，頤縮鼻乾，口嚙唇白，兩眼昏爛，採鼻擗眉，脊聳體黃，鬪牙咬甲，焦渴自汗，尿白瀉酸，肚脹腸鳴，癖結潮熱，酷嗜瓜果鹹酸，炭米泥土而欲飲水者，皆其候也。

證候

疖亦名風疖亦名筋疖

錢肝疖白膜遮睛筋疖

瀉血而瘦

湯肝疳眼白青眼睛澀癢

聖惠搖頭

揉目流汗徧身合面而卧面色青黃髮疎頭焦筋青  
腦熱渾身瘡癬腹中積聚下痢頻多久而不痊轉甚  
羸瘦 曾氏目生眵糞髮際左臉多青或白睛微黃  
瀉利夾水或如苔色

心疳亦名驚疳

錢氏面黃頰赤身壯熱

湯氏口

内生瘡 聖惠渾身壯熱吐利無常頰赤面黃胸膈  
煩滿鼻乾心躁口舌生瘡痢久不痊多下膿血有時  
盜汗或乃虛驚 楊氏小便赤澀五心皆熱 曾氏  
齧牙舒舌愛飲冷水喜伏眠於地

脾疳亦名食疳

錢氏面黃腹大食泥土

湯氏脾

疳食不消胃疳多吐 聖惠腹多筋脉喘促氣麤乳  
食不多心腹脹滿多啼欬逆面色痿黃骨立毛焦形  
枯力劣胸膈壅悶水穀不消口鼻常乾情意不悅愛  
暗憎明腸胃不和利多酸臭 曾氏愛食冷物引飲  
無度身面俱黃髮稀作穗頭大項小腹脹脚弱間或  
釀瀉肌瘦目慢晝涼夜熱不思乳食 錢氏又云肥  
疳即脾疳也身瘦虛黃乾而有瘡其候不一種種異  
端今略舉之曰澀或生白膜唇赤身乾黃或黑喜卧  
冷地或食泥土身有瘡疥瀉青白黃沫水痢色變易



疳疔  
白或赤者可醫青黑則難療也蛔疳者失乳飯早食  
肉太早或腸胃停蓄甜膩化為蛔蟲皺眉多啼嘔吐  
清沫腹中乍痛肚脹青筋唇白紫黑腸頭齒癢是也  
蛔雖食蟲蟲不可動  
從口鼻出者難治脊疳者蟲食脊骨身熱羸黃積  
中生熱煩温下痢拍背如鼓鳴脊骨如鋸齒或十指  
皆瘡頻齧爪甲是也腦疳者胎中素挾風熱生下乳  
哺越常頭皮光急滿頭餅瘡腦熱如火髮結如穗遍  
身多汗頰腫頤高是也臨產多慾亦  
然易損兒眼乾疳者瘦悴少  
血舌乾多啼其病在心目不轉睛乾啼少淚其病在  
肝身熱尿乾手足清冷其病在腎聲焦皮燥大便乾

結其病在肺搭口癡眠胃脘乾渴其病在脾總為五  
乾疳是也疳渴者臟中夙有疳氣加之乳母恣食五  
辛酒麪炙煨使小兒心肺壅熱日創煩渴引水乳食  
不進夜則渴止是爾疳瀉者毛乾唇白額上青紋肚  
脹腸鳴泄下糟粕是爾勿用熱藥止之疳痢者挾受風寒暑  
濕或冷熱不調或停積宿滯水穀不聚頻下惡物是  
爾疳腫脹者虛中有積其毒與氣交并故令腹肚緊  
脹由是脾復受濕故令頭面脚手虛浮是爾當磨積調氣  
疳勞者潮熱往來五心煩熱手足心及胸前熱而發  
瘡盜汗骨蒸嗽喘枯悴是爾或渴而復瀉飲水惡食

疳疔

疳疔

疳疔



肚硬如石面色如銀斷不可活無辜疳者腦後頂處  
有核如彈按之轉動軟而不疼其間有蟲如米粉不  
速破之則蟲隨熱氣流散淫蝕臟腑以致肢體瘡瘡  
便利膿血壯熱羸瘦頭露骨高是爾鍼刺破或澣濯  
兒衣露於簷下為雌鳥落羽所污兒着此衣蟲入皮  
毛亦致無辜之疾兒衣已曬須微火烘之其若手足  
極細項小骨高尻削體瘦腹大臍突號哭胸陷或生  
穀癥是為丁奚虛熱來往頭骨分開翻食吐蟲煩渴  
嘔噦是為哺露丁奚哺露皆因脾胃久虛不能化水  
穀以榮血氣故肌肉消鑠腎氣不足復為風冷所傷

使柴骨枯露亦有胎中受毒臟腑少血致之此皆無  
辜種類之疾病而至此不幾殆哉又有小兒久患腎  
疳內虛不食甚者天柱骨倒治法當用錢氏地黃丸  
加驅疳等劑仍與貼項強筋若不識證謂之五軟非  
也天柱骨倒凡有三種有吐瀉日久羸弱成者有肝  
膽伏熱面赤唇紅忽變此者有傷寒不及發表成者  
是皆風邪入肝以致筋絡舒弛吐瀉者當調胃氣肝  
熱者隨輕重以涼肝並與強筋貼項惟傷寒天柱骨  
倒者難療故併及之

莊氏家傳小兒二十四候

第一候瀉膿血日漸瘦

是冷熱疔 第二候脚細肚高胸前骨生愛喫泥土  
酸鹹日久通身黃時時吐逆下痢腹內疼痛是脾疔  
第三候鼻下赤爛愛揉眼兼血痢是肺疔乃因喫  
着承熱物或病後所損心肺加之欬嗽更以服涼冷  
藥過多便上熱下冷漸漸昏沉日夜煩哭 第四候  
皮虛皺面無顏色身上燥癢心煩 第五候毛髮稀  
疎鼻生瘡是肺疔 第六候頭生瘡毛髮稀焦是肝  
疔 第七候牙變黃赤不定是腎疔 第八候頭髮  
焦乾鼻下瘡生是肺疔 第九候咬指甲毛髮作穗  
四肢沉重是心疔 第十候肚上筋生齒蟲蝕是骨

槽疔 第十一候吐逆腹脹是胃疔又名妳疔 第  
十二候齒斷臭爛面無顏色心不思食是脾疔又名  
口疔 第十三候愛合面臥多睡如醉腹脹氣急蓋  
是因曾喫生肉如此腹內有蟲是心脾疔 第十四  
候鼻內乾痛口中臭氣齒根有鮮血是肝肺疔 第  
十五候脚細肚高并肚上有青脉是脾疔 第十六  
候非時生瘡愛喫冷水是熱疔 第十七候皮膚上  
生粟子糞中米出是脾冷疔 第十八候氣滿腹脹  
及口乾是心胃疔 第十九候愛餐生米麩炭靴瓦  
是脾胃疔 第二十候揉鼻揩眼及咬指甲愛飲

五疳  
可治

是肝渴疳 第二十一候多寒熱愛臥不起是骨  
疳 第二十二候愛飲水眼白不開是肝疳 第二  
十三候肌體或熱或涼發渴無時是急疳 第二十  
四候齒斷黑唇懶開則赤是心疳積熱  
聖惠凡小兒疳在內眼澀腹脹痢色無常或如泔淀  
以漸羸瘦此候可療若鼻下赤爛自採鼻頭上有瘡  
生痂痛癢漸漸流引涎於兩耳時時目赤頭髮稀疏  
腦皮光緊頭大項細肌體羸瘦亦可治也若唇口被  
蝕齒斷作五色或盡峭黑舌下有白瘡上齧有瘡子  
口中時有臭氣齒斷漸染欲爛亦可治也若下部開

五疳  
不可治

張有時赤爛癢不可忍下痢無常亦可治也若疳蝕  
脊脊十指皆癢自咬指甲頭髮作穗脊骨如鋸有時  
腹脹有時下痢若急治之無不差也  
聖惠凡小兒肝藏疳若目睛帶青脉左脇下硬多吐  
涎沫眼角左右有黑氣所衝不可治也心藏疳若愛  
驚啼常好飲水便食辛味耳邊有脉舌上有黑靨者  
不可治也脾藏疳若肚大唇無血色人中平滿下痢  
無度水穀不消好喫泥土皮枯骨露不可治也肺藏  
疳若欬逆氣促多瀉白沫身上有斑生如粟米大色  
若黑者不可治也腎藏疳若愛食酸鹹飲水無度

疳治法

便如乳牙齒青黑耳腦乾燥肩竦骨枯不可治也又  
五疳有五絕候一襯着脚中指底不覺疼二抱着手  
足垂躄無力三病未退遍身不煖四藏府瀉青涎及  
沫不止五項筋舒展無力如此之候皆不可治也凡  
醫用藥切在審詳也

治法

瀉疳者小兒病癖或久吐瀉醫者妄投轉過之藥小  
兒易為虛實致令胃虛而亡津液內發虛熱外消肌  
肉一臟虛則諸臟皆弱其病目胞腫腹脹痢色無常  
漸加瘦瘠久不痊可是腸胃有風積法當宣風散  
熱導之後各依本臟補其母

錢諸疳皆依本臟補其母及與治疳藥冷則木香丸  
熱則胡黃連丸主之疳在內目腫腹脹利色無常或  
沫青白漸瘦弱此冷證也史君子丸主之疳在外鼻  
下鼻爛自採鼻頭上有瘡不着加漸進耳生瘡治鼻  
瘡爛蘭香散諸瘡白粉散主之 肝疳當補肝地黃  
丸主之 心疳當補心安神丸主之 脾疳當補脾  
益黃散主之 腎疳當補腎地黃丸主之 筋疳當  
補肝地黃丸主之 肺疳當補脾益黃散主之  
骨疳當補腎地黃丸主之 大抵疳病當辨冷熱肥  
瘦其初病者為肥熱疳久病者為瘦冷疳冷者木香

疳治法

刀十八

九熱者胡黃連九冷熱之疳尤宜如聖九疳故小兒  
之藏府柔弱不可痛擊大下必亡津液而成疳凡有  
可下量大小虛實而下之則不至為疳也初病津液  
少者當生胃中津液白朮散主之惟多則妙楊熱  
者涼之冷者溫之冷熱者溫涼之此其要也熱疳病  
多在外鼻下赤爛頭瘡濕癢五心煩熱掀衣氣麤渴  
引冷水煩躁卧地肚熱脚冷潮熱往來皆熱疳也冷  
疳病多在內利色無常其沫青白肢體軟弱目腫面  
黃又一證躁渴卧地似有熱狀惟飲食不進滑泄無  
已亦冷疳也其有瀉多膿血日加瘦弱此則謂之冷

熱疳大抵疳之受病皆虛使然熱者虛中之熱冷者  
虛中之冷治熱不可妄表過涼治冷不可峻溫驟補  
故錢氏又曰小兒易為虛實脾虛不受寒溫服寒則  
生冷服溫則生熱當識此而勿誤是果非幼幼之綱  
領乎上醫處此消積和胃滋血調氣隨順藥餌以扶  
之淡薄飲食以養之榮衛調和臟腑自然充實一或  
過焉君子未保其往也取積之法又當權衡積者疳  
之母由積而虛謂之疳極諸有積者無不肚熱脚冷  
須酌量虛實而取之若積而虛甚則先與扶胃使胃  
氣內充然後為之微利若積朕乎虛則先與利導纔

得一泄急以和胃之劑為之扶虛然取積雖當疎利  
如白豆蔻蘿蔔子縮砂蓬朮消積等輩亦不可無勝  
間癖痛亦虛中之積也先寒後熱飲水不食或因飲  
水以致喘嗽錢氏有癖為潮熱之說治法解散寒熱  
即與下癖合是而觀發作不同療治不一又可無權  
度於此哉 **曾**六抵疳之為病皆因過餐飲食於脾  
家一臟有積不治傳之餘臟而成五疳之疾若脾家  
病去則餘臟皆安苟失其治日久必有傳變然脾家  
病宜蘆薈丸沉香檳榔丸 積或水晶丹 積烏犀丸 積  
更察虛實療之有蟲者投史君子丸 腹痛化蟲飲 腹

痛如心腹痛吐清水蟲自下多投二聖丸 腹痛諸疳  
證皆宜用局方五疳保童丸或萬應丸常服化積治  
疳仍各投本臟調理之劑寧心用茯神湯 驚悸調肝  
用耆歸湯調脾用參苓白朮散 不乳補肺用補肺散  
咳嗽補腎用調元散庶各得其宜則前證不致再作  
**演山**積是疳之母所以有積不治乃成疳候又有  
治積不下其積存而臟虛成疳尤重太抵小兒所患  
疳證泄瀉無時不作風候者何惟疳瀉名熱瀉其臟  
腑轉動有限所以不成風候雖瀉不風亦轉他證作  
渴虛熱煩躁下痢腫滿喘急皆疳候虛證古云疳虛

疳治法

疳候

二

用補虛是知疳之爲疾不可更利動臟腑發作之初  
名曰疳氣腹大脹急名曰疳虛渴痢頻併名曰疳積  
五心虛煩名曰疳熱毛焦髮穗肚大青筋好喫異物  
名曰疳極受病傳臟已極熱發往來形體枯槁面無神采無  
血色名曰疳勞手足細小項長骨露尻髻無肉肚脹  
臍突名曰疳食加嘔噦頭骨分開作渴引飲蟲從  
口出名曰哺露此皆疳候又因多食生冷甘粘肥膩  
積滯中脘不化久亦成疳治疳之法量候輕重理其  
臟腑和其中脘順其焦使胃氣溫而納食益脾元  
壯以消化則臟腑自然調貼令氣脈與血脈相參壯

筋力與骨力俱健神清氣爽疳消蟲化漸次安愈若  
以藥攻之五臟疎却腸胃下去積毒取出蟲子雖曰  
醫療卽非治法蓋小兒臟腑虛則生蟲虛則積滯虛  
則疳羸虛則脹滿何更利下若更轉動腸胃致虛由  
虛成疳疳虛證候乃作無辜無辜之孩難救矣  
疳者乾也因脾胃津液乾涸而患在小兒爲五疳在  
大人爲五勞總以調補胃氣爲主  
後列諸方其證候龐雜不能名爲何等疳者卽於通  
治諸疳方內檢之若證候的與五疳等條下證候對  
者卽檢本疳方分寒熱虛實擇而用之常須識此勿

令誤也

楊氏云肝痲者由乳食不調肝藏受熱所致也  
 若乳母寒温不調滋味不節或外感風寒內傷喜怒  
 邪氣未散遽以乳兒多成風痲肝者眼之候上膈伏  
 熱痰涎壅滯以致肝風入眼赤腫翳生眵淚爛眶痛  
 癢揉擦昏暗雀盲甚至經月合眼亦名痲眼外證搖  
 頭揉目白膜遮睛眼青淚多頭焦髮豎筋青腦熱甲  
 瘻筋攣燥渴汗多下痢瘡癬是也 錢氏以地黄丸  
 主之 楊氏以天麻丸生熟地黄湯主之 曾氏  
 調肝用耆歸湯

天麻丸 治肝痲風痲眼

青黛

川黃連

天麻

五靈脂

夜明沙

川芎

蘆薈

龍膽草

防風

蟬退

全蝎

麝香

乾蟾頭

右為末豬膽汁浸糕丸麻子大每服十九薄荷湯

生熟地黄湯

治痲眼閉合不開內有朦霧

生地黄

熟地黄

川芎



赤茯苓

枳殼炒

杏仁水浸去皮

川黃連

半夏麴

天麻

地骨皮

甘草炙

當歸各貳錢半

右剉散每服二錢生薑三片黑豆十五粒水煎溫服

耆歸湯 治小兒稟賦素弱豆瘡出不快者及肝虛

目視不明チラ

黃耆壹兩蜜水塗炙

當歸酒洗焙乾

白芍藥

川芎各半兩

甘草炙叁錢

右件咬咀每服二錢水一盞煎七分無時溫服

張渙熊膽天麻丹 治風疖羸瘦搖頭揉目百脉拘

急チラ

天麻

羌活人參肉真熊膽

蟬殼

使君子去殼胡黃連各壹兩

蘆薈

乾蟾酥炙黃

右件搗羅為細末粳米飯和如黍米大每服拾粒

煎荊芥湯下量兒大小加減

烏蟾丹

烏蛇酒浸去皮炙令黃乾蟾酥炙

蛇蛻皮燒灰各壹兩

胡黃連

半兩已上搗羅為細末次用

真蘆薈

麝香

熊膽各貳錢半

右件同拌勻以粟米餅和如黍米大每服拾粒煎薄荷湯下乳前

莊氏家傳治小兒風疳順肝氣進飲食蘆薈丸

蘆薈

壹錢別研秤或只以皂角水磨

草龍膽

壹兩淨洗剉焙

乾

右件藥一處搗羅為末用不坤皂角三錠以水二升按汁用生絹濾去滓入銀器內慢火熬成膏入前二味藥調和得所丸如菉豆大每服三丸至五丸薄荷湯吞下

漢東王先生家寶治小兒風疳氣攻項下生核子皂

角膏方

皂角

大者壹莖燒存性

糯米

壹合炒黑色

草烏頭

貳錢生

黃皮

壹錢炒黑色

右為末每用不拘多少以井華水調貼如未安須用水精丹取後用調氣觀音人參散等藥補仍再貼兼與疳藥相間服  
神妙觀音散 補虛調胃氣進乳食止吐瀉久不進食

白扁豆

微炒

石蓮肉

炒去心

人參

焙各壹分

疳疔

刀針

茯苓

壹錢半焙

甘草

炙

香白芷

各壹錢

綿黃耆

搥碎用蜜水拌炙

木香

炒各壹錢

神麩

貳錢

右為末每服嬰孩一字二三歲半錢四五歲一錢

用水一藥注或半銀盞棗子半片煎十數沸服

人參散

補虛調胃氣進乳食止吐瀉

人參

壹錢

茯苓

壹錢

蓮肉

去心炒各壹分

黃耆

半兩搥蜜水拌炙

甘草

貳錢

右為末每服嬰孩一字二三歲半錢四五歲一錢

以水一藥注或半銀盞入棗子半片煎十數沸服

莊氏第六候頭生瘡毛髮稀焦是肝疳方

肉豆蔻

壹錢

蟾灰

全者壹箇

桔梗

炮

茯苓

煨

大黃

煨各壹兩

龍腦

麝香

各壹錢

右為末軟飯丸

麻子大粟米飲下三丸只可兩服

服

治小兒手足動眼自不開有時語笑或即嗔怒兼多

驚手指甲青狀形似死妄稱天鈞通神丸

茯苓

壹錢

龍齒

各煨半兩

鈎丹

壹錢

胡黃連

各壹分

銀箔

伍片

麝香

壹錢

手汗指

刀針

釣藤壹兩

右為末鍊蜜丸麻子大每十丸米飲下莊氏第二十二候用

此方

第三風疳小兒手足拘攣眼目不開有時自笑或嘔

怒驚叫手爪甲青狀似鬼形已似天癆須服金箔

茯苓散

金箔伍片

茯苓

牛膝

胡黃連各壹兩

龍骨壹分

木香

麝香各壹錢

右牛為末每服一字米飲下日二服忌油膩

**心疳**楊氏云由乳食不調心臟受熱所致也蓋其血

氣未定乳哺有傷易生壅滯內有滯熱未得疏通故

心神驚鬱而作驚疳之候外證身體壯熱臉赤唇紅

口舌生瘡胸膈煩悶小便赤澀五心皆熱盜汗發渴

齧齒虛驚是也錢氏安神丸主之薛氏用安神

丸以治心異功散以補脾楊氏以茯苓丸錢氏安

神丸主之曾氏寧心用茯神湯

朱砂安神丸治心疳怔忡心中痞悶

朱砂肆錢

黃連

生地黃各半兩

生甘草貳錢半

蘭香葉貳錢燒灰

銅青

心疳

心疳

輕粉各伍分

右為末乾敷上

茯苓丸 治心疳驚疳

茯神

蘆薈

琥珀

黃連淨

赤茯苓各叁錢

鈎藤皮

遠志肉薑製焙乾

蝦蟇灰各貳錢

石菖蒲壹錢

麝香少許

右為末粟米糊丸麻子大每服十九薄荷湯下

茯神湯 治心氣不足虛而驚悸日常煩哭及嬰孩

生下羸瘦多驚宜子母同服自然有效

茯神去皮木根壹兩

人參去蘆

當歸去蘆尾酒洗各半兩

甘草炙貳錢

右件咳咀每服二錢水一盞煎七分無時溫服有

微熱煩躁入麥門冬去心同煎

張漢參黃丹 治驚疳挾熱夜卧驚悸

乾蝎貳拾壹箇微炒

天漿子壹拾肆箇乾者微炒

人參細末入

胡黃連各壹兩

天竺黃半兩研已上為

龍腦壹錢並

青黛

朱砂各壹分

右件一處拌勻煉蜜和如黍米大每服十粒人參

湯下量兒大小加減

天竺黃丹

天竺黃

壹兩 細研

晚蠶蛾

微炒

白僵蠶

微炒

川黃連

各半兩 已上搗羅為細末

次用

朱砂

青黛

麝香

各壹分 並細研

右件拌勻粳米餅和如黍米大每服七粒至十粒

煎人參湯下量兒大小加減

仙人水鑑治小兒驚疳朱砂丸 五歲至十五歲並

宜服之

朱砂

青黛

黃連

鬱金

夜明砂

用炒焦黑 各半兩

麝香

熊膽

用冷水上雞子多 浸一宿各壹錢

右同研如粉次入浸熊膽水和為丸如棗豆大空

心臨卧金銀薄荷湯下三丸至五丸切忌生冷油

膩神効

萬全方真珠散 治小兒心疳體熱黃瘦

真珠

麥門冬

去心各半兩

天竺黃

金銀箔

各研伍拾片臨和 加入諸藥末內

牛黃

麝香

各細研

胡黃連

甘草

羶羊角

屑

川大黃

當歸

心疳

刀

朱砂

犀角 屑各壹分

雄黃

茯神

右搗羅為散每服以茵陳湯調半錢量兒大小服之

朱氏治小兒肚大項小即是驚疳方

釣藤

甘草 各貳分

人參

訶蘘 各壹分

右件為末以水一茶椀入藥二錢煎取六合去滓重煎溫服

治五疳八痢心臧熱方

蘆薈 半兩研

輕粉

青黛

香墨

飛羅麩 各壹錢

史君子 壹箇

蝸牛 伍箇和肉炒焦細研 麝香 半錢

右為末研細滴水為丸芥子大生地黃汁化下丸至二九薄荷湯亦得 莊氏第九候用此方

麝香丸 治小兒一切驚疳等病

草龍膽

胡黃連 各半兩

木香

蟬蛻 去頭足洗淨各壹錢 瓜蒂

龍腦

麝香

牛黃 各壹錢並各細研

右豬膽為丸如桐子及菘豆大驚疳或秘或瀉清

米飲送下小兒五七粒至一二十粒眼疳豬肝湯  
下疳渴燻豬湯下豬肉湯下亦得驚風發搐眼上  
竄薄荷湯下一丸更水研一丸滴鼻中牙疳瘡口  
瘡研貼蟲痛苦棟根湯或白蕪荑湯送下百日內  
小兒大小便不通水研封臍中有蟲候乾漆麝香  
各少許并入生油壹兩點溫水化下一大丸慢驚  
勿服

睡驚丸 治小兒一切驚疳食積風癩之證

史君子

伍拾箇燒

香墨

棗大壹塊

金銀箔

各柒片

膩粉

貳錢

右先將史君子存性同墨研細次入金銀箔乳鉢  
內研次入膩粉并麝香少許研令極細稀糊丸如  
桐子大陰乾每服一丸薄荷湯磨下一歲已下半  
丸一名青金丹極効

治小兒因喫着患熱病妳次腹痛并及驚風毒妳便

乃下痢吐逆又名妳疳

桃仁

去皮尖炒

胡黃連

各半兩

沉香

朱砂

別研各壹分

金箔

伍片

右爲末軟飯丸麻子大米飲下五丸妳汁下亦得

莊氏第十一  
候用此方



治小兒胃疳及進食方

胡黃連

蘆薈各壹分

肉豆蔻壹箇

檳榔

乾蟾炙各半箇

夜明砂半分

朱砂

麝香各半錢

右為末煉蜜丸葉豆大一歲一丸米飲反乳汁下亦得如是疳盛次加二丸至三丸取下蟲屎為驗  
五白一服

治小兒心藏積熱生疳桃花丸

寒水石

壹兩用炭火燒熟研如麪細

朱砂

半錢細研合和如桃

右為末水浸蒸餅丸如粟米大冷水下三五丸服

旬日自然安妙莊氏第二十

脾疳楊氏云由乳食不節脾胃受傷所致也或乳母

恣食生冷肥膩或乳兒過傷或飯後與乳致吐或乳

多眠久則變為乳癰腹脇結塊亦為妳疳外證面黃

身熱壯大脚弱吐逆中滿乏力叫啼水穀不消泄下

酸臭合面困睡減食喫泥是也錢氏益黃散主之

楊氏以靈脂丸同益黃散主之薛氏用四味肥

兒丸以治疳五味異功散以生土會氏調脾用參

苓白朮散不乳食

疳疔

勿科八

三三

益黃散

四味肥兒丸

治嘔吐不食腹脹成疳或作瀉不止  
或食積脾疳目生雲翳口舌生瘡牙齦腐爛發熱  
瘦怯遍身生瘡又治小使澄白腹大青筋一切疳  
證

黃連炒

蕪荑

神麩

麥芽炒各等分

右為末水糊丸桐子大每服一二丸空心白滾湯送下

靈脂丸 治脾疳食疳

白豆蔻仁

麥蘖炒

五靈脂

縮砂仁

蓬朮煨

青皮去穢

橘紅

史君子焙

蝦蟇炙各錢

右為末米糊丸麻子大每服十九丸米湯下

神効換肌丸 治脾疳肌瘦潮熱盜汗泄瀉糟粕頭

大腹急

川黃連炒

鼈甲酒炙

肉豆蔻煨

使君子麩裏煨

神麩炒

麥芽炒各半兩

訶子肉貳錢半

麝香伍分

右為末糊丸芥子大米湯下

神脾疳

神脾疳

神脾疳

張渙木香煎 治食疴不知饑飽積滯內停腹大脚  
細下痢無度

南木香 剉

胡黃連

羅為細末次用

麝香 壹分 細研

肉豆蔻 去殼各壹兩

使君子 去殼

巴豆 柴箇去皮心膜 紙裏出油細研

乾蟾 酥炙

五靈脂 各壹兩 已上搗

右件同拌勻滴水於石臼中搗一二百下和如黍  
米大每服二粒至三粒温生薑湯下乳食後看兒  
大小加減

檳榔丹 能食不生肌肉宜常服

檳榔 麩裏炮麩乾為度

木香 木香

胡黃連 各壹兩

代赭石 壹分 研已上各搗

香墨 燒存性 細研

麝香 壹分 細研

右件通拌勻糯米餅和如黍米大每服十粒煎橘  
皮湯下食後量兒大小加減

肉豆蔻丹 肌瘦挾積常服尤佳

肉豆蔻 去殼

青橘皮 炒黃各壹兩

牽牛子 炒黃壹分已上搗

蘆薈 壹分 研

麝香 壹錢 研

右件一處拌勻用糯米餅和如黍米大每服十粒

牙神膏

刀打

三五

生薑湯下食後量兒大小加減  
聖惠木香丸 治小兒食疳腹中多痛大腸或瀉鼻  
養乾瘦時有體熱

木香

胡黃連

蟾頭炙令

麝香

蘆薈

青黛

雄黃各細研

香墨

熊膽各壹分

使君子半兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如菉豆大每服以粥  
飲下五丸量兒大小以意加減

訶梨勒丸

治小兒食疳水穀不消心腹脹滿好嘔

泥土肌體瘦弱

訶梨勒皮叁分

肉豆蔻壹枚去殼

青黛

麝香

蘆薈

朱砂各細研

熊膽研入各壹分

右件藥搗羅為末都研令勻用酒煮粳米飯和丸  
如黍粒大每服以粥飲下三九日二服量兒大小  
增減服之

桃花散

治小兒食疳腹脹

桃花壹分

乾蟾塗去酥炙

肉豆蔻去殼

青黛細研

赤芍藥

紫筍茶各半兩

右件藥搗細羅為散每服以溫粥飲調下半錢看  
兒大小臨時加減

孔氏家傳治小兒脾疳方

胡黃連

史君子

五味子

檳榔各壹錢

南木香半錢

右為末粟飯丸如菘豆大飯內與五七丸日三服

大胡黃連丸錢治一切驚疳腹脹蟲動好喫泥土生

米不思飲食多睡吼哇藏府或瀉或秘肌膚黃瘦

毛焦髮黃飲水五心煩熱能殺蟲進飲食兼治瘡

癰常服不瀉痢唾泥如切

胡黃連

黃連

苦棟子各壹兩

白蕪荑去翳半兩

乾蟾頭燒存性

麝香壹錢

青黛另研壹錢

蘆薈另研壹分

右先將前四味為細末豬膽汁和為劑每壹丸如

胡桃大入巴豆仁壹枚置其中用油單紙一重裹

之同米一升許蒸米熟為度入後四味為丸少入

麩糊丸如麻子大與十九或十五丸清米飲下食

後臨卧日三服

大蕪荑湯又名梔子茯苓湯治黃疸土色為濕熱

小便不利今反利者知黃色髮黃脫落知胸脫腎

百脾疳

凡濕熱之證，鼻下斷作瘡者，土逆行營，能乳者，胃中有熱，故也。喜食土者，胃氣不足，面色黑者，為寒，大便青，屬寒，褐色血，黑色，血熱蓄中間，黃色，有熱，治法當滋營潤燥，內除寒熱，外致津液。

山梔

黃連

麻黃

羌活

柴胡

茯苓

黃檗

甘草

大蕪荑

白朮

防風

當歸

右件判如麻豆大，作一服水一盞，半煎至一盞去，香稍熱服食前。

治小兒脾疳面黃多睡手足浮腫方

桑白皮

漢防已

人參

茯苓

胡黃連

麝香

右為末煉蜜丸如麻子大，用米飲下，五丸一日二服。

莊氏第二候

脚細肚高胸前骨生愛喫泥土酸醜日久通身黃時時吐逆下痢腹內疼痛是脾疳宜服

虎睛

牛黃

朱砂

麝香

桔梗

右為末鍊蜜丸生薑湯下三丸至五丸

治小兒脾疳瀉血肚大氣喘方

丁香

乾蝎

右為末軟飯丸米粒大蕪荑湯下

治小兒通身黃瘦大小便結澀脾所召也

漢防已炒

木通

胡黃連壹分

右為末每服一錢水七分盞生薑少許煎至五六

分分溫二服莊氏第十五方

白朮

胡黃連

夜明砂炒各壹分

甘草炙各壹兩

木香各兩

木通各兩

桑白皮

檳榔壹箇

治小兒疳氣進飲食黃耆散

黃耆

白朮

甘草炙

乾蝎

右為末每服半錢米飲調下

丹小兒喫泥

石膏

茯苓

右為散煎服

五味子

蒼朮

陳橘皮

當歸各壹兩

厚朴薑汁

黃芩

甘草

白朮

芍藥

乾薑

木瓜貳兩

陳皮

白朮

茯苓

石膏

甘草

經治小兒喫泥及臃肚

膩粉壹分用沙糖搜丸如麻子大空心米飲下一丸

丸瀉出土瘡膿如掌切脹也

莊氏第十九候愛餐生米麩炭甄丸是脾胃疳蘆薈

丸治小兒驚風五疳

蘆薈

胡黃連

牛黃

天竺黃

草龍膽

茯苓各半兩

龍腦

麝香

人參

川大黃

雄黃各壹分

生犀屑貳分

右為朱鍊蜜丸菴豆大每服三丸薄荷湯下溫酒

亦得化下亦無妨

小兒脾疳常喫泥土日久遍身通黃醫人不識或呼為陰黃宜服虎睛丸

虎睛壹箇

牛黃貳錢

桔槔

麝香

胡黃連各壹錢

右件為末煉蜜為丸麻子大每服三丸食前米飲

下日二服

肺疳楊氏云由乳食不調壅熱傷肺所致也肺主乎氣鼻乃肺所通其氣不和則風濕乘虛客於皮毛入於血脉故鼻下兩傍赤癢瘡濕各為鼻疳其瘡不痛



汗所流處隨即生瘡亦名疔蠹外證咳嗽喘逆壯熱  
惡寒皮膚粟生鼻瘡流涕咽喉不利頤爛吐紅氣脹  
毛焦泄痢頻併是也 錢氏主補脾生肺以益黃散  
主之 楊氏以清肺飲化蠹丸 錢氏阿膠散 主之  
薛氏用清肺飲以治肺益氣湯以生金 曾氏用補  
肺散

地黃清肺飲 治肺熱疔蠹咳嗽氣逆多啼壯熱惡

寒

桑白皮 炒半兩

紫蘇

北前胡

防風

赤茯苓

黃芩

當歸 天門冬 去心 連翹  
桔梗 生地黃 甘草 炙各錢半  
右剉散每服二錢井水煎食後服次用化蠹丸  
化蠹丸

燕莢

蘆薈

青黛

川芎

白芷稍

胡黃連

川黃連

蝦蟇灰 各等分

右為末豬膽汁浸糕糊丸麻子大每服二十九食  
後臨臥杏仁煎湯下其鼻常用熊膽泡湯小筆蘸  
洗俟前藥各進數服却用青黛當歸赤小豆瓜蒂

地榆黃連蘆薈等分雄黃少許細末入鼻欬瘡

補肺散 治久患咳嗽肺虛氣促有痰惡心

阿膠 壹兩半 剉炒 白茯苓 馬兜鈴 去老梗

糯米 各半 兩 杏仁 貳拾壹粒湯 泡去皮尖

甘草 肆錢 炙

右剉每服二錢水一盞煎七分無時溫服

張渙麝香丹 治小兒肺疳皮毛枯燥欬上氣

胡黃連 壹兩 半夏 半兩湯洗七遍 紫蘇子 微炒

五味子 各壹分 乾蟾 壹枚塗酥炙微黃已上搗羅爲細末次用

麝香 細研 蘆薈 細研 朱砂 細研各壹分

右件一處拌勻以棗肉和如黍米大每服五粒至

七粒米飲下量兒大小加減

靈砂丹 因嗽成疳最宜服之

人參 半兩 去蘆 甜葶塵 研 五靈脂

胡黃連 各壹分已上搗羅爲細末次用 辰砂 半兩 細研

麝香 細研 蘆薈 細研 杏仁 麩炒去皮 各壹分

右件一處拌勻以粳米飣和如黍米大每服十粒

煎人參湯下量兒大小加減

五靈脂丹 久嗽恐成疳常服尤佳

五靈脂 半兩 蟾頭 壹枚塗酥炙微黃 蟬殼 微炒

疳積

款冬花各半兩已上搗羅為細末次用

青黛細研

雄黃細研各壹分

右件藥一處拌勻糯米餅和如黍米大每服十粒煎人參湯下不拘時候量兒大小加減

萬全方治小兒肺疳不欲乳食時復腹痛胡黃連丸

胡黃連

當歸焙微炒

訶梨勒皮

木香各半兩

青橘皮湯浸去白穰焙

紫蘇子

杏仁

湯浸去皮尖麩炒微黃各壹分

麝香

壹錢研入

右件搗羅為末用粟米飯和丸菉豆大每服三丸以粥飲下量兒大小加減

張國林肺疳方

真珠朱拾粒

辰砂半錢

人參

甘草各貳錢

麝香半字

輕粉伍錢七

白附子壹箇

右件先將人參甘草剉碎炒熟白附子炮碾末次研入真珠辰砂麝香輕粉勻畢每服半錢或一字用金銀薄荷煎湯調服日進一服食後只三服其肺疳立愈

莊氏第三候鼻下赤爛愛揉眼兼血痢是肺疳乃因喫着乘熱物或病妳所損心肺加之咳嗽更以服

疳積

刀斗八

三

涼冷藥過多便上熱下冷漸漸昏沉日夜煩哭

龍腦

朱砂各壹分

釣藤

玄參

各壹兩

胡黃連炮半兩

麝香壹錢

右為末鍊蜜丸如黃米大米飲下三九至五九

治小兒頭項細心腹脹滿皮膚乾皺毛髮焦黃鼻下

赤爛口舌生瘡瀉痢不止日漸羸瘦

大蟾

壹箇去四足劈開腹去肚腸入胡黃連壹兩和在内線縫合以濕紙三重裹用泥固濟四面令乾微火出陰氣更用炭三斤燒令通赤即焦候冷淨去泥土細研如粉

麝香

熊膽

蘆薈各半兩

右一處細研如泥麩糊丸如麻子大米飲下三九

乳汁亦得三歲以上加丸

理小兒五疳八痢腹脹羸瘦頭髮焦乾口鼻生瘡

黃連

白蕪荑與黃連同炒焦

夜明砂

用承淘五次焙各壹兩

右為末積豬膽汁和丸如菉豆大三九至五九不

計時候麥門冬熟水下如久患疳氣服藥無効或

腹脹氣促不能飲食米飲下取出疳蟲即差莊氏第八

此方候用

腎疳楊氏云由乳哺不調臟腑伏熱所致也凡甘味

入於脾而動蟲蟲動則侵蝕臟腑遂使孩提心下擾

疳疳

切十八

三十一

悶若上蝕齒斷則口瘡出血齒色紫黑下蝕腸胃則  
下痢肛爛濕癢生瘡療治不蚤精髓消耗難以有瘳  
蟲者蠹也曰為濕蠹多因疳傷久痢腸胃受濕得之  
狀如狐惑傷寒齒蝕之證或以走馬命名蓋齒屬腎  
腎主虛纔受熱邪疳氣直奔上焦故以走馬為喻初  
作口氣名曰臭息次第齒黑名曰崩砂盛則斷爛名  
曰潰槽熱血迸出名曰宣露甚者齒皆脫落名曰腐  
根其根既腐縱得全活齒不復生外證腦熱肌削手  
足如冰寒熱時來滑泄肚痛口臭乾渴齒斷生瘡爪  
黑面鰲身多瘡疥是也 錢氏地黄丸主之 仍當

於生脉散中多加黃耆以補肺 曾氏用調元散  
調元散 主稟受元氣不足顛顛開解肌肉消瘦腹  
大如腫致語遲行遲手足如分同神色昏慢齒生  
遲服之効

乾山藥 去黑皮 伍錢 人參 去蘆

白茯苓 去皮

茯神 去皮 根

白朮

白芍藥

熟地黄 酒洗

當歸 酒洗

黃耆 蜜水炙各 貳錢半

川芎

甘草 炙各 叁錢

石膏

右碎每服二錢水一盞薑二片棗一枚煎七分無  
時溫服如嬰孩幼嫩與乳母同服

存腎肝

刀針

卷

九味地黄丸 治腎疳

熟地黄肆錢伍分 赤茯苓

川棟子 當歸

牡丹皮 山藥

右為末蜜丸桐子大每服八十九空心温酒下

張渙熊膽散 治急疳蟲傷臟腑上蝕口齒生瘡赤

爛世呼為走馬疳

葇宍子炒令微黑 蝦蟇灰

生硫黃壹分已上搗羅為細末次用

麝香 雄黃

山茱萸肉

川芎

史君子肉貳錢

白礬各半兩

熊膽半兩

熊膽半兩

熊膽半兩

熊膽半兩

熊膽半兩

右件藥一處拌勻為細末每服一字煎荆芥湯調下如有瘡處宜薄傅之如鼻癢即取少許逐日吹鼻中日三兩上

熊膽膏 截急疳病

真熊膽半兩 蚌蛇膽為末

牛黃研各壹分 龍腦 麝香各壹錢

右件藥都細研以井華水一小盞攪和勻以磁器

盛重湯慢火熬成膏每服一豆大薄荷湯化下兼

塗患處

立聖膏 治急疳侵蝕

人乳汁半合

黃礬壹粟大

白礬壹粟大

石膽壹豆大

右件藥都研細以綿裹內乳汁中浸經一宿看汁有味慢火熬成膏每用少許塗於口裏如鼻中有瘡滴入少許若有腫處先以三稜鍼刺破除去血然後即塗此藥

二金散 治急疔毒盛

砒霜壹分 麝香半兩

右件藥先將砒霜去紙上炒過後入麝香同研令細每用一字以雞羽掠在瘡上日使三兩度隨時

展去藥無令噉津

治小兒腎疳并疝氣偏墜寒熱方

沒藥炮 甘草各貳分 硫黃

木香炮 胡黃連各壹分

右爲末用蒸棗肉丸如麻子大從蓉湯下三丸可兩服莊氏第七方

通治五疳方五疳保童丸 治小兒乳食不擇冷熱

好食肥膩恣食甘鹹臟腑不和生疳

青黛 苦楝根皮 夜明砂

五倍子 蘆薈 黃連

并通五疳

刀斗

龍膽草

白蕪荑

乾膽各壹

麝香

少許

蠟蛻

去嘴爪 壹分

豬膽

大者伍箇 拌諸藥焙

右件粟米煮糊為丸如麻子大一歲兒三丸不拘時米飲下日三服忌豬肉

大蘆薈丸

治疳殺蟲和胃止瀉

胡黃連

黃連

白蕪荑

去扇

蘆薈

木香

青皮

白雷丸

破開赤者不用 鶴蝮 微炒各半兩

麝香

貳錢 另研

右為末粟米飯丸菜豆大每服一二十丸米飲下愚按前方肝脾疳積食積發熱目生雲翳或疳熱

頸項結核或耳内生瘡肌體消瘦發熱作渴飲食少思肚腹膨脹或牙齦蝕落頰頰腐爛或陰囊玉莖生瘡或胸脇小腹作痛並効內青皮以龍膽草代之麝香不用尤効

蘆薈丸會主五疳八痢虬蟲臟腑虛弱身體瘦悴頭髮焦疎腹脹青筋小便白濁渴水無度洞泄不時穀食難化遍身瘡疥神色乾燥此藥大能養胃壯氣止痢除蟲長肌

南木香

丁香

各貳錢半

訶子

去核 取肉

肉豆蔻

各半兩

使君子肉

蘆薈

各肆錢

并通治疳

切



棗子肉

壹兩薄切用瓦  
盛慢火焙乾

右除使君子肉薄切於乳鉢內極細杵仍將前南  
木香等四味濕麩裏煨至香熟取出地上候冷去  
麩剉焙同棗肉蘆薈為細末再入乳鉢同使君子  
肉杵勻煉蜜丸作麻仁大每服三十丸至五十五  
丸溫米湯送須是空心服之兒小米湯化服  
萬應丸 治諸疳證胃口有熱飲食不進頭髮作穗  
面色痿黃

五倍子

去內  
蟲屑

胡黃連

青皮

去白

陳皮

去白

黃檗

神麩

麥芽

淨洗  
焙乾

三稜

炮剉

莪朮

炮剉

蕪荑

檳榔

龍膽草

川棟子肉

使君子

各壹  
兩

右除檳榔不過火麥芽二味外餘十二味剉碎炒  
令微焦色候冷同前檳榔麥芽研為細末水煮麩  
糊丸麻仁大每服三十丸至五十丸或七十丸溫  
米清湯無時送下或空心兒小者在粟殼大粒數  
下法同前

博濟方至聖青金丹

治小兒一十五種風疾五般

疳氣變蒸寒熱便痢棗花糞脚細壯脹肚上青筋

頭髮稀疎多，喫泥土，擗眉毛，咬指甲，四肢羸瘦，疔  
虺咬心，瀉痢頻併，饑驚多，嗽疔蝕口鼻赤白瘡，疔  
眼雀自悉，皆能治。

青黛 上細研者貳分  
研良方叁分

雄黃 貳分研細  
良方貳兩

龍腦 少許研局  
左壹字

朱砂 壹分研良  
方壹錢

膩粉 壹分良  
左壹錢

胡黃連 貳分良  
左貳兩

熊膽 壹分用溫水化  
入藥良方壹錢

白附子

貳枚良方壹  
錢局左貳錢

蘆薈

壹分研良  
方壹錢

麝香

半分  
研

蟾酥 壹皂子大  
局左壹字

鈇霜

少許良方  
皆同局左

壹字

水銀

壹皂子大局左壹錢  
同膩粉研不見星

右件二十三味細研杵羅為末後再都入乳鉢內

細研令勻用豬膽壹枚取汁熬過浸蒸餅少許  
為丸如黃米大曝乾於瓷器內收密封或要取  
每服二丸各依湯使如後小兒患驚風天吊戴上  
眼睛手足搐搦狀候多端但取藥一丸用溫水化  
破滴入鼻中令嚏噴三五遍後眼睛自然放下搐  
搦亦定更用薄荷湯下二丸小兒久患五疳四肢  
瘦小肚高擗眉喫土咬指甲髮稀疎肚上青筋粥  
飲下二丸小兒變蒸寒熱薄荷湯下二丸化破眼  
小兒久患瀉痢米飲下二丸小兒久患疳虺咬心  
苦楝子煎湯下二丸小兒患鼻下赤爛口齒疳蟲

井口瘡等用兒孩子妳汁研二九塗在患處小兒  
患疳眼雀目用白羊子肝壹枚以竹刀批開內藥  
二九在肝內以麻縷纏定用淘米泔水內煮令熟  
空腹喫仍令乳母常忌毒魚大蒜雞鴨豬肉等此  
藥若小兒常隔三兩日喫一服永無百病不染橫  
天之疾凡有患但與服必有功效

靈死紅丸子 治五疳肥孩兒

郁李仁 壹百粒用温  
水浸去皮尖

坯子臙脂 壹分

麝香 牛錢  
別研

右先研郁李仁細爛次入臙脂麝香同研用粳米

飯為丸如麻子大每服三九至五九一日三服用  
薄荷湯下量兒大小臨時加減九數

譚氏蝦蟆丸 治五疳羸瘦毛髮稀疏採鼻咬甲好  
食泥土腹大頸細痢如泔涎乳食不消小便白濁

綠礬 牛斤  
為末 棗 壹升半  
去核

右先用醋五升并礬者棗熟後入黃連肆兩訶子  
去核貳兩史君子貳兩夜明砂貳兩乾蝦蟆肆箇  
燒灰存性同搗碎入前藥內攪勻直到乾焦為度  
再杵羅為末棗肉丸如黍米大三四歲每服三十  
丸米飲下乳食前

張渙夜明丹 治五疳腹脹目澀多睡

夜明砂 壹兩 微炒 胡黃連 草龍膽

苦棟根 各半 兩 乾蝦蟇 伍箇 燒存性 並為細末 後用

蘆薈 青黛 麝香 各細研 壹分

右件一處拌勻粳米飯和丸如黍米大每服十粒米飲下不拘時候量兒大小加減

劉氏金蟾丸 治小兒五疳羸瘦合面卧地筋青腦熱吐瀉無度渾身壯熱口舌生瘡痢下膿血心腹脹滿喘促氣急乳食全少多啼嘔逆飲食不化或時增寒多涕欬嗽鼻下赤爛十指皆癢蝕於唇齒

生瘡出血肛門不收毛髮焦黃但是疳疾神效

乾蝦蟇 伍箇 燒灰 胡黃連 宣連

鶴蝨 肉豆蔻 苦棟根 白皮

雷丸 蘆薈 蕪荑

雄黃 壹分 飛過

右為末麪糊為丸菘豆大雄黃為衣每服十五丸飯飲下

張氏香蟾丸 治五疳殺蟲消肚膨止痛住瀉痢生

肌膚

乾蝦蟇 酥炙 黃色 大黃連 洗去 鬚 蕪荑仁

蘆薈

右件等分爲末豬膽麩糊爲丸如桐子大每服四十粒用飯飲吞下不拘時一日二服至三服忌生冷宿食毒物

莊氏五疳丸

熊膽

蕪荑去皮各壹錢

麝香壹字

胡黃連

別杵爲末壹分

大乾蟾

用上截去臍剖碎入在餅內鹽泥固濟以炭火燒通赤取出停一夜取藥研爲細末秤壹分

右件先將蕪荑研極細次入麝香次入胡黃連蟾研末令勻傾出却研熊膽以沸湯鎔化再入前四

味更研令勻糊爲丸如菘豆大每服三四歲十丸

四五歲十五丸米飲下食前服

王氏保童丸治五疳消積宿滯進食長肌肥孩兒

胡黃連

草龍膽末炒紫色各半兩

史君子

木香

蘆薈細研各壹錢

大麥蘖

半兩巴豆參米箇去皮心同麥蘖炒今蘖紫色去巴豆不用以蘖爲末

川苦棟

壹分炒紫色

右爲細末同研令細用醋糊爲丸如菘豆大每服十粒至十五粒米飲下不計時候此藥大治小兒疳腹脹

吳氏黃耆飲子 治小兒五疳或傷脾腹脹髮黃時

時壯熱頭上虛汗日漸黃瘦或泄瀉

綿黃耆壹兩 人參 陳皮微炒不

白茯苓 白檳榔極大者 甘草炙各半兩

肉豆蔻壹箇小者

右為麤末每服三錢水一大盞慢火煎至七分濾

去滓時時與服温喫

趙氏家傳治小兒五疳退黃榮肌膚解積熱壓驚消

飲進食

史君子貳拾壹箇 胡黃連半兩 五靈脂

蟾頭炙令焦各壹分 麝香半錢研 蘆薈

熊膽各研貳錢

右為末燒粟米飯為丸菘豆大每服二十九米飲

下

治小兒五疳面色黃瘦身體壯熱喫乳食不能消化

眼目澀痛及胸膈痰涎愛食酸鹹常多瀉痢

胡黃連 母丁香 黃連微炒去毛

蘆薈 熊膽研各半兩 麝香壹分細研

蟾頭壹枚塗酥炙焦黃

右為末用牛膽和丸菘豆大如患心藏疳煎蕪荑

通治五疳

四二四

甘草湯下三九食疳瀉血或赤白痢新汲水下三九吐逆不止及水瀉生薑湯下眼疳羊子肝血與酒和看多少微煎下三九莊氏第四候用此方脂連丸治五疳潮熱腹脹髮焦

胡黃連半兩 五靈脂壹兩

右為末獾豬膽汁丸麻子大米飲下

**冷熱疳疳**之新者為熱疳面黃臉赤骨熱盜汗鼻乾口臭唇焦煩渴心躁驚悸情意不樂若疳之久者為冷疳目腫腹脹便利不定瀉糞肥臍或似油珠煩渴黃瘦熱疳病多在在外冷疳病多在內又有冷熱二證

交互非新非久不內外因者

治冷疳木香丸

木香

青黛另研

檳榔

肉豆蔻去皮各壹分 麝香另研壹錢半

續隨子壹兩半炒

蝦蟇參箇先用繩繫乾燒存性

右末蜜丸如棗豆大每服三五丸至一二十九丸薄荷湯下食前

湯氏云小兒冷疳多渴好卧冷地煩躁啼叫飲食不進漸成羸瘦其候難明有若熱證但大便滑泄百藥不效是也因女子百藥俱試而無偶中者竟

與錢氏木香丸不數服而愈自後凡有此證無不獲驗

治熱疳胡黃連丸

胡黃連

黃連各半

硃砂壹分

右上一二物為細末研入朱砂末都填入豬膽內用淡漿於砂銚子內懸胎煮一飯時久取出研入蘆薈麝香各壹分飯丸如麻子大每服五七丸至一二丸米飲下食後一方加蝦蟇半兩不燒

治冷熱疳如聖丸方見

無辜疳巢氏兒面黃髮直時壯熱飲食不生肌膚積

經日月遂致死者謂之無辜言天上有鳥名無辜晝伏夜遊洗濯小兒夜席露之經宿此鳥即飛從上過而取此衣與小兒着并席與小兒卧便令兒生此病  
聖惠小兒無辜腦後有核如彈丸捏之反下轉是也凡小兒有此物如禽獸舌下有禁蟲若不速去當損其命此核初生軟而不痛中有蟲如米粉得熱氣漸長大大則筋結定即蟲隨血氣流散所有停留子母相生侵蝕藏府肌肉作瘡或大便泄膿血致使小兒漸漸黃瘦頭大髮立手足細弱從茲夭折也夫小兒無辜疳痢者大腹泄痢膿血毛髮皮膚枯槁

無辜疳

刀斗

四十六



肌體日漸瘦羸腸胃既虛痢無時節故名無辜疳痢也。漢東王先生云小兒無辜疾者古云天上有一鳥名無辜因曬小兒衣物失取過夜遇此鳥過尿之令兒啼叫諸病所生日漸黃瘦者非也此蓋是八邪所傷得之其八邪者饑飽勞役風驚暑積謂之八邪久則令人日漸黃瘦喫食不長肌肉夜間多哭身上或發微微壯熱多渴喫食不知饑飽或生瘡癬是也。朱氏八片錦歌孩子無辜氣多因母作為若人能慎護安得見疳羸驚薄成風疾暄寒作氣痿須交除病乳莫更着重衣喫食無令早能言不怕遲論中八

不許胸起力頻微頭皮光哲哲毛髮薄離離肝壅侵雙眼脾黃入四肢渾身生癢疹遍體是瘡痍瀉痢無休歇增寒少定時綉毬全不顧竹馬豈能騎白暈眸中現清涎口畔垂鬪牙須咬甲舉手要擣眉夜夜餐瓜果朝朝食土泥胃傷腸肚脹肺盛喘何疑飲食無休歇就眠似醉迷。肥兒丸 治小兒腦後項邊有物如彈子按之轉動

- 胡黃連 神麴炒 麥蘖各伍錢
- 檳榔 參錢 木香 貳錢 肉豆蔻 麴裏

無辜疳 刀斗八 日七

史君子肉

各貳錢半

右為細末蒸餅丸如黍米大用米飲食遠服

聖惠鼈甲散 治小兒無辜疳項細肚大毛髮乾立

作穗

鼈甲 參分塗醋炙黃去裙襴

檳榔 參顆

沉香

漏蘆

牛蒡子 微炒

史君子

赤芍藥

訶梨勒皮

甘草

炙微赤剉各半兩

右件搗羅為散每服一錢以冰一小盞煎至五分去渣不計時候量兒大小分減溫服

張渙蝎虎丹

截疳祛毒

乾蝎虎

雄者微炙壹枚 蝸牛殼

蘭香根

澱花

各壹分已上搗羅為細末次入

雄黃 水磨者細研

麝香

細研各壹分

龍腦 半分細研

右件通拌勻煎米醋打白麩糊和如黍米大每服十粒煎脂麻湯下乳食後

香甲湯 截疳辟邪

漏蘆

壹兩

沈香 剉

牛蒡子 微炒

訶梨勒皮

微炮

安息香

鼈甲

塗酥炙黃去裙襴

乳香

研各半兩

無辜疳

刀斗

八

右件搗羅爲細末同乳香拌勻每服一錢水八分  
入人參少許煎四分去滓放溫熱服量兒大小加

減

張渙無辜疳痢玉粉散 定痢截疳

十胡粉 壹兩

白龍骨

水磨雄黃 各研

楮木根白皮

漏蘆

白馬夜眼 焙乾

各半

右件搗羅爲細末都拌勻每服一字至半錢以雞  
卵清調下乳食前

五肝丹 治無辜疳痢不止

地膽草

葛蒲 一寸九

漏蘆 各壹

胡黃連

地榆 各半兩已上搗

天雞肝 薄切

豬肝 同入鹽少許用諸

右件同於石臼中搗一二百下成膏和丸如黍米

大每服十粒麝香湯下食前量兒大小加減

梅肉散 治無辜疳渴利不止眼出障翳身體浮腫

烏梅肉 炒乾

綿黃耆

乾葛 各壹

川黃連

蒺藜根

乾薑 炮

甘草 炙各

右件搗羅爲細末每服一錢水一盞煎至六分去

無辜丹

刀斗

四十九

滓放温時時與服

藍葉湯 治無辜疳血痢不斷

藍葉 壹兩

地龍

人參 去蘆頭

烏梅肉

冬瓜仁

黃連

赤茯苓

蝸牛殼 微炒各半兩

右件搗羅為細末每服一錢水一小盞煎至六分

去滓温服乳食前

天靈丹 治無辜疳痢久不差

天靈蓋 壹箇

乾蟾 壹兩 燒灰

胡黃連

葇苳子

水淘去浮者炒令黑色各半兩

砒霜 壹分同天靈蓋煨

五車裏膠泥固濟於太炭火上燒令通赤取出候冷已上都搗羅為細末次入麝香壹分

右件都拌勻軟飯和丸如黍米大每服五粒乳汁下量兒大小加減服之

温藏湯 治小兒無辜疳痢久不止手足逆冷

肉豆蔻 二殼

乾薑 炮各壹兩

龍骨

當歸

厚朴 去蘆皮炙令香熟各半兩

附子

壹枚重半兩炮去皮臍

茅香 半分

右件搗羅為細末每服一錢水八分一盞入生薑三片煎至五分去滓温服乳食前

朴附丹 治無辜疳痢赤白相雜

厚朴 塗生薑汁炙令香熟 訶梨勒皮 剉裹炮

附子 壹枚炮去皮臍 龍骨 烏梅肉

赤石脂 各半兩

右件搗羅為細末鍊蜜和丸如黍米大每服十粒米飲下乳食前

人中白散 治小兒無辜疳氣寒熱積滯不化腹肚脹痛

人中白 壹分 麝香 半分

蘆薈 各半兩

蝦蟇 塗酥炙焦

右件藥細研為散每日空心及晚後用熟水調服半錢服後當下惡物量兒大小加減服之

朱砂丸 治小兒一切無辜疳黃瘦腹痛或痢有蟲冷之與熱悉主之

朱砂 壹分細研一方用

菖蒲

漏蘆 各壹兩 雄黃 壹分細研一方用

乾蟾 壹枚醋炙令黃 麝香 壹兩細研一方用

右件藥搗羅為末都研令勻用粟米飯和丸如麻子大每服以粥飲化下二丸空心午後各一服隨兒大小以意加減

决明子丸 治小兒冷熱無辜疳或時驚熱或時夜啼大便青黃白汗頭熱身熱頭髮作穗四肢黃瘦不多食物

用馬蹄决明子貳兩搗羅爲末鍊蜜和丸如麻子大每於食後以熟水下三丸更量兒大小加減服之

漏蘆散 治小兒無辜疳肚脹或時瀉痢冷熱不調用漏蘆壹兩搗細羅爲散每以豬肝壹兩散子壹錢鹽少許斟酌以水煮熟空心頓服粥飲下

漏蘆丸 治小兒無辜疳痢羸弱不欲飲食及腹內

蟲動作多吐清水

漏蘆 貳兩

豬肝 燂乾

楮株根白皮 各

右件藥搗羅爲末鍊蜜和搗一二百杵丸如彈子大每服以溫水研一九不計時候量兒大小分減服之

聖惠又方用地膽子壹兩搗細羅爲末每服壹錢以豬肝壹兩入鹽少許煮熟無時量兒大小分減食之

治小兒無辜疳痢不止方

右用没石子貳枚炒令赤黑色搗細羅為散以麩半匙和作餅子焙熟却研為末不計時候以粥飲調下半錢量兒大小加減服之

外臺備急治小無辜疳痢方

當歸

龍骨

黃連

人參

没石子

甘草

炙各壹兩

右六味搗散蜜丸服三九日再以差為度大小增減量之

外臺救急療小兒瘦頭乾無辜兼痢方  
右用馬齒莧搗絞汁服三合以差止

子母祕錄治小兒無辜痢赤白兼成疳方

右用胡粉熟蒸熬令色變以飲服之

傳驗治一歲至兩歲小兒無辜病方

右用夜明砂熬擣為散任意拌飯并喫食與喫三歲號乾無辜

五疳出蟲方 聖惠五疳久而不差則腹內有蟲肌體

黃瘦下痢不止宜服藥出之則疳氣漸退其蟲狀如絲髮或如馬尾多出於腹背及頭項上若蟲色黃白及赤者可治青色者不可療也

顛顛經朱砂丸 治孩子疳痢辨蟲顏色定吉凶

朱砂半石

阿魏如朱

蝙蝠血參兩

眉酥少許

右細和少許口脂調先桃柳枝煎湯浴兒後看兒大小以菘豆大填兒臍中後用紙可臍中貼之用青衣蓋兒看蟲出來黃色輕青黑色重

聖惠乾蟾丸 治小兒五疳及驚風出蟲定生死

乾蟾壹枚五月 蛇蛻皮壹條

穀精草貳兩花

入罐子內以鹽泥固濟曬乾燒令通赤放冷研細

胡黃連

瓜蒂

母丁香三味同 牛黃

龍腦

朱砂

雄黃

蘆薈

天竺黃

麝香各壹分

青黛半兩

右件藥都入乳鉢內研令極細用獾豬膽汁煎麪糊和丸如菘豆大一二歲兒以溫米泔半合化下五丸服藥後以桃柳湯浴兒着青衣蓋疳蟲當出衣上及眉毛鬚邊如細麩片子或如糝面塵毒黑色者難治黃白色易治仍宜粥飲下二九日三服甚者半月內差

麝香丸 治小兒五疳瘦弱毛髮乾焦口鼻多瘻有

蟲

五疳丸

刀針

五疳



麝香

蘆薈

粉霜

朱砂各壹分

蟾酥豆許

皂莢三寸燒灰

蛇蛻皮伍寸燒灰

蝙蝠參箇取血拌入藥末

右件藥都細研以油鎔蠟和丸如小豆大先以桃柳湯洗兒後用藥一丸塗於臍中上以醋麩封之良久即蟲出黃白赤者易治黑者難療

蘆薈丸 治小兒五疳四肢乾瘦腹脹氣麤頻揉鼻

眼宜服此出蟲

蘆薈

牛黃

蟬殼各壹分

膩粉

粉霜

硫黃

麝香

各壹錢

田父

壹枚燒煙似絕便住

青黛

半兩

巴豆

拾粒去皮心膜油 蛇蛻皮壹條燒灰

右為極細末令勻以粳米飯丸如棗豆大每服以溫水下二丸良久煎桃柳水浴兒後以青艾蓋遍身當有蟲出白黃色者可治青黑者難治  
出蟲丸 治小兒五疳久不差羸瘦極甚

朱砂

麝香

牛黃

蝸牛子

炒

夜明砂

炒

熊膽

各壹分

蟾酥

半錢

右件藥都細研以麩糊和丸如棗豆大每服以溫

五疳出蟲

刀斗

五疳

水下三九更別以米研一九滴向鼻中得嚏五七  
聲良久得有蟲隨汗出立効

乾蟾丸 治小兒五疳出蟲

乾蟾 壹枚 燒灰

天靈蓋 灰半

麝香 半分

蟬殼 去足 炒

鼈甲 酥炙黃焦去 裙爛各壹分

右件藥為細末每用燒飯和丸如菘豆大二歲已  
下以蛤粉湯下一丸三歲已上至五歲一丸服藥  
後續以桃柳湯浴兒後用青衣蓋之當有蟲子出  
赤白者輕黑者重

熊膽丸 治小兒五疳出蟲

熊膽

朱砂

麝香

蚺蛇膽

蜚蝗 炒

瓜蒂 各半

右件藥為極細末入研了藥令勻用積豬膽汁和  
丸如菘豆大先用桃柳湯浴兒了用粥飲下三九  
以青衣蓋當有蟲出也

定命散 治五疳有蟲

乾蝦蟆 壹枚 燒灰

蛇蛻皮 炒

蟬殼 各壹分

右件為極細末入麝香末半錢研勻但是一切疳  
至午時後以煖水調下半錢一二歲即服一字後  
煎桃柳湯放溫浴兒了使用青衣蓋當有蟲出即

疳積 五疳 五疳

青黛丸 治五疳體熱乾瘦髮立鼻癢有蟲不欲飲  
乳

青黛 人中白 各半

豬牙皂角 麝香 壹分

胡黃連 參分 蟬殼 各半 人乳汁 各少

右件為末五月五日午時修合以粽子肉棗肉及  
蟾涎乳汁丸如黍米大以桃柳湯浴兒後以米飲  
下三丸後着青衣裏兒看身上有蟲出青黑者不  
堪白黃赤者易差

錢乙胡黃連麝香丸 治疳氣羸瘦白蟲作

胡黃連 白蕪荑 各壹兩半 麝香 壹錢

黃連 木香 各半 辰砂 壹分

右末麪糊丸如菽豆大米飲下五七丸至三五歲  
可十五丸無時

錢乙榆仁丸 治疳熱瘦悴有蟲久服充肥

榆仁 黃連 各壹兩

右為末用豬膽七枚破取汁與藥同和入碗內甑  
上蒸九日每日一次候日數足入研麝香半錢湯  
浸蒸餅和丸菽豆大每服五七丸至二十九丸

疳積 五疳 五疳

飲下

**蛔疳**小兒食乳飯早食肉太早或腸胃停蓄甜膩化為蛔蟲皺眉多啼嘔吐清沫腹中作痛肚脹青筋唇口紫黑搖頭齒癢是也 玉訣歌惡哭痰青蛔齧心涎生積冷痛難任每餐甜物并時果致得蟲生病轉深 先用史君子散蘆薈丸取蛔後溫脾胃

史君子散 治小兒疳蛔  
史君子 拾箇瓦上炒為末  
甘草 膽汁浸  
白蕪荑 各壹分  
苦楝子 伍箇炮去核  
右末之每服一錢水煎服

蘆薈丸 治小兒疳蛔

蘆薈

安息香

胡黃連

枳殼 壹錢炒各

史君子 叁分炒

蕪荑 壹分

定粉 壹錢半

麝香 少許

右末積豬膽糊丸如菉豆大五七丸米飲吞下

張渙三根散 治蛔疳蟲動啼叫不止每至月初間

尤甚狀如神祟

貫衆根

棠梨根

醋石榴根 各壹兩

栗刺

故綿

乾漆 各半兩

右件藥六味並燒灰存性搗羅為細末每服一錢

除毒丹 此方治蛔疳不差傳染兄弟姊妹

鬼白 壹兩 去毛

苦參 剉

青箱子

草龍膽 各半 兩

硫黃

緋絹

乾蝦蟇

白礬 各壹分

右件藥竝燒灰存性搗羅為細末煉蜜和如麻子大每服十粒磨沉香湯下量兒大小加減  
豬肚丹 治小兒疳瘦盜汗多倦少力大便有蟲會經大効

川黃連 揀淨

胡黃連

木香 各壹兩

羌活

蘆薈

肉豆蔻

鼈甲 酥炙去裙襴

白蕪荑 各半兩

右件搗羅為細末用豬肚一箇洗刮令淨先以好香白芷貳兩內肚中蒸極熟去白芷不用却入諸藥縫合再蒸如泥取出同豬肚搗二三百下成膏丸如黍粟大每服十粒米飲下不拘時候量兒大小加減

穀精丹 治諸病下蟲如絲髮或如馬尾甚者便至天傷

穀精草

參兩入餅子內鹽泥固密用慢火煨通赤為度

甘菊

用慢火煨通赤為度

乾蟾取者用酥炙黃

胡黃連

羅為細末次入

麝香各壹分並細研

粉霜

蘆薈

皂莢參十燒灰

母丁香各半兩已上搗

右件都拌勻用豬膽汁和如黍米大每服十粒米泔放温下量兒大小加減

桃柳湯 服諸藥後用此法助之

桃枝貳兩 柳枝貳兩

右件並剉碎以水兩大椀煎數沸通手浴兒甚佳浴兒畢用一青衣服蓋之疳蟲自出為驗

小兒合地面無顏色啼聲乍高狀似心痛徃徃口乾發動有時醫人不識妄呼見祟不知小兒曾喫生肉肉化為蟲此方大効苦棟丸

苦棟根 鶴蝨 朱砂各壹兩

檳榔參箇 麝香壹錢

右末麵糊丸如小豆大每服三丸白湯下日三服

忌毒物

下蟲丸 治疳蛔諸蟲

新白苦棟根皮酒浸焙 綠包貫衆

木香 桃仁浸去皮焙 蕪荑焙

疳蛔疳

雞心檳榔各貳錢 鶴虱炒壹錢 輕粉伍分

乾蝦蟇叁錢 史君子伍拾取

右為末麩糊丸麻子大每服一二十丸天明清肉  
汁下內加當歸川連各貳錢伍分

**脊疳** 蟲食脊脊身熱羸黃積中生熱煩渴下利拍背

如鼓鳴脊骨如鋸齒或十指皆瘡煩齧爪甲是也

聖惠金蟾散 治小兒脊疳頭大項細四肢黃瘦肚

大胸高毛髮乾立

蟾壹枚大者塗 夜明砂微炒

樗根白皮 地榆 桃白皮 黃檗各剉

訶梨勒煨用 百合 白蕪荑微炒

人參去蘆 川大黃剉碎 黃連去鬚各

胡粉叁錢 丁香叁粒 檳榔壹分

右件藥搗細羅為散每服用粥飲調下半錢日三服

地骨皮丸 治小兒脊疳漸漸黃瘦以手指擊之背

如鼓響脊骨高是也此因妳熱所致

地骨皮 紫參 黃耆剉

川大黃剉碎 郁李仁湯浸去皮小大

龍膽去蘆 子芩 枳殼麩炒微

脊疳 解八

木香

猪苓

去黑皮

海蛤

細研各壹分

右件藥搗羅為末，鍊蜜和丸，如菘豆大，每服以溫水研下，五九日，三服量兒大小，加減服之，常得微利為効。

殺疳丸

治小兒脊疳，日漸羸瘦，腹中有蟲。

沒石子

瓜蒂

鶴虱

並細研各半兩

蟾頭

蘆薈

青黛

並細研各半兩

麝香

膩粉

朱砂

研入各壹分

右件藥搗羅為末，以糯米飯和丸，如黍米大，每服以粥飲下，五九日，三服量兒大小，以意加減。

蘆薈丸

治小兒脊疳，腹內有蟲，上攻背脊，脊骨漸高，肌體羸瘦。

高肌體羸瘦

蘆薈

青黛

朱砂

麝香

熊膽

胡黃連

貫衆

地龍

黃連

蟬殼

雷丸

蝦蟇

壹枚，塗酥，炙令焦黃

右件藥搗羅為末，用蝸牛肉研和丸，如麻子大，每服以粥飲下，五九日，三服量兒大小，增減服之。青黛丸，治小兒脊疳，四肢瘦弱，腹脹壯熱，頭髮乾疎，時時煩渴，脊骨如鋸。



青黛各壹 朱砂各細研 夜明砂微炒

定粉各壹 蟾酥研入 熊膽細研

糯羊角屑 犀角屑各半分 黃連半兩去鬚

麝香壹錢細研

右件藥搗羅為末用軟飯和丸如菘豆大每一歲以粥飲下一丸

第五脊疳十指爪甲癢痛頭髮焦乾肚腹虛鳴脊骨如鋸時時下痢狀如青淀或膿或血朱砂丸

天靈蓋壹箇 柴胡 白朮

麝香各壹錢 檳榔壹箇

右件棗肉為丸如麻子大每服三丸米飲棗湯下  
朱氏治小兒脊疳瀉血不止方

定粉 好棗拾箇搗碎 頭髮少許剪碎

右件為團博襯久煨通赤細研米飲下半錢  
莊氏治小兒久下血不止謂之歷脊疳方

用穿山甲米醋浸炙為末每服一錢米飲調下食空服

**腦疳**胎中素挾風熱生下乳哺越常頭皮光急滿頭餅瘡腦熱如火髮結如穗徧身多汗顛腫顛高是也  
仙人水鑑小兒三歲已下多睡時容面在地者便是

腦中疳氣宜服此方

消石 菊花

栢葉

各等分

釜下墨

右為散吹入鼻中永不合面臥地也吹鼻中有惡物似泥泄數條卽便是腦中疳氣此是殺入之本小兒腦疳乳母宜服此方

栢葉

松葉

黃葵花

鼓子花

鼈甲

虎骨

末為攪榔

大黃

右並生為末與醋三升煎膏丸如棗豆大每白空

心飲下三九効

藥性論治小兒腦疳方

右研蘆薈不以多少為細末每用少許吹鼻中殺

腦疳鼻中癢

聖惠牛黃丸 治小兒腦疳身熱髮枯

牛黃

蘆薈

熊膽

胡黃連

木香

犀角

龍腦

麝香

蟾酥

青黛

細研半兩

右件藥搗羅為末都研令勻以麪糊和丸如黃米

治腦疳

治腦疳

治腦疳

大每服以温水下五九日三服量兒大小以意加減

龍腦丸 治小兒腦疳羸瘦煩熱

龍腦

麝香

雄黃各壹錢

胡黃連末

牛黃

朱砂

熊膽

蘆薈

乾蝦蟇灰各壹分

右件藥都研令如粉以水化熊膽和丸如麻子大若硬更入糯米飯同丸每服用薄荷溫湯下三九日三服量兒大小以意加減

吹鼻龍腦散 治小兒腦疳鼻塞頭痛眼目昏暗羞

明怕日

龍腦

麝香各細研少許

蝸牛殼炒令黃

蝦蟇灰

瓜蒂

黃連去鬚

細辛各壹分

右件藥搗細羅為散入瓷合內貯之每取少許吹於鼻中每日兩上用之

治小兒合面卧地多睡或氣急面黃哭聲高叫或心痛口乾蓋是因曾喫生肉如此腹內有蟲方

鶴蝨貳分

茯苓壹兩煨

木香壹分

苦楝根叁兩

檜株根半兩

龍腦

明怕日

木香

右先將三味根用水一斗煎成膏然後將三味爲朱搜和成丸黍粒大每服三五丸米飲下莊氏第十三候用此

第七腦疳鼻下赤爛身心煩躁鼻内生瘡頭髮自落日夜痛無休歇狀似鬼形安息丸

安息香

丁香

胡黃連

麝香

雄黃各壹錢

肉豆蔻

金銀箔各伍片

右末煉蜜丸如麻子大每服三丸米湯下

龍膽丸 治腦疳腦熱瘡

龍膽草

升麻

苦棟根皮焙

赤茯苓

防風

蘆薈

油髮灰各貳錢

青黛乾

黃連淨各參錢

右爲末豕豬膽汁浸糕糊丸麻子大薄荷湯下仍以蘆薈末入鼻

乾疳身體壯熱或時增寒舌澀口乾睡多盜汗皮膚枯燥髮立毛焦乳食雖多肌肉消瘦四肢無力好睡昏昏日往月來轉加疰瘁是其候也 瘦瘁少血舌乾多啼其病在心日不轉睛雖啼無淚其病在肝身熱尿乾手足清冷其病在腎聲焦皮燥大便乾結其

疳疔

切

六

病在肺搭口癡眠胸脘乾渴其病在脾  
仙人水鑑獨治乾疳方

天靈蓋

生龍甲

波斯青黛

黃鹽已上各壹分陶隱居云北海黃鹽草粒麤以作魚鮮及鹹菹

右並同研令細日服一字空心熟水下若是濕疳

不治乾疳治之不過三服神效

聖惠天竺黃散 治小兒乾疳心藏煩熱眼目赤澀

皮膚乾燥夜多盜汗羸瘦不能乳食

天竺黃半兩

牛黃

雄黃

朱砂

蘆薈

麝香各細研

蟾頭炙令焦黃

胡黃連

犀角屑

木香

甘草炙微赤

釣藤各壹分

龍腦壹錢細研

右件藥搗細羅為散都研令勻每服以溫水調半錢日三服量兒大小以意加減

治小兒乾疳體瘦煩熱眠卧不安方

牛黃

雄黃

蘆薈

青黛各細研

丁香

黃連去鬚

熊膽研入

蛇蛻皮灰

天竺黃

天漿子微炒

犀角屑各壹分

胡黃連半兩

蟾酥半錢

麝香壹錢

右件藥搗羅爲末更研令勻以鍊蜜和丸如菉豆大每服以粥飲下三九日三服量兒大小以意加減

青黛丸 治小兒乾疳肌體羸瘦皮毛乾焦發歇寒

熱昏昏多睡

青黛參二分

牛黃

蘆薈

朱砂

麝香

雄黃各細

胡黃連

蛇蛻皮灰

龍膽去蘆

蟬殼微炒各壹分

蟾壹枚塗酥炙焦黃

右件藥搗羅爲末都研令勻用麩糊和丸如黍米大每服以粥飲下三九日三服量兒大小臨時增減

牛黃丸 治小兒乾疳煩渴壯熱皮膚枯燥日漸羸瘦

牛黃半錢

雄黃細研

黃連去鬚

蘆薈

天竺黃各壹分

龍腦

麝香各壹錢

甘草半分炙微赤剉

右件藥搗羅爲末都研令勻用糯米飯和丸如菉豆大每歲以粥飲下一丸

前乾疳

四十八

六十八

胡黃連丸 治小兒乾疳瘦弱不能乳食髮立腦乾

肌體柴瘦

胡黃連 兩未半

朱砂

波斯青黛

蘆薈 各一分

麝香 壹分

蛇蛻皮 壹條 燒灰

蟾酥 仁一分 大杏

右件藥都研為末用豬膽壹枚取法酒一盞和藥末都於銚子內熬如膏丸如菽豆大五歲至七歲以粥飲下五九日三服三歲已下三九

青黛散 治小兒乾疳日久不差骨立形枯諸治無効者

青黛

朱砂

蘆薈

地龍

夜明砂 各微

乾蝦蜊 灰

熊膽 各壹分

麝香 壹分

右件藥都細研為散每服半錢空心以粥飲調下更用少許藥吹入鼻中後以桃枝湯看冷熱浴兒衣蓋有蟲子出為効也

牛黃丸 治小兒乾疳體熱羸瘦心神煩躁少得眠

卧

牛黃 細研

朱砂 細研水

子芩

犀角 屑各 兩

麝香 壹分 細研

右件藥搗羅爲末都研令勻以糯米飯和丸如麻  
子大每服用粥飲下三丸量兒大小增減服之  
按乾疳既是五藏之涸則當以人參白朮散加減  
十八味丸之類補而濡之若專恃已上諸丸藥恐無  
瘳理

**內疳** 聖惠云小兒乳食不消心腹虛脹眼目澀癢體  
熱皮枯腸胃不調痢下五色漸漸羸瘦蟲蝕肛腸日  
月彌深痢轉不止故號內疳 錢氏云疳在內則目  
腫腹脹利色無常或沫青白漸瘦弱此冷證也宜使  
君子丸



