

足本大字

校 重
湯 頭 歌 訣

重慶時新書局印行

婦科醫社重編

大字
足本

湯

頭

歌

訣

上海春明書店印行

例言

一、舊本湯頭歌訣，辭句鄙陋，義理含糊，既不適用，又多費解，本書則分門別類，詳爲詮釋，理法兼備，體用俱全，一經閱讀，瞭如指掌，自能觸類旁通，得其精華，取而用之，得益無窮。

一、舊本四句一方，殊欠周詳，本書則歌不限方，方不限句，藥味藥引，力求詳明，對症施治，治法略爲兼括，並示古人用藥觸類旁通之妙，簡及加減之法，以便取裁施用，便利多多。

一、本書欲使用藥者有所依據，服藥者憑之參考，故某病則用某方，方後加以注釋，闡明本方之義理，舉目瞭然，不費搜尋之勞。

一、古方多如恆河沙數，本書勢難盡錄，爰取其便利而最切實用者，得

歌三百首，得方三百有奇，皆簡而易知，讀者神而明之，變而通之，自能觸類而通其變化，無往而不宜，本書三卷，實勝前人幾缺譽。有識之士當不以編者爲須臾斯言也。

湯頭歌訣目錄

補益之劑十首附方七

四君子湯六君子湯 吳功散香砂六君子湯

升陽益胃湯

黃耆龜甲散

秦艽龜甲散

秦艽扶羸湯

紫菀湯

百合固金湯

補肺阿膠散

湯頭歌訣目錄

小建中湯黃耆建中湯 黃耆五物湯 十四

味建中湯十八味大建中湯

益氣聰明湯

發表之劑十四首附方八

麻黃湯

桂枝湯各半湯

大青龍湯

小青龍湯

葛根湯桂枝葛根湯

升麻葛根湯

九味羌活湯

十神湯

神龍散 太無神龍散 海藏神龍散 白龍散

麻黃附子細辛湯

人參敗毒散 敗毒散 清風敗毒散

再造散

麻黃人參芍藥湯

神白散 蔥豉湯

攻裏之劑 七首附方四

大承氣湯

小承氣湯 三化湯

調胃承氣湯

木香檳榔丸

枳實導滯丸 木香導滯丸

溫脾湯 減味溫脾湯

蜜煎導法 豬胆汁導法

涌吐之劑 二首附方六

瓜蒂散 三聖散 參蘆散 梔豉湯 燒鹽方

烏附尖

稀涎散 通關散

和解之劑 九首附方五

小柴胡湯

四逆散

黃連湯

黃芩湯 黃芩芍藥湯 芍藥湯 黃芩加生薑

半夏湯 芍藥甘草湯

逍遙散 八味逍遙散

藿香正氣散

六和湯

清脾飲

痛瀉要方

表裏之劑八首附方五

湯類歌訣 目錄

大柴胡湯 柴胡加芒硝湯 桂枝加大黃湯

防風通聖散

五積散 熟料五積散

三黃石膏湯

葛根黃芩黃連湯

參蘇飲 香蘇飲 香蘇飲

茵陳丸

大羌活湯

消補之劑七首附方六

平胃散 平陳湯 胃苓湯 柴平湯 不換金

正氣散

三

保和丸 大安丸

健脾丸 秘製丸

參苓白朮散

枳實消痞丸

醒甲飲子

葛花解醒湯

理氣之劑 十一首附方八

補中益氣湯 助陽益氣湯

烏藥順氣湯

越鞠丸 六鬱湯

蘇子降氣湯

四七湯 七氣湯 四七湯

四磨湯 四磨飲子

代赭旋覆湯

紺珠正氣天香散

橘皮竹茹湯 金匱橘皮竹茹湯

丁香柿蒂湯 濟生丁香柿蒂湯 丁香柿

竹茹湯

定喘湯

理血之劑 十三首附方七

四物湯 八珍湯 十全大補湯 胃氣湯

大參養榮湯

歸脾湯

養心湯

當歸四逆湯 四逆吳茱萸生薑湯

桃仁承氣湯

厚朴地黃湯

救血方

秦艽白朮丸 蒼朮防風劑 秦艽蒼朮湯

秦艽防風湯

槐花散

不煎飲子

四生丸

雜 煎 散 跌 目 雜

養元活血湯

祛風之劑 十二首附方四

小續命湯

大秦朮丸

三牲飲 星香飲 易簡星香飲

地黃飲子

獨活湯

順風勻氣散

坐車帶通用痛風方

獨活寄生湯 三痺湯

清風散

五

川芎茶調散 菊花茶調散

香空膏

人參荊芥散

祛寒之劑十二首附方二

理中湯 附子理中湯

瀉武湯

四逆湯

酒通人尿猪胆汁湯 日通湯

吳茱萸湯

益元湯

回陽急救湯

四神丸

厚朴溫中湯

導氣湯

驅氣方

橘核丸

祛暑之劑六首附方十

三物香薷飲 黃連香薷飲 五物香薷飲

六味香薷飲 十味香薷飲 二香散 藜

需湯 香葛湯

清暑益氣湯

縮脾飲 大類湯

生脈散

六一散 益元散 碧玉散

雞蘇散

利濕之劑 十三首附方八

畦茶散 四苓散 豬苓散

小半夏加茯苓湯 茯苓甘草湯

腎著湯 甘藷苓米湯 黃耆防己湯

舟車丸

疏鑿飲

實脾飲

五皮飲

湯頭歌 卷 目錄

羌活勝濕湯 羌活除濕湯

大橘皮湯

茵陳蒿湯 柏皮梔子湯

八正散

葶藶分清飲 縮泉丸

當歸拈痛湯

潤燥之劑 十三首附方二

炙甘草湯

滋燥養榮湯

活血潤燥生津飲

韭汁牛乳湯 五汁安中飲

七

湯 煎 散 丸 日 錄

潤腸丸

通幽湯 營歸潤腸湯

搜風順氣丸

消渴方

白茯苓丸

猪腎養芫湯

地黃飲子

酥蜜膏酒

潤燥湯

瀉火之劑二十七首附方七

黃連解毒湯 三黃石膏湯 梔子金花丸

附子瀉心湯 大黃附子湯

半夏瀉心湯

白朮湯 人參白朮湯

竹葉石膏湯

升陽散火湯

涼膈散

清心蓮子飲

甘露飲 桂苓甘露飲

清胃散

瀉黃散

錢乙瀉黃散

瀉白散加減瀉白散

瀉青丸

龍膽瀉肝湯

宮歸龍薈丸

左金丸

導赤散戊己丸 連附六乙湯

清骨散

普濟消毒飲

清靈湯升麻湯

桔梗湯

清咽太平丸

湯頭歌訣 目錄

清斑青黛飲

辛夷散

蒼耳飲

妙香散

除痰之劑十首附方五

三陳湯薄痰湯 溫胆湯 潤下丸 二賢散

滌痰湯

青州白丸

清氣化痰丸

順氣消食化痰丸

滾痰丸

二九

金沸草散局方金沸草散

半夏天麻白朮湯

常山飲

截瘧七寶飲

收瀉之劑九首附方二

金鎖固精丸

扶苓丹

治濁固本丸

調經散河間調經散

桑螵蛸散

真人養臟湯

當歸六黃湯

柏子仁丸

牡蠣散撲汗法

殺蟲之劑二首

烏梅丸

化蟲丸

癰瘍之劑六首附方二

真人活命飲

金銀花酒蟻藥丸 雄雞丸

託裏十補散

託裏溫中湯

託裏定痛湯

散腫潰堅湯

經產之劑十二首附方二十二

妊娠六合湯 表虛六合湯 表實六合湯 柴

胡六合湯 石膏六合湯 茯苓六合湯 梔

子六合湯 風濕六合湯 升麻六合湯 膠

艾六合湯 朴實六合湯 附子六合湯 大

黃六合湯 溫六合湯 連附六合湯 熱六

合湯 寒六合湯 氣六合湯 風六合湯

膠艾湯 婦人良方膠艾湯 婦寶丹

富歸散

黑神散

清魂散

羊羚角散

當歸生薑羊肉湯 千金羊肉湯

達生散 紫蘇飲

參朮飲

牡丹皮散

固經丸

柏子仁丸

望梅丸

骨灰固齒牙散

湯頭歌訣 目錄

軟脚散

稀痘神方

三

正訂湯頭歌訣

補益之劑方七

助陽 四君子湯 局 中和義。參朮茯苓甘草比。人參白朮茯苓各二錢甘草一錢氣味中和故名君子 益以

夏陳 半夏 名六君。湯 子 祛痰補氣陽虛餌。二陳除痰四君補氣脾弱陽虛宜之 除却半夏名異功。

散錢 或加香砂胃寒使。加木香砂仁行氣溫中名香砂六君子湯

升陽益胃 升陽益胃 垣 湯 東 尤者黃連半夏草陳皮。苓瀉防風羌獨活。柴

胡白芍棗薑隨。黃耆二兩人參半夏炙甘草各一錢羌活獨活防風白芍炒各五錢陳皮四錢白朮茯苓澤瀉柴胡各三錢黃連二錢每服三錢加薑棗煎 ○六君子助陽補

脾除痰重用黃耆補氣固胃柴胡羌獨活升陽澤瀉茯苓瀉熱降濁加芍藥和血斂陰少佐黃連以退陰火按東垣治療首重脾胃而益胃又以升陽為先故每用補中上并下滲之藥此方補中有散發中有收脾胃諸方多從此仿也



(南)

勞熱 黃耆鼈甲散羅 地骨皮。 芫菀參苓柴半知。 地黃芍藥天冬桂。 甘桔

桑皮勞熱宜。治虛勞骨蒸喘熱咳嗽食少盜汗黃耆鼈甲天冬各五錢地骨皮秦芫茯苓柴胡各

一兩加蜜煎○鼈甲天冬知芍補水養陰參耆桂苓甘草固衛助陽桑
桔瀉肺熱菀夏理痰嗽芫柴地骨退熱升陽為表裏氣血交補之劑

風勞 秦芫鼈散羅 甲治風勞。 地骨柴胡及青蒿。 當歸知母烏梅合。 止嗽

除蒸斂汗高。鼈甲地骨皮柴胡各一兩青蒿五錢秦芫當歸知母各五錢烏梅

肺勞 秦芫扶羸湯直 鼈甲柴。 地骨當歸紫菀偕。 半夏人參兼炙草。 肺勞

蒸嗽服之謂。治肺痿骨蒸勞嗽聲啞自汗體倦柴胡二錢秦芫鼈甲地骨當歸人參各錢半紫

菀半夏甘草炙各一錢加葦稟煎接黃耆紫甲散蓋本此方除當歸加餘藥○差
肌解熱柴胡秦芫葛為要劑故骨蒸方中
多用之此方雖表裏交治而以柴胡為君

肺勞 紫菀湯海 中知貝母。 參苓五味阿膠偶。 再加甘桔治肺傷。 咳血吐

痰勞熱久。治肺傷氣極勞熱咳嗽吐血肺痿肺癰紫菀知母貝母阿膠各二錢人參茯苓
甘草桔梗各五分五味子十二粒一方加蓮肉○以保肺止咳為君故用阿膠五味

以清火化痰為臣故用知母貝母佐以參苓
甘草扶土以生金使以桔梗上浮而利膈

肺傷咳血 百合固金

湯趙
蕺菴

一、地黃。玄參貝母桔甘草藏。麥冬芍藥當歸配。

喘咳痰血肺家傷。

生地二錢熟地三錢麥冬錢半貝母百合當歸白芍甘草各一錢玄參桔梗各八分○火旺則金傷故以玄參二地助腎滋水麥冬百合保肺安神芍藥

當歸平肝養血甘桔貝母清金化痰皆以
甘草培本不欲以苦寒傷生發之氣也

止嗽生津

補肺阿膠

散錢
氏

馬兜鈴。鼠粘甘草香糯停。肺虛火盛人當服。

順氣生津嗽便寧。

阿膠兩半馬兜鈴焙鼠粘子炒甘草炙糯米各一兩杏仁七錢牛蒡利膈滑
痰杏仁降氣潤嗽李時珍曰馬兜鈴非取其補肺取其清熱降氣肺自安也

其中阿膠糯米
乃補肺之正藥

建中散寒

小建中湯

仲景

芍藥多。

即桂枝加芍藥湯
再加飴糖名建中

桂薑甘草大棗和。更加飴糖

補中藏。虛勞腹冷服之瘥。

芍藥六兩桂枝生薑各三兩甘
草一兩棗十二枚飴糖一升

增入黃耆名亦爾。再

黃耆兩半名黃耆建中湯金匱若除飴糖則名黃耆五
物湯不名建中矣今人用建中者絕不用飴糖何哉

表虛身痛效無過。又有建中十四

味。陰斑勞損起沈疴。

亦有陰症發斑者淡紅隱隱散見肌表此寒伏于下逼其無根之火薰肺而然若服寒藥立斃

十全大補加附

子。麥夏菴蓉仔細哦。

即十全大補湯加附子麥冬半夏肉苁蓉名十四味除茯苓白朮麥冬川芎熟地肉苁蓉名八味大建中湯治同

聰耳明目

益氣聰明湯

東垣

蔓荊。升葛參耆黃柏并。更加芍藥炙甘草。耳

聾目障服之清。

參考各五錢蔓荊子葛根各三錢黃柏白芍各二錢升麻錢半炙草一錢每服四錢○人之中氣不足清陽不升則耳目不聰明蔓荊升葛升其清氣參耆甘

草補其中氣而以芍藥平肝本黃柏滋腎水也

發表之劑十四首附

寒傷營無汗

麻黃湯

仲景

中用桂枝。杏仁甘草四般施。發熱惡寒頭項痛。

傷寒服此汗淋漓。

麻黃去節三兩桂枝二兩杏仁七十枚去皮尖甘草炙一兩傷寒太陽表證無汗用此發之○麻黃善發汗恐其力猛故以桂枝監之甘草和之不

令大發也按桂麻二湯雖治太陽證而先正每云皆肺藥以傷寒必自皮毛入而桂麻又入肺經也

氣傷衛有汗

桂枝湯

仲景

治太陽中風。芍藥甘草薑棗同。

桂枝芍藥生薑各三錢炙草三兩大棗十二枚

治太陽中風有汗用此解肌以和桂麻相合名各半。湯太陽如瘧此為功。熱多者

兩解風寒

大青龍湯

仲景

桂麻黃。杏草石膏薑棗藏。

麻黃六兩桂枝炙草各三兩杏仁四十枚石膏雞子大生薑三

兩大棗十二枚

太陽無汗兼煩躁。

煩為陽為風躁為陰為寒必太陽證兼煩躁者方可用之以杏草佐麻黃發表以薑棗佐桂枝解飢石膏質重瀉火氣輕亦透肌表

義取青龍者龍與雨雲升雨降儼熱類除煩躁乃解也若少陰煩躁而誤服此則逆

風寒兩解此為良。

麻黃湯治寒桂枝湯治風大青龍免風寒而兩解之陶節菴曰

此湯險峻今人罕用

太陽行水發汗

小青龍湯

仲景

治水氣。喘咳嘔噦。渴利慰。

太陽表證未解心下有水氣者用之或喘

或咳或嘔或噦或渴或利或短氣或小便秘皆水氣內積所致

薑桂麻黃芍藥甘。細辛半夏兼五味。

乾薑桂枝麻黃芍藥酒炒炙草

細辛各二兩半夏五味子各半升桂枝解表使水從汗洩芍藥斂肺以收喘咳薑夏細辛潤腎行水以止渴嘔亦表裏分消之意

祛風無汗太陽

葛根湯

仲景

內麻黃襄。一二味加入桂枝湯。

桂枝芍藥炙草各二兩薑三兩棗十二枚此桂

枝湯也加葛根輕可去實因無汗。中風表實故汗不得出十指曰有汗加葛無麻黃。

四兩麻黃三兩名桂枝加葛根湯仲景治太陽有汗惡風

陽明升散 升麻葛根湯錢氏。乙再加芍藥甘草是。升麻三錢葛根芍藥各二錢炙

故用升藥發散陽明表邪陽邪盛則陰氣虛故加芍藥斂陰和血升麻甘草升陽解毒故亦治時疫陽明發熱與頭疼。無汗惡寒均堪倚

及目痛鼻乾不得臥等證亦治時疫與陽斑。痘疹已出慎勿使。恐升散重虛其表也

解表通劑 九味羌活湯張元素用防風。細辛蒼芷與川芎。黃芩生地同甘草。

三陽解表益薑蔥。羌活防風蒼朮各錢半白芷川芎黃芩生地甘草各一錢細辛五分加生薑葱白煎陰虛氣弱人禁用。加減

臨時在變通。潔古製此湯以代麻黃桂枝青蘘各半等湯用羌防蒼細芎芷各走一經祛風散寒為諸路之應兵加黃芩泄氣中之熱生地泄氣中之熱甘草以調和諸藥然黃

芩生地寒滯未可概施用時宜審

時行 十神湯局裏葛升麻。陳草芎蘇白芷加。麻黃赤芍兼香附。時行疫

感冒效堪誇。葛根升麻陳皮甘草川芎紫蘇白芷麻黃赤芍香附等分加薑葱煎湯風寒兩感頭痛發熱無汗惡寒咳嗽鼻塞○芎藭升葛蘇香附辛香利氣發表散寒加芍

藥者斂陰氣於發汗之中加甘草者和陽氣於疏利之際也吳綬曰此方用升麻乾葛能解陽明瘟疫時氣若太陽傷寒發熱用之則引邪入陽明傳變發斑矣慎之

散風寒濕。神朮散方局用甘草蒼。細辛藁本芎芷羌。蒼朮二兩炙草細辛藁本白芷川芎羌活各一兩每服四錢生

姜蔥各走一經祛風濕。太陰蒼朮少細辛厥陰少陽川芎太陽羌活藁本陽明白止此風白煎方與九味羌活湯意同加藁本除黃芩生地防風較羌活湯更穩

寒泄瀉總堪嘗。太無神朮散太無丹即平胃。散加入菖蒲與藿香。陳皮為君二錢蒼朮

厚朴各一錢炙草菖蒲藿香海藏神朮散蒼防草。太陽無汗代麻黃。蒼朮防風各二兩炙草一兩用各錢半治風痺瘧瘧時氣

代仲景麻黃湯治。若以白朮易蒼朮。太陽有汗此湯良。名白朮湯用代桂枝湯治太陽傷風有汗二朮主治略同

特有止汗發汗之異

少陽表證。麻黃附子細辛湯。仲發表溫經兩法彰。麻黃細辛各二兩附子一枝炮

陽之經細辛為腎經表藥聯屬其間若非表裏相兼治。少陰反熱葛能康。少陰證脈沈屬裏當無熱今反發熱為太陽表證未除

暑濕熱時行 人參敗毒 散活人毒 即熱濕也 茯苓草。枳桔柴前羌獨芎。薄荷少許薑三

片。時行感冒有奇功 人參茯苓枳殼桔梗柴胡前胡羌活獨活川芎各一兩甘草五錢每服二兩加薄荷生薑煎 ○羌活理太陽遊風獨活理少陰伏風兼能去濕

除痛川芎柴胡和血升清枳殼前胡行痰降氣甘桔參 茯苓肺強胃輔正區邪也 喻嘉言曰暑濕熱三氣門中推此方為第一俗醫誤却人參曾與他方有別耶 去參名為敗毒

散。加入消風 散見風門 治亦同。 合消風散名 消風敗毒散

陽虛不能作汗 再造散 節 用參耆甘。桂附羌防芎芍參。細辛加棗煨薑煎

。陽虛無汗法當諦。 人參耆甘甘草川芎白芍酒炒羌活防風桂枝附子炮細辛煨薑大棗煎○以參耆甘草薑桂附大補其陽虛无防芎細散寒發表加芍藥者于

陽中陰散中有收引節菴曰發熱頭痛惡寒無汗服汗劑汗不出者為陽虛不能作汗名無陽證庸醫不識不論時令遂以麻黃重劑劫取其汗誤人死者多矣又曰人第知參耆能止汗而不知其能發汗以在表藥隊中則助表藥而解散也

內虛感寒 麻黃人參芍藥湯。 東垣 桂枝五味麥冬襄。歸耆甘草汗兼補。虛

人外感服之康。 麻黃白芍黃耆當歸甘草炙各一錢人參麥冬各三分桂枝五分五味五粒○東垣治一人內蘊虛熱外感大寒而吐血法仲景麻黃湯加補劑製此方一服

而愈原解曰麻黃散外寒桂枝補表虛黃耆實表益衛人參益氣固表麥冬五味保肺氣甘草補脾胃芍藥安太陽當歸和血養血

一切風寒 神白散衛生家寶用白芷甘。薑蔥淡豉與相參。白芷一兩甘草五錢淡豉五十粒薑三片葱白三寸煎服

取一切風寒皆可服。婦人雞犬忌窺探。服要至誠肘後單煎蔥白豉。蔥一握

名慮傷寒初覺頭痛身熱便用代麻黃湯功不慙。宜服之可代麻黃湯

攻裏之劑七首附方四

胃府三焦大熱大實 大承氣湯仲景用芒硝。枳實大黃厚朴饒。大黃四兩酒洗芒硝三合厚朴

八兩枳實五枝救陰瀉熱功偏擅。急下陽明有數條。大黃治大實芒硝治大躁大堅二味治無形血藥厚朴治大滿枳實治痞二味

治有形氣藥熱毒傳入陽明胃府痞滿燥實堅全見雜證三焦實熱並須以此下之○胃為水穀之海上為萬物之母四旁有病皆能傳入胃已入胃府則不復傳他經矣陶節菴曰傷寒熱邪傳裏須看熱氣淺深用藥大承氣最緊小承氣次之調胃又次之大柴胡又次之蓋恐硝性燥急故不輕用

胃府實滿 小承氣湯仲景朴實黃。大黃四兩厚朴二兩譫狂痞鞭音硬上焦強。熱在上焦則滿

在中焦則腹胃有燥熱則語益以羌活名三化。湯中風閉實可消詳。用承氣治二便加羌活治

風中風證實者可偶用然涉虛者多不可輕投

胃實緩攻 調胃承氣湯仲景 硝黃草。大黃酒浸芒硝各一兩甘草炙五錢 甘緩微和將胃保。用甘草

微和胃氣勿令大泄下也 不用朴實傷上焦。不用厚朴枳實恐傷上焦氤氳之氣也 中焦燥實服之好。

一切實積 木香檳榔丸張子和 青陳皮。枳殼柏連稜蓬隨。大黃黑丑兼香附。

芒硝水丸量服之。一切實積能推蕩。瀉痢食瘡用咸宜。木香檳榔青皮醋炒陳皮枳殼炒黃柏酒

炒黃連吳茱萸湯炒三稜莪朮並醋煮各五錢大黃酒浸一兩香附牽牛各二兩芒硝水丸量虛實服
○木香香附青陳枳殼利氣寬腸黑牽牛檳榔下氣尤速氣行則無痞滿後重之患矣連柏燥濕清熱
稜莪行氣破血硝黃去血中伏熱並為推堅峻品溫熱積滯去則二便調而三焦通泰矣蓋宿垢不淨清陽終不得升亦通因通用之義也

枳實導滯丸東垣 首大黃。芩連殼朮茯苓勳。澤瀉蒸餅糊丸服。濕熱積滯力

能攘。大黃一兩枳實麩炒黃芩酒炒黃連酒炒神麩炒各五錢白朮土炒茯苓各三錢澤瀉三錢蒸餅糊丸量虛實服之黃枳實蕩熱去積芩連佐之以清熱芩瀉佐之以利濕神麩佐之以

消食又恐苦寒力峻故加白朮補土固中若還後重兼氣滯。木香導滯丸加檳榔。

瀉藥攻下

溫脾 湯干金

參附與乾薑。甘草當歸硝大黃。寒熱並行治寒積。

臍腹絞結痛非常。

人參附子甘草芒硝各一兩大黃五兩當歸乾薑各三兩煎服日三本方除當歸芒硝亦名溫脾湯治久痢赤白脾胃冷實不消○硝黃以蕩其積

叢附以祛其寒參草當歸以保其血氣按古人方中多有硝黃柏連與薑棗桂附寒熱並用者亦有參朮硝黃補瀉並用者亦有大黃麻黃汗下兼行者今人罕識其指姑錄此方以見治療之妙不一端也

肚枯便秘

蜜煎導法通大便。

仲景用蜜熬如飴捻作挺子或將猪膽汁灌肛中。

用猪胆汁醋和以竹管插肛門中將汁灌入頃常大便名猪胆汁導法仲景

不欲苦寒傷胃府。陽明無熱勿輕攻。

胃府無熱而便

秘者為汗多津液不足不宜用承氣妄攻此仲景心法後人罕知故錄三方于攻下之末

通吐之劑

二首附方六○汗吐下和乃治療之四法經曰在上者涌之其高者因而越之故古人治病用吐法者最多朱丹溪曰吐中就有發散之義張子和曰譙汗法古方多有之惟

以吐發汗者世罕知之今人醫療惟用汗下和而吐法絕置不用可見時師之缺略特補湧吐一門方藥雖簡而法不可廢也若丹溪用四物四君引吐又治小便不通亦用吐法是在用者之圓神矣

食實熱

瓜蒂散仲景赤小豆

甜瓜蒂炒黃赤豆共為末

或入藜蘆鬱金漆

張子

赤豆加藜蘆防風一方去赤豆加鬱金非汁俱名三聖散

此吐實熱與風痰

瓜蒂吐實熱藜蘆吐風痰

虛者參蘆散一味

勾

虛人痰壅不得服瓜蒂者參蘆代之或加竹瀝

若吐虛煩梔鼓湯

仲景梔子十四枚鼓四合治傷寒後虛煩

劇痰烏附尖方透

丹溪治許白雲用瓜蒂梔子苦參藜蘆屢吐不透後以漿水和烏附尖服始得大吐

古人尚有燒鹽方。一切積滯功能奏。

燒鹽熱湯

調服以指探吐治霍亂宿食冷痛等證千金曰凡病宜吐大勝用藥

吐中風痰

稀涎散散散

皂角白礬班

皂角四挺去皮弦炙白礬一兩為末每服五分○白礬酸苦涌泄能軟頑痰皂角辛酸通竅專制風木此專門之兵

也初中風時宜用之

或益藜蘆微吐間。風中痰升人眩仆。當先服此通其關。

令微吐稀涎續進他

藥通關散用細辛皂

角為末

吹鼻得嚏保生還

卒中者用此吹鼻有嚏者可治無嚏者為肺氣已絕

和解之劑

九首附方五

和解

小柴胡湯

仲景

和解供。半夏人參甘草從。更用黃芩加薑棗。少陽百

病此為宗。

柴胡八兩半夏半升人參甘草黃芩生薑各三兩大棗十二枚治一切往來寒熱胸滿脅痛心煩喜嘔口苦耳聾咳渴悸利半表半裏之證屬少陽經者但見一證即是

不必忍具○胆府清淨無出入經在半表半裏法宜和解柴胡升陽達表黃芩退熱和陰半夏祛痰散逆參草補正補中使邪不得復傳入裏也

陽邪熱厥

四逆散

仲景

裏用柴胡。芍藥枳實甘草須。

柴胡芍藥炒枳實

此是陽

邪成厥逆。

陽邪入裏四肢逆而不溫

斂陰泄熱平劑扶。

芍藥枳實積實泄熱甘草和逆柴胡散邪用平劑以和解之

升降陰陽

黃連湯

仲景

內用乾薑。半夏人參甘草藏。更用桂枝兼大棗。寒

熱平調嘔痛忘。

黃連炒乾薑炮甘草桂枝各三兩人參二兩半夏半升大棗十二枚治胸中有熱而欲嘔胃中有寒而作痛或丹田有熱胸中有寒者仲景亦用此湯○按此

湯與小柴胡湯同意以桂枝易柴胡以黃連易黃芩以乾薑易生薑餘藥同皆和解之意但小柴胡湯為少陽藥此湯為太陽陽明藥也

太陽合病不利

黃芩湯

仲景

用甘芍并。一陽合利棗加烹。

治太陽少陽合病下痢黃芩三兩芍藥甘草各

二兩棗十二枚○陽邪入裏故以此方遂為治痢祖。後人加味或更名。利瀉泄也痢黃芩微其熱甘草大棗和其大陰。滯下也仲景

本治瀉寒下利藥要用此治痢更名黃芩芍藥湯潔再加生薑與半夏。名黃芩加生薑。前證古治痢加木香檳榔大黃黃連當歸官桂名芍藥湯。半夏湯仲景

兼理此能平。單用芍藥與甘草。

炙等分名芍藥
甘草湯仲景

散逆止痛能和營。

虞天民曰
白芍不惟

治血虛兼能行氣腹痛者營氣不和逆於內
裏以白芍行營氣以甘草和逆氣故治之也

解鬱調經

逍遙散局

用當歸芍

柴苓朮草加薑薄。

柴胡當歸酒拌白芍酒炒白朮
土炒茯苓各一錢甘草炙五分

加煨薑
薄荷煎

散鬱除蒸功最奇。

肝虛則血病歸芍養血平肝木盛則土衰朮草和中補土紫胡升
陽散熱茯苓利濕甯心生薑煖胃去痰薄荷消風理血醫實曰方

中柴胡薄荷二味最妙蓋木喜風搖寒即摧萎濕即發生木鬱則火鬱火鬱則土鬱土鬱則
金鬱金鬱則水鬱水鬱五行相因自然之理也余以一方治木鬱而諸鬱皆解遙逍散是也 調經八

味丹梔著。

加丹皮梔子名八味
逍遙散治肝傷血少

治一切不正之氣

藿香正氣散局

大腹蘇。甘桔梗苓朮朴俱。夏薑白芷加

薑棗。

外感內傷

嵐瘴並能驅。

藿香大腹皮紫蘇茯苓白芷各三兩陳皮白朮土炒厚朴
薑汁炒半夏麩桔梗各二兩甘草一兩每服五錢加薑棗

煎○藿香理氣和中辟惡止嘔蘇芷桔梗散寒利膈以散表邪服朴消滿陳
夏除痰以疏裏滯苓朮甘草益脾去濕以輔正氣正氣通暢則邪逆自已矣

調和六氣

湯局

藿朴杏砂呈。

半夏木瓜赤茯苓。朮參扁豆同甘草。

薑棗煎之六氣平。

薑香厚朴杏仁砂仁半夏木瓜赤茯苓白朮人參扁豆甘草加薑棗煎能御風寒暑濕燥火六氣故曰六和○蓋朴杏砂理氣化食參朮陳夏補正

匡脾豆瓜祛暑赤茯苓行水大抵以理氣或益香薷或蘇葉。傷寒傷暑風用須明。

葉傷暑加香需

溫瘧。清脾飲嚴用和用香朴柴。苓夏甘苓白朮。更加草薷薑煎服。熱多

陽瘧此方佳。

青皮厚朴醋炒柴胡黃芩半夏薑製甘草炙茯苓白朮土炒草薷煨加薑煎瘧不止加酒炒常山一錢烏梅兩個大渴加麥冬知母○瘧疾一名脾寒蓋因脾胃受

傷者居多此方乃加減小柴胡湯從溫脾諸方而一變也青柴平肝破滯朴夏平胃祛痰芩苓清熱利濕朮草補脾調中草薷散太陰積寒除痰截瘧

瀉瀉

痛瀉要方劉草窗

陳皮芍。防風白朮煎丸酌。

白朮土炒三兩白芍酒炒四兩陳皮炒兩半防風一兩或煎或丸久

瀉加并煎補土瀉木理肝脾。

陳皮理氣補脾防芍瀉木益土若作食傷醫便錯。

吳鶴皋曰傷食腹痛得瀉便淡今瀉而瀉不減故責

之土敗木賊也

表裏之劑八首附方五

湯頭歌

發表攻裏 大柴胡湯仲景用大黃。枳實芩夏白芍將。煎加薑棗表兼裏。妙

法內攻併外攘。柴胡八兩大黃二兩枳實四枚半夏升黃芩芍藥各三兩生薑兩片大棗十枚

熱芍藥飲陰半夏和胃止嘔薑棗調和營衛按本方次方治少陽陽明後方治太陽陽明為不同柴胡加芒硝湯義亦爾。小柴胡湯加芒硝六兩仲景

有桂枝加大黃湯。仲景桂枝湯內加大黃一兩芍藥三兩治太陽誤下轉屬太陰大實痛者

表裏實熱 防風通聖散河大黃硝。荆芥麻黃梔芍翹。甘桔芎歸膏滑石。

薄荷芩朮力偏饒。表裏交攻陽熱盛。外科瘍毒總能消。大黃酒蒸芒硝防風荆芥麻黃黑梔白芍

妙連翹川芎當歸薄荷白朮各五錢桔梗黃芩石膏各一兩甘草二兩滑石三兩加薑葱煎○荆防麻黃薄荷發汗而散熱搜風梔子滑石硝黃利便而降火行水芩桔石膏清肺瀉胃川芎歸芍養血補肝連翹氣聚血凝甘朮能補中燥溼故能汗不傷表下不傷裏也

解散表裏 五積散治五般積。寒積食積氣積血積痰積。麻黃蒼芷芍歸芎。枳桔桂薑甘

茯苓。陳皮半夏加薑蔥。當歸川芎白芍茯苓桔梗各八分蒼朮白芷厚朴陳皮各六分枳殼七分麻黃半夏各四分肉桂乾薑甘草各三分重表者用

桂枝○桂麻解表散寒甘芍和裏止痛蒼朴平胃陳夏行痰芫歸養血茯苓利水薑芷祛寒濕枳桔利膈腸一方統治多病唯善用者變而通之

陳根桂陳餘略炒。

三味生用餘藥微炒熟料尤增溫散功。溫中解表祛寒濕。散痞調經用各充。節陶

庵白凡陰證傷寒脈浮沉無力均當服之亦可加附子

解表清裏 二黃石膏 湯 芩柏連。梔子麻黃豆豉全。薑棗細茶煎熱服。因寒

熱表裏三焦熱盛宜。石膏兩半黃芩黃柏黃連各七錢梔子三十個麻黃淡豉各二合每服一兩薑三片棗二枚茶一撮煎熱服治表裏三焦火熱譫狂斑痧身自

俱黃○黃芩瀉上焦黃連瀉中焦黃柏瀉下焦梔子通瀉三焦之火以清裏麻黃淡豉散寒發汗而解表石膏體重能解肺胃之火氣輕能解肌也

太陽陽明解表 葛根黃芩黃連湯。仲 甘草四般治二陽。治太陽桂枝證醫誤下之邪入陽明脅熱下利

脈促喘而汗出者葛根八兩 解表清裏兼和胃。喘汗自利保平康 成無已曰邪在裏宜見

炙草黃芩各二兩黃連三兩 解也病有汗出而喘者為邪氣外甚今喘而汗出為裏熱氣逆與此方散表邪清裏熱○脈數而止曰促凡葛根者專主陽明之表

清裏內傷外感 參蘇飲元 內用陳皮。枳殼前胡半夏宜。乾葛木香甘桔茯苓

。內傷外感此方推。

人參紫蘇前胡半夏藜蘆乾葛茯苓各七錢半陳皮枳殼炒桔梗木香甘草各二錢每服二錢加薑煎治外感內傷發熱頭痛嘔逆咳嗽

痰眩風瀉外感重者去藜加葱白○蘇葛前胡解表蘇參前若去芎柴入。飲號芎蘇治不

差。去人參前胡加川芎紫胡香飲蘇局僅陳皮草。感傷內外亦堪施。香附炒紫蘇各二錢

陳皮去白一錢甘草七分加薑葱煎

汗吐下兼行 茵陳九外臺用大黃硝。鼈甲常山巴豆邀。杏仁枳殼蜜丸服。

汗吐下兼三法超。時氣毒癘及瘧痢。一丸兩服量病調。茵陳芒硝鼈甲炙梔子各二兩大黃五兩

常山杏仁炒各三兩巴豆一兩去心皮炒鼓五合蜜丸梧子大每服一丸或吐或汗或利不應再服一丸不應以熱湯投之○梔子淡鼓枳鼓湯也合常山可以湧吐合杏仁可以解肌大黃硝承氣湯也

可以瀉熱去實合茵陳可以利濕退黃加巴豆火熱以祛藏府積寒加鼈甲滋陰以退血分寒熱此方備汗吐下三法雖云劫劑實是佳方

大羌活湯即九味。已獨知連白朮暨。即九味羌活湯加防己知母獨活黃連內生地散

熱培陰表裏和。傷寒兩感差熱慰。兩感傷寒一日太陽與少陰俱病二日陽明與太陽俱病三日少陽與厥陰俱病陰陽表裏同時俱

病欲汗則有裏證欲下則有表證經曰其兩感于寒者必死仲景無治法潔古爲製此方開有生
者○羌獨蒼防細辛以散寒發表苓遼防己知母芎地以清裏培陰白朮甘草以固中和表裏

消補之劑方七首

除濕散滿

平胃散方局

是蒼朮朴。陳皮甘草四般藥。

蒼朮泔浸二錢厚朴薑汁炒陳皮去白甘草炙各一錢薑棗煎

除濕散滿驅瘴嵐。調胃諸方從此擴。

蒼朮燥濕強脾厚朴散滿平胃陳皮利氣行痰甘草和中補土泄中有補也

或合

二陳名平陳湯治痰或五苓。

名胃苓湯治瀉

硝黃麥麴均堪著。

加麥芽神麴消食加大黃芒硝瀉積

若合小柴胡名

柴平。

湯

煎加薑棗能除瘴。又不換金正氣散。卽是此方加夏藿。

半夏藿香

飲食觸傷

保和丸

神麴與山查。苓夏陳翹朮

音子加。

糊麴爲丸麥

芽湯下

。亦可方中用麥芽。

山查去核三兩神麴茯苓半夏各一兩陳皮朮子微炒連翹各五錢○山查消肉食麥芽消穀食神麴消食解酒葎子下氣制麴茯苓滲濕連

翹散結陳夏健脾化痰此內傷而氣未病者故但以和平之品消而化之不必攻補也

大安丸內加白朮。

二

消中兼補效堪誇。

補脾消食

健脾丸

參朮與陳皮。枳實山查麥蘗

芽

隨。麴糊作丸米飲下。

消補兼行胃弱宜。

人參白朮土炒各二兩陳皮麥芽炒各一兩山查兩半枳實炒三兩枳

朮丸潔古亦消兼補。

自朮土炒枳實麩炒等分荷葉燒飯上升奇。荷葉包陳米飯煨乾為丸引胃氣及少陽甲胆之氣上升

補脾 參苓白朮散

扁豆陳。山藥甘蓮炒慧仁。數藥利結梗上浮截藥上行兼保肺

。恐燥藥 棗湯調服益脾神。

人參茯苓白朮土炒陳皮山藥甘草炙各一片扁豆炒十二兩蓮肉炒砂仁苡仁炒桔梗各半斤共為末每服二錢棗湯或米

飲調下

固脾消痞

枳實消痞

丸東垣 四君全。麥芽夏麩朴薑連。蒸餅糊丸消積滯。

清熱破結呃虛痊。

枳實炒黃連汁炒薑各五錢人參白朮土炒半夏麩炒麥芽厚朴薑汁炒茯苓各三錢甘草炙乾薑各二錢○黃連枳實治痞君藥麥夏薑朴溫

胃散滿參朮苓草燥濕補脾使氣足脾運痞乃化也

瘧母

鼈甲飲子嚴氏治瘧母。

久瘧不愈 中有結癖 甘草耆木芍芎偶。草菓檳榔厚朴增。

烏梅薑棗同煎服。

鼈甲醋炙黃耆白朮土炒甘草陳皮川芎白芍酒炒草菓麩煨檳榔厚朴等分薑三片棗二枚烏梅少許煎○鼈甲周陰入肝退熱散結為君甘陳

養此助陽補氣川芎白芍養血和陰草菓溫胃檳榔
破積厚朴散滿甘草和中烏梅酸斂蕪棗和營衛

解醒 葛花解醒湯 香砂仁。一苓參朮薤青陳。神麴乾薑兼澤瀉。溫中利

瀝酒傳珍。 葛花破仁豆蔻各一錢木香一分茯苓人參白朮炒青皮陳皮各四分神麴炒乾薑

行氣溫中葛花引濕熱從肌肉出芥瀉引
濕熱從小便出益以參朮同其自氣也

理氣之劑十一首 附方八

補氣升陽 補中益氣湯 黃耆朮陳。升柴參草當歸身。 黃耆蜜炙錢半人參甘草炙

歸身各五分升麻柴胡各三分加薑薑煎去虛者升麻用蜜水炒用○東垣曰升麻味薄性陽能引脾
胃清氣行於陽道以資春氣之和又引參耆甘草上行充實腠理使衛外為固凡備脾胃之藥多以升
陽補氣名 虛勞內傷功獨擅。亦治陽虛外感因 虛人感冒不任發散者此 方可以代之或加辛散藥 木香蒼朮

易歸朮。調中益氣暢脾神。 除常歸白朮加木香蒼朮名調中益氣湯前方加白
芍五味子發中有收亦名調中益氣湯俱李東垣方

甲氣 烏藥順氣湯 芎芷薑。橘紅枳桔及麻黃。 薤薑炙草薑煎服。 中氣

厥逆比方詳。

厥逆痰塞口噤脈伏身冷為中風身冷為中氣中風多痰涎中氣無痰涎以此為辨許學士云中氣之證不可作中風治喻嘉言曰中風證多挾中氣烏藥橘紅各

二錢川芎白芷枳殼桔梗麻黃各一錢蠶絲炒薑炙草各五分加薑棗煎○麻梗芎芷發汗散寒以順表氣烏薑陳枳行氣祛痰以順裏氣加殭蠶清化消風甘草協和諸藥古云氣順則風散風

邪卒中當先治標也

六鬱

越鞠丸丹治六般鬱○氣血痰火濕食因。

此六鬱也芎蒼香附兼梔麩。氣

暢鬱舒痛悶傳

吳鶴皋曰香附開氣鬱蒼朮燥濕鬱撫芎調血鬱梔子清火鬱神麩消食鬱各等分麩糊為丸又濕鬱加茯苓白芷火鬱加青黛痰鬱加星夏枯藁海石血鬱加桃

仁紅花氣鬱加木香檳榔食鬱加麥芽山查枳殼加吳茱萸

又六鬱湯蒼芎附。甘苓半橘梔砂仁。

蒼朮川芎香附甘草茯苓橘

紅半夏梔子砂仁○此前方加味兼治鬱看六鬱中之重者為君餘藥聽加減用之痰

降氣行痰

蘇子降氣湯局橘半歸。前胡桂朴草薑依。下虛上盛痰嗽喘。

亦有加參貴合機

蘇子橘紅半夏當歸前胡厚朴薑汁炒各一錢肉桂炙甘草各五分加薑煎一方無桂加沉香○蘇子前胡橘紅半夏降氣行痰氣行則痰行也數藥兼

能發表加當歸和血升草緩中下虛上盛故又用官桂引火歸元如氣虛亦有加人參五味者

舒鬱化痰

四七湯三理七情氣。

七氣寒熱喜怒憂愁患也亦名七氣湯

半夏厚朴茯苓蘇。

半夏薑汁炒五錢厚

朴薑汁炒三錢茯苓四錢紫蘇二錢○鬱雖由乎氣亦多挾濕挾痰故以半夏厚朴除痰散滯茯苓蘇葉利寬濕中濕去痰行鬱自除矣

薑棗煎之舒鬱結。痰涎

嘔痛盡能舒。又有同名四七。

湯參桂夏草妙更殊。

人參官桂半夏各一錢甘草五分加薑煎○人參補氣官

桂平肝薑半夏祛痰甘草和中併不用利氣之藥湯名四七者以四味治人之七情也

七情氣逆

四磨湯嚴

亦治七情侵。人參烏藥及檳沉。

人參烏藥檳榔沉香等○氣逆故以烏藥檳榔

而順之加參者恐傷其氣也

濃磨煎服調逆氣。實者枳殼易人參。去參加入木香枳。五

磨飲子白酒斟。

白酒磨服治暴怒卒死名氣厥

代赭旋覆

湯仲景

用人參。半夏甘薑大棗臨。重以鎮逆鹹軟痞。痞鞭

音元音愛

氣力能禁。

赭石一兩參二兩旋覆甘草各三兩半夏升生薑五量兩棗十二枚○旋覆之鹹以軟堅赭石之重以鎮逆薑夏之辛以散虛痞參甘大棗之甘以補胃弱

順氣調經

紺珠正氣天香散香。附乾薑蘇葉陳。烏藥舒鬱兼除痛。氣行

血酒自經勻。香附八錢烏藥二錢陳皮蘇葉各一錢乾薑五分每服五六錢○烏藥入氣分而理氣香蘇入血分而利氣乾薑兼入氣血用辛溫以順氣平肝氣行則血行經自

調而痛
自止矣

胃虛呃逆 橘皮竹茹湯 治嘔呃。參甘半夏陳皮麥。赤茯苓再加薑棗煎。方

由金匱此加關。金匱方橘皮竹茹各二升人參一兩甘草五兩生薑半斤棗三十枚名橘皮竹茹湯治嘔逆也後人加半夏麥冬赤茯苓枳實。呃逆由胃火上冲肝

胆之火助之肺金之氣不得下降也竹茹麥冬枳實清肺和胃而降氣胃金清則肝木自平矣二陳降痰逆赤茯苓心火生姜嘔家聖藥久病虛羸故以參甘大棗扶其胃氣

哮喘 丁香柿蒂湯嚴氏 人參薑。呃逆因寒中氣戕。丁香柿蒂各二錢人參一錢生薑五片 濟生香蒂

僅二一味。亦名丁香柿蒂湯加薑煎○古方單用柿蒂取其苦溫降氣濟生加丁香生薑取其開鬱散痰加參者扶其胃氣也 或加竹橘用皆良。竹

茹橘紅名丁香柿蒂竹茹湯治同

定喘湯 白菓與麻黃。款冬半夏白皮湯。蘇杏黃芩兼甘草。肺寒膈熱喘哮

 白菓三十枚炒黃麻黃半夏薑製款冬各三錢桑皮蜜炙蘇子各二錢杏仁黃芩各錢半甘草一錢加薑煎。麻黃杏仁桑皮甘草散表寒而清肺氣款冬溫潤白菓收澁定喘而清金黃芩

清熱蘇子降氣半夏燥
痰共成散寒疎壅之功

理血之劑十三首
附方六

養血通劑 四物湯局 地芍與歸芎。血家百病此方通。當歸酒洗生地各三錢白
芍二錢川芎錢半○當歸

辛苦甘溫入心脾主血爲君生地甘寒入心腎滋血爲臣芎
藥酸寒入肝脾斂陰爲佐芎藭辛溫通行血中之氣爲使 八珍湯 合入四君子。參朮
苓草 氣

血雙療功獨崇。四君補氣
四物補血 再加黃耆與肉桂。加風耆助陽固衛
加肉桂引火歸元 十全大補湯補

方雄。補方
之首 十全除却耆地草。除生地黃
耆甘草 加粟米百
粒 煎之名胃風。湯張元素治風
寒腸胃積滯完

穀及痰
齧牙閉

人參養榮湯 卽十全。湯見前
四物下 除却川芎五味聯。陳皮遠志加薑棗。脾肺氣血

補方先。卽十全大補湯除川芎加五味陳皮遠志○薛立齋曰
氣血兩虛發生諸證不問脈病但服此湯諸證悉退

引血歸脾 歸脾湯清
生 用朮參耆。歸草茯神遠志隨。酸棗木香龍眼肉。

煎加薑棗益心脾。怔忡健忘俱可却。腸風崩漏總能醫。

人參白朮土炒茯苓
神效仁龍眼肉各

二錢黃耆蜜炙錢半當歸酒洗遠志各一錢木香甘草炙各八分○血不歸脾則妄行參耆草朮之甘溫以補脾志茯苓仁龍眼之甘溫酸苦以補心當歸養血木香調氣氣壯則自能攝血矣

補血寧心 養心湯用草耆參。二茯苓歸柏子尋。夏麴遠志兼桂味。再加

酸棗總寧心。

黃耆蜜炙茯苓神川芎當歸酒洗半夏麴各一兩甘草炙一錢人參柏子仁去油肉桂五味子遠志棗仁炒各二錢半每服五錢○參耆補心氣芎歸養心血

茯苓仁遠志泄心熱而寧心神五味棗仁收心氣之散越半夏去擾心之痰涎甘草補土以培心子赤桂引藥以達心經

益血復脈 當歸四逆 湯仲 桂枝芍。細辛甘草木通耆。再加大棗治陰厥。

脈細陽虛由血弱。

當歸桂枝芍藥細辛各二兩甘草炙木通各二兩棗廿五枚○成氏曰通脈者必先入心補血當歸之苦以助心血心苦緩急食酸以收之芍藥之

酸以收心氣肝苦急急食甘以內有久寒加薑棗。

素有久寒者加吳茱萸二升生薑半斤發酒煎名四逆加吳茱萸生薑湯仲景

表溫中通脈絡。

桂枝散表風吳茱萸生薑細辛溫經當歸木通通經復脈

不用附子及乾薑。助陽遇劑陰反

薑附四逆在於回陽當歸四逆在於益血復脈故雖內有久寒止加生薑吳茱萸不用乾薑附子恐反灼其陰也

膀胱畜血 桃仁承氣湯仲景 五般奇。甘草硝黃併桂枝。桃仁五十枚去皮尖研大黃四兩芒硝桂枝甘草各二兩

脹硝黃甘草調胃承氣也熱甚轉血故加桃仁潤燥緩肝表證未除故加桂枝調經解表熱結膀胱小腹脹。如狂畜血最相宜。小

脹而小便自利知為畜血畜下焦畜血發熱故如狂

胃熱吐衄 犀角地黃湯芍藥丹。生地半兩白芍一兩丹皮犀角二錢半每服五錢 血升胃熱火邪干。斑

黃陽毒皆堪治。犀角大寒解胃熱而清心火芍藥酸寒和陰血而散肝火丹皮苦寒瀉血中之伏火生地大寒涼血而滋水以其平諸經之僭逆也 或益柴

芩總伐肝。因怒致血者加柴胡黃芩

咳嗽痰血 咳血方丹 中訶子收。栝蔞海石山梔投。青黛蜜丸口噙化。欬

嗽痰血服之瘳。訶子煨取肉栝蔞仁去油海石去砂梔子炒黑青黛水飛等分蜜丸欬甚加杏仁○青黛清肝瀉火梔子清肺涼心栝蔞潤燥滑痰海石軟堅止嗽訶子斂肺

定喘不用血藥者火退而血自止也

血痔便秘 東垣秦艽白朮丸。歸尾桃仁枳實攢。地榆澤瀉皂角子。糊丸

血痔便艱難

大腸燥結故便難秦艽白朮歸尾酒洗桃仁研地榆各一兩枳實麩炒澤瀉皂角子燒存性各五錢糊丸○歸尾桃仁以活血秦艽皂子以潤燥枳實泄胃熱澤瀉瀉濕

邪地榆以破血止血白朮以燥濕益氣

仍有蒼朮防風劑。潤血疏風燥濕安。

本方除白朮當歸地榆加蒼朮防風大黃黃柏檳榔

名秦艽蒼朮湯除枳實皂角地榆加防風升麻柴胡陳皮炙甘草黃柏大黃紅花名秦艽除風湯治病同

便血 槐花散用治腸風。側柏葉黑荆芥枳殼充。為末等分米飲下。寬腸

涼血逐風功。

槐花柏葉涼血枳實寬腸荆芥理血疎風

小蘗飲子藕節蒲黃。

炒木通滑石生地裏。

歸草當歸梔子淡竹葉。

甘草煎服

血淋

熱結服之良。

小蘗藕節散瘀血生地涼血蒲黃止血木通瀉心火遠小腸梔子散鬱火出膀胱竹葉清肺涼心滑石瀉熱利竅當歸引血歸經甘草和中調氣

血熱妄行

四生九濟用三般葉。

側柏艾荷生地協。

側柏葉艾葉荷葉生地黃

等分生搗如

泥煎。血熱妄行止嘔愜。

側柏生地補陰涼血荷葉散瘀血留好血艾葉生者性溫理氣止血

損傷積血

復元活血湯發

柴胡。花粉當歸山甲俱。桃仁紅花大黃草。損

傷瘀血酒煎祛。柴胡五錢。花柳骨痛。穿山甲。地骨。紅花。各三錢。桃仁五十粒。去尖。研大黃。

活血脈以甘草緩血急以大黃。桃仁紅花山甲花粉破血潤血。

祛風之劑 十二首 附方四

風證通劑 小續命湯 桂附芎。麻黃參芍杏防風。黃芩防己蒼甘草。六

經風中此方通。通治六經中風。嘔邪不遠。語言蹇澁及剛柔二瘓。亦治厥陰風濕。防風一錢。二

分附子四分。薑棗煎。麻黃杏仁。麻黃湯也。治寒桂枝芍藥。桂枝湯也。治風參草補氣。芎芍養血。防風

治風淫。防己治濕淫。附子治寒淫。黃芩治熱淫。故為治風通劑。劉宗厚曰。此方無分經絡。不辨寒熱。虛

實雖多。亦奚以為。按此方。今人罕用。然古今風方。多從此方損益為治。搜風活血降火。秦芩湯。羌活防。芎芷辛芩三壠黃。石膏歸芍蒼甘麻。

。風邪散見可通營。治中風風邪散見不拘一經者。秦芩石膏各三兩。羌活獨活防風。川芎白

芷黃芩酒炒。生地酒洗。熟地當歸酒洗。白芍酒炒。茯苓甘草炙。白朮土炒。各一兩。細辛五錢。每服一兩。劉宗厚曰。秦芩湯愈風。湯雖有補血之藥。而行經散風之劑。居其大半。將何以養血而益筋骨也。按風有三法。解表攻裏。行中道也。初中必扶外感。故用風藥解表散寒。

而用血藥氣藥調
裏活血降火也

卒中痰厥 三生飲局方用烏附星。三皆生用木香聽。生南星一兩生川烏附子加

參對半扶元氣。每服一兩卒中痰迷服此靈。烏附燥熱行經逐寒南星辛烈除痰散

逆氣醫貫曰此行經散痰之劑斬關擒王之將宜急用之凡中風口開為心絕手撒為脾絕眼合為肝

星香散亦治卒中。體肥不渴邪在經。中藏中府者重中經者稍輕胆星八錢散痰木

痰厥風邪 地黃飲子河山茱斜。麥味菖蒲遠志茯。茯苓桂附巴戟天。少

入薄荷薑棗服熟地山茱肉石斛麥冬五味石菖蒲遠志茯苓肉蓯蓉瘖厥風痺能治之。

四肢不收為風痺 火歸水中水生木。熟地以滋根本之陰桂附菴蓉巴戟以返真元之火山

水源水火既交風火自息矣劉河間曰中風非外中之風良由將息失宜心火暴甚腎水虛衰不能制

歸元也惟桂附能引火歸元火歸水中則水能生木木不能生風而風自息矣

瘰癧昏憤 獨活湯丹 中羌獨防。芎歸辛桂參夏葛。茯神遠志白微草。瘰

癧音癧昏憤力能匡。羌活獨活防風當歸川芎細辛桂心人參半夏葛蒲茯神遠志白微各

肝邪二活防風治風辛桂滋經半夏除痰芎歸和血血活則風散也肝移熱于心則昏憤人參補心氣葛蒲開心竅茯神遠志安心白微退熱止風風靜火息血活神甯瘰癧自己矣

噎僻偏枯 順風勻氣散 朮烏沉。白芷天麻蘇葉參。木瓜甘草青皮合。噎

僻偏枯口舌瘡。口眼噎邪僻枯不遂皆由宗氣不能用於一身白朮二錢烏藥錢半天麻人參各五分蘇葉白芷木瓜青皮甘草炙沈香磨各三分加薑煎○天麻蘇芷以疎

風氣烏藥青沈以行滯氣參朮炙草以補正氣氣勻則風順矣木瓜伸筋能于土中瀉木

上中下痛風 黃柏蒼朮天南星。桂枝橫行防已下行及威靈。仙上桃仁紅花龍

膽草。行羌芷上行川芎上行神麴停。痛風濕熱與痰血。上中下通用之聽。

黃柏酒炒蒼朮泔浸海星薑棗各二兩防已桃仁去皮尖膽草白芷川芎神麴炒各一兩桂枝威靈仙紅花羌活各二錢半麴糊丸名上中下通用痛風方丹溪○黃柏清熱蒼朮燥濕龍胆瀉火防已利水

四者治濕與熱桃仁紅花活血去瘀川芎血中氣藥南星散風燥痰四者活血與痰羌活去百節風白芷去頭面風桂枝威靈去臂脛風四者所以治風加神麴者消中焦陳積之氣也證不彙者加減為治

風寒濕痺

獨活寄生

湯千金

羌防辛。芎歸地芍桂苓均。杜仲牛膝人參草。

冷風頑痺屈能伸。

獨活桑寄生秦羌防風細辛川芎酒洗常歸酒洗白芍酒炒熟地桂心茯苓杜仲薑汁炒續斷牛膝人參甘草等分每服四錢

若去寄

生加耆續。

黃耆續斷

湯名三痺古方珍。

名三痺湯治風寒濕三痺喉嚨言此方用參耆四物一派補藥加羌防勝風濕桂心勝寒細辛獨活通腎

細凡治三氣變虛成痺者宜準諸此

消風散熱

消風散內羌防荆。芎朴參苓陳草并。薑蠶蟬蛻麝香入。爲末

茶調或酒行。頭痛目昏項背急。頑麻癢疹服之清。

人參防風茯苓川芎羌活蠶蟬麝香各二兩

荆芥厚朴薑汁炒陳皮去白甘散各五錢每服三錢茶調下疥癬酒下○羌防芎荆治頭目項背之風殭蠶蟬蛻散關屬皮膚之風藜香厚朴去蒸散滿參茶甘橘補正調中

頭自風熱

川芎茶調散

局

荆防。辛芷薄荷甘草羌。目昏鼻塞風攻上。正

偏頭痛悉平康。

薄荷三錢川芎荆芥各四錢防風錢半細辛一錢羌活白芷甘草各二錢爲末每服三錢茶調下○羌活治太陽頭痛白芷治陽明頭痛川芎治少陽厥陰

頭痛細辛治少陰頭痛防風爲風藥卒從薄荷荆芥散風熱而清頭目以風熱攻上宜于升散頭頂之上惟風藥可到也如芥草以緩中加茶調以清降

方內若加蠶蟬菊

。菊花茶調散用亦臧。菊花清頭目 殭蠶去風痰

風濕熱頭風 青空傷東垣 芎草柴苓連。羌防升之入頂巔。爲末茶調如膏服

。正偏頭痛一時闕。川芎五錢甘草炙兩半柴胡七錢黃芩酒炒黃連兩錢羌活防風各一兩每服三錢○風熱濕熱上攻頭腦則痛頭兩旁鬪少陽偏頭痛屬少

陽相火本趨苦寒以羌防芎柴升之則能去濕熱于高巔之上矣

婦人血風勞 人參荆芥散婦 熟地。防風柴枳芎歸比。酸棗鼈羚桂虎甘。

血風勞作風虛治。血虛空疎乃成風邪寒熱盜汗久漸成勞人參煎芥熟地柴胡枳殼棗仁炒鼈甲童便炙羚羊角白朮各五分防風甘草炙當歸川芎桂心各三分

加薑煎○荆防柴羚以疎風平木地黃鼈甲以退熱滋陰芎歸桂枝以止痛調經參木炙草棗仁以斂汗補虛除煩進食

祛寒之劑十二首 附方二

寒客中焦 理中湯仲景 主理中鄉。仲景曰理中者理中焦 甘草 人參 朮 黑薑。 白朮土炒二兩 人參乾薑炮甘

草炙各一兩治太陰厥逆自利不渴脈沉無力○人參利氣益脾爲 嘔利腹瀉陰寒盛。或加

湯頭歌訣

附子總扶陽。名附子
理中湯

陰證厥逆

真武湯仲景壯腎中陽。茯苓朮芍附生薑。

附子一枚炮白朮二兩炒
茯苓白芍炒生姜各三兩少

陰腹痛有水氣。悸眩暈惕保安康。

中有水氣故必悸頭眩汗多亡陽故肉瞶筋惕
音純動貌○朮朮補土利水以療悸眩薑附回陽

益火以逐虛寒芍藥斂陽和營以止腹痛真武北方水神
腎中火足水乃歸元此方補腎之陽壯火而利水故名

陰盛格陽

四逆湯。仲景中薑附草。三陰厥逆太陽沉。

附子一枚生用乾薑一兩
甘草炙二兩冷服專治三

陰厥逆太陽初
證脈沉亦用之或益薑葱芍枳。通陽腹脈力能任。

音仁面赤格陽於上也加葱白
通陽腹痛加芍藥和陰咽痛加

枳梗嘔吐利止脈不出加人參補
氣腹脈嘔吐加生薑以散逆氣

吐利寒厥

白通加人尿豬膽汁。

湯仲景尿音鳥去聲
小便也俗讀平聲非

乾薑附子兼葱白。附子一枚
炮乾薑一

兩葱白四朮此白通湯也葱白以通陽氣
薑附以散陰寒加人尿五合豬胆汁一合熱因寒用妙義深。陰盛格陽厥無脈。陰寒
內甚
格陽於外故厥熱無脈純與熱藥則寒氣格拒不得達入
故於熱劑中加尿汁寒藥以為引用使得入陰而回陽也

吳茱萸湯仲景人參棗。重用生薑溫胃好。陽明寒嘔太陽熱嘔忌用少陰下利厥陰

頭痛皆能保。吳茱萸一升泡人參三兩生薑六兩棗十二枚○薑棗參棗補土散寒茱萸辛熱能入厥陰治肝氣上逆而致嘔利腹痛

戴陽煩燥 益元湯活艾附與乾薑。麥味知連參草將。附子炮艾葉乾薑麥冬五味知母黃連人參甘草○

艾葉辛熱能回陽薑棗蔥煎入童便。冷內寒外熱名戴陽。此證陰盛格陽之證面赤身熱不煩而躁但飲水不入口為外熱內

寒此湯薑附加知連與白通加人尿猪膽汁同意乃熱因寒藥為引用也按內熱曰煩為有根之火外熱曰躁為無根之火故但躁不煩及先躁後煩者皆不治

三陰寒瀉 回陽救急陽節菴曰即四逆湯用六君。桂附乾薑五味羣。附子炮乾薑肉桂人參各五分白朮茯苓各一

錢半夏陳皮各七分甘草三分五味九粒薑煎加麝三釐豬膽汁。三陰寒厥見奇功。薑桂附子祛其陰寒六君溫補助其陽氣

五味人參以生其脈加麝香者以通其竅加胆汁者熱因寒用也

腎虛脾瀉 四神丸 故紙吳茱萸。肉蔻五味四般須。大棗百枚薑八兩。故破

紙四兩酒浸炒吳茱萸一兩鹽水炒肉豆蔻三兩麩裏煨五味子三兩薑炒生薑同煎棗爛即去薑搗棗肉為丸臨臥鹽湯下若早服不能敵一夜之陰寒也五更腎瀉火衰扶

。由腎命火衰不能生脾土故五更將交陽分陽虛不能健閉而泄瀉不可專責脾胃也故紙辛溫能補相火以通君火火盛乃能生土肉苁蓉胃困腸吳茱萸燥脾去濕五味補腎瀉精生薑溫中大便補土亦以防水土也

虛寒脹滿 厚朴溫中湯 陳草葶。乾薑草蔻木香停。煎服加薑治腹痛。虛

寒脹滿用皆靈。厚朴陳皮各一錢甘草茯苓荳蔻木香各五分乾薑三分加薑煎○乾薑草

濕甘草甘平以和中
寒散氣行痛脹自已矣

寒疝 寒疝痛用導氣湯。川棟茴香與木香。吳茱煎以長流水。散寒通氣

利小腸。疝亦名小腸氣川棟四錢木香五錢茴香二錢吳茱一錢溫泡同煎○川棟苦寒入肝舒筋能導小腸膀胱之熱從小水下行為治疝君藥茴香煖胃散寒吳茱溫肝燥濕木

香行三焦通氣

寒濕疝氣 疝氣方丹用荔枝核。梔子山查枳殼益。荔枝雙結狀類學丸能入肝腎辟寒散滯梔子瀉火利水

枳殼行氣破癥山查散再入吳茱煖厥陰。疝乃厥陰肝邪非腎病以肝脈絡陰器也長流水煎疝痛釋。等

或爲末
空心服

剝疝 橘核丸 生中川棟。桂朴實延胡藻帶昆。桃仁二朮酒糊合。癩疝痛

頑鹽酒吞。

橘核川棟子海藻帶昆布桃仁各二兩桂心厚朴枳實延胡索木通木香各五錢
酒糊爲丸鹽湯或酒下○橘核木香能入厥陰氣分而行氣桃仁延胡能入厥陰氣

分而活血川棟木通能導小腸膀胱之濕官桂能祛肝腎之
寒厚朴枳實行結水而破宿血昆布藻帶寒行水而鹹軟堅

祛暑之劑 五首附方十

散暑和脾 三物香薷飲 局豆朴先。香薷辛溫香散能入脾肺發越陽氣以
散蒸熱厚朴除濕散滿扁豆清暑和脾 若云熱盛

加黃連。

名黃連香薷飲活人治
中暑熱盛口渴心煩

或加芩草 茯苓甘草名五物。

香薷利濕祛暑木瓜宜。

加木瓜名六味香薷
飲木瓜茯苓治濕盛 再加參耆與陳朮。兼治中傷十味全。六味加參耆陳皮白
朮名十味香薷飲

香散 合人香蘇飲。 五味香薷飲合香蘇飲香附紫蘇陳皮
蒼朮名二香散治外感內傷身寒腹脹 仍有藿藳湯香葛湯傳。三

香藳飲合藳香正氣散名藳藳湯治伏暑吐
瀉三物香藳飲加葛根名香葛湯治暑傷風

補肺生津清熱燥濕 清暑益氣 湯東垣 參草者。當歸麥味青陳皮。麴柏葛根

蒼白朮。升麻澤瀉棗薑隨。 人參黃耆甘草炙當歸酒洗麥冬五味青皮麴炒陳皮留白神麴炒黃柏酒炒葛根者朮白朮土炒升麻澤瀉加薑棗煎

○熱傷氣參耆補氣斂汗濕傷脾二朮燥濕強脾火旺則金病而水衰故用麥味保肺生津黃柏瀉火滋水青皮理氣而破滯當歸養血而和陰麴草和中而消食升葛以升清澤瀉以降濁也

溫脾消暑 縮脾飲用清暑氣。砂仁草菓烏梅豎。甘草葛根扁豆加。吐瀉

煩濕溫脾胃。 砂仁草菓煨烏梅甘草炙各四兩扁豆炒研葛根各二兩暑必兼濕而濕屬脾土故用砂仁草菓利日滯脾扁豆解暑滲濕葛根升陽生津氣草補土和中烏梅清

熱止 古人治暑多用溫。 如香薷飲大暑為陰證此所謂。潔古曰中熱為陽證為有

曰脈虛身熱得之傷暑 大順散 杏仁薑桂甘。散寒燥濕斯為貴。 先將甘草白砂仁次入乾薑杏仁炒合肉桂為末每服一錢吳

鳴皋曰此非治暑乃治暑月飲冷受傷之脾胃耳

大補復脈 生脈散 麥味與人參。保肺清心治暑淫。氣行汗多兼口渴。病

危脈絕急煎斟。 人參五分麥冬八分五味子九粒○人參大補肺氣麥冬甘寒潤肺五味酸收斂肺並能瀉火生津蓋心主脈肺朝百脈補肺清心則氣充而脈復將死脈絕

暑服之能令復生夏月
火旺燥金尤宜服之

消暑利濕 六一散 滑石同甘草。解肌行水兼清燥。統治表裏及三焦。熱

渴暑煩瀉痢保。

滑石六兩甘草一兩燈心湯下亦有用薑湯下者○滑石氣輕解肌質重瀉火滑能入竅淡能行水故能通治上下表裏之濕熱甘草瀉火和中又以緩滑石

之寒益元散 碧玉散 與鷄蘇散 砂黛薄荷加之好。

前方加辰砂名益元散取其清心加青黛名碧玉散取其涼肝加薄

荷名雞蘇散取其散肺也

利濕之劑十三首 附方八

行水經劑

五苓散 治太陽府。

太陽經熱傳入膀胱府者用之

白朮澤瀉豬茯苓。膀胱化氣

添官桂。利便消暑煩渴清。

豬苓茯苓白朮炒各十八銖澤瀉一兩六銖桂半兩每服三錢○二苓甘淡利水澤瀉甘鹹瀉水能入肺腎而通膀胱導

水以泄火邪加白朮者補土所以制水加官桂者氣化乃能出也經曰膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣

除桂名爲四苓散。無寒但渴服

之靈。濕勝則氣不得施化故

濕利其濕則湯自止

豬苓湯 除桂與朮。加入阿膠滑石停。

豬苓茯苓澤瀉阿膠

滑石各一兩〇滑石瀉火解肌最能行水吳
鶴皋曰以諸藥過燥故加阿膠以存津液
此為和濕兼瀉熱。疸黃小便閉渴嘔寧。

五苓治濕勝
猪苓兼熱勝

行水消痞 小半夏加茯苓湯。仲景行水消痞有生薑。半夏一升茯苓三兩生薑加
半斤除茯苓名小半夏湯

桂除夏治悸厥。茯苓甘草湯名彰。加桂枝甘除半夏名茯苓甘草湯仲景治傷寒
水氣乘心厥而心下悸者先治其水却治其厥〇

火因水而下行則眩
悸止而痞滿治矣

濕傷腰腎 腎著湯金匱內用乾薑。茯苓甘草白朮襄。傷濕身痛與腰冷。亦

名甘薑苓朮湯。乾薑炮茯苓各四兩甘草炙白朮炒各二兩〇黃耆防己湯金匱除薑茯苓

朮甘薑棗共煎嘗。此治風水與諸濕。身重汗出服之良。黃耆防己各一
兩白朮七錢半

甘草炙五錢加薑棗煎〇防己大辛苦寒通行十二經開竅行水黃耆生用遠
表白朮燥濕強脾並能止汗加甘草者益土所以製水又以緩防己之峻急也

燥實陽水 舟車九河牽牛及大黃。遂戟芫花又木香。青皮橘皮加輕粉。

燥實陽水卻相當。

口渴面赤氣粗便秘而腫脹者為陽水黑牽牛四兩炒大黃二兩酒浸廿
遂麵裏煨羌花醋炒大戟麵裏煨青皮炒橘紅各一兩木香五錢輕粉一

錢水丸○牽牛大黃遂戟羌花行水厲藥木香青陳
以行氣少加輕粉以透經絡然非實證不可輕投

陽水 疏鑿飲 檳榔及商陸。苓皮大腹同椒目。赤豆羌瀉木通。煎益薑

皮陽水服。

檳榔商陸茯苓皮大腹皮椒目赤小豆秦羌羌活澤瀉木通等分加薑皮棗煎○羌
羌散濕上升通瀉瀉濕下降苓腹薑皮行水於皮膚椒檳豆商攻水于腹裏亦上下

表裏分
消之意

虛寒陰水 實脾飲 氏 苓朮與木瓜。甘草木香大腹加。草薶附薑兼厚朴。

虛寒陰水效堪誇。

便利不渴而腫脹者為陰水茯苓朮朮土炒木瓜甘草木香大腹子草薶
慈煨附子炮黑薑厚朴炒加薑棗煎○脾虛補以苓朮甘草脾寒溫以慈

附黑薑脾濕利以茯苓大腹小導以厚朴木香又土之不足由于木之有餘木瓜木香皆能
平肝瀉木使木不尅土而脾和則土能制水而脾實矣證曰濕勝則地泥實土正所以制水也

脾虛膚腫 五皮飲澹用五般皮。陳茯苓桑大腹奇。陳皮茯苓皮薑皮 或用五

加皮易桑白。脾虛膚脹此方司。

脾不能為胃行其津液故水腫半身以上宜汗半身以下宜利小便此方于瀉水之中仍寓調補之意皆用皮

者水溢皮膚以皮行皮也

濕氣在表

羌活勝濕

湯局方

羌獨芎。甘蔓藁本與防風。濕氣在表頭腰重。

痛發汗升陽有異功。風能勝濕升能降。氣升則水自降不與行水滲濕同。濕氣在表宜汗又風

能勝濕故用風藥上升使濕從汗散羌活獨活各一錢川芎甘草炙藁本防風各五分薏荊子三分如有寒濕加附子防己若除獨活芎蔓草。除若湯

升麻蒼朮充。除獨活川芎蔓荊甘草加升麻蒼朮名羌活除濕湯治風濕身痛

示腫瀉泄。大橘皮湯治濕熱。五苓六一二方綴。陳皮木香檳榔增。能消

水腫及瀉泄。用五苓散赤茯苓一錢猪苓澤瀉白朮桂各五分用六一散滑石六錢甘草一錢加陳皮錢半木香檳榔各三分每服五錢加薑煎○小水併入大腸致小腸不利

而大便泄瀉二散皆行水瀉熱之藥加檳榔峻下陳皮木香理氣以利小便而實大便也水腫亦濕熱為病故皆治之

黃疸。茵陳蒿湯仲景治疸黃。陰陽寒熱細推詳。陽黃大黃梔子入。瘵熱在裏口渴便閉

身如橘色脈沉實者為陽黃茵陳六兩大黃二兩酒浸已子十四枚○茵陳發汗利水能泄太陰明之熱濕梔子導濕熱出小便大黃導濕熱出大便陰黃附子與乾薑

以茵陳為主如寒熱陰黃色暗便溏者亦有不用茵陳者。仲景柏皮梔子湯。黃柏

梔子五十枚甘草一兩按陽黃胃熱者宜下之如發熱者則勢外出而不內入不必汗下
惟用梔子黃柏清熱利濕以和解之若小便利色白無熱者仲景作虛勞治用小建中湯

淋痛尿血。八正散。木通與車前。扁蓄大黃滑石研。甘草梢瞿麥兼梔子

煎加燈草痛淋。一方有木香治濕熱下注口渴咽乾淋痛尿血小腹急滿木通燈草瞿麥
降心火入小腸車前清肝火入膀胱梔子涼三焦鬱火大黃滑石瀉火利

水之捷藥扁蓄利便通淋草梢入莖止痛雖治
下焦而不專於治下必三焦通利水乃下行

腎淋白濁。草薺分清飲。石菖蒲。甘草梢烏藥益智俱。或益茯苓
甘草梢減半餘藥等分

鹽煎服。少許。通心固腎濁精驅。遺精白濁○草薺能泄厥陰陽明濕熱去濁分清烏藥
疏逆氣而止便數益智固脾胃而開鬱結石菖蒲開九

竅而通心甘草梢達賢莖而止痛濕熱去而心腎
通則氣化行而淋濁止矣以此疎泄為禁止者也。縮泉丸。益智同烏藥。等山藥為糊丸

便數需。鹽湯下治
便數遺尿

濕氣瘡瘍。當歸拈痛。羌防升。猪澤茵陳苓葛芎。二朮苦參知母草。

瘡瘍濕熱服皆應。

當歸酒洗羌活防風升麻猪苓澤瀉茵陳黃芩酒炒葛根蒼朮白朮土炒苦參知母並酒炒甘草炙○羌活道開節防風散留黃苦參高芥茵陳知

母以泄濕熱當歸以和氣血升葛助陽而升清芥瀉瀉濕而降濁參甘二朮補正國中使苦寒不傷胃疎泄不損氣也劉宗厚曰此方東垣本治濕熱脚氣後人用治諸瘡甚驗

潤燥之劑十三首附方二

虛勞肺痰

炙甘草湯仲景

參薤桂

麥冬生地大麻仁。大棗阿膠加酒服。虛

勞筋痿效如神。

甘草灸人參生薑桂枝各三兩阿膠蛤粉炒二兩生地一斤麥冬麻仁研各半斤棗十二枚水酒各半煎仲景治傷寒厥結代心動悸及肺痿喘多千金醫用

治虛勞實經用治呃逆外臺用治肺痿○參草冬益氣復脈同膠生地補血養陰聚麻潤滑以緩脾胃養桂辛溫以散餘邪

血虛風燥

滋燥養榮湯

兩地黃○芩甘歸芍及羌防。

羌防風藥潤劑 瓜枯燻燥兼風

秘。火燦金傷血液亡。

當歸酒洗二錢生地熟地白芍炒黃芩酒炒秦莖各一錢防風甘草各五分

內燥血枯

活血潤燥生津飲。

丹溪

二冬熟地兼梧蘗。桃仁紅花及歸芍。利

便通幽善澤枯。

熟地當歸甘芍各一錢天冬麥冬各八分桃仁研紅花各五分

反胃噎膈

韭汁牛乳飲丹

反胃滋。養榮散痰潤腸奇。五汁安中

飲丹 養榮散

藕。三般加入用隨宜。

牛乳半斤韭菜汁少許滾湯頓服名韭汁牛乳飲牛乳六分韭汁

火虛且枯或有素血寒痰濕滯胃口不食入反出也牛乳潤燥養血為若韭汁藕汁
消痰益胃汁溫胃散痰梨汁消痰降火審證用之加陳酒亦佳以酒乃米汁也

潤腸丸

身

垣用歸尾羌。桃仁麻仁及大黃。

歸尾羌活大黃各五錢桃仁大麻仁各一兩蜜
丸○歸尾栲仁潤燥活血羌活散火搜風大黃

破結通幽麻
仁滑腸和緩或加芫防皂角子。

風濕加秦芫防風皂角子燒存性研
皂子得濕則滑善通便芫防治風

風秘血秘善通腸

。風燥血燥
致大腸秘

噎塞便秘

通幽湯

東垣

中二地俱。桃仁紅花歸草濡。升麻升清以降濁。

清

不升則陰濁不降故大便不通生地熟地各五
分桃仁研紅花當歸身甘草炙升麻各一錢

噎塞便閉此方需。有加麻仁大黃者。

當歸潤腸湯名殊。

上藥皆潤燥通腸

風秘腸風

搜風順氣丸

大黃蒸。郁李麻仁山藥增。防獨車前及檳榔。兔

絲牛膝山茱仍。中風風秘及氣秘。腸風下血總堪憑。大黃九蒸九晒五兩
大麻仁郁李仁去皮

山藥酒蒸車前子牛膝酒蒸山茱肉各三兩兔絲子酒浸防風獨活檳榔枳殼炒各一兩蜜丸○防
風潤腎搜風檳榔枳殼氣破滯大黃經蒸晒則性稍和緩同二仁滑利潤燥通幽牛膝車前下行利水加

山藥山茱兔絲固本益
陽不使過於攻散也

胃熱消渴 消渴方丹中花粉連。藕汁生薑汁牛乳研。粉連研末或加薑汁蜜

為膏服。瀉火生津益血痊。黃連瀉心火生地滋腎水藕汁
益胃花粉生津牛乳潤燥益血

腎消 白茯苓丸治腎消。花粉黃連葶藶調。一參熟地覆盆子。石斛蛇床

臙腫要。音皮鷓鴣臙皮也茯苓花粉黃連葶藶人參元參熟地黃覆盆子各一兩石斛蛇床子
各七錢半雞臙皮三十具微炒蜜丸磁石湯下○黃連降心火石斛平胃熱熱地元參

生腎水覆盆蛇床固腎精人參補氣花粉生津茯苓交心
腎葶藶利濕熱臙腫治膈消磁石也黑馬水假之入腎也

解毒治腎消 猪腎薺萆金湯干參茯神。知芩葛草石膏因。磁石天花同黑豆

。強中消渴此方珍。下消之證莖長與盛不交精出名強中綠服那術熱藥而毒盛也猪腎
一具大豆一升薺萆人參石膏各三兩磁石綿裹茯神知母黃芩葛根

甘草花粉各二兩先煮豆腎去滓以藥分三服○知本石膏以瀉邪火人參甘草以固正氣葛根花粉以生津薤菴黑豆最能解毒磁石豬腎引之入腎也

消渴煩躁。地黃飲子易簡參耆草。二地二冬。枇杷參。澤瀉枳實疏二府。躁

煩消渴血枯含。○人參黃耆甘草炙天冬麥冬生地枇杷葉蜜炙石斛澤瀉枳實麩炒每服二錢○參耆甘草以補其氣氣能生水二地二冬以潤其燥潤能益血石斛平胃

杷補氣澤瀉瀉膀胱之火枳實瀉大腸之滯使二府清則心肺二藏之氣得以下降而渴自止

氣乏聲嘶。酥蜜膏酒千金用飴糖。二汁百部及生薑。杏棗補脾兼潤肺。聲

嘶氣憊酒溫嘗。○酥蜜飴糖棗肉杏仁細研百部汁生薑汁共煎一炊久如膏溫酒細細嚥服之

燥金受濕熱之邪。清燥湯東垣二朮與黃耆。參苓連柏草陳皮。豬澤升柴五

味麩。麥冬歸地痿方推。○治肺金受濕熱之邪痿臂喘促口乾便赤黃耆錢半蒼朮炒一錢白朮炒陳皮澤瀉各五分人參茯苓升麻各三分當歸酒洗

生地麥冬甘草炙神麩炒黃柏酒炒猪苓各二分柴胡黃連炒各一分五味丸粒煎○肺為辛金主氣大腸為庚金主津燥金受濕熱之邪則寒水生化之源絕而痿躄渴諸證作矣參耆苓朮陳草補土以生金麥味保金而生水連柏歸地瀉火滋陰猪澤升柴升清降濁則燥金肅清水出高原而諸病平矣此方不盡潤藥因有清燥二字故附記于此然東垣所云清燥者蓋指肺與大腸為燥金也

瀉火之劑二十七首附方九

三焦實熱 黃連解毒湯毒即大熱也 四味。黃柏黃芩梔子備。分等躁狂大熱嘔不

眠。吐血血 斑黃均可使。若云三黃石膏湯。再加麻黃及淡豉。見

此為傷寒溫毒盛。三焦表裏相兼治。梔子金花丸 加大黃。黃芩黃柏黃連梔子大黃

水潤腸瀉熱真堪倚。

惡寒痞滿 附子瀉心湯 用三黃。寒加熱藥以維陽。本連各一兩大黃二兩附子一枚炮急三黃重搗其

兩故加 痞乃熱邪寒藥治。傷寒痞滿從外之內滿在胸而不在胃多屬熱邪故宜苦瀉若雜病之痞從內之外又宜辛散 惡寒加附始

相當 心湯心下痞而復惡寒汗出者附子瀉心湯 大黃附子湯同意。溫藥下之妙異

常。 大黃細辛各二兩附子一枚炮令置陽中 有陰宜以溫藥下其寒後入罕識其旨

下虛痞 半夏瀉心湯 黃連芩。乾薑甘草與人參。大棗和之治虛痞。

半夏半斤黃連一兩乾薑黃芩甘草炙人參各三兩大棗十二枚治傷寒下之早胸滿而不痛者為痞身寒而嘔飲食不下非柴胡證凡用瀉心者多屬誤下非傳經熱邪○否而不泰為痞瀉心者必以苦故用芩連散痞者必以辛故用薑夏欲交陰陽通上下者必和其中故用參甘大棗

胃實熱 白虎湯仲用石膏煨。知母甘草粳米陪。石膏一斤知母六兩亦有加入

人參者。名人參白虎湯燥煩熱渴舌生胎。白虎西方金神此方清肺金而瀉胃火故名然必實

類白虎湯證誤投之不可救也按白虎證脈洪大有力類白虎證脈大而虛以此為辨又當觀小便赤者為內熱白者為內寒也

脾胃虛熱 竹葉石膏湯仲人參。麥冬半夏與同林。甘草生薑兼粳米。暑

煩熱渴脈虛尋。竹葉二把石膏一斤人參三兩甘草炙三兩麥冬一斤半夏粳米各半升加薑煎治傷寒解後嘔渴少氣○竹葉石膏之辛寒以散餘熱麥甘粳麥之甘平以

補虛生津豈夏之辛溫以豁痰止嘔

火鬱 升陽散火湯東垣葛升柴。羌獨防風參芍儕。生炙二草加薑棗。陽經

火鬱發之佳。柴胡八錢葛根升麻羌活獨活人參白芍各五錢防風二錢半炙甘草三錢生甘草二錢每服五錢加薑棗煎○火發多在肝胆之經以木盛能生火而二經俱挾

相火故以柴胡散肝為君羌防以發太陽之火升葛以發陽明之火獨活發少陰之火加參甘者補土以泄火加白芍瀉肝而益脾且令散中有補發中有收也

膈上實熱

涼膈方

散局 硝黃梔子翹。黃芩甘草薄荷饒。竹葉蜜煎療膈上。

葉生竹上故治上焦

中焦燥實服之消。

連翹四兩大黃酒浸芒硝甘草各二兩梔子炒黑黃芩酒炒薄荷各一兩為末每服三錢加竹葉生蜜煎〇連翹薄荷竹葉以

升散於上梔芩硝黃以推瀉於下使上升下行而膈自清矣加甘草生蜜者病在膈甘以緩之也潘思敬曰仲景調胃承氣湯後人加味一變而為涼膈散再變而為防風通聖散

胃火淋渴

清心蓮子方

飲局 石蓮參。地骨柴胡赤茯苓。耆草麥冬車前子。

躁煩消渴及崩淋。

石蓮人參柴胡赤茯苓黃耆各三錢黃芩酒炒地骨皮麥冬車前子甘草各二錢〇參者甘草補虛瀉火柴胡地骨退熱平肝黃芩麥冬清熱上

焦赤茯苓前利濕下部中以石蓮交其心腎也

胃中濕熱

甘露方

飲局 兩地生熟與茵陳。苓枳枇杷黃芩枳殼石斛倫。甘草二冬

天平等胃熱。

等分煎〇二地二冬甘草石斛平胃腎之虛熱清而桂苓犀角可加均。加茯苓兼補黃芩茵陳折熱而去濕枳殼枇杷抑氣而降火

桂名桂苓甘露飲本事方加犀角通治胃中濕熱口瘡吐衄

胃火牙痛 清胃散東垣用升麻黃連。當歸生地牡丹全。或益石膏平胃熱。

口瘡 吐衄白血 及牙宣。齒根出血○黃連瀉心火亦瀉脾火丹皮生地平血熱當歸引血歸經石薤瀉陽明之火升麻升陽明之清昂按古人治血多用升麻然

上升之藥終不可輕施

胃熱口瘡 瀉黃散 甘草與防風。石膏梔子藿香充。炒香蜜酒調和服。胃

熱口瘡並見功。防風四兩甘草二兩黑梔子一兩藿香七錢石膏五錢○梔子石膏瀉肺胃之火藿香辟惡調中甘草補脾瀉熱重用防風者能發脾中伏火又能於土中瀉

也本

脾胃鬱火 錢乙瀉黃散 升防芷。芩夏石斛同甘枳。亦治胃熱及口瘡。火

鬱發之斯為美。升麻防風白芷各錢半黃芩枳殼半夏石斛各一錢甘草七分○升防白芷以散胃火芩夏枳殼以清熱開鬱石斛甘草以平胃調中

肺火 瀉白散錢乙桑皮地骨皮。甘草粳米四般宜。桑白皮地骨皮各一錢甘草五分粳米百粒○桑皮瀉肺火骨退虛

熱甘草補土生金粳米和中清肺參茯知苓皆可入。人參茯苓知母黃芩聽加名加減瀉白散 肺炎喘嗽此方

施。

肝火 瀉青丸乙錢用龍胆梔。下行瀉火大黃養。羌防升上芎歸潤。火鬱肝

經用此宜。

龍胆草酒洗大行酒洗羌防升上芎歸酒洗等分蜜丸竹葉湯下○羌防引火上升梔加大黃抑火下降芎歸養肝血而潤肝燥

肝經濕火

龍膽瀉肝

湯局

梔芩柴。生地車前澤瀉借。木通甘草當歸合。

肝經濕熱力能排。

胆草酒炒梔子酒炒黃芩酒炒生地酒炒柴胡車前子澤瀉木通當歸甘草生用○龍胆柴胡瀉肝胆之火黃芩梔子瀉肺與三焦之熱以佐之澤

瀉瀉腎之濕木通車前瀉小腸膀胱之濕以佐之歸地養血補肝甘草緩中益胃不令苦寒過于泄下也

肝火

當歸龍薈

丸宣

用四黃。

龍膽蘆薈木麝香。黑梔青黛薑湯下。一切

肝火盡能攘。

當歸酒洗胆草酒洗梔子炒黑黃連酒炒黃柏酒炒黃芩酒炒各一兩大黃酒浸青黛水飛蘆薈各五錢木香二錢麝香五分蜜丸薑湯下○肝木為生火之原諸

經之火因之而起故以青黛龍胆入本經而直折之而以大黃芩連梔柏通平上下三焦之火也蘆薈大苦大寒氣躁入肝恐諸藥過於寒瀉故用當歸養血補肝用薑湯辛溫為引加木麝香取其行氣通

竅也然非實熱不可輕投

肝火 左金丸丹 柴連六一丸。肝經火鬱吐吞酸。黃連六兩薑汁炒吳茱萸一兩鹽湯泡亦名柴連丸○肝實則作痛

或嘔酸心為肝子故用黃連瀉心清火使火不剋金則金能制木而肝平矣吳茱萸能入厥陰行氣解鬱又能引熱下行故以為反佐寒者正治熱者反治使之相濟以立功也左金者使肺右之金得行于左而不平再加芍藥名戊己丸。熱瀉熱痢服之安。戊為胃土己為脾土加芍藥代肝安脾使木不剋土連附六一

湯 治胃痛。寒因熱用理一般。黃連六兩附子一兩亦反佐也

淋小腸火 道赤散錢乙 生地與木通。甘草稍竹葉四般攻。口糜淋痛小腸火

。引熱同歸小便中。等分煎○生地涼心血竹葉清心氣木通瀉心火入小腸草梢達腎莖而止痛

骨蒸勞熱 清骨散用銀柴胡。胡連秦艽鼈甲符。地骨青蒿知母草。骨蒸

勞熱保無虞。銀柴胡錢半胡黃連秦艽鼈甲壹便次地骨皮青蒿知母各一錢甘草五分○地骨胡連知母以平內熱柴胡青蒿秦艽以散表邪鼈甲引諸藥入骨而補陰甘

草和諸藥而瀉火

大頭天行 普濟消毒飲東垣 芩連鼠。玄參甘桔藍根侶。升柴馬勃連翹陳。

蠶蠶薄荷為末咀。

黃芩酒炒黃連酒炒各五錢玄參甘草生用桔梗柴胡陳皮去白各二錢鼠粘子板藍根馬勃連翹薄荷各一錢蠶升麻各七分末服或蜜丸

化或加入參及大黃。

虛者加入參便秘加大黃大頭天行力能禦。大頭天行親戚不相訪問染者多不救。原文曰芩連瀉心肺

之火為君玄參陳皮甘草瀉火補肺為臣連翹薄荷鼠粘藍根蠶蠶馬勃散散陽明少陽二經之陽桔梗為舟楫不令下行為載李東垣曰此邪熱客心肺之間上攻頭面為腫以承氣瀉之是為誅伐無過遂處此方全活甚衆

雷頭風 清震湯河治雷頭風。升麻蒼朮兩般充。二味局方名升麻湯荷葉一枚升胃氣

邪從上散不傳中。頭面腫痛痙名雷頭風一云頭如雷鳴東垣曰邪在三陽不可過用寒藥重劑誅伐無過處清震湯升陽解毒蓋取震為雷之義也

肺癰咳吐膿血 桔梗湯濟生中用防己。桑皮貝母栝婁子。甘枳當歸薏杏仁

。黃耆百合薑煎此。桔梗防己瓜蒌貝母當歸枳殼杏仁桑皮各五分黃耆七分杏仁百合甘草各三分薑煎肺癰吐膿或咽乾。

便秘大黃可加使。一方有人參無枳殼。黃耆補肺氣杏仁薏仁桑皮百合補肺清火栝婁貝母潤肺除痰甘桔隨提氣血利膈散寒防己散腫除風瀉濕清熱當歸

以和其血枳殼以利其氣

肺火咯血 清咽太平丸 薄荷芎。柿霜甘桔及防風。犀角蜜丸治腦熱。早

問咯血頰常紅。兩頰肺肝之部。兩寅卯木旺之時木盛生火來尅肺金薄荷十兩川芎柿霜

使之搜肝瀉肺薄荷理血散熱清咽除蒸犀角涼心平肝柿霜生津潤肺甘草緩炎上之火勢桔柑載諸藥而上浮

胃熱發斑 消斑青黛飲陶節處 梔連犀。知母元參生地齊。石膏柴胡人參 甘草

。便實參去大黃躋。去人參 加大黃 薑棗煎加一匙醋。陽邪裏實此方稽。發斑

胃熱亦諸經之火有以助之青黛黃連清肝火梔子清心肺之火元參知母生地清腎火犀角石膏清胃火引以柴胡使達肌表使以薑棗以和營衛熱毒入裏亦由胃虛故以人參甘草益胃加醋者酸以

收之也

濕熱鼻癰 辛夷散嚴氏裏藁 本防風。白芷升麻與木通。芎細川芎 甘草茶調

服。鼻生癰肉此方攻。肺經熱上蒸於腦入鼻而生癰肉猶濕地得熱而生芝菌也諸藥

本能天巔頂燥熱法風細辛散熱通竅川芎散鬱疎肝木通茶清瀉火下行甘草甘平緩其辛散也

風熱鼻淵

蒼耳散

陳無擇

中用薄荷。辛夷白芷四般利。蔥茶調服疎肝肺。

清升濁降鼻淵瘥。

蒼耳子炒二錢半薄荷辛夷各五錢白芷一兩未服○凡頭面之疾皆由清陽不升濁陰逆上所致濁氣上騰于腦則鼻流濁涕為淵數藥升陽通

竅除濕散風故治之也

驚悸夢遺

妙香

散王荆公

山藥與參耆。甘桔二茯遠志隨。少佐辰砂木香麝。

驚悸鬱結夢中遺。

山藥二兩乳汁炒人參耆者蜜炙茯苓茯神遠志炒各一兩桔梗甘草各三錢辰砂二錢木香二錢半麝香一錢為末每服二錢酒下○山藥固精

參耆補氣遠志二茯清心寧神桔梗木香疎肝清肺丹麝鎮心散鬱辟邪甘草補中協和諸藥使精氣神相依邪火自退不用固濇之藥為洩遺良劑以其安神利氣故亦治驚悸鬱結

除痰之劑十首附方五

一切痰飲 二陳湯局用半夏陳。益以茯苓甘草臣。

半夏薑製二錢陳皮去白茯苓各一錢甘草五分加薑煎

利氣調中兼去濕。一切痰飲此為珍。

陳皮利氣甘草和中苓夏除濕順氣濕除痰飲自散導痰湯內加星

枳。頑痰膠固力能馴。

加胆星以助半夏加枳實以成衝腦倒壁之功若加竹茹與枳實。湯名溫膽可

寧神。二陳湯加竹茹枳實名潤下丸丹溪僅陳皮草。利氣去痰妙絕倫。八兩鹽五

錢水浸洗甘草二兩蜜炙蒸餅糊丸薑湯下或將陳皮鹽水煮晒同甘草為末名二腎散不可多服恐損元氣

中風痰證 滌痰湯嚴氏用半夏星。甘草橘紅參茯苓。竹茹菖蒲兼枳實。痰

迷舌強服之醒。治中風痰迷心竅舌強不能言半夏薑製胆星各二錢半橘紅枳實茯苓各三錢人參菖蒲各一錢竹茹七分甘草五分加薑煎此即遵痰湯加入人參扶正也

蒲開察竹茹清金

風痰驚悸 青州白丸星夏并。白附川烏俱用生。晒露糊丸薑薄引。風痰

驚痰小兒癱。半夏水浸生衣七兩南星白附子各二兩川烏去皮臍五錢四味俱生用為末袋盛水搗出粉再搗再搗以盡為度磁盆盛貯日晒夜露春五夏三秋七各十日糯

米糊丸薑湯下癱瘓酒下驚風薄荷湯下○痰之生也由於風寒濕星夏辛溫祛痰燥濕烏附辛熱散寒逐風浸而暴之殺其毒也

順氣行痰 清氣化痰丸 星夏橘。杏仁枳實栝樓實。芩苓薑汁為糊丸。氣

順火消痰自失。半夏薑製胆星各兩半橘紅枳實麩炒杏仁去皮尖栝樓仁去油黃芩酒炒茯苓各一兩薑製糊丸淡薑湯下○氣能發火火能生痰陳杏降逆氣枳實破滯

氣痞恬平熱氣星夏燥濕氣茯苓行水氣水濕火熱皆生痰之本也故化水必以清氣為先

頑痰怪病

順氣消食化痰丸。

瑞竹堂

青皮星夏葶子蘇攢。麩麥山查葛杏附

。蒸餅為糊薑汁搏。

半夏薑製胆星各一斤陳皮去白青皮蘇子洗香水炒萊菔子生薑麥芽炒神麩炒山查炒葛根杏仁去皮尖炒香附醋炒各一兩薑汁和蒸

餅為糊丸○痰由濕生星夏燥濕痰因氣升蘇子杏仁降氣痰因氣滯青陳香附導滯痰生于酒食麩葛解酒查麥消食濕去食消則痰不生氣順則喘滿自止矣

咳嗽多痰

滾痰丸

王隱君

用青礬石。大黃黃芩沉香。百病多因痰作祟。

頑痰怪證力能匡。

青礬石一兩用焰硝一兩同入瓦罐鹽泥固濟煨至石色如金為度大黃酒蒸黃芩酒洗各八兩沉香五錢為末水丸薑湯下量虛實服○礬石懷

悍能攻陳積伏匿之痰大黃葶熱實以開下行之路黃芩涼心肺以平上僭之火沉香能升降諸氣以導諸藥為使然非實體不可輕投

小腸

金沸草散

活人

前胡辛。半夏荆甘赤茯苓。煎加薑棗除痰嗽。肺

感風寒頭目擊。

旋覆花前胡細辛各一錢半夏五分荆芥錢半甘草炙三分赤茯苓六分○風熱土壅故生痰作嗽荆芥發汗散風前胡旋覆消痰降氣半夏燥痰散逆甘草

發散緩中細辛溫經茯苓利濕用赤者入血分而瀉丙丁也

局方

金沸草散不用細辛茯苓。加入麻黃赤芍均。同治

火心爲丁痰厥頭痛火。半夏天麻白朮湯。東參耆橘柏及乾薑。苓瀉麥芽。

蒼朮麩。太陰痰厥頭痛良。半夏麥芽各錢半白朮神麩炒各一錢人參黃耆陳皮蒼朮

升陽苓瀉瀉熱導水麩麥化滯助脾乾薑以滌中寒黃柏以瀉在泉少火也。

痰瘧。常山飲局。中知母取。烏梅草菓檳榔聚。薑棗酒水煎露之。刮痰截

瘧功堪詡。常山燒酒炒二錢知母貝母草菓煨檳榔各一錢烏梅二個一方加穿山甲甘草

不致交爭矣常山吐痰行水檳榔下氣破積貝母清火散痰烏梅斂陰退熱須用在發散表邪及提出陽分之後爲宜。

刮痰截瘧。截瘧七寶。飲易。常山菓。檳榔朴草青陳夥。水酒合煎露一霄。

陽經實瘧服之安。常山酒炒草菓煨檳榔厚朴青皮陳皮甘草等分水酒各半煎露之發日

菓消膏梁之痰加甘草入胃佐常山以引吐也。

收瀼之劑九首附方二

湯頭歌訣

夢遺精滑 金鎖固精丸 芡蓮鬚。龍骨茯苓牡蠣需。連粉為糊丸鹽酒下。

滑精秘氣滑遺無。

芡實蒸蓮鬚沙苑蒺藜炒各二兩龍骨酥炙牡蠣鹽水煮一日夜煨粉各一兩蓮子粉為糊丸鹽湯或酒下○芡實固精補脾牡蠣滑精清熱蓮

子交通心腎養藜補腎益精龍骨連鬚皆固精收脫之品

遺精消渴 伏菟丹局療精滑脫。菴苓五味石蓮末。酒煮山藥為糊丸。亦

治強中及消渴。

強中者下消之人莖長興盛不交精出也菴絲子十兩酒浸五味子八兩白茯苓石蓮各三兩山藥六兩酒煮為糊丸漏精鹽湯下赤濁燈心湯下白濁茯苓

湯下消渴米飲下○菴絲強陰益陽五味滑精生水石蓮清心止濁山藥利濕固脾茯苓甘淡而滲於補陰正中能泄腎邪也

渴熱精濁 治濁固本丸 蓮蕊鬚。砂仁連柏一二苓俱。益智半夏同甘草。清

熱利濕固兼驅。

固本之中兼利濕熱遠鬚黃連沙各二兩砂仁黃柏益智仁半夏薑製茯苓各一兩猪苓二兩甘草炙三錢○精濁多由濕熱與痰連柏清熱二苓利濕

半夏除痰濕熱多由鬱滯砂智利氣兼能固腎強脾甘草補土和中蓮鬚則瀉以止脫也

寒濁脫肛 訶子散東垣用治寒瀉。炮薑粟殼橘紅也。

訶子煨七分炮薑六分粟殼去蒂蜜炙橘紅各五分末

服○果穀固腎瀉腸訶子收脫住河間散訶子木香訶草連。仍用朮芍煎湯下。訶子一兩半生

瀉炮薑逐冷輔陽陳皮升陽調氣散半煨木香五錢黃連三錢甘草二錢為末煎白朮散白芍湯調服久瀉以此止之不止加厚朴二錢

者。

便數健忘數類也欠短也 桑螵蛸散應宗治便數。參苓龍骨同龜殼。菖蒲

遠志及當歸。補腎寧心健忘覺。桑螵蛸鹽水炒人參茯苓一用茯神龍骨煨龜板酥炙菖蒲鹽炒遠志當歸等分為末臨臥二錢人參湯

下治小便數而欠補心虛安神○虛則便數故以人參螵蛸補之熱則便欠故以龜板滋之當歸潤之菖蒲茯苓遠志並能清心熱而通心腎使心職行則小腸之府甯也

虛寒脫肛久痢 真人養藏湯羅訶粟殼。肉蔻當歸桂木香。朮芍參甘為瀉

劑。脫肛久痢早煎嘗。訶子麴裏煨一兩二錢罌粟殼去蒂蜜炙三兩六錢肉豆蔻麴裏煨五錢當歸白朮炒白芍酒浸人參各六錢木香二兩四錢桂八錢生

甘草一兩八錢每服四錢寒甚加附子一方無當歸一方有乾糞○脫肛由于虛寒參朮甘草以補其虛官桂豈慈以溫其寒木香調氣當歸和血芍藥酸以收斂訶子粟殼瀉以止脫

目汗盜汗 當歸六黃湯治汗出。醒而汗出曰自汗者柏苓連生熟地。當歸黃柏黃連寐而汗出曰盜汗者柏苓連生熟地。連黃苓二地

等分黃瀉火固表復滋陰。汗由陰歸地以滋其陰汗由火擾黃芩柏加麻黃根功更

者加倍李時珍曰麻黃根走表能引諸藥至衛分而固腠理或云此藥大苦寒。胃弱氣虛在所忌。

腎虛盜汗 柏子仁九人參朮。麥麩牡蠣麻黃根。再加半夏五味子。陰虛

盜汗棗丸吞。柏子仁炒研去油一兩入參白朮牡蠣煨麻黃根半夏五味各一兩麥麩五錢棗

肉九米飲下○心血虛則臥而汗出柏仁養心甯神牡蠣麥麩涼心收脫五味斂

汗汗半夏燥濕麻黃根專走肌表引參朮以固衛氣陽虛自汗 陽虛自汗牡蠣散。黃耆浮麥麻黃根。牡蠣煨研黃耆麻黃根各一錢浮

汗黃耆麻黃根走肌表而固衛撲法芎藭牡蠣粉。撲汗法白朮棗本川芎各二錢半糯米粉半兩為末袋盛週身撲之或將龍骨牡蠣捫

龍骨牡蠣為未合糯米粉等分亦可撲汗

殺蟲之劑二首

寒厥 烏梅九仲景用細辛桂。人參附子椒薑繼。黃連黃柏及當歸。溫藏安

虻寒厥劑。

烏梅三百個醋浸蒸細辛桂枝附子炮人參黃柏各六兩黃連一斤乾薑十兩川椒去汗當歸各四兩治傷寒厥陰證寒厥吐虻○蟲得酸則伏故用烏梅得苦則安故用連相虻因寒而動故用附子椒薑當歸補肝人參補脾細辛發腎邪桂枝散表風程郊倩曰名曰安虻實是安故仲景云併主下痢

腸胃諸蟲

化蟲丸

鶴虱及使君。檳榔蕪荑苦楝羣。白礬胡粉糊紫脛。腸

胃諸蟲永絕氛。

鶴虱檳榔苦楝根東引者胡粉炒各一兩使君子蕪荑各五錢枯礬一錢半麩粉丸亦可末服○數藥皆殺蟲之品單服尙可治之彙萃爲丸而盡焉有不死

呼者

癰瘍之劑六首附方二

一切癰疽

真人活命飲

金銀花。防芷歸陳草節加。貝母天花兼乳沒。穿

山角刺酒煎嘉。

金銀花二錢當歸酒洗陳皮去白各錢半防風七分白芷甘草節貝母天花粉乳香各一錢沒藥五分二味另研候藥熟下皂角刺五分穿山甲三大片剉蛤

粉炒去粉用好酒煎服恣飲盡醉○忍冬甘草散熱解毒癰瘡聖藥花粉貝母清痰降火防風白芷燥濕排膿當歸和血陳皮行氣乳香託裏護心沒藥散瘀消腫山甲角刺透經絡而積壅加酒以行藥勢

一切癰疽能潰散。

已成者潰潰後忌服用毋差。大黃便實可加便。鐵器酸未成者散

物勿沾牙。

金銀花酒加甘草。奇瘍惡毒皆能保。

金銀花五兩生者更佳甘草一兩酒水煎一日一夜服護膜須用蠟藥

丸。

黃蠟二兩白礬一兩溶化爲丸酒服十九加至百丸則有力使毒不攻心一方加雄黃名雄禁丸蛇咬尤宜服之

一方均是瘍科寶。

解裏散表

託裏十補散即局方十宜散

參耆芍。歸桂白芷及防風。甘桔厚朴酒調服

。癰瘍脈弱頰之充。

人參黃耆當歸各二錢川芎桂心白芷防風甘草桔梗厚朴各一錢熟酒調服○參耆補氣當歸和血甘草解毒防風發表厚朴散滿桂芷桔

梗排膿表裏氣血交治共成內託之功

寒瘍內陷

託裏溫中

湯孫彥和

薑附羌。茵木下沉共四香。陳皮益智兼甘草。

寒瘍內陷嘔瀉良。

附子炮四錢炮薑羌活各三錢木香錢半茵香丁香沉香益智仁陳皮甘草各二錢加薑五片煎治瘡癰變寒內陷心痞便溏嘔呃昏瞶○瘍塞內

陷故用薑附溫中助陽羌活通關節炙草益脾元益智丁沉以止呃進食尚木陳皮以散滿除痞此孫彥和治王伯祿臂瘍盛夏用此亦捨時從證之變法也

內託止痛

託裏定痛湯

四物兼。

當歸地黃川芎白芍

乳香沒藥桂心添。再加蜜炒嬰粟

發潰瘍虛痛去如拈。

醫藥殺收瀉能止諸痛桂心四物活血託裏充肌乳香能引毒氣外出不致內攻與沒藥並能消腫止痛

消堅散腫

散腫潰堅

湯東垣

知柏連。

化粉黃芩龍膽宜。升柴翹葛兼甘桔。

歸芍稜莪昆布全。

黃芩八錢半酒炒半生用知母黃柏酒炒花粉胆草酒炒桔梗昆布各五錢柴胡四錢升麻連翹甘草炙三稜酒炒莪朮酒洗炒各三錢葛根歸尾

酒洗白芍酒炒各二錢黃連二錢每服五六錢先浸後煎○連翹升葛解毒升陽甘桔花粉排膿利膈歸芍活血昆布散瘀稜莪破血行氣龍胆知柏連大瀉諸經之火也

經產之劑

十二首附方二十二○婦人諸病與男子同惟行經姙娠則不可以例治故立經產一門

姙娠傷寒

海藏妊娠六合湯。

四物為君妙義長。

當歸地黃川芎白芍

傷寒表虛地骨桂

。表虛自汗發熱惡寒頭痛脈浮四物四兩加桂枝地骨皮各七錢二藥解肌實表名表虛六合湯

表實細辛兼麻黃。

頭痛身熱無汗脈緊四物四兩加細辛麻

黃各五錢二藥溫經發汗名表實六合湯

少陽柴胡黃芩入。

寒熱脅痛心煩善嘔口苦脈弦為少陽證加柴胡解表黃芩清裏名柴胡六合湯

陽明石

膏知母臧。

大熱煩渴脈大而長為陽明證加白虎湯清肺瀉胃名石膏六合湯

小便不利加苓瀉。

加茯苓澤瀉利水不名茯苓六合湯

眠黃芩梔子良。

汗下後不得眠加黃芩梔子養陰除煩名梔子六合湯

風濕防風與蒼朮。

兼風兼濕肢節煩痛心熱脈浮加防風搜

風蒼朮燥濕名 胎動血漏名膠艾。傷寒汗下後動胎漏血加阿膠 虛痞朴實頗相當。

風濕六合湯 陶滿痞脹加厚朴枳實炒 脈沉寒厥亦桂附。身冷拘急腹痛脈沉亦有不得已而加 便秘散滿消痞名朴實六合湯 附子肉桂散寒回陽者名附子六合湯

畜血桃仁黃。大便認小便赤脈實數或膀胱畜血亦有 安胎養血先為主。餘因各

證細參詳。後人法此治經水。過多過少別溫涼。溫六合湯加芩朮。加黃

芩白朮治經水過多黃芩 色黑後期連附商。加黃連清熱香附行 熱六合湯梔連益。

抑陽白朮補脾能統血 加梔子黃連 寒六合湯加附薑。加炮薑附子 氣六合湯加陳朴。加陳皮厚朴 治血海虛寒 治血滋虛寒 氣六合湯加陳朴。治氣鬱經阻 風六

合湯加芫莖。加秦芫莖 此皆經產通用劑。說與時師好審量。

胎動漏血 膠艾湯 中四物先。阿膠艾葉甘草全。阿膠川芎甘草各二兩艾葉 當歸各三兩芍藥地黃各

兩酒水煎內阿膠烱化服○四物養血阿 婦人良方單膠艾。亦名膠 胎動血漏腹痛痊

膠補陰艾葉補陽甘草升胃加酒行經 香附用童便鹽水 方名如寶丹調經專。

酒醋各浸三日炒

養血安胎

當歸散

益婦人妊。尤芍芎歸及子芩。安胎養血宜常服。產

後胎前功效深。

婦人懷妊宜常服之。臨盆易產且無乘疾。當歸川芎芍藥黃芩各一斤。白朮半斤。為末。酒調服。丹溪曰。黃芩白朮安胎之聖藥。蓋種妊宜清熱涼血。血不妄

行則胎安。黃芩養陰。芩能除胃熱。白朮補脾。亦除胃熱。脾胃健則能化血養胎。自無半產胎動血漏之患也。

消痰下胎

黑神散

中熟地黃。歸芍甘草桂炮薑。蒲黃黑豆童便酒。消

痰下胎痛逆忘。

痰血攻滯則作痛。胞胎不下亦由血滯不行。諸藥各用兩。黑豆炒去皮。半斤酒童便合煎。○熟地歸芍以酒煎。蒲黃黑豆滑以行血。黑薑官桂熱以動血。緩以

甘草散以童便行以酒力也。

產中昏暈

清魂散

嚴氏用澤蘭葉。人參甘草川芎協。荆芥理血兼祛風。產

中昏暈神魂帖。

澤蘭人參甘草各三分。川芎五分。荆芥一錢。酒調下。○川芎澤蘭和血人參甘草補氣外感風邪。荆芥能疏血中之風。肝藏魂。故曰清魂。

子癇 羚羊角散

本事方

杏薏仁。防獨芎歸又茯神。酸棗木香和甘草。子癇

風中可回春。

羚羊角屑一錢。杏仁薏仁防風獨活川芎當歸茯神。各五分。木香各二分。半加薑煎治。娠中風。涎滯。價仆。口噤。搐掣。名子癇。○羚羊平肝火。防獨散

風邪乘伏以甯神芎歸以和血杏仁木香以利氣苡仁甘草以調脾胃

蓐勞 當歸生薑羊肉湯。

金匱當歸三兩生薑五兩羊肉一斤

產中腹痛蓐勞匡。

產後發熱自汗身痛名蓐勞腹痛者瘀血

末去新血不生也

亦有加入參耆者。

氣能生血○羊肉辛熱用氣血之屬以補氣血當歸引入血分生薑引入氣分以生新而加參耆者氣血交補也 千金

四物甘桂薑。

千金羊肉湯芎歸芍地甘草乾薑肉桂加羊肉煎

經產

達生

散丹溪達小羊也取其易生

紫蘇大腹皮。

參朮甘陳歸芍隨。

再加蔥葉黃腦

楊。

孕婦臨盆先服之。

大腹皮三錢紫蘇人參白朮土炒陳皮當歸酒洗白芍酒洗各一錢甘草炙三錢青蔥五葉黃楊腦七個煎○歸芍以益其血參朮以補

其氣陳散微葱以順其壅不慮不潔產自無難矣

若將用芎易白朮。

名紫蘇飲子

子懸宜。

胎氣不和上衝心腹各子懸

妊娠轉胞

妊娠轉胞參朮飲。

丹溪轉胞者氣血不足或痰飲阻塞胎為胞逼歷在一邊故臍下急痛而小便或數或閉也

芎芍當歸

熟地黃。

炙草陳皮

留兼半夏

氣升胎舉自如常。

此即人參湯除茯苓加陳皮半夏以降痰加薑煎

血癥

牡丹皮散

婦人良方

延胡索歸尾桂心赤芍藥牛膝稜菘酒水煎。氣行瘀散

瘕血削。

瘕血凝聚則成瘕丹皮延胡索歸尾桂心各三分赤芍牛膝莪朮各六分三稜四分酒
水各半煎○桂心丹皮赤芍牛膝以行其血三稜莪朮歸尾延胡索行血中氣滯氣中

血滯則結
者散矣

經多崩漏

固經丸

婦人良方

用龜板君。黃柏樗皮香附羣。黃芩芍藥酒丸服

漏下崩中色黑殷。

治經多不止色紫黑者屬熱龜板炙四兩黃柏酒炒芍藥酒炒各二兩樗
皮炒香附童便浸炒各兩半黃芩酒炒二兩酒丸○陰虛不能制胞絡之

火紋經多龜板芍藥滋陰壯水黃芩清上焦
黃柏瀉下燥香附辛以散鬱樗皮瀉以收脫

血少經閉

柏子仁丸

良方

熟地黃。牛膝續斷澤蘭芳。卷柏加之通血脈。經

枯血少腎匡肝。

柏子仁去油牛膝浸酒冠柏各五錢熟地一兩續斷澤蘭各三兩蜜九米飲下
○經曰心氣不得下降則月事不來柏子仁安神養心熟地續斷牛膝補肝益

腎澤蘭卷柏
括血通經

生津止渴

望梅丸

認

用鹽梅肉。

蘇葉薄荷與柿霜。

茶末麥冬糖共搗。燕

行賚服勝瓊漿。

鹽梅肉四兩麥冬去心薄荷葉去梗柿霜細茶各一兩紫蘇葉去梗五錢為極
細末白霜糖四兩共搗為丸雞子大旅行帶之每合一九生津止渴加參一兩

尤

固齒 骨灰固齒散猪羊骨。臘月醃成煨研之。骨能補骨鹹補腎堅牙健齒

老尤奇。用臘月醃猪羊骨火煨細研每晨擦牙不
可間斷至老而其效益彰頭上齒牙亦佳

遠行健足 軟脚散中芎芷防。細辛四味研加霜。輕撒鞋中行遠道足無恙

抱汗皆香。防風白芷各五錢川芎細辛各二錢半為末行遠路
者撒少許於鞋內步履輕便不生篋疱足汗皆香

小兒稀痘方

稀痘神功米以丹三種荳。粉草細末竹筒裝。臘月廁中浸洗淨。風乾配入梅

花良。絲瓜藤絲煎湯服。一年一次三年光。用赤小豆黑豆綠豆粉草各一兩細末入竹筒中削皮留節鑿孔入藥杉

木塞緊溶蠟封固浸臘月廁中一月取出洗浸風乾每藥一兩配臘月梅花片三錢以雪中花片落地者不著人手以針刺取更妙如急出用入紙套中略烘即乾兒大者服一錢小者五分以霜後絲瓜簾上小簾絲煎湯空腹服忌葷腥十二日解出黑願又方蜜糖忍冬末。願不伴服之效亦字

強。金銀花爲末糖調不住服之。更有元參菟絲子。其江王相公蜜丸如彈空心膏。白酒調化日

二次。菟絲子半斤酒浸二宿煮乾去皮元參四兩共爲細末蜜丸彈子大白湯調下每日二次或加犀麥生地黃。又方加生地麥冬四錢犀角二兩

此驗過稀痘法。爲力簡易免倉皇。

湯頭歌訣

七二

重校舊本經絡歌訣

十二經脈歌增潤古本 加註詳釋

手太陰肺脈中焦起。下絡大腸肺與大腸相表裏胃口行。胃之上腕即胃門上膈屬肺從肺系。

即喉橫從腋下膈內繫。膊下對腋處名膈音柔前平心與心包脈。行少陰心主之前下肘循臂骨上

廉。膈盡處為肘肘以下為臂遂入寸口上魚際。關前動脈為寸口大指後肉隆起處為魚口際其間穴名大指內側爪甲根。

少商支絡還從腕後出。臂骨盡處為腕接次指交陽明經。大腸此經多氣而少血。是動

則為喘滿欬。肺主氣膨膨肺脹缺盆痛。肩下橫骨指中名缺盆陽明胃經穴兩手交替音茂管厥。肺

所主病欬上氣。喘渴金不煩心生水心煩胸滿結。脈布胸中膈臂之內前廉痛。為厥或

為掌中熱。脈行少陰心主之前肩背痛是氣盛有餘。脈絡交於手上肩背小便數兩欠便頻或

汗出。肺主皮毛氣虛亦痛。肩臂痛溺色變。母病及及少氣不足以報息。虛

手陽明經大腸脈。次指內側起商陽。本經穴名循指上廉出合谷。谷名虎口穴兩骨

岐骨兩筋中間行。手背外側兩筋循臂入肘外廉行臑外。廉肩髃。香兩肩端兩骨前廉柱骨傍

。上出膀胱經之天柱會此。六陽經皆會於大椎故經文云上出於椎骨之會上下入缺盆內。肩下橫骨陷中絡肺下膈屬

大腸。表裏支從缺盆上入頸。斜貫兩頰下齒當。挾口人吻。鼻下交左右。上

挾鼻孔盡迎香。本經穴經此經血盛氣亦盛。是動齒痛頸亦腫。是主津液病

所生。大腸主津目黃。大腸內熱目乾。無津鼻動。鼻動喉痺。喉痺痛在肩前膈。大指次

指痛不用。不隨人用指

足陽明胃脈鼻頰起。山下循鼻外入上齒。環唇挾口交承漿。下唇頤後大

迎頰車裏。頰下為頰領下頰領其下耳前髮際至額顙。支循喉嚨缺盆入。下膈

屬胃絡脾宮。相宜直者下乳俠臍中。支者起胃口循腹裏。下行直合氣街

達。氣街達於脾關抵伏下臍臍。按臍兩筋循臍下。臍一曰臍蓋循臍下。臍中中膈通。支者中

指入大指。厲兌之穴經盡矣。交是此經多氣復多血。振寒呻欠呻吟而顏黑

。病至惡見火與人。血氣盛忌聞木聲心惕惕。陽明土閉戶塞牖欲獨處。甚

則登高而棄衣而走。實奔擊腹脹。脈循腹裏水火為肝厥。足經狂瘧溫溼及汗出

。多汗陽明法熱則口喎并脣脣。音幹唇脣頸腫喉痺循頰腹水腫。土不屬乳乳

皆本經乳間穴膝臑股伏兔。膝上六寸肝外足跗上皆痛。氣盛熱在身以前。陽明行有

餘消穀善溺黃甚。不足身以前皆寒。胃中寒而腹脹壅。太陰脾脈起足大

指。循指內側白肉際。過核骨後孤拐骨張景岳曰非也內踝前。臍旁上臍音善足肚

經中二字通用循臍膝股裏。股內前廉入腹中。屬脾絡胃相為上膈通。挾咽連

舌_{舌本}散舌下。支者從胃_上注心宮。此經血少而氣旺。是熱即病舌本強

。上_聲食則嘔出胃腕痛。心中善噫_{噫即}而腹脹。得後與氣_{大使}快然衰。衰_{病脾}

病身重_{脾主肌肉}不能動搖。瘦泄_{瀉積}水閉及黃瘧。濕煩心心痛_{即胃}食難消。下_{食不}

強立股膝內多腫。四肢_{脾主}不舉臥因胃不和。

手少陰心_脈起心經。下膈直絡小腸承。支者挾咽擊目系。直者_後心系

上肺膈。下腋循膈後廉出。太陰_肺心主_心之後行。下_{行二脈}肘循臂_{內後}抵

掌後。銳骨之端_{掌後}小指停。此經少血而多氣。是動咽乾_{少陰火}厭_{挾咽}心

痛應目黃_{魚痛}渴欲飲。臂膈內_後高掌熱蒸

手太陽經小腸廉。小指之端起少澤。循手_外上腕_骨出踝中。下_{掌腕}

上_骨骨_內側。兩筋之間膈_外後廉。出肩_角而繞肩胛。

肩下成交肩之上入缺盆。肩下橫直絡心中循陰明。下膈抵胃屬小腸。心為表

裏支從缺盆上頸頰。至目銳皆入耳中。至本經聽宮穴支者別頰復上頰。目下抵鼻

至於目內眥。內絡額交足太陽接。噤痛頰腫循頰頭難同。以肩似拔兮

以折。出肩循頰耳聾目黃腫頰間。入耳至曾上頰是所生病為主液。小腸主液頸頰肩膈肘臂

麻痛。此經少氣而多血。

足太陽經膀胱脈。目內眥上額交頰。鬚支者從巔入耳上角。直者從巔絡

腦間。還出下項循肩膊。肩後之挾脊去脊各一寸五分抵腰循脊旋。脊旁

正屬膀胱府。相為表裏一支貫腎入膈傳。從腰脊下中行行上中下膈等穴入膈委中穴膝外抽處為膈一支從膊別貫

脚。胛肉為脚挾脊去脊各三寸行附分魄戶膏肓等穴循脾脾膈股外為脾合膈行。與膈入膈膈足出蹠歷旁

骨。本經穴足外側赤白肉際小指外側至陰穴全。交足小陰此經少氣而多血。頭痛脊痛腰如

折。目似脫兮項似拔。腦如結兮腦如裂。痔腫入瘡太陽狂癩疾並生。癩狂

有刺木就行太勝經氣不能循經下阻經者行上冲於腦而為欬嘔目黃而淚出。顛項背腰尻切苦高關腦。痛者動時

痛皆徹。以上病皆經脈行過

足腎經脈屬少陰。斜從小指趨足心。湧泉出於然骨一作谷足內循內踝。入

跟足後上臨關內廉尋。上股內後廉真貫脊。會於督脈屬腎下絡膀胱深。相為

直者從腎貫肝膈。入肺挾舌本循喉嚨。支者從肺絡心上。注於胸中膈交手

厥陰。心包此經多氣而少血。是動病飢不欲食。腹內飢而不嗜食咳唾有血脈入肺故

腎損故見血。鳴鳴鳴。上奔目睛腦子心懸脈絡心水坐起輒。坐而欲起善恐心惕如人將

捕之。腎咽腫舌乾兼口熱。少陰上氣腎水心痛或心煩。脈絡黃疸腎水乘

女腸瀉腸或瀉或便血及痿骨厥。下不足脊股後廉之內痛。嗜臥少陰病足下

癰痛切。

手厥陰經心主標。心包下膈絡三焦。心包與三起自胸中膈支者出脅下腋

三寸循臑內過。太陰肺少陰心中間走。入肘下臂兩筋超。掌後兩筋橫紋陷中行掌心

勞宮穴從中指出中冲穴支從小指次指交。小指內之次指交三焦經經少氣原多血。是動則症

手心熱。肘臂擊急絨下腫甚則支滿在胸脅心中憺憺時火動面赤目黃笑不歇是主脈所生病者。心主脈掌熱心煩心痛

擊。皆經脈所過

手少陽經三焦脈。起手小指次指間。無名指循腕表手出臂外之爾骨。天井穴

貫肘循臑外上肩。交出足少陽膽之後。入缺盆布臆中傳。兩乳中間散絡心包

而下膈。循屬三焦表裏聯。三焦與心包為表裏支從臆中缺盆出。上項出耳上角巔

。以屈下頰而至顛。支從耳後入耳旁緣。出走耳前過頰經客主人穴交兩頰。至目

銳眚外角煩胆經連交足少陽是經少血還多氣。耳聾隘痛及喉痺。少陽相火氣所生病分

至焦心包皆主相火汗出多。火蒸為汗頰腫痛及目銳眚。耳後肩髃肘臂外皆痛癢及小次指

小指次指不用

足少陽脈膽之經。起乎兩目銳眚邊。上抵頭角下耳後。循頸行手少陽前

三焦至肩却出少陽後。入缺盆中支者分。耳後入耳中耳前走。支別銳眚

下大迎。寸三分助脈陷中合手少陽抵於頰下寸助脈加頰車下頸連。皆復合缺盆

下胸貫膈。絡肝屬膽表裏榮。相為表裏循脅裏向氣街出。挾臑四寸助脈繞毛際入髀厭

橫。橫入髀厭即髀厭直者從缺盆下腋。循胸季脅過章門。脅骨下為季脇即肝經章門穴下合髀厭即

髀厭外出膝外廉外輔骨即膝下兩旁高骨緣。下抵絕骨出外踝。外踝以上

故每言外循躡足入小次指間。支者別附入大指。循指歧骨出其端。足大指本節後歧

骨交此經多氣而少血。是動口苦。肝經上溢善太息。木氣心脅痛疼轉側難。足熱

足熱面塵體無澤。木鬱不頭痛領痛銳皆痛。缺盆腫痛亦痛脅。馬刀俠嬰頸

腋生。少陽汗出相火振寒多瘡疾。少陽居半表半裏故胸脅髀膝外脛絕骨。

外踝皆痛及諸節。皆經脈所過

足厥陰肝脈所終。大指之端毛際叢。起大循足跗上廉上內踝。中封出太陰

後脾脈入關中。內循股陰入毛中繞陰器。上抵小腹俠胃通。屬肝絡膽。相為

上貫膈。布於脅肋循喉嚨。後上入頰額。咽頰本篇後連目系。出額會督頂巔

逢。與督脈會於支者後從目系出。下行頰裏交環唇。支者從肝別貫膈。上

主於肺乃交宮。交於是經血多而氣少腰。痛俛仰難為工。不可婦少腹腫男

墮疝。脈抵小腹隘乾喉嚨脫色面塵蒙。木胸滿嘔逆及飧泄。木剋狐疝遺尿

或閉癥。肝火

奇經八脈初卷補輯

任脈起於中極底。

臍下四寸穴名中極任脈起於其下二陰之交會陰之穴任由會陰而行腹背

以上毛際循腹裏。中行

極上於關元臍下三寸穴名至咽喉。上頸循面入目是。

絡於承泣

衝脈起氣街並少陰。

腎挾臍上行胸中至。

任脈當臍中而上衝脈使腎旁而上以上並出素問骨空論

衝為五臟六腑海。

衝絡血海五臟六

腑所稟氣。上滲諸陽

經灌諸精。

上出頰頰

從下衝上取茲義。

故名衝

亦有並腎下行

者。注少陰絡氣街出。陰股內廉入髓中。

膝後曲處

伏行筋骨內踝際。下滲三

陰肝脾灌諸絡。以溫肌肉至跗指。

循足而下湧泉入足大指此段出靈樞經逆肥瘦篇

督脈起小腹骨中央

。入繫廷孔女人陰庭溺孔之端即溺瀆穴

絡陰器。會纂二陰之交名纂

至後別繞腎。

與直腸絡太陰少

陰比。與膀胱腎二脈相合上股內後

貫脊屬腎行。上同太陽起

目

內眥。上額交巖絡腦

間。下項循肩內仍挾脊。抵腰絡腎此督脈並太陽而行者。循男莖。男子下篡亦與女子

類。又從少腹胃臍中央。貫心入喉頤及唇。環上繫目下中央際。此為並

任此督脈並任脈而行者亦同衝。脈大抵三脈同一本。衝任督三脈皆起於會陰之下一原而三歧異任而同體靈素言之

每錯綜。靈樞五音五味籍衝脈任脈皆起於胸中上循背裏是又言衝任行背故經亦有謂衝脈為督脈者古圍經有以任脈循背者謂之督自少腹直上者謂之任亦謂之督今人大率

以行身背者為督行身前者為任從中起者為衝然考督任二經所行穴道一在身前一在身後而衝脈居中無穴道似當以此說為正督病少腹上衝心痛。不得

前後二便衝疝攻。此督脈為病固於衝脈者其在女子為不孕。衝為血海任主胞胎噎乾咽喉遺溺及痔瘡

絡陰器合纂間此督脈為病同於衝任者任病男疝內結七疝女癥帶。帶下癥聚婦人之疝衝病裏急氣逆冲。血不足故急氣有餘

則逆此段出素問骨空論○督者督領諸經之脈也衝者其氣上衝也任者女子得之以任養也

蹻陰蹻乃少陰腎之別脈。起於然骨內

蹻大骨之下照海穴至內踝。直入陰股入陰間。上循胸入缺盆過。出入迎前胃經頤入旁動脈

揚頭歌訣

八

鴻頭歌訣

八四

經。任脈衝脈督脈帶脈為經入脈帶及二維未說破。

帶脈約束一身如帶陽維陰維

陽維陰維謂之奇經入脈

帶及二維未說破。

帶脈約束一身如帶陽維陰維

湯頭歌訣 全書一冊

實價國幣五元

(外埠酌加郵匯費)

發行者 上海春明書店

總經理 重慶時新書局

保安路一三九號

分售處 全國各大書局

版權所有
翻印必究

民國三十三年三月再版

3/11/0

12

44812