

蘭臺軌範卷一

吳江徐靈胎洞溪著

通治方雖云通治亦當細切病情不得龍統施用也

小建中湯金匱 虛勞裏急悸動。腹中痛。夢失精。四肢發疲。手足煩熱。咽乾口燥。此湯主之。

桂枝三兩去皮 甘草三兩 大棗十二枚 芍藥六兩 生薑三兩 膠鴟一升 右六味以水七升。煮取三升。去滓。納膠鴟。更上微火消解。溫服一升。日三服。此方治陰寒陽衰之虛勞正與陰虛火旺之病相反庸醫誤用害人甚多。此四味乾口燥乃津液少非有火也。

黃耆建中湯金匱 虛勞裏急。諸不足者主之。

於小建中湯內加黃耆一兩半。餘依前法。

大建中湯 治虛裏急。少氣。手足厥冷。小腹牽急。或腹滿弦急。不能食。起即微汗。陰縮。或腹中寒痛不堪。口乾精出。或手足乍寒乍熱。而煩冤酸痛不能久立。

黃耆 當歸 桂心 芎藥 人參 甘草 銀花 夏柏 黑附子 炮各二錢半 右藥每

服五錢。加薑三片。棗一枚。煎服。此非金匱大建中湯。金匱方入腹痛門。所用之肉桂心也。此方兼治下焦虛寒之症。不但建立中宮。

炙甘草湯傷寒論一復脉湯名 治虛不足。汗出而悶。脈結悸。行動如常。不出百日。危急者。十一日死。

甘草四兩 桂枝 生薑各三兩 麥門冬半斤 麻仁半斤 阿膠 人參 各二兩 大棗三十枚 生地黃一斤

右九味以酒七升。水八升。先煮八味取三升。去滓。納膠消盡。溫服一升。日三服。此治血脈空竭方。用結悸者雖行動如常亦不出百日必死。若復危急不能行動則過十日必死。語極明白從前解者多誤。

八味地黃九味 治虛勞腰痛。少腹拘急。小便不利者。主之。又婦人病飲食如故。煩熱不得卧。而反倚息者。此名轉胞。不得溺也。以胞系于戾。故致此病。但利小便則愈。此亦主之。

乾地黃八兩九蒸為度。揭膏 乾山藥 山萸肉 酸丹皮 白茯苓 澤瀉 酸桂枝 附子 各一兩

序

欲治病者必先識病之名能識病名而後求其病之所由生知其所由生又當辯其生之因各不同而病狀所由異然後考其治之之法一病必有主方一方必有主藥或病名同而病因異或病因同而病證異則又各有主方各有主藥千變萬化之中實有一定不移之法卽或有加減出入而紀律井然先聖後聖其揆一也自南陽夫子以後此道漸微六朝以降傳書絕少迨唐人外臺千金不過褒集古方未能原本內經精通病變然病名尚能確指藥味猶多精切自宋以還無非陰陽氣血寒熱補瀉諸膚廓籠統之談其一病之主方主藥茫然不曉亦間有分門立類先述病原後講治法其議論則雜亂無統其方藥則浮泛不經已如雲中望月霧裏看花彷彿想像而已至

於近世則惟記通治方之數首藥名數十種以治萬病全不知病之各有定名方之各有法度藥之各有專能中無定見隨心所憶姑且一試動輒誤人余深憫焉茲書之所由作也本內經以探其源次難經及金匱傷寒論以求其治其有未備者則取六朝唐人之方以廣其法自宋以後諸家及諸單方異訣擇其義有可推試多獲效者附焉庶幾古聖治病之法尚可復覩使學者有所持循不至彷徨無措至於推求原本仍當取內經金匱等全書潛心體認而後世之書亦當窮其流派掇其精華摘其繆誤而後此書之精意自能融會貫通而心有實獲則變化在我矣

乾隆二十九年四月洞溪徐靈胎書於吳山之半松書屋

凡例

一每病先敍病原首內經次金匱傷寒次病源千金外臺宋以後亦間有採者前人已有之論則後者不錄若一病之中為病不一則即詳著於總名之下不復另立病名方之次第亦然

一病必有一方專治者名曰主方而一病又有幾種每種亦各有主方此先聖相傳之法莫之能易也俱載本病之下其有此病之主方而他病亦可用者則他病下祇載方名并治法註云見某病門以便

翻閱

一專治一病為主方如一方而所治之病甚多者則為通治之方先立通治方一卷以俟隨證棟用變而通之全在乎人服食養生皆在其中矣

一金匱諸方非南陽所自造乃上古聖人相傳之方所謂經方是也此乃羣方之祖神妙淵微不可思議分載於各證之下學者當精思熟識以為準的

一傷寒一科宜將傷寒論諸條字字體認其一百十三方亦當字字來悟余已將一百十三方編成類方一書矣此書無病不載豈可獨遺傷寒故略取六經主病之方隨證分錄其外諸方兼治雜病者俱分載各證條下蓋傷寒諸方當時本不專治傷寒南陽取以治傷寒之變證耳學者當合金匱傷寒兩書相參並觀乃能深通其義而所投輒效矣

一後世諸方其精實切病者皆附于古方之後其有將古方增減一二味即另立方名者殊屬僭妄蓋加減之法稍知醫理者皆能之若易一二味即自名一方則方名不可勝窮矣今一概不錄或有雜藥奇法據稱得之秘傳而其理不可解則有效有害皆未可知一概不錄或方中有難得之藥及無人能識之藥并違禁之藥如治骨一概不錄其有飛鍊禁咒等方既乏師承又屬渺茫一概不錄至于大藥重

劑藥品既多修治艱鉅此乃服食之大藥非救病之急劑學者平時查考以廣見聞可也一概不錄學務窮經志切師古不尚奇功祇求實效此書之志如是而已

一凡事最忌耳食孔子所謂道聽而塗說也如治浮火者當引火歸元乃指腎臟虛寒火不能納非治實火及別臟之火也如類中風用地黃引子乃治少陰純虛之辨證非治風火疫厥之中風也如暑天用大順散乃治夏日貪冷中寒之證非治暑熱正病也如大便不通用蘆薈丸乃治廣腸堅結諸藥不效之病非治津枯液燥之病也虛勞用建中湯乃治陽虛脉遲之證非治陰虛火旺之證也近人耳聞有此數方並不細審病因惘然施用受禍必烈集中俱為標出此外不止一端學者所當痛省一通天地人之謂儒百家藝術皆士大夫所宜究心况疾病乃身命所關豈可輕以諉人此集溯本窮流簡括明備人人易曉病者醫者對證尋方互相考證則是非立辨不致以性命輕擲未始非衛生之一助云

蘭臺軌範總目

卷一

通治方

卷二

風

痹歷節

痿

厥

虛勞

消證附強中

傷寒

百合

感冒

寒熱

霍亂附消轉

痓

癃閉利淋

痢

卷三

濕

渴

瘻瘍

痢

癲狂癇

痰飲

咳嗽附肺

疝

卷四

喘

臌脹水腫

肺痿附肺

諸血

卷五

噎膈嘔吐附開

泄瀉

頭心附胃

脚氣附轉

卷六

積聚癰痞

蟲附根

諸痛附腰腹

筋筋附轉

卷七

疫癰鬼疰

諸疽附黃汗

情志臥夢

五竅病耳目鼻口齒

雜病

卷八

婦人

少兒

蘭臺軌範目錄

卷一

小建中湯	黃耆建中湯	大建中湯	炙甘草湯
八味地黃丸	資生腎氣丸	六味地黃丸	當歸生薑羊肉湯
竹葉石膏湯	脾約丸	四君子湯	五味異功散
七味白朮散	六君子湯	獨參湯	參附湯
保元湯	生脉飲	歸脾湯	補中益氣湯
虎潛丸	資生丸	龜鹿二仙膠	三才封髓丹
七寶美髯丹	無比山藥丸	還少丹	羊腎丸
羊肉粥方	三才丸	天王補心丹	祕方補心丸
黑地黃丸	元精丹	青州白丸	指迷茯苓丸
威喜丸	靈砂	二神丸	導赤散
亡血脫血方	當歸補血湯	益血潤腸丸	芎歸膠艾湯
四物湯	八珍湯	十全大補湯	人參養榮湯
柴胡四物湯	菟絲子丸	阿伽陀藥	解朮方
服牛乳方	生地黃煎	王屏風散	
盜汗方	止汗紅粉	當歸六黃湯	來門冬湯
二腎散	逍遙散	平胃散	五苓散

二陳湯

枳朮丸

瀉黃散

保和丸

加減思食丸

越鞠湯丸

四磨飲

妙香丸

藿香正氣散

天水散

二氣丹

瀉白散

三黃湯

涼膈散

四物二連湯

左金丸

龍膽瀉肝湯

甘露飲

清心蓮子飲

瀉熱梔子煎

大順散

十精丸

成煉鍾乳粉

玉霜圓

礞石滾痰丸

黑錫丹

龍腦雞蘇丸

至寶丹

蘇合香丸

瓊玉膏

大活絡丹

解毒萬病丹

卷二

酒風

侯氏黑散

風引湯

防己地黃湯

頭風摩散

越婢湯

小續命湯

錄驗續命湯

近效丸附湯

地黃煎

三黃湯

風痱方

蒸半身不遂方

治風懿方

口眼喎僻方

又方

又方

開心肥健方

一切風虛方

又方

卒不得語方

控涎丹

滌痰散

勝金丸

稀金丸

癲風方以上

薄證方

寒瘲熨法

黃耆桂枝五物湯

桂枝芍藥知母湯

烏頭湯

獨活寄生湯

舒筋飲

拔癆膏

史國公酒方以上薄
歷節薄

金剛丸

虎骨四助丸

加減四助丸

煨腎丸

續骨丹

思仙續斷圓以上瘦

戶蹶方

赤圓

茯苓甘草湯

戶蹶方

白薇湯以上

桂枝加龍骨牡蠣湯

薯蕷丸

大黃麨蟲丸

治夢泄精方

羌活補髓丸

肘後懶肝散

骨蒸方

救急療瘻疾方

口乾方

秦艽鱉甲散

秦艽扶羸湯

十味煎

金鎖丹

人參蛤蚧散

金鎖固精丸

金鎖丹

金鎖正元丹

犀角紫河車丸以上瘦

文蛤散

消渴方

猪腎慈尼湯以上消症

黃連圓治渴方

桑根湯

神效散

葛根黃芩黃連湯

桂枝湯

麻黃湯

桂枝麻黃各半湯

桂枝加葛根湯

葛根湯

葛根芩芩連湯

桂枝加芍藥湯

大青龍湯

桂枝加桂湯

小柴胡湯

太柴胡湯

大承氣湯

小承氣湯

調胃承氣湯

桃核承氣湯

抵當湯

抵當丸

大陷胸湯

大陷胸丸

小陷胸湯

白虎湯

麻黃附子細辛湯

四逆散

四逆湯

四逆加人參湯

通脉四逆湯

通脉四逆加豬膽汁湯

當歸四逆湯

卷三

理中丸及湯

附子鴻心湯

梔子豉湯

真武湯

大黃黃連瀉心湯

白通湯

白通加豬膽汁方

豬膚湯

甘草湯

甘桔湯

瓜蒂散

麻黃升麻湯

旋覆代赭湯

苦酒湯

枳實梔子豉湯

竹葉石膏湯

燒視散

豬膽導法

蜜煎導法

治男子新病起房內復者方

治交接勞復陰卵腫縮入腹絞痛便欲死方

竹皮湯

療食勞方

治結胸冬法

鵝石散

鱉甲散

升麻鱉甲湯

升麻鱉甲去雄黃蜀椒方

梔子仁湯

還陽湯

姜蕤湯

白虎加蒼朮湯

黑膏傷寒

百合知母湯

滑石代赭湯

百合雞子湯

百合地黃湯

百合洗方

桔梗牡蠣散

百合滑石散以上百合

九味羌活湯

敗毒散

參蘇飲以上風冒

四時加減柴胡方

天行熱病方

苦參湯

凝雪湯

大黃湯

薰身法以上寒熱

五苓散

理中丸

霍亂轉筋入腹方

又方

又方

廣濟高良薑湯

霍亂轉筋入腹方

茱萸湯

灸法以上霍亂

括萎桂枝湯

麻黃加獨活防風湯以上

括萎瞿麥圓

滑石白魚散

茯苓戎鹽湯

豬苓湯

治諸種淋方

石葦散

胞轉方

療小便難方

石葦散

蘇瀉煎

治石淋方

治熱淋方

四汁飲

牛膝膏

八正散

家韭子丸

治小便失禁方

夜多小便方

豬壯丸

縮泉丸

治尿牀以上經利淋

卷四

麻黃加朮湯

防己黃耆湯

麻黃杏仁薏苡甘草湯

桂枝附子湯

白朮附子湯

甘草附子湯

二妙散以上漏

白虎人參湯

一物瓜蒂湯

香薷飲

十味香薷飲

黃連香薷飲

枇杷散

蟾酥丸

千金丹

又刮痧法以上

龍甲煎丸

白虎加桂枝湯

蜀漆散

柴胡去半夏加栝蒌湯

柴胡桂蠻湯

蜀漆丸

陵鯉湯

清脾湯

瘡瘍病醫不能救者方

療瘧常山湯

牡蠣湯

常山飲

集驗瘧洽從四肢始療方

四獸湯以上瘧

烏梅引子

白頭翁湯

紫參湯

訶梨勒散

甘草瀉心湯

黃芩湯

黃芩加半夏生蠻湯

乾蠻黃連黃芩人參湯

赤石脂禹餘糧湯

雄黃丸

柴胡加芒硝湯

主赤白痢方

瘡瘍五疳茶下痢方

薤白湯

訶梨勒丸以上

生鐵洛為飲

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯

柴胡加龍骨牡蠣湯

治癲狂百病

萸岩子散

琥珀壽星丸

控涎丹

獨效苦丁香散

抱膽丸

苦參丸以上癩

芩桂甘尤湯

甘遂牛夏湯

十乘湯

小青龍湯

小半夏湯

木防己去石膏加茯苓芒硝湯

澤瀉湯

木防己湯

小半夏加茯苓湯

葶藶太東瀉肺湯

桂苓五味甘草湯

芩甘五味薑半夏湯

芩甘五味加薑半夏杏仁大黃湯

芩甘五味加薑半生夏杏仁湯

厚朴大黃湯

痰飲頭痛往来寒熱方
礬石湯

金珠化痰丸

葛花解醒湯以上飲

射干麻黃湯

皂莢丸

厚朴麻黃湯

澤瀉湯

越婢加半夏湯

小青龍加石膏湯

杏仁煎

十味丸

療上氣方

鯉魚湯

觀音應夢散

補肺阿膠散

清音丸

葶藶丸

蘇子煎

蘇子降氣湯

治久嗽上氣心胸煩熱吐膿血方以上嗽

烏頭桂枝湯

蜘蛛散

大烏頭煎方

洗陰腫核痛

麝香大戟丸

濟生橘核丸

川棟子丸

硇砂圓

蟬脫散以上

麥冬湯	桂枝加厚朴杏子湯	麻黃杏仁甘草石膏湯	定喘湯
皴肺丸	清燥救肺湯 <small>以上</small>	雞矢醴方	防己茯苓湯
甘草麻黃湯	麻黃附子湯	桂枝去芍藥加麻黃細辛附子湯	牡蠣澤瀉散
枳朮湯	蒲灰散	己椒薑圓	舟車神祐方
大腹水腫方	麻豆湯	十水丸	治療水病洪腫氣脹不消方
大聖滑川丸	木香散	葶藶丸	桔梗白散 <small>肺癆</small>
療患氣乘水身面腫垂死方	散藥	沉香琥珀丸	滋血潤腸湯
治蠱脹方	小青丹	煨腎散	禹餘糧丸 <small>以上腹腫水腫</small>
烏鵲魚湯	桂枝去芍藥加皂莢湯	柏葉湯	桔梗白散 <small>牙癆</small>
甘草乾薑湯	韋莢湯	瀉心湯	治療牙縫出血
血枯方	桂枝去芍藥加皂莢湯	犀角地黃湯	治療小便出血方
治吐血百治不瘥療十瘥神驗不傳方	柏葉湯	犀角地黃湯	王屑散
四生丸	白芨枳杷丸	皮膚血汙方	地黃散
諸竅出血方	治療舌上出血如孔鑽者	汗血方	神效方
療齒斷血出	治療酒醉牙齒漏血	雄黃麝香散	瞿麥散
黃連散	治療滿口齒血出	治牙宣方	茉花湯

鹿角膠丸

黃土湯

赤小豆當歸散

牛角鵝灰散

豬臘丸

又豬臘丸以上治血

茱萸湯

生薑瀉心湯

半夏瀉心湯

黃芩加半夏生薑湯

猪苓散

大半夏湯

大黃甘草湯

茯苓瀉瀉湯

文蛤湯

生薑半夏湯

半夏乾薑散

葛根加半夏湯

橘皮湯

橘皮竹茹湯

黃連湯

昆布丸

關格不通方

千金理諸噎方

又方

中風客熱噦方

嘔噦方

消穀丸

卒噦

廣濟檳榔散

崔氏方

深師治噎方

反胃方

丁香柿蒂湯

治冷呃方

撞氣阿魏九以上一錢

溫脾湯

調梨勒丸

香草丸

固腸丸

附子理中丸

川上瀉瀉

卷六

奔豚湯

茯苓桂枝甘草大棗湯

桂枝加桂湯

備急丸

貪食食多不消心腹堅滿痛治之方

療食鱠傷

蚊龍病方

療大肉傷

療食鱠傷

破癬湯

備急熨盤方

療十年瘻癩方

椒熨方

療米癰羸瘦至死

廣濟療癩方

廣濟療瘻方

廣濟療瘻方

治食索粉積方

易簡紅丸

大七氣湯

半硫圓丸

髮癩飲油方

食髮成瘕方

酒薑氣薑血薑方

蛇癥方

蛟龍病方

蛇瘕

腹內蛇癥方

血瘕方

虱瘕

婦人狐瘕方以上積
聚癰癥

甘草粉蜜湯

烏梅丸

瘡蛇蟲攻心腹痛

瘡蟲蝕下部

療傷寒憲病

追蟲丸

下蟲丸

瘡寸白蟲

又方

瘡濕惡蟲

療蛔蟲

瘡百蟲方

鵝虱散

胡粉丸

甘草瀉心湯

苦參湯

雄黃

赤小豆當歸散

厥頭痛吐方

蕪荑散以上
頭痛

頭痛方

又方

止痛太陽丹

氣攻頭痛方

透頂散

痛風餅子

麝犀湯

祕方貼頭風熱病

清震湯

治頭內如蟲蛀響

玉真圓

茶調散以上
頭痛

桔梗薤白白酒湯

桔梗薤白夏湯

枳實薤桂枝湯

茯苓杏仁甘草湯

橘皮枳實生薑湯

薏苡仁附子散

桂枝生薑枳實湯

赤石脂丸

九痛丸

大建中湯

療胸痹心痛方

熨背法

療心痛方

海蛤丸

失笑散以上心
胃痛

甘薑苓朮湯

青娥丸

加味小柴胡湯

摩腰膏

療腰痛方

又方

海蛤丸

藥綦子以上
腰痛

厚朴七物湯

附子粳米湯

蒸臍法

厚朴三物湯

大黃附子湯腹痛以上

礬石湯

第一竹瀝湯

烏麻酒

茱萸木瓜湯

蘇子粥

杉木湯

欖榔散

木本散

雞屎白散

療轉筋方

延效療轉筋

轉筋灸法以上脚氣

卷七

小金丹方

還魂湯

又方

外臺走馬湯

雄黃粉

治瘧方

辟溫殺鬼丸

八毒赤丸以上痘瘡

茵陳蒿湯

消石礬石散

梔子大黃湯

桂枝加黃耆湯

猪膏髮煎

茵陳五苓散

大黃硝石湯

麻黃醇酒湯

黃疸方

赤苓散

寒水石散

女勞疸

牛痘煎

救急三十種黃方

療黃疸方

近效爪蒂散

麻黃連翹赤小豆湯

黃耆芍藥桂枝苦酒湯諸痘

桂枝救逆湯

黃連阿膠湯

溫膽湯

治多忘

枕中方

鎮心省睡益智方

療虛煩不可攻方以上情志卧夢補腎治五聾方

通耳法以上耳

七寶散

去翳方

磁石猪腎羹

磁硃丸

石斛夜光丸

羚羊角散

補肝丸

洗眼藥以上

通草散

瓶鼻方

蟬花散

目

洗眼藥

消鼻痔方

凌霄花散

蒼耳散

治鼻渊方

又方

又方

鼻中瘻肉以上

口甘方

口苦方

療口瘡

推頰車法

口氣鼻穢方

口中臭方

口香去臭方

治潔唇方

又方

塗唇方

刺舌法

療舌腫方

又方

療重舌

療舌脹方

療舌腫脹

治失音

療馬喉痺

琥珀犀角膏

喉腫刺法

口傍惡瘡方

敷面靨方

又方

止牙痛方

治牙痛仙方

治牙疼方

如神散

細辛散以上口齒

卷八

桂枝茯苓圖

當歸芍藥散

乾薑入參半夏丸

葵子茯苓散

當歸貝母苦參丸

當歸散

白朮散

枳實芍藥散

下瘀血湯

竹葉湯

竹皮大丸

白頭翁加甘草阿膠湯

半夏厚朴湯

甘麥大棗湯

溫經湯

土瓜根散

旋復花湯

大黃甘遂湯

礬石丸

紅藍花酒

蛇床子散

狼牙湯

三物黃芩湯

當歸建中湯

佛手散

回生丹

開骨散

奪命散

下死胎方

交加散

護胎方

海蛤散

小柴胡加地黃湯

烏雞煎圓

猪蹄湯

紫石英丸

催生丹

小調經散

二味參蘇飲

紫蘇飲

紫散

秦桂丸

求嗣方

黃龍湯婦人上

瀉青丸

導赤散

生犀散

瀉黃散

五味異功散

益黃散

瀉白散

阿膠散

地黃丸

四君子湯

四物湯

八珍湯

十全大補湯

六君子湯

補中益氣湯

香砂助胃膏

肥兒丸

九味蘆薈丸

木香丸

胡黃連丸

如聖丸

蘭香散

白粉散

蟾蜍丸

蕪荑散

安蟲散

白玉散

柳華散

仙方活命飲

消積丸

保和丸

四神丸

五苓散

白虎湯

地黃清肺飲

茵陳湯

小柴胡湯

加味道遥散

龍膽瀉肝湯

斷癰丹

黃連膏飲

金匱加減腎氣丸

五色丸

小續命湯

大青膏

利驚丸

牛李膏

鈎藤鈎飲

歸脾湯

越鞠丸

安神丸

雄黃散

蠟蛇鉤藤散

羚羊角丸

止汗散

當歸六黃湯

園參湯

參附湯

人參養榮湯

浴體法

神效當歸膏

保命散

治疳積方

治赤瘍方

治痘出眼中方

治癩方

治骨蒸方

治遺尿方

治牙疳方

治吐乳方

治蟬螂子方

損

蘭臺軌範卷一

吳江徐靈胎洞溪著

通治方雖云通治亦當細切病情不得龍統施用也

小建中湯金匱虛勞裏急悸動腹中痛夢失精四肢發疲手足煩熱咽乾口燥此湯主之

桂枝三兩去皮甘草三兩大棗十二枚芍藥六兩生薑三兩膠鴟一升右六味以水七升煮取三升去滓納膠鴟更上微火消解溫服一升日三服此方治陰寒陽衰之虛勞正與陰虛火旺之病相反庸醫誤用害人甚多此咽乾口燥乃津液少非有火也

黃耆建中湯金匱虛勞裏急諸不足者主之

於小建中湯內加黃耆一兩半餘依前法

大建中湯 治虛裏急少氣手足厥冷小腹牽急或腹滿弦急不能食起即微汗陰縮或腹中寒痛不堪口乾精出或手足乍寒乍熱而煩冤酸痛不能久立

黃耆 當歸 桂心 芍藥 人參 甘草 銀花 夏枯草 黑附子 炮炙各二錢半 右藥每

服五錢加薑三片棗一枚煎服此非金匱大建中湯金匱方入腹痛門所用之肉桂心也此方兼治下焦虛寒之症不但建立中宮

炙甘草湯傷寒論一復脉湯名治虛不足汗出而悶脈結悸行動如常不出百日危急者十一日死

甘草 四兩 桂枝 生薑各三兩 麥門冬 半斤 麻仁 半斤 阿膠 人參各二兩 大棗三十枚 生地黃一斤

右九味以酒七升水八升先煮八味取三升去滓納膠消盡溫服一升日三服此治血脈空竭方用能行動則渴十日必死語極明白從前解者多誤

八味地黃九味金匱虛勞腰痛少腹拘急小便不利者主之又婦人病飲食如故煩熱不得卧而反倚息者

此名轉胞不得溺也以胞系于戾故致此病但利小便則愈此亦主之

乾地黃八兩九蒸為度揭青乾山藥 山萸肉 酸丹皮 白茯苓 澤瀉 酸桂枝 附子各一兩

右八味為末。煉蜜丸如桐子大。酒下十五丸。日再服。此方亦治脚氣。乃腫邪水去而陰不傷。扶陽而火不升。製方之妙固非一端。但近人以比一方治天下之病。則又大失此方之義也。

資生腎氣丸

治肺腎虛。腰重脚輕。小便不利。或壯腹腫脹。四肢浮腫。或喘急痰盛。已成蟲謐。

於前八味九加車前子牛膝各一兩。餘依前法。

六味地黃丸

錢氏治腎陰不足。發熱作渴。小便淋閉。氣壅痰嗽。頭目眩暉。眼花耳聾。咽乾舌痛。齒牙不固。腰

腿痠軟。自汗盜汗。便血諸血失音。水泛為痰。血虛發熱等證。於前方去肉桂附子。餘依前法。

此方

當歸生薑羊肉湯

金匱治小兒瘧。治產後腹中污痛。並治腹中寒疝。虛勞不足。

當歸三兩 生薑五兩 羊肉一斤

右以水八升煮取三升。溫服六合。日三服。若寒多者。加生薑成一

升。痛多而嘔者。加陳皮二兩。白朮一兩。如加生薑等者。亦加水五升。煮取三升。二合服。

之精不足者。補之以味。

是也

竹葉石膏湯傷寒論

治傷寒解後虛羸少氣逆欲吐者。

竹葉二把 石膏一斤

半夏半斤 人參三兩 甘草二兩

炙 麥門冬一升 梗米半升

右七味以水一斗煮

取六升去滓。

納粳米煮米熟湯成。去米溫服一升。日三服。

集驗載此方加生薑治暑最良。此治三陽

解後人俱概用峻補以留其邪。則元氣不能驟復。愈補愈虛矣。亦治傷暑發渴脉虛。暑病有虛熱者。宜之。若吐逆。督脈之症。則大誤矣。

脾約丸金匱即麻仁丸

治腸胃熱燥大便祕結。

麻仁五兩

另研 大黃一斤 蒼朮厚朴 薑炒 枳實炒 茯苓藥炒各五兩

杏仁五兩

右為末。蜜丸梧子大。臨睡用白湯

送下二十九大便利即止。

此潤腸之主方。

四君子湯 治面色痿白。言語輕微。四肢無力。脉來虛弱者。若內傷虛熱。或飲食難化。須加炮薑。

人參

白朮

茯苓

甘草各二錢

右加薑棗水煎服

此補脾之主方

五味異功散

錢氏

調理脾胃。於四君子湯加陳皮一錢為末。每服二錢。白湯調服。

七味白朮散

治一切吐瀉煩渴。霍亂虛損。氣弱保養衰老。及治酒積喘嗽。於四君子湯加薑香半兩。

葛根一兩。木香二錢半為末。每服二錢。白湯調下。

六君子湯

治氣虛有痰。脾虛臟脹。即前方加陳皮半夏。餘依前法。更加薑香砂仁為香砂六君子湯。

獨參湯

治元氣大虛。昏厥脉微欲絕。及婦人崩產脫血血暈。

人參

分兩隨症

右一味須上棟者。濃煎頓服。待元氣漸回。隨證加減。

此一時急救之法服

參附湯

治陰陽血氣暴脫證。

人參一兩。附子

錢製五分

右加薑棗水煎服。此亦急救之方。本方去人參。加黃耆。名者附湯。

保元湯

生脉飲

治熱傷元氣。氣短倦怠。口渴出汗。

人參五錢

麥門冬

五味子各三錢

右三味水煎服。

此方傷暑之後。存其津液。庸醫即以之治暑病。誤甚。觀方下治證並無一字治暑邪者。

此即於復脉湯內取參麥二味。以止汗故復加五味。

子近人不論何病。每用此方收住邪氣。殺人無算。

人參不論何病。每用此方收住邪氣。殺人無算。

歸脾湯

濟生

治思慮傷脾。或健忘怔忡。驚悸盜汗。寤而不寐。或心脾作痛。嗜臥少食。及婦女月經不調。

人參

龍眼肉

黃耆錢半

甘草五分

白朮二錢

茯苓二錢

木香五分

當歸

酸棗仁炒研

遠志錢一

右加薑三片。

水煎服。補脾有二法。一補心以生脾血。一補腎以壯脾氣。此

補中益氣湯棟 治陰虛內熱。頭痛口渴。表熱自汗。不任風寒。脈洪大。心煩不安。四肢困倦。懶於言語。無氣以動。動則氣高而喘。

黃耆炙 人參 雲朮錢五分 甘草錢一 陳皮五分 當歸一錢 升麻 柴胡各五 右八味加生薑三片。太棗二枚。水煎溫服。為合度。若氣高而喘。則非升柴所宜。學者不可誤用也。

虎潛丸瀉 治腎陰不足。筋骨痿不能步履。

龜板

黃柏各四兩

知母

熟地

各二兩

牛膝

五錢

鎮陽

虎骨

當歸

各一兩

芍藥

五錢

右為末。

煮鷄

羊肉

搗為丸。

桐子大。

淡鹽湯下。

文此方

屬為

度

後人

人

參

三兩

茯苓

二兩

雲朮

三兩

山藥

二兩

薏仁

一兩

蓮肉

二兩

芡實

一兩

甘草

一兩

陳皮

一兩

麥蘖

神曲各二

砂仁一

半

白豆蔻

八錢

桔梗

一兩

藿香

一兩

川黃連

四錢

白扁豆

山楂各一

右十

八味

為細末。

煉蜜九

彈子大。

每服二丸。

米飲下。

論何

因為

總治

脾胃

之藥

則失製

方之義矣。

藥味太

雜全無法度姑

存之以備一格

龜鹿二仙膠 大補精髓益氣養神。

鹿角血者龜板自敗者 以上二味另熬膏 枸杞子

甘州者人參十五三十兩人參兩

右用鉛蟬如法熬膠

初服酒化一錢五分。漸增至三錢。空心下。精不足者補之。以味而龜鹿又

能通督任填補之法。此為最穩。

三才封髓丹鑑 除心火。益腎水。滋陰養血。潤補不燥。

天冬

熟地

人參各五錢

黃柏三兩

砂仁一兩

甘草錢七

右為末。麵糊丸梧子大。每服五十

丸用從參半兩。切作片。酒浸一宿。次日煎三四沸。空心食前送下。此補陰氣之方。老人便結者為虛人。

七寶美髯丹邵應師

補腎氣。烏鬚髮延年益壽。

何首烏赤白雌雄

牛膝八兩。以何首烏先用米泔水浸一日夜。以竹刀刮去粗皮。切作大片。用黑豆

豆覆之。以豆熟為度。去豆。鋪牛膝一層。每鋪何首烏一層。每鋪豆一層。如是相間上鋪。

如前用生豆蒸。如法蒸七次。去豆。用破故紙半斤。酒浸洗淨。用黑芝麻同炒無聲為度。去芝蔴。當歸尾半斤。去頭。白茯苓半斤。

乳拌浸透。曬乾蒸。赤茯苓半斤。黑牛乳。菟絲子半斤。酒浸一宿。先

炮杞子半斤去蒂枯者。右共為末。蜜丸龍眼大。

每日空心嚼二三丸。溫酒或米湯白鹽湯皆可。下製法不可犯鐵器。

此方化鐵器血之方。

無比山藥丸針。治丈夫久虛百損。五勞七傷。頭痛目眩。支厥。或煩熱。或脾疼腰攬。不隨飲食。不生肌肉。或少食而脹滿。體無光澤。陽氣衰絕。陰氣不行。

熟地酒浸。赤石脂

巴戟去心。茯苓

牛膝酒浸。山茱萸肉

澤瀉各三錢。乾山藥二兩。

五味子六兩。肉蓯蓉

酒浸四兩。菟絲子

杜仲炒各三兩。

右藥煉蜜丸桐子大。每服二十九至三十九。食

前溫酒。或米飲下。服七日後。令人身健體潤。面光音響。為驗。此通中藥入腦。鼻必酸疼。分怪氣。此收攝腎氣之方。最

安爲穩

還少丹楊氏。大補心腎。脾胃虛寒。飲食少思。發熱盜汗。遺精白濁。及真氣虧損。肌體羸瘦。肢節倦怠等證。

山藥牛膝遠志

山萸肉。茯苓。五味子

杜仲炒各一兩。

枸杞子。熟地各二兩。

巴戟酒浸心。

肉蓯蓉酒浸一宿。石菖蒲

杜仲同拌炒各一兩。

枸杞子。熟地各二兩。

右共為細末。煉蜜同棗

肉為九梧子。大每服三十丸。溫酒或鹽湯下。日三服。此交通心腎之方。

羊腎丸。治腎勞虛寒。面腫垢黑。腰脊引痛。屈伸不利。夢寐驚悸。小便不利。

熟地杜仲

菟絲子另研。石斛

黃耆續斷

肉桂

牛膝磁石淨

煅醋

沉香 五加皮 山藥炒一兩

右為末。雄羊腎兩對以葱椒酒煮爛入少酒糊杵丸梧子大每

服七十丸空心鹽湯送下此降納腎之方

羊肉粥方養老 治老人虛損羸瘦助陽壯筋骨。

羊肉二斤 黃耆一兩 生用 人參二兩 白茯苓一兩 大棗五枚 糜米三合 加生薑少許 尤佳

右先以肉去

脂皮取精熬。肉留四兩細切餘一斤十二兩以水五大盞並黃耆等煎取汁三盞去滓入米煮粥臨熟下切生肉更煮入五味調和空心服之此古人服食之方也

三才丸潔 治肺脾虛欬嗽。

人參 天門冬 地黃各等分

右為末。煉蜜丸空心服此方與嗽證非宜必上
下純虛而不嗽者可用

天王補心丹藏

治心血不足神志不寧津液枯竭健忘怔忡大便不利口舌生瘡等證。

人參 白茯苓 元參 桔梗

遠志各五錢 當歸

五味子

麥冬

天冬

丹參

酸棗仁各一兩 生地四兩 柏子仁一兩

右為末。煉蜜丸如椒目大白湯下此養心主方

一方有甘草川連 石菖蒲四錢無五味子一方有甘草川連

祕方補心丸 治心虛手振

當歸五錢 川芎

粉甘草兩 一生地一兩 遠志二兩 藜仁炒

柏子仁去油各三兩 人參

膽星

硃砂另研各五錢 金箔片二十 膏香一錢 琥珀三錢 茯苓七錢 石菖蒲六錢

右為末。餅糊丸。菜豆大硃砂

為衣。每服七八十九。吐津喫下或薑湯送下此心神恍惚而有痰者宜之

黑地黃丸 治陽盛陰衰脾胃不足房室虛損形瘦無力面多青黃而無常色此補腎益胃之劑也

蒼朮油浸熟地一斤 五味子半斤 乾薑五錢 春一兩 肉桂七錢

右為末。蜜丸梧子大。食前米飲服百丸治

血虛久痔其妙。按此治脫血脾寒之聖藥。
乾薑當泡淡炒黑用

元精丹 北方黑氣入通於腎。開竅於二陰。藏精於督。味鹹其類水。其病在骨。此藥主之。

血餘自已髮及父子一本者及小壯男女髮拔去黃白色者用灰湯洗二三次以大皂角四兩搗碎一層板一層和勻以中鍋蓋蓋鹽泥固濟勿令泄氣桑火慢煮三炷香即退火待冷取出約重四兩有餘於無風處研為細末何首烏製法如前七寶美髯丹法取淨末一斤

黑芝麻九蒸九晒取女真實四兩破故紙末四兩生地膏入藥熟地各八兩旱蓮草桑甚各取四兩胡桃仁研膏膠棗二兩槐角子八牛膽內右以藥末和諸膏和勻加煉蜜一斤入石白杵千餘下為丸梧子大每服六十九空心用首烏釀酒二三杯送下日三服諸品皆色黑之藥專補腎血此治便後脫血之神方也

青州白九禍 治一切風及小兒驚風婦人血風大人頭風。

南星三兩白附子二兩半夏七兩川烏半兩各右為細末放磁器中日曬夜露春五夏三秋七冬十日以糯米粉煮粥九薑湯下風證溫酒下驚風薄荷湯下此四味宜水研取漿澄粉曬露七日去水作丸此治風痰之要藥也

指迷茯苓丸 治中脘留伏痰飲臂痛難舉手足不得轉移。

茯苓二兩半夏一兩枳殼半兩風化硝二錢右為末薑汁和丸桐子大每服三十九薑湯下按方極和半夏宜生研澄粉用

威喜丸方 治飲食積滯蟲瘡脹滿久痢久瘍沉冷積塞。

廣木香 肉豆蔻四錢乾薑炮炒二巴豆二升研去皮杏仁四十粒去皮百草霜五錢加桂枝大半錢研右前

四味為末入百草霜同研後入杏仁巴豆霜研黃蠅一兩五錢酒煮一時去酒將蠅入麻油七錢鎔化拌藥研勻乘熱丸如菉豆大每服二三十丸用黃蠅之義最精凡治積新病宜急下久病宜緩下此方治久患寒積之證乃緩下法也

靈砂碣 治上盛下虛發泄壅盛最能鎮墜升降陰陽和五臟助元氣。

水銀一斤硫黃四兩

右二味用新鐵鉗炒成砂子或有烟焰即以醋灑候研細入水火鼎醋調赤

石脂封口鐵線孔縛曬乾鹽泥固滲用炭二十斤煅如鼎子烈筆蘸赤石脂頻抹其處大盡為度經宿

取出研為細末糯米糊為丸如麻子大每服三丸空心裏湯米飲井花水人參湯任下量病輕重增至

五七九丸此鎮墜之藥若研黑
錫丹則此方可不簡

二神丸本事治腰痛腎虛全不進食

破故紙四兩肉豆蔻生二兩

右為末用大棗四十枚生薑四兩同煎摩爛去薑裹核皮研膏入藥末

丸鹽湯下此治腎家有寒濕之方本方加五味子吳茱萸各二兩為四神丸

導赤散錢氏治心熱口糜舌瘡小便黃赤莖中作痛熱淋不利

生地一斗通

甘草梢分等右三味水煎服此瀉心火從陽中出也

亡血脫血方千金翼

治亡血脫血鼻頭白色唇白去血無力者

生地黃十斤

右一味搗以酒一斗絞取汁令極盡去渣微火煎減半納白蜜五升裹膏一升以攬之勿止令可丸酒服如雞子一丸日三久服不已老而更少萬病除愈千金又以此二味加阿膠甘草

作煎服亦可用

當歸補血湯寶鑑

治男婦血虛似白虛證肌熱面赤煩渴引飲脈來洪大而虛重按則微

當歸二錢黃耆一兩

右二味水煎服此補血之方

益血潤腸丸

治津液亡大腸祕老人虛人皆可服並祛風養血

熟地六兩杏仁炒

麻仁各三兩以上枳殼

當歸一錢

橘紅淨各二兩五錢阿膠

肉蓯蓉各半

蘇子荆芥各一兩

右為末以前三味膏同杵千餘下仍加蜜丸梧子大每服五六十九空心白

湯下。此牌約九
之變法

苦當膠艾湯金匱

婦人有漏下者有半產後因續下血不絕者有妊娠下血者假令妊娠腹中痛為胞阻

膠艾湯主之

苦窮

阿膠

甘草各二錢

當歸各三兩

芍藥四兩

乾地黃六兩

右六味水五升清酒

三升合煮取三升去滓納膠令消盡溫服一升日三服不瘥更作

四物湯竭治一切血熱血虛血燥諸證

當歸

熟地各三錢

芍藥五分

白芍二錢酒炒

右四味水煎服

此血病之主方

八珍湯治心肺虛損氣血兩虛即四君子湯合四物湯餘依上法

十全大補湯竭治男子婦人諸虛不足五勞七傷不進飲食久病虛損時發潮熱氣攻骨脊拘急疼痛

夜夢遺精面色蒼黃脚膝無力即八珍湯加桂心陳皮

人參養營湯竭治脾肺俱虛發熱惡寒肢體瘦倦食少作瀉

人參

白朮

茯苓

甘草

黃耆

陳皮

當歸各一錢

熟地七分

白芍一錢半

柴胡一錢

桂心一錢遠志五分五味子半分

右十二味加薑三片大棗二枚

此即十全大補湯去川芎加

柴胡四物湯竭治日久虛勞微有寒熱脈沉而數

川芎

當歸

白芍

熟地各一錢五分

柴胡一錢人參

黃耆

甘草

半夏各三錢

右為末水煎服

柴胡加入補藥俱不相合獨此為宜也

免絲子丸和

治督氣虛損五勞七傷脚膝痠疼面目黧黑目眩耳鳴心衝氣短時有溢汗小便數滑

免絲子丸

鹿茸酥炙澤鴻去毛

石龍芮去土淨再用

桂枝附子各一兩

水洗

桂枝附子各一石斛

熟地

茯苓

牛膝焙酒浸山萸肉 繢斷 防風 杜仲

內從容酒炒浸補骨脂酒炒華澄舶

巴戟

沉香

茴香炒各五錢五分五味子 川芎

桑螵蛸酒浸

覆盆子錢各五錢右為細末酒煮麵糊為

九梧子大每服三十九

溫酒下或鹽湯下此等方不過陰陽兼補之法泛而無統近時補劑盡如此然能多而不雜尚屬可取

從容免絲子九 此方不寒不熱助陰生子。

肉從容一兩覆盆子

蛇床子 川芎

當歸

免絲子各一兩二錢

白芍一兩牡蠣鹽泥固凝

烏鵲魚骨各八五味子 防風錢各六錢

艾葉三錢條芩五錢

右為末煉蜜丸如梧子大每服三四

十九鹽湯下早晚皆可服此乃婦人溫經之主方也

餌朮方十金

生朮削去皮炭火急炙令熟空肚飽食之全無藥氣可以當食不假山糧得飲水神祕之

勿傳真於求尤佳此服食之方也

服牛乳方十金 能補虛破氣

牛乳三升薑發半兩末

主補虛損填骨髓長肌肉去客熱

生地黃煎五升外

生薑發之

半兩末

右二味於銅器中水三升和乳合煎取三升頓服日三七日除一切氣

生地黃煎五升外

生薑發之

半兩末

右二味於銅器中水三升和乳合煎取三升頓服日三七日除一切氣

右煎地黃等六味汁三分減一納蜜調入膠末候煎成以器盛之酒和服

阿伽陀藥千金

主諸種病及將息服法久服益人神色無諸病方

類此等即所謂海上奇方如紫金錠之其所治之證皆與本草不相合而不可思議也

確有神驗真不可思議也

紫檀亦可用蘇木

小檗一名山茜草

鬱金

胡椒各五

右為末水和納白中更搗一萬杵丸好

陰乾用

諸咽喉口中熱瘡以水煮升麻湯下桐子大一丸旦服之諸面腫心悶因風起者煮防風湯

服一丸諸四體酸疼。或寒或熱。麻黃湯一丸。諸蠶下部有瘡。吞一丸。又煮艾槐白皮湯研一丸灌下。部諸卒死。冷水服二丸。諸破厥癢。當心帶一丸。又水研一丸。三服。諸被蛇及惡獸等毒。以麗者如相思子研藥一丸服。並以紫檀磨汁和藥塗患處。諸被鬼撓亂。失心癲狂。又汁下。如無青艾乾。又取汁亦可。并隨身帶一丸。諸傳尸水磨雄黃下。諸消渴。朴硝湯下。諸淋。水服二丸。諸疔腫。元參湯下。諸卒胸膈熱苦。竹葉湯下。諸難產。以蓀蔔二七水煮服一丸。薑黃亦得。諸熱瘡。大黃取汁服。又以大黃和藥調塗。諸吐血。若因熱吐者。服之並瘥。因冷吐者。菖蒲汁下。諸鼻中血。刺薑汁下。並研灌鼻。諸噎病。括華汁下。諸赤白帶下。以丹皮刺薑根各二分煮服。後補法。以地榆桑螵蛸桑耳各二分。水二升。煮取一升。分作二服。取汁一合。研藥一二丸服之。諸藥毒惡忤研服。惡瘧。恆山湯下。瘟疫時氣。元參湯下。諸蠶疳濕及心風心驚。戰悸多忘。恍惚嘔吐。黃疸失音。風癇。臍下絞痛。霍亂吐利。小兒驚啼。產後血結。並宜服之。

王屏風散傳 治風邪久留而不散者。自汗不止者。亦宜。

防風

黃耆

白朮

各等分

或

右為細末酒調服

此能固表使風邪不易入加牡蠣名白朮散

盜汗方外

止汗紅粉

麻黃根

牡蠣

煅各一兩

赤石脂

龍骨

各五錢

人參

各三兩

龍骨

枸杞根

白皮

各四兩

大棗

七枚

右為末。以絹袋盛貯。如朴粉用之。

六升煮取二升五合。分六服。

當歸六黃湯

治陰虛有火。盜汗發熱。

當歸

生地

熟地

黃芩

黃連

黃柏

等分

黃耆

加倍

右水煎服。

凡止汗方內俱加浮麥大棗

麥門冬湯三 治漏氣因上焦傷風。時其腠理上焦之氣慄慄滑渾。遇開即出。經氣失道邪氣內著。故有是證。

麥冬 生蘆根 竹茹 白朮各五錢 甘草半錢 茶芩各二兩 人參 陳皮 咸蕤各三兩

右九味每服四錢。薑五片。陳米一撮。煎熱服。不論冬夏頭汗自出。謂漏風俗名蒸龍頭。

二腎散 治積塊進飲食。

橘紅一片 甘草四兩 鹽五錢

右以水煮爛曬乾為末。淡鹽湯下。有塊加薑黃半兩。同前煎。氣滯加香附二兩。氣虛加沉香半兩。另入噤口痢。加蓮肉二兩。

逍遙散方 治肝家血虛火旺。頭痛目眩。煩赤口苦。倦急煩渴。抑鬱不樂。兩肋作痛。寒熱小腹重墜。婦人經水不調。脉弦大而虛。

芍藥酒炒當歸

白朮炒

茯苓

甘草炙

柴胡各二錢

本方加丹皮梔子。即加味逍遙散。

加煨薑三片。薄荷少許。煎服。脾之分膚。

平胃散 墓 治濕淫於內脾胃不能克制。有積飲痞膈中滿者。

蒼朮五斤米泔 陳皮去白厚模

薑汁炒

甘草三十

兩炙

右為末。每服二錢。薑湯下。日三服。或水煎。每服

五錢。如小便赤澀。加茯苓澤瀉。米穀不化。飲食傷多。枳殼。胃中氣不快。心下痞。氣加枳殼木香。心下痞悶。腹脹者。加厚朴。甘草減半。遇夏加炒黃芩。遇雨水濕潤時。加茯苓澤瀉。如有痰涎。加半夏陳皮。款嗽飲食減少。脉細。加當歸黃耆。脈洪大緩。加大黃。大黃連。大便硬。加大黃三錢。芒硝三錢。先嚼熟炒桃仁。爛以藥送下。本方加皂礬。即皂礬平胃丸。消食積。治癰瘡。

五苓散金 治瘦人臍下有悸。吐涎沫而癲眩。此水也。此方主之。以作湯往往鮮效。

澤瀉一兩

分猪苓去皮白朮

右五味為末。白飲服方寸匕。日三服。多飲暖水。

汗出愈。

傷寒論以此方治太陽表裏未清之症。所謂表裏者經與府也。故此方為利膀胱水道之主藥。

二陳湯丸

治肥盛之人。濕痰為患。喘嗽脹滿。

半夏

一錢 茯苓各三錢 陳皮去白甘草一錢

右四味加薑三片。水煎服。

枳朮丸

治痞積消食強胃。

金匱名枳朮湯治心膈大如盤。

枳實

一兩 白朮 二兩

右用荷葉裏燒飯為丸。桐子大。每服五十丸。加木香砂仁。即香砂枳朮丸。本

瀉黃散

治脾胃伏火。口燥唇乾。口瘡口臭煩渴。

藿香

七錢 山梔 一兩 甘草 二兩 防風 四兩

右四味同蜜酒炒為末。每二錢煎服。其妙在用蜜酒炒。

保和丸

治食積酒積。

山楂

二兩 半夏

製橘紅

神曲

麥芽

茯苓

一兩 連翹

萊菔子

炒

黃連

各半

右為末。水丸。

加白朮二兩。名大安丸。

此治脾胃濕熱之方。

加減思食丸

治脾胃俱虛。水穀不化。胸膈痞悶。腹脹時脹。食減嗜臥。口苦無味。虛羸少氣。胸中有寒。飲食不下。反胃惡心。及病後心虛。不勝穀氣。食不服。當並宜服之。

神曲

炒黃 大麥芽

二兩

烏梅

四兩

乾木瓜

半兩 白茯苓

甘草

炒各二

右為末。蜜丸。櫻桃大。每

服一丸。

細嚼白湯送下。如渴時噙化一丸。

此收納胃氣之方。

越鞠湯丸

治一切濕痰食火氣血諸鬱。

香附

蒼朮 檻芎

各二

神曲

山楂仁

各一

右以水煎服。或作丸。菉豆大。每服百丸。白

滾湯下

四磨飲_湯 治七情傷感。上氣喘急。胸膈不快。妨悶不食。

人參 檳榔 沉香 天台烏藥

右四味各濃磨水。取七分煎三五沸。空心溫服。

胸中不即下達亦古製方之法也

妙香丸竭 治時疫傷寒。解毒。治潮熱。積熱及小血驚癇百病。

巴豆三百十五粒去殼心膜炒熟研如粉。巴豆太多宜酌減。牛黃研 龍腦研 脂粉

麝香研各辰砂三兩。金箔研九兩。

右合研匀。煉黃蠟六兩。入白蜜三分。同煉勻為丸。每兩作三十九。如治潮熱。積熱。傷寒。結胸。發黃。狂走。躁熱。口乾面赤。大小便不通。大黃。甘草湯下一丸。毒刺下血。黃連湯調脂粉少許。如患酒毒食毒。茶毒。氣毒。風痰伏居。吐逆等證。並用脂粉。龍腦米飲下。中毒吐血。悶亂煩躁欲死。者用生人血下立愈。小兒百病。驚癇。急慢驚風。涎潮搐搦。用龍腦脂粉。蕎蕷湯下。菉豆大二丸。諸積食積。煩赤煩躁。睡臥不寧。驚哭。瀉利。並用金銀薄荷湯下。更量歲數加減。如男婦因病傷寒時。疫陰陽氣交結。伏毒。氣胃中喘燥。眼赤。潮熱。經七八日至半月日未安。醫所不明。證候。脉息交亂者。可服一丸或分作三丸。亦可並用龍腦脂粉米飲調下。一服取轉下一切惡毒。並亞藥丸瀉下。如要藥即行用鍼刺一孔。冷水浸少時服之。其效更速。凡用端丸之藥既不可化開服。則三分一丸之小丸每服三丸為妥。不能下者。宜作一分一丸之小丸。

藿香正氣散_局 治外受四時不正之氣。內停飲食。頭痛寒熱。或霍亂吐泄。或作瘧疾。

厚朴 陳皮 桔梗 半夏各二兩 甘草一兩 大腹皮換檳榔亦可

白芷 茵苓 蘇葉各三兩

藿香三兩 右十味加薑棗水煎熱服。

此方可治時疫

天水散河間一名益元。散一名六一散。 治夏時中暑。熱傷元氣。內外俱熱。無氣以動。煩渴欲飲。腸胃枯涸者。又能催生。

下乳積聚水腫。裏急後重。暑注下迫者。宜之。

桂府滑石水

六兩 膜甘草一兩

辰砂三錢

右為細末。新汲水一碗調服三錢。滑利清涼通達水道。

二氣丹方 治內虛寒。胸腹滿痛。泄利無度。嘔吐自汗。小便不禁。陽氣漸微。手足厥冷。及傷寒陰症。霍亂轉筋。久下冷痢。少氣羸困。一切虛寒癥冷。

肉桂

硫黃

細研各半錢

乾薑泡

硃砂

另研各二錢

衣黑附子

製五錢

右為末。麵糊丸。桐子大。每服三十

丸。艾湯或鹽湯下。

此治下焦無陽。橫寒犯腎之症。

瀉白散

錢

治肺熱咳嗽

桑皮

炒

地骨皮

各兩

甘草

五錢

右為末。每服一二錢。入梗米百粒。水煎。

此方能治肺中之飲。

三黃湯

碎事

治三焦實熱。一切有餘火症。大便祕結者。

黃芩

大黃

黃連

各等

右三味水煎服。

涼膈散

治心火上盛。中焦燥實。煩躁口渴。目赤頭暍。口瘡唇裂。吐血衄血。大小便祕。諸風瘻癰發班

發。狂。及小兒驚風。痘瘡黑陷。

連翹

四兩

大黃酒浸芒硝

五錢

甘草

二兩

黃芩

酒炒

薄荷

桔子

各一兩

右為末。每服三錢。加竹

葉生薑煎。

此寓中上二焦之火。即調胃

承氣加陳風清火之品也。

四物二連湯

元

治血虛五心煩熱。晝則明了。夜則發熱。

當歸

白芍

炒

生地

各兩

川芎

七分

黃連

炒五分

胡黃連

三分

右六味水煎服。

此方主之。血中有鬱熱。

左金丸

治肝藏火實。左脅作痛。

黃連

大兩

吳茱萸

洗一兩泡

右為末作丸。

吳茱萸景用以治嘔逆吐涎等證。斷續亦瘦飲。

為害也。

兩物皆屬於肝。此方亦不專治左脅。

龍膽瀉肝湯方 治胸痛口苦。耳聾耳腫。筋痿陰濕。熱癢陰腫。白濁溲血。

龍膽酒炒

三分黃芩炒

一錢澤鴻一錢木通

車前子各五分

當歸酒洗二分炒

柴胡一錢甘草

生地酒炒各三份

各散

右十味水煎服。此瀉中上焦之

甘露飲局 治丈夫小兒胃中客熱。牙宣齒爛。目垂欲閉。饑不欲食。及目赤腫痛。口瘡咽腫。瘡疹已發未發。又療脾胃濕熱。醉飽房勞。黃疸腹滿。或時身熱。並宜服之。

枇杷葉

熟地

天冬

枳殼

茵陳

生地

來冬

石斛

甘草炙

黃芩各等
露飲此乃以散

右為末。每二錢水一盞。煎七分。去滓食後臨臥溫服。本事方去來冬加犀角。名加減甘

清心蓮子飲局 治心虛有熱。小便赤澀。

黃芩 莪門冬去心地骨皮

甘草炙

車前子各半

石蓮肉去心

白茯苓去皮黃耆蜜炙

人參各六錢半

右剉散。每三錢另用麥冬十粒水煎八分。水中沉冷空心服。發熱加柴胡薄荷。亦可以散

瀉熱梔子煎量外 治膽府實熱。精神不守。

梔子二十粒竹茹一兩香豉六合大青

橘各二赤蜜三合

右六味以水六升煮取一升七合。去

滓下蜜。再微煎二三沸。分再服。

大順散局 治胃暑伏熱引飲過多。脾胃受濕。水穀不分霍亂嘔吐。臟腑不調。

甘草三十斤長乾薑

杏仁去皮

肉桂各四斤

右先將甘草用白砂糖炒及八分黃熟。次入乾薑同炒令薑裂。次入杏仁又同炒。候不作聲為度。節淨後入肉桂一處搗為散。每服二錢水煎溫服。如煩躁井花水調下。不拘時。沸湯調亦得。此治暑天內傷冷飲之症。非治暑也。又甘草多於諸藥八倍。亦非其

意河居其方本不足取而後之庸醫竟以此治婦人之暑病報人細算故錄此以證其非

十精丸又名保真丸

和紀用經

免絲子人精長陰發陽酒浸一宿溫搗

甘菊花

月精二味

柏子仁

草精益氣

白朮

日精長人參

茱精鎮心療驚

石斛

山精治筋骨如

鹿茸

血精止腰痛

肉蓯蓉

地精破瘀消食

酒浸一宿蒸用

巴戟

天精治精冷益

紫色者去心

藥二味秋加

酒浸一宿

磁石

至三十粒忌生葱

此世所謂丹藥也。溫平補益。

主五勞七傷。欬逆上氣。治寒嗽。通音聲。明日益精。安五臟。通百節。利九竅。下乳汁。益氣補虛。療脚弱冷疼。下焦傷竭。強陰久服延年益壽。令人有子。

成煉鍊乳粉金翼

主

五勞七傷。欬逆上氣。治寒嗽。通音聲。明日益精。安五臟。通百節。利九竅。下乳汁。益氣補虛。療脚弱冷疼。下焦傷竭。強陰久服延年益壽。令人有子。

鍊乳

右取韶州鍊乳。

顏色明淨光澤者不拘多少。置鍊乳於金銀器中。即以大鑄著水沉金銀器於鑄中煮之。常令如魚眼。沸水減即添薄乳三日三夜。粗厚管者七日七夜。候乳色變黃白即熟。如疑生更煮滿十日最佳。出金銀器中。更著清水。更煮經半日許。即出之。水色清不變則止。即於磁鉢中。用玉錠著水研之。每日著水攪令勻。勿使著錠。勿使纖塵入內。研費乾澀即更添水。常令如稀米泔狀。乳細者皆浮在上。粗者沉在下。復繞鉢四邊研之。狀若乳汁。研指上如書中白魚膩即成。澄取曝乾。每服秤半兩分為三服。用溫酒調下空腹服。更量病輕重加減服之。亦可和為丸服之。此鎮心強藥

唐人最
重之

王霜圓局

治真氣虛羸。下焦傷竭。臍腹弦急。腰脚痺痛。精神困倦。面色枯槁。或亡血盜汗。遺瀝失精。二便滑。數肌消陽痿。久服續骨聯筋。祕精堅體。安魂定魄。輕身壯陽。

白龍骨

一斤細搗羅研水飛三次。曬乾用黑

火煅

成粉

紫梢花

代之各三兩

牛膝酒浸炙

乾杵

磁石

七次

醋淬

紫巴戟穿心澤瀉酒浸一宿石斛炙硃砂研肉蓴苔去皮酒浸一宿尚香微炒肉桂去皮各免絲子酒浸一伏時鹿茸半兩酒浸一伏韭子微炒天雄淨以醋二升沃於坑候乾剝熱便投天雄在內宿後取出去皮嚼精納氣腎中陽虛者最宜亦丹藥也

右為細末。煉酒蜜各半和丸如桐子大。每服三十九空心晚食前溫酒下。按此藥酒濃

礞石滾痰丸養生主論治實熱老痰之峻劑。虛寒者不可用。

黃芩

大黃

酒蒸各八兩礞石埋地內一兩焰消煅過沉香

五錢

右四味為細末水丸川椒大量人大小用

之用。溫水一口送過咽即仰臥令藥徐徐而下。半日不可飲食勿起身行動言語待藥氣自胃口漸下二腸然後動作飲食。服後喉間稠黏壅滯不快此藥力相攻故痰氣從上也少頃藥力至而漸逐惡物入腹下腸效如響應下結痰之主方

黑錫丹局治脾元久冷上實下虛胸中痰飲或上攻頭目及奔豚上氣兩脅脹脹並陰陽氣不升降五種水氣脚氣上攻或卒暴中風皮潮上膈等症

沉香

附子

胡蘆巴

肉桂

半兩茴香

破故紙

肉豆蔻

金鈴子

木香各一兩

黑錫

硫黃

與黑錫結砂子各三兩

右為末同研酒煮麵糊為丸梧子大陰乾以布袋擦令光

瑩每服四十九薑湯下此鎮納上越之陽氣為醫家必備之要藥

按黑成砂最難加冰糖少許亦可炒

龍腦雞蘇丸局治上焦熱除煩解勞去肺熱咳嗽血熱驚悸脾胃熱口甘吐血肝膽熱泣出口苦腎熱神志不定上而酒毒膈熱消渴下而血滯五淋血崩

薄荷一斤生地六兩黃芩一兩

新蒲黃

炒半兩麥冬

阿膠

人參

木通

銀柴胡各二兩

日夜煎汁通沸湯浸一通夜煎汁

甘草一兩黃連一兩

右為末。好蜜二斤先煎一二沸然後下生地末不住手攪時加

木通柴胡汁。慢火熬膏。勿令火緊。膏成。然後加藥末和九豌豆大。每服二十丸。白湯下。此方凜虛勞虛煩。梔子湯下。肺熱黃芩湯下。心熱悸動。恍惚人參湯下。衄血吐血。麥冬湯下。肝熱防風湯下。腎熱黃柏湯下。以上並食後臨臥服。治五淋及婦人漏下。車前湯下。癰癩者。生薑湯下。掣痛者。蒲黃滑石水一鍾調下。氣逆橘皮湯下。室女虛勞。寒熱潮作。柴胡人參湯下。按生地末不若鮮者一斤同蜜熬成膏尤薄荷太多宜減十分之九想製方之人所用薄荷乃他處之薄荷非蘇州之真龍腦也。真龍腦芳烈透腦。機魄大過反有所害故醫者不可不知藥也。

至寶丹局 治中惡氣絕。中風不語。中諸物毒。熱疫煩躁。氣喘吐逆。難產悶亂。死胎不下。以上並用童便一合。生薑自然汁三五滴。和溫化下三丸。至五丸。神效。又治肝肺積熱。嘔吐邪氣攻心。大腸風祕。神魂恍惚。頭目昏眩。口乾不眠。傷寒狂語。並治之。

生烏犀屑

生玳瑁屑

琥珀研

硃砂研飛

雄黃研細各一兩

龍腦

麝香研各一分

牛黃研五錢

安息香

一兩半為末。酒研飛淨。雨熱膏用。水安息尤妙。

銀箔金箔各五十片研細為衣

右將生犀玳瑁為細末。入餘藥研勻。將安息香膏重湯煮凝成後。入諸藥中。和搗成劑丸。如桐子大。用參湯化下三丸。至五丸。又治小兒諸癇急驚。心熱卒中。客忤不得眠。煩躁風涎。搐搦。每一年兒服二丸。人參湯下。本事方中。多人參南星天竺

黃安神定魄丸。補之方。真神丹也。

蘇合香丸局 療傅屍骨蒸。瘡瘍肺癰。疰忤鬼氣。卒心痛。霍亂吐利。時氣瘡瘍。赤白暴利。瘀血口閉。痘癰丁腫。驚癇。小兒吐乳。大人狐狸等疾。

蘇合香油

五錢入安息香丸。另為末用。無

丁香

青木香

白檀香

沉香

草撥

香附子

荳子

梗取

烏犀

礬

硃砂

水飄

各薰

陸香

片腦

研各五錢。麝香一錢。

右為細末。入安

息香膏

煉蜜和劑

圓如芡實大

每四丸

空心用沸湯化下

溫酒下亦得

冰麝

太多宜減

大半

瓊玉膏申先 生方 治虛勞乾咳。

生地黃

四斤若取鮮生地汁須用十斤

白茯苓

十二兩

白蜜二斤

人參六兩

有加沉香血

右以地黃汁同蜜熬沸用

物各一錢五分

絹濾過將參茯為細末

入前汁和勻以磁瓶用綿紙十數層加箬葉封瓶口入砂鍋內

以長流水沒瓶

頸垂柴火煮三晝夜取出換紙禁口以蠟封固

懸井中一日取起仍煮半日湯調服

此方別本製法

此為血證第

一方按乾淮生地四斤浸透可取自然汁一斤若浙地則十斤

紙取自一斤須三十斤方可配諸藥故修合之法當隨時隨地實通也

大活絡丹濟

治一切中風癱瘓瘧癆痰厥拘攣疼痛癰疽流注跌撲損傷小兒驚癇婦人停經

白花蛇

烏梢蛇

威靈仙

兩頭尖俱酒

草烏

天麻

全蝎去毒首烏

水浸

龜板

炙黃

貫仲

沉香以上各細辛

羌活

官桂

藿香

烏藥

乳香另研去油

殼蠶

大黃

蒸

木香

沉香二兩各細辛

赤芍

沒藥另研去油

丁香

當歸各半錢

血竭

葛根

天南星

薑製青皮

骨碎補

白蔻

安息香酒熬黑附子製

虎胫骨

當歸各半錢

血竭

茯苓

香附

酒浸元參

白朮

以上各防風

葛根

牛黃

另研各半錢

牛黃另研

松脂各半錢

另研各半錢

地龍

炙

犀角

麝香另研

牛黃另研

片腦

另研各半錢

另研各半錢

另研各半錢

另研各半錢

蜜丸

如桂圓核大

金泊為衣陳酒送下

證必備之藥也

方書亦有活絡丹

紙用地龍乳香等四五味此

乃治藜蘆人實邪

之方不堪用也

紫雪

局

療脚氣口中生瘡狂易叫走瘡疫毒屬卒死溫瘧五戶五注心腹諸疾疔瘍及解諸熱毒藥邪

熱卒黃等症并解蠱毒兔魅野道熱毒又治小兒驚癇百病

黃金

一兩

寒水石

磁石

石膏

滑石各三

以上並搗碎

用水一斛煮至四斗去滓入下

藥

羚羊角屑

犀角屑

青木香

沉香各五

丁香一

元參

升麻各一

甘草八兩以上入前藥汁中。再煮取一斗五升。去渣入下藥。朴硝十斤。硝石四斤。二味入前藥汁中。微火上煎。柳木蕊攬不住手。候有七升。投在木盆中。半日欲凝入下藥。麝香當門子錢半兩。

硃砂三兩。上藥入前藥中。攬調令勻。磁器收藏。藥成霜雪紫色。水調下。按二硝太多。當只用十分之二。則藥力方厚。丁香用二兩。

余所合者皆然。方中黃金百兩。以鼎金一萬頁代之。尤妙。


邪火毒火穿經入臟。無藥可治。比能消解其效如神。

解毒萬病丹金瓶 治一切藥毒。蒜子。鼠莽。惡菌。疫死牛馬河豚等毒。及時行瘟疫。山風瘡瘍。猩喉風。瘡黃痘。亦眼瘡瘍。熱毒上攻。或自縊溺水。打撲傷損。癰疽發背。魚膚瘡腫。百蟲蛇犬所傷。男子婦人癩。邪狂走鬼胎。鬼氣並宜服之。

山茨菰去皮洗淨 川文蛤一名五棓子。搗破 千金子去殼用紙包裹。細研。盡去盡油。無油成霜。 二兩。麝香三錢。

紅芽大戰洗培 右各研細末。和勻。以糯米粥為劑。每料分作四十粒。於端午七夕。重陽合如欲急用。辰日亦得。於木臼中杵數百下。不得令婦人孝服。人不具手足。人及雞犬之類。見之一。此祕集中之第

之奇不可思議。或入加味。砂雄黃各五錢。尤妙。



蘭臺軌範卷二

吳江徐靈胎洞深著

風

靈素

素問風論篇曰風之傷人也或為寒熱或為熱中或為寒中或為癘風或為偏枯或為風也其病各異其名不同或內至五臟六腑不知其解顧聞其說岐伯對曰風氣藏於皮膚之間內不得通外不得泄風者善行而數變腠理開則灑然寒閉則熱而悶其寒也則衰食飲其熱也則消肌肉故使人怯慄而不能食名曰寒熱風氣與陽明入胃循脈而上至目內眥其入肥則風氣不得外泄則為熱中而目黃人瘦則外泄而寒則為寒中而泣出風氣與太陽俱入行諸脉俞散於分肉之間與衛氣相干其道不利故使肌肉憤悶而有瘡衛風有所凝而不行故其肉有不仁也癰者有榮氣熱腑其氣不清故使鼻柱壞而色敗皮膚瘍潰風寒客於脉而不去名曰癰風或名寒熱以春甲子傷於風者為肝風以夏丙丁傷於風者為心風以季夏戊己傷於邪者為脾風以秋庚辛中於邪者為肺風以冬壬癸中於邪者為腎風風中五臟六腑之俞亦為臟腑之風各入其門戶所中則為偏風風氣循風府而上則為腦風風入係頭則為目風眼寒飲酒中風則為漏風入房汗出中風則為內風新沐中風則為首風久風入中則為陽風飧泄外在腠理則為泄風故風者百病之長也至其變化乃為他病也肺風之狀多汗惡風色鮮白時發短氣晝日則差暮則甚其診在眉上其色白心風之狀多汗惡風焦絕善怒噦亦色病甚則言不可快診在口其色赤肝風之狀多汗惡風蓋悲色微蒼嗌乾善怒時憎女子診目下其色青脾風之狀多汗惡風身體急惰四肢不欲動色薄微黃不嗜食診在鼻上其色黃腎風之狀多汗惡風面龐淡浮腫脊痛不能正立其

色照隱曲不利。診在肌上其色黑。冒風之狀。頭多汗惡風。食飲不下。膈塞不通。腹善滿。失衣則腹脹。食寒則泄。診形瘦而腹大。首風之狀。頭面多汗惡風。當先風一日。則病甚。頭痛不可以出納。至其風日。則病少愈。漏風之狀。或多汗。常不可單衣。食則汗出甚。則身汗喘息。惡風衣常濡。口乾善渴。不能勞事。身體盡痛則寒。辨症斷不至誤治也。諸風病狀各殊。其多汗惡風同。傷風畏風。陽風自汗。凡七情六淫之病。必有現症能平人氣象論。面腫曰風。

風厥勞風。評熱病論。岐伯曰。汗出而身熱者。風也。汗出而煩滿不解者。厥也。病名曰風厥。氣逆甚即名風厥。帝曰。願卒聞之。岐伯曰。巨陽生氣。故先受邪。少陰與其為表裏也。得熱則上從之。從之則厥也。少陰之氣上乃能厥。帝曰。治之奈何。岐伯曰。表裏刺之。飲之服湯。帝曰。勞風為病何如。岐伯曰。勞風法在肺下。其為病也。使人強上冥視。唾出若涕。惡風而振寒。此為勞風之病。帝曰。治之奈何。岐伯曰。以救俛仰巨陽引精者三日。中年者五日。不精者七日。放出青黃涕。其狀如膿。大如彈丸。從口中若鼻中出。不出則傷肺。傷肺則死也。肺最當體認。若認以為肺癰。肺痿。則失之遠矣。蓋肺癰乃肺癰。肺痿屬此。則風寒入肺。痰涎凝結也。

酒風 病能論。帝曰。有病身熱解墮。汗出如浴。惡風少氣。此為何病。岐伯曰。病名曰酒風。

偏枯 生氣通天論。汗出偏沮。使人偏枯。

癥 靈樞熱病篇之為病。身無痛者。四肢不收。智亂不甚。其言微知可治。甚則不能言。不可治也。

金匱

夫風之為病。當牛身不遂。或但臂不遂者。此為渾脈微而數。中風使然。寸口脉浮而緊。緊則為寒。浮則為虛。寒虛相搏。邪在皮膚。浮為血虛。絡脈空虛。賊邪不滲。或左或右。邪氣反緩。正氣即急。病在緩處。故外治必塗其緩者。邪引邪。喝僻不遂。邪在於絡。肌膚不仁。邪在於經。即重不勝。邪入於腑。即不識人。邪入於臟。舌即難言。

口吐涎此辨證要訣寸口脉遲而緩。遲則為寒。緩則為虛。榮緩則為亡血。衛緩則為中風。邪氣中經則身癢而癰疼。心氣不足。邪氣入中。則胸滿而短氣。

傷寒論

脈浮而太浮為風虛。大為氣強。風氣相搏必成癰疼。身體為癰。癰者名泄風。久風為加癰。

病源

風癰 風邪之氣若先發於陰。病發於五臟者其狀奄忽不知人。喉裏噫噫然有聲。舌強不能言。發汗身軟者可治。眼下及鼻人中左右上白者可治。黑赤吐沫者不可治。汗不出體直者七日死。口噤 諸陽經筋皆在於頭三陽之筋并絡入領頰夾於口。諸陽為風寒所客則筋急故口噤不開也。證其脉遲者生。

舌強 脾脈絡胃夾咽連舌本散舌下心之別脈係舌本今心脾二臟受風邪故舌強不得語也。

賊風 冬至之日有疾風從南方來名曰虛風其傷人也但痛不可按抑轉動傷風令則骨解深痛按之乃應骨痛也但覺身內索索冷欲得熱物熨痛處即小竇時有汗久不去重遇冷氣相搏結成癰癰及偏枯遇風熱相搏乃變附骨疽也附骨疽亦由風冷所致

風瘻 口噤不開背強而直如發瘻之狀其重者耳中策策痛卒然身體痙直者死也由風邪傷於太陽經復遇寒濕則發瘻也此與病後瘻證之輕不同

角弓反張 風邪傷人令腰背反折不能俛仰似角弓者由邪入諸陽經故也

柔風 血氣俱虛風邪并入在於陽則皮膚緩在於陰則腹裏急柔風之狀四肢不能收裏急不能仰不仁 由榮氣虛衛氣實風寒入於肌肉使血氣不宣流其狀搔之皮膚如隔衣是也

風驚悸 由心氣不足。心府為風邪所乘。則驚不自安。悸動不定。其狀目精不轉。而不得呼。

刺風 由體虛膚腠開為風所侵。如刀錐所刺也。

盞風 由體虛受風。其風在於皮膚。淫淫躍躍。若晝若刺。一身盡痛。侵傷氣血。其動作如盞垂也。
此乃爛風也

鬚眉墮落 皆由風濕冷得之。邪客於經絡。與血氣相干。使榮衛不和。故面色敗。皮膚傷。鼻柱壞。鬚眉落。

口渴

養生方云。夜臥當耳勿得有孔。風入耳中。喜食口渴。
口渴見金匱。此又是一病。

外臺

風猥退 四肢不收。身體疼痛。肌肉虛滿。骨節懈急。腰脚緩弱。由分肉流於血脉。久成風水之病。
蟬曳 肢體弛緩。不收攝也。人以胃氣養肌肉。經脉。胃氣衰損。則經脈虛而筋肉懈惰。故風邪搏於筋而使蟬曳也。

風毒發 眼疼脚縱。中指夜連肘邊。牽心裏悶。肋脹少氣。喘氣欲絕。不能食。

風方

酒風陳 治身熱懈惰。汗出如浴。惡風少氣。

澤鴻

尤裕十

麋銜

五分合

以三指撮

為後飯

平微寒

主治風

濕

三指

為一撮

約二三錢

飯後

藥

性乃能深

知其義

先為後飯。按麋銜疑即鹿啣草。為後飯服在飯後半飯。箭也。凡古方須將神農本草細參藥性。乃能深知其義。

侯氏黑散金匱 治大風四肢煩重。心中惡寒。不足者。

菊花四十白朮十分細辛三分茯苓三分牡蠣三分桔梗八分防風十分人參 磬石各三

黃芩五分當歸

乾薑 茵羈 桂枝各三

右十四味杵為散酒服方寸匕日一服初服

二十日溫酒調服。禁一切魚肉大葷。常宜冷服六十日止。即藥積在腹中不下也。熱食即下。矣。冷食自能助藥力。滿空隙使邪氣不能容

風引湯匱除熱癲癇 築氏云脚氣宜風引湯

大黃

乾薑

龍骨各四

桂枝三兩

甘草

牡蠣各二

寒水石

滑石

赤石脂

白石脂

紫石英

石膏各六

右十二味杵粗節以韋囊盛之取三指撮

井花水三升煮三

沸溫服一升。

此乃臘月之熱非草木之品所
能敵故以金石重藥清其裏

防己地黃湯金匱

治病如狂狀妄行獨語不休無寒熱其脈浮。

防己一分桂枝 防風各二

甘草一分

右四味以酒一杯浸之一宿絞取汁生地黃二斤㕮咀

蒸之如斗米飯久以銅器盛其汁更絞地黃汁和分再服。

此方他藥輕而生地獨重乃治血中之風也
等法最宜細玩 凡風勝則燥又風能發

火故治風藥中無
純用燥熱之理

頭風摩散匱

大附子一枚 盡等分

右二味為散末了以方寸匕已摩拭上令藥力行。

越婢湯金匱

風水惡風一身悉腫脉浮不渴續自汗出無大汗者主之。

麻黃六兩

石膏半斤生薑三兩 甘草二兩 大棗十五

右五味以水六升先煮麻黃去上沫納諸藥。

煮取二升分溫三服惡風加附子一枚本方加白朮四兩即越婢加朮湯

越婢寒散之方也 治風熱在表之證

小續命湯針 治卒中風欲死身體緩急口目不正舌強不能言奄奄忽忽精神悶亂諸風服之皆驗

麻黃 防己 人參 黃芩 桂心 芍藥 甘草 川芎 杏仁各一

防風半兩 附子一枚 生薑五兩

右十二味㕮咀以水一斗二升先煮麻黃三沸去沫納諸藥煮取

三升分三服不瘥更合三四劑隨人風輕重虛實脚弱服之亦瘥。恍惚者加茯神遠志骨節痠煩有熱

者去附子倍芍藥外臺加白朮一兩石膏當歸各二兩無防已。續命為中風之主方因證加減變化由義人自為說流轉無窮而中風一證遂十不愈一矣人而總不能舍此以立法後人不知此必醫見其有寒象而後可加然尤宜於西北人若東南人則當詳審勿輕試

錄驗續命湯 治中風非身體不能自收口不能言。冒昧不知痛處或拘急不得轉側。

麻黃 桂枝 當歸 人參 石膏 乾薑 甘草各三 川芎 杏仁四十 右

九味以水一斗煮取四升溫服一升當小汗薄覆脊憑几坐汗出則愈不汗更服無所禁勿當風并治但伏不得臥咳逆上氣面目浮腫虛而感風則成非此治非證之主方

近效丸附湯 治風虛頭重眩苦極不知食味暖肌補中益精氣。

白朮二兩 附子一枚半

泡去皮甘草一兩

右三味剉每五錢匕薑五片棗一枚水盞生煎七分去滓溫服

此治中風後陽虛之證按古今錄驗近效二種乃唐以前之方書今全本未見外臺中引二書之方極多金匱要略宋人校書者往往以本集中載方太少故亦採取二書并干金外臺之外擇其精要者附一二方於每病之後而方首亦必不沒其所本之書古人之不苟如此今人見其方載入金匱中即以為仲景所定之方誤矣須知之

地黃煎金治熱風心煩悶及脾胃間熱不下食方

生地黃汁 柏杞根汁各二 生薑汁 酥各三 荆瀝

竹瀝各五 天門冬

人參各八

茯苓六兩 大黃

梔子各四

右十一味搗篩五物為散先煎地黃等汁成膏納散攪匀每服一

匕日再漸加至三七覺利減人反以剛燥辛熱之品治之是益其疾也今

三黃湯針 治中風手足拘急百節疼痛煩熱心亂惡寒經日不欲飲食

麻黃五分 獨活四分 細辛

黃耆各二 黃芩三分

右五味以水六升煮取二升分溫三服一服

小汗二服。大汗心熱。加大黃二分。腹滿。加枳實一枚。氣逆。加入參三分。悸。加牡蠣三分。渴。加括鬚根三分。先有寒。加附子一枚。此方傳以驅風為治

風痱方針 治手足不遂。瘡直。伏龍肝五升為末。冷水八升。攬取汁飲之。能盡為害。

治半身不遂方針 磬沙兩石。熟蒸。分作貞袋三枚。熱盛一袋。著患處。如冷換熱者。數易之。瘥後。須早肚釀粳米。葱白。薑。椒。豉等。爛煮熟。日食一具。十日止。按此法熨

治風懿方 竹瀝一升 治半身不遂。手足拘急。身冷強直。不語。或狂言角弓反張。或食或不食。或大小便不利。治風懿之法與治風痱之法不相遠

口眼喎僻方 千金翼 治中風面目相引。偏僻牙車急舌不轉。

牡蠣熬 磬石燒 附子泡去皮 伏龍肝等分 右四味。搗節為散。以三歲雄雞血和藥敷上。預候看。

勿令太過。偏右塗左。偏左塗右。正則洗去之。

又方 千金翼 治風著人面。引口偏著耳牙車急舌不得轉。

生地黃汁 竹瀝各一獨活三兩 右三味合煎取一升。頓服之即愈。經活血風舒

開心肥健方 千金翼

人參五兩

大豬肪八枚

右二味搗入參為散。猪肪煎取凝。每服以人參一分。猪脂十分。以酒半升

和服之。一百日。骨髓充盈。日記十言。身體潤澤。去熱風冷風心頭等風。月服二升半。即有大效。此方治老人及

風燥者最宜

一切風虛方 十金翼

杏仁九升去尖及

右一味搗為末。以水九升研濾。如作粥法緩火煎。令如麻浮上。匙取和羹粥酒

內一匙服之。每食即服。不限多少。服七日後。大汗出。二十日後。汗止。慎風冷。猪魚雞蒜大醋一劑後。諸風減差。春夏恐酸少作服。秋九月後煎之。此法神妙可深秘之。此即作杏酪之法。服食最宜。

竹瀝湯外臺 治諸中風。

竹瀝二升 生葛根一升亦當用汁按 生薑十三合

右三味分三服。日三。

此通經絡之法

卒不得語方外臺 以苦酒煮芥子薄頸一周。以衣包之一日一夕乃解瘥。

中風不語寶鑑 取龜尿點石。取龜尿法。置龜於新荷葉上。以猪髮鼻內截之。立出。

地黃飲子宣明 治中風舌瘡不能言。足廢不能行。此少陰氣厥不至。名曰風痱。急當溫之。

熟地

山茱萸

五味子

旋谷酒浸 石斛

麥冬

石菖蒲

遠志

茯苓

桂心

附子炮

巴戟去心等分 薄荷葉

右十三味。每服三錢。生薑五片。棗一枚。煎服。

風氣甚而有火多痰

者忌服。此治少陰氣厥之方。所謂類中風也。故全屬補腎之藥。庸醫不察。竟以之治一切中風之證。輕則永無愈期。甚則益其病而致死。醫者病家終身不悟也。

稀涎散局方 治中風牙關緊急。并治單蛾雙蛾。

江子仁六粒 牙皂三錢 明礬一兩

右先化開。磬入二味。待磬枯為末。每用二分。吹入喉中。

此急救法。開喉

喉之法

稀痘丸本事 治口眼喎斜。偏風失音。不語。時時吐涎。久服。并眼目清明。長鬚鬚黑。筋骨強健。

稀痘 五月中取葉及嫩枝。洗九蒸九曬。微焙為末。煉蜜丸。桐子大。溫酒或米飲下三四十丸。余按

蕷瀝汁熬膏打末為丸尤有力。此緩治之劑。非一時救病之法。

控涎丹三因

甘遂

大戟

白芥子等分

右為末。煮糊丸。桐子大。曬乾。臥時淡鹽湯。或熱湯下五七丸。至

十九。此乃下風之方人

實證

滌痰散嚴氏 治中風痰迷心竅。舌蹇不能言。

南星

薑製半夏各一錢半 枳實

茯苓

各二錢 石菖蒲

人參

各一錢 竹茹

七分 甘草

五分

勝金丸本事 治中風忽然昏倒若醉。形體昏悶。四肢不收。風涎潮於上膈。氣閉不通。

生薄荷

半兩 猪牙皂角

一兩搗碎水一升

二味研成膏

爪蒂木

一兩 梨蘆

二兩 研成末

硃砂

五錢 託研

右將硃砂末二分。與二味研勻。用膏子搗和丸如龍眼大。以硃砂一分為衣。溫酒化下一丸。甚者二丸。以吐為度。得吐即醒。不醒者不治。見其痰在上膈則可用否

銀液丹丸 治諸風痰涎。結心膈滿。頭漏目運。面熱心忪。痰唾稠黏。精神昏憊。及風涎潮搐。並宜服之。

天南星

三分為末硃砂半兩研飛

鐵粉

水銀

各三兩 水銀結砂子

粉研

一兩黑鉛塊同甘草三十兩與水銀結砂為水

右研勻。麵糊丸梧桐子大。每服二丸。同薄荷湯下。生薑湯亦可。微為度。食後服。如治風癇。不計時候。

脣瘡逆上用此鎮壓亦不可少 脣瘡逆上用此鎮壓亦不可少

前方提之使

下隨宜施治全在辨證之確

鴉風方 治眉落鼻瘻。偏體生瘻。出神仙感遇傳。

角刺

燒灰一二升 大黃

蒸

右為末。再煎大黃湯服方寸匕。旬日即愈。

青州白圓

通治

痘瘡節

靈素

靈周脾論黃帝曰願聞衆瘡岐伯對曰此各在其處更發更止居更起以右應左以左應右非能周也更發更休也帝曰善願聞周瘡何如岐伯對曰周瘡者在於血脉之中隨脈以上隨脈以下不能左右各當其所。帝曰善此痛安在何因而有名岐伯對曰風寒濕氣客於外分內之間迫切而為沫沫得寒則聚聚則排分內而分裂也經中無疫字沫即疫也分裂則痛痛則神歸之神歸之則熱熱則痛解痛解則厥厥則他瘡發發則如是此內不在臟而外未發於皮獨居分肉之間真氣不能周故曰周瘡

深瘡 九鍼十二原篇八風傷人內舍於骨解腰脊節腠理之間為深瘡

風瘡 壽夭剛柔篇病在陽者命曰風病在陰者命曰瘡陰陽俱病者命曰風瘡二病之殊兩言而定

寒瘡 壽夭剛柔篇寒瘡之為病也留而不去時痛而皮不仁

素問瘡論帝問瘡之安生岐伯對曰風寒濕三氣雜至合而為瘡也其風氣勝者為行瘡寒氣勝者為痛瘡濕氣勝者為著瘡也凡瘡之客五臟者客五臟脾氣入肺瘡者煩滿喘而嘔心瘡者脉不通煩則心下鼓暴上氣而喘乾善噫廢氣上則恐肝瘡者夜卧則驚多飲數小便上為引如懷腎瘡者善脹反以代踵脊以代頭脾瘡者四肢懈墜發咳嘔汁上為大塞腸瘡者數飲而出不得中氣喘爭時發飧泄胞瘡者少腹膀胱按之內痛若沃以湯灑於小便上為清潔陰氣者靜則神藏躁則消亡飲食自倍腸胃乃傷淫氣喘息瘡聚在肺淫氣憂患瘡聚在心淫氣遺溺瘡聚在腎淫氣絕瘡聚在脾諸瘡不已亦益內也其風氣勝者其人易已也帝曰瘡其時有死者有疾久者有易已者其故何也岐伯曰其入臟者死其留連筋骨間者久其留皮膚間者易已帝曰其客於六腑者何也岐伯曰此亦其食飲居處為其病本也帝曰榮衛之氣亦令人瘡乎岐伯曰榮者水穀之精氣也和調於五臟灌陳於六腑乃能入於脉也故循脈上下貫五臟絡六腑也衛者水穀之悍氣也其氣剽疾滑利不能入於脉也故循皮

膚之中分肉之間。重於肓膜散於胸腹。逆其氣則病。從其氣則愈。不與風寒濕氣合。故不為痺。帝曰善。痺或痛或不痛。或不仁。或寒或熱。或燥或濕。其故何也。岐伯曰。痛者寒氣多也。有寒故痛也。其不痛不仁者。病久入深。榮衛之行。滯經絡。特疎。故不通。皮膚不榮。故為不仁。其寒者陽氣少。陰氣多。與病相益。故寒其熱者。陽氣多。陰氣少。病氣勝陽。曹陰故為痺。其多汗而濡者。此其逢濕甚也。陽氣少。陰氣盛。兩氣相感。故汗出而濡也。帝曰。夫痺之為病。不痛何也。岐伯曰。痺在於骨。則重。在於脉。則血凝而不流。在於筋。則屈不伸。在於肉。則不仁。在於皮。則寒。故具此五者。則不痛也。凡痺之類。逢寒則蟲。逢熱則痏。

陰痺至真要大論。陰痺者。按之不得。腰脊頭項痛。時眩。大便難。陰氣不用。餓不欲食。咳唾則有血。心如懸。病本於腎。

筋肌骨痺長刺節論。病在筋。筋蠻節痛。不可以行。名曰筋痺。病在肌膚。肌膚惡痛。名曰肌痺。病在骨。骨重不可舉。骨髓酸痛。寒氣至。名曰骨痺。

肉苛逆調論。帝曰。人之肉苛者。雖近於衣絮。猶尚苛也。是為何疾。岐伯曰。榮氣虛。衛氣實也。榮氣虛。則不仁。衛氣虛。則不用。榮衛俱虛。則不仁且不用。肉如故也。人身與志不相有。曰死。

金匱

問曰。血痺病從何得之。師曰。夫尊榮人。骨弱肌膚盛。重因疲勞汗出。臥不時動搖。加被微風。遂得之。但以脉自微濇。在寸口關上。小緊宜鍼。引陽氣令脉和緊去。則愈。寸口脉沉而弱。沉即主骨弱。即主筋沉。即為腎弱。即為肝。汗出入水中。如水傷心。歷節痛。黃汗出。故曰歷節。少陰脉浮而弱。弱則血不足。浮則為風。風血相搏。即疼痛如掣。盛人脉濇。小短氣自汗出。歷節反不可屈伸。此皆飲酒汗出。當風所致。味酸則傷筋。筋傷則緩。名曰弛緩。則傷骨。骨傷則痿。名曰枯槁泄。相搏。名曰斷泄。榮氣不通。衛不獨行。榮衛

俱微三焦無所御。四屬斷絕身體羸瘦。獨足腫大。黃汗出。脛冷。假令發熱。便為歷節也。

痺歷節方

痺症方 靈樞 治之以馬膏。膏其急者。以白酒和桂。以塗其緩者。以桑鈎鈎之。即以生桑炭置之坎中高下。

青其急者。白酒鍊桂性味辛溫。能通經絡行血脉。故可以塗其緩者。桑之性平。能利關節。除風寒濕痺。諸痛。故以桑鈎鈎之者。鈎正其口也。復以生桑火炭置之地坎之中。高下以坐等者。欲其淺深適中。便於坐而得其暖也。然後以前膏熨其急煩且飲之美酒。噉之美肉者。皆助血舒筋法也。雖不善飲亦自強之三拊而已。言再三拊摩其患處。則病亦已矣。筋骨之病總在軀殼。古法多用外治。今人不能知矣。

寒痺熨法 靈樞 用醇酒二十升。蜀椒一升。乾薑一斤。桂心一斤。凡四種皆㕮咀。瀆酒中。用綿絮一斤。細白布四丈。并納酒中。置酒馬矢溫中。馬矢溫中者燃馬屎而燶之也。 蓋封塗勿使泄。五日五夜出布。綿絮曝乾之。乾後復

瀆以盡其汁。每瀆必辟。辟周 其日乃出乾。并用淳綿絮複布為複巾。重布為中。如今之央袋。所以盛此綿絮藥淳也。 長六七尺。為六七巾。則用生桑炭炙巾以熨寒痺所刺之處。令熱入。至於病所。熨寒痺所刺。則知先已利過然。法亦當考明。 後熨之。若不刺而徒熨。恐藥性不易入。則刺寒復炙巾以熨之三十遍而止。汗出以巾拭身。亦三十遍而止。

黃耆桂枝五物湯 金匱 治血痺。陰陽俱微。寸口脈上微尺中小緊外證。身體不仁。如風痺狀。

黃耆 芍藥桂枝各三兩 生薑六兩 大棗十二枚 右五味以水六升煮取二升。溫服七合。日三服。一方有人參。此即桂枝湯以黃耆易甘草。乃衛虛榮弱之方。固衛即以護榮。

桂枝芍藥知母湯 金匱 治肢節疼痛。身體尪羸。脚腫如脫。頭眩短氣。溫渴欲吐。

桂枝四兩 芍藥三兩 甘草 二兩 麻黃 一兩 附子炮各一兩 生薑 二兩 血丸各五個 知母四兩 右九味以水

七升煮取二升。溫服七合。日三服。此為陽虛之症。

烏頭湯 金匱 治歷節疼痛。不可屈伸。

麻黃 荘藥 黃耆

甘草炙各三兩烏頭三枚咬咀以蜜二升
煮取一升即出烏頭入

右五味咬咀四味水三升煮

取一升去滓納蜜煎中更煎之服七合不知更服之其煎法精妙可師風寒入節非此不能通達陽氣入

獨活寄生湯針 治風寒濕痹偏枯脚氣

獨活三兩

桑寄生

秦艽

細辛

歸身

生地

白芍

川芎

桂心

茯苓

杜仲

牛膝

人參

甘草

芍等

一方有防風

右十四味爲粗末每服四錢煎

服治之方

舒筋飲

治臂痛不能舉由氣血凝滯經絡不能行所致非風非濕腰以下食前服腰以上食後服

片薑黃

二錢如無以
義赤代之

赤芍

當歸

海桐皮

去粗皮五分
錢

白朮各一錢

羌活

炙甘草

各一錢

右七

味加薑三片煎服磨沖沉香汁少許

拔瘻膏

用生半夏爲末同廣膠等分先用薑汁將膏煎烊調入半夏金

史國公酒方

聖惠

治中風語言謇澁手足拘挛半身不遂瘻癱不仁

當歸酒洗

虎腥骨

酒浸一日
焙乾醋炙羌活

龍甲

炙

萆薢

防風

秦艽

牛膝

松節

晚蠶沙

二兩

枸杞子五兩

柏根

八兩蒸

右為粗末絹袋盛

浸無灰酒一斗

十日取飲

半身不遂外治方

大活絡丹

指迷茯苓丸
通治

瘻

素問

素問瘻論黃帝問曰五臟使人瘻何也岐伯對曰肺主身之皮毛心主身之血脉肝主身之筋膜脾主身之肌肉腎主身之骨髓故肺熱葉焦則皮毛虛弱急薄者則生瘻變也心氣熱而下肺厥而上上則下脉

虛虛則生。脉痿樞折。掣而不任地也。肝氣熱則膽泄口苦。筋膜乾。筋膜乾則脛急而攣。發為筋痿。脾氣熱則胃乾而渴。肌肉不仁。發為肉痿。腎氣熱則腰脊不舉。骨枯而髓減。發為骨痿。帝曰。何以得之。岐伯曰。肺者臟之長也。為心之蓋也。有所失亡。所求不得。則發肺鳴。鳴則肺熱葉焦。發為痿變。此之謂也。人治痿而用燥熱之藥。俱誤。悲哀太甚。則胞絡絕。胞絡絕則陽氣內動。發則心下崩數溲血也。故本病曰大經空虛。發為肌痺。傳為脉痿。思想無窮。所願不得。意淫於外。入房太甚。宗筋弛縱。發為筋痿。及為白淫。故下經曰。筋痿者。生於肝。使內也有漸於濕。以水為事。若有所留。居處相濕。肌肉濡漬。痺而不仁。發為肉痿。故下經曰。肉痿者。得之濕地也。有所遠行。勞倦。逢大熱而渴。渴則陽氣內伐。內伐則熱。舍於腎。腎者。水臟也。今水不勝火。則骨枯而髓虛。故足不任身。發為骨痿。故下經曰。骨痿者。生於大熱也。黃帝曰。何以別之。岐伯曰。肺熱者。色白而毛散。心熱者。色赤而絡溢。肝熱者。色蒼而爪枯。脾熱者。色黃而肉蠕動。腎熱者。色黑而齒槁。帝曰。如夫子言可矣。論言治痿者。獨取陽明。何也。岐伯曰。陽明者。五臟六腑之海。王濶示筋宗筋主束骨而利機關也。衝脈者。經脈之海也。主滻灌谿谷。與陽明合於宗筋。陰陽總宗筋之會。會於氣街。氣街一名氣衝。足陽明經穴在毛際兩旁。開闊上一寸。動脉處。而陽明為之長。皆屬於帶脈。而絡於督脈。故陽明虛則宗筋絕。帶脈不引。故足痿不用也。帝曰。治之奈何。岐伯曰。各補其榮。諸經所謂榮者。而通其俞。注為俞。調其虛實。和其順逆。筋脉骨肉。各以其時受月。則病已矣。受之時月。王冰注謂病所。未知是否。生氣通天論。濕熱不攘。大筋緩短。小筋弛長。經短為拘。弛長為痿。

難經

五損損於骨。骨痿不能起於牀。
痿方

金剛九命 治腎損骨痿。不能起於牀。

萆薢

杜仲炒去絲 萍苓酒浸等分

右為末。酒煮腰子搗丸如桐子大。每服五七十九溫酒下。

虎骨四助丸局 治脚痿

宣木瓜

天麻

蓀苓

牛膝各培一斤乾

附子一兩

虎骨各一兩

右以上各如法修製。先將

前四味用無灰酒浸春秋各五日。夏三冬十日。取出焙乾入附子虎骨共研為末。用浸藥酒打麵糊丸。

梧子大每服五十九食前鹽湯下。

加減四助丸三因

治腎肝虛熱淫於內。致筋骨痿弱。足不任地。驚恐戰慄。潮熱時作。飲食無味。不生氣力。

肉蓀苓

酒浸牛膝

酒浸木瓜乾

鹿茸酥炙熟地

五味子

酒浸菟絲子

酒浸各等分

右為末。煉蜜

九桐子大每服五十九溫酒米飲下。一方不用五味。有杜仲。

煨腎丸解 治腎肝虛及脾損穀化。

牛膝

萆薢

杜仲炒去絲

白蒺藜

防風

菟絲子

酒浸蓀苓酒浸

葫蘆巴

破故紙等分

桂枝減半

右為末。將猪腰子製如食法。搗爛蜜丸如桐子大。每服五七十九溫酒送

下。又治腰痛不起。亦治腎癆

續骨丹解 治兩脚軟弱。虛羸無力。及小兒不能行。

天麻酒浸白附子

牛膝

木龍子

各半兩

羌活半兩

烏頭泡一錢

地龍去土

乳香

沒藥各二

硃砂一錢

右以生南星末一兩。無灰酒炙糊丸。雞頭大硃砂為衣。

此加味

活絡丹

此加味

舒筋最宜

思仙續斷圓解

治肝腎風虛氣弱。脚不可踰地。腰脊痠痛。風毒流注下經。行止艱難。小便餘瀝。此補五

臟內傷。調中益精涼血。堅強筋骨。益智輕身耐老。

思仙丸 生地各五兩

五加皮

防風

米仁

羌活

川斷

牛膝各三兩

草薢四兩

右為細末。好酒三升，化青鹽三兩，用大木瓜半斤去皮子，以鹽酒煮木瓜成膏，杵丸如桐子大，每服三

四十丸，空心食前溫酒鹽湯下，膏少和酒可也。

此方治下焦風濕脚氣，亦效。內經針灸之法，獨取陽明以陽明為諸筋總會也，而用藥則補腎為多，以腎為筋骨之總司也。養其精血，而逐其風痰，則大略無誤矣。

虎潛丸

大活絡丹

俱見通治

厥

靈素

靈癲狂篤厥逆為病也。足暴清煦，若將裂腸，若將以刀切之，煩而不能食，脉大小皆濶，則不知人矣。

如此甚

素厥論 黃帝問曰：厥之寒熱者何也？岐伯對曰：陽氣衰於下，則為寒厥；陰氣衰於下，則為熱厥。帝曰：熱厥之為熱也，必起於足下者何也？岐伯曰：陽氣起於足五指之表，陰脈者集於足下，而聚於足心，故陽氣勝，則足下熱也。帝曰：寒厥之為寒也，必從五指而上於膝者何也？岐伯曰：陰氣起於五指之裏，集於膝下，而聚於膝上，故陰氣勝，則從五指至膝上寒。其寒也不從外，皆從內也。

解精微論 厥則目無所見，夫人厥，則陽氣并於上，陰氣并於下，陽并於上，則火獨光也；陰并於下，則足寒，足寒則脹也。厥則無不能通陰納陽

在之藥胎，害無窮 調經論 血之與氣，並走於上，則為大厥。厥則暴死，氣復反則生，不反則死。

陽明脉解

論厥逆連藏，則死。連經則生。

瘡能煎厥

素脉解篇內壅而厥，則為瘡能此腎虛也。

少陰不至者厥也。

肝氣當治而未得，故善怒。

善怒者，

能煎厥。

素脉解篇內壅而厥，則為瘡能此腎虛也。

少陰不至者厥也。

肝氣當治而未得，故善怒。

善怒者，

能煎厥。

者名曰煎厥。

劉河間地黃引

生氣通天論 陽氣者，煩勞則張，精絕，腎積於夏，使人煎厥。

此當治肝

薄厥

素生氣通天論 陽氣者，大怒則形氣絕而血菀於上，使人薄厥。

此當治肝

陽明厥 素陽明脈解論。陽明厥則喘而惋惋則惡人。

少陰厥 素脉要精微論。脉俱沉細數者。少陰厥也。

風厥 素評熱論。汗出而身熱者風也。汗出而煩滿不解者厥也。病名曰風厥。此當風

尸厥 素繆刺論。五絡俱竭。令人身脉皆動。而形無知也。其狀若尸。名曰尸厥。

難經

督之為病。脊強而厥。

金匱

問曰。寸脉沉大而滑。沉則為貫。滑則為氣實。氣相搏。血氣入臟即死。入腑即愈。此為卒厥。何謂也。師曰。唇口青。身冷。為入臟。即死。如身和。汗自出。為入腑。即愈。卒厥之症類似中風一或誤治死不旋踵

傷寒論

寸口諸微。亡陽。諸濡。亡血。諸弱。發熱。諸緊。為寒。諸乘寒者。則為厥。鬱冒不仁。以胃無穀。氣脾濁不通。急不能言。戰而慄也。少陰脈不至。腎氣微少。精血奔氣促。迫上入胸膈。宗氣反聚。血結心下。陽氣退下。熱歸陰股。與陰相動。令身不仁。此為尸厥。少陽厥陰俱病。耳聾。囊縮而厥。水漿不入。不知人者。六日死。此由致厥之象

厥寒

諸四逆厥者不可下之。虛家亦然。以下所論諸條皆指傷寒症手足通冷而言。非氣逆不知人之厥也。傷寒始發熱。六日厥反九日而利。凡厥利者。當不能食。今反能食者。恐為除中。食以素餅。不發熱者。知胃氣尚勝。必愈。傷寒一二日至四五日而厥者。必發熱。前熱者後必厥。厥深者熱亦深。厥微者熱亦微。厥應下之而反發汗者。必口傷爛。此為凡厥者。陰陽氣不相順接。便為厥。此致厥之由厥者。手足逆冷是也。此厥傷寒。脉微而厥。至七八日。膚冷。

人躁無暫安時者此為臟厥。傷寒熱少厥微。指頭寒默默不欲食煩躁數小便利色白者此熱除也。欲得食其病為愈。若厥而嘔胸脅煩滿其後必便血。熱入病者手足厥冷言我不結胸小腹滿按之痛者此冷結在膀胱關元也。傷寒發熱下利厥逆躁不臥者死。傷寒發熱下利至甚厥不止者死。傷寒五六日不結胸腹瀉脉虛復厥者不可下此為亡血下之死。傷寒脉促手足厥逆者可灸之。下利手足厥冷無脉者灸之不溫若脉不還反微喘者死。虛寒之厥下利後脉絕手足厥冷時脈還手足溫者生脉不還者死。病人手足厥冷脉乍結以客氣在胸中心中滿而煩欲食不能食者病在胸中當吐之。傷寒症諸條有寒有熱有虛有實有寒熱互乘其變不一隨病異形非厥之正病也尤不可不潛心體察凡一病其變態不同如此何可執一說以人命為兒戲耶

厥方

戶厥方素問

以竹管吹其兩耳鬢鬢刺同其左角之髮方一寸。燔治飲以美酒。燔治燒爲末也

赤圓金匱

寒氣厥逆主之。

茯苓

半夏各四兩洗一方用桂烏頭二兩細辛作人參一千金

先食酒飲下三丸日再夜一服不知稍增之以知為度

真朱即珠砂

白薇

當歸各一
人參

甘草各一

右為粗末。每服五錢水二盞。煎至一盞去滓溫服。此病

而婦科皆不知無不誤治

四逆湯傷寒論

下利厥逆而惡寒者主之。大汗若大下利而冷厥者亦主之。方見傷寒

通脉四逆湯傷寒論

下利清穀裏寒外熱。汗出而厥者主之。方見通治附加減法如面色赤者加葱九莖。

腹中痛者去葱。加芍藥二兩。嘔者加生薑二兩。咽痛者去芍藥加桔梗一兩。利止脉不出者去桔梗加人參一兩。

當歸四逆湯傷寒論

手足厥冷。脈細欲絕者主之。方見傷寒以上三方皆治寒

瓜蒂散

白虎湯此治熱厥

二

烏梅丸此治蟲厥

三

蘇合香丸此治氣厥

四

磨飲

五

至寶丹此治通治

六

虛勞

金匱

夫男子平人脉大為勞極虛亦為勞。男子面色薄者主渴。及亡血卒喘悸脉浮者裏虛也。男子脉虛沉弦無寒熱短氣。裏急小便不利。面亦白。時目瞑兼衄。少腹滿。此為勞使之然。勞之為病其脉浮大。手足煩。春夏更變。秋冬瘥。陰寒精自出。酸削不能行。男子脉浮弱而濡。為無子。精氣清冷。男子平人脉虛弱細微者喜溢汗也。人年五六十。其病脉大者。瘦俠背行。若腸鳴馬刀俠癟者皆為勞得之。脉沉小溼名脫氣。其人疾甚則喘渴。手足逆寒。腹滿甚則溏泄。食不消化也。脉弦而大。弦則為減。大則為芤。減則為寒。芤則為虛。虛寒相搏。此名為革婦人則半產漏下。男子則亡血失精。古人所謂虛勞皆是純虛無吐血咳嗽者。正相反誤治必危。近日吐血咳嗽之病乃是血症有似虛勞其實非虛勞也。

大虛勞者。五勞六極七傷是也。五勞者。一曰志勞。二曰思勞。三曰心勞。四曰憂勞。五曰腫勞。六極者。一曰氣極。二曰血極。三曰筋極。四曰骨極。五曰肌極。六曰精極。七傷者。一曰陰寒。二曰陰暑。三曰陰急。四曰精連連。五曰精少。陰下濕。六曰精清。七曰小便苦。數臨事不卒。

五蒸。一骨蒸根在腎。二脉蒸根在心。三皮蒸根在肺。四肉蒸根在脾。五內蒸亦名血蒸。必外寒而內熱。把手附骨。而內熱。其根在五臟六腑。又有二十三蒸。各有證名。

肺勞者。短氣面腫。鼻不聞香臭。肝勞者。面目乾黑。口苦精神不守。恐畏不能獨臥。目視不明。心勞者。忽忽喜忘。大便苦難或時。鴟浪口內生瘡。脾勞者。舌苦直不能咽。腎勞者。背難以俛仰。小便不利。色赤黃而有餘瀝。莖內痛。陰濕囊生瘡。小腹滿急。此乃五勞之勞

虛勞方

桂枝加龍骨牡蠣湯金匱失精家。少腹弦急。陰頭寒。目眩一作頭暉。脈虛虛芤遲乃為虛寒之症。故用桂枝及建中等湯。髮落。脈極虛芤遲。為清穀亡血。失精。脉得諸芤動微堅。男子失精。女子夢交。此湯主之。

桂枝二兩芍藥 生薑各三兩甘草二兩 大棗十二枚 龍骨 牡蠣各三兩 右七味以水七升煮取三升分溫三服。脉極虛芤遲乃為虛寒之症。故用桂枝及建中等湯。若寒血而脈數者。乃陰虛之症。與此相反誤用此藥。

薯蕷丸金匱 虛勞諸不足。風氣百疾主之。

薯蕷分當歸

桂枝

芍藥

生薑各二兩

甘草二兩

大棗十二枚

龍骨

牡蠣各三兩

右七味以水七升煮取

三升分溫三服

大棗

甘草

大棗

血肌膚甲錯。兩目暗黑。此丸主之。

大黃

十分蒸 黃芩

二兩 甘草

三兩 桃仁

一升 杏仁

一升 芍藥

四兩 乾地黃

十兩 蟬蠧

一升 乾漆

一兩

蟲蟲一升 水蛭

百枚 麋蟲

半升 右十二味為末。煉蜜為丸。小豆大。

酒飲服五丸。日三服。

血乾則散

草木之品所能下。必用食血之蟲以化之。

此方專治瘀血成勞之症。不除則正氣永無復理。故去病即所以補虛也。

治夢洩精方

金

韭子

一升

右為末。酒服方寸匕。日三服。立效。

羌活補髓九針

療髓虛腦痛不安。膽腑中寒。

羌活

川芎

當歸各三錢

桂心

二兩

人參

四兩

酥

一升

大麻仁

二升

熟棗肉

研脂

牛髓

羊髓各一

右十味先節前五味為散。後用棗肉、麻仁打匀。再下二髓及酥。重湯煮之。為丸桐子大。

酒服三十九丸。日再服。

肘後癰肝散

金匱附方

治冷勞。又主鬼疰。一門相染。

獺肝

一具炙乾末之

右水服方寸匕。日三服。

骨蒸方針

療虛熱骨蒸。羸瘦煩悶。短氣喘息。兩鼻孔張。日西即發。

龍膽

黃連

桔梗各一錢

梔子

二七枚

芒硝

半兩

青葙子

苦參

大黃

黃芩

芍藥各半

右十一味

搗節為末。煉蜜和丸。如梧子大。飲服十九丸。日二服。以知為度。比為熱者宜之。

救急療瘻疾方

外臺

炎甘草

三兩

右一味。小便煮服。

用小便奇此方本治咽痛

口乾方

外臺

療脾熱腸痛。熱滿不歇。目赤不止。口唇乾裂。

石膏
碑綿
生地汁

赤蜜各一
升
淡竹葉切

右四味水一斗五升先煮竹葉取七升去滓煮石

膏取一升五合去滓納地黃汁煮二三沸下蜜煎三升細服

傳屍勞方臺外

獵肝一具破乾炙

鱉甲一枚

野狸頭一枚

紫苑四分

漢防己半兩

蜀漆洗

麥冬

甘草炙各一兩

右藥

搗節已成煉烊羊腎脂二分合蜜一分烊令和丸桐子大每服十九丸加至十五丸日再其藥合和分一分懸門額上一分著頭邊一分繫臂上先服頭邊次服臂上次服門上大驗

秦艽龍甲散蜜
寶

治骨蒸壯熱肌肉消瘦舌紅頰赤氣粗困倦盜汗

鱉甲 柴胡 地骨皮各一兩

秦艽 知母

當歸錢各五錢

右為末每半兩入烏梅一枚青

蒿五葉同煎臨臥空心溫服

秦艽扶羸湯直指

當歸

人參各一錢半

柴胡二錢

地骨皮

紫苑

半夏

甘草各一錢

右九味加薑棗煎服

十味煎外臺 治凡病在胸膈上者宜飽服而在夜肺既居上則病在上晝宜服丸夜宜合桑白皮汁等服

桑白皮一升

地骨皮三升

二味以水七升煮取三升去渣澄清

生地汁五升

麥冬汁二升

生薑汁一升

竹懸

生葛根汁各三升

白蜜一升

牛酥三合

大棗一升

桃仁一升

右十味先煮生地以下葛

根以上和煎減半則內桑皮等和煎之三分減一則內酥蜜棗等藥攪之勿停手如稠飴狀每服胡桃
大一枚哈之滋潤肺經此為第一

百花煎類方奇要

治吐血咳嗽補肺

生地汁 蒬汁 黃牛乳

一胡桃研細

黃明膠

炙嫩

木半兩

生薑汁

半斤

乾柿五枚

研細

大棗二十枚去皮核

研爛

清酒一升

秦艽半兩末

秦艽味太苦

當用薄荷或蘇子汁

杏仁三兩研細

右藥煎減半

入好蜜四兩

漫火

養成入磁器

服一匙

米飲調下

日三

宜減去大半

人參蛤蚧散

鑑

治二三年間

肺逆喘嗽

咯吐膿血

滿面生瘡

遍身黃腫

蛤蚧一對全者河水浸五宿逐日換水洗去腥氣

酥炙黃杏仁

五兩研細

甘草

炙三兩研細

人參

扶苓

貝母

知母

桑白皮各二兩

桑白皮各二

右為細末

磁器內盛

每日如茶點服神效

金鎖固精丸 治夢遺滑精

芡實

蓮鬚

茱萸各二兩

龍骨

酥炙

牡蠣殼四兩

右以蓮子粉糊丸服鹽湯送下

金鎖丹

本事

治夢泄遺精關鎖不固

茴香

葫蘆巴

破故紙炒

白龍骨

酥炙

牡蠣殼四兩

右以蓮子粉糊丸服鹽湯送下

為末和二膏研勻酒浸煮熟九桐子大

每服三十九

鹽湯下

金鎖正元丹

治真氣不足元臟虛弱四肢倦怠百節酸疼精神昏困手足多冷心忪盜汗飲食減少

小便滑數遺精白濁

五倍子

茯苓各八兩

補骨脂

微炒

紫巴戟去心

葫蘆巴炒

蕤英

洗淨各

硃砂

別研

龍骨各三

右為細末入研令勻酒糊為丸如桐子大

每服十五丸至二十九

空心食前

溫酒或鹽湯下

犀角紫河車丸

鑑

治傅戶勞

三月必平復

其餘勞症即消數服神效

紫河車

宿

洗淨焙乾

一錢

鱉甲酥炙

桔梗

一錢

胡黃連

白芍

敗鼓皮

心

醋炙

大黃

一錢

貝母

龍膽草

黃藥子

知母

各二錢

芒硝

犀角

銕

硃砂

錢研

右為末蜜丸桐子大

硃砂為

衣空心溫酒服二十九如膈熱食後服重病不過一料

小建中湯

金匱黃耆建中湯

火甘草湯

附方

大建中湯

八味地黃丸

金匱人參養榮湯

人參養榮湯

瓊玉膏

生地黃煎

外臺

四物二連湯

元戎方俱見通治

以上九

消證附張

靈素

靈師傳篇。胃中熱則消穀。令人懸心善饑。素氣厥論。心移寒於肺。肺消。肺消者飲一溲二死不治。陽陰別論。二陽之病發心脾。有不得隱曲。女子不月。其傳為風。消其傳為息。責死不治。氣厥論。心移熱于肺。傳為膈消。

金匱

厥陰之為病。消渴。氣上衝心。心中疼熱。飢而不欲食。食即吐。或下之不肯止。此症不可誤認蛇厥

病源

夫消渴者。渴不止。少便多是也。其病變多發癰疽。此坐熱氣留於經絡。血氣壅滯。故成癰腫。內消病者。不渴而小便多是也。利多不得潤養。五臟臟衰。則生諸病。由腎盛之時。恣意快情。致使虛耗。故不渴而小便多也。強中病者。莖長興盛。不痿。精液自出。由少服五石熱。住於腎中。下焦虛少壯之時。血氣尚豐能制於五石。及至年衰。血氣減少。腎虛不復能制津液。若精液竭。則諸病生矣。

消證方

文蛤散

金匱

渴欲飲水不止者。主之。

傷寒論治心煩肉上粟起意欲飲水反不渴者。

文蛤五兩

上一味

杵為散。以沸湯五合。和服方寸匕。欲飲而不渴乃服也。

消渴方針

括薑根

生薑

麥冬

蘆根切各二升茅根切三升

右五味咬咀以水一斗煮取三升分三服

此清胃
之主方

茯神湯

洩熱止渴治胃腑實熱引飲常渴者。

茯神

二兩 括薑根五兩生麥冬五兩姜蕤四兩知母四兩生地黃六兩小麥二升大棗二十

淡竹葉

升切三升

右九味以水三斗煮小麥竹葉取九升去渣下藥煮取四升分四服不問早晚但渴

即進通治渴患熱者

黃連圓滻渴方針

黃連一斤 生地黃一斤

右二味絞地黃汁浸黃連出曝燥復內汁中令汁盡乾搗末蜜丸桐子大

服二十九日三食前後無拘亦可為散酒服方寸匕

此治胃中有伏火之方製法神妙 本事方用冬瓜汁收入黃連內為丸即以冬瓜汁煎大麥仁湯

下亦仿此義則知
多吃冬瓜亦妙也

桑根湯

半金

主日飲一石水方

桑根白皮切五升入地三尺者良炎令黃黑

右一味水煮以味濃為度適寒溫任性飲戒食鹽

神效散本事方 治渴疾飲水不止

白浮石

蛤粉

蟬蛻各等

右細末用鯽魚膽七個調三錢服不拘時候神效

猪腎藤芯湯

半金

強中之病。莖長興盛不交精液自出消渴之後即作癰疽皆由石熱凡如此等宜服

猪腎

一具 大豆一升 藤芯三兩人參

石膏各三兩

茯神

磁石綿裹知母

葛根

黃芩

甘草

括薑根各二兩

以水三升原合一劑病勢漸歇即止

腎氣丸治通見
白虎人參湯乾裂方勞見虛

吳江徐靈胎洞溪著

傷寒

素問

素熱論篇。帝曰。今夫熱病者皆傷寒之類也。或愈或死。其死皆以六七日之間。其愈皆以十日以上者何也。岐伯對曰。巨陽者諸陽之屬也。其脈連於風府。故為諸陽主氣也。人之傷於寒也。則為病熱。熱雖盛不死。其兩感於寒而病者必不免於死。帝曰。願聞其故。岐伯曰。傷寒一日。巨陽受之。故頭項痛腰脊強。二日陽明受之。陽明主肉。其脈挾鼻絡於目。故目熱目疼。而鼻乾不得卧也。三日少陽受之。少陽主膽。其脈循脇絡於耳。故胸脇痛而且聾。三陽經絡皆受其病。而未入於臟者。故可汗而已。四日太陰受之。太陰脈布胃中。絡於嗌。故腹滿而嗌乾。五日少陰受之。少陰脈貫腎絡於肺。繫舌本。故口燥舌乾而渴。六日厥陰受之。厥陰脈循陰器而絡於肝。故煩滿而囊縮。三陰三陽五臟六腑皆受病。榮衛不行。五臟不通。則死矣。陰非風寒直入臟中也。其不兩感於寒者。七日巨陽病衰。頭痛少愈。八日陽明病衰。身熱少愈。九日少陽病衰。耳聾微聞。十日太陰病衰。腹減如故。則思飲食。十一日少陰病衰。渴止不滿。舌乾已而嘯。十二日厥陰病衰。囊縱少腹微下。大氣皆去。病日已矣。帝曰。治之奈何。岐伯曰。治之各通其臟脈。病日衰已矣。其未滿三日者可汗而已。其滿三日者可泄而已。水熱穴論。帝曰。人傷於寒而傳為熱。何也。岐伯曰。夫寒甚則生熱也。

兩感 素熱論。帝曰。其病兩感於寒者。其脈應與其病形何如。岐伯曰。兩感於寒者。病一日。則巨陽與少陰俱病。則頭痛口乾而煩渴。二日。則陽明與太陰俱病。則腹滿身熱。不欲食。三日。則少陽與厥陰俱

病則耳聾囊縮而厥陰水漿不入不知人六日死。帝曰五臟已傷六腑不通榮衛不行。如是之後三日乃死。何也？岐伯曰：陽明者十二經脈之長也。其血氣盛故不知人。三日其氣盡故死。兩感則表

溫病暑病 素熱論。凡病傷寒而成溫者先夏至日者為病溫後夏至日者為病暑暑當與汗皆出勿止。陰陽交 素評熱病論。帝問曰有病溫者汗出輒復熱而脈躁疾不為汗衰狂言不能食。病為何？岐伯曰病名陰陽交。交者死也。帝曰願聞其說。岐伯曰人所以汗出者皆生於穀穀生於精今邪氣交爭於骨肉而得汗者是邪却而精勝也。精勝則當能食而不復熱。復熱者邪氣也。汗出者精氣也。今汗出而輒復熱者是邪勝也。不能食者精無俾也。病而留者其毒可立而傾也。且夫熱論曰汗出而脈尚躁盛者死。今脈不與汗相應此不勝其病也。其死明矣。狂言者是失志失志者死。今見三死不見一生雖愈必死也。

遺證 素熱論。帝曰熱病已愈時有所遺者何也？岐伯曰諸遺者熱盛而強食之故有所遺也。若此者皆病已衰而熱有所藏因其穀氣相薄兩熱相合故有所遺也。帝曰善治遺奈何？岐伯曰視其虛實調其逆從可使必已矣。帝曰病熱當何禁之？岐伯曰病熱少愈食肉則復多食則遺此其禁也。

難經

傷寒有幾其脈有變不然傷寒有五有中風有傷寒有濕溫有熱病有溫病其所苦各不同。中風之脈陽浮而滑陰濡而弱濕溫之脈陽濡而弱陰小而急。傷寒之脈陰陽俱盛而緊濶熱病之脈陰陽俱浮浮之而滑沉之散濶溫病之脈行在諸經不知何經之動也。各隨其經所在而取之。傷寒有汗出而愈下之而死者有汗出而死下之而愈者何也？然陽虛陰盛汗出而愈下之即死。陽盛陰虛汗出而死下之而愈虛

陰盛者風傷衛而汗自洩寒氣在內而未出也。陽盛陰虛者身熱汗出燥火內結津液乾枯陰氣欲竭也。此以有別處為虛無邪處為盛。

傷寒論六經服證

太陽病脈浮頭項強痛而惡寒。尺寸俱浮者太陽受病也。其脈上連風府故頭項痛腰脊強發熱汗出惡風脈緩者名曰中風。惡寒體痛嘔逆脈陰陽俱緊者名曰傷寒。發熱惡寒者發於陽也無熱惡寒者發於陰也發於陽者七日愈發於陰者六日愈以陽數七陰數六也。

陽明中風口苦咽乾腹滿微喘發熱惡寒脈浮而緊。惡寒未陽明病若能食名中風不能食名中寒尺寸俱長者陽明受病也。其脈伏鼻絡於目故身熱目疼鼻乾不能卧。陽明外證身熱汗自出不惡寒反惡熱也。陽氣已離太陽故不惡寒陽明脈大明之經病有太陽陽明有正陽陽明有少陽陽明傳肺之證此三條皆太陽陽明者脾約是也少陽陽明者發汗利小便已胃中燥煩實大使難是也。陽明之為病胃家實也。此正陽陽明居中土也萬物所歸無所復傳始雖惡寒二日自止此為陽明病也

少陽之為病口苦舌乾目眩也。尺寸俱弦者少陽受病也。其脈循脣絡於耳故胸脣痛而耳聾。少陽中風兩耳無所聞目赤胸中滿而煩者不可吐下吐下則悸而驚。傷寒脈弦細頭痛發熱者屬少陽。頭痛發熱與太陽同而脉之弦細獨異三陽合病脈浮大上關上但欲眠睡目合則汗。內熱極傷寒六七日無大熱外熱輕則其人躁煩者此為陽去入陰也躁則病欲退矣傷寒三日三陽為盡三陰當受邪其人反能食而不嘔此為三陰不受邪也

太陰之為病腹滿而嘔食不下自利益甚時腹自痛尺寸俱沉細者太陰受病也。其脈布胃中絡於嗌故腹滿而嘔乾。傷寒脈浮而緩手足自溫者繫在太陰。同一太陰病而有沉細浮緩之殊蓋沉乃太陰病脉浮緩乃太陰本脉也自利不渴者屬太陰以臟有寒故也當溫之宜服四逆輩。少陰自利而渴熱入下焦也少陰病欲吐不吐心煩但欲寐五六日自利而渴者屬少陰也。尺寸俱沉者少陰受病也以其脈貫腎絡於肺繫舌本故口燥舌乾而渴。

厥陰之為病。消渴氣上撞心心中疼熱飢而不欲食。則吐衄下之利不止。尺寸俱微緩者厥陰受病也。以其脈循陰器絡於肝。故煩滿而囊縮。厥陰中風脈微浮為欲愈。不浮為未愈。

傷寒傳足不傳手經脈

此本論節庵最為明晰

足太陽脈起於目內眞。從頸下後項連風府。行身之後終於足。其外證頭皮頃強腰脊痛。骨節痛。心發熱惡寒。標病宜發汗。但太多則亡陽。筋惕肉瞤。小便不利者當利。自利者不可利。利之引熱入膀胱。其人如狂。不可下。下之為結胸。

足陽明脈起於鼻頰絡於目。循面下人迎。入缺盆下膈。屬胃。行身之前終於足之厲兑穴。故其證目痛鼻乾。不得眠。頭頰痛。身熱微惡寒。無汗者屬標病。宜解肌。身熱發渴汗出屬本病。宜清熱解肌。若惡熱自汗。發渴去衣被。發斑發黃。發狂大便祕。腹滿。此正陽明胃腑病也。宜下之。

足少陽脈起於目锐眞。上抵頭循角絡耳中。循胸脇。行身之側終於足。故頭角痛。目眩。耳聾。脇疼。心下痞寒。熱往來。嘔而口苦。膽熱也。此經無標本。只有小柴胡一湯。和解隨證加減。有三禁汗之犯太陽下之犯陽明。利之犯少陰。脈弦數者是本經證。

足太陰為三陰經首。其脈始於足大指上行至腹。絡於喉。連舌本。行身之前也。故腹滿自利。咽乾。嘔吐。腹滿邪入脾也。嘔吐脾氣不和也。自利挾熱下利也。咽乾脾脈連喉也。頭不疼。陰脈至頸而還也。身微熱。手足溫。表邪解而傳入裏也。身目俱黃。標病宜平熱。腹滿硬痛渴而喉乾。小便赤。大便難。本病雖宜下。然當分寒熱施治。足少陰脈始於足心。上行貫脊。循喉絡舌本。下注心胸。行身之後也。其病手足乍冷乍溫。身不熱者。標病二便不通。舌乾口燥者。本病。此經本熱而標寒也。宜急下以存腎水。雖自利。此是飲湯水所致。不可疑為寒也。初病大熱。至此變為厥冷者。是熱深厥亦深也。急下之。至陰又難拘定法。因分直中者。

寒證傳經者。熱證大抵六經中。惟此難辨。有直中真陰者。有夾陰中寒者。有虛陽伏陰者。有陰極發躁者。有漏底傷寒者。前二證身不熱。厥冷全似少陰傳經而冷者。後四證身熱面赤。又全似陽大要口燥舌乾渴而譴語。大便實者傳經熱證也。足冷嘔吐瀉痢不渴或惡寒腹痛者。直中真寒證也。足厥陰脈始於足大指上。循陰器抵小腹。循脇上口唇與督脈會於顛頂行身之側也。其證煩濁囊拳消渴舌捲譴語大便不通而頭疼。手足乍冷乍溫者。此是陽經傳來熱邪。本病宜急下。若發熱惡寒狀如瘧疾。此是熱邪在經標病。宜和解。若不嘔便清。當有大汗至而自愈。頭疼者以督脈會於顛頂故也。大抵熱深厥亦深。則舌捲囊縮。肝主陰寒冷極。亦捲縮須以口渴不渴。足冷不冷。脈沉實沉細別之。厥陰屬熱者甚

誤人無算。熟讀傷寒論自知。

傷寒六經治法方

諸方清義俱詳余所著
傷寒類方中不更贅

桂枝湯見本傷寒論 治太陽中風。頭皮發熱。汗出惡風。

桂枝去皮二兩。芍藥三兩。甘草二兩。生薑三兩。大棗十二枚。

桂枝去皮二兩。芍藥三兩。甘草二兩。生薑三兩。大棗十二枚。

右五味㕮咀以水七升微火煮取三升去滓。

適寒溫服一升。服已須臾歎熱稀粥一升餘。以助藥力。溫覆令一時許。通身熱微似有汗者益佳。不可令如水流漓。病必不除。若一服汗出病差。停後服不必盡。若不汗。更服依前法。又不汗。後服當小促其間半日。許令三服盡。若病重者。一日一夜服。周時觀之。服一劑盡。病證猶在者。更作服。若汗不出者。乃服至二三劑。禁生冷。粘滑肉麪五辛酒酪臭物等物。此服外感風寒之藥服法俱當如此

麻黃湯。治太陽中寒。頭身俱痛。發熱無汗。惡風而喘。

麻黃三兩。桂枝二兩。甘草一兩。杏仁七十個。湯泡去皮尖。右四味以水九升先煮麻黃減二升去上沫納諸藥。煮取二升半去滓。溫服八合。覆取微似汗。不須啜粥。餘如桂枝法將息。

桂枝麻黃各半湯 治傷寒向愈脈微緩惡寒身癢

桂枝一兩十六芍藥酒洗生薑切 甘草炙 麻黃各一兩 太裏擘杏仁二十四個湯浸去皮尖及兩仁者

右

七味以水五升先煮麻黃一二沸去上沫納諸藥煮取一升八合去滓溫服六合令微汗則愈

桂枝加葛根湯 治太陽病項背強七八反汗出惡風

葛根四兩芍藥二兩甘草二兩生薑三兩 大裏擘桂枝三兩

右六味以水一斗先煮葛根減二

升去上沫納諸藥煮取三升去滓溫服一升覆取微似汗不須啜粥餘如桂枝法本方無麻黃若加麻則為葛根湯矣陳

無已本誤加

葛根湯 治太陽病項背強無汗惡風者又治太陽陽明合病自下利者

葛根四兩麻黃二兩桂枝去皮芍藥二兩甘草二兩生薑三兩 太裏擘桂枝三兩

右七味㕮咀以水一斗

先煮麻黃葛根減二升去沫納諸藥煮取三升去滓溫服一升覆取微似汗不須啜粥餘如桂枝法將

息及禁忌

葛根芩連湯 治太陽證誤下利遂不止喘而汗出者此主之

葛根半斤甘草炙 黃芩略 黄連三兩 右四味以水八升先煮葛根減二升入諸藥煮取二升

去滓分溫再服

桂枝加芍藥湯 治太陽誤下腹滿時痛屬太陰也此主之大實痛者加大黃一兩即桂枝加大黃湯

桂枝三兩芍藥酒洗甘草二兩生薑三兩 大裏擘桂枝十二

右五味㕮咀以水七升微火煮取三升去滓

適寒溫服一升此即桂枝湯加芍藥一倍即另成一方而以之治太陰證分兩輕重之所關如此 太陰病必順滿

太青龍湯 治太陽中風脈浮緊惡寒發熱身疼不汗出而煩躁者

麻黃

六兩去節

桂枝

二兩去皮

甘草

二兩炙

杏仁

四十個去皮尖生薑

三兩大棗

十二枚擘

石膏

如雞子大碎

右七味以水九升

煎

桂枝湯

桂枝二兩去皮

甘草二兩

炙

杏仁四十個去皮尖生薑三兩大棗十二枚擘

右七味以水九升煎

先煮麻黃減二升去上沫納諸藥者取三升去滓溫服一升取微似汗汗出多者溫粉撲之

一服汗者停後服汗多亡陽遂虛惡風煩躁不得眠也

此風寒兩傷之方按載大青龍何以不載小青龍蓋

停後服汗多亡陽遂虛惡風煩躁不得眠也

桂枝加桂湯 治燒針令其汗針處被寒核起微赤發奔豚久其核上各一壯與此湯 即桂枝湯加桂二兩

小柴胡湯 治少陽中風往來寒熱胸脇苦滿心煩喜嘔腹痛心悸頭汗出舌上胎白及婦人熱入血室

等證

柴胡

半斤黃芩

人參

甘草

四兩

半夏

半升洗

生薑

三兩切

太棗

十二枚擘

右七味水一斗二升煮

洗

生薑

三兩切

太棗

十二枚擘

右七味水一斗二升煮

洗

取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服

若胸中煩而不嘔去半夏人參加括薑實一枚

若渴者去半夏加人參合煎成四兩半

括薑根四兩

若腹中痛者去黃芩加芍藥三兩

若腸下痞鞕去

大棗四兩

若心下悸小便不利者去黃芩加茯苓四兩

若不渴外有微熱者去人參加桂

三兩溫覆取微汗愈

若欬者去人參大棗生薑加五味子半升

乾薑二兩

此方加減

桂枝胡湯

治傷寒十餘日柴胡證仍在嘔而心下急心中痞鞕而瘀熱結在裏往來寒熱等證

柴胡

半斤黃芩

芍藥

三兩洗

半夏

半升洗

生薑

五兩切

枳實

四枚洗

大棗

十二枚擘

大黃

二兩洗

右八味以水

一斗二升煮取六升去滓再煎溫服一升日三服

大承氣湯 治傷寒十餘日吐下後不解晡時發潮熱獨語如見鬼狀尋衣摸牀冒中有燥屎也此下之

大黃

四兩洗

厚朴

半斤去皮尖

枳實

五枚洗

芒硝

三合

右四味以水一斗先煮二物取五升去滓納大黃煮取

二升去滓納芒硝更上微火一兩沸分溫再服得下餘勿服胃中非存燥屎之所此言胃中者指足陽明言即所謂胃中實是也乃陽胃之總名

小承氣湯 治汗多微發熱不惡寒或小便數而大便鞭譏語者與此湯微和胃氣

大黃四兩去皮尖厚朴二兩去皮尖枳實三枚去皮尖右三味以水四升煮取一升二合去滓分溫二服初服湯當更

衣不爾者盡飲之若更衣者勿服之

調胃承氣湯 治胃氣不和不惡寒但熱腹微滿而煩與此湯

大黃四兩去皮尖甘草二兩去皮尖芒硝半斤酒浸去皮尖右三味㕮咀以水三升先煮大黃甘草取一升去滓納芒硝

更上大微煮令沸少少溫服不惡寒乃外邪已盡方可下此仲景之要法

桃核承氣湯 治太陽病不解氣結膀胱其人如狂血自下下者愈其外不解者尚未可攻宜先與桂枝解外外解已但小腹急結此主之

桃仁五十個去皮尖桂枝二兩去皮尖大黃四兩去皮尖芒硝二兩甘草尖右五味以水七升煮取二升半去滓納芒硝

硝更上火微沸下火先令溫服五合日三服當微利

抵當湯 治傷寒六七日少腹鞭小便自利其人如狂喜忘大便黑此有蓄血

水蛭煮三十個去足尖蟇蟲各三十個去足尖桃仁三十個去皮尖大黃三兩酒浸去皮尖右四味為末以水五升煮取三升去滓溫服一升不下再服

抵當丸 治傷寒有熱少腹滿應小便不利今反利者為有血也當下之不可餘藥

水蛭二十個去足尖蟇蟲二十個去足尖桃仁二十個去皮尖大黃三兩右四味杵分為四丸以水一升煮一丸取七合服之

眸時當下血若不下者更服

大陷胸湯 治表未解而醫反下之胃虛而陽氣內陷心下有鞭舌上燥渴小有潮熱心上至少腹痛不

可近

大黃六兩芒硝一升甘遂一錢右三味以水六升先煮大黃取二升去滓納芒硝煮一兩沸納甘遂末溫服一升得快利止後服結胸乃水飲為患傷寒論云此為水結故用甘遂

大陷胸丸 治病發於陽而反下之熱入因作結胸病發於陰而反下之因作瘧所以成結胸者以下之太早故也。

大黃半斤葶苈子數粒芒硝杏仁去皮尖熬黑各半升右四味搗篩二味納杏仁芒硝合研如脂和散取如彈丸一枚別搗甘遂末一錢心白蜜二合水二升煮取一升溫頓服之一宿乃下如不下更服取下為效。

小陷胸湯 治病在心下按之則痛脈浮滑者

黃連一兩半夏半升洗去滓甘草一錢右三味以水六升先煮括裏取三升去滓納諸藥煮取二升去滓分溫三服

白虎湯 治脈滑而厥裏有熱也又治三陽合病腹滿身重諺語遺尿自汗出者

知母六兩石膏一斤甘草二兩粳米六合右四味以水一斗煮米熟湯成去滓溫服一升日三服陽極於內發散則路過故從小便去之

麻黃附子細辛湯 治少陰始得病反發熱脈沉者

麻黃去節細辛各二兩附子一枚泡去皮破八片右三味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫納藥煮取三升去滓溫服一升日三服

四逆散 治少陰傳經熱邪四逆或欬或悸或小便不利或腹中痛或泄痢下重者

甘草炙 枳實破水瀆失乾柴胡芍藥各十右四味搗篩同飲和服方寸匕日三服欬者加五

味子乾薑各五分并生下痢 悸者加桂枝五分 小便不利者加茯苓五分 腹中痛者加附子一分炮令拆 泄痢下重者先以五升煮薤白三升 煮取三升去滓以散三方寸匕納湯中煮取一升半 分溫再服熱邪入深乃見四逆誤認為寒胎害匪細
薤白能治下重以能復大腸之氣也

四逆湯 治脈沉體痛溫溫欲吐下利清穀手足厥冷內寒外熱脈微欲絕等證

甘草二兩 乾薑半兩 附子一枚生用去皮破八片 右三味㕮咀以水三升煮取一升二合去滓分溫再服強人可大附子一枚乾薑三兩四逆湯不可輕用一症不具即當細審心諸症皆全方可決用無疑

四逆加人參湯 治痢後亡血 本方加人參

通脈四逆湯 治下痢清穀脈絕汗出而厥 本方加乾薑一倍

通脈四逆加豬膽汁湯 治汗出而厥脈絕拘急 本方加豬膽汁

當歸四逆湯 治手足厥冷脈細欲絕脈浮革因而腸鳴者

當歸二兩 桂枝芍藥各三兩 細辛二兩 太棗二十枚 甘草通草各二兩 右七味以水八升煮取

三升去滓溫服一升日三服此四逆症乃從太陽誤下所致非厥陰少陰之四逆也故仍以桂枝湯為主

理中丸及湯 治霍亂頭痛發戴身皮痛寒多不用水者理中湯若大病瘥後喜唾久不了了胃上有寒者用理中丸

人參 甘草炙 白朮 乾薑各三兩 右四味搗篩為末蜜丸如雞子黃大以沸湯數合和一

丸研碎溫服之日三服夜二服腹中未熱益至三四丸然不及湯湯法以四物依兩數切用水八升煮取三升去滓溫服一升日三服四逆乃溫下焦中焦之法理中為溫上焦中焦之法各有部位也

附子瀉心湯 治心下痞而復惡寒汗出

大黃二兩黃連

黃芩一兩附子一枚泡去皮
右四味切三味以麻沸湯二升瀆之須臾絞去

滓納附子汁分溫再服治上焦用生藥故瀆而不

汗

梔子政湯

治汗吐下後虛煩不得眠及大下之後身熱未去心中結痛或微煩者

梔子一枚擘香豉綿裹

右二味以水四升先煮梔子得一升半納政煮取一升半去滓分為二服溫

進一服得吐者止後服邪在至高之分以此之謂在上者

而越之也此方之最和平者

真武湯

治太陽汗出不解仍發熱心悸頭眩身瞶動振振欲倒地者又治少陰至四五日小便不利

四肢沉重疼痛自下痢此為有水氣

茯苓

芍藥

生薑一兩

附子一枚泡去皮破八片

右五味以水八升煮取三升去滓溫服

七合日三服此治水逆若效者加五味半升細半乾薑各一兩

若小便利者去茯苓若下利者去芍藥加乾薑二兩若嘔者去附子加生薑足前成半斤

大黃黃連瀉心湯治傷寒脈浮緊而復下之緊反入裏則作痞按之自濡但氣痞耳此主之

大黃二兩黃連一兩

右二味以麻沸湯二升瀆之須臾絞去滓分溫再服

凡治下焦之補劑當多煎以熟為主治上焦之

寫劑當不煎以生為主此亦治至高之熱邪故亦用生藥

白通湯治少陰下痢

葱白四莖乾薑一兩附子一枚生用去皮破八片

右三味以水三升煮取一升去滓分溫再服

此為寒病

白通加豬膽汁方治服白通湯利不止汗出而厥逆無脈乾嘔而煩服湯後脈暴出者死微續者生

即白通湯煎成納人尿五合豬膽汁一合分溫再服

豬膚湯少陰病下利咽痛胸滿心煩者此主之

豬膚一斤 右一味以水一斗煮取五升去滓。加白蜜一升。白粉五合。熬香和令相得。温分六服。

大下之虛

甘草湯桔梗湯 治少陰咽痛先與甘草湯不瘥與桔梗湯

甘草二兩 右一味以水二升煮減半去滓溫服七合。日二服。桔梗湯加桔梗一兩煎法同。此方
之大陰在上

瓜蒂散 治太陽病胸中痞。鞶氣上冲脚不得息。此胸中有寒也。又或手足厥冷。脈乍緊。心中煩滿不能食。病在胸中。並當吐之。

瓜蒂熬 赤小豆絡一右二味各別搗篩為散。已合治之。取一錢匕。以香豉一合。用熱湯七合。煮作稀糜。去滓取汁。和散溫頓服之。不吐者。少少加。得快吐乃止。諸亡血虛家不可與之。

麻黃升麻湯 治傷寒六七日。大下後厥逆。寸脈沉遲。下部脈不至。咽喉不利。吐膿血泄利為難治主之。

麻黃二兩 半升麻 當歸各一兩 知母 黃芩 姜蕤名十石膏。碎綿裹。白朮 乾薑

芍藥 天冬去心桂枝 茯苓 甘草炙絡 右十四味以水一斗先煮麻黃一兩沸去上

沫。納諸藥者取三升去滓分溫三服。令汗出愈。

旋覆代赭湯 治傷寒汗出吐下後。心下痞。鞶嘔氣不除。此主之。

旋覆花三兩。人參二兩。生薑五兩。半夏半升代赭石一兩。大棗擘碎甘草三兩。右七味以水一斗。

煮取六升去滓。再煎取三升。溫服一升。日三服。

苦酒湯 治少陰病咽中生瘡。聲不出者。

半夏洗破十雞子去黃納苦酒著殼中 右二味納半夏著苦酒中。以雞子殼置刀環中。安火上。令二沸去

津少少含嚥之不差。更作三劑服之。奇製法

枳實梔子散湯 治大病瘥後勞復

枳實火梔子十四枚散一升

綿裹

右三味以清漿水七升。空者取四升納枳實梔子煮取二升。下散更

煮五六沸去滓溫分再服。覆令微似汗。若有宿食者。加大黃如博基子大五六枚。作虛治乃純用此氣

清大之品
當細參之

竹葉石膏湯 治傷寒解後虛羸少氣。氣逆欲吐者

方見通治
氣者多屬大症

壯大食氣

燒梶散 治陰陽易病。其人身重少氣。少腹裏急。陰中拘緊。熱上衝胸。頭重不舉。眼中生花。膝脛拘急。

右取婦人中視近陰處。剪燒灰。以水和服方寸心日三服。小便即利。陰頭微腫則愈。婦人病。取男子視

當燒灰

豬膽導法 以豬膽汁加醋納穀道中。

蜜煎導法 以蜜煎老。捏作指大一條納穀道中。以手按之。

右二方俱治傷寒大發汗。小便利。津液內竭。大便雖硬不可攻之。用此法。

治男子新病起房內復者方針 取女人月經赤帛燒服方寸心亦治陰卵腫縮入腹。絞痛欲死方針 取所交接婦人衣服以覆男子立愈。

竹皮湯蠶 治交接勞復卵腫腹痛便縮欲死。

青竹皮一升 右一味水三升。煮五六沸。絞汁頓服立愈。此方范汪亦治大便後勞復。

療食勞方蠶 杏仁五十枚 右一味以酢二升煎取服之。取汗則差。

治結胸矣法本事

巴豆一枚
黃連七錢
右搗細末用津唾和成膏填入臍心以火炙其上腹中有聲其病去矣不拘壯數以病退為度。總多便以溫湯浸手怕拭之恐生瘡也。此法最穩凡胸中病俱可依此法外治

鵝石散
林事 治傷寒發狂棄衣奔走踰牆上屋。

黃連
寒水石各等
右為細末每服二錢濃煎甘草汁調服。

鱉甲散
活人書 治傷寒八九日不瘥名曰壞證傷寒不能治者宜此療之。

升麻
黃柏半兩 前胡去蘆烏梅去核枳實炒熟犀角粉
用半兩 黃芩各半
生地黃切兩
甘草一分
鱉甲去腥米醋炙赤

金匱

右剉如麻豆大每服抄五錢。水一盞半煎至八分去滓溫服。

升麻鱉甲湯
金匱 陽毒之為病面赤斑斑如錦文咽喉痛吐膿血五日可治七日不可治此湯主之。

升麻
二兩 當歸一兩
蜀椒炒去汗
甘草
二兩 鱉甲
一兩 大雄黃
半兩 右六味以水四升煮取一升頓服。老小再服取汗。

升麻鱉甲去雄黃蜀椒方 陰毒之為病面目青身痛如被杖咽喉痛五日可治七日不可治。升麻鱉甲湯去雄黃蜀椒主之。肘後千金方陽毒用升麻湯無鱉甲有桂陰毒用甘草湯即本方無雄黃活人陽毒升麻湯用犀角射干黃芩人參無當歸蜀椒鱉甲雄黃蜀椒半熱之品陽毒用而陰毒反去之。梔子仁湯
活人書 治陽毒傷寒壯熱百節疼痛。

梔子仁一兩
柴胡半兩
升麻
黃芩
兩 赤芍一兩
大青一兩
石膏
二兩 知母一兩
甘草
半兩

杏仁
二兩 陽毒去皮尖及雙仁者搗炒微黃 右件搗為粗末每服抄四錢以水一盞入生薑半分煎一百粒煎至六分去滓不計時候溫服。

還陽湯
林事 治陰毒面色青四肢逆冷心燥腹痛用硫黃末新汲水調下良久或寒一起或熱一起。

更看緊慢。再服一二錢，則為汗出差。

姜蕤湯

活人書

治風溫兼癰。冬溫及春月中風傷寒發熱頭眩痛喉乾舌強胸內疼痞滿腰背強。

姜蕤

三分

石膏

一兩杵碎

白蘞

麻黃

乾秤泡焙

川芎

葛根

生者二兩尤妙

大羌活

去蘆甘草

炙

杏仁

去皮尖雙仁搗碎各半兩

青木香

春用半兩炒

右判

如麻豆大

每服五錢水

一盞半煎

日三服

此清散之劑
可治時疫

白虎加蒼朮湯

本事方

治濕溫多汗。

知母

五兩

甘草

二兩

石膏

一斤杵碎

蒼朮

梗米

六合

三

右為末。每服四錢水一盞半煎至七分。去滓取汁溫服。

黑膏

活人書

治溫毒發斑。

好致

一升

生地黃

半斤切

右二味以豬膏

一斤合露

之煎令三分減一。

絞去滓。

用雄苗麝香如大豆

者內中絞和盡服之。毒便從皮中出。則愈。凡外感之症。治之得宜。六七日間無不愈者。過期不愈者。皆治法千端聚訛。不復故。仲景傷寒論。治傷寒之正方。不過數首。餘皆吳氏治之。變症。故取治雜病之方。隨症治療也。按傷寒為外感之總名。傳變出入。千頭萬緒。仲景傷寒論一字不可遺漏。今止舉六經本病。及六經主方數首。以存大畧。不可以此而廢全書也。能將傷寒全書熟讀而精通之。則凡為外感之病。游刃有餘矣。故此集外感之方。選錄甚少。意有在也。

百合病

金匱

論曰。百合病者。百脈一宗。悉致其病也。意欲食。復不能食。常默然。欲卧。不能卧。欲行。不能行。飲食或有美時。或有不用。聞食臭時。如寒無寒。如熱無熱。口苦小便赤。諸藥不能治。得藥則劇吐利。如有神靈者。身形如和。其脈微數。每渴時頭痛者。六十日乃愈。若渴快然。但頭眩者。二十

日愈其證或未病而預見。或病四五日而出。或病二十日或一月微見者各隨證治之。

百合病見於陰者以陽法救之。見於陽者以陰法救之。見陽攻陰復發其汗此為逆見陰攻陽乃復下之此亦為逆。此等症病後得之者甚多醫者不知多方誤治以致病氣日深不可救廢始終無一能識之者遍地皆然也

人能識之者遍地皆然也百脉一宗悉病蓋肺朝百脉故以百合治肺為主藥

百合病方

百合知母湯金匱

百合病發汗後者主之。

百合擘七枚

知母二兩

右先以水洗百合瀆一宿當白沫出。去其水更以泉水二升煎取一升去滓。

別以泉水二升煎取一升去滓後合和煎取

滑石代赭湯金匱

百合病下之後者主之。

百合擘七枚

滑石三兩碎如彈丸大

綿裹代赭石如彈丸大

右先以水洗百合瀆一宿當白沫出。去其水更以泉

水二升煎取一升去滓

別以泉水二升煎滑石代赭取一升去滓後合和煎取一升五合分溫服

百合雞子湯金匱

百合病吐之後者主之。

百合擘七枚

雞子黃一枚

右先以水洗百合瀆一宿當白沫出。去其水更以泉水二升煎取一升去

滓內雞子黃搗令細煎五分溫服

百合地黃湯金匱

百合病不經吐下發汗病形如初者主之。

百合擘七枚

生地黃汁一升

右先以水洗百合瀆一宿當白沫出。去其水更以泉水二升煎取一升

去滓內地黃汁煎取一升五合分溫再服中病勿更服大便當如漆

百合洗方金匱

百合病一月不解變成渴者主之。

百合升以水一斗瀆之一宿以洗身洗已食煮餅勿以鹽豉也

桔萎牡蠣散金匱 百合病渴不差者主之。

桔萎根 牡蠣殼等 右為細末飲服方寸匕日三服。

百合滑石散金匱

百合病變發熱者一作發主之。

百合一兩 滑石三兩

右為散飲服方寸匕日三服當微利者止服熱則除。

感冒方附

九味羌活湯張元素方

四時發散

羌活 防風 川芎 白芷 細辛 蒼朮 黃芩 甘草 生地 右加生

薑三片葱白三莖水煎服此外此之總方惟生地不若易當歸為佳此方

敗毒散醫人

治傷寒瘟疫風濕風肢拘踠風瘻頭痛目眩四肢痛憎寒壯熱項強睛疼。

羌活 獨活 前胡 柴胡 川芎 枳殼

白茯苓 桔梗 人參兩

甘草五錢右為細末每服二錢水一盞入生薑三片煎七分溫服或沸湯點服。煩熱口渴加黃芩。

參蘇飲湯

治感冒風寒頭痛發熱憎寒欬嗽涕唾稠黏胸膈滿悶脈弱無汗。

人參

蘇葉 乾葛 前胡 陳皮 枳殼

茯苓 半夏各八

桔梗

木香

甘草各五

生薑五片大棗一枚

右十三味水煎熱服取汗

以上三方乃感冒風寒之總法其病在皮毛肌肉之中未入經絡故不能傳變大設驅散太陽陽明之風寒足矣其有食者

則兼用消食之品可也此等症四時皆有南方最多

寒熱

靈素

靈口問篇帝曰人之振寒者何氣使然岐伯曰寒氣客於皮膚陰氣盛陽氣虛故為振寒寒慄。

素逆調論黃帝問曰人身非常溫也非常熱也為之熱而煩滿者何也岐伯對曰陰氣少而陽氣勝故熱而煩滿也。帝曰人身非衣寒也中非有寒氣也寒從中生者何也岐伯曰是人多壅氣也陽氣少陰氣多故身寒如從水中出帝曰人有四肢熱逢風寒如火如大者何也岐伯曰是人者陰氣虛陽氣盛四肢者陽也兩陽相得而陰氣虛少少水不能滅盛太而陽獨治獨治者不能生長也獨勝而止耳。逢風寒如火如火者是人當肉爍也。帝曰人有身寒湯火不能熱厚衣不能溫然不凍慄是為何病岐伯曰是人者素腎氣勝以水為事太陽氣衰腎脂枯不長一水不能勝兩大腎者水也而生於骨。腎不生則髓不能滿故寒甚至骨也所以不能凍慄者肝一陽也心二陽也腎孤臟也一水不能勝二大故不能凍慄病名曰骨牌是人當攣節也。帝曰人之肉苛者雖近於衣絮猶尚苛也是為何疾岐伯曰榮氣虛衛氣實也榮氣虛則不仁衛氣虛則不用榮衛俱虛則不仁且不用肉如故也人身與志不相有曰死

移熱移寒 素逆調論黃帝問曰五臟六腑寒熱相移者何岐伯曰督移寒於脾癰腫少氣脾移寒於肝癰腫筋攣肝移寒於心狂隔中心移寒於肺肺消飲一溲二死不治肺移寒於腎為涌水涌水者按腹下堅水氣客於大腸疾行則鳴濯濯如囊裹漿水之病也脾移熱於肝則為驚効肝移熱於心則死心移熱於肺傳為鬲消肺移熱於腎傳為橐瘞腎移熱於脾傳為虛腸澼死不可治胞移熱於膀胱則癃溺血膀胱移熱於小腸鬲腸不便上為口糜小腸移熱於大腸為虛瘕為沉大腸移熱於胃善食而瘦又謂之食亦胃移熱於膽亦曰食亦膽移熱於腦則卒頰鼻淵鼻淵者濁涕下不止也傳為衄矯眞目故得之氣厥也

難經

寒熱之病候之如何也然皮寒熱者皮不可近席毛髮焦鼻毫不得汗肌寒熱者皮膚痛唇口鼻無汗骨

寒熱者病無所安。汗注不休。齒羣痛。陽維為病苦寒熱。

傷寒論

病人身大熱反欲近衣者熱在皮膚。寒在骨髓也。身大寒反不欲近衣者寒在皮膚。熱在骨髓也。

此種寒熱既非感冒亦非傷寒其淺深有皮膚骨髓之殊其久暫有歲月之異輕者有似感冒重者即變骨蒸所以內經以後諸書寒熱自有方論不入傷寒等法大段以清營中之熱為主其或有風有疾有積有瘀者則隨症消息之可也

寒熱方

四時加減柴胡湯

金匱

治五臟寒熱

柴胡

白朮各八分

大腹檳榔

一枚并皮子用

陳皮

五分生薑

五分桔梗

七分以上

冬三月

柴胡稍多

春三

月減白朮

增枳實

夏三月又增

甘草

仍用枳實

白朮秋三月同冬三月惟陳皮稍多

右各咬咀分為

三貼

一貼以水三升

煮取二升

分溫三服

如人行四五里

進一服渣再合煎一服

胡

治寒熱總不能外柴

寒熱久者必有

積帶

分錢半兩

分讀去聲

天行熱病

方外臺

療天行三日外

至七日不歇

內熱令人更相染著

主大青消毒湯

大青四兩

香豉八合

綿裹熬

乾葛

梔子各四分

生地切

升

芒硝

三兩

右六味切

以水五升

煮取二升

半去滓下芒硝分三服

一方有石膏八兩

忌無薑熟麪酒蒜等物

此方專清

苦參湯

金

療天行熱病

五六日以上宜服

苦參

三兩

黃芩

二兩

生地黃

八兩

右三味切

以水八升

煮取二升

去滓溫服半升

日再服

忌無薑

凝雪湯

臺

療天行毒病

七八日熱積胸中

煩亂欲死

荒花一升

右一味以水三升煮取一升半瀆故布薄胸上不過再三薄熱則除當溫四肢護厥逆

迦<sub>按本草荒花能治
蟲毒消胸中痰水</sub>

大黃湯外 療天行五六日不解頭痛壯熱四肢煩疼不得飲食

大黃胃黃連心肝黃柏腎梔子_{肺各半兩} 右四味以水八升煮六七沸內煎一升。每白七盞。煮取三

升去滓分三服此許推然方神良又療傷寒已五六日頭痛壯熱四肢煩疼取汗並宜老小忌猪肉冷

水_{此二黃湯之變}

熱能除六經之熱

桃葉裏身法外 水一石。煮桃葉取七斗。以薦席自圍衣被益上安桃湯於牀竇下取熱自熏停少時當

雨汗汗遍去湯待歇速粉之并灸大椎則愈

_{按寒熱之因千變萬殊有屬外感有屬內傷而外感內傷之中又各不同其外有屬寒飲有屬寒血有屬積聚}

_{有屬寒症不可勝舉其治法各詳於本病條}

_{下當細審之此只錄時行熱病之數方耳}

霍亂附轉筋

傷寒論

問曰病有霍亂者何答曰嘔吐而利名曰霍亂問曰病發熱頭痛身疼惡寒吐利者此屬何病答曰此名霍亂自吐下又利止復發更發熱也 傷寒其脈微澀者本是霍亂今是傷寒卻四五日至陰經上轉入陰必利本嘔下利者不可治也欲似大便而反失氣仍不利者屬陽明也便必鞶十三日愈所以然者經盡故也下利後當便鞶鞶則能食者愈今反不能食到後經中頗能食復過一經能食過之一日當愈不愈者不屬陽明也吐利發汗脈平小煩者以新虛不勝穀氣也_{此霍亂是傷寒變症}

霍亂者由人溫涼不調陰陽清濁二氣有相干亂之時其亂在於腸胃之間者因遇飲食而變發則心腹

絞痛。其有先心痛者，則先吐先腹痛者，則先利。心腹並痛者，則吐利俱發。挾風而實者，身發熱頭痛，體疼而復吐利虛者，但吐利心腹刺痛而已。亦有飲酒食肉，腥膾生冷過度，因居處不節，或露卧濕地，或當風取涼，而風冷之氣歸於三焦，傳於脾胃。脾胃得冷，則不磨。不磨，則水穀不消化，亦令清濁二氣相干。脾胃虛弱，便則吐利，水穀不消，則心腹脹滿，皆成霍亂。霍亂脈大，可治；微細，不可治。霍亂吐下脈微，遲氣息劣，口不欲言者，不可治。此霍亂之正病言之最詳乾霍亂者，是太氣搏於腸胃，致飲食不消，但腹滿煩亂，絞痛短氣也。按轉筋之病，金匱有雞屎白散一方，附脚氣條下，而轉筋之症，不一有平時常轉筋者，有霍亂而轉筋者，特有轉筋入腹者，當用木瓜、吳茱萸等藥及外治湯熨之法，以備選擇。

霍亂轉筋方

五苓散 霍亂頭痛發熱多，欲飲水者主之。寒多不用水者，理中丸主之。論見通治

理中丸

此是寒霍亂之方，百不誤用者，害不旋踵。

加減法 若臍上築者，督氣動也。去末加桂四兩，吐多去末加生薑三兩。下多者還用末，悸者加茯苓二兩。渴欲得水者，加木足前成四兩半。腹中痛者，加人參足前成四兩半。寒者，加薑成四兩半。腹滿者，去末加附子一枚。服湯後如食噴，飲熱粥一升許，微自溫，勿發揭衣服。
又方 千金翼 治霍亂轉筋，兩臂及脚胸脇諸轉筋，並主之。

香薷一把，水煮令極濃，服二三升，即差。青木香亦佳。

廣濟高良薑湯外臺 治霍亂吐瀉，轉筋入腹。

高良薑四兩桂心四兩右二味以水七升煮取二升去滓分三服此亦治寒

霍亂轉筋入腹方外木瓜子根皮合煎湯服之

茱萸湯外療霍亂轉筋不止

吳茱萸一升甘草乾薑各二錢子一把亂髮燒桂心二兩右六味以水七升煮取二升三

合去滓分溫三服

大法外臺以手拘所患脚大母指當脚心急筋上七壯又灸當足大母指聚筋上七壯又灸足大母指下約中一壯又灸湧泉入腹者灸臍左二寸十四壯又灸股中大筋上陰一寸轉筋四逆者灸兩乳根黑際各一壯轉筋欲死者灸臍上一寸十四壯

藿香正氣散局元散脚蘇合香丸局

香薷飲周方俱見通治

症

金匱

太陽病發熱無汗反惡寒者名曰剛症一作痙太陽病發熱汗出而不惡寒名曰柔症太陽病發熱脈沉而細者名曰症為難治太陽病發汗太多因致症夫風病下之則症復發汗必拘急瘡家雖身疼痛不可發汗汗出則症病者身熱足寒頸項強急惡寒時頭熱面赤目赤獨頭動搖卒口噤背反張者症病也若發其汗者寒濕相得其表益虛即惡寒甚發其汗已其脈如蛇暴腹脹大者為欲解脈如故反伏弦者症夫症脈按之緊如弦直上下行症病有灸瘡難治太陽病其症備身體強八人然脈反沉遲此為症太陽病無汗而小便反多氣上衝胸口噤不得語欲作剛症症為病胸滿口噤臥不著席腳攣急止齒

聖方

括薑桂枝湯

金匱

太陽病甚。症備身體強八八然。脈反沉。進此湯主之。

括薑根

二兩桂枝

芍藥

三兩

甘草

二兩

生薑

三兩

大棗

十二

右六味以水九升。煮取三升分

溫三服。取微汗。汗不出。食項啜熱粥法。

麻黃加獨活防風湯

金匱

治癰瘍

麻黃

桂枝

芍藥

一斤

藥

三兩

甘草

半兩

獨活

防風

各一

右六味

每服一兩

水煎

產乃傷寒壞症。一兒得之。猶有愈者。其餘則百難瘳。一其
醫者或有因下而得生虛者。竟無治法。全匱諸方。見於絕少。

葛根湯

金匱

大承氣湯

金匱

桂枝加葛湯

有干用見中
藥寒門

小續命湯

見中
風門

癃閉利淋

靈素

靈本輸篇。三焦手少陽之脈入絡膀胱。約下焦。實則閉癃。虛則遺溺。

五味篇。酸走筋。多食之。令人癃

素宣明。五氣論。膀胱不利為癃。不約為遺溺。氣厥論。胞移熱於膀胱。則癃溺血。骨空論。督脈為病。癃

痔。遺溺。

金匱

淋之為病。小便如粟狀。小腹急。急痛引脣中。淋家不可發汗。發汗則必便血。熱在下焦者。則尿血亦令淋祕不通。小便不利者。有水氣。其人若渴。

病源

石淋 淋而出石也。腎主水。水結。則化為石。

氣淋 腎虛膀胱熱氣脹所為也

膏淋 淋而有肥狀似膏故謂之膏淋亦曰肉淋此腎虛不能制於肥液故與小便俱出也

勞淋 热淋之甚者則尿血心主血血之行身遍經絡循環腑臟勞甚則散失其常經溢滲入胞而成血淋也

胞轉 其病狀臍下急痛小便不通是也或因小便應下而強忍之或為寒熱所迫此二者俱合水氣還上氣於胞使胞屈別不得充張外水應入不得入內溲應出不得出外內相雍塞故令不通病至四五日乃有致死者飽食訖應小便而忍之或飽食訖而走馬或小便急疾走或忍水入房皆令胞轉或胞落並致死數便為產絕便為胞轉

尿床 小便乃水液之餘從膀胱入於胞夜卧則陽氣衰伏不能制於陰所以陰氣獨發於眠睡不覺尿出也

癃閉利淋方

括蔥瞿麥圓金
覆盆子一兩 小便不利者有水氣其人苦渴此主之

括蔥根二兩茯苓三兩薯蕷三兩附子泡瞿麥一兩 右五味末之煉蜜丸梧子大飲服三丸日三服不知增至七八丸以小便利腹中溫為知

滑石白魚散驗 主小便不利

滑石二分亂髮燒三分白魚二分 右三味杵為散飲服半錢七日三服

茯苓戎鹽湯驗 小便不利主之

茯苓半斤白朮二兩戎鹽一兩大根蟬右三味以水五升煮取三升溫三服

豬苓湯金匱 脈浮發熱渴欲飲水小便不利者主之。

豬苓去皮 苓

阿膠

滑石

澤瀉各一兩 右五味以水四升先煮四味取二升去滓內

膠烊消溫服七合日三服

此蓄飲之症

治諸種淋方千金

葵根八兩 茅根

石首魚頭口各三兩 宜用頭中骨甘草

通草二兩

貝子五合 天麻根五兩

右七味

㕮咀以水一斗二升煮取五升分五服日三夜二亦主石淋治石淋尤切

石葦散千金 治血淋

石葦

當歸

蒲黃

芍藥

右四味

各等分治下篩酒服方寸匕日三

胞轉方千金 治丈夫女人胞轉不得小便八九日者

滑石一斤 寒水石碎

葵子一升

右三味以水一斗煮取五升盡服即利

瘻小便難方本事 治便難小腹脹不急治殺人

用葱白三斤細剗炒令熱以帕子裹分作二處更替運臍下即通

石葦散局方 治膀胱有熱淋澀不宣或尿如豆汁或便出砂石並治之

木通兩 石葦二兩 去毛滑石

白朮

瞿麥

芍藥

葵子各三兩

當歸

甘草炙

王不留行 右為細末每服二錢小麥湯調下食前日二三服

藕葦煎書養老 治老人淋病小便不利痛閼之極

藕汁五合 白蜜五合 生地黃汁一升

右相和微火煎之令如餳空心含半匙漸漸下飲食忌熱食

采肉此方亦治血淋

治石淋方十金

車前子二升綢袋貯以水八升。煮取三升。空腹頓服之。須臾當下石子。宿勿食。服之良。

治熱淋方千金 石斛四斤 白茅根四斤 以水一斗五升。煮取五升。每服一升。日三夜一。

四汁飲 治熱淋小便赤澁疼痛。

葡萄取自然汁 生藕取汁 生地取汁 白蜜各五

右和勑先把一盞銀器石器內慢火熬沸。不拘時溫服。

牛膝膏 治死血作淋。

桃仁尖去皮 鳴尾各一 牛膝四兩酒浸一服 赤芍赤芍 生地兩半 水十鍾。微火煎至二碗入麝香少許。分四次空心服。如夏月用涼水換此膏不壞。

八正散清 治諸淋

瞿麥 桔子 菊蓄 大黃 滑石 木通 車前子 甘草各一 加燈心一

錢煎服。

治小便失禁方針 以水三升。煮雞腸取一升。分三服。

家韭子丸 治遺溺及陽氣衰敗。白濁遺精。

家韭子炒 小鹿茸四兩 肉苁蓉酒浸 牛膝酒浸熟地 當歸兩 兔絲子酒浸巴戟 酒半 杜仲

石斛 桂心 乾薑各一 右為末。酒糊丸。桐子大。每服五十丸。加至百丸。食前鹽湯溫酒任

下。小兒遺尿者。多因胞寒。亦陽氣不足也。別作小丸服。

夜多小便方千金 治膀胱冷。故小便至夜獨多。

雞腸加食 羊腎一具去脂 赤石脂六兩 龍骨三兩 肉苁蓉四兩 川連五兩 桂心二兩 右七味為

未。每服方寸匕。日二服。五日中作羊腎丸一劑。十日外作羊腎脯。香味如常食飽與之。

豬肚丸 治小腹頻數。

豬肚一個蓮子一升同煮去皮心焙乾為末

船上茴香五錢破故紙水炒

川棟子酒炒去核一兩

丁香三兩加桑螵蛸一兩

加桑螵蛸水炒去核一兩

加桑螵蛸水炒去核一兩

加桑螵蛸水炒去核一兩

一兩尤效。蜜丸梧子大。每服五十丸。空心溫酒送下。

縮泉丸 治脬氣不足。小便頻多。

烏藥

益智仁各等分二味為末。

酒煮山藥糊丸如梧子大。每服五十丸。空心鹽湯送下。

一方有覆盆子

治尿床針

取雞肫肝一具。并腸燒末酒服。男雌雌雄。

威喜丸治通見水

蒲灰散治見水

龍腦雞蘇丸治五淋血

見通治