

卷式

脈葉
方
考
合
刻



脈藥聯珠卷二石

沈脈部 無浮及革計二十六脈

沈脈為裏或氣或積氣鬱脈軟積則有力治積宜攻治氣調益攻積之劑大黃枳實厚朴

芒硝污濁可滌木香檳榔三稜莪遂蒼朮當歸疎熱導濕脈沈軟者調香散鬱香附神

麴梔子炒黑川芎山查麥芽可入沈香烏藥人參補益腹脇膨脹服之可釋此方正合

氣湯宣明三稜散丹溪越鞠丸嚴氏四磨湯也所有沈脈兼症雖分晰于後但沈脈提

網總言或氣或積其治法亦宜臨症變通泰酌者若舌胎黃滑則行中宜兼用燥藥以

治其濕若舌胎乾黃行中宜兼潤藥以助其津然舌胎黃滑而不用燥藥可舌胎若是

黃不用潤藥不可潤藥者如油當歸火麻仁括婁仁郁李仁桃仁天門冬生地知母冬

葵子之類也燥藥者如蒼朮茯苓羌獨活車前皆冷澤瀉

澤瀉苡仁半夏南星之類也又須學者細心詳察加減非筆墨所能盡也

沈遲之脈為冷為寒附子理中可以投緣草薑參朮烏附相參脈若有力攻行始安厚朴

肉寇草果同煎木香大腹肉桂心添醒脾解鬱行水為先此方正合仲景附子理中湯

方倍朮丸也夫沈為諸鬱遲乃屬寒又為血冷凝積須分有力無力若有力宜溫中開

導無力宜溫中調氣與氣口相應者為凝寒積滯以此方泰酌用之乃專治裡寒之法

沈數內熱邪伏陰經或提或散清熱方甯升麻羌活白芍葛根黃連生地知母黃芩石膏

參草梔子檳清若或有力芒硝生軍連翹薄荷配合清心此方正合局方羌活升麻湯

湯也夫沈屬裏數為熱此乃外感寒邪失于表散而傳入陽明鬱結化熱者也故宜升

提清散也或其人素有積滯其脈必寔又當攻下截此而除熱所以亦可用硝黃等味

又或陽盛而裏虛之症治法與此不同詳于數沈之條是以沈數及數沈雖似而治法有間學者于此等脈症治究心不悞其療疾或庶幾乎無謬矣

沈滑痰實宜降宜攻陳皮半夏茯苓和中加蒼白朮香附川芎黃連枳殼厚朴橘紅藿香

參人蘇葉子同星香烏藥氣下疾鬆如或滑甚滾滾丸攻此方正合局方二陳湯東垣平胃散陳

氏不換金正氣湯局方四七湯簡易星香湯王隱君滾滾丸也夫沈為鬱滑為痰無刀為虛有力為實而疾之為病異變百出先除其本則百症俱消而治痰宜先治氣治氣

即是清火此中奧妙學者宜通百症可以類推也

沈瀉少血亦主寒濕少血宜補加味四物芎歸熟地白芍連柏五味麥冬人參蒼朮杜仲

知母可加牛膝三痺湯和驅風利濕續斷細辛防風獨活芪桂茯苓秦艽草人五臟藥

者合用五積麻黃蒼朮陳朴夏枯枳殼乾姜臨時損益此方正合正傳加味四物湯濟

有五積外有五痺五積者乃寒熱氣血疾也五痺者乃皮脈肉筋骨也然而病源總在

乎肺心脾肝腎耳當名何經何痺大凡痺症脈多見瀉若心脾痺多在血分肺脾痺多

在氣分診法則左屬血而右屬氣若骨痺則屬腎經是經氣大虧而氣血兼病已如血

分痺宜四物合五積散治之氣分痺宜四君合五積散主之再以引經之藥酌配君臣

佐使以抽添補瀉之法或半補半瀉或六補四瀉或七補三瀉又在學者臨時會意至

骨痺一症受病既深精脈既壞十難愈一若脾胃尚健猶可施治然七年之病非三年

之艾不能膠也

沈大裏症謹防夜厄邪復五臟三焦壅塞或提或導逐邪要訣調中益升提邪出升柴

參芪木香蒼朮甘草橘紅開鬱利濕若或內結硫黃可入除却參芪加朴枳實黃芩白

芍當歸宜益治理無訛破氣調血此方正合東垣調中益氣湯陶氏六一順氣湯良方

病則夜重又為氣甚血虛之脈宜理氣調血為先如推氣內陷者治宜提散若脈兼實而舌苔黃者則宜下之乃以硝黃易參芪以枳實破其氣歸芍調其血六順氣當歸承氣合為一方也而其間或更兼他脈在於何部又須加減學者總宜究心約性為要

沈緩氣弱每多眩暈四季脈緩不為之病中洲土濕時時悶氣條肝疎土更兼益腎管得

肝鬱發痞滿症沈香木香羌蘇葉並檳榔大腹木草芍進更用木瓜肝脾痺靜如有內

寒乾姜力勁厚朴薑黃參芪扶正陳澤白蔻砂仁氣順甘草益智通益心腎或水腫脹

舟車丸定此方正合局方二和湯東垣溫胃湯也夫沈為鬱緩為濕凡見是脈者看其

氣虛則脈自流利已若內有寒濕而見麻木筋痛閉症者則用澤瀉乾姜等味導濕益中疎通可耳若有蓄水腫脹脈沈緩而實者宜用舟車丸改去陽水然後按脈症調理

舟車丸乃牽牛大黃甘遂大戟
芫花青皮橘紅木香輕粉也

沈洪之脈病在陽明三焦並熱宜散宜清黃連黃柏梔子黃芩升麻歸地犀角通靈丹皮

翹草加用葛根舌胎黃者可益生軍知母白芍用以斂陰此方正合局方解毒湯東垣

湯薛氏正氣湯河間黃芩芍藥湯也脈經洪為陽附於浮而不附沈沈獨不知浮沈連數之外其二十四脈皆形容脈神也洪者如波浪之洶洶而浮部見者在于皮上得之

沈部見者在于肉下得之見脈則見其洶洶之形宜浮則有波浪之形哉沈則無波浪形哉總在八手得脈之神合其形狀耳如能于浮沈中分洪大虛散濡弱微細連數中

分緩瀉伏革滑結促代者其診視庶幾乎近矣凡沈洪之脈乃表和裏熱每多吐衄崩中腸癰內症也

沈實積熱三焦壅塞風寒貫經滯痰挾食治宜豁達兼用表劑厚朴檳榔草果散鬱知母

苗芩草芍羌活葛根柴胡生軍條積三陽並治伏邪提出若繫帶違腰間洞泄乃是胃

寒或呃逆治先理中推蕩寒積大黃芒硝歸尾朴枳桃仁肉桂附子羌活薑木茴香加

草參末寒熱同施並行不悖此方正合吳氏三消飲仲景桃仁承氣湯陶氏黃龍湯實

則積去熱消氣復也然亦有寒中藏臍而兼腎家有濕者必有洞泄之症夫瀉而脈猶

沈實者寒滯不行也宜以硝黃枳朴破其積姜附木香散其寒如陽如解凍太盛

則游沙即去脈稍見軟即當抽添消補之法

調理脾胃學者細究察非筆墨所可盡者

沈弦血少或停飲漿有力困酒無力勞傷直來直去腸痛難當抑肝扶脾滋陰和陽若治

停飲枳殼檳榔豬苓澤瀉赤茯苓木香半夏蘇子桔橘生薑木瓜吳萸柴朴草將膏皮白

木草果助勳黃芩白茯苓煎用薑棗脈如無力補血地黃山萸山藥丹澤同方或益附桂

八味丸良此方正合良方木香分氣散及雞鳴散濟生清脾飲崔氏八味丸也沈弦

肝之正脈若六部俱見則肝木侮脾可知所以多飲而脈弦者酒能助肝而

傷脾也况肝藏血酒能散血血散則肝空肝空則脈弦矣若非因飲即是肺血不足然

補肝當先益腎故宜八味丸以熟地補血懷山補脾茯苓補心肺丹皮清邪熱澤瀉導

腎濕山萸補肝腎而過竅肉桂抑木扶脾化氣附子引血葯以滋不足之真陰及行十

二經營而溫散凝滯夫血和則肝滿肝滿則筋和脈暢乃無過于不及之象所以脈葯

消息機關始

見奇妙也

沈緊內寒腹中必痛在上胃疼在下後重陰凝之疾溫散開壅附子乾薑歸芍為從厚朴

陳皮參椒酌用桂茯苓蔻丁木香供升降得宜細辛動引溫經發表麻黃可統若有外

症施治不共緊滑宜涼前方不用丹皮桃仁硝黃一開瓜婁山甲防芷堪奉連翹歸芪

金花調送

此方正合良方溫胃湯三因桂香散仲景麻黃附子細辛湯及薛氏牡丹皮湯正宗八味排膿散也凡脈沈而緊者寒病在內宜溫之散之可用前方得

效若或沈緊而兼滑實者恐有腸癰等症則未可用前方當以清涼解毒排膿為要一
般沈緊之脈須辨大小虛實滑澹則內熱外寒之疾有別用藥懸殊學者總宜察辨問
沈長之脈陽邪潛伏熱閉陽明大腸積蓄如或壯熱防發陽毒治先下之大黃生熟歸芍

甘草丹皮赤茯苓白木生芪治足加苓蒼朮連翹獨活牛膝木通枳陳豨蓬宣散疎

通寒温用熟此方正合子和四順清涼散活人加味防已湯也夫脈沈為陰給脈長為

陽盛若沈而帶滑實者宜用苦寒或帶緩緊者宜用辛涼當臨時加減不

可泥定死譜如治陰結則姜黃鬱金乳香沒藥木香等俱可加入如治陽盛則梔子機應變所定之訣乃大槩規模如此之

連黃柏花粉等味俱可加入如治陽盛則梔子機應變所定之訣乃大槩規模如此之

脈當用如此之藥而未得沈長之脈反用溫補溫散解表汗吐之劑者也

定歌訣雖以二三古方合而為一猶未能盡應變之用而仍諄諄以抽添應變之為訣

勿泥古方之說於

治道或有小補云

沈乳有痰或便或溺失血過多必見是脈帶緊腸癰帶滑淋熱治先調和歸尾艾葉地芍

川芎阿膠炙草或加地榆胡索牛膝丹皮桃仁桂心 逆薑黃紅花散瘀之劑若失過

多先宜補益一味丹參止加三七涼以蒲黃瀆燒卷柏芋根髮灰草霜犀屑熱益苓連

寒加茂木吐衄崩便分虛與熱臨時變通方中損益此方正合金匱加味膠艾湯良方

牛膝散及姜黃散加味丹參散也

若脈沈而乳未見失血之症必有痰積若帶滑緊必係腸癰內疾治法詳于沈緊之條

而既有痰積雖用行散之藥亦仍致便溺而後愈也若帶洪大弦長乃腸癰血痔已成

治本俱在本條然在兩寸見乳即當吐衄兩尺見則當便溺兩關見或吐或便如右寸

見乃肺家血左寸見則心家血右關見乃脾胃血左關見乃肝與小腸之血兩尺見乃

大腸膀胱之血治法當按何經用何

藥為君子為性考查不至有誤也

沈微陰虧或痢或汗若在病後誤下為判治為補正參芪桂半草木茯苓歸芍同贊五味

熟地或益薑炭如崩血漏伏龍肝斷阿膠蚕砂搜風救難中寒氣虛附烏雄辨此方正至

十寶湯寇氏伏龍肝散局方三建湯也沈微乃大傷正元之脈亦有霍亂吐瀉之後似

後及血虛內風癱瘓諸症亦可於峻補之中加妙黑荆芥獨活細辛

沈細之脈氣少體弱帶緊神勞滑致僵仆僵仆因疾神勞痛作緊宜治血參芪朮託熟地

英歸茯苓桂酌茯苓防風五味斂約如或滑促痰火灼燥治宜清理半扶半劑如夏橘

紅柴蘇厚朴消火丹皮生地白芍治血妄行生磨犀角補氣行痰降火之藥此方正合

黃芪湯局方七氣湯及犀角地黃湯也夫沈細雖為少氣然有病之脈須兼緊緩滑促

同看以分氣血寒熱之症非似沈微之症為虛症如帶滑者在上則嘔在中則噤全滑

乃至僵仆是疾盛而正氣不足閉其兩道以致僵仆也若帶緊緩者是血不榮經氣不

運血故有四肢不舉筋骨疼痛之病亦或有癥瘕凝滯之疾或脈帶促者則因陰火內

斷牛膝枸杞菴蓉鹿茸虎骨等味宜臨症加減唯冬季得是脈而四至平和者勿作為

大病脈看之是弱人之正脈也

沈濡亡血致有冷痺下部有熱小便不利冷痺宜溫歸芍熟地肉桂川芎參芪助氣小便

閉淋滋陰得濟石斛丹皮麥冬五味草梢木香苓朮濕利山藥健脾鹿膠合劑阿膠和

血滋腎養肺此方正合拔萃黃芪益損湯外台白膠散千金阿膠煎也夫濡者如水底

沈弱虛極氣虧血竭寸見陽衰尺見精絕救弱之法惟有補益扶陽補氣救陰滋血四君

四物十全大補建中選擇變易之方熟地巴戟山藥苓莢小茴牛膝杜仲五味從容潤

澤遠志芎藭蒲朮杞棗蜜鹿角膠霜故紙補益柏仁兔絲地苓得力此方正合丹溪論陰

斑丸也沈弱乃勞怯病後之脈縱有餘邪亦先補正故宜用四君子湯大補丸青囊仙傳

苓甘草以補氣用四物熟地當歸芍藥川芎以補血二湯合之為八珍湯加黃芪肉桂

為十全大補湯再加附子參冬半夏從容為十四味大建中湯也至後之藥味每合古

方然臨症加減在學者考察精明隨經易味以期填寔虧虛不致有實實虛虛之誤又

非筆墨所能盡述也

沈本無虛肥人亦有不為傷暑氣虧精走脚弱喘促胃弱致嘔補中益氣扶土為首參朮

芪苓歸芍麥偶熟地茯神桔半草友五味蓮肉懷山甘遠志棗仁麝沈香誘附

從

蓉鹿茸用牡或益牛膝下行不苟調理陰陽精神抖擻此方正合萬氏旋神飲集驗鹿

茸丸也沈脈木無虛脈之位而

於胖人之皮下肉上見之亦近乎沈而控之空軟者亦即虛也故載是症况胖人於皮

下肉上現脈每近於實若著肉而空則為虛矣無論他症先扶脾胃蓋脾胃主肉而肉

見空虛故宜先理中州若於夏日宜兼清暑之味如香薷藿香赤茯苓六一散之類加

減用之可耳如非夏日而有脚軟筋疲神衰氣弱之象非峻補不可也學者宜詳之

沈牢怪脈脫精敗血寒熱相搏或急或滿婦人半產治宜分別半產崩漏當歸艾葉熟地

阿膠芎芎芪炙敗精症者川烏巴戟故紙茯苓懷山白朮從容單解石斛白蔘肉桂桃

仁並追寒濕或加吳萸川椒枸脊龜鹿二膠麥冬回脈丸用天真或堪避厄此方正合

散局方安腎丸也夫牢者推筋著骨如按石礙而中混混然有脈此乃陰分傷極陽氣

潛伏而未絕之象治宜補陰而不可膩滯升陽而不可峻發宜潤而不滯溫而不峻如

天真丸者宜之與龜鹿二仙膠俱堪並用方在彙古方中若婦人半產血崩漏下見是

脈者急用前方和經益血宣達營衛氣血復而脈自起如腎氣素虧又夾寒濕當用後



方溫寒封濕扶弱益精見脈起而柔軟再作丸服然此等脈現縱堪療治亦須保養百日乃可見效未嘗非起死回生之道也

沈動陰虛時時發熱或驚或痛四肢攣厥陰陽不和治宜解結當歸芍藥草蘇芎桔半夏

青陳烏藥二枳檳榔大腹木香磨汁虛有汗者黃芪補益防風茯苓牡蠣茯苓老或足

蟲脈帶曲屈妙應殺蟲黑丑鶴蝮雷丸檳榔貫衆大戟輕粉大黃使君黑錫苦棟根行

茴香疝截或加川椒蕪荑乾漆兌角煎丸雄黃衣赤一補一下治法迥別學者慎之道

難盡筆此方正合局方流氣飲子宣明牡蠣白朮散醫林妙應丸也凡沈動之脈看有

陰陽相搏曰動故宜解散後而用補藥若已見亡精敗血之症自當按症下藥如建中

入味等通而用之可耳若人形不壞脈按有力而前後微有屈曲之形則為有餘或為蟲積凝結治宜追蟲下積其目自舒所以一様動脈而在

沈部無散散原在浮沈中浮取蕩漾可求浮中之散柳絮風流沈中之散水溜魚游人得

此脈大命難留五藏不禁四肢不收面青鼻黑夜半魂遊稍盡人意遼參湯投此方正合東垣

獨參湯局方人參散也散脈本在浮部而沈又見魚游之脈即是散也經云陰陽相過曰溜夫水溜瀉漆亦皆散之家故沈脈中立散除非杜撰也

沈伏邪閉先候人迎寒暑濕熱霍亂筋治宜和解扶土安神夏陳白朮霍朴枳檳桂薑甘

草除濕和經川芎香附羌獨蒼增惡氣鬱者檀麝冰沈萼芡訶子犀角硃丁乳木安息

蘇合油真驅邪辟惡救急靈通此方正合濟生大正氣散局方濕鬱湯雜著蘇合香丸

越陽極似陰故只宜和解不可認為傷寒陰症而所憑者在滑濇間探消息耳如按之帶滑則用前方和解若帶遲濇治法詳于逆部如本非傷寒又非霍亂候然昏顛而脈

伏乃是中惡疾閉宜用蘇合香丸開導藏腑並刮痧以通經絡血氣一通陰陽自和脈自通矣切不可暴用峻補或漫用姜附參芪若夾痧症恐無救也審之慎之

沈短氣滯陰中伏陽七情鬱結秋日無妨治須調理寸尺弱強寸短有力氣積阻缺陳皮

厚朴烏藥草蒼砂仁白蔻檀藿木香丁皮半夏參補為良尺短腹痛消導何妨青皮

子廣茂檳榔麥芽神麴枳橘茴香菖蒲故紙澄茄可襄尺寸無力六君子湯補氣調理

加減相當此方正合東垣調氣平胃散三因流氣丸也沈本為積短屬氣病其原皆由積是為氣不及而積有餘若治療之法自當去積而後氣舒也然治積必先氣氣調

然後積能化行若或按經言短為氣病又云為不及之症則不分有力無力見短脈而

輒用芩朮等補氣而行積為要若無力者然後可竟用補氣之藥又宜察其積之寒熱脈

之滑瀉隨症加減寒則加肉桂吳萸川椒等類熱則加黃連梔子黃芩等類疾加南星

川貝等類血積加歸尾紅花桃仁等類可也六君子湯詳于類方之條總在學者變通

為是非筆墨所可盡述也

沈促之脈肉熱炎炎不為痰積亦發狂斑治宜清熱涼血為先歸芍生地梔子黃連石膏

荊芥升麻芩兼丹青皮草知柏合煎發斑外症解毒求痊犀角青黛元參蘆朮或多積

者宜下宣通大黃生地輕重加添大病之後此脈不便滋陰二地二冬參全日見急難

難保延年此方正合秘驗清胃飲節菴消斑青黛飲千金人參固本丸也沈促者內熱

之極也或為消渴便閉腹痛嘔逆口糜鼻衄便血狂斑癰疽惡毒熱總為熱

分外症則發內症則消蓋沈為陰促為熱熱在陰分故先涼血也學者審之

沈結陰積痰飲血滯緩而歇止其脈便是去積宣通此為正治理氣導痰南星枳利草夏

陳皮丁木香繼砂仁白寇香附開閉青朴歸芍參朮補氣神麴茯苓升葛劑提蒼朮地

榆薑桂協濟補瀉同施醫家留意此方正合濟生導痰湯良方木香寬中散實鑑平醫

而阻隔脈道故也是宜先治痰積則氣達脈舒又當看其人之形體強弱或下之所補

或補之再下或補瀉兼施然脈緩雖因寒而積但積久內裡必熱即王氏滾痰丸下之

亦可而必反有浮熱上炎之應或見腹痛陰寒則當溫緩前方

中或加吳萸附子川椒等味絕在察形觀色臨症會悟為的也

沈代之脈至數先求五十止歇不治自瘳四十止歇四載春夏三十止者三載春終二十

定歇兩載夏休十五一止期年遊世十數內止論日斷謀何臟先病逢剋則囚於等脈

見大命難留凡脈至止歇定數不亂者為代者一藏無氣而他藏代之也凡遇

剋之日即死如脾胃脈尚存過甲乙寅卯日時必死餘仿此不贅

脈藥聯珠

遲脈部無數計二十七脈而革牢合一訣
皆由浮則為革沈則為牢故也

遲脈為寒血凝氣少人迎浮應其寒在表附子桂心芪朮薑棗芍歸茯苓熟地益好重劑

防風表寒一掃頭痛加芷熟艾宣道蒼木吳萸加參椒炒臨時調濟心靈技巧此方正合簡易

十味到散百一都梁九元戎小已寒丸也夫遲脈為寒為陽虛故宜散寒而兼補陽當
以人迎氣口分別表裏尺寸分別上下有神無神辨虛實所病之經或陰或陽寸十二

經中隨經更換以應變症不可
泥定死法而治人于死地也

遲浮寒得亦成於風風寒相搏呢逆冲冲宜温宜散薑附温中羌活茴木上下疎通

痞滿氣口必隆桂枝白木草茯苓和融肺寒塞者麻獨防風紫苑五味防已天雄秦丸椒

菊山藥萸蓬細辛貫衆杜仲歸芍參芪桂肉草石膏從疾兼葯衆散號八風臨時抽換

大格為宗此方正合寶鑑羌活附子湯金匱苓桂術草湯千風八風防風散也夫遲寒

邪之所侵當先明首從若浮遲者風首而寒從也故治先驅風而後理寒如浮遲者寒

首而風從也故治宜先散寒而後理風是古人用葯以君臣者所以制首從也然或問

浮遲與遲浮之脈診法何以分之僕應之曰微哉微哉然寔顯而明者也此則為浮遲

候脈方及皮毛則見脈而不顯至數者是浮也稍重而明三至者是遲也此則為浮遲

之脈浮主而遲賓也若入指候脈于皮毛之間得脈已見三至者遲也如皮毛間得脈

道庶幾
近矣



遲脈陰象兼沈裏傷有力是積無力虛殃有積腹痛絞結非常人參薑附歸草硝黃寒熱

並進古哲奇方遲沈無力前藥更張硝黃並去用朮丁香丁皮陳朴陰甚服良加芪肉

桂熟地助勦扶羸救弱黃雌雞湯此方正合千金溫脾湯韓氏溫中湯良方黃雌雞湯也夫遲脈本主陰寒沈又屬裏若有力則有積壅塞

陽道治宜溫中下積濁陰散而陽氣自復故用硝黃能蕩滌積滯但其性陰寒故佐以

姜附參歸補元溫藏不傷正氣而寒積堪清又不似紅丸子癖積丸等漫以巴豆熱毒

之藥相劫致傷正氣也若遲沈而無力惟以溫補當用後方溫

中補正又不可漫用硝黃所以用藥貴乎變通勿泥為得也

遲滑蓄飲正氣不充腹脹膨脹鬱滯宜攻久鬱化熱口臭牙風治疎理氣枳朴寬胸緒苓

澤瀉半夏橘紅前胡芍藥旋覆花從內氣弱者參朮補中茯苓肉桂甘草薑通加沈香

附丁寇通融此方正合海藏五飲湯也遲為積寒滑為留飲脈若有力乃過食寒涼蓄

不足以致留蓄其脈兩寸及氣口必壅故治宜先理氣行水化痰軟堅蓄積去而氣自

通氣分舒而脈自流利若滑而無力又當補正以助藥力又宜以參朮姜桂補正溫中

再加丁香附白蔻等驅寒理氣學者詳其從治逆治正治之活法可耳

遲澇之脈血少痰窠精傷痿痺枯槁沈疴先宜補血二地須多人參歸芍山藥萸和朮芪

陳茯遠志除痼茹鱈骨枯症能蹉縱有痰積緩消磨更須自養服餌休訛少失調

養神手無何此方正合經驗養榮內經烏鱈魚骨丸也遲本屬陰寒之脈而澇乃少血

木將自焚脾氣衰而津液欲竭故惟宜補益正元氣血和而痰積寒濕自散故宜用前

方而或以十四味建中湯主之然此等脈氣雖用藥調治亦須自養否則夏病死于秋

冬病死於春可不慎哉

遲大寒疾更看浮沈浮是表寒沈乃虛微或為燥結或為骨疼寸大頭脹尺大濕淋血虛

氣盛土實寒凝治先溫解須認六經三陽表症薑桂杏仁麻黃甘草歸芍人參病從陰

分附子細辛川芎半夏五味茯苓嘔噎脹悶水濕俱清寒中夾熱加用黃芩若或淋瀝

湯用五苓尺部獨見危症非輕湯也遲脈一息三至猶覺滯然而指下按之如吹氣猶

肝此為遲大之脈也訣云大則病進蓋緣邪重而正元不足又氣盛血虛之脈夫邪重

正虧氣血偏勝若調治失宜其變症可危季夏左尺獨見遲大是腎水受剋大命難保

宜急滋腎救陰勿得認是沈寒痼冷水蓄濕留之症漫用桂附姜朮五苓等味也學者於此當明應時脈治法變通不可太沉歌訣為要

遲緩形同緩長遲短緩利遲滯遲硬緩軟診察此脈內外深淺外緩內遲裏寒不免若足

表寒外遲內緩遲緩相兼寒濕病伴筋骨拘攣頭足痛懣治驅寒濕附桂溫煖苓朮參

草乾薑散滿尺寸上下頭脚病管若或頭痛芎芷一赶脚氣濕痺蒼朮宜纂細辛藁本

羌獨草斷當歸活血經絡滯散加減抽添靈機宛轉此方正合活人附子八味湯局方神木散及活絡飲也遲與緩至數

畧同脈神却異遲脈一息三至而因寒必滯急緩脈一息三至有餘而因濕必軟利熱

既云滯急而云兼軟利豈不自相混亂乎而不知切脈有浮中沈三條或浮候遲而沈

候緩者是外寒內濕也或浮候緩而沈候遲者乃外濕而內寒也是以診脈當于寸關

尺知上下之病殊浮中沈察內外之症異然後論兼脈兼病擬用複方療治於脈理庶

幾近矣

遲本無洪來盛即是心腹脇痛熱因寒滯宜疎宜解勿作虛治先去表寒麻黃散利羌柴

葛桔三陽通濟芷芎苓草蘇下氣裏熱宜清石膏合異治法有條醫人會意此方正合槌法升葛



解肌湯也夫遲本屬陰寒而形兼洪者洪乃陽甚熱邪之脈固不得與陰邪凝結者同
徐而獨不知遲乃外寒輕按則得之洪為裡熱或素有癰痔脈沈洪忽感外寒以致浮
取而遲皆常脈脈之變故所以當明兼脈兼病之訣若遲專為寒洪專為熱人所共
知而竟不能識遲洪亦有同而兼症者也然脈有異兼故病有異治外寒內熱者當
分表寒四分裡熱或外熱內寒者當四分表
熱而六分温中於此推敲始見治理之妙也

遲實寒積腸脹呃逆脈雖見寒胃家熱鬱用桂香附青陳霍枳益智甘草温中散結若或

有痰三棱莪遂胡速薑苗草寇宜入調血歸芍木通利濕赤苓赤皮能清熱鬱榔榔木

香破氣最捷木瓜伐肝健脾白朮更換抽添臨症選擇此方正合統旨七氣湯而加枳

裡虛實為伏熱裏積或因血滯帶寒致經脈不通須宜攻血或因熱積痰積為寒所滯當先行食宜問症察色臨時加減導實扶元可也

遲弦勞脈血弱乘風滿身疼痛腸脹膨胸治先補血益氣加工當歸熟地參桂氏同山萸

枸杞肝腎和融茯遠神志苾棗仁從羚羊角屑心脾氣通外邪欲却美獨防風白朮五

味山藥川芎木瓜療痺筋脈舒鬆此方正合局方黃芪丸滑氏補肝散也遲為寒滯弦

兩方更易抽減或倍人參助氣則血得以生血足則諸痛自釋腹中虛氣得血調和彭脹自減然弦屬肝感遲亦屬濕風濕相搏或成痺症故又宜兼施羌活等味也

遲緊傷寒陽弱氣少滿身攣急嘔噁痛攪發表温經調血宜早麻黃附子當歸甘草芍藥

桂枝飴餈薑棗或加吳萸細辛薑炒回陽急救加減須曉心細膽大重劑始好此方正

麻黃附子甘草湯局方當歸建中湯加吳萸細辛炮姜也遲屬寒緊為痛痛兼浮厲表兼沈屬裡表以桂枝麻黃為君裏以附子乾姜加吳萸為君而必用歸芍

如裂乃重傷於寒治惟得陽和化冷源脈滋流生氣始同所以表散回陽中宜用補血

活血之藥者乃滋源之道也今以兩方用更當加味統表裏陰陽並治而古方鮮有及此者

遲長有毒陽盛夾寒邪犯下體脚步蹒跚治先表散風藥同攢羌防蒼木附子可於麻黃

藥芷咽痛腫垂升麻佛耳苾草同煎細辛可入追散風頑若發外症涼暖並安赤化粉

陳貝穿山歸尾兒刺乳沒同班銀花合酒腫痛消蠲脈遲因痛勿作寒看此方正合

附子湯外科仙方活命飲也夫遲而見長者遲因為寒而脈長為陽盛與地相應力感於陽邪復為外寒所襲致脈反遲故宜用羌防麻黃等追散外寒再隨症調治若與氣口相應是陽毒在裏則當用仙方活命飲消毒止痛為先其脈遲者蓋緣疼痛所致不可認作寒症治也學者詳之

遲芎之脈瘀血內凝或為淋閉或為中崩消瘀生血用藥宜溫芎歸白芍熟地桂心瘀多

未下莪朮三稜漆灰茜草加用鬱金失血過多補正人參黃芪白木陳草茯苓荊芥側

柏燒灰服靈如或救急散用黑神此方正合良方加味四物湯局方參朮湯直指散拍

積凝滯痛甚而致脈遲總宜行血活血補血止血則痛止而脈復故瘀者行之凝者活之敗者止之虧者補之此四方之中藥味既多其抽換合症在學者主張不可樂用而致夾標也

遲微虛寒氣血俱竭惟宜滋補不用暖劑遠志茯神參芪草芡當歸肉桂棗仁心益或劑

自汗防風龍骨熟地天冬五味浮麥附子可加麻根節 敗血傷精致得此脈丸用斑

龍丹吞金液此方正合錢氏遠志飲濟生黃芪湯也遲散之脈陽虛陰竭之症自非湯

血傷精宜用斑龍丸培補真元更用金液丹補火以生土脾氣充始能進食化津添精長血其損傷之症庶可望痊亦須量人之陰陽偏勝調之在學者臨時細心推究隔三

隔三之治
為得也

遲細之脈氣弱神勞五臟凝冷飲食難消除濕補火療治有條滋益有條通理三焦遠志

熟地山藥萸交杜仲枸杞五味楮桃茴香牛膝續斷筋骨菟絲巴戟從蓉酒澆火衰精

脫丸用仙茅柏霜蒼朮白茯苓宜饒車前利水枸地均邀臨症加減筆難盡包此方正合

丹聖濟仙茅丸也凡遲細之脈皆由氣血兩虧陽弱寒侵男子脫精女人帶下或房勞過度七情內傷或病後失養致有此脈故用前方平補五藏後方補火利濕或相參用

之或抽添易換在乎切望者得心應手之為得也

遲濡之脈微細相同治先補血於此異工當歸熟地薑桂温中瀉精緩腎巴戟從蓉杜仲

牛膝淋瀝收通真元虧損當用鹿茸起痿韭子菟絲倍從若或遺漏五子衍宗此方正

家韭子丸也遲濡本為亡血之脈或為淋瀝遺濁女子帶下白淫又或虛汗冷痺是為外寒內熱上寒下熱之症當在尺寸候之為的治宜散血補精散寒理熱寒熱清而經

脈調氣血足而營衛達然此方或加丹參熟艾首烏皆可五子衍宗方詳於彙考也

遲弱之脈精氣兩虧治法惟補尺寸同推寸過於尺心肺藥陪山藥遠志扶神當歸菖蒲

五味巴戟為媒尺弱於寸肝腎先培山萸熟地牛膝小茴從蓉杜仲續斷枸肥丸加棗

肉益腎心脾二至百補鹿角膠培苗精楮實天麥冬揆金櫻菟絲龍眼肉推牛膝枸地

煎膏聽為加鹿角霜芡實粉隨知母生地五味無違茯苓山藥參芪扶羸和膏丸服起

弱補衰此方正合集驗打老兒丸及秘驗二至百補丸也凡見是脈乃陽陰弱或病後及產婦得之或房勞精敗者治唯峻補若尺弱於寸宜補肝腎寸弱於尺當



補心肺而脾為中州運化血氣之官法當和益脾氣充而能運藥餌庶幾可治若飲食不進雖有多丹亦無如之何也

遲虛陽弱脫精勞役氣促自汗寒暑兩及正治寒暑六和湯劑藿朴杏砂半夏茯苓赤木

扁豆甘草參木薑棗煎之寒加蘇葉暑益香薷常人是脈羸瘦久病宜補氣血當歸黃

芪人參草炙芍藥桂心夏附並入或丸或膏緩緩調食頤養在已稍假藥力此方正合局方六和

湯及八味建中湯也凡脈見遲虛或霍亂吐瀉後得是脈者治宜和解邪散此方正合局方六和

用前方或傷暑加香薷或傷冷加蘇葉乾姜等味若素有舊疾勞役精脫見是脈者惟

以補益更或氣虛中滿喘促用煎藥不能納受乃以後方或熬成膏子緩緩調服或加當歸黃芪膏合用然宜自加保養始有藥功也

遲見牢革牢革多遲血亡精敗藥力難施人迎氣口不應難醫中風中濕陰伏陽離機先

峻補宜用歸芪白朮附子炙甘相依芍藥官桂薑棗煎之且待脈軟隨症施為若或不

轉五日死期此方正合寶鑑當歸補血湯仲景木附湯局方三味建中湯也夫革脈浮取而牢脈沈取之也主女子半產敗血男子失精漏下乃有此脈若半產

之症絕難安胎宜用四物湯以歸尾為君加熟艾龜板髮灰等味或腹痛甚以桂心麝香下之然後再行調治可耳如男子傷精敗血或久病之後得是脈者少則服前藥脈

漸軟弱者可望回生否則死期可定矣

遲本無動閒或有之關中豆轉寒痺傷肢虛勞濕痛手足拘攣常人是脈平胃調之蒼朮

陳草半藿相宜吳萸可益川椒用奇寒痰解散脈自開移若久病後附桂同施白朮芍

藥茯苓堪依人參炮薑溫補扶持陽動汗出陰動熱司若如麻促肺絕難醫此方正合局方不換

金正氣散三因附子湯也遲而動者乃寒積痰涎凝結關見則積在肝脾尺部則積在腎經看其人體未壞見是脈者先為開導積消則脈復若久病形羸氣虛陽弱者惟



先温煖其寒凝濕積消散脈亦自消如東風解凍之意如其脈動細如麻子遲而在右部寸關見者乃肺枯胃絕之脈不能療治也

遲原無散散即魚翔屋漏彈石鰕遊影張五臟氣散汚溺遺常六腑氣盡四肢青黃病放

不救團參散良聊盡人事至此悽惶此方正合錢氏團參散也如此等脈其人氣血已入腹若常人無病倏然閉絕見是脈者乃痧脹也急宜放刺灌以菴湯以吹開關散用

平安散蟾酥丸救急勿可以脈敗而不治也又在學者泰通大救固扶危回生起死不

得袖手旁觀置生人於死地有傷仁術故僕常云好從死地求生地莫把陰天作夜天兩句此之謂也

遲伏邪閉霍亂病成陽浮陰落吐瀉驚人僵仆禁口開關散清為末吹鼻兒莢細辛得蘇

用約三部宜分寸痰尺積關伏邪停治先和解涼煖兼行黃連附子黃柏桂心椒薑海

肉當歸人參細辛透腎白朮宜斟防風甘草追散六淫治法活變學者細心脈伏兼瀉

勞思傷神沉疴久病專補血精十日不復命必歸陰此方正合集驗開關散仲景烏梅

閉而遲沈又屬內寒然至於伏者必寒熱交爭致潛入三因或因痧脹或因中惡或有腹痛霍亂轉筋等症或僵仆口禁不省人事乃先以開關散吹鼻俟蘇即用前藥和解

以治六淫所犯之疾若痧脹中惡則不可用前方當以六和湯不換金正氣散或七氣

湯星香散蘇合香丸等選擇用之痧脹切勿可犯附學者當知如沈疴久病之後惟

宜大補如十全大補湯或以補中益氣湯升提陽氣而使脈起十四味建中湯以補勞損其抽添更換以應病情筆難盡述也

遲短寒積或感七情氣少血滯三焦飲停治宜温煖宣氣通營積行氣復氣足於行一消

二補附子人參炮薑五味麥草茶陳有痰食滯消導須均丁香半橘茯苓砂仁血虧寒

疝補瀉要明生薑二地歸芍加增紅花沒藥胡索五靈或加香附舒氣和經此方正合陶氏回陽

返本湯楊氏丁香茯苓湯良方加味交加散經險附丸也遲屬虛寒而短乃氣帶寒滯凝留中關必壅而尺寸之脈俱不及指壅則氣結故曰氣少治宜溫中散結而脈自舒條然治疾之中宜先扶正蓋遲短皆正元不足之脈也學者審之

遲脈無促結毒有之外寒內熱絞結推移痰食瘀血疽腫膿瀉隨症施約寒熱兼醫表裏

裡熱麻黃草依防風蒼朮升葛參提歸芍白芷解表疎肌清熱內散梔子丹皮芍藥調

血朮茯苓和脾蔓荊可入犀角加奇大寒大熱療治非宜寒熱並者黃連吳萸治療有法

勿可多歧也此方正合外科托理溫經湯薛氏當歸川芎散錢乙生犀角湯局方氏已丸

又不可用大寒大苦之藥而引表寒又不可用大辛大熱之藥而助裡熱唯宜疎散以解表清和以解裡勿致寒熱紐結而有助寒助熱之弊為得然能于遲中求促促感知

遲得寒熱並治而不偏醫道庶幾近矣

遲結類促結乃屬陰內積寒滯或感七情陰陽離隔治要和寧川烏附子香用尚沈良薑

乾吳萸桂心濕用蒼朮氣合砂積血須胡索莪朮三稜丁皮青皮甘草同斟虛用生化

芍歸桃仁補血熟地血暢積行也此方正合寶鑑沈香附桂丸局方蟠葱散錢氏生化湯

以辛熱之味冲散凝冷其積自化而脈道自通然看屬何積或血或食依症佐藥然而遲結之脈終屬氣血不足故宜補血補熱後脈絡自透更可加參以助氣不莪朮者恐

閉中關助脹然一劑之後積氣稍開亦可加用也

遲而見代其命將傾救急溫煖附子人參丁香可入薑棗煎斟形神如壞用藥無成中風

胎孕隨症施行風痰壅者加膽星孕婦痛厄川芎歸身胎留人死胎落人生

遲而代乃陰極陽衰

之脈治惟扶陽補氣以期脈復然形體壞者終難望痊或中風痰得是脈者乃邪閉一
其氣不至故見代而浮沈數部亦當隨症引經軀邪扶正則脈復也唯孕婦見是脈
而腹痛甚者死胎欲下不能當用佛手散加桂心牛膝等下落其胎以保其命至此學
者又宜心細胆大毅然決然為人下胎乃是善道不可畏者畏尾因有胎而不知已壞
反用安胎藥致傷人命乃醫家之罪也



脈藥聯珠卷三絲

數脈部 無遲與緩而革牢為一訣計共二十六脈

數脈屬熱三部分詳寸見上熱關應腹腸尺數淋閉溺血脫肛左數目病右數喉癆或煩

或嘔或悶顛狂皮枯燥痒癰腫疽殃法惟清火治道為良元連參橘薄荷生芩翹柴升

桔馬勃蚕殭通淋止渴木通地黃板藍消毒統理瘡瘍不浮不沈舌胎積雷瘟疫初起

達原飲嗜草果甘草厚朴檳榔知母芩芍散清涼加羌柴葛竝治三陽邪或得裡即用

大黃時疫要劑並號天方 此方正合東垣普濟消毒飲本事火府丹吳氏達原飲及

毒而已在上治上在下治下可耳唯六脈不浮不沈而數頭痛發熱舌苔多積粉者乃

瘟疫初起不可專用清熱之藥宜用達原飲以檳榔草果厚朴之辛直達膜原破其潛

伏之邪乃以知母芩芍等滋陰清火退邪則脈靜已或看之邪發動傳于何經即用何

經之藥追逐之若背痛項強太陽症見以羌活為君眉棱骨痛鼻塞目脹陽明見以葛

根為君若太陽穴痛耳脹腸疼氣逆少陽症見以柴胡為君若出及三陽即將羌活柴

胡葛根同用若邪已傳裡可加大黃為君即名三消飲此等治法皆古人所未及者也

數浮陰虧按必無力因熱生風不可汗泄治先滋陰陰足火息二地生熟二冬天麥石斛

黃芩犀角磨屑用山豆根加枇杷葉枳殼甘草浮熱並揭或至瘰癧身癢瘡疾荊芥當
歸驅風活血 此方正合千金甘露飲簡易文加散也或曰數屬熱浮屬風其正條似與
有力而帶弦也故治以表散為先雖升陽散火中必多用風藥以疎其經也如數浮者
乃因熱而生風更或內虛故其脈必無力而帶大故治以清降為先雖解毒消風中必
宜滋陰血血以和其經也是字意雖同一顛倒之間治法迥別乃在入手診視脈神之
有力無力而兼弦兼大則境界不同其為病不類故所以治療之際差在毫釐遠以千

里學者于此脈要症治宜乎慎
心理會不可以人命為忽也

數沈裡熱上下宜分有力邪伏無力虛徵治邪和解鬱火提清升柴梔杏赤芍黃芩石膏

知母草豉太青厚朴殼 實者加增麥冬生地五味葛根甘草花粉益加參氣此方正合梔石

梔子仁湯仲景梔子厚朴湯元珠天粉粉散也或問數沈之脈與沈數之脈有何分別
夫沈數之脈者多因邪伏陰經故脈多兼弦滑乃沈為主數為實治法宜解提達鬱或

脈有力即以攻之下之是屬有餘蓋緣先因邪陷脈沈久鬱變熱而致數者也若數沈
之脈者多因本元不足陽伏陰虧故脈多細兼動蓋因數為主沈為實治法宜和緩升

提故脈無力即宜滋陰益氣調胃生津是屬不足蓋緣先因陰火內灼脈數陰弱而致
脈沈者也然其中不無有積滯氣凝故畧用枳厚等味開導然脈訣字義雖類而主實

虛實於字之上下顛倒之間其字法更張是非任意注作而致誤後學者也但葉乎其
道者勿以僕之所議為淺陋忽之是當心領神會於兼脈兼症細微曲折了了於胸臆

則復劑復方君臣佐使明明於指下而其間千變萬化觸
處無虛是在執事者為之豈僕之筆墨所能槩之也哉

數脈帶滑停食停痰脈分虛實尺寸兩關關宜開導枳實陳甘南星芩夏枯薑茯連杏仁

表裡並治熱痰麥芽神麴食滯推冊寸滑頭眩天麻定旋黃蘗澤瀉腎熱消蠲正元虧

者芪朮麥斑或加旋覆開豁軟堅荆瀝竹瀝隨意調添此方正合丹溪清氣化痰丸東垣半夏白朮天麻湯也夫數脈

兼滑乃痰火兩感之脈而宜察其有力無力及寸關尺之部分以分上中下之痛楚浮
中沈之所候以定外間切之疾病然凡見數滑相兼當以六分行疾四分清熱何以言

之蓋痰涎既去則火熱無所憑依而自然清息此所以治本而標應也或不知者見火
痰繼而專於清火竟不遂痰乃服藥使火退痰留不免變症百出醫者不悟病者不知

至死而無明文殊可嘆也凡數滑之脈治疾為主治熱為賓然治疾先降氣氣降則
痰消痰消則熱去醫者於此究心切脈論症用藥不致有訛其能濟世活人功德之積

自不
少也

數而見漑血虧火熾補陰散熱生地涼血熟地芍藥黃芩清熱黃芪天冬枸杞地骨以補

以清治法最得芎歸知母丹皮破積蓮肉參甘熬膏補益或加茜根阿膠側柏血熱安

行俱堪止截此方正合良方生地黃飲子局方地黃膏茜根散也凡瀉為少血而見數者總以補血涼血為先以清熱散火為佐蓋血分充足則虛火自退所謂治本清源之道

數大之脈熱病漸進須察浮沈葯力再定浮則表熱三陽的認麻黃發表升麻提淨石膏

竹葉清胃潤津黃芩麥冬大清性寒蒼木荷葉合煎青震羌防芎藭柴胡引症太少陽

明諸葯治進黃連生地火消血任脈或沈大內熱已甚古有黃胎急下方稱歸芎芫地

硝草黃並不用枳朴脈非實論此方正合局方升麻湯河間青震湯王機川芎散子和

極故其變症亦急非可緩治者也是以在表即用麻黃在裏即用大黃更以羌防升柴

助其表散芩連石膏大青助其理熱此用劑亦可謂極矣然表散之中又得麥冬生地

之甘寒以滋其陰理熱之中又得芎歸之辛溫以護其陽是散不傷陰下不傷陽方見

製方之妙也或曰古人云汗多亡陽下多無陰今子言散不傷陰下不傷陽豈不與經

言相背乎青霏曰然按經論理孰不知之而要在推求隔變之理明陰陽互變之道也

經言汗多亡陽散多亡陰者乃以表裡為陰陽指表陽而裡陰也僕之所言散不傷陰

下不傷陽者乃以氣血為陰陽也夫表散者是發汗汗屬血汗多則血竭血竭是陰傷

故是方中有麥冬生地生精補血於表散不致傷陰也下之者是逐熱積逐熱必傷氣

氣屬陽氣耗則陽傷是方中不用枳朴故云下不傷寒也夫立法固難立言不易固於陰陽表裡未明經言未達豈敢漫為杜撰哉耶

數脈兼洪陽邪煩極為狂為祟清神驅熱黃連解毒連翹黃蘗知母黃芩生地草桔清火滋陰表散更急防風羌獨藁本治濕防已澤瀉歸芪血益蘇木陳皮理氣解結提斑升

麻貫通犀角赤芍元參瘡生口舌謔語狂言大黃可入牛黃冰片硃砂邪辟氣促目瞑

須防厥逆此方正合東垣黃連消毒散正宗元參升麻湯河間牛黃瀉心散夫數洪之脈陽盛而喘急或為脹為崇為癰疽為吐衄狂煩皆陽邪攻正治雖宜表宜

下藥用寒涼而其間亦當先救陰養血為先然此等脈現變症百出或頭腫目脹或口舌咽瘡或狂亂癲邪或吐衄崩漏俱宜隨症急治於此三方中抽換加增不致有悞也

數脈帶實火熱沖沖人迎氣口表裏不同表須兼裏三化湯宗美活厚朴枳實寬胸大黃

滌蕩硝石裏攻梔子黃蘗甘草和同或有蓄水氣口脈隆二香茴木黑丑禹功隨症加

減治法宜通此方正合潔古三化湯金匱大黃硝石湯子和禹功散也夫數而有力乃為熱而三部俱實即為有力而又當看人迎氣口之應若人迎大者亦夾

風邪故雖攻實而宜兼消風若氣壅大乃有蓄水非硝黃所能治宜用禹功散先導其水再治其熱在學者臨症變通為要也

數弦之脈內熱虛勞中關停飲脇痛煩悵或為瘧疾治法分條虛風勞弱歸地先煎川芎

白芍防芷風消細辛藁本筋脈和調或有停飲腳氣病交防已犀角木通草梢檳榔黃

蘗二朮炒焦涼血生地加用石膏芩連可入桃仁瘀銷牛膝竹瀝濕熱俱剷若見瘧疾

一味青蒿或加桂心末服酒調柴胡厚朴半夏痰消青皮白茯苓木宜招檳陳甘草靈

仙可邀薑葱大棗陰陽水熬首烏鼈甲白朮歸稍黃柏知母治瘧平調參芪升草虛者

更桃此方正合拔萃養血當歸地黃湯丹溪防已飲肘後青蒿湯經驗青蒿散函初瘧疾三方也弦為勞為陰弱為血虧更數為熱陰虛陽盛則為勞也治宜滋血消風

為本而或內停支飲流入足三陽變成脚氣腿足腫脹雨脇彭痛寒熱往來濕熱為病者宜利濕疎經解熱消毒亦兼行痰滋血和筋若已成瘧疾仍先治瘧疾然後調將在

切脈臨症機要不失治疾自可得心應手用劑無訛也

數而帶緊寒熱往來覺塞頭痛目脹難開沈熱在裏浮表不乖表宜羌獨芍桔前柴狀苓

甘枳消補同俳脈沈腹痛裏積堪猜大黃蒼朮加味名儕苓連木澤濕熱行該神麴枳

實生軍勇哉或加硝朴舌有黃胎此方正合局方散毒散東垣枳實導滯丸也凡數脈為熱緊脈為寒今數而兼緊是寒熱相搏又須看浮

沈若浮數而沈緊是表熱而裏寒若浮緊而沈數是外寒而內熱若浮沈俱緊則為筋

骨胸腹脇肋疼痛然治法惟宜疎風解熱理濕驅寒而已又須看寸關尺之強弱寸甚

則為咳為喘為頭痛宜用輕劑以發揚若兩關甚者為嘔為脹為醋心為積飲宜用重

劑以散越之若尺甚者為便閉為淋瀝為疝痛為足腫宜用通劑以疎泄之而其間總

要散熱為主驅寒止痛為實浮以表約為君

以下為藥為主是在學者通多應變機巧難窮

數長之脈陽毒狂驚壯熱煩悶病起陽明清毒疎散表裏宜分羌防柴芷翹桔芍荆射干

枳殼連草條苓大黃竹瀝痰火宜增升麻犀角湯飲蘆根石膏寒水表裡雙清如有外

症用苦黑參菊花梔子陽毒邪輕此方正合垣苓連消毒飲局方陽毒升麻湯本事故雙王散陳氏苦參丸也夫數為熱極長為陽毒發甚

若見於寸部而或帶帶必癩癩心迷乃痰火症發若關尺俱長三陽有毒或足脛痛必

外癰疽外症或痔瘡腹疽須先清熱解毒必應表裏兼行透經疎絡先汗後下以分毒

勢夫脈長與洪大無異也

數脈見扎血必妄行寸扎吐衄關扎便崩尺必淋溺腸癰或成吐衄便溺治法通均生熟

二地連檉苗苓歸芪和補涼劑兼溫地芍芍藥續斷黑荆槐花梔炭能止便崩通幽銷

痰紅花桃仁藕節荷蒂或煎苧根一味牛膝地髓治淋腸癰臟毒兒枳烏攢穿山赤芍

芷草元明花粉甘草可入生軍膿血盡者內補勿行

此方正合薛氏當歸六味湯景岳營煎東垣導滯通幽湯聖惠地髓

此方正合薛氏當歸六味湯景岳營煎東垣導滯通幽湯聖惠地髓

此方正合薛氏當歸六味湯景岳營煎東垣導滯通幽湯聖惠地髓

此方正合薛氏當歸六味湯景岳營煎東垣導滯通幽湯聖惠地髓

此方正合薛氏當歸六味湯景岳營煎東垣導滯通幽湯聖惠地髓

此方正合薛氏當歸六味湯景岳營煎東垣導滯通幽湯聖惠地髓

此方正合薛氏當歸六味湯景岳營煎東垣導滯通幽湯聖惠地髓

此方正合薛氏當歸六味湯景岳營煎東垣導滯通幽湯聖惠地髓

此方正合薛氏當歸六味湯景岳營煎東垣導滯通幽湯聖惠地髓

此方正合薛氏當歸六味湯景岳營煎東垣導滯通幽湯聖惠地髓

此方正合薛氏當歸六味湯景岳營煎東垣導滯通幽湯聖惠地髓

湯入雙荷散等根散金鑑一煎散也大數為熱而兼花者看何部若寸部必有吐衄
關部則便崩咯嘔尺部則便溺血淋或腸癰已成或膿血多去以致脈花蓋花脈主失
血而亦主瘀積若帶紫必是內癰或腸或胃或潰未潰總宜隨症調治前訣雖集
數方猶不能盡治療之法至於抽易又在學者明而裁之不可聚收而致夾雜也

數微陽弱乍熱乍寒汗下之後元氣未還浮沈宜別表裏詳泰三和七補斟酌其間參歸

熟地甘枸懷山茱萸杜仲浮要加刪秦芫龍甲地骨柴班青蒿知母勞嗽能安洗加紫

苑貝母消痰阿膠五味苓桔牡丹症分久近氣色同看此方正合景岳大補元煎羅謙甫秦芫龍甲散海藏紫苑湯也

夫微脈原屬氣血兩虧之症而又在數部乃陰火妄行若或於傷寒瘟疫汗下後發邪
未盡故宜七補三和之劑乃用青柴秦芫等味以同補藥和之若久病虛勞治惟大補
則不宜更疎散用之劑也學者詳之

數脈兼細火動陰虛神煩氣促勞疾難醫滋陰降火和解扶脾人參生地知母黃芪龍甲

白茯苓夏桑皮天冬紫苑芫桔柴提加桂芍藥地骨相宜此方正合衛身人參黃芪湯羅謙甫黃芪龍甲散也數為

虛為細為少氣又為寒濕變熱兼滑則有痰兼紫則為積為痛故或乾嘔或脇脹或痰
厥或五藏凝涎然總為不足之症治先補正略兼行痰化積宜和解陰陽故用前方以
參芪補其氣以地芍調其血以龍甲天冬知母滋其腎水以桑皮桔梗瀉上焦之熱以
秦芫地骨除骨蒸以紫苑半夏理其痰以肉桂引火歸元以茯苓滲其積濕然仍當臨
時加減如有痰嗽加川貝五味有刺痛加沉香香附烏藥等味又在學者會意也

脈數兼澇亡血骨蒸小便不利內熱頻頻滋陰益血生地歸身麥冬白芍桑白芍斟酌知藥

五味熟地遼參白木甘草遠志棗仁葳蕤膏美或服黃精此方正合家鈔參門冬飲景岳七福飲曜仙葳蕤膏及黃

精膏也夫微細弱濡等脈其刑相似而病有各別微脈者皆因汗下之後失調陽氣被
傷乃致脈微也細脈者乃本元氣少以致濕蓄脹悶或為癥積作痛五藏凝涎氣衰而

致脈細也弱脈者乃氣血兩或病後房勞或產後夫補而至弱者推濡脈乃必為亡血過多或泄瀉傷陰陽氣內熾而反熱故脈多見於沈然凡此等脈見法治固惟一補而

其間扶陰扶陽孰先孰後又在學者臨時斟酌蓋非筆墨所能盡述也

數而脈弱疼損陽離骨痛氣促精竭神疲治宜大補清熱先施虎脛熟地歸芍陳皮知母

龜板瑣陽用奇牛膝羊肉酒煮丸之加薑白朮茯苓菟絲河車五味甘草和分加用龍

骨濟陰止遺若或氣弱可益參芪此方正合局方虎潛丸丹溪補陰丸秘驗龍虎濟陰丹也脈弱本屬陽虛而至數者乃陰虛火動之脈治

宜補而滋陰為先故當用前方壯水滋腎補肝養血益筋強骨補氣補形大其脈數以屬陽盛而已見弱脈斷不可瀉陽只宜補陰以配陽使水火均平脈氣自轉而其間或應加增更換又在學者隨症精思得其妙理治之為得也哉

數虛浮熱火動陰虧精氣有損形體俱羸寸虛口糜尺虛腎衰滋陰降陽援弱扶危人參

山藥熟地當歸外邪不盡升柴散揮陳皮甘草石斛膏倍木通知母石膏解肌虛煩渴

甚桂薑解圍以熱治熱醫道深微也此方正合景岳補陰益氣煎及大清飲圖經桂枝飲也凡數脈為熱虛為損傷亦為傷暑若陰虛火動者

必津液枯槁口糜舌裂或脈陽飛越不可盡用寒涼致陽更越而陰更沈及至無救也是當以滋陰降陽得坎離交媾脈氣自和若邪在肌表而致脈虛數者仍用升柴石膏

等提散解肌兼滋陰分若陰虛火動而致煩渴自汗病如陽症而見是脈者當用肉桂引火歸元亦如傷寒陰症似陽真真武理中等湯之愈相似不可泥定數脈而不用辛

熱之藥也

數本無革深察有之渾渾革革涌泉相如弊弊綽綽弦絕死兮或云脈溢形按鼓皮沈取

曰牢推按不移半產崩亡血精遺至此惟補膏用兩儀人參熟地參朮亦宜血海敗者

人參湯奇不施雜藥氣血不齊且待脈轉方許可醫無神尺絕二日死期此方正合景岳兩儀膏局

方參朮膏良方人參湯也夫革脈之形猶如按鼓則近於浮若沈得之則脈經所謂衆也然革牢二字之形皆推移不動之象而何能兼數然甲乙經云渾渾革革至于涌泉

其涌泉之形有如數也其沈取而為牢經云契契綽綽去如絕絃其契契綽綽亦如數也諸家脈書或有牢無革或有革無牢而不知牢革乃在浮沈間分其氣象或方出一

條則非也凡此等脈見皆陰陽欲離真元將敗而革牢為陰厥數涌是陽飛故治療之法或用兩儀膏益其氣血是救牢脈者也用參朮膏補其氣是救革脈者也用大參湯

補氣和血是救亡血者也若見是脈則諸虛之脈蜂起唯先保住真元俟脈轉再行調治故不宜漫用葶藶也

數而帶動三部須明寸動汗出尺動熱驚闕動虛閉陰結陽凝寸部扶陽尺部斂陰關中

和解參朮茯苓陳霍砂草夏加用黃芩寸動盜汗用黃連湯小麥連藥芪地歸身尺動

火丸用約陰歸朮芍地五味苓苓石脂續斷地榆丹參抽添更易臨症詳明此方正合局方香砂

六君子湯宣明黃芩二陳湯芫翁試驗虛汗丸節菴三浦丸岳景約陰丸也夫動與數一類而云數而帶動者蓋數言其捷動言其形數脈一息六至是三部九候皆然是數

脈也動脈者多見於關或前或後則為寸尺指下按之形如轉豆不與三部九候之脈同看故動雖似數而寔非數而數中有轉互之形無來無往乃是動也是以仲景云陰

陽相搏而為動又云陽動汗出陰動熱發成無已注云陽虛則陽動陰虛則陰動是動脈因陰陽相戰所致與數脈為熱者全非也故脈書云動乃數脈見於關上者亦非也

而數為熱勝動為陰陽相戰故在關部則和解在寸部則扶陽在尺部則扶陰使陰陽和則脈解暢又滋陰清涼則以治熱勝此治法之不可易者也然雖見數脈不可遽用

大寒之劑恐傷陽氣或雖得是脈有形冷惡寒者亦陽氣不通亦可加肉桂吳萸等以通陽道不可因脈數而不用煖葯學者審之

奪命散也夫數而帶散者乃釜沸雀家等脈皆為不治之症然若非久病或霍亂以及吐瀉陰陽擾亂之秋或產後中熱致汗多陽散而見是脈者宜先扶正固氣用奪命散或加五味烏枚收斂其失散之元陽以待脈轉再加調治學者均宜詳察又非歌訣所能述者

數而脈伏陽被陰逼外邪相侵內有結積或為霍亂或為關格先和後理約用涼熱薑軍

乾薑半夏和膈桂枝人參甘草宜災大便不通元明粉益且待脈起隨症調攝形體虛

羸滋補為急歸地枸杞杜仲牛膝肉桂引火薑附加得以陽散陰鬱開熱息此等機關

療治勿失此方正合仲景黃連湯元真元明粉散景岳大營煎也夫脈伏而數者外邪相通伏為陰數為陽是陰勝陽致陽陷於陰陰陽交戰乃有霍亂關格等

症寸為疾熱尺為寒積總宜和解為先若形體素羸乃神勞氣耗陰火內動之象不可專責外邪相通治須補正扶陽逐散陰邪兼滋陰分而用大營煎陰陽分治意在獨解

數而脈短心痛氣凝或為食積或血不行治先疎理沒藥砂仁良薑川棟山甲五靈青皮

胡索尚末楮沈木鼈炒治尺短疝疼木通石斛梔子黃芩黃蘗枳殼澤草生寸短上熱

加減隨經熱積消散氣復脈平脈軟弱者益氣參陳竹茹止嘔脈暢胃清如無神氣病

亦可驚此方正合家秘怯痛凡景岳抽薪飲本事橘皮竹茹湯也夫數短之脈與動相

而為陰積所滯故治宜理氣行滯但兼數則有熱可知又宜清熱為先若脈短數而無力者是氣弱胃虛有熱故當以人參補其氣以竹茹清其胃則虛嘔自止脈平而舒也

數脈又促陽極陰樵發斑狂叫舌裂唇焦六經同治並理三焦表裡清散生地阿膠黃芩

柏葉知芍陰調山梔滑石桔梗石膏生草芍木內熱堪消熱生風者羌防可邀薄荷荊

芥前柴散剝內積熱甚生熟軍硝尺脈無底厥逆堪焦此方正合良方生地黃散原機

乃熱之極也內熱如是陰氣將盡而津血將竭如此之脈雖火熱已甚非洪大之比乃多細短之形近於不足故用藥不宜大劑而陽浮於上必求陰根故先候兩尺有底與否若尺脈不至陰氣已絕一變即為釜沸之脈不可治也故經云善調尺者不待于水此之謂也若兩尺有底陰氣未傷是乃陽盛治法宜抑陽救陰為因或因熱生風而風熱相搏致脈促者而清熱之中又當消風風熱清而脈自靜也故宜用前方加減先滋陰次清熱後驅風下積乃治法之規格用藥之大端也而其間見機應換或補或瀉在察神觀色得之而又非歌訣所能包括也

數脈兼結其至不勻或緩或止痰積留滯開鬱舒氣宜別陰陽調陽清熱香附黃芩茯苓橘桔海粉萹仁連翹青黛滌滯元明理痰清氣熱鬱能平陰結為積莪朮三稜青皮丁

木連夏同斟形羸弱者補氣扶真健脾和胃木茯苓人參麥芽神麴查朴砂陳三消七補醫要留心隨機抽換按症加增也此方正合節庵化疾丸秘方化滯丸局方化滯調中湯兼而知不知仲景云藹藹如車蓋曰陽結累累如循長竿曰陰結雖云車蓋長竿分而

浮沈表裡而察其形皆非緩之形也然時有一止無定與代相類而代則止數有定而結無定其往來急慢原別也所謂緩來一止之息乃寒疾積滯所致於遲部中之所結是也若熱疾積滯而致結其脈仍於數部一息六至而中有止歇者也如此分結脈則寒積熱積治分兩途則無淆混又治法更當觀其人之形體壯衰在陽者為氣病當先調氣氣舒則積行在陰者為血病當先攻積積去則氣暢若其形體不充本元素弱又當先補正氣正氣充而積滯自化故前所定之方皆有次第非隨意胡謔漫行定訣者也而此中變易又在學者臨症推敲務期攻補得宜勿可按圖索驥而以一方治百病數而見代浮沈遲同察神觀色以定吉凶至數算期理數當通數因陽盛滋陰為宗一陰

六味調理為工生熟二地芍藥冬丹參牛膝甘草和中金匱滋腎山藥萸同丹澤茯

地治法宜通參歸加入氣血調融扶正脈復醫學之功此方正合景岳一陰煎金匱六味地黃湯局方參歸湯也夫數

為陽成代乃一藏之脈不至是係陽勝於陰其心肝脾胃腎五藏之中有陰不及者則
 脈不至而每見一止或四十動而止為腎氣衰三十動而止為肝氣衰二十動而止為
 心氣衰十動而止為脾氣衰數動而止為五藏氣衰期死可定若在暴病傷藏自應以
 滋補五藏之陰可期脈復而此方專用一陰煎六味湯獨益腎者蓋腎為先天之本此
 藏得通則心肝脾肺俱可望滋生挽回也故張景岳定以一陰煎養腎二陰煎補心
 陰煎益肝四陰煎滋肺五陰煎扶脾而總不離乎地黃麥冬芍藥人參補氣調血生
 之味而總以一陰煎為主約也立法一不過益水制火是宗丹溪陽常有餘陰常不足
 論而於數脈兼代者更為合格也是以治疾切脈者能察陰陽偏勝之情用藥得寒熱
 血氣之情補偏救癸助弱抑強進不及而退有餘滋陰不滯
 抑揚不寒能於危症之中得施藥力其醫藥庶幾近之也



南京中醫藥大學

辰
 燕
 雜
 未

脈藥聯珠

奇經八脈主病用藥訣

督脈為病實者脊強癱瘓厥仆不能俛仰尺寸俱浮真下直上是為督脈或狂迷惛風疾

壅閉疎通得夾羌獨防風藁本力膺蒼耳荆芥正藥合黨寒宜附子烏頭共漿少飲頭

重細辛主掌熱去烏附連軍熱盪治先刮痧放痧勿罔合古砭鍼導疾奇想不信痧症

疾死多枉此方乃王海藏所論督脈為病當用之主藥而未立方名青霏因題之為督

脈由脊骨之第二十一椎直上至風府腦戶及百會穴環下翼柱至斷交而終故其病

與太陽少陰合也王海藏云宜用羌活等味皆太陽藥而藁本為督脈之正藥細辛則

少陽藥也或因寒而病者則佐以烏附或加肉桂麻黃桂枝以溫散之或因熱病者則

佐以連軍或加黃藥荆瀝竹瀝以清潤之皆為正治也而其中有兼濕者宜加蒼木茯苓

苓防已稀莖等味或血虛者加當歸紅花丹參芍藥等味或病之甚者則先灸大椎陶

道穴六七壯乃脊骨第二第三椎也過此等脈症宜先刮背脊腰眼風池風府之痧是

開門驅賊之要法夫邪在皮毛刮之則去邪在經絡放之則清是黃帝所謂邪在經絡

以微針導之不以毒藥攻其臟腑也俟大邪既散或有餘邪投藥發汗無不隨手霍然

者也此乃大禹治水之道先劍控於淺而使暢流之理一也今之醫者何診治奇病絕

不及痧譬猶治水而不知疎通壅塞欲期水勢暢流豈可得乎今僕以太陽少陰之痧

之要訣也然刮痧之道雖即古之砭石治病之法而今按部宣明刮放之處亦發前人

任脈為病七疝癥瘕心腹氣痛拘急難伸寸關緊細長實俱沈是任脈現治法詳真任本

陰脈病合陽明宣疎和鮮荔核尚沈本香川棟烏藥青檳良薑歸附胡索沒丁或加全

騷或益桃仁枳朴香附蒼草砂陳硫黃硝石橘紅五靈煉丹來復太陰元精此方正合賢

天台烏藥散百選桃仁膏東垣丁香棟實丸鉄甕來復丹也夫任脈為諸陰之海起於

小腹之內兩陰之間行曲骨毛際同足三陰並會而上冲腹胸咽喉環唇至斷交猶通

及承泣而終然皆屬陽明部位故其脈必氣口丸丸不散其為病也男子內結七疝

子帶下瘕聚故治法當理三陰之結兼治陽明乃以前方理氣破積調血和中以治其

七散瘕聚是皆宗經正治之法若陽明氣逆或厥或仆又當加白微白前有熱加犀角

黃連羚羊角有疾加膽星天竹黃血積加三稜莪朮風加鉤藤桑白皮等味然凡見是脈

無疝瘕之疾而有厥仆眩悶嘔惡之症者先刮胸膈兩膺胃腕大腹少腹結聚間之痧

或改舌根之血然後認症施藥始能應效否則變症百出無所措手至於死之非死於

疾而乃死於治也夫脈異病變而不刮痧致痧及汲

以疎經絡徒投藥餌及至於無救者醫家之罪也

衝脈為病氣逆裏急胸填咽脹眩運燥熱寸沈寸微中央堅實至關而迴或牢而直或二

經海乃是衝脈療治之法與胃經同脈起氣衝少腹橫骨中透斷交二十四穴忌汗吐

下宜降解結三部分治止痛定厥益氣調中虛症大格參芪蒼草升柴木橘芍藥吳萸

五味加得夏月熱甚地黃知藥龜板知陰薑汁中腕痛哉或痰血積胡索五靈草果没

入下部腹痛治疝同列或用四苓豬苓茯苓澤白朮補脾先清其濕青陳香附三稜莪朮

乾薑良薑通治積結正藥白微參歸草益專療婦女營冒血厥或嘔不止養正丹截硃

硫水銀黑鉛塔合丸服鹽湯濟生救急此方正合東垣加味調中益氣湯丹溪大補陰

勝紅丸本事白微湯谷氏養正丹也夫衝脈為五臟六腑之海與任脈同起少腹胞中
居足陰明少陰二經之間直上至胸中而散上及唇口而終凡二十四穴其為病乃與
胃腎兼發胃熱而腎火盛者則氣逆裡急甚至喘嘔腕中閉痛療治之法只宜降氣清
火引熱下行亦須察其人之形體強弱以施補瀉之方前方皆燥濕清熱調氣寬中開

營破積之味而惟白微乃衝脈之正約而或可加以白前佐之是治法之大端凡婦女皆任脈主事行經則血海空虛而血海乃衝脈所司其間或虧或鬱則病在衝脈或因怒而厥或因血枯而致內火氣逆者又不宜盡用辛香之味更燥血助火又當滋潤蓋血如阿膠白芍麻仁及療血枯之烏鰂骨等味不可缺也又十二經血脈同會於衝故其病則陰陽渾亂清濁不分其發即成痧症又當先刮提刺放以通肌經絡而刮放總當與任督同治蓋寒厥近督熱厥近任須知厥之有寒熱氣血疾虺酒色臟腑之別雖用藥宜按症投之必先提刮陽少陽之痧使上下內外得通始可前此藥力也凡遇此脈先提頭頂之痧及刮少腹關元胃脘等處中關得通上下氣達則用藥亦靈速者不可因古人未及言痧不以僕言為是而置痧疾不論致誤人命有傷仁術也慎慎為之

帶脈為病腹滿腰痛遺精帶漏裡急後重赤白淋露筋痿癱瘓脈起少脈環腰不縱共計八穴診應尺動月事未調婦科疾弄虛實分治使藥亦眾治先理血四物加從紅花

桂枝甲炙送桃仁沒藥破血止痛濕熱病者脈如提輕滲濕茯苓二朮並用黃連黃蘗

澤瀉草送千金腎者藥味本共虛用故紙杞杜仲遠志菟絲山藥萸供龍骨牡蠣金

櫻澀壅覆盆巴戟伯仁定恐乾薑韭子鹿角膠銅赤石脂煨溫補統力或克應丸丹艾

芍供地芍當歸帶病必用以理以補治法細誦灸帶脈穴邪鬼俱恐繞刮其痧除腰腹

痛此方正合海藏加味四物湯因清熱滲濕湯千金腎者湯正傳經驗秘真丹良方

如束帶故曰帶脈不與十二經及奇經七脈縱行者也其候在脊骨第十四椎橫圍皆

是而其診應於關部左右彈指或兩尺俱動乃帶脈現也其病則腹滿而腰溶溶如坐

水中男子為淋濁女子為滯漏或因濕熱下注蘊蓄而成或因思慕無窮意滯於外精

氣隨泄或因房勞太甚所致蓋因實熱者為實因房勞者為虛其因思慕者則濕熱虛

實兼而有之何則蓋思慮傷脾而脾不健運致濕氣下流而為積濕又腎家慾火妄動

而為鬱熱濕熱俱而為之寔精氣外泄為之虛故云因思慕者虛實兼有之也而治當

察孰先孰後補瀉得宜古人立法以健脾燥濕清熱鮮鬱理氣瀉精為正治之法故王海藏以加味四物湯益血破血孫思邈以聖著湯三因以滲濕湯利濕清熱正傳秘真丹良方克應丸皆補益瀉固為急然濕熱未清不可固瀉也濕熱未清不可瀉也而治法先清理濕熱後補固精門乃是常治或久坐濕地邪風所襲或衝任之邪串於腰脈腰痛如折脹悶不通使閉腹痛者宜先刮腰間之痧然後投劑始堪效應或灸帶脈穴章門穴能已婦人白淫癆瘵也

陽維之脈足外踝起維絡諸陽循首入耳三十二穴六陽綱紀候在尺內斜過寸止病苦

寒熱痛癢膚癢顛仆羊鳴失音不語或苦腰痛惡風汗洗用桂枝湯宜表慎裡風也風

府刺之可已更當和鮮小柴胡使芩夏草薑棗煎取榮衛牒卑虛弱可擬黃芪建中

八物湯理此四方乃張潔古李瀾湖所論治陽維為病之劑也經云陽維為病苦熱

少腹側循脇肋斜上肘會手陽明於臂過肩會手足少陽手足陽明於肩并八肩後會

於太陽上循耳後至臑空承靈正榮目窻臨泣下額與手足少陽明五脈會於陽白又

循頭人耳至本神而止凡三十二穴也其診候應在尺內斜徑而至寸即陽維脈現其

為病苦寒熱而單寒單熱者兼太陽症也宜挂枝湯或先寒後熱或先熱後寒者兼少

陽症也宜小柴胡湯益陽維專司衛氣自病則熱甚乃與陰戰故寒熱不定更近乎少

陽半表半裡之間治宜和解若誤下之邪乘虛入或成陰虛而變症百出也或本元素

弱者即宜用黃芪建中湯及八物湯以助衛氣此皆治之大法也而其脈現其病不應

反有乾噦脹悶脇痛筋縮眩運厥仆者急先刮後兩肋及兩腿肩并髀股臂臑等處之

痧然後投劑始能應症至於臨病加減又在靈機應變為得也

陰維之脈足內踝與維絡陰脈頂前止停一十四穴應刺期門候在尺外邪上不經邪傳

於裏病苦心疼顛瘖僵仆肉痺羊鳴肢滿陰痛渾似瘡生寒熱兼病詳察何經兼太陰

者理中湯行參朮薑草加附同名少陰四逆附草薑并當歸吳萸治合厥陰太陰熱病

承氣湯斟少陰衝任散用金鈴延胡同法失笑厥陰寒熱分治約不同倫內傷血弱四
物養榮妙香之類大法宜遵隨症加減醫者留心治道總訣認定三陰邪依經絡刮放

痧清腿灣兩脇飛陽築賓內踝之上放血痧平前方乃張潔古李瀕湖所論治陰維為病之方也經云陰維之病苦心痛而陰

維之脈起於諸陰之交於足少陰築賓穴上循股內及小腹至脇肋過期門穿膈抵
咽喉會任脈再至頂前而止凡十四穴也其診候應在尺部斜上而至寸或如貫珠乃

陰維脈現其為病若心痛脇脹腰痛陰中痛亦有癩瘡腫仆之疾古治之法潔古以兼
太陰症者用理中湯兼少陰症者用四逆湯兼厥陰症者用當歸四逆湯吳茱萸湯等

類而李瀕湖又以寒中三因者宜前如或陰維兼症三陰屬熱者或兼少陰及衝症
宜金鈴散延胡索散兼厥陰者宜失笑散兼太陰者宜承氣湯此治有熱而寔症也或

榮血內傷病兼衝任厥陰者又宜四物湯養榮湯妙香散等類可謂治備已矣而尤未
及諸陰脈逆以致陰維脈現而為邪氣所閉致六陰渾亂經脈欬邪者乃沙症也痧症

者邪氣也邪氣滯於經絡與臧府無涉者若徒以藥味攻其臧腑則與內經之言相背
故療治之要先刮兩脇肋期門咽喉及腹前衝任陽明之痧并刺尺內踝上一寸少陰

前與陰維所會之築賓穴出使經絡疎通血然後
用藥始堪應手此自素問之後未見言此治法也

陽蹻之脈起自足跟上至於目風池穴停二十四穴六腑通行寸左右彈其脈可徵陽急

陰緩腰背苦疼偏枯痺癱換抽筋拘縈絡閉風痛週身所候在寸虛實宜分浮強實

大宜瀉宜清目不得瞑陽盛昏昏先刺外踝左右推尋治宜和解半夏湯斟指迷七氣

香附青陳甘桔藿桂義遂通榮半夏益智通理七情或為邪閉寒熱狂驚轉筋嘔逆痧

症須明刮提刺放疎絡通經然後投劑起斃回生半夏湯乃靈樞經治陽蹻脈感而目不瞑之劑也甲乙經云目病不得瞑

者乃衛氣不得入於陰故陽感陰虛陽蹻脈現也而其脈本起於脚踵出外踝會足於
陽脈上行循脇後又會手足諸陽脈穴上至精明轉風池而終凡二十二穴診候在於

寸口前左右彈指者是也為病因陽急陰緩故若腰背痛或為偏風癱枯角弓反張目痛不交睫皆陽絡捷而陰絡弛陽絡不護陰絡不遺陽陽甚而曰蹠治先扣之靈樞以半夏湯通其陰陽之絡得汗則和又用指迷七氣湯解其七情之鬱氣血痰滯之積為正治之法然亦有血不榮筋營衛隔絕者又當助以養血涼血和血調經之味如歸芍藥地黃丹皮紅花之類或佐以風藥宜用桑寄生獨活桂枝之類或資以緩急之味宜用棗仁益智山萸柏子仁等味宜察其形症加減可耳大凡現是脈乃六陽橫蹠故治兼六陽宜先刮手足三陽之痧或刺風池風府先通督脈次刺足陽之脈出血以緩其勢而直陽脈在外踝之後除直而行者是也見其血鼓之穴刺之然後用藥始合經旨也學者宜審之

陰蹠之脈亦起足跟與腎相會直達睛明上通泥丸湧泉穴生凡有八穴號曰天根後在

兩尺彈指病侵陰急陽緩目瞑昏昏禁強衛弱寒熱相爭癩瘰腹痛皮膚痺膚疥男子癩

疝婦女癥瘕治先溫解提衛舒榮炮薑附子甘草人參參冬五味茶蓮陳葉所忌汗下

刮痧正經六陰俞穴提放通筋治痧仙劑荊芥細辛鬱金降香末服茶清痧忌附子前

方慎斟此方正合陶氏回陽返本湯至衡寶花散也夫陰蹠為病乃陽併於陰不能出

八脈為病者皆二經十五絡陰陽攪亂五臟六腑氣血相混故陽并於陰則熱若陰甚又寒陰并於陽則寒若陽甚又熱是陰陽相戰則有寒熱之病而十二經固分六陰

六陽其奇經八脈亦分陰陽如督為陽任為陰衝為陽帶為陰而二維二蹠自別陰陽也凡人之病也或陰或陽祇病一二經者按經投劑即可霍然若外感六淫之氣或足

三陽先受或六陽同受或六陰同受必三陽三陰同受或六陽同受或六陰同受必

如五臟之清氣不升六腑之濁氣不降猶之五湖四竇漫溢泛濫盡入江河而清濁已

混更水甚土崩泥沙揮攪流蕩不清并俞壅塞故其病者有痧脹之名而痧脹猶沙漲

也故痧脹之症多屬奇經蓋奇經為十二經之江河四海也故痧症總由十二經清濁不分而泛溢入於奇經而奇經脈現則為痧症也學者能辨十二經泛溢之所由兼識

奇經八脈之所主陰陽上下寒熱清濁之所自用藥緩急進退佐使君臣之所宜方有
 寒熱溫涼燥潤攻散固瀉補瀉因和之劑藥有甘苦酸鹹辛淡之味病有皮毛肌肉筋
 骨臟腑頭足腹背上下前後表裏陰陽虛實之症當以色對病以病對脈以脈對症以
 症對方以方對藥以藥對味以味對性以性對用以用對至以至對中如此研心治疾
 其庶幾乎
 近道也矣

