

救急選方下卷

疗瘡急證門

程山齡曰療疔之法貴在乎早初起卽療者十

全十活稍遲者十全五六失療者十全一二

內服莫妙於菊花甘草湯

外料  
十全

甘菊花

四兩

甘草

四錢

水煎頓服撻再煎服

消疔箇便方

大金

疗瘡及諸惡毒初起但未成膿

者服之神效

白礬

研三錢

葱白七莖

右同搗極爛分作七塊每塊用熱酒一杯送  
下服畢用厚被蓋之再進葱白湯一鍾少頃  
汗出如麻從容去其覆物其病如脫此雖味  
澁難服其效甚妙

萬靈奪命丹大金療一切疔毒入腰煩悶惡心并

癰疽發背惡瘡

朱砂水飛

蟾酥人乳泡

輕粉

蟾礎各五錢

銅綠

血竭各一兩

雄黃

枯礎各二兩

共為細末

麪糊丸藥

實大每服十九粒令病人先將葱白三寸嚼爛

吐在手心將丸包在葱內熱湯吞下出汗

疔毒已篤者二服卽愈

丹方彙編

土蜂房一具

蛇蛻一條

黃泥固濟燒存性為末每空心

好酒服一錢少刻大痛痛止其瘡已化為黃

水

追疔奪命湯急效仙方能內消腫毒  
羌活 獨活

防風 青皮 黃連 芳藥 細辛

甘草 蟬退 僵蚕 澤蘭 金線重樓

右等分水煎加少酒服以衣被蓋覆汗出為

度病退減後再加木黃利下兩次以去餘毒

黃連解毒湯

正宗

療疔毒入心內熱口乾煩悶恍

惚脈實者

黃連

黃芩

黃柏

山梔

連翹

甘草

牛旁子

各等

燈心二十

根水煎服

救命仙方

外科  
纂要

疔疔走黃打滾欲死者一服

見効

牡蠣

山梔

銀花

木通

連翹

牛房子

乳香

沒藥

角刺

瓜蔓仁

大黃

地骨皮

各八分

右水酒煎便秘者

加朴消

卽正宗疔毒復生湯  
花粉代瓜萎仁耳

大乙紫金丹

正宗解諸毒療諸瘡真能起死回生  
宋

方出飲食  
中毒門

疗瘡生根入腹者便死用磨針刀鐵釀水一碗

絲綿濾淨銀窩內煎三四沸服之病者須更

腸鳴行利一二次甦醒方妙

瘡瘍經驗全書

托裏護心散

啟齋諸疔瘡發背曾經汗下毒氣  
玄

攻心迷悶嘔而痛二三服而安乳香

明淨  
一兩

菉豆粉

四兩

右細末每服三錢甘草湯調

下、此方原出  
于精要

金瘡擷撲門

傷重昏憒者急灌以獨參湯雖內瘀血切不可  
下急用花蕊石散內化之方出卒失血門恐因漏而

亡陰也凡瘀血在內大小便不通用大黃朴  
硝血凝而不下者急用木香肉桂末三二錢

以熱酒調灌服血下乃生若口噤手撒遺尿  
痰盛唇青體冷者虛極之癥也急投太劑

參附湯多有得生者正體類要

參蘇飲類要療出血過多瘀血入肺面黑喘促

人參一兩

蘇木二兩

右水煎服

鷄鳴散

因三

療從高墜下及木石所壓。凡是傷損

瘀血凝積氣絕欲死。

大黃一兩

杏仁二七箇

右研細酒一盃煎至六分盞。候去滓。鷄鳴時。服次日取下瘀血卽愈。若便覺氣絕不能言。取藥不及急擘口開以熱小便灌之。

療亂打血攻心。

醫法指南

大黃當歸

蘇木

紅花各三

酒水各半煎服

案斯方勝於大成湯

凡被打損血悶搶心氣絕不能言。可擘開口尿

中令下咽卽醒又墮車落馬及車碾木打已  
死者以死人安著以手袖掩其口鼻眼上一  
食頃活眼開與熱小便二升金

跌撲傷損去血過多脉微欲死獨參湯加童便  
接住元氣再處太法傷損及金瘡去血過多  
與產婦同脉來和緩者生急疾死者死宜虛  
細不至數貫

證治  
大還

摧壓跌打從高墜下及竹木所磕落馬撲車氣  
沈重取藥不及擘開口以熱尿灌之用半夏

末吹鼻以艾灸脣再將患人盤尼坐住將髮  
提起使氣從上升則可活矣

危證  
願體  
集

又方危證  
簡便  
皂莢末急吹入鼻亦可如活却以生  
薑汁和杏油打勻灌之

療人被人打死或踢死危證  
簡便急取百會穴艾灸

三壯立甦

撲打墜損惡血攻心悶亂疼痛  
救急易方用乾荷葉  
五斤燒令烟盡空腹以童便溫一盞調下三

錢

傷經砍斷血筒血出如湧泉者是

醫學集成

銅末付

之又用葱一斤炒乘熱熨之

自刎者乃迅速之變須救在早遲則額冷氣絕

必難救矣氣從口鼻通出

生薑五片

人參

錢二兩白米一合煎湯灌之接補元氣急用

縫合法

正宗

自行被擗穿斷舌心血出不止以米醋用鷄翎

刷所斷處其血即止仍用真蒲黃杏仁去皮

尖研砂少許研為細末煉蜜調藥稀稠得所

噙化而安

得効

順血散

本朝經驗

療一切金瘡撲損及產後血暈

當歸

芎藭

芍藥

蒲黃

澤瀉

枳殼

人參

大黃

沈香

茯苓

各一錢

接骨木

五錢

甘草

三分

右剉細

每服一錢

入麻布袋用沸湯擺服之

五金所傷並竹木刺流血不止上身被傷急以

銀一錠燒紅烙傷處如下身急以鐵一塊燒

紅烙傷處其血立止此急救良方也

瘡醫全

可法良規云。凡傷損之症。若誤飲涼水。瘀血凝滯。氣道不通。或血上逆。多致不救。若入於心。卽死。急飲童便。熱酒以和之。若患重而瘀血不易散者。更和以辛溫之劑。睡臥要上身墊高。不時喚醒。勿令熟睡。則血庶不上逆。故患者多為逆血填塞胸間。或閉塞氣道。咽喉不得出入而死。

傷醫  
大全



破傷風門

大豆紫湯

金

療破傷風入四體角弓反張口噤

不能言或產婦墮胎凡得此者太重不過五

劑

大豆

五升

清酒

一斗

右子味以鐵鑄猛烈

火熬豆令極熟焦煙出以酒沃之去滓服一

升日夜數服服盡更合小汗則愈

破傷風瘡口作白痴

無血者

殺人最急療之

葉氏

右以雄鼠糞直者是研細熱酒調半錢服

鎮風散

正宗

療破傷風諸藥不妨事在危急者用

之必應

鱠膠

枕粉

培斷  
微培

白藥

紅色  
各一兩

朱砂

三錢

別研

為細末

每服

二錢無灰熟酒調下外灸傷處七壯知痛為  
吉如一切瘡癰風發時昏倒不省人事者  
每服三錢二服卽愈不發

玉真散

本

療風自諸瘡口入為破傷風項強牙

關緊欲死

事

防風天南星右為末每服

三錢

童子

小使一大盞煎至七分熟

名防

打傷至死但心頭微溫以童子小使調下

二盞并三服可救二人性命

香膠散

三因療破傷風口噤強直魚膠燒七分

留性

右研細入麝香少許每服二錢酒調下不飲  
酒米湯下或以蘇木煎湯下

破傷風血凝心針入肉三症如神方

鑿治大還烏鵲


翎燒灰存性細研服一錢滾湯下

大芎黃湯

活法機要療破傷風在裏者宜疎導

川芎 羌活 黃芩 大黃各二錢

右水煎服臘脣通和為度



湯火傷門

凡火燒損慎勿以冷水洗之火瘡得冷熱氣更  
深轉入骨壞人筋骨難瘥初被火燒急向火

更炙雖大痛強忍之一食噴卽不痛神驗千金

火氣入腹熱悶柳葉一升煎湯服萬全

火燒欲死廣筆記好煮酒三罇入浴缺內令患者

沒酒中極重不死

療人卒中烟火毒用黃豆醬一塊調溫湯一碗

灌之卽甦

本草彙言○療人遭火燒身爛垂死者

用臭醬一兩取水自酒一二升燒將酒頓溫不

可過熱調醬於中令患者浸酒中燒極重不

死天各甲子秋八月燒火藥發燒死藥匠數百人內十餘人遍體赤爛未死者令行

此石浸活如數

療火傷

時後破鵝子取白塗之又取燒灰以水和

習習爾以敷之亦以灰汁洗之

又方

衛生易簡凡湯燒先用鹽末撲之護肉不壞後

用藥傅

又方

本草附方用瓶盛麻油以筋就樹夾取蓄蓼松

收入瓶內勿犯人手密封收之遇有傷者以  
油塗之甚妙

平時收老黃瓜不拘多少覓厚實磁瓶貯之藏  
暗濕處自爛為水將此水塗火傷處立時  
止痛可不起泡此余幼時墜入烈火半體皆  
傷連療不効得此方愈頤體集

清涼散

育方類編

耑瘻湯泡火燒敷之止疼立愈

鋪地上出火氣研細末爛者乾搘未破者以  
太麥淨沙鍋內炒至漆黑為度取出以紙

香油桐油調擦

療湯火傷

暴證  
要

鷄黃油

如法取傳

法用鷄子

不拘多少煮熟去白留黃入銅杓內每十箇

加菜油一小酒盞煎枯去查出火氣用傳甚

佳。魏齊陳君每用藥油救人卽此也。

湯煎膏火所燒

外熟臺

熟擣生胡麻如泥以厚塗瘡

上

滾湯煎膏所灼火燄所燒

外臺

牛糞新者和以鷄

子白塗之比常用之亦不作瘡不漏神效

火盪熱油傷

公選良方

鷄子清油調淋洗或用蜜

塗

火藥傷

危證簡便

取鷄蛋清多年陰溝泥和勻傳神

効○又方先弔臘酒令洗以拔其毒再以鷄

子十數箇熟去白以黃炒焦黑取油約一盞

用大黃研末二兩和勻傳上三日全好

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯

金匱

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯

郭桂枝

三兩

龍骨

四兩

甘草

二兩

生薑

三兩

牡蠣

三兩

蜀漆

三兩去腥

蒸五兩

龍骨

四兩

大棗

十二枚

蜀漆

三兩去腥

本草綱目  
卷下  
玄妙煎

玄妙飲

丹臺玉案

療湯火所傷先服恐火毒攻心

黃連

花粉

各二錢

陳皮

桔梗

山梔

各一分一錢

竹葉十片水煎如藥不便

只用好酒溫洗拔其熱毒內服童便以護其心使火毒不內攻隨取大黃末桐油調敷卽垂危者皆保無恙

逐火丹

石室秘錄

療無意之中忽為湯火所傷遍身

潰爛

與鬼為隣服之可以變死而生

當歸四兩

茯苓

黃耆各三兩

大黃

甘草各五錢

荆芥

黃芩

防風各三錢

右水煎

火燒湯發鴟盪油盪奇方瘡醫大全平日泡過茶的  
茶葉剩下的茶脚不拘甚的粗細茶葉用瓦  
壘一箇放朝北地上日逐裝在壘內聚之已  
燒用太磚一塊蓋好須得一年用之方妙愈  
陳愈好凡遇上症不問已潰未潰擦上即定

文忠選方  
卷下  
痛結疮第一驗方

火燒滾湯起泡瘡醫  
火燒滾湯起泡瘡醫陳蒿蓼麴打糊裱上立止  
疼痛結膿

滾粥燙傷瘡醫  
大全錫箔遍貼神妙如受傷重者可  
喫溫香油一鍾

顧世澄曰凡被火傷之人宜用恙活丁兩煎服  
俾火毒得汗外泄庶免內攻瘡醫  
大全

咬傷門

人齒咬破指頭痛不可忍久則爛脫手指笄手  
掌諸方不載急用人尿使瓶盛之將患指浸  
在內一宿卽愈如爛者用龜殼燒灰敷之如  
無龜用鼈殼燒灰擦數亦可保元世○人咬傷

者用龜板或鼈甲燒存性為末以香油調擦

單方

又方危證簡便咬時一日內先用熱小便浸傷處洗  
淨牙黃瘀血次以龜板或鼈甲調擦若腫痛

瘡發疼甚者亦與童便浸洗拭乾用粗草紙  
燃薰麻油點火用烟燄薰腫痛止良久方住  
以解牙毒如臭腐淋漓用葱白三兩粉草五  
錢煎湯每日洗淨再用藥擦

又方集驗良方人咬用塘鷄屎塗咬處立刻止痛不  
成膿○又亦用生栗子嚼爛敷之

又方丹方彙編用熟尿洗去牙黃瘀血以蟾酥丸塗  
入孔中或嚼白蘚塗之如痛用麻油紙燃火  
燬薰之用乾人糞裝荔枝殼內安定咬處加

艾圍灸之以不痛為度。

又方危證簡便人咬指用飯店內陳久快子索即頭筋兒頭

數十箇燒灰存性研細用米湯調做一箇套  
子套上雖極重者亦可救。

療獵犬咬人方附後先嗍却惡血灸瘡中十壯明

日以去日灸一壯滿百乃止案嗍却惡血人不肯為之宜用

角法  
嗍之

又方附後生食蟾蜍鱠絕良亦可燒炙食之不必  
令其人知初得嘴便為之則後不發。

又方 金 急用鍼刺去血以人小便洗淨用胡桃

殼半邊以人糞填滿掩其瘡上着艾灸之殼

焦糞乾則易之灸至百壯次日又灸百壯灸

至三五百壯為佳 出東醫寶鑑 千金無所欵

又方 聖惠 杏仁去皮尖研作湯頻服之良 ○ 又亦

黑豆煮汁服之甚良

又方 奇效 急於無風處以冷水洗淨卽服韭汁

單方 隔日 又一碗四十九日共七碗百日

忌食徐木齋云風大一日咬三人止一人用

此方得活親其驗一用膽礬末傅患處立愈

秘方集驗云並菜汁一搗服之百日內常食並菜更妙○此原出千金

又方

萬全備急

將番木鱉子煅灰一錢熟酒調服

又方

秘方集驗

番木鱉一錢銅鍋炒雄黃四分為末

冷水調三分五厘服之大小便出血卽愈

又方

奇方類編

番木鱉

三箇

虎脰骨

三錢

甘草

一錢

右水酒各半煎服

又方

壽域

用生杏仁搗爛傅之立效

金瘻丸大杏仁熬黑

研

療顙大所傷或經久復發無藥可療者用之極

驗醫方  
大成

明雄黃五錢

真麝香五分

右研勻

用酒調二錢服如不肯服者則撚其鼻而灌之服藥後必使睡切勿驚起令其自醒候利下惡物再進前藥則可矣

犬咬涎入瘡令人昏悶浸椒水調莽草末塗之

本草  
附方

療風狗咬

本朝  
驗

鐵砂一錢

番木鼈六分

甘草

五分

右水煎服小兒減半若過劑令人迷

悶不醒

又方

本朝  
經驗

急用熟小便洗淨咬處生杏仁研爛

封之日

丁換宜服 防風 升麻

葛根各五錢

分

杏仁一錢

甘草一分

右水煎此方甚

妙

又方

本朝  
經驗

灸咬處宜服 金銀花

五錢

木鼈

檳榔

各三錢

白芷

橘皮

各二錢

番木鼈

礬石

杏仁 甘草

各五分

右水煎或加

鐵漿一七或加韭汁為妙服此藥每五日內

再用寬中丸瀉下五七行、下盡毒為度。

狗咬寬中丸

青黛

百草霜各三錢

各三

檳榔

木鼈

杏仁

黑牽牛

黃連

番木鼈

黃芩

大黃

雄黃

鐵粉

各一錢

一

巴豆

四十粒

右為細末、稀糊為丸、大人三十九

小兒十九、白湯送下、以上二方、神効無比。

衆療不差、毒攻心煩亂、嘯已作太聲者、天靈蓋

燒灰末、以東流水和服方寸七、以活止。

○外臺

音董多言也。

又方

本朝  
經驗

班猫五分

大黃一錢

甘草二分

右為末水調下不肯飲擦鼻灌口內當救萬

凡風犬咬者百日內忌飲酒忌食鷄鴉羊豬肉  
肥膩諸口味及發風毒物麻物赤小豆俱不  
可見十年勿食茄子終身忌食狗肉危證  
簡便○  
蕷葵赤小豆三年勿食之青梅實百日勿食  
之

崔氏云凡初被咬卽覓一切物與喫後不發也

外臺

療常大咬人傷處毒痛心悶

聖惠

杏仁

半兩生用

桃白皮

一兩剉

右水煎服當吐狗毒差

療狗咬人

聖惠

以火灸瘡中腫上擣韭汁飲三合

日三五度瘡差卽止

又方

危簡便證

先用米泔水洗傷處令極淨再以杏

仁口內嚼爛敷之以帛縛之卽差○又方松

香為末傅之極効

凡犬傷人量所傷大小杏仁爛咬沃破處以帛

繫定至差無苦

本草衍義

又方

危證簡便

白礬納瘡中裹之

止痛速愈

又方

同春

銀杏塗傷處

又方

袖珍

蓖麻子五十粒去殼以井花水研膏先

以鹽水洗啖處乃貼此膏

危證

簡便續方

草麻仁研如膏先

以藍水洗淨敷上即愈

又方

山居便宜

燒蟾蜍為末傅之

狗咬血不止急以砂糖塗之立愈

博聞類纂

犬咬傷瘡重發者用蓼青根擣汁服之

附後○又

方以蠟炙溶灌入瘡中

山居便宜云搗生蘿蔔汁服之可解

療狗咬極重者雖遍身咬碎擦立刻止疼神妙

方續免證簡便方用蚯蚓擣爛搽敷狗咬眼內以帕

縛之數日令愈奇驗

療犬咬傷不可便貼膏藥及生肌類閉毒於內

也當先用舟車丸禹功散通經散等藥隨便  
服利十餘次腫減痛止後方敷貼儒門事親

療貓兒咬一百研薄荷汁塗之立効

療貓咬傷人常有隔窓放屁被貓咬其陰頭其

人將死用光鼠糞燒灰麻油調傅立效豈非  
物類相感而可以相制乎。壽域神方

療貓咬本朝經驗雄黃末水調金咬處○若貓毒不  
盡寒熱時發或遍身發班者用鼠毒神方兼  
服紫金錠甚効

療鼠咬聖濟惠麝香封咬處上以帛繫之

又方簡便用砂糖調水冷服立效○又方猫屎揉  
之卽愈

又方危證桐油塗之○先以鹽湯洗淨次傅藥

又方

秘方  
集驗

班貓燒灰麝香少許津唾調敷

又方

本朝  
經驗

急以火硝盛咬處點火發之以散毒

氣次將牡蠣石灰黃柏三味為末調繁縷汁

塗咬處服後方

鼠毒神方

本朝  
經驗

療鼠咬毒或經久寒熱淋瀝如

勞或遍身發紫赤斑或骨節疼痛精神不爽

當歸

各五分

芎藭

七分

生地

八錢

芍藥

各一錢

沈香

洋參

各五分

茯苓

七分

紫檀

八分

白檀

六分

甘草

二分

千屈菜

八錢

右每帖二十錢水

煎服忌食一切油膩動風物○若發班於其

上以鍼去惡血兼服紫金鉢亦療

咬毒

柞木皮湯

本朝經驗

療鼠咬傷

柞木皮

二錢

當歸

三分

川芎

三分

金銀花

一錢

大黃

五分

甘草

一分

右水煎服

柞木即擦也實名橡斗者是

療馬咬及踏人作瘡有毒腫熱疼痛

後

灸瘡中

及腫上卽差

又方割雞冠血點所醫瘡中日三

外臺救急灸訖或人屎或馬屎或鼠屎燒為末

易方

和豬脂但取丁味皆可傅○又方用益母草細切和醋炒封之

又方醫說用栗子細嚼付之立效

又方秘方

集驗

艾灸傷處內服蘇木湯一碗卽止痛

○服童便韭汁亦妙寒水石末敷傷處旬日

亦愈

馬咬毒入心用馬齒莧煎湯服之立癒

聖惠

馬咬成瘡腫痛石灰傅之効

危謐簡便

豬鴟人千鍊松脂貼上

山居便宜作餅子貼之以帛繡定

○又方屋畜中泥以敷之

救急易古云今之承溜也

又方危證簡便梓樹葉擣敷之

猪咬成瘡

本草附方龜板燒研香油調搽之

療蛇咬方大衍方云黃蠟鎔化滴瘡口內

十便大衍方云黃蠟鎔化滴瘡口內

蛇有四孔咬處必有四竅每竅滴入黃蠟應

時不痛其毒立散經時毒氣已入腸胃者用

黃蠟為丸菉豆大研雄黃為衣酒吞下十圓

或十五圓毒氣內消

又方丹溪心法急以小便洗出血次取口中唾塗之

又以牙塗封傷處，傅而護之，甚妙，且不痛腫。

山居四要云用大  
礬傅處亦佳

路行卒被蛇咬，當急扯裹脚帶，扎縛傷處，上下寸許，使毒氣不能侵傷肌體。又急用白礬安刀頭火上溶汁，沸滴於傷處，待冷以長篦子速挑去膿，則毒血隨出，黓腫尚未退，更滴之以退為度。村居山僻，及途中夜行，卒被蛇傷，咬難求白礬處，速作艾炷灸五壯，以唾調鹽塗之，如黓腫尚未消，當更灸，更擦毒涎，自然。

流出且不透裏傷人蜈蚣咬亦宜灸醫學綱目○

趙延禧云遭惡蛇所螫卽帖蛇皮便於其上

灸引去毒氣卽止醫學綱目說

療蛇咬

醫學綱目

細辛五錢

白芷五錢

雄黃二錢

麝香少許

右為末每服二錢溫酒調服

蛇傷潰爛百藥不愈以新水數洗淨腐敗見白筋搘乾以白芷末入膽礬麝香少許摻之惡

水涌出數十日平復

夷堅志

回生酒醫學綱目療毒蛇所傷至死

杠板歸不拘多

少研爛用汁與生酒調服隨量飲之渣貼患

處立已

療蛇咬

聖惠

白礬

甘草

各一兩

右為散如蛇

蟻着之時心頭熱躁眼前暗黑用新汲水服

一下錢即止

瑞竹堂方  
名解毒散

又方 救急易方

急於無風處以麻皮縛咬處土下刀

剗去傷肉小便洗令淨燒鐵物烙之然後填  
蚯蚓泥次填陳年石灰末絹扎住輕者針刺  
瘡口并四旁出血小便洗淨以蒜片着咬處

卷之三

艾灸三五壯

又方

研

用藍葉搗汁調雄黃末敷之或用雄黃

一錢生礬二錢杓內溶化將筋頭蘸藥傷處

冷則易之連點十次若毒走腫痛者以麻油

燙熏之再用解毒紫金丹一錢酒磨服之取汗

魚腥草

卽

蓼

療蛇傷用之輒愈亦解蕈毒

吳草譜

毒蛇咬

烟袋燒熱滴油抹之百試百效

瘡醫大全○

又烟袋內油塗四邊腫處卽消切不可塗喫

傷孔內

又方本朝經驗生柿及柿餅搗爛傅咬處極妙若無

生柿及柿餅用柿漆亦佳

蛇咬忌食酸物梅子犯之大痛

醫學綱目

療卒為蛇繞

不解

金以熱湯淋之無令人尿之

療蛇入口或入七竅

金

丁人因熱逐涼臚熟寤

着有蛇入口中挽不出用刀破尾入生椒二

三粒裹着須臾自出

又方肘後

艾灸蛇尾卽出若無火以刀周匝割蛇

尾截令皮斷乃將皮倒脫卽出○至道方云

蛇出後急以雄黃朱砂細研煎人參湯調下灌之取蛇毒十便

蛇入七竅劈開蛇尾納川椒數粒以紙封之其蛇自出更煎人參湯飲之或飲酒食蒜以解內毒如被蛇咬食蒜飲酒更用蒜杵爛塗患處加艾於蒜上灸之其毒自解凡毒虫傷並

効口齒類要○衛生易簡云急以手捻定用刀割破以辛辣物置破尾上用綿繫之自

出不拔

又方瘡醫大全以針刺其尾不過二三針則褪出

蜈蚣蟻人附割鷄冠血塗之差又嚙鹽塗之効

又嚼大蒜若小蒜以塗之

又方外臺接蠱汁以潰之卽差○又方取錫矢令熟以尉之不越十度卽差

又方聖惠取蠍牛捺取汁滴入咬處須臾自差此方神驗○又方取蠍少許將筆管坐所咬處鎔蠍滴向管內令到創上三四滴便止

又方衛生易簡以生薑汁調雄黃末貼傷處瘥○又方用燈草蘸油點燈以烟薰之不問他毒虫

傷皆可用此薰極驗

壽域方云用筆管合在傷處用紙點燈火

燒着吹滅將烟入筆管內用烟熏傷處止

又方

秘方  
集驗

用艾於傷處灸三五壯拔去毒卽愈

中蜈蚣毒舌脹出是也雄鷄冠血浸舌並咽之

一男子為蜈蚣入咽喉中咬之垂死之際一

醫令殺生鷄血乘熱灌喉中蜈蚣卽出而愈

實良方也

青囊雜纂

蜂蟻人

附後取人溺新者洗之差又刮齒垢塗之

又方

千金

以淳醋沃地取泥塗之

又方 救急 方用 醣醋麻雄黃塗傷處

又方 本草 易方 衍義 用生芖梗塗之立効○又生芖頭刮

汁傳之

夢溪筆談

又方 醒法 指南 用吐沫調硃砂擦之又療蜈蚣傷

療壁虎咬聖惠 取青麻葉心七枚以手擦令汁出

塗之差○又方 硝砂雄黃各半兩同細研挑

破瘡內藥在瘡中

又方 頸體 磬壁虎咬傷最難救療以青苔塗擦再用

敗毒散加青苔三錢煎服

蜘蛛咬

外臺

取生鐵衣以醋研取汁塗之差

又方

千金

以烏麻油和胡粉如泥塗之乾則易之

取差止

又方

外臺

以蒜摩地取泥塗之

又方

聖惠

雄黃一錢分三錢麝香一錢

藍汁一大盞

右為末於藍汁中以塗咬處立差○又方嚼  
雞自傳立効○又方嚼續隨子傳之立差

又方

直指

縛定咬處勿使毒行以貝母末酒服半

兩至醉良久酒化為水自瘡口出水盡仍塞

瘡口甚妙

又方

本草  
附方

烏鵲屎浸酒服又取冠血塗之

又方

醫學  
綱目

蜘蛛咬諸般虫咬用葛粉生薑汁調

傳

壁蠻毒人必死

酉陽  
雜俎

桑柴灰三度沸取汁調白

礬末為膏塗瘡口卽差

又方

本草  
附方

易方醋磨雄黃塗之妙

又方

本草  
附方

用大黃研醋水塗傷處立效

毛蟲蟄人

本草  
附方

赤痛不止馬齒莧搗熟封之妙

又方

醫學綱目

雜色毛虫極毒，凡人觸着則放毛入

人手足上，經數日痒在外而痛在內，骨肉皆

爛，有性命之憂。此名射工毒，諸藥不効，用鍋

底黃土為末，以酸醋捏成團，於痒痛處搓轉

其毛皆出在土上，痛痒立止，神妙無比。

黃土卽伏

龍肝又取蒲公英根莖白汁，傳之立瘥。

又方

危謐簡便

甘草口內細嚼，傳之立時愈。

○又方經驗良方如內已爛，用海螵蛸為末，傳之愈。

療惡蟲咬聖惠蛇蛻皮煮湯洗三兩度，又燒灰水

和傳瘡上○又太紫草浸油塗之

療蛇毒及一切車傷但有小氣可以下藥卽活

神效千金麥門冬煎湯調香白芷末服之腥穢

薰水自口中出

凡蛇傷蟲咬倉卒無藥去處以太藍汁一椀雄  
黃末二錢調均點在所傷處併令細細服其  
汁神驗如無藍以灑花青黛代之醫說

療諸蛇蟲傷毒用青黛雄黃等分為末新汲水

調一錢服

衛生易簡

諸蟲咬傷

本草附方以燈火熏之出水妙

又方

急  
易方

諸惡蟲傷以膩粉生薑汁調傅傷處

又方

奇効  
良方

用白礬雄黃黃蠟等分九如指頭大

遇有傷處匙上溶開滴傷處或以竹筒按上  
滴入則毒不散

雄黃散

千金

療一切惡蟲咬著人成瘡不可辨認

醫療不効者

雄黃 破砂

白礬

露蜂房

各等分

右為細末入麝香少許同

研勺用醋調塗瘡上難辨認者尤宜速療三

五日毒氣入心不得聞哭聲

衛生易簡無自  
禁有乳香療二十一

十七般虫咬  
傷人及瘡腫

凡蟲畜所傷、痛極危急、或因傷經風而牙關緊閉、角弓反張、不省人事者、此毒流經絡也、急用蒜切片、以艾灸之、令傷處着火、痛裂則氣聚、而毒隨氣返、返則毒提、傷處得火而散、卽隨火瘡而泄、不致內攻矣、若灸十餘壯、不應、卽加至三五十壯、無不應手而愈者、故療癰毒者、以隔蒜灸法、有回生之功也、古人有淋

洗灸刺等法正以引導經絡祛邪解散之意  
予遇施此法而應手者比比故記之醫級

誤中蛇虺百蟲毒

瘡醫大全

雄黃一錢

巴豆一粒

去油

乾薑

五分

麝香

一分

共研細開水調服



卷之三

諸物入耳門

附

入鼻  
物撞着

入目

眼被

療耳中有物不可出方

千金

以弓弦從一頭令散

傳好膠挂耳中物上停之令相著徐徐引出

附後  
金  
麻  
繩剪令頭散

百虫入耳

千金

蜀椒末一撮以醋半升調灌耳中

行二十步卽出○又方火熨桃葉捲之取塞

耳立出○又方以葱潔灌耳中虫卽出○又

方若甲蟲入耳者以火照之卽向明出或蚰

蜒諸蟲入耳以酢灌之或麻油或人尿亦佳

又方衛生易簡用鷄冠血滴入耳中卽出○又方用蒼耳草搗自然汁灌少許於耳內其蟲卽傾出

百蟲入耳不可驚動如在左耳以手緊閉右耳及兩鼻孔努氣至左耳蟲自出右耳亦然良方○又方宜閉口勿言以紙塞耳竅鼻竅只

空垂入之耳用蘇油滴入耳竅中或出或死

瘡醫  
大全

如蟲夜間暗入者切勿驚慌喊叫逼蟲內攻宜

正坐點燈光向耳竅其虫見光卽出對直有  
人其虫不出

正宗

蜈蚣入耳後附以木葉裹鹽炙令熱以掩耳上卽  
出冷復易之驗○又閉氣滿卽吐之復閉準

前以出為度或死耳中徐徐以鉤針出之

又方救急易方用生薑汁灌耳中自出○又方

本朝經驗

用蘿蔔汁灌耳中亦佳

蚰蜒入耳聖惠小蒜搗研取汁灌耳中自出○又  
方地龍一條納葱葉中化水滴耳中其蚰蜒

亦化為水

又方瑞竹堂方

竹瑞堂方

蠅牛全搘碎置於耳邊卽出

又方

衛生易簡

用龍腦少許吹入耳中其蟲卽化為

水○又方用貓尿灌耳中立出取貓尿用盆

盛貓以生薑擦牙

飛蛾入耳

時後

先大喚氣仍閉口掩鼻呼氣其蟲

隨氣而出○又方閉氣以葦管極吸之卽出

亦療百蟲入耳

百代醫宗吸蟲訣云

諸虫

入耳藥品不便者此法最妙

竹管入透半耳中使口用力一吸

竹管入透半耳中使口用力一吸

其蟲隨氣而出俗人未識此捷

又方

衛生易簡

用醬汁灌耳中、又擊銅器於耳傍

蟻入耳

時後燒陵鯉甲末以水和灌之

療小蟲蟻入耳挑不出

衛生易簡

燐心浸油釣出虫

療百節蚰蜒并蟻入耳

本草附方

苦酒注之起行卽

出

水入耳中

救急易方

用薄荷汁點之立効又用麻油

點耳內立出

水銀入耳及入六畜等耳皆死

怪症方

以金銀着耳邊水銀卽吐出

水銀入耳

卽吐出

療黃豆入耳救急方用鵝翎管截作長十二寸許去其中膜留少許於一頭以有膜之頭入耳中呴氣吸之卽出

又方

本朝  
經驗

若在左耳以手緊塞右耳及兩鼻孔令閉氣一人將中指繫按出入耳根下凹處一手將耳朶向下引挽患人一努努氣豆自出右耳亦然

諸物入鼻不出

本朝  
經驗

作紙撚刺鼻打嚏一聲卽

出若不出頓頓取嚏為佳

療目卒  
草沙石輩  
眯不出後  
肘磨好墨以新筆  
點注目中瞳子上

又方

聖惠療雜物眯目不出鷄肝血注目中神效

○又方白蘘荷根擣絞汁注目中卽出○又

方書中白魚以乳汁和研注眼中良

又方

濟生粟七粒嚼爛取汁洗之卽出

又方

本草大蘿洗搗綿裹滴汁入目中卽出

麥芒入眼不出方

聖惠外臺煮大麥汁注眼中卽出良

眼被物撞着

聖惠杏仁爛研以人乳汁浸頻頻點

麥芒入眼不出方

聖惠外臺煮大麥汁注眼中卽出良

又方 葉氏 牛涎日兩三次點之避風黑睛破亦可

又方

本朝  
經驗

水仙花根掘取洗研爛和沙糖點眼

中○又方 麻蠅頭數十箇研和砂糖水點眼

中○又方 鹿茸為細末調人乳頻頻滴眼中

誤吞諸物門

誤吞鈎方附後若繩猶在手中者莫引之但益以珠璫若慧子輩就貫之著繩稍稍令推至鈎處小小引之則出

誤吞錢臺外擣火炭末服方寸七則出

又方聖濟葵菜不以多少絞取汁冷飲之即出

又方魏氏爛嚼鳧茈嚥之多為妙生熟皆不可

方云自然  
消化成水

又方事林續記草索頭寸剪十四段燒葵菜汁調服

誤吞銅錢經驗良方木賊草為末每服一錢用鷄子  
自調下

又方怪症多食胡桃自化出也胡桃與銅錢共  
食成粉可證矣

又方傳曰類纂以小羊蹄草嚼嚥即下

誤吞金銀或銅錢入腹衛生易簡石灰一杏

硫黃一毫英子大同研末酒調服

又方續醫說韭菜熟而不斷與蠶豆同咽之不過  
二次從太便出

又方救急方肥肉與葵菜作羹，卽食數頓，則銅錢自然下。

誤吞銅錢救急良方用桑柴灰細研米飲調下一錢。

或用菉豆粉冷水調下三錢。或生茨菰取呷。  
或濃煎艾湯飲或多服飴糖立出。○又方用  
艾蒿五兩水五升煮取一升頓服之立下。  
又亦以蜜一升服之卽出。

療誤吞鐵石骨刺等不下危急

百一方

王不留行 黃蘢皮等分 右為細末蒸餅

圓如彈子大以麻線穿之掛當風處每用一  
圓冷水化開灌下立效

誤吞銅鐵或金銀等物不能化得用砂仁濃煎  
湯服之自下

誤吞針類救急易方用好磁石含之卽出或為末服  
方寸七○又以香油一盞服之次用乾麪燒  
餅令人食飽其針隨大糞中出

誤吞鉗刺咽中痛者瘡醫大全亂蘚筋下團搓龍眼  
大以線穿繫留線頭在外以湯浸濕急吞下

咽頃刻扯出其針必刺於蔬中而出如一凹  
不中節再吞再扯○又方針入咽無藥可施  
癩蠍蟻數個將頭剝去倒垂流血以甌接之  
適內一盃許灌入喉中移時連針吐出針自軟

而

兒誤吞針哽喉不下死在須臾保用黑砂糖和  
黃泥為丸令兒吞下泥裹針于內大便而下  
誤吞鉤線聖蠟去身吞其頭數枚勿令本人

知

誤吞線鑷續醫說啖以錫半斤卽於穀道中隨穢而下凡誤吞五金者皆可啖也

誤吞竹木入喉咽出入不得者本草附方故鋸燒令

赤漬酒中及熱飲之○又亦秤鑷燒紅淬酒

飲之

誤吞稻芒本草附方白鴟頻食又用脂麻炒研白湯

調下

又方直指蓬砂牙消等分為末蜜和半錢含嚥

誤吞蠍蛇傷醫大全急吞生雞蛋二枚不可嚼次日

卽裹出○又方生公鷄熟益灌入喉中蜈蚣

卽出

案堅鷄集載以上二方並云更食未  
油盞許須臾大吐以蜈蚣畏油故也

又方

醫法  
指南

韭菜連根擂水一木碗灌之

誤吞水蛭

本草藍靛和酒絞取汁服  
附方

又方

口齒  
類要

食蜜卽愈試以活蛭投蜜中卽化為

水屢驗一書云井中生蛭以白馬骨投之卽

無試之亦驗夫蛭卽蠍蝗也雖死為未見水

復活吞之為害不小療以前法無不愈者

誤吞馬蝗腹痛壽域用田中泥為丸水吞下其蟲

必隨吐瀉出

誤吞水蟲食蜜卽化

醫法  
指南

誤吞田螺下喉將死者奇方將鴨一隻以水灌之少時將鴨倒懸令吐涎與病人服之卽化誤吞小蛇悶亂欲死本草柿餅五六个水煎多飲之瀉下而愈

木屑搶喉奇方鐵斧磨水灌之卽愈

類編

誤吞髮繞喉不出本草元頭亂髮燒作灰水服

一錢

誤吞大骨

簷竹堂方

砂含化卽愈

誤吞硝子碎片哽喉不下欲死

本朝經驗

欵冬花根

莖燒灰為末白湯勻服之○又方山崖黃土

水攬頻飲之極驗硝子得土卽消也

吞桃枝竹杖

傷醫大全

但口中數數多食白糖自消

去

誤食磁鋒

傷醫大全

生紅蘿蔔搗爛吞下其磁鋒卽

從大使而出

誤食諸蟲

本草附方

蜀椒制其毒

誤食蜘蛛暴死

本草

取猪涎送下解毒藥

附方

諸物哽噎門

附

兒頭入臼

指入竹筒

療魚骨鯁在喉中衆法不能去

外臺

取飴糖丸如

鷄子黃大吞之不去又吞此用得効也○又

亦以少許硝砂口中咀嚼嚥之立下○又亦

小嚼薤白令柔以繩繫中央持繩一端吞薤

到哽處引哽當隨出

救急易方云  
以蜜煮豚即與此法同

○又亦作竹簽刮令滑綿纏內咽中令至哽處可進退引之哽卽出○又亦好蜜一匙抄

稍稍嚥之令下良

又方續醫說速取新綿白糖二物將綿裹糖如梅大令患人嚥下入喉間留綿一半于外時時以手牽掣俾喉中作痒忽然痰涎壅出其骨粘於綿上矣

又方魏氏砂糖如鷄子大爛嚼仰面以熱酒嚥下骨隨酒便下又自梅取肉去核以砂糖含化須臾骨軟自下此方甚驗

又方百一編砂甘草等分為末綿裹含之嚥汁當隨痰出

咽中骨哽欲死者本草附方白鳳仙子研水一斗呷以竹筒灌入咽其物卽軟不可經牙或爲末吹之

療食諸魚骨梗久不出方事本右以皂角末少許

吹鼻中得鰻出多妙此方

禮云魚去乙謂其頤間有骨如乙字

○形者鰻人不肯出也  
案此方原出聖惠

金銀銅鐵哽

本草百病主治

縮砂濃煎服加甘草或

鳳仙子及根

擂汁下銅物哽

薤白

慈姑汁

鳧茈

胡桃

石灰

同硫黃少許酒服

竹木哽

百病  
主治

半夏服取

鯽魚膽點

象牙

為末  
水服

棗核哽

萬全  
續方  
主治

人頭垢為丸茶下十九吐之

小兒誤吞一錢在咽中不下以淨白表紙令卷實如著以刀縱橫亂割其端作鬚醫之狀又別取一箸縛鍼鉤於其端令不可脫先下咽中輕提輕抑一探之覺鉤入於錢竅然後以紙卷納之咽中與鉤尖相抵覺鉤尖入紙卷

之端不凝肌肉提之而出

儒門  
事親

療諸鯁方

十便

胡氏方云以木炭皮為細末研令

極細如無炭皮堅炭亦可粥飲調下二錢日

四五服以鯁下為度此法人家皆有

沈存中  
云在漢

東乃目覩其神有劉晦士一人隣家一  
子錢以此飲之下一物如大烏梅割之乃瘥

裹一子錢也池州徐使君極宝此方數數用之  
未有不效者近歲累有人言得此方之效不

復悉  
載

療竹刺羌鬚鯁鯁在喉中

茅竹

堂方用多年舊籬笆  
竹截斷煎濃湯吃下立愈

竹絲鯁

瘡醫  
大全

不拘黑白芝麻炒熟泡湯飲再以

乾芝麻嚼服幾口或以芝麻搗爛嚼食

吞銅在喉不出

瘡醫  
大全

炭末指彈入喉中其兒

當卽咯出

誤吞桃李不下

瘡醫  
大全

以少許水灌小兒頭承其

水與飲卽出

誤吞鐵針橫喉不下

本朝  
經驗

馬腹中石研末水調

燕下少頃吐出神驗

瓷餳噎咽遂逕至死

本朝  
經驗

噴灌鼻孔中立噴

出○又方蘿菔自然汁灌鼻中亦佳○又方  
鐵礬少許灌口中○又方鷄冠血和生薑汁  
灌口鼻中雖死立出而甦○又方冬葵子水  
煎灌亦佳

一小兒五歲因戲劇以首入搗藥臼中不復出  
舉家驚呼無計或教之使執兒兩足以新汲  
水急澆之兒驚喘體縮遂得出

醫書

兒頭入臼事林廣記兒頭入鐵臼以噴嚏藥着鼻中  
即出

指入竹筒事林廣記以石灰浸水蘸餉時卽出

諸物入內門

療針折入肉中千金刮象牙為末水和聚着折針

上卽出

又方

瑞竹堂方

蠟蛇腦子

推爛塗卽出

右用硫黃研

細調貼以紙花貼定覺痒時其針卽出

針棘竹木諸刺在肉中不出鼠腦擣爛厚塗之

卽出

肘後危證簡便方云瘡人病而針折在肉中

針悞入肉無眼者不動有眼者隨氣血遊走若走向心窩胸膛者陰瘍醫大全急用烏鵲翎敷莖

灸焦黃色研細末酒調服一二錢俱可

如聖膏

湯醫大全療針入肉

車脂釐油不拘多少

研如膏調磁石細末撫紙上如錢許貼之每

日換二次

竹木刺在肉中不出十頭塗之卽出○又方  
嚼白梅以塗之又溫小便瀆之

又方劉涓子方鹿角燒灰末以水和塗之立出久者

不過一夕

蘆葦刺入肉絲細嚼栗子粗盦傷處

療竹木刺入肉

良明  
彙集

草麻子搗爛塗上卽出

又方

瘡醫  
大全

收晚蠶蛾入竹管內塞之凡遇竹木

刺戳入肉內卽取蚕蛾研細和津唾調塗之

卽出

又方

本朝  
經驗

蟬頭研和米糊攤紙花上貼之並

療針入肉效

如神散

本朝  
經驗

療針及竹木刺入肉並一切骨哽

悉効

松葉鳳仙花莖葉斧子右燒存

性各等分爲末每服五七分溫酒送下針及

竹木刺入內者頃刻出其効如神

療少陽魚刺

醫方集五

用大麥不拘多少濃煎薰洗

傷處即止

案海鷗魚食鑑一名少陽魚藏器云尾有大毒海人被刺毒者以魚

尾竹皮及海一  
鱗皮解之

又方

本韻

經驗焚樟腦或樟木枝葉薰之以解刺毒

中藥毒門

甘豆湯金甘草解百藥毒此實如湯沃雪有同

神妙方稱大豆汁解百藥毒余每試之大懸

絕不及甘草又能加之為甘豆湯其驗尤奇

百一下選方  
加淡竹葉

凡中相友藥毒面青脉絕腹脹吐血蕩醫  
大全蠶退

紙即出過蠶的紙燒灰研一錢冷水調服雖危可活

石藥毒用白鴨屎人參金甘草安和七十二種

石一千二百種草解百藥毒本草

雄黃毒用防已

本草

鐵粉毒用磁石

皂莢

乳香

本草

錫毒用杏仁

本草

礬石毒用大豆汁

本草

桔梗毒用白粥

本草

躑躅毒用梔子汁

本草

杏仁毒用藍子汁

本草

金銀毒水銀服數兩卽出鷄屎汁煮葱白汁鳴

血及屎汁並療

本草

大戟毒用菖蒲汁

本草

甘遂毒用黑豆汁

本草

芫花毒用防已

防風

甘草

桂汁

本草

藜蘆毒用雄黃

溫湯

煮葱汁

本草

半夏毒用生薑及乾薑汁

南星毒同

本草

蜀椒毒用葵子汁

蒜桂汁

人尿

冷水

土漿

鷄毛燒吸烟及調服水

本草

硝砂毒用葵豆汁

浮萍

本草

丹砂毒用藍青汁

鹹水

本草

用鹽半兩以冷

水攬勺令澄旋旋服之又以蚌肉食之良奇

良方

桂毒用葱汁

本草

銅毒用慈姑

胡桃

鴨通汁

本草

苦瓠毒用稷米汁

黍穠汁

本草

瓜蒂毒用麝香

本草

○又方

本草

經驗服瓜蒂吐不止

啜味噌汁又令患人踞床以桶盛冷水漬脚  
至膝立止

案博物志以冷水漬  
至膝炎瓜至數十枚

解砒霜毒

本草

煇如狂心腹疼痛四肢厥冷命

在須臾黑鉛四兩磨水一盃灌之○又方麻

油一盞灌之

經驗良方云立可起死神驗。暴證知要云緊束其腰吐之。

又方一百白扁豆不以多少為細末入青黛等分

細研再入甘草末少許巴豆一枚去殼不去

油別研為細末取一半入藥內以砂糖一木

塊水化開添成一木盞飲之毒隨利去後服

五苓散之類醫林集要用益元散○又方釀醋多飲之

吐出毒卽解不可飲水

又方

危證便

急以人屎汁灌之卽解若在胸中作

楚者急以膽礬三分研細冷水調灌卽吐出  
若在腹中痛甚者宜用黑鉛四兩磨水兩三  
碗漸磨漸灌卽大渴出毒氣而愈○在膈上  
則爪蒂散吐之在腹中則萬病解毒丹下之

入門

救急丹

辨證錄

天下毒藥莫此為甚救法必須吐

其毒

甘草

二兩

爪蒂

七箇

玄參

二兩

地榆

五錢

水煎服一下喉卽吐再煎渣服

之又吐砒霜之毒必然

苦參湯

辨證錄

此方亦神妙，苦參三兩，煎湯一碗。

丁氣服之，卽大吐而愈。○總以吐解毒盡為度，醒後仍顛不語者，每日以菉豆水飲之，毒盡自愈。

秘方集驗

瀉毒神丹

石室秘錄

服砒霜之毒，五臟欲裂者，腹必

大痛，舌必伸出，眼必流血而死，最可憐也。急用此。

當歸

三兩

大黃

一兩

白礬

一兩

水煎湯數碗飲之，立時大瀉，則

生，否則死矣。

甘草

五錢

砒霜服下未久者取雞蛋一二十箇打入碗內攬勻入明礬末三錢灌之吐則再灌吐盡便

愈洗冤錄

解砒毒神驗方

秋燈叢話

白礬三錢調水飲之立解

黃礬散

醫學心悟

服毒者砒信為重也用小薊根搗

汁飲之立救或用此散療據云奇效

大黃一兩明礬五錢共為末每服三四錢

冷水調下

誤中砒毒橫身紫累百解不效此名砒霜累瘡

瘡醫

黃土地上挖一斗大坑以井水滿之攬

大全

令渾濁以一碗與之少刻又與之待渾身紫

繫俱散一吐卽甦雖冬月間亦宜用此法必

效

解斑貓毒一百以澤蘭按汁飲之乾者為細末白

湯調下

又方

青囊雜纂

玉簪根擂水服之卽解

又方

洗冤錄

黑小豆汁服之差用肥皂水灌下再

以鵝翎絞喉數次令吐卽活○又方用生鷄

卯開孔灌入口中連灌五六枚得吐卽活倘  
閉以箸抉開灌入

療食野葛已死者方後以物閼口取鷄子三枚  
和以灌之須臾吐野葛出○又方取生鴨就  
口斷鴨頭以血瀝口中入咽則活若口不閉  
取大竹筒以一頭柱其胸脅取冷水注筒中  
數易注之須臾口開則可與藥若甚者兩脅  
及臍各筒注之甚佳○又方飲甘草汁但唯  
多更善

又方平金煮桂斗飲之又噉葱湯佳葱湯療諸毒

又方秘方急以升麻湯探吐亦妙○又方用大

糞汁灌下即可解或用韭菜汁灌下亦可

通腸解毒湯辨證錄療服斷腸草氣不能通腹痛

便閉而死甘草一兩大黃一兩金銀花一兩

水煎服一瀉

胡蔓草即鈎葉如茶其花黃而小一葉入口百

竅潰血人無復生廣西愚民私怨茄以自斃

家人覺之急取抱卵未生鷄兒細研和以清

油幹口灌之乃盡吐出惡物而甦少遲不可  
救矣如人誤服此藥者止以前法解之

嶺南衛生

方

烏頭天雄附子毒用大豆汁遠志防風棗肉飴

糖

本草

○又用人參汁陳壁土

泡湯服

綠豆汁并

華水

案朱子文集云中烏頭毒勢甚危惡多

飲新水大嘔泄而解此亦不可不知也

又方一百多年壁土熟湯泡攬之令濁少頃乘熱

去脚取飲不省人事灌之或掘地以水攬

水飲亦妙

又方本草童尿飲之又黃連湯飲之

又方瑣碎錄癲癇不省者竹青濃煮汁溫冷服之

又方保元嘔吐不止以香油灌下立解

又方暴證知要目赤狂躁用蘿菔汁入黃連甘草汁各半盞服

又方博聞類纂急以冷水漱口飲丁丁尤佳蓋野

猪每中藥箭必走入溪澗飲水此其驗也十

方飲少生麻油

丁人服附子酒多頭腫多如斗瓦裂血出急取

紫豆黑豆各數合生嚼併煎濃汁飲之廻解

危證

簡便

巴豆毒用煮黃連汁大豆汁菖蒲汁煮寒水石

汁冷水

本草

又方肘後下利不止黃連乾薑等分為末水服方寸七又大豆煮汁一升飲之

又方危證  
簡便以黃連黃柏煎湯冷服忌食熱湯熱

性藥物

又方百生油卽解

又方 怪症芭蕉根汁解之

方

症

又方 本朝經驗下利不止困頓用參連湯

人參 二錢

黃連 一錢 水煎兼啜冷粥

解輕粉毒 本草齒縫出血臭腫貫衆黃連各半兩

煎水冰片少許時時漱之

又方 醫方摘要出山黑鉛五斤打壺一把盛燒酒十

五斤納土茯苓半斤乳香三錢封固重湯煮一日夜埋土中出火毒每日早晚任性飲數

杯後用瓦盆接小便自有粉出為驗服至筋

骨不痛乃止

又方

暴證知要

誤吞輕粉、筋骨痛。川椒半斤，湯泡晒乾，三泡三晒，為丸。天花粉為衣，空心溫酒下。

五十九

又方

萬全備急

黑鉛燒熟，淬酒數次，飲之。

又方

奇方類編

川椒去目，每日清晨吞之，任意不拘

多少，白湯下。

中水銀毒

萬全備急

生炭為末，煎汁服。

又方

本草

黑鉛解之。

又方瘡醫  
大全揀閼口花椒二兩吞下卽裹水銀從

木便出

解鉛粉毒  
秘方砂糖調水服又肥皂搗爛取汁

灌下皆效○又方以麻油調蜂蜜與服

皂礬毒瘡醫  
大全急取麵糊一鉢服之

多服犀角令人煩入麝香一字調水飲之

硫黃毒用米醋黑鉛鐵漿朴消本草○又方黑錫

煎湯服卽解

又方聖濟硫黃毒發令人背膊疼悶目暗漠漠烏

梅肉焙一兩沙糖半兩漿水一大盞煎七分  
呷之

啞芙蓉毒

保元

或不省人事用釀醋溫熱入砂糖

灌下一二碗探吐之

大黃苦消毒

暴證知要

泄瀉不止用炒乾薑半兩甘

草二錢烏梅二箇水煎服

陶氏經車捷更有

梗米人參白朮附

子皮升麻右燈心一握水

煎入炒陳壁土一匙調服

麻黃毒

暴證知要

汗出不止將病人髮撒水盆中足

露于外用炒麩皮布裹欬欬烙之如再不止

用撲粉

撲粉方

醫方考

龍骨

牡蠣

糯米各等分

右為末撲之

孝慈備覽用麪皮糯米粉各二升龍骨牡蠣各二兩極細末以

疎絹包裹周身撲之

誤食膳黃

萬全續方

吃海蠣卽解

案續醫說云水母

吳人名為海蠣

誤服銀硃膳黃

蕩醫大全

薑梨水溫服卽解

誤服銀粉

蕩醫大全

蔬油 黃蜜 紅砂糖

攬勺服之○又方多食生荸薺卽解○又方  
香油灌之○又方急搗蘿菔汁飲之

桐油毒本草吐不止乾柿餅食之又甘草解之

又方救急易方熱酒飲之良

中石炭毒昏聾飲冷水卽解

本草

服藥過劑悶亂者外臺水和胡粉

水和葛根

地漿 襪荷汁 糜米瀝 豉汁 乾薑

黃連 餡糖 飲薑汁 吞鷄子黃 刮

東壁土少少以水一二升和飲之良

燒犀

角水服方寸七 凡此諸藥飲汁解毒者雖

危急亦不可熱飲之待冷則解毒熱則不解

毒也

凡解藥毒湯劑不可熱服。宜涼飲之。蓋毒得熱則勢愈盛也。然此特以中熱毒為言耳。若解木鱉、茵薑、黃連、石膏之類，而中陰毒者，豈仍避熱而猶堪以寒飲乎。瘡醫大全

集驗療中諸毒藥未死，但聞腹中煩冤，剝裂作聲，如腸胃破斷狀。目視一人成兩人，或五色光起，須臾不救。方外臺取新小便和圓，邊久麻一升，絞取汁一升，頓服。氣已絕，但絞口與之。

入腹便活也已死萬一冀活但數與屎斗也

療藥毒不止煩悶

千金翼

甘草

二兩

白梁粉

一升

蜜

四兩

右水煎如薄粥飲一升

楊氏家藏方不用白

濕粉用菉豆粉名甘

粉散解一切藥毒

甘草分

礬灰散

三因

療中諸毒

白礬

牙茶各等分

右為末每服二錢新汲水調一得吐卽效未

效再服

楊氏家藏方名備急散此藥入口味甘而不覺苦者是中毒也

青黛雄黃散

三因

凡始覺中毒及蛇蟲咬癰疽纏

作卽服此令毒氣不聚

上好青黛

雄黃

等分右為細末新汲水調下二錢

化毒散

楊氏家藏

療中藥毒吐血或心痛或舌尖微

黑口脣裂嚼豆不腥者是

巴豆

一枚去心膜研如泥

黃丹

半錢

雄黃

一字研細同

右用烏鵲子一

粒煎盤內煎成餅摻藥在上捲為筒子臨睡  
一服爛燙茶清送下當夜取下毒

解毒藥用露蜂房甘草等分用麸炒令黃色去  
麸為末水二碗煎至八分令溫臨臥噴服明

日取下惡物極妙

毒域神方

誤食毒藥咽喉急閉

魏氏家藏用羊蹄根細研醋調

飲吐出涎灌蜜水聲方出

療中諸藥毒衛生易簡用四物湯香蘇散各一貼和煎服或萱草根研汁飲之

解一切藥毒百白扁豆生熟乾為細末新汲水調下二三錢吳內翰備急方云服砒霜大渴利腹脹欲裂以水調隨所欲飲與之卽安○又亦續隨予隨多少以熱湯送下毒卽隨大便利去

療吐却惡毒物後覺胸心不安穩

聖惠

茯苓

麥門冬

人參

各一兩

青竹茹

半兩

棗三

枚水煎服且宜食粥



中飲食毒門

飲食中毒煩懣癢之方

金匱

苦參

三兩

苦酒

一升半升

右煮三沸三上三下服之吐食出卽差或以

水煮亦得○又方犀角湯亦佳

貪食食多不消心腹堅滿痛

金匱

鹽

一升

水

三升

右煮令鹽消分三服當吐出食便差

蜀椒閉口者有毒誤食之戰人咽喉氣便欲絕

或吐下白沫身體癱冷急療之方

金匱

濃煎

豉汁飲之桂煎汁飲之飲冷水二升

或食木蒜 或飲地蠶

誤吞樹閉氣不通

百

一喫京棗三個解之

食諸菌中毒悶亂欲死療之方

金匱

大豆濃煮汁

飲之 人糞汁飲一升

土雙飲一二升

服諸吐利藥並解

食楓樹菌而笑不止療之以前方

金匱

誤食野芊煩毒欲死療之以前方

人種芊三年

不收成野芊

並殺人  
○金匱

療中蕈毒同蒜毒聖濟左繙藤取枝莖煎汁服之

又方 夷堅志 取金銀花生啖甚驗

又方 得効 方用芫花生為末每服一錢新汲水調  
服以利為度

又方 朱氏集驗 茄萸煎湯服吐下解又熟艾煮服三  
五盞雄鷄取熱血灌之

又方 秘方集驗 六十散 滑石末一錢草丁錢研勻甘 每服二錢水調  
服效

又方 鄉藥集成 生荳少許和油食之 村家救急方作冬瓜 癸丑年  
年家僅摘蕷燒於火中戲云食之味甘一婢

信之食少許又二婢在傍取食些少須臾三婢眩悶一倒竈中二入房而倒倉卒無藥令食生菘又喫與真油一小滴然後目開渠云眩悶中生菘入口則一路冷徹咽中始知有生理

療蕈毒欲死

一百一十一用石首魚頭白水煮濃汁灌之

解菌湯

辨證錄

療悞食毒菌胸脹心疼腹痛腸瀉

而死

甘草

二兩

白芷

三錢

水煎服服後乃

用鵝翎掃其咽喉引其上吐必盡吐出而愈

又方

辨證錄

白藜

五錢

瓜蒂

一枚

水煎服

非旺

卽瀉而愈

食松蕈中毒

本朝經驗

喫豆腐解之

諸蕈如糖蕈之屬經久皆毒人食之並有害

子水煮食之且飲煮汁解之

本朝經驗

野菌毒

百病主治

甘草

煎麻油服

防風

本朝經驗

胡椒

生薑

梨葉汁

荷葉煎

阿魏

童尿

人屎汁

案吳蕈譜云食蕈中毒二便頻遺身軟口苦以甘草濃煎灌之獲愈

食芋中毒

本朝經驗

地漿

生薑汁

食鱗中毒療之方金匱  
紫蘇煮汁飲之搗汁飲之亦良

又方本草生藕汁 烹乾蒜汁 冬瓜汁 丁香  
右服之並佳

又方證治要訣丁香末 薑湯服五分

又方綱目集解大黃 紫蘇 冬瓜 右水煎  
太盞服之效

蟹柿相反令人吐血服此解本草 蘆根汁

蟹柿反惡若連食時莫教吐盡血隨之澹軒

木香急煎湯飲之竒效

蟹捕不惡太口結之以血昏不識人病垂

殆用木香解子灌之見百下方

食鯰鱗魚中毒

金匱

蘆根煮汁服之卽解

又方

百

五倍子 白礬

右等分為細末水

調灌之○又方槐花殼子右為細末水調灌  
之○又方以麻油灌之木吐毒物盡出瘥

又方

禁竹

堂方用新鮮肥皂丁箇如無半新者亦可

去筋膜內子去黑壳搗爛如黃豆數粒硼砂  
少許再共搗小切作指頭大放入口井水灌

下卽愈

又方 醫法指掌錄 用鷄血灌之

又方 萬全備急 人寐清汁灌之 吐出得生蘆根汁  
豆粉棗欖甘蓀皆不及也

瓜蒂散 辨證錄 人有食河豚 舌麻心悶 腰脹氣難  
舒口開而聲不出 療法宜吐出其肉

瓜蒂 七枝 白茅根 一兩 蘆根 一兩 水煎汁  
飲之必大吐 吐後前證盡解

食河豚毒 本朝經驗 白藜水煎服灸食亦可 烏賊魚

墨最制其毒○又方無患子燒存性調水服

○又方蘘荷根研取汁服之○又方古艾錢

一文食口中蘸津喫

食魚中毒面腫煩亂方金匱橘皮濃煎汁服之卽

解

鱠食之在心胸間不化吐復不出速下除之療

之方

橘皮

一兩

大黃

朴消

各二兩

右以

水一升煮至小升頓服卽消

食魚中毒

萬全續方

橄欖汁蘆根汁吃下俱妙

又方 秘方 集驗 冬瓜搗汁飲之

蟲魚毒

百病主治

蓬砂

同甘草浸香油

獺皮

煮汁並解一切魚肉

蝦蟹毒

苦參

煎醋

羊蹄葉

擣汁或煎解河豚及諸魚毒

療自死六畜肉中毒方

金匱

黃蘚屑搗水服方寸

七

療食生肉中毒方

金匱

掘地深三尺取其下土三

升以水五升煮數沸澄清汁飲一升卽愈

此卽

換地

療食六畜肉中毒方

金匱

燒赤小豆一升為末服

三方寸匕神良

療食鬱肉漏肺中毒方

鬱肉密器蓋之隔宿者  
是也漏肺茅屋漏下治

○着者是也金匱燒大尿酒服方寸匕每服人乳汗

亦良

大尿、肘後作人乳

○飲生韭汁三升亦得

化漏湯

辨證錄

療食漏肺致胸膈飽滿上吐下瀉

木腸如刀割疼痛

山楂

三錢

甘草

五錢

大黃

三錢

厚朴

三錢

白芷

二錢

麥芽

二錢

水煎服

療木畜鳥獸肝中毒方

金匱

水浸豆豉絞取汁服

數升愈

療食馬肉中毒欲死方

金匱二兩

香豉

二兩

杏仁

三兩

蒸丁食墳熟杵之服日再服○又亦煮蘆根

汁飲之良

療食牛肉中毒方

金匱

甘草煮汁飲之卽解

療食野菜馬肝肉諸脯肉毒

金匱

取頭垢如棗核

大吞之起死人○又狗屎燒灰水和絞取汁

飲之立愈

療諸食中毒方

金匱

飲黃龍湯及犀角汁無不療

也飲馬尿亦良又服韭汁數升

黃龍湯

本草

卽糞清大明曰臘月截淡竹去青皮

浸滲取汁療天行熱疾中毒

療以雉肉作餅曬

因食皆吐下亦

金

犀角為末

服方寸七

食雉子毒

事林廣記

飲醋少許卽消○又方

本草

飲薑

汁

療食鴨肉成病胸滿面赤不下食

聖惠

糯米泔溫

服一中盞

療食白鯉雞子過多致病鄉藥集蘇一升者服一

云蒜一升煮服之

萬全備急云取蘇子一升煮食之吐而愈

療中鳩毒氣欲死者聖惠用葛根三合水三中盞調飲之如口噤者以物揭開灌之

食鷄中毒吐不止萬全續方生犀角末新汲水調下

卽愈

諸鳥肉毒事林廣記生白扁豆末冷水服之

食鱸魚中毒欲死惠生薑根春取汁多飲為良

并療蠅毒亦可煮薑荳芽汁飲之

食章魚中毒○又方熱灰投滾湯中澄清服之

本朝  
經驗

鹿角菜湯浸化飲之亦解諸

魚毒○又方熱灰投滾湯中澄清服之

本朝  
經驗

炒豆屑湯攪飲之○又方鐵

漿飲之○又方大黃為末五六分白湯送下

○又方櫻葉水煎服嚼櫻子亦佳○椎樹莖  
乾者水煎服○又方眼子菜水煎服大妙

解食毒鱉秘方集驗飲藍汁數椀如無藍汁靛青水

亦可

駒溺湯

辨證錄

療食鱉而腹痛欲死

馬尿一

按

甘草

兩

水煎服得吐卽愈不吐卽再飲

二煎無不愈者

中蠍毒

瘡醫  
大金

白芷

雄黃

各三  
錢

丹砂

山查

枳實

各一  
錢

茯苓

五  
錢

水煎服一劑

痛止二劑毒出矣

又方

本草

胡椒解之

馬刀毒

本草  
萬全

飲新汲水解之

食肉傷

萬全  
備急

中查三十個搗碎濃煎湯飲○又

方阿魏煎湯飲

療飲酒連日醉不醒時後蕪菁菜並少米熟煮去  
滓冷之內鷄子三枚或七枚調勺飲之二三  
升○又方擣生葛根汁及葛藤餅和絞汁飲  
之無濕者乾葛煎服佳乾蒲煎服之亦佳

飲酒中毒經日不醒者今人謂之中酒也用黑  
豆一升煮取汁溫服一小盞不過三服卽愈

醫說

飲酒過多不解萬全備急鷄距子煎汁啜之  
酒內過度脹脹以食鹽擦牙漱下如湯沃雪

萬全

備急

燒酒醉死本草急以新汲水浸其髮外以故帛浸

濕貼其胸膈仍細細灌之至甦乃已

又方

秘方集驗冷汚泥搭胸前燥卽再搭直至泥濕

為度自愈凡酒毒至死黑大豆二升煎汁飲

愈

又方

醫法指南

飲好醋一杯卽醒

又方

願體

將頭髮浸入新汲水內用熟豆腐切片

遍身貼之冷卽更換再煎葛根湯飲之醒後

五食菜豆湯

又方

東醫寶鑑

過飲燒酒中毒則面青口噤昏迷不

省甚則腐腸穿腸遍身青黑冷吐下血死在

須臾初覺便脫衣推身袞轉之無數吐之即

甦又以溫湯裸體浸灌常令溫煖若灌冷水

卽死又取牛爪及蔓青搗取汁幹開口灌之  
不住又碎冰頻納口中及肛門又葛根搗取

汁灌口中漸醒而愈

燒酒以錫壺盛經宿飲之令人醉悶不省以陳

壁土攬水澄清入甘草湯灌之卽醒危謐簡便

飲酒中毒

本朝經驗

眼子菜水煎服之

飲點剝酒中毒

西洋造者是○本朝經驗

食鹽水煮飲三四

椀乃瘥

食熟麪中毒

本草附方

蘿蔔擣取汁飲之無生者則

取子水研取汁飲之又地骨皮煮取汁飲之  
又赤小豆末和水服卽愈

又方

萬全續方暖酒和薑汁服

食棕傷

萬全續方

以水服壁上黃土一錢卽瘥

食蕎麥中毒本朝經驗楊梅皮為末白湯送下○又

方多服蘿蔔汁亦可又杏仁生啖卽消○又

方荔枝花莖葉卽隨軍茶剉水煎服○又方柑皮搗

絞汁服乾者水煎服○又方海帶水煎服

豆粉毒

百病去治

杏仁

豆腐蘿蔔

療豆腐毒

朱氏集驗

蘿蔔煎湯飲之

又方

入門杏仁水研取汁飲之

又方

東醫寶鑑過食豆腐腹脹氣塞欲死新汲水多

解鹽滷毒

秘方  
集驗

豆腐漿灌下如無生漿將黃豆

浸濕搗爛灌下抹皂布水或肥皂水皆能令

吐切不可用熱

又方

辨證

鹽滷之毒必至口鹹作渴腹中疼痛

身蜷脚縮而死療法必用甘以解之用甘草

三兩煎湯救之如服已久加當歸二兩腸潤

未必皆死也

多喫茶中毒

本朝  
經驗

砂糖 甘草 白梅

釀醋並解其毒

食竹筍中毒本草 生薑及麻油能殺其毒

又方本朝經驗草 腰膝滿手不可近喬麥殼水煎多飲

之又海帶煮汁服之亦可

喫油燂諸物中毒本朝經驗 桔皮水煮飲之

水芥毒

百病主治

硬糖

杏仁

同乳餅粳米煮粥食

食銀杏中毒

百病主治

香油多飲吐之又地漿藍汁

甘草汁飲之

又方方便書

銀杏樹根煎濃湯灌下卽活

又方公選良方

小兒食之過多胞脹欲死急用白蘞

頭煎湯頻頻灌之少頃自定

秘方集驗云白  
藥多食之成癥

療法同上○瘍醫大全云凡中白蘂毒雖

然一聲卽暈去儼如驚狀者是療法亦同

中白蘂毒

錄信

將木香滾水磨汁入麝香少許

服之卽解或將白果殼搗爛煎服

食桃成病

外臺

桃梟燒灰二錢水服取吐卽愈

食梨過傷

事林廣記

梨葉煎汁解之

食柑毒

事林廣記

柑皮湯解鹽湯亦可

食菱傷作脹

萬全備急

生薑汁飲之立消又麝香小

許水點服

食瓜過多本草但飲酒及水服麝香

又方萬全續方食白煮魚卽化為水或加麝香少許

○又食瓜薹傷心腹堅脹痛悶不安用鹽二

兩水一椀煎消燉服吐下卽安

食西瓜中毒

本朝經驗番椒剉浸水飲之

食胡椒中毒

本朝經驗菉豆粉解之嘔而欲絕者齏

油灌之

番椒同

療食諸菜中毒方

千金

甘草

貝齒

胡粉

各等分

右為細末水服方寸七〇又小兒尿乳斗共

服二升亦好

又方外臺取雞毛燒末以飲服方寸匕七差

療食諸藥中毒發狂煩悶吐下欲死聖惠 雞糞燒

灰為末水服一錢未解更服

又方本草 甘草 香油五並佳

中萬能毒醫說 生薑汁或濃薑湯服

食雜菰菜子過多腹脹氣急東醫寶鑑 桂心為末飯

丸菉豆大以水吞下十丸未愈再服又桂皮

濃煎取汁飲之又服瓜蒂散吐之即愈

又方入桂心末五錢麝香一錢飯九葉豆大白  
湯下十五丸卽效名曰桂香丸

喫茱萸痛

事林廣記

高良薑末熱湯調服立見效

凡海中菜多食損人令腰痛發氣吐白沫飲熱  
醋卽安凡海菜傷皆同此法

東醫寶鑑

飲冰水及涼水過多心脾疼痛萬全續方用川椒二十粒浸于漿水中一宿還以水吞之其病卽  
愈永不發

解烟毒

秘方

砂糖調水服

烟毒發熱欬嗽大作服之而痊

醫意

麥冬

知母 山梔 花粉 黃芩 蘇子

糖一兩和服

食諸肉中毒或吐下血胡荽子一升煮令發裂  
取汁停冷每服半升又生薑汁飲之

本草附方

療食諸毒肉吐血不止瘡黃甚者用葱子一升  
洗煮使破取汁停冷服半升日夜各一服血

定止

衛生易簡

消肉化毒丹

辨證錄

人有食牛犬之肉、一時心痛

欲吐不能欲瀉不可。宜用吐法亦有探吐之

不應者療法宜消化解毒

神曲

雷丸

山楂

大黃

各三錢

厚朴

枳實

各一錢

右水煎服。此方乃逐下之神

方。倘可上湧不必用此方。

黃龍湯

奇効良方

療因食中毒

右將竈底當釜直

下掘赤土為細末。以冷水調隨多少服之。或

以犀角水磨取汁飲亦療食六畜肉中毒大

妙

飲食毒物瑞竹鵬砂四兩真香油一斤瓶內浸之遇有毒者服油一小盞夕浸尤佳

又方

本草

雄黃、青黛等分為末每服二錢新汲水

下

神仙解毒萬病丸一百解一切藥毒惡草菰子蘭  
蕈金石毒喫自死馬肉河豚發毒時行疫氣  
山嵐瘴癥急喉閉纏猴風衝冒寒暑熱毒上  
攻或自縊死落水打折傷死但心頭微燄未

隔宿者並宜用生薑蜜水磨一粒灌之須臾

復甦癰疽發背未破魚臍瘡諸般惡瘡腫毒

湯火所傷百蟲犬鼠蛇傷并東流水磨塗并

服一粒良久覺痒立消打撲損傷折炒松節

酒磨下半粒朝鮮李宗準紫金丹方云如無松節酒以炒松節入酒湯用

乃以東流水磨塗男子急中及顛邪喝叫亂

走女人鬼氣鬼胎並宜煖酒磨下一丸可分

兩服有毒即吐或利毒盡自止李宗準云通利一兩行無

如欲吐則生溫酒一二匙壓下則不吐孕

本草綱目 卷之四  
婦不可服

文蛤

三兩 淡紅黃色者搘碎洗淨

紅苔

大戟

一兩

山茨菰

二兩

洗卽鬼

火藥

○曬

仙人掌

人心云人皆不識以老鴟

為之其

山茨菰

俗名金燈籠

其葉似

莖花似

燈

○曬

籠其色白

上有黑點結子三棱

二月長苗

三月開花

四月苗枯

空地得之其茨菰

上

有毛包裹

人不可識株時可於有苗時記

其地至秋冬取之此藥中其山茨菰不真

則藥不効

李宗準曰本草云葉如車前根

如慈姑則與余所得根如小蒜葉如韭者

異乃知

臘仙所云者與余同而亦為本草

所謂零陵

團茨菰無疑矣但其花上黑點

或有或無

亦豈風土之異乎

○案葉氏錄

驗楊氏家藏並云山茨菰乃是平驚花

根

白花

耆令

攻本草

無其說

續隨子

一兩

去研

尤可疑

錄以待識者

辨之

續隨子

一錢

研

細紙裹壓出油

再研如白霜

麝香

三錢

右將前三

味焙乾為細末

入麝香續隨子研

令勻以糯

米粥為丸

每料分作四十粒

於端午七夕重

陽日合如欲急用

辰日亦得於木臼中杵數

百下不得令婦人

孝子不具足鷄犬之類見

之

李宗準云今案合未重七兩八錢然為飛

羅所次不過七兩五錢每劑可用糯米二

合

洋淘作濃飯重六兩六錢合糊重十四兩

強

杵後重十四兩三四錢蓋糊時或粘着乾

燥則添水故也陳自明臞仙王應孺皆以一

剖分

四十粒余恐人不度氣之強弱老幼

藥服一粒也今分為八十粒半  
應猶所謂每服半粒亦此意也○萬病解毒

圓得効

文蛤半兩

山茱萸一兩

續隨子半兩

麝香一錢

大戟七錢半

全蝎五枚

山荳根半兩

朱砂

雄黃各二錢

主療修製同上○大乙

神丹

一名追毒丹  
乾坤生意

文蛤三兩

山茱萸二兩

大戟

一兩半

千金子一兩

麝香三錢

朱砂

五錢

右主療修製同上

外斜正宗大乙  
紫金丹卽是○

案解毒萬病圓始見葉氏錄驗方名聖搜奪

命丹又觀音散而楊氏家藏方加板藍根名

解毒圓然其主療修製之詳至百一方而備

焉後世或名玉樞丹或名華金鍊皆此方

而諸家增味頗多持危氏萬病解毒圓譚仙  
大乙神丹諸家多採用故附于此

懸川門人

山本太玄校刊

沼津門人

軒村熙 覆校

而諸家增味頗多特危氏萬病解毒圓譙仙  
大乙神丹諸家多採用故附于此


懸川門人

山本太玄校刊

沼津門人

軒村熙覆校

救急選方下卷



醫有讀汗牛之書、而不能施理者焉、又有好施理術、而不識一丁字者焉、故世人恒嘲言、讀書者不善理、善理者不讀書、其為弊也久矣、殊不知讀書而不善理者、剗精利神於無用之學也、施理而不讀書者、師心逞臆於司命之職也、均是吾道蠹賊、其不罹天網者、僥倖而已矣、吾先人創建醫學、意在矯此二弊焉、伯兄廉夫繼先志、上自乾元崇文之秘帙、石包天承之奧冊、下至山經地志、碑乘牋說、苟涉係吾道者、莫不搜索而採擷也、今日所處

劑者、即昨日所抄謄、善讀而善理者、唯吾伯兄有  
焉、如此然後、可能解世人之嘲矣。頃伯兄著《救急  
選方》、此亦抄謄之所得也。其書援據該博、在讀者  
自知之。蓋先人選濟急方、有意補續未果而逝。故  
伯兄繼其志云。此書之行、不特在救疾疢之危急、  
而在革醫家之宿弊焉。伯兄之志能達寰宇、則醫  
家負書籤之謗者、與錯用錫餳之人、均當愧沮而  
悔改焉。其功於吾道、豈淺淺乎哉。癸亥正月初九  
日胞弟湯川元俊安道跋

家君以濟衆為已任、每慨今世醫家或平素不研其術、一旦遇卒暴之證、錯愕失措、遂致夭橫、乃病在蓐也、著此書以備應急之資、其啟來學、惠亦溥矣、享和初付之閑雕、未幾燬于火、今茲再命翻梓、廣刷行之、醫家預讀此書、精窮其術、使世人無復斃乎、委靡平則、家君濟衆之功、亦與天壤不朽云。

文化庚午孟冬既望不肖男元胤夾祺謹題