

本草卷十二之十三目錄

木部

桂　牡桂　菌桂　松脂　槐實　槐膠　槐花　枸杞
栢實　茯苓　琥珀　墜　榆皮　酸棗　蘗木　楮實
乾漆　五加皮　牡荊實　蔓荊實　辛夷　桑上寄生　杜仲　楓香脂
女貞實　木蘭　雞核　丁香　沉香　薰陸香　雞舌香　藿香
詹糖香　檀香　乳香　降真香　蘇合香　金櫻子　藤黃　迭鬼香
海紅豆　落鷹木　紫木　栟木皮　無名木皮　奴會子　乾陀木皮　含水藤中水
皂莢　蜜香　阿勒勃　鼠藤　浮烟囉勒　靈壽木皮　綟木　斑珠藤
阿渾子　不彫木　曼遊藤　龍手藤　放杖木　石松　牛娘藤　震燒木
木麻　帝休　河邊木　檀桓　木蜜　朗榆皮　那耆恋　黃屑
桑根白皮　竹葉　吳茱萸　檳榔　梔子　紫鉚　騏驎竭　龍腦香

食茱萸　無義　枳殼　枳實　厚朴　茗荛榛　秦皮　秦椒
山茱萸　紫葳　胡桐淚　墨　棘刺花　猪苓　白棘　烏藥
沒藥　龍眼　安息香　仙人杖　松蘿　毗梨勒　菴摩勒　鬱金香
衛矛　海桐皮　大腹　紫藤　合歡　虎杖　五倍子　伏牛花
天竺黃　蜜蒙花　天竺桂　折傷木　桑花　椋子木　每始二木　必栗香
撚木　研藥　黃龍眼　箭幹　元慈勒　都咸子　鑿孔中木　櫟木皮
省藤　松楊木　楊廬耳　故氈敝　侵木　象豆　地主　腐木
石剌木　桫木　息王藤　角落木　鴉鳥漿　紫珠　牛領藤　枕材
鬼膊藤　才戟　奴柘　温藤　鬼齒　鐵槌柄　古欖板　慈母
飯籮　白馬骨　紫衣　梳笼　倒掛藤　故木砧　古厠木　桃橛
梭頭　救月杖　地龍藤　火槽頭

重刊經史證類大全本草卷之十二

木部上品

桂

桂花

賓州桂

宜州桂

桂味甘辛大熱有小毒主濕中利肝肺氣心腹寒熱冷疾霍亂轉筋頭痛腰痛出汗止煩止嘔欬嗽鼻齆能暖胎堅骨節通血脉理疎不足宣導百藥無所畏久服神仙不老生桂陽二月八月十月採皮陰乾

吐逆陶隱居云桂本經惟有一種今俗用桂有二種心半卷多脆者單名桂入藥最多所用桑與前說相應與本經乃並有三種廣州者好名曰菉桂次出交阯桂州者厚而不好經云桂葉如枹葉澤黑皮黃心亦齊武帝時朝臣獻桂皮氣相類而葉異亦能變化為木者正圓如竹三重者良牡桂皮薄色黃少脂肉氣如木蘭味亦辛此桂則是半卷多脂者此云仙經有三桂以葱涕合和雲母蒸化為木服之則有三種明矣陶又云齊武帝時湘州得樹以植芳林苑中陶隱居雖是梁武帝時人實生自宋孝武建元三年歷齊為諸王侍讀故得見此樹而言也蘇恭但只知有二種亦不能細尋事跡而云陶為深誤何臆斷之甚也抱朴子云桂可以竹瀝合餌之亦可以龜腦和服

輒須之蓋禮所云薑桂不辛以為芬芳陶注云菌桂葉似柿葉中有縱文三道味甚辛烈皮厚二寸以上者名曰牡桂葉長尺許陶云小桂或言其葉小者肉引經云似柏葉驗之殊不相類不知此言從何所出今按桂有二種惟老皮堅枝無肉薄卷及二三重者或名菌桂或名筒桂其全不堪用其小枝薄卷及二三重者或名菌桂或名筒桂其枝嫩枝皮名為肉桂亦云桂枝其老者名木桂亦名大桂得人參麥門冬其草大黃人參調和雷公桐君岐伯黃帝扁鵲俞跗醫和李氏本草云菌桂牡桂心半卷多脆者單名桂入藥最多所用桑出單桂條陶為深誤也今按陳藏器本草云菌桂牡桂心皮氣相類而葉異亦能變化為木者正圓如竹三重者良牡桂皮薄色黃少脂肉氣如木蘭味亦辛此桂則是半卷多脂者此云仙經有三桂以葱涕合和雲母蒸化為木服之則有三種明矣陶又云齊武帝時湘州得樹以植芳林苑中陶隱居雖是梁武帝時人實生自宋孝武建元三年歷齊為諸王侍讀故得見此樹而言也蘇恭但只知有二種亦不能細尋事跡而云陶為深誤何臆斷之甚也抱朴子云桂可以竹瀝合餌之亦可以龜腦和服

崇圃桂為名今之所生不一離此郡從嶺以南際海盡有桂樹又厚堅土人所採厚者必嫩薄者必老以老薄者為一色嫩既辛香兼又筒卷老必味淡自然極薄卷者即牡桂也以老大而名焉筒卷者即菌桂也以嫩而易卷古方有筒桂字似菌字後人誤而書之習而成俗至於書傳亦復因循桂心即是削除皮上甲錯取其近裏辛而有味有三種菌桂葉似枇杷葉此乃云葉如柏葉蘇以桂葉無似枇杷葉此陶為深誤剩出此條今據陶注桂葉似柿葉驗之殊不相類不知此言從何所出今按桂有二種惟老皮堅枝無肉薄卷及二三重者或名菌桂或名筒桂其枝嫩枝皮名為肉桂亦云桂枝其老者名木桂亦名大桂得人參麥門冬其草大黃人參調和雷公桐君岐伯黃帝扁鵲俞跗醫和李氏本草云菌桂牡桂心半卷多脆者單名桂入藥最多所用桑出單桂條陶為深誤也今按陳藏器本草云菌桂牡桂心皮氣相類而葉異亦能變化為木者正圓如竹三重者良牡桂皮薄色黃少脂肉氣如木蘭味亦辛此桂則是半卷多脂者此云仙經有三桂以葱涕合和雲母蒸化為木服之則有三種明矣陶又云齊武帝時湘州得樹以植芳林苑中陶隱居雖是梁武帝時人實生自宋孝武建元三年歷齊為諸王侍讀故得見此樹而言也蘇恭但只知有二種亦不能細尋事跡而云陶為深誤何臆斷之甚也抱朴子云桂可以竹瀝合餌之亦可以龜腦和服

輒須之蓋禮所云薑桂不辛以為芬芳陶注云菌桂葉似柿葉中有縱文三道味甚辛烈皮厚二寸以上者名曰牡桂葉長尺許陶云小桂或言其葉小者肉引經云似柏葉驗之殊不相類不知此言從何所出今按桂有二種惟老皮堅枝無肉薄卷及二三重者或名菌桂或名筒桂其枝嫩枝皮名為肉桂亦云桂枝其老者名木桂亦名大桂得人參麥門冬其草大黃人參調和雷公桐君岐伯黃帝扁鵲俞跗醫和李氏本草云菌桂牡桂心半卷多脆者單名桂入藥最多所用桑出單桂條陶為深誤也今按陳藏器本草云菌桂牡桂心皮氣相類而葉異亦能變化為木者正圓如竹三重者良牡桂皮薄色黃少脂肉氣如木蘭味亦辛此桂則是半卷多脂者此云仙經有三桂以葱涕合和雲母蒸化為木服之則有三種明矣陶又云齊武帝時湘州得樹以植芳林苑中陶隱居雖是梁武帝時人實生自宋孝武建元三年歷齊為諸王侍讀故得見此樹而言也蘇恭但只知有二種亦不能細尋事跡而云陶為深誤何臆斷之甚也抱朴子云桂可以竹瀝合餌之亦可以龜腦和服

崇圃桂為名今之所生不一離此郡從嶺以南際海盡有桂樹又厚堅土人所採厚者必嫩薄者必老以老薄者為一色嫩既辛香兼又筒卷老必味淡自然極薄卷者即牡桂也以老大而名焉筒卷者即菌桂也以嫩而易卷古方有筒桂字似菌字後人誤而書之習而成俗至於書傳亦復因循桂心即是削除皮上甲錯取其近裏辛而有味有三種菌桂葉似枇杷葉此乃云葉如柏葉蘇以桂葉無似枇杷葉此陶為深誤剩出此條今據陶注云菌桂葉似柿葉中有縱文三道味甚辛烈皮厚二寸以上者名曰牡桂葉長尺許陶云小桂或言其葉小者肉引經云似柏葉驗之殊不相類不知此言從何所出今按桂有二種惟老皮堅枝無肉薄卷及二三重者或名菌桂或名筒桂其枝嫩枝皮名為肉桂亦云桂枝其老者名木桂亦名大桂得人參麥門冬其草大黃人參調和雷公桐君岐伯黃帝扁鵲俞跗醫和李氏本草云菌桂牡桂心半卷多脆者單名桂入藥最多所用桑出單桂條陶為深誤也今按陳藏器本草云菌桂牡桂心皮氣相類而葉異亦能變化為木者正圓如竹三重者良牡桂皮薄色黃少脂肉氣如木蘭味亦辛此桂則是半卷多脂者此云仙經有三桂以葱涕合和雲母蒸化為木服之則有三種明矣陶又云齊武帝時湘州得樹以植芳林苑中陶隱居雖是梁武帝時人實生自宋孝武建元三年歷齊為諸王侍讀故得見此樹而言也蘇恭但只知有二種亦不能細尋事跡而云陶為深誤何臆斷之甚也抱朴子云桂可以竹瀝合餌之亦可以龜腦和服

之藥性論云桂心君亦名紫桂殺草木毒忌生葱味苦辛無毒主治九種心痛殺三蟲王破血通利月閉治軟脚痺不仁痺痛止腹內冷氣痛不可忍主下治一切風氣補五勞七傷通九竅利關節益精明目暖腰膝破瘀癖癥瘕消瘀血治風痺骨節攣縮續筋骨生肌肉

圖經曰菌桂生交趾山谷牡桂生南海山谷桂生桂陽舊經一種郭璞云南人呼桂厚皮者為木桂蘇恭以謂牡桂即木桂又有桂心用亦別而爾雅但言梫木桂桂及單名桂者是也今嶺表所出則有筒桂肉桂牡桂桂心官桂之名而醫家用之罕有分別者舊說菌桂正圓如竹筒窠字近或傳寫之誤耳或云桂枝之重者則今所謂筒桂也筒桂肉氣如木蘭味亦相類削去皮名桂心今所謂官桂疑是此也桂是半卷多脂者今所謂桂枝疑是此也今觀賓宜韶欽諸州所圖上者種類亦各不同然皆題曰桂無復別名參考舊注謂菌桂葉似柿葉中有三道文肌理緊薄如竹大枝小枝皮俱是筒與今賓州所出者相類牡桂葉狹於箘桂而長數倍其皮半卷多紫與今宜州韶州者相類彼土人謂其皮為木蘭皮肉為桂心此又有黃紫兩色益可驗也桂葉如柏葉而澤黑皮黃心赤今欽州所出者葉窄而細亦恐是其類但不作桂葉形為疑耳皮厚者名木桂即桂是也桂葉名桂為一物亦未可據其木俱高三四丈多生深山蠻洞中人家園圃亦有種者移植於嶺北則氣味殊少辛辣固不堪入藥也三月生花全類茱萸九月結實甚香可用作飲香尤佳

圖經今人多以紫綿花果作髮具二月八月採皮九月採花並陰乾不可近火中品又有天竺桂今亦稀有故但附於此張仲景治傷寒用桂枝湯甲乙經治陰受病發痺內熨方用酒一斗四物咬咀著清酒中綿蓋一斤細白布四丈苔并內酒中置馬矢煴中善封泥令暴乾復漬之以盡其汁每漬時常以手按之令入新瓮瓶中後下二物煮二升去滓棄瓶中其布長六尺為六七巾即用之生絹亦可用之生絹炭之三十徧而止汗出多巾以熨身亦三十徧而止起步內充巾以覺風每熨如此病已矣所謂內熨也又治躄筋急亦以白酒和桂末二大兩白蜜一斤上加紙七重以繩封之每日晡時去紙一重七日開之藥成氣香味美格韻絕高今人多作故并著其法

雷公云凡使勿簇者要熬用如未用即用重密熬絹并紙裹勿令犯風其州土只有薄皮遂成桂心凡使即單擣用色厚者去上麤皮取心中味辛桂只取得五兩取有味厚處生

聖惠方 治風頭痛每欲天陰一兩為末以酒調如膏用傳頂上并額角

又方 治九種心痛効悶用桂心一分為末以淳稍熱服立効

又方 治酒一大盞煎至半盞去滓頓熱酒調下一錢七

又方 治寒疝心痛四肢逆冷全不欲食用桂心二兩去皮濤羅為散不計時候熱酒調下一錢七

又方 治產後惡血衝心痛氣悶欲絶用桂心三兩搗羅為散不計時候用熱酒磨十二丸

外臺秘要 療小兒驚癎等分搗末服如小豆大温水下日三

狗膽汁和丸如櫻桃大不自覺桂末雄雞屎中遺尿

千金方 治中風面目相引偏口喎斜語澁不正即止左喎揄右右喎揄左

黄取汁故布蘸揄病

常用大效

又方 大治失音未桂

著舌下斬讋汁

又方 治卒中惡心痛桂心八分吹咀

以水四升煮取一升分

肘後方 治卒心痛桂心八兩

水四升煮取一升分

又方 治心腹俱脹痛短氣欲死

一升二合煮取八合去

又方 治中風四肢逆冷吐清水宛轉啼呼煮取二升去滓適寒温盡服

又方 治反胃有血痛擣桂節三升

許以苦酒和塗痛上乾復塗

葛氏方 治卒吐血桂屑方寸匕

許服亦療下血大神驗千金方同

又方 治產後腹中癥痛未桂温酒

服方寸匕日二予毋秘録同

孫真人食忌 治中風失音方桂一尺以

水三升煎取一升服取汗

又方 治噉血取桂心擣作

未以水下方寸匕

梅師方 蜀椒閉口者有毒誤食之便氣欲絶或下白沫身體冷急煎桂汁服之多飲冷水二升愈食飲吐藥煎

攪汁服之

又方 治卒外腎腫疼痛方桂心末和水調方寸匕塗之

又方 治產後血泄不禁止餘血心乾薑等分為末空心酒服方寸匕

斗門方 治中風失音用桂心一兩去其麁皮近人身體懷之至兩時辰許為末分為三服每服用水二盞煎取一盞服之差大效聖惠方同

姚和衆方 治小兒癖腫取桂心炙令熟熨之日可四五度

抱朴子云桂可以合葱涕蒸作水亦可以竹瀝合餌之亦可以龜腦和而服之七年能步行水上長生不死又云趙他子服桂二十年足下毛生日行五百里力舉千斤

衍義曰桂大熱素問云辛甘發散為陽故漢張仲景桂枝湯治傷寒表虛皆須此藥是專用辛甘之意也本草第一又云療寒以熱藥故知三種之桂不取菌桂牡桂者蓋此二種性止温而已不可以治風寒之病獨有一字桂本經言甘辛大熱此正合素問辛甘發散為陽之說尤知菌牡二桂不及也然本經止言桂仲景又言桂枝者蓋亦取其枝上皮其木身麄厚處亦不中用諸家之說但各執己見終無證據今又謂之官桂不知緣何而立名慮後世為別物故書之又有桂心此則諸桂之心不若一字桂也

牡桂 味辛温無毒主上氣欬逆結氣喉痹吐吸心痛脅風脅痛温筋通脉止煩出汗利關節補中益氣久服通神輕身不老 生南海山谷 陶隱居云南海郡即是廣州今俗用牡桂狀似桂而扁廣殊薄皮色黃脂肉甚少氣如木蘭味亦類桂不知當是別樹為復猶是桂生有老宿者爾亦所未究 唐本注云爾雅云梫音寑木桂古方亦用木桂或云牡桂即今木桂及單名桂者是也此桂花子與菌桂同惟葉倍長大小枝皮俱名牡桂然大枝皮肉理麄虛如木肉少味薄小及小桂皮肉多半卷中必皺起味辛美一名肉桂一名桂枝一名桂心出融州桂州交州甚良 [illegible]

圖經云葉狹長於菌桂葉一二倍其嫩枝皮半卷多紫肉中皺起肌理虛軟謂之桂枝又名肉桂削去上皮名曰桂心藥中以此為善其厚皮者名曰木桂二月八月採皮日乾之 爾雅釋木云梫一名木桂郭云今南人呼桂厚皮者為木桂桂樹葉似枇杷而大白華華而不著子叢生巖嶺枝葉冬夏常青間無雜木本草謂之牡桂是也 藥性論云牡桂君味甘辛能去冷風疼痛

圖經文具桂條下

經驗後方治大人小兒喫雜果子多腹脹氣急方取肉桂碾末飯丸如菉豆大小兒熟水下五丸大人十丸未瘥再服

菌桂 味辛温無毒主百病養精神和顏色為諸藥先聘通使久服輕身不老面生光華媚好常如童子 生交阯桂林山谷巖崖間無骨正圓如竹立秋採 陶隱居云交阯屬交州桂林屬廣州而蜀都賦云菌桂臨巖崖俗中不見正圓如竹者惟嫩枝破卷成圓猶依桂用非真菌桂也仙經乃有用菌桂云三重者良則明非今桂矣必當

別是一物應更研訪　唐本注

云菌者竹名古方用筒桂者是

敘云三重者良其筒桂亦有一

文肌理緊薄三重卷者葉似柿葉中三道

味極淡薄不如竹大枝小枝皮俱是菌然大枝皮不能重卷

云葉似柿葉而尖狹光淨花白蘂黃四月開五月結實樹高

青黃薄卷若筒亦名筒桂厚硬味薄者名枝桂又不入藥用

三月七月採皮日乾

圖經　文具桂條下

別仙傳范蠡好食桂飲水討葉人世世見之又曰

桂又象林人常服桂皮葉以龜腦和服之

韓終采藥詩闇河之桂實大如粟而食之後天

別說云謹按諸家所說桂之所出及醫家所見用唯之

味重者宜入治藏及下焦藥

本經以菌桂養精神以壯桂

枝桂枝者枝條非身幹也取其輕薄而能發散今又有

一種柳桂乃桂之嫩小枝條皮俱薄而味甘辛熱也

松脂

松脂味苦甘溫無毒主瘟惡瘕頭瘍白禿疥瘡風氣安五藏

除熱胃中伏熱咽乾消渴及風瘫死肌鍊之令白其赤者主

惡瘫久服輕身不老延年一名松膏一名松肪生太山山谷

六月採

松實味苦溫無毒主風瘫寒氣虛羸少氣補不足九月採陰

乾

松葉味苦温主風濕瘡生毛髮安五藏守中不飢延年 臣萬錫錫謹校藥性

松脂生秦山山谷今處處有之其用以通明如薰陸香顆者為勝道人服餌或合茯苓松柏實菊花作丸皆先煉治其法用大釜加水置甑用白茅藉甑底又加黄砂厚寸許可矣然後布松栢松上炊以桑薪湯減即添熟水常令滿倶松脂盡入釜中乃出之投松冷水既凝又蒸如此三過其白如玉然後入藥亦可單服其實及根白皮古亦有果品餘不開堪入藥其花上黄粉名松黄山人及時拂取作湯點之甚佳但不堪停久故鮮用寄遠燒其枝上下承取汁夜名松諸音諸主牛馬瘡皮上緑衣名艾納香用今諸香煙不散方書言松為五粒字當讀為鬣音之誤也言每五鬣為一葉或有兩鬣七鬣者不及鬣上者佳好也中品有毒

聖惠方

絶穀昇仙不食法取松實為膏酒調下三錢日三則不飢渴飲木勿食他物百日身輕日行五百里

又方

不服松葉令人不老身生緑毛輕身益氣久服不已絶穀少細切更研每日食前以酒調下三錢亦可粥汁服之

初服稍難久自便矣

又方

治牙齒歷蟲齒根暗黑用松節燒灰措之神効未用之填

松根白皮主辟穀不飢風虚脚痺疼痛 圖經

數十過白滑則可用其有白也其實不可多得惟葉正是斷穀所宜細切如粟以水及麪煮用膏流出者乃勝於鑿鬲及煮用之

飲服之亦有陰乾燾為屑丸服者人患惡病服此無不差比來苦脚弱人釀松節酒亦皆有脂潤又凌冬不凋取皆有脂潤又凌冬不凋

理為佳物但人多輕忽近易得之爾 唐本注

似蒲黄正爾酒服身輕療病云勝皮葉及脂其子味甚甘

經直云味苦非也松取枝燒其上下承取汁名詣音詣主馬

牛瘡疥佳樹皮緑衣名艾納香燒之其煙團聚青白

可愛也 臣萬錫錫謹校藥性

耳聾牙有蚘孔少許吹之不落蟲自死能貼諸瘡膿血煎膏

生肌止痛神効又有五葉者一叢五葉如釵名五粒

松道家服食絶粒子如巴豆新羅往往進之 日華子

潤心肺下氣除邪煎膏治瘡爛排膿 又云松葉暖無毒灸置

皮味苦温無毒治脚軟骨節風 又云松根白

又方 神仙餌松實用七月取松實過時即落瓣收去木皮擣如膏每服如雞子大日三服服及百日身輕三百日日行五百里絕穀久服亦不飢行五百里絕穀久服月仙渴即服之

外臺秘要 集驗療齲齒取松脂出梅師方同

又方 治惡風疾松脂煉投冷水中二十徧蜜先服二兩飢者二百日差斷鹽及房室

又方 療歷節諸風百節酸痛亦可二十徧用以煉酥三升溫和松脂三

千金方 治脚氣十二風痺不能行服更生散數劑及衆療不得力服此一劑便吸咀以水四石煮取四斗九升以釀五斗米如常法別蒸松葉汁以漬米并饋飯訖釀封頭七日發澄飲之取

又方 治歷節風松葉擣取一升以酒三升浸七日服一合日五六服

又方 治口瘡青粉葉一斤搗取汁和蜜一升煎二沸服一升頭面汗即止

又方 治三年中風不較者松葉一斤細切之以酒一斗煮取三升頭服汗出立差

千金翼 治蟲食齒根齒黑者松脂一兩熟搗巳豆一兩相和熟擣可以松木灰百日神効

梅師方 治耳久聾松脂三兩熟巳豆一兩相和熟擣可丸通過以薄綿裹內耳孔中塞之日一度易

孫尚藥 治脚轉筋疼痛攣急者松節一兩細剉如米粒乳香一錢右件藥用銀石器內慢火炒令焦只留一二分

一方 治齒齲松膠香研細如上先用油塗了蠟未一日便乾頑者三兩度

鬼遺方 治齒齲松葉令勻凡齒

傷寒類要 治天行瘟方切松葉如米酒服方寸匕日三服

抱朴子 趙瞿病癩歷年醫不差乃棄粮弃送於山穴中瞿自怨不幸悲歎涕泣經月有仙人經穴見之哀之具問其詳瞿知其異人也叩頭自陳乞命於是仙人取囊中藥賜之教其服百餘日瘡愈顏色悅肌膚潤仙人再過視之瞿謝活命之恩乞遺其方仙人曰此是松脂彼中極多汝用能服之長服身轉輕力百倍登危涉險終日不困年百歲齒不

辟五年瘟

墮髮不白夜臥常見有光明如鏡

列仙傳 偓佺好食松實能飛行徙走及馬以松子遺堯堯不能服松者精松也

野人閑話 伏虎尊師篇煉松令苦味盡取得後每一斤煉了松脂入四兩蔆苓未每晨水下一刀上即終年不食而復延齡身輕清爽

衍義曰 松黃一如口乾唇焦多煩燥渴昏悶不爽松莞川芎當歸石膏蒲黃五物等同為末每服二錢水三合紅花三棱同煎七分去滓與栢子薄與栢子仁同治虛損

高鄘軍槐實

槐實味苦酸鹹寒無毒主五內邪氣熱止涎喘補絕傷五痔久瘡婦人乳瘕子藏急痛以七月七日取之搗取汁銅器盛之日煎令可作丸大如鼠屎內窾中三易乃愈又墮胎久服明目益氣頭不白延年

枝主洗瘡及陰囊下濕痒

皮主爛瘡

根主喉痺寒熱生河南平澤可作神燭 景天為之使 陽隱居 為好十月巳日採之新盆盛之令腦蒲髮不白而長生今處處有此云七月取其子未堅故擣絞取汁唇木生云別錄云八月斷槐大枝使生數寸擣耳味苦平無毒主五痔心痛婦人陰中瘡痛槐樹蘭也當取堅如桑耳者枝炮熨主蝎蟄毒 日華子 槐葉而黑宇宮槐葉畫羅宵氣稱曰樣槐一也大葉而黑名守宮槐聶名檬不爾即名槐又曰槐葉畫合夜開者別名守宮槐聶合治大熱誰痺皮黃汁淋陰囊腫痛又云槐白皮味苦無毒主口齒風痺膿血以煎漿水煮含之又煎淋洛男子 藥性論 云槐子臣主

陰乾如種貴服味一如茶明目除熱淚頭腦心脅間熱風頭閉風眩欬逆上者花瞿染黃子生房七月五痔并一切惡瘡婦人產門癢痛及瘍火瘡煎膏止痛長肉

圖經曰槐實生河南平澤今處處有之其木有極高大者葉如槐而青綠者但謂之槐其功用不言有別四月七月採嫩實擣取汁作煎子名守言槐葉細而青綠者但謂之槐其功用不言有別四月七月採嫩實擣取汁作煎子五月開花六月結實七月八月採老實入藥皮根採無時今醫家用槐者最多春採嫩枝取蘗以塗癬取花之陳久者為黑丑以治下血折取嫩房角作湯以當茗主頭風明目補腦煮白皮汁以治口齒及下血水吞黑子以療白髮木上耳取未服方寸匕治大便血及五痔脫肚等皆常用有殊效者鵲明目使髮不落方十月上巳日取槐子去皮內新甕中封口三七日初服一枚再二枚至十日十枚漸增始大良劉禹錫傳信方著破州王及郎中槐湯炙痔法以槐枝濃煎湯先洗痔便以艾灸其上七壯以知為度及日亮西川安撫使判官乘驟入駱谷及宿有痔疾因此大作其狀如胡瓜貫於腸頭熟如嬰兒至驛僵仆主鄭重云川病用其漬煮即差及命所便作槐湯洗熱

至三五壯愈覺道熱氣入腸後穢一時至痛楚鴻後遂失卻

雷公云使用銅鉢盛之一云用烏牛乳浸一宿蒸過用良

食療主邪氣產難絕產胞衣煮汁飲亦可食主癮疹療瘕心痛乘槐側出發和水服若不止飲熱水一升蝟蟲出

千金方療脫赤眼取槐木枝如馬鞭大長二尺作三段齊頭使童子一人以其柔研之至

又方療痔七月七日採槐子熟擣絞取汁內銅器中綿盖着高門上曝之二十日已上煎成取鼠糞大內穀道中日三亦主瘡百種瘡

古方明目黑髮槐子於牛膽中漬陰乾百日食後

又方吞一枝十日身輕三十日白髮黑百日內通神

又方治九種心痛當太歲上取新生槐枝一握去兩頭水三大升煎取一升頭服

又方治鼻氣窒塞以水五升煮槐葉取三升下葱豉調和再煎飲

千金翼治嬰孺瘡槐白皮醋浸半日洗之及諸惡瘡

肘後方 治內瘻用槐白皮擣丸綿裹內下部中得効

又方 療腸痔每大便常下血槐木耳取末飲服方寸匕日三服

百一方 治中風身直不得屈伸以酒或水六升煮取二升去滓適寒温稍服之

經驗方 治野雞痔用槐柳枝煎洗痔上便以艾灸之七壯

又方 治下血槐花荊芥穗等分為末酒調下一錢匕

梅師方 治崩中或赤白不問年月遠近取槐枝燒灰食前酒下方寸匕

又方 治痔有蟲咬穀道痒或下膿血多取槐白皮濃煮汁安盆坐湯之虛其穀道令更煖良久欲大便當蟲出不過三度即愈加用末綿裹內下部

食醫心鏡 治野雞痔下血腸風脫肛方嫩槐葉一斤煮如法煎取葉攥作丸如茶法煎呷之

廣利方 治妊娠難產令易方水吞槐子七枚即出

廣濟方 療牙齒疼痛取槐樹白皮煮去滓用鹽少許漱寒温不見日嚼一大握水二升煎取一升洗之三五偏冷復煖若漱遠恐衝風即

必効方 療陰瘡及濕痒槐槐枇面含之日二易之

傷寒類要 八熱心悶昔經子燒末酒服方寸匕

子母秘録 日月赤足而欲走手把物不離手方中七

產寶 療崩中不止不問年月遠近取槐耳燒作灰為末酒服方寸匕

太清草木方 槐者虛星之精以十月上巳日採子服之去百病長生通神

衍義曰 槐實止言實今當分為二實本出夾中子大如豆堅而紫色者實也今本條不載出夾膜夾中子蓋其用各別皆隨專風熱

**槐膠主一切風化涎治肝藏風筋脈抽掣及急風口噤柔或四肢不收頑痺或毒風周身如蟲行或破傷風口眼偏斜腰脊強硬任作湯散丸煎雜諸藥用之亦可水煮和諸藥為丸及

作湯下藥新定

梔花味苦平無毒治五時心痛眼赤殺藏蟲及熱治皮膚風弄腸風瀉血赤白癇並炒服葉平無毒煎湯治小兒驚癇壯熱疥癬及丁腫皮葉同用新補見日華子

圖經 宋 日華子下

簡要濟衆 治鼻衄不止搗梔花塗之又搗葉作疾餅食甚效温酒服二錢匕

衍義曰梔花今染家亦用收時拣其未開花煮一沸漉之套染淺紅色更鮮明為餅藥色更鮮明熟漉血甚佳不可過劑

苦州枸杞

枸杞味苦寒根大寒子微寒主五內邪氣熱中消渴周痺風濕下肢膚氣客熱利大小腸久服堅筋骨強陰益精補髓輕身不老耐寒暑一名杞根一名地骨一名西王母杖生常山平谷及諸丘陵陰岸冬採根春夏採葉秋採莖實陰乾

陶隱居 名曰羊乳一名却暑一名仙人杖一名地輔

蘇頌 圖經 羅摩枸杞此言其補益精氣強盛陰道也蘇摩一名苦杞根一名地厚大作藤生牆之有白汁人家多種之可生啖亦蒸煮食也枸杞根實為服食家所說甚美仙人之杖遠有旨乎一名枸檵郭云今枸杞也詩四牡騑騑周道倭遲出堂邑而石頭烽火樓下最多葉及子服之輕身益氣爾雅朴樕云樕槚臣子葉同說味甘平或名地骨或名却老或名地輔陶云安神令人長壽葉和羊肉作羹益人甚除風明目若渴可煮作飲代茶飲之白者良與乳酪相惡發熱諸毒瘡癰悉宜用之能補益精髓不足易顏色變白明目久服堅筋骨輕身不老耐寒暑其子酒浸蒸曝千遍為末入藥亦佳

寇宗奭 衍義 枸杞子補內傷大勞虛及堅筋骨強陰莖老耐寒暑一名杞根一名地骨

云集于苞杞陸機云一名地骨春生作羹甜微苦其蓋似薯子秋熟正赤云家紫一名托盧或名却老或名地輔臣子葉同說味甘平目安神令人長壽葉和羊肉作羹益人甚除風明目若渴可煮作飲代茶飲之白者良與乳酪相惡發熱諸毒瘡癰悉宜用之能補益精髓不足易顏色變白明目久服堅筋骨輕身不老耐寒暑其子酒浸蒸曝千遍為末入藥亦佳取葉土蟲窠子曝乾為末入藥之

大宛有似其物蒜二及月花上杞赤一杞淡五圖散周中地
者細刺然于杞地種畢上入巳法密多攜其天經胥烈今飲昔中
甘辨溲溏七冬物相等于月治正華若耶根作曰腫節圖中為
入耳號疏月日蒜類于採上服月及杞葉名最葉物即問名為
葉或亦有入蒜一料汁根西之土于一云地六知杞物風
污云治利月色蒜實南十治五寅服名今唱月石生杞清云血
神淡江有熟赤入形唐一服月梯之地物春七指常也熟地陽一
良流甘公味主蒜月之上根軒為月杞百月華山春仙春人

傳言名利杞若下根其五月根月益生二
蓬大灰必下蒜品無功治上根作小秋紅
葉為物此赤必下蒜品無功治上葉作小秋紅
服別杞為甘云腫者等之採月治南如四室化食胰
南虎謂別而甘溲病人右十末之中甘云冬便呼岸
忙不之麦蒜別而甘溲病人右十末之中甘云冬便呼岸
杜然地一下宝蒜注也并月治三記甘集脉結為今
名中圖物相蒜注也傳杞上服月者葉于根紅井處
狗今腫消事不李圖謂實玄之上西似為謹貴葉、
杞物疗談宁圖宿而物根治七辰河井杞根其有
圖杞相而注去之有杞葉服月採女子陸爾蒜葉之
著杞娟二云詩云刺蜴葉之上葉于秋蒜雅長幹春
有用物濕問于者物作十中四服氣曉云衣高生
之术物女似物蒜前一药月物正云物蒜二苗

法煮汁飲之益陽事能去眼中風痒赤瞤瘡葉汁點之取洗去泥和麪拌作飲煮熟吞之去腎氣尤良又益精髓

聖惠方 枸杞子酒主補虛長肌肉益顏色肥健人能去風濕痺飲之初以三合為始後即任性飲之外基秘要同

千金方 治齒疼煮枸杞汁含之

又方 治肝虛或當風眼淚等雜病方枸杞子取肥者一斗破內絹袋置罐中以酒一斗浸訖密封勿泄氣三七日每旦飲之任性勿醉

又方 治虛勞客熱用枸杞根未調服有固疾人不得輒人不得防毒

肘後方 治大赫瘡此惠急宜防毒氣入心腹飲枸杞汁至一盞

又方 療目熱生膚赤白膜瘡枸杞子汁洗日五七度

又方 犬食馬肉生狂方忽鼻頭發狂便宜枸杞子汁煮粥飼之即不狂若不肯食藥塩塗其鼻既瓶之則欲食矣

經驗方 金髓煎枸杞子不計多少逐日旋採摘紅熟者去蔕子揀令潔淨便以無灰酒於淨器浸之酒過筒蓋

酒交以兩月為限用蠟綿封閉緊密無令透氣候日數足啓出於新竹器內盛貯旋於沙盆中研令爛細然後以細布濾過候研癟皆盡去滓不用即并前漬藥酒及癟過藥汁攪勻量銀鍋內多少升斗作畨次想慢火熬成膏切須不住手用物攪恐粘底不勻候稀稠得所傾出用淨瓶器盛之勿令泄氣每早辰溫酒下二大匙頭夜卧服之百日中身輕氣壯積年不廢可以羽化

經驗後方 治五勞七傷庶事衰弱枸杞葉半斤切粳米二合以豉汁中相和煮作粥以五味末葱白等調和食之

又方 變白輕身枸杞子二升十月壬癸日採；時面東摘生地黃汁三升以好酒二升於甕餅內浸二十一日取出研令地黃汁同浸攪之却以紙三重封其頭了更浸候至立春前三日開瓶逐日空心飲一盃至立春後髭鬢却黑補益精氣服之耐老輕身無比勿食蕪荑葱

孫真人備急方 治滿口齒有血枸杞根為末煎湯敷後喫又治赤眼痒痛神効

兵部手集 療眼暴赤痒痛枸杞汁點眼立驗

沈存中方 陝西枸杞長一二丈其圍數寸無刺根皮如厚朴異於諸處生子如櫻桃全少核暴乾如餅極爛有味

外臺秘要療瞎暴天行腫痒地骨皮三升水三斗煮取三
升絞去滓更內鹽一
兩煎取二升傳目或加乾薑
二
兩

治疽凡患癰疽惡瘡出膿血不止者取地骨皮不拘多少淨洗先刮上面麤皮留之更刮取細白穰取麤皮同地骨一處煎湯林洗瘡令膿血淨以細穰貼之立効有一朝士鹿胷間病疽經歲不差人教取地骨皮依傳貼之初淋洗出血一二升其家人輩懼欲止病者曰疽似火寬更淋之再用五升許血漸淡遂止以細穰貼之次日結痂遂愈

別說云謹按枸杞亦非甘物用根去上淨麤皮一重近白者一

故使人疑然此物本草所載及諸文所說名極多用甚衆花枝有傳四時取採不絕枝無刺者真枸杞也此說可為

行義曰枸杞當用梗皮地骨當用根皮枸杞子當用其紅實是一物有三用其皮寒根大寒子微寒亦三等此正是孟子所謂性由杞柳之杞後人徒勞分別又為之枸棘茲強生名耳凡杞未有無棘者雖大至有成架然亦有棘但此物小則多刺大則少刺還如用其子直為補腎藥是胃未考究經意當更量其虛實皆一也今人多

用之

州柏實

密州側柏

柏實味甘平無毒主驚悸安五藏益氣除風濕痺療恍惚虛損吸吸歷節腰中重痛益血止汗久服令人潤澤美色耳目聰明不飢不老輕身延年

柏葉味苦微溫無毒主吐血衄血唾血崩血痢血崩中赤白輕身益氣令人耐寒暑去濕痺止肌四時各依方面採陰乾

栢白皮主火灼爛瘡長毛髮牡蠣及桂瓜子爲之使畏菊花
葉實亦爲服餌所重服別有法栢處々有當以太山爲桂
華蹄諸石及麪麴陶隱居云栢
惡麪人有以釀酒無妨恐酒味相和異單用也
子惟出陝州宜州爲勝太山
本草經云栢實生泰山谷今處處有之而乾州者最佳三月
圖經曰栢實生泰山谷今處處有之而乾州者最佳三月
開花九月結子候成熟收採蒸暴乾舂擸取熟仁子
用其葉名側栢密州出者尤佳雖與他栢相類而其葉皆側
同而生功効殊別採無時張揖廣雅云栢葉微炙用
一主之青栢葉一把乾姜三片水二升煮取一升去滓別絞
一升去滓別絞馬通汁一升和合煎取一升綿濾一服盡
之山東醫工亦多用側栢然云性寒止痛其方採葉入白中
湯火燒人及小兒傷湯火燒
濕瘡合搥如泥冷水調作膏以治大人及小兒傷湯火燒
熱傷栢傷處用黍子繫定三兩日瘡當欲仍滅藏又取葉
乾漏末臭川黃連二味同煎為
又方栢實生泰山谷今處處有之而乾州者最佳三月
圖經曰開花九月結子候成熟收採蒸暴乾舂擸取熟仁子
用其葉名側栢密州出者尤佳雖與他栢相類而其葉皆側
同而生功効殊別採無時張揖廣雅云栢葉微炙用
一主之青栢葉一把乾姜三片水二升煮取一升去滓別絞
一升去滓別絞馬通汁一升和合煎取一升綿濾一服盡
之山東醫工亦多用側栢然云性寒止痛其方採葉入白中
湯火燒人及小兒傷湯火燒
濕瘡合搥如泥冷水調作膏以治大人及小兒傷湯火燒
熱傷栢傷處用黍子繫定三兩日瘡當欲仍滅藏又取葉
乾漏末臭川黃連二味同煎為

太腹下血赤痢已成膿血者治之有效
龍骨赤石脂禹餘糧各等分為末每服方寸匕日三服
今俗用謂之三龍散
孔明傳載黑神丸治人多傷寒後以作藥其
所栢葉人多傷寒後以作藥其
人參栢葉九節者
日華子云栢葉并叢栢葉并叢栢葉
乾者治之有效
雷公云凡使勿用側栢葉并叢栢葉其有子圓葉成
水用蕪盛栢子仁著火綫綴
度無盡三兩栢子仁用酒五
又云凡使勿用側栢葉并叢栢葉其有子圓葉成
片如大片雲母葉上有黃毛者花栢葉其
搗濃葉成掌無子叢栢葉其
一斤先揀去兩畔并心枝了用糯
汁一伏時卻用黃精自然汁二斤十二兩
盡然後用之如修事一
聖惠方治大風疾今眉鬚俱用杜中
羅為末以水調下一錢上
又方治大風疾今眉鬚俱用杜中
羅為末以水調下一錢上
又方治憂恚喘血頰滿水漿不下痛用栢葉
羅為散不計時候以漿水調下二錢上
又方小兒臌脹啼驚癇瘛不乳食大便青
白色用栢子仁未溫水調下一錢

經驗後方 治霍亂轉筋先以煖物裹脚然後以栢樹木細剉煑湯淋之

又方 治小兒洞下痢煑栢葉服之

梅師方 治中熱油及火燒瘡以栢白皮猪脂煎塗瘡上罨瘥方同

孫真人食忌 生髮方取側栢葉陰乾作末和油塗之

孫真人枕中記 採松栢法常以三月四月採新生松葉可長三四寸并花蘂取陰乾細擣為末其栢葉取深山巖谷中採當年新生者一百長三二寸者陰乾細擣為末用白蜜丸如小豆大常以月旦一十五日日未出時燒香東向手持藥八十一丸以酒下服一年延十年命服二年延二十年命欲得長服肉加大麻巨勝欲心力壯健若加茯苓人參此藥除百病益元氣添五藏六腑清明耳目強壯不衰老延年益壽神驗用七月七日露水丸之更佳服時乃呪曰神仙真藥體合自然服藥入腹天地同年呪當服藥斷諸雜肉五辛最切忌慎之

姚氏方 治鼠瘻腫核痛未成膿以栢葉傅著腫上熬鹽著腫上熨令熱氣下即消

抱朴子 漢成帝時獵者於終南山見一人無衣服身皆生黑毛跳坑越澗如飛乃密伺其所在合圍取得乃是一婦人問之言我是秦之宮人聞東賊至秦王出降驚走入山飢無所食將欲餓死有一老公教我喫松栢葉實初時苦澀後稍便之遂不復飢冬不寒夏不熱此女是秦人至成帝時三百餘載也

列仙傳 赤松子好食栢實齒落更生

別說云 謹按陶隱居説栢忌取冢墓上者今云出乾州者最佳則乾州栢葉茂大者皆是乾陵所出他處皆無大者但取其州土所宜子實氣味豐美可也乾陵之栢異於他處其本末有無文理者而其文多為菩薩雲氣人物鳥獸狀極分明可觀有盜得一株徑尺者可值萬錢關陝人家多以為貴宜其子實最佳也又以其枝節脂油為膏傅惡瘡久不差有蟲者牛馬畜產有瘡疥名為重病以傳之三五次無不愈也

衍義曰 栢取諸以療馬瘍疥今不見用松諸者老人虛秘栢子仁大麻子仁松子仁等分同研溶白蠟丸桐子大以少黃丹湯服二三十丸食前余官陝西每登高望之雖千萬株皆一一西指蓋此木為至堅之木不畏霜雪得木之正氣他木不逮也所以受金之正氣所制故一一向之

茯苓味甘平無毒主胃膈逆氣憂慮驚邪恐悸心下結痛寒熱煩滿咳逆口焦舌乾利小便止消渴好睡大腹淡疝膿瘕水腫淋結開胸調藏氣伐腎邪長陰益氣力倍神守中久服安魂養神不飢延年一名伏菟其有抱根一名茯神其赤者名赤茯苓其白者名白茯苓其黑者名茯神其茯苓皮名茯苓皮其赤白者名赤白茯苓皮

○茯神平主辟不祥療風眩風虛五勞口乾止驚悸多恚怒善忘開心益智安魂魄養精神生太山山谷大松下二月八月採陰乾

弘景曰此即是茯苓中抱木者也今人皆用茯苓不復別取茯神也

陶隱居云按藥無馬問或是馬蓼蘩聲相近故也今出蘭州彼土人乃假研松作之形多小虛赤不佳自然成者大如三四升器外皮黑細皺內堅白形如鳥獸龜鼈者良作丸散者皆先煮之兩三佛乃切暴乾白色者補食亦為至要云其通神而致靈和顏而悅明腸而開心調榮而理胃上品仙藥也計應三十許年而色理無異朽蛀掘地得昔人所理一塊以對庶者為茯神是其次茯苓全不朽矣其有衝松根斜明其真不佳自然成者大如三四升器後結一塊也仙方惟云茯苓而無嫌無嫌唐本注云季氏本草云馬乃為茯使無名馬問者問爾陶不悟云是馬蓼謬矣字草書似刀字寫人不識訛為問今太山亦有茯苓白實而理小而不復採用第一出華山形極龐大雍州南山亦有不如華山者今注馬問當是馬蘭二注皆恐非也臣禹錫等謹按蜀本圖經云生枯松樹下形塊無定以似人龜鳥形者佳今所在有大松處皆有惟華山最多注云茯苓千歲松脂也蕓蓼生其下有無根一名女蘿也無注南子云下有茯苓上有菟絲術云茯苓者松脂入地千歲為茯苓望松樹旁者下有之

志云茯神松汁祈作勝茯苓或曰松根茯苓貫著之生朱提
漢陽縣 藥性論 云茯苓臣忌米醋能開胃止嘔逆善安心神
主肺痿痰壅治小兒驚癇療心腹脹滿婦人熱淋赤者破結
氣 又云 茯神君味甘無毒主驚癇安神定志補勞乏主心下
急痛堅滿人虛而小腸不利加而用之其心名黃松節偏治
中偏風口面喎斜毒風筋攣不語心神驚掣虛而健忘 日華
子 云茯苓補五勞七傷安胎暖腰
膝開心益智止健忘忌醋及酸物
圖經曰 茯苓生泰山山谷今泰華嵩山皆有之出大松下附
根而生無苗葉花實作塊如拳在土底大者至數斤
似人形龜形者佳皮黑肉有赤白二種或云是多年松脂流
入土中變成或云假松氣於本根上生今東人採之法山中
古松久為人斬伐者其枯折槎枿枝葉不復上生者謂之茯
苓撥見之即於四面丈餘地內以鐵頭錐刺地如有茯苓則
錐固不可拔於是掘土取之其撥大者茯苓亦大皆自作塊
不附著根上其抱根而輕虛者為茯神然則假氣而生者其
說勝矣二月八月採者良皆陰乾史記龜策傳云茯靈在菟
絲之下狀如飛鳥之形新雨已天清靜無風以夜稍或作燒
菟絲去之即篝燭此地篝音溝籠也蓋然大而籠罩其上也
火滅即記其處以新布四丈環置之明乃掘取入地四尺至
七尺得矣此類今固不聞有之神仙方多單餌之其法取白
茯苓五斤去黑皮擣篩以熟絹囊盛於三斗米下蒸之米熟
即止暴乾又蒸如此三過乃取牛乳二斗和合著銅器中微
火煮如膏收之每食以竹刀割取隨性任飽服之則不飢如

先煑葵菜汁飲之任[illegible]
[illegible]山之陽者非美山之陰者[illegible]苦[illegible]
以湯淋去苦味淋之不止其汁當甜乃[illegible]酒
蜜三升相和內末其中并置大瓮攪之[illegible]封之勿洩氣冬
五十日夏二十五日飛自浮出酒[illegible]甘[illegible]極甘美以
作餅大如手掌空室中陰乾色赤[illegible]食一枚酒送之
然日不須食自飽此名神仙度世之[illegible]服[illegible]去以合白菊
花或合桂心或合朮丸散自任皆可[illegible]勝或云茯
苓中有筋最能損目若又服者當杵[illegible]飛澄熟援
去盡赤浮方可服若合他藥則不須爾凡藥有茯苓皆忌米
醋舊說琥珀是千年茯苓所化一名江珠張茂先云今益州
來昌出琥珀而無茯苓又云燒蜂窠所作三說張皆不能辨
按南蠻地志云林邑多琥珀云是松脂所化又云楓脂為之
彼人亦不復知地中有琥珀則傍無草木入土淺者五尺深
者或入九尺大者如斛削去皮初如桃膠久乃堅凝
其方人以為枕然古今相傳是松類故附於茯苓耳

雷公云

凡採得後去皮心神了擣令細於水盆中攪令濁浮者去之是茯苓筋若誤服之令人眼中童子并黑睛點小兼盲目甚記之

聖惠方

治面䵟皯及產婦黑䵟如雀卵色用白茯苓末蜜和傅之

肘後方

姚氏療野茯苓末白蜜和塗上滿七日即愈

經驗後方 養老延年服茯苓方華山挺子茯苓研削如棗許大令四方有角安於新甆瓶內以好酒浸以一重紙封其頭後一百日開其色當如餳糖可日食一塊百日後肌體潤澤服一年後可夜視物久久食之腸化為筋可延年耐老面若童顏

孫真人枕中記 茯苓久服百日百病除二百日夜晝不眠二年後役使鬼神四年後玉女來侍

抱朴子 任子季服茯苓十八年玉女從之能隱能彰不食穀灸瘢滅面生光玉澤

宋王微 茯苓讃皓苓下居彤紛上薈中狀雞鳧具容龜蔡神侔少司保延幼艾終志不移柔紅可佩之

神仙服茯苓法 白茯苓去皮酒浸十五日漉出為散每服三錢水調下日三

衍義曰 茯苓乃樵斫訖多年松根之氣所生此蓋根之氣味噎鬱未絕故為是物然亦由土地所宜與不宜其津氣盛者方發泄於外結為茯苓故不抱根而成物既離其本體則有茯之義茯神者其根但有津氣而不甚盛故止能伏結於本根既不離其本故曰茯神此物行水之功多益心脾不可闕也或曰松既樵矣而根尚能生物乎答曰如馬勃菌五芝木耳石耳之類皆生於枯木石糞土之上精英未淪安得不為物也且上有兔絲下有茯苓之說甚為輕信

味甘平無毒主安五藏定魂魄殺精魅邪鬼消瘀血通五淋生永昌

陶隱居云舊說云是松脂淪入地千年所化燒之亦作松氣俗有琥珀中有一蜂形色如生博物志又云燒蜂窠所作恐非實此或當蜂為松脂所黏因墜地淪沒耳亦有煮毈雞子及青魚枕作者並非真惟以拾芥為驗俗中多帶之辟惡刮屑服療瘀血至驗仙經無正用惟曲晨丹所須以赤者為勝今並從外國來而出茯苓處並無不知出琥珀處復有茯苓以否

今按陳藏器本草云琥珀止血生肌合金瘡和大黃鼈甲作散酒下方寸匕下惡血婦人腹內血盡即止宋高祖時寧州貢琥珀枕碎以賜軍士傳金瘡漢書云出罽賓國初如桃膠凝乃成焉

臣禹錫等謹按蜀本注云又云一說楓脂入地千年變為琥珀乃知非因燒蜂窠成也蜂窠既燒安有蜂形在其間不徒自松脂變也松脂袪變安有楓脂所成若覆其事而言則琥珀之為物乃是木脂入地千年著所化也但餘本不及楓松有脂而多經年歲故不自其下極得也

藥性論云琥珀君治百邪產後血瘵痛

日華子云療蠱毒壯心明目摩翳止心痛癲邪破結癥

圖經曰文具茯苓條下

海藥是海松木中津液初若桃膠後乃凝結溫主止血生肌鎮心明目破癥瘕氣塊產後血暈悶絕兒枕痛等並宜餌此方琥珀一兩鼈甲一兩京三稜一兩延胡索半兩沒藥半兩大黃六銖熬搗為散空心酒服三錢七日再服校量神驗莫及產後即減大黃凡驗真假於手心熟磨吸得芥為真復有南珀不及舶上來者

雷公云凡用紅松脂石珀水珀花珀物象珀瑿珀琥珀紅松脂如琥珀只是濁太脆文橫水珀多無紅色如淺黃多麄皮皺石珀如石重色黃不堪用花珀文似新馬尾松心文一路赤一路黃物象珀其內自有物命動此使有神妙瑿珀是衆珀之長故號曰瑿珀琥珀如血色熟於布上拭吸得芥子者真也夫入藥中用水調側柏子末安於甆鍋子中安琥珀於末中了下火煮從巳至申別有異光別擣如粉重篩用

外臺秘要[illegible]中六七日不出琥珀珠一物貫串至哽所又復推以牽引出矣若水[illegible]滑

又方[illegible]物所頓笮得瘀血刮琥珀[illegible]黃二三七服日四五服差

鬼遺方[illegible]閉絕無所識琥珀[illegible]便調一錢三服差

通典云[illegible]象郡林邑縣多出琥珀松脂淪入[illegible]不深八九尺大如斛削去皮成焉初

別說云[illegible]茯苓琥珀雖小有異同皆云松脂入[illegible]茯苓處未嘗有琥珀採茯苓時當[illegible]根服不朽所之津潤如生者則削所[illegible]不[illegible]其根不死津液下流故生茯苓[illegible]

茯神[illegible]心貫通津液也若琥珀即是松樹枝節榮盛時為炎日所灼流脂出樹身外日漸厚大因墮土中津潤歲久乃為土所[illegible]沮而光瑩之體獨存今可拾芥尚有粘性故其中有蟲蟻之類乃未入土時所粘著者二物皆自松出而所稟各異茯苓生成於陰者也琥珀生於陽而成於陰故皆治榮而安心利水也

衍義曰琥珀今西戎亦有之其色差淡而明澈南方者色深而重濁彼土人多碾為物形其謂千年茯苓所化則其間有沾著蜂蟻宛然完具者是極不然也地理志云林邑多琥珀實松脂所化耳此說為勝但土地有所宜不宜故有能化有不能化者張茂先又為燒蜂窠所作不知得於何處以手摩熱可以拾芥餘如經

瑿烏兮切味甘平無毒古來相傳云松脂千年為茯苓又千年為琥珀又千年為瑿然二物燒之皆有松氣為用與琥珀同補心安神破血尤善狀似玄玉而輕出西戎而有茯苓處見無此物今西州南三百里磧中得者大則方尺黑潤而輕燒之腥臭高昌人名為木瑿謂玄玉為石瑿洪州土石間得者燒作松氣破血生肌與琥珀同見風拆破不堪為器量此

二種及琥珀或非松脂所為也有此差舛今略論也 新見唐本

陳藏器 蘇恭於琥珀注後出墜功狀按墜本功外小兒帶之辟惡磨滴日醫赤腄等

太平廣記 梁四公千傳曰交河之間平磧中掘深一丈下有墜琥珀黑逾純漆或大如車輪求服之攻婦人小腸癥瘕諸疾

秦州榆皮

榆皮味甘平無毒主大小便不通利水道除邪氣腸胃邪熱氣消腫性滑利久服輕身不飢其實尤良療小兒癇小便不利傷熱花主小兒癇小便不利傷熱一名零榆生潁川山谷二月採皮取白暴乾八月採實並勿令中濕濕則傷人 陶云其皮刮除上赤皮亦可臨時用之性至滑利初生嫩者以作羹食令人多睡愁公所謂榆皮服之即令人不飢今人瞋也斷穀乃至人不飢并澄八月採實恐本經誤也 唐本注云榆三月實熟時採之今人稱榆莢矣今陳藏器本草云榆實作醬以蘸筆參差以陳者良大榆皮入用 今按

臣禹錫等謹按爾雅云榆白埋異而剌榆之剌如棘詩云山有樞是也 藥性論云榆白皮滑能主利五淋治不眠療齁取白皮陰乾末之 食療云生皮主暴赤腫以皮三兩搗和三年醋滓封之日七易亦治女人妒乳腫服丹石人採葉主服一兩頓盡下氣令人能食消心腹間惡氣卒心痛之良能助肺殺諸蟲白皮通經脈誕傳癬

圖經曰榆皮生潁川山谷今處處有之三月生莢仁古人採以為糜羹今無復食者惟用陳老實者醬耳然榆之類有十數種葉皆相似但皮莢皮白色剝之刮去上黑皮取木理有異耳白榆先生葉即末無酒調塗之刺入葉令孕婦骨刺即拓則出古人所謂榆白皮者云美於白皮亦可用多用之小兒禿髮不生瘡末無酒調塗之刺入葉令孕婦骨刺即拓則出古人所謂榆白皮者云美於白皮亦可用多用之小兒禿髮不生瘡爾雅所謂榎莖詩唐風云上有榎是也二月採皮取白暴乾四月採實並勿令中濕榆皮亦歲農人食之以當粮不損人

食療生榆皮利小便主石淋又取葉煮食之時復食一頓良良高昌人多壽白皮為末和粟麵食之甚美今人能食仙家長服服丹石人亦食之取利關節故也又榆仁可作醬食之亦甚香美有少辛味能助肺氣致諸蟲下氣令大能食又心腹間惡氣內消之美并主小兒癇小便不利

外臺秘要治渴小便利非濕以水一斗煮取五升去黑皮名油腫其色多紅不可雖子白皮亦

千金方五色丹毒以榆白皮末以雞子白塗之

千金髓火灼爛瘡榆白皮熟嚼封之差

備急方療身躰泰腫滿榆名少雖木作粥食

又方小兒白秃髮不生榆白皮燒令黑研取末以猪脂和塗之亦出

楊氏產乳療急生榆皮以好酒煮取汁一服三合日三服

稽叔夜養生論云榆令人嫉

別說云謹按榆白皮結乾為末婦人妊娠臨月日三服方寸匕令產極易產下兒身尚青塗之信其驗也又濕搗治如粉用粘瓦極有力亦以石為碓舂每用此以

衍義曰榆皮今初春先生夫者是去上皺澁乾結者將中間歉處對乾堪苗葉當時采為羹菜甚美貯亦用以豐年人缺食鄉民多食之

酸棗味酸平無毒主心腹寒熱邪結氣聚四肢酸痛濕痺煩心不得眠膚上下痛血轉久洩虛汗煩渴補中益肝氣堅筋骨助陰氣令人肥健又服之安五藏輕身延年生河東川澤八月採實陰乾四十日成惡實陰乾出東山間云即是山棗樹子而味酸食之使不得眠又云即小小棗而味極酸東間亦有之正如麻黃發汗根節止汗也此乃棘實更非酸棗味酸者全非也酸棗小而圓其核中仁亦圓大棗實無此形狀大棗中木酸者是木短而大棗仁大而長不類也圖經云今河東及淮南以其木為車軸及屋柱等木甚細理而硬所在有之八月採實自

其實今醫以為酸棗大誤得眠蓋其子肉味酸食之使不正如麻黃發汗根節止汗也此乃棘實更非酸棗味酸者全非也酸棗小而圓其核中仁亦圓大棗實無此形狀大棗中木酸者是木短而大棗仁大而長不類也圖經云今出東山間云即是山棗樹子而味極酸東間亦有之即小小棗而味極酸者是木短而大棗仁大而長不類也圖經云今河東及淮南以其木為車軸及屋柱等木甚細理而硬所在有之八月採實自

注陶云棗樹高數丈經圍一二尺木理細而堅不易得今南方車轂多用之蘇恭云棗不思睡核中仁能令人不得眠是大棗也楊若圖經更非此乃棘實更非酸棗味酸者全非也酸棗小而圓其核中仁亦圓大棗仁大而長不類也圖經云今河東及淮南以其木為車軸及屋柱等木甚細理而硬所在有之八月採實自

大明曰云棗仁主筋骨風炒末作湯服之名酸棗云棗仁酸棗仁主筋骨風炒末作湯服之此即真棗仁酸棗既是棗中之酸更無他異

發明曰云棗仁主筋骨風炒末作湯服之名酸棗云棗仁酸棗既是棗中之酸更無他異

論云酸棗仁主筋骨風炒末作湯服之名酸棗云棗仁酸棗既是棗中之酸更無他異

又云山棗樹如棘子而多刺葉細長色赤如丹此醫之所不識其實今棗中酸者未必即酸棘子為之又云即小小棗而味極酸東間亦有之即小小棗而味極酸者是木短而大棗仁大而長不類也圖經云今河東及淮南以其木為車軸及屋柱等木甚細理而硬所在有之八月採實自

又云山棗樹如棘子而多刺葉細長色赤如丹此醫之所不識其實今棗中酸者未必即酸棘子為之又云即小小棗而味極酸東間亦有之即小小棗而味極酸者是木短而大棗仁大而長不類也圖經云今河東及淮南以其木為車軸及屋柱等木甚細理而硬所在有之八月採實自

皆棘子為之又云即小小棗而味極酸東間亦有之即小小棗而味極酸者是木短而大棗仁大而長不類也圖經云今河東及淮南以其木為車軸及屋柱等木甚細理而硬所在有之八月採實自

酸滑好食山人以當果五代史後唐列石藥讓云酸棗仁治痛下氣痛

睡多生使不得睡炒熟日華子云酸棗仁治痛下氣痛

圖經曰酸棗生河東川澤今近京及西北州郡皆有之理多在坡坂及城壘間似棗木而皮細莫木心赤色葉俱青花似棗花八月結實紫赤而圓小味酸皆小酸棗仁也其地名酸棗縣其樹高數丈經圍一二尺木理細而堅不易得今南方車轂多用之蘇恭注所謂酸棗是也一名酸棗而皮滑莖今酸棗縣即酸棗之理而且重其樹皮亦細文似蛇鱗其棗圓小而赤味酸皆小酸棗仁也其地名酸棗縣其樹高數丈經圍一二尺木理細而堅不易得今南方車轂多用之蘇恭注所謂酸棗是也一名酸棗而皮滑莖今酸棗縣即酸棗之理

葉俱青花似棗花八月結實紫赤而圓小味酸皆小酸棗仁也其地名酸棗縣其樹高數丈經圍一二尺木理細而堅不易得今南方車轂多用之蘇恭注所謂酸棗是也一名酸棗而皮滑莖今酸棗縣即酸棗之理

採實取核中仁陰乾四十日成熟日華子云酸棗仁治痛下氣痛

酸曰穠棗孟子曰養其穠棗趙岐注所謂酸棗之種類也日貫小而赤色黑味酸棗縣出者為真其木高數丈經圍一二尺木理細而堅

且重邑人用為車軸及健筋其皮亦細文似蛇鱗蓋鞭仁長而色赤如丹者不易得今市之貨者皆棘實耳漏之虎詳辨也本經主煩心不得眠今醫家兩用之蓋主虛煩不得眠與胡治振悸不得眠熟生熟便爾懸異而胡治振悸不得眠與胡治振悸不得眠同

酸棗仁二升㕮以水八升煮取三升分四服深師主虛不得眠煩不可忍者

酸棗仁湯酸棗仁二升蜈蚣乾薑茯苓芍藥各二兩甘草各二兩生薑六兩六物切

兩炙並切以水一斗先煮棗減二升後內五物煮取二升分

服一方更加桂一兩二湯酸棗並生

用療不得眠豈便以煮湯為熟乎

食療酸棗平主寒熱結氣

安五藏療不得眠

聖惠方治膽虛睡臥不安心多驚季用酸棗仁一兩生乾取葉重拌

熟擣細為散每服二錢竹葉湯調下不計時候

又方治夜不眠睡用酸棗仁半兩生乾取葉重拌

先以粳米三合煮作粥臨熟下棗仁計更煮三五沸空

心食之

又方治骨蒸勞心煩不得眠臥時時驚悸

研絞取汁下米二合煮粥候熟下地黃汁一合更攪

過不計時候食之

圖經曰酸棗樹高丈餘枝葉俱似李而小二月開花白色結實至八月九月熟紫赤色其肉甜美而酸核中仁扁而光滑

又方療胸膈煩悸不得眠酸棗仁二升煮取一升去滓臨臥服

圖要濟急方治膽風主毋氣虛實不調昏沉嗜多酸棗仁一兩生

用酸棗仁二兩水二大盞煎取一盞半去滓臨臥服

散每服二錢水七分煎至七分無時溫服

行義曰酸棗微熟紅不言川仁仍療不得眠天下皆有之但以土產佳陽子曰酸棗縣即滑之屬已其陽不宜高數丈味酸醫之所重今市人賣者皆棘子耳說未盡殊不知小則為棘大則為酸棗平地則易長居崖則難生故棘多生崖壑上久不撓則成幹人方呼為酸棗更不言棘徒以世人之意如此行路故成大木者少多為人樵去然此物線世所須及三尺便開花結子但棗小者氣味薄木大者氣味厚又有并別今陝西臨潼山野所出者亦好亦主地所宜也並可取後有白棘條乃是酸棗棘長仁亦少實亦大故棗取大木剌取小棗也亦不必強分別爾

蘗木

黃蘗也

味苦寒無毒主五藏腸胃中結熱黃疸腸澼止泄

熱二升煎口瘡久服通神心根名檀桓主心腹百病安魂魄不飢渴久服輕身延年通神生谿谷中山谷及永昌

唐本注

云子蘗一名檀桓心腹百病安魂魄不飢渴久服輕身延年通神生谿谷中山谷及永昌

陳藏器

蘗所在有今云皮黃恐是樹名非小蘗也

蘇恭

蟲瘡痢下血殺蛔蟲煎服主消渴

日華子

黃蘗樹高數丈葉似吳茱萸云茯苓今所在有本出房陵今合上二月五月採皮日乾

藏器

治下血如雞鴨肝片及男子心除勞治骨蒸洗肝明目多淚口乾心熱發癍蟲蝕治蛔

圖經曰

蘗木中者為佳木高數丈葉類茱萸及椿根葉經冬不凋三月開黃白色結實如松子狀五月採皮去外麤皮曝乾用其根名檀桓淮南萬畢術曰蘗令而脫取蘗三斤水一升煮三五沸去滓作結喉丸大如小豆每服三丸日再服亦治口瘡又方治卒消渴小便多黃蘗一片水一升煮三五沸去滓頓服一劑即愈又方治卒消渴小便多黃蘗一種多刺而小細葉者名刺蘗不入藥用又下品有一種小蘗條木如石榴皮黃子赤如拘杞兩頭尖人剉以染黃今醫家亦稀用

雷公云

凡使用刀削上麤皮了用生蜜水浸半日漉出煞蒸令蜜盡為度乃修事五兩開

圖經曰

蘗木出永昌今處山谷及永昌今有之以蜀中者為佳木高數丈葉類茱萸及椿根葉經冬不凋三月開黃白色結實如松子狀五月採皮去外麤皮曝乾用其根名檀桓淮南萬畢術曰蘗令而脫取蘗三斤水一升煮三五沸去滓作結喉丸大如小豆每服三丸日再服亦治口瘡又方治卒消渴小便多黃蘗一片水一升煮三五沸去滓頓服一劑即愈又方治卒消渴小便多黃蘗一種多刺而小細葉者名刺蘗不入藥用又下品有一種小蘗條木如石榴皮黃子赤如拘杞兩頭尖人剉以染黃今醫家亦稀用

雷公云

凡使用刀削上麤皮了用生蜜水浸半日漉出煞蒸令蜜盡為度乃修事五兩開

蜜二兩

外臺秘要口中及舌生瘡爛到黃蘗含之

千金方治小兒重舌以黃蘗苦竹瀝浸瀝點舌上

肘後方咽喉卒腫食飲不通黃蘗末服方寸七未解再服

又方傷寒時氣溫病毒攻手足腫疼痛欲斷亦治毒攻陰腫細到黃蘗五斤以水三升煮漬之

葛氏方男子陰瘡煩爛水煮黃蘗洗白蜜塗之

又方卒喉痺取黃蘗片切含之又嚥汁

又方食自死六畜肉中毒黃蘗一斤咬咀一斗煮三沸去滓恣飲便愈

經驗方治嘔血黃蘗好者以童子小便浸一宿焙乾為末蜜塗之乾再為末用麥門冬熟水調下二錢七立差

梅師方治癰疽發背或發乳痛之即煞人瘡黃蘗末和塗之初起微赤不急治生白蜜和塗二易至蜜枯慢火炙燥搗末敷腫上炙燥搗末敷腫

簡要濟衆治小兒熱瘡黃蘗末和塗之

外臺秘要方治小兒熱瘡黃蘗末和塗之

千金翼小兒熱瘡黃蘗末和塗之

衍義今卑下之人多用黃蘗染黃入藥不知此物大苦大寒能瀉膀胱實熱若膀胱虛熱及無熱者服之反損腎氣令人骨痿不起

滁州楮實

明州楮實

楮實味甘寒無毒主陰痿水腫益氣充肌膚明目久服不饑不老輕身生少室山一名穀實所在有之八月九月採實日乾四十日成

葉味甘無毒主小兒身熱食不生肌可作浴湯又主惡瘡生肉

樹皮主逐水利小便

莖主癮瘮痒單煮洗浴

皮間白汁療癬**陶隱居**云此即今穀音構樹也仙方採擣取汁和用用亦乾服使人通神見鬼南人呼穀紙亦為楮紙武陵人作穀皮衣又甚堅好爾**臣禹錫等謹按蜀本**圖經云樹有二種取有子葉似葡萄者佳八月採實所在皆識也**藥性論**云穀木皮亦可單用味甘平無毒能治水腫氣滿葉乾炒末搜麪作餺飥食之主水痢**段成式酉陽雜俎**云構穀田久廢必生構葉有瓣曰楮無曰構**日華子**云楮實壯筋骨助陽氣補虛勞助腰膝益顏色皮班者是楮皮白者是穀**又云**楮葉涼無毒治刺風身痒此是班穀樹**又云**[illegible]樹月傳瘡蟲蜂犬咬漿合朱砂為團名曰五金膠漆

圖經曰楮實生少室山今所在有之此有二種一種皮有班花文謂之斑穀今人用為冠者一種皮無花枝葉大相類但取其葉似葡萄葉作瓣而有子者為佳其實初夏生如彈丸青綠色至六七月漸深紅色乃成熟八月九月採水浸去皮穰取中子日乾仙方單服其實正赤時收取子陰乾篩末水服二錢匕益久乃佳俗謂之穀一說穀田久廢必生構葉有瓣曰楮無曰構詩小雅云爰有樹檀其下惟穀陸機疏云幽州謂之穀桑或曰楮桑荊揚交廣謂之穀江南人績其皮以為布又擣以為紙長數丈光澤甚好又食其嫩芽以當菜茹主四肢風痺赤白下痢其葉主鼻洪小品云鼻衄數升不斷者取楮葉擣取汁飲三升不止再三飲神良久衄亦差紙亦入藥見劉禹錫傳信方治女子月經不絕來無時者取案紙三十張燒灰以清酒半升和調服之頓定如冬月即煖酒服華中四暈服之立驗已斃者去板齒灌之經一日亦活今楮紙用之最博或用其灰止金瘡出血甚効楮布不見有之醫方但貴楮實餘亦稀用俚俗或取其木枝中白汁塗癬甚效楊炎南行方治瘴痢無問老少日夜百餘度者取乾楮葉三兩熬擣為末煎烏梅湯服方寸匕日再服取羊肉裹末內穀道痢出即止

雷公云凡使採得後用水浸五日將物攪旋投水浮者去之然後曬乾却用酒浸一伏時了便蒸從巳至亥出焙令乾用

聖惠方 治癬濕痒用楮葉半斤細切擣爛傳癬上

外臺秘要 近効天行後兩膝腫以穀枝汁隨意服愈

又方 有人虛肥積年氣上如水病面腫脚不腫穀楮葉八兩以水一斗煮取六升去滓內米煮粥熟

又方 點眼暗昏取楮白皮暴乾合作一繩子如釵股火燒作灰待冷細研如麪每點於瞖上日三五度漸消

又方 頭風白屑如麪一易新者截楮本作枕十日

肘後方 治卒風不得語涎出隨多穀少飲之楮葉取汁飲亦差

廣利方 治蝎螫人痛不止方穀楮白汁塗之立差

子母秘録 小兒赤白痢渴及煩熱以飲漿半升漬楮葉令香

瓜一箇切內葉汁中煮三二沸去滓服隨意細細二服渴停

抱朴子 楮實赤者服之十四日百年三十日神仙之更少令人夜應徹視見鬼神自

行及走馬

楊亮輔 說患人躭睡擣穀葉服驗

修真秘旨 服楮實者輕為骨軟疾

丹房鏡源 搆汁搜藥砂子

乾漆味辛溫無毒有毒主**絕傷補中續筋骨填髓腦安五藏**

五緩六急風寒濕痺療欬嗽消瘀血痞結腰痛女子疝瘕利

小腸去蛔蟲

生漆去長蟲久服輕身耐老生漢中川谷夏至後採乾之半夏

為之使畏雞子今又忌油脂**陶隱居**云今梁州漆最勝益州亦有廣州漆性急易燥其諸處漆桶上蓋裏自然有乾者狀如蜂房孔孔隔者為佳生漆毒烈人以雞子和服之去蟲猶有齧腸胃者畏漆人乃致死外氣亦能使身肉瘡腫自別有療法仙方用蟹消之為水鍊服長生**臣禹錫等謹按蜀本**注云按漆性並急凡取時須荏油解破淳者難得可重重別刷試之上等清漆色黑如鑿若鐵石者好黃嫩若蜂窠者不佳圖經云樹高二丈餘皮白葉似椿樗皮似槐花子若牛李子心黃六月七月刻取滋汁出金州者最善也**藥性論**云乾漆臣味辛鹹能殺三蟲主女人經脈不通**日華子**云治傳尸勞除風入藥須擣碎炒熟不爾損人腸胃若是濕漆煎乾更好或毒發飲鐵漿并黃櫨汁甘豆湯幷蟹解並可制

圖經曰乾漆生漆出漢中川谷今蜀漢金峽襄歙州皆有之木高三二丈皮白葉似椿花似槐子若牛李木心黃六月七月以竹筒釘入木中取之崔豹古今注曰以剛斧斫以竹管承之汁滴則成漆是也乾漆舊云用漆桶自然乾者狀如蜂房孔孔隔者今多用筒子內乾者以黑如鐵石者為佳漆葉中藥見華佗傳彭城樊阿少師事佗佗求服食法佗授以漆葉青黏散方云服之去三蟲利五藏輕身益氣使人頭不白阿從其言年五百餘歲漆葉所在有之青黏生豐沛彭城及朝歌一名地節一名黃芝主理五藏益精氣本出於迷入入山者見仙人服之以告佗佗以為佳語阿阿秘之近者人見阿之壽而氣力強盛怪之以問所服食阿因醉亂誤說人服多驗其後無復有人識青黏或云即黃精之正葉者神仙方乃有單服淳漆法傳於世云

外臺秘要療蛔蟲心痛惡心吐水乾漆熬擣蜜和丸服十五丸日再服

經驗方治婦人不曾生長血氣藏腑疼痛不可忍及治丈夫元氣小腸氣撮痛者並宜服二聖丸乾漆一兩為末生漆一兩先擣濕漆入銚子內熬如一食飯間已來住火與乾漆末一處拌和丸如半皂子大每服一丸溫酒吞下無時如元氣小腸膀胱氣痛牙關緊急但擘開牙關溫酒化一丸灌下必安治漆人不可服

簡要濟衆治九種心痛及腹脇積聚滯氣筒子乾漆二兩擣碎炒煙出細研醋煮麵糊和丸如梧桐子大每服五丸至七丸熱酒下醋湯亦得無時服

杜壬治小兒胃寒蟲上諸證危惡與癎相似乾漆擣燒煙盡白蕪荑等分為細末米飲調下一字至一錢

席延賞 治女人經血不行及諸癥瘕等病室女萬瘕丸乾漆一兩為細末一兩以生地黃汁升入銀器中熬候可丸如梧子大每服一丸加至三五丸酒飲下通利為度

抱朴子 內篇淳漆不投以大蟹投其鼻出一年六甲行厨至也

淮南子 漆見蟹而不能行

義曰 乾漆若遇濕氣亦未見用凡用者皆乾漆取其濕着在燥熱更宜炒令煙盡乃入藥搗篩之通神長生法或以大蟹投其鼻出一年六甲行厨至也

物之性也若漆遇人以血治之凡驗漆性稀者以物蘸起則絲而不斷乃為真也又漆於乾上薄之速乾者並佳餘如

皮加五州使

五加皮 味辛苦溫微寒無毒主心腹疝氣腹痛益氣療躄小兒不能行步陰囊濕癢陰癢男子陰痿囊下濕小便餘瀝女人陰痒及腰脊痛兩脚痿痺風弱五緩虛羸補中益精堅筋骨強志意久服輕身耐老一名豺節五葉者良生漢中及宛句五月七月採並十月採根陰乾遠志為之使畏蛇皮玄參今近道處

處有東間弥多四葉者亦好煮根莖釀酒主益人道家用此作丸亦以煮石與地榆並有秘法

日華子曰 云加皮有小毒能破逐惡

圖經曰 五加皮生漢中及宛句今江淮湖南州郡皆有之春生叢赤莖又似藤蔓高三五尺上有黑刺葉生五叔作簇者良四葉三葉者最多為次每一葉下生一枝三四月開白花繖狀青子至六月漸黑色根苦荊根皮黃黑皮黃黑肉白骨堅硬五月採根陰乾用勒州人呼為木骨一說今所用乃有數種京師北地者大片類秦皮黃蘗薑平真如桂而色白絶無氣味療風痛頗效驗不入丸散攣急之治風痺四肢攣急用皮柔韌而無味苦為專主去今江淮吳中乃剥野椿根為五加皮輕脆芬香是也其苗葉有刺類枸杞花香氣如檄攪春時結實如豆粒而扁春書得霜乃紫黑色吳中亦多俗名為追風使亦曰使陽剥取酒漬以療風乃不知其為五加皮也江淮吳中皆以酒漬飲之時便服未完更服

楊氏產乳 療竈丹從兩腳赤如火燒五加葉根燒作灰五兩取煅鐵家捶中水和塗之

東華真人煮石經 舜常登蒼梧山日廟金玉之香草朕用偃息正道此乃五加也又異名曰金盖昔西域真人王屋山人王常言何以得長久何不食石蓋金盖毋皆是煮石而餌得長生之道共相與言曰寧得一把五加不用金玉滿車寧得一斤地榆不用王侯玉敦者即地諭也五加地榆

雷公曰 今五加皮其樹木是白楸柯其上有葉如蒲葉者其葉花是雌剥皮陰乾陽人使陰陰人使陽

外臺秘要 治服諸藥石後或熱噤多向冷地固又不得食諸熱麪酒等方五加皮二兩以水四升煮取二升服

魯定公 毋單服五加酒以致不死臨隱去佯託死時人自莫之悟耳張子聲楊建始王叔平于世彥等皆服此酒而房室不絶得壽三百年有子二十人世世有得服五加酒散而獲延年不死者不可勝計或只為散以代湯茶面飼之驗亦然也大王君謂五加云蓋天有五星之星精也金德位應五湖人應五車故青精之莖則有東方物應五車精之莖則有東

方之液白氣入節則有西方之津赤氣入華則有南方之光玄精入根則有北方之神黃煙入皮則有咸氾之靈五神鎮生相轉育成用之者真仙服之者反嬰也

蜀州牡荊

牡荊實味苦温無毒主除骨間寒熱通利胃氣止欬逆下氣生河間南陽宛白山谷或平壽都鄉高岸上及田野中八月九月採實陰乾得木相實青相共療頭風防風為之使惡石河間宛白平壽並在北南陽在

西論蔓荊即應是今作栘檛之荊而復非見其子殊佳正如小欬子色青黃荊子實小大如此也牡荊子及出北方如烏豆大正圓黑仙術多用牡荊子乃注瀆疏下云瀆疏一名牡荊一名空疏反白中空時有節子似枸杞子赤色而仙方用牡荊云能通神見鬼此實是真非人離城陽攞也未甘苦冬月熱俗仍無識者當被如此說瀆疏主療與牡荊都不同其形類垂異恐垂實理有荊楊之栘子相對此是牡荊非惟其實乃栘葉並好又云有不對者即非牡荊楊為牡荊則不應有子如此並莫詳虛實須更博訪乃詳之爾雅云此即野作樣杖荊是也實細黃色莖勁作樹不為蔓生故謂之為牡荊蔓荊此極誤也栘葉無實之謂也栘葉為蔓荊實不堪為羊今所在皆有此荊既非本經所載栘今生處乃是蔓荊將以附此條後陶誤矣別錄云荊葉味苦平無毒主久痢霍亂轉筋血瀝下部蟲濕瘺蠹蝕主腳氣腫滿其根味苦平無毒水煮服主心風頭風肢體諸風解肌發汗有青赤二種以青者為佳出類聚方今人相承多以牡荊木取莖截於火上燒為蔓荊此極誤也栘葉莖截於火上燒以物承取瀝飲之去心悶煩熱頭風旋目眩心熱驚癎止消渴除痰蟲欲吐卒失音不語



圖經曰牡荊生河間南陽宛句山谷或平壽都鄉高岸上及田野中今眉州蜀州及近京亦有之此即作箭杖者葉如龜脚不為蔓生故稱牡荊也入用

月採實陰乾此有青赤二種以青者為佳謹按陶隱居歷
眞隱誤云荊木之華葉通神見鬼精注云尋荊有三種直云
荊木即是今可作箠杖者葉香亦有花子不入藥方術則
用牡荊牡荊子入藥比方人略無識其本者六甲陰符說一
名羊櫨一名空疏理白而申虛斷植即生今羊櫨所植亦生
而花實微細藥家所用者天監三年上將合神仙飯奉勑論
牡荊白荊並白多子；籠大歷三年上將合神仙飯奉勑論
圓或褊或異或多似竹節葉與餘荊不殊蜂多採牡荊牡荊
訂冷而稍疎荊被燒則煙火氣躰疎；蜂多採牡荊牡荊
其中主治心風第一干時即遠若牡荊躰輕實不入煙火不入
之所有者云雚元亮集驗方治腰腳蒸法取荊葉不限多少
蒸令熱熱置於龕中其下著火温之以病人踡於葉中剩著
葉蓋洎更當汗出藥中旋；燤近尋覓遂不植循用荊葉今
風仍遊葱該酒及豆酒並得以差為度又取此荊莖條截於
灸上燒之兩頭以器承取瀝汁飲之主心悶煩熱頭風旋月
取心中瀝之欲吐卒失音小兒心熱驚癎止消渴除痰令人
不睡

聖惠心方治濕痺方用荊枝燒瀝塗之効

外臺秘要限頭風頭痛取荊瀝不多少服集驗方同

金方療丸藪出血方荊華

傳取汁酒和服二合

又方治心虛驚悸不定羸瘦方荊瀝二升以火煎至一升六合分服四合日三夜一集驗方同

千金翼治猴腫瘡方含荊瀝稍稍燕之

肘後方治月卒痛燒荊末出黃汁傳之

又方荊如臂取瀝服五六合即得差

姚氏下赤白痢五六年者燒大蛇毒荊葉弋袋盛傳瘡腫上

深師方療瘡方荊木燒取汁傳之差

姚和衆小兒通耳方取蚯蚓糞荊子中白粉和油滴耳中日再之

眉州蔓荆

蔓荆實味苦辛微寒平温無毒主筋骨間寒熱濕痹拘攣明目堅齒利九竅去白蟲長蟲主風頭痛腦鳴目淚出益氣久服輕身耐老令人光澤脂緻音雉 小荆實亦等 惡烏頭石膏 陶隱居云小荆即應是牡荆牡荆子大於蔓荆子而反呼為小荆恐或以樹形為言復不知蔓荆樹亦高大爾 唐本注云小荆實今人呼為牡荆子者是也其蔓荆子大故呼牡荆子為小荆實亦等言其功用與蔓荆同也蔓荆苗蔓生故名蔓荆生水濱

本草拾遺云…蔓長丈餘花…小荆為蔓荆遂將蔓荆子為牡荆子也…注云今據陶誤不別蔓荆亦不知牡荆爾以理推之即蔓生者為蔓荆作樹生者為牡荆蔓生者大如梧子樹生者細如麻子則牡荆為小荆明矣圖經云蔓荆蔓生水濱苗莖蔓延春因舊枝而生小葉五月葉成如杏葉六月有花淺紅色蘂黃九月有實黑斑大如梧子而虛輕冬則葉凋 藥性論云蔓荆子臣治賊風能長鬚髮 日華子云利關節治赤眼癇疾注云海鹽亦有大如豇豆…有小軟蓋子六七八月採

圖經曰蔓荆實舊不載所出州土今近京及秦隴明越州多有之苗莖高四尺對節生枝初春因舊枝而生葉類小楝至夏盛茂有花作穗淺紅色蘂黃白色花下有青萼至秋結實斑黑如梧子許大而輕虛八月九月採一說作蔓生故名蔓荆而今所有並非蔓也

唐本注 長鬚髮

雷公云 凡使去蒂子下白膜一重用酒浸一伏時後蒸從巳至未出曬乾用

衍義曰 蔓荆實諸家所解蔓荆牡荆紛紀不一經既言蔓荆明知是蔓生即非高木也既言牡荆則自是木上生者況漢書郊祀志所言以牡荆莖為幡竿故知蔓荆即子大者是又何疑焉後條有牡荆即便是牡荆也子青色如茱

辛夷

更不合更立藥前條註文中云本草不載亦無別名但有藥花功用又別斷無疑焉注中妄稱石荆當之其說轉見穿鑿

辛夷味辛溫無毒主五藏身體寒風頭腦痛面黯溫中解肌利九竅通鼻塞涕出治面腫引齒痛眩冒身兀兀如在車船之上者生鬚髮去白蟲久服下氣輕身明目增年耐老可作膏藥用之去心及外毛毛射人肺令人欬一名辛矧一名侯桃生漢中川谷九月採實暴乾

菊為之使畏石膽

浦黃黃連石膏黃環陽陽居云今出丹陽近道形如桃子小時氣辛香即離騷所呼辛夷者是樹花未開時收之正月二月好採今見用者大連合抱高數仞葉大於柿葉所在皆有實臭不任藥也方云去毛用其心然難得而滋人也今按陳藏器本草云辛夷今挑子有毛未析時取之所云用此花開者及在二月此殊誤爾此江南地暖正月開比地寒二月開初發如筆北人呼為木筆其花最早南人呼為迎春樹高數仞葉似柿葉而狹長正月二月花似著手小桃色白而帶紫花落而無子夏秋復著花葉與無子者同取花欲開者開四月花落子赤似相思子花葉一如三尺已來便有枝柯繁茂還生花如勝所在山谷皆有此二種今死中有樹高三四丈花葉一如可愛正月二月花開煞白色花如小筆經秋歷冬葉花漸大如有毛小桃至來年正月二月始開初是與元府進來其樹纔可二三四尺有花無子謂之木筆花樹種經二十餘載方結實以此推之即是年歲淺者無子非有二種也其花開早晚應各隨其土風爾

陶隱居

唐本注

蜀錦詩雙按蜀本圖經云

圖經曰辛夷生漢中川谷今處處有之人家園庭亦多種植木高數丈葉似柿而長正月二月生花似著毛小桃

日華子

藏器論

云辛夷通開脈明目治頭痛煩熱鼻塞涕出面腫面皰微炙已開者劣謝者不佳

子名白帶紫花落無子至夏復開花初出如筆故北人呼為木筆花又有一種枝葉並如子如相思子或云都是一種花開早晚亦隨南北節氣寒溫九月採實暴乾用或云用花蘂縮者良已開者劣謝者不佳

雷公云凡用之去盦皮拭上赤肉毛了即以芭蕉水浸一宿漉出用漿水煮從巳至未出焙乾用若治眼目中患即一時去皮用囊實者

屈平九歌乘赤豹兮從文貍辛夷車兮結桂旗注辛夷香草也言山鬼出入乘赤豹從神貍結桂與辛夷以為車旗言有香潔也

衍義曰辛夷先花後葉即木筆花也最先春以具花未開時一本如桃花色者一本紫者今入藥當用紫色者仍須未開時收取入藥當去毛苞

寧府桑生

桑生寄生味苦甘平無毒主腰痛小兒背強巨兩切癰腫安胎充肌膚堅髮齒長鬚眉主金瘡去痺女子崩中內傷不足產後餘疾下乳汁其實明目輕身通神一名寄屑一名寓木

名宛童一名蔦音鳥又音弔生弘農川谷桑樹上三月三日採莖葉陰乾陶隱居云桑上者名桑上寄生爾雅人云施音異於桑上方家亦有用楊上楓上者隨各隨其樹名之形

類猶是一般但根津所因處為異法生椹枝間寄根在皮節之內葉圓青赤厚澤易折傍白生枝節冬夏生四月花白五月實赤大如小豆今處處有以出彭城為勝俗呼為續斷用之按本經續斷別在上品蔈主療不同豈只是一物市人混雜無識者服食方是桑據處處此又不同**陶朱生**云此多生大如小棗子惟虢州有桑上者椹樗柳水楊楓等樹上子黃大于汁甚黏核大似小豆葉無陰陽如細柳葉而厚軟莖麤短江南人相承用為續斷殊不相關且寄生實九月始熟而黃今補五月實赤大如小豆蓋陶未見也**臣禹錫等謹書**

注云按諸樹多有寄生莖葉並相似云是鳥食一物子糞落樹上感氣而生葉如橘而厚軟莖如槐而肥脆今處處有之以色方家惟須桑上者然非自採即難以別可斷莖而視之以色深黃者為驗圖經葉似龍膽而厚闊莖短似雞脚作樹形三月四月花黃赤色六月七月結子黃綠色如小豆以汁稠粘者良也**蘇恭**云桑寄生臣能令胎牢固主懷妊漏血不止多在樗樹上收呼為桑寄生

月華子云駐筋骨益血脉採桑上者極效緣有形與樗樹上者亦不同次即楓樹上力同樗樹上者黃色七月八月採

圖經曰桑寄生出弘農山谷桑上今處處有之云是鳥食桑子落枝節間感氣而生葉似橘而厚軟莖似槐枝而肥脆三四月生花黃白色六月七月結實黃色如小豆大三月三日採莖葉陰乾陳楸樗柳水楊楓等上皆有寄生惟桑上者堪用然殊難辨別醫家非白採不敢用或云斷其莖視之其色深黃并實尋有汁稠粘者為真謹按爾雅寓木

雷公曰凡使在樹上自然生獨枝樹是也採得後用鍮刀和根枝莖細剉陰乾了任用勿令見火

衍義曰桑寄生新舊書云今處處有之苦而不能生邪柳方宜不同豈歲窠所摘賤之苦而不能生則麥當生麥穀當也若以為鳥食物子落枝節間感氣而生桑渭細根上生者如何得生桑上者宜假其感造化之氣別是一物古人當子落枝節間由是言之自是感造化之氣別是一物古人當日惜取桑上者宜假其耳又云今醫家鮮用此一物又有醫家非不用也第以難驗如神向承乏吳山有桑上者嘗得真桑寄生下慈以偽藥罔人鄰邑者乃遍令人採摘孝不可得遂以實告甚不樂不敢以偽藥罔人鄰邑有人偽以作木寄生送服之逾月而死哀哉

所謂蔦與女蘿陸機疏云一名為詞煩并云蔦與女蘿陸機疏云蔦一名寄生桑上寄生也蘆子如覆盆赤黑甜美而中品有松蘿條即女蘿也舊云生熊耳川谷松上五月採陰乾古方入吐劚藥今醫家鮮用亦不復採之但附於

杜仲味辛甘平温無毒主腰脊痛補中益精氣堅筋骨強志除陰下濕小便餘瀝腳中酸疼不欲踐地久服輕身耐老一名思仙一名思仲一名木綿生上虞山谷及上黨漢中二月五月六月九月採皮惡蛇蚘皮玄參陰陽居云上虞在豫出建平宜都者狀如厚朴折之多白絲相連皮横理切令絲斷也圖經曰杜仲生上虞山谷又上黨漢中今出商州成州峽州木高數丈葉如辛夷亦類柘其皮類厚朴折之內有白絲相連二月五月六月九月採皮用江南人謂之檰初生葉嫩時採食主風毒脚氣及久積風冷腸痔下血亦宜乾未作湯謂之檰芽花實苦澁亦堪入藥未作發亦主益脚篋中方主腰痛補腎湯杜仲一大斤水一斗半大升二物細切分十四劑每劑取一劑以水一大升浸至五更煎三分減一憑取汁以羊腎三四枚切下之再煮三五沸如作羹法空腹頓服用塩醋和之亦得此亦見崔元亮海上方但崔方不用五味子耳

雷公云凡使先須削去麁皮用酥蜜和作一兩炙之盡為度炙乾了細剉用凡修事一斤酥二兩蜜三兩二味相和令一處用也

聖惠方治卒患腰脚疼痛補腎杜仲一兩去麁皮炙微黃剉以水二大盞煎至一盞去滓用羊腎一對細切去膜入藥中煮次入薤白七莖塩花椒薑醋等如作羹喫空腹食之

肘後方腰背痛杜仲一斤切酒二升漬十日服三合

勝金方治婦人胎藏不安并產後諸疾宜服杜仲丸兎土乾
膏以攝衆氣下

楓香

楓香脂味辛苦平無毒主癰瘇風瘙浮腫盪痛一名白膠香
其樹皮味辛平有小毒主水腫下水氣煮汁用之所在大山
皆有 唐本注云楓高大葉三角如槭而岐一月採脂唐本先附 馬志 謹按 唐本楓香脂
出廣州桄木紋黃赤如血大者一斤已上其械化為

通興南蠻記楓脂為之琥珀在地上傍不生草木深忽八九尺大如斛削去皮成焉初如桃膠成乃堅宋齊丘化書云老楓化為羽人衍義曰楓香與松脂皆可亂乳香尤宜區別楓香微黃白色燒之尤見真偽兼能治風癮瘾瘕痒毒水煎熟漬洗

女貞實



女貞實味甘平無毒安五藏養精神除百疾久服肥健輕身不老生武陵川谷立冬採陶隱居云葉茂盛凌冬不凋皮青而白與秦皮為表裏誤矣然秦皮葉大冬枯女貞葉小冬茂殊非類也唐本注云女貞亦服食之俗方不復用亦人亦無識者唐本注云女貞葉似枸骨及冬青樹等其實九月熟黑似牛李子陶云與秦皮為表裏誤矣然秦皮葉細冬枯女貞葉大冬茂殊非類也唐本注云女貞似枸骨皮青而白圖經云樹高數丈花細青白色採實日乾今山南江南皆有之陳藏器云女貞似枸骨樹如杜仲皮堪浸酒補腰脚令健枝葉燒灰淋取汁銼白似骨故云枸骨詩義疏云木虮其樹似栗一名枸骨理白滑其子為木蟲子可合藥木蟲在葉中卷葉如子羽化為蟲非木子又云冬青也葉堪染緋子浸酒去風血補益木肌白有文作象齒笏冬月青翠故名冬青江東人呼為東生李邕又云出五臺山葉似椿子赤如郁李微酸性熟與此小有異同當是別有一種耳又嶺南冬青皮涼無毒去血補益肌膚

圖經曰女貞實生武陵川谷今處處有之山海經云泰山多真木是此木也其葉似枸骨及冬青木極茂盛陵冬不凋花細青白色九月而實成皮可以浸酒或云即今冬青木也而冬青木肌理白文如象齒道家取以為簡其實亦浸酒去風補血其葉燒灰面膏塗之治癬瘃殊效兼滅瘢瘕瘢又李邕云五臺山冬青葉似椿子如郁李微酸性熟與此小有異同當是別有一種耳又嶺南有一種女真花極繁茂而深紅色與此不同其實不聞中藥品也枸骨木多生江浙間木體白似骨故以名南人取以旋作合器甚佳詩小雅云南山有枸陸機云山木其狀如檀一名枸

胃理白可為函板者是也皮亦堪浸酒補腰膝燒其枝葉為灰淋汁塗白癜風亦可作煎傳之

蜀州木蘭

春州木蘭

韶州木蘭

木蘭味苦寒無毒主身大風癩疾陰下痒濕明耳目療中風傷寒及癰疽惡瘡去面皶赤皰酒皰惡在皮膚中去面皶赤皰酒皰惡風癩疾陰下痒濕明耳目療中風傷寒及癰疽惡瘡去面皶赤皰酒皰惡

一名林蘭一名杜蘭皮似桂而香生零陵山谷及太山十二月採皮陰乾

陶隱居云零陵諸處皆有今東人皆以山桂皮當之亦云木蘭似桂葉其葉氣味辛香今益州有皮厚狀如榆桐皮甚薄而肉為桂心蓋是桂中之一種耳

蜀本圖經云樹高數仞葉似桂而三月四月採皮陰乾

唐本注木蘭生零陵山谷及泰山今潮嶺蜀川諸州皆有之如桂有三道縱文支支相類道家用合香亦好味辛香不及桂也葉有三道縱文皮如桂有三道縱橫文香味劣於桂此與桂同是一種取外皮為本蘭中之一種耳

圖經曰木蘭生零陵山谷及太山今潮嶺蜀川諸州皆有之如桂有三道縱文支葉亦有三道縱文皮如桂而全別而韶州所生乃云與桂肉為桂心蓋是桂中之一種耳一名杜蘭皮似桂而香生零陵山谷及太山十二月採皮陰乾

唐本注木蘭皮一斤細切以三年酒漬一七日出於日中晒精末藥末服方寸

外臺秘要療面上皶皰酒漬之方

子丹秘錄療小兒重舌木蘭皮一尺廣四寸削去麤皮用醋一升漬取汁注重舌上

茸州檳核



檳核味甘溫微寒無毒主心腹邪結氣明目赤痛傷淚出目腫皆爛鼻破心下結痰痞氣久服輕身益氣不飢生函谷川谷及巴西

陶隱居云今從北方來云出彭城間形如烏豆大圓而扁有文理狀似胡桃棃核今人皆合殼用為分兩此乃廣破取人仁耳

蘇恭圖經云樹生葉細似枸杞而尖長花白子紫色子如大豆大如五味子莖多細刺六月成熟五月六月採實去核鼓陰乾

唐本注云出雍州五月六月採日乾

圖經曰檳核生函谷川谷及巴西今河東亦有之其木高丈餘葉似枸杞而尖長花白子紫色七月八月採莖間有刺

附枝莖而生類五味子六月成熟五月六月採實去核鼓陰乾古今方惟用治聰劉禹錫傳信方所著法最奇云眼風淚痒或生腎或赤皆一切皆主之

宣州黃連搗篩末檳核仁去皮病乾棗三枚割頭少許留之去核以二物滿填於中却取所割下棗頭依前合定以火炙令熟量水半盌於銀器中文武火煎取一盌去滓分為二服一日盡之

雷公云凡使先湯浸去皮尖擘作兩片用苦消木通草二味和檳仁同水煮一伏時後瀝出去諸般藥取檳仁研成膏任加減入藥中使每事四兩用苦消一兩木通草二兩

陳藏器云檳子生熟足睡不眠

廣州丁香

丁香味辛温無毒主温脾胃止霍亂擁脹風毒諸腫齒痟蟲
能發諸香其根療風熱毒腫生交廣南蕃二月八月採 今主
州送丁香圖樹高丈餘葉似櫟葉花圓細黃色凌冬不凋賢
家所用惟用根子如釘長三四分紫色中有黃大如山茱萸
者俗呼為母丁香可入心腹之藥爾以舊本丁香根注中有
不入心腹之用大字恐其根必是有毒故云不入心腹也 又
陳藏器本草云丁香主癭白以生薑汁研拔去白鬚塗孔中即異常黑也今惟
母丁香擊之則順理而析兩人門療腫逆甚驗 又
主冷氣腹痛 日華子云丁香主冷氣及胃患痃蠱主卵及產

氣胃 治風痛壯陽暖腰膝治冷氣殺酒毒消痃癖除冷勞
圖經曰丁香出交廣南蕃今惟以櫟淩冬不凋花圓細如山茱萸者謂之母丁香
長三四分紫色其中有麁大如丁香子至次年春採之
二八月採子及根又云盛冬生
海藥 按山海經云生東海及崑崙國二月三月花開紫白
色至七月方始成實大者如巴豆為之母丁香小者
實為之丁香主風痺蠱骨攧勞臭治氣烏髭髮殺蟲療五痔
辟惡去邪治妳頭花止五色毒痢正氣止心腹痛樹皮亦能
治齒痛
雷公云凡使有雄雌雄顆小雌顆大似櫻桃方中多使雌
大腹雄須去丁蓋乳子發人胃
聖惠方 治桑蠐蟲人用丁香末蜜調塗之
千金方 治乾霍亂不吐不下方丁香十四枚末以沸湯一升和之頓服不差更作服
梅師方 治乳頭裂破擣丁香末傳之
又方 治奶乳癰取丁香擣末水調方寸匕服

又方治崩中晝夜不止取丁香二兩以酒二升取半分服外臺和要方同

簡要濟衆治傷寒咳噫不止及噦逆不定丁香一兩乾柿蔕一兩焙乾擣羅為散每服一錢煎人參湯下無時服

衍義曰丁香日華子云治口氣此正是御史所含之香治胃寒及脾胃冷氣不和有大者名母丁香氣味尤佳為末縫紗囊如小指實末內陰中主陰冷病中病便已

崖州沉

廣州沉香

沉香 微溫療風水毒腫去惡氣 陶隱居云此香合香家要用不正入藥惟療惡核毒腫道方頗有用處 唐本注云沉香青桂雞骨馬蹄煎香等同是樹葉似橘葉花白子似檳榔大如桑椹紫色而味辛樹皮青色木似櫸柳 臣禹錫等謹按陳藏器云沉香枝葉並似椿云如橘恐未是也其枝節不朽最緊實者為沉香浮者為煎香以吹形如雞骨者為雞骨香如馬蹄者為馬蹄香細枝未爛緊實者為青桂香其馬蹄雞骨只是煎香蘇乃重云深覺質長並堪薰衣去臭餘無別功又杜衡葉一名馬蹄香即并此者與前香別也 南州志云交州有蜜香樹欲取先斷其根經年後外皮朽爛木心與節堅黑沉水者為沉香浮水面平者為雞骨最麄者為棧香 日華子云沉香味辛熱無毒調中補五藏益精壯陽暖腰膝去邪氣止轉筋吐瀉冷氣破癥癖冷風麻痺骨節不任濕風皮膚痒心腹痛氣痢

圖經曰沉香青桂香雞骨香馬蹄香棧香同是一本舊不著所出州土今惟海南諸國及交廣崖州有之其木類椿櫸多節葉似橘花白子似檳榔大如桑椹紫色而味辛交州人謂之蜜香欲取之先斷其積年老木根經年其外皮幹俱朽爛其木心與枝節不壞者即香也細枝緊實未爛者為青桂堅黑而沉水為沉香半浮半沉與水面平者為雞骨最麄者為棧香又云棧香中形如雞骨者為雞骨香形如馬蹄者為馬蹄香然今人有得沉香奇好者往往亦作雞骨形不必獨是棧香也其又麄不堪藥用者為生結黃熟香其實一種有精麄之異耳並採無時嶺表録異云廣管羅州多棧香

如柜柳其花白而繁皮堪作紙名為香皮紙灰白色有文如魚子牋其理慢而弱沾水即爛不及楮紙亦無香氣又云漬泥香雞骨黃熟雖同是一木而根幹枝節各有分別者是也然此香之奇異最多品故相去一千謂在海南作天香傳言之盡矣云四香凡四十二狀皆出於一本木體如白楊葉如冬青而小又叙所出之地也比海南雷中國出香之地云實化真高雷中國出香之地也比海南者優劣不伴甚矣說所稟不同復售者多而取者速是以黃熟不待其稍成棧沉不待似是蓋趨利賊賊之深也非同愛管黎人非時不妄翦伐故木無夭札之患得必異香皆其事也又薰陸香形似白膠出天竺單于二國南方草木狀如薰陸出大秦國其木生於海邊也廣誌云盛夏木膠出汝上夷人取以煮白沙糖波斯國松木脂有煙赤如櫻桃者名乳香蓋薰陸之類也今人無復別薰陸者通謂乳香為薰陸耳治腎氣補腰膝霍亂吐下痛惡中邪氣五痔治血止痛等藥及膏煎多用之然至黏難研用時以繒袋盛搗熟貫之其說無定今醫家又一說云按三省方家用雞舌香療口臭者亦有採花釀成香者今不復見果有其實似棗核者以為雞舌香雞舌香以此雞舌以似近之抱朴子云以雞舌黃連乳汁煎注之諸百瘡之在目愈而更加精明倍常又有詹糖香出交廣以其皮及蠹屑和之難得淳好者唐方多用今亦稀見又蘇合香是諸香汁煎之非自然一物也又云大秦國採得生於山中其皮以辟邪惡固知非其也梁書云天竺國合蘇合香先煎其汁以為香膏乃賣其滓與諸人是以展轉來廣南貨者其經煎鍊之餘乎今用罕油乃其合治成者耳或云西國草木皮汁所為胡人欲貴重之故鮮其名耳又有擣香木如擣生南海諸國雞不生中華人間徧有之檀香類但不香耳至夏有不生者忽然蠹

香名方者至多亦以雞舌香為主或取以療氣及口臭則其用可知又何謂也其言有採花釀成香者今不復見果有此香海商亦當見之不應都絕京下老醫或有謂雞舌香與丁香同種花實叢生其中心最大者為雞舌香擊破有解理如雞舌者好今不復見此等廣南雖有出陳氏拾遺亦未知的否千金療瘡癰連翹五香湯方用丁香一方用

不知緣何得香名無復有芬芳也又葛稚用百一方有治氣藥借雞舌香酒服當差今治氣藥心切痛者研雞舌香療口臭者亦有採花釀之以成香木花或

開當有大水農人候之以測水旱號為水檀又有一種葉亦相類高五六尺生高原地四月開花正紫亦名檀根如葛極主癘疥殺蟲有小毒也

海藥 沉香按正經生南海山谷味苦温無毒主心腹痛霍亂中惡邪鬼瘧精氣清人神並宜酒煮服之諸瘡腫宜入膏用當以水試乃知子細沒者為沉香浮者為檀似雞骨香似馬蹄者為馬蹄香似牛頭者為牛頭香枝條細實者為青桂麄重者為棧香已上七件並同一樹梵云波津亦此香也

雷公云 沉香凡使須要不枯者如菊角硬重沉於水下為上也半沉者次也夫入散中用須候衆藥出即入膏和之用

通典 海南林邑國秦象郡林邑縣在置水中則沉故名曰沉香次不沉者曰棧香海南北嵩國出好棧香薰香及疏黃其薰香樹生千歲根本甚大伐之四五年木皆枯散唯中節堅實為香獨存取以為香

楊文公談苑 嶺南雷州及海外瓊崖山中多香樹山中夷民採割與人其熟香沉棧皆二品曰熟結生結熟結者斫而得之久爛泥而別取黃熟其破者為黃散香夷民以

香獨存取以為香

別說云 謹按沉香一種類極多除掌氏補注及圖經所載各件外又有如鼈脚鱔脊竹葉之類不啻一二十品要之可入藥者雅沉而出共中無空心者可用若雞沉水而有空心則是雞骨也謂中空而有朽路若雞骨中血眼而軟黑也

義曰 沉香木嶺南諸郡悉有之實海諸州尤多交趾建枝行義曰沉香木嶺南諸郡悉有之實海諸州尤多交趾建枝崗嶺相接千里不絕土人斫之積久爛泥而別取黃熟其破者為黃散香夷民以攜茅廬或為飯觸木佳有香者百無一二蓋木得水方結多在橋梁或為飯觸木佳有香者百斫枝幹中或為沉或為簡或為沉或為簡或為沉或為簡

香今南恩高寶等州惟產生結斜枝必以刀斫成坎經年得之白木其香結為塊黑逐雨水所漬遂結香復以鋸取之極清烈沉之良者推在瓊崖等州名鵝鴨脾燔之有膏如鵝鴨脾也謂中空而有朽路若雞骨中血眼而軟黑也

藥用 依木皮而結者謂之青桂木中得者宜入藥如冬青大者合數人抱不牲沉水氣清在土中歲久不待刳剔而成者謂之龍鱗亦有削之難得也然經中止言薰陸香今醫家用以修和衛氣為上品

自春咀之 柔韌者謂之黃蠟沉水毒腫去惡氣餘更無治療人藥須極細為佳今人故多與烏藥磨服走散滯氣獨行則勢弱與他藥相佐當緩取效有滓無損餘藥不可方也薰陸香

木葉類棠梨南印度界阿吒釐國出今謂之西香南番者更佳即今人謂之乳香為其滴如乳窠在地者謂之陽

香者一品

薰陸香微温療風水毒腫去惡心氣伏尸
惡瘡毒腫通方頗有用處 唐本注云出大秦在海邊自有天到
國 臣禹錫等謹按南方草木狀云出大秦在海邊自有天到
生拔地中盛夏樹膠流出沙上夷人悕取之賣與賈人注
方異物志同其異者雖云狀
圖經 文具沉香條下

唐本薰陸香微温去惡氣惡瘡出天竺國及耶鞞似松
腊黃白色天竺者多
梅師方 治蠱毒痛不可忍爵
薰陸香咽其汁立差

雞舌香微温療風水毒腫去惡心氣療霍亂心痛 陶隱居云此
惡不正入藥惟療惡核毒腫 皆合香
通道方頗有用處 唐本注云雞舌
樹葉及皮花似栗花如梅花 家要
子似棗核此雖樹也不入香用
其雄樹葉花實採花釀之 以成香出崑崙及交愛以南
爲佳雞舌香使味辛無毒入咬鼻散子
名丁香 齊民要術

陶隱居云此合香紫
要用不正入藥惟療

又方療胃吞忽生瘡雞舌
香末以綿裹含之差

抱朴子雞舌香黃連乳汁煎以
漢官侍中年老口臭賜雞舌香一斛

沈存中筆談予集靈苑方論雞
舌香即今丁香是也日華子云雞
舌香治口氣至今方書為然又古方五
香連翹湯用雞舌香千金五
香連翹湯無雞舌香却有丁香
丁香一條蓋不曾深考也今世
所用雞舌香乃乳香中得之大
如山茱萸剖開中如拆襪裹
無氣味用以治疾殊爭謬

蒙州藿香

藿香微温療風水毒腫去惡氣療霍亂心痛 南海馮氏增補 南方草木狀云味辛

藿香出海邊國形如都梁可著衣服中傣生吏民自種之五六月採暴之乃芬尔出交趾九真諸國

日華子云味辛

圖經曰藿香舊附五香條不著所出州上人家亦多種植二月生苗莖梗甚密作叢葉似桑而小薄六月七月採之暴乾乃芬香滿黃色然後可收又金樓子及俞益期牋皆云扶南國人言衆香共是一木根便是梅檀節是沉水花是雞舌葉是藿香膠是薰陸譯本經所以與沉香等共條然出於此性然今南中所有乃是草類南方草木狀云藿香傣生吏民自種之正相付合也范曄和香方云藿香本經主霍亂心痛故近世醫方治脾胃吐逆為最要之藥

別說云謹按藿香圖經云二月生苗舊附五香條中今人多用莖葉恐當移入草部爾又雞舌香補注引藥性論及齊民要術圖經引三省故事及千金昔謂是丁香又引抱朴子用入服方則其說自相矛盾君奭性論謂入香中令人身香及為丁子香則可以為丁香若抱朴子所說用丁香為丁子入服若含香者則丁香含之亦宜入服又雞舌無香味故有諸家要用不正入藥者以乳香中含之雖無香味却得口中無臭以其無臭以乳頭雜之若以乳香中所揀者含之雖無香味淡利九竅之理諸方名用治小兒驚癇亦效蓋九又下條丁香注所說用丁香自當用丁者然未知其果否也又薰陸乳香圖經有云今人無復別者今按西出天竺單于南北波斯等国西來者色黃白南來者色赤紫圖經稱木生海邊泌上盛夏木膠出則是日久相重疊者不成乳頭雜以土石其成乳者是新出未雜沙石也薰陸總名也乳者是薰陸之乳頭也今松脂楓脂中亦皆如是者多矣

南海馮氏增補 南方草木狀 異物志云味辛 日華子云味辛

詹糖香微温療風水毒腫去惡氣伏尸 陶隱居云此香皆今惟療惡核毒腫詹糖出西戎今州上真淳者難得多以其皮及處虫屎雜之惟散者為佳餘香無真為而有精麤爾

香家要用不正入藥

注云詹糖樹似橘煎枝為香交廣以南云詹糖香治惡瘡去惡氣生晉安

圖經文具沉香條下

檀香 陶隱居云白檀消風熱腫腹霍亂中惡鬼氣殺虫安心神止煩渴療風毒惡氣及虫毒治惡瘡疥癬檀香熬無毒治忤痛霍亂腎氣腹痛濃煎服水磨傅外腎并腰腎痛處

南海馮氏增補 南方草木狀 異物志云味辛 日華子云心

圖經文具沉香條下

乳香微温療風水惡氣療瘧瘴毒毒腫去惡氣療霍亂心痛

南海馮氏增補 南方草木狀 異物志云味辛 日華子云味辛熱微毒下

氣益精補腰膝治腎氣止霍亂衝惡中邪氣心腹痛痃氣煎膏止痛長肉入丸散微炒殺毒得不粘 陳藏器云蓋薰陸之類也其性溫療耳聾中風口噤婦人血氣能發酒理風冷止大腸傀澼癖療諸瘡令內消

圖經 文具沉香條下

海藥云乳頭香謹按廣志云生南海是波斯松樹脂也然赤如櫻桃者為上仙方多用辟穀魚療耳聾中風口噤不語善治婦人血氣能發粉酒紅透明者為上

簡要濟衆 催生方乳香一分黃明者細研為末取母桐子大每服五九酒下

博濟方 治子死腹中黃明乳香以端午日午時或歲除夜收猪心血相和研為丸如雞頭大以紅絹袋盛掛於門上妊婦若令下一九

又方 治急慢驚風乳香半兩同研細每服半錢用乳香湯調下或小便調妙

靈苑方 治甲疽發背腫疼痛不差凡此疾須剔去肉中甲不治亦愈或已成瘡不差用此法乳香末塗攀燒研等分之肉消愈傳

沈存中 乳香即薰陸香也如乳頭者為乳香屑碎雜者為瀝青

川房鏡源乳香 啞鉤

降真香出黎南件和諸雜香燒煙直上天召鶴得盤旋於上 海藥 云徐表南州記云生南海山 又云生大秦國末混千無毒主天行時氣宅舍怪異並燒悉驗 又按仙傳云燒之或引鶴降酬星辰燒此香甚為第一度籙燒之功力極驗小兒帶之能辟邪惡之氣也

蘇合香味甘温無毒主辟惡殺鬼精物温瘧蠱毒癇痙去三蟲除邪令人無夢魘久服通神明輕身長年生中臺川谷 陶隱 居 俗傳云是師子屎外国說不爾今皆從西域來真者雖別亦不復入梁惟供合好香爲疑也 臣 禹錫 等謹按圖經云此香從西域及崑崙來紫赤色與紫真檀相似堅實極芬香惟重如石燒之灰白者好云是師子屎此是胡人說言陶不悟之過以為疑也 臣 禹錫 等謹按唐本注云蘇合香是諸香汁煎之以為膏乃是中天竺國大秦國人採蘇合先煎其汁以為香膏乃非自然一物也 又云 大秦人採蘇合香賣其滓與諸人是以展轉來遲中國不大香也 陳藏器 云按師子屎是西国孕驢之所產其名爾

圖經 文具沉香條下

舒州金櫻子

金櫻子味酸澁平溫無毒主療腰脾洩下痢止小便利
服令人耐寒輕身方術多名用云是今之南燕

泉州金櫻子

宜州金櫻子

小今醫家用之甚驗 蘇恭曰 此同名而已醫方中亦用止冷熱痢殺寸白蛇蟲等和鐵粉研按白髮傳之再出黑者亦可染髮 又云 金櫻東行如根平無毒洽寸白蟲對二兩入米三十粒水二升煎五合空心服須臾瀉下神驗 又云 皮平無毒炒止瀉血及崩中帶下

圖經曰 金櫻子舊不載所出州土云住處有之今南中州郡多有而以注西蜀嶺南嶺外者為勝叢生郊野中大類薔薇有刺四月開白花夏秋結實亦有刺黃赤色形似小石榴十一月十二月採江南蜀中人熬作煎酒服云補洽有殊效宜州所供云本草謂之營實味別也洪州昌州皆能煮其子作煎膏至都下服食家用和雞頭實作木陸丹益氣補真甚佳

孫真人食忌 金櫻子煎經霜後以竹夾子摘取於大木臼中舂杵却刺勿損之擘為兩片去其子以水淘洗過爛擣入大鍋以水煎不得絕火煎約水耗半取出濾過仍熏煎似稀湯每服取一匙用暖酒一盞調服其功不可具載

沈存中 金櫻子止遺泄取其澁且澁世之用者待紅熟取汁熬膏大誤也經熟則却失本性今取半黃時採用妙

行義曰金櫻子經九月十月熟時採不爾復令人利

八種海藥餘

藤黃謹按廣志云出鄂岳等州諸山崖其樹名海藤花有蘗散落石上彼人收之謂沙黃就樹採者輕妙謂之鵞掌酸澁有毒主蚰牙蛀齒點之便落據今所呼銅黃謬矣蓋以銅藤語訛也按此與石淚採無異也畫家及丹竈家並時用之

返魂香謹按漢書云漢武帝時西國進返魂香武王內傳云聚窟洞中上有返魂樹採其根於釜中以水煮候成汁方去滓重火煉之如漆候凝則香成也西國使云其香名有六帝曰六名何一名返魂一名驚精一名迴生一名震壇一名人馬精一名節死香燒之一豆許凡有疫死者聞香再活故曰返魂香也

雅州落鴈木

海紅豆謹按徐表南州記云生南海人家園圃中大樹而生葉圓有莢微寒有小毒主人黑皮黑黯花瓣頭面遊風宜入面藥及藻豆近右蜀中種亦成也

落鴈木謹按徐表南州記云生南海山野中藤蔓而生四面如刀削代州鴈門亦有藤蘿高丈餘鴈過皆綴其中故曰落鴈木又云鴈銜至代州鴈門七首放落而生以此為名蜀中雅州亦出味平温無毒主風痛傷折脚氣腫脹滿虛脹以粉末

同煮汁蘸洗並立效又主婦人陰瘡浮疱以椿木同煮之妙也

圖經曰落鷹木生雅州味甘性平無毒治產後血氣痛并折傷內損等疾其苗作羹纏連大味苗葉形色大都似茶無花實彼土人四月採苗入藥用

蒘木謹按蜀記云生南中八郡樹高數十餘丈闊四五圍葉似飛鳥翼皮中亦有麵彼人作餅食之廣志云作飯餌之輕滑美好白勝桄榔麵味平温無毒主補虛冷消食彼人呼為蒘麵也

柵木皮謹按廣志云生廣南山野郊漢爾雅注云柵木如桑樹味苦温無毒主霍亂吐瀉小兒吐乳暖胃正氣並宜煎服無名木皮謹按徐表南州記云生廣南山谷大温無毒主陰腎痿弱囊下濕癢並宜煎其汁小浴極妙也其實號無名

波斯家呼為阿月渾狀若榛子味辛無毒主腰冷陰腎虛弱房中術使用者眾得木香力也

奴會子謹按拾遺云生西國諸戎大小如苦藥子味辛平無毒主治小兒無辜痟冷虛渴脫肛骨立瘦損脾胃不磨劉五娘方用為煎治孩子瘦損也

二十六種陳藏器餘

乾陀木皮味平無毒主破宿血婦人血閉腹內血塊酒煎服之生安南皮厚堪染者謂之櫻桃

海藥云按西域記云北西國彼人用染僧褐故名乾陀褐色也樹大皮厚味平温主癥瘕氣塊温腹暖胃止逼也

含水藤中水味甘平無毒主止渴潤五藏山行無水處斷之得水可飲清美去濕痺煩熱生嶺南葉似狗蹄煮汁服之主

天行時氣擣葉傳中水爛瘡皮皸劉欣期交州記亦載之也

海藥云謹按廣州記云生嶺南及諸海山谷狀若葛葉似枸杞多在路行人乏水處便喫此藤故以為名主頭痛心躁天行瘧氣癰癤丹石發動亦宜服之

臭蘆葉味苦平作飲止渴除瘀不睡利水明目出南海諸山葉似茗而大南人取作當茗極重之廣州記曰新平縣出臭蘆臭蘆茗之別名也葉大而澁又南越志曰龍川縣出臭蘆葉似茗味苦澁土人為飲南海謂之過羅或曰物羅皆夷語也

海藥云謹按廣州記云出新平縣狀若茶樹闊大無毒主煩渴熱悶下瘀通小腸淋止頭痛彼人用代茶故人重之如蜀地茶也

蜜香味辛溫無毒主臭除鬼氣生交州大樹節如沉香異物志云其葉如橘交州人采其葉以蒸生肉作臛甚美又云蜜香蟲名又云樹生千歲斫作四五歲乃往看尸注心氣惡去邪鬼尸注心氣生取惟中節堅實是也樹如樗按法華經注云木蜜香實也樹形似槐而香伐之五六年乃取其香

圖經文具沉香條下

海藥云謹按內典云狀若槐樹異物志云其葉如橘交州記云樹似沉香無異主辟惡去邪鬼尸注心氣生南海諸山中種之五六年便有香也

阿勒勃味苦大寒無毒主心腸間熱風心黃骨蒸寒熱殺三蟲生佛逝國似皂莢圓長味甜好噍一名婆羅門皂莢也

海藥云按異域記云主熱病及下痰殺蟲通經絡子療小兒癇氣凡用先炙令黃用

鼠藤味甘溫無毒主丈夫五勞七傷腰肺痛冷陰痿小便數白益陽道除風氣補衰老好顏色取根及莖細剉濃煮服之

訖取微汗亦浸酒如藥酒法性極溫服訖稍令人悶無苦生南海海畔山谷作藤莖葉滑淨似枸杞花白有節心虛

苗頭有毛南人皆識其藤有鼠咬痕者良但須嚼燕其汁驗也

海藥云謹按廣州記云生南海山谷藤蔓而生鼠愛食其故曰鼠藤咬處即人用入藥被人食之如喫其味甘美主腰腳風冷大補水藏好顏色長筋骨並劉濃煎服之亦取汁浸漬更妙

浮爛囉勒味酸平無毒主一切風氣開胃補心除冷痺和調藏腑生康國似厚朴也

靈壽木根皮味苦平止水作枕令人延年益壽生劒南山谷圓長皮紫漢書孔光年老賜靈杖頴注曰木似竹有節長不過八九尺圍可三四寸自然有合杖之制不須削理也

綏木味甘温無毒主風血羸瘦婦人諸疾浸酒服之生山漢山谷木文側故曰綏木

斑珠藤味甘温無毒主風血羸瘦補腰腳益陽道宜浸酒生林

中不凋子如珠而斑冬取之

時曰渾子味辛温澁無毒主諸瘕刺去冷氣令人肥健生西國諸蕃云與胡椒子同樹一歲椒子二歲渾子也

不彫木味苦温無毒主調中補衰治腰腳去風氣却老變白生大白山巖谷樹高二三尺葉似槐莖赤有毛如棠梨

曼遊藤味甘温無毒久服長壯一延年去咳嗽出犍為牙門山谷如寄生著大樹春華色紫亦如柳張司空云蜀人謂之流鶯藤亦治癬

龍手藤味甘温無毒主偏風口喎手足癱緩補虛益陽去冷氣風痺其酌多少以醇酒浸近火令温空心服之取汗出妥荔浦山石上向陽者葉如龍手因以為名採之無時也

放杖木味甘温無毒主一切風血理腰腳輕身變白不老浸

酒服之生溫活睦發山中樹如木天蓼老人服之一月放秋
故以為名也
石松味苦辛溫無毒主人久虛風痺腳膝疼冷皮膚不仁氣
力衰弱久服好顏色變白不老浸酒良生天台山石上如松
高一二尺也
牛妳藤味甘溫無毒主荒年食之令人不飢取藤中粉食之
如葛根令人髮落牛好食之生深山大如樹
震燒木主火驚失心煮服之又取掛門戶間大厭火災此雷
擊木也
大麻味甘無毒主老血婦人閉風氣羸瘦癥瘕久服令人
有子生江南山谷林澤葉似胡麻相對山人取以用釀酒也
休主不愁帶之愁自銷天生少室嵩高山山海經曰少室

山有木名帝休其枝五衢黃黑實服之不愁今嵩山應有
此木人未識固可求之亦如萱草之忘憂也
河邊木令飲酒不醉五月五日取七寸投酒中二徧飲之必
能飲也未試
檀桓味苦寒無毒主長生神仙去萬病末為散飲服方寸匕
盡一枝有驗此百歲蘗之根如天門冬長三四尺別在一旁
以小根綴之一名檀桓芝靈寶方亦云
木蜜味甘平無毒止渴除煩潤五藏利大小便去膈上熱功
用如蜜樹生南方枝葉俱可敗亦煎食如飴今人呼白石木
蜜子名枳椇味甜本經云木蜜非此中汁如蜜也崔豹古今
注云木蜜生南方合體甜軟可敗味如蜜老枝煎取倍甜止
渴也

朗榆皮味甘寒無毒主下熱淋利水道令人睡生山中如榆皮有滑汁秋生莢如北榆陶公只見榆作注為南土無榆也那耆悉味苦寒無毒主結熱熱黃大小便澁赤痂毒諸熱明目取汁洗目主赤爛熱障生西南諸國一名龍花也黃屑朱苦寒無毒主心腹痛霍亂破血酒煎服之主酒疸目黃及野雞病熱痢下血水煮服之從西南来者並作屑染黃用之梱如檀

木部中品

桑根白皮味甘寒無毒主傷中五勞六極羸瘦腑中脉絶補虛益氣去肺中水氣嗽血熱渴水腫腹滿臚脹利水道去寸白可以縫金瘡採無時出土上者殺人 續斷 桂心 藤 子為之使

葉主除寒熱出汗汁解蜈蚣毒
桑耳味甘有毒黑者主女子漏下赤白汁血病瘕積聚陰
痛陰陽寒熱無子療月水不調其黃熟陳白者止久洩益氣
不飢其金色者治癖飲積聚腹痛金瘡一名桑菌一名木麥
【圖本】麥作
【凌一】詮荀切
五木耳名櫄音軟益氣不飢輕身強志生犍為山谷六月多雨
時採即暴乾【陶隱居】云東行桑根乃易得而江嶺多出土不可
可輕信桑耳斷穀方云木櫄又呼為桑上寄生此云五木耳而不顯四者是何木按者桑樹生燥耳有黃赤白者又多雨時亦生軟濕者人採以作菹皆無復藥用【大】【生】云櫄耳人常食視耳用療疼楡柳桑耳出為五耳軟者症甚敢桑穰味甘寒無毒單食主消渴藥味苦甘寒有小毒水煎取濃汁除脚氣水腫利大小腸厥逆煩熱有小毒蒸林取汁為煎與冬灰等同功黑者良主消渴藥味辛寒有小毒蒸林下水飲之研取白汁合金瘡又主小腹痛吐下冬月用乾者濃煮服脹傳金瘡止血生肌也【今按】陳藏器木草云桑葉汁主霍亂吐不止桑根白皮煮汁飲止霍亂【孟詵】云桑根白皮煮汁飲利五藏又入散用下一切風氣水氣【又云】桑葉炙煎飲之止渴一如茶法【又云】桑皮煮汁可染褐色又不落紫燒灰淋汁入鍊五金家用【日華子】云桑白皮温調中下氣益五藏止霍亂吐瀉止即生桑白皮使平能治肺氣喘滿水氣虛勞客熱頭痛內補不足崩中帶下女子產後血暈研汁治小兒天弔驚癇及傳驚又療丈夫腳弱【又云】桑耳寒無毒利五藏通關節下氣益精出羌活【又云】桑耳温平無毒主益力不飢多動風氣發痼疾古槐桑樹上者良能治風熱血痢人心虛悸令人肋下急損經絡言不出者良【孟詵】桑根白皮煮汁飲止消瘧止渴利大小腸開胃下山桑根皮【又云】家桑東行根【又云】家桑葉暖無毒利五藏通關節下氣益精接傳上春葉未開枝可作【又云】桑葉暖無毒止腸風瀉血婦人心虛煩悸【又云】桑葉及傳驚又療丈夫腳弱【又云】桑葉暖無毒利五藏宣腸胃氣擁毒氣不可多食性益眼明石人熱發和鹽豉作羹美【開寶】【又云】桑葉炙煎服治一切風【又云】桑耳單用平【孟詵】云寒無毒主治婦人漏下赤白不老取黑遲一斤和枓一百日盡化為黑泥染白髮黑孔中即生如漆又取二七枚和胡桃研黑者【臣禹錫等謹按藥性論】云桑耳水氣浮腫主湯絕利水道消水氣桑耳使一名桑黃味甘辛無毒療伏血下赤血【又云】木耳下月閉血凝產後血疾腹痛吐下冬月用乾者濃煮服之研取白汁合金瘡又主小腹痛去惡風及宿血乘桂者名【陶隱居】云桑耳可多食性益眼明石人熱發和鹽豉作羹美【開寶】【又云】桑耳單用平【孟詵】云寒無毒主治婦人漏下赤白不老取黑遲一斤和枓一百日盡化為黑泥染白髮黑孔中即生如漆又取二七枚和胡桃研黑者

圖經曰

桑根白皮本經不著所出州土今處處有之採[illegible]

不可用出土上者用東行根益佳或云木白皮[illegible]

用初採得以銅刀剝去上麤皮取其裏白切焙乾其皮中[illegible]

涎勿使刮去藥力節在其上惡鐵及鉛不可近之桑葉以[illegible]

秣再生者為上霜後採之煮湯淋滯者足去風痺殊勝桑[illegible]

一名桑黃者有黃熟陳白者又有金色者手可用碎切酒煎[illegible]

帶下其實椹有白黑二種暴乾皆主變白髮皮上白蘚燒灰[illegible]

名桑花狀如地錢刀削取炒乾以止衄吐血等其燒皮[illegible]

汁醫家亦多用之桑上蠹蟲主暴心痛金瘡肉生不足[illegible]

白汁主小兒口瘡傅之便愈又以塗金刃所傷燥痛須[illegible]

止更剝白皮裹之令汁得入瘡中良冬月用根皮皆驗白[illegible]

作線以縫金瘡腸用者更以熱雞血塗之唐安金藏剖腹[illegible]

此法便愈桑條作煎見近效方云桑煎療水氣腳氣肺氣[illegible]

腫蓋風氣桑條二兩用大秤七兩一物細切如豆以水一[illegible]

升煎取三大合如欲得多造準此增加先熬令香然後煎[illegible]

服肚空時喫或茶湯或羹粥每服半大升亦無禁忌也本[illegible]

云桑枝平不冷不熱可以常服療遍體風癢乾燥腳氣風[illegible]

四肢拘攣上氣眼暈肺氣嗽消食利小便久服輕身聰明[illegible]

目令人光澤療口乾仙經云一切仙藥不得桑煎不服[illegible]

抱朴子方桑枝一小升細切熬令香以水三大升煎[illegible]

大升一日服盡無問食前後此服只依前方也桑葉可常[illegible]

神仙服食方以四月桑茂盛時採葉又十月霜後三分三[illegible]

已落時一分在者名神仙葉即採取與前葉同陰乾擣[illegible]

散任服或煎以代茶[illegible]

[illegible]鎮神又桑葉令[illegible]乾和桑衣煎服治痢亦主金瘡及[illegible]

[illegible]止血方書稱桑之功最神在人資用尤多爾雅云桑[illegible]

[illegible]根同梔郭璞云辨半也一半有葚半無名曰梔又[illegible]

女桑桋桑俗間呼桑木之小而條長者為女桑又山桑木堪

為弓弩檿桑絲中琴瑟皆材

之美者也他木鮮及焉

雷公云

凡使要十年已上向東畔嫩根採得後銅刀剝上青

黃薄皮一重只取第二重白嫩青涎者於槐砧上

用銅刀剉了焙令乾勿使皮上涎落

落涎是藥功此藥惡鐵并鉛也

聖惠方

治大風頭面髭髮脫落以桑柴灰熱湯淋取汁洗頭

面以大豆水研取漿解澤灰味彌佳次用熱水入菉

豆麵濯之取淨不過十度良

三日一沐頭一日一洗面

外臺秘要

治偏風及一切風桑枝剉一大升用今年新嫩枝

以水一大斗煎取二大升夏用井中沉恐酢壞每

日服一盞空心服盡又煎服終身不

患偏風若預防風能服一大升佳

又方

[illegible][illegible]寒髮鬢墮落令髮潤生桑白皮二升以

水淹浸煮五六沸去滓洗沐鬢髮自不落

又方

五痔以桑耳作羹空心下飯飽食之日三食之待孔卒

痛如鳥啄取大小豆各一升合擣作兩囊蒸之及熱更

互坐之即差

千金方 治口瘡白漫漫取桑先以髮梳口次以汁傳之

又方 八月九月中刺手足犯惡露腫多發入以桑枝三條內以頭柱瘡口上令熱盡即易之盡二條則瘡自爛仍取韭白布帛急裹之若有腫者更作用韭白傳瘡上以佳

肘後方 治人火小鼻齆小勞輒發轉以杏仁大塞鼻數度即可斷深師方同

葛氏方 卒小便多消渴入地三尺取桑根剥取白皮炙令黑剉以水煮之令濃隨意飲之亦可內水米勿入蓋

又方 產後下血不止炙桑白皮煮水飲之

又方 血露不絕鋸截桑根取屑五指撮取酒服之日三

又方 因瘡而腫者皆因中水及中風寒所作其腫入腹則殺人多以桑灰淋汁煮中盡毒令人腹內堅痛面黃青林霜骨立病變無常取桑木心剉得一斛著釜中以水淹之令上有三斗水煮取二斗盛取清微火煎令得一斛若有遺矜復易取俞梅加方同升宿勿食旦服五合則吐盡毒出

悔師方 治水腫坐臥不得頭面身體悉腫取東引花桑枝燒灰淋汁煮赤小豆空心食令飽即食盡不得動六畜

又方 治金瘡止痛桑根煎取服

又方 治金瘡止痛桑根煎取服

經驗方 治欬嗽甚者或有吐血殷鮮桑根白皮一斤米泔三宿淨刮上黃皮剉細入糯米四兩糖薑一處擣

才每服米飲調下一兩錢

又方 治青盲此一法當依而用之視物如鷹鶻有此效正月二十日九月十二十月十二月十一月二上件神日用桑柴灰一合以前煎湯煮令得所不以藥汁稍熱洗之如覺冷即住手洗遇上件日不得不洗緑豆湯之於甕器中澄令極清

經驗後方 治肺毒瘡如大風疾緑雲散以桑葉好者淨洗過熟蒸一宿候日乾爲末水調二錢匕服

又方 墜馬拗損以桑根白皮九斤爲末水一升煎成膏傳於損處便止已後亦無宿血終不發動

廣濟方 治瀉血不止桑耳一大兩熬令黑以水一大升煎三合煎取六合去滓空心分溫三服

又方 治蛇咬瘡桑樹白皮燒灰

又方 治金瘡取新桑白皮燒灰和馬糞塗瘡上數易之

勝金方 治小兒瀉用桑葉不拘多少用生蜜逐葉上傳過將線繫葉蒂上綿陰乾細切用水煎汁服之差

錢相公篋中方 治蜈蚣及蜘蛛毒取桑白皮汁傳之效





子母秘録 治落胎下血不止以桑木中蝎盡燒末酒服方寸七日二服

又方 小兒重舌桑白皮 煮汁塗乳飲之

又方 小兒鵝口桑白皮 汁和胡粉傅之

楊氏産乳 凡子不得與桑椹子食令兒心寒

官氣方 治小兒舌上生瘡如粥皮取桑白皮汁傅之三兩度差

仙方 桑椹熟時取之日乾爲末蜜和丸桐子大空心酒服四十九丸長服之良

史記 桑椆根旁行出地者名爲伏蛇治心痛一絶本經云桑根出士者殺人此用治心痛宜更研訪

毛詩 洋水篇云食我桑椹懷我好音

氓詩 無食桑葚注葚實也食過則醉傷其性

丹房鏡源 桑灰結汞

衍義曰 桑根白皮條中言桑之用稍備然獨遺烏椹桑之精英盡在於此採摘微研以布濾去滓石器中熬成稀膏量多少入蜜再熬成稠膏貯甕器中每用一二錢食後煎白湯熱服治心腹痛及小腸熱性微寒

竹葉筆 音謹 **竹葉** **味苦平** 大寒無毒 **主欬逆上氣溢筋急惡瘍殺小蟲** 除煩熱風痙喉痺嘔吐 **根作湯益氣止渴補虛下氣消毒** 治風痙 **實通神明輕身益氣** 生益州

淡竹葉味辛平大寒主胷中痰熱欬逆上氣瀝大寒療暴中風風痺胷中大熱止煩悶皮箔微寒主嘔噦温氣寒熱吐血崩中溢筋苦竹葉及瀝療口瘡目痛明目利水道益氣可久食

竹笋 蜀本作 諸笋 味甘無毒主消渴利九竅

陶隱居 云竹類甚多此前一條云是筆竹次用淡苦爾又一種薄殼者名苦竹葉最勝又有寔中竹筆竹並以笋爲佳於藥無用凡取竹瀝惟用淡苦筆竹實出藍田江東乃有花而無實而頃來亦有實狀如小麥甚可爲飯 **今按** 陳藏器本草云苦竹笋主不瞑去面目并舌上熱黃消渴判目解酒毒除熱氣健人諸笋皆發冷血及氣淡竹根煮取汁主丹石發熱渴除煩熱毒主吐血熱毒風壓四肢不語苦者治眼赤 **又云** 淡竹葉味甘平無毒主小兒驚癇天弔蜜葉同用 **又云** 苦竹味苦冷無毒主中風失音作瀝功用治卒中風失音不語五痔 **陶華子** 云淡竹并根味甘冷無毒消癀治熱疘煩悶小兒驚癇天弔蜜葉同用 **孟詵** 云笋寒主逆氣除煩熱動氣發冷癥不可多食陳者不可食其淡竹及中毋竹瀝療熱風和食飲服之良 **又云** 慈竹實味甘寒無毒主消渴竹燒瀝治卒中風失音不語苦者治眼赤 **又云** 慈竹瀝治肺痿唾血鼻衄吐血煩悶 **蜀本** 圖經云竹節間黃白者味甘名竹黃尤制石藥毒發熱 **圖經曰** 筆竹淡竹苦竹本經並不載所出州土今處處有之竹之類甚多而入藥者惟此三種人多不能盡別謹按竹譜宜刺船細者可爲笛苦竹體圓而質勁皮白如霜大者惟堪作杖次用船者多用桂竹也然今之刺船亦有二種一種出江浙近地亦時有之苦竹有紫甘竹次筆而茂即淡竹有白有紫甘竹次筆而茂即淡竹也今處處有之

陳藏器序 久渴心煩服竹瀝可敵一種出江浙近地亦時有之俗呼甜苦筍食品所最貴者亦不聞入藥用淡竹肉薄節間有粉大南人以燒竹瀝者醫家只用此一品與竹譜不復用亦稀有之

食療淡竹上其竹次主欬逆消渴痿飲噎痺鬼疰惡氣殺小蟲除煩熱苦竹葉主口瘡目熱瘡啞苦竹箨主下熱壅

苦竹根細剉一斤水五升煮取汁一升分三服大下心肺五藏熱毒氣苦笋不發痰淡竹箨主噎膈鼻衄竹瀝大寒主中風大熱煩悶勞復淡竹笘主噎膈鼻衄竹實通神明輕身益氣篁淡苦其外餘皆不堪不宜人

外臺秘要療凡脫折折骨諸瘡苦中風則發痙口噤殺人若已中風覺頸項強身中急速者急服此方竹瀝飲二三升若已口噤以物強發口之忌冷飲食及酒竹瀝卒煩難得可合十許束併燒中夾承取接之可活

千金方凡飲酒頭痛以竹箨二枚擣調更煮三沸飲之治齒斷間津液血出不止若竹箨四兩以醋漬一宿含之

又方治齒間血出以竹葉濃煮之令其人解衣乃別令一人與鹽少許寒溫得所含嚥其汁青竹瀝亦佳

又方齒血不止刮生竹皮醋漬之令其人解衣乃別令一人含嚥其汁青竹瀝亦佳

又方治時氣五六日已上者竹瀝半盞新水半盞相和令均非時服

肘後方治霍亂轉筋心腹脹滿濃煮竹葉湯五六升分三服不差重作亦時時

又方小兒身中惡瘡膿汁青竹瀝塗之

葛氏方卒消渴小便多作竹瀝恣飲數日愈

孫真人食忌卒得惡瘡不識者燒苦竹葉和雞子黃傅

梅師方治產後身或強直口噤面青手足強及張欲竹瀝一升醒

又方主雄娠恒苦煩悶此名子煩竹瀝湯茯苓三兩竹瀝一升分三服不差重作亦時時

又方升水四升合竹瀝煎取二升服竹瀝

又方治目赤腫痛如刺不得開肝實熱所致或生障翳苦竹瀝五合黃連二分綿裹入竹瀝內浸一宿以點目中數度令熱淚出

食醫心鏡理心煩悶益氣力止渴苦笋熟煮任性食之又苦竹笋主消渴利水道下氣理風熱脚氣取蒸者煮食之又董竹笋主消渴風熱益氣力發氣脹蒸煮炙任食

簡要濟衆 頭瘡大筍殼葉燒爲灰量瘡大小用灰調生油傅入以臘粉佳

兵部手集 治發背頭未成瘡及諸熱腫痛以青竹筒角之及大戰戰然出不止遍匝膏肋 以腫處就坑子上角之如菉豆

又方 治瘡瘜竹箨燔灰油和塗之妙

又方 治中風口噤口噤體熱者竹瀝一升 小兒口噤不可逆加鍼灸忍痛動甘共五脉因之成癇是以田舍小兒任其自然皆無此疾可畜之

又方 治小兒大人欲逆短氣臭膿涕粘淡竹瀝一合煖之分三四服兒新生切

廣利方 治金瘡中風口噤欲死瀝半大升微火煖服之 竹

姚氏方 卒齒痛取苦竹燒一頭得汁多漱齒上差再服之

傷寒類要 治六接勞復卵腫晡晡發熱中絞痛便欲死刮竹皮一升以水三升煮五合煖之分三四服日三五服大人一升 小兒減之 中絞去滓頓服 海藏方同

子母秘録 治胎動取甘竹根煮汁服

又方 安胎取竹瀝服之

又方 治妊娠八月九月若瘴鬱樹或斗馬驚傷得心痛青竹筯五兩切以酒一升煎取五合頓服不差再服之

又方 小兒頭瘡耳上生瘡竹葉燒末和豬脂塗上又以雞子白傳之 妙

又方 小兒痢到青竹節二兩去滓服一合無治小兒口噤 体熱病

產書 治妊娠誤有失墜忽推墜著痛新青竹筯二合以好酒一升煮筯三五沸分作三度服

產寶 治妊娠因夫所動困絶以竹瀝飲一升立愈

又方 治產後血氣暴虛汗出淡竹瀝三合微煖服之須臾再服

楊氏產乳 療瘡瘍燒竹葉爲末以雞子白和之塗上不過三四次立差

又方 妊娠若頓吐子頓故也竹瀝不限多少細細服之

又方 療胎動安胎方研竹根煮汁食之

姚和衆 藏兒連夜二合服令盡之 小孩夜後狂語竹瀝一合

李時該聞集云爆竹辟妖氣鄰人有仲叟家為山魈所祟擲瓦石開戶踊不已出示彌盛時謂其叟曰翁旦夜於庭落中恭除冬爆竹數十竿叟然其言爆竹至曉寂然安帖遂止

別說云謹按舊稱竹實鸞鳳所食今近道竹間時見開花小麥子無氣味而澁江浙人號為竹米以為荒年之兆及其有江南餘千人来言彼有竹實大如雞子竹葉層層包裹味甘近井勝蜜食之令人心膈清涼生深竹林茂盛蒙密處項因得之但日久汁枯乾而味尚存爾因知鸞鳳之食必非常物也

衍義曰竹葉凡諸竹與筍性皆微寒故知葉其用一致本經不言筍及苦取歷作油亦不必強擇也張仲景竹葉湯用淡竹筍薑化不益脾翀家一小兒方二歲隔夫照管壯熱喘逆瞑目多驚先三五日醫微愠逆瞑目多驚先三五日醫忽然其母誤將有巴豆食藥作餅驚藥化五九如麻子大嚼不爛之良久大吐有物噎於喉中乳媪以苦摘出之約長三寸麁如小指乃三日前臨臂曬者乾筍是夜諸證皆定次日但以和氣藥調治遂安其難化也如此經日而知之者謂之工不能問而知之者謂之巧故為難治醫者當審慎也

吳茱萸味辛温大熱有小毒主温中下氣止痛治寒濕心腹痛逆氣利五藏去痰冷腹内絞痛諸瘕實不消守惡根殺三蟲根白皮殺蛔蟲蛲蟲治喉痺欬逆止洩注食不消女子經產餘疾療白癬一名藙生上谷用反窓氣九月九日採陰

乾 蓼實爲之使惡丹參消石白堊畏紫石英 名藙而俗中呼爲藙子當是不識藙字似蔱字仍以[illegible]
相傳其根南行東行者爲勝道家去三尸方亦用之[illegible]
云爾雅釋木云椒榝醜梂陸氏草木疏云椒榝[illegible]
陶誤也 臣禹錫等謹按藥性論云茱萸味苦辛大熱有毒
主心腹疾積冷心下結氣疰心痛治霍亂轉筋胃中冷氣吐[illegible]
瀉腹痛不可勝忍者可愈療遍身𤸷痹冷食不消利大腸擁氣
氣削皮能療齒䘌主中惡腹中刺痛下痢不禁治寸白蟲[illegible]
[illegible]云椒榝薰越椒茱萸[illegible]也榝一音考 孟詵云茱萸主心痛下[illegible]
除咳逆藏冷又皮止齒痛又患風瘙痒痛者取茱萸一升[illegible]
酒五升和煮取一升半去滓以汁煖洗中惡[illegible]
者取茱萸一升清酒一升和煮四五沸冷服之半升日三[illegible]
得少汗差 謹按殺鬼疰氣又半日者不甚食又[illegible]
中刺痛煮一盞汁服之止又骨在肉中不出者[illegible]
爛出腳氣衝心可和生薑汁飲之甚良 日華子云[illegible]
節治霍亂瀉痢消痰破癖逆風治腹痛[illegible]
產後餘血 又云茱萸葉熱無毒治霍亂下氣止心腹痛冷氣
內外腎釣痛鹽研罯神驗乾即又浸復罯霍亂[illegible]轉筋和艾
以醋湯拌罯妙也 陳藏器云梂子根濃煮浸痔[illegible]
亦主痔病又爾雅云梂實梂也其子房生爲梂[illegible]草
名羊梂一名鼠查梂[illegible]此乃名同耳
梂似小柤而赤人食之生高原
圖經曰 吳茱萸生上谷川谷及宛句今處處有之[illegible]
尤多木高丈餘皮青綠色葉似椿而闊[illegible]

開花紅紫色七月八月結實似椒子嫩時微黃至成熟則深
紫九月九日採陰乾風土記曰俗尚九月九日謂爲上九茱
萸到此日氣烈熟色赤可折其房以插頭云辟惡氣禦冬又
續齊諧記曰汝南桓景隨費長房學長房謂曰九月九日汝
家有災厄宜令急去家各作絳囊盛茱萸以繫臂上登高飲
菊花酒此禍可消景如言舉家登高山夕還見雞犬牛羊一
時暴死長房聞之曰此代之矣故世人每至此日登高飲酒
戴茱萸囊由此耳世傳茱萸氣好上言其衝膈不可爲服食
之藥也張仲景治嘔而胸滿者茱萸湯主之吳茱萸一升棗
二十枚生薑一大兩人參一兩以水五升煎取三升每服七
合日三乾嘔吐涎沫而頭痛者亦主之又其南行枝主大小
便卒關格不通取之斷度如手第二指中節含之立下出雖
僧垣方根亦入藥用顆繁高療脾勞熱有白蟲在脾中爲病
令人好嘔者取東行茱萸根大者一尺大麻子八升橘皮二
兩凡三物㕮咀以酒一半浸一宿微火上薄煖之三下絞去
滓平旦空腹服一升取盡蟲便下出或死或半爛或下黃汁
凡作藥法禁聲勿語
道作藥蟲便下驗

雷公云 凡使先去葉核并雜物了用大盆一口使鹽水洗
一百轉自然無涎日乾任入丸散中用脩事十兩
用鹽二兩研作末投東流水四斗中分作一百度洗別有大
効若用醋煮即先沸醋三十餘沸後入茱萸沸醋盡熬乾每
用十兩使醋
一溢爲度

食療微温主痢上瀉厚腸胃肥健大不宜多食

聖惠方治陰毒傷寒四肢通冷絹袋入隻盛蒸令極熱熨腳心候氣通暢勻腰即停熨累用驗

外臺秘要集驗熨癥法茱萸三升碎之以酒和煮熟布裹熨癥上冷更煴更炙用癥移走逐熨之候消乃止也

又方治癰疽發背及發乳房茱萸一升擣之以苦酒和粘癰上更

又方陰下濕摩茱萸一升水三升煮三沸去滓洗瘥差

千金方治十白蟲茱萸根洗去一宿平旦分再服凡茱萸皆用細根東北陰者良若稍大如指已上者皆不任用

又方治心腰內外痛茱萸一升三升煎取半升空心頓服

千金翼產後虛羸盜汗時齘齒雞子大以酒三升漬一宿平旦分再服凡茱萸皆用細根東北陰者良若

又方主大人小兒風癎茱萸一升酒五升煮取一升帛染拭之

又方主頭風沐頭茱萸二升水五升煮取二升以綿染拭髮根良

肘後方治中風不能語發欲痛不可忍者茱萸一兩桃仁一兩和水五升煮取三升稍稍服之

又方治腸痔大便常血下部瘡痛如蟲咬若搥地作坑燒令赤酒沃中熏熟收開小孔以下部

上令乃下不過三四度即差

孫真人備急方赤痢臍下痛茱萸一合黑豆湯吞之外

經驗方治脾元氣發欲痛不可忍者茱萸一兩桃仁一兩和炒令茱萸焦黑後去茱萸取桃仁去皮尖研細蔥白三莖煨熟以酒浸溫分三服

經驗後方補水氣藥赤茱萸二兩米醋煮爛細研爲膏丸如梧桐子大搗湯下七丸空心服

兵部手集治醋心每醋氣上攻如臟醋茱萸一合水三盞煎七分頓服縱濃亦須強服近有人心如塗破服此

又方小兒火灼瘡一名瘡漿瘡名火爛瘡用酒煎茱萸拭上

方後二十年不發

又方治中風腹痛或子腸脫出茱萸三升酒五升煎取二升分溫三服

楊氏產乳療中惡心痛吳茱萸五合以酒三升煮三沸分三服

衍義曰吳茱萸須深湯中浸去苦烈汁凡六七過始可用今速腸虛人服之愈甚

檳榔



廣州檳榔

檳榔味辛温無毒主消穀逐水除痰癖殺三蟲伏尸療寸白生南海陶隱居云此有三四種出交州形小而味澁核南者形大而味澁核亦有大者名賭子俗人名藥子俗人又小者南人名藥子俗人呼爲檳榔孫亦可食唯交州及嶺南人皆呼爲檳榔大熏使乾恐堪停久其中仁腐生肌肉止痛燒爲灰主口瘡生肌肉止痛燒爲灰主口

馬錫等謹按藥性論云白檳榔治心痛風血積聚君味甘大寒能主宣利五藏破堅滿氣下水腫六腑壅閉大腸不利水穀道澁

日華子云檳榔破癥結下胖調中除煩破癥結下五勞七傷建脚氣

海藥云檳榔生南海今嶺外州郡皆有之大如桃榔而高五七丈正直無枝皮似青桐節如桂竹葉生木巔大如赤者味苦殺蟲無補

圖經曰檳榔生南海今嶺外州郡皆有之大如桃榔而高五七丈正直無枝皮似青桐節如桂竹葉生木巔大如赤者味苦殺蟲無補

檳榔君味甘大寒能主宣利五藏破堅滿氣下水腫六腑壅閉大腸不利水穀道澁治心痛風血積聚

云未實時青皮裹之以當果實其俗云南方地温不食則柔滑而甘美嶺南人呼爲檳榔孫亦可食唯爵之則柔滑而甘美嶺南人呼爲檳榔孫

陳藏器云檳榔味澁除一切風下一切氣通利九竅補五勞七傷建脚氣

方珍之以爲口實

仁者功劣於檳榔檳榔也生收火乾中無而更細藥子土人皆呼爲檳榔孫

記云山檳榔形小而更細藥子土人皆呼爲檳榔孫

味澁除一切風下一切氣通利九竅補五勞七傷建脚氣

開胖調中除煩破癥結下

春生至夏乃熟然其肉極易火焙熏乾始堪停久此有三種欲收之皆先以灰汁煮熟仍爛

有大而味澁核亦大者名猪檳榔最小者名藥子其功用不小

說有別又云尖長而有紫文者名檳榔圓而矮者名檳榔力

檳榔力大今醫家不復細分但取作雞心狀存正穩心不虛

破之作錦文者爲佳其大腹檳榔所出與檳榔相似但壺葉狠

小異并皮收之謂之大腹檳榔或云檳榔

難得真者今貨人多大腹也

海藥 謹按廣志云生東海諸國樹莖葉根蘗與大腹小異又云如櫬櫚也葉若茜似芭蕉狀陶弘景云向陽曰檳榔向陰曰大腹味澁温無毒主賁純諸氣五膈氣冷氣風氣瘴毒水腫浮氣奏醫云檳榔二枚一生一熟搗末酒煎服之善治膀胱諸氣也

食療 多食發熱南人生食閩中名檳榔將來乾者煮熟重煮切勿經火恐無力効若熟使不堪用如不

雷公云 凡使取好存坐穩心堅文如流水碎破內文如錦文者妙半白半黑并心虛者不入藥用凡使須別擣與檳榔頭圓身形矮毗者是檳榔身形尖紫文麤者是檳榔七力小檳榔七力人欲使先以刀刮去底細

聖惠方 治口吻生白瘡用二枚燒灰細研傳之妙

又方 治胎動腰痛憾心或有血下用一兩為末非時水煮葱白濃汁調下一錢匕

外臺秘要 若脚氣非冷非熱非老人弱人脹滿者檳榔仁為末以檳榔煎汁或茶飲或豉汁調下一錢匕

經驗方 治金瘡白檳榔末少許為末傳之即差

海師方 治醋心檳榔一兩細皮二兩細切同炒令黃為散空心生薑湯下方寸匕

孫真人食忌 治霍吐以白檳榔一分炙為末水一盞煎半盞服

斗門方 治膀重痛用檳榔為末酒下一錢

又方 治本藏氣以雞心檳榔半兩炮擣為末不差檳榔半兩簡服或用熱酒調一錢匕效

簡要濟衆 治諸蠱在藏腑久不差檳榔半兩炮擣為末每服一錢至二錢葱蜜煎湯調下空心服

又方 治脚氣衝心白檳榔一箇雞心大者為末用童子小便生薑汁温酒共半盞調只作一服無時服

廣利方 治脚氣衝心致悶乱不識人白檳榔十二分為末分三服空心爰小便五大合調服日再服

御藥院 治痰涎檳榔為末白湯點一錢

齊民要術 檳榔下氣及宿食白蟲消穀痰飲

衍義曰 檳榔二書所說甚詳今人又取尖長者入藥言其快銳速效屢嘗試之果如其說

臨江軍梔子

江陵府梔子

建州梔子

梔子味苦寒 大寒無毒 主五內邪氣胃中熱氣面赤酒皰瘡

鼻齇赤癜瘡 療目熱赤痛眥心大小腸大熱心中煩悶

胃中熱氣 一名木丹 一名越桃 生南陽川谷九月採實暴乾

陶隱居 云解五支毒處處有之 今惟出西蜀 餘者多不堪用 亦可染 用於藥甚稀 五支即羊躑躅也 見本經

蘇恭 重支藥性論 云山梔子殺蠱毒去熱毒風利五淋 主時疾除熱及消渴口乾 赤癜病

圖經曰 梔子生南陽川谷及西蜀州郡皆有之 木高七八尺 葉似李而厚硬又似樗蒲子 三月生白花 花皆六出甚香 俗說即西域詹匐也 夏秋結實如訶子狀生青熟黃中仁深紅 九月採實暴乾 南方人競種以售利 實之家言獲利之博也 此亦有兩三種入藥者山梔子方書所謂越桃也 皮薄而圓小 刻房七稜至九稜者為佳 其大而長者乃作染色 又謂之伏尸梔子不堪入藥用 張仲景傷寒論及古今諸名醫治發黃皆用梔子 又治大病起勞復皆用梔子湯飲 多不可悉載 梔子亦療血痢 搗末三方極效 去皮擣窒丸服 亦搗末三方以十四枚去皮擣窒丸服立愈 時行熱燒梔子三枚未服立愈 時行熱

病後勞發水煮十枚飲汁溫卧徹食加大黃別煮汁臨熟內之合飲徹汗乃愈挾

雷公云凡使勿用顆大者號曰伏尸梔子無力須要如雀卵赤色者上凡使先去皮髮須了取仁以井華水浸一宿瘡出

食療主噤噩紫癜風心躁黃疸積熱心躁鱉血梔子仁燒灰治下大小多少服之

又方治下錢七服之量其大小多少服和

千金方治丈瘡未起赤腫子仁乃佳已成瘡燒白糖灰粉之燥即差

肘後方治霍亂心腹脹痛煩滿短氣未得吐下若轉筋燒梔子二七枚研末熟水調服

梅師方治火丹毒傳和水調傳之

又方治熱毒下血或因食物發動以三十枚擘水三升煎取一升去滓服

又方治熱病新差早起及多食後發以十枚水三升煎取一升去滓溫服卧令微汗若食不消加大黃三兩

又方治傷寒差後交接發動困欲死眼不開不能語梔子二十枚水三升煎取一升服

又方治霍亂心腹脹痛煩滿短氣未得吐下若轉筋燒梔子二十枚研末熟水調服

又方治熱毒下血或因食物發動以三十枚擘水三升煎取一升去滓服

普濟方治冷熱氣不和不思飲食心腹痛為刺山梔子用鳥頭等分生搗為末以酒糊丸如梧子大每服十丸加至二十丸煎生薑湯下如小腹氣痛炒過香葱酒再下二十丸

兵部手集治頭痛不可忍是多風熱所致梔子末和蜜濃傳舌上即止

勝金方治婦人臨產前不眠多時頭甚者不限多少燒灰細末空心熟水調一匙頭甚者不過五服

孫尚藥治傷寒下痢後更煩按之心下熨者虛煩也梔子十四枚擘豉四合右二味以水四升煎梔子取二升去滓分再服得吐餘內豉更煎取一升去滓分再服得吐餘勿服嘔有癡膿者不可服嘔膿盡乃愈

古今錄驗奉王散胃痈食多喜飲梔子實生之

丹房鏡源梔子柔金

衍義曰梔子仲景治發汗後虛煩不得眠若劇者必反覆顛倒心中懊憹梔子豉湯治之虛故不用大黃有寒毒故也梔子雖寒無毒治胃中熱氣既止血亦津液耐藏無用養內生虛熱非此物不可去張中景傷寒論已著又治心經留熱小便赤澁去皮山梔子火炮大黃連翹等分末之水煎三二錢匕服之無不效

廣州騏麟竭 出番禺

紫鉚礦騏麟竭味甘鹹平有小毒主五藏邪氣帶下止痛破積血金瘡生肉與騏麟馬蝗二物大同小異 唐本注云紫色如膠作赤黧畜皮及寶鈿用爲偶色亦以膠寶物云蟻於海畔樹藤皮中爲之紫鉚樹名渴黧騏麟竭樹名渴留俞如蜂造蜜所恨用之異全別紫鉚色赤而黑其葉大如盤鉚從葉上出騏麟竭色黃而赤味鹹平無毒主心腹卒痛止金瘡血生肌肉除邪氣久痛三角成竭從本中出如松脂唐本先附王石劉令按

鳥鴉鷓鴣 出廣州 日華子 云紫鉚無毒治一切惡瘡癰久

此藥性急亦不可多使却引膿

圖經曰騏麟竭舊不載所生州土今出南番諸國及廣州木高數丈婆娑可愛葉似櫰桃而有三角其脂液從木中流出滴下如膠飴狀久而堅乃成竭亦作血色故亦謂之血竭採無時其味鹹而氣腥者是海男血不可用真竭微咸而甘作梔子氣味舊說與紫鉚大都相類而別是一物功力亦殊今按段成式酉陽雜俎云紫鉚出貝膾國國人呼爲勒佉亦出波斯國木高丈許枝幹繁鬱葉似橘柚冬不凋落三月花開不結子每有露霧露微雨潔濡其枝條則爲紫鉚又交阯蠻斯國使人呼及沙利州人說如此而真嘴國使人言是蟻運上於木端作窠蟻懷爲露霧所霑即化爲紫鉚又交阯蠻志亦云本州歲貢紫鉚出於蟻壤乃知與血竭雖俱出於木而非一物明矣今醫方亦罕用惟染家所須耳

海藥 紫鉚謹按廣州記云生南海山谷其樹紫赤色是木中津液成也治崩瘀疼痛宜入膏用又可造胡燕脂餘滓則王作家使也又騏麟竭謹按南越志云是紫鉚樹之脂也其味甘温無毒主打傷利內傷血聚並宜酒服欲驗真僞但爇之不爛如蠟者上也

雷公云騏麟竭凡使勿用海母血真似騏麟竭只是味鹹甘似槌子氣是也欲使先研作粉重篩過臨使安於丸散或膏中任使用勿與衆藥同擣化作飛塵也

聖惠方 産後血暈不知人及任語齒噤一兩細研爲末非時温酒調二錢匕

廣利方 治金瘡血不止兼痛齒噤末傅之立止

貫相牛經 牛馬有漏蹄以紫礦火許和猪脂内入漏處燒鐵篦格之

酉陽雜俎 紫鉚樹出真臘國使衆都尉汝門陀汝尾援脆言蟻運土於樹下作窠蟻壤得雨露結而成紫礦豈

崙者一名波斯次

太清仙煉靈砂法 騏驎竭出於西胡禀於炎惑之氣生於湯石之陰結而成質紫鉚形若爛石其功亦

能添益陽精消陰滯氣

行義曰 紫鉚如糖霜結於細枝上累累然紫黑色研破則紅今人用造綿燭脂遜来亦難得餘如經

廣州龍腦

龍腦香及膏香味辛苦微寒一云温平無毒主心腹邪氣風濕積聚耳聾明目去目赤膚翳出婆律國形似白松脂作杉木氣明淨者善久經風日或如雀屎者不佳云合糯穀一作米炭相思子貯之則不耗膏主耳聾 唐本注云樹形似杉木言婆律膏是樹根下清脂龍腦是根中乾脂子似豆蔻皮有甲錯香似龍腦味辛尤下惡婆律國藥以國爲名即杉脂也無脂猶甘蕉無實唐本先附 注云龍腦香樹出婆利國呼

為箇不爽律亦出波斯國樹高丈餘葉圓而背白遠觀宛似龍腦香肥者出婆律膏香其樹有肥瘦瘦者出中波斯斷其樹剪取之入藥用有別法南海熙諸國云龍腦香從樹所取摩一切毒蟲咬人香止心腹氣令人香止一切蟲又主蠱毒取二七枚末服當熟問頭痛風痰殺腹藏及虫

圖經曰其木高七八丈大可六七圍葉圓而背白結實如豆蔻皮青乃根下清液耳有甲錯香即木中脂似白松亦謂之婆律膏陰成者狀如雞卵其外麤皮內白如脂也如

海藥主風腦帶之衣裓此今海南時有龍腦多用火煨成片其中亦容雜偽入藥惟貴生

南海舶賈客貨之相傳云七圍如積年杉木倣生枝於木端流出研木作坎而承云老根節方有之然極難得

時紫白龍腦皆如蝉蠟之形彼人名為龍腦帶又有蒼龍腦主風癇研末少許以新汲水

海藥主風癇研末少許以新汲水

弘景云生西海律國是波律樹中脂也如白香聞十餘步外是後不聞有香氣狀味苦辛微温無毒主內外障眼三蟲治五痔

唐太宗時西海諸國貢龍腦香是被處出月

紅鬚方治急中風目脾牙禁無問其口自開貼得下藥龍腦天

齒三二十揩大牙左右共

南星等分為末乳鉢內研自五日午

時合出者只用一字至半錢名開關散

經驗後方治時疾發瘧豆瘡及赤瘡子未透心煩狂躁氣喘

妄語或見鬼神龍腦一

一錢紫草湯下少時心

如雞頭肉大每服一

神便定得聽瘡復發透依常將息取安

衍義曰龍腦條中與圖經所說名

小兒風延閉壅及暴得

驚熱甚齊用然非常服之

亦相宜多則掩茶氣味

如松株葉異濕時無香採

吐因在南印度境有竭南蕃中香獸

之後斫之中有香獸

有方

亦

蜀州食茱萸

食茱萸味辛苦大熱無毒功用與吳茱萸同少為劣爾療水氣用之乃佳唐本注云皮濕闊口者是雖名為食茱萸而不堪多啖之也今按顆粒大經久色黃黑乃是食茱萸顆粒緊小久色青綠亦是吳茱萸今按陳藏器本草云食茱萸殺鬼毒及惡蟲毒起陽殺牙齒蟲痛唐本先附臣禹錫等謹按藥性論云食茱萸畏紫石英治冷痺腰脚軟弱通身刺痛腸風痔疾殺腸中三蟲去虛冷陳藏器云[illegible]皮殺牙齒蟲止痛本經已有吳茱萸云是口折者日[illegible]以吳地為好所以有吳之名兩處俱堪入食若[illegible]

[illegible]之與吳[illegible]同云食與不[illegible]口折者[illegible]不折者是陳藏器本經一名吳茱萸又云生宛朐宛朐[illegible]以出為食茱耳聾垂出一條

圖經曰食茱萸舊不載所出州土云功用與吳茱萸同或云即茱萸中顆粒大經久色黃黑堪啖者是今南北有之其木亦甚高大有長及百尺者枝莖青黃上有小白點葉正類油麻花黃蜀人呼其子為艾子蓋禮記所謂藙者艾聲訛故云耳宜入食羹中能發辛香然不可多食多食衝眼兼又脫髮採無時

食療温主心腹冷氣痛中惡除欬逆去藏腑冷能温中甚良又齒痛酒煎含之又殺鬼毒中賊風口偏不語者取子一升美豉三升以好酒五升和煮四五沸冷服半升日三四服得汗便差又皮肉痒痛酒二升水五升茱萸子半升煎取三升去滓微煖洗之立止又魚骨在腹中刺痛煮汁一盞服之其骨軟出又脚氣衝心和生薑煮汁飲之又魚骨刺入肉不出者擣封之其骨自爛而出又閉目者名欓子不堪食

孫真人食忌云六月七月勿食傷人氣發瘡痍

勝金方治蛇咬毒茱萸一兩為末冷水調分為三服立差

蕪荑



蕪荑味辛平無毒主五內邪氣散皮膚骨節中淫溫淫毒去三蟲化食逐寸白散腸中溫溫喘息一名無姑一名薾音藺
唐音晉生晉山川谷三月採實陰乾陶隱居云今惟出高麗狀如榆莢氣臭如煮酒人皆以竹醬食之性殺虫置物中亦辟蚘但患其臭耳爾雅云蕪荑(使味辛)一名薾(音藺)今俗名蕪荑唐本注者最好今注蕪荑河東河西處處有之狀如榆莢而闊以為惟出高麗蓋是不知

蕪荑 本云無姑其實亦名蕪荑注無姑如榆也生山中葉圓而厚剝取皮合漬之其味辛香所謂蕪荑也今近道亦有之大抵榆類而差小陶隱居云今惟出高麗狀如榆莢氣臭如煮酒人皆以竹醬食之性殺虫置物中亦辟蚘但患其臭耳爾雅云蕪荑(使味辛)一名薾(音藺)今俗名蕪荑唐本注者最好今注蕪荑河東河西處處有之狀如榆莢而闊以為惟出高麗蓋是不知

圖經曰蕪荑生晉山川谷今近道亦有之大抵榆類而差小其實亦早成比榆乃大氣臭如煮酒爾雅釋本云無姑榆也生山中葉圓而厚剝取皮合漬之其味辛香所謂蕪荑也今注云蕪荑(使味辛)一名薾(音藺)唐本注云蕪荑(使味辛)一名薾(音藺)陳藏器云蕪荑(使味辛)一名薾(音藺)蘇恭云薾(音藺)蕪荑相近蘇恭云薾(音藺)蕪荑相近陳藏器云蕪荑(使味辛)一名薾(音藺)蘇恭云薾(音藺)蕪荑相近

蕪荑生晉山川谷今近道亦有之大抵榆類而差小其實亦早成比榆乃大氣臭如煮酒爾雅釋本云無姑榆也生山中葉圓而厚剝取皮合漬之其味辛香所謂蕪荑也今注云蕪荑(使味辛)一名薾(音藺)唐本注云蕪荑(使味辛)一名薾(音藺)陳藏器云蕪荑(使味辛)一名薾(音藺)蘇恭云薾(音藺)蕪荑相近蘇恭云薾(音藺)蕪荑相近

入藥但可作食品耳秋後方始久積傳信方治久患脾胃氣泄不止蕪荑五兩擣末以飯九每日空心午飯前烙用膩米飲下三十九增至四十九久服去三尸益神駐顏云得之童癸魯得力

陳藏器作醬食之主五臟惡氣體者良此小雞病除瘡癬

海藥謹按廣州記云生大秦國是波斯蕪荑也味辛温無毒又婦人子宮風虛寒子腸瀉痢

詞子三五
莞良

食療小散腹中氣痛又和馬酪可治癬作醬甚香美功尤勝於榆仁塵者良又發中惡蟲毒

外臺秘要治鬲胱氣急宜下氣蕪荑部或下水惡汁并下氣住

千金方主脾胃有蟲食即痛面黃無色疼痛無時必効以石州蕪荑仁二兩和劑炒令黃色為末非時米飲調二錢匕

衍義曰蕪荑有大小兩種小蕪荑味尤辛入藥當用大蕪荑別有種然小蕪荑醞造多假以外物相和不可不擇去也治大腸寒滑及多冷氣不可關也須左以他藥為丸服又云性溫治大腸寒滑不可關也須左以他藥為丸服温而散走寒氣

汝州枳殼

枳殼味苦酸微寒無毒主風痒麻痺通利關節勞氣欬嗽背膊悶倦散留結胃膈痰滯逐水消脹滿大腸風安胃止風痛生商州山谷九月十月採陰乾用當去瓤核乃佳此與枳實主療稍別故特出此條今附

云枳殼如麻豆惡痒主腸風痔疾心腹浸淫煎含治齒痛消痰有氣加調五藏下氣止痛逆消痰治反胃霍亂瀉痢消食破癥結五膈氣除風明目及肺氣水腫利大小腸皮膚痒痛腫可炙熟入藥浸軟剉炒令熟

云建脾開胃

圖經文見枳實條下

陳藏器云根皮主野癬未服方寸匕本經採實用九月比為枳今江南俱有枳橘此自別種非千變易也

雷公云凡使勿使枳實緑性不同若使枳殼取辛苦腥并有隔油飢滴一切瘡要塵久年深者為佳用時先去瓤以麩炒過待麩焦黑遂出用布拭上焦黑然後置博如粉用

千金方主口僻眼急風枳殼上青為末欲至瓤上者得五升微火炒去濕氣以酒三升漬微火煖令得藥味盡性飲之

肘後方治中風身直不得俯仰及覆者刮枳橿皮一升酒三升清一宿服五合至一升酒盡再作良

食醫心鏡治水氣皮膚痒及明目枳殼一兩竹末如茶法煎服之

經驗後方治風瘴痒不止以枳殼三兩麩炒微黄去瓤為末每服二錢非時水一中盞煎至六分去滓服

梅師方治一切瘰癧以水煮枳殼為煎塗之乾即未塗之

博濟方治遠年近日腸風下血嵌痔不上枳殼燒成黑灰存性為末五錢炭末五錢和勻用濃米飲調下空心服五更初如行五里再服高小兒一服

必效方癭病初頭出痛不可忍枳殼於瘡灰中煨熟微研為末每服一錢至一錢半酒調下空心服

杜壬方瘦胎散昔胡陽公主難產方上進枳殼四兩牛膝兩為末每服空心大錢七如茶點服自五月後一服至臨月不惟易產仍無胎中惡病忌登高厠

衍義曰枳殼文具枳實條下

枳實味苦酸寒微寒無毒主大風在皮膚中如麻豆苦痒除寒熱結止痢長肌肉利五藏益氣輕身除胃脘痰癖逐得水

破結實消脹滿心下急痛逆氣膹風痛安胃氣止瘧洩明目生河內川澤九月十月採陰乾 陶隱居云今處處有採破香亦如橘皮以陳者爲良枳攩壅及皮療水脹恭風骨節疼急枳實俗方多用道家不須 唐本注云枳實曰乾乃得陰便濕爛也用當去核及中瓤乃佳今或用枳殼乃爾若稱枳實須恰移瓤用者殊不然也 今按陳藏器本草云枳實根皮主痞且辛舊云江南爲橘江北爲枳今江南俱有橘枳江北有枳無橘此自是種別非開變也臣味苦辛解傷寒結胸入脇胸湯用主上氣喘欬賢云傷冷陰瘧而用之氣加

圖經曰枳實生河內川澤枳殼生商州林谷今京西江湖州郡皆有之以商州者爲佳如橘而小高亦五七尺葉如棯多刺春生白花至秋成實九月十月採陰乾舊說七月八月採者爲枳殼今醫家多以厚而小者爲枳實完大者爲殼皆以臍膨近道所出者俗呼臭橘不甚用張仲景治心下堅大如盤水飲所作枳實木湯主之枳實七枚木一兩以水一斗煮取三升分三服腹中軟即稍消之又胃痺心中痞堅滿氣噎食不下迫氣槍心枳實芍藥各四兩厚朴三兩生薑四兩甘草一兩橘皮三兩白朮三兩以水五升先煮四物取二升去滓內枳實煮取一升半納朴更煮取一升分溫三服此名枳實湯治胸痺心中痞氣結在胸胸滿脇下逆氣槍心枳實薤白桂枝湯主之陳枳實四兩厚朴四兩薤白半斤桂枝一兩以水五升先煮四物取

外臺秘要 枳實湯治胸痺氣壅滿心胸不利枳實二枚麩炒黃黃芩三兩大棗十二枚水一斗煮取三升分溫三服日三夜一服 又方治胸痺胸中氣塞滿心胸不利枳實二枚麩炒黃黃芩三兩大棗十二枚水一斗煮取三升分溫三服日三夜一服 千金方治胸痺氣壅滿心胸不利枳實二枚麩炒黃黃芩三兩大棗十二枚水一斗煮取三升分溫三服日三夜一服 又方治積痢脫肛枳實石七磨令消犢著柄蜜塗炙令煖更易熨肛取縮即止 經驗方治腸風下血枳實半斤麩炒去瓤綿黃蕃末一錢七若難服以糊爲丸如梧子大空心飲下二十丸 集驗方治五痔不以年月久新枳實爲末煉蜜丸如桐子大空心飲下二十丸 濟衆方治傷寒後卒胸膈痛枳實一味剉麩炒黃爲末服二錢米飲調下一日二服 廣利方治小兒久痢冰澀不調枳實六分擣末以飲汁調二錢匕二歲兒一錢子母秘錄方同 子母秘錄治婦人陰腫堅扁用半斤碎炒令熟故帛裹熨冷即易之

衍義曰枳實枳殼一物也小則其性酷而速大則其性詳而緩故張仲景治傷寒倉卒之病承氣湯中用枳實其意也皆取其疎通決泄破結實之義他方但導敗風壅之氣可常服者故用枳殼其意如此

商州厚朴

歸州厚朴

厚朴 味苦温大温無毒 主中風傷寒頭痛寒熱驚悸氣盛痙
胃中冷逆胸中嘔不止洩痢淋露除驚去留熱心煩滿厚腸胃
名厚皮一名赤朴其樹名榛其子名遂折療氣喘明目益

生交阯寬句三九十月採皮陰乾草石消石 陶隱居云今出建平宜都極厚肉紫色爲好殺蟲而薄皮俗方多用道家不須也 楊等謹按吳氏云厚朴出洪農 藥性論云厚朴大熱能主瘕積年冷氣腹內雷鳴虛乳宿食不消除痰飲去結水破宿血消化水穀止痛大温胃氣嘔吐酸水主心腹滿病人虛而及膀胱泄五藏一切氣婦人産前産後腹藏不安調關節發腹 日華子云建脾主反胃霍乱轉筋冷熱氣瀉藏蟲除驚去煩悶明耳目入黃皮薑汁炙或薑汁炒用又名烈朴 圖經曰厚朴出交阯寬句今中絶(有之而以梓州龍州者爲上木高三四丈徑一二尺春生葉如柳葉四季不周紅花而青實皮極鱗皺而厚紫色多潤者佳薄而白者不堪三月九月十月採皮陰乾廣雅謂之重皮方書或作厚朴主腹脹脉數厚朴半斤枳實五升温服一升腹中轉動更服不五升內大黃四兩再煎取三升去滓温服入谷日三嘔者加半夏五合下利者去大黃動勿服又厚朴七物湯主腹痛脹滿厚朴半斤甘草大黃各三兩棗十枚大枳實五枚桂四升去滓温服八合日三嘔者加生薑至半斤陶隱居治霍乱寒多者加生薑五兩以水一斗煎取二升半温分再服不差心二兩枳實五枚生薑三兩四物切以水六升煎取二升

西京 陝西 江淮 湖南 蜀川 山谷

分三服唐石泉公主方慶廣南方云此方不惟霍乱可醫至於諸病皆療並須預排此也此方與治中湯等並行其方見人參條中

雷公曰凡使要用紫色味辛爲好或丸散便去麤皮用醋炙過每修一斤用酥四兩炙了細剉用若湯飲下使用自然薑汁入兩炙一斤爲度

聖惠方治霍亂氣嘔逆心胷滿悶不下飲食用一兩搗羅為散每服以薑汁炙令黃爲末非時新水調下二錢匕

又方治痰壅咽喉氣急生薑汁炙令黃爲末非時粥飲調下二錢匕

梅師方治男子女人久患氣脹心悶飲食不得因食不調冷熱相擊致令心腹脹滿厚朴三兩炙令上香斗門方治男子女人久患氣脹心悶飲食不得因食不調冷熱相擊致令心腹脹滿厚朴火上炙令乾又醮薑汁炙令上香劍直符焦黑為度擣篩如麵以陳米飲調下二錢匕日二服良亦治反胃止嘔甚效

千毋秘錄治心腹一切氣痛不通厚朴三兩炙令香心不過三四劑差一升為三服空

衍義曰厚朴今西京伊陽縣及商州亦有但薄而色不如衍州者厚而紫色有油味苦不以薑製則棘人

平胃散中用最調中至今生薑製則溫胃急不能下氣為佳

茗荈苦搽茗味甘苦微寒無毒主瘻瘡利小便去痰熱渴令人少睡春採之

苦搽主下氣消宿食作飲加葉荊芥薄荷等良

本經主云爾雅釋木云檟苦搽主圖小似梔子冬生葉可煮作羹飲今呼早採者爲茶晚取者爲茗一名荈蜀人名之苦荼生山南漢中山谷人下品陳藏器本草云苦搽寒破熱氣除痺氣利大小腸食之宜熱令即聚痰搽是茗嫩葉搗成餅並得火良久食令人瘦去人黠使不睡唐附先

圖經曰茗苦搽舊不注所出州郡今閩浙蜀則江湖淮南山中皆有之爾雅所謂檟苦搽郭璞云禾小似梔子冬生葉可煑作羹飲今呼早採者為荼晚採者為茗一名荈蜀人謂之苦茶是也今通謂之茶茶荼聲近故呼之春中始生嫩葉蒸焙去苦水末之乃可飲與古所食殊不同也茶經曰茶者南方佳木自一尺二尺至數十尺其巴川峽山有兩人合抱者伐而掇之木如小蘆葉如梔子花如白薔薇實如栟櫚蔕如丁香根如胡桃其名一曰茶二曰檟三曰蔎音設四曰茗五曰荈又曰茶之別者有枳殼芽枸杞芽枇杷芽皆治風疾又有皂莢芽槐芽柳芽乃上春摘其芽和茶作之故今南人輸官茶往往雜以衆葉惟茅蘆竹箬之類不可入自餘山中草木芽葉皆可和合椿柹尤奇其茶性極冷惟雅州蒙山出者溫而主疾茶譜云蒙山有五頂頂有茶園其中頂曰上清峯昔有僧人病冷且久遇一老父謂曰蒙之中頂茶當以春分之先後多聚人力俟雷之發聲併手採摘三日而止若獲一兩以本處水煎服即能祛宿疾二兩當眼前無疾三兩固以換骨四兩即為地仙矣其僧如說獲一兩餘服未盡而疾差其四項茶園採摘不廢惟中峯草木繁密雲霧蔽虧鷙獸時出故人跡不到矣近歲稍貴此品製作亦精於他處其性以不甚冷大都飲茶少勤醒神思過多則致疾病故唐毋景茶飲序云釋滯消壅一日之利暫佳瘠氣侵精終身之累斯大是也

食療云茶葉利大腸去熱解痰煮取汁用煮粥良又茶主下氣除好睡消宿食當日成者良蒸擣經宿用陳故者即動風發氣市人有用槐柳初生嫩芽葉雜之

外臺秘要治卒頭痛如破非中冷非中風其痛是胃膈有痰厥氣上衝所致名為厥頭痛吐之即差單煮茗作飲二三升適冷煖飲一二升須臾吐吐畢又飲能如此數過劇者須吐膽汁乃止不損人待渴即差

食醫心鏡主赤白痢及熱毒痢好茶一斤炙擣末濃煎一二盞喫差如久患痢亦宜服又治氣壅暨腰痛轉動不得煎茶五合投醋二合頓服

經驗方治陰囊上瘡用蠟面茶為末先以甘草煎水洗後用貼妙

兵部手集治心痛不可忍十年五年者煎湖州茶以頭醋和服之良

勝金方治蠼螋尿人成瘡初如糝粟漸大如豆更大如火烙漿疱疼痛至甚速用草茶并蠟茶俱可以生油調傅止其痛藥至立止妙

別說云謹按本注引爾雅云檟苦荼作羹[illegible]非此也其嫩者云今之茶[illegible]者又之[illegible]二者安可作羹是知是非此圖經之閩浙蜀荊江湖淮南山中皆有之然則性類各異近世蒙頂[illegible]建州北苑數處產此性味獨與[illegible]名[illegible]治作餅日得火愈良其他者[illegible]丸大便更不可久收其

色味苦微寒 大寒無毒 主風
毒瀼渾洗瘙瘕陰蝕目中
青翳白膜 療男子小精婦人帶下小兒瘡身熱可作洗目湯
久眼頭不白輕身 皮膚光澤肥大有子一名岑皮一名石檀
生廬江川谷及寃句二月八月 採皮陰乾 大戟為之使惡吳茱萸惡葛根居
云是樊槐音規皮而水漬以和墨書色不脫微青且亦殊簿
恐不必爾俗方惟以療目道家亦有用處 唐本注云北樹似
檀葉細皮有白點而不麤俗見味苦名爲苦樹 皮療眼有效以葉似檀故
色者是俗見味苦名爲苦樹 皮療眼有效以葉似檀故

名石檀也 日華子諸家藥性論 云秦白皮平惡苦熱方
主明目去肝中久熱兩目赤腫疼痛風淚不止治小兒身熱
作瀉浴差皮一升水煎濾去滓洗赤眼極效 日華子云
洗肝益精明目小兒熱驚皮一名盆柱

圖經曰 秦皮生羌川谷及河陽亦有
秦皮之其木大都似檀枝葉皆青綠色葉如槐頭許大而
不光並無花實根似槐二月八月採皮乾其皮有白點
而不麤錯俗呼爲白蜡木取皮燒之青色書紙看之青色者
是此爲真也

外臺秘要治赤眼及睛上膠青翳方

秦皮一兩清水一升於白瓷
中浸春夏一食時以上看碧色出即以盦頭擣

色味苦微寒 北京西生 暑合 其不 衍義曰 芽爲 如針 顆又 日之 晚採 皆可 用信之 近人以建茶治 羽茶經丁謂北苑茶錄毛 對其說甚詳然古人謂其 新芽一發使長寸餘微麤 刀皆有餘故也如雀舌麥 皆人有言曰釋滯消癰一 原其始終又言溫噦上表 者爲茶 也

錦仰卧點所患眼仍亢從之曹中滿氣著微痛不畏良久三
玉斛間即側卧瞼却熱汁每日十畏仁上著不過兩日差
又方治眼因赤差後昏暈奉皮一兩切水一升五合煮取七合溫言
淮南子稔木色青翳雨纍藉蜀蜜皮一日中
藥也注茶苦歷木水浸而瀕也天蛇即草間黃花如
沈存中蛛是也人被其螫仍爲露水所濡乃成此疾遂煮汁
一斗飲之差

越州秦椒

歸州秦椒

秦椒味辛温生温熟寒有毒

主風邪氣温中除寒痺堅齒明目

療陰痺吐逆疝瘕去老血産後餘疾腹痛出汗利五藏

久服輕身好顏色耐老增年通神

生太山川谷及秦嶺上或琅琊八月九月採實

或呼爲大椒又云即今椽居蛇切樹而椽子是偕椒恐譌曹本注云秦椒樹葉及莖子都似蜀椒但味短實細藍田南秦嶺間大有也

弘景曰 蜀椒出武都赤色者善秦椒出天水隴西者善其實麤而肉厚口面皆赤裂開三生子爲瘢痕者是也

恭曰 秦椒生太山川谷及秦嶺上今秦鳳及明越間亦有蜀椒生秦川谷及秦嶺上或琅琊今秦鳳及明越間亦有

藏器曰 秦椒生秦川谷及秦嶺上或琅琊今秦鳳及明越間亦有蜀椒生秦川谷及秦嶺上或琅琊今秦鳳及明越間亦有

時珍曰 蜀椒出武都赤色者善秦椒出天水隴西者善其實麤而肉厚口面皆赤裂開三生子爲瘢痕者是也

發明

弘景曰 椒能溫中故療陰痺吐逆疝瘕也

恭曰 椒能溫中故療陰痺吐逆疝瘕也

藏器曰 椒能溫中故療陰痺吐逆疝瘕也

時珍曰 椒能溫中故療陰痺吐逆疝瘕也

附方

新一 治風邪氣温中除寒痺堅齒明目療陰痺吐逆疝瘕去老血産後餘疾腹痛出汗利五藏久服輕身好顏色耐老增年通神秦椒味辛温生温熟寒有毒

新二 治齒痛蜀椒煎湯含之又擣瘡上冷即易之又法去閉口

新三 治瘡中風者以椽作膏塗瘡温氣

新四 治惡風遍身四肢痺搖動主女人月閉不通治產後惡血痢多年冷痛孟詵云秦椒君味苦辛氣温

新五 治齒痛蜀椒煎湯含之又擣瘡上冷即易之又法去閉口

新六 治瘡中風者以椽作膏塗瘡温氣

新七 治惡風遍身四肢痺搖動主女人月閉不通治產後惡血痢多年冷痛孟詵云秦椒君味苦辛氣温

發明

時珍曰 椒能溫中故療陰痺吐逆疝瘕也

附方

新一 治風邪氣温中除寒痺堅齒明目療陰痺吐逆疝瘕去老血産後餘疾腹痛出汗利五藏久服輕身好顏色耐老增年通神秦椒味辛温生温熟寒有毒

新二 治齒痛蜀椒煎湯含之又擣瘡上冷即易之又法去閉口

新三 治瘡中風者以椽作膏塗瘡温氣

新四 治惡風遍身四肢痺搖動主女人月閉不通治產後惡血痢多年冷痛孟詵云秦椒君味苦辛氣温

新五 治齒痛蜀椒煎湯含之又擣瘡上冷即易之又法去閉口

新六 治瘡中風者以椽作膏塗瘡温氣

新七 治惡風遍身四肢痺搖動主女人月閉不通治產後惡血痢多年冷痛孟詵云秦椒君味苦辛氣温

圖經曰

秦椒生秦川谷及秦嶺上或琅琊今秦鳳及明越間亦有蜀椒生秦川谷及秦嶺上或琅琊今秦鳳及明越間亦有

金商州者之初發生葉及莖子都似蜀椒但味短實細藍田南秦嶺間大有也

隱居云似椒而大色黃黑味亦頗有椒氣恐譌耳

蜀椒但實細赤裂開三生子爲瘢痕者是也

時珍曰詩言椒云椒聊且蕃衍盈升又言椒聊之實蕃衍盈掖又言椒聊且遠條且

治爲撒詩言椒云椒聊且蕃衍盈升又言椒聊之實蕃衍盈掖又言椒聊且遠條且

堅而滑蜀人作茶吳人作茶者皆是也今成皐諸

山謂之竹葉椒其木亦如蜀椒
中又用葱雞脯最佳葉皆相似于長
而不圓其味如椒而辣易辨
擣香而今每見新生一種葉實大
說正相合嘗以實大者為正宋撒北
今人葉短蓋一二人新舍與今異
云作飲加葱姜煮熟心豎等良久
云撒氣新下言開之益下不上
肘後方治卒患心腹痛益氣
傷寒類要治傷寒人發汗不
續十全方治傷寒一分未
衍義曰春夏多方書服一分
異物秦地有之
蜀種樹如

使惡梗梗防風防己 陶隱居云出近道諸山中大樹子初甚
未乾赤色如胡蘭子亦可酢既乾皮甚薄當以合核爲用爾

臣禹錫等謹按本性論 云上月水不定補腎氣以陽道堅長陰衰添精髓療耳鳴除面上瘡主能發汗止老人尿不節一切風逐一切氣破癥結治酒鼾小兒食之當果子止水痢生平林間樹高丈餘葉陰白冬不凋冬花春熟最早諸果蔬及葉煮汁飼狗王瘍又有一種大相似冬凋春實夏熟人呼爲木半夏無別功根平無毒根皮煎湯洗惡瘡疥并犬馬瘡癩

圖經曰 山茱萸生漢中山谷及琅邪宛句東海承縣今海州亦有之木高丈餘葉似榆花白子初熟未乾赤色似胡蘭子有核亦可啖既乾皮甚薄九月十月採實陰乾云普云一名蜀棗矣葉如梅有刺毛二月花如杏四月實如酸棗赤五月採實每一斤去核取肉皮用只是一物子一斤去核取肉皮用只是一物蘇云是一物不可用也

雷公云 凡使勿用雀兒蘇真似山茱萸只是核八稜不八肉皮用只可成四兩已來經須去內核每修事去核了一斤取之用只可成四兩已來經須去內核每修事去核了一斤取

行義曰 山茱萸與吳茱萸甚不相類山茱萸色紅大如棗子初結子時其大小亦不過豌豆吳茱萸如川椒初結子時其大小亦不過豌

臣禹錫等謹按本性論 云山茱萸使味酸辛大熱治腦骨痛上瘡主能發汗止老人尿不節一切風逐一切氣破癥結治酒鼾小兒食之當果子止水痢生平林間樹高丈餘葉陰白冬不凋冬花春熟最早諸果蔬及葉煮汁飼狗王瘍又有一種大相似冬凋春實夏熟人呼爲木半夏無別功根平無毒根皮煎湯洗惡瘡疥并犬馬瘡癩

圖經曰 山茱萸生漢中山谷及琅邪宛句東海承縣今海州亦有之木高丈餘葉似榆花白子初熟未乾赤色似胡蘭子有核亦可啖既乾皮甚薄九月十月採實陰乾云普云一名蜀棗矣葉如梅有刺毛二月花如杏四月實如酸棗赤五月採實每一斤去核取肉皮用只是一物子一斤去核取肉皮用只是一物蘇云是一物不可用也

雷公云 凡使勿用雀兒蘇真似山茱萸只是核八稜不八肉皮用只可成四兩已來經須去內核每修事去核了一斤取之用只可成四兩已來經須去內核每修事去核了一斤取

行義曰 山茱萸與吳茱萸甚不相類山茱萸色紅大如棗子初結子時其大小亦不過豌豆吳茱萸如川椒初結子時其大小亦不過豌

臣禹錫等謹按本性論 云山茱萸使味酸辛大熱治腦骨痛上瘡主能發汗止老人尿不節一切風逐一切氣破癥結治酒鼾小兒食之當果子止水痢生平林間樹高丈餘葉陰白冬不凋冬花春熟最早諸果蔬及葉煮汁飼狗王瘍又有一種大相似冬凋春實夏熟人呼爲木半夏無別功根平無毒根皮煎湯洗惡瘡疥并犬馬瘡癩

圖經曰 山茱萸生漢中山谷及琅邪宛句東海承縣今海州亦有之木高丈餘葉似榆花白子初熟未乾赤色似胡蘭子有核亦可啖既乾皮甚薄九月十月採實陰乾云普云一名蜀棗矣葉如梅有刺毛二月花如杏四月實如酸棗赤五月採實每一斤去核取肉皮用只是一物子一斤去核取肉皮用只是一物蘇云是一物不可用也

雷公云 凡使勿用雀兒蘇真似山茱萸只是核八稜不八肉皮用只可成四兩已來經須去內核每修事去核了一斤取之用只可成四兩已來經須去內核每修事去核了一斤取

行義曰 山茱萸與吳茱萸甚不相類山茱萸色紅大如棗子初結子時其大小亦不過豌豆吳茱萸如川椒初結子時其大小亦不過豌

臣禹錫等謹按本性論 云山茱萸使味酸辛大熱治腦骨痛上瘡主能發汗止老人尿不節一切風逐一切氣破癥結治酒鼾小兒食之當果子止水痢生平林間樹高丈餘葉陰白冬不凋冬花春熟最早諸果蔬及葉煮汁飼狗王瘍又有一種大相似冬凋春實夏熟人呼爲木半夏無別功根平無毒根皮煎湯洗惡瘡疥并犬馬瘡癩

圖經曰 山茱萸生漢中山谷及琅邪宛句東海承縣今海州亦有之木高丈餘葉似榆花白子初熟未乾赤色似胡蘭子有核亦可啖既乾皮甚薄九月十月採實陰乾云普云一名蜀棗矣葉如梅有刺毛二月花如杏四月實如酸棗赤五月採實每一斤去核取肉皮用只是一物子一斤去核取肉皮用只是一物蘇云是一物不可用也

雷公云 凡使勿用雀兒蘇真似山茱萸只是核八稜不八肉皮用只可成四兩已來經須去內核每修事去核了一斤取之用只可成四兩已來經須去內核每修事去核了一斤取

行義曰 山茱萸與吳茱萸甚不相類山茱萸色紅大如棗子初結子時其大小亦不過豌豆吳茱萸如川椒初結子時其大小亦不過豌

臣禹錫等謹按本性論 云山茱萸使味酸辛大熱治腦骨痛上瘡主能發汗止老人尿不節一切風逐一切氣破癥結治酒鼾小兒食之當果子止水痢生平林間樹高丈餘葉陰白冬不凋冬花春熟最早諸果蔬及葉煮汁飼狗王瘍又有一種大相似冬凋春實夏熟人呼爲木半夏無別功根平無毒根皮煎湯洗惡瘡疥并犬馬瘡癩

圖經曰 山茱萸生漢中山谷及琅邪宛句東海承縣今海州亦有之木高丈餘葉似榆花白子初熟未乾赤色似胡蘭子有核亦可啖既乾皮甚薄九月十月採實陰乾云普云一名蜀棗矣葉如梅有刺毛二月花如杏四月實如酸棗赤五月採實每一斤去核取肉皮用只是一物子一斤去核取肉皮用只是一物蘇云是一物不可用也

雷公云 凡使勿用雀兒蘇真似山茱萸只是核八稜不八肉皮用只可成四兩已來經須去內核每修事去核了一斤取之用只可成四兩已來經須去內核每修事去核了一斤取

行義曰 山茱萸與吳茱萸甚不相類山茱萸色紅大如棗子初結子時其大小亦不過豌豆吳茱萸如川椒初結子時其大小亦不過豌

臣禹錫等謹按本性論 云山茱萸使味酸辛大熱治腦骨痛上瘡主能發汗止老人尿不節一切風逐一切氣破癥結治酒鼾小兒食之當果子止水痢生平林間樹高丈餘葉陰白冬不凋冬花春熟最早諸果蔬及葉煮汁飼狗王瘍又有一種大相似冬凋春實夏熟人呼爲木半夏無別功根平無毒根皮煎湯洗惡瘡疥并犬馬瘡癩

圖經曰 山茱萸生漢中山谷及琅邪宛句東海承縣今海州亦有之木高丈餘葉似榆花白子初熟未乾赤色似胡蘭子有核亦可啖既乾皮甚薄九月十月採實陰乾云普云一名蜀棗矣葉如梅有刺毛二月花如杏四月實如酸棗赤五月採實每一斤去核取肉皮用只是一物子一斤去核取肉皮用只是一物蘇云是一物不可用也

雷公云 凡使勿用雀兒蘇真似山茱萸只是核八稜不八肉皮用只可成四兩已來經須去內核每修事去核了一斤取之用只可成四兩已來經須去內核每修事去核了一斤取

行義曰 山茱萸與吳茱萸甚不相類山茱萸色紅大如棗子初結子時其大小亦不過豌豆吳茱萸如川椒初結子時其大小亦不過豌

臣禹錫等謹按本性論 云山茱萸使味酸辛大熱治腦骨痛上瘡主能發汗止老人尿不節一切風逐一切氣破癥結治酒鼾小兒食之當果子止水痢生平林間樹高丈餘葉陰白冬不凋冬花春熟最早諸果蔬及葉煮汁飼狗王瘍又有一種大相似冬凋春實夏熟人呼爲木半夏無別功根平無毒根皮煎湯洗惡瘡疥并犬馬瘡癩

圖經曰 山茱萸生漢中山谷及琅邪宛句東海承縣今海州亦有之木高丈餘葉似榆花白子初熟未乾赤色似胡蘭子有核亦可啖既乾皮甚薄九月十月採實陰乾云普云一名蜀棗矣葉如梅有刺毛二月花如杏四月實如酸棗赤五月採實每一斤去核取肉皮用只是一物子一斤去核取肉皮用只是一物蘇云是一物不可用也

雷公云 凡使勿用雀兒蘇真似山茱萸只是核八稜不八肉皮用只可成四兩已來經須去內核每修事去核了一斤取之用只可成四兩已來經須去內核每修事去核了一斤取

行義曰 山茱萸與吳茱萸甚不相類山茱萸色紅大如棗子初結子時其大小亦不過豌豆吳茱萸如川椒初結子時其大小亦不過豌

臣禹錫等謹按本性論 云山茱萸使味酸辛大熱治腦骨痛上瘡主能發汗止老人尿不節一切風逐一切氣破癥結治酒鼾小兒食之當果子止水痢生平林間樹高丈餘葉陰白冬不凋冬花春熟最早諸果蔬及葉煮汁飼狗王瘍又有一種大相似冬凋春實夏熟人呼爲木半夏無別功根平無毒根皮煎湯洗惡瘡疥并犬馬瘡癩

圖經曰 山茱萸生漢中山谷及琅邪宛句東海承縣今海州亦有之木高丈餘葉似榆花白子初熟未乾赤色似胡蘭子有核亦可啖既乾皮甚薄九月十月採實陰乾云普云一名蜀棗矣葉如梅有刺毛二月花如杏四月實如酸棗赤五月採實每一斤去核取肉皮用只是一物子一斤去核取肉皮用只是一物蘇云是一物不可用也

雷公云 凡使勿用雀兒蘇真似山茱萸只是核八稜不八肉皮用只可成四兩已來經須去內核每修事去核了一斤取之用只可成四兩已來經須去內核每修事去核了一斤取

行義曰 山茱萸與吳茱萸甚不相類山茱萸色紅大如棗子初結子時其大小亦不過豌豆吳茱萸如川椒初結子時其大小亦不過豌

臣禹錫等謹按本性論 云山茱萸使味酸辛大熱治腦骨痛上瘡主能發汗止老人尿不節一切風逐一切氣破癥結治酒鼾小兒食之當果子止水痢生平林間樹高丈餘葉陰白冬不凋冬花春熟最早諸果蔬及葉煮汁飼狗王瘍又有一種大相似冬凋春實夏熟人呼爲木半夏無別功根平無毒根皮煎湯洗惡瘡疥并犬馬瘡癩

圖經曰 山茱萸生漢中山谷及琅邪宛句東海承縣今海州亦有之木高丈餘葉似榆花白子初熟未乾赤色似胡蘭子有核亦可啖既乾皮甚薄九月十月採實陰乾云普云一名蜀棗矣葉如梅有刺毛二月花如杏四月實如酸棗赤五月採實每一斤去核取肉皮用只是一物子一斤去核取肉皮用只是一物蘇云是一物不可用也

雷公云 凡使勿用雀兒蘇真似山茱萸只是核八稜不八肉皮用只可成四兩已來經須去內核每修事去核了一斤取之用只可成四兩已來經須去內核每修事去核了一斤取

行義曰 山茱萸與吳茱萸甚不相類山茱萸色紅大如棗子初結子時其大小亦不過豌豆吳茱萸如川椒初結子時其大小亦不過豌

臣禹錫等謹按本性論 云山茱萸使味酸辛大熱治腦骨痛上瘡主能發汗止老人尿不節一切風逐一切氣破癥結治酒鼾小兒食之當果子止水痢生平林間樹高丈餘葉陰白冬不凋冬花春熟最早諸果蔬及葉煮汁飼狗王瘍又有一種大相似冬凋春實夏熟人呼爲木半夏無別功根平無毒根皮煎湯洗惡瘡疥并犬馬瘡癩

圖經曰 山茱萸生漢中山谷及琅邪宛句東海承縣今海州亦有之木高丈餘葉似榆花白子初熟未乾赤色似胡蘭子有核亦可啖既乾皮甚薄九月十月採實陰乾云普云一名蜀棗矣葉如梅有刺毛二月花如杏四月實如酸棗赤五月採實每一斤去核取肉皮用只是一物子一斤去核取肉皮用只是一物蘇云是一物不可用也

雷公云 凡使勿用雀兒蘇真似山茱萸只是核八稜不八肉皮用只可成四兩已來經須去內核每修事去核了一斤取之用只可成四兩已來經須去內核每修事去核了一斤取

行義曰 山茱萸與吳茱萸甚不相類山茱萸色紅大如棗子初結子時其大小亦不過豌豆吳茱萸如川椒初結子時其大小亦不過豌

臣禹錫等謹按本性論 云山茱萸使味酸辛大熱治腦骨痛上瘡主能發汗止老人尿不節一切風逐一切氣破癥結治酒鼾小兒食之當果子止水痢生平林間樹高丈餘葉陰白冬不凋冬花春熟最早諸果蔬及葉煮汁飼狗王瘍又有一種大相似冬凋春實夏熟人呼爲木半夏無別功根平無毒根皮煎湯洗惡瘡疥并犬馬瘡癩

圖經曰 山茱萸生漢中山谷及琅邪宛句東海承縣今海州亦有之木高丈餘葉似榆花白子初熟未乾赤色似胡蘭子有核亦可啖既乾皮甚薄九月十月採實陰乾云普云一名蜀棗矣葉如梅有刺毛二月花如杏四月實如酸棗赤五月採實每一斤去核取肉皮用只是一物子一斤去核取肉皮用只是一物蘇云是一物不可用也

雷公云 凡使勿用雀兒蘇真似山茱萸只是核八稜不八肉皮用只可成四兩已來經須去內核每修事去核了一斤取之用只可成四兩已來經須去內核每修事去核了一斤取

行義曰 山茱萸與吳茱萸甚不相類山茱萸色紅大如棗子初結子時其大小亦不過豌豆吳茱萸如川椒初結子時其大小亦不過豌

臣禹錫等謹按本性論 云山茱萸使味酸辛大熱治腦骨痛上瘡主能發汗止老人尿不節一切風逐一切氣破癥結治酒鼾小兒食之當果子止水痢生平林間樹高丈餘葉陰白冬不凋冬花春熟最早諸果蔬及葉煮汁飼狗王瘍又有一種大相似冬凋春實夏熟人呼爲木半夏無別功根平無毒根皮煎湯洗惡瘡疥并犬馬瘡癩

圖經曰 山茱萸生漢中山谷及琅邪宛句東海承縣今海州亦有之木高丈餘葉似榆花白子初熟未乾赤色似胡蘭子有核亦可啖既乾皮甚薄九月十月採實陰乾云普云一名蜀棗矣葉如梅有刺毛二月花如杏四月實如酸棗赤五月採實每一斤去核取肉皮用只是一物子一斤去核取肉皮用只是一物蘇云是一物不可用也

雷公云 凡使勿用雀兒蘇真似山茱萸只是核八稜不八肉皮用只可成四兩已來經須去內核每修事去核了一斤取之用只可成四兩已來經須去內核每修事去核了一斤取

行義曰 山茱萸與吳茱萸甚不相類山茱萸色紅大如棗子初結子時其大小亦不過豌豆吳茱萸如川椒初結子時其大小亦不過豌

臣禹錫等謹按本性論 云山茱萸使味酸辛大熱治腦骨痛上瘡主能發汗止老人尿不節一切風逐一切氣破癥結治酒鼾小兒食之當果子止水痢生平林間樹高丈餘葉陰白冬不凋冬花春熟最早諸果蔬及葉煮汁飼狗王瘍又有一種大相似冬凋春實夏熟人呼爲木半夏無別功根平無毒根皮煎湯洗惡瘡疥并犬馬瘡癩

圖經曰 山茱萸生漢中山谷及琅邪宛句東海承縣今海州亦有之木高丈餘葉似榆花白子初熟未乾赤色似胡蘭子有核亦可啖既乾皮甚薄九月十月採實陰乾云普云一名蜀棗矣葉如梅有刺毛二月花如杏四月實如酸棗赤五月採實每一斤去核取肉皮用只是一物子一斤去核取肉皮用只是一物蘇云是一物不可用也

雷公云 凡使勿用雀兒蘇真似山茱萸只是核八稜不八肉皮用只可成四兩已來經須去內核每修事去核了一斤取之用只可成四兩已來經須去內核每修事去核了一斤取

行義曰 山茱萸與吳茱萸甚不相類山茱萸色紅大如棗子初結子時其大小亦不過豌豆吳茱萸如川椒初結子時其大小亦不過豌

臣禹錫等謹按本性論 云山茱萸使味酸辛大熱治腦骨痛上瘡主能發汗止老人尿不節一切風逐一切氣破癥結治酒鼾小兒食之當果子止水痢生平林間樹高丈餘葉陰白冬不凋冬花春熟最早諸果蔬及葉煮汁飼狗王瘍又有一種大相似冬凋春實夏熟人呼爲木半夏無別功根平無毒根皮煎湯洗惡瘡疥并犬馬瘡癩

圖經曰 山茱萸生漢中山谷及琅邪宛句東海承縣今海州亦有之木高丈餘葉似榆花白子初熟未乾赤色似胡蘭子有核亦可啖既乾皮甚薄九月十月採實陰乾云普云一名蜀棗矣葉如梅有刺毛二月花如杏四月實如酸棗赤五月採實每一斤去核取肉皮用只是一物子一斤去核取肉皮用只是一物蘇云是一物不可用也

雷公云 凡使勿用雀兒蘇真似山茱萸只是核八稜不八肉皮用只可成四兩已來經須去內核每修事去核了一斤取之用只可成四兩已來經須去內核每修事去核了一斤取

行義曰 山茱萸與吳茱萸甚不相類山茱萸色紅大如棗子初結子時其大小亦不過豌豆吳茱萸如川椒初結子時其大小亦不過豌

臣禹錫等謹按本性論 云山茱萸使味酸辛大熱治腦骨痛上瘡主能發汗止老人尿不節一切風逐一切氣破癥結治酒鼾小兒食之當果子止水痢生平林間樹高丈餘葉陰白冬不凋冬花春熟最早諸果蔬及葉煮汁飼狗王瘍又有一種大相似冬凋春實夏熟人呼爲木半夏無別功根平無毒根皮煎湯洗惡瘡疥并犬馬瘡癩

圖經曰 山茱萸生漢中山谷及琅邪宛句東海承縣今海州亦有之木高丈餘葉似榆花白子初熟未乾赤色似胡蘭子有核亦可啖既乾皮甚薄九月十月採實陰乾云普云一名蜀棗矣葉如梅有刺毛二月花如杏四月實如酸棗赤五月採實每一斤去核取肉皮用只是一物子一斤去核取肉皮用只是一物蘇云是一物不可用也

雷公云 凡使勿用雀兒蘇真似山茱萸只是核八稜不八肉皮用只可成四兩已來經須去內核每修事去核了一斤取之用只可成四兩已來經須去內核每修事去核了一斤取

行義曰 山茱萸與吳茱萸甚不相類山茱萸色紅大如棗子初結子時其大小亦不過豌豆吳茱萸如川椒初結子時其大小亦不過豌

臣禹錫等謹按本性論 云山茱萸使味酸辛大熱治腦骨痛上瘡主能發汗止老人尿不節一切風逐一切氣破癥結治酒鼾小兒食之當果子止水痢生平林間樹高丈餘葉陰白冬不凋冬花春熟最早諸果蔬及葉煮汁飼狗王瘍又有一種大相似冬凋春實夏熟人呼爲木半夏無別功根平無毒根皮煎湯洗惡瘡疥并犬馬瘡癩

圖經曰 山茱萸生漢中山谷及琅邪宛句東海承縣今海州亦有之木高丈餘葉似榆花白子初熟未乾赤色似胡蘭子有核亦可啖既乾皮甚薄九月十月採實陰乾云普云一名蜀棗矣葉如梅有刺毛二月花如杏四月實如酸棗赤五月採實每一斤去核取肉皮用只是一物子一斤去核取肉皮用只是一物蘇云是一物不可用也

雷公云 凡使勿用雀兒蘇真似山茱萸只是核八稜不八肉皮用只可成四兩已來經須去內核每修事去核了一斤取之用只可成四兩已來經須去內核每修事去核了一斤取

行義曰 山茱萸與吳茱萸甚不相類山茱萸色紅大如棗子初結子時其大小亦不過豌豆吳茱萸如川椒初結子時其大小亦不過豌

臣禹錫等謹按本性論 云山茱萸使味酸辛大熱治腦骨痛上瘡主能發汗止老人尿不節一切風逐一切氣破癥結治酒鼾小兒食之當果子止水痢生平林間樹高丈餘葉陰白冬不凋冬花春熟最早諸果蔬及葉煮汁飼狗王瘍又有一種大相似冬凋春實夏熟人呼爲木半夏無別功根平無毒根皮煎湯洗惡瘡疥并犬馬瘡癩

圖經曰 山茱萸生漢中山谷及琅邪宛句東海承縣今海州亦有之木高丈餘葉似榆花白子初熟未乾赤色似胡蘭子有核亦可啖既乾皮甚薄九月十月採實陰乾云普云一名蜀棗矣葉如梅有刺毛二月花如杏四月實如酸棗赤五月採實每一斤去核取肉皮用只是一物子一斤去核取肉皮用只是一物蘇云是一物不可用也

雷公云 凡使勿用雀兒蘇真似山茱萸只是核八稜不八肉皮用只可成四兩已來經須去內核每修事去核了一斤取之用只可成四兩已來經須去內核每修事去核了一斤取

行義曰 山茱萸與吳茱萸甚不相類山茱萸色紅大如棗子初結子時其大小亦不過豌豆吳茱萸如川椒初結子時其大小亦不過豌

臣禹錫等謹按本性論 云山茱萸使味酸辛大熱治腦骨痛上瘡主能發汗止老人尿不節一切風逐一切氣破癥結治酒鼾小兒食之當果子止水痢生平林間樹高丈餘葉陰白冬不凋冬花春熟最早諸果蔬及葉煮汁飼狗王瘍又有一種大相似冬凋春實夏熟人呼爲木半夏無別功根平無毒根皮煎湯洗惡瘡疥并犬馬瘡癩

圖經曰 山茱萸生漢中山谷及琅邪宛句東海承縣今海州亦有之木高丈餘葉似榆花白子初熟未乾赤色似胡蘭子有核亦可啖既乾皮甚薄九月十月採實陰乾云普云一名蜀棗矣葉如梅有刺毛二月花如杏四月實如酸棗赤五月採實每一斤去核取肉皮用只是一物子一斤去核取肉皮用只是一物蘇云是一物不可用也

雷公云 凡使勿用雀兒蘇真似山茱萸只是核八稜不八肉皮用只可成四兩已來經須去內核每修事去核了一斤取之用只可成四兩已來經須去內核每修事去核了一斤取

行義曰 山茱萸與吳茱萸甚不相類山茱萸色紅大如棗子初結子時其大小亦不過豌豆吳茱萸如川椒初結子時其大小亦不過豌

臣禹錫等謹按本性論 云山茱萸使味酸辛大熱治腦骨痛上瘡主能發汗止老人尿不節一切風逐一切氣破癥結治酒鼾小兒食之當果子止水痢生平林間樹高丈餘葉陰白冬不凋冬花春熟最早諸果蔬及葉煮汁飼狗王瘍又有一種大相似冬凋春實夏熟人呼爲木半夏無別功根平無毒根皮煎湯洗惡瘡疥并犬馬瘡癩

圖經曰 山茱萸生漢中山谷及琅邪宛句東海承縣今海州亦有之木高丈餘葉似榆花白子初熟未乾赤色似胡蘭子有核亦可啖既乾皮甚薄九月十月採實陰乾云普云一名蜀棗矣葉如梅有刺毛二月花如杏四月實如酸棗赤五月採實每一斤去核取肉皮用只是一物子一斤去核取肉皮用只是一物蘇云是一物不可用也

雷公云 凡使勿用雀兒蘇真似山茱萸只是核八稜不八肉皮用只可成四兩已來經須去內核每修事去核了一斤取之用只可成四兩已來經須去內核每修事去核了一斤取

行義曰 山茱萸與吳茱萸甚不相類山茱萸色紅大如棗子初結子時其大小亦不過豌豆吳茱萸如川椒初結子時其大小亦不過豌

臣禹錫等謹按本性論 云山茱萸使味酸辛大熱治腦骨痛上瘡主能發汗止老人尿不節一切風逐一切氣破癥結治酒鼾小兒食之當果子止水痢生平林間樹高丈餘葉陰白冬不凋冬花春熟最早諸果蔬及葉煮汁飼狗王瘍又有一種大相似冬凋春實夏熟人呼爲木半夏無別功根平無毒根皮煎湯洗惡瘡疥并犬馬瘡癩

圖經曰 山茱萸生漢中山谷及琅邪宛句東海承縣今海州亦有之木高丈餘葉似榆花白子初熟未乾赤色似胡蘭子有核亦可啖既乾皮甚薄九月十月採實陰乾云普云一名蜀棗矣葉如梅有刺毛二月花如杏四月實如酸棗赤五月採實每一斤去核取肉皮用只是一物子一斤去核取肉皮用只是一物蘇云是一物不可用也

雷公云 凡使勿用雀兒蘇真似山茱萸只是核八稜不八肉皮用只可成四兩已來經須去內核每修事去核了一斤取之用只可成四兩已來經須去內核每修事去核了一斤取

行義曰 山茱萸與吳茱萸甚不相類山茱萸色紅大如棗子初結子時其大小亦不過豌豆吳茱萸如川椒初結子時其大小亦不過豌

臣禹錫等謹按本性論 云山茱萸使味酸辛大熱治腦骨痛上瘡主能發汗止老人尿不節一切風逐一切氣破癥結治酒鼾小兒食之當果子止水痢生平林間樹高丈餘葉陰白冬不凋冬花春熟最早諸果蔬及葉煮汁飼狗王瘍又有一種大相似冬凋春實夏熟人呼爲木半夏無別功根平無毒根皮煎湯洗惡瘡疥并犬馬瘡癩

圖經曰 山茱萸生漢中山谷及琅邪宛句東海承縣今海州亦有之木高丈餘葉似榆花白子初熟未乾赤色似胡蘭子有核亦可啖既乾皮甚薄九月十月採實陰乾云普云一名蜀棗矣葉如梅有刺毛二月花如杏四月實如酸棗赤五月採實每一斤去核取肉皮用只是一物子一斤去核取肉皮用只是一物蘇云是一物不可用也

雷公云 凡使勿用雀兒蘇真似山茱萸只是核八稜不八肉皮用只可成四兩已來經須去內核每修事去核了一斤取之用只可成四兩已來經須去內核每修事去核了一斤取

行義曰 山茱萸與吳茱萸甚不相類山茱萸色紅大如棗子初結子時其大小亦不過豌豆吳茱萸如川椒初結子時其大小亦不過豌

臣禹錫等謹按本性論 云山茱萸使味酸辛大熱治腦骨痛上瘡主能發汗止老人尿不節一切風逐一切氣破癥結治酒鼾小兒食之當果子止水痢生平林間樹高丈餘葉陰白冬不凋冬花春熟最早諸果蔬及葉煮汁飼狗王瘍又有一種大相似冬凋春實夏熟人呼爲木半夏無別功根平無毒根皮煎湯洗惡瘡疥并犬馬瘡癩

圖經曰 山茱萸生漢中山谷及琅邪宛句東海承縣今海州亦有之木高丈餘葉似榆花白子初熟未乾赤色似胡蘭子有核亦可啖既乾皮甚薄九月十月採實陰乾云普云一名蜀棗矣葉如梅有刺毛二月花如杏四月實如酸棗赤五月採實每一斤去核取肉皮用只是一物子一斤去核取肉皮用只是一物蘇云是一物不可用也

雷公云 凡使勿用雀兒蘇真似山茱萸只是核八稜不八肉皮用只可成四兩已來經須去內核每修事去核了一斤取之用只可成四兩已來經須去內核每修事去核了一斤取

行義曰 山茱萸與吳茱萸甚不相類山茱萸色紅大如棗子初結子時其大小亦不過豌豆吳茱萸如川椒初結子時其大小亦不過豌

臣禹錫等謹按本性論 云山茱萸使味酸辛大熱治腦骨痛上瘡主能發汗止老人尿不節一切風逐一切氣破癥結治酒鼾小兒食之當果子止水痢生平林間樹高丈餘葉陰白冬不凋冬花春熟最早諸果蔬及葉煮汁飼狗王瘍又有一種大相似冬凋春實夏熟人呼爲木半夏無別功根平無毒根皮煎湯洗惡瘡疥并犬馬瘡癩

圖經曰 山茱萸生漢中山谷及琅邪宛句東海承縣今海州亦有之木高丈餘葉似榆花白子初熟未乾赤色似胡蘭子有核亦可啖既乾皮甚薄九月十月採實陰乾云普云一名蜀棗矣葉如梅有刺毛二月花如杏四月實如酸棗赤五月採實每一斤去核取肉皮用只是一物子一斤去核取肉皮用只是一物蘇云是一物不可用也

雷公云 凡使勿用雀兒蘇真似山茱萸只是核八稜不八肉皮用只可成四兩已來經須去內核每修事去核了一斤取之用只可成四兩已來經須去內核每修事去核了一斤取

行義曰 山茱萸與吳茱萸甚不相類山茱萸色紅大如棗子初結子時其大小亦不過豌豆吳茱萸如川椒初結子時其大小亦不過豌

臣禹錫等謹按本性論 云山茱萸使味酸辛大熱治腦骨痛上瘡主能發汗止老人尿不節一切風逐一切氣破癥結治酒鼾小兒食之當果子止水痢生平林間樹高丈餘葉陰白冬不凋冬花春熟最早諸果蔬及葉煮汁飼狗王瘍又有一種大相似冬凋春實夏熟人呼爲木半夏無別功根平無毒根皮煎湯洗惡瘡疥并犬馬瘡癩

圖經曰 山茱萸生漢中山谷及琅邪宛句東海承縣今海州亦有之木高丈餘葉似榆花白子初熟未乾赤色似胡蘭子有核亦可啖既乾皮甚薄九月十月採實陰乾云普云一名蜀棗矣葉如梅有刺毛二月花如杏四月實如酸棗赤五月採實每一斤去核取肉皮用只是一物子一斤去核取肉皮用只是一物蘇云是一物不可用也

雷公云 凡使勿用雀兒蘇真似山茱萸只是核八稜不八肉皮用只可成四兩已來經須去內核每修事去核了一斤取之用只可成四兩已來經須去內核每修事去核了一斤取

行義曰 山茱萸與吳茱萸甚不相類山茱萸色紅大如棗子初結子時其大小亦不過豌豆吳茱萸如川椒初結子時其大小亦不過豌

臣禹錫等謹按本性論 云山茱萸使味酸辛大熱治腦骨痛上瘡主能發汗止老人尿不節一切風逐一切氣破癥結治酒鼾小兒食之當果子止水痢生平林間樹高丈餘葉陰白冬不凋冬花春熟最早諸果蔬及葉煮汁飼狗王瘍又有一種大相似冬凋春實夏熟人呼爲木半夏無別功根平無毒根皮煎湯洗惡瘡疥并犬馬瘡癩

圖經曰 山茱萸生漢中山谷及琅邪宛句東海承縣今海州亦有之木高丈餘葉似榆花白子初熟未乾赤色似胡蘭子有核亦可啖既乾皮甚薄九月十月採實陰乾云普云一名蜀棗矣葉如梅有刺毛二月花如杏四月實如酸棗赤五月採實每一斤去核取肉皮用只是一物子一斤去核取肉皮用只是一物蘇云是一物不可用也

雷公云 凡使勿用雀兒蘇真似山茱萸只是核八稜不八肉皮用只可成四兩已來經須去內核每修事去核了一斤取之用只可成四兩已來經須去內核每修事去核了一斤取

行義曰 山茱萸與吳茱萸甚不相類山茱萸色紅大如棗子初結子時其大小亦不過

郭云一名陵時又名凌霄十即用花不用根也山中亦有白花者按陸璣疏云一名黃白二名紫葳紫葳羅願爲爾雅翼云凌霄花治酒齄鼻風刺風婦人血腸遊風崩中帶下圖經曰紫葳陵霄花也生山中人家園圃亦多種之初作藤蔓生依大木歲久延引至巔而有花其華夏中乃盛陶隱居云詩有苕之華郭云陵霄又名苕雅注苕一名陵霄本草云而無陵霄之說豈古今所傳書有異同耶又據陸機及孔穎達疏義亦云苕一名陵時珍本草云今蜀人多採其花及時乃是鼠尾草之別名郭又謂苕爲陵時本草云今蜀人乃知陶蘇所引是以陵時作陵霄耳又陵霄非是草類蓋可明其誤矣今醫家多採其花乾之入婦人血崩風毒藥又治火丈血熱風毒四肢皮膚生癮疹并行經脈方陵霄花不以多少擣羅爲散每服二錢温酒調下食前服甚效

大斗門方

治暴耳聾凌霄花葉爛研自然汁灌耳內差

胡桐淚

胡桐淚出大漠鹽堿中狀如蜜滴凝結而成味甚苦主大毒殺人不可近心腹煩滿水和服之取吐又云主惡毒蟲研三二兩注之立差又爲金銀銅藥中毒者研末服之亦可主蠱毒及山谷中瘴氣而堅實有夾爛木

者二是胡桐樹液淪入土石變赤地久之其樹高大皮葉似白楊青桐枝葉皆赤故名胡桐律律漆聲訛也西域傳云胡桐以棗而出

西有之初生如柳木則如李服如黃石極鹹苦等水煮消用

子云治風蝕牙齒痛有二般一石子黃土色者為上即今

圖經曰胡桐淚出罽賓大者如斗小者如升今人貨之者相傳生本

初生以柳漸大則以棗桐壘冬月採得之狀如黃蠟雪石古方稀用今始

律淚聲近也然有一種木脂極相類但不堪用

海藥謹按嶺表記云出疾勞能軟一切物多服令人吐也作律字非也

又有石淚在石上採出名胡桐淚可以鞭牛骨槽風

通典西戎樓國多出一種柳胡桐白色白草等所著也胡桐流出者凝如飴

亦似蟲食其樹而津下流出者凝如飴可以鞭

墨味辛無毒止血生肌膚合金瘡產後血運崩中卒下血醋摩服之亦主眯目物芒入目摩點瞳子上又止血痢及小兒客忤擣篩和水溫服之好墨入藥麤者不堪

墨云溫

外臺秘要治天行毒病衄鼻是熱毒血下數升者取好墨未之雞子白九如梧子用生地黃汁下一二十九如人行五里再服

千金方治物落眼中不出好墨清水研銅筯點之即出多於通間門外得之令人瘖不即治亦殺人擣墨水和服一錢匕

肘後方客忤者中惡之類也名胡桐疾痛風骨槽

又方崩中漏下清黃赤白使人無子好墨未一錢匕服

又方產難墨一寸未水服之立產

又方治赤白痢薑墨丸乾薑墨各五兩篩以醋煮和丸梧子大加至四五十丸米飲下日夜可六七服

臣禹錫等謹按陳藏

如無醋漿以醋入水解之令其味如醋漿和之七十病剌垂死服之愈徐云但爵書墨一九差

又方治墮胎胞衣不出腹中腹中疼痛牽引腰脊用好墨細研每服非時溫酒調下二錢匕

梅師方治鼻衄出血多眩冒欲死濃研香墨點入鼻孔中氣絕以

子母秘録治產後凶暈心悶氣大夫小便濃研墨服下黏胎死腹中若胞衣不出心墨三寸末酒服一升

又方墨三寸末酒服一升

衍義曰墨松之煙也世有以粟煙為佳今高麗國每貢墨於中國不知用何物合和不宜入藥然推遠煙入藥蓋未達不敢嘗之義又治大小血痢墨細末二錢以白湯調稀稠得所頓服熟多者尤相宜又鄭延祐為墨黑光如漆松煙不及與諸文下皆是不可入藥當附于此

棘剌根 苦平無毒主久下冷冲腸胃寒熱痛除煩渴熱不下食

時附一名剌原又有棗剌

相遠越恐本言不關棗針也名濟萬恐別是一名亦作刺人門冬苗乃亦猶諸棘皂類後條用花斯不足拄文

用棘針天門冬一名棘門冬苗乃花定有直者盡直用者盡曲者盡益宜用白者為生充剌當用白者為生充

時及棗棘之別所以同門乾云棘有赤白二種切頭曰棘多有之叢高三二尺花赤實小而圓紅

聖惠方治小兒一切病用棘針末吹入鼻中

龍眼核

豬苓味甘平無毒主瘧解毒蠱疰不祥利水道久服輕身耐老一名假猪屎生衡山山谷及齊陰寬句二月八月

珠陰乾 陶隱居云是楓樹苓其皮至重作冤枳猪屎故以名之削去黑皮乃稱之 臣禹錫等謹按吳氏云豬苓神農甘雷公若無毒司馬虎注莊子二家一名苓根似豬屎治渴瘧性論云豬苓臣微熱解傷寒溫疫大熱發汗主腫脹滿腹急痛

圖經曰豬苓生衡山山谷及齊陰寬句今蜀州亦有之舊說是楓木苓今則不必楓根下乃有生土底皮黑作塊似豬糞故以名之又名地烏桃二月八月採陰乾剝去皮肉白而實者佳莊子謂之豕零司馬虎注云一名苓根似豕零苓猪糞治渴張伸景治傷寒諸苓猪苓澤瀉滑石阿膠各一病在藏加渴者猪苓湯主之猪兩以水四升煮四物取二升內膠每服七合日三嘔而思水者亦主之又治消渴脉浮小便不利微熱消渴欲飲水而復吐之爲水逆冬時寒救如瘧狀亦與猪苓散治水服方寸匕日三多飲煖水三分澤瀉五分桂三分細搗篩若此即五苓散也猪苓木茯苓各出即愈利水道諸湯劑無猪苓者皆用之又黃疸病又加茵蔯病並猪苓主之猪苓散猪苓等分杵末每服方寸匕煖水調下今施用有一種刺猪苓蔓生春夏採根庾信麻効云味甘性寒無毒

唐本餘去邪氣 凡採得用銅刀削上麁皮一重薄切下東流水浸夜至明漉出細切以升麻煮對蒸一日出去升麻曝乾用

雷公云凡採得用銅刀削上麁皮一重薄切下東流水浸夜至明漉出細切以升麻煮對蒸一日出去升麻曝乾用

外臺秘要治旋漈憩子淋猪苓五兩一味末以白湯三合服方寸匕漸至二七日三夜二盡劑不差宜轉用之

又方治小兒大便不通猪苓一兩以水少許煮雞屎白一錢調服立差

子母秘録治如娠從脚上至腹腫小便不利微渴引飲猪苓五兩以熟水服方寸匕日三服

楊氏産乳瘧通體遍身腫小便不利猪苓五兩搗篩煎水三合調服方寸匕加至二七

衍義曰猪苓行水之功多久服必損腎氣昏人目果欲久服者更宜詳審

白棘

白棘味辛寒無毒主心腹痛癰疽瘭腫止痛決刺結瘕丈夫虛損陰瘡精自出補腎氣益精髓一名棘鍼一名棘刺生雍州川谷及隰（云亭子北是酸棗園斜今人用天門冬苗代之并是真也唐本注）同棘中時後有之亦為難得也

圖經曰白棘棘鍼也生雍州棘上叢生高三四尺花葉並實都似棗而有赤白二種蘇恭云白棘莖白如粉子葉與赤棘之亦為誰得耳然有鉤直二種直者入補藥鉤者入瀉

藥鍼採無時花冬至後百日實不通藥中亦用棘子昂觀人採為白棘同療皆信之二物命不相類不知何故疑誤若此其說

外臺秘要

治齒蟲齒腐棘鍼二物等分水三升煮取一升含之

又方

治眾血棘刺三升水五升煮取二升分三服

千金方

治諸惡腫失治有膿鍼作灰水服之經宿膿頭出

又方

蟲食齒根肉黑燒腐棘傳之十遍雖黃未傳之易

子母秘錄

小兒驚風口禁乳不下燒棘未水服一錢匕

又方

癮疹痒瀰瘡及小兒丹煮棘根汁洗之出千金

衍義曰白棘名棘鍼一名棘刺按經如此甚明諸家之意強生疑惑今掠不取其肥盛紫色莖上有皺薄白膜先剝起者故曰白棘取白之意不過如此其棘刺花乃是棘上所開花也餘無他義今人

日月實四月拆又東：針療物玉篇云在張掖郡時有人以

炭枝取油塗脫髮使黑餅

信州烏藥

潮州烏藥

台州烏藥

衢州烏藥

氣味辛溫無毒主中惡心腹痛蠱毒鬼疰客忤不
行疫癘瞥脫腎間冷氣攻衝皆瘳婦人血氣小兒腹宿諸
蟲其葉及根嫩時採作茶片炙喉前服能補中益氣偏止小
便滑數生嶺南邕容州及江南樹生似茶高丈餘一葉三椏
葉清陰白根色黑褐作車轂形狀似山芍藥根又似烏樟根
自餘直根者不堪一名旁其八月採根今附

日華子云治一切氣除一切冷霍亂及反胃吐食瀉痢解冷熟其功不可悉載貓犬百病並可摩服并

圖經曰烏藥生嶺南邕容州及江南今台州雷州衡州亦有作三椏面青背白五月開細花黃白色六月結實如山萄藥而有極麁大者又似鈎樟根然根有二種嶺南者黑褐色而堅硬天台者白而虛軟並八月採根以作車轂形如連珠狀者佳或云天台出者香白可愛而不及海南者力大

斗門方治陰毒傷寒烏藥子一大盞炊令黑煙起投於水一合煎取三五沸服一大盞候汗出回陽立差

別說云謹按本草圖經及世稱以天台者為勝今比之衡州洪州者其香味唯天台者為劣入藥功效亦不及但

肉色頗赤而差細小爾用者宜廣求而比試之

行義曰 烏藥和來氣火走泄多但不甚鋼猛與沉香同磨作湯點治腎腹冷氣甚穩當

廣州沒藥

沒藥味苦平無毒主破血止痛療金瘡杖瘡諸惡瘡瘭痔漏卒下血目中醫暈痛膚青牛波斯國似安息香其塊大小不定黑色 今附 臣禹錫等謹按藥性論云沒藥單用亦得末苦辛能主打撲橫心腹血瘀痛不可忍皆以酒投飲之良 **筆子** 云破癥結宿血消腫毒傷折跌筋骨瘀痛傘及

南詔國及廣州或有之木之枯而窻成久者則行膏夜流滴下地下凝結成塊或大或小亦類安息香採無時今方多用治內傷痛楚又治血暈及臍腹疠刺者沒藥一物研細溫酒調一錢便止又治歷節諸風骨節疼痛晝夜不可忍者沒藥半兩研虎脛骨三兩塗酥炙黃色先搗羅為散與沒藥同令細溫酒調二服大佳

海藥 謹按徐表南州記生波斯國是彼處松脂也狀如神香赤黑色味苦辛溫無毒主折傷馬墜推陳置新能三好血凡服皆須研爛以熱酒調服近効墮胎心腹痛及野雞痫瘧產後血氣痛並宜丸散中服爾

行義曰 沒藥大緊通帶血打撲損疫痛皆以酒化服血滯則氣血不行壅滯故如是肌肉須腫脹者經絡滿急經絡滿急故痛且腫凡

龍眼

龍眼

龍眼味甘平無毒主五藏邪氣安志厭食除蟲去毒久服強魂聰明輕身不老通神明一名益智其大者似檳榔生南海山谷

陶隱居云廣州別有龍眼似荔枝而小非益智恐彼人別名今者為益智耳食之並利人 唐本注云益智似連翹子頭未開者味甘辛殊不似檳榔其苗葉花根與豆蔻無別惟子小耳龍眼一名益智而益智非龍眼也其龍眼樹似荔枝葉若林檎花白色子如檳榔有鱗甲大如雀卵味甘酸也 今按[illegible]其肉薄於荔枝而[illegible]益智[illegible] 今附

臣禹錫等謹按蜀[illegible]

圖經曰龍眼生南海山谷今閩廣蜀道出荔枝處皆有之木高一二丈似荔枝而枝葉微小凌冬不凋春末夏初生細白花七月而實成殼青黃色文作鱗甲形圓大如彈丸核若木梡子而不堅肉白有漿甚甘美其實極繁每枝常三二十枚荔枝纔過龍眼即熟故南人目為荔枝奴一名益智以其味甘歸脾而能益智耳[illegible]云南海舊貢龍眼荔枝十里一置五里一堠奔馳險阻道路[illegible]為患至和帝時汝南唐羌為[illegible]上書言狀帝下詔大官勿復受獻由是而止其為世所貴重久矣今人亦甚珍之暴乾寄遠北中以為佳果亞於荔枝

衍義曰龍眼經曰一名益智今專為果未見入藥補注不言神農本草編入木部中品果部中復不曾收入今除為果之外別無龍眼若謂為益智子則專調諸氣今為果者僅不能也矧自有益智條遠不相當故知木部龍眼即便是今為果者按今注云甘味歸脾而能益智與說甚當

安息香味辛苦平無毒主心腹惡氣鬼疰出西戎似松脂黃黑色為塊新者亦柔刃〔音刃〕唐本先附

臣禹錫等謹按蕭炳云燒之去鬼來神段成式酉陽雜俎云安息香樹出波斯國波斯呼為辟邪樹長三丈皮色黃黑葉有四角經寒不凋二月開花黃色花心微碧不結實刻其

爲末服方寸匕此是等欲成竹時立死者色黑如漆嘗六月
收之苦桂竹多生此又別一種仙人杖味甘小温無毒久服
長生堅筋骨令人不老作茹食之去痰
癖除風冷生劒南平澤葉似苦蕎而細莖似竹節間有毛
憂四月次子張掖河洲草木經冬不凋其實代服食者甚多
子實世代服食者甚多之又及此行也息意滋味戊人有驚
嘉蔣者此物存焉豈非將欲扶吾壽也新補見陳藏器日華
子

海藥謹按廣州記云生南海波斯國樹中脂也狀若搥膠
以秋月採之又方云婦人夜夢鬼交以臭黃合爲丸
薰丹穴永斷又主男
子遺精暖腎辟惡氣

仙人杖味鹹平一云冷無毒主瘧氣嘔逆辟疰小兒吐乳大人
吐食並水煮服小兒驚癎及夜啼安身伴睡良又主痔病燒

具枸杞條下

經曰文

松維味苦甘平無毒主腹痛風氣止虛汗頭風女子陰寒腫
痛療痰熱溫瘧可爲吐湯利水道一名女蘿生熊耳山川谷
松樹上五月採陰乾陶隱居云東山甚多生雜樹上而汉松
上爲是寄生以桑上者爲真毛詩云爲爲鳥與女蘿施于
今詳經云松蘿當用松上者其下不用松上者其功有異同爾
使味苦辛微熱能治寒熱能去頭痛主項上瘤癭日華子
圖經文具桑寄生條下
毗梨勒味苦寒無毒功用與菴摩勒同出西域及嶺南交愛
等州戎人謂之三果唐本注云樹似胡桃子形亦似胡桃核似訶梨勒而圓短無稜用亦同法唐本
元附臣禹錫等謹按藥性論云毗梨勒使能温暖腸腹無去
一切冷氣蕃中人以此作漿甚熱能染鬚髮變黑色日華子
云下氣瀉痢

海藥謹按唐志云生南海諸國樹不與訶梨子相似即圓
而毗也味苦帶澁微温無毒主烏鬚髮燒灰乾立效

菴音諳摩勒朱苦甘寒無毒主風虛熱氣一名餘甘生嶺南交廣愛等州唐本注云樹葉細似李子青黃色核圓作六七稜其中仁亦入藥用今陳藏器本草云菴摩勒主補益強氣力合鉄粉用一斤變白不老取子壓取汁和油塗頭生髮去風痒初塗髮脫後生如漆人食其果青細密朝開暮斂如夜谷而生如栗粒微小春生冬凋三月有花黃隨即結實作羨餘三兩子

圖經曰菴摩勒餘甘子也生嶺南及西川蠻界山谷中皆有木高一二丈枝條甚軟葉如李子狀梵云菴摩勒果是也味甘微酸寒滑利大腸主冷氣欬嗽久服輕身延年長生凡服乳石之人常宜服也

衍義曰菴摩勒餘甘子也解金石藥熱服佛經中多用之蓋西域出有之

海藥生西國大小如柰樹子其微寒滑利大腸主冷氣欬嗽久服輕身延年長生凡服乳石之人常宜服也

衍義曰菴摩勒餘甘子也解金石藥熱服佛經中多用之蓋西域出有之

熟如李子狀青白色連核作五六大瓣乾即黑褐色皺皆有之其俗亦作果子歌之初覺味苦良久更甘故以名也

蠻金香味苦無毒主諸氣諸風諸女氣氣鬼鬼魅鬼疰鬼毒鬼注鬼精鬼交鬼尸鬼臭陳氏云其香十二葉為百草之英合而釀酒以降神也以此言之則草也不當附于木部

花狀如紅藍四月五月採花即香也

陳藏器云味苦平無毒主一切惡氣鬼疰入諸香藥用之生大秦國花如紅藍花即是香也

信州衛矛

衛矛味苦寒無毒主女子崩中下血腹滿汗出除邪殺鬼毒蠱疰中惡腹痛去白蟲消皮膚風毒腫令陰中解一名鬼箭生霍山山谷八月採陰乾陶隱居云山野處亦有其苗有三羽狀如箭羽俗皆乎爲鬼箭而爲用甚稀用之削取皮用今注醫家用鬼箭療婦人血氣大效臣禹錫等謹按藥性論云鬼箭使一名衛矛有小毒能破陳血能落胎主中惡腰腹痛及百邪鬼魅日華子云鬼箭羽味苦澁通月經破癥結止血崩帶下殺腹藏蟲及產後血疰肚痛

圖經曰衛矛鬼箭也出霍山山谷今江淮州郡或有之三月以後生苗莖高五尺許具幹有三羽狀如箭羽葉亦用鬼箭皆大方也

陶公云此使勿用頭相似各別採得後只使箭頭真似箭只是上葉不同味亦相近用根頭用梳上赤毛用酥緩炒用之每修事一兩用一分炒酥盡爲度

掌秘要治乳無汁鬼箭五兩水六升煮取四升一服水服方寸七日三大合日三亦可作灰

行義曰衛矛所在山谷皆有之然未嘗於平陸地見而葉絕似三面如鋒刃人家多種之供崇方家用之亦少

雷州海桐皮

海桐皮味苦平無毒主霍亂中惡赤白久痢除丹毒疥癬牙齒蟲痛並煮服及含之水浸洗目除膚赤堪作繩索入水不爛出南海巳南山谷似梓桐疾痛及目赤煎洗

圖經曰海桐皮出南海山谷今雷州及近海州亦有之葉如手大作三花朱皮若梓白皮而堅韌可作繩入水不爛不拘時月採之古今方多用浸酒治風濕骨節拘攣亦療因覽傳信方著其法云頃年子在姑熟之日得腰膝痛不可忍醫以腎藏風毒攻刺諸藥莫療因覽傳信方用海桐皮五加皮各一兩甘草半兩薏苡仁二兩生地黃十兩入物㕮咀令麤以蓋刀子切用綿一兩都包裹入無灰酒二斗浸冬二七日夏一七日候熟空心食後日午晚時時一盞長令醺醺不時不用添減禁忌食

白寫病病

海藥謹按廣志云生南海山谷中似桐皮黃白色故以名之味苦溫無毒主腸癖心痛大腸虛毒疾腸澼溫無毒主心熱煩悶止渴除大腸虛毒疾腸澼心痛以煎入疎氣藥良所出與椰相似葉根幹小異生

圖經曰

孫真人云

紫藤味甘微溫無毒水良花搗碎拭酒醋白腐壞瘡子作角其中人熬令香著酒中令不敗酒敗者用之亦正四月生紫花可愛人亦種之江東呼爲招豆藤皮著樹從心重重有皮今附

陳藏器云主水癘病京都人亦種之以飾庭池

合歡

合歡味甘平無毒主安五藏和心志令人歡樂無憂久服輕身明目得所欲生益州山谷陶隱居云按孟詵食療云合歡蠲忿萱草忘憂也詩人又有宜男用至於合歡俗間火識之者當以其非療病之功稍見輕略致來謝猶如長生之法人罕敦尚亦爲遺棄唐本注云此樹花發紅白色所在山澤中有之今東西京第宅山池間亦有種者名曰合歡或呼爲夜合本草云合歡皮葉療及葉並去諸蟲毒即刺瘡腫及金瘡折傷筋骨痛並宜煮汁洗之又和酒煎服令人不忘也唐本注云夜合皮解了不相牽綴和之醫方多用之殺蟲煎膏消腫長肌續筋最可洗衣垢又名合歡樹

圖經曰合歡表裏生益梓夔州山谷今近京雍洛間皆有之人家多植於庭除間木似梧桐枝甚柔弱葉似皂莢槐等極細而繁密互相交綴每一風來輒似相解了不相牽綴其葉至暮而合故一名合昏五月花發紅白色瓣上若絲茸然至秋而實作莢子極薄細今注曰欲蠲人之憂則贈以丹棘丹棘一名忘憂欲蠲人之念則贈以青裳青裳合歡也故稽康種之舍前是也常宙獨行方匊心甲錯是爲肺癰黃昏湯治取夜合皮掌大一枚水三升煮取半分再服

子母秘錄小兒撮口病夜合葱汁拭口并洗

又方打槌損疼癌夜合花末酒調服二錢匕妙

衍義曰合歡花其色如今之醲暈線上半白下半肉紅散垂如絲爲花之異其綠葉至夜則合又謂之夜合花陳藏器曰華子皆曰皮穀蟲又曰續筋骨經中不言

越州虎杖

汾州虎杖

滁州虎杖

虎杖根微溫主通利月水破留血癥結 陶隱居云田野甚多此狀如犬馬蓼莖斑
而葉圓極主暴瘕酒漬根服之也 今按 陳藏器本草云虎杖
主風在骨節間及血瘀煑汁作酒服之葉擣傅蛇咬一名苦杖
杖莖上有赤點者是 臣禹錫等謹按蜀本圖經云生下濕地
作樹高丈餘其莖赤根黃二月八月採根日乾所在有之 藥性論 爾
雅云蒤虎杖注云似紅草而麄大有細刺可以染赤
云虎杖使一名大蟲杖也味甘平無毒主治大熱煩躁止渴
利小便壓一切熱毒暑月和甘草煎色如琥珀可愛甚看嘗
之甘美瓶置井中令冷徹如氷白瓷器及銀器中盛以茶啜
之時人呼爲冷飲子又且尊於茗能破女子經脈不通擣以
酒浸常服有孕人勿服破血 日華子 云治產後惡血不下心
腹脹滿排膿主瘡癤癰毒婦人血暈撲損
瘀血破風毒結氣又名斑杖又名應杖

圖經曰虎杖一名苦杖舊不載所出州郡今處處有之三月
生苗莖如竹笋狀上有赤斑點初生便分枝丫葉似
小杏葉七月開花九月結實南中出者無花根皮黑色破開
即黃似柳根亦有高丈餘者爾雅云蒤虎杖郭璞云似葒草
而麄大有細刺可以染赤是也二月三月採根暴乾河東人
燒根灰貼諸惡瘡浙中醫工取根洗去皺皮剉焙擣篩蜜丸
如赤豆陳米飲下治腸痔下血甚佳俗間以甘草同煎爲飲
色如虎珀可愛瓶盛置井中令冷徹如氷極解暑毒其汁染
米作糜糕益美

雷公云凡使勿用天藍并斑蘭根其二味根形味相似用採得後細剉却用上虎杖葉亹一夜出晒乾用

外臺秘要治卒暴癥腹中有物硬如石痛刺晝夜若不治之流注作未將米五升炊飲內撹之好酒五斗漬封數日可飲一升半勿食魚鹽臟當出亦可但取其一副乾

肘後方水煮惡毒手足腫疼痛欲斷方用虎杖根剉一斛以清酒清飲之從少起日三服二隔用日留下不盡自六七月旋旋開花至九月中方今天下暑月多用之張汁為飲不得晉宇則不堪飲藥性論云和甘草煎嘗之甘美其味即是而生之味非虎杖也論其

集驗方治一切毒若於不計多少為末每服二錢用日留下不言味即草藥也蜀本圖經言作本處大多生階似寒菊然花葉莖藥差大為異仍葉有淺黑斑自六七月旋旋開花至九月中方已花片四出其色白蕊大者陝西山麓水次甚多

衍義曰虎杖根今時候當

洋州五倍子

五倍子味苦酸平無毒每療惡瘡宣痺肺藏風毒流溢皮膚作風濕癬瘡瘙痒膿水五痔下血不止小兒面鼻痒瘡一名文蛤在處有其子色青大者上

圖經曰五倍子舊不著所出州土云在處有之今以蜀中者為勝此膚木葉上生至熟而黃大者如拳中多蟲一名百蟲倉九月結實無花其木青黃色其實

陳藏器序云五倍子治腸虛泄痢熟湯服

博濟方 治風毒土攻眼腫疼痛不可忍者或上下臉皆赤
爛浮腎瘀肉侵睛神效驅風散五倍子一兩荊子
一兩半同炒末每服二錢水二盞銅石器內煎及一盞澄
淨去渣洗留滓二服又依前煎洗大能明眼目去澁痒
經驗後方 治小兒吐不定五倍子二箇一生一熟甘草一錢
用濕紙裹炮過一同搗末每服米泔調下半錢立差
丹房鏡源 五倍子 炷鉛
衍義曰 五倍子今染家亦用治口
齒以末揩之便可飲食

益州伏牛花

伏牛花生蜀地所在有之今惟益蜀近鄰有之多生
山中葉而不光亞赤有刺花黃色生蜀地
圖經曰 伏牛花生蜀地所在有之今惟益蜀近鄰有之多生
在山谷有刺三月採 川澤中葉青細似黃
色作穗似杏花而
小三月採陰乾
天竺黃味甘寒無毒主小兒驚風天弔鎮心明目去諸風熱
一名竹膏人多燒諸骨及葛粉等雜
名竹瀝止血滋養五藏一名陽虎刺花
海誌云生天竺國今諸竹內往往得之
治中風痰壅卒失音不語小兒客忤
是南海邊竹內塵沫成者耳
天竺黃自是竹內所生如黃土着竹成片
小兒藥亦宜用故也

簡州密蒙花

宋甘平微寒無毒主青盲肅赤澁赤脉卜元熬豆及膚翳攻眼生益州川谷樹高丈餘葉似冬青葉而厚背色白有細毛二月三月採花

圖經曰蜜蒙花生荔州川谷今蜀中州郡皆有之木高丈餘葉似冬青葉而厚背色白有細毛二月三月採花微紫色

雷公云凡使采得後陰乾却拌蜜入瓷瓶內封固安置飯甑內蒸三度先却出曬

用母修事一兩用酒八兩用蜜半兩蒸爲度此元治木錦花浸待色變

衍義曰蜜蒙花利州路甚多葉冬亦不凋然不似冬青蓋柔而不光潔不深緑花細碎數十房成一采冬生春開此木也今居草部恐未書善

天竺桂味辛温無毒主腹內諸冷血氣脹功用似桂皮薄不過烈生西胡國今附

圖經文見桂條下

海藥謹按廣州記云生南海山谷補暖腰腳破產後惡血治血痢腸風功力與桂心同方家少用

衍義曰天竺桂與北桂同但薄而已

折傷木味甘鹹平無毒主傷折筋骨疼痛散血補血產後血悶止痛酒水煮濃汁飲之生資州山谷唐本注云藤生繞樹上葉似菌草葉而尖厚八月九月採莖日乾唐本先附

桑花暖無毒建脾澁腸止鼻洪吐血腸風崩中帶下此不是

桑椹花即是桑㮈上白癬如地錢花樣刀削取入藥微炒使

新補見日華子

圖經文具桑根白皮條下

椋音良子木味甘鹹平無毒主折傷破惡血養好血安胎止痛

生肉唐本注云葉似柿而薄黑莖木堅重煑汁赤色爾雅云椋即来是也郭注云椋林中車輔八月九月林木日乾唐木先附

每始王木味苦平無毒主傷折跌筋骨生肌破血止痛酒水煑濃汁飲之生資州山谷唐本注云藤生繞樹木上生葉似藤麼葉三月八月採唐本先附

者濃汁飲之生資州山谷

四十五結云陳藏器餘

必栗香味辛温無毒主鬼氣煑服之并燒爲香殺蟲魚葉搗碎置上流魚悉暴鰓一名化木香詹香也葉如椿生高山堪爲書軸白魚不損書也

海藥主鬼疰心氣一切邪心氣菓落水中魚當暴死也

櫚木味辛温無毒主破血堕血堕心冷欬並煑汁及熟服出安南及南海人作床几似紫檀而色赤爲枕令人頭痛爲熱故也

海藥謹按廣志云生安南及南海山谷胡人用爲床坐性堅好主產後惡露衝心癥瘕結氣赤白漏下並對煎服之

研藥味苦温無毒主霍亂下痢中惡腹内不調者服之出南海諸州根如烏藥圓小樹生也

海藥葉味主治同上唐本注云生南海山谷胡人用爲床坐性堅好主產後惡露衝心癥瘕結氣赤白漏下並對煎服之

黄龍眼味苦温無毒主解金藥銀藥毒以水研取半合空心少少服經二十許日差出嶺南狀如龍眼黄色也

海藥功力藤解毒子也

箭幹及鏃亡婦人產後腹中痒安所臥蓆下勿令婦人知

元慈勒味甘無毒主心病流血合金瘡去腹內惡血血痢下血婦人帶下明目去障翳風淚努肉生波斯國似龍腦香

〈海藥〉無慈勒樹中脂也味甘平消腎破血止痢腹中毒血今少有

大小如半夏

鑿孔中木主難產取入鐵裹者燒末酒服下產也

〈海藥〉謹按徐表南州記云生廣南山谷味甘平無毒主煩躁心悶瘧鬲傷寒清涕欬逆上氣宜煎服子食之香

〈千金方〉治諸瘡因風致腫以根皮三十斤剉以水三斛煮取一斛去滓內牛乳一把漬瘡當出膿血日爲之差止

味苦平無毒主蛇蟲煮汁服之又主齒痛打碎口中含之又取和米煮粥飼狗去瘕生南地深山皮赤如脂堪縛物片片自解也

松楊木皮味苦平無毒主水痢不問冷執皮濃煎令黑服一升生江南林落間大樹葉如梨江西人呼爲涼木松楊縣以此樹爲名也

楊廬耳平無毒主老血結塊破血止血煮服之楊廬木上耳也出南山

故髑髏無毒主石淋燒灰末服三指撮用水下之又主盜汗

書云止咸未鹵試

〈聖惠方〉治膀胱虛熱下砂石澁痛利水通燒灰研食前溫酒調下一錢匕

梫木味苦平無毒破產後血煮服之葉搗碎封蛇咬亦洗瘡

癬樹如石榴葉細高丈餘四月開花白如雪生江東林箐間
象豆味甘平無毒主五野雞病蠱毒飛尸喉痺取子中仁碎
爲粉微熬水服一二匕亦和大豆藻面出黑生嶺南山林作
藤著樹如通草藤三年一熟角如皂莢子若雞卵皮紫色剖
中仁用之一名橄子一名合子主野雞病爲上
地主平無毒主鬼氣心痛酒煮服一合此土中古木腐爛者
也
腐木主蜈蚣咬末和醋傳之亦漬取汁傳咬處良
石刺木根皮味苦平無毒主破血因產血不盡結瘕者煮汁
服此木上寄生破血神驗不可得生南方林箐巳江西人呼
爲靳刺亦種爲籬院樹似棘而大枝上有逆鉤也
柳木枝葉味苦温無毒主霍乱煎汁服之木高丈葉如桑出
南方山中郭注爾雅云楀 音古 大木葉如桑也
息王藤味苦温無毒主產後腹痛血露不盡濃煮汁服之生
嶺南山谷冬月不凋
角落木皮味苦温無毒主赤白痢皮煮汁服之生江西山谷
似茱萸獨莖也
鴉鳥漿味甘温無毒主風血蠱毒解諸毒物故曰老山人浸酒用解諸毒
鴉鳥漿生江南林木下高一二尺葉陰紫色冬不凋有赤子
如珠
紫珠味苦寒無毒解諸毒物癰疽喉痺飛尸蠱毒七腫下瘧
蛇虺蟲螫狂犬毒並煮汁服亦煮汁洗瘡腫除血長膚名
紫荊樹似黃荊葉小無棱非田氏之荊也至秋子熟正紫圓
如小珠生江東林澤間

牛領藤味甘温無毒主腹内冷腰膝疼弱小便白數陽道之
煮汁浸酒服之生云領南高山形褊如牛領取之陰乾也
枕林味辛小温無毒主欬嗽痰飲積聚脹滿鬼氣注忤煮汁
服之亦可作浴湯浸脚氣及小兒瘡疥生南海山谷作舸舡
次於樟木無蟲用之也

鬼膿藤味苦温無毒主癰腫腸蕈葉傳之藤堪浸酒去風血
生江南林澗中葉如梨子山人亦名鬼薄者也

木戟味辛温無毒主疫癖氣在藏府生山中葉如梔子也

奴柘味苦小温無毒主老血瘕男子疫癖閃痞取刺和三稜
草馬鞭草作煎炒稠糖病在心食後在臍空心服當下惡物
生江南山野似柘節有刺冬夏不凋

溫藤味苦温無毒主風血積冷浸酒服之生江南山谷不凋

著述生也

鬼齒無毒主中惡注忤心腹痛此腐竹根先入地者煮服之
亦名鬼針為其賊惡隱其名爾

鐵掃帚柄無毒主鬼打及疆鬼卒突人致惡者和桃奴鬼箭等
九服之

古祠板無毒主鬼氣注忤中惡心腹痛脊急氣喘惡夢悸常
為鬼神所崇撓者水及酒和東引桃枝煎服當得吐下古塚
中棺木也彌古者佳杉材最良千歲者亦通神作琴底爾雅注
云杉生江南作棺埋之不腐

慈母無毒取枝葉炙黃香作飲下氣止渴令人不睡主小兒
痰痞生山林間甚如櫻桃而小樹高丈餘山人並識之

飯蘿燒作灰無毒主時行病後食勞取方寸匕服南方人謂

筐也又燒灰作灰末傳狗咬瘡竈竹器也

白馬骨無毒主惡瘡和黃連細辛白調牛膝雞桑皮黃荊等可燒爲末淋汁取治瘰癧瘡惡瘡蝕息肉白癜風以物揩破塗之又單取莖葉煮汁服之止水痢生江東似石榴而短小對節紫衣味苦無毒主黃疸暴熱煩黃沉重下水瘡亦止熱痢煮服之作灰淋取汁沐頭長髮也古木錦花也石花皆有之堪染褐下水廣濟方云長髮也

梳笓無毒主蠱病是活蟲入腹爲病如癥瘕者又梳笓墻主小兒惡氣霍亂水和飲之

倒掛藤味苦無毒主一切老血及產後諸疾結痛血上欲死煮汁服生深山如懸鉤有逆刺倒掛於樹葉尖而長也

故木砧一名百味無毒主人病後食勞復取發當時來亦病

行止牌下土如錢許男左女右和砧上垢及鼠頭一枚無即以鼠屎三七黃服之神効又卒心腹痛取砧上垢著人鼻瘡底悉穿又柳凡上層燒傳吻上噙瘡

古廁木主鬼魅傳尸溫疫鬾神等取木以太歲所在日時當戶燒薰之又薰之杖瘡冷風下入以木於瘡上薰之廁籌主難產及霍亂身冷轉筋於床下燒取熟氣徹上下土中惡鬼氣此物雖微其功

錄

桃拙無毒主卒心腹痛鬼疰惡血惡氣脹滿煮服之三戴者良桃性去惡極更宜桃仁桃膠同功也

梭頭主失音不語吃病者刺手心令痛即語男左女右

救月蝕主月蝕瘡久月割耳燒爲灰油和傅之杖即月蝕瘡救月擊物木九人亦取日蝕耳瘡令汁東行一丁碎搗取耳後月蝕耳瘡令汁東

諸處每至四五月後晦多於衢路間得之大如狸豆破之辛
香古老相傳是月中下也山桂猶堪爲器況月桂乎正應不
的識其功耳今江東處處有不知北地何意獨無爲言耳月
路耶月感之矣餘杭靈隱寺僧云種得一株近代詩人多所
論述漢武洞冥記云有遠飛雞朝往夕還常銜桂實是於南
土所以北方無南方月路所以有也
地龍藤味苦無毒主風血羸老腹內及腳肿冷食不作肌
膚屈如龍故號地龍藤透梢不生似
龍所生與此頗同有異耳吳中亦有也
火槽頭主歐逆橫竪上立炭主金瘡刮取傅瘡上止
血生肉帶之辟邪惡鬼帶入內水底取得永銀著出
重刊經史證類大全本草卷之十三