

傷寒總病論

宋 龐安時撰  
附札記





傷寒總病論 附札記 宋 龐安時撰

商務印書館

2J68/65

# 傷寒總病論

附札記

宋 麗安時撰

★ 版權所有 ★

商務印書館出版

上海河南中路二十一號

(上海市書刊出版業營業許可證出字第〇二五號)

新華書店總經售

商務印書館上海廠印刷

(14017·17)

1937年6月初版

開本787×10921/82

1956年12月重印第1版

字數 89,000

1956年12月上海第1次印刷

印數 1—15,000

印費 5 13/10

定價(9) ￥ 0.65

## 出版說明

傷寒總病論，朱龐安時撰。全書六卷：卷一敍論並六經諸證。卷二論汗吐下利並用本中火和表溫裏的方法。卷三論結胸、痞氣、陰陽毒、孤惑、百合、痞、濕渴和雜病、勞復等證。卷四論醫治時行寒疫及傷寒證。卷五論天行、溫病和變噦、變黃、敗壞等證，並附小兒傷寒證。卷六載冬夏傷寒發泄、雜方和妊娠傷寒方、傷寒暑病通用刺法，傷寒溫熱病死生證，並差後禁忌。仲景脈說、華佗內外實說等篇。書末附音訓和修治藥法各一卷。每證之下，有論有方，評脈辨證，隨病治療。作者並根據內經等書引證別家的說法，參加自己的經驗，對張仲景傷寒論作了一部分的補充材料。

本書作者龐安時字安常，宋慶曆—元符（一〇四二—一〇九九年）時蘄水人。幼時他父親授以脈訣，長而博讀靈樞、太素、甲乙諸書，努力鑽研，融會貫通。各證中尤精於傷寒，能得仲景大意。爲人治病，十愈八九。有遠道來求醫的，他爲病人佈置房舍，讓他們安居下來，並親視湯藥，必待痊愈後方遣回。病

家持金來謝，也不盡收；一本救死扶傷的精神，盡心爲病者服務，由此可見他爲人品質的崇高。他在當時和蘇軾、黃庭堅、張耒常有來往，他們都對龐的醫術，備加推重。這些可在本書所載蘇軾的手書和黃庭堅的後序中得見一般。所以宋代筆記中，如張耒的明道雜志，蘇軾的東坡雜記、仇池筆記，袁文的甕牖閒評，葉夢得的避暑錄話等都有關於他的記載。他的醫學在當時是有一定影響的。他的著述有難經辨、主對集、本草補遺。這三部書都已亡佚，現僅存有傷寒總病論。

張仲景傷寒論是中醫內科的經典著作，歷代的個別醫家都有注釋。如成無己的注解傷寒論，朱肱的類證活人書，許叔微的傷寒百證歌、傷寒發微論、傷寒九十論，韓祗和的傷寒徵旨論，都能闡發傷寒論的要義，幫助讀者進一步對傷寒證的了解。龐安時的傷寒總病論，也是其中的一種。

本書首先在辨證方面，依照張仲景的六經分證法，說明病證由五臟六腑傳變的原因，特別強調地理氣候、飲食起居與疾病的關係。其次在治療方面，主要是用汗、吐、下、和諸法，根據病人具體條件，隨證治療。最後在處方方面，採用傷寒論的醫方，說明藥物佐使加減的關係，並根據自己臨床的經驗，引據古醫書，補充了若干具有療效的醫方，因而豐富了張仲景的傷寒論。但是作者限於時代，對有些

病因不明、辨證不清的證候，特別是傳染性質的病證，還不免有些唯心和迷信的解釋。

本書原據清黃丕烈士禮居叢書覆宋刊本排印，列入叢書集成。這部書的傳本不多，宋刊以後，金元明都沒有刻本。此次重印，復據士禮居本原書校勘，除改正原排印的錯誤，並據所引傷寒論、內經、脈經等書和士禮居本校勘札記參校。凡宋本錯字，經原校勘確實有據的，都加改正；可以兩存的，一如其舊。書末仍附印士禮居本校勘札記，藉供參考。但宋本還存在着錯字，如「寐」誤作「寐」，「篩」誤作「節」，「浙」誤作「浙」，「梢」誤作「稍」，「憎」誤作「增」等，未經士禮居本校勘說明的，都加改正。並統一了通用互見的字，如斗、卧、蒸、烝、花、華、參、棗、人、仁、班、班等。凡引據傷寒論原書經作者節刪而意義不明的地方，也照傷寒論原文，加以補正。宋刊本原書目錄缺一葉半，士禮居本仍舊，今按分目補正。又宋張耒有傷寒總病論跋一篇，今從張氏柯山集中錄出，作爲附錄。

商務印書館 一九五六年八月

蘇軾啓。久不爲問。思企日深。過辱存記。遠枉書教。具聞起居佳勝。感慰兼集。惠示傷寒論。真得古聖賢救人之意。豈獨爲傳世不朽之資。蓋已義貫幽明矣。謹當爲作題首一篇。寄去。方苦多事故。未能便付去人。然亦不久作也。老倦甚矣。秋初決當求去。未知何日會見。臨書悵惘。惟万万以時自愛。不宣。軾再拜。安常處士閣下。

五月廿八日。

人生浮脆。何者爲可恃。如君能著書傳後。有幾念此。便當爲作數百字。仍欲送杭州開板也。知之。知之。

又白。

傷寒總病論目錄

第一卷

太陽證芍藥甘草湯

甘草乾薑湯 調胃承氣湯

陽明證梔子香豉湯

少陽證

太陰證五苓散湯

**橘皮湯**  
**桂枝芍藥湯**

**少陰證** 麻黃細辛附子  
黃連河寥湯

麻黃附子甘草湯  
桔梗甘草湯

四通

風散四逆湯

**厥陰證** 烏梅丸

帝散  
乾薑黃芩湯  
茯苓甘草湯  
白虎湯

兩感證

三陰三陽傳病證

第二卷

可發汗證 桂枝湯 麻黃湯 大青龍湯 萬根湯  
桂枝青龍湯 莫根龍膽湯 麥奴丸

知母麻黃湯

不可發汗證 小建中湯 竹葉湯 防風白朮散  
李根湯 大橘皮湯

四逆證 四逆湯 小青龍湯 桂枝麻黃各半湯

桂枝二麻黃一湯 紫胡桂枝湯 小柴胡湯

可下證 大承氣湯 大柴胡湯 調中小承氣湯

茵陳湯 十棗湯 茵陳丸

不可下證

可水不可水證 五苓散

可吐不可吐證

可灸不可灸證

可火不可火證

可溫證

火邪證 桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯  
桂枝甘草龍骨牡蠣湯

第三卷

結胸證 大陷胸湯  
小陷胸湯

大陷胸丸  
三物白散方

心下痞證 生薑瀉心湯  
半夏瀉心湯

大黃黃連瀉心湯  
甘草瀉心湯

加附子瀉心湯

陽毒證 升麻湯

陰毒證 甘草湯  
硫黃丸

反陰丹  
附子飲子

狐惑證 赤小豆當歸散

百合證 百合知母湯  
百合地黃湯

滑石代赭湯  
百合湯  
桔梗牡蠣散  
百合雞子湯  
百合滑石散

瘧濕暬等證

瘧證 萬根麻黃湯

濕證 黃耆湯  
桂枝附子湯

杏人薏苡湯  
甘草附子湯

暬證 瓜蒂湯  
小橘皮湯

發汗吐下後雜病證

茯苓桂枝湯  
乾薑附子湯  
茱萸桂枝湯  
赤石脂禹餘粮湯

橫榔散  
茯苓白朮湯  
梔子厚朴湯  
旋復花代赭湯

五味子湯  
梔子香豉湯  
葛根芩白湯  
柴胡龍骨牡蠣湯

黃芩梔子湯  
荆芥散

桂枝人參湯  
理中丸

葛根芩白湯  
良薑湯  
黃連當歸湯

茅根湯  
薤白梔子湯

黃芩芍藥湯  
黃連黃檗湯

黃連熱艾湯  
葛根芩白湯

地黃湯  
大黃梔子散

苦芩麗湯  
青黛丸

葛根芩白湯  
葛根芩白湯

麻杏石脂禹餘粮湯  
黃芩梔子散

麻人龍膽丸  
大黃散

麻人龍膽丸  
葛根芩白湯

麻杏石脂禹餘粮湯  
黃芩梔子散

桂枝梔子湯  
升麻大黃湯

桂枝梔子湯  
升麻大黃湯

麻杏石脂禹餘粮湯  
黃芩梔子散

桂枝梔子湯  
升麻大黃湯

第四卷

暑病論

暑病表證代葛根證

大青黃湯

葛粉散

素問載五種暑病無方

代麻黃證

葛根散

## 時行寒疫論

時行寒疫治法趙東黃膏

崔文行解散  
葛根解肌湯

蘆薈湯

## 班豆方論

溫病發班治法小兒證附

地黃膏  
黃連  
五香湯  
薄金散  
麻黃甘草湯  
紫草湯  
油飲子  
桔子薤豉湯

黃芩麻黃湯  
漏蘆湯  
水解散  
薰甲湯  
紅花湯  
甘草湯  
桔巴出定方

樟皮飲子  
葛根石膏湯  
淡竹瀝飲子  
甘草乾薑湯  
犀角升麻湯  
三豆飲子

## 第五卷

### 天行溫病論

辟溫疫方論居春酒附辟溫粉

研雄黃并燮法  
殺鬼丸

傷寒總病論

目錄

青筋牽證 柴胡地黃湯 石膏竹葉湯

赤脈攢證 石膏地黃湯

黃肉隨證 火法附 玄參寒水石湯

白氣狸證 石膏杏人湯 石膏杏白湯

黑骨溫證 火法附 苦參石膏湯 知母解肌湯

溫病噦方論 茅根葛根湯 桑皮飲子 茅根橘皮湯

黃病證 梨石蠍石散

傷寒感異氣成溫病 壞後及瘡證 知母石膏湯

白虎加桂枝湯

石膏甘草散

瓜下散

敗壞別行方 附子繁甲湯 木通桂枝湯 繁甲恒山湯

敗壞別行方 繁甲犀角湯 風引加附子湯

小兒傷寒證 葛根芍藥湯 蘭葉湯 射干湯 地皮湯

傷寒雜方 玄精石湯 瓜蒂牙消散 犀角五香湯

妊娠雜方 麻黃杏子湯 朴消散

妊娠雜方 伏龍肝散 吞雞子法 牛散 阿膠散

陳皮枳實湯

第六卷

鹿角屑湯  
地黃生薑飲子  
傷寒暑病通用刺法  
列缺 太淵 太白 天柱  
商陽 生薑 漏門  
涌泉 小便飲子  
期門  
大黃桃人湯  
石膏括樓湯  
中肺輪  
大杼  
陷谷 丘墟  
手少陰  
曲池  
魚榮

傷寒死生候

熱病死生候

溫病死生候

天行差後禁忌

解仲景脈說  
半夏桂枝甘草湯

解華佗內外實說

辨論

與有位辨傷寒論書

惣論音訓

脩治藥法

# 傷寒總病論卷一

宋 · 劍水龐安時撰

敍 論 凡言龐曰其下有皆安時言

太陽證

陽明證

少陽證

太陰證

少陰證

厥陰證

兩感證

三陰三陽傳病證

敍論

龐曰素問云冬三月是謂閉藏水冰地裂無擾乎陽又云彼春之暖爲夏之暑彼秋之忿爲冬之怒是以嚴寒冬令爲殺厲之氣也故君子善知攝生當嚴寒之時周密居室而不犯寒毒其有奔馳荷重勞力之人皆辛苦之徒也當陽氣閉藏反擾動之令鬱發腠理津液強瀆爲寒所搏膚湊反密寒毒與榮衛相渾當是之時勇者氣行則已怯者則著而成病矣其即時成病者頭痛身疼肌膚熱而惡寒名曰傷寒其不即時成病則寒毒藏於肌膚之間至春夏陽氣發生則寒毒與陽氣相搏於榮衛之間其患與冬時卽

病候無異。因春溫氣而變。名曰溫病也。因夏暑氣而變。名曰熱病也。因八節虛風而變。名曰中風也。因暑濕而變。名曰濕病也。因氣運風熱相搏而變。名曰風溫也。其病本因冬時中寒。隨時有變病之形態爾。故大醫通謂之傷寒焉。其暑病濕溫風溫死生不同形狀各異治別有法。

龐曰。天寒之所折。則折陽氣。足太陽爲諸陽主氣。其經夾脊膂。貫五臟六府之脈。上入腦。故始則太陽受病也。以其經貫五臟六府之脈。故病有臟府傳變之候。以其陽經先受病。故次第傳入陰經。以陽主生。故足太陽水傳足陽明土。土傳足少陽木。爲微邪。以陰主殺。故木傳足太陰土。土傳足少陰水。水傳足厥陰木。至第六七日。當傳足厥陰肝木。必移氣克於脾土。脾再受賊邪。則五臟六府皆危殆矣。榮衛不通。耳聾囊縮。不知人。則死。速用承氣湯下之。方在可下 證中則可保五死一生。勿從容拯溺。令病人水漿不入。湯液不下。無可奈何也。素問云。脾熱病則五臟危。又云。土敗木賊則死。若第六七日傳厥陰脈。得微緩微浮。其證寒熱似瘧。此爲必愈。宜桂枝麻黃各半湯和之。方在可汗 證中微緩微浮爲脾胃脈也。故知脾氣全不再受克。邪無所容。否極泰來。榮衛將復。水升火降。則寒熱作而大汗解矣。人將大汗必冒昧者。若久旱天將時雨。六合皆至昏昧。雨降之後。草木皆蘇。庶物明淨。玉冊所謂換陽之吉證也。

王叔和云。土地溫涼。高下不同。物性剛柔。餐居亦異。是以黃帝興四方之間。岐伯立四治之能。以訓後賢。開其未悟。臨病之工。宜兩審之。

龐曰。叔和非醫之圓機。孰能臻此也。如桂枝湯自西北二方居人。四時行之。無不應驗。自江淮間地偏暖處。唯冬及春可行之。自春末及夏至以前。桂枝麻黃青龍內宜黃芩也。自夏至以後。桂枝內又須隨證增知母、大青、石膏、升麻輩取汗也。若時行寒疫及病人素虛寒者。正用古方。不在加減矣。夏至以後。雖宜白虎。詳白虎湯。自非新中暑而變暑病。乃汗後解表藥耳。一白虎未能驅逐表邪故也。或有冬及始春。寒甚之時。人患斯疾。因汗下偶變狂躁不解。須當作內熱治之。不拘於時令也。南方無霜雪之地。不因寒氣中人。地氣不藏。蟲類泄毒。嵐瘴間作。不在此法。治別有方也。又一州之內。有山居者。爲居積陰之所。盛夏冰雪。其氣寒。腠理閉。難傷於邪。其人壽。其有病者多中風中寒之疾也。有平居者。爲居積陽之所。嚴冬生草。其氣溫。腠理疎。易傷於邪。其人夭。其有病者多中濕中暑之疾也。凡人稟氣各有盛衰。宿病各有寒熱。因傷寒蒸起宿疾。更不在感異氣而變者。假令素有寒者。多變陽虛陰盛之疾。或變陰毒也。素有熱者。多變陽盛陰虛之疾。或變陽毒也。

龐曰。四時之中。有寒暑燥濕風火相搏。臺變諸疾。須預察之。其飲食五味禽魚蟲菜果實之屬。性偏有嗜者。或金石草木藥素嘗有食者。人五臟有大小。高下。堅脆。端正偏傾。六府亦有大小長短。厚薄緩急。令人終身長有一病者。貴者後賤。富者乍貧。有常貴。有常富。有暴富。有暴貧。有暴樂。有暴苦。有始樂後苦。有離絕蘊結。憂喜怒者。夫常貴後賤。名曰脫營。常富後貧。名曰失精。暴樂暴苦。始樂後苦。精竭體沮。脫勢候

王精神內傷情慕尊貴。妄爲喪志。始富後貧。焦皮蠟筋。常富惡勞。驕墮精消。離間親愛者。魂遊絕所。懷者意喪所慮者。神勞結怨恨者。志苦憂愁者。閉塞而不行。盛怒者迷惑而不治。恐懼者薄憚而不收。喜樂者擇散而不藏。此皆非外邪所中。而得之於內也。良工必預審問其由。先知臟府經絡受病之所。可舉萬全。工不思曉。令五臟六府血氣離守。迨靈不救。又何言哉。

龐曰。陰陽虛盛者。非謂分尺寸也。榮衛者。表陽也。腸胃者。裏陰也。寒毒爭於榮衛之中。必發熱惡寒。尺寸俱浮大。內必不甚躁。設有微煩。其人飲食欲溫而惡冷。謂陽虛陰盛也。可汗之則愈。若誤下則死也。若寒毒相薄於榮衛之內。而陽勝陰衰。極陰變陽。寒盛生熱。熱氣盛而入裏。熱毒居腸胃之中。水液爲之乾涸。燥養結聚。其人外不惡寒。必蒸蒸發熱而躁甚。則讛語。其脈浮滑而數。或洪實。或汗後脈雖遲緩之有力。外證已不惡寒。腹滿而喘。此皆爲陽盛陰虛。當下之則愈。若誤汗則死也。仲景載三等陽明。是陽盛陰虛證矣。調經論云。陽虛則外寒。陰虛則內熱。陽盛則外熱。陰盛則內寒。以此別之。若陰獨盛而陽氣暴絕。必四肢逆冷。牕篋湊痛。身疼如被杖。面青或吐或利。脈細欲絕。名曰陰毒也。須急灸臍下。服以辛熱之藥。令陽氣復生。濶然汗出而解。若陽獨盛而陰氣暴絕。必發躁狂走。妄言面赤咽痛。身斑斑如錦文。或下利赤黃。脈洪實。或滑促。名曰陽毒也。宜用針泄。服以苦酢之藥。令陰氣復生。濶然汗出而解也。

龐曰。夫邪逆陰陽之氣。非汗不能全其天。真紫問云。辛甘發散爲陽。謂桂枝、甘草、細辛、薑、棗、附子之類。能

復陽氣也。酸苦澆泄爲陰。謂苦參、大青、葶藶、苦酒、艾之類。能復陰氣也。酸苦之藥既折熱復陰。亦當小汗而後利者。經云。身汗得而後利。則實者可活是也。

華佗治法云。傷寒病起自風寒入於腠理。與精氣分爭。榮衛否隔。周行不通。病一日至二日。氣在孔竅皮膚之間。故病者頭痛惡寒。身熱。腰背強重。此邪氣在表。隨證發汗則愈。

龐曰。凡發汗須如常覆腰以上。厚衣覆腰以下。以腰足難取汗故也。半身無汗。病終不解。凡發汗後。病證仍存於三日內。可二三發汗。令腰脚周遍爲度。若病不解。便可下之。設令下後。不解。表裏邪亦衰矣。更觀脈證調治。七日內可期正汗爲善也。發汗後不可再行汗者。始發熱惡寒。今不惡寒。但倍發熱而躁。始脈浮大。今洪實或沈細數。始惺靜。今狂語。此胃實陽盛。再行汗藥即死。須當下之。有人始得病。變陽盛之證。須便下之。不可拘日子深淺次第也。病三日以上。氣浮上部。填塞胸心。故頭痛胸中滿。或多痰涎。當吐之。則愈。

龐曰。若虛損及新產人。不能吐者。可服枳實散。枳實細末。米飲調。錢。日可三四服。若有虛寒。手足冷及脈微弱者。枳實貳兩加桂枝壹兩同末之。如前服。

病五六日以上。氣結在臟府。故腹滿身重。骨節煩疼。當下則愈。若小便少。手足心并腋下不滋潤。尙未可攻之。當消息其候。不可亂投湯藥。虛其胃氣也。以上解華佗治法。

太陽證

尺寸俱浮者太陽受病也。當一二日發以其脈上連風府故頭項痛而腰脊強。此是太陽勝胱經。屬水。  
太陽病發熱汗出惡風其脈緩者名爲中風。太陽病或已發熱未發熱必惡寒體痛脈陰陽俱緊者名爲  
傷寒。

傷寒一日太陽受之脈若靜者爲不傳。頗欲吐若煩躁脈數急者爲傳也。

傷寒二三日陽明少陽證不見者爲不傳也。病發熱而惡寒邪發於陽也不熱而惡寒者邪發於陰也。發  
於陽者七日愈發於陰者六日愈陽數七陰數六故也。發於陽者隨證用汗藥攻其外。發於陰者用四逆輩溫其內。

太陽病頭痛至七日以上自愈者其經竟故也。若欲作再經者針足陽明使經不傳。補足陽明土三里穴也。

風者解表而不了了者十二日愈。方言曰南楚疾愈。謂之差或謂之了。

太陽病初服桂枝湯反煩不解先刺風池風府却與桂枝湯則愈。

太陽病自汗四支難以屈伸若小便難者可與陽旦證內加附子壹枚炮去皮尖八破同煎服之。陽旦即桂枝湯異名桂草乾薑湯與之以復陽氣若厥愈足溫更與芍藥甘草湯其脚卽伸若胃氣不和讒語者少與調胃承氣湯微溏則讒語止。

芍藥甘草湯主脈浮而自汗。小便數。寸口脈浮大。浮爲風。大爲虛。虛則生微熱。虛則兩脅掣。小便數。仍汗出。爲津液少。不可誤用桂枝湯。宜補虛退熱通治。誤服湯後。病證仍存者。按古之參附。淮今之壹兩。古之壹升。若以古方裁減。以合今升。一劑則銖兩。升合之分毫。難以從俗。莫若以古今升秤均等。而減半爲一劑。稍增其枚粒。乃便於俗爾。且仲景方云。一劑盡。病證猶在者。更作減半之劑。此古方一劑又加其半。庶可防病未盡而服之也。有不禁大湯劑者。再減半亦得。肘後所謂或以壹分爲兩。或以貳銖爲兩。以盡當升可也。貧家難辦。或臨時抄撮皆可。龜末每抄五錢。水兩平蓋。煎八分服之。有鹽聚者。每服入鹽三片。聚三枚。一日三服。未中病可六七服也。有不可作羹散者。是病勢大。宜依古方行之。凡湯劑。有附子一枚。半之劑。合用附子一枚半。古方不折枚者。是枚力要完也。半兩以上。大附子可當一枚半。四錢以下者。可用兩枚爲准。枚傷多不妨。仲景云。強人可加附子成兩枚是也。甘草半。芍藥半。各武兩

芍藥

甘草半。各武兩

細剉水壹升半。煎七合半去滓。溫分再服。

甘草乾薑湯

甘草。乾薑。各壹兩

煎如前方。

調胃承氣湯

大黃。甘草。芒消。各壹兩

細剉水壹升。煎上二味至五合。去滓。下芒消烊化。暖服壹盞。微溏爲度。如難利者。再與一劑。

太陽病汗證。反下之。遂利不止。脈促。表未解也。喘而汗出者。葛根黃芩湯主之。

黃芩 參錢 黃連 參兩 甘草 半兩 乾葛 一兩

細剉水煎升半煎七合半去滓溫飲壹盞日三服。

陽明證

尺寸俱長者陽明受病也。當二三日發以其脈夾鼻絡於目故身熱目痛鼻乾不得臥。此證黑寒可發汗若調胃承氣湯方在太陽證下。

龐曰：有三陽陽明者其太陽陽明本太陽病若發汗若下若利小便此亡津液胃中乾燥因轉屬陽明也少陽陽明者本傳到少陽因發汗利小便已胃中燥大便難也正陽陽明者病人本風盛氣實津液消鑠或始惡寒汗出多寒罷而反發熱或始得病便發熱狂言也。

凡陽明證俱宜下唯中寒惡寒爲病在經與太陽合病屬表可發其汗。

二陽合病脈必浮大而長外證必頭痛腰疼肌熱目疼鼻乾也浮大者太陽受病也長者陽明也頭腰太陽也肌肉鼻陽明也。

二陽併病太陽證罷但發潮熱手足熱汗出大便難而譫語者大承氣湯下之則愈方在太陽證中下

二陽併病太陽初得時發其汗汗先出復不徹因轉屬陽明自微汗不惡寒若太陽證不罷不可下下之爲逆如此者可小發其汗設面赤者陽氣怫鬱在表當解之蒸之若汗出不徹當短息不足言陽氣

怫鬱不得越。當汗出而不汗。其人短氣。但坐以汗出不徹故也。宜麻黃湯。更發其汗即愈。何以知其汗不徹。其脈濫故知也。方在可汗證中。古本字多差誤。以從來所見病人證候中。符合如此。故改正。陽明病能食爲中風。不能食爲中寒。

陽明病中寒。脈浮無汗。其人必喘。發汗則愈。宜麻黃湯。

方在可汗證中。

陽明病。脈遲。汗出多微。惡寒者。表未解。發汗則愈。宜桂枝湯。

方在可汗證中。

若不惡寒。爲外欲解。手足濶然汗出。方在可下。

者大便已硬。宜大承氣湯。

方在可汗證中。

陽明病有不可攻者。謂陽明病心下硬滿者不可攻。攻之利不止者死。利止者愈。

陽明病或發汗。或自汗。大便雖硬。小便少者。未可攻。津液恐還入胃。必先輕後滯也。小便自如。乃可攻之。  
亦不宜正與汗藥。別與消詳也。

陽明病脈浮而緊。咽乾口苦。腹滿而喘。發熱汗出。不惡寒而反惡熱。身重。若發汗。則煩躁憤憤。反讐語。若加溫針。必恍惚煩躁。不得眠。若下。則胃中空虛。客氣動鬲。心中懊憹。苦生舌上者。梔子香豉湯主之。

肥梔子 拾收 香豉 貳合

水貳升。煮梔子減半。下豉再煮。剗合去滓。溫服壹盞。得快吐者。止後服。

脈浮緊。必無汗。而反有汗。咽燥。腹滿。惡熱。法當下之。而又脈浮緊。不當下。此恐變風溫。宜細詳。

陽明病口鼻燥但漱水而不欲嚥者必衄。

少陽證

尺寸俱弦者少陽受病也。當二三日發以其脈上循脇絡於耳故胸脇痛而耳聾。脈浮而緊曰弦非謂弦脈也。凡傷寒脈浮緊相搏皆屬弦之類也。有屬太陽有屬陽明者少陽正得弦脈體是小弦長大脈也多宜和表鮮有汗證。

足少陽膽屬木弦者細長如琴弦狀仲景云。

少陽之證口苦咽乾目眩也。

此三陽經皆病未入於藏可汗而解。仲景少陽證唯小柴胡乃和表藥耳。

弦細頭痛發熱屬少陽宜小柴胡湯不可發汗發汗則讞語此屬胃胃和則愈不和則煩而躁宜調胃承氣湯此屬少陽陽明證也。方在太陽證中。

本太陽病不解轉入少陽者脇下癢滿乾嘔不能食往來寒熱尙未可吐下脈緊者小柴胡湯主之加少牡蠣牡蠣。

若已吐下發汗溫針讞語小柴胡湯證罷此爲壞病知犯何逆以法治之。知犯何逆者犯四種溫病壞候也。

少陽中風兩耳微聞目赤胸中滿而煩不可吐下吐下則驚悸小柴胡湯主之。方在和表證中。

三陽合病脈浮大上關上但欲眠睡合目則汗不言弦者隱於長大也。

三陽合病面垢讞語腹滿身重不能轉側遺尿發汗則讞語下之則額上生汗手足逆冷若自汗者宜白

虎湯 方在厥陰  
證中

傷寒四五日或六七日無大熱其人躁悶此爲陽去入陰也。

傷寒三日三陽爲盡三陰當受邪其人反能食而不嘔此爲三陰不受邪也。病到陰必吐利

傷寒三日少陽脈小者欲愈也小而平勻者也

### 太陰證

尺寸俱沈細者太陰受病也當四五日發其經布胃中絡於嗌故腹滿而嗌乾宜大承氣湯下之方在可下證中脈大而胸滿多痰者宜吐之無此證者宜汗之傷寒脈浮緩類大之手足自溫者繫在太陰小便不利者必發黃五苓散加茵陳主之若小便自利者不能發黃至七八日雖暴煩下利日十餘行必自止以脾家實腐穢當去故也橘皮湯主之

### 五苓茵陳散

以茵陳濃煎湯調五苓散貳錢服之日三四黃從小便下以小便清爲度。

### 橘皮湯

橘皮 壹兩 生薑 貳兩

細剉水壹升半煎七合去滓分貳服稍熱呷未差再作服

本太陽病醫反下之因爾腹滿時痛者屬太陰也桂枝芍藥湯主之

桂枝 壹兩 芍藥 叁兩 甘草 壹兩 大棗 四枚

㕮咀以水叁升煮取壹升半去滓每溫壹盞日叁服芍藥爲君小建中湯不用鈿糖故也

少陰證

尺寸俱沉者少陰受病也當五六日發以其經貫腎絡於肺繫舌本故口燥舌乾而渴大承氣湯下之在方

可下腹中

少陰之爲病脈微細但厥寐也

少陰中風陽微陰浮爲欲愈也

凡少陰病四逆者宜溫之

少陰病始得之反發熱脈沉者麻黃細辛附子湯主之

麻黃 貳兩 細辛 貳兩 附子 壹枚

㕮咀以水三升先煮麻黃十數沸去上沫內諸藥煮取壹升去滓每溫壹盞日三服

少陰病得之二三日麻黃附子甘草湯微汗以二三日無陽證故微發汗也。

謂初得病二三日當見少陰證無陽者須發小汗也

麻黃

貳兩

甘草

貳兩

附子

壹枚

㕮咀以水一升先煮麻黃十數沸去上沫內諸藥煮取壹升半去滓每溫一盞日三服。

龜曰少陰病脈沉不知何沉也且沉緊發汗則動經沉數爲病在裏不可發汗詳此脈或沉而濡或沉而微是表中寒而裏不消脈應裏而發熱在表故以小辛之藥溫散而微微取汗也。

太谿穴在內踝後跟骨上動脈陷中冒發熱者謂其身發熱也

少陰病吐利煩躁四逆者死

煩躁者內煩躁也與茱萸湯證宜細審其生死也

少陰病惡寒而勑居貴時時自煩不欲厚衣宜大柴胡湯

方在可下證中

少陰病四逆惡寒而自勑脈不至而吐利煩躁者死

重詳定此

少陰病下利利止而眩時自冒者死

此合是少陽冒味汗濶出脈匀

少陰病六七日息高者死

少陰病脈微細沉但欲臥汗出不煩自欲吐至五六日自利復煩躁不得臥寐者死。

少陰病得之二三日以上心中煩不得臥者黃連阿膠湯主之。

黃連

壹兩

黃芩

壹分

芍藥

壹分

雞子黃 半枚

阿膠 炙 參分

以水貳升先煮三物取壹升去滓內阿膠烊盡小冷內雞子黃攪令相得溫溫一盞日三四服。

少陰病下利清穀裏寒外熱手足厥逆脈微欲絕身反不惡寒其人面赤或腹痛或乾嘔或咽痛或利止

方在可下證中

少陰病吐利手足厥冷煩躁欲死者茱萸湯主之。

茱萸 壹兩半 湯

人參 參分

大棗 叁個

以水叁升半煮取壹升半去滓每溫一盞日叁服。

少陰病咽痛者桔梗甘草湯主之。

桔梗 半兩

甘草 壹兩

細剉水壹升煎半勝去滓作叁服細呷之。

又半夏散亦主之。

半夏 湯洗七遍

桂枝 去皮

甘草 炙

右各等分各別搗篩已合治之每服叁錢水壹盞半煎至八分溫冷少少嚥之。

少陰病下利清穀裏寒外熱手足厥逆脈微欲絕身反不惡寒其人面赤或腹痛或乾嘔或咽痛或利止

脈不出者通脈四逆湯主之。

甘草 壹兩

附子 大者半個  
人加半個  
強

乾薑 叁分  
加壹兩半  
人

細剉水三升煎至一升去滓每溫服一盞日三四服未差急更作一劑不可作煮散其脈續續出者愈暴出者死面赤者加連須葱四莖去青腹痛去葱加芍藥壹兩嘔者加生薑壹兩咽痛者去芍藥加桔梗半兩利止脈不出者去桔梗加人參半兩病與方皆相應者乃與服之。

少陰病下利六七日欬而嘔渴心煩不得眠者宜豬苓湯。

豬苓 茯苓

澤瀉 滑石

阿膠 各半  
兩

咬咀以水貳升先煮四物取壹升去滓內阿膠末烊盡每溫一盞服。

少陰病下利咽痛胸滿心煩豬膚湯主之。

豬膚 半斤

以水五升煮取貳升半去滓加白蜜半升白粉貳合半熬香和令相得每溫服一盞日三四服。

少陰病四逆其人或欬或悸或小便不利或腹中痛或泄利下重者四逆散主之。

甘草 枳實

柴胡 芍藥各伍  
分

擣篩爲細末白飲和服方寸匕日三服欬者加五味子乾薑炮各貳分半并主下利悸者加桂貳分

半小便不利者加赤茯苓貳分半腹痛者加附子壹箇炮去皮臍泄利下重者先以水叁升薤白湯一盞煎八分日三四服

厥陰證

尺寸俱微者厥陰受病也六七日發以其脈循陰而絡於肝故煩滿而囊縮微緩者囊必不縮寒似瘡爲欲愈候若外證發熱惡

各半湯也若尺寸俱沉短者裏必縮宜承氣湯下之方在可下證中

厥陰之爲病消渴氣上衝心心中痛熱飢而不欲食食則吐衄下之利不止烏梅丸主之

傷寒脈微而厥至七八日膚冷其人躁無暫安者此藏厥非衄厥也衄厥者其人當吐衄令病者靜而復煩也此藏寒衄上入其鬲故煩須臾復止得食而嘔又煩者衄聞食臭卽出其人常自吐衄衄厥者烏梅丸主之又治久痢藏厥宜四逆證

烏梅

壹百伍

拾個

黃連

捌兩

當歸

貳兩

川椒

桂枝

附子

人參

黃芩

細辛

各叁

累擣篩合治之以苦酒浸烏梅一宿去核蒸之貳斗米下飯熟擣成泥和藥令相得內白中與蜜再杵二千下丸如梧桐子大先食飲服十九日三服稍加至二十九禁生冷滑臭食物等厥陰中風脈微浮者爲欲愈不浮爲未愈

脈遲反以黃芩湯得微其熱腹中應冷當不能食今反能食此爲除中必死。

先厥後發熱下利必自止而反汗出咽痛者其喉爲痺發熱無汗其利自止若不止必便膿血者其喉不痺。

龜曰熱少微厥指頭寒嘿嘿不欲食煩躁數日小便自如此熱除也宜乾薑甘草湯方在太陽證中

龜曰手足逆冷皆屬厥陰不可下亦不可汗有須下證者謂手足雖逆冷或有溫時手足雖逆冷而手足掌心必緩非正厥也故可消息汗下也。

傷寒一二日至四五日厥者必發熱前發厥者後必發熱厥甚熱亦甚厥微熱亦微厥不過五日六日不厥者必愈若六日厥者必發熱愈甚仍下利也。

龜曰寒熱而厥面色不澤冒昧者當用絲衣包手足令溫緩必大汗而解也有不因大汗下而兩手忽無脈謂之雙伏或一手無脈謂之單伏或利止如此必有正汗急用四逆輩溫之時有汗便安脈終不出者死下利先厥後發熱利必自止不爾咽中痛或喉痺若便膿血者其喉不痺。

厥而下利者當不能食反能食者爲除中必死能食反發熱脈數者必發癰膿厥而嘔胸脇煩滿後必便膿血。

病者手足冷小腹按之痛此結冷在膀胱關元也。當關元灸之發熱下利厥逆躁不得臥者死。

病人手足厥冷脈乍緊者邪結在胃中心下滿而煩不能飲食者病在胸中當吐之宜瓜蒂散凡病可吐者皆宜此方

瓜蒂 赤小豆等分

細末別以香豉壹合熱湯參蓋煮作稀糜去滓取汁和散壹錢溫溫頓服不吐者少少加藥再服得吐快乃止諸亡血虛家不可與服有用丁香者吐之  
多霍燥人

傷寒厥而心下悸宜先治水當服茯苓甘草湯次治其厥不爾水漬入胃必作利也茯苓甘草湯

茯苓各半兩 生薑半兩 甘草半兩

細剉水貳升煎壹升溫飲壹盞悸止爲度

傷寒六七日大下後寸脈沉而遲手足厥逆下部脈不至咽喉不利睡腹血泄利不止者爲難治宜麻黃升麻湯有不因下而自利加  
歸血者亦宜此方

麻黃壹兩 當歸各半兩 知母 黃芩

萎蕤各三錢 茯苓

甘草 石膏 白朮 乾薑各壹錢半

細剉水貳升半先煮麻黃一二沸去沫內諸藥煮壹升貳合去滓溫服一盞如人行七八里久進一

服以汗出卽住服。

本自寒醫復吐下之寒格愈逆食入口卽吐宜乾薑黃芩湯。

乾薑  
黃芩  
黃連  
人參各一兩半

細剉水參升煮取壹升半去滓溫服一盞。

下利微熱而渴脈弱者自愈脈數汗出亦然緊爲未解發熱而厥七日下利爲難治。

凡厥通用四逆湯方在四逆證中謂其脈浮遲或微或細或沉皆屬裏有寒也。

厥而脈滑者爲裏有熱白虎湯主之。

知母  
石膏  
甘草  
粳米各一兩半

以水五升煮米熟湯成去滓溫服一盞日三服有渴加人參半兩。

龐曰三陽皆有合病凡合病者有十四證唯三陰無合病。

兩感證

龐曰素問載兩感於寒其脈應與其病形者一日則互陽與少陰俱病頭痛口乾而煩滿二日則陽明與太陰俱病腹滿身熱不欲食讌語三日則少陽與厥陰俱病則耳聾囊縮而厥水漿不入口不知人六日死言其六日死者是藏府榮衛或有所通行故四日少陰與太陽俱病五日與太陰與陽明俱病六日厥

陰與少陽俱病。是重傳得六日死矣。其有三日死者。素問謂陽明爲五藏十二經脈之長。其邪氣盛故不知人。三日其氣乃絕。故死矣。夫邪氣盛則實。表裏邪實併領血氣入胃不通於榮衛氣血。故氣血隨邪而盡。則三日死矣。其脈候素問已脫。今詳之。凡沉者皆屬陰也。一日脈當沉而大沉者少陰也。大者太陽也。二日脈當沉而長。三日脈當沉而弦。乃以合表裏之脈也。沉長沉弦皆隱於沉大。凡陰不當合病。唯三陽可以合病。今三陰與三陽合病。故其脈似沉緊而大。似沉實而長。亦類革至之死脈也。

三陰三陽傳病證

龐曰。傷寒一日。巨陽受病。前所說膀胱詳矣。病源云。小腸雖則誤其標。本其手足陰陽。自有併病者。故素問云。六日三陰三陽五藏六府皆受病。榮衛不行。五藏不通。則死矣。是表裏次第傳。不必兩感。亦有至六日傳徧五藏六府而死者也。素問云。諸浮不躁者。皆在陽。則爲熱。其有躁者。在手。假令第一日脈不躁。是足太陽膀胱脈先病。脈加躁者。又兼手太陽小腸也。又云。諸細而沉者。皆在陰。則爲骨痛。其有靜者。在足。假令第四日脈靜者。足太陰始傳病也。脈加數者。又兼手太陰病也。故六日亦能傳徧藏府也。躁謂脈數。靜謂脈不數。用藥則同。若用鍼。須取足與手之經也。

# 傷寒總病論卷二

可發汗證

不可發汗證

四逆證

可下證 血證附

可水不可水證

可灸不可灸證

可溫證

和表證  
不可下證

可吐不可吐證

可火不可火證

火邪證

可發汗證

大法春宜發汗

太陽中風。陽浮而陰弱。陽浮者自發熱。陰弱者自汗出。嗌嗌惡寒。淅淅惡風。翕翕發熱。鼻鳴乾嘔者。桂枝湯主之。

桂枝

芍藥

生薑

半  
各壹兩

甘草

壹兩

大棗

陸個

咬咀。水吞升半。微火煎取壹升。七合半。生布絞去滓。溫服一盞。須臾啜熱粥一椀。令助藥力。周覆一

時汗偏身濺濺者益佳不可令如水流漓病必不除若一服汗出病差止後服不必盡劑也若不汗如前法更服半日許令三服若病重者一日一夜可盡一劑病證猶存者更作服若汗未出乃至二

太陽病初服桂枝湯反煩不解者先刺風池風府却與桂枝湯則愈按風池是少陽之經陽維之會不針天柱而取風池者陽維維諸陽巨陽與諸陽主氣故也

龐曰凡桂枝湯證病者常自汗出小便不數手足溫和或手足指梢露之則微冷覆之則溫渾身熱微煩而又憎寒始可行之若病者身無汗小便數或手足逆冷不惡寒反惡熱或飲酒後慎不可行桂枝湯也

**太陽病發汗遂漏不止其人惡風小便難四支微急難以屈伸者桂枝加附子湯主之**桂枝湯內加附子一錢炮去皮尖切片  
桂枝湯內加附子一錢炮去皮尖切片

下後脈仍脹滿者桂枝去桂藥湯主之成結胸故去芍藥之佐全用辛甘發散其寒氣也服桂枝湯或下之仍頭項強痛翕翕發熱無汗心下滿微痛小便不利者桂枝去桂加白朮茯苓各一兩半主之不用桂加水成四升取二升

**太陽病項背強几几汗出惡風者桂枝加葛根貳兩添水成四升煎取貳升通治柔痓**

太陽下之微喘者表未解也。桂枝加杏人厚朴湯主之。桂枝內加厚朴一兩  
杏人肆拾枚此則中風自汗用桂枝湯證也。龐曰惡寒者不當風而憎寒惡風者當風而憎寒皆屬表證太陽病頭痛發熱身疼痛骨節煩疼惡風無汗而喘者麻黃湯主之。

麻黃三兩桂枝壹兩甘草半兩杏人叁枚

咬咀水貳升半煮麻黃數沸去上沫內諸藥煮取壹升貳合半去滓每飲一盞續次服盡不用粥投溫覆如桂枝法將息未汗可再作二三劑。龐曰傷寒之脈緊盛而按之澀是也。脈浮而緊浮爲風緊爲寒風傷衛寒傷榮榮衛俱病骨節煩疼外證必發熱無汗或喘其人但憎寒手足指未必微厥久而復溫掌心不厥此傷寒無汗用麻黃證。

凡脈浮數或浮緊無汗小便不數病雖十餘日尙宜麻黃湯也。

太陽中風脈浮緊發熱惡寒身痛不汗出而煩躁者大青龍湯主之。若脈微弱自汗出惡風者不可服之。服之則厥逆筋惕肉瞞此爲逆也。大青龍湯。

麻黃三兩桂枝各一兩甘草半兩石膏各一兩

杏人肆拾枚棗伍枚生薑壹兩

咬咀水五升煮麻黃數沸去上沫內諸藥煮取二升每溫飲一盞微汗爲度若汗周身潤則止服未

周身潤可停待少時服盡。不欲汗多亡陽故也。亡陽遂虛。惡風煩躁。不得眠也。

傷寒脈浮緩。身不疼但重。乍有輕時。無少陰證者。大青龍湯主之。

少陰當言太陰。按太陰證內有脈浮緩。手足溫者。繫太陰。太陰當發汗。證屬青龍湯。似桂枝證反無汗而脈緊。似麻黃證反身不疼而脈浮緩。

太陽病項背几几無汗惡風。葛根湯主之。

葛根 貳兩

甘草 豈兩

麻黃 半兩

桂枝 豈兩

芍藥 豈兩

生薑 半兩

大棗 陸枚

咬咀水四升。先煮麻黃葛根數沸。去沫下諸藥。煮取貳升半。去滓。每溫飲一盞。日三服。如桂枝湯將息。

太陽與陽明合病。必自下利者。葛根湯主之。

太陽與陽明合病不利但嘔者。葛根加半夏湯主之。用前葛根湯內加半夏壹兩。壹分。湯洗十遍。每個作四破。

龐曰。脈浮緊無汗。服湯未中病。其人發煩。目瞑極者。必衄。小衄而脈尚浮者。宜麻黃湯。衄後脈已微者。不可再行也。凡脈浮自汗。服湯不中病。桂枝證尚在。必頭痛甚而致衄。小衄而脈尚浮者。再與桂枝湯。衄後脈已微者。不可再行也。

傷寒三日後。與諸湯不差。脈勢如數。陽氣猶在經絡。未入藏府。宜桂枝石膏湯。此方可夏至後代。桂枝證用之。若加麻黃壹兩。可代麻黃青龍湯用之。

石膏

參兩

梔子

貳拾肆個

生薑

壹兩

桂枝

各壹兩

黃芩

各壹兩

甘草

各半兩

升麻

葛根半兩

哎咀水五升。煮取貳升半去滓。溫飲一盞。食頃再服。若得汗即止後服。

龐曰。凡發汗以辛甘爲主。復用此苦藥者何也。然辛甘者折陰氣而助陽氣也。今熱盛於表。故加苦以發之。素問云。熱淫于內。以苦發之故也。

葛根龍膽湯。療病四五日不差。身體毒熱面赤。兼治陽毒風溫。

葛根

生者肆兩

者貳兩代

乾

生薑

升麻

大青

龍膽

桂枝

各半兩

甘草

麻黃

芍藥

各半兩

蒸蕤

壹兩

石膏

壹兩

半兩

哎咀水四升半。下麻黃煮數沸。去上沫。內諸藥煎貳升。去滓。溫飲一湯盞。日三夜二。

凡葛根須用家園味。多白粉者爲佳。

若誤用味苦野葛多  
吐人轉增病多

時行熱病。六七日未得汗。脈洪大或數。面目赤。身體大熱煩躁。狂語欲走。大渴甚。又五六日以上不解。熱在胃中。口禁不能言。爲塊傷寒。醫所不能治。如死人。或精魂已竭。心下緩緩。發開其口。嚥藥下咽。卽活。兼

治陽毒麥奴丸。

麻黃

• 參分

釜底煤

黃芩

竈底墨

梁上塵

小麥奴

竈中黃土

芒消

大黃

各半

細末蜜丸彈子大。新汲水三合。和一丸研服之。渴者但令冷水足意飲之。須臾當寒竟。汗出便差。若日移五尺不汗。依前法再服一丸。差即止。須微利。小麥奴乃小麥未熟時叢中黑莖。捻之成黑勃者是也。無即以小麥炒黑焦。地上出火毒用之亦得。此藥須是病人大渴倍常躁盛。若小渴者強與之爲禍耳。強人每服半雞子大。亦治溫

傷寒連服發汗湯七八劑。汗不出者死。如中風法蒸之。使溫熱之氣外迎。無不得汗也。古今用效。薪火燒地良久去火掃地。以水洒之。取蠶沙、桃柏、荊葉、棟及麥麩皆可。同和鋪燒地上。可側手厚上鋪席。令病人臥席上。溫覆之。熱月只可夾被覆。其汗立出。後周身至腳心皆汗濺濺。乃用溫粉撲止。移之上牀即愈。無蠶沙。卽用麩糠之類鋪燒地上亦得。溫粉法。白朮。藁本。白芷各兩。赤小豆一升。入英粉拾貳兩。和勻用之。無英粉以蚌粉代之。

傷寒差後。有不了了證者。謂至十日或半月二十日。終不惺惺。常昏沉似失精神。言語錯謬。或無寒熱。有似鬼祟。或朝夕潮熱。煩亦或有寒熱如瘧狀。此乃發汗不盡。餘毒氣在心胞絡間所致也。宜知母麻黃湯。

知母

半  
• 蒿兩

麻黃

• 蒿兩

芍藥

黃芩

甘草

桂枝

各半兩

咬咀水貳升半煮麻黃數沸去上沫內諸藥取壹升參合去滓每溫飲一大盞半日可相次三服溫覆令微汗若心煩欲水當稍與之令胃中和則愈未汗盡劑

太陽病下之後氣上衝其脈必浮可依證發汗不與汗則成結胸也凡發汗脈浮大雖大便祕小便少者可發汗而解也合汗不汗諸毛孔閉塞閼絕而死

不可發汗證

脈浮緊法當身痛當以汗解假令尺中脈遲爲榮氣不足血少故也。前陽明病脈遲汗出多微惡寒不責榮不足蓋尺脈長大而遲也此若軟繫而遲不可汗宜小建中湯

小建中湯

桂枝

參分

生薑

參分

芍藥

半兩

甘草

半兩

棗

陸枚

飴糖

半兩

咬咀水貳升半煮取九合去滓方下飴糖煎令化每溫飲一湯盞日進二三服尺尙遲再作一劑入人參加半兩同煎最良舊有微滯或嘔者不用飴糖也兼治傷寒一二日胸中悸而煩及汗後身疼脈沉遲又治傷寒陽脈澀陰脈弦法當腹中急痛先小建中湯不差與柴胡湯方在和表證中

龐曰。凡脈緊病必無汗。唯濡而緊病必自汗。勿誤行桂枝。宜建中湯也。

脈濡弱不可發汗。汗則厥而煩躁。不得眠。

諸動氣在心腹上下左右。不可發汗。

龐曰。諸脈動數微弱。不可發汗。

以上並宜建中湯。若煩躁者宜竹葉湯。

竹葉湯治虛煩。病似傷寒。身亦熱而煩躁。頭不痛。身不疼。脈不數者。兼治中渴。渴吐逆而脈滑數者。及傷寒解後。虛羸少氣。氣逆欲吐者。並宜服之。

淡竹葉 半把

石膏 肆兩

半夏 參分

人參 半兩

甘草 半兩

麥門冬 貳兩

粳米 壹合

淘過

細剉以水伍升煎。貳升半米熟去滓。溫飲一盞。日進三服。夜二服。嘔者加生薑一兩半。不嘔不用。

虛煩或嘔吐。脈弦細芤遲。手足微寒。胸滿者。橘皮湯主之。兼治暴煩下利。

方在太陰證中。

四逆不可發汗。發汗則聲嘶舌萎。不得前言。亂睛眩者。命將難全。

咽中閉塞。不可發汗。發汗則吐血。氣微絕。手足不能自溫者。乾薑甘草湯主之。

方在太陰證中。

淋家不可發汗。發汗必便血。

瘡家雖身痛不可發汗。汗出則瘡血過多。

動氣在右不可發汗。汗出則虧而渴心苦煩。飲則吐水。動者謂心腹中虛氣動。若誤汗有此證。先宜五苓散三服。方在可水證中。次服竹葉湯。方在前。但先服防風白朮散。次服建中湯。方在前。防風白朮散。

防風壹兩 牡蠣粉半兩 白朮參分

細末溫米飲調下二錢。日二三服。汗出續與建中湯。動氣在上不可發汗。發汗則氣上衝。正在心端。李根湯主之。

半夏半兩 桂枝 當歸 茯苓 芍藥 黃芩

甘草 人參各壹分

麴末每五錢水兩盞。薑三片。甘李根白皮一圓。如雞子黃大煎八分通口。日三五服。動氣在下不可發汗。發汗則心中大煩。骨節苦痛。目運惡寒。食則反吐。穀不得前。先服大橘皮湯得吐止。後服建中湯。

大橘皮湯亦主手足冷嘔噦。

橘皮壹兩 薑貳拾肆箇 甘草半兩

人參壹分 竹茹半兩

㕮咀水參升煎壹升半去滓溫服一盞。食頃再服。

不當汗而強汗之，則津液枯槁而死。

四逆證

四逆湯治病發熱頭痛脈反沉。若不差身體疼痛者脈浮遲表熱裏寒下利清穀者汗出熱不去內拘急支節疼四逆者下利厥逆惡寒者下利腹脹滿身疼脈浮者先用四逆溫裏得利止乃可隨證用藥攻表也。

甘草

壹兩

附子

半個

乾薑

參分

咬咀

以水壹升半煮取陸合去滓溫分作貳服。

手足厥脈微欲絕者當歸四逆湯主之。

當歸

桂枝

芍藥

細辛

各壹兩半

棗

叁拾陸  
箇

甘草

木通

各壹兩

咬咀

以水四升半煮二升二合去滓每溫一盞服。

和表證

傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱而煖或渴或利或噫或小便難腹滿而喘者小青龍湯主之。

麻黃

芍藥

細辛

乾薑

甘草

桂枝  
半兩  
各壹兩

半夏  
參分

五味子  
半兩

咬咀以水六升先煮麻黃數沸去上沫內諸藥煮一升去滓每溫服一盞若渴者去半夏加括樓根壹兩半若微利去麻黃加薤花一雞子大炒亦若噫者去麻黃加附子壹枚炮小便不利小腹滿者去麻黃加赤茯苓貳兩若喘去麻黃加杏仁壹兩壹分無薤花以桃花壹鴨子大不炒代之太陽病得之八九日如瘧狀發熱惡寒熱多寒少其人不嘔清便欲自可一日二三度發脈微緩者爲欲愈也脈微而惡寒此陰陽俱虛不可更發汗吐下也面色反有熱色者未解也以其不能得小汗出其身必痒宜桂枝麻黃各半湯。

桂枝湯末  
麻黃湯末  
各參分

以水一升半棗三箇生薑三片煎減半去滓溫飲一盞未有小汗再服之。

服桂枝湯大汗出脈洪證候不改者服桂枝湯如前法若形似瘧狀日再發者宜桂枝二麻黃一湯。

桂枝湯末  
麻黃湯末  
各壹兩

以水一升半薑三片棗三箇煎減半去滓溫飲一盞未有小汗再服之。

服桂枝湯大汗出後大煩渴脈洪大者白虎湯加人參主之方在厥陰證中

龐曰傷寒已得汗身和脈絃細讝語妄見此爲津液不和與小柴胡去人參加桂枝湯服之津液和自愈。

未差。與調胃承氣湯下之。

傷寒六七日發熱微惡寒。支節煩疼微嘔。心下支結外證未去。柴胡桂枝湯主之。兼治寒疝腹痛。

柴胡

壹兩

桂枝

壹錢

黃芩

人參各半

人參

各半

半夏

肆錢

字

半兩

生薑

半兩

大棗

叁枚

芍藥

半兩

甘草

壹字

大棗

玖枚

生薑

半兩

大棗

叁枚

人參

各半

生薑

壹分

大棗

叁枚

人參

各半

桂枝

壹錢

黃芩

半兩

芍藥

半兩

甘草

壹錢

大棗

玖枚

生薑

半兩

大棗

叁枚

人參

各半

桂枝

壹錢

黃芩

半兩

芍藥

半兩

甘草

壹錢

大棗

玖枚

大棗

玖枚

生薑

半兩

大棗

叁枚

人參

各半

生薑

壹分

大棗

叁枚

人參

各半

桂枝

壹錢

黃芩

半兩

芍藥

半兩

甘草

壹錢

大棗

玖枚

人參

各半

桂枝

壹錢

黃芩

半兩

芍藥

半兩

甘草

壹錢

大棗

玖枚

人參

各半

桂枝

壹錢

黃芩

半兩

芍藥

半兩

甘草

壹錢

大棗

玖枚

人參

各半

桂枝

壹錢

黃芩

半兩

芍藥

半兩

甘草

壹錢

大棗

玖枚

人參

各半

桂枝

壹錢

黃芩

半兩

芍藥

半兩

甘草

壹錢

大棗

玖枚

人參

各半

桂枝

壹錢

黃芩

半兩

芍藥

半兩

甘草

壹錢

大棗

玖枚

人參

各半

桂枝

壹錢

黃芩

半兩

芍藥

半兩

甘草

壹錢

大棗

玖枚

人參

各半

桂枝

壹錢

黃芩

半兩

芍藥

半兩

甘草

壹錢

大棗

玖枚

人參

各半

桂枝

壹錢

黃芩

半兩

芍藥

半兩

甘草

壹錢

大棗

玖枚

人參

各半

桂枝

壹錢

黃芩

半兩

芍藥

半兩

甘草

壹錢

大棗

玖枚

人參

各半

桂枝

壹錢

黃芩

半兩

芍藥

半兩

甘草

壹錢

大棗

玖枚

人參

各半

桂枝

壹錢

黃芩

半兩

芍藥

半兩

甘草

壹錢

大棗

玖枚

人參

各半

桂枝

壹錢

黃芩

半兩

芍藥

半兩

甘草

壹錢

大棗

玖枚

人參

各半

桂枝

壹錢

黃芩

半兩

芍藥

半兩

甘草

壹錢

大棗

玖枚

人參

各半

桂枝

壹錢

黃芩

半兩

芍藥

半兩

甘草

壹錢

大棗

玖枚

人參

各半

桂枝

壹錢

黃芩

半兩

芍藥

半兩

甘草

壹錢

大棗

玖枚

人參

各半

桂枝

壹錢

黃芩

半兩

芍藥

半兩

甘草

壹錢

大棗

玖枚

人參

各半

桂枝

壹錢

黃芩

半兩

芍藥

半兩

甘草

壹錢

大棗

玖枚

人參

各半

桂枝

壹錢

黃芩

半兩

芍藥

半兩

甘草

壹錢

大棗

玖枚

人參

各半

桂枝

壹錢

黃芩

半兩

芍藥

半兩

甘草

壹錢

大棗

玖枚

人參

各半

桂枝

壹錢

黃芩

解也。

病十日以上脈浮細嗜臥者爲已安候。小柴胡和之。細而遲者勿與。  
婦人中風七八日續自寒熱發作有時經水適斷者此爲熱入血室其血必結故使如瘡狀發作有時小柴胡湯主之。

婦人傷寒發熱經水適來晝日明了暮則譫語如見鬼狀此爲熱入血室無犯胃氣必自愈。

先宜小柴胡湯  
不愈可刺

婦人中風發熱惡寒經水適來得之七八日熱除而脈遲身涼胸脇下滿如結胸狀譫語此爲熱入血室也當刺期門隨其實取之。

陽明病潮熱大便溏小便自如胸脇滿不去者小柴胡湯主之又不大便而嘔舌上白苦者亦宜服之上焦得通津液得下胃氣因和身濶然汗出而解。

陽明中風脈浮弦大而短氣腹滿脇下及心痛久按之氣不通鼻乾不得汗嗜臥一身及目悉黃小便難。有潮熱時時噦耳前後腫刺之小差外不解病過十日脈續浮者與小柴胡湯若不尿腹滿加噦者不治。

可下證血證附

大法秋宜下

陽明病發熱不惡寒汗多者急下之。

凡脈沉細數爲熱在裏又兼腹滿咽乾或口躁舌乾而渴者或六七日不大便小便自如或目中瞳子不明無外證者或汗後脈沉實者或下利三部脈皆平心下堅者或連發汗已不惡寒者或已經下其脈浮沉按之有力者宜大承氣湯。

大黃 半兩

厚朴 壓兩

枳實 壓枚

朴消 半兩

咬咀以水四升先煮厚朴枳實至參升下大黃煮取壹升半去滓下朴消烊化每溫一盞服利即止後服如作羹散煎每服厚朴枳實末共參錢水兩盞煎壹盞半下大黃末壹錢煎壹盞絞去滓下朴消末壹錢烊化服之。

陽明與少陽合病而利脈不負者爲順也負者失也互相克爲負也脈滑而數者有宿食當下之。湯·陽明土·其脈大·少陽木·其脈弦·若合病·土被木威克·更利爲胃已困·若脈不弦·爲土不負·弦者爲土負·必死·

脈雙弦而遲心下堅或脈大而緊者陽中有陰可下之病者煩熱汗出如瘧狀日晡則發潮熱者屬陽明其脈必實當下之而愈。

病人小便不利大便乍難乍易時有微熱喘冒不能臥者有燥屎宜下之。

傷寒嘔吐下後不解不大便五六日以上至十餘日日晡則發潮熱不惡寒獨語如見鬼狀若劇者發則

不識人循衣妄撮。嘗見有此微空。煩躁不安。微喘直視。脈弦者生。脈濡者死。微者但發熱譫語可下之。一服利止後服。

過經譫語者可下之。

病人不大便五六日。繞臍痛。煩躁發作有時。此有燥屎故不大便。可下之。以上並宜大承氣湯

太陽病未解。其脈陰陽俱停者。必先振慄。汗出而解。

陽微者先汗之而解。陰實者先下之而解。下之宜大柴胡湯。

柴胡

肆兩

黃芩

芍藥  
各壹兩

枳實  
兩枚

生薑

半兩

半夏  
壹兩

大棗  
陸個

大黃  
壹兩

咬咀以水六升。煮取叁升去滓再煎。每溫一盞服。

因下之後。潮熱而微利者。此醫以丸藥下之。非其治也。而有表證。仍胸鬲滿而嘔者。先服小柴胡湯。後服

大柴胡湯。小柴胡湯在和衷證中

傷寒發熱。汗出不解。心中痞悶。嘔吐下利者。大柴胡湯主之。

傷寒十餘日。結熱在裏。往來寒熱者。宜大柴胡湯。

陽明病譫語發潮熱。脈滑疾者。小承氣湯主之。

大黃 貳兩 厚朴 壹兩 枳實 兩枚

咬咀水貳升半煎至八合去滓放溫時飲一盞以利爲度凡大便祕悶恐有表證者但少少飲之微下爲度不可飲多恐大泄利也虛弱人可作羹散煎服

太陽病若吐下發汗後微煩小便數大便難者與小承氣湯利之則愈此太陽陽明證也下利譏語者有燥屎也宜小承氣湯初一服譏語止若更衣者停後服不爾盡與之

更衣卽登廁也非賴師古注漢書更衣之義集

驗方痔有更衣挺出頗妨於更衣更衣出清血故以知之

陽明病不吐不下心煩者可與調胃承氣湯方在太陽證中

發汗後惡寒者虛也不惡寒但熱者實也當和其胃氣宜調胃承氣湯

傷寒十三日過經譏語者此有熱當以湯下之若小便利者大便當頓反下利而脈調和者知醫以丸藥下之非其治也若自下利者脈當微厥今反和者爲內實也宜調胃承氣湯

太陽病過經十餘日心下溫溫欲吐而胸中痛大便反溏腹微滿鬱鬱微煩此時極吐下者與調胃承氣湯不爾可與之但欲嘔胸中痛微溏者此非柴胡證以嘔故知極吐下也屬調胃承氣湯傷寒吐後腹脹滿者屬調胃承氣湯

茵陳湯治陽明病發熱汗出者此爲熱越不能發黃也但頭汗出其身無汗齶頸而還小便不利渴而飲

水者以瘀熱在裏身必發黃。

茵陳蒿參兩

大黃壹兩半

梔子武拾個大者染枝

㕮咀水貳升半先煮茵陳至貳升內二味煮取壹升貳合半去滓溫飲一盞日三服小便當利尿如皂角沫一宿腹減黃從小便出。

十棗湯治太陽病中風下利嘔逆表解者乃可攻之其人熱熱汗出發作有時頭痛心下痞硬滿脇下痛乾嘔短氣汗出不惡寒者此表和裏未和也。

芫花甘遂

大戟等分

異杵師杵末合之  
入白再杵二三百下

先以水壹升煮肥棗拾枚擘碎煮取半升去棗用煎湯少半調末一錢匕羸人半錢再單飲棗湯送之平旦服若下少而病不除明旦加藥一錢半如前服之服之必利利後糜粥自養。

欬而脇下痛此爲有飲宜十棗湯。

調中湯治夏月及秋初忽有暴寒折於盛熱熱結四支則壯熱頭痛寒傷於胃下利或血或水或赤帶下壯熱且悶脈數宣下之久年腸風下之亦差。

大黃參分

葛根黃芩

芍藥

桔梗

茯苓

藁本

白朮

甘草各半兩

咬咀水參升煎至貳升下大黃取壹升貳合去滓溫溫飲一盞移時勿鬲食再服之得快下壯熱便歇其下利亦止凡秋夏早熱積日或有暴寒折之熱無可散喜搏著肌中作壯熱氣也胃爲六府之表最易爲暴寒所折故也虛人亦不發壯熱但下利或霍亂不宜用此實人有服五石人喜壯熱與別藥下則加熱喜悶而死矣是以宜以此下和其胃氣調中湯又治陽病因下遂協熱利不止及傷寒不因成晝兩煎服之殊驗也茵陳丸療瘴氣及黃病瘡瘍

茵陳

梔子

鼈甲

芒消各壹

大黃貳兩

豉半

常山

杏仁各壹兩

巴豆半兩

細末蜜丸梧桐子大初得時氣三日內平旦米飲服二丸如人行十里久或吐或利或汗出不爾更服一丸以熱粥投之老少以意加減丸數服若黃病瘡瘍時氣傷食瘡瘍小兒驚熱欲發癇服之無不差者療瘴神驗亦白痢服之亦效春初有宿熱依上法服之取吐利當年不憂熱病有性殺藥者每服七丸利者非血證

五丸

抵黨湯治太陽病六七日表證仍脈微而沉反不結胸其人發狂者乃熱在下焦小腹當脹滿小便反利者下血乃愈所以然者以太陽隨經瘀血在裏故也小腹滿而小便不利者非血證

水蛭

蟲各拾

桃人榮枚

大黃壹兩

咬咀以水貳升半煮至壹升貳合半去滓溫分四服未下再服虛人只可作半料服之如作羹散每五錢水壹蓋半煎壹蓋去滓服之

桃人承氣湯治太陽病不解熱結在膀胱其人如狂血自下者乃愈其外不解者尙未可攻當先隨證行湯解外外已解但小腹急結者乃可攻之不黑寒爲外解

桃人貳拾肆個

大黃貳兩

甘草

桂枝

芒消各壹兩

咬咀以水叁升半煎取壹升半去滓內芒消烊化溫服壹蓋虛人減作半料亦可作羹散每伍錢水壹蓋半煎至壹蓋去滓下芒消壹錢半烊化服之

桃人承氣湯又治產後惡露不下喘脹欲死服之十差十

龐曰脈朝夕缺者實癥也可下之朝平夕缺者非癥也不可下缺謂數脈六七至者也若脈數一息八九至愾不可下若下之則煩躁下利不止而死凡數脈與皮毛相得亦不可下也合下不下令病人腹脹滿通身浮腫而死

不可下證

脈軟而弱弱反在關關下三寸口分也濡反在顛顛上三寸部分也微反在上也濡反在下尺部也微則陽不足濡則無血陽氣反微中風汗出而反煩躁澀則無血厥而且寒宜建中湯方在不可汗證中

陽微不可下。下之則心下痞。

諸動氣在心腹上下左右俱不可下。

動氣在右不可下。下之則津液內竭，咽喉躁，鼻乾，頭眩，心

**宜竹葉湯**。方在不可汗證中。

卷之三

動氣在右不可下下之則津液內竭咽躁鼻乾頭眩心悸。宜竹葉湯·方在不可汗證中  
動氣在左不可下下之則腹裏拘急不止動氣反劇身雖有熱反欲勑先服乾薑甘草湯·方在不可汗證中後服建中湯·方在不可汗證中·  
動氣在上不可下下之則掌握熱煩身冷熱汗自泄欲水自灌竹葉湯主之·方在不可汗證中·  
動氣在下不可下下之則腹滿卒起頭眩食則下清穀心下痞堅半夏瀉心湯主之·方在痞證中·

龐曰。諸脈濡弱微虛細相搏。俱不可下。

諸四逆不可下虛家亦然

**可拘忌也。**龐曰：若下證悉具而見四逆者，是失下後氣血不通使然。但手足微厥，掌心常溫時，復指梢溫便下之，不

傷寒嘔多。雖有陽明證。不可攻也。

龐曰。凡下證小便不利。或尙少。未可攻之也。

不當下而強下之，令病人腸胃洞泄不禁而死。

可水不可水證

龐曰。凡病非大渴不可與冷水。若小渴口咽乾。小小呷滋潤之。若大渴煩躁甚。能飲一斗者與五升。能飲一升者與半升。若乃不與則乾燥無由作汗。煩喘而死者多矣。但勿令足意飲也。若大汗將來。躁渴甚者。但足意飲之勿疑。常人見因渴飲水而得汗。見小渴遂強與之。致停飲心下。滿結喘而死者亦多矣。其有熱脈數。尙可作汗而解者。出於天幸也。

五苓散治病人口則吐。或渴而嘔者。或汗後脈尙浮而煩渴者。或下利渴而小便不利者。或因渴停水心下。短息者難治。嘔而小便不利者。皆主之。

豬苓

白朮

茯苓

桂枝

澤瀉各半兩

細末白飲調下貳錢。日參服數飲緩水。汗出效。

陽明病小便數者。大便即堅。不更衣。十日無所苦。欲得水。但與之。當以法救渴者。五苓散主之。

霍亂頭痛發熱。身體疼。發熱欲飲水。五苓散主之。若得病無熱。但狂言煩躁不安。精采不與人相當。勿以火導之。但以豬苓散方寸匕服之。當逼飲新汲井水壹升。卽令指刺喉中吐去之。病隨手愈。若不能吐者。勿強與水。水停則結心下也。當以藥吐之。不爾。更致危病。若當吐不吐時。以豬苓散吐之。其死迨速矣。亦可針之尤佳。夫飲鬲實難治。此皆三死一生也。太陽病發汗後。大汗出。胃中乾燥。煩不得眠。其人欲飲水

者但與之當稍稍飲之令胃和則愈。

可吐不可吐證

龐曰胸鬲痞悶痰壅塞礙脈得浮或滑並宜瓜蒂散吐之方在厥陰腹中產後六七日內下瀉諸藥不効得此脈與吐之瀉立止。

下利日數十行其脈反遲寸口微滑吐之則止。

龐曰虛家當吐而不敢吐之宜以枳實散壓氣毒痰水過日毒入胃乃可微下之也。

諸四逆脈微弱虛細或弦遲雖中滿悶不可吐宜橘皮湯枳實散之類橘皮湯在和表證中枳實散在綱論中不可吐而強吐之氣築心卽死矣。

可灸不可灸證

燒針令其汗針處被寒核起而赤者必發責脈氣從少腹上撞者灸其核上一壯與桂枝加桂湯桂枝湯在內加桂湯桂足成壹兩壹分如前法煎之。

少陰病其人吐利手足不逆反發熱不死灸少陰七壯。

下利手足厥無脈灸之不緩反微喘者死。

傷寒脈促手足厥逆可灸之。

合灸不灸令病人冷結久而彌固氣衝心而死微數之脈慎不可灸因火爲邪則爲煩逆追虛逐實血散脈中火氣雖微內攻有力焦骨傷筋血難復也脈浮當以汗解而反灸之邪無從去因火而盛病從腰以下必當重而搏此爲火逆若欲自解當先煩煩乃有汗隨汗而解何以知之脈浮故以知汗出而解脈浮熱甚而灸之此爲實實以虛治因火而動咽躁必睡血

不當灸而誤灸令火邪入腹干錯五藏重加煩而死

可火不可火證

下利穀道中痛當以炒鹽末熨之或炒枳實末溫熨二味相兼益佳若臍下冷結不可便熨冷氣攻心腹必死須先用藥溫之久而可熨凡臍下冷結成關陰大小便不通服藥雖多不見效以炒鹽熨臍下須臾卽通然關陰已服巴豆甘遂大黃輕粉之類太多卽暴通利而損人尤宜詳之也

可溫證

大法冬宜溫熱藥

少陰病其人飲食入則吐心中溫溫欲吐復不能吐始得之手足寒脈弦遲若鬲上有寒飲乾嘔者不可吐宜四逆湯溫之方在四逆證中

下利其脈浮大此爲虛以強下之故也。設脈浮大因爾腹鳴宜當歸四逆湯溫之。方在四逆

火邪證

醫以火臥床下或遇身用火追却汗或熨或誤灸皆屬火邪也。

傷寒脈浮醫以火迫切之亡陽驚或狂起臥不安者宜桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯。

桂枝

壹兩半

蜀漆

壹兩半

甘草

壹兩半

龍骨

貳兩

牡蠣

貳兩半

生薑

壹兩半

大棗

陸枚

以水陸升先煮蜀漆減壹升內諸藥煮取貳升去滓溫服壹盞無蜀漆以恆山代之火切後脈浮當汗出而愈。

火邪下之因燒針煩躁者桂枝甘草龍骨牡蠣湯主之。

桂枝

半兩半

甘草

半兩半

牡蠣

半兩半

龍骨


各壹兩

以水二升煮一升去滓溫取一盞可代救逆湯使之。

龐曰灸及燒針後證似火切者並宜火切治之煩躁驚及狂用六石風引湯尤良柴胡加龍骨牡蠣湯亦通用。

病人因火劫至十五六日身黃下利狂欲走師脈之言當下清血如豚肝乃愈後如師言何以知之師曰寸口脈陽浮而陰濡弱陽浮爲風濡弱爲虛浮虛受風少血發熱惡寒洒淅項強頭眩醫以火熏鬱令汗

出惡寒遂甚客熱因火而發怫鬱蒸於肌膚自爲黃小便微難短氣鼻中出血而復下之胃無津液利遂不止熱瘀在膀胱畜結成積狀如豚肝當下不下心亂迷憤狂走赴水必不能自制蓄血若去目明心了此皆醫所爲輕者得愈極者不治



# 傷寒總病論卷三

結胸證

陽毒證

狐惑證

瘧濕渴證

發汗吐下後雜病證

陰陽易證

結胸證

病發於陽而反下之。熱入內作結胸。其病心下堅滿。按之如石。鞭而痛。項強如柔。瘡狀。其脈寸口浮。關上

尺中皆沉。或沉緊。名曰結胸也。下之則和。宜大陷胸湯。今作煮散  
煎之

大黃

壹兩半

芒消

錢半

甘遂

末一臺

心下痞證

陰毒證

百合證

瘧證

渴證

異末。先以水壹升半煎大黃半升。絞去大黃滓。下消末更煮一二沸。內甘遂末和勻。溫分二服。一服快利。止後服。如作煮散。卽先以水一盞煎大黃末肆錢匕。至捌分。下消末貳錢匕。候化勻。下甘遂末。

半錢匕沸勻溫服之。移時未利再煎一服。快利爲度。

藏結如結胸狀。飲食如故。時時下利。寸口脈浮。關上脈小細沉緊。名曰藏結。舌上白苔生者難治。藏結無陽證。不往來寒熱。其人反靜。舌上苔滑不可攻也。

結胸證。其脈尺寸浮大者不可下。下之則死。復宜發汗也。

結胸證悉具。煩躁甚者死。

太陽病脈浮而動數。浮則爲風。數則爲熱。動則爲痛。數則爲虛。頭痛發熱。微盜汗出而反惡寒。表未解也。醫反下之。動數變遲。鬲內拒痛。胃中空虛。宿熱動鬲。短氣煩躁。心下懊憹。陽氣內陷。心下固鞶。則爲結胸。大陷胸湯主之。若不結胸。但頭汗。餘處無汗。劑頸而還。小便不利。身必發黃也。

結胸無大熱者。此爲水結在胸脅也。但頭微汗出者。宜大陷胸湯。

太陽病重發汗而復下之。不大便五六日。舌躁而渴。日晡則少有潮熱。從心下至小腹滿而痛不可近者。宜大陷胸湯。

虛弱家不耐大陷胸湯。卽以大陷胸丸下之。

結胸者項亦強。如柔痓狀。下之則和。宜大陷胸丸。

大黃

肆兩

葶苈子

壹兩半

朴消

壹兩捌

杏仁

貳合

杵二味內杏人朴消合研如脂丸如彈子大抄甘遂末壹錢白蜜貳升水貳升煮取壹升溫頓服之

一宿乃下不下更服

小結胸正在心下按之則痛脈浮滑者宜小陷胸湯

半夏

陸錢半分

黃連

壹分

桔梗

壹枚建錢用

咬咀水叁升煮梧棲至貳升下諸藥煮取壹升去滓溫溫服一盞食頃再服一日盡劑微解下黃涎即愈

太陽病下之脈促者不結胸此爲欲解也脈浮者必結胸脈緊者必咽痛脈弦者必兩脅拘急脈細數者頭痛未止脈沉緊者必欲嘔脈沉滑者協熱而利脈浮滑者必下血

寒實結胸無熱證者與三物白散方

小陷胸者非也

桔梗

參分

巴豆

壹分

貝母

參分

細末內巴豆研勻白飲調下壹錢羸人減之病在鬲上必吐在鬲下必利未利啜熱粥投之利過不止飲冷粥止之

龜曰近世治結胸多行針頭丸用硫黃陽起石者若病熱毒甚者必死唯治冷結寒實耳

心下痞證

病發於陰而反下之爲痞。發熱惡寒爲陽。誤下則爲結胸。無傷寒下之後。若發熱汗出者爲欲解。若心下滿而鞭痛者。此爲結胸也。但滿而不痛。此爲痞氣。宜半夏瀉心湯。

甘草

黃芩

乾薑

人參各一兩半

黃連半兩

大棗二枚

半夏一分一兩

咬咀水陸升瘡取差升去滓再煎壹升半溫溫飲一盞日三夜二設下後津液入裏。胃虛上逆。寒結在心。下。故宜辛甘發散。半夏下氣。苦能去濕。兼通心氣。又甘草力大。故乾薑黃連不能相惡也。

心下痞。按之濡其脈關上浮者。宜大黃黃連瀉心湯。

大黃壹兩

黃芩各半

半夏一分一兩

人參各一兩半

咬咀以鰣眼沸湯壹升瀆之。須臾絞去滓。溫溫分四服。得利止後服。寒濕迫心氣不行。欲作熱也。

心下痞悶而復惡寒汗出者。大黃黃連瀉心湯內加附子主之。附子壹枚。炮去皮尖。四破。以水三合煎服之。與瀉心湯而痞不解。其人渴而口乾燥。小便不利者。五苓散主之。方在可水證中。

傷寒汗出解之後。胃中不和。心下痞悶。乾噫食臭。脅下有水氣。腹中雷鳴下利。宜生薑瀉心湯。

生薑武兩

人參

甘草

黃芩各半

半夏壹兩

大棗二枚

乾薑各半

咬咀水伍升。煮取參升去滓再煎取壹升半溫作四服。

胃中不和。爲少陽木氣所制。故用二薑之辛味。

傷寒中風。醫反下之。其人下利日數十行。穀不化。腹中雷鳴。心下痞。鞭而滿。乾嘔心煩。不得安。醫見心下痞。謂病不盡。復下之。其痞益甚。此非結熱。但以胃中虛。客氣上逆。故使鞭也。甘草瀉心湯主之。

甘草

貳兩

黃芩

乾薑

人參

各半兩

半夏

壹兩壹分

大棗

陸枚

黃連

半兩

咬咀水伍升。煎至叁升去滓再煎取壹升半溫作四服。胃虛故加甘味。

大下後復發汗。心下痞。惡寒者表未解。不可攻痞。當先解表。表解乃可攻痞。攻痞宜大黃黃連瀉心湯。前

附子。是汗出多而惡寒。表將解而裏結未除故也。此證是發汗後無汗惡寒。故先須解表也。

汗出嘔吐下利。是胃中津液燥。裏有結實。非胃虛也。故以大柴胡湯下之。

傷寒發熱。汗出不解。心下痞鞭。吐嘔下利者。大柴胡湯主之。  
病人脅下素有痞。連臍傍引小腹入陰筋者。此爲藏結死。

### 陽毒證

初得病一二日。便成陽毒。或服藥吐下後。變成陽毒。其病腰背痛。煩悶不安。狂言欲走。或見鬼。或下利。其脈浮大而數。面赤斑斑如錦紋。咽喉痛。吐下膿血。五日可治。七日不可治。升麻湯主之。不可作劑散。不可作

升麻

當歸

甘草

各貳兩

雄黃

研。壹分

桂枝 壹分

鼈甲 半兩

蜀椒 半分

咬咀水貳升煎壹升去滓溫服一盞食頃再服溫覆手足出汗汗出則解未解重作之得吐尤佳陽毒宜葛根龍膽湯方在可發汗證中

陰毒證

初得病一二日便成陰毒或服藥六七日以上至十日變成陰毒其病身重背強腹中絞痛咽喉不利毒氣攻心心堅強氣不得息嘔逆唇青面黑四支厥冷其脈沉細而緊仲景云陰毒之候身痛如被杖喉咽痛五六日可治七日不可治甘草湯主之煮散不可作

甘草

鼈甲

升麻

當歸

桂枝各貳

蜀椒 壹分

雄黃 壹分

咬咀水叁升煎取壹升去滓溫溫每飲一盞食頃再服溫覆中毒當汗吐之汗吐則愈不吐再服之治陰毒反陰丹

硫黃 伍兩研末

太陰玄精石 味殊研末

硝石 貳兩研末

用鐵銚子先鋪玄精石一半次鋪硝石一半中間下硫黃又以硝石蓋硫黃都以玄精石蓋之用盞子合定令三斤炭火燒令得所勿使煙出多急取出以瓦盆合定地下四面灰擁勿令煙出直候冷

取細研。蒸餅心丸。豌豆大。艾湯下十五丸。病重加至二三十九。此法甚驗。喘促吐逆者。入口便安。服此藥三五服。覺不退。便於臍下一寸半灸之。須是大炷百壯。未愈可至二百壯。若手足極冷。小便澀。小腹癟。污痛。囊縮。即須更於臍下四寸。如前灸之。乃與當歸四逆并反陰丹。頻頻與服。內外通達方。可解。若稍緩。卽死矣。當歸四逆。乃加吳茱萸生薑者。是慎勿與尋常利小便藥。此是陰毒氣結在小腹所致也。有見小便不通。便用炒鹽及裹熱藥熨臍下。欲望小便通利。其冷氣在小腹之間。被熱物所熨。無處通出。卽奔上衝心。其死速矣。

又治陰毒硫黃丸

硫黃 貳兩 水銀 豐兩

同研入銚。洒少醋。慢火炒。欲似煙出。再出火洒醋。如此三四遍。地上放冷研之。蒸餅丸梧桐子大。每服二十三十九。艾湯吞下。日三服。食前。

陰毒脈沉微。欲絕。四肢逆冷。大躁而渴。不止。附子飲子。

附子 炙一枚。半兩以上者。去皮尖。四破。

以水九升。煎至三升。去附子入瓶。油單緊封。沉井底。候極冷。取飲之。仍下硫黃丸甚妙。

陰毒之爲病。因汗下藥性冷所變。多在四五日也。或素來陽氣虛冷。始得病。便成陰毒。或始因傷風傷冷。

物便成陰毒。其病六日內可治。過六日不可治。

狐惑證

狐惑之爲狀如傷寒。或因傷寒變成斯疾。其候默默欲眠。目不得閉。臥起不安。蝕於喉爲惑。蝕於陰爲狐。不欲飲食。惡聞食臭。其面乍赤乍黑。乍白。蝕於上部則聲嘎。甘草瀉心湯主之。方在痞證中。蝕於下部則咽乾。燒黃壹味。病者脈數則熱。微煩。默默但欲臥。汗出初得之三四日。目亦如鳩眼。七八日則兩目皆周皆黑。若能食者。膿已成也。赤小豆當歸散主之。

赤小豆壹升。浸生芽曝乾。當歸壹兩

細末漿水調下二錢日三服。

百合證

龐曰。百合病者。百脈一宗。悉致其病。意欲食復不能食。常默默欲臥。復不能臥。欲出行復不能行。或有美食時。或惡聞食臭時。如寒無寒。如熱無熱。口苦小便赤。諸藥不能治。得藥則增劇。吐利者。如有神祟者。身形如和。其脈微數。每渴時頭痛者。六十日乃愈。若渴頭不痛。浙然者。四十日愈。若渴快然。但頭眩者。二十日愈。其證或未病而預見。或病四五日而出。或二十日或一月微見者。隨證治之。

治汗後百合病百合知母湯。

百合拾枚

知母半兩

百合先洗漬一宿。當白沫出去其漬水別以清泉水壹升半煮百合取壹升去滓又別以泉水壹升  
煮知母取半升去滓同百合湯煎至壹升溫分三服。

治下後百合病滑石代赭湯。

百合拾枚 滑石壹兩半

代赭半兩

先以水漬百合一宿當白沫出則去其水更以泉水壹升半煮取一升去滓別以泉水一升煮滑石  
代赭取半升去滓合和重煎至一升分溫三四服。

治吐後百合病百合雞子湯。

百合拾枚 雞子黃貳枚

先以水洗百合漬一宿當白沫出去其水更以泉水一升煮取一升去滓下雞子黃攪勻分溫三服  
治不經吐下發汗百合病形如初者百合地黃湯。

百合拾枚 地黃汁半升

先以百合水漬一宿有白沫出去其水更以泉水一升半煮取一升去滓內地黃汁再煮取一升二  
合溫分三服中病勿更服。

治百合病一月不解變成渴者百合湯洗之。

百合 一升。如前洗。先煮一宿。  
當白沫出。去其水。

更以水一斗煎數沸。洗周身。慎風。仍食白湯餅。但勿與鹽豉也。煮餅是切麵條湯。煮水淘過。熱湯漬食之。

渴不差。栝樓牡蠣散主之。

栝樓 無黃脈 者。牡蠣粉 等分。

細末水調方寸匕。日三服。

治百合病變發熱。百合滑石散。

百合 壹兩。滑石 叁兩。

細末。清飲調方寸匕。日三服。當微利熱則除。已利勿服之。

百合病見於陰者。以陽法救之。見於陽者。以陰法救之。見陽攻陰。復發其汗。此爲逆。見陰攻陽。乃復下之。此亦爲逆。

瘡濕暍證

傷寒所至。太陽病瘡濕暍。此三種宜應別論。以爲傷寒相似。故此見之。

瘡證

太陽病發熱無汗反不惡寒名曰剛瘡。

太陽病微熱汗出不惡寒名曰柔瘡。

病源云  
惡寒

其證身熱足寒頭強項急惡寒時頭熱面赤目脈赤獨頭搖卒口噤背反張者瘡病。

太陽病發汗太過因致瘡。素問曰太陽所至爲表汗虛又云肺熱移於腎便爲柔痓始太陽中風發熱而故迫汗大過因而熱寐汗反爲冷渴

之氣復著太陽經故發瘡也

瘡病臥不着席小兒腰背去席二指大人側掌爲難。

治療病脈弦直上下行。

仲景云太陽病證其身脉八八然脈反沉遲者爲欲作瘡宜桂枝加桔梗湯。桔梗不主中風強項八八其意湯內當加桔梗四兩。

瘡病不宜大發汗及針灸宜小汗之

柔瘡宜桂枝加葛根湯。桂枝湯內加葛根四兩

剛瘡宜葛根麻黃湯。方在解表證中

剛柔瘡加減葛根麻黃湯。

葛根 麻黃 生薑 各一錢

防風 茯苓 荀藥

白朮 人參

葛葉

防己

桂枝 甘草 各半 附子 壓枚

各半

兩

附子

壹枚

咬咀水六升先煮麻黃葛根數沸去上沫內諸藥煮取二升去滓飲服一盞食頃再服日四五夜二三柔痓自汗者去麻黃加葛根成壹兩半剛痓胸滿口噤臥不着席脚變急其人必齦齒宜大承氣湯下之方在可下證中

濕證

太陽病關節疼痛而煩脈沉緩濕痺之候其人小便不利大便反快只當利其小便宜五苓散方在可水證中

濕家之爲病一身疼發熱身如熏黃仍治風濕脈浮身重汗出惡風宣黃耆湯

黃耆 武兩 防己 貳兩 甘草 壹兩 白朮

生薑 各壹兩 藕 拾個

咬咀水四升煎至二升去滓溫飲一盞食久再服喘者加麻黃壹兩胃中不和者加芍藥壹兩半氣上衝者加桂枝壹兩半下有陳寒者加細辛壹兩服後當如蟲行皮中從腰下如冰厚坐被上又以一被繞腰以下令微汗出

濕家其人但頭汗出背強欲得被覆向火若下之早則嘔胸滿小便不利舌上如胎者此丹田有熱胸上有寒渴欲得水而不能飲口燥故也

濕家下之額上汗出微喘小便不利者死下利不止者亦死問曰風濕相搏一身盡疼痛法當汗出而解值天陰雨不止汗出已解身復痛何也答曰發其汗汗大出者但風氣去濕氣續在是故不愈也若治風濕者發其汗但微似欲出汗者風濕俱去也

濕家病身上疼痛發熱面黃而喘頭痛鼻塞而煩其脈大自能飲食腹中和無病病在頭中寒濕故鼻塞細末瓜蒂含水畜少許鼻中則愈

濕家身煩痛可與麻黃湯內加白朮貳兩

麻黃湯在可汗證中

病者一身盡疼發熱日晡則劇者此名風濕此病因傷於汗出當風或久傷於冷所致也可與杏仁薏苡湯

麻黃

壹兩半兩

杏仁

肆拾伍枚

薏苡仁

甘草

半兩

桂枝

貳兩

附子

貳枚

生薑

壹兩半兩

大棗

貳枚拾

甘草

壹兩

咬咀以水二升先煮麻黃一二十沸去上沫內諸藥煮取一升去滓溫二三服

傷寒八九日風濕相搏身體煩痛不能轉側不嘔不渴脈浮虛而澀者宜桂枝附子湯此治大便自利小便不利者

咬咀以水三升煮取一升去滓分溫四服若大便堅小便自利者去桂枝加白朮貳兩煎如前法初

一二服身如痺。半日許服之都盡。其人如冒狀勿怪。此乃龍附并走皮膚。遂水氣未得除。故使之耳。風濕相搏。骨節疼煩掣痛。不得屈伸。近之則極。汗出短氣。小便不利。惡風不欲去被。或有微腫者。甘草附子湯主之。

附子

貳兩

白朮

貳兩

桂枝

叁兩

甘草

貳兩

哎咀水三升。煮取一升去滓。分溫三服。身腫者加防己貳兩。悸氣小便不利加茯苓壹兩半。溢水成四升。煎一升三合。

暎證

太陽中熱者。渴是也。其人汗出惡寒。身熱而渴。白虎湯加人參主之。

方在厥陰  
腹中

太陽中暎者。身熱疼重而脈微。此夏月傷冷水。水行皮中所致也。瓜蒂湯主之。

瓜蒂

貳拾柒

水半升。煮取二合半。去滓溫服。

太陽中暎。發熱惡寒。身重而疼痛。其脈弦而細芤而遲。小便已濁然毛聳。手足逆冷。小有勞。身即熱。口前開板齒燥。若發其汗。則惡寒甚。加溫針。則反熱甚。下之則淋甚。宜大小橘皮湯。

大橘皮湯在不  
可汗體中。小橘皮湯。手主

足冷嘔

橘皮

武兩

生薑

綠兩

哎咀水三升煮取一升半去滓作四服稍熱呷之。

發汗吐下後雜病證

病人脈微而濡此乃醫所病大發其汗又數大下之其人亡血病當惡寒復乃發熱無休止時夏月盛熱欲着複衣冬月盛寒欲裸其體所以然者陽微則惡寒陰弱則發熱此醫發其汗使陽氣微又大下之令陰氣弱五月之時陽氣在表胃氣虛冷以陽氣內微不能勝冷故欲着複衣十一月之時陽氣在裏胃中躁熱以陰氣內弱不能勝熱故欲裸其身又陰脈遲濶故知亡血也

此皆可治陽微惡寒四逆陰弱發熱為內寒病宣苦酒艾之類

大下後復發汗小便不利者亡津液故也勿治之得小便利必自愈

發汗後其人臍下悸者欲作奔豚茯苓桂枝湯主之

茯苓

肆兩

桂枝

武兩

甘草

壹兩

大棗

捌個

咬咀以甘爛水五升先煮茯苓減一升內下諸藥煮取一升半溫溫作三服

作甘爛水法

取水貳升置大盆中以楊柏枝擣水上又有珠子五六千箇搘逐取用之

發汗或下後痞滿或成寒實結胸氣塞不通宜檳榔散

檳榔 貳個·一生  
一錢

細末酒二盞煎二盞四分作兩服溫飲之兼治蛇厥心腹刺痛南海本草治膀胱氣佳。

龐曰因發汗時汗出如水漏下還復汗少喘促不止脈促而按之濡者合當汗而解脈促而按之實者死若脈浮手足微厥面垢脣青昏憒而喘者陰陽未和尙阻升降宜服順陰陽五味子湯。

麻黃 半兩

人參

五味子

麥門冬

橘皮

生薑 各壹分

棗 柒枚

杏仁

附子 壹枚生

咬咀水二升煮七合去滓通口服一盞未差再作二三服手足厥甚者厚衣護其厥。

下後復發汗晝日煩躁不得眠夜而安靜不嘔不渴無表證脈沉微身無大熱者宜乾薑附子湯。

不可作  
薑故

乾薑 壹兩

咬咀水一升半煎至半升時飲一小盞食久再服。

傷寒若吐下後心下逆滿氣上衝胸起則頭眩脈沉緊發汗則動經身爲振振搖者宜茯苓白朮湯。

茯苓 貳兩

桂枝 壹兩

白朮

甘草 各壹兩

咬咀水三升煮至一升半去滓分溫四服。

發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反復顛到心中懊憹香豉橘子湯主之少氣者加甘草嘔者加生薑。

梔子香豉湯

肥梔子 貳拾

香豉 兩合  
絲羹

水二升煎梔子至一升三合下豉取七合半去滓每進一盞得吐止後服。

梔子甘草湯前湯內加甘草壹兩同梔子煮後下豉如前法加水半升。

梔子生薑湯前方內加生薑貳兩半同梔子煮後下豉同前法加水半升。

傷寒五六日大下之後身熱不去心中結痛者欲解也屬梔子香豉湯主之。

下後腹煩滿起臥不安者梔子厚朴湯主之。

梔子 大者 厚朴 貳兩 枳實 貳枚

咬咀水二升煮一升去滓溫飲一盞。

傷寒醫以丸藥下之身熱不去微煩梔子乾薑湯主之。

肥梔子 捌個 乾薑 壹兩

以水一升七合煮取八合去滓分溫三服。

凡用梔子湯得効卽止後服病人舊有微薄不可與之發汗若下之而煩熱胸中壅塞者梔子湯主之。

傷寒五六日已發汗而復下之。胸脅滿微結。小便不利。渴而不嘔。但頭汗出。往來寒熱。煩者此表未解。柴胡桂枝乾薑湯主之。

桂枝

黃芩

各壹兩

柴胡

肆兩

桔梗根

貳兩

乾薑

甘草

半

牡蠣

各壹兩

桔梗根

兩

哎咀

水六升煎至三升去滓再煎一升半

溫時飲一盞食頃再服

傷寒發汗若吐下解後心下痞硬噫氣不除者旋復花代赭湯主之。

旋復花

甘草

各壹兩半

人參

壹兩半

生薑

貳兩半

代赭

兩末半

棗

叁枚

半夏

壹兩半

哎咀

水五升煎三升去滓再煎取一升半

溫分四服

傷寒若吐下後七八日不解熱結在裏表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾燥而煩飲水至數升者白虎加人參主之。方在厥陰證中

傷寒八九日下之胸滿煩驚小便不利讙語身重不可轉側者柴胡龍骨牡蠣湯主之。

柴胡

貳兩

龍骨

半

黃芩

生薑

鉢丹

半夏

壹合

人參

桂枝

茯苓

牡蠣

各壹

桂枝

茯苓

牡蠣

各半

半夏

壹合

大黃  
壹兩

棗  
鹽個

哎咀水六升煎取三升下大黃切如棗子塊更煎取貳升去滓溫飲一盞。

傷寒服湯藥下利不止心下痞鞭服瀉心已復以他藥下之利不止醫以理中與之利益甚理中治中焦此利在下焦以赤石脂禹餘糧湯主之復不止當以五苓散利小便五苓散方在可水腫中

赤石脂禹餘糧湯

赤石脂  
禹餘糧各八兩

水四升煮取二升去滓溫飲一盞。

太陽病外證未除而數下之遂協熱而利利不止心下痞鞭表裏不解者桂枝人參湯主之。

桂枝  
甘草  
各半兩

白朮  
人參

乾薑  
各半兩

哎咀水五升先煮四味取三升內桂更煮取一升去滓溫分三服。

發汗後腹脹滿者厚朴人參湯主之。

厚朴  
四兩

甘草  
壹兩

生薑  
肆兩

半夏  
壹兩  
壹  
半兩

人參  
半兩

以水五升煮取一升半去滓溫分三服。

治頭痛壯熱心中煩黃芩梔子湯。

黃芩

梔子

石膏

乾葛

各兩

豉

葱白

半斤

哎咀水四升煮取一升半溫溫作三四服始得病便如前證亦可服治夏月傷暑毒殊驗  
傷寒發汗後或未發汗頭痛如破宜葱白湯

連鬚

葱白

半斤

生薑

兩

水二升煮一升去滓溫溫作二三服

服前湯頭痛未解宜葛根葱白湯

葛根

芍藥

半斤

生薑

兩

葱白

寸切

壹兩

知母

各半

哎咀水二升半煮取一升去滓溫溫分減服

傷寒頭痛立効荆芥散

天南星

草烏頭

肉白者

荆芥穗

各半

石膏

壹兩

細末每服二錢半陳茶一錢薑汁半呷薄荷三葉水兩盞煎至八分溫溫相次三服

傷寒嘔吐不止惡寒脈細或浮遲宜理中丸兼治霍亂吐利及傷寒後發熱水停喜睡者

人參 乾薑 甘草 白朮 各壹

細末蜜丸雞子黃大。每服一丸。百沸湯一盞。化令細煎三五沸。溫服之。霍亂臍上築者不宜。朮可作湯去。尤加桂一兩半。水三升煎取八合。稍熱服之。吐甚去。朮加生薑一兩半。作湯煎如前法。飲熱粥一椀。微溫覆之。勿發揭衣被。有寒腹滿痛或四肢拘急或下利轉筋。加生附子二枚。作湯服之。

治傷寒嘔吐欲死。生薑半夏湯。

半夏 壹兩 生薑 叁兩

水三升半煮一升去滓。溫分四服。

治嘔吐發熱。脈滑數或洪者。茅根湯。

茅根 半升 麥門冬 貳合

半夏 壹兩

人參 半兩

茯苓 半兩 生薑 貳兩

㕮咀水五升煎一升半去滓。溫分減服。

霍亂頭痛發熱。身疼多飲水者。宜五苓散。方在水證中。

傷寒發熱自利。脈浮大數及鼻血或嘔者。宜黃芩芍藥湯。

黃芩 壹兩 芍藥 甘草 各壹兩

咬咀水五升煮取一升半去滓分四服。嘔者加半夏一兩一分生薑一兩半煎服。

治傷寒熱痢或兼腹痛黃連當歸丸。

黃連 嘗歸 各一兩

當歸 各二兩

乾薑

赤石脂 各一兩

細末蜜丸梧桐子大米飲吞下二三十九日三夜二服。

傷寒下利如爛肉汁赤帶下伏氣腹痛諸熱毒悉主之薤白梔子湯。

梔子 半升  
細鹽 半升  
薤白 大者

肥梔子 柱個

水三升半先煮梔子十沸下薤白煎至二升去滓下豉煮一升半溫溫分減服必解下惡積。

傷寒汗解因飲酒復劇苦煩悶乾嘔口燥呻吟錯誤不得臥此藥解熱毒除酷熱不必飲酒劇者療五日

中神妙黃連黃蘖湯。

黃芩 半升  
黃芩 各一兩  
梔子 柱個  
肥梔子 拾武

咬咀水三升煎一升二合去滓溫溫分減服未差更作。

傷寒四日而大下熱利時作白通諸藥多不得止四順湯熟白通湯苦溫除熱止利莫若黃連熟艾湯。

黃連 半升  
黃蘖 各一兩  
龍骨 半兩  
熟艾 半兩  
大

咬咀水四升煮一升二合去滓分減溫服。

龜曰。凡冷利皆宜四逆。冷利臍下必寒。水穀黃白色或青黑也。熱利臍下必熱。利黃赤色也。天行熱毒下利赤白。久下膿血及下部毒氣。當下細蟲如布絲縷大。或長四五寸。黑頭銳尾。宜麝香丸。

麝香 壹錢

附子

雄黃

丹砂

乾薑

巴豆

各貳分

之不効。今增巴豆。試之甚驗。

搗下篩訖。

煉蜜和丸。小豆大。米飲下二丸。未知增之。

此方本无巴豆。是古方脫去。服

傷寒後咳噫。肉豆蔻湯。

肉豆蔻 壹個

石蓮肉 炒

茴香 各壹分

丁香 半分

生薑

人參 各貳分

枇杷葉 伍片。拭去毛。炙。

拭去毛。炙。

炙。

大青葉

秦艽

吳藍

升麻

黃芩

桔梗根 各式 分

甘菊 豈分

石膏 參分

竹瀝 莖合

朴消 參分

咬咀分二貼每服一貼水二升半煎至一升二合去滓下竹瀝朴消分溫四服肉色黃加茵陳六分  
面似火加梔子十四枚加水成三升煮取一升半溫飲一盞

七八日熱盛不解苦葶藶湯

苦酒

壹升

苦葶藶

壹合

生艾汁

半升

同煎至七合作二服此療內熱病有牛黃一刀圭尤良阮河南曰今諸療疾多用辛甜薑桂人參之屬此皆貴價難得常有必欲求之轉以失時而苦參青葙葶藶子艾之屬所在盡有之除熱解毒最勝向貴價藥也前後數參並用之得病內熱者不必按常藥次也便以青葙苦參艾苦酒療之但少促其開耳無不解者

苦酒即米醋也

龐曰辛甜薑桂人參之屬是發散寒氣之藥其病未傳成內熱者爲調治之大要藥也決不可慮其酸苦之藥正治內熱病急要之藥也設當行辛甘而用酸苦設當行酸苦而用辛甘是昧於陰陽之用如此醫殺之耳其辛甘酸苦自是調治通行之要藥若論苦則忌甘論甘則忌苦雖有屢中誠爲粗工矣

傷寒發黃者先用瓜蒂末內鼻中口含水搐鼻中去黃水用五苓散最良

時行一切不知身上疼痛不寒亦不熱沉沉似有所思順事多語此藏正傳熱麻人龍膽丸服此藥不死。

大麻仁

大黃  
兩各壹

柴胡

黃芩

白鮮皮

秦艽

赤芍藥

龍膽草  
分各貳

黃連  
壹分

梔子  
肆貳拾個

細末蜜丸如梧桐子大食後煎淡竹葉湯下三十九日與三服以大利爲度十日小差壹月平復地黃湯療傷寒及溫病應發汗而不與發汗五內有瘀血者及鼻衄吐血不盡內熱瘀血面黃大便黑者此方主之消化瘀血甚良。

生濕地黃  
肆兩

牡丹皮

芍藥

犀角屑  
無以升麻代各半兩

咬咀水貳升煮取壹升去滓溫溫飲一盞喜忘如狂者加地黃黃芩各三分加水一升脈大來遲腹

不滿自言滿者爲無熱不用黃芩也。

鼻衄或吐血下血黃芩湯。

黃芩

肆兩

咬咀水三升煮一升半溫飲一盞兼治婦人漏下血不止

黃芩更佳

吐血百治不差此方療十差十大黃散。

地黃汁  
半升

生大黃末  
壹方寸

煎地黃汁三沸下大黃末調勻空腹服之每溫飲一小盞日三服血即止  
熱病毒氣入眼赤痛生翳不見光喚者大黃梔子湯

生大黃

蜜附

升麻

半兩

瞿麥

甘草

各壹分

梔子

柒個

㕮咀水二升煎至一升去滓溫作四服以利爲度難利者煎藥畢下朴消二分和服先煮諸藥至一升半乃下大黃大黃先以水漬和水下之則折熱易利治毒病入眼忽生赤翳或白或腫膿起或赤痛不得視光明入心肝或眼浮腫如吹汁出生膜覆珠子或內障不見物良由病後不慎酒麪炙燙五辛所致宜服此頻利之秦皮大黃湯

秦皮

柴胡

常山

黃芩

升麻

芍藥

白芍

枳實

甘草

兩

大黃

參分

㕮咀水參升煮貳升下大黃再煎一升半去滓食後溫飲一盞熱盛者加焰消半兩湯成後下化匀服未差更作可至五七劑

又方滿眼湯

斑豆瘡不  
宜用

升麻

黃連

各半

細剉水二升煎至一升綿包頭搣湯滴入眼中頻頻用之

下部瘡瘍瘻毒散

雄黃 青葙子

苦參

黃連各三分

桃仁壹分

爲散以艾汁和丸。棗核大。綿包內下部薦薑汁更佳。冬月無艾濃煎艾汁和爲丸。更以米飲調下。貳錢溫飲之。日二服。

治瘡瘍青黛丸

青黛

丁香

黃連等分

細末甘淀和丸。棗核大。口中瘡含之。咽汁若下部有瘡。綿裹內下部日含化五六十九差。牽馬丸治天行四五日下部生瘡。醫所不能治。此方主之。

附子壹分

藜蘆

桂枝

巴豆各半兩去皮心炒黑

細末別研巴豆加蜜杵丸。橘柵子大。墮心熱水下二丸。未知加三丸。熱在鬲上不下。飲熱湯半升。投吐之下部瘡自差。神良。

天行口瘡黃藥升麻湯

黃藥

升麻

甘草生半兩各

或咀水一升半煮半升入地黃汁一合。煎半升分二服。細呷之。

又方薔薇飲子

薔薇莖葉切一升  
皮。冬用根。

水三升煮半升溫溫漬之去涎喉咽有瘡者嚥汁少許爲佳。

又方黃藥飲子

黃藥薄切小片蜜漬一宿嚼藥汁漬瘡。

又方五倍子散

五倍子炒爲末傅之涎出吐去以差爲度。

傷寒喉中痛閉塞不通射干煎。

生射干  
豬脂各半斤。

合煎令射干色微焦去滓取壹棗大綿裹含稍稍嚥之。

治喉咽痛塞鵝砂散。

鵝砂  
硝砂半分  
草烏頭尖  
雄黃各一錢  
牙消  
白礬  
甘草  
分量各等

細末米飲調一錢細細呷之。

古方黑龍煎治咽喉腫痛九種疾。

人參半兩 甘草一錢 無灰酒一盞升

不蠍皂角一條

水三斗浸皂角一宿淨鑊內煎令水減半次下人參甘草細切又同煎三分耗二布絞去滓下酒更入釜煤一七半攪煎如餳稀入瓷合內埋地中一宿若用時取一丸如雞頭大蓋中以溫酒一呷化之先以水漱口以鵝毛點藥入喉中掃之有惡涎或自出或下腹可兩三度引藥方歇良久令吐候惡物出盡了令喫少許水浸蒸餅及軟飯粥壓之次含甘草一寸嚥汁忌炙燉胡餅豬肉淹藏等物如木舌難下藥以匙按舌用藥掃喉中。

九般名

急喉閉 纏喉風 結喉 燥喉 重舌

木舌 過蟲 蜈蚣 飛系入喉

元祐五年自春至夏秋蘄黃二郡人患急喉閉十死八九速者半日一日而死黃州潘推官昌言親族中亦死數口後得黑龍膏救活者數十人。

龐曰急切亦不候合此膏用古方以意處之但得不蠍皂角一兩條搗碎水三升半浸少時搾汁去滓下甘草一分人參一分同煎作稀膏勿令太稠乃下後藥。

霜梅上白鹽 硼砂 焰消各等分

三味生研用前膏斟酌和勻可以掃得爲度每以鵝毛搣少許如前法掃喉中甚効其將息次第亦如前法此膏得力尤速若日久膏乾以甘草水化之病差後咽喉外生瘡勿疑無鹽梅以白鹽代

天行手足腫疼痛欲脫者濃煎虎杖汁漬之

天行後毒氣手足腫痛欲脫必作癰膿升麻大黃湯

升麻 木通 白斂各等分 黃芩 茄藥各一兩

甘草 半兩 大黃半兩

咬咀水參升煮二升半下大黃煮一升半溫溫飲一盞利下爲度

傷寒勞復證

病新差後氣血津液衰耗慎勿爲諸勞動事凡言語思慮勞神梳沐潔類勞力則生熱而復病如初也又新差後精髓枯燥切不可爲房事犯房事勞復必死魏晉郵顧子獻病差後華敷囑之慎勿爲勞事餘勞尚可女勞卽死此是女勞復非陰陽易也素問云病熱而有所遺者是新差後腸胃尙弱若多食則難消化而復病如初也此是食復新差強人足兩月虛弱人足百日則無復病矣

天行勞復頭痛四肢疼葱豉湯

葱白  
豉 半升

水二升半煎葱爛去滓入雄鼠屎三七枚末之和匀分再服未差更作天行勞復作熱且至晚則腰背痛頭項強重葛根薑豉湯。

芍藥  
生薑 各一兩  
半  
豉  
葱白 各一兩  
半  
葛根 兩兩

咬咀水三升煎二升下豉煎一升半去滓溫飲一盞。

大病差後勞復枳實梔子湯。

枳實  
壹分  
肥梔子 捺貳  
個  
香豉 半升

漿水三升煮枳實梔至二升下豉煮一升半去滓溫飲一盞溫覆微汗食復者加大黃棗子大七枚。

同煎服之愈。

療傷寒已差勞復如初脈浮無汗者桂枝梔子湯。自汗者去麻黃。

梔子 捺貳  
個  
豉 半升  
桂枝 麻黃 各一兩

咬咀水三升煎至二升下豉取一升半去滓溫飲一盞溫覆取小汗差。

療傷寒勞復如初自汗出者脈浮滑煩躁甚宜此方。

梔子石膏香豉湯

梔子 拾隨個

石膏 肆兩

香豉 綿裹一臺兩

水三升先煮二味至二升半下豉煮取一升半去滓溫飲一盞

一法湯成入雄風  
矢二七枚末良

病未平復後勞動致熱氣攻胸手足拘急搐搦如中風狀瓜萎湯

瓜萎根 黃脈者無 淡竹茹 半斤

水三升煮一升二合去滓日二三服溫與之

婦人病未平復因夫所動小腹篤中急痛腰跨疼四肢不任舉動無熱證者附子黃耆湯。

白朮

當歸

桂枝

附子

甘草

芍藥

人參 合半兩

黃耆 卷分

生薑

壹兩

附子

甘草

芍藥

哎咀水四升煮至一升半去滓通口服一盞食久再服溫覆取小汗

男子勞房成復病鼠屎湯

薤根

豬鼠屎

硬者是卽牡鼠也

水三升半煮薤根至一升半去滓下鼠矢末再煎三沸溫飲一盞相次三服衣覆必有黏汗爲効未汗再作一劑兼治陰陽易神驗

男子房勞復發熱口噤臨死舌出數寸又始得病百節痛如被打渾身沉重恍惚失措脈促而絕不可治

或有吐涎不止。或有譫妄煩亂者。皆不可治。

天行差後勞復發熱。嘔吐食不下。蘆根湯。

蘆根

半升

生薑

貳兩

橘皮

枇杷葉

各壹

㕮咀水三升煮一升半去滓溫飲一盞。大故心煩躁加石膏貳兩。加水一升煮二升。

陰陽易證

陰陽易病者。陰陽相感動。其毒氣着人如換易也。男子病新差。女子與之交。女子得病名曰陽易。女子病新差。男子與之交。男子得病名曰陰易。若二男二女則不相易。然女犯男得病鮮有死者。男犯女得病救稍緩則十無一人得生者。若女犯男。男自發勞復。則女不病。男犯女。女自發勞復。則男得病亦輕。富貴之家雖知其事。後生輕於自恣。犯之多致不救。田野之人。蒙昧不知傷寒能死人。因此病死者十有三四矣。皆不知其所犯之由深可傷也。男子女人陰陽易病。其狀身體疼痛。熱上衝胸。頭重不能舉。眼內生眵。四肢拘急。小腹絞痛。手足拳則皆死。其亦有不卽死者。若小腹裏急。熱上衝胸。頭重不欲舉。百節解離。經脈緩弱。血氣虛骨髓竭。便吸吸氣力轉少。着牀不得動。起止仰人。引歲月死。宜此方。足甲棍灰散。

取交接婦人手足甲二十枚。根近隱處一尺同燒。或米飲調下二錢。日三服。陰頭微腫。小便利爲愈。若未愈。灸陰頭一百壯。便差。陰頭在毛際間。提陰向上當頭是穴。

女子陽易則取男子手足爪甲根近隱處如前燒服之可灸毛際橫空上中央曲骨一穴百壯。男子陰易如前法灸若陰卵縮未下灸足大拇指旋毛上小炷七壯是大敦二穴男女初得陰陽易病便服薤根鼠矢湯出汗有驗。

傷寒口乾喜睡方

大棗

肆拾枚去皮尖

烏梅

肥者拾個去核爲末

右以棗肉和爲丸含化自然汗

# 傷寒總病論卷四

暑病論

素問載五種暑病

暑病表證  
時行寒疫論

時行寒疫治法

聖散子方

斑豆方論

溫病發斑治法  
小兒證附

暑病論

龐曰。冬傷於寒。夏至後至三伏中。變爲暑病。其熱重於溫也。有如傷寒而三陰三陽傳者。有不依次第傳。如見五藏熱證者。各隨證治之。

暑病表證

暑病代桂枝并葛根證

桂枝

芍藥

知母

生薑  
各壹兩

甘草

壹兩

黃芩

半兩

葛根

貳兩

棗一枚

陸

咬咀水六升煮取三升。通口服一盞。相次取汗。

暑病代麻黃證。

桂枝

杏人

知母  
各壹

麻黃  
參兩

甘草

黃芩  
各壹

暑病代青龍湯證。

麻黃

貳兩

杏人  
參拾

石膏  
叁兩

知母  
拾陸

桂枝

甘草  
各壹

甘草  
兩・肆兩

暑病代葛根麻黃證。

葛根  
貳兩

麻黃  
半・壹兩

生薑  
壹兩

桂枝

知母

黃芩

芍藥  
各壹

生薑  
半・壹兩

棗  
拾陸

如前煎服。

暑病三日外至七日不歇內熱令人更相染大青消毒湯。

大青

芒消  
各貳

山梔子  
壹兩

石膏  
肆兩

豉  
半升

濕地黃  
半升

哎咀水七升煮取三升去滓下芒消一盞以熱除爲度。

暑病通用白虎一如傷寒與暎證用之。方在厥陰汗證中

暑病通用麥奴丸。證中

暑病若吐下後別見形證一如傷寒門治之。

暑病嘔逆發斑瘡豆壩候一如溫病門治之。已上四條先生所論

預防熱病急黃賊風葛粉散。

葛粉

貳升

生乾地黃

壹升

香豉

半升

細末食後服方寸匕牛乳蜜湯竹瀝米飲烏梅湯任性調下日三服有病者日五服。

素問載五種暑病

肝熱病者先左頰赤肺熱病者先右頰赤心熱病者顏先赤頰也腎熱病者頭先赤頭也脾熱病者

鼻先赤主中病雖未發見赤色刺之名曰治未病

肝熱病者先小便黃腹痛多臥身熱熱爭則狂言及驚瘡滿痛手足躁不得安臥庚辛甚甲乙大汗氣逆

則庚辛死刺足厥陰少陽其逆則頭痛員員脈引衝頭也。

心熱病者先不樂數日乃熱熱爭則卒心痛煩悶喜嘔頭痛面赤無汗壬癸甚丙丁大汗氣逆則壬癸死。

刺手少陰太陽。

脾熱病者先頭重頰痛心煩青欲嘔身熱熱爭則腰痛不可俛仰腹滿泄兩脅痛甲乙甚戊己大汗氣逆則甲乙死刺足太陰陽明。

肺熱病者洗浙然厥起毫毛惡風寒舌上黃身熱熱爭則喘咳痛起走胸膺背不得太息頭痛不任汗出而惡寒丙丁甚庚辛大汗氣逆則丙丁死刺手太陰陽明出血如豆大立已。

腎熱病者先腰痛膀胱苦渴數飲水身熱熱爭則項痛員員澹澹然戊己甚壬癸大汗氣逆則戊己死刺足少陰太陽諸汗者至其所勝日汗出也。

龐曰五種熱病二三日逢剋未爲逆忌在五六日也。

時行寒疫論

病源載從立春節後其中無暴大寒又不冰雪而人有壯熱病者此屬春時陽氣發於冬時伏寒變爲溫病也從春分以後至秋分節前天有暴寒皆爲時行寒疫也三月四月或有暴寒其時陽氣尚弱爲寒所折病熱猶輕五月六月陽氣已盛爲寒所折病熱則重七月八月陽氣已衰爲寒所折病熱亦微其病與溫病暑病相似但治有殊耳其治法初用摩膏火灸唯二日法針用崔文行解散汗出愈不解三日復發汗若大汗而愈不解者勿復發汗也四日服藜蘆丸微吐愈若病困藜蘆丸不吐者服赤小豆蕘蒂散吐

之已解視病尙未了了者復一法針之當解不解者六日熱已入胃乃與雞子湯下之愈無不如意但當  
歸視節度與病耳食不消病亦如時行俱發熱頭痛食病當速下之時病當待六七日時病始得一日在  
皮二日在膚三日在肌四日在胸五日入胃入胃乃可下也熱在胃外而下之熱乘虛入胃然要當復下  
之不得下多致胃爛發斑微者赤班出五死一生劇者黑班出十死一生人有強弱相倍也病者過日不  
以時下之熱不得泄亦胃爛斑出矣若得病無熱但狂言煩躁不安精神言語不與人相主當者治法在  
可水五苓散證中此巢氏載治時行寒疫之法焉溫病暑病相似但治有殊者據溫病無暍膏火矣又有冬溫

### 時行寒疫治法

初得時行赤色頭痛項強兼治賊風走疰寒痺趙泉黃膏

大黃

附子

細辛

川椒

乾薑

桂枝各壹兩

巴豆伍拾粒

咬咀苦酒漬一宿以臘月豬脅一斤煎調火三上三下去滓收之傷寒赤色熱酒調服梧桐子大一枚又以火摩身數百遍兼治賊風最良風走肌膚追風所在摩之神効千金不傳

崔文行解散時氣不和傷寒發熱

桔梗炒

細辛各肆兩

白朮捌兩

烏頭炮壹斤

細末傷寒服一錢五銖匕不覺復小增之以知爲度若時氣不和日服一錢五銖匕辟惡欲省病一服了去此時行寒疫通用之無病者預服以辟寒爲佳皆酒調下

藜蘆散溫辟溫疫傷寒

藜蘆 蘭蜀  
細辛 附子 分各參

朱砂 分各壹  
桂枝

牡丹皮

皂角 分各伍

未之絳囊帶一方寸匕男左女右臂上着之覺有病之時更以粟米大內鼻中酒服一錢匕覆取汗日再當取一汗耳。  
赤小豆瓜蒂散在厥陰證中。

雞子湯治熱盛狂語欲走。

生雞子 柒枚  
芒消 壓兩

井花水一大升同攪千遍去沫頻服之快利爲度

豬苓散卽傷寒門五苓散也在可水證中已上五方戴巢氏治

龐曰摩膏火炙可行於西北二方餘處難施莫若初服解散赤散之類如轉發熱而表不解乃行後四方爲佳天行壯熱煩悶無汗者麻黃葛根湯

麻黃  
伍兩

葛根  
四兩

龜末每服五錢水二盞

桔子二箇葱白五寸豉一撮煎八分去滓沫

溫溫相次四五服取汗止後服。

天行一二日麻黃湯

自汗者去麻黃加葛根二兩

麻黃  
武兩

石膏  
壹兩半

貝齒  
亦得五箇無

升麻

甘草

芍藥  
各壹兩

杏人

肆拾箇

龜末每服五錢水二盞

煎八分溫服取汗止後服

葛根解肌湯汗後表不解宜服此

自汗者去麻黃

萬根  
肆兩

麻黃

芍藥

大青

甘草

黃芩

桂枝  
各貳兩

石膏  
叁兩

煎如前法

詔書發汗白薇散治時氣二三日不解

白薇  
貳分

杏丸  
參分

貝母  
參分

麻黃  
柒分

細末酒調下方寸匕相次二三服溫覆汗出愈湯調亦得

聖散子方  
此方蘇子瞻尚書所傳有序文

昔嘗覽千金方三建散於病無所不治而孫思邈特爲著論以謂此方用藥節度不近人情至於救急其驗特異乃知神物効靈不拘常制至理開感智不能知今予所得聖散子殆此類也歟自古論病唯傷寒至危急表裏虛實日數證候應汗應下之法差之毫釐輒至不救而用聖散子者一切不問陰陽二感或男女相易狀至危篤者連飲數劑則汗出氣通飲食漸進神宇完復更不用諸藥連服取差其餘輕者心額微汗正爾無恙藥性小熱而陽毒發狂之類入口卽覺清涼此殆不可以常理詰也時疫流行平旦輒煮一釜不問老少良賤各飲一大盞則時氣不入其門平居無病能空腹一服則飲食快美百疾不生真濟世衛家之寶也其方不知所從來而故人巢君穀世寶之以治此疾百不失一二余旣得之謫居黃州連歲大疫所全活至不可數巢君初甚惜此方指江水爲盟約不傳人余竊鑑之乃以傳蘄水人龐君安常龐以醫聞於世又善著書故以授之且使巢君之名與此方同不朽也其用藥如右

肉豆蔻	拾箇	木豬苓	石菖蒲	茯苓	高良薑
羹本		芍藥	吳茱萸	附子	厚朴
獨活		柴胡	枳殼	炮	薑炙
吳朮	蜀人謂著朮之白者爲白朮蓋茅朮也而謂今之白朮爲吳朮		白朮	澤瀉	
半夏	各半兩 薑汁製			細辛	
				藿香	

剉焙作煮散。每服七銖水一盞半煎至八分去滓熱服。餘滓兩服合爲一服重煎。皆空心服。

治時氣傷寒頭痛身熱腰背強引頸及中風口噤治瘧不絕婦人產中風寒經氣腹大華佗亦散方。

丹砂

貳分

蜀漆

乾薑

細辛

乾薑

細辛

黃芩

桔梗

防已

桂枝

茯苓

人參

沙參

女萎

烏頭

常山

各三

雄黃

吳茱萸

各伍

桔梗

麻黃

代赭

各拾

常山

各三

雄黃

吳茱萸

各伍

桔梗

除細辛丹砂乾薑雄黃桂外皆熬治作散酒服方寸匕日二耐藥者二匕覆令汗出治瘧先發一時服藥二匕半以意消息之。

烏頭赤散治天行疫氣病。

烏頭

陸分

皂角

雄黃

細辛

桔梗

大黃

各壹

細末清酒或井花水服一刀圭日二不知稍增以知爲度除時氣不和一日進一服牛馬六畜中天行癰瘍亦以方寸匕人始得病一日時服一刀圭取兩豆許內鼻孔中。

斑豆瘡論

龐曰天行豌豆瘡自漢魏以前經方家不載或云建武中南陽征虜所得仍呼爲虜瘡其後名醫雖載發

班候是發汗吐下後。熱毒不散。表虛裏實。熱氣燥於外。故身體發斑。又說豌豆疮瘡。表虛裏實。一如發斑之理。別云。熱毒內盛。攻於藏府。餘氣流於肌肉。遂於皮膚毛孔中。結成此瘡。既是裏實。熱毒內盛。則未發及欲發瘡斑。未見皆宜下之也。瘡已差。則再下之。此病有二種。一則發斑。俗謂之麻子。其毒稍輕。二則豌豆。其毒最重。多是冬溫所變。凡覺冬間有非節之暖。瘡毒未發。即如法下之。次第服預防之藥。則毒氣內消。不復作矣。有不因冬暖四時自行者。亦如法下之。古方雖有治法。而不詳備。疑當時毒熱未甚。鮮有死者耶。近世此疾。歲歲未嘗無也。甚者天柱十有五六。雖則毒氣內壞。不治。因醫爲咎。又大半矣。若身疼壯熱。頭痛。不與小汗。何由衰散。大腑久祕。毒攻腰脅。或心腹脹滿。不與微利。何由釋去。故當消息汗下。然則寒藥固不當行。溫藥反增熱毒。若熱勢大盛。脈候洪數。涼性之藥。不阻表裏氣。亦可通用。若寒氣阻礙。脈候浮遲。則溫性之藥。不阻表裏氣者。可冀冰釋云。不可汗下寒熱之藥。只可紫草一味者。乃滯悶之流種。是遭逢輕疾。以自差爲功。若值重病。則拱手待斃矣。世有權貴。自信不任人拘忌。冷熱汗下。病或不救。則責醫謬誤。斯又可爲傷歎。夫調瑟者必當移柱。故用古方。附以愚見爲斑豆方。以小兒多染此患。故專用小湯劑。大人可借用之。

溫病發斑治法 小兒證附

冬月觸冒寒毒者。至春始發病。病初至表。或已發汗吐下。而表證未罷。毒氣不散。故發斑瘡。又冬月天氣

溫煖人感乖候之氣未卽發病至春又被積寒所折毒氣不得泄至夏遇熱其春寒已解冬溫毒始發出於肌膚斑爛隱彫如錦文也。

治溫毒發斑大疫難救兼治豌豆瘡不出地黃膏

濕地黃

肆兩

好豉

半升

以豬膏一斤和勻露一宿煎五七沸令三分去一絞去滓下雄黃末一錢匕麝香末半錢匕攪勻稍稍盡飲之毒從皮中出則愈小兒斟酌服

冬溫未卽發病至春被積寒所折不得發至夏得熱其春寒解冬溫毒始發於肌中斑爛隱彫如錦紋而欬悶嘔吐清水宜服黃芩麻黃湯

葛根

橘皮

杏人

麻黃

知母

黃芩

甘草

各半兩

㕮咀水二升煮八合去滓溫分減服之嘔吐先定便宜消息不嘔者去橘皮

肺府藏熱暴發氣班不可作  
養故香豉石膏湯

香豉

貳合

葱鬚

壹兩

石膏

貳兩

梔子

參參

生薑

貳兩

大青

升麻

芒消

各三分

咬咀水三升煮取一升三合去滓下芒消溫溫分減服。

溫病發斑赤斑者五死一生黑斑者十死一生大疫難救黑奴丸主之

方在雜汗證中

冬溫至夏發斑歎而心悶嘔清汁眼赤口瘡下部亦生瘡或自下利黃連湯。

黃連

壹兩

橘皮

杏人

炒

枳實

麻黃

葛根

厚朴

甘草

各壹分

咬咀水三升煮一升二合去滓溫溫分減服下利先止別當消息小兒斟酌。

天行發斑瘡須臾偏身皆戴白漿此惡毒云永徽四年此瘡自西域東流于海內但煮葵菜蒜薑啖之則止鮮羊血入口卽定初患急食之作菜下飯亦得。

小兒時行瘡豆恐相傳染先服漏蘆湯下之本治熱毒癰疽赤白諸丹熱毒瘡瘍。

以下皆是小兒湯劑

漏蘆葉

無以山梔子代之

連翹

白斂

甘草

芒消

各壹分

升麻

枳實

麻黃

黃芩

各壹分

大黃

肆分

咬咀水二升煮一升半下大黃煮一升去滓下芒消分減服以利爲度大人服可倍作

大黃水浸時和水下之少

龐曰凡覺冬溫至春夏必發斑豆小兒輩須服漏蘆湯下之得下後逐日空心飲甘草汁三歲以上一盞兒小減之直候腹疼乃止未疼可飲至十日則永不發或下後飲羊血一盞則不發。

治時行豌豆瘡樺皮飲子

樺皮二兩細切水一升煮至半升去滓飲汁分減服。

龐曰初得病便驚狂不眠渾身熱然汗出問之身不憎寒亦不惡風其脈如數以漏蘆湯下之不甚數者以大承氣湯下之非但瘡豆傷寒亦然。

治豆瘡毒氣不出煩悶熱毒氣攻腰或腹脇痛不可忍大便不通五香湯主之。

麝香半分

木香

丁香

沉香

乳香各壹分

麝香

柏實

射干

連翹

黃芩

芍藥

升麻

甘草各半兩

大黃壹兩

龜末

桂枝

甘草各半兩

天行熱氣生瘡泡身痛壯熱水解散。

麻黃壹兩

黃芩

桂枝

甘草

各半兩

細末緩水調下二錢匕小兒一錢覆令小汗熱氣在表已發汗未解或吐下後熱毒不散煩躁謬語。

此爲表虛裏實熱氣躁於外故身體發斑如錦紋或不因汗下始得病一二日便發皆由溫疫熱毒氣使然也甚則發豌豆瘡其色白或赤發於皮膚頭作漿戴白濃者其毒則輕有紫黑色作根隱隱

在肌肉裏。其毒則重。十死一生。甚者五內七竅皆有瘡形如豌豆。故以名焉。脈洪數者。是其候也。天行熱毒未解。欲生豌豆。發熱疼痛。宜服解肌出汗葛根石膏湯。

葛根

麻黃各兩

石膏武兩

黃芩

芍藥

桂枝

甘草各兩

自汗者去  
麻黃

斑豆始有白庖。忽搐入腹。漸作紫黑色無膿。日夜叫煩亂者。鬱金散。

鬱金

一枚甘草壹分。水半碗。煮乾去  
甘草。片切。焙乾爲細末。

真腦子炒半錢。

同研。每一錢匕。以生豬血五七滴。新汲水調下。不過二服。甚者毒氣從手足心出。如癰狀乃差。此是

五死一生候也。

此患小便澀。有血者中壞也。瘡黑厭無膿。十死不治。斑豆煩喘。小便不利。鼈甲湯。

燈心

壹把武兩

鼈甲

水一升半煎六合去滓。溫分作二服。

斑豆定煩喘。淡竹瀝飲子。

淡竹瀝

煖飲之。煩喘自汗。瘡不作黑盛可治。

定煩喘麻黃甘草湯。

麻黃 杏仁 桑白皮 甘草各壹分

㕮咀水一升煎四合放溫分減服。若脈數有熱以竹瀝代水一半煎之。嗽或喉痛加射干一分。

斑豆瘡出不快。紅花湯。

紅花子一錢碎。

水半升煎百沸去滓分減服之。

斑豆服涼藥太過欬嗽手足冷脈遲甘草乾薑湯。

乾薑半兩

咬咀水一升半煎六合分作二服。

常行瘡豆紫草湯最良。患其服之太少不能中病。但多糙切好紫草以湯沃之。用物合定候溫去滓。每紫草半升用湯一升爲準也。分減斑豆已出不可正爾發表更增斑爛以表虛故也。豌豆瘡欲出甘草湯。

甘草肆兩

細剉水二升煎一升去滓分減溫服覺腹中微利即止。

油飲子

飲清油一升卽不生。

豌豆斑瘡不快表裏不解煩喘大便祕氣攻腹滿犀角升麻湯。

麻黃 壹分

木香

犀角

升麻

芍藥

甘草

杏人

枳實

雄黃 各壹分

大黃 半兩

麝香 壹錢

甘草

咬咀水二升煎一升半下大黃再煎一升去滓下雄麝末沸勻分作三服以大便通爲度。  
瘡已出定方

芒硝 豬膽

和研勻塗之勿動痂落無瘢仍臥黃土末上良。

天行瘡豆預服此則不發三豆飲子

赤小豆

黑豆

菉豆 各壹升

甘草 壹兩

淨淘水八升煮熟逐日空心任性食豆飲汁七日永不發。


瘡豆發斑下利赤黃或膿血遍身發熱梔子薤豉湯。

好豉 半升

薤白 武兩

肥梔子 拾陸枚

水二升。煮梔子薤白。將爛下豉。再煮。十數沸去滓。分減服。解下惡物差。



# 傷寒總病論卷五

天行溫病論

辟溫疫論

青筋牽論

赤脈攢證

黃肉隨證

白氣鯉證

黑骨溫證

溫病喉方論

黃病

傷寒感異氣

及瘧證

敗壞別行方

小兒傷寒

天行溫病論

龐曰。辛苦之人。春夏多溫熱者。皆由冬時觸冒寒毒所致。自春及夏。至前爲溫病者。素問仲景所謂傷寒也。有冬時傷非節之暖。名曰冬溫之毒。與傷寒大異。卽時發病溫者。乃天行之病耳。其冬月溫暖之時。人感乖候之氣。未卽發病。至春或被積寒所折。毒氣不得泄。至天氣暄熱。溫毒乃發。則肌肉斑爛也。又四時自受乖氣而成府藏陰陽溫毒者。則春有青筋牽。夏有赤脈攢。秋有白氣鯉。冬有黑骨溫。四季有黃肉。隨治亦別有法。難經載五種傷寒。言溫病之脈行在諸經。不知何經之動。隨經所在而取之中風木傷寒。金

熱病火濕溫水溫病土治之者各取其所屬據難經溫病本是四種傷寒感異氣而變成溫病也土無正形因火而名故以溫次熱也土寄在四維故附金木水火而變病所以王叔和云陽脈浮滑陰脈濡弱更遇於風熱變成風溫陽脈洪數陰脈實大更遇其熱變成溫毒溫毒爲病最重也陽脈濡弱陰脈弦緊更遇濕氣變爲濕溫脈陰陽俱盛重感於寒變成溫瘡斯乃同病異名同脈異經者也故風溫取足厥陰木手少陰火溫毒專取手少陰火溫瘡取手太陰金溫溫取足少陰水手少陰火故云隨經所在而取之也天行之病大則流毒天下次則一方次則一鄉次則偏着一家悉由氣運鬱發有勝有伏遷正退位或有先後天地九室相形故令升之不前降之不下則天地不交萬化不安必偏有宮分受斯害氣莊子所謂運動之泄者也且人命有遭逢時有否泰故能偏着一家天地有斯害氣還以天地所生之物以防備之命曰賢人知方矣

辟溫疫論

療疫氣令人不相染及辟溫病傷寒屠蘇酒通俗文曰屋平日居蘇廣雅云居蘇庵也然居蘇平而庵園所以聚會以繫塞故正旦會飲辟溫酒而以居蘇爲名也

大黃

桂枝

桔梗

川椒  
銖各拾伍

白朮  
銖拾銖

烏頭

菝葜

防風  
銖各伍

咬咀縫囊盛。以十二月晦日早懸沉井中至泥。正旦平曉出藥置酒中。屠蘇之飲先從小起。多少自在。一人飲一家無病。一家飲一里無恙。飲藥酒三朝還置井中。若能歲歲飲可代代無病。當家内外井皆悉著藥。辟溫氣也。忌豬肉生葱。桃李雀肉等。

辟溫粉

芎 杞 白芷 藁本 苓陵香 等分

爲末。每壹兩半入英粉肆兩。和匀。常撲身上。無英粉蚌粉亦可。凡出汗太多。欲止汗。宜此法。

入溫家令不相染研雄黃并嚏法。

水研光明雄黃。以筆濃蘸塗鼻竅中。則疫氣不能入。與病人同床。亦不相染。五更初洗面後。及臨時點之。凡溫疫之家。自生臭穢之氣。人聞其氣。即時以紙筋探鼻中。嚏之爲佳。不爾。邪氣入上元宮。遂散百脈而成斯病也。以雄黃點之。則自不聞其氣。并辟諸惡怪夢神良。

常以雞鳴時。存心念四海神名三七遍。辟百邪惡鬼。令人不病溫。

東海神阿明。

南海神祝融。

西海神巨乘。

北海神禹強。

每入病人室。存心念三遍。口勿誦。

古今名賢傳許季山所撰千敷散辟溫疫惡疾不相染着。

附子

壹個  
分者

細辛 乾薑

麻子

柏實

各壹  
分

細末和入柏實麻子令勻酒服方寸匕服藥一日十年不病二日二十年不病三日三十年不病受師法保應三日服之歲多疫則預服之不飲酒井花水服亦得忌豬肉生菜。

辟溫殺鬼丸薰百鬼惡氣。

雄黃

雌黃

燭羊角

虎頭骨

各柒  
兩

龍骨

鼈甲

陵鯉甲

蠅皮

各叁  
兩

樗鷄

拾伍枚  
羌青五枚  
代

空青

壹兩  
以石綠代

川芎

真朱砂

各伍  
兩

東門上鷄頭

壹枚

細末以蠟貳拾兩併丸鷄頭大正旦門前燒壹丸男左女右臂上帶一丸辟百惡獨弔喪間死吞下壹丸小豆大天陰大霧燒壹丸於門牖前極佳。

務成子螢火丸主辟疾病惡氣百鬼虎狼蛇虺蜂蠍諸毒。

五兵白刃盜賊凶害者冠軍將軍武威太守劉子南從尹公受得此方永平十二年於虜界交戰敗績士卒掠盡子南被圍矢如雨未至子南馬數尺矢輒墮地虜以爲神人各解圍而去子南以方教

子及諸兄弟爲將者皆未嘗被傷累世祕之漢末青牛道士得之以傳安定皇甫隆隆傳魏武帝乃有人得之故一名冠軍丸一名武威丸會試此法一家五十餘口俱染病唯四人帶者不染

螢火

鬼箭

蒺藜

雄黃

雌黃

礬石各貳兩

羖羊角

鍛竈灰

鐵錘柄

入鐵處燒焦各壹兩半

爲末以鷄子黃丹雄鷄冠一具和之如杏子大作三角絳囊盛住丸帶左辟若從軍繫腰下勿離身

劉根別傳曰潁川太守到官民大疫掾吏死者過半夫人郎君悉病府君從根求消除疫氣之術根曰寅歲泄氣在亥今年太歲在寅於聽事之亥地穿地深叁尺與深同取沙叁斛着中以淳酒叁升沃其

上府君從之病者卽愈疫氣遂絕於聽事取太歲六合之地也

青筋牽證

春三月青筋牽證其源自少陰少陽從少陰而涉足少陽少陽之氣始發少陰之氣始衰陰陽怫鬱於膝裏皮毛之間因生表裏之病因從足少陽發動及少陰則藏府受癘而生其病肝府藏陰陽毒氣病類背雙筋牽急先寒後熱其病相反若府虛爲陰邪所傷者則腰強急腳縮不伸府中欲折眼中生花此法主之不可作煮散

柴胡地黃湯

柴胡

武兩半兩

生地黃

伍合半兩

香豉

伍合半兩

生薑

石膏

各錄兩兩

桂枝

半兩半兩

大青

白朮

芒硝

梔子人

各壹兩半兩

咬咀水七升煎三升去滓下芒硝溫飲一盞日三四服未差再作。肝府藏陰陽溫毒病頸背牽急先寒後熱其病相反若藏實則爲陽毒所損眼黃頸背強直若欲轉動卽合身回側不可作煮散。

石膏竹葉湯

淡竹葉

貳升半兩

梔子人

黃芩

升麻

芒硝

各壹兩半兩

細辛

各半兩

石膏

肆兩半兩

車前草

壹升葉

哎咀水陸升先下竹葉車前草煮肆升去滓下諸藥煮二升去滓下芒硝化勻溫飲一盞。

赤脈擴證

夏三月行赤脈擴病其源自少陰太陽。

心府藏陰陽溫毒氣身熱皮肉痛起其病相反若藏實則爲陽毒所侵口乾舌破而咽塞若府虛則爲陰邪所傷戰掉不定而驚動不可作煮散石膏地黃湯。

石膏

生葛根  
各肆兩

麻黃  
一兩

玄參  
參兩

知母

半兩

梔子人

大青

黃芩

芒硝

各壹兩

濕地黃  
半升

咬咀水九升取四升去滓下芒硝烊化勻溫飲一盞日三四服。

黃肉隨證

四季月終餘十八日行黃肉隨病其源從太陰陽明相格節氣相移三焦寒濕不調四時關格而起則藏府之癧隨時而受癘陽氣外泄陰氣內伏。

脾府藏溫毒病陰陽毒氣頭重項直皮肉強其病相反藏實則陽疫所傷蘊而結核起於頸下布熱毒於分肉之中上散入髮際下貫顴顫隱隱而熱不相斷離不可作  
養散玄參寒水石湯。

羚羊角屑

大青  
各壹兩

升麻

射干

芒消  
各壹兩

玄參

肆兩

寒水石  
半兩

梔子人

貳兩

咬咀水七升煎至三升去滓下芒消烊化勻溫飲一盞日三四服。

扁鵲云炎肝脾二臟主治四時隨病。

白氣狸證

秋三月行白氣。狸病。其源從太陽繫于太陰。太陰受淫邪之氣。則經絡壅滯。毛皮堅。發泄邪氣。則藏府傷溫。隨秋受病。

肺府藏溫病。陰陽毒氣。其病相反。若府虛則陰邪所傷。乍寒乍熱。損肺傷氣。暴嗽嘔逆。不可作委散。宜石膏杏人湯。

石膏

肆兩

杏人

前胡

各兩

甘草

壹兩

梔子人

葛根

各壹兩

玄參

葛根

各壹兩

桂枝

大青

葛根

各壹兩

咬咀水九升煎四升。溫飲一盞。日三四服。

肺府藏溫病。陰陽毒氣。其病相反。若藏實則爲陽毒所損。體熱生班。氣喘引飲。不可作貧散。宜石膏葱白湯。

豉

半升

紫苑

桂枝

麻黃

杏仁

升麻

梔子人

大青

芒硝

黑骨溫證

冬三月行黑骨溫病。其源從太陽少陰相搏蘊積。三焦上下壅塞。陰毒內行。藏府受客邪之氣。則病生瘧。腎府藏溫病。陰陽毒氣。其病相反。若府虛則爲陰毒所傷。裏熱外寒。意欲守火而引飲。或腰痛欲折。腎府

藏溫病陰陽毒氣其病相反若藏實則爲陽毒所損胸脇切痛類如刀刺心腹彭脹服冷藥差過而便洞泄不可作  
發散苦參石膏湯

苦參

生葛各兩

石膏

濕地黃各肆兩

梔子人

茵陳

芒硝各一兩半

香豉

葱白各半升

咬咀水八升煎三升半去滓下芒硝烊化勻溫飲一盞日三四服

扁鵲云灸脾肝腎三臟治丹毒黑骨溫之病

知母解肌湯療溫熱病頭痛骨肉煩疼口燥心悶或是夏月天行毒外寒內熱者或已下之餘熱未盡者或熱病自得利有虛熱煩渴者

麻黃

甘草各一兩

葛根各一兩

石膏參兩

咬咀水三升煎一升去滓溫飲一盞若已下及自得利下虛熱未除者除麻黃加葛根成三兩病常自汗者亦如此法加葛根無汗而難得汗者加麻黃成一兩半因變泄者除麻黃加白薇人參各一兩加水四升煎至一升半

溫病暎方論

伏熱在胃令人胸滿氣逆逆則暎若大下後胃中虛冷亦致暎也

溫病有熱飲水暴冷喫茅根葛根湯。

茅根

葛根 各半  
升

水四升煮二升去滓溫飲一盞。

溫病熱未除重被暴寒寒毒入胃蘊結不散變喫梓皮飲子。

單煮梓皮汁稍稍飲之佳。

溫病積飲冷冷結胃中熱入腎中變壯熱大喫者服梓皮湯夫腎中有熱者病差後足心皮裏剝脫去頭髮禿落是其證也。

溫病胃冷變喫茅根橘皮湯。

白茅根 半升

橘皮 半兩

桂枝

葛根 各半  
兩

哎咀水三升煎取半去滓溫飲一盞喫止停後服微有熱減桂半兩  
微有熱宜去桂  
加生薑二兩

溫病有熱飲水暴冷喫枇杷茅根湯。

枇杷葉

茅根 升各半

水四升煮去半去滓稍熱飲之一二盞  
已上四方皆不可作羹散

溫病者此熱入腎腎藏惡燥熱盛則腎燥腎燥故渴引飲而自救也。

萎蕤湯療冬溫及春月中風傷寒發熱頭眩痛咽乾舌強胸中痛心胸痞滿腰背強

萎蕤

白薇

麻黃

獨活

大杏人生

芎藭

甘草

青木香

葛根

各壹兩

石膏

半兩

咬咀水五升煎二升半去滓飲一盞通口服之取汗若一寒一熱者加朴消半兩大黃壹兩半朴消未後下

黃病證

黃病者一身盡痛發熱面色洞黃七八日後結熱裏有血當下之如瘀肝狀有血必狂病自下血亦有自愈者如黃其人小腹滿急若眼睛澁痛鼻骨疼兩膊及項強腰背急則是黃候大便澁但得小便利則不慮死矣不用大便多多則心腹脹爲不佳此由寒濕在表則熱蓄於脾胃腠理不開瘀熱與宿穀相搏鬱蒸不得消散則大小便不通故身體面目皆變黃色黃候其寸口近掌無脈口鼻氣冷者死

療諸黃膏髮煎

亂髮兩瓣子

豬管捌兩

二味煎令髮消盡研絞去滓分二服病從小便去有人再病胃中乾糞下便差

又方

瓜蒂貳拾柒箇水壹升煎去半頓服之。

黃疸目黃不除瓜丁散。

瓜丁細末

含水畜豆許深入鼻中黃水出盡爲度。

孫真人曰凡遇天行熱病多內熱着黃但用瓜丁散內鼻中黃水出乃愈卽於後不復患病黃矣常須用心警候病人四支身面微似有黃氣卽速行瓜丁散不可令散漫失候必大危矣特忌酒麪色欲犯者死黃家日晡發熱而反惡寒此爲女勞得之膀胱急小腹滿身體盡黃額上反黑足下熱因作黑癰大便必黑腹臍脹滿如水狀大便黑溏者此女勞之病非水也腹滿者難療消石礬石散。

消石  
礬石

等分擣篩以大麥粥汁和服方寸匕日三重衣覆取汗病隨大小便去小便正黃大便正黑也大麥則須是無皮麥者千金方云消石二分熬令燥礬石一分熬令燥故注之。

傷寒感異氣成溫病壞候并瘡證。

病人素傷於風因復傷於熱風熱相搏則發風溫四肢不收頭痛身熱常自汗出不解治在少陰厥陰少火厥木不可發汗汗出則讙語內煩擾不得臥善驚目光無精治之復發其汗如此者醫殺之耳。

風溫之爲病。脈陰陽俱浮。汗出體重。其息必喘。嘿嘿但欲眠。下之則小便難。發汗則譏語。加溫針則耳聾。難言。但吐下之則遺尿。宜萎蕤湯。方在溫病賦。因發汗後身體不惡寒。而反惡熱無下證者。名曰風溫。知母石膏湯。

知母 壹兩

石膏 壹兩

葛根

萎蕤 各參

甘草

黃芩

升麻

人參

杏仁

羌活

防風 各半

咬咀

水三升煎一升半去滓

溫飲一盞通口與之取汗

病人素傷於寒。因復傷於熱。變成溫瘡。寒多熱少者。華佗赤散主之。

在寒發治法中

寒熱相半者。丹砂丸。

燒子兼治間日

丹砂

升麻

人參

杏仁

羌活

防風 各半

細末

蜜丸梧桐子煎竹葉湯吞下二三十丸

發前三服中病則吐

或身習習麻木未中病加至四十

丸間日發前如法服中病即止

溫瘡內熱甚。昏昏嘿嘿者。麥奴丸主之。

方在可汗門中

溫瘡其脈如平。身無寒。但熱骨節煩疼時。嘔白虎加桂枝湯。

石膏 肆兩

知母 壹兩半

甘草 半兩

粳米 壹合

桂枝 參分

哎咀水三升半煮米熟去米下藥取一升半溫飲一盞。

溫瘡之爲病先熱後寒。

病人嘗傷於濕因而中暎濕熱相搏則發濕溫病苦兩脛逆冷腹滿又胸頭目痛苦妄言治在少陰不可發汗汗出則不能言耳聾不知痛所在身青而色變名曰重暎如此者醫殺之耳。

治濕溫如前證者白虎湯主之

方在傷寒厥  
陰門中

濕溫多汗妄言煩渴石膏甘草散。

石膏  
等分

細末漿水調下二錢匕日三服。

龐曰愚醫昧於冷熱之脈見足脛冷多行四逆輩如此醫殺者不可勝計濕溫脈小緊有如傷寒脈但證候有異數進白虎則脛自溫而差也。

病人素傷於寒因復傷於熱變爲溫毒溫毒爲病最重也。

本太陽病不解轉入少陽小柴胡證龍此爲壞證知犯何逆以法治之。

寸口脈洪而大數而滑洪大榮氣長滑數胃氣實榮長卽陽盛憐鬱不得出胃實卽牢難大便苦乾燥三焦閉塞津液不通醫復發汗令陽氣盛不周復重下之大便遂祕小便不利榮衛相搏五心煩熱兩目如

火鼻乾面赤舌燥齒黃而大渴過經成壞病。

巢氏亦載此一候今列入證中經手神效方附

三黃石膏湯 治如前證。

石膏

壹兩研

黃連

黃藥

黃芩

各半兩

香豉

貳合半

梔子

五箇

麻黃

參分

咬咀水三升煎取一升分三服未中病再一劑其效如神。

深師方曰傷寒已八九日三焦生熱其脈滑數昏憤身熱沉重拘急或時呻吟欲攻內則沉重拘急由表未解直用汗藥則毒因加劇古方無表裏兼療者思以三黃湯解其內有所增加以解其外故用三黃石膏湯。

論曰傷寒發汗或下或誤後三焦熱脈候洪數譫語不休晝夜喘息鼻中屢衄血而疾勢不解身目如發黃狂躁欲走宜三黃石膏湯。

以上四種溫病王叔和所謂同病異名同脈異經者也風溫與中風脈同溫瘡與傷寒脈同濕溫與中濕脈同溫毒與熱病脈同唯證候異而用藥有殊耳誤作傷寒發汗者十死無一生。

敗壞別行方

天行病經七日已上熱勢彌固大便祕澀心腹痞滿食飲不下精神昏亂恍惚狂言譫語其脈沉細衆狀

之中無一可救。決計附子鼈甲湯。

不可作  
羹散。

鼈甲

白蘚皮

茵陳

細辛

桂枝

白朮

吳茱萸

附子

枳實

大黃

生薑

㕮咀水三升煮一升溫作三服。

傷寒將理失節。服冷藥太多。伏熱在藏。手足厥逆。爪甲稍青。恐陽氣漸衰。成陰毒氣。脚踝之間。變入狐惑。

面色斑斑如錦紋。木通桂枝湯。

木通

桂

吳茱萸

細辛

甘草

半兩

葱白

臘莖

棗

玖箇

分

㕮咀水二升半煎一升二合去滓

溫作四服。

傷寒三七日至四七日。勞瘞不歇。熱毒不止。乍熱乍寒。乍差乍發。動作如瘡。鼈甲恆山湯。

鼈甲

恆山

牛膝

各參

大青

牡丹

各半

石膏

貳兩

烏梅肉

甘草

各壹

淡竹葉

豉

生麥門冬

生地黃

各貳合

㕮咀水五升煎二升半溫飲一盞。

傷寒八九日不差名曰敗傷寒諸藥不能治者。龍甲犀角湯。

龍甲

升麻

柴胡

烏梅肉

枳實

犀角屑

黃芩各半兩

甘草壹分

生地黃武合半

㕮咀水三升煎一升半分五服日三夜二。

敗傷寒頭痛骨肉痛荒言妄語醫所不能療者用前黑奴丸主之。

證中方在雜汗

龐曰有人患時氣經六七日因發狂遂眼瞪不瞬手攀欄曲口噤或有張口者冥冥不知人事口鼻氣絕但心頭溫面色和六脈皆動一如尸厥如此不省五六日因作成敗計救用風引湯加附子嚥下兩服遂省風引加附子湯。

寒水石

石膏

赤石脂

白石脂

紫石英

滑石各半錢

附子壹箇

龍骨

大黃

乾薑各肆錢

甘草

牡蠣粉各貳錢

桂枝

參錢

龕末每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫飲之。

小兒傷寒證

小兒傷寒發熱自汗多啼葛根芍藥湯。

葛根  
參分 茄藥 甘草 黃芩 桂枝

各半  
兩

蜜末每服三錢水一盞煎六分去滓溫作二服相次與之熱盛者去桂加升麻半兩無汗者加麻黃一兩喘者加杏子半兩。

龐曰小兒傷寒始因壯熱不除被湯丸下後其項強眼翻弄舌畜瘍如發癩狀久則哽氣啼聲不出醫以爲驚風屢服朱砂水銀牛黃彖粉巴豆竹瀝之類藥皆無驗此由誤下後毒氣結在心胸內熱生涎涎裹諸藥不能宣行所致也蕩涎散

粉霜  
壹錢 脂粉  
貳匣

芫花  
壹分

細末緩漿水調下一歲半錢病勢大者再服白色着底者粉霜也宜盡嚥之良久得睡取下黑黃涎裹包丹砂之類皆成顆塊啼聲便出立安

龐曰小兒結胸亦如前狀但啼聲出醫亦多作驚風治之其脈浮滑試以指按心下則痛而啼宜半夏黃連括樓湯斟酌服當下黃涎便差方在結胸門中

小兒傷寒蒸起風熱發癩手足搐掣不省蛇皮湯

麻黃 大黃 牡蠣 黃芩  
各肆 錢

寒水石

白石脂 赤石脂 石膏

紫石英 滑石  
各肆 錢

人參

桂枝

龍齒  
各貳錢

甘草  
參錢

蛇退皮  
壹錢

龜末每肆錢水一盞半煎七分溫分二服熱多者進三服以水并竹瀝中半煎尤佳  
小兒傷寒後胃中有熱煩悶不食至日晚潮熱頰赤躁亂嘔吐蘆根湯

生蘆根

生茅根

赤茯苓

子芩

麥門冬

甘草

生薑各壹分

小麥

糯米粒各貳百

細剉水一升二合煎六合去滓分三服立効

小兒傷寒欬嗽胸鬲痰壅喉中呀呷聲射干湯

射干

麻黃

紫苑

桂心

半夏  
各半兩

甘草  
壹分

甜葶苈

杏人炒

麻黃各等分

龜末每二錢水一盞煎五分溫溫分減服

小兒傷寒後盜汗體熱咽乾犀角黃耆湯

犀角屑

茯神

麥門冬

黃耆

人參  
各半兩

甘草  
壹分

龜末每三錢水一盞煎五分溫溫服。

小兒傷寒裏不解發驚妄語狂躁潮熱釣藤大黃湯。

釣藤皮 當歸 甘草 炙芍藥 各半

大黃 參分

龜末每三錢水一盞煎陸分溫溫服以利爲度難利者間茵蘆丸服

方在傷寒門中

此方不唯治傷寒常

時小兒傷食作驚發癇不乳溫壯吸喉皆可斟酌與服以利爲度

# 傷寒總病論卷六

傷寒雜方

傷寒暑病  
通用  
刺法

熱病死生候

天行差後禁忌

解華佗內外實說

與有位辨傷寒論書

總論音訓

傷寒雜方

冬夏傷寒發汗極効時雨散。  
之  
大  
驗  
行

蒼朮  
肆兩

甘草

麻黃  
各兩

豬牙皂角  
肆挺

姪娠雜方

傷寒死生候  
溫病死生候

解仲景脈說

辨論

脩治藥法

拯貧民

傷寒頭痛玄精石方。

石膏 各壹兩

麻黃 歐兩

甘草 半兩

龜末 每服四錢水一盞竹葉二七片煎七分去滓溫飲不計時候。

傷寒頭痛不止瓜蒂牙硝散。

藜蘆 壓錢 瓜蒂 參錢

牙硝 貳錢

腦麝 各少許

細末吹少許入鼻得嚏則愈。

時氣八九日喘悶煩躁麻黃杏子湯。

桔梗 麥門冬 各壹兩

麻黃 半兩

杏人

黃芩

甘草 各半分

龜末 每五錢水一盞半煎八分溫溫日可四五服。

時氣脳熱頭疼不止朴消散。

川朴消研生油調塗頂上。

時氣豌豆瘡出不快心神煩悶犀角五香湯。

犀角屑 丁香 乳香 木香 各半兩

玄參

升麻 各壹兩

麝香 壓分

龜末 每五錢水一盞竹瀝半盞煎八分溫溫日三四服。

姪娠雜方

姪娠時氣令子不落伏龍肝散。

伏龍肝爲末水調塗臍下乾時易之疾差乃止。

姪娠傷寒內熱極甚令不傷胎含鷄子法。

取鷄子以絹袋貯投井底浸令極冷旋破吞六七枚佳。

姪娠傷寒腹脹大便不通喘急牽牛散。

大黃  
鬱金  
青橘皮各一  
細末不計時薑湯調下二錢以利爲度。

甘草  
參分

牽牛子  
取末  
兩

姪娠傷寒服汗下諸藥熱已退覺氣虛不和宜與此藥安胎黃耆人參湯。  
黃耆  
人參  
半夏  
陳橘皮  
麥門冬  
當歸

各半  
兩

麩末每服四錢水二盞薑三片煎七分去滓下阿膠末一小匕烊化溫與之日可三四服。  
大熱甚胎不安者不宜前藥宜用阿膠散。

阿膠末一錢半竹瀝調下無竹瀝用小麥竹葉煎湯調下。

姪娠傷寒四五日已上心腹脹渴不止腰痛重橘皮枳實湯。

枳實

麥門冬

各三  
分

陳橘皮

壹兩

龜末每服五錢水一盞半生薑四片煎八分去滓溫服。

妊娠熱病胎死腹中鹿角屑湯。

鹿角屑  
一兩

水一椀葱白五莖豉半合煎陸分去滓溫作二服。

又方益母草飲子。

益母草絞汁飲半升卽出。

治傷寒小產惡露不行腹脹煩悶欲死大黃桃人湯。

朴消

大黃

二味等分末之每一錢或二錢桃人去雙人皮尖碎之濃煎湯調下以通爲度日三服。

小產後其惡露被熱蒸斷不行地黃飲子。

地黃汁

藕汁

各一盞

生薑汁

一盞

令和緩溫分三四服微有寒煎二十沸服之亦下死胎。

傷寒產後血運欲絕紅花散。

紅花

荷葉

薑黃  
鹽分

末之炒生薑小便調下二錢。

凡傷寒小產夏月宜少用醋炭多有煩悶運死者。

傷寒產後惡血衝心悶亂口乾生薑小便飲子。

生地黃汁 藕汁 小便 盞各一

和勻煎三兩沸溫熱分作三服。

傷寒產後惡露爲熱搏不下煩悶脹喘狂言者抵黨湯及桃人承氣湯主之。二方在可下門中

傷寒小產後煩悶大躁渴石膏括樓湯。

黃連

黃芩

甘草

括樓根  
各壹兩

石膏  
壹兩半

龜末每服四錢水一盞半煎八分溫服一盞。

傷寒暑病通用刺法

龐曰：凡過經不解讞語者當刺期門隨其實而瀉之。刺期門之法須待脈弦或浮緊刺之必愈。餘刺之不差以正取肝之邪故也。期門穴直乳下當腹傍近脇骨是穴針入一寸。

傷寒發熱嗆嗆惡寒其人大渴飲水者其腹必滿小便不利而自汗出其病欲解此爲肝乘肺名曰縱當

刺期門。

腹滿誠語寸口脈浮而緊此爲肝乘脾名曰橫當刺期門。

下血而譏語此爲熱入血室但額上汗出者當刺期門隨其實而瀉之。瀉然汗出者愈婦人中風發熱惡寒其經水適來得七八日熱除脈遲身涼胸脇下滿如結胸狀而譏語此爲熱入血室當刺期門隨其實者而取之。

太陽與少陽併病頭痛或眩時如結胸心下必堅當刺瀉肺臟大杼慎不可發汗發汗則譏語譏語則脈弦五日譏語不止當刺期門。

傷寒喉痺刺手少陰腕骨小指後動脈是也刺入三分補之。

佳通里二穴去腕後一寸是手少陰之經主熱病喉痺減入三分可灸三壯

傷寒妊娠腹滿不得小便腰以下腫如水氣狀懷孕七月太陰當養此心氣實當刺瀉勞宮及關元小便利即愈。

勞宮手掌中央屈名指取之關元在脐下三寸

傷寒飲水過多腹脹氣喘刺中脘

鳩尾下三寸

傷寒汗不出脊強喉閉煩滿針大杼

大杼穴在第一椎下兩傍

一寸五分針入一寸瀉之各

傷寒餘熱不盡皮膚乾燥針曲池

在曲肘橫紋頭

針可透下瀉之

熱病汗出脈反順可汗者取之魚際太淵太都太白瀉之則熱去補之則汗出太甚者取踝上橫紋以上

之。魚際在大指本節後。內側散脈中。太淵在掌後陷中。太都足太指本節後陷中。太白足內踝上二寸。名曰復溜。主骨寒熱汗。法不休故也。

熱病七八日脈口動喘而眩者急刺之汗且自出淺刺手大指間是也合谷穴

· 猛

**熱病先手臂痛刺手陽明太陰汗出止** 太陰絡列缺穴在腕上二寸半·刺七分·陽明商陽穴在手大指次指端·去甲如薤葉·刺三分·湯穴在手小指次指端·去甲如薤葉·刺三分·

**熱病始於頭首者，刺項太陽而汗出止。**

**陽** 在少陰陰泉穴。在兩腳心陷處。屈足口指宛宛中。刺入七分。瀉之可愈五分。

**熱病治至經痛者**。先取足陽明而汗出。陷谷穴在足大指次指之間。本

熱病如足脛痛者分取足陽明而浮出節後陷中鉗入五分薄之

熱病三日汗不出，憊憊胸脇痛不可轉側，大小便血及嘔不止，氣逆嘔嘔煩渴，食飲不下，針勞宮心穴，一針立解。

漢書  
五

傷寒死生候

傷寒下利厥逆煩躁不得臥者死

傷寒厥逆六七日發熱而利者生汗出利不止者死但有陰無陽故也

傷寒欬逆上氣。其脈散者死。謂形損故也。

夫病者實則讞語虛則鄭聲。重語是也。直視讞語喘滿者死。下利者亦死。

傷寒脈陰陽俱緊。口中氣出唇口乾燥。勃臥足冷。鼻中涕出舌上胎滑。勿妄治也。

傷寒脈浮而洪。身汗如油。喘而不休。水漿不下。形體不仁。乍靜乍亂。此爲命絕也。又未知何藏先受其災。若汗出髮潤。喘而不休。此爲肺先絕也。陽反獨留。形體如煙熏。直視搖頭。此爲心先絕也。唇吻反青。四肢熱習者。此爲肝先絕也。環口黧黑。柔汗發黃。此爲脾先絕也。洩便遺失。狂言目反直視者。此爲腎先絕也。

傷寒脈順。四時夜半得病。日中解。日中得病。夜半解。更不傳也。

熱病死生候

熱病陰陽交者。熱煩身燥。太陰寸口脈兩衝尙躁盛。是陰陽交死。得汗脈靜者生。

熱病得汗。身冷脈欲絕。其人已安靜。但昏沉喜睡。急與四逆輩。令手足溫。不爾。熟寐而卒。熱病陽進陰退。頭獨汗出。死陰進陽退。腰以下至足有汗出。亦死。陰陽俱進。汗出已熱如故。亦死。陰陽俱退。汗出已寒慄不止。口鼻氣冷亦死。

熱病所謂併陰者。熱病已得汗。因得泄。是謂併陰。故治。熱病所謂併陽者。熱病已得汗。脈尙躁盛。大熱汗

出雖不汗身和而動是謂併陽故治

熱病不知痛所在不能自收口乾渴熱甚陰頭有寒者熱在骨髓死不治

病若譏語妄言身當有熱而反四逆脈沉細者死

熱病在腎令人渴口乾舌焦黃赤晝夜引飲不止腹大而脹尚不厭飲目無精光死不治

熱病所謂陽附陰者腰以下至足熱腰以上寒陰氣下爭而還心腹滿者死

熱病所謂陰附陽者腰以上至頭熱腰以下寒陽氣上爭而還得汗者生

熱病得汗脈減躁身和面赤此爲榮未交待時自已肝病待甲乙之例

素問云 榮未交日且得汗 待時而已今

熱病七八日脈微小病者洩血口中乾一日半而死代脈者一日死

熱病七八日脈不躁不數而喘後三日有汗三日不汗四日死未曾汗勿庸刺

熱病身面發黃面腫心熱口乾舌卷焦黃黑身麻而臭伏毒傷肺中脾者死

熱病瘞瘞狂言不得汗瘞瘞不止伏毒傷肝中膽者死

熱病汗不出出不至足嘔膽吐血善驚不得臥伏毒在膽足少陽者死

溫病死生候

有病溫汗出輒復熱而脈躁疾不爲汗汗衰狂言不能食病名曰陰陽交見三死而未見一生辰戌丑未亥

年有此證。溫病得病便短息微悶。神識惺惺。脈尺寸反者死。子午卯酉年有此證。

凡溫病人三二日身熱脈疾。頭痛食飲如故。脈直疾八日死。四五日頭痛脈疾。喜吐。脈來細。十二日死。此病不療。八九日脈不疾。身不痛。目不赤。色不變。而反利。脈來牒牒。按不彈。手指時時大。心下硬。十七日死者生。心下不硬。

### 天行差後禁忌

飲酒合陰陽復病必死。生鱠煮麴酒。韭蕈蠅蕈豆粉。犬羊肉。腸血生菓油肥之類。食之皆發熱黃。下利不救。諸勞動皆致復。尚可治。女勞多死。

### 解仲景脈說

龐曰。動脈見於關上下無頭尾。厥厥動搖。名曰動也。陽動則汗出。陰動則發熱。關位占六分。前三分爲陽。後三分爲陰。若當陽連寸動而陰靜。法當有汗而解。素問云。陽加於陰謂之汗。當陰連尺動而陽靜。則發熱。素問云。尺龕爲熱中。若大汗後。形冷惡寒者。三焦傷也。此是死證。脈按之虛軟。戰汗而解。脈按之有力。躁汗而解。脈虛微。必經汗吐下。無津液作汗。陰陽自和。

趺陽在足大指次指間。上行五寸。是足陽明胃脈也。名曰衝。陽穴也。

少陰脈在足內踝後跟骨上動脈陷中。是足少陰腎脈也。名太谿。

仲景云。接寸不及尺。握手不及足。謂醫者只憑尺寸。不診衝陽太谿也。

龐曰寸口脈浮大浮爲虛醫反下之爲責虛取一實大爲無血反飲冷水令汗大出爲守空迫血致趺陽脈亦浮虛虛寒相搏則嘯也若趺陽脈不浮而但滑者則胃寒而嘯矣

龐曰伏氣之病謂非時有暴寒而中人伏毒氣於少陰經始雖不病旬月乃發便脈微弱法先喉痛似傷次則下利喉痛半夏桂枝甘草湯主之下利有諸證用通脈四逆湯主之方在少陰證中此病三二日便差古方謂腎傷寒是也

半夏 桂枝 甘草 生薑 各壹兩

㕮咀以水三升煮一升每一盞細呷之

龐曰君子春夏養陽秋冬養陰順天地之剛柔也謂時當溫必將理以涼時當暑必將理以冷涼冷合宜不可太過故能扶陰氣以養陽氣也時當涼必將理以溫時當寒必將理以熱溫熱合宜不可太過故能扶陽氣以養陰氣也陰陽相養則人氣和平有人好攝生者盛暑亦複衣避風飲食必熱而成發黃脫血者多矣盛寒之時云井暖當服以涼藥而成吐利腹痛者多矣此皆憑庸人妄傳以爲實理往往橫天而尚不覺知深可傷也此是平人將理之法其有夙熱痼冷者須當順其性爾

### 解華佗內外實說

魏志華佗傳有府吏兒尋李延共止俱頭痛身熱所苦正同佗曰尋當下之延當發汗或難其異佗曰尋

外實延內實故治之宜殊卽各與藥明早並起某深疑陳壽誤用內外字非華佗本意也病者頸痛身熱惡寒爲陰邪外實法當發汗病者頭疼身熱但蒸蒸發熱不惡寒爲陽邪內實也法當下之所謂外實者外爲陽爲表也陽氣爲寒所折爭於表間陽衰而陰勝故發熱復有惡寒之證可以汗而發之以復陽氣也所謂內實者內爲陰爲裏也極陰變陽寒甚生熱陽氣反勝而入裏故胃府內實蒸蒸作熱不惡寒可以泄利以復陰氣言實者非正實乃邪實也素問云邪氣盛則實所以知佗傳內外二字差謬矣

辨論

近世常行煮散古方湯液存而不用蓋古方升兩大多或水少湯濁藥味至厚殊不知聖人專攻一病決一兩劑以取驗其水少者自是傳寫有舛非古人本意也唐自安史之亂藩鎮跋扈至於五代天下兵戈道路艱難四方草石鮮有交通故醫家省約以湯爲煮散至有未能中病疑混而數更方法者多矣沿習至今未曾革弊古方湯液實於今世爲無用之書唐徐氏大和濟要方減其升兩雖則從俗患其太省故病未半而湯劑已竭鄙心患之自顧抄撮斟酌積三十餘年稍習其事故敢裁減升兩庶從俗而便於行用或一方而取半劑或三分取一或四分取一或增其水有可以作煮散者有病勢重專用湯攻者或云古升秤省三升准今之一升三兩准今之一兩斯又不然且晉葛氏云附子一枚准半兩又云以煮當升以分當兩是古之升秤與今相同許人減用爾今之爲醫者多是愚俗苟且衣食貪冒貨賄

大方廣論何以該通，唯密窺鄙淺方技，使人不窺其隙，以自矜大乘便爲神工致遠，恐泥其天枉，固已多矣。鮮有多聞博識者，雖時有之士大夫，咸鄙其爲術，自非不顧流俗，以拯濟爲心，則不能留神焉。今解釋前言，詳正脫誤，擇其篤論，刪其繁方，仍增入新意，不敢穿鑿冀新學易見。覽斯文已得其七八矣。此方皆古聖賢撰用，其効如神，更不一一具姓名載其所出，其間自有所見，經手得驗者，具緝成卷，在識者覽而知焉。


上蘇子瞻端明辨傷寒論書

安時所撰傷寒解實用心三十餘年，廣尋諸家，反覆參合，決其可行者，始敢編次。從來評脈辨證處，對湯液頗著實効，不敢輕易謬妄，誤人性命。四種溫病敗壞之候，自王叔和後，鮮有炯然詳辨者。故醫家一例作傷寒行汗下。傷寒有金木水火四種，有可汗可下之理。感異氣復變四種溫病，溫病若作傷寒行汗下，必死。傷寒汗下尚或錯謬，又況昧於溫病乎？天下枉死者過半，信不虛矣。國家考正醫書，無不詳備，惟此異氣敗壞之證，未暇廣其治法。安時所以區區略述，欲使家家戶戶閱方易爲行用，自可隨證調治脈息，自然詳明，不假謁庸粗甘就橫天者也。設有問孫真人云：「今時日月短促，藥力輕虛，人多巧詐，感病厚重，用藥即多。又云加意重複，用藥乃有力。」自孫真人至今，相去逾遠，藥反太輕省，何也？安時妄意唐遭安史之亂，藩鎮跋扈，迨至五代，四方薦石鮮有交通，故醫家少用湯液，多行表散，又近世之人嗜欲益深，天行

災多用藥極費。日月愈促。地脈愈薄。產藥至少。何以知之。安時常於民家見其遠祖所錄方冊上記昔事跡。其間有廣順年巴豆每兩千二足。故以知藥石不交通也。且溫疫之病。周官不載。班瘡豌豆始自魏晉。腳氣肇於晉末。故以知年代近季。天災愈多。用藥極費也。舉石曾青之類。古人治衆病痼疾大要之藥。今王公大人家尙或闕用。民間可知矣。人參當皇祐年每兩千四五白朮自來每兩十數文。今增至四五百所出州土。不絕如帶。民家苗種以獲厚利。足以知地脈愈薄。產藥至少矣。湯液之制。遭值天下禍亂之久。地脈薄產之時。天災衆多之世。安得不憐惜而爲煮散乎。故今世上工治病。比之古人及中工者幸矣。設有問今之升秤。與古不同。其要以古之三升準今之一升。古之三兩準今之一兩。雖然如此。民間未嘗依此法而用古方者。不能自解裁減。又如附子一枚準半兩。是用一錢三字爲一枚。使人疑混。如何得從俗乎。安時言唐大和年徐氏撰濟要方。其引云。秤兩與前代不同。升合與當時稍異。近者重新纂集。約舊刪脩。不惟加減得中。實亦分兩不廣。又云。今所刪定六十三篇。六百六首。勒成六卷。於所在郡邑。標建碑牌。明錄諸方。以備衆要。又云。時逢聖曆年屬大和。便以大和濟要方爲名。備錄如左。已具奏過准勑頒行。此方已遭兵火煙滅。安時家收得唐人以朱墨書者。紙籍腐爛。首尾不完。難辨。徐氏官與名。即不知本朝崇文諸庫。有此本否。安時謂裁減古方。宜依徐氏。以合今之升秤。庶通俗用。但增其藥之枚粒耳。是以仲景諸古方次第復許減半。苟藥湯中載之詳矣。陶隱居云。古今人體大小或異。藏府血氣亦有差焉。請以意

酌量藥品分兩引古以明取所服多少配之或一分爲兩或二銖爲兩以盞當升可也若一一分星較合如古方承氣湯水少藥多何以裁之所以聖惠方煮散盡是古湯液豈一一計較多少治病皆有據驗在調習多者乃敢自斟酌耳設有問暑熱重於溫病者宜行重複方卻多行煮散者何安時謂夏月多自汗腠理易開經云天暑地熱經水沸溢故用煮散或有病勢重者卽於湯證之下注云不可作煮散也如此之類者頗多聊引梗概俗云耕當問奴織當訪婢士大夫雖好此道未必深造宮妬朝嫉者衆吹毛求瑕寧不燦金更望省察狂瞽之言干浼台聽悚息無地

某再拜



# 傷寒論音訓

敍論

漬浸也 • 埃陽切 • 搏手擊也 • 譙瘡癩切 • 脆青歲切 • 說文曰脫切 • 吐活間 • 音潤 • 摰徒安切 • 潤平洛切 • 譴之廉切 • 潤水竭也 • 譴而寡語也 • 疾

泄思列切 • 漏漏也 • 滅壯立切 • 和汗出也 • 填徒堅切 • 賈逵曰

太陽證 腰脊強下居亮切

陽明證 热丑入切 • 汗出貝 • 息扶物切 • 意憤公對切

恍惕上 • 聰律切 • 悚懼悽愴也 • 懈怠憂也 • 疾悔也 • 上於報切

少陰證 沢亡活切 • 水踝胡瓦切 • 跟足踝也 • 跟切 • 怂其季切

厥陰證 蟎中長蟲也 • 腹胡恢切

可發汗證 淋桑激切 • 洗洗也 • 禿翁許及切

不可發汗證 扌苦侯切 • 央空者 • 名曰芤 • 中闊動也 • 如倫切

可下證 瞳徒東切 • 瞳瞳布胡切 • 妄撮亡活切 • 三慄力質切 • 黨底崩 • 痘於豫切 • 駛山吏切

不可下證 劀居員切

結胸證

痓 惡也。充至切。

痓濕喝證

齶 音械。齒連氣也。齶切也。

濕證

喚於月切。掣尺折切。

雜病證

甘爛水 即肝切。熟也。不擊則生。擊之則熟。水之味本鹹。擊熟之則歸土性矣。然土之澁也。練切。淺水

土。甘與甘同。

傷寒勞復證

頰呼內切。得非牡鼠乎。謂之緩篋器也。先營切。

暑病表證

喝熱也。溫也。

五種暑病

脢凌 脢上戶當切。說文云。脢帶也。下光丸切。疼痛。員澹下達濁切。

辟溫疫論

薑 玎介切。掠 力酌。蟲切。

青筋牽證

牽 輕煙切。引前也。青 東方之色。筋主肝。肝屬木。謂之牽。有筋牽相連之意。

赤脈攢證

攢 芳未切。故好爭者。相擊也。赤。南方之色。脈主心。心屬火。火隨肉證

隨 句爲切。黃者中央之色。內屬脾。脾屬土。土無正形。從在四季。正王在長夏。謂之隨者。有若從木火金水之意。火生土。故黃肉隨所次列之於赤脈攢之後。

一切。顙顙

式朱 耳前動。輸切。

白氣猩證

猩 陵之初。白。西方之色。氣主肺。肺屬金。瘦口補物而有殺心。亦若金類。

**黑骨溫證**

**溫** 烏昆切。黑。北方之色。骨主腎。腎屬水。謂之溫者。亦自水而已。故溫居末。以惣其名焉。謂之

溫噦方證

婉  
切之  
月

黃病方證

**瘴** 丁寒切。火瘴也。**臚** 切。力居。

敗壞別行

**瞪** 直耕切。怒。式閏切。目動也。莊子曰。終日視而目不曠。臘曲略也。

小兒傷寒

**呀呷** 上 · 虛牙切 · 唸呀張目良 ·  
· 呼甲切 · 說文云 · 爭呷也 ·


傷寒暑病

誠 胡謐切

熱病死生

**瘻癰**  
下上  
• 子用切

**瘻癰** 下子用切



# 脩治藥法

方中有不載者  
今不載者

芍藥 赤白利  
補白

乾薑 炮

芒消 生

黃連 洗去  
鐵土

梔子 去殼

生薑 薄切

大棗 去核

細辛 洗去  
苗

鷄子黃 蒸熟方

吳茱萸 湯洗

桔梗 煙炒

茯苓 赤利  
補白

甘草 炒炙  
或炮

大黃 炒炙  
或生

黃芩 須家葛  
或不枯者

乾葛 乾者  
陳者去

橘皮 白去  
鹽

桂枝 刮去  
鹽

麻黃 去根  
節

附子 去皮尖  
生用

阿膠 同上

人參 去蘆

猪苓 去黑  
皮

澤瀉 去苗

滑石 研

•

枳實 納去穢

•

烏梅 去核

•

川椒 去目并肉

•

赤小豆 濡牙惟狐惑生暴乾證如此

•

石膏 研

•

粳米 淘

•

瓜丁 即瓜蒂也末之

•

梁上塵 藥熟方篩過

•

飴糖 下湯洗七

•

半夏 過湯洗七

•

防風 去蘆

•

竹茹 刮淡竹

•

五味子 去梗

•

豬膚 切去膜

•

柴胡 去蘆

•

當歸 洗去蘆

•

黃藥 或蜜炙或酥

•

天門冬 去心皮

•

杏仁 去皮尖爲湯劑不炒黃

•

龍膽 去蘆

•

小麥奴 即小麥秀出黑者如無炒小麥焦黑

•

淡竹葉 劍

•

牡蠣粉 炒

•

蕪花 炒如無以桃花不炒代之

•

李根 甜李根入土者刮去白皮

•

厚朴 炒

•

茵陳蒿 去梗

芫花 醋拌·新瓦上煥

甘遂 湿者裹·煨用  
赤皮連珠者·煨用

大戟 炒

蕷本 去苗  
洗·去苗

木通 刮去龜

鼈甲 去裙肉  
炙角黃色·醋

破瘀湯中以絳袋煮之

水蛭 水浸·去血  
米炒

癰蟲 糯米炒去翅足

桃人 去皮尖·默炒  
惟入湯生用·研

蜀漆 洗去腥

龍骨 研

朴消 生

夢麻子 隔紙炒研  
甜者用

括樓焙·無黃

貝母 研

雄黃 研

硝石 研

太陰玄精石 者味鹹  
者碎細·加入

地黃汁 取自然汗·若用  
濕地黃則切

代赭 湯用則綿裹

漢防已 紋如車輪  
氣運者·去穀

芎藭 即川芎·  
去蘆

薏苡仁 去穀

檳榔 半生半

旋復花

去梗•

禹餘糧

搗碎•

荆芥穗

去梗•

薤白

切•

麝香

研•

肉豆蔻

煨•

茴香

炒•

枇杷葉

炙•刷

秦丸

去蘆•

甘菊

須家園單葉者•或  
鄧州白菊亦佳•或

生艾汁

如無•以水浸  
研然艾亦得

大麻人

炒鳴取出•冷地上攤以新場•磨破  
皮•以密篩篩過•擇去殼•搗碎

犀角屑

如無•以升麻代之•  
以升麻代之•

青黛

研•

藜蘆

去蘆•

赤石脂

塊剉•

連鬚慈白

寸切•

茅根

剉•洗

熟艾

竹節剉過•以

丹砂

研•

石蓮肉

炒•

丁香

不焙•

大青葉

去根莖•

吳藍

用葉•

竹瀝

淡竹二尺長•截兩頭•以導閑起•中間  
火燒•兩頭即竹瀝滴處•以椀盛之

牡丹皮

去心•

秦皮

中碧色者•真•傾硯

苦參

取皮•

薔薇莖葉 切

生射干 去穢

鵬砂 研

草烏頭尖 去黑皮用之。若用烏頭，則皮并尖亦

白礬 桃核。與礬石同。惟荆芥散生用之。

霜梅上白鹽 無以白鹽代之。

薤根 切

蘆根 切去鬚。

生乾地黃 生乾

貝齒 燒

獨活 去蘆 親隱威

手足指甲 燒

吳朮 去皮 細切

五倍子 去內中蟲  
炒切

豬脂 切

殭蚕 炒而不濕黑者須白直者

琥珀 研

牙消 生

焰消 生

狼鼠矢 頭尖硬者

葛取粉 搗篩取之

躑躅 酷炒

石菖蒲 去毛

苦酒 米醋是也

沙參 去蘆

沉香 不焙

漏蘆葉 子代之無以山梔

乳香 研

燈心 切

紅花子 稚碎

菝葜 去穢

柏實 研

陵鯉甲 蟆皮

毅鬼丸內生用

樗鶴 去翅足  
燒青膏 改

螢火 焰

無可即以柴青代之

東門上 鷄頭 燈

鐵錘柄 焼者

生葛根 切

羚羊角 砧

前胡 去蘿

白茅根 洗

真腦子 研

桑白皮 切

豬膽 用汁

零陵香 去梗

虎頭骨 銳

毅羊角 銳

空青 或無石青代以

鬼箭 取羽

蒺藜 炒去刺以新塘

車前草 切

口參 去蘿

寒水石 洗

紫苑 去蘿

白薇 去苗

亂髮	星角水洗之	以
白蘚皮	去心	
牛膝	去蘆 夏間一宿	酒浸三宿
紫石英	光明者 研須極	
龍齒	大者 研須極	
小麥	淘	
茯神	去皮 木	
蒼朮	去麌 皮	
猪牙皂角	刮去黑皮 酥或蜜炙或	
枳殼	去穢炒	
藕汁	切	研
荷葉	焙	
不艸皂角	去兩頭及 皮子	
巴豆	去皮心臘 皆可惟菌陳丸生用 惟可惟用湯劑 趙良黃膏去皮 惟碎惟用油	
生薑汁	用自然汁 惟不用滓	
牽牛子	半生半炒 未半兩入一下取	
鹿角屑	杵	
天南星	炮 散生用	惟荆芥

百合去心。如入湯用。則水浸一宿。拍碎。

麻黃湯末 桂枝 □□□□□

蒸方皆在可發汗證。皆秤一半。和勻煎服。

不可作煮散方

陽毒升麻湯

陰毒甘草湯

熱病乾薑附子湯

青筋牽柴胡地黃湯

赤脈攢石膏地黃湯

黃肉隨玄參寒水石湯

白氣經石膏杏人湯

黑膏溫苦參石膏湯

溫喊茅根葛根湯

梓皮飲子


茅根橘皮湯

枇杷茅根湯

溫病壞後三黃石膏湯敗壞別行附子鱉甲湯


已上除不可作煮散方外。凡湯劑言咬咀者。如咬咀萎蕤之滓狀。今之龜末是也。凡龜末每服四錢。水一盞半。煮八分。濾去滓。得七分爲準。內有半夏附子爲毒藥之類。每四錢水二盞。入生薑三片。煎七分。內有或用朴硝。或用阿膠。或用飴糖。或用焰硝。或用雞子清。皆煎成湯後。去滓下之。內或用竹瀝煎者。每四錢水一盞。二分煎至七分。下竹瀝三分。煎至七分。內或用大黃者。虛人入大黃同煎之。如難得通利人。每服

四錢水一盞半煎至一盞別入大黃半錢同煎至七分又難得利者以湯浸濃大黃汁三二分同煎之以取利爲度政和歲次癸巳門人布衣魏炳編



## 龐先生傷寒論序

龐安常自少時喜醫方。爲人治病。處其死生多驗。名傾淮南諸靈。然爲氣任俠。鬪雞走狗。蹴鞠擊毬。少年豪縱。事無所不爲。博奕音技。一工所難而兼能之。家富多後房。不出戶而所欲得人之以醫聘之也。皆多陳其所好。以順適其意。其來也。病家如市。其疾已也。君脫然不受謝而去。中年乃屏絕戲弄。閉門讀書。自神農黃帝經方。扁鵲八十一難經。皇甫謐甲乙。無不貫穿。其簡策紛錯。黃素朽蠹。先師或失其意。學術淺薄。私智穿鑿。曲士或竄其文。安常悉能辯論發揮。每用以治病。幾乎十全矣。然人疾詣門。不問貧富。爲便房曲齋。調護寒暑所宜。珍膳美蔬。時節其飢飽之度。愛老而慈幼。不以人之疾嘗試其方。如疾痛在己也。蓋其輕財如糞土。耐事如慈母。而有常似秦漢間任俠。而不害人似戰國四公子。而不爭利。所以能動而得意。起人之疾。不可爲數。他日過之。未嘗有德色也。其所惄惄傷寒論。皆其日用書也。欲掇其大要。論其精妙。使士大夫稍知之。然未嘗游其庭者。雖得吾說。而不解。若有意於斯者。讀其書。自足以攬其精微。故不著。著其行事。以爲後序云。前序海上人諾爲之。故虛其右以待。元符三年三月豫章黃庭堅序。




## 重雕宋刻傷寒總病論札記

此書摘取張長沙之大要，辯論精妙。其有證而無方者，上溯內經，旁及他書，參呂己見，爲增損進退之法，實能發仲景未盡之意，而補其未備之方，是爲龐氏之撰著，非僅述而不作也。故所引原文，每有刪削，觀諸家抄本，多有異同。或未見宋刻，傳寫互異，或依據張書，增補失真，故今將宋刻龐論翻雕，未敢輒改原文，即有抄本，義長者亦第摘取備考，別疏爲札記附於後，丕烈又識。

序文啓


薛本題本此上俱有軒字，居右。

薛本題本此上亦有軒字，略小。



## 後序

三行自少時。顧本無時字六行皇甫謐。謐當作正。用以治病。七八行不問貧富爲便房曲齋調護寒暑。薛本作不問貧賤富貴。均爲調護寒暑。八行時節其飢飽之度。薛本無之度二字九行耐事。薛本作耐子。十行他日過之。薛本過作見。十一十二行故不著著其行事。顧本不重著字。目錄第一面「結胸證」以前宋刻原缺。各本亦無。按目錄計缺一葉有半。而此葉板心刻四葉。不知目錄前尚有文字否。今因無從補刊。故仍其缺。不敢妄作也。



卷第一

一面十行冰也。案也字衍。薛本俱無。

十一行其有。

頤本有作人。

非又勞房。

作力。

薛本房。

本作有卑。

三面二行故須。

薛本作又須。

四行而變暑病。

頤本病下有二字。

七行有平居者。

濕居者。

薛本作有卑。

四面三行揮散。

薛本揮本揮。

四行工。

薛本此上。

四面六行欲溫。

原本欲字破損。

今照頤本補。

薛本張本皆作飲。

非。

五面六行足。

薛本作更。

按更字是。

十一行虛寒。

頤本作虛。

汗非。

薛本一上有當字。

六面二行一二日發以上連風府。

薛本一下有其脈二字。

七面後三行大湯劑。

原本大作人。

八面十三行自微汗。

薛本微作汗。

身非。

九面五行大便已鞞。

薛本鞞作鞞。

按原本鞞作鞞者甚多。

不能悉正。

皆當從鞞爲是。

後倣此。

十一面三行傷寒三四日陽爲盡。

薛本作傷寒三日三陽爲盡。

案當依薛本是。

十二面五行注故芍藥。

薛本作但。

以芍藥。

作反。

十四面當三三日發。

原本作二二日誤。

今依薛本改。

張本作三四日是。

三行而聾。

薛本作耳聾。

頤本作耳聾。

四

行相載。

薛本相搏。

十一面三行傷寒三四日陽爲盡。

薛本作傷寒三日三陽爲盡。

案當依薛本是。

十二面五行注故芍藥。

薛本作但。

以芍藥。

作反。

十四面當三三日發。

原本作二二日誤。

今依薛本改。

張本作三四日是。

三行而聾。

薛本作耳聾。

頤本作耳聾。

四

十一面三行傷寒三四日陽爲盡。

薛本作傷寒三日三陽爲盡。

案當依薛本是。

十二面五行注故芍藥。

薛本作但。

以芍藥。

作反。

十四面當三三日發。

原本作二二日誤。

今依薛本改。

張本作三四日是。

三行而聾。

薛本作耳聾。

頤本作耳聾。

四

十四面十三行已合治之。

薛本作已卽合消之合治之。顧本已作匕。案當作各別搗篩。已合治之。薛顧本皆誤。

十五面十一行熬香。

薛本香作乾。非。

十六面六行氣上衝心中痛熱。

顧本重一。薛本得俱作能。案能字是。

十七面一行當不得食。

薛本顧本得俱作能。案能字是。

十八面六行次治其厥。

顧本次作須。十行永宜此方。俱作亦。薛本張本永。

十九面二行醫逆。

顧本作。

二十面十四行與太陰。

顧本無與字。案原本與字。疑衍。

卷第二

二十二面六行指梢。

薛本稍作稍。

七行增寒。

顧本作增。

十二行翕弱熱。

薛本熱上是。

二十二面二行憎寒。

原本作增悞。今依薛本改。以下憎寒及後二行皆倣此。

二十四面二行注當發證。

顧本發下。

又注青龍湯似桂枝證。薛本湯下有者字。似汗字。作加如。

二十五面一行勢如。

薛本當作加是。

二十六面五行黑棗。

薛本麥。

九行及皮。

顧本作。

二十六面五行以失。

薛本以作似。

二十七面八行注此若軟緊而遲。

原本若字破損。

照薛本補。張本同。顧本作此浮緊而遲。并無若字。誤甚。

二十八面六行少氣逆。薛本氣字下重一氣字十二行氣微絕欲是。顧本微作

二十九面九行穀不得前。薛本前作消非

二十九面十四行參勝。薛本勝作升顧本同

二十九面十四行去仁參。薛本仁作人顧本同

有五味子。顧本同。案小青龍湯本方無五倍子。當作五味子爲是。

三十一面十四行互。原本作玄誤顧本作弦

薛本張

三十四面九行互。本均作互案互字是。今改。

三十五面十一行大柴胡胡湯。薛本不重胡字

顧本同案重者乃衍字也。

三十八面三行在壯熱但主利。薛本在作發主作下。

三十八面十二行表證在。薛本有仍字

上

三十九面十三行注開下關上。薛本顧本皆作關上關下

四十面三行咽躁。薛本同顧本躁作燥

案當作燥爲是。

三行方有。薛本同顧本有作在

案當

是。  
作在爲

四十四面十一行拘忌。顧本忌四十一面三行煩喘。顧本喘

四十二面十三行微喘。顧本喘

作熱。

四十三面九行開陰關。顧本作十行同

四十四面八行桂枝甘草湯主之。薛本桂枝甘草龍十一行並宜火刲治之。薛本宜下有依字四十五面一行自爲

**黃**薛本自上有身字·自作目·二行蓄血若去·原本若作君誤今照各本改·

卷第三

五十面一行注爲陽。薛本爲下有發於二字。張本同。

薛本爲下有發於二字・張本同・

五十一面八行發後無汗薛本發下有汗字。顧本同。十行引小腹入陰筋者

各本同。案此乃仲景傷寒論原文。但原文引上有痛字。此痛字但不可少。但

薛本同張本·雜作可·案當作可爲是·五十二面三行注雜發汗薛本同張本如字上俱有身痛二字·案此亦仲景原文本有此二字·六行如被杖薛本同張本如字上俱有身痛二字·案此亦仲景原文本有此二字·十四行勿以煙出

作辭  
使本  
以

五十三面三行通逐薛本俱作達

卷之三

五十四面三行爲狀有病字。一行其面乍黑乍白。二行本面字下皆多乍赤。三行本面字下皆多於二字。四行咽乾苦參湯洗之五字。

五行汁

本張本則俱作無

七行細志

九行美薛本顧本  
俱作美十一行浙然各本俱  
作浙

五十五面一行兩漬字。原本均作漬誤。今照各本改正。

6

五十六面一行如煎洗。薛本張本煎洗俱作前浸。按下有濟字。若用浸字則重意。當作如前洗爲是。十三行所至。薛本至作致。薛本至

五十七面。一行。反不惡寒。

案仲景原文  
無不是。

五十七面。按此葉非宋。四行注而故。薛本張本故。又而避害。原本避字模糊。今又而爲郡。若汗太多。原本模糊。本張本郡俱作汗。

大俱作太。顧本  
都作口。大亦作太。  
本誤作曰。今依薛本張本改作項字。顧本亦誤作曰。

又熱令。薛本張本俱作令熱。五

十八面。四行。斷齒。各本俱作齶齒。案斷

字誤。當作齶。

是。

四行注方在可下門中。

薛本同張本顧

本門俱作證。

五十八面。五行。濕證。張本證

作候。

六行注水證。

張本水上有可字

七行身汗出。薛本張本身下

五十九面。一行。濕家。

下之額上汗出微喘。小便不利者死。案此乃仲景原文也。但原文乃小便利者死。以額汗微喘爲孤陽無根。而症。何云死耶。薛本張本並同。又按尤在涇金匱心典曰。

一作小便不利者死。謂陽上游而陰不下濟也。

亦通。

五十九面。五行。含水畜。薛本畜

作搐。

七行可與杏仁薏苡湯。薛本作可與麻黃杏仁薏苡甘草湯。

六十面。五行溢水。薛本溢作溫。

作搐。

七行喝證。張本證

作候。

十三行。反熱甚。薛本作發。

六十一面。七行。宜苦酒艾。原本苦作若誤。今照薛本

九行。茯苓桂枝湯主之。薛本作茯苓桂枝甘草大棗湯主之。

六十二面。二

行酒二盞煎二盞四分。薛本同張本。作酒二盞煎一盞四分。

六十五面。三行。理中治中焦。薛本治上。

有者字。

六十八面。八行呻吟。薛本張本伸俱作呻

爲是。

六十面。五行溢水。薛本溢作溫。

作搐。

七行喝證。張本證

作候。

十二行弦而細芤而遲。薛本無兩

而字。

十二行口前開。薛本作

口開前。

六十九面。一行。故使之耳。薛本張本

之俱作然。

二行則極。薛本作痛劇。

六十九面。五行。含水畜。薛本畜作溫。

作搐。

七行喝證。張本證

作候。

十三行。反熱甚。薛本作發。

六十一面。七行。宜苦酒艾。原本苦作若誤。今照薛本

九行。茯苓桂枝湯主之。薛本作茯苓桂枝甘草大棗湯主之。

六十二面。二

行酒二盞煎二盞四分。薛本同張本。作酒二盞煎一盞四分。

六十五面。三行。理中治中焦。薛本治上。

有者字。

六十九面五行肉豆蔻

薛本穀作蔻  
顧本作穀誤

七十一面十二行血不止

原本作上今  
依薛本改正

七十三面一行蟹瘡

薛本作蟹  
當作蟹。按此誤

七十五面十三行草一分

薛本張本草上皆有甘  
字。接原本脫去。

七十七面三行且至晚

薛本且

七十九面十三行灰燒

薛本無  
燒字

十三行陰頭

薛本陰頭下  
俱有穴字

八十一面二行陰卯

薛本卯作  
卯是五行去皮尖。接當以去  
皮核爲是。

皮核爲是。  
蓋大棗  
亦無尖可去也。

卷第四

八十一面八行爲暑病其熱。此五字原本破去

此行內除暑字而字三陽  
九行如見。按如字原本破去。拙作  
傳三字。餘皆拙寫者。如字。薛本如作而。

八十二面十四行豉

半此二字原本破去。

八十三面四行見形

薛本形下  
有證字。薛本如下有候字。

八十三面十行腎熱病者

案內經下有頤

八十四面四行洗浙

薛本同張本  
顧本俱作先淅。接內經作浙文。

本作先淅。但當從先爲是。

四行頭痛

不任。各本皆同。按內經作頭痛不堪。  
六行脾凌

薛本脾作脚。非  
接內經作脶凌。

八十四面八行亡逆

俱作無。薛本顧本亡

十四行旅蒂

薛本顧本悉俱作風

八十五面六行法焉

薛本張本俱作云  
顧本作也。

八行走疰

薛本作疰。

十行五拾粒

薛本張本下皆

八十七面八行甘草

薛本無此味

八十八面七行謫居

薛本謂作調非同

十行肉豆腐

薛本同前

八十九面一行七銖

薛本作三錢

又注於上方曰二十四銖

今之七銖也

九十四面四行每

各本皆作毒

七行何由衰散大腑久祕

薛本大作六

顧本衰作表

按毒字是表按當作衰爲是

九十一面二行隱瘻

薛本瘻

九十二面四行杏仁

炒今依薛本謂本補

十三行一盞

薛本蓋下有小字

十四行永不發

薛本發下尚有一發字

十四行或下後

薛本

同顧本下字

九十三面三行憎寒

原本作憎誤今依各本改

十四行白濃

本薛本謂當作脹爲是

九十五面一行自汗

本薛本謂同顧本作自安

又黑厭

薛本厭

九十五面四行嗽或喉痛

薛本或作而

## 卷第五

一〇〇面五行手太陰水

薛本謂本水俱作金當從金爲是

七行相形

薛本形作刑

十一行注庵園

薛本園

一〇一面八行鼻竅中

薛本竅下有內兩陷三字中下有傍字

九行以紙筋探鼻中嚏之

薛本謂以紙筋

鼻中嚏出之

一〇二面二行柏實

薛本此下尚有射千枳實二味

四行三日服之

薛本張本同顧本之作遇

疑誤

內所引證之當作蠅今改正法

本作願亦誤願

一〇二面十三行五兵白刃盜賊凶害。

薛本此八字接連上行諸毒下而者  
冠軍云云。另提行起者。又作昔。

一〇三面五行住丸。

薛本住

作五 又左

辟。各本俱

八行地深叁尺與深同

張本地深之深作闊。薛本尺  
下有廣字。顧本與作餘。

一〇三面十二行反。

張本顧本俱作及。又其病薛本病下有  
相反二字。薛本侵下有又咽塞聲嘶二字。  
相反四字。而下又多若虎虛明陰邪所加八字。  
皮肉強厚八字。顧字原本作項。喉字原本所無。

八行頭重

一〇四面六行合自

薛本自作身。

一〇四面十三行所侵。

薛本侵下有又咽塞聲嘶二字。  
薛本塞下有頭重。

一〇五面六行開格

薛本開作開。顧本開作關。

八行毒氣。

薛本氣字連接其病

一〇四面十三行脰。

原本作輪誤。薛本作項。

八行頸下

薛本下作側。

一〇五面十三行臍。

今依各本改。薛本作臍。

一〇六面二行狀

薛本作班。張本顧本皆作班。

一〇七面一行陽毒。

薛本陽字上有則爲二字。

一〇八面十行煎去

薛本去作取。

一〇九面四行汗。

原本誤作汁。薛本張本汗。

七行洞

顧本作口。

一一一面七行素傷於寒因復傷於寒。

薛本上寒字作風。

十行米中病

薛本米作末。未字下又多一來

一二面三行病苦。

薛本苦作若。

三行又

薛本熱作寒。

一二面三行病苦。

薛本苦作若。

十一行素傷於熱

薛本熱作寒。

一二面按此葉宋本原缺。張本顧本亦皆無。今照薛本補全。

十二行本太云云。

顧抄本連上。

十三行寸口云云。

抄顧本。

一二面又以顧抱沖所抄王字泰活字本校其異同。亦載于此。

本亦連上。

又數滑。

顧抄本作滑。

十三行陽盛佛禪。

佛作沸。

十四行如搏。

顧抄本如作相。

一一三面一行注亦

原作六疑誤。今上。

本亦連上。

又治如前證。

顧抄本此四字在前。

五行咬咀。

本薛

照顧抄本改。今上。

一行湯字下。

顧抄本有不可作養散五字。

又治如前證。

顧抄本此四字在前。

本薛

此二字顧本缺六行深師方曰。此四字顧本此下有七行未解。此下顧抄本有今且用解毒二字古抄本無而二字。而已二字。又古方字。

顧抄本又思本有憲字上顧抄七行解字作救。顧抄本又故用三黃石羔湯字下空一格。有前用三黃石羔湯一句。湯九作而。

行論曰。顧抄本作九行身目。顧抄本作十行湯字下。顧抄本空一格。

顧曰。身眼。

顧本俱

一二三面十四行異語。薛本異語作譜。一一四面五行蜘蛛。薛本顧本俱

一二五面五行荒言。薛本荒言作謬。七行加附子嚙下。薛本嚙

一二六面四行畜瘡。薛本畜瘡七行芫花。薛本下有米醋浸。揅

卷第六

一二三面八行喉痺。原本誤作喉痺。原本誤作喉痺。薛本渴去。旁改括囊。本作大躁石膏湯。

一二四面八行腹瀉。薛本瀉

一二五面一行注腹溜。薛本溜

八行注足口指。

張本作中。

一二四面十行中央。原本誤作先。二二五面一行注腹溜。薛本溜

作復。

一二五面九行節後。原本此二字破損。照張又入五。原本此二字亦破損。

一二六面三行足冷。薛本顧本

皆作冷。

六行利

里黑。薛本里作黑。

按當從黑爲是。

按

十一行熟寐而卒。原本無卒字。今依薛本

按

十二

三

一二六面十行得脈。薛本得字下有汁字。按當從汗字之誤。

按

十二

三

一二七面六行得汗者。薛本張本者下俱有生字。

按

八行代脈日死。

俱有一字。

按

十四行汗汗。

字。

按

薛本原作汗汗。抹去一

字。

按

薛本顧本俱不重

字。

按

薛

一二八面十一行衝愈。薛本張本衝十三行注太谿。原本誤作大絡。

一二八面十四行太谿。原本谿誤作太。今改。誤作二二九面。四行吹則。薛本吹作次。四行通氣。薛本氣作脈。

一二九面十二行覺。此字原本半字。破去。描寫作學。各本亦作學。按文義似當作覺。不當作學。故以意改之。一三〇面一行華陀本意也。

薛本顧本復俱作復。  
當有非字。按當從復爲是。

一三〇面十一行故敢。原本作故敗誤。十三行淮。薛本顧本俱作准。一三〇面一行華陀本意也。皆有非字。按

校作技。顧四行其緝。張本其。

本作板。顧四行其緝。張本其。

一三一面八行頗知。薛本知八行明然。俱作烟。薛本張本明十行雖惟。俱作准。十一行略意。薛本張本意。

一三二面三行令王公。俱作今。四行今增至四五百。薛本張本此六字俱在上每兩千四五句下。

一三三面一行古引。薛本作引古。六行安不。俱作寧。薛本張本安又千凜。各本千俱。

傷寒論音訓

一三五面十二行苦侯切。原本作苦使切誤。各本亦誤。今依原本校字作苦侯切。改。

一三六面六行牡豕。牡鼠。原本牡皆誤作。十四行金狸。口捕物。按原本口係破損。下半字裏有痕迹。正。


脩治藥法

一四一面十二行注取自然汗。汗當作汁。

一四四面十二行口參。原本破損。以藥味次考之。當是玄參。一四六面一行口口口口。原本破損。不可考。本亦無。張本作研細用。薛本顧二行口口。  
口口口原本破損。薛本張本口口作湯末。口口作同上。  
口口口二口口作中立練。按中立練二字有誤。

一四六面七行黑膏溫膏當作

道光癸未歲吳門黃氏士禮屋開雕同邑施南金書



## 題宋刻龐安常傷寒總病論後

郡中藏書家所謂朱奂文游者余猶及見其人家多書以老故大半散去最後一單中有龐安常傷寒總病論亦第與羣籍並出主人不以爲宋刻估人之買者亦未知爲宋刻也雜置坊間有識者過而識之以青蚨五星易歸自是我輩之好言收藏者皆爭相購矣是書先至小讀書堆顧抱沖家旣而五硯樓袁壽階知之余亦知之因壽階先與議易故歸之抱沖先見是書遂先錄其副抱沖所錄余未之見見其友人施君少谷手錄本少谷時在抱沖家教其子弟習書法故見而借抄抄畢原書歸壽階余從之倩工影鈔一本統而計之宋刻一影宋刻者抱沖少谷與余有三矣厥後余與壽階以影鈔易宋刻是書遂爲百年一塵中物年來力紿舉而贈諸藝芸書舍不意壽階之影鈔者亦於其身後展轉歸藝芸于是刻與鈔盡爲他人所有余則一無所有矣刻洪氏集驗方之冬余忽得一夢有人謂余何不再刻龐傷寒醒而異之遂商諸藝芸思借鈔入刻奈藝芸不允讓影鈔付梓而尤借宋刻備校適少谷哲嗣稻香欣然援贈其先人手澤付諸剞劂于是復以宋刻較影鈔而知少谷之影鈔爲功不小也三卷三十三葉唯少谷影鈔本有之餘本都缺想少谷鈔後抱冲始鈔鈔時偶失之自是宋刻缺此葉已後影鈔本皆失之非余之重刻不知宋刻缺此葉非少谷之影鈔不知宋刻之原未缺此葉也書之經人拆散傳錄其弊有如此者不可

不警也。其中五卷十五葉宋本缺。惟薛性天家鈔本有之。字跡行款與原本殊。未知何據。後見抱沖所鈔者中亦有此葉。謂是從王宇泰活字本補入。今余覆刻。據薛本補。據顧本校存其異同可耳。宋刻不無誤處。余復借張蒔塘家藏鈔本。薛性天家藏鈔本。顧容安家藏鈔本。雖未知其同出一源與否。而字有異同。悉爲標出。可從者或改正文以就之。未敢信者或存校語以參之。余友張君訓菴素諳醫理。共相參訂。以定校勘數十條。其任檢閱而草創者。余長孫美鑑之力也。是書自王宇泰活字印行之後。未見重梓。即王本相傳止有二百部。故行世絕少。余姪曾有之。爲友人借去被焚。故未及一校。爲憾。朋好中皆想望是書。渴欲一見。故命工梓行。至于是書之深奧。昔安常友人蘇黃兩公已詳言之。不復丐當代名流之儒醫兼通者贅一言。已道光癸未仲春黃丕烈識。

# 附錄

## 跋龐安常傷寒論

宋張耒

古之良醫皆不預爲方。何也。病之來無窮。而方不能盡。使不工者惑其疑似而用之。則害大矣。惟仲景傷寒論。論病處方。纖悉必具。又爲之增損進退之法。以豫告人。嗟夫。仁人之用心。且非通神造妙者不能爲也。龐安常又竊憂其有病證而無方者。續著爲論數卷。其用心爲術。非儻古人何以及茲。淮南人謂龐安常能與傷寒說話。豈不信然哉。予將去黃。欒仲實以黃別駕後序求予書。而仲實之父爲醫。得龐君之妙。謂予言何如也。(見張耒柯山集卷四十四)