

本草綱目木部第三十五卷下

木之二 喬木類

秦皮 本經中品

校正 併入拾遺棹木

釋名 梲皮 音岑 榑木 音尋 石檀 別錄 樊槻 宏景 盆桂 日華 苦樹

蘇恭 苦梲 時珍曰秦皮本作梲皮其木小而岑高故因以為名人訛為榑木又訛而為秦木或

云本出秦地故得秦名也高誘注淮南子云梲苦梲木也恭曰樹葉似檀故名石檀俗因味苦呼為

苦樹

集解 別錄曰秦皮生廬江川谷及冤句水邊二月八月采皮陰乾宏景曰俗云是樊槻皮而水

漬以和墨書色不脫微青恭曰此樹似檀葉細皮有白點而不粗錯取皮漬水便碧色書紙看之皆青色者是真頌曰今陝西州郡及河陽亦有之其木大都似檀枝幹皆青綠色葉如匙頭虛大而不光竝無花實根似槐
根俗呼爲白榑木

皮氣味苦微寒無毒

別錄曰大寒普曰神農雷公黃帝岐伯酸無毒李當之小

寒權曰平惡苦瓠防葵之才
曰惡吳茱萸大戟爲之使

主治風寒溼痺洗洗

寒氣除熱目中青腎白膜久服頭不白輕身

本經

男子少精婦人帶下小兒

風癩

身熱可作洗目湯久

服皮膚光澤肥大

別錄

明目去目中久熱兩目

赤腫疼痛風淚不止作湯浴小兒身熱煎水澄清

洗赤目極效

甄權

主熱痢下重下焦虛

好古

同葉煮湯

洗蛇咬并研末傅之

藏器

發明

宏景曰秦皮俗方惟以療目道家亦有用處大明曰秦皮之功洗肝益精明目退熱元素

曰秦皮沉也陰也其用有四治風寒溼邪成癩青

白幻翳遮睛女子崩中帶下小兒風熱驚癇好古

曰痢則下焦虛故張仲景白頭翁湯以黃蘗黃連

秦皮同用皆苦以堅之也秦皮浸水青藍色與紫

草同用治目病以增光暈尤佳時珍曰椀皮色青

氣寒味苦性瀉乃是厥陰肝少陽膽經藥也故治

目病驚癇取其平木也治下痢崩帶取其收瀉也

又能治男子少精益精有子皆取其瀉而補也故

老子云天道貴瀉此藥乃服食及驚癇崩痢所宜

而人止知其治目一節幾於廢棄良爲可惋淮南

子云椀皮色青治目之要藥也又萬畢術云椀皮

止水謂其能收淚也高誘解作致水言能使水沸

也者謬

附方

新舊三

赤眼生翳

秦皮一兩水一升半煮七合澄清日日溫洗一方加滑石

黃連等分

眼暴腫痛

秦皮黃連各一兩苦竹葉半升水二升半煮取八合食後

溫服此乃謝道人

赤眼睛瘡

秦皮一兩清水一升白盃中浸春夏一食

頃以上看碧色出即

以筋頭纏綿仰臥點令滿眼微痛勿畏良久瀝取熱汁日點十度以上不過兩

日瘥也

外臺秘要 **眼弦挑鍼** 乃肝脾積熱剉秦皮夾沙糖水煎調大黃末一錢微利佳

直指方 **血痢連年**

秦皮鼠尾草薔薇根等分以水煎去滓銅器重釜煎成丸如梧

子大每服五六丸日二服稍增

天蛇毒瘡 似癩非

乃草間花蜘蛛也人被其螫為露水所濡乃成此疾以秦皮煮汁一斗飲之即瘥 寇宗奭本草

合歡

本經中品

釋名合昏

唐本夜合

日華青裳

圖經萌葛

綱目烏賴樹

頌曰

古今注云欲蠲人之忿則贈以青裳青裳合歡也
植之庭除使人不忿故嵇康養生論云合歡蠲忿
萱草忘憂藏器曰其葉至暮卽合故云合昏時珍
曰按王璆百一選方云夜合俗名萌葛越人謂之
烏賴樹又金光明
經謂之尸利灑樹

集解

本經曰合歡生豫州山谷樹如狗骨樹別錄

療病之功也恭曰此樹葉似阜莢及槐極細五月
花發紅白色上有絲茸秋實作莢子極薄細所在
山谷有之今東西京第宅山池閒亦有種者名曰
合昏頌曰今汴洛閒皆有之人家多植於庭除閒
木似梧桐枝甚柔弱葉似阜角極細而繁密互相
交結每一風來輒自相解了不相牽綴采皮及葉

用不拘時月宗奭曰合歡花其色如今之醮暈線
上半白下半肉紅散垂如絲爲花之翼其綠葉至
夜則合也嫩時燂
熟水淘亦可食

木皮

去粗皮炒用

氣味甘平無毒主治安五臟和心志

令人歡樂無憂久服輕身明目得所欲

本經

煎膏消

癰腫續筋骨

大明

殺蟲搗末和鐺下墨生油調塗蜘蛛

蛛咬瘡用葉洗衣垢

藏器

折傷疼痛研末酒服二錢

匕

宗奭

和血消腫止痛

時珍

發明

震亨曰合歡屬土補陰之功甚捷長肌肉續筋骨槩可見矣與白蠟同入膏用神效而外

科家未曾錄用何也

附方

新舊三

肺癰唾濁

水三升煮取夜合皮一掌大

韋宙獨

撲損折骨

夜合樹皮卽合歡皮去粗皮炒

行方

每服二錢溫酒臥時服以滓傅

髮落不生

合歡木

之接骨甚妙

王璆百一選方

小兒撮口

夜

勻生油調塗一夜一次

普濟方

中風攣縮

夜合枝酒夜合枝

花枝濃煮汁拭口中

柏枝槐枝桑枝石

并洗之

子母秘錄

夜合枝酒夜合枝

榴枝各五兩並生剉糯米五升黑豆五升羌活二

兩防風五錢細麴七斤半先以水五斗煎五枝取

酒法封三七日壓汁每飲五合勿過醉致吐常令

有酒氣也

奇效良方

阜莢

本經中品

本草綱目木部

卷三十五

合歡

四

釋名

皂角

綱目

雞栖子

綱目

烏犀

志謂之雞栖子曾氏方謂之

烏犀外丹本草謂之懸刀

集解

別錄曰皂莢生雍州山谷及魯鄒縣如豬牙

長尺二者良俗人見其有蟲孔而未嘗有蟲形皆

言不可近令人惡病殊不爾也其蟲狀如草葉上

青蟲微黑便出所以難見恭曰此物有三種豬牙

皂莢最下其形曲戾薄惡全無滋潤洗垢不去其

尺二者粗大長虛而無潤若長六七寸圓厚節促

直者皮薄多肉味濃大好頌曰所在有之以懷孟

者爲勝木極有高大者本經用如豬牙者陶用尺

二者蘇用六寸圓厚者今醫家作疎風氣丸煎多

用長皂莢治齒及取積藥多用以爲蔬茹更益人時

性味不甚相遠其初生嫩芽以爲蔬茹更益人時

珍曰皂樹高大葉如槐葉瘦長而尖枝間多刺夏

開細黃花結實有三種一種小如豬牙一種長而

肥厚多脂而黏一種長而瘦薄枯燥不黏以多脂者爲佳其樹多刺難上采時以篋籠其樹一夜自落亦一異也有不結實者樹鑿一孔入生鐵三五斤泥封之卽結莢人以鐵砧槌阜莢卽自損鐵碾碾之久則成孔鐵鍋爨之多爆片落豈阜莢與鐵有感召之情耶

阜莢脩治

敷曰凡使要赤肥并不蛀者以新汲水浸一宿用銅刀削去粗皮以酥反復炙

透槌去子弦用每莢一兩用酥五錢好古曰凡用有蜜炙酥炙絞汁燒灰之異各依方法

氣味辛鹹温有小毒

好古曰入厥陰經氣分時珍曰入手太陰陽明經氣分之

才曰柏實爲之使惡麥門冬畏空青人參苦參機曰伏丹砂粉霜硫黃礞砂

主治風痺

死肌邪氣風頭淚出利九竅殺精物

本經**療腹脹滿**

消穀除欬嗽囊結婦人胞不落明目益精可爲沐

藥不入湯

別錄

通關節頭風消痰殺蟲治骨蒸開胃

中風口噤

大明

破堅癥腹中痛能墮胎又將浸酒中

取盡其精煎成膏塗帛貼一切腫痛

甄權

溽暑久雨

時合蒼朮燒烟辟瘟疫邪溼氣

宗奭

燒烟熏久痢脫

肛搜肝風瀉肝氣

汪機

通肺及大腸氣治咽喉痹

塞痰氣喘欬風癘疥癬

時珍

發明

好古曰 阜莢厥陰之藥活人書治陰毒正氣散內用阜莢引入厥陰也時珍曰 阜莢屬金

入手太陰陽明之經金勝木燥勝風故兼入足厥陰治風木之病其味辛而性燥氣浮而散吹之導之則通上下諸竅服之則治風溼痰喘腫滿殺蟲塗之則散腫消毒搜風治瘡按麗安時傷寒總病

論云元祐五年自春至秋蘄黃二郡人患急喉痹
十死八九速者半日一日而死黃州推官潘昌言
得黑龍膏方救活數千人也其方治九種喉痹急
喉痹纏喉風結喉爛喉道蟲蟲蝶重舌木舌飛絲
入口用大皂莢四十挺切水三斗浸一夜煎至一
斗半入人參末半兩甘草末一兩煎至五升去滓
入無灰酒一升釜煤二匕煎如傷入瓶封埋地中
一夜每溫酒化下一匙或掃入喉內取惡涎盡爲
度後含甘草片又孫用和家傳秘寶方云凡人卒
中風昏昏如醉形體不收或倒或不倒或口角流
涎出斯須不治便成大病此證風涎潮于上胸痹
氣不通宜用急救稀涎散吐之用大皂莢肥實不
蛀者四挺去黑皮白礬光明者一兩爲末每用半
錢重者三字溫水調灌不大嘔吐只是微微稀冷
涎或出一升二升當待惺惺乃用藥調治不可便
大吐之恐過劑傷人累效不能盡述宗奭曰此法
用皂莢末一兩生礬末半兩膩粉半兩水調
一二錢過咽卽吐涎用礬者分膈下涎也

附方

舊二十六新

中風口噤

不開涎潮壅上皂角一挺去皮豬脂塗炙黃色

為末每服一錢溫酒調下氣壯者二錢以吐出血為度簡要濟眾方

中風口喎

角

五兩去皮為末三年醞醋和之左喎塗右右喎塗左乾更上之外臺秘要

中暑不省

皂莢一兩燒存性甘草一兩微炒為末溫水調一錢灌之澹寮方

鬼魘不寤

皂莢末刀

圭吹之能起死人千金方

自縊將死

皂莢末吹鼻外臺方

水溺卒死

一宿者尚可活紙裹皂莢末納下部須臾出水即活外臺秘要

急喉痹塞

不救

皂莢生研末每以少許點患處外以醋調厚封項下須臾便破出血即愈或按水灌之亦良。直指

方用皂角肉半截米醋半蓋煎七分破出膿血即愈

咽喉腫痛

牙皂一挺去皮米醋浸炙

七次勿令大焦為末每吹少許入咽吐涎即止

風癩諸瘰

五膏

聖濟總錄

取痰如神大阜角半斤去皮子以蜜四兩塗上慢
火炙透搥碎以熱水浸一時按取汁慢火熬成膏
入麝香少許攤在夾綿紙上曬乾剪作紙花每用
三四片入淡漿水一小盞中洗淋下以筒吹汁入
鼻內待痰涎流盡吃脂麻餅一
風邪癩疾阜焚燒
個涎盡卽愈立效 普濟方 存性四
兩蒼耳根莖葉日乾四兩蜜陀僧一兩爲末成丸
梧子大硃砂爲衣每服三四丸棗湯下日二服
稍退只服二十丸名一切痰氣阜焚燒存性蘿蔔
抵住丸永類方一切痰氣子炒等分薑汁入
煉蜜丸梧子大每服五七
胸中痰結阜焚三十挺
十丸白湯下簡便方 去皮切水五
升浸一夜按取汁慢熬至可丸丸如梧子大每食
後鹽漿水下十丸。又釣痰膏用半夏醋煮過以
阜角膏和勻入明礬少許以柿餅
欬逆上氣唾濁
搗膏丸如彈子噙之 聖惠方 不得
臥阜焚丸用阜焚炙去皮子研末蜜丸梧子大
每服一丸棗膏湯下日三夜一服 張仲景方 **痰**

喘欬嗽

長阜莢三條去皮子一莢入巴豆十粒一

制杏仁麻油制巴豆蜜制半夏一處火炙黃色爲末每用一字安手心臨臥以薑汁調之喫下神效

余居士

卒寒欬嗽

阜莢燒研豉湯服

牙病喘息

喉中水雞鳴用肥阜莢兩挺酥炙取肉爲末蜜丸豆大每服一丸取微利爲度不利更服一日一服

必腫滿入腹

脹急阜莢去皮子炙黃爲末酒一

後二便關格

千金方用阜莢燒研粥飲下三錢立

子爲末酒麪糊丸每服五十丸酒下○聖

食氣黃

腫氣喘胸滿用不蛙阜角去皮子醋塗炙焦爲末

子大每服三丸食後陳橘皮湯下日三劑腹脹滿服隔二日增一丸以愈爲度

欲令瘦者豬牙皂角相續量長一尺微火煨去皮

子搗篩蜜丸大如梧子服時先喫羊肉兩臠汁三

兩口後以肉汁吞藥十丸以快利為度覺得力更

服以利清水即止藥瘥後一月不得食肉及諸油

賦上集驗方**身面卒腫**三升酒一斗漬透煮沸每

服一升一日三**卒熱勞疾**一兩微塗緩炙酥盡

搗篩蜜丸梧子大每日空腹飲下十五丸漸增**急**

至二十丸重者不過兩劑愈崔元亮海上方

勞煩熱體瘦三皂丸用皂莢皂莢樹皮皂莢刺各

五度煎之候少疑入麝香末一分以童子小便浸

蒸餅丸小豆大每空心溫水下七丸聖惠方

腳氣腫痛皂角赤小豆為末酒醋**傷寒初得**不問

以皂角一挺肥者燒赤為末以水五陰陽

合和頓服之陰病極效千金方**時氣頭痛**熱

本草綱目木部

卷二十一 下 皂莢

用皂角燒研新汲水一中盞薑汁蜜各少許和二錢服之先以煖水淋浴後服藥取汗即愈聖惠

卒病頭痛

皂角末吹鼻取

腦宣不止

不蛀皂角去皮子蜜炙搥

碎入水按取濃汁熬成膏

張子和儒門事親

鼾鼻不通

皂角末吹之

風熱牙痛

仍加白礬少許黃泥固濟

煨研日擦之

風蟲牙痛

外臺秘要方用皂莢末

全方用豬牙皂角食

揩牙烏鬚

大皂角二十挺以

十遍爲末

日用揩之

取嚏即安深師方

腸風下血

用長尺皂角五挺去皮子酥炙三次研

每溫水下

大腸脫肛

不蛀皂角五挺搥碎水按

十丸

聖惠

取汁二升浸之

自收上收

後以湯盪其腰肚上下令阜角氣行則不再作仍
以阜角去皮酥炙為末棗肉和丸米飲下三十丸

惠方 聖下 部 驢 瘡 阜 角 為 末 研 綿 裹 外 腎 偏 疼 阜 角 和 皮 為 末

水調 傅 之 良 便 毒 腫 痛 阜 角 炒 焦 水 粉 炒 等 分 研 末 以 熱 醋 調 攤 貼 患 處 頻

以水潤之即效○又方用豬牙阜角七片煨黃去
皮弦出火毒為末空心溫酒服五錢 袖珍方

便毒癰疽 阜角一條醋熬膏傅 婦人吹乳 袖珍方

阜角去皮蜜炙為末酒服一錢○又詩云婦人吹
爛法如何阜角燒灰蛤粉和熱酒一盃調入字管

教時刻 丁腫惡瘡 阜角去皮酥炙焦為末入麝香
笑呵呵 少許人糞少許和塗五日後根

出 普 小兒頭瘡 黏肥及白禿用阜角燒黑為末
濟方 去痴傅之不過三次即愈 鄧

筆峰衛 小兒惡瘡 阜角洗拭乾以少麻 足上風
生雜興 油搗爛塗之 肘後方

瘡

作癢甚者皁角炙大風諸癩長皁角二十條炙

慮過候冷入雪糕丸梧子大積年疥瘡豬肚內放

每酒下五十丸直指方去皁角食之射工水毒生瘡皁莢長尺二者苦酒

肘後袖珍方咽喉骨哽豬牙皁角二條切碎生絹袋盛魚

骨哽咽皁角末吹鼻取九里蜂毒皁莢鑽孔貼

五壯即安救急方腎風陰癢以稻草燒皁角烟熏

子脩治數日揀取圓滿堅硬不蛙者以瓶煮熟剝

刀切曬用其氣味辛温無毒主治炒春去赤皮以

水浸軟煮熟糖漬食之疎導五臟風熱壅宗核中

白肉入治肺藥核中黃心嚙食治膈痰吞酸

蘇頌

和血潤腸

李杲

治風熱大腸虛秘癩癰腫毒瘡癬

時珍

發明

機曰皂角核燒存性治大便燥結其性得溼則滑滑則燥結自通也時珍曰皂莢味辛屬

金能通大腸陽明燥金乃辛以潤之義非得溼則滑也

附方

舊三新一

腰腳風痛

不能履地皂角子一千二百個洗淨以少酥熬香為

末蜜丸梧子大每空心以蒺藜子

大腸虛秘風人

腳氣人大腸或秘或利用下痢不止

諸藥不效服

去盡即變黃色屢驗皂角子瓦焙為末米糊丸腸

風下血

皂莢子槐實一兩用粘殼糠炒香去糠為末陳粟米飲下一錢名神效散聖惠方

本草綱目

卷之五

皂莢

十一

裏急後重 不蛀 皂角子 米糠炒過 枳殼炒等 分爲

濟方 小兒流涎 脾熱有痰 皂角子 仁 兩半 夏薑湯

大每溫水下 五惡水入口 及皂莢水入口 熱痛不

丸 聖濟總錄 惡水入口 止以皂莢子 燒存性

分沙糖半兩和膏 婦人難產 皂角子 二枚 吞風蟲

含之 博濟方 婦人難產 之 皂角子 千金方 吞風蟲

牙痛 皂角子 末綿裹彈子 大兩顆 醋煮 粉滓面醫

皂角子 杏仁 等分 研勻 夜預免瘡癩 凡小兒 每年

以津和塗之 聖惠方 夜預免瘡癩 六月六日照

年歲吞皂莢子 可免瘡癩之患 大人亦可吞七散

或二十一枚 林靜齋所傳方也 吳曼扶壽方

便癰初起 皂角子 七個 研末水服 效一方 一切丁

腫 皂角子 仁 作末 傅之 年久瘰癧 阮氏經驗方 用

五日愈 千金方 年久瘰癧 不蛀 皂角子 一

百粒米醋一升礪砂二錢同煮乾炒令酥看瘰子
多少如一個服一粒十個服十粒細嚼米湯下酒
浸煮服亦可○聖濟總錄
言虛人不可用礪砂也

刺一名丁氣味辛温無毒主治米醋熬嫩刺作煎塗

瘡癬有奇效蘇頌治癰腫妬乳風癘惡瘡胎衣不下

殺蟲時珍

發明楊士瀛曰阜茨刺能引諸藥性上行治上焦
病震亨曰能引至癰疽潰處甚驗時珍曰阜

茨刺治風殺蟲功與茨同但其銳利直達病所爲

異耳神仙傳云左親騎軍崔言一旦得大風惡疾

雙目昏盲眉髮自落鼻梁崩倒勢不可救遇異人

傳方用阜角刺三斤燒灰蒸一時久日乾爲末食

後濃煎大黃湯調一匕飲之一旬眉髮再生肌潤

目明後入山脩道不知所終又劉守真保命集云

癩風乃營氣熱風寒客于脈而不去宜先用樺皮散服五七日後灸承漿穴七壯三灸後每旦早服樺皮散午以升麻葛根湯下錢氏瀉青丸晚服二聖散用大黃末半兩煎湯調阜角刺灰三錢乃緩疎泄血中之風熱也仍戒房室三年樺皮散見樺皮下又追風再造散卽二聖散云服之便出黑蟲爲驗數日再服直候蟲盡爲絕根也新蟲嘴赤老蟲嘴黑

附方

新十小兒重舌阜角刺灰入朴消或腦子少許漱口摻入舌下涎出自消

惠方

小便淋閉

阜角刺燒存性破故紙等分爲末無灰酒服聖濟總錄腸風

下血

便前近腎肝便後近心肺阜角刺灰二兩胡椒仁破故紙炒槐花炒各一兩爲末每服一

錢米飲下

傷風下痢

風傷久不已而下痢膿血日

槐花生用各半兩爲末煉蜜丸梧子大胎衣不下每服三十丸米湯下日二服袖珍方

皂角刺燒為末每服一錢
溫酒調下熊氏補遺
婦人乳癰皂角刺燒存

一錢和研每服一錢
溫酒下直指方
乳汁結毒產後乳汁不泄結

子各燒存性等分為末每
溫酒服二錢袖珍方
腹内生瘡在腸臟不可

角刺不拘多少好酒一碗煎至七分溫服其膿血
悉從小便中出極效不飲酒者水煎亦可藺氏

經驗瘡腫無頭皂角刺燒灰酒服三錢嚼葵子三

親癰癩惡瘡皂角刺燒存性研白芨少
大風癩瘡

選奇方用黃蘗末皂角刺灰各三錢研勻空心酒
服取下蟲物並不損人食白粥兩三日服補氣藥

數劑名神效散如四肢腫用鍼刺出水再服忌一
切魚肉發風之物取下蟲大小長短其色不一約

愈也二升其病乃發背不潰皂角刺麥麩炒黃一兩
仁存方綿黃芪焙一兩甘草半

兩爲末每服一大錢酒一盞乳香一塊煎七分去滓溫服 普濟本事方

木皮根皮氣味辛溫無毒 **主治** 風熱痰氣殺蟲 時珍

附方 新 **肺風惡瘡** 瘙癢用木乳卽皂莢根皮秋冬炒黃芪人參枳殼炒甘草炙等分 **產後腸脫** 不收爲末沸湯每服一錢 普濟方

角樹皮半斤皂角核一合川棟樹皮半斤石蓮子炒去心一合爲粗末以水煎湯乘熱以物圍定坐熏洗之挹乾便喫補氣丸 藥一服仰睡 婦人良方

葉主治 入洗風瘡溲用 時珍

附錄 **鬼阜莢** 藏器曰生江南澤畔狀如阜莢高一尺作湯浴去風瘡疥癬按葉去衣垢沐髮

令長

垢沐髮

令長

肥阜莢

綱目

集解

時珍曰肥阜莢生高山中其樹高大葉如檀

如雲實之莢而肥厚多肉內有黑子數顆大如指頭不正圓其色如漆而甚堅中有白仁如栗煨熟可食亦可種之十月采莢煮熟搗爛和白麩及諸香作丸澡身面去垢而膩潤勝於阜莢也相感志言肥阜莢水死金魚辟馬蠱麩見之則不就亦物性然耳

莢氣味辛温微毒主治去風溼下痢便血瘡癬腫

毒

時珍

附方

新賜風下血獨子肥阜燒存性一片為末下糊丸陳米飲下普濟方

痢噤口

肥阜莢一枚以鹽實其內燒存性為末以少許入白米粥內食之即效乾坤生意

風虛牙腫

老人腎虛或因涼藥擦牙致痛用獨子

入生樟腦

肥人以青鹽實之燒存性研末摻之或

衛生家寶方

頭耳諸瘡

眉癬燕窩瘡並用肥

一分研勻香油調

小兒頭瘡

因傷湯水成膿出水

塗之摘玄方

入膩粉麻油調

臘梨頭瘡

不拘大人小兒用獨核

搽海上方

巴豆二枚紫定鹽泥包煨存性入檳榔輕粉五七

分研勻香油調搽先以灰汁洗過溫水再洗拭乾

乃搽一宿見效不癬瘡不愈

須再洗普濟方

時時搽之便毒初起甚效

楊起簡便方

肥阜一個燒存性香油

調搽卽愈

撮生方

核氣味甘腥溫無毒主治除風氣

時珍

無患子

宋開寶

釋名

桓遺

木患子

綱目

噤婁

遺

肥珠子

綱目

油珠子

綱目

菩提子

綱目

鬼見愁

藏器曰

今注云

昔有神巫曰寶

能符

古

劫百鬼得鬼則以此木為棒殺之世人相傳以此木為器用以厭鬼魅故號曰無患人又訛為木患也時珍曰俗名為鬼見愁道家禳解方中用之緣此義也釋家取為數珠故謂之菩提子與薏苡同名纂文言其木名盧鬼木山人呼為肥珠

子油珠子

因其實如肥油而子圓如珠也

集解

藏器曰無患子高山大樹也子黑如漆珠博

香纓及浣垢宗奭曰今釋子取為念珠以紫紅色

小者佳入藥亦少西洛亦有之時珍曰生高山中

樹甚高大枝葉皆如椿特其葉對生五六月開白

花結實大如彈丸狀如銀杏及苦楝子生青熟黃

本草綱目卷之六 無患子

老則文皺黃時肥如油煤之形味辛氣髓且硬其
蒂下有二小子相黏承之實中一核堅黑似肥阜
莢之核而正圓如珠殼中有仁如榛子仁亦辛髓
可炒食十月采實煮熟去核搗和麥麩或豆麩作
澡藥去垢同於肥阜用洗真珠甚妙山海經云袂
周之山其木多桓郭璞注云葉似柳皮黃不錯子
似棟着酒中飲之辟惡氣澆之去垢核堅正黑卽
此也今武當山中所出鬼見愁亦是樹莢之子其
形正如刀豆子而色褐彼人亦以
穿數珠別又是一物非無患也

子皮

卽核外肉也

氣味微苦平有小毒主治澀垢去面

黔喉痺研納喉中立開又主飛尸

藏器

附方

新

洗頭去風

明日用楸子皮阜角胡餅菖蒲同搗碎漿水調作彈子大每用

泡湯洗頭良

洗面去黔

楸子肉皮搗爛入白麩和多能鄙事爲大丸每日常用洗面去垢

及黔甚良
集簡方

子中仁氣味辛平無毒主治燒之辟邪惡氣藏器煨

食辟惡去口臭

時珍

附方

一新

牙齒腫痛

肥珠子一兩 大黃香附各一兩 青鹽半兩 泥固煨研日用擦牙

濟方

樂華

本經下品

集解

別錄曰樂華生漢中川谷五月采恭曰此樹葉似木槿而薄細花黃似槐而稍長大子殼

似酸漿其中有實如熟豌豆圓黑堅硬堪爲數珠者是也五月六月花可收南人以染黃甚鮮明又以療日赤爛頰曰今南方及汴中園圃間或有之宗奭曰長安山中亦有之其子謂之木樂子携至

京都爲數珠
未見入藥

華氣味苦寒無毒

之才曰決明爲之使

主治目痛淚出傷背

消目腫

本經

合黃連作煎療目赤爛

蘇恭

無食子

唐本草

釋名没石子

開寶

墨石子

炮炙論

麻茶澤

珣曰波斯人每食以代果

故番胡呼爲没食子梵書無與没同音今人呼爲墨石没石轉傳訛矣

集解

恭曰無食子生西戎沙磧閒樹似檉禹錫曰按段成式酉陽雜俎云無食子出波斯國呼

爲摩澤樹高六七丈圍八九尺葉似桃而長三月

開花白色心微紅子圓如彈丸初青熟乃黃白蟲

蝕成孔者入藥用其樹一年生無食子一年生拔

屢子大如指長三寸上有殼中仁如栗黃可散時

珍曰按方輿志云大食國有樹一年生如栗子而長名曰蒲盧子可食次年則生麻茶澤卽沒石子也間歲互生一根異產如此一統志云沒石子出大食諸番樹如樟實如中國茅栗

子脩治

斃曰凡使勿犯銅鐵并被火驚用顆小無杵米者妙用漿水於砂盆中研令盡焙乾

再研如烏犀色入藥

氣味苦温無毒主治赤白痢腸滑生肌

肉

唐本

腸虛冷痢益血生精和氣安神烏髭髮治陰

毒痿燒灰用

李珣

温中治陰瘡陰汗小兒疳蠱冷滑

不禁

馬志

發明

宗奭曰沒石子合他藥染鬚造墨家亦用之珣曰張仲景用治陰汗燒灰先以湯浴了布

裹灰撲之甚長

附方

舊三五新五

血痢不止

沒石子一兩為末飯丸小豆大每食前米飲下五十丸

普濟

小兒久痢

沒石子二個熬黃研末
產後下痢
宮氣方

沒石子一個燒存性研末酒服

牙齒疼痛

綿裹無熱即飲下日二了母秘錄

一錢咬之涎出吐

鼻面酒皴

南方沒石子有孔者水磨成膏夜塗之

甚妙

口鼻急疔

沒石子末吹下部

大小口瘡

氏得效方
口鼻急疔
沒石子末吹下部

沒石子炮三分甘草一分研末

者少許置乳上吮之入口即啼不過三次
足趾肉刺
無食子三枚肥阜莢一
奇效方
聖惠

訶黎勒

唐本草

釋名

訶子
時珍曰訶黎勒梵言天主持來也

集解

恭曰訶黎勒生交州愛州頌曰今嶺南皆有而廣州最盛樹似木槌花白子形似卮子橄

欖青黃色皮肉相着七月八月實熟時采六路者

佳嶺南異物志云廣州法性寺有四五十株子極

小而味不瀉皆是六路每歲州貢只以此寺者寺

有古井木根蘸水水味不鹹每子熟時有佳客至

則院僧煎湯以延之其法用新摘訶子五枚甘草

一寸破之汲井水同煎色若新茶今其寺謂之乾

明古寺尚在舊木猶有六七株南海風俗尚貴此

湯然煎之不必盡如昔時之法也訶子未熟時風

飄墮者謂之隨風子暴乾收之益小者佳彼人尤

珍貴之蕭炳曰波斯舶上來者六路黑色肉厚者

良六路卽六棱也敦曰凡使勿用毗黎勒个个毗

頭也若訶黎勒文只有六路或多或少並是雜路

勒皆圓而露文或入路至十二

三路號曰椰精勒瀆不堪用

脩治 數曰凡用訶黎勒酒浸後蒸一伏時

刀削去皮取肉剉焙用核則去肉**氣味苦**

温無毒

權曰苦甘炳曰苦酸琇曰酸瀋温好古

主

治冷氣心腹脹滿下食

唐本

破胸膈結氣通利津液

止水道黑髭髮

甄權

下宿物止腸澼久洩赤白痢

蕭炳

消痰下氣化食開胃除煩治水調中止嘔吐霍亂

心腹虛痛奔豚腎氣肺氣喘急五膈氣腸風瀉血

崩中帶下懷孕漏胎及胎動欲生脹悶氣喘并忌

痢人肛門急痛產婦陰痛和蠟燒烟熏之及煎湯

熏洗

大明

治痰嗽咽喉不利含三數枚殊勝

蘇恭

實大

腸斂肺降火

震亨

發明

宗奭曰訶黎勒氣虛人亦宜緩緩煨熟少服此物雖瀉腸而又泄氣其味苦瀉故爾杲曰

肺苦氣上逆急食苦以泄之以酸補之訶子苦重瀉氣酸輕不能補肺故嗽藥中不用震亨曰訶子下氣以其味苦而性急肺苦急急食苦以瀉之罰降而下走也氣實者宜之若氣虛者似難輕服又治肺氣因火傷極遂鬱遏脹滿其味酸苦有收斂降火之功也時珍曰訶子同烏梅五倍子用則收斂同橘皮厚朴用則下氣同人參用則能補肺治咳嗽東垣云嗽藥不用者非矣但欬嗽未久者不可驟用爾嵇含草木狀言作飲久服令髭髮白者變黑亦取其瀉也珣曰訶黎皮主嗽肉主眼瀉痛波斯人將訶黎勒大腹等在船上用防不虞或遇大魚放涎滑水中數里船不能通乃煮此洗其涎滑尋化爲水則其治氣消痰功力可知矣○慎微曰金光明經言流水長者除病品云熱病下藥服訶黎勒又廣異記云高仙芝在大食國得訶黎勒長三寸置抹肚中便覺腹中痛因大痢十餘行疑

訶黎勒爲崇後問大食長老云此物人帶一切病
消利者乃出惡物爾仙芝寶之後被誅失所在○
頌曰訶黎主痢唐本草不載張仲景治氣痢有方
唐劉禹錫傳信方云予曾苦赤白下諸藥服遍久
不差轉爲白膿令狐將軍傳此方用訶黎勒三枚
兩炮一生並取皮末之以沸漿水一合服之若只
水痢加一錢七甘草末若微有
膿血加二七血多亦加三七

附方

新舊丸六

下氣消食

訶黎一枚爲末瓦器中水一
大升煎三兩沸下藥更煎三

五沸如麴塵色入少一切氣疾
鹽飲之食醫心鏡一枚宿食不消訶黎一
嚼嚥○又方訶黎三枚溼紙包煨
熟去核細嚼以牛乳下千金方

氣嗽日久黎一
枚含之嚥汁瘥後口爽不知食味卻煎檳榔湯一
盃服立便有味此知連州成密方也
經方

嘔逆不食

訶黎勒皮二兩炒研糊丸
心湯服二十丸日三服
廣濟方
風

痰霍亂

食不消大便瀉訶黎三枚取皮為末

小兒

霍亂

訶黎一枚為末沸湯服一子母秘錄

小兒風痰

壅閉語音不出

氣促喘悶手足動搖訶子半生

半炮去核大風熱

腹皮等分水煎服名二聖散

衝頂

熱悶訶黎二枚為末芒消

一錢同入氣痢水

醋中攪令消磨塗熱處

瀉

訶黎勒十枚麩裏塘火煨熟去核研末粥飲頓

陳橋皮厚朴各三兩搗篩蜜丸大如梧

水瀉下痢

訶黎勒炮二分肉豆蔻一分為

下痢轉白

訶子三

末米飲每服二錢聖惠方

赤白下痢

訶子十二個

一加甘草末一錢普濟方

赤白下痢

訶子六個

核焙為末赤痢生甘草湯下白痢炙甘

妬精下疳

草湯下不過再服

趙原陽濟急方

七

大訶子燒灰入麝香少許先以米泔水洗後搽之
或以荆芥黃蘗甘草馬鞭草葱白煎湯洗亦可昔
方士周守真醫唐靖爛莖一二
寸用此取效也 洪邁夷堅志

核主治磨白蜜注目去風赤痛神良
蘇頌 止欬及痢

時珍

葉主治下氣消痰止渴及洩痢煎飲服功同訶黎

時珍 唐包佶有病中謝
李吏部惠訶黎勒葉詩

婆羅得
宋開寶

釋名婆羅勒
時珍曰 婆羅得
梵言重生果也

集解
珣曰 婆羅得生西海波斯國樹似中華柳樹
子如薤麻子方家少用之
時珍曰 按王憲外

臺秘要婆羅勒似蒺藜子但以
指甲爪之卽有汁出卽此物也

子氣味辛溫無毒主治冷氣塊溫中補腰腎破疔

癬可染髭髮令黑

藏器

附方

新

拔白生黑

婆羅勒十顆去皮取汁熊脂二兩白馬鬣膏煉過一兩生薑炒

一兩母丁香半兩爲末和煎每拔白點之指令入肉卽生黑者此嚴中丞所用方也孟詵近效方

櫟

別錄下品

釋名櫟柳

衍義

鬼柳

時珍曰其樹高舉其木如柳故名山人訛爲鬼柳郭璞註爾雅

作柜柳云似柳皮可煮飲也

集解

宏景曰櫟樹山中處處有之皮似檀槐葉如櫟櫟人多識之恭曰所在皆有生溪澗水

側葉似樗而狹長樹大者連抱高數仞皮極粗厚殊不似檀宗奭曰檉木今人呼爲檉柳其葉謂柳非柳謂槐非槐最大者木高五六丈合二三人抱湖南北甚多然亦不材也不堪爲器嫩皮取以緣栲栳及箕唇時珍曰檉材紅紫作箱案之類甚佳鄭樵通志云檉乃榆類而枚烈其實亦如榆錢之狀鄉人采其葉爲甜茶

木皮脩治

數曰凡使勿用三四年者無力用二十年以來者心空其樹只有半邊向西生者良剝下去粗皮細剝蒸之從已至未出焙乾用

氣味苦大寒無毒主治時行頭痛熱結在腸胃

別錄

夏日煎飲去熱

宏景

俗用煮汁服療水氣斷痢

蘇頌

安

胎止妊婦腹痛山檉皮性平治熱毒風燔腫毒

大明

附方

舊一
新四

通身水腫

柳樹皮煮汁日飲
聖惠方

毒氣攻腹

手足

腫痛柳樹皮和槲皮煮汁煎如飴
糖以樺皮煮濃汁化飲

時後方

蠱毒下血

柳皮一尺

蘆根五寸水二升煮一升
頓服當下蠱出

小兒痢血

梁州柳皮二分炙犀角

十二分水三升煮取一升分
三服取瘥

飛血赤眼

柳皮去粗皮切二兩

古錢七文水一升半煎七合去
滓熱洗日二次

聖濟總錄

葉氣味苦冷無毒主治

接貼火爛瘡有效
蘇恭
治腫

爛惡瘡鹽搗罽之

大明

柳

本經
下品

釋名小楊

說文
楊柳

宏景曰柳即今水楊柳也恭曰柳與水楊全不相似水楊葉圓

本草綱目卷之五下柳

三

闊而尖枝條短硬柳葉狹長而青綠枝條長軟陶
以柳爲水楊非也藏器曰江東人通名楊柳北人
都不言楊楊樹枝葉短柳樹枝葉長時珍曰楊枝
硬而揚起故謂之楊柳枝弱而垂流故謂之柳蓋
一類二種也蘇恭所說爲是按說文云楊蒲柳也
從木易聲柳小楊也從木亞聲易音陽亞音酉又
爾雅云楊蒲柳也旄澤柳也檉河柳也觀此則楊
可稱柳柳亦可稱楊故今南人猶併稱楊柳余宗
本種樹書言順插爲柳倒插爲楊其說牽強且
失揚起之意宗奭曰釋家謂柳爲尼俱律陀木
集解別錄曰柳華生琅邪川澤頌曰今處處有之
俗所謂楊柳者也其類非一蒲柳卽水楊也
枝勁韌可爲箭筈多生河北杞柳生水旁葉粗而
白木理微赤可爲車轂今人取其細條火逼令柔
屈作箱篋孟子所謂杞柳爲楛捲者魯地及河朔
尤多檉柳見本條時珍曰楊柳縱橫倒順插之皆
生春初生柔荑卽開黃蕊花至春晚葉長成後花
中結細黑子蕊落而絮出如白絨因風而飛子着

衣物能生蟲入池沼卽化爲浮萍古者春取榆柳之火陶朱公言種柳千樹可足柴炭其嫩芽可作湯飲

柳華釋名柳絮

本經

正誤

見下

氣味苦寒無毒主治風

水黃疸面熱黑

本經

痂疥惡瘡金瘡柳實主潰癰逐

膿血子汁療渴

別錄

華主止血治溼痹四肢攣急膝

痛

甄權

發明

宏景曰柳華熟時隨風狀如飛雪當用其未舒時者子亦隨花飛止應水漬汁爾藏器曰

木經以柳絮爲花其誤甚矣花卽初發時黃蕊其子乃飛絮也承曰柳絮可以捍氈代羊毛爲茵褥柔軟性涼宜與小兒臥尤佳宗奭曰柳花黃蕊乾時絮方出收之貼灸瘡良絮之下連小黑子因風

而起得水溼便生如苦蕒地丁類花落結子成絮
古人以絮爲花謂花如雪者皆誤矣藏器之說爲
是又有實及子汁之文諸家不解今人亦不見用
時珍曰本經主治風水黃疸者柳花也別錄主治
惡瘡金瘡潰癰逐膿血藥性論止血療癰者柳絮
及實也花乃嫩蕊可搗汁服子與絮連難以分別
惟可貼瘡止血裹痹之用所謂子汁療渴者則連
絮浸漬研汁服之爾又崔寔四民月令言三月三
日及上除日采絮愈
疾則入藥多用絮也

附方 新吐血咯血 一錢 經方 柳絮焙研米飲服 **金瘡血出** 柳絮

封之卽止 面上膿瘡 柳絮膩粉等分以燈走馬

外臺秘要 牙疳 楊花燒存性入麝香 大風癩瘡 楊花四兩搗

待乾取少許搽保幼小全 花蛇烏蛇各一條去頭尾酒浸取肉全蠟煨蜈蚣蟾

取汁熬膏和丸梧子大硃砂為衣每服五十丸温
酒下一日三服以愈為度
孫氏集效良方
腳多汗溼
楊花着鞋及襪內穿之
摘元

葉氣味

同華

主治

惡疥痂瘡馬疥煎煮洗之立愈又

療心腹內血止痛

別錄

煎水洗漆瘡

宏景

天行熱病傳

尸骨蒸勞下水氣煎膏續筋骨長肉止痛主服金

石人發大熱悶湯火瘡毒入腹熱悶及疔瘡
日華療

白濁解丹毒

時珍

附方

舊一
新五

小便白濁

清明柳葉煎湯代茶
以愈為度
集簡方

小兒丹

煩

柳葉一斤水一斗煮取汁三升
洗赤處日七八度
子母秘錄

眉毛脫落

垂柳

葉陰乾爲末每薑汁於鐵器中調夜夜摩之聖惠方卒得惡瘡不可名識者柳葉或

皮水煮汁入少鹽頻洗之肘後方面上惡瘡方同痘爛生蛆嫩柳葉鋪

席上臥之蛆盡出而愈也李樓奇方

枝及根白皮氣味同華主治痰熱淋疾可爲浴湯洗

風腫瘙癢煮酒漱齒痛蘇恭小兒一日五日寒熱煎

枝浴之藏器煎服治黃疸白濁酒煮熨諸痛腫去風

止痛消腫時珍

發明頌曰柳枝皮及根亦入藥葛洪肘後方治癰疽腫毒妬乳等多用之韋宙獨行方主疔瘡

及反花瘡並煎柳枝葉作膏塗之今人作浴湯膏藥牙齒藥亦用其枝爲最要之藥時珍曰柳枝去

風消腫止痛其嫩枝
削爲牙杖剔齒甚妙

附方

新舊十黃疸初起

柳枝煮濃汁半升
外臺秘要脾胃虛弱

不思飲食食下不化病似翻胃噎膈清明日取柳
枝一大把熬湯煮小米作飯酒麩滾成珠子曬乾
袋懸風處每用燒滾水隨意下米米沉住火少時
米浮取看無硬心則熟可頓食之久則麩散不黏
矣名曰絡索米**走注氣痛**氣痛之病忽有一處如
楊起簡便方打撲之狀不可忍走注

不定靜時其處冷如霜雪此皆暴寒傷之也以白
酒煮楊柳白皮暖熨之有赤點處鑷去血妙凡諸
卒腫急痛熨之皆即**風毒卒腫**上方同**陰卒腫痛**柳
止姚增坦集驗方

三尺長二十枚細剉水煮極熱以故帛
裹包腫處仍以熱湯洗之集驗方**項下瘦氣**

水涯露出柳根三十斤水一斛煮取五升
以糯米三斗如常釀酒日飲范汪方**齒齲腫**

痛

垂柳枝槐白皮桑白皮白楊皮等分煎水熱含
冷吐。又方柳枝槐枝桑枝煎水熬膏入薑汁

細辛芎藭末每用
擦牙聖惠方

風蟲牙痛

楊柳白皮卷如指大
含咀以汁漬齒根數

過卽愈。又方柳枝
甚驗。又方柳枝剉一握剉入少鹽花漿水煎含

器盛之清酒三升漬三日頻
耳痛有膿柳根細切
含漱涎三日愈。古今錄驗

燥卽易之
斗門方

漏瘡腫痛柳根紅鬚煎水日洗。摘元
方用楊柳條罐內燒烟熏之

出水
卽效

乳癰妬乳初起堅紫眾療不瘥柳根皮熟搗
火溫帛裏熨之冷更易一宿消

肘後
方

反花惡瘡肉出如飯粒根深膿潰柳枝葉三
斤水五升煎汁二升熬如餲日三

塗之
聖惠方

天竈丹毒赤從背起柳木灰水
湯火灼瘡

柳皮燒灰塗之亦
可以根白

痔瘡如瓜腫痛如火
皮煎豬脂頻傅之

皮煎豬脂頻傅之

肘後方

湯洗之艾灸三五壯王及郎中病此驛吏用此方
灸之覺熱氣入腸大下血穢至痛一頃遂消馳馬

而去○
本事方

柳膠主治惡瘡及結砂子

時珍

柳寄生

見後寓木類

柳耳

見菜部木耳

柳蠹

見蟲部

檉柳

音偵○宋開寶

釋名赤檉

日華

赤楊

古今注

河柳

爾雅

雨師

詩疏

垂絲柳

綱目

人柳

綱目

三眠柳

衍義

觀音柳

時珍曰

按羅願爾雅翼

云天之將雨檉先知之

起氣以應又負霜雪不凋乃木之聖者也故字從
聖又名雨師或曰得雨則垂垂如絲當作雨絲又
三輔故事云漢武帝苑中有柳狀如人號曰人柳
一曰三起三眠則柳之聖又不獨知雨負雪而
已今俗稱長壽仙人柳亦曰觀音柳謂觀音用此
灑水也宗奭曰今人謂之三春柳以其一年三秀

名故

集解

志曰赤檉木生河西沙地皮赤色細葉禹錫

楊也陸機詩疏云生水旁皮赤如絳枝葉如松時
珍曰檉柳小幹弱枝插之易生赤皮細葉如絲
娜可愛一年二次作花穗長三四寸水紅色如
蓼花色南齊時益州獻蜀柳條長狀若絲縷者卽
此柳也段成式酉陽雜俎言涼州有赤白檉大者
爲炭其灰汁可以煮銅故沈炯賦云檉似柏而香
王禎農書云山柳赤而脆河柳白而明則檉又有
白色者也宗奭曰京甚多河西人或取滑棧爲鞭

木氣味甘鹹溫無毒主治剝驢馬血入肉毒取木

片火炙熨之并煮汁浸之開寶枝葉消痞解酒毒利

小便時珍

附方新腹中痞積觀音柳煎湯露一夜五更空心

一切諸風不問遠近檉葉半斤切枝亦可荆芥半

瀝五合新瓶盛之油紙封入重湯煮一酒多致病

伏時每服一小蓋日三服普濟方

長壽仙人柳曬乾為末每服一錢溫酒調下衛生易簡方

檉乳即脂主治合質汗藥治金瘡開寶

水楊唐本草

釋名

青楊

綱目

蒲柳

爾雅

蒲楊

古今注

蒲移

音移

移柳

古今注

萑苻

音丸蒲時珍曰

楊枝硬而揚起故謂之楊多

宜水涘蒲萑之地故有水楊蒲柳萑苻之名

宜水涘蒲萑之地故有水楊蒲柳萑苻之名

宜水涘蒲萑之地故有水楊蒲柳萑苻之名

宜水涘蒲萑之地故有水楊蒲柳萑苻之名

宜水涘蒲萑之地故有水楊蒲柳萑苻之名

宜水涘蒲萑之地故有水楊蒲柳萑苻之名

集解

恭曰水楊葉圓闊而尖枝條短硬與柳全別

柳葉狹長枝條長軟頌曰爾雅楊蒲柳也其

柳葉狹長枝條長軟頌曰爾雅楊蒲柳也其

柳葉狹長枝條長軟頌曰爾雅楊蒲柳也其

柳葉狹長枝條長軟頌曰爾雅楊蒲柳也其

柳葉狹長枝條長軟頌曰爾雅楊蒲柳也其

柳葉狹長枝條長軟頌曰爾雅楊蒲柳也其

柳葉狹長枝條長軟頌曰爾雅楊蒲柳也其

苻今河北沙地多生之楊柳之類亦多崔豹古今

苻今河北沙地多生之楊柳之類亦多崔豹古今

苻今河北沙地多生之楊柳之類亦多崔豹古今

苻今河北沙地多生之楊柳之類亦多崔豹古今

苻今河北沙地多生之楊柳之類亦多崔豹古今

苻今河北沙地多生之楊柳之類亦多崔豹古今

苻今河北沙地多生之楊柳之類亦多崔豹古今

苻今河北沙地多生之楊柳之類亦多崔豹古今

苻今河北沙地多生之楊柳之類亦多崔豹古今

注云白楊葉圓青楊葉長柳葉長而細移楊葉圓

注云白楊葉圓青楊葉長柳葉長而細移楊葉圓

注云白楊葉圓青楊葉長柳葉長而細移楊葉圓

注云白楊葉圓青楊葉長柳葉長而細移楊葉圓

注云白楊葉圓青楊葉長柳葉長而細移楊葉圓

注云白楊葉圓青楊葉長柳葉長而細移楊葉圓

注云白楊葉圓青楊葉長柳葉長而細移楊葉圓

注云白楊葉圓青楊葉長柳葉長而細移楊葉圓

注云白楊葉圓青楊葉長柳葉長而細移楊葉圓

而弱水楊即蒲柳亦曰蒲楊葉似青楊莖可作矢

而弱水楊即蒲柳亦曰蒲楊葉似青楊莖可作矢

而弱水楊即蒲柳亦曰蒲楊葉似青楊莖可作矢

而弱水楊即蒲柳亦曰蒲楊葉似青楊莖可作矢

而弱水楊即蒲柳亦曰蒲楊葉似青楊莖可作矢

而弱水楊即蒲柳亦曰蒲楊葉似青楊莖可作矢

而弱水楊即蒲柳亦曰蒲楊葉似青楊莖可作矢

而弱水楊即蒲柳亦曰蒲楊葉似青楊莖可作矢

而弱水楊即蒲柳亦曰蒲楊葉似青楊莖可作矢

赤楊霜降則葉赤材理亦赤然今人鮮能分別機

赤楊霜降則葉赤材理亦赤然今人鮮能分別機

赤楊霜降則葉赤材理亦赤然今人鮮能分別機

赤楊霜降則葉赤材理亦赤然今人鮮能分別機

赤楊霜降則葉赤材理亦赤然今人鮮能分別機

赤楊霜降則葉赤材理亦赤然今人鮮能分別機

赤楊霜降則葉赤材理亦赤然今人鮮能分別機

赤楊霜降則葉赤材理亦赤然今人鮮能分別機

赤楊霜降則葉赤材理亦赤然今人鮮能分別機

種一長似不相類時珍曰按陸機詩疏云蒲柳有二

種一長似不相類時珍曰按陸機詩疏云蒲柳有二

種一長似不相類時珍曰按陸機詩疏云蒲柳有二

種一長似不相類時珍曰按陸機詩疏云蒲柳有二

種一長似不相類時珍曰按陸機詩疏云蒲柳有二

種一長似不相類時珍曰按陸機詩疏云蒲柳有二

種一長似不相類時珍曰按陸機詩疏云蒲柳有二

種一長似不相類時珍曰按陸機詩疏云蒲柳有二

種一長似不相類時珍曰按陸機詩疏云蒲柳有二

枝葉

氣味

苦平無毒

主治

久痢赤白

搗汁一升服

搗汁一升服

搗汁一升服

搗汁一升服

日二大效

唐本

主癰腫痘毒

時珍

發明

時珍曰水楊根治癰腫故近人用枝葉治痘瘡魏直博愛心鑑云痘瘡數日陷頂漿滯不

行或風寒所阻者宜用水楊枝葉無葉用枝五斤
流水一大釜煎湯溫浴之如冷添湯良久照見纍
起有暈絲者漿行也如不滿再浴之力弱者只洗
頭面手足如屢浴不起者氣血敗矣不可再浴始
出及癢塌者皆不可浴痘不行漿乃氣澁血滯膜
理固密或風寒外阻而然浴令暖氣透達和暢鬱
蒸氣血通徹每隨暖氣而發行漿貫滿功非淺也
若內服助氣血藥藉此升之其效更速風寒亦不
得而阻之矣直見一姬在村中用此有驗即得其
方行之百發百中慎勿易之誠有變理之妙也蓋
黃鐘一動而蟄蟲啟戶東風一吹而堅冰
解凍同一春也群書皆無此法故詳著之

木白皮及根氣味

同華

主治金瘡痛楚乳癰諸腫痘

瘡

時珍

發明

時珍曰按李仲南永類鈴方云有人治乳癰

其方乃水楊柳根也葛洪肘後方治乳癰

附方

一新金瘡苦痛楊木白皮焙燥碾末水服方寸

白楊

唐本草

釋名獨搖

宗奭曰木身似楊微白故曰白楊非如

名高飛與移楊同名今俗通呼移楊爲

集解

恭曰白楊北土極多人種墟墓閒樹大皮白其

無風自動者乃移楊非白楊也頌曰今處處有之

北土尤多株甚高大葉圓如梨葉皮白色木似楊

采無時崔豹古今注云白楊葉圓青楊葉長是也
宗奭曰陝西甚多永耀閒居人脩蓋多此木也其
根不時碎札入土卽生根故易繁植土地所宜爾
風纔至葉如大雨聲謂無風自動則無此事但風
微時其葉孤絕處則往往獨搖以其蒂長葉重大
勢使然也時珍曰白楊木高大葉圓似梨而肥大
有尖面青而光背甚白色有鋸齒木肌細白性堅
直用爲梁椽終不撓曲與移楊乃一類二種也治
病之功大抵彷彿嫩葉亦可救荒老葉可作酒麪料

木皮脩治

數曰凡使銅刀刮去粗皮蒸之從巳
至未以布袋盛掛屋東角待乾用

氣味苦寒無毒

大明曰酸冷

主治毒風腳氣腫四肢緩

弱不隨毒氣游易在皮膚中痰癖等酒漬服之

唐本

去風痺宿血折傷血瀝在骨肉閒痛不可忍及皮

膚風瘙腫雜五木爲湯浸損處

藏器

治撲損瘀血竝

煎酒服煎膏可續筋骨

大明

煎湯日飲止孕痢煎醋

含漱止牙痛煎漿水入鹽含漱治口瘡煎水釀酒

消瘦氣

時珍

附方

舊一

一妊娠下痢

白楊皮一斤水一斗煮取

項

下瘦氣

秋米三斗炊熟取圓葉白楊皮十兩勿令見風切水五升煮取二升漬麩末五兩如

常釀酒每旦一盞日再服 崔氏方

枝主治消腹痛治吻瘡

時珍

附方

舊二

一口吻爛瘡

白楊嫩枝鐵上燒灰和

腹滿

新一

脂傳之

外臺秘要

癖堅

如石積年不損者必效方用白楊木東枝去粗皮辟風細剉五升熬黃以酒五升淋訖用

絹袋盛滓還納酒中密封再宿**面色不白**白楊皮

每服一合日三服外臺秘要

桃花一兩白瓜子仁三兩爲末每服方寸匕

日三服五十日面及手足皆白

聖濟總錄

葉主治齟齬煎水含漱又治骨疽久發骨從中出

頻搗傅之

時珍

扶移

音夫移拾遺

釋名移楊

古今注

唐棣

爾雅

高飛

崔豹

獨搖

時珍曰

移乃

故

得楊名按爾雅唐棣移也崔豹曰移楊江東呼爲夫移圓葉弱蒂微風則大搖故名高飛又曰獨搖

陸機以唐棣爲郁李者誤矣郁李乃常棣非唐棣也

集解

藏器曰：扶移木生江南山谷樹，大十數圍，無風葉動，花反而後合。詩云：唐棣之華，偏其反。

而是也。時珍曰：移楊與白楊是同類二種，今南人通呼爲白楊，故俚人有白楊葉有風掣無風掣之語，其入藥之功大抵相近。

木皮氣味苦平，有小毒。主治去風血，腳氣疼痹，踠

損，瘀血痛不可忍。取白皮，火炙酒浸服之。和五木

皮煮湯，搗腳氣殺瘰，蟲風瘙燒作灰，置酒中令味

正經時不敗

藏器

發明

時珍曰：白楊、移楊皮並雜五木皮，煮湯浸搗，損痹諸痛腫，所謂五木者，桑、槐、桃、楮、柳也。並

去風和血

附方

一新婦人白崩

扶楊皮半斤牡丹皮四兩升麻牡蠣煨各一兩每用一兩酒二

鍾煎一鍾食前服集簡方

松楊

拾遺

校正

併入唐本草松子木

釋名 棕子木

音涼時珍曰其材如松其身如楊故名松楊爾雅云棕即來也其陰可蔭

涼故曰棕木藏器曰江西人呼為涼木松楊縣以此得名

集解

藏器曰松楊生江南林落閒大樹葉如梨志曰棕子木葉似柿兩葉相當子細圓如牛李

生青熟黑其木堅重煮汁色赤郭璞云棕材中車輞八月九月采木日乾用

木氣味甘鹹平無毒主治折傷破惡血養好血安

胎止痛生肉

唐本

木皮氣味苦平無毒主治水痢不問冷熱濃煎令

黑服一升藏器

榆

俞由二音
本經上品

釋名零榆本經白者名粉

時珍曰按王安石字說云
榆藩俞柔故謂之榆其粉

則有分之之道故謂之
粉其莢飄零故曰零榆

集解

乾八月采實並勿令中溼溼則傷人宏景曰
別錄曰榆皮生穎川山谷二月采皮取白暴

此卽今之榆樹取皮刮去上赤皮亦可臨時用之
性至滑利初生莢仁以作糜羹令人多睡嵇康所
謂榆令人瞑也恭曰榆三月實熟尋卽落矣今云
八月采實恐誤也藏器曰江東無大榆有刺榆秋
實故經云八月采者誤也刺榆皮不滑利頌曰榆
處處有之三月生莢古人采仁以爲糜羹今無復

食者惟用陳老實作醬耳按爾雅疏云榆類有數十種葉皆相似但皮及木理有異耳刺榆有鍼刺如柘其葉如榆淪爲蔬羹滑於白榆卽爾雅所謂蘊莖詩經所謂山有樞是也白榆先生葉卻着莢皮白色二月剝皮刮去粗殼中極滑白卽爾雅所謂榆白粉是也荒歲農人取皮爲粉食之當糧不損人四月采實宗奭曰榆皮初春先生莢者是也嫩時收貯爲羹茹嘉祐中豐沛人缺食多用之時珍曰邢昺爾雅疏云榆有數十種今人不能盡別惟知莢榆白榆刺榆檮榆數者而已莢榆白榆皆大榆也有赤白二種白者名粉其木甚高大未生葉時枝條閒先生榆莢形狀似錢而小色白成串俗呼榆錢後方生葉似山茱萸葉而長尖觶潤澤嫩葉煤浸淘過可食故內則云莖苴粉榆兔藜滌瀡以滑之三月采榆錢可作羹亦可收至冬釀酒淪過曬乾可爲醬卽榆仁醬也崔寔月令謂之醬醕音牟偷者是也山榆之莢名蕪萸與此相近但味稍苦耳諸榆性皆扇地故其下五穀不植古人

春取榆火今人采其白皮爲榆麪水調和香劑黏滑勝於膠漆承曰榆皮溼搗如糊用黏瓦石極有力汴洛人以石爲碓嘴用此膠之

白皮氣味甘平滑利無毒主治大小便不通利水

道除邪氣久服斷穀輕身不飢其實尤良本經療腸

胃邪熱氣消腫治小兒頭瘡痂疔別錄通經脈搗涎

傳癰瘡大明滑胎利五淋治齁喘療不眠甄權生皮搗

和三年醋滓封暴患赤腫女人妬乳腫日六七易

效孟詵利竅溲溼熱行津液消癰腫時珍

發明詵曰高昌人多搗白皮爲末和菜菔食甚美令人能食仙家長服服丹石人亦服之取利

關節故也時珍曰榆皮榆葉性皆滑利下降手足
太陽手陽明經藥也故人小便不通五淋腫滿喘
嗽不眠經脈胎產諸證宜之本草十劑云滑可去
著冬葵子榆白皮之屬蓋亦取其利竅滲溼熱消
留著有形之物爾氣盛而壅者宜之若胃寒而虛
者久服滲利恐洩真氣本經所謂久服輕身不饑
蘇頌所謂榆粉多食不
損人者恐非確論也

附方

新舊九

斷穀不飢

榆皮檀皮為末日服
救荒本草

齧喘不

止

榆白皮陰乾焙為末每日旦夜用水
五合末二錢煎如膠服食療本草

久嗽欲死

許明則有效方用厚榆皮削如指大長尺餘
納喉中頻出入當吐膿血而愈古今錄驗
虛勞

白濁

榆白皮二升水二斗煮取
五升分五服千金方

小便氣淋

榆枝石
燕子煎

水日服
普濟方

五淋澀痛

榆白皮陰乾焙研每以二錢
水五合煎如膠日二服普

濟方渴而尿多非淋也用榆皮二斤去黑皮以水一斗煮取五升一服三合日三服外

臺秘身體暴腫榆皮搗末同米作粥食臨月易產

要 榆皮焙為末臨月日三服方寸墮胎下血不止榆皮當

歸焙各半兩陳承本草別說或母病欲下胎榆

水煎服之普濟方胎死腹中白皮煮汁服二升

秘錄子母身首生瘡榆白皮末油和塗之火灼爛瘡

榆白皮嚼塗五色丹毒俗名遊腫犯者多死不可

和塗之千金髓小兒蟲瘡榆皮末和豬脂塗綿上覆癰疽

發背榆根白皮切清水洗搗極爛和香油傅之留

愈以桑葉嚼爛隨大小貼之小兒瘰癧榆白皮生

口合乃止神效救急方之小兒瘰癧搗如泥封

之類易。○小兒禿瘡醋和榆白皮末塗之
必效方蟲當出產乳方

葉氣味

同上

主治嫩葉作羹及煤食消水腫利小便

下石淋壓丹石

藏器時珍曰暴乾爲末淡鹽水拌或炙或曬乾拌菜食之亦辛滑下

水煎汁洗酒皸鼻同酸棗仁等分蜜丸日服治膽

熱虛勞不眠

時珍

花主治小兒癩小便不利傷熱

別錄

莢仁氣味微辛平無毒主治作糜羹食令人多睡

宏主婦人帶下和牛肉作羹食

藏器

子醬似蕪荑能

助肺殺諸蟲下氣令人能食消心腹閒惡氣卒心

痛塗諸瘡癬以陳者良

孟詵

榆耳

見木耳

榑榆

拾遺

集解

藏器曰榑榆生山中狀如榆其皮有滑汁秋生莢如大榆時珍曰大榆二月生莢榑榆八

月生莢可分別

皮氣味甘寒無毒主治下熱淋利水道令人睡

藏器

治小兒解顱

時珍

蕪荑

別錄中品

釋名

蕪荑

爾雅

無姑

本經

葭薺

唐

音殿

木名

榑

音偏

時珍曰按說文

云榎山枌榆也。有刺實爲蕪荑。爾雅云：無姑其實。夷又云：莖荑殺牆，則此物乃莖樹之荑，故名也。恭

曰：蕪荑乃殺牆二字之誤。

集解

別錄曰：蕪荑生晉山川谷三月采實陰乾。宏景曰：今惟出高麗狀如榆莢氣臭如狐彼人

皆以作醬食之。性殺蟲置物中亦辟蛙。但患其臭。恭曰：今延州同州者甚好。志曰：河東河西處處有之。頌曰：近道亦有之。以太原者良。大抵榆類而差小其實亦早成。比榆乃大氣臭。郭璞爾雅註云：無姑姑榆也。生山中葉圓而厚，剝取皮合漬之，其味辛香。所謂蕪荑也。采實陰乾用。今人多取作屑以芘五味。惟陳者良。人收藏之多，以鹽漬則失氣味。但宜食品，不堪入藥。珣曰：按廣州記云：生大秦國是波斯蕪荑也。藏器曰：蕪荑氣羶者良。乃山榆仁也。時珍曰：蕪荑有大小兩種，小者卽榆莢也。揉取仁醞爲醬味尤辛。人多以外物相和不取仁。醞去之入藥，皆用大蕪荑。別有種

氣味辛平無毒

權曰苦平 璉曰辛溫 璉曰作醬甚香美功尤勝于榆仁可少食之過

多發熱爲辛故也 秋月食之尤宜人

主治五內邪氣散皮膚骨節中

淫淫溫行毒去三蟲化食

本經

逐寸白散腸中噎噎

喘息

別錄

主積冷氣心腹癥痛除肌膚節中風淫淫

如蟲行

蜀本

五臟皮膚肢節邪氣長食治五痔殺中

惡蟲毒諸病不生

孟詵

治腸風痔瘻惡瘡疥癬 大殺

蟲止痛治婦人子宮風虛小兒疳瀉冷痢得訶子

豆蔻良

李珣

和豬膽搗塗熱瘡和蜜治溼癬和沙牛

酪或馬酪治一切瘡

張鼎

附方

新舊三

脾胃有蟲

食即作痛面黃無色以石州
蕪荑仁二兩和麪炒黃色為

末非時米飲服二

錢匕千金方

制殺諸蟲
生蕪荑生檳榔各四
兩為末蒸餅丸梧子

大每服二十丸

白

瘡熱有蟲
瘦悴久服充肥用榆
仁一兩黃連一兩為

末豬膽汁七枚

和入盃內飯上蒸之一日蒸一次
九蒸乃入麝香半錢湯浸蒸餅和丸綠豆大每服

五七丸至一二

錢氏小兒直訣

小兒蟲癘
胃寒蟲上諸證
危惡與癘相似

用白蕪荑乾漆

燒存性等分為末

結陰下血
蕪荑

搗爛紙壓去油

為末以雄豬膽汁丸梧子大每
服九丸甘草湯下日五服三日斷根
普濟方

胃氣泄

久患不止蕪荑五兩搗末飯丸梧子大每
日空心午飯前陳米飲下三十丸久服去

三尸益神

王紹顏續傳信方

膀胱氣急
宜下氣

蕪荑

搗和食鹽末等分以綿裹如棗大納下
部或下惡汁並下氣佳外臺秘要
風後失音不能言肥兒丸用蕪荑炒神麴炒麥蘖
炒黃連炒各一錢爲末豬膽汁打糊丸黍米大每
服十丸木通湯下黃連能蟲牙作痛以蕪荑仁安
去心竅惡血全幼心鑑
中甚效方危腹中鼈瘕平時嗜酒血入於酒則爲
氏得效方酒鼈平時多氣血凝於氣
則爲氣鼈虛勞痼冷敗血雜痰則爲血鼈搖頭掉
尾如蟲之行上侵人咽下蝕人肛或附脇背或隱
胃腹大則如鼈小或如錢治法惟用蕪荑炒煎服
之兼用暖胃益血理中之類乃可殺之若徒事雷
丸錫灰之類無益也
仁齋直指方

蘇枋木

唐本草

釋名

蘇木

時珍曰海島有蘇枋國其地產此木故名今人省呼爲蘇木爾

集解

恭曰蘇枋木自南海崑崙來而交州愛州亦有之樹似菴羅葉若榆葉而無澀抽條長丈

許花黃子青熟黑其木人用染絳色
南州記云生海畔葉似絳木若女貞
時珍曰按徐表

含南方草木狀云蘇枋樹類槐黃花黑子出九真煎汁忌鐵器則色黯其木蠹之糞名曰紫納亦可

用暹羅國人賤用如薪

脩治

斲曰凡使去上粗皮并節若得中心文橫如紫角者號曰木中尊其力倍常百等須細剉

重搗拌細梅樹枝蒸之從巳至申陰乾用

氣味甘鹹平無毒

杲曰甘鹹涼可升可

降陽中陰也好古曰味甘而微酸辛其性平

主治破血產後血脹悶欲

死者水煮五兩取濃汁服

唐本

婦人血氣心腹痛月

候不調及蓐勞排膿止痛消癰腫撲損瘀血女人

失音血噤赤白痢并後分急痛明大虛勞血癖氣壅

滯產後惡露不安心腹攪痛及經絡不通男女中

風口噤不語並宜細研乳頭香末方寸匕以酒煎

蘇枋木調服立吐惡物瘥海藥霍亂嘔逆及人常嘔

吐用水煎服藏器破瘡瘍死血產後敗血李杲

發明元素曰蘇木性涼味微辛發散表裏風氣宜

死者宜之時珍曰蘇枋木乃三陰經

血分藥少用則和血多用則破血

附方舊一產後血運蘇枋木三兩水五產後氣喘

新五產後血運升煎取二分服

面黑欲死乃血入肺也蘇木二兩水盃煮一

盃入人參末一兩服隨時加減神效不可言胡

氏破傷風病蘇枋木爲散三錢酒服立脚氣腫痛

蘇枋木驚驚藤等分細剉入定粉少許水偏墜腫

痛蘇枋木二兩好酒一壺煮金瘡接指凡指斷及

真蘇木末敷之外以蠶繭包

烏木綱目

釋名烏楠木楠音烏文木時珍曰本名文木南

集解時珍曰烏木出海南雲南番葉似櫻櫚其

嫩木也南人多以繫木染色偽之南方草木狀云

南有之古今注云烏文木出波斯船上將來

烏文闊然温括婺等州亦出之皆此物也

氣味甘鹹平無毒主治解毒又主霍亂吐利取屑

研末温酒服

時珍

樺木

宋開寶

釋名

檣藏器曰晉中書令王珉傷寒身驗方中作檣字時珍曰畫工以皮燒烟熏紙作古畫

字故名檣俗省作樺字也

集解

藏器曰樺木似山桃皮堪爲燭宗奭曰皮上

有紫黑花勻者裏鞍弓鞞時珍曰樺木生遼東及臨洮河川西北諸地其木色黃有小斑點紅色能收肥膩其皮厚而輕虛軟柔皮匠家用襯鞞裏及爲刀靶之類謂之暖皮胡人尤重之以皮卷蠟可作燭點

木皮氣味苦平無毒主治諸黃疸濃煮汁飲之良

開寶煮汁冷飲主傷寒時行熱毒瘡特良卽今豌豆

瘡也

藏器

燒灰合他藥治肺風毒

宗爽

治乳癰

時珍

附方

新舊一

乳癰初發

腫痛結硬欲破一服卽瘥以

北來真樺皮燒存性研無灰

酒温服方寸七卽臥覺卽

瘥也 沈存中靈苑方

乳癰腐爛

靴內年久樺皮燒灰酒服

一錢日一服

唐瑤經

肺風毒瘡

遍身瘡疥如癩及癰疹瘡

荆芥穗二兩炙甘草半兩各爲末杏仁水煮過去

用樺皮散主之

樺皮燒灰四兩枳殼去穰燒四兩

皮尖二兩研泥爛研勻每服二錢食後小便熱短

温酒調下瘡疥甚者日三服和劑方

小便利

樺皮濃煮汁

飲

染黑鬚髮

樺皮一片包側柏一枝燒烟熏香油盃內成烟以手

抹在鬚鬢上卽黑

也 多能鄙事

脂主治燒之辟鬼邪

藏器

緜木

拾遺

釋名集解

藏器曰生林澤山谷
木文側戾故曰緜木

氣味甘溫無毒主治風血羸瘦補腰腳益陽道宜

浸酒飲

藏器

欄木

拾遺

集解

藏器曰出安南及南海用作牀几似紫檀而
色赤性堅好時珍曰木性堅紫紅色亦有花

紋者謂之花欄木可作器皿
扇骨諸物俗作花梨誤矣

氣味辛溫無毒主滲產後惡露衝心癥瘕結氣赤

白漏下竝剉煎服

李璠

破血塊冷嗽煮汁熱服爲枕

令人頭痛性熱故也

藏器

椶櫚

宋嘉祐

釋名 椶櫚

時珍曰皮中毛縷如馬之鬣鬣故名椶櫚俗作棕音閩鬣也椶音并

集解

頌曰椶櫚出嶺南西川今江南亦有之木高一二丈無枝條葉大而圓有如車輪萃於樹

杪其下有皮重疊裹之每皮一匝爲一節二旬一采皮轉復生上六七月生黃白花八九月結實作

房如魚子黑色九月十月采其皮用山海經云石翠之山其木多椶是也藏器曰其皮作繩入土干

歲不爛昔有人開冢得一索已生根嶺南有枕櫚檳榔椰子冬葉虎散多羅等木葉皆與椶櫚相類

時珍曰椶櫚川廣甚多今江南亦種之最難長初生葉如白菱葉高二三尺則木端數葉大如扇上

聳四散歧裂其莖三棱四時不凋其幹正直無枝
近葉處有皮裹之每長一層卽爲一節幹身赤黑
皆筋絡宜爲鐘杵亦可旋爲器物其皮有絲毛錯
縱如織剝取縷解可織衣帽褥椅之屬大爲時利
每歲必兩三剝之否則樹死或不長也三月於木
端莖中出數黃苞苞中有細子成列乃花之孕也
狀如魚腹孕子謂之櫻魚亦曰櫻笋漸長出苞則
成花穗黃白色結實纍纍大如豆生黃熟黑甚堅
實或云南方此木有兩種一種有皮絲可作繩一
種小而無絲惟葉可作帚鄭樵通志以爲王篲者
非也王篲乃落帚之名卽地薦子別有蒲葵葉與
此相似而柔薄可爲扇笠許慎說文以爲櫻欄亦
矣誤

筍及子花氣味苦澇平無毒

藏器曰有小毒戟人
喉未可輕服

珣曰温

有大毒不堪食時珍曰櫻魚皆言有毒不可食而
廣蜀人蜜煮醋浸以供佛寄遠蘇東坡亦有食櫻

筍詩乃制
其毒爾
主治 澀腸止瀉痢腸風崩中帶下及養

血藏器

附方

一新

大腸下血

梔子煮熟切片曬乾爲末蜜湯或酒服一二錢 集簡方

皮氣味

同子

主治

止鼻衄吐血破癥治腸風赤白痢

崩中帶下燒存性用

大明

主金瘡疥癬生肌止血

李珣

發明

宗奭曰櫻皮燒黑治婦人血露及吐血須佐以他藥時珍曰櫻灰性澀若失血去多瘀滯

已盡者用之切當所謂澀可去脫也與亂髮同用更良年久敗櫻入藥尤妙

附方

一新

鼻血不止

櫻櫚灰隨左右吹

血崩不止

櫻櫚

皮燒存性空心淡酒服

婦人良方

血淋不止

櫻櫚皮

炒爲末每服二錢甚下血不止一椀椀皮半斤栝樓

錢米飲調下水穀痢下椀椀皮燒研水服小便不

通即通利累試甚驗水酒服二錢

磷木○磷良刃切拾遺

釋名檀木音潭

集解藏器曰磷木生江南深山大樹樹有數種取

曰此木最硬梓人謂之磷筋木是也木入染絳用葉亦可釀酒

木灰氣味甘温小毒主治卒心腹癥瘕堅滿疔癖

淋汁八升釀米一斗待酒熟每温飲半合漸增至

一二蓋卽愈

藏器出肘後

柯樹

拾遺

釋名集解木奴

珣曰按廣志云生廣南山谷波斯家用木爲船舫者也

白皮氣味辛平有小毒主治大腹水病采皮煮汁

去滓煎令可丸如梧子大平旦空心飲下三丸須

臾又一丸氣水竝從小便出也

藏器

烏白木

唐本草

釋名鷓白

時珍曰烏相鳥喜食其子因以名之陸龜蒙詩云行歇每依鷓舅影挑頻時見

鼠姑心是矣鼠姑牡丹也或云其木老則根下黑爛成曰故得此名鄭樵通志言烏白卽柎柳者非

集解

恭曰生山南平澤樹高數仞葉似梨杏五月

可壓油然燈極明宗奭曰葉如小杏葉但微薄而

綠色差淡子八九月熟初青後黑分爲三瓣時珍曰南方平澤甚多今江西人種植采子蒸

煮取脂澆燭貨之子上皮脂勝于仁也
根白皮氣味苦微温無毒
大明曰性涼慢火炙乾黃乃用**主治暴**

水癥結積聚
唐本**療頭風通大小便**
大明**解蛇毒**
震亨

發明
時珍曰烏桕根性沉而降陰中之陰利水通腸功勝大戟一野人病腫滿氣壯令掘此根

搗爛水煎服一盃連行數行而病平氣虛人不可用之此方出太平聖惠方言其功神聖但不可多

服爾誠然

附方
舊一**小便不通**
烏桕根皮煎湯**大便不通**
烏桕

新九**烏桕根皮煎湯**
飲之**大便不通**
烏桕

木根方長一寸劈破水煎半盞服之立通二便關

不用多喫其功神聖兼能取水斗門方乾爲末熱水

格服二三日則殺人烏相東南根白皮吐甚效肘

後水氣虛腫小便澀烏相皮檳榔木通二兩爲腳

氣溼瘡極癢有蟲烏相根爲末傳之尸疰中惡心

痛刺沉默錯亂用烏相根皮煎濃汁一合調暗疔

硃砂末一錢服之肘後方無硃砂永類方暗疔

昏狂搗爛井華水調一盞服待瀉過以三角銀杏

仁浸油搗盞患嬰兒胎毒曬研入雄黃末少許生

油調搽鼠莽砒毒烏相根半兩插水鹽餉痰喘

三四個待吐下鹽涎乃佳如不行熱茶催之與兒喫

方玄

葉氣味

同根

主治食牛馬六畜肉生疔腫欲死者搗

自然汁一二盃頓服得大利去毒卽愈未利再服

冬用根

時珍

柏油氣味甘涼無毒主治塗頭變白爲黑服一合

令人下利去陰下水氣炒子作湯亦可藏器塗一切

腫毒瘡疥

時珍

附方

新

膿泡疥瘡

同

研頻入睡

津

不見星乃止

以

溫湯洗淨瘡

以藥填

小兒蟲瘡

用舊絹作衣化相

油塗之與兒穿着

入唐瑤經驗方

次日蟲皆出油上取下熅之有聲是也別以油衣與穿以蟲盡爲度 瀕湖集簡方

巴豆

本經下品

釋名巴菽

本經剛子

炮炙老陽子

時珍曰此物出巴蜀而形如菽豆故以名

之宋本草一名巴椒乃菽字傳訛也雷斅炮炙論又分緊小色黃者爲巴有三稜色黑者爲豆小而兩頭尖者爲剛子云巴與豆可用剛子不可用殺人其說殊乖蓋緊小者是雌有稜及兩頭尖者是雄雄者峻利雌者稍緩也用之得宜皆有功力用之失宜參朮亦能爲害況巴豆乎

集解

別錄曰巴豆生巴郡川谷八月采陰乾用之去心皮頌曰今嘉州眉州戎州皆有之木高一

二丈葉如櫻桃而厚大初生青色後漸黃赤至十二月葉漸凋二月復漸生四月舊葉落盡新葉齊生卽花發成穗微黃色五六月結實作房生青至八月熟而黃類白豆蔻漸漸自落乃收之一房

有二瓣一瓣一子或三子子仍有殼用之去殼戎
州出者殼上有縱文隱起如線一道至兩三道彼
土人呼爲金線巴豆最爲上等他處亦稀有時珍
曰巴豆房似大風子殼而脆薄子及仁皆似海松
子所云似白豆
蔻者殊不類

脩治

宏景曰巴豆最能瀉人新者佳用之去皮心
熬令黃黑搗如膏乃和丸散敷曰凡用巴與

豆敲碎以麻油并酒等煮乾研膏用每一兩用油
酒各七合大明曰凡入丸散炒用不如去心膜換
水煮五度各一沸也時珍曰巴豆有用仁者用殼
者用油者有生用者麩炒者醋煮者燒存性者有
研爛以紙包壓去
油者謂之巴豆霜

氣味辛温有毒

別錄曰生温熟寒有大毒普曰神
農岐伯桐君辛有毒黃帝甘有毒

李當之熱元素曰性熱味辛有大毒浮也陽中陽也時
降陰也杲曰性熱味辛有大毒浮也陽中陽也時

珍曰巴豆氣熱味辛生猛熟緩能吐能下能止能
行是可升可降藥也別錄言其熟則性寒張氏言
其降李氏言其浮皆泥于一偏矣蓋此物不去膜
則傷胃不去心則作嘔以沈香水浸則能升能降
與大黃同用瀉人反緩爲其性相畏也王充論衡
云萬物含太陽火氣而生者皆有毒故巴豆辛熱
有毒之才曰芫花爲之使畏大黃黃連蘆筍菰筍
藜蘆醬豉冷水得火良惡藁草與牽牛相反中其
毒者用冷水黃連汁大豆汁解之

主治傷寒溫瘧寒熱破癥瘕結

聚堅積留飲痰癖大腹蕩練五臟六腑開通閉塞

利水穀道去惡肉除鬼毒蠱疰邪物殺蟲魚

本經療

女子月閉爛胎金瘡膿血不利

丈夫陰癩

殺斑蝥蛇虺

毒可煉餌之益血脈令人色好變化與鬼神通

別錄

治十種水腫痿痺落胎

藥性

通宣一切病泄壅滯除

風補勞健脾開胃消痰破血排膿消腫毒殺腹臟

蟲治惡瘡癩肉及疥癩疔腫

日華

導氣消積去臟腑

停寒治生冷硬物所傷

元素

治瀉痢驚癇心腹痛疝

氣風鳴耳聾喉痺牙痛通利關竅

時珍

發明

元素曰巴豆乃斬關奪門之將不可輕用震

曰世以巴豆熱藥治酒病膈氣以其辛熱能開腸

胃鬱結也但鬱結雖開而亡血液損其真陰從正

曰傷寒風溼小兒瘡痘婦人產後用之下膈不死

亦危柰何庸人畏大黃而不畏巴豆以其性熱而

劑小耳豈知以蠟匱之猶能下後使人津液枯竭

胸熱口燥耗卻天真留毒不去他病轉生故下藥

宜以爲禁藏器曰巴豆主癥癖疰氣痞滿積聚冷
氣血塊宿食不消痰飲吐水取青黑大者每日空
腹服一枚去殼勿令白膜破乃作兩片并四邊不
得有損缺吞之以飲壓令下少頃腹內熱如火利
出惡物雖利而不虛若久服亦不利人白膜破者
不用好古曰若急治爲水穀道之劑去皮心膜
油生用若緩治爲消堅磨積之劑炒去烟令紫黑
用客以通腸可以止瀉世所不知也張仲景治百
劫病之功微用亦有撫緩調中之妙譬之蕭曹絳
灌乃勇猛武夫而用之爲相亦能輔治太平王海
藏言其可以通腸可以止瀉此發千古之秘也一
老婦年六十餘病溏泄已五年肉食油物生冷犯
之卽作痛服調脾升提止瀉諸藥入腹則泄反甚
延余診之脈沈而滑此乃脾胃久傷冷積凝滯所
致王太僕所謂大寒凝內久利溏泄愈而復發綿
歷歲年者法當以熱下之則寒去利止遂用蠟圓
巴豆丸藥五十丸與服二日大便不通亦不利其

泄遂愈自是每用治泄痢積滯諸病皆不瀉而病
瘡者近百人妙在配合得宜藥病相對耳苟用所

不當用則犯輕
用損陰之戒矣

正誤

宏景曰道家亦有鍊餌法服之云可神仙人
吞一枚便死而鼠食之三年重三十斤物性

乃有相耐如此時珍曰漢時方士言巴豆鍊餌令
人色好神仙名醫別錄采入本草張華博物志言
鼠食巴豆重三十斤一謬一誣陶氏信為實語
誤矣又言人吞一枚即死亦近過情今並正之

附方

舊十三新一切積滯
巴豆一兩蛤粉二兩黃
藥三兩為末水丸綠豆

大每水下五丸

寒澀宿食

不消大便閉塞巴豆仁
一升清酒五升煮三日

醫學切問

三夜研熟合酒微火煎令可丸如豌豆大
每服一丸水下欲吐者二丸千金方
水蠱大

腹

動搖水聲皮膚色黑巴豆九枚去心皮炙黃
杏仁六十枚去皮尖炙黃搗丸小豆大水下

丸以利爲度勿飲酒

張文仲備急方 飛尸鬼擊 中惡心痛腹脹大便不通走馬湯用

巴豆二枚去皮心炙黃杏仁二枚以綿包椎碎熱

湯一合捻取白皮心炙黃杏仁二枚以綿包椎碎熱

外食瘡積瘡 搗丸綠豆大一錢阜焚去皮子六錢

後積滯泄痢 腹痛裏急杏仁去皮尖巴豆去皮心

丸綠豆大每服二三丸煎大黃湯下開日氣痢赤

一服一加百草霜三錢 劉守真宣明方

白心米飲下三四丸量人用此乃鄭獬侍御所傳

方也瀉血不止 納入紙封煨熟去豆食之其病

即止虛人分作二小兒下痢 赤白用巴豆煨熟去

服決效 普濟方 小兒下痢 赤白用巴豆煨熟去

研末飛羅麪煮糊丸黍米大量人用之赤用甘

草湯白用米湯赤白用薑湯下全幼心鑑 夏

草湯白用米湯赤白用薑湯下全幼心鑑 夏

草湯白用米湯赤白用薑湯下全幼心鑑 夏

草湯白用米湯赤白用薑湯下全幼心鑑 夏

草湯白用米湯赤白用薑湯下全幼心鑑 夏

草湯白用米湯赤白用薑湯下全幼心鑑 夏

月水瀉

不止巴豆一粒鍼頭燒存性化蠟和小兒

吐瀉

燒滴入水中同杵丸黍米大每用五七丸蓮

子燈

心湯伏暑霍亂傷冷吐利煩溼水浸丹用巴

下

同上一伏暑霍亂豆二十個去皮心及油黃

丹炒

研一兩二錢半化黃蠟和丸綠豆大每服乾

五七

丸水浸少頃別以新汲水吞下和劑方乾

霍亂病

去皮心脹痛不吐不利欲死巴豆一枚二便

不通

汁在臍內安餅于上灸二七壯取利為度葱鹽

楊氏

寒痰氣喘青橋皮一片展開人剛子一個麻

家藏

紫定火上燒存性研末薑汁和酒

一鍾

呷服天台李翰林用此治莫風溼痰病人坐

秀才

到口便止神方也張杲醫說風溼痰病人坐

冊先

將無油新巴豆四十粒研如泥紙壓去油

分作三餅如病在左令病人將右手仰置書上安藥于掌心以盥安藥上傾熱水入盥內水涼卽換

良久汗出立見神效病在右安左掌心陰毒傷寒

一云隨左右安之保壽堂經驗方

心結按之極痛大小便閉但出氣稍暖者急取巴豆十粒研入麪一錢捻作餅安臍內以小艾炷灸

五壯氣達卽通此太師陳解中藥毒去油馬牙消

北山方也仁齋直指方

等分研丸冷水服喉痹垂死止有餘氣者巴豆去一彈丸廣利方

出卽甦千金纏喉風痺以巴豆兩粒紙卷作角切斷兩頭

金勝傷寒舌出巴豆一粒去油取霜以紙撚卷舌

上出血如箸孔巴豆一枚亂髮雞中風口喎七枚

去皮研左喎塗右手心右喎塗左手心仍以小兒暖水一盞安藥上須臾卽正洗去聖惠方

口瘡

不能食乳剛子一枚連油研入黃丹少許剗去願上髮貼之四邊起粟泡便用溫水洗去

乃以舊蒲湯再洗卽不風蟲牙痛聖惠用巴豆一成瘡神效瑞竹堂方

一瓣切一頭剗去中心入豆在內蓋定綿裹隨左

右塞耳中○經驗方用巴豆一粒研綿裹咬之○

又方鍼刺巴豆燈上燒令天絲入咽凡露地飲食

烟出熏痛處三五次神效

食之令人咽喉生瘡急以白礬耳卒聾閉巴豆一粒紙裹

巴豆燒灰吹入卽愈

鍼刺孔通氣塞風瘙隱疹心下迷悶巴豆五粒

之取效通氣塞風瘙隱疹心下迷悶巴豆五粒

帛染拭之隨手疥瘡搔癢巴豆十粒炮黃去皮心

粉少許孤破點上不得近目并外腎上如荷錢癬

熏日著腎則以黃丹塗之甚妙千金方

瘡一巴豆仁三個連油杵泥以生絹包擦日一切惡

瘡

巴豆三十粒麻油煎黑去豆以油調硫黃輕粉末頻塗取效普濟癰疽惡肉金

膏

解一切瘡毒及腐化瘀肉最能推陳致新巴豆

仁

炒焦研膏點痛處則解毒塗瘀肉上則自化加

乳

香少許亦可若毒深不能收斂者**疣痣黑子**巴

宜

作搥絰之不致成腐外科精義

一

錢石灰炒過人言一錢糯**箭鏃入肉**不可拔出

米

五分炒研點之怪症方**箭鏃入肉**者用新巴

豆

仁略焙與蜣螂同研塗之斯須痛定微癢忍之

待

極癢不可忍便撼拔動之取出速以生肌膏傅

之

而痊亦治瘡腫夏侯鄆在潤州得此方後至洪

州

旅舍主人妻病背瘡呻吟不已鄆用此方試之

卽

痛止也**小兒痰喘**巴豆一粒杵爛綿裹塞鼻男

經

驗方**小兒痰喘**左女右痰卽自下龔氏醫

鑑

牛疫動頭巴豆二粒研生麻油三兩漿水

牛

疫動頭半升和灌之賈相公牛經

油

主治中風痰厥氣厥中惡喉痹一切急病咽喉

本草綱目木部卷三十五巴豆

不通牙關緊閉以研爛巴豆綿紙包壓取油作搽
點燈吹滅熏鼻中或用熱烟刺入喉內卽時出涎
或惡血便甦又舌上無故出血以熏舌之上下自

止

時珍

殼主治消積滯治瀉痢

時珍

附方

新

一切瀉痢

脈浮洪者多日難已脈微小者服之立止名勝金膏巴豆皮楮

葉同燒存性研化蠟丸綠豆大每痢頻脫肛黑色
甘草湯下五丸劉河間宣明方堅硬
用巴豆殼燒灰芭蕉自然汁煮入朴消少許洗軟
用眞麻油點火滴于上以枯礬龍骨少許爲末摻
入肛頭上以芭蕉葉托

入危氏得效方

樹根主治癰疽發背腦疽鬢疽大患掘取洗搗敷患處留頭妙不可言收根陰乾臨時水搗亦可

時珍

出楊誠

大風子

補遺

釋名

時珍曰能治大風疾故名

集解

時珍曰大風子今海南諸番國皆有之按周達觀真臘記云大風乃大樹之子狀如椰子

而圓其中核數十枚大如雷丸子中有仁白色久則黃而油不堪入藥

仁脩治

時珍曰取大風子油法用子三斤去殼及黃油者研極爛瓷器盛之封口入滾湯中

蓋鍋密封勿令透氣文武火煎至黑色如膏名大風油可以和藥

氣味辛熱有毒主治風癰疥癩楊梅諸瘡攻毒殺

蟲

時珍

發明

震亨曰粗工治大風病佐以大風油殊不知

而先失明者時珍曰大風油治瘡有殺蟲劫毒之功蓋不可多服用之外塗其功不可沒也

附方

新大風諸癩少酒糊丸梧子大每服五兩入

空心溫酒下仍以苦大風瘡裂大風子燒存性和參湯洗之普濟方

以殼煎湯洗之楊梅惡瘡上方同風刺赤鼻大風子嶺南衛生方

子仁輕粉硫黃爲手背皴裂大風子搗泥末夜夜唾調塗之壽域

海紅豆

海藥

釋名集解

珣曰按徐表南州記云生南海人家園圃中大樹而生葉圓有莢近時蜀中種

之亦成時珍曰樹高二三丈葉似梨葉而圓按宋祁益部方物圖云紅豆葉如冬青而圓澤春開花白色結莢枝開其子纍纍如綴珠若大紅豆而扁皮紅肉白以似得名蜀人用爲果飭

豆氣味微寒有小毒主治人黑皮黥黯花癬頭面

遊風宜入面藥及澡豆

李珣

相思子

綱目

釋名紅豆

時珍曰按古今詩話云相思子圓而紅故老言昔有人歿於邊其妻思之哭於

樹下而卒因以名之此與韓馮冢上相思樹不同彼乃連理梓木也或云卽海紅豆之類未審的否

集解

時珍曰相思子生嶺南樹高丈餘白色其葉似槐其花似阜莢其莢似扁豆其子大如小

豆半截紅色半截黑色彼人以嵌首飾段公路北
戶錄言有蔓生用子收龍腦香相宜令香不耗也

氣味苦平有小毒吐人**主治通九竅去心腹邪氣**

止熱悶頭痛風痰瘴瘧殺腹臟及皮膚內一切蟲

除蠱毒取二七枚研服卽當吐出

時珍

附方新**瘴瘧寒熱**相思子十四枚水研**貓鬼野道**

眼見貓鬼及耳有所聞用相思子薤麻子巴豆各
一枚硃砂末蠟各四銖合搗丸如麻子大服之卽
以灰圍患人面前着一斗灰火吐藥入火中沸
卽畫十字于火上其貓鬼者死也**千金方****解**

中蠱毒必效方用未鑽相思子十四枚杵碎爲末
溫水半盞和服欲吐抑之勿吐少頃當大

吐非常輕者但服七
枚神效**外臺秘要**

豬腰子

綱目

集解

時珍曰豬腰子生柳州蔓生結莢內子大若豬之內腎狀酷似之長三四寸色紫而肉堅

彼人以充土宜饋送中土

氣味甘微辛無毒主治一切瘡毒及毒箭傷研細

酒服一二錢并塗之

時珍

石瓜

綱目

集解

時珍曰石瓜出四川峨眉山中及芒部地方其樹脩幹樹端挺葉肥滑如冬青狀似桑其

花淺黃色結實如綴長而不圓殼裂則子見其形似瓜其堅如石煮液黃色

氣味苦平微毒主治心痛煎汁洗風痺

時珍

本草綱目木部第三十五卷下終