

济世良方



戒鴉片煙癮盡絕根株良方

榧子肉

殺虫潤肺
宜通諸竅

拾兩搗為細末用柳寄生

驅除筋絡毒氣
身體則不作痛

五錢煎水浸榧末三日後攤開晒乾為廣柳寄生惟四川省

最多如本處難覓即在柳柯中栽種忍冬藤根護微土待發

新枝葉

取用

北瓜乾

能解鴉片
毒性

三兩又名金盞

盞

去子皮削片晒

乾研末用炙升麻

提氣升陽
不致洩泄

三錢煎水浸瓜末五日

大生

地

滋陰
生血

五兩咀片生搗細膩各藥忌火炒名為雙合法製

黑紗糖

消臍疔
積垢

八兩合煉為小丸癮重者每服三錢輕者二

錢用生芪為引

壯脾
益氣

壹錢煎湯半茶杯癮前吞服食烟幾遍

服丸幾次。無論遠年近日。癮之大小。不須半月。毒癮莫不解。淨永無後患。此丸本宅布送十餘年。百服百效。此方於道光十六年八月初一日會呈稟。

兩廣總督鄧蒙批仰各屬刊示廣布。并在督署內合藥施散。嗣於道光十八年九月初三日復抄此方呈稟。

兩江總督陶亦蒙批仰各屬照此刊刻曉示。卽承江寧

沈太守在本省救生局。並天喜祠兩處製藥設局施散。當此功令森嚴之際。凡吸食者莫不盡絕根株。然鴉片流毒天下。至大。人數至多。聞現賣戒烟丸內。每用參茸。價值昂貴。不便貧家。

且以烟膏烟灰爲引致滋息酸之弊所以戒烟者往往旋戒
乃旋思吸食若不吸食則慙慙待斃欲斷絕淨盡又無良方
可憑輾轉遷延痛恨無地倘一疎漏勢被查拏若逾限期立
遭惡戮之苦余不忍坐視重刊前方廣爲激勸並製藥丸施
送但此藥工只費三四百文可解數人之癮伏冀

仁人君子垂鑒照此推行廣布濟救迷途不惟活無窮民命抑且保

無數身家天相吉人功德無量

今又附方專治悞服烟膏烟灰爲癮之丸并解毒癮經驗

生番瓜四兩去皮切片白蜜壹兩五錢 真燒酒壹兩

三

台爲一用砂鉢隔水蒸燉一炷香每日癰前食不須半月毒
癰盡絕

神效良方
江寧顧氏撰刊製藥奉送

凡人患癰疽疔毒者宜早服此藥
其效如神

此藥乃我朝上只費三四百文

醫聖之書
不須必重洗前

可速則轉難其藥如神

凡患癰疽疔毒者宜早服此藥

其效如神

濟世良方目錄

卷一

急救五絕
自縊
墻壓
溺死
魘魅
凍死
餓死

斷腸草
中砒八
鹽鹵二
河豚毒三
白果毒二

雷擊
水銀毒
鉛粉毒
中蠱三
中煤
洋烟毒

解諸毒二
湯火傷六
中風中痰十一
中暑等九

藥酒二
半身不遂
骨痛四
中寒
傷寒五
感冒二

中濕
骨痛三
陰症
縮囊二
瘟疫十八
痰飲四

諸咳九
哮喘五
瘧疾三方
瘧疾六
痢疾十五

霍亂 十四

胃冷熱吐 三

噎膈 七

痞積 四

酒驚

鼓脹 十三

黃黑疔 六

癆嗽 吐血

灸癆 五方

臟毒 四

火症 熱毒

大便血 四

溺血 血淋 五

諸汗 五

驚悸

不寐 三

風狂顛 三

猪羊顛 二

三消

四 赤白濁 四

夢遺 三

久淋 二

小便頻數

血淋

大小便閉 十一

脫肛 五

偏正頭風 九

頭眩

雀斑點

六 眼疾 十

耳聾 四

虫入耳 六

鼻疾 七

酒瘡 三

鼻疳 鼻瘡

唇瘡

舌腫舌瘡 五

口臭 三

牙痛 十五

走馬疳 五

固齒

烏鬚

落牙

喉症 十八

尖音

心胃痛十二 心腹不快 小兒虫積肚痛二 腹扁瀉

護臍丸 酒肉過多脹滿 腰痛三 脇痛 疝氣八

骨節腰痛 腿膝 鶴膝三 脚氣寒濕 綉毬風 鷄眼

癩瘡 手指鵝掌風四 手指蛇頭三 凍瘡 金蓮方

卷二

腫毒灸法二 四妙湯 二妙湯 陽和湯 九 鉄筆圈

赤金箍 紫金箍 葱歸湯 透膿散 梅花五氣丹

三生散 肺癰 疔毒 對口 發背反搭 一筆消治發

背各疔等方三十 爛腿脚三 收口二 馬齒莧治法十五

對口 四

楊梅結毒 三

一便毒 十一

爛膝

赤白遊毒 七

風濕乳癰乳吹 八

大麻風 五

癩串 八

痔漏 十二

疥瘡 七

癩疥 三

癬 十三

癩瘡

坐板瘡

汗斑

白蛇纏

天蛇寄毒

蠟燭瀉

久濁

狐臭

杖瘡 五

杖撻 六

跌打損傷 十四

刀傷 四

金瘡鉄扇散等 十

破傷風

人咬

狗咬

虫獸咬

蛇咬 十

蝎咬 七

蜈蚣咬 六

黃蜂咬

蜘蛛傷

蚯蚓傷

鼠傷

辟蚊蚤

三

除臭虫 三

誤吞針錢鉄等 十

誤吞螞蝗

吞木屑

鷄魚骨硬 十一

治酒醉

鬼箭風

尿坑

狐媚

脫頰

飛絲入目 魔魘 明目 保養 禿髮再生 生鬚髮
廣濟丹 陰症 頭痛 痲痧 爛喉 天地交禁忌
食諸毒須知

卷三

兒科慈幼編各類 稀痘神方 不出痘方 急慢驚風
眼內生痘 達生編真言 難產七因 種子丸 八仙糕
調經至言 回生方論 資生丹方 資生丹治法

天醫日 馬猪狗病 避水鬼

卷四

竹林寺女科凡九十一症

絮酒加味芍歸湯
佛手散
生化湯
愈風散
難產方

安胎催生方
通乳方
砭石丸

急救五絕良方

一曰自縊。二曰墻壁壓。三曰溺死。四曰魘魅。五曰凍死。
凡五絕者。皆以半夏爲末。冷水爲丸。如豆大。納鼻中。卽愈。心溫者。一曰可治。又治倅死。此丸納鼻中愈。

一救自縊死。凡自縊高懸者。徐徐抱住。解繩。不可絕斷。上下安被。放倒。微微搥正喉嚨。以手掩其口鼻。勿令透氣。一人脚踏其兩肩。以手挽其頂髮。常令絀急。勿使緩縱。一人以手摩盪其胸臆。屈伸其手足。若已殪直。漸漸強屈之。人以脚裹衣。抵其糞門。

若婦人併陰門勿令洩氣。又以竹管吹其兩耳。候氣從口出。呼
吸眼開。仍引按不住。須臾以小薑湯。或清粥灌合喉潤。漸漸能
動乃止。此法自旦至暮。雖已冷可治。自暮至旦。陰氣盛難救。心
下微溫者。雖一日以上亦可治。自發百中。一法半夏末吹鼻
中。一法氣已脫極重者。只灸湧泉穴。男左女右脚心。灸三壯
卽活。一法男用雌雞刺雞冠血滴入口中卽活。不可將茶水
灌。

救水溺死。凡溺死者。先以刀幹開溺者口。橫放筋一隻。令其牙
啣之。使可出水。又令一健夫屈溺人兩足。著肩上。以背相貼。倒

駢而行令其出水仍先用燥土置地上將溺者仰卧其上更以土覆之止露口眼自然水氣瀉入土中其人卽醒仍急用竹管於口耳鼻臍糞門內迭更吹之令上下相通又用半夏末搗其鼻又用皂角末綿裹塞糞門須臾出水卽活一方艾炙臍中卽活一方將溺死之人用梯乘其人倒放用鹽塞滿鼻又填滿臍鹽化卽醒

一救凍死凡凍死及冬月落水微有氣者脫去濕衣隨解活人熱衣包煖用米炒熱囊盛熨心上冷卽換之或炒灶灰亦可候身漏煖日開氣回後以溫酒或薑湯粥飲灌之若先將火炙必死

一法用雄黃煇硝各等爲末點兩眼角。倘或微笑須急掩其口。如不掩則笑不止不可救矣。

一救壓死凡壓死及墜跌死。心頭溫者。急扶坐起。將手提其髮。用半夏末吹入鼻內。少甦。以生薑汁同香油攪勻灌之。次取散血藥服。如無藥小便灌之。一取東向桃柳枝各七寸。煎湯灌下。一救魘魅。凡中惡魘死者。不可近前呼叫。但唾其面。不醒卽咬脚跟及拇指。畧移動卧處。徐徐喚之。原無燈不可用燈照。待少醒。以皂角末吹鼻取嚏。凡溺縊魘死。急取韭菜汁灌鼻中。得角末麝香同灌更快捷。一男子被鬼擊。身有青痕。作痛者用。

金銀花二三兩煎湯飲之極效。一治客忤倖死還魂湯方

麻黃去節二兩 杏仁去皮尖七十粒 甘草兩水二碗煎至一碗灌之。諸倖死

者通用。溺死。魘死。諸厄。暗中雖牽。擾鬼祟。然非無因。至前若寬

救良方。因刊印行世。凡七孔出血者不治。

俾共知之存誠附識。

救餓死。餓俄將死之人。切不可驟與粥飯。食恐臟腑不常。反速其

死。須先用稀米湯。緩緩灌下。候甦醒時。漸與粥食。亦須少與。又

用布浸熱水。熨其臍腹。以回元氣。勻可回生。

救食斷腸草急。以生羊血灌之。即愈。遲則腸斷不救矣。

救中砒霜毒。防風末水調服。或石膏調冷水服。或刺羊血服。或飲

生藥豆汁或搗烏柏根汁服或用降香末四兩濃煎服皆驗

白礬末西新汲水調灌下喉卽活凡服砒之人不可睡卧恐毒

流四肢用葉豆粉兩銀硃一錢雞蛋清箇油半盞調服連砒吐出愈

或生麻油一碗灌之立愈

中鹽滷毒飲生豆腐漿卽解或服生豆汁或鴨旦數個打爛連

黃生吃卽吐吐出愈

中河豚毒飲胡麻油或大豆汁或橄欖汁均可解

中白果毒用木香滾水磨入麝少許服之卽解或白果殼

搗爛煎服

救雷擊方。此仙婁子春自言。宋末進士。文天祥其友也。常云。雷擊之鬼。化爲蚯蚓。故譚子化書云。凡被雷擊死者。搗蚯蚓汁覆臍中。可活。

中水銀毒。以炭末煎汁服解。

中鉛粉毒。以麻油調蜜如飴糖服愈。

解中蠱毒。密取山豆根研水服少許。未定再服。禁聲者愈。

治蠱毒神方。凡遊川廣者不可不知。大葶薺不拘多少。切片曬乾。爲末。每早空心白滾湯調下。錢入蠱家無害。

金蠱毒中之者。吮白礬味甘嚼。黑豆不腥。以石榴根皮煎汁吐之。

取兩刺蝟到家必能捕獲

解中煤毒。鹹菜鹵灌下即愈。

救吞洋烟毒。片即鴉白礬五錢陳鹹欖煨灰五錢生菜豆兩共細末用陰陽

水共一大碗調灌。如不見動靜再服一劑即愈。等醒後生甘草

五錢熬湯冲好神砂二錢服之即好。

解諸毒方。甘草菜豆水煎服能解百藥毒。食巴豆毒泄不止者。

川連一錢煎服立解。凡中砒霜一切毒藥垂死者急用上白糖

靛花淡豆豉甘草等分。研勻冷水調灌即醒。一方掘黃土地

三尺深。以新汲水攪渾。澄清取用解百毒。名地漿水凡解一切毒

藥俱令冷服。大忌熱湯水飲。熱則不可救。若見酒必死。

一湯火傷方。麻油倍白蠟白蜜。先用麻油熬數滾。入蠟溶化。熬滾。

再入白蜜熬勻。候冷刷塗傷處。即能止痛速愈。後並無斑點。若疼急重傷。外敷內服。即可護心。不致火氣內攻。若飲冷水必死。浸冷水中。必爛至骨。一方地榆末香油調敷立愈。

一方急搗蘿蔔汁。或童便服。外用炒槐花研末油調敷立止痛。或爛茶葉敷亦愈。一方尿桶底下爛泥。同井底泥擦上止痛。

乾再敷。一方生大黃末調雞蛋清敷。二三次愈。一方大黃

末四兩。松香末四兩。將松香清水內燒化。傾入涼水內撈起乾。

研用赤石脂白石各二兩共爲細末菜油調塗痛處立止痛而愈

若遇已破卽乾末滲上卽日不痛而結好神效無比。

一治中風不省人事牙關緊閉湯水不入者生南星生半夏猪牙

皂各等分研末少許吹鼻內有嚏可治無嚏不可治。

一治牙關緊閉白礬鹽花各等爲末擦牙卽開。

一中風痰壅或不能言香油一杯薑汁半杯調灌下痰去立愈。

一方用雞子一個去殼香油一兩調勻灌下愈

一 中風痰口眼歪斜生南星兩生川烏生附子各五錢木香二錢爲末

每服五錢薑水煎服虛弱者加人參一錢更妙。

一痰厥氣絕心頭溫喉中噴者神效古石灰老屋者刮去土為

末每服三錢水一碗煎至六分去渣澄清灌下少頃痰下愈

一口眼歪斜白芷獨活薄荷各等為末蜜丸彈子人每服一九細

嚼清茶下。一方棉花子炒黑為末三錢乳香末三錢紅糖四

兩飯後黃酒送下二三次即愈。

一手足拘攣不伸牙皂焙木香各等水煎一二服立效。

一口眼歪斜膏藥蓖麻子去殼研爛左歪塗右石歪塗左一經改正

即速洗去神效。一方新石灰醋調塗法如前立即牽正。

治中風方白礬末二錢薑汁調灌立醒。

中風 中痰

如三十六種風。左癱右瘓。口眼歪斜。偏正頭風。跌撲脚氣等症。服過百粒。卽爲全人。若些小風症。服二三十丸足矣。陰騭文注

紫背浮萍

七月七採晒乾

爲末蜜煉丸。如彈子大。每服一丸。溫酒化下。

汗出卽愈。詩曰。一葉圓圓浮水面。青青背紫根爲線。能醫一切諸風症。欲採須交七月七。晒乾爲末蜜煉丸。紫萍一粒丹如彈豆淋酒下服單丸。跌撲頭上也出汗。耐心長服爲全人。始信仙丹金不換。

人於夏月暑天道路倅倒。不省人事。或稍醒而不能運動者。急扶陰涼乾處。掬道上熱土。放臍間撥開作竅。令人撒溺其中。後

用葶藶嚼爛以滾水和童便送下。切不可灌冷水入腹。卽死。外用布蘸滾水。摩盪心腹臍下。卽愈。

凡人猝中昏倒。不省人事。牙關緊閉。涎痰壅塞。急以大指搯人中。候醒。或用半夏末。或皂角細辛菖蒲爲末。吹入鼻中。取嚏。如口噤不開。以白威梅蘸薑蠶擦之。待少醒。然後可用藥。

凡男婦涎潮於心。猝然昏倒。不省人事。當卽扶入暖室中。扶策正坐。當面用好醋紅炭薰之。令醋氣冲入鼻中。良久其涎潮聚於心者。自收歸舊。輕者卽醒。重者亦省人事。惟不可吃一點湯水。入喉。如入則其涎水繫於心絡。不去必成廢人。

凡男婦奄奄死去。脈動無氣。氣閉不通。名謂尸厥。將菖蒲屑納鼻中。再用肉桂屑放舌下。或剔取本人左角髮方寸。燒灰爲末。和熱酒灌之。立愈。并以竹管吹其兩耳。更妙。

中暑迷悶。嚼大蒜一大瓣。冷水送下。如不能嚼。用水研灌之。路中倉卒無水。渴甚。急嚼生葱二寸許。和津同咽。可抵飲水。

急救中風。凡中風。喉內無聲。口禁不開。兩目耀上。手足冷而身煖。用生薑嚼碎。不俱多少。向面上天庭等處頻擦。又以薑汁滴男

左女右眼角。卽醒。或以白鹽梅擦牙。龜尿滴舌。卽愈。後服十

全大補湯。理中湯收功。

冠按中痰此症似乎中風惟喉內有聲口斜眼閉是爲中痰切勿
用薑若以薑湯灌之卽死如聞薑氣亦不救須用細辛末吹鼻
得嚏卽省或以小便對入喉內或用白鳳仙花沖酒灌之均愈
後服十全大補湯

加入初覺大指次指麻木不仁或手足少力肌肉微掣數年內恐
有中風之證宜預防之惟補中益氣湯六味丸兼服甚妥

半身不遂仙方。細辛白芷川烏草烏川弓白朮當歸各一兩蒼朮

牛膝天麻鱉膠川山甲白花蛇酒浸微炒硃砂雄黃各三錢共爲

細末每服錢半夜臥時熱黃酒送下蓋煖出微汗三四服卽見

效以愈爲度。避風寒。忌發物。

藥酒方。濟世蒼朮兩川椒兩老酒斤共貯瓶內封口。安米在上。

以重湯煮至口上米熟爲度。初飲盡醉。蓋煖出一身汗即愈。

身不遂方。大料豆陳皮當歸五加皮各四兩老酒斤或燒酒浸三

日早晚溫服。口眼歪亦愈。又方白鳳仙花收取陰乾浸老酒

煮熟去花飲酒。半月全愈。碎金

日夜筋骨疼痛方。川烏草烏附子俱用生薑煮過各三兩川椒二兩共爲

末酒糊爲丸。如菜豆大。每服九九。每日早午晚三次空心酒送

下一料可治數人。

七枝煎治年久癩癩並筋骨疼痛槐柳椿楮茄枝蘗艾右煎水
三桶大盆浸洗如冷又添熱水以被蓋出汗避風未愈再洗幾
次神效

中寒猝倒昏迷不醒先用熱酒薑汁各半盞和勻灌服待稍醒然
後進藥。

治傷寒感冒皆可用。生薑一兩打碎葱白七條茶葉撮黑糖三錢水煎三

碗熱服蓋被出汗愈如無汗以葱湯擻之不可太過

治個感風寒芝麻炒焦二兩研末熱黃酒冲服蓋被出汗愈

傷寒時症或只一茶杯水一碗煎一滾卽離火畧停又煎一滾如

此三次去豆入蜜一酒杯調勻溫服如牙關已閉挖開灌之有起死回生之力。

治厥逆腹痛壺吸法用二砂壺各盛燒酒八分重湯煮滾將酒傾去其壺口卽對臍上合住使緊吸之輪換汗出愈。

治傷寒發狂龍膽草爲末鷄子清蜜化涼水服二錢愈。

治時症感冒惡寒發熱身痛頭暈咳嗽一服卽愈。神方厚朴陳皮半

夏白芷桔梗茯苓各一錢甘草五分薑片三寸水煎服出汗愈。腹

脹加腹皮惡心加藿香頭疼加川芎食重加枳殼麥芽

四治湯白砂糖五錢傷寒生薑湯下。傷食山查湯下。傷暑陰陽

水 下 婦人血崩百草湯下

治中濕骨節痛立效常歸桂心元胡天麻等各水煎服愈。

治渾身疼痛透骨丸秘方蒼朮錢五川烏草烏遠志各四錢川椒當歸

人參各三錢為末蜜丸黃豆大早午晚各服五六十顆黃酒下。

治疼痛不能轉側白朮炒一兩好酒煎溫服愈。

治老年筋骨痛鹿茸焙為末陳酒送服三五次愈。

治陰症陰囊縮入手足厥冷腹痛脹滿冷汗大出大附子官桂乾

薑炒黑研末每三錢滾酒調下即愈。

治陰縮方硫黃三錢沖酒服陽物即出。

疝疫敗毒散。凡疝疫皆係大熱之症。不可妄用熱藥。此治天行時疫其症頭面腫大。咽喉不利。舌乾口燥。增寒壯熱。時氣流行。不問四時通治。防風。荆芥。羌活。前胡。升麻。乾葛。赤芍。桔梗。川芎。白芷。牛蒡子。甘草。羌葱。水煎熱服出汗。

疝疫秘方。烏梅七錢。蜂蜜七錢。水二碗煎服立愈。

疝病欲死。苦參乃解疝之聖藥。苦參一兩。水二碗煎。一碗加酒一

杯服之。或吐或汗愈。

疝疫。潮州徐某。遇疝鬼執不放。欲殺鬼。願傳治療方。求放。其方

雷龍四兩。飛金廿張。硃砂三錢。明礬一兩。大黃四兩。水法爲丸。每服三錢。愈。

治大頭瘟神方散花錢酒杯雞子清個攪勻服甚效

一方貫眾三錢葛根二錢甘草錢半白殭蠶錢黑豆十粒水煎服。

治一切瘟疫時症傷寒感冒不論已傳未傳百發百中有力者宜

修台以濟人陰德最大名救苦丹秘傳天麻麻黃松羅茶菜豆

粉各一兩雄黃硃砂甘草各八錢生大黃二兩共為末蜜煉丸彈子

大收磁器內勿洩氣遇症大人一丸小兒半丸涼水送下出汗

即愈重者連進二服無有不愈未汗之時切不可飲熱湯熱物

汗出之後不忌

治天行時疫取初病之人衣服於甌上蒸過則一家不染

治大頭瘟神方散花錢酒杯雞子清個攪勻服甚效

過一切瘟疫。生大黃室內燒之。并作扇墜各物。佩身可辟穢。

一方管仲浸水缸內。加白礬少許。日逐飲之不染。一方赤小豆

不拘多少。新布袋盛放井中。浸兩日。取出。合家各服二十一粒。

卽不染疫。一方蒼耳葉陰乾為末。冷水調服亦不染。

瘟疫疔腮。赤小豆末。鷄蛋清調搽愈。或井底泥塗數次愈。

時疫不染秘方。蒼朮三錢 川芎八錢 乾葛一錢 甘草三錢
分三厘 五分 分六厘 六分

厚薑片六厘 連鬚葱三枝 水二碗煎八分空心服。已病愈。未病者不染。

也。又方黑豆一握。每日五更投於井中。勿令人見。凡飲此水

之家俱不傳染。

辟禱瘟疫方正月朔旦面東以齏汁吞赤小豆三七粒一年無病

立秋日面西并華水吞七粒不犯痢疾

又方虎頭骨藜蘆吳茱萸南星皂角雄黃各二錢木屑二合酒浸晒乾

共為末蜜丸小彈子大焚一九辟邪已染之家焚一九床下即

平安宜多製施送其德不小

一方凡人病家雄黃擦鼻內或飲雄黃酒一杯所至不染

治一切痰飲主方陳皮白茯苓各一錢半夏二錢甘草五分生薑片三水煎

熱服痰壅火動薑汁半杯沙糖兩匙滾湯下

治痰壅盛四汁膏雪梨汁一鍾薑汁白蜜各半鍾薄荷三兩和勻重

湯煮十餘沸。任意服。降痰如奔馬。

消痰潤肺。貝母末和沙糖爲丸。噙之止嗽。

諸咳嗽聖藥。粟殼四兩醋炒杏仁二兩五味一兩焙乾。枯礬五錢共爲末。每服

二錢。白滾湯下。神效。

久嗽痰火氣急哮喘肺痿聲啞。百花膏雪梨四兩生薑一兩共搗汁

去渣。加蜜四兩共煎數沸。入磁器內封固。不拘時服。無病亦可服。

最能滋陰降火。忌蘿蔔。

老年久嗽不能卧。猪板油米糖蜂蜜各四兩熬成膏。時常挑一匙

含化。三五日卽止。

治痰嗽吐血大蘇膏一個去頂內挖空入米糖滿原頂蓋好黃泥包裹煨熟服之神效。

治久嗽甚至四五十聲者。薑汁半杯蜜二匙同放茶碗內煎滾溫服三四次愈。

治癆嗽方次冬百合煎服。或熬膏服神效。

治一切咳嗽甜梨一個刺四十九孔。每孔每白胡椒一粒。麵裹煨熟。待冷去椒食梨即愈。

治氣喘如神蘇子白芥子蘿蔔子等各水煎服立愈。

治痰火喘嗽神方。蛤蜊殼洗淨炭火燒焙莫燒過性燒出氣味响炆放地上去火毒為末磁器

痰火喘嗽

三

二

收貯遇痰火症取一兩分爲三服。少吃晚飯。先用麵糊調捏丸。如黃豆大。少用滾水將丸藥二三口吞下。旋丸旋吞。不可放乾。纔吞下咽痰卽隨丸而下。真仙方也。

治哮喘用風茄葉搗水。用二黃紙拖隨晒隨乾。以水乾紙燥捲筒。作烟吃卽愈。

石虛哮喘熱傷暑而發。並鹽哮喘酒哮喘皆虛哮喘也。麥冬三兩桔梗三錢

甘草二錢水煎服一劑卽愈。不必加去痰之藥。加則不效。

石實哮喘遇冷氣風寒而發。爲實哮喘。百部各二錢炙草各二錢桔梗三錢茯苓三錢

錢半夏陳皮各一錢水煎二服卽愈。熱哮喘加元參三錢寒哮喘加乾

薑錢鹽哮喘加飴糖錢酒哮喘加柞木錢

治痰火哮喘飴糖二兩豆腐漿一碗煮化即服愈

瘧疾三方不拘陰陽一日三四日及非時瘧人無老幼病無論新

久按方依次服之應手而愈切勿增減藥有首功有後效故分

三方而第二方實為主不刻削不峻補而功獨歸之

第一方陳皮半夏製茯苓威靈仙各錢蒼朮未泔浸炒厚朴羌汁炒柴胡黃

芩各八分青皮枳榔各六分羌片三片用河井水各一盞煎八分空心服

如頭痛加白芷錢一無汗加麻黃錢一只服一煎後去之此方平胃

消痰理氣除濕有疏導開先之功輕者兩劑即愈若三劑後病

雖減而不愈必用第二方

第二方。生首烏三錢陳皮茯苓柴胡黃芩各八分白朮炒當歸威靈仙

各一錢炙草三分鱉甲醋炙知母各二錢薑片三錢河井水各一盞煎熟入酒

半杯煎數沸空心服久瘧加蓬朮一錢此方補瀉互用不用參芪

屏去常山草果平平無奇却有神效即人弱症重十劑立起切

勿早用參芪須俟瘧疾扶元再用三方貧家只用此方多多益

善

第三方人參一錢黃芪炙歸身各錢二分白朮炒陳皮八分炙草三分柴胡八分

升麻四分或加麥冬一錢青蒿子八分此二味臨時酌用生薑片棗二枚

水煎牛饑服二三劑元氣充實愈

治瘧十日後效常山酒煮知母貝母草果各錢五分水煎臨期之日五

更熱服即愈切勿加減

治久瘧一服便止永不再發常山錢半檳榔錢一丁香五分烏梅一個藥同

炒熱沖酒一盞半滾三滾取起露一宿次早溫服愈

治瘧不論新久虛實寒熱一服立愈番木鱉去壳炒雄黃硃砂黑色一兩

甘草各錢共細末每服四分將發預先吃飯一碗將藥水酒調服

蓋被出汗即愈

治瘧單方沙糖四兩燒酒斤半盪滾盡量飲之愈須瘧臨來時飲

截瘧奇方。川貝半夏各等分研末炒如小龍眼大收貯。臨期先一

時羗湯化下。解茶水二三時。

又方狗毛焙灰。水冲服愈。

治利疾初起方。橘餅一兩冰糖五錢煎茶服一時即愈。

治水瀉立止。安化茶冰糖碎冲服。一方大蒜頭貼臍下。並兩足

心立止。

治紅白利方。山茶炭五錢紅糖開服。白利加橘紅木香各三錢

治不論紅白新久利方。櫻粟花連壳七個龍眼七個黑棗七個冰糖二錢水二

碗煎服立愈。

治和仙方生菴五錢紅陳茶五錢白冰糖兩水煎隨意溫服逐口

可食並無姑碍。菴以和陽。茶以和陰。能消穢惡。且解濕熱。及酒

食暑氣之毒。不拘紅白皆宜。

治噤口痢不飲食。用梅水少許放舌上。即開胃。

久痢不止。或噤口利病勢欲絕者金色鯉魚一個約一斤餘如常用鹽醬必加

胡椒末三四錢。煮透盛於病者前。令嗅吞氣。欲食即令隨多少

食之。和湯連肉一飽。即除根。此方屢效。久利更宜。

治血痢不止。白痢俱效。乾菴燒黑為末。每服一錢。米湯下。

治水瀉不止。巴豆一粒胡椒七粒為末。和丸。冷茶下。一夜即止。

治痢奇方。鷄冠花酒煎服。紅痢用紅花

治久血痢。烏梅一兩去核燒灰存性為末。每服二錢米湯下。

治水瀉不止。枯礬錢一丁香分五為末。黃酒調服立止。

治泄瀉肚痛。生薑淡豆豉胡椒各三錢少水煎熱服立止。

治噤口痢兼治反胃。沙糖生薑各四兩烏梅十五個去核。共搗爛以滾湯

調勻頻服。

治霍亂吐瀉垂死。但有一點胃氣存者。服之回生。選方霍香葉疎

皮各五錢水二杯煎八分。時時溫服愈。

治中暑霍亂。菜豆粉白糖各一兩新汲水調頻服愈。

治乾霍亂神方并花水和百沸湯各半杯名陰陽水加白礬二錢

服立愈。一方大蘿蔔梗葉搗汁。冷熱各半。一飲而愈。一方

搗韭菜汁半碗。重湯燉熟服立止。一方古石灰古塔城墻取三錢冷

水攪勻澄清去渣調沙糖二錢服愈。

治絞腸痧腹痛蓋世奇方。水葡萄桃頭五寸長三十根沙糖四兩水煎溫服。

一方同上難辯之症。白馬糞入少水絞汁半碗灌之立愈。

治一切霍亂立愈方。葱七枚搗爛黃酒沖服極效。

治霍亂不得吐瀉食鹽炒一兩牙皂一錢水煎服吐即愈。又方用鹽

一大撮炒黃人童便溫服。少嘔吐出愈。又方羌汁人童便溫

服吐出然後進藥切不可與米飲人口即死必待吐瀉過三三時饑甚方可與稀粥慢慢調理

治霍亂吐瀉神方五爪龍草三洗淨聽用先將梗米一合炒後入黃色

五爪龍草同炒又加水一碗滾數沸去渣溫服半時即愈

治嘔吐之聖藥生薑碎一兩半夏五錢水煎加橘皮徐徐服之

胃冷惡心丁香一錢豆蔻三錢研末每服五分酒下立愈

胃熱嘔吐黃連羌炒一錢石膏火煨二錢為末滾水下

治服藥即吐百藥不效伏龍肝為末水丸塞兩鼻遂不可吐神效

治噎隔反胃食不能下仙方鴨肫皮數十個乾微炒為末每早燒酒送下

六分頻服愈。一方用桑樹下絲瓜藤纏在樹上生的聽其老

俟經過霜雪後取下收貯。遇有此症。煨灰存性。黃酒或滾水送

下一錢久服即愈。一方雪梨一個丁香五十粒梨內濕紙包裹

四五重煨熟食之愈。一方蘿蔔浸蜜煎細細嚼嚥良

治膈氣神驗壁虎一條雌雄各一名壁蛇先脩竹筒二個內置香油入虎浸

一宿在瓦上慢慢炙脆研末每一錢加射香三分每服只用一分

二厘作三次服下初次五厘二次四厘三次三厘燒酒送下即開關後

吃稀粥三五日方可吃飯初起者一服久者二服全愈

柿餅飯反胃神方昔一人三世死於反胃者得此方愈柿餅雜乾

飯內同蒸吃。不用水，亦不用他藥雜之。旬日而愈。又方乾柿三枚連蒂搗爛，酒沖服，甚效。勿以他藥雜之。

生鵝血治噎膈。武昌小南門外猷花寺僧自究病噎，百藥不效。臨歿，謂其徒曰：我毒懼此患，胸臆中必有物爲祟。逝後剖去，殮我感汝等入地矣。其徒如教，得一骨如簪，取置經案。久相傳視，後適有戎帥寓寺宰鵝，未斷其喉，偶見此骨，取以挑刺，鵝血噴出，而骨遂消滅。自究之徒亦病噎，因悟鵝生血可治。數飲，遂愈。後以此方授人，無不驗者。

治男婦痞積，鷄蛋五個，阿魏五分，黃蠟一兩，桐杓內煎化，作十塊，每早吃。

一塊滾湯下或腹痛解出如膠漆之物自愈

治多年痞積至重兩張立消膏藥蜜陀僧五兩阿魏五錢羌活水紅花

子各一兩麝香五分香油斤許火候照常法熬膏貼

又無價寶膏吳椿樹皮內肉打碎煎膏貼患處痞行追貼自消不

復發。一方斬艾獨蒜川山甲入鹽為末米醋搗成餅量痞大

小貼之兩炷香久化為濃血從大便出。

治酒蟹方蟹要吃酒攻上心來取白馬溺飲之即化為水除患

治鼓脹神效臨危亦可回生黃牛糞男用雌女用雌陰乾微火焙

黃為末一兩酒三碗煎一碗濾去渣飲酒三服全愈

治氣鼓神效。砂仁兩搗蘿蔔子濾汁浸一夜炒乾浸晒七次爲末。

每服一錢米飲下立效。一方一服全消仙方。皮硝黑糖各四兩

用碗頓數滾澄清去渣滾黃酒冲服。盡量爲度。

治男女頭面浮腫肚腹脹滿上氣喘急千金不傳秘方。沉香木香

乳香沒藥各三錢琥珀一錢白丑生用頭末八錢黑丑用牙皂浸過焙半生半熟八錢棋榔

牙皂浸透半生熟一兩研末。牙皂水打糊爲丸。梧子大每服二錢七分五

更時沙糖煎湯送下。一方猪肚一具入蒜頭四兩煮爛連服

五六個愈。

治腹脹神方。西瓜一個切去頂剗去穰三成入蒜泥滿將蓋蓋上。

用粗綿紙數層裹住放新砂鍋內上用砂鍋蓋住炭火圍蒸七
炷香取起先吃蒜瓜湯早吃午即舒氣隨吃隨便若係水腫即
不住遺愈。水蠱葫蘆蒲燒灰酒冲服。一方洋桃五六枚蜜
蒸或熟猪板蒸服九日全愈。

治水腫腹大遍身浮腫仙方。腫在腹為水腫分別治之紅

棗三斤大戟一斤水煮一日夜去戟用棗晒乾食之立消。一方土

狗一名蝮蛇焙乾為末温酒吞下愈。用上半截即消。上身之水。下半截消

下身之水。左可消。右可消。右方士以此為奇。

十種水病神應丸。一清水先從左右肋腫起根在肝大戟。二赤

水先從舌根起根在心葶藶子。三黃水先從腰肋起根在脾

炒甘遂。四白水從脚腫起根在肺桑白皮。五黑水從外腎

腫起根在腎連翹。六玄水從面腫起根在外腎菟花。七風

水從四肢腫起根在骨澤瀉。八石水從腎腫起根在膀胱藜

木。九高水從小腹腫起根在小腸巴豆。十氣水或盛或衰

起根在腹大腸赤小豆看病起根除一味倍多餘九味等分焙

末爲丸蜜煉梧子大赤茯苓煎湯吞三丸不拘時每日三服愈

後服養脾散

養脾散方。肉桂乾羌肉蔻赤茯苓莪朮川芎桔梗各爲末每服三

錢白湯下。早午晚各一服。此二方醫廢無效。百發百中。

治黃疸秘方。地骨皮三兩砂仁一兩黑棗四兩去核砂仁藏內分四劑。用水二碗

煎七分露一宿。五更熱服。深者三服必效。

治三十六種黃病。雞子一個連殼燒灰研細。醋和溫服。鼻中更出

為效極黃者三服必愈。

治黃疸眼與週身黃如金色者。絲灰根五六根搗爛。水一碗煎八分

黃酒沖服即愈。

治黃胖秘傳方。紅棗一斤煮去皮核雞肫皮十個焙乾為末皂礬一兩為末。二味用米

醋一碗煎乾。研細。人棗搗丸。菜豆大。每三十丸。黃酒下。

治聖痘多死。黃瓜根絞汁空心服。當有黃水從小便出。能愈未出再服

治黃疸用活小金魚一條。豆腐皮包熟酒吞下。每日一條三日愈。

治癆症嗽帶血驗方。貝母冰糖各二兩。每早用三錢白滾湯調鷄子

清一箇同服最驗。一方欵冬花百合蒸焙等分為末蜜丸龍眼大

卧時嚼一丸薑湯下。

癆嗽神方五汁膏。蜂蜜羌汁各四兩。白蘿蔔汁梨汁各半斤。人乳一碗

共熬成膏早晚滾湯服數匙。二料除根。凡吐血各症飲童便

者百無一死。飲寒涼者百無一生。童便吃乳兒者佳。截頭尾不

拘時早晚服。以病愈為度。

治久嗽癆病神方健豬肺照常洗淨少放湯煨極稠爛少放些醋
油醋蓋好次日五更病者不會說話時着入用開水頓熱吃下
再睡一覺次日又復如此一肺可分兩三服重者不過三四肺
全愈應驗多人最忌說過話則不靈又好下飯

同生膏凡虛火旺消補兩難服此神效人乳男女用胎乳藕汁白

蜜甜酒漿童便後入各一碗煎膏滴水不散每早空心白湯下半盞

病深者多服全愈忌服寒涼藥食不救

治諸血症極效方韭菜連根搗爛入童便在內用布絞去渣重湯

煮熟澄清者飲之立止

齊世... 癆症 吐血

吐血不止方。當歸二錢。川芎錢半。官桂三錢。水煎服立止。

治虛勞吐血。肥猪肚一具。入江米一盂。茶線縫嚴蜜。煮極爛。連湯吃數

次即愈。

吐血良方。生地二錢。藕節五錢。茜根錢半。柿餅二個。共煎湯常服愈。

痰癆重法。用濕紙條貼背脊上。先乾者即癆重處。以墨點記。用艾

多灸。先脩火盆鉄鉗。如重出即鉗付火盆內。怕飛入人口鼻內

要謹防。一法先用絲兜罩住病人口鼻。其重出不能逃矣。速

付火盆簡絕。

治癆怯妙法。凡男女患一切癆怯。但有脉有神者。無不應效。用上

鑽頭砂兩透明雄黃五錢

錢共爲末單層綿紙包固選未曾行經十

二三歲壯實童女將藥貼在女臍內汗巾檢縛一週時取下秤
藥比前重三錢餘者更妙。卽拴於病人臍上須先備人乳十餘
碗候病人口乾與乳飲之渴止乳亦止然後解下藥其病自去
再用調理十人九活。

治虛癆神方。此專治氣血兩虛骨蒸癆熱精神怠倦飲食不進以
及陰虛吐血咳逆一切弱症。輕者二三料全愈。重者四五料除
根卽無病亦可常服可保神健身強。且極易極應。子得之異授。
見者廣傳。功德無量。枇杷葉五六片鮮者更佳。凡咳甚者多加。若無咳不必用。大梨二個

肺痿者佳去皮心切碎蜜半鍾先熬滴水成珠大便乾燥者多加瀉者不用加大棗兩建蓮肉四兩連皮

先將枇杷葉放銅鍋內或砂鍋河水多煎幾滾取絹攪清汁葉

不用後將梨棗蓮蜜同放鍋內鋪平。又放枇杷葉汁淹過面。蓋

好煮半炷線香翻轉。再煮如此久。用磁罐收貯。隨熱食。咳嗽

多痰者加川貝一兩研細俟煮熟時入內再一二滾取起。若吐血

用藕節汁同煮。冬月多製。久收不壞。夏月惟供一二日食。

諸品不拘時候頓熱取食且可口多食不厭。最與臟腑有益較之

茶食蜜餞佳勝多矣。

吐血成斗命在須臾。貫眾五錢黑頭髮瓦煨研側柏葉搗汁入末

於汁內隔湯煮一炷香久取起加童便黃酒各一杯飲之神效

一嘔出全是血此從胃中來。韭菜茅草根藕節側柏葉荷葉以上

五味或全用。或隨使用。俱取汁磨陳京墨五六分加薑汁三四匙冷

服寒天溫之。如無好墨。用童男剃下頭髮洗瓦煨篩調汁服俱

效。一先發痰咳後吐血此乃肺中積熱。生地白芍桑白皮地

骨皮各一錢水煎取蘭花根搗汁冲服氣急加蘇子二錢炒研服

一先發吐血後痰嗽嗽出血絲或米大血粒。此乃陰虛症。生地二錢

痰多洩瀉者減半白茯苓山萸肉丹皮麥冬川貝山藥青蒿枸杞各一錢

澤瀉一錢遺精小便多用三四分五味三分驚甲三錢醋炒蘇子二錢水煎服熱盛者

血 弱血

加犀角磨汁一匙和服陰火盛加龜膠錢一此症忌用半夏白朮

羌桂之燥熱更忌黃芩黃連之苦寒凡吐血者以水盃盛看

浮者肺血以羊肺蘸白芨末食沉者肝血以羊肝蘸食半沉浮

者心脾血也以羊脾羊心蘸食白芨用微火焙研經云喉不停

物毫髮必欬血既滲入愈欬愈滲宜童便以清利之日飲不間

并自戒葱蒜臭濁之物又戒房事則小便自清去其頭尾日飲

二三次久飲除根百試百驗幸勿遲疑誤事

治衄血不止方麥冬生地各五錢水煎服立止一方胎髮燒灰存性

梅焙一研末吹鼻立止一方不令病人知口噙冷水忽然

噴其面立止 一方新汲水隨左右洗足即止 一方生蘿蔔

汁入塩少許和酒服三盞立止

治吐血咯血大能潤肺止咳

咯血出於腎痰帶血絲者是

天冬一茯苓杏仁貝

母甘草

各五錢

為末蜜丸芡實大每服一九口中嚙化日夜可服

十丸并吃六味湯尤為神效

一方猪心

一個用銅刀劈開洗淨

血切薄片加好硃砂

文三甜酒杯

重湯蒸爛淡食重者六七個愈

治患臟毒便血溺血神效柿餅

燒灰

為末米湯下二錢一服即愈

又方黑豆

二合炒焦

研末熱酒淋之去豆飲酒立愈 一方木耳入猪

大腸內者爛食愈

一方荆芥砂仁研末蓮草湯下愈

治火症便血。百合二個煎湯代茶。一週時卽止。切勿用糖。

治熱毒下血。藕葛根各搗汁一鍾和服。

一腸風痔漏下血。香白芷爲末。每服二錢。米飲下。

一大便下血秘方。縮砂仁二錢爲末。米飲熱服。一方雞冠花並子

炒爲末。酒下。一方劉寄奴爲末。空心茶調下。二錢愈。

治溺血覺林痛不止。神效。川牛膝五錢水煎。早午晚每日三服。

治血淋秘方。地骨皮五錢酒煎服。一方核桃一個芝麻一合研滾水下。

一方車前草搗汁一碗。入酒空心溫服。一方馬齒莧搗爛滾

酒服愈。一方茅草根煎湯頻服皆愈。

治自汗盜汗神方自汗屬陽盜汗氣血兩虛當歸黃芪炙 棗仁炒

各等水煎服立愈。

治諸汗。牡蠣煨 小麥麵炒 研末猪胆汁調服。一方枯礬研末睡

調塞臍中以膏藥封之即止。一方白礬煎水洗去脚汗。

一方白芷或何首烏研末調塗臍即止。

一驚悸心膽虛怯晝夜不寐百方不效此方如神人參錢一 石羔錢三

陳皮半夏 製 茯苓 枳實 麥冬去心 棗仁 甘草各錢半 龍眼五箇 煎服。

治不寐方。人參錢三 乳香錢三 硃砂兩各三 棗仁炒黑 為末蜜丸彈子大臨

卧時龍眼湯下一丸。一方臨卧時含上白糖一酒杯緩緩潤

下切不可吃茶水。不寐因心神不安白糖能凝心心神定故得寐一方燈草煎茶服

治風狂痰迷心竅方。蛇含石二兩醋淬七次以酥為度黑雄猪胆為丸芥子大

每服五分一錢為止十餘服即愈再服後方。

寧神飲方。茯苓陳皮瓜蒌各八分黃芪遠志杏仁各六分半夏貝母各錢

甘草五分薑片水二鍾半飽服心熱加麥冬黃連

治顛神方。一婦患顛十年二服全愈鬱金七兩明礬三兩為末糊丸黃

豆大每十九滾湯下。或竹葉煎湯服亦可。

救驚怖死者。用溫酒一兩盃灌之即活。

呂祖治顛仙方。扶乩所授莫說顛來莫說狂今朝留下草頭方。香團葉

是驅痰蕪梧桐枝名降火痰竹葉木瓜皆有益金萱黃菊兩無傷撮來件件俱仙餌一笑天然樂壽長。

治猪羊顛風常時跌倒不省人事二服全愈皂礬紅魚鱉切碎麵

鉛粉炒黃各兩硃砂三錢研末每服三錢空心酒調下即愈真仙方也

治羊顛風仙方川貝母去心八兩研粉用羅篩過鋪大草紙一百張一

層草紙篩一下百張篩百下然後用線連之分四帖蒸煮乾收每遇病取一張槎成團空心滾湯下即愈

治三消病食橘餅滾水下除膈止消又菜豆研煮飲止消

一方市門瀉坑中水擇清者取一盞令服三五次愈最效勿令病

人知。一方天花粉水煎當茶飲立效。

治赤白濁秘方。木通七錢滑石三錢粉草四錢黃荆子二錢水煎空心服。

一方蓮肉白茯苓等為末滾水調服即愈。一方側柏葉煮二三

滾搗汁。用雞蛋清蜜半酒杯攪勻。服三四次愈。一方威酸草

搗汁酒漿沖服數次愈。

治男子失精女子夢遺最效。白芍酒炒龍骨均牡礪均桂枝各炙草三

惠三枚水二杯煎八分服。

治失精暫睡即泄韭菜子炒二兩白龍骨四錢為末每二錢空心酒下。

治夢遺不止石蓮肉六兩甘草一兩為末每服二錢燈心湯下。

治諸淋車前草或煎湯或搗汁服最效
久淋不止剪金花十餘

葉煎湯再服即瘥。

土

治小便頻數。葷煎湯服永不夜起。
又益志仁二十四粒人塩同煎服愈

血淋白帶香附二錢龍骨牡礪石蓮臭椿皮各四錢共為細末每服二

錢石斛湯下。

治大小便閉神方。此症乃氣閉。非大小便不分也。家傳秘方。曾治

多人。醫家以澤瀉木通車前等投之。全無一效。當歸一兩川芎五錢

柴胡升麻各三錢水二碗煎八分。一服即通。

大便不通。猪胆剪開。套筆管入糞門。大便即出。米湯止。

小便不通。猪苓、澤瀉、木通、甘草、節各三錢水煎服愈。一方白菊花

連板葉搗汁冲酒服立通。一方猪胆投熱酒中服之。一方

大蘿蔔英搗汁入蜜少許黃酒冲服。一方車前搗汁入蜜少

許冲酒服俱立通。

治大小便閉方。大蜣螂六七月間牛糞中尋用線穿起陰乾。取全者放磚上

焙之以刀從腰切斷。如大便閉用上半截。小便閉用下半截俱

閉全用。研末新汲水送服神效。

治大臍實熱不通。大黃皮、硝牙皂各等水煎服立效。一方當歸白

芷各等研末每二錢蜜湯調服。

治年老大便閉澁不通火麻仁

一音研芝麻浸取汁桃仁

荆芥穗

炒各一兩

人鹽少許同煎服立通

治老幼脫肛神效石榴皮萬年青

各二錢

煎湯服

一方瓜子殼煨

三錢研末老酒下

一方冰片

分一

大田螺

一個

將冰片入田螺口

內去尾化水用杯接住其水用鷄毛刷之即收仙方此症多主

氣虛用補中益氣湯加咸爲最

一方羌汁蜜和勻雞翎掃上

即收。一方生南蛇油塗上即收切不可塗着別處若遇龜頭

即縮而不出矣慎之

治徧正頭風百藥不效一服即愈天下第一方白芷

炒二兩半

川芎甘

草草烏牛生熟各一兩為末每服一錢細茶下。一方香白芷酒洗為末

蜜丸彈子大清茶或荆芥湯下仙方。

不論偏正遠近白芷川芎各五錢為末酒煎盡量飲睡後酒醒其患

若失。一方生蘿蔔汁一蜆殼冰片少許仰卧隨左右注鼻中。

昔三荆公病此。道人傳方效以治人無不愈者。一方兼眼

花鵝不食草二錢川芎錢半青黛五分冰片五厘共研細末代鼻烟用。

一方馬齒莧煎滾以氣薰鼻左痛薰右右痛薰左即愈。一方首

烏三錢土茯苓一兩天麻當歸防風各二錢煎服即愈。

又偏正頭風膏藥白附子草麻子去殼各等搗成餅貼患處一週時永

不再發

治頭風如雷震者惟此立愈。山羊糞炒研末酒送二錢愈。一方

生薑三大片。濕紙包煨熟貼兩太陽印堂以帶纏之立愈。

治頭眩昏倒。生白葉二去殼搗爛滾水沖服三五次斷根。

治而紫風刺癢疹。硫黃枯礬各入蜜調塗愈。而上忽生紅黑丹如

疥狀不急治遍身卽死。鹿角燒存性爲末以猪胆汁調塗愈。

一治雀斑秘方。猪牙皂紫背浮萍白梅肉各爲末每洗面時擦洗

其斑自落神效。面皮黑炮白茯苓末蜜調敷。抓破而皮生薑汁

調輕粉末敷之無疤痕。一點志巴豆七粒石灰等分爲末以鹹

鹵浸藏糯米於灰內候米爛將瘡用針撥破以米膏點之三次
愈 一方鹵鹵點石灰照上法三次自落

治眼赤腫痛不可忍二劑愈當歸川芎生地赤芍羌活防風各一錢

薄荷白芷生大黃各八分燈心竹葉煎臨卧時服血熱痛甚加龍

胆草石膏白睛紅障加桑白皮菊花蟬退木賊。

治火眼并老年紅花仙方皮硝六錢桑白皮八分水盪半煎八分冷定

洗眼每日數次眼如童子。一暴發火眼牙猪胆一個白礬二錢

胆內陰乾點之仙方。一方六味湯加白蔻殼煎服立愈。

治熱眼煎藥方防風去風羌活去風黃芩涼脾黃連去赤腫白蒺藜各八分

去翳障 鬱金各八分 石藥各等分 水煎飯後服渣再煎。

治去翳神效 麩仁二兩 油一錢 硼砂一錢 麝香二分 研勻收貯乳點。

治青盲眼可以復明 雄鼠胆 鯉魚胆各二枚 和勻滴之立效。

一時眼方 羌活六錢 黃酒煎服次早愈。

一眼昏花 羯羊胆一個 蜜灌調勻陰乾用時取一粒磁盞內水化開

點凡患眼疾切不可用冷水洗洗則難愈。

治七十二眼症 千金不易仙方 當歸 知母 菊花各八分 亦芍 連翹 防

風 荆芥各七分 川芎五分 兩大背 紅加黃連 梔子各八分 上眼泡 紅加

桃仁八分 枳殼七分 青珠有障加胆草 柴胡各七分 眼目昏花加黃栢

八分知母七分心熱小便不利加木通八分滑石錢半大便結實加枳殼

八分大熟地三錢朴硝一錢眼目紅腫加羌活七分白芷八分眼痛有疾加

貝母花粉各七分唇爛口臭加石羔二錢頭痛加白芷藁本各七分熱

淚不止加木賊草七分脹悶加枳殼八分酒毒加乾葛八分內障加蒙

花草決明各八分咽喉痛加桔梗元參各七分有翳加白蒺藜蔓荊

決明各七分右藥如遇前症照方煎服重則數劑愈。眼皮生瘤

櫻桃核磨水搽自消

治耳聾頂大田雞入黃豆羌汁老酒蒸食即愈

治耳聾奇方巴豆一粒斑貓三粒射香冰片各三厘為末以葱汁蜜糖和

稔如麥粒形新棉裹置耳中響聲勿驚二日之後出黃水愈詩

曰。一豆三斑不去油射香冰片少同投葱蜜爲丸麥子大不痛

不癢不須憂若是此方無應驗罰做人間馬與牛。一方大蒜

辨一空巴豆一粒去皮膜火炮極熱新棉包塞耳中三次愈。

又方三石丹此方有理硫黃雄黃磁石川山甲各爲末篩過絲棉

裹塞耳中口內噙生鉄一塊數日立愈。

治耳痛濕或血濃者蛇退末吹入立愈。一方髮灰末吹入立愈

一方腫痛葱白汁滴入愈。一方痛不可忍者磨鉄刀水滴入愈

一方濃水不乾礬末吹入神效。

一治百虫入耳夜間向燈虫見明卽出。人須遠避見人則不出矣。

一方葱汁或香油滴入耳卽出。火熨桃葉捲塞耳立出。

一蜈蚣入耳以雞肉置耳邊卽出。或葱汁韭菜汁滴入亦出。

一蜒蚰入耳羊乳滴入卽化爲水。耳癢燒酒一點洗之卽止。

諸虫入耳用猫尿滴入其虫自出。用生薑擦猫鼻卽尿。

治鼻不聞香臭桑白皮炒八錢水煎早晚溫服自愈。忌椒辛魚腥。

鼻流濁涕白鼻淵白芷一兩蒼耳子炒辛荑各二錢半薄荷五分共末葱汁

調食後清茶服。

鼻出臭濃曰腦漏鯉魚牙煨研雲苓一兩每早服三錢酒下愈。

鼻中長出一塊曰鼻痔輕粉二錢白礬一錢杏仁七錢去皮為末吹鼻中化

為水。一方白礬一兩蓖麻子七粒烏梅五個麝少許研末絲綿裹塞鼻

為息肉自消。

鼻中忽長一毛漸長痛不可忍曰倚痛毛桐油點即落。

血熱入肺為酒瘡鼻連翹四兩炒為末每早服三錢清水下。

治酒瘡鼻并治婦人面上粉酒刺友硫黃一錢輕粉三分杏仁十四粒去皮尖

共為末作膏臨臥時塗鼻早洗去。一方鹽常擦自愈。一方

雄黃鉛粉各一錢硫黃五分為末乳調塗次早洗去三次愈。

治疳爛通鼻孔鹿角煨白枯礬各一兩髮灰五錢為末先用花椒湯洗

淨搽藥於疔上三四次愈如不收口。瓦松燒爲末搽神效。

治鼻中生瘡搗杏仁乳汁和敷之。鼻癰乾羌末蜜和塞愈。

治口瘡方生錢一硃砂五爲末敷上立愈。又五倍子焙末搽愈。

治唇瘡日久不瘥藍葉搗汁洗數次愈。一方氣鬱生瘡用甌上

滴下汗敷之如神。此法兼治見疔神效

治舌腫神方。舌猝然腫硬咽喉閉塞卽時氣絕。用皂礬錢五瓦焙紅

色放地上冷研細末將病人用鐵鉗拗開牙藥擦其舌卽活。

一方蒲黃乾薑各爲末搽之卽愈。

治口舌生瘡吳萸末醋調塗脚心效。舌無故出血槐花炒末搽

之立效。一舌長數寸者木鱉四兩刮淨毛切片川連四錢水二

碗煎至一碗將舌浸良久即收。一方研冰片敷之即收。

治口臭枯槁末人麝香少許擦牙其臭自止。一方嚼之麻吃

一方嚼白醋一口洗咽。

治牙痛神方詩曰一撮花椒水一盞細辛白芷與防風濃煎漱齒

三更後不怕痛牙風火虫。一方火硝錢冰片雄各一分元明

粉五分共末擦患處立愈。一方六味加破故紙煎服愈。一方

青鹽五錢淨黃泥裏煨一刻取出再用川椒去核共研末擦患處

立愈永不復發。一方圓眼一箇開一小孔將食鹽裝滿炭煨

研細擦牙立愈。一方書符時口念十二地支念完書完不可

先後神效驗

治風火牙疼立止千金不傳方。細辛三分青鹽四分丹草丹皮青皮各六分

石羔煨防風各七分荆芥五分水煎服。又方生地丹皮石羔煨

青皮防風生甘荆芥石藥七味各等。照後加減。上左盡根牙痛

屬胆加羌活龍胆草各五分下左盡根牙痛屬肝加紫胡梔子各五分

上右盡根牙痛屬大腸膀胱加大黃枳殼各五分下右盡根牙痛

肺加黃芩桔梗各五分上前門牙痛屬心加黃連麥冬各五分下前門

牙痛屬腎加黃栢知母各五分上門牙痛屬胃加川芎白芷各五分

下門牙兩傍屬脾加白朮各五分

治牙痛神方雞肫皮煨黃青鹽各錢細辛川椒各五分為末擦痛處立止。

一方乾薑兩雄黃三錢為末搽之立止。一方巴豆半粒塞牙縫立止。

治牙防結核生蘿蔔皮貼數次愈。

治跌打牙動痰熬根燒灰貼痛處即牢。

一牙根出血曰牙瀉草決明煎水噙之或苦參枯礬末各等擦之。

治走馬疳腐爛人中白錢銅綠三錢麝香五厘研末敷愈。一方砒霜。

粉霜二物先研極細石灰羅過次研等分拌勻研干下極細膩。

每以雞羽尖挑半米許掃瘡上即斂慎勿多用。

小兒走馬疳方

口臭牙上爛流涎未長下如羊鬍鬚瘡卽此病也

巴豆

一粒研末

雄黃爲衣

用膏藥貼眉心一日夜揭去痛立愈。一方石菖蒲磨涼水常

漱洗愈。一方大紅棗去核人中白填滿棗內綿纏火內燒焦

爲末入麝厘擦之立愈大小人俱宜。

無痛常擦固齒方生石羔生礬

各等爲末

用指擦牙甚妙。洗齒必於

晚間漱齒須於飯後妙法宜知。

秘傳固齒烏鬚髮仙方槐角子

炒

地骨皮

炒

青鹽大熟地補骨脂

炒香首烏製

沒石子

煨

骨碎補

七毛名一兩

北細辛熟大黃

各二錢

百藥

煎一錢共爲細末每清晨擦牙用滾水嗽二百遍嚥下不可間斷。

其鬚目內黑出此方珍之

治落牙法離骨散詩曰白馬牙與紫玉簪百足蜈蚣首尾全麻黃
等分共爲末麝香少許合前件臨時可否將來用輕輕貼在痛
牙邊咳嗽一聲牙落地此方可似活神仙一方玉簪花根枯
礬入仁言少許研末點牙根卽落一方白馬尾燒存性爲末
點卽落若遇好牙點着亦落慎之

治一切喉症端午午時菖蒲根拌雄黃用濃鹽湯浸七日晒乾遇
喉症小塊口噲痰出卽愈一腫痛水不得下青鹽白礬各爲

末吹入吐痰卽愈一方真蟾酥末用換頭點患處卽消

咽喉諸症多因火勝熱結而然。山豆根啣汁。或煎水嚥之。卽開或

山豆根末加冰片少許吹入數次。痰出愈。一方石羔煨紅出

火氣菊花杏仁

各五錢

麥冬

一兩

苦參

四錢

水二碗煎六分加蜜一小

杯緩服卽開。如不能進或無藥。急將兩臂以手拍數十次。取紫

髮纏緊大姆指以針刺指甲邊血滴下。其喉自開如放痧一

般兩手皆然。一方藍靛入豬胆內扎緊掛在不見日無烟火

雨到之處一年取下。研細末磁罐收貯。遇咽喉百病用少許加

冰片同研入患處無不取效如神。一方扁柏汁。或雪梨汁服

之皆效。一方木鬚子

煨一箇

冰片

一分

共末吹入喉愈。

一方

上喜子窠數十個瓦焙冰片少許共研細末吹喉血散痰消愈

喉腫分風火風以鶴虱草嚼之火以元參嚼之苦水吞下愈。

喉癰腫脹不進水穀胆礬二哈之吐出惡痰愈 一方釜底煤水

丸桐子大以新汲水灌一二九即愈。一方雞肫皮勿洗煨為

末吹入愈 一瑣喉症方生雞蛋一箇先吃千金草研汁菜豆湯一杯

後吃即愈 一方白菊花連根葉搗汁灌下立愈。

治喉癰用頭胎黃牛糞以新瓦洗淨蓋糞週圍文武火煨烟盡存

性為末筆管徐徐吹入愈。

治咽喉十八症甘草桔梗各三錢防風荆芥黃芩元參各一錢薄荷五分

水煎食後頻頻嚕嗽。嚕下氣逆加陳皮。咳嗽加知母貝母。發渴加五味麥冬。肺痿加阿膠百合。面目浮腫加茯苓。嘔吐加半夏。生薑氣弱加人參黃芪。腹痛加白芍枳殼。目赤加梔子黃連。咽痛加鼠粘竹茹。聲啞加半夏桂枝。胸膈痞悶加枳實酒毒加乾葛。陳皮疫毒加鼠粘大黃芒硝。

喉閉神效萬金不傳秘方。猪胆五錢黃連青黛薄荷殭蠶白礬朴硝

各五錢。研末臘月初一日取胆將各藥裝入胆內。青紙包好。將地

掘一小坑方深一尺。以竹橫懸此胆在內。至立春日取出。待風

吹去胆皮。青紙研末密收。遇喉症吹少許立效。

治失音仙方猪脂斤一入燭先熬成油撈去渣入白蜜斤一再煉一匙

裝磁罐冷成膏封固不時挑一匙滾水下愈無病亦可常服潤

腸肺解燥結。

治心胃痛不論寒熱新久一服即止官桂錢半白芍酒炒二錢甘草五分水

煎服立止 一方芝麻二合炒黃研米醋一盞煎三分服神效。

一方桔子核三錢炒黃研末冲黃酒服愈。一方新棉花子炒黃三錢研末

黃酒下三服除根。

治胃痛受暑寒怒熱鬱名九氣仙方川鬱金香附甘草節各二錢薑

煎服即愈 一方山羊血錢一燒酒送下 一方胡椒七粒束一個

杏仁五粒共搗爛熱燒酒送下。一方牙皂燒存性研末燒酒服一

錢愈。一方生芝麻半升候痛時不必看。隨手取來銅炳內炒黑

為末老酒送下。一服除根。

目痛屢瀾屢發。此症婦人多有之。一服除根。荔枝核木香同研末

每服二錢。一方沙糖半盅燒酒調服立止。

心心痛方。詩曰。一個烏梅二個束。七顆杏仁一處搗。男酒女醋送

下之。不害心痛直到老。

心腹不快。蘿蔔子一合生薑片三片水煎服。

小兒重積。腹痛口吐清水。者是史君子肉二錢檳榔一錢水煎食。

後服。一方史君子去皮研熱水冲服其虫即出。

一腹痛泄瀉山渣肉炭大麥芽炭紅糖各三錢薑湯冲服愈。

腹痛護臍丸胡椒末分三硫黃黃蠟各錢溶丸艾蕒大一丸入臍愈。

酒肉過多脹滿不安鹽花擦牙温水漱下二三口如湯沃雪消。

治腰痛不止絲灰根燒存性為末每一錢温酒送下神效。

閃挫腰痛不能屈伸麝牙硝雄黃各半厘共末以少許點人中挾患

者周圍行數次腰痛若失未效再點以效為止。一方橙子核

炒研末以鹽酒調空心服尤妙。一方木香分三麝香分一細末吹

鼻內左閃吹右右閃吹左令手上上和之愈。

如脇痛白芥子研末水調敷患處愈。

疔疔氣方荔枝核燒

三錢

小茴香川練肉

各錢半

共研末酒調入鹽少

許熱服再以葱湯搗汗出妙。

疔疔氣偏墜荔枝核龍眼核

均炒

小茴香

各炒等

爲末每空心服一錢

用升麻

一錢

水酒煎送下。

一腎囊風雞蛋黃熬油搽愈。

小腸氣痛大茴香杏仁

各三錢

葱白

五錢

同核桃肉嚼嚙神效。

腎大如三服除根。小茴香荔枝核青皮

各等

爲末酒調下。每服二

錢若痒用退雞水洗愈痒甚者柳葉煎水熏洗。

疔疔初起絲瓜

燒存性

研末黃酒下愈。

一木腎豆用中克絲子草

煎湯以手搓揉洗自消。

骨節腰痛。五加皮三錢胡椒鼠屎各七粒羌片三斤用好燒酒一斤煮一炷

香。半饑時盡量飲。取微汗。輕者一次愈。重者數次以愈為度。

一腿膝疼痛不能舉步。山查肉白茯苓各等蒸晒為末。蜜丸。桐子大。每

三錢白湯下。服一二斤無不愈者。

一鶴膝神友有患此症五年。敷藥三日即愈。乳香沒藥各錢半地骨

皮無名異各五錢麝香五分為末。車前草搗汁酒調敷患處。一方

白芷一斤酒煮成膏。磁器收貯。每日取膏塗患處。至消乃止。

一方白茯苓一斤炒去刺帶黃色。牛膝虎骨各三兩酥炙。共細末。朝服三錢。夜三

錢酒下遠年者二斤全愈。

一脚氣痛蒼朮

米泔浸
鹽炒

黃柏

酒浸
炙

牛膝

各五
錢

水煎空心服。

一方

鳳仙花葉煎湯洗渣搗敷患處。

一方冬瓜皮煎湯洗立效。

一脚生寒濕瘡乾粉心

兩

生礬

五錢

紅丹

二錢

共末麻油調敷次日熱

米泔洗再敷數次包愈。

一寒濕脚氣花椒

一兩

葱

一把

薑

三兩

打碎水煎

薰洗立愈。

一綉毬風杉木灰鷄子黃油調搽愈。

一足趾鷄眼或痛或瘡地

骨皮同紅花研末油調敷愈。

一肉刺鷄眼蒜麻子末敷上少

頃其刺自出。

一脚指縫爛痒鵝掌皮灰礬末搽愈。

一脚脛

驅眼痛田螺去殼搗敷。流火活絡丹酒服愈。

一 癩瘡並鷄眼仙方

白蠟黃蠟

各一兩半

松香楓肉

各一兩

銅綠

六錢

血竭

兩 乳香沒藥

各三錢

用猪油熬入楓子肉去渣再入二蠟後入各

藥末攪勻。用時重湯燉化開貼數貼除根。

一 手指疼痛腫曰代指烏梅仁搗爛入苦酒以指浸之須臾瘥。

一 方桃仁搗爛和蜜塗患處瘥

一 鵝掌風指掌層層剝皮血肉外露熱豆腐水洗漿更妙。一方

斬艾四兩水四碗數滾入大口瓶內用麻布二層蓋扎將手心放

瓶口熏之如冷再熱再熏無不效者。一方五楮子末桐油調

逢火烘數次愈。一方天麻子或葉煮濃汁洗擦兼治癬痒

手指蛇頭玄參末入雞蛋內將指套過夜愈。一方用田雞竹

刀破肚縛住愈。一方蘿蔔開一孔入雄黃五分蒸半熟套指愈

一手足凍瘡蘿蔔菜橘皮煎湯洗。又蟬殼灰研麻油調敷愈

治金蓮方。白鳳仙花根葉搗爛煎湯頻洗之骨自軟柔不受痛

苦近有用猴脛骨煎洗多悞事也。

腫毒初起灸法。凡腫毒惡瘡初起以濕紙覆其上先乾處是頭
用蒜頭去皮切兩錢厚安上中通一孔用棗核大艾炷於蒜上
灸之蒜敗頻換或有十數頭生一處者將蒜搗爛鋪瘡頭上艾
燒之此灸不論壯數只以痛者灸至不痛不痛者灸至痛爲止
凡陰陽二毒灸之無不立愈至於陰瘡紫白不起或日久頑瘡
不收口更爲神效。一灸毒虫蛇蝎蜈蚣瘋狗咬傷攤蒜於傷
處鋪艾多燒至不痛爲度再搗蒜汁沖黃酒服立愈

不論陰陽大毒上載隔蒜灸法固妙今隔黃灸法更妙用白麵捏

圈圍患處入乾糞填滿圈內大艾頻灸俱以痛不痛爲度若陰發背更宜多灸

一切陰陽二毒癰疽發背對口疔瘡等初起益氣和血解毒托裏

潰後排膿去瘀生肌長肉瘡科始終之仙方當歸生黃芪金

銀花各五錢甘草三錢水二碗煎稠患在上飽服在下空心服服後

盡量飲醉益煖出汗卽愈至重三服全愈神效無此毒在上加

川芎升麻在中加桔梗橘紅在下加牛膝桂枝初起加地丁羌

活有表症加麻黃陽症加連翹貝母腫痛加乳香沒藥腫處硬

白加半夏南星泄瀉加蒼朮白朮嘔吐惡心加陳皮半夏惡寒

加桂枝膠成不潰加防風川山甲不思飲食加白木陳皮氣虛

加入參黃芪肉赤口渴加入參麥冬五味熱盛加黃連山梔陰

寒毒疽肉白色淡加陳皮肉桂炮羌排膿加白芷欲破加皂刺

方白礬耐用涼水調灌隨消此諸書未載奇驗異常

治腫毒疔瘡即時消散誠外科之仙方白菊花四兩甘草四錢水三碗

煎一碗沖執黃酒服

治一切陰毒陰疔癰背鶴膝流注白色平塌等症此方龍宮獻許真君林屋山人

家傳秘方執地兩白芥錢鹿角膠三錢肉桂錢甘草錢炮羌錢膠錢各五分水

煎服我飲好酒

治一切陰寒冷症非麻黃不能開其腠理非桂枝不能解其凝結
此三味雖酷暑不可缺一也將應用之方煎成投入同服二方
不論已潰未潰俱可服。

鉄筆圈圈毒免走芙蓉葉

一兩文蛤炒焦

小粉各八錢

生南星生半夏生

甘草

各五錢

爲末好醋調敷留頭出毒

赤金箔貼腫毒惡瘡神效五倍

二兩陳小粉炒黑

四兩人中白

兩半爲末

鷄蛋清調搽四圍如此蜜水濕之腫甚二次卽消。

紫金龜方鮮鴨蛋

三個煮熟去皮煎油

蝦蟆頭三個炭燒存性

銀硃三錢

爲末搗蛋油

內收此遇黃痛不可忍者用鷄翎掃瘡週圍留頭出毒其痛立

其能束緊癰根甚效

一瘡毒將潰之時用此湯洗之以瘡內熱癢為度獨活白芷當歸

甘草

各三錢

葱頭

七個

水濃煎去渣以絹帛蘸湯熱洗溫再易

瘡膿已熟不破不用刀針一服即破

爾蛾一個燒存性末

黃酒調服即破

不可用二個即破二口神妙方也一方白丁香

即雄雀糞

赤小豆

研末水調敷自破一方蟾酥射香末少許搽上即破

一腫毒初起寒熱骨痛嘔惡似傷寒冰片麝香

各五分

輕粉辰砂

各六分

分乳香沒藥血竭雄黃

各錢

鮮酥

自取蟾酥二錢用男胎乳調

將上藥為末入

酥乳汁內調丸即刻晒乾用川椒燈心同藥收藏瓶內以蠟封

口凡遇惡瘡大毒用葱白食後嚼下然後將藥丸放舌下睡煖處蓋被藥化徐嚥之瘡大者二三丸亦可即得汗而愈寒月用葱白湯催之如暗疔勢急用葱白煎酒一杯研末五丸灌下其效如神此外科第一奇方也

一瘡大痛漫腫光色名附骨癰仙方蜂房蛇退乳髮各燒存性等分爲末

每服錢半酒下愈此方兼治瘡口久不合

治肺癰并肺痿神效鹹芥菜瀉陳者佳每日溫服立愈三方每日

煮瀉杯豆腐漿服則胸中一塊塞上塞下數次方能吐出惡

膿日服至愈一方白芷百合洗搗汁日服一磁七日至愈

治一切惡瘡疔毒初起走黃無不神效白礬錢葱白同搗爛分

作七塊用熱白酒送下吃完蓋煖出汗再飲葱白湯催之汗出
淋瀝待一二時從容去被其患如失大忌風寒

治一切癰疽對口發背等毒神效赤小豆

研細末

生蜜調敷雞蛋清

調亦可乾則再刷此物能通滯氣散惡血清熱毒消腫止痛性
和物微功效極大不可輕視而忽之也

治發背左右反搭奇方桐樹葉

打桐油樹

數張濃茶煎取葉俟冷代膏

藥貼患處每日換一二張六七日全愈

一筆消藤黃

五錢

黃柏青黛

各兩

共細末醋調敷患處立消

治諸疽疔瘡惡毒初起葱白十生蜜一搗敷患處日換三四次立

消。先列數方簡便至極人若能初起早治無不應手取效第恐

延遲自誤使毒熾盛將來吉凶便不可知耳。一方芙蓉花葉

和蜜搗爛敷患處立愈。一方白芨芙蓉葉天南星銅青大黃

連翹各等共末蜜或醋調敷。一方芙蓉葉栢葉為末醋調敷

一方頂好冰片二川連雄黃一錢研末好燒酒調搽立愈。

治發背神效夜明砂淘淨陳石灰越陳越三分灰七分夜明砂共

研加麻油調勻先用米泔瘡口拭淨以鵝毛蘸藥沿口畫圈一

二分寬次早敷藥處即愈每日盡藥一圈漸圈漸小圈至中心

自能成功矣

一方危迫極用人糞燒灰醋調敷乾換神效

一方苦參二斤熬濃湯時刻飲初起者服三斤可以陰消如已成形

腐爛者外用去腐生肌藥敷內服苦湯至十二斤無不全愈

一方蟬殼一個為末臨睡黃酒沖服至重二服全愈 一方活蝦

蟆一箇去腸肚剝全身癩皮貼蓋瘡上用針將皮上刺數孔以出毒

氣自覺安靜且能爬住瘡口不令長大又可免蜈蚣聞氣來侵

神妙之極 一方用活蟾一隻繫於瘡上半日必昏潰再易一

隻必踉蹌三易其蟾如舊則毒散矣累試極效 一方敗龜板

一箇去肋黃蠟炙透為末每服二錢沖黃酒下

治對口神方大肥皂

一箇去子去邊

加婦人梳下頭泥

三錢

生山藥三和勻

搗爛敷瘡口。不論初起腐爛多敷幾次愈。一方烏羊角炙灰

糖酒拌服立愈。一方並用夏妙。一方硃砂蚯蚓搗敷即愈。

疔瘡仙方。凡手心口背及面上有瘡起泡發癢或寒熱麻木不痛

此極惡之瘡。急用巴豆一粒米飯一粒粘貼瘡上。立時拔疔神效。

服白菊花連根葉搗汁一碗。死可回生。一方白菊花甘草各

兩水煎服。並治對口。名救命丹。一方白公鷄冠血點之效

按疔青金膏寒水石銅青輕粉各二錢枯礬一錢麝香一分共為末。先用

竹針刺瘡口。然後敷上。其疔毒自出。

一瘡不收口白蠟兩冰片一研末勻滾者填入愈

唇疔荔枝燒灰存性研末麻油調塗兼治諸瘡若生耳疔鼻疔
塗外面即愈 一疔瘡初起飲麻油一杯可保無虞

治諸疔神方甘草末三錢菊花連根葉搗爛白布絞出汁再以滾水

沖在渣內用布漉出調甘草末飲之入口即活

馬嘴疔生唇中下如不急治即死用鷄冠血頻頻塗之 一方蜘蛛

蟻一箇搗爛塗之自愈 扎馬疔豨薟紫苑地丁車前草白酒煎服

治一切疔瘡惡毒川烏草烏蒼朮細辛白芷薄荷防風甘草各五錢

共為末用雞子清調敷留頭仙方 一方金銀花連莖藤搗爛

絳汁半鍾熱酒冲服護煖出汗愈。一方蒼耳子微炒爲末黃

酒冲服將末渣雞子清調敷患處疔根拔出。一立時拔疔草

麻子一粒去油乳香一分去油共爲末以軟飯搗成餅放疔上外以膏藥

貼一二時根即拔出妙甚。凡生紅絲疔須針挑斷其絲將多

年尿坑上碎木椽子煨灰研細用錫糖拌塗在疔上德出疔頭

疔即拔出無事若不急治隔一日外即無救矣

治爛腿癰瘡無論遠近爛見骨者半月收功香油二斤亂髮四兩杉木

燒灰研末三兩白占二兩麝香五分先油煎熟入亂髮候化開次下杉木灰

再入白占化煇下麝香攪勻復以疔張紙入油內收盡爲度貼

三日反轉外面貼七日全愈。

又方白蠟

三錢

密陀僧

二錢

真麻油

二兩

共熬膏紙攤油洗貼。

治爛脚又癢痛仙方赤石粉

二錢

章丹輕粉

各五分

枯礬冰片

各三分

牙

硝一分共細末先濃茶洗淨敷數次愈。

治諸毒收口生肌仙方藥雖賤大有功效牛糞

山上陳者

焙為末搽敷

次即愈一方桑葉醋煮一滾即撈起貼瘡甚效。

馬齒莧

治驗名長命菜

性清涼內服外敷神效勿忽。一治三十六種風

熬膏內服外敷久久自愈。一治楊梅瘡遍身如癩喉硬如管取

一大握水煎溫服出汗愈。一發背諸毒水煎入酒熱服出汗再

服去熱退腐三服全愈。一痔漏每日蒸着食之以愈爲度。又加
瓦松葱椒煎湯先熏後洗最效。一癬痒極搗敷立止。一多年頑
瘡癰瘡疼痛不收口者蒸着多食外搗敷之。一日一換。三日腐
肉已盡紅肉如珠卽愈。一螻蟻寄生脚腿間皮肉生虫或痛或
痒加鹽少許搗敷患處。二三次愈。先用葱椒湯洗淨。一治濕癬
白禿加石灰末炒紅搗勻敷之。一赤遊毒加葶根搗敷之。一血
淋搗汁服愈。一血痢搗汁和蜜一匙空心溫服。一腹中寸白虫
煮一握和鹽醋空肚食之少頃虫盡出。一小兒走馬疳燒鳧灰
搽之卽好。

治對口仙方鮮茄蒂何首烏等水煎服愈。

一對口疼痛諸藥不效敷此立止雄黃錢一吳茱萸兩一為末香油熬

熟調搽立止真仙方也。一方山藥菜豆粉搗勻醋調敷。

一方大麥鬚煨存性麻油調敷立愈。

對口初起枸橘三收瓦焙存性研細末黃酒冲服盡量飲醉即益原

被得汗立解不可因藥沒要緊輕忽自誤輕藥治重病靈效異常

治楊梅天泡一切惡瘡方雄黃錢十輕粉錢一杏仁去皮十粒研末雄猪

胆汁調敷數次愈百發百中。一方真香油加鐵鏽不拘多少

加靛二厘入油內搽之自愈兼治肥瘡白蛇患驗

治結毒及玉莖爛完者服此得生。土茯苓一斤生薑兩共煎服數碗不十日愈。其潰處以藥末調麵糊之漸愈。

治魚口便毒未破一劑全消。石為魚口便毒生於兩脗合縫之間。結腫

是也。有生於小腹之下。陰毛之傍。名曰橫痃。又名外疔。治宜散

滯行瘀通利。大小便如口潰則大溫補之。不然恐變別症。川山

甲炒鱉甲各一錢全蝎炒七箇生大黃三分水煎服。一方班毛炒一錢

白芷不為末每服六分。空心酒下。一方用針十個。紫煖頭上

麻油燈火上燒紅。向患處搗三四下。即用糖雞屎攤膏貼上。可消

治陰頭爛去半邊。立效。五倍子一個輕粉五分冰片三分共細末敷瘡

上每日數次如瘡乾者生甘草湯洗敷藥更妙

一陰頭生瘡蜜調甘草末敷並治一切惡瘡甚效、一方腫痛兒

茶

研末

冰片三分

甘草水洗搽

一方腎囊腫大陳木瓜打碎煎

湯加紅糖五錢服。

萬應丹

長肉生肌一切破臭惡瘡及刀箭所傷打損頭額跌破手足等症

杏仁輕粉官粉血竭黃

丹赤石脂黃柏兒茶

各二錢

冰片

二分

沒藥

五錢

新鮮桑白皮炙甘研

末如夏天加阿魏各共爲末溲之、一拔毒生肌溲藥天竺黃

一輕粉五錢冰片三分爲末溲瘡上愈。

一魚口初起瓜萋一個燒存性末勻三服黃酒下卽消

治結毒古今第一方。鍾乳石分三珍珠分二硃砂虎珀冰片各五厘共爲

末入炒飛麵粉分十二服每日用土茯苓一斤煎水十二碗清晨

一碗入藥一服溫服其茯苓湯須一日服盡不可別飲湯茶重

者再服一料無不愈者忌酒色葷辣諸物。一方大蝦蟆筒好

陳酒三斤將蝦蟆酒重湯煮化去蝦蟆熱飲酒盡醉爲度蓋煖出

汗通透數日愈忌風寒發物。

治爛膝頭良方用龍眼第二層樹皮打爛熬水成膏洗患處淨再

用熱白番茹切片貼上冷又換洗得數次每次換茹四五遍卽

愈永不復發。治漆瘡蠟黃一申神神錢錢末蜜調塗愈

治瘡石灰水拌敷上一日除根。一方杉木鉤花熬水洗愈。

火丹赤遊丹毒爛至背心只有一層未破者不治卽死用六安茶爲末香油調敷大妙凡五色丹毒俗名赤遊風不早治多死不可輕視用榆白皮爲末雞子清和敷。一方螺螄搗汁塗效。

一方大黃朴硝等末水調敷。

白火丹用麻油擦眉上卽乾者是又指甲白者是北細辛末大人

每服三錢小兒錢半水調下其粗末再研紗袋盛撲患處隨手

愈。一方人中白末三錢搗生大黃汁送下令大瀉或大黃煎水

送亦可。一方水田螺筒冰片五厘合臍上不過二三個卽愈仙

治濕熱風血腫瘡爛脚等瘡陳石灰水麻油各等鷄毛敷刷愈。

治乳癰奶癰鮮蟬一隻搗爛沖黃酒服即消

乳吹仙方土半夏二枚研爲丸葱頭白衣裹好不可狼藉塞鼻孔左

乳癰塞右右塞左立刻見效。一生痘芝麻炒焦研爛燈盞內

油脚調敷即散 翻白草鮮者酒煎熱服立效。

治乳吹癰巖神效內府槐花卽子亦可炒熟爲末每服三錢黃酒下三一

已成塊金銀花連葉蒲公英各四兩搗爛取汁黃酒沖服蓋煖出汗

渣敷患處立愈。一初起二三日立消仙方活鱖魚一箇山藥如魚

一同搗如泥敷乳上以紙蓋之二服全愈。一方鵝毛煖爲

末酒送下三錢

一方葫蘆巴

錢搗酒煎服酒敷之愈

一大麻風全身腫爛頭髮眉毛俱落兩脚臭爛一治一效

奇驗方

六蝦蟆

一隻

用泥裹煨熟去泥以大碗盛蟆小碗蓋住乘熱沖滾

黃酒烹一刻止服酒取汗為度只服一次三日全消

一方川山甲

一箇要頭尾四足耳目口鼻俱全者

生漆

一斤

每日將山甲漆數次漆完

用瓦器炙灰如患人要頭身先好即服山甲頭身起要手足先

好即服四足起熱陳酒服完即愈如山甲有一不全而病人亦

缺一未痊仙方

一方

千金不秘方

大黃桑皮苦硝

各一撮

水煎無風

處洗每日二次如有虫加鴿糞同煎如爛用琥珀末擦之

一方已壞爛并一切風痺疼痛洗方甘草葳靈仙各一斤水二担將

藥煎五六滾傾入大缸內令病人用小櫬坐其中周圍用蓆圍

定熏浸洗令渾身汗透淋漓洗三日藥味盡止在煖室無風處

大避風寒凡洗病宜效此法。

異人傳授治大痲風仙方凡患此最爲惡症其病手足麻木眉落

鼻折肌肉潰爛面如虫行指落足斷臭穢不堪且能傳染此皆

風孽所致宜自懺悔戒淫慾忿怒及一切鮮發猪羊鷄鵝魚蝦

等類得此神方久服自愈但此病深重服藥須久若不耐久無

益也不守戒無益也俗云癩子喫肉不圖人身一失人身萬劫

難得可不哀哉其方用明淨松香不俱多少去渣滓取溪河淡水用淨鍋將松香煮化不住手攪視水色如米泔嘗味極苦卽傾冷水內將松香乘熱扯拔冷定硬另換清水再煮再拔如前製法不論幾次只以松香體質鬆脆潔白所煮之水澄清不苦爲度陰乾磨細羅篩過凡服此藥每料二斤日將白米作粥候溫量投藥末和勻任意食之不可多嚼卽則再食日進數餐不可更食乾飯只以菜乾笋乾少許過口一切油鹽醬醋葷腥油麵糖果雜物槩行禁忌渴時不可吃茶用白滾水候溫投藥末和勻飲之每日約服數錢以漸而進不可太多服至旬日或

作嘔或胸膈嘈逆或大便下諸毒物此藥力盛行必須強服不可中止遠年痼疾盡料全愈患病未深只須半料鬚眉再生肌膚完好筋骨展舒平復如舊飲食不忌惟猪首鵝菌及濕毒之物終身忌服此方藥雖平常應效如神勿輕忽之

治癩癧不拘久近已破未破奇方花粉苦參

各五錢

皂刺

四十九個炒黃

土茯苓

三片

共煎湯當茶吃愈忌牛肉

一方治內消蜈蚣

三條去頭

足山甲

炒各五錢

全蝎

炒去毒十四箇

火硝

三分

共末每服

一錢

黃酒下隨嚼核

桃肉

二枚

服完一料愈

一方活蝎

一箇

麻油浸

爲末以鵝毛蘸

油搽瘡上初起者名瘡母每日多搽幾次大約三五日全愈

白癩串仙方未潰內消錢美蚕黑牽牛錢班毛米炒黃色

輕粉二分共細末每服二錢清晨百滾湯下如腹痛用六一散

錢五清湯調服即止此方不可連日服服過兩天隔一二日再服

其毒從大小便出服此藥後時時看驗已消不必服矣

治癩簡易方枇杷葉一斤四兩去毛梗淨焙為末白糖斤拌勻不拘時開水送

下服完即愈一方雞蛋個開一小孔採綠萼梅花將開者七

朵入蛋內封好蒸去花食蛋如此七枚不間斷全愈不可輕忽

一方玉簪花嫩者米醋浸一宿蒸熟扯碎如膏藥大貼患處愈

治癩癧滿項神方夏枯草金銀花蒲公英各五錢用酒水各半煎

服多服數劑愈

治痔漏不拘新久有漏至通汚從孔出者先用此方追盡膿毒再

服後開消管丸自然見效胡黃連一兩羌刺蝟皮一兩氏黃射

香三分共為末軟飯為丸桐子大空心酒下一錢半月後復後左

消管丸此藥不用刀針不受痛苦自然管消真仙方也胡黃連二

炒取一兩穿山甲一兩麻油一兩石決明一兩煨槐米一兩微一兩共末和勻

淨末一兩蜜練丸桐子大早晚一服滾湯下一錢愈至重四十日全愈如

漏四邊有硬肉突起加蚕繭二十個焙焦為末和入前藥服之

神效至極凡患痔漏曾服前開二方其病已愈仍恐久後不守

禁忌或食猪肝番茹絲慾勞形飲酒煎炒燒炙等每致瘡疔復

萌必服此丸可以斷根名完善丸方夏枯草花十兩去連翹五兩去心

甘草節五兩金銀花四兩右藥共炒磨細末以淨銀花一斤熬濃汁法

丸象豆大每早空心淡鹽湯服三錢若已起漏三五年者兩料

愈一二年者一料全愈。

肛門酒痔全絲瓜燒存性末每服二錢酒送神效。

一內外痔蜒蚰數個搗爛寒水石二分冰片五厘搗勻搽上立愈。

一方野蘿蔔三月間採收鮮用亦佳一名野苦蕒一個去梗葉猪肉四兩不用鹽置新

砂鍋內煮熟下飯只一個血即消止數個可全愈矣。一方秦

椒一二十個切碎炒黃以滾湯潑入煮半刻連椒傾入新便桶內裸坐燻一二時俟水冷棄去三次永不復發矣。

肛門腫痛下墜無論新久痛止腫消枳殼荔枝草

一名天明精又明地松各

二河水三瓢煎熏洗三次愈。一方梓桐樹枝葉或苦苣菜煎

湯洗俱效

護痔膏用此藥圍護四邊好肉方上枯痔散白芨石羔黃連

各三錢

冰片射香各三分研末鷄子清調膏塗之。

枯痔散自有此方世三斷無不愈之痔真仙方也紅砒

不拘多少舊氏煨白

烟燒將枯礬二錢烏梅二錢白靈藥五分研極細末用鹽以口津

濕指頭醃藥於痔上擦燃一日二次初敷不腫五六日出臭水

盡其痔乾枯不用上藥輕者七八日全愈重者半月收功。

痔漏丸

魚鱉極明黃蠟各四兩

明礬二兩硃砂一兩珍珠象牙

各五錢均研末先

將魚鱉酒煮極爛杵如膏入蠟化盡離火入礬各末和勻丸如

梧子大每服三十丸空心酒送下。

附原方論按痔之病。繇七情內傷。五賊外攘。饑飽不節。勞役酒色。

厚味所致也。生於肛門之外者名外痔。內者內痔。初起即當醫。

治。庶免後患。每以小恙不足懼。延挨日久。變為痔漏。始倉忙求。

治。或治不如法。往往糞從孔出。血從竅流。釀成莫救之禍。惜。

哉子每目擊而心憫焉。因遍訪名流得傳是方。製以療人。輒皆
奇效。蓋黃蠟明礬爲解毒生肌之聖藥。加珠牙硃末。其功更倍
之矣。魚鱉爲君者。取味厚滋補而有膠固不漏之義。且無刀針
掛線爛藥之險。重軀命者。亟宜服之。崇正戊寅新安洪九疇識

治痔漏神方。大蜈蚣

一條作七段

梧子

七箇去蓋

將蜈蚣每梧子內放一段

紅瓦煨過。研細末收貯。每早晚以洗面水洗痔瘡。洗過將藥些
須擦痔瘡上。不可間斷。藥完全愈。

治疥靈丹。花椒。枯礬。硫黃。各等爲末。香油蘸末。火搗頻搽。卽愈。

一方硫黃醋淬效。

一方硫黃水銀

各一錢

油。核桃肉。生豬板油。

搗如泥聞臭擦患處愈。

治膿窠疥。硫黃雄黃

各一錢

胡椒

八分

紅砒

三分

研末香油調搽。

一遍

身疥瘡雄黃硫黃生礬川椒

各等砒分三

共末鷄蛋黃潤搽愈。

一方菖蒲末鋪席臥並煎水洗數日愈。

一方石灰半碗熱水一

盆攪勻待溫去渣頻頻浸洗甚效。

一椒硫等分研末敷愈。

治鷄屎癩劉寄奴

一兩

皮硝

五錢

米泔水煎洗數次愈。

一油灰蠟痢

白殼蝦

撮

白糖

半杯

同搗極爛剃頭後塗患處癢極不可搔。三次

愈 疥瘡生石羔

一兩

硫黃

一錢

枯礬

五分

共末猪油蘸擦神效。

治癬蔓延決明子

一兩

水銀輕粉

各一錢

砒

三分

研末擦破搽數次愈。

一方白芷各二錢硫黃川椒各一錢爲末老薑鐵銹藥末擦之

一方頂錫粉三仙丹頭楓子肉燒存性各五分皮硝煨青礬各三錢硫黃一錢

砒三分共爲末醋蘸擦數次愈。一方土蒺藜連根葉搗煎水洗

一方藁本煎水洗最妙。一蠟梅花葉擦愈。一川荆樹皮米醋

磨擦立愈。

治年久頑癬牛皮癬神效。紅砒五分明礬川槿皮杏仁各一錢佉僧硫

黃各二錢爲末先將癬括破用油或醋蘸擦。一日三次三日愈。

一牛皮煨灰油搽

治癬諸藥不效仙方川槿皮二兩大黃一兩雄黃輕粉各二錢班毛一錢百

藥煎餅海桐皮兩巴豆一錢共末陰陽水調敷或油搽數次愈

一方大楓子肉八箇鉄錫粉水銀雄黃各一錢麝香五分共細末先刮

破用薑蘼搽數次愈。一方真鉄錫粉二錢三仙丹四分雄黃大黃

胡椒蛇床子各五分硫黃一錢楓子肉五箇白礬六分五倍子二箇蜈蚣二條

條冰片麝香各三分共爲細末先刮破薑蘼藥擦或油搽愈。

治一切頂癰木油注極木或杉木新鋸屑一箕用紙糊碗面以屑堆碗上火

炭放屑頂燒着少時火將近紙卽用鉄筋抹去再加木屑燒數

次開碗紙看卽有油數匙搽時將癰刮破以羊毛軟筆湛熱油

塗上甚痛停半日再塗癰漸結痂而愈癰方極多都不及此真

神方也

口賺瘡神效。米糖以碗盛於飯鍋上蒸薄攤瘡上。油紙蓋帛縛數

日數次愈。一方石羔

煨

桔槔

各一錢

爲末桐油調膏貼之並治

裙邊濕毒等瘡。

一方水龍骨

即船底石灰炒

末香油塗至效。一方

銀硃

二錢

銅綠半松香

各三錢

研末桐油調作隔紙膏貼之三

五日數易愈。

一方荔枝全個燒灰研末麻油調塗效。

甲坐板瘡仙方松香

五錢

雄黃

一錢

蒼朮

二錢

爲末和勻綿紙包捲作紙

條二個猪油熔化浸透灰燒滴下油搽瘡卽愈。一方輕粉枯

礬黃栢

各五錢

硃砂雄黃

各一錢

爲其末先用川椒湯洗淨後敷約

立效

治汗斑仙方蜜化僧

錢二

硫黃雄黃白附

各一錢

日信

三分

共為末醋調

搽一日洗去其黑點緩緩白愈

治腰裏起紅泡一圍如褲腰名白蛇屨急宜早治蛇退

一條燒存性

厠

坑板上浮泥同研童便調敷一方白芨水龍骨研末無根

水調敷

一天蛇奇毒此症生十指羅心一指爛去連傳一指一節爛去連

傳一節傳至手心必損命雄黃

五

蜈蚣

炙末二分

鷄子

一枚打孔

伴去黃人蔘

勻以患指套浸即愈

白蠟燭瀉蛭虫錢雄黃錢同研敷愈。

久濁不愈生白果打爛將龜頭用白果包裹紫紫一夜愈。

狐臭體氣石綠錢輕粉錢研末醋調塗五次斷根。

杖瘡凡受刑畢卽飲童便一碗免血攻心又燒酒頻洗杖處

方熱豆腐切片鋪杖紫處其氣如蒸腐卽紫色復以一片鋪之旋鋪旋換以紫肉淡紅色爲度。一方葱白搗爛炒熱鋪杖處

冷則再炒再換消腫止痛散瘀去毒如神。一方救苦散治杖

瘡久爛深坑用此搽之數日愈。公問血竭白蠟各一錢硃砂輕粉

各一錢研末搽上一口夜四圍生起兩日卽平。

治損傷手指皸裂水四五碗砂煨熟將手熏洗浸漬良久

活血止痛不致潰爛其洗手水過夜臭不可聞 一方訶子煨

半夏銀硃等為末蜜調敷

治杖夾損傷死血鬱結疼痛命在頃刻塗此立止真起死回生之

聖藥也乳香沒藥各錢半輕粉血竭冰片各三分麝香一分樟腦二錢

黃蠟一兩猪油二錢共研末將蠟油同化調藥成膏晝夜流水即

時甦醒凡痛甚將肥皂煨搗極爛塗傷處立刻止痛凡遇杖夾

先服急救蝮蛇胆酒磨溫服如急切片酒下無酒童便自已小

便下忌見婦人藏胆糯米并時不壞

治杖打跌打

一打死同生吹藥方皂角生半夏南星細辛各錢共細末吹鼻即醒

治夾後妙方土狗鄧游雄尖嘴蝦蟇即地沙鷄即蛤灶鷄紐蚯蚓

白頭者佳 以上俱用燒酒浸死焙乾為末每服三四分之後再各五錢

置一服用後煎藥內熱服 煎藥方半膝紅花栴榔陳皮歸尾

羌活獨活甘草各二錢酒水各半煎服

治跌打損傷方胡椒黃蠟各二兩公鷄一隻去毛共搗爛敷患處如癢

即愈若高處跌下急以熱尿灌之 治內傷取小便處黃透磚

片洗淨火煨醋焯五次刀刮細末每服三錢好酒送下在上食

後在下食前服奇效神方凡跌打損傷先飲童便免血攻心急

將葱白搗炒熱敷患處頻換以解痛如毒傷用熱豆腐片搗患處數易自消頭破骨折葱和蜜搗敷立效 一方五爪龍藤根

去心搗碎老酒煎服立效 一方螃蟹生一斤搗爛滾酒冲服

仙方 一螃蟹搗爛敷患處其骨自接 一方金櫻子去皮酒煎

熱服渣敷患處立愈 一不論刀跌諸傷生半夏末敷上立止

痛能收口生肌 一方土鱉子十數個打爛黃酒冲服立愈

治一切損傷但能灌下惡血行而自平矣歸尾各二錢紅花蘇

木各錢水酒各半煎服即愈 一方白蠟一兩膽黃三錢入麻油溶化

塗傷處立愈湯火傷亦好

一跌打傷損在胸膈不食者以生豬肉切細末將溫水送下一錢
卽思食 一或脇破腸出急以油抹人煎人參柯杞汁淋之連
食羊腎粥十日愈或以冷水噴其面其腸自收

一凡刀斧傷斷指者將蘇木末敷用蚕繭裹數日卽愈如故

一刀傷見血煨石羔末敷卽止 一方舊毡帽燒灰研末敷上立
時止血不痛易收口神效

一跌打損傷服黎洞丸最妙內服甘草湯並黎洞丸外用燒酒摩
敷無不應效丸藥現成可買故方未載 一刀傷方端午日用

石灰一升大黃四兩共細末炒黃磁瓶收貯止血極妙名桃花散

一方韭菜石灰搗成餅貼牆上乾透研細末血流不止滲上立愈

金瘡鐵扇散象皮

切薄片川小焯焙黃色以乾為度勿令焦龍骨用上白者研各五錢老材香山峽

等省無漆民間棺殮俱用松香黃蠟塗棺內後有遷葬者其舊從之香蠟謂老材香東南各省無之川數百年陳石灰代之其

效寸栢香

卽松香中黑色者

松香

與寸栢香同溶攪勻飛磬各一傾入冷水取出曬乾

以上

共細末貯磁罐遇有刀石破傷者以藥敷傷口以扇向傷處搨之立愈傷處喜涼惡熱夏月宜卧涼地冬月忌卧熱處傷口不

必布包過煖難於結痂忌酒色致血熱妄行若傷處發腫鷄鴨

毛蘸黃連水塗之至敷藥時血流用扇無血流不用扇若傷日

久潰爛有膿血黃連湯沈上藥敷之此方蓋明大中丞德得於

山右盧醫刊以傳世無不奇效。

箭簇鉛炮子入肉神方 蛤蜊三箇巴豆五粒共搗泥敷傷處先止痛

後痒少刻鏃出矣卽以生肌藥敷之。一方花蕊石煨七次研末敷

傷四圍自出 一銃子入肉以水銀灌入傷處其鉛卽化仍從

傷處隨水銀出。仙方

箭頭鉄針竹木刺入肉 乃一箇螻蛄搗爛敷傷處卽出 一方針

入肉螻蛄人五倍子內包火煨爲末凉水調敷患處用紙蓋

上其針自出。 一竹木刺入肉生粟嚼敷。 一方蟻螬研敷

一方象牙末水調敷。 一方鹿角燒灰水調敷均立出久者不

過一夕即出。

一人牙咬傷若人牙黃入內不出必爛毒難愈。急用尿桶二三時待牙黃毒出後用龜板炙灰敷之愈。

炙破傷風法。卽風犬咬傷並治。此方最易而神。用胡桃殼稠入糞填滿。以大艾多多。要候人大汗遍身困甚卽愈。日久者傷處如前炙亦愈。又雄黃白芷等分酒煎服。

一風狗咬此乃九死一生之症。於無風處以熱小便擠去惡血。用隔殼炙法。或七八十壯。或一二百壯。以其人臭汗出大因爲度。看其頭頂必有紅髮數根。要細尋拔出。

一重獸咬傷方。凡咬傷并風狗一切毒。用砂壺二個。各盛燒酒半壺。先一壺以湯盪滾傾去。酒卽按在破傷口上。拔出污黑血水。滿則自落。再以次壺仍按瘡上。輪流提拔。以毒盡爲度。

牙蛇咬方。急以傷處上下頭繩扎緊。浸糞缸內。先飲香油一碗。嚼蒜飲酒。或吃飽飯。免毒攻心。一絲瓜搗酒熱飲。醉以雄黃塗傷處愈。一方鷄蛋三箇破頭合咬處。聽蛋內谷谷有聲。變黑色。

再換一個合之。變黃黑色。再換合之。自愈。不疼極妙仙方。

方白麩水和捏圓圈箍患處。明礬一兩杓熔化。傾於圈內。頃刻化爲水。其毒自解。一方烟袋焙熱烟油。頻滴傷處。蛇牙自出。

真仙方也。一方白芷兩水調服。卽活爛人骨者。白芷末加胆

礬射香少許。日日搽之。卽愈。一方大蒜攤傷處。以艾炙之。不
痛爲度。又蒜汁熱黃酒冲服。以上數方。能解諸毒。不止治蛇傷
已也。

一蛇入七竅。將刀破蛇尾。納胡椒末。立刻退出。一蛇畏雄黃。有
蛇之處。常以雄黃少許。燒熏衣被等。則不敢侵擾矣。

一土虺蛇咬急。拔去頭頂心紅髮一根。何首烏搗汁冲酒服。渣敷
咬處。其痛立止。

一蝎螫咬。蝎有二種。雄蝎螫人。痛在一處。雌蝎螫人。諸處牽痛。照

工以白麵圈熔明礬法治之。或以鷄蛋敲孔合之。二法最妙。
方蝸牛塢塗患處立愈。一方白礬半夏末醋調塗愈。

方寫馬字一個於地上將馬字臨了一點帶勢繞

馬字九回畢卽撮土少許敷患處卽止痛其法



方用指畫符於傷處登寫鷄字三個於符上卽用指撮擲於地

痛卽止其效如神。 蝎螫符 卅廿

方銀硃鷄蛋清調塗愈

蜈蚣咬隔蒜炙神效。 一鷄屎塗之效。 焗底烘蜜調敷之。

雄鷄唾滴之。 一燈盤油內燈花敷之。 一用蜘蛛箇伏在傷

處吸其毒少頃醉死投水中半刻卽活取蚊上蟻諸方亦用

一黃蜂叮熱酒洗。清油塗。蚯蚓泥搽。蜂房末油調敷俱效。

一蜘蛛傷。胡粉調薑汁塗。若遍身成瘡。用葱葉一莖。盛蚯蚓一條。捏住二頭。不令透氣。搖動化爲水。點傷處愈。

一蚯蚓傷。石灰水滾待涼浸洗。一煎鹽湯水洗腫卽消。

一鼠咬傷。猫毛燒灰入麝少許研末香油敷。

辟蚊蚤法。鴿屎水龍骨風茄花研末和勻。烟熏之絕種。一方黃

蟾骨研同木屑作筒燒之蚊不敢近。一鱧鱺魚連骨皮晒乾

蚊烟內燒之蚊卽化水。

去臭重法。羊頭骨一箇秦椒半斤共入火盆。同木屑燒之。門窗緊閉。勿

令出烟。臭重悉死。一方白芷蒼朮番木鱉雄黃各二兩研糊丸

指頭大。微火燒熏門戶緊閉。勿息葯氣。其臭重扁蝨俱化為殼。

一臭重自滅。漁人所飼魚鴉。每春換落翅毛。取置火上。得烟一熏。

臭重盡成空殼。此乃以臭攻臭第一妙方。

一誤吞針。田鷄眼一對。豆腐皮包吞下。其二眼緊捧針頭尾。從大

便出。一方煮蠶豆與韭菜同食自下。一方韭菜拌肥猪肉

四兩同食自下。

一小兒誤吞錢物。用半乾腐皮三張。切大片。以麻油拌食之。由大

俱出外履皮龍裹物麻油洋膠曾截神效

誤吞鉄物用栗樹炭二塊搗極細末沙糖和細丸服三錢立出

一不論誤吞金銀銅鉄葶薺時服其銅自化瀉出 一多食肥羊

猪脂及肥肉必隨大便而下 一白丁香三錢煎服立下 一

蚯蚓糞温水攪吞即解出 一羊脛骨燒焦研末三錢米飲湯

下從大便出詩曰蚕豆炒來研細末非菜多食是奇方誤食金

銀銅鉄錫定從大便出無差

誤吞螞蝗此虫最毒雖燒灰爲末投水即活惟食蜜化水

誤吞木屑鉄片磨汁灌下即愈

百世良方 卷二 誤吞 骨硬

魚骨硬貫仲濃汁一大杯分三服連進少刻一哈卽出 一方

葳靈仙錢五煎汁少服之骨軟出 一方青果葳靈仙砂糖共

煎吃上二三期骨化爲涎 一方鳳仙花子或根搗爛嚼順

諸骨俱化溫水嗽口免傷齒 五倍子未溲喉內卽化

一方白飴糖切如栗栗大吞之立下 一沙糖哈化鱧魚下愈

一方芋麻根搗汁用茶匙挑灌下卽愈 一橄欖煎湯服愈

一葳靈仙錢二龍骨錢四沙糖和酒煎一口吞下骨軟如棉

諸骨硬下四五日未效用鯉魚脊上三十六鱗焙研滾水冲服

其刑自跳出神妙甚者不過三次。

酒醉方洋參煎湯吃解

一鬼箭風堆花燒酒擦患處手拍見青色卽愈 一方紅花白芷

防風威靈仙

各二錢

酒煎服取汗三服全愈。切忌針挑火淬

一男婦尿坑硫黃

二錢 葱頭七箇

同搗爛用布包臍上卽不尿也

一治狐媚方。凡狐迷男女。白日用口吸人精。夜間交媾如人。用桐

油搽陰處自去。或用珠蘭根擦之。則獸自死。將獸肉乾爲末。服

之更妙

一脫頰方。烏梅乾肉噙之。卽上。或搗貼牙交立愈。

一飛絲入目。石菖蒲搗碎。左目塞右鼻。右塞左鼻。百發百中愈。

夜禁魔魘卧時以鞋一仰一覆則永絕

治明目方。花頭海螵斤一馬料豆斤一砂鍋同煮海螵化為度。將豆晒

乾。隨意作小菜點心食。服過升一老年燈下可寫細字。

固精健脾保養仙方。小紅棗三箇核桃肉半箇二共每晨滾水送吃。價

廉且易。大有奇效。一代參方。防黨或洋參第一次用附子四

兩煎濃去渣。將參浸晒收乾。二次黃芪八兩三次升麻四兩四次五

味子四兩俱煎濃汁。收入參內。製好可代人參之功。

一禿髮再生方。訶子三錢青果五錢三奈官桂樟腦各錢香油二兩浸三

日。每早手蘸油擦三十六下。短者長無者生矣。

仙傳生黑長鬚奇方真麝香鴉片橄欖

新自鹿角尖

各五錢 橙子

汁六兩老薑汁六兩猴羌三兩聽用將前四味俱研細末併橙薑二汁

入小磁罐內以柳枝塞口隔湯煮三炷香久埋土內七日取起

將猴羌兩許水二碗煎至一碗如某處要生鬚或要鬚長用牙

刷將猴羌汁先擦潤然後擦罐中之藥每早空心吃核桃一個

次日加吃一個遞加至七個則止至第八日減去核桃肉一個

週而復始逐日增減至七日改易滾水送下日吃日長日擦日

黑不吃便止此係仙授奇方珍之

廣濟丹白朮

壁土炒

蒼朮

米泔浸一宿去皮

陳皮厚朴

薑汁炒各三兩

甘草白茯苓

炒黃丹參各一兩半老黃米三升淘淨共爲細末蜜煉丸龍眼大服
去刺候乾炒香

二丸即能充飢療病昔浙省大饑朱文公以此施濟全活無

算此方去米名萬安丸能治瘟疫傷寒中寒暑瘴氣痧胃寒

噎膈瘧痢一切危急病症昔某遊學四方配此丸籍安身家兼

濟同人數十年來萬無一失若有仁人君子配合施濟功德

豈淺鮮哉

和陰症神方明礬錢一黃丹分八胡椒分二芒硝分一共細末醋調勻男攤

左手心女右手心緊對陰竅少刻熱氣上冲渾身大汗衣被盡

濕寒隨汗出症立愈矣

頭痛方象牙皂角白芥子共末嗅少許於鼻內三四次愈并除根
治疰痧其症頭腹痛煩悶眩暈若與別症相同但起於卒或之頃
痛甚顛仆按六脉皆沉或右關浮洪胸背股上有細班隱於肌
膚之內者是急尋生辛芍或蠟油各食二三枚如非疰痧難下
喉若真味甜能下神效生辛芍性最解此症再用燈草蘸菜油
點火照之隱隱紅班上焯必爆响務要細看紅痧焯否則復發
方用蕎麥五錢煎湯溫服自愈不可太熟食忌薑茶烟酒藥忌陳
皮紫蘇甘草半夏猪羊肉等誤食者凶

石爛喉妙方牛黃指甲

瓦上焙黃男女互用各五厘

青黛六分喜子窠

二十箇要墻上者瓦

焙黃冰片厘藥珍三分瓦上焙象牙屑黃均研細末吹在患處神效。

腰痛刀豆殼燒灰研末冲酒服愈。

人於三四月間有喉病者因寒天寒氣鬱結不開至春始發須初交冬時多買萊菔菜俗名蘿蔔葉攤在屋上任他風日霜露至立春前一日收下用繩掛在無日處陰乾二三月時收來切碎或醬或鹽飯燜蒸熟當小菜吃甚妙一家永無喉間之患若人家有此病此菜與他煎湯服或研細末服愈。

正月十五日為天地交夫婦當分床獨宿若犯禁忌一年內夫婦雙亡若十五子時犯之半年內必然雙亡。十六日同。

食物諸毒須知

食驚後忌走竟菜地腹內成驚若食竟菜立刻成驚而死從九
湧出遇白馬溺化爲水倘誤食者速飲馬溺或可救治。

食驢肉喫荆芥茶殺人。食黃魚羹罷飲荆芥茶足底奇痒發狂

食黃頰魚偶犯荆芥者立死。荆芥一名假蘇蜜鮮並食死

屋漏水滴肉上殺人。河鮑藥並食毒。凡服藥前後一日俱不食

獸岐尾蟹獨鰲羊一角鷄四足白鳥鳥首鳥鷄白首白馬青蹄烏

蹄肉落地不沾塵經宿尙暖曝炙不燥人水自動又皮肉無異

腸臟變改者如肝色青黯腎氣紫黑魚無腸胆牛肝孤葉鮓魚

同鹿肉。羊肉同鱧。羊肝同生椒。多食猪肉得胡荽。俱殺人。

生鱧同酥乳。變諸虫。牛猪肉同食。成寸白虫。猪羊肉以桑柴煮炙食之。亦成寸白虫。飲瓶水毒。早蓮臘梅更甚。

蛇遺不淨在澗。誤飲其水。腹中產蛇。水調雄黃服之。下蛇愈。

草藥夾雜毒草。採藥者須細心揀淨。鷄食蜈蚣百虫久。則苦毒。

食之殺人。故養生之家。鷄老不食。又夏不食鷄。

黃蠟炒鷄食之。脹悶氣塞三日而死。他毒可驗。此毒死如平人。絕無可驗。亦無救法。辟穀諸方。每用黃蠟。必須解下。然後吃他物。

解法。青菜。冬葵子湯。或麻油。大麻子汁。葵菜湯。波菱菜湯。亦可。

食物過煎。材毒者。一婦以魚湯米飯餉夫。道過煎材。花落於中。食之。死。鱓昂頭出水者。毒殺人。

守宮毒。隔宿凡上茶水不可飲。恐守宮見水。卽淫餘。瀝遺入。最毒。誤飲。急覓地漿水飲之。或可救。

夏日汗透衣。切勿烈日中晒。若將乾。忽暴雨。急爲收納。則烈日之毒。錮於內。如遇暑汗出時。偶一衣之。以暑引暑。其毒立中。症候全類傷寒。若誤作寒治。必至發狂。謔語。再誤授參芪核附湯。以益陽。未有不至口鼻流血不已者。

久閉宅舍。陰。瘴潮。疹。濕。毒。閉結不散。甚或狐淫。邪魅。借以潛踪。蛇。

虺惡獸從而盤踞。宜大其聲勢。或死之以火。驚而散之方進。
凡年久臺榭池館。藤蘿花樹。翳翳之下。不可恣爲烹飪。恐其中有
蛇虺毒虫窟穴。宴設至夜。蠅蚋之類。必爲叢積。諸物遊行梁上。
吸其所欲而不得。涎墮脩中。屢之必斃。

燥毒上坑漏火氣而臭穢者。人受熏蒸。不覺自斃。房中置水一盆。
則免此患。兔肉與鷄同煮。食易洩瀉。

柿性寒引痰。倘與蟹同食。或同羊肉食。必患痢腹痛。或至不救。

誤食砒毒。生白礬三錢井水下。

小兒科 凡兒在胎。口有惡穢。生下時。乘其啼聲未出。用棉包指。

拭去口中惡汁。則永無他疾。如不及。卽濃煎黃連二錢甘草二錢半。

熬汁。用棉團蘸與食之。待吐出惡沫。然後與乳。能令出痘稀少。
一初生三五日宜綳縛令臥。勿豎頭抱。免致驚癇。

一宜七八十歲老人舊裙褲。改作小兒衣衫。令兒有壽。雖富貴之家。切勿新製紵絲綾羅之類。與小兒服。不惟折福。且易生病。至彌月受賀宴客。切戒殺生。

一小兒四五個月。止與乳吃。半年方與稀粥。周歲以前。切不可吃。

量腥并生冷之物。令兒多疾。至三四歲後。臟腑稍壯。纔與量腥。

至薑炙煎炒。椒辣鷄鴨油膩之物。尤宜切忌。

生果菜食之
便成重積

一乳母最宜節慎。節則調養脾胃。否則脾胃損傷。百病蠭生。夏忌

熱乳。冬忌冷乳。皆宜捏去而後與之。以喜乳與兒。令痰喘成驚。

以怒乳與兒。令疝氣腹脹。以寒乳與兒。則便青而奶片不化。以

熱乳與兒。則面黃而嘔吐不食。以病乳與兒。則黃瘦骨蒸。虛羸

盜汗。以魛乳孕婦與兒。則夜啼泄瀉。胸背皆熱。以醉乳與兒。則恍

惚多驚。癩如鴉聲。食後不可與乳。乳後不可與食。乳食並進。難

於消化。初則成積。久則成癖成疳。故曰。忍三分寒。吃七分飽。多

搽腹少洗澡吃熱吃軟吃少則不病吃冷吃硬吃多則病矣

一週之內謂之芽兒切忌頻浴以致濕熱之氣鬱聚不散身生赤

遊丹毒冬久浴則傷風夏久浴則傷熱凡浴兒時須調和湯水

勿令兒驚四圍遮護謹避風寒臍背二處尤宜防護風寒由背而火能成

疳風肚臍勿令潮濕否則風邪入臍流毒心脾能致撮口臍風等症者肚中有濕將紅羊絨燒灰摻上北好

凡兒臍背下部宜煖頭而心胸宜涼解脫不可當風坐臥不宜著

地春天勿與護頂裹足以致陽氣不舒因多發熱等症

兒生六十日後則瞳子成而笑認人切忌生人持抱及見非常

之物若愛護太過日捧懷抱不令見風日不著地氣以致筋骨

見件慈幼編

柔弱數歲不行。偶少失護。疾病便生。此皆保育太過。不及之咎。嬉戲之物。不可聽其恣意久弄。亦能傷腎。至刀劍兇具。勿令持玩。會坐勿令久。會行勿令驟。睡臥須有節。要令當起早。飲食勿過美。要令當嫌少。夜莫停燈。晝莫說鬼。睡莫當風。坐莫近水。笑極與和。哭極與喜。哭笑之後。莫卽與乳。

一。小兒初有知識。不可令小廝婢女出外頑耍。易至驚嚇。且言語嬉笑。便有下列習氣。卽蹉跌受嚇。亦不使知。誤事不小。至乳母須時覺察。起居眠食。皆宜留心。不可托大。每見乳母作弊。三毒不知。兒受冤枉者多矣。且僕婢下人。性多愚蠢。其視吾兒。不受

固足受傷過愛亦能致害

一見衣夏曬日中須放地上退去熱氣冬烘衣被亦須涼後方可
穿用至洗兒衣不可露於星月之下易惹邪祟如遇失收當用
醋薰過方可衣之又有烏名隱飛最喜陰雨夜過落羽人家庭
簷置兒衣中遇到作痛必死故洗衣夜露大小人均忌

一兒剃頭須就煖處剃後用薄荷三葉杏仁三粒去皮尖搗爛入生麻油

三四滴膩粉拌察之可避風邪一切瘡疥剃頭日期丑寅日吉丁未日凶

一臍為根本風濕防護須嚴一有失防臍腫不乾久而作搗入於

經絡即成風癩并撮口臍風皆為惡候宜預用軟棉包指頻拭

牙根之上。其有筋兩條。竹刀輕輕割斷。以豬乳點之。又宜察看臍上。有赤脈直上。卽於赤脈盡頭處。灸三壯。皆預防良法。

一。小兒落胎之時。臍軟無臍。風臍硬直。定有臍風。速宜預治。臍風口噤等症。須看上腭及牙齦。上有白泡點子。用銀針或指甲輕輕挑破。血出無妨。濃磨京墨塗之。閒日再看。再生再挑。若口開有物如蝸牛。或似黃豆白虫者。用豬油薄切擦消。畧見牙關緊急。不便吃乳。啼聲漸小。口吐涎沫。便須卽照前法。觀看口舌。如法治之。然後服藥。

小兒忽然驚死。手足抽掣。當放於床上。任其牽動。不可抱緊。蓋

固足受傷過愛亦能致害

一兒衣夏曬日中須放地上退去熱氣冬烘衣被亦須涼後方可
穿用至洗兒衣不可露於星月之下易惹邪祟如遇失收當用
醋薰過方可衣之又有烏名隱飛最喜陰雨夜過落羽人家庭
層置兒衣中遇到作痛必死故洗衣夜露大小人均忌

一兒剃頭須就爇處剃後用薄荷三杏仁三粒去皮尖搗爛入生麻油

三四痛膩粉拌察之可避風邪一切瘡疥剃頭日期丑寅
日吉丁未日凶

一瘡為根本風濕防護須嚴一有失防臍腫不乾久而作搐入於

經絡即成風癩并撮口臍風皆為惡候宜預用軟棉包指頻拭

牙根之上。其有筋兩條。竹刀輕輕割斷。以豬乳點之。又宜察看臍上。有赤脈直上。卽於赤脈盡頭處。灸灸三壯。皆預防良法。

一小兒落胎之時。臍軟無臍。風臍硬直。定有臍風。速宜預治。臍風口噤等症。須看上脣及牙齦。上有白泡點子。用銀針或指甲輕輕挑破。血出無妨。濃磨京墨塗之。閒日再看。再生再挑。若口開有物如蝸牛。或似黃豆白虫者。用豬油薄切擦消。畧見牙關緊急。不便吃乳。啼聲漸小。口吐涎沫。便須卽照前法。觀看口舌。如法治之。然後服藥。

小兒忽然驚死。手足抽掣。當放於床上。任其牽動。不可抱緊。蓋

風與痰相激而逆行筋絡間皆有痰流注定後則仍歸於脾胃中。若一緊抱便凝結不散。醒後多成廢人。

一小兒臍不乾亂髮燒灰敷之立效。

一小兒遺尿方。取龜尿滴臍中即愈。取尿法。將荷葉放盆內。龜於葉上用鏡照。龜見自影即撒尿。

防小兒臍風馬牙神方

枯礬

硼砂

各二錢半

硃砂

二分

冰片

麝香五分共為末。凡小兒下地洗過後。用此末摻臍上。每日換尿布時。仍摻此末。摻完永無臍風等症。

治臍突腫

赤小豆

淡豆豉

天南星

去皮

白歛

各錢

共為末

用芭蕉自然汁調敷臍四旁。得小便自下即愈。

掩臍法。治小兒大小便不通。用連根葱白一莖。去土薑一塊。淡豆豉二十一粒。鹽一小匙。同研爛作餅。烘煖掩臍。用帛扎定。良久氣通自愈。不效再一餅愈。

延生第一方。小兒臍帶落下。取置新瓦上。用炭火四圍燒。至烟將盡。放土上。碗蓋存性。研爲細末。透明硃砂亦爲細末。水飛過。臍帶若有五分。用乳汁二蜆殼調和。或黃連甘草湯亦好。如沙糖樣。抹兒口上。一口抹完。次日大便遺下穢濁。終身永無瘡疥及諸

胎疾。保生妙法。臍帶內若有虫。當去之。

一。小兒初生卽不啼哭。奄奄如死者。急看喉間懸於前上齧。有一泡。速用指甲摘破。急以帛拭去惡血。勿令嚙下。卽能通聲。

一。小兒初生氣絕不啼。急用棉絮包裹抱在懷中。未可斷臍帶。將胞衣置爐炭中燒之。撚大紙條蘸油點火。於臍帶下薰之。蓋帶連兒腹薰時。有火氣由臍入腹。更以熱醋湯盪洗臍帶。須臾氣回啼哭。方可洗浴斷臍帶。

一。小兒初生啼哭不出。須看舌下。若連舌如石槌子。速以指甲摘斷之。或以蘆葦削作刀割之。微有血出卽愈。若舌下血出多者。亂髮燒灰同豬脂相和塗。若小兒齒根有黃筋二條。亦用蘆刀

割斷猪乳點爲妙。如兒口難開先點猪乳。又初生不小便者。急用葱白四寸四破之。以乳汁半盞煎兩沸灌下。

痘神方 橄欖核搗碎磨成細粉。雜入粉麵中作糕餅。每日隨意與小兒食之。此核末服過四兩以上者。出痘稀少。服至斤許者。永不出痘。

兒痘不出要他出方。帶肉淡櫻桃七枚煎湯服下即出。

兒火毒游瘡方。韭菜地上蚯蚓糞。以麻油調搽。

小兒出花時氣天行痘症宜預服此三豆飲。 小黑豆 菜豆

各升
半淘 赤小豆 甘草節各二兩每日水煮任意食豆飲汁。痘自不

發雖出亦稀少

治痘後結毒 赤小豆 黃豆 豉豆 各用好陳米醋浸一宿搗

如泥敷患處即愈

異傳不出天花奇方

天麻子

三十粒去殼衣揀肥大者用

硃砂

一錢揀明透者用

麝香

五厘真淨者用

右藥先將硃砂麝香研極細末後入天麻子共研

成膏於端午午時擦小兒頭頂心 前心 背心 兩手心

兩脚心 兩臂灣 兩脚灣 兩脇共十三處俱要擦到不可

短少擦如錢大勿使藥有餘剩擦後不可洗動聽其自落本年

擦過一次出痘數粒次年再擦一次出痘三粒擦過三次永不

出痘。如未過週小兒於七月七日。九月九日依法擦之。更妙。男女治法皆同。傳方之家不出天花已十三代矣。刊佈以公於世。

治小兒驚風兼能稀痘

生大黃

粉草

各三分

硃砂

一分

共研細末

用砂糖

半錢

滾水開調藥末落地之後徐徐作兩目溫溫灌完。永

無驚風之患。卽日後痘疹亦輕微。倘未曾服過。偶於五七日之間已動驚風。用此一服卽愈。

治急慢驚風神方

杏仁

六粒

桃仁

七粒

黃梔子

七個

右藥研爛加

燒酒鷄蛋清白乾麵。量孩兒年歲作丸如元霄樣之大小置於手足二心。布條紮緊一週時。手足心均爲青藍色則病已除。但

須切記男左女右不可錯置是為至要萬應萬驗起死回生方

小兒初生無皮以土狗焙灰滲之愈
一方 早白粳米粉撲之肌肉自生

急慢驚風 剪刀破貓尾取血數匙滾水冲服即活

治小兒陰子腫大不消糊砂錢一水研塗之即消。

小兒夜啼不止燈花四個為末燈心湯調乳送下二三次立效。

一方蟬退下半截分一為末薄荷湯調下立止。

治渾身起羅網蜘蛛瘡燥痒難忍豆腐皮燒灰存性為末香油調

塗立痊。 一治紅赤腫痛蒜頭半個葶薺二個煮搗爛熱酒下自消

小兒急慢風痰厥等症起死回生神方 烏梅肉 硃砂各二分

麝香

三厘共研細末母乳調灌愈。

治急慢驚風

硃砂一錢

輕粉七分

殭蠶七個

全蝎三個青蒿節蟲

搗和丸菴豆大每用一粒研細娘乳調服。歌曰。一錢硃砂七

分雪。七個殭蠶三個蝎任他急慢與驚風調服親娘乳與血

鍋焦丸小兒常服能消諸積等病妙不可言

鍋焦

炒黃三斤

神麩

山查

蓮肉

各兩

砂仁

二兩

鷄肫皮

二兩

共細末加白糖米粉和

勻焙作餅食之

小兒積食不食燒核桃存性研食之良。治瀉痢久不止肉豆蔻

去油為末三錢炒米麵一兩拌勻調服。一赤白痢大小人俱妙。蘿蔔

汁蜜等和勻服立效

治噤口痢 甜梨一個挖空蜜填滿紙包火煨熟吃立止。

治諸蟲二服除根 苦練根皮二兩 史君子肉 生薑各一兩水三碗

熬至一碗加蜜二兩又至一碗露一宿擇初旬五更徐徐熱服蟲

盡下。一方史君子去殼半生半搗碎拌紅糖空心吃少頃蟲

從大便出若未盡頻服以蟲盡為度。

打驚重方大小人肚脹或有痞塊作痛或瀉日久 雷丸 黑丑

炒 白丑炒 錫灰是錫器灰渣 鷄心枳榔炒二錢 共為末沙

糖拌食。一服立愈如下重驚多恐不淨再一服。忌香油煎炒新

見科慈幼編

鮮油膩炒米粉香糕餅一切香物一個月

面上瘡鹿角燒灰香油調抹立效

凡小兒出痘時白芥子末蜜調塗兩足心引毒下行痘不入目

方胭脂鷄蛋清調塗眼四圍痘不入目一方眼内生痘取黑

狗耳上刺血一滴入眼內卽除

初生小兒遍身紅白無皮速以早米粉乾撲候生皮乃止凡脇

下脚縫肩灣等處有紅爛無皮者兒必頻哭只用牛屎燒灰存

性研極細末摻之卽愈

六字真言。一曰睡。二曰忍痛。三曰慢臨盆。

初覺腹痛。自家拿穩主意。不必驚慌。疼一陣。連五七陣。漸疼漸緊。此是要生。疼得慢。則是該疼。只管安眠穩食。不可亂動。若忍作正產。胡亂臨盆。錯到底矣。此時第一要忍痛。忍住疼。照常吃飯睡。

覺疼得久。自然易生。千萬不可揉腰擦肚。站時穩站。坐時正坐。不可將身左右擺扭。此時必要寬懷。惜力安睡。閉目養神。若不能臥。漸且扶人緩行。或扶桌站立。疼若緩。又睡。總以睡爲妙法。且宜仰睡。腹中寬舒。無論遲早。不可用力。不可聽收生婆說孩兒頭。

已在此若當其時。孩兒自會鑽出。至小兒力薄。其轉身用力已極。到產門不能得出。只稍用力一陣助之。脫然而下矣。

或曰。大便時亦須用力如何生產。不用力曰。大便呆物必須人力。小兒自會轉動。不但必用力。正切忌用力。小兒端坐腹中。及至生產。垂頭向下。若小兒末會轉身。用力一遍。則腳先出。或轉身未定。用力一遍。則橫臥腹中。一手先出。此等弊病皆由妄自用力之故。當用力只有一盞茶時。其餘不可亂動。卽如大便。未到其時。縱用力亦不能出。况於人乎。

或問何以知此一盞茶時而用力乎。曰。若小兒到產門。則渾身骨

節疎解胸前陷下腰腹重墜大小便一齊俱急目中金花爆濺
此時用力一陣則母子分張矣

或問忍疼過久恐亦不妙曰從不聞婦人私產而難產式想因恠
人知極力忍疼疼到莫奈何處自脫然而下矣

或問若橫生倒產有法治否曰急令安睡用大劑加味芎歸湯服
之將手足緩緩托人再睡一宿自然生矣又云托之不入奈何
曰若肯睡再無托不入之理如亂動或亂服方藥必不好矣

或問盤腸生是何故曰是用力之過蓋產母平日氣虛臨時用力
努掙渾身氣血下注以致腸墜兒下一次如此下次熟路又復

如此若等瓜熟蒂落何得有此異怪乎

又問一痛便生又何也曰蓋氣已足母子兩分兒自要出矣

又問臨產有經驗之藥可用否曰不用既不用力不動手又有睡法便自會生何須用藥

又問用藥有損否曰有損如鼠兔二丸耗氣損血回生丹破血損氣以致產後中風發熱等疾此二方古今稱爲靈寶尙然如此其他藥可知矣

以問總無可用之藥乎曰只有加味芎歸湯佛手散此二方使宿血出而新血生且身體壯健無別病

凡生產艱難。或天寒孩兒生下不哭。或已死者。急用衣物包裹。再用香油紙撚。將臍帶慢慢燒斷。煖氣入腹。有氣而活。如先剪斷臍帶。則死矣。

或問臨產飲食如何。曰。此時全要好飲食調理。但不可過於肥膩。倘不能食。常進米粥。及肉湯之類。吹去油澄清。連連飲之。有益。能壯精神。人以食爲命。豈可缺乎。

臨產時。宜老成安靜。二三人伺候。不必多人。夏月更不宜人多。熱氣擁盛。使產母煩燥發暈。爲害不小。房中宜輕言底語。令其得睡爲妙。第一勸其放心安靜。忍痛歇息。不可當面求神號佛。咨

嗟驚詫。皆能令其憂疑擾亂。以致悞事。冬月宜設火盆。盛夏多貯井水。亦勿過涼。

或問試痛何故。曰。兒到七八個月會動。或母腹中有火。或起居不時。令兒不安。以致動疼。宜照常穩食安睡。一二日自安。或痛之不止。用安胎藥一二服。萬不輕易臨盆。亂動如剖卵出雛。豈能活乎。

何爲試疼。一陣緊一陣者。正產也。一陣慢一陣。或乍緊乍慢。皆試疼也。止腹痛者。木產也。連腰痛者。將產也。

傷食受寒。何以辨之。曰。傷食者當臍而痛。手按之更痛。或臍旁有

一硬處寒痛多在臍下綿綿而痛不增不減得熱物而稍緩也
或問倘將正生認作試疼不亦害乎曰無害果當其時小兒自會
鑽出縱或過時不過落於褲中何大害

孕已知覺卽用布一幅六七寸寬橫束腰間直至臨盆之時解去
若試疼不宜解去

有孕後睡時須兩邊換睡不可儘在一邊則產時中道而易生矣
有孕後最忌無怒口不可出疾言手不可用鞭撻蓋怒傷血氣多
有因此動胎者卽不動胎怒氣入胎子生多疾

娠婦不可登高上梯恐傾跌有損不可伸手高處取物恐胎傷而

子啼腹中如腹中子啼。但令娠婦鞠躬片時。或俯拾地上錢。豈之類。自安。

孕婦禁忌。一切宰殺凶惡之事。不可看。修造興工動土之事。不可看。龜兔及殘疾污穢怪異形象。俱勿看。

產後數日。忽然渾身大熱。面紅眼赤。口渴。此血虛之症。宜用當歸補血湯。若認作傷寒。而用石膏芩蓮等寒涼之藥。則必死矣。

產後上床。宜高枕靠墊。勿令睡下。膝宜豎起。隨飲熱童便一盞。只

宜閉目靜養。勿令熟睡。亦不宜高聲急叫。以致有驚恐。四壁

宜遮風。不問有痛無痛。俱要用熱童便和熱酒各半。每次一杯。

一日三五次至三日而止。若無大病，只是如此，不必服藥。米
粥不拘時候，可進則進，忌暈腥一月。

死胎只宜佛手散服之自下。如不下，再用平胃散一服，外用黃牛
糞炒熟，絹包熨腹，何以知其死胎？曰：面赤舌青，母活子死；面青
舌赤，子活母死。

胞衣不下何故？總是臨盆早之過，當產骨開，壯者數日合，弱者一
月方合。不待其開而強出之，其胎出而骨眼隨閉，以致胞出不
及耳。

此症可傷命否？曰：不妨，不必服藥，不必驚恐。若胞衣不下，急用粗

麻線將臍帶繫住。又將臍帶雙折再繫一道。以微物墜住。再將臍帶剪斷。過三五日。自痿縮乾小而下。此方屢驗。只與產母說知。不必驚恐。萬不可聽收生婆。忘用手取傷生者甚多。

或問早一時不可用力亂動。如遲一時可不妨否。曰。不妨。若當其時。必無不出之理。或偶有不出。宜上床安睡。使小兒在腹中。亦安睡。歇力少刻。自然出矣。何用早動乎。

昔一婦產兒。手先出。不能得入。穩婆用力欲取。子知之。急令安睡。與大劑芎歸湯食之。徐徐手入。明日早生下。

大全方曰。孕有七八個月生者。有一二年後生者。不可不知。

增廣達生編

達生編人所當知。宜時常觀看解說。富貴之家。尤宜熟講。蓋閨人平時嬌養。口飫肥濃。身安逸樂。且性情嬌執。不聽人言。到此時纔一知覺。卽不能耐。房中擠簇多人。內外嚷成一片。穩婆絡繹。各要爭功。脈未離經。胎未轉下。卽便坐草。及至不順。奇方珍藥。紛紛亂投。以致母子兩誤者多矣。豈不惜哉。

或曰。穩婆不必用乎。曰。既有此輩。亦不能不用。但要我用他。不可他用我。全憑自家作主。不可聽命於彼耳。大約此等人不明道理。一進門來。不問遲早生熟。使令坐草用力。一定說兒頭已在此。或

令揉腰擦肚。或手入產門探摸。多致傷損。更有一等狡惡之婦。借此居奇射利。禍不忍言矣。

房中只要會生育。過老嫗。及有氣力抱腰女人。靜以守之。米粥時進。以飽爲度。

腹痛不生。非是難產。還是子未出胎。切勿懼怕。卽一日二日至三五日無妨。安心定氣。任其自然。勉強忍痛。照常飲食。要坐則坐。要行則行。要睡則睡。保養精神爲第一。莫聽穩婆促迫。用力太早。白已亦勿求速離身。旁人亦勿多言恐懼。以亂其心。時至自然分娩。將產最戒曲身眠臥。雖甚腹痛。切戒曲腰。以阻兒轉舒尋路。蓋兒

至難產人見其不動則謂死胎其實因無力而非死也只要速
送產母元氣心安氣和調理精神胎元漸復可保無虞又有胞水
下子忽不動停至一二日三五日者調補氣血之外切戒驚恐
慮暴躁蓋驚則神散憂則氣結暴躁則氣不順血必妄行多致
自悶。知此善調自無可恙。

手先出名曰橫生。足先出名曰倒生。救法急令產母仰臥。畧以
塗兒手心足心。仍以香油抹之。輕輕送入。卽便自轉順生。不可
其久出。久則手足青而子傷。難以送入。亦不可妄用催生方藥。

手足之出。非藥可治。又切勿誤聽凶婦用刀斷手。一斷。子必腹亂擾。而傷母矣。

產時。如門戶已正。兒已露頂而不下。此必因兒轉身。臍帶攀肩。名曰礙產。治法令母仰臥。輕輕推兒向上。以手中指按兒肩。去臍帶。俟兒順正。用力送下。

產。生路未正。被產母用力一逼。令兒偏挂左右腿畔。兒頭在產不下。但云頭已露頂。非頂也。乃額也。名曰偏產。治法令母仰臥。輕輕推兒近上。以手扶其額頂端正。用力一逼。卽下。

已出戶時。人卽以兩手抱產母胸前。產母亦自以手緊抱肚腹。

胎衣下墜如胎衣來遲切勿慌忙以草紙燒烟燻鼻卽下再遲
則急斷臍帶洗兒仍用軟帛物繫墜臍帶然要輕巧牢固然後截
以此帶極脆若不便斷臍帶恐血反潮入胞中攻心則傷母。

骨不開多因用力太早逼兒頭在戶口也數日不下者服藥後
閉目靜養片時則藥入陰分藥始奏功不然無效蓋開目則氣行
閉道閉目則氣行陰道夜雖屬陰不閉目則尚在陽晝雖屬陽一
閉目則氣亦入陰矣產婦須耐心靜按自己兩手中指本節後有
心跳動此方是正產消息直至中指中節兩旁之脈應手亂跳痛
又緊方可臨盆若中指本節無脈動便非產期中指中節無脈

動尚須少耐不用坐草。以此爲候。百無一失。又臨產時總宜吃
不令空腹。則產後易健旺。

難產七因

因安逸。蓋婦人懷胎。血以養之。氣以護之。宜常時行動。令氣血
流。胞胎活動。如久坐久臥。以致氣不運行。血不流順。胎亦沉滯
活動。故令難產常見。

因奉養。蓋胎之肥瘦。氣通於母。母之所嗜。胎之所養。如嗜食厚
不知節制。每致胎肥。難產常見。糟糠之婦。容易生產。可知。

因淫慾。古者婦人懷胎。卽居側室。不共夫寢。蓋情慾一動。火擾

小中血氣沸騰三月以前犯之則易動胎小產三月以後犯之則
犯衣大厚而難產再則胎元漏洩子多肥白而不壽瘡毒痘毒疾
也難醫。

因憂疑令人求子之心甚切保胎之計反疏或問卜禱神或聞
日產變者常懷憂懼心怯氣閉血脈阻滯產亦艱難。

因軟怯如少婦神氣怯弱子戶未舒更腰曲不伸輾轉傾側兒
不得出又中年婦人生育既多氣虛血少生亦艱難。

因倉皇有等愚蠢孀婆不審正產弄產但見腹痛遽令努力產
無主只得聽從以致橫生倒產子母有傷皆因倉卒之失。

因虛乏。娠婦當產時。兒未欲出。用力太早。及兒欲出。母力已乏。兒停住。因而產戶乾澁。產亦艱難。此可以補血催生。如保產無湯最妙。

有嚴寒天氣。滴水成冰之時。貧家房中火氣微薄。以致血寒。而亦令不出。然此亦因臨盆早去衣久坐之故耳。若令擁被安臥。時而產。豈有此患。是以冬月生產。下部不可脫去綿衣。并不可臥冷處。臍下腿膝間。要令常煖。血得煖則行。兒易產也。

胎七八個月。胎忽亂動。三兩日間。或痛或止。或胞水已下。腹痛

止。脈未離經。離經之脈一呼一吸六至或沉細而滑此非產也。名曰試胎。又有臨

產一月前忽然腹痛却又不產。此是胎轉。名曰試胎。胞水有無俱不妨事。只要直身坐臥行立。不可驚憂逼迫。二者俱非正產。必因曲身觸犯而然。

有孕之後。飲食宜淡泊。不宜肥濃。宜輕清。不宜重濁。宜甘平。不宜辛熱。宜食諸物。猪肚 肺 淡鯊 火腿 海參 白菜 蓮

子 熟藕 山藥 麻油 腐皮 橄欖仁 服至一斤生子聰明而少痘

金銀花湯 炒蓮子湯 諸味總宜潔治。多用清湯。吹去浮油。飲

之最佳。俱宜白煮。忌用油煎。然此亦為膏粱之體言耳。若藜藿之腹。亦宜得肥甘而潤之矣。六七個月後。腐皮麻油二物。最宜多用。

不妨日日食之。麻油解毒腐皮滑胎。且清卽兼補。貧富皆宜卽食。一二百張。則生產極易。或以麻油拌食更妙。但麻油不宜熬熟。

食諸物。椒 薑 煎炒 野味 豬肝 犬 驢 馬 螺

因 自死肉 豬血 甲魚 蝻 蝦 鱈 魚 勿多飲酒

勿亂服藥。產後宜用鐵秤錘或白石子。燒紅入醋。令醋氣入鼻。以免血暈。且收斂神氣。又能解穢。每日三四次。過三日止。或惡血
倒心。血暈昏悶不省人事者。用萆菜切碎。放有嘴壺瓶內。以熱醋
大碗灌入。密封瓶口。扶起病人。以壺嘴向鼻。遠遠熏之。

此男生女。夫命所招。與婦人何干。倘或連胎生女。不可在旁咨送。

嘆息令其氣善致病傷生凡此只宜寬慰爲主又有將女溺死者忍心害理必有慘報。歷歷不爽。

產後或腹痛。用馬料豆炒至烟出。用老酒淬之。如此三次去荳飲酒能治產後七十二症。傷風受寒者尤宜。

產後飲食各處不同。徽俗纔上床。卽與肥鷄乾飯。吳俗率與藷粥。甚至有彌月而後茹暈者。皆不通可笑。蓋難消化之物。產後百脈

空虛。脾不運動。必致成病。大清淡。又不能生精神。養脾胃。惟三朝宜吃白米粥。每次二三碗。日三四次。晚間亦然。小菜宜陳而淡者。大量不可早吃。肚肺海參腰子陳酒藕湯。相間時啖。自無他病。鷄

鴨蛋不可吃。糖心鷄蛋尤凝滯。斷不可入口。

或問食物必要去油。取其清也。曰不但要清。且更要淡。蓋清淡之味。本乎天。能生精神。濁則否矣。若飲醇酒。食鹹味者。皆令燒乾無乳。此其驗也。

產後漸進。毛米粥飲。取糠氣能降火。白粥宜極稀。以漸調理。爲上乳少者。血虛之故。如產母去血過多。又或產前有病。以及貧賤之家。婢僕下人。產後失調。養血脈枯槁。或年至四十。血氣漸衰。皆能無乳。但服通脈湯。自有乳。若亂用穿山甲。王不留行等物。往往不效。卽或勉強打通。乳汁清薄。令兒不壽。且大損元氣。產後多病。不

夫便乾反爲不美

小產重於大產大產如粟熟必脫小產如生菜破其皮亮斷其根
蒂也但人往往輕視死者多矣一切調理並如大產法小心將養
須過於正產一倍可也

種子丸

赤腳大仙傳

此方出於雲南大理府有一姓周年六十一歲一妻九妾無子因
己身虛弱精血清寒元陽不固難以生子憂之後嗣一日遊名山
遇一老僧久脩得道真人因談內事周訴乏嗣求良方真人憐其
誠信乃發心傳授一方此藥清而不寒溫而不熱男服則壯筋骨

添精補髓滋陰固本女服則調經安胎順氣助陰周拜而受之依
方合脩服至四十日自覺目明身健鬚黑髮烏勝前百倍果有水
火既濟之功延本還元之妙強筋健骨夜度數女堅固強硬後妾
生得七子繫其宗衍周壽至九十七歲此方屢服屢驗刊刻在碑
爲子孫之計若後人無子者立可成孕卽有子亦可常服此藥專
治身體虛弱者少時酒色過度頭眩耳鳴眼目昏花腰膝疼痛四
肢無力自汗盜汗元陽虛損夜夢遺精陽痿不舉均可治之補丹
回養元氣延年益壽不可盡述或男子精寒腎虛陽事不能久堅
元陽衰敗女人氣血寒冷子宮久虧赤白崩漏經水不調久不受

胎此為第一方也

真魚鱉

一斤切片牡蠣粉炒成珠

銀杜仲

八兩去皮鹽水炒

白當歸

八兩酒洗晒乾

白蓮鬚

八兩煉淨

肉菴蓉

八兩去甲酒洗淨晒乾

兔絲餅

八兩去灰土炒酒煮成餅晒乾

真沙厘

八兩入乳驢童便老酒各炒二兩

巴戟肉

八兩去骨酒炒

淫羊藿

八兩去淨根枝

毛真羊

油酥

淮半七

六兩肥者去蘆切片酒洗晒乾

破故芷

六兩揀淨鹽水炒

結雲

苓

四兩入乳浮蒸彩次晒乾

紅枸杞

四兩揀淨酒蒸晒乾

大附子

二兩每個重四錢漂製聽用

上肉桂

二兩去皮

上桂附子老人可用年少不用以上諸藥遵依

古炮製共研細末蜜為丸如桐子大每早服百粒用淡鹽湯送

下晚服百粒陳老酒送下如無子者依此方修服捷於影響

有服此方者無不效驗予不敢私特附剞劂廣傳於衆亦可謂

小補云爾

豫章曹光裕堂敬傳

求嗣之方甚多神效者錄之

男子止宜寡慾精氣便厚如精氣已衰者

犬赤何首烏

內有錦紋者連皮打碎人乳浸蒸日晒夜露九次取乾者四兩

芡實肉

四兩人參量

黃枸杞人乳浸一宿晒乾二兩

白蓮蕊

十一對選將開者去梗連鬚房瓣並用晒乾各為末

生地黃

酒浸一宿八兩用木甌安煑羊腎鍋上蒸極爛外羊腎十一對

淡鹽醃一

宿用白酒滷於砂鍋內煮至深黑色取起去囊皮筋膜同地黃

先杵千餘下又上藥和八再杵二千餘下為丸如黃豆大如乾

酌入蜜煉每服三錢空心淡鹽湯下須戒定色慾待婦女經盡

交媾即成孕矣

婦人止宜調經不可用春方種子不可用香附丸耗氣血亦宜寡慾使血不妄動或長服六味丸

調經種玉湯

醫鏡云子一生調經不論虛實寒熱惟用此方無

不神效真仙方也

當歸川芎吳萸

錢各

熟地香附

錢各

白芍茯苓

陳皮

錢各

元胡

錢各

右藥作四劑加生薑片

錢各

水碗半煎至一碗空心

服渣再煎臨臥時服待經行之日服起一日一劑藥盡經止則

當交媾即成孕矣不效俟後月經來再服四劑必孕若過期而

經血色淡者加官桂炒乾薑熟艾

錢各

若先期三五日色紫者加

條芩三錢

必孕湯 若經準而不孕照方服四劑下期再服四劑無不孕者

續斷沙參杜仲當歸香附益母川芎橘皮錢砂仁五錢水煎服

治胎前產後泄瀉平胃散 蒼朮米泔浸厚朴薑汁炒陳皮各錢甘草炒

二分煎服

八仙糕凡陰陽不足之人此糕最補脾胃肥壯身體 白朮白茯苓

芩淮山藥蓮薏芡實各八兩飯上蒸熟曬乾臨合時微炒陳皮甘草各兩臘炒米三斗共每

年臘月極凍之日炒糯米用大簋放天井中間鋪開冷透以收

臘氣藥共磨篩細收磁罐內勿洩氣食時旋入糖滾水沖服

天地生生之理。止陰陽二氣。男秉陽。女秉陰。男肖日。女肖月。男子
生氣。一日一動。女子生氣。一月一週。半夜子時。男子生機所發。月
經行日。女子生意所萌。能於此生生之時。加意保護。便可却病延
年。此一定之理也。每思世間女子。較男子常逸。至於富貴之家。閨
婦。錦衣美食。曲房深屋。無飢寒風露筋力勞苦之事。然癆瘵
多。疾病時作。此何故哉。蓋其受病甚微。中於所忽。而不自知也。
八抵女子年十四。則天癸至。月事時下。此時生意勃然。凡以生以
育。皆由於此。第其將行之時。新者未生。舊者欲去。意中必有煩躁。

狀異於平日彼時自知經將欲行一切起居便當加意調攝勞
氣腦悲鬱憂驚俱不宜犯最不可飲食冷物坐臥冷處蓋寒冷
肅殺之氣最害生意况經行之時四肢百骸毛孔皆開然後舊
人於衝脈而下彼時若一受寒氣不論何處其欲下之血卽停
不行初則止須毫毛之聚逐日血行周身至於所凝之處則滯
不行日積日多此瘀血癆傷癥瘕痞塊癰癰膈噎行經疼痛短
諸病所由來也至於淨後一二日內百骸四肢皆生新血此時
受冷氣則生意鬱遏無論何處受冷則此處便不生發此血枯
症黃瘦無力心脾脹悶月經過期帶下諸病所由生也當其時

感之至微原不知覺至病已成醫家又隨病施治不究所以此婦人所以多病而難治也况富貴之家婦女素習驕恣又善掩飾甜瓜冷菓一時可口禁之不能且好啖生冷則胃氣內寒見熱便怕不知一時之爽利有限日久之疾痛難當以致不能生育種種受害皆由於此今特指出凡天下婦女能於行經時慎避風寒戒食生冷及一切難以消化之物與夫勞碌氣腦悲鬱憂驚加意禁制如產後調攝一般每月不過五六日使百病自除此時服藥亦易收效故去積行瘀須於經行之時趁勢下之補養調理須於經淨之日乘機助之其奏巧必速於往日此中轉弱爲強挽回造化實

具至妙元機。奈世俗庸醫未嘗深論。及此若能深信而力行之。有
疾婦女半年之內。有不脫體安吉者。誓斷吾舌。且可使永無疾苦。
廣嗣多男。其所益豈淺鮮哉。

回生方論

初集庵曰。回生丹。保產之仙方也。前有修合送人者。臨產服一丸。
坦然快便。不覺其功。但聞製藥。齋戒虔心。發願普濟。然後擇一靜
室。如法遵行。吳門馬同學。製此丸。蒙以十九丸見贈。余知其丹之好。
不知其丹之神也。歸卽隨便送人。癸丑冬。有一難產者。子死腹中。
亦聞而急檢筒。尙有一丸。與服之。死胎立下。母命護全。人咸驚歎。

余遂發願修製送入迄今已數十年屢試屢驗而艱難諸症之護
救者不下數萬人但不知此方起於何人記云長葛孫奎臺得之
異人傳授然製法湯引尚有缺處不若余得者之詳且明也今列
於左

秋授資生丹方

忌鐵器要緊

綿紋大黃

一斤為末

蘇木 三兩搥碎河水五碗煎汁三碗聽用

大黑豆

三升水浸取壳用絹袋盛壳同

豆煎熟去豆不用將壳晒乾其汁留用

紅花

三兩炒黃入酒四五碗煎三五滾去渣存汁聽用

米醋

九斤陳者

佳

將大黃末

一斤

入淨砂鍋下米醋

二斤

文火熬之以長木筋不住

手攪之成膏再加醋

三斤

熬之又加醋

三斤

次第加畢然後下黑豆

汁三碗再熬次下蘇木汁次下紅花汁熬成大黃膏取入瓦盆

盛之大黃鍋鈿亦鏟下入藥

凡收合時務要虔心并忌婦人孝服雞犬生人不見之處方妙

土白黨

二兩

當歸

一兩

川芎

一兩

香附元胡索

各一兩

蒼朮

一兩

浸炒蒲黃

一兩

隔紙炒茯苓

一兩

桃仁

一兩

去皮尖川牛七

五錢

炙甘草

五錢

榆五錢

酒洗川羌活

化橘紅

各五錢

白芍

五錢

酒炒木瓜

三錢

青皮

三錢

三錢

米烏藥

二兩

去錢皮夏薑

木香

各四錢

乳香沒藥

各二錢

益母草

二兩

馬鞭草

五錢

秋葵子

三錢

熟地

一兩

三稜

五錢

醋浸五靈脂

五錢

山萸肉

五錢

酒蒸搗爛入藥

右藥三十味并前黑豆壳共晒乾為末入石臼內下大黃膏拌

勻再下煉蜜斤一共搗干杵取起為丸每丸重二錢八分陰乾須

二十日不可日晒不可火烘乾後重二錢有零以蠟護之

臨用參湯服一丸分娩全不費力如無參淡炒鹽湯亦可論口
凡胎已成子食母血月足血成塊謂之兒枕將產兒枕先破血
裏孩兒故難產服此逐去敗血須臾自生橫生逆生同治亦有
因氣血虛損宜多服人參爲引。

一子死腹中因產母染病所致用車前子錢一煎湯服一丸或二丸

三丸無不下者若因血下太早子死用人參車前湯服如無參
用陳酒少許煎車前服亦可。

胎衣不下用炒鹽少許泡湯服一丸二丸卽下。

產後血暈用薄荷湯服一丸卽醒。以上四條危症乃臨產緊要關頭。時卽有名醫措手不及起死回生此丹必須預備。

產後三日血氣未定還走立臑奔充於肝血暈起止不得眼見黑花滾水服一丸立愈。

產後七日氣血未定因食物與血結聚胸中口乾心悶煩渴滾水服一丸立愈。

產後虛羸血入於心肺熱入於脾胃寒熱似瘧實非瘧也滾水服一丸立愈。

產後敗血走注五臟轉滿四肢畱停化爲浮腫口渴而四肢覺

寒乃血腫非水腫也服此丹愈

產後敗血熱極心中煩躁言語顛狂非風邪也滾水服一丸愈
產後敗血流入心竅閉塞失音用甘菊花桔梗各三分煎湯服
此一丸愈

產未滿月誤食酸寒堅硬之物與物相搏流入大腸不得化
泄痢膿血用山查湯服此丸立愈

生產時百節開張血入經絡停滯日久虛脹酸疼非濕症也蘇
梗煎湯服此丸愈

產後月中飲食不得應時兼致怒氣餘血流入小腸閉塞水道

小便澁結。溺血似鷄肝。用木通四分煎服。又或流入大腸閉。

却肚門大便澁難。有瘀血成塊如鷄肝者。陳皮湯服此丸愈。

產後惡露未淨。飲食寒熱不得調和。以致崩漏。形如肝色潮熱。

煩悶背膊拘急。用白朮三分廣皮二分煎湯服此丸愈。

產後敗血入五臟六腑。並走肌膚。四肢面黃。口乾。鼻中流血。遍

生斑點。危症也。陳酒化服此丸可愈。

產後小便澁。大便閉。乍寒乍熱。如醉如癡。滾水送服此丸立愈。

產後血崩。糯米湯下。一產後赤白帶下。煎阿膠艾葉湯下。

產後嘔吐。陳皮生薑湯下。一瀉血。大棗湯下。

一產後咳嗽不止五味子廿蘇葉錢煎湯下。

一產後傷寒頭疼身熱無汗加麻黃三葱薑煎湯下。

一產後傷風頭痛身熱自汗冬加桂枝春夏加防風白朮末各三分葱薑湯下。

一產後喉中似蟾鳴敗血冲過於心轉入肺肺主氣血冲心氣與血俱結成一塊於喉中聲似蟾鳴人以為怪得此症者十不救一服此丹可愈。

一產後便澁腰痛似角弓。妊婦百日之外血氣方滿今在月中七日之外食油麵爽口之物以致煩躁不得安寧因循不肯服藥。

兼傷房事。或久病後坐臥當風。取其一時之快。不肯房事。將息宜乎有此病也。急服此丹即愈。

一治經脈不通。婦人經脈猶溝渠也。溝渠壅塞。則水道不行。婦人氣閉。則經水不通。切不因循養病而喪軀。要急服此丹。以通流之。保其天和。遂其化工。美哉妙哉。

一治室女經壅不通。室女經脈與婦人不同。隱匿於胞絡。漸入子宮。至十三四歲出現。始知人事。苟或喜怒寒濕溫熱失宜。以此經不通。猶乾涸也。宮中癸水不行。猶地之水瘀逆而乾涸也。室女身中亦猶是也。易曰。天一生水。地六成之。先服四物湯三五

帖使癸水生於宮中然後服此丹引導流通勿可聽庸醫作癆
瘵治也。四物湯方詳第二症內。

一治室女經痞不通加

蓬朮三分

薑黃末

五分

赤芍

二分

天花

粉四分

俱爲末同酒化開不拘時服。經自然通矣。

一治婦人月信前後不一空心酒化服卽準。

以上危症皆產後破血爲害也。故此丹有奇功。至產後一切異症
醫人不識。人所未經。但服此丹無不立安。一丸未應。二丸三丸必
効無疑。胎前常服此丸。壯氣養胎。滋陰順產。調和臟腑。平理陰陽。
更爲神妙。室女閉經。月水不調。眾疾彙聚。服此丹者。諸病悉除。無

不神效南方近來此等病症最多子甚憫焉故製丸送人并刊此
方廣佈使世之善人君子或製丸或印送俾四海之閨中免此難
症幸甚矣。○此方余未克製造試驗然前人必屢試驗方刊刻傳
世豈誑妄哉若能遵其洵製備以濟人其功德固屬不淺但婦人
一胎產乃天地自然之造化天豈以生道而殺人哉必不然
而世竟有因難產而殞命者抑又何也蓋因用穩婆之悞以致
如此良可悲夫余室人於癸未年分娩先一月接穩婆在家臨盆
三日不產幾致殞命舉家驚慌連接數穩婆入門皆揉腰擦肚
卒莫能產危急之時接遠方有祝姓穩婆至進門卽命扶室人於

床上俯臥不須著力不用恐懼彼施符水室人上床安睡片時卽
寬精神稍健須臾室人自謂兒已生在床上矣。感謂祝氏法術之
神。後余至長沙。遇一名醫。遂以婦人產難之事相詢。醫曰。天下無
難產者。皆彼穩婆使之用力太早。用力不產。愈用氣力。以致力竭
神疲。加以生死關頭。在心驚怖。憂悲。夫心乃藏神。心驚則神散。肝
藏魂。肝鬱則魂離。肺藏魄。肺悲則魄飛。精神耗散。魂魄飛離。胎定
難產。以致殞命。間有橫倒者。皆由用力之早。逼使然耳。君但看
西齋居士之達生編。自明此理。余曰。達生編書店中有否。曰。有余。遂
購得一本。展視見六字真言。其文雖約。其理甚精。反覆購思。得明

此理以後余家各婦生產并無難事。此僅二十八頁。至精至微。并
載有胎前臨產產後諸藥方。屢用甚驗。余願諸君子各購一本。熟
觀而玩索之。並將於鄰里老媪說而開道之。則天下自無難產之
心。枉死之產婦耳。是爲誌。

至籍中一切濟人利物之事。並口頭方便。種種能行。固屬功德不
淺。但思濟人之事。又莫如行醫。不費銀錢。而福緣無量。故古人云
生不能爲良相。便當學爲良醫。謂可以濟世。誠確論也。余自脩省
不讀。太微功過格。見凡救命一人。皆准百功。自村不惟財勢不
在。以救人。卽活人之事。亦不能數觀。遂思學醫可以救疾活人。構

小孫真人朱丹溪李東垣王叔和李士材張仲景以及素問內經
可書悉心研究畧得大意爲人治病未嘗不已人之疾究竟胸無
成見下藥未免疑信相叅後讀景東腸先生嵩崖尊生一書忽心
下一旦豁然明徹爲人視病診脈不過察其遲數以定六部十二
經手足之三陰三陽兼看舌胎對徵夫陰陽表裏於七表八裏恐
以不清反滋疑惑至於決人生死亦不過於七怪脈審之而已於
經籍之上身中身下身周身六淫七情婦部幼部逐一反覆探索
用藥亦照斯籍之良方不增不減自此視病診脈無不洞見并無
延慮治疾無不效驗但於幼兒驚風等症難以自信後得夏禹疇

生幼科鑿鏡一書。知望形色審苗竅之法。又得精詳外症。讀外
正宗兼習膠丹之法。亦頗通曉。以後凡遇男女內外大小諸症。
有手到病除之功。所救活之人。亦不勝數。皆得力於嵩崖尊生。
科鑿鏡外科正宗諸書也。有志濟世者。曷亦購此三書。並本草
性細玩而窮索之。由此而救疾活人。不憚煩勞。不受謝金。其功
豈淺鮮哉。

道好生人命最重。其報應自不止福及己身。而百福千祥。亦必
將子若孫。六獲餘慶耳。余之學醫濟世利人。已獲明效。且亦非
事。只要於看書時。心領神會。臨症時。悉心察形觀色。診脈而察。

又必察其舌色之紅白黃黑則表裏陰陽自明庶用藥亦不致
余是以爲諸君子告冀同志勉力勿怠是幸

附天醫日以備查看

月卯日 二亥 三巳 四未 五巳 六卯 七亥 八丑

九未 十巳 十一卯 十二月亥日

治馬患諸病 白鳳仙花連根葉熬膏有病抹其眼角四圍卽

出汗而愈

猪病 水銀錢灌下去腸中之惡穢則愈

猫狗病 烏藥錢煎湯灌愈

水鬼方 古云死於水之鬼羊臊氣岸死之鬼紙灰氣水鬼怕
寫字如遇羊臊氣急寫一囂字可遠害。

弄哮喘方 用鮮白鳳仙花連根葉一二株洗淨春爛。又加白

芥末二兩白芷末二錢共合一處攪勻將病人在無風處從頂
節骨起直敷至尾骨止敷完再加沙紙一條封上初時涼至一
時後極熱至耐不得然後去之穿衣不可見風一次而愈忌房
事一月倘或再發必輕再一服除根矣。此乃王兼水先生所傳
屢試屢驗真仙方也。

百越竹林寺女科

婦女之病九十一症治法七十九方

第一經前論其症血來如膽水五心作熱腰痛并小腹痛面黃

色不思飲食乃氣血虛先退其熱然後調經次月血勝而愈先

用黃芩散治之

黃芩散方

黃芩六分 川芎八分

當歸白芍 蒼朮各錢

甘草三分

知母

五分 花粉五分 水煎溫服後用調經丸

調經丸方

山稜 莪朮 當歸 白芍 生地 熟地

各錢

元胡 茯苓

各雨

川芎錢小茴香錢烏藥錢大茴香錢砂仁錢香附錢米糊錢為丸菜豆大

不拘時酒服

中二經後 論其症經來如漏水頭昏目暗小腹乍痛兼白帶咽

中莫如魚腥惡心吐逆先用理經四物湯後用補內當歸丸

理經四物湯三 當歸二錢川芎八分生地三錢柴胡七分白朮炒元胡焦

醋炒香附各一錢半白芍酒炒一錢二分黃芩酒炒三稜各一錢水煎臨臥服

補內當歸丸四 當歸續斷白芷阿膠厚朴茯苓菴蓉蒲黃炒

黃肉各兩川芎五錢熟地兩半甘草乾薑各五錢附子一錢蜜煉為丸空心溫

酒下七八十粒次月即愈

第三經或前或後。論其症因皮土不勝不思飲食。由此血衰宜

補脾。則血旺氣勻。自然應期。宜服紫金丸。

紫金丸

五

陳皮

五錢

良莠

五錢

檳榔

五錢

砂仁

五錢

紅花

五錢

枳殼

錢三稜兩一米糊為丸。米湯送八十粒。

第四經血虛發熱

論其症因婦人性急。或行經時房事觸傷。脇

中結一塊如鷄蛋大。在左右兩脇。月水不行。變成五心煩熱。頭

痛目暗咳嗽生痰。若半年一載不醫。肉瘦泄瀉。則難治矣。宜先

止熱用逍遙散。

逍遙散方

六

當歸白

芍

川芎

各八分

黃芩

六分

薄荷葉

四分

地骨皮石蓮肉各錢胆草五分水煎空心服止其嗽用紫苑湯

紫苑湯七杏仁錢半去皮去尖阿膠炒研八分待煎好方入藥白桑皮蜜炙知母炒

川貝去心枳實各錢五味子五分桔梗紫苑蘇子各錢欵冬花九分水煎臨

飲服

第五經閉發熱論其症因行經時及產後食生冷并食水果血

見水則滯過也初起一二月作寒作熱五心煩燥脾上勝自然

經水流通若半年不治變成骨蒸子午面熱肌肉消瘦泄瀉不

止急宜治之病倘甚重急用鴉片三厘調甘草湯送下有起死回

生之妙宜服逍遙散紫苑湯二方俱詳第四

第六行經氣血作痛。論其症經來一半血未會盡腹中作痛變發潮熱。或有不熱須破其餘血熱止痛。安宜用紅花散。

紅花散

八

枳殼

六分

紅花

七錢

牛膝 當歸 蘇木 赤芍 三稜 莪朮

各分

川芎

五分

水煎空心服

第七經來不止。經來一日不止有半月之久。乃血妄行。問其故。

曾吃椒薑熱物過度。否是謂熱症。須用金匱散。

金匱散

九

續斷 阿膠

炒

地榆 當歸 白芷

各錢

黃芩 川芎 白芍

各分

熟地

二錢

水煎空心服

第八經來如黃水。此症人虛。不可用涼藥。須煖其經以和其血。

次月血勝而愈宜用加味四物湯

加味四物湯寸當歸烏藥川芎元胡小茴香白芍各八分熟地錢一

薑棗水煎空心服

如九經來如綠水 此症全無血色乃大虛大寒不可用寒涼藥

要用烏鷄丸半月非但病愈又能懷孕

烏鷄丸十一天雄附子三錢鹿茸山藥菟蓉肉桂蒲黃此當歸

黃肉川芎各一分白芍兩一熟地兩半烏鷄肉皮油不用米糊為丸空心

酒送下百丸

如十經來全白色 此症無血色五心煩熱小便作痛面色青黃

乃血氣虛也服此半月必孕宜用烏雞丸方詳第十一

第十一經來成塊 如葱白色又如死猪血黑色頭昏目暗唇麻

此症虛也急用內補當歸湯方詳第二症內

第十二經來息如夏月之腐 此乃血弱更兼熱物譬如水乾涸

溝渠久則臭也身衰舊血新血不接則臭宜用龍骨丸。

龍骨丸 十二 龍骨海漂蛸牡蠣生地 各錢 當歸川芎白芍茯苓

資 黃芩 六分 蜜丸空心服百丸

湯藥方 十三 當歸三稜莪朮赤芍丹皮白朮香附條芩陳皮

木通 資 薑一片煎服

十三經來不止如魚腦 雙足疼痛不能動履乃下元虛冷更

兼風邪所致宜行血行氣疎風止痛散

疎風止痛散 十四

當歸天麻薑蚕烏藥牛膝獨活石南藤紫

金花乳香骨碎補

各錢

川芎

五分

薑片

三分

葱白

三箇

酒煎空心服

十四經來如牛膜片 此症經來不止兼牛膜色一般昏迷倒

地乃氣血變成雖驚無事用硃砂丸

硃砂丸 十五

硃砂

錢一

白茯苓

兩一

水和丸煮湯送五十粒立效

十五經來如血胞 經來不止或下血胞三五個如雞蛋大用

刀割開內石榴子其婦昏迷不知人事無妨宜十全大補湯

十全大補湯十一 當歸白朮各一錢 川芎白芍人參茯苓各一分 生地

黃芪各一錢 薑棗煎空心服三五帖立效內有甘草肉桂末二味米

炒令老肉桂味辛恐動血宜加減用之為要

第十六經來疼痛小便如刀割 此乃血門不開皆用八珍無效

宜用牛膝湯一劑有功

牛膝湯方十七 牛膝三兩 乳香麝香各錢 水碗半煎牛膝至一碗

臨服磨乳麝入內空心服愈如係火症可用硃砂六一散

第十七經來弔陰痛不可忍 此症兩條筋從陰弔起至乳上疼

痛身上發熱宜用川練湯二劑即愈

川練湯十八

川練子豬苓澤瀉各分麻黃六分木香三分小茴香大

茴香白朮烏藥乳香元胡各錢枳榔八分薑片葱一水煎對火服發

汗即愈

十八經來未盡潮熱氣痛 此症經來一半覺口渴小腸痛此

因傷食生冷血滯不行有餘血在內不可用補劑只宜涼藥若

補用莪朮散熱去經盡痛止熱退。

莪朮散十九 莪朮山稜紅花牛膝蘇子各錢水煎空心服。

十九經已盡作痛 此症手足麻痺乃腹中虛冷氣血衰甚用

人參四物湯治之。

人參四物湯二十 人參各錢 白芍錢 當歸二錢 川芎八分 薑片三 棗三 水

煎服即愈。

第二十經來結成一塊 如烏角一條橫過痛不可忍不思飲食

面色青黃急服元胡散治之

元胡散二十 元胡四錢 髮灰三錢 共末酒調服至半月其塊自消

第二十一經來脇氣痛 經來脇內一塊如杯大其色淡黃宜治

塊為先用四物元胡湯治之

四物元胡湯二十 當歸各錢 川芎錢 白芍錢 元胡一錢 熟地半錢 薑片三 酒

煎加沉香三分 食後服。

第二十二經來遍身疼痛 經來二三日遍身疼痛及寒邪入骨

或熱或不熱宜解表用烏藥順氣散發汗即愈。

烏藥順氣散 二十

烏藥薑蠶白芷陳皮枳殼分 甘薑甘草分

麻黃去節 薑片三分 葱根一分 水煎服即愈

第二十三觸經傷寒 經來誤食生冷遍身潮熱痰氣緊滿惡寒

四肢厥冷乃觸經傷寒急投五積散即安。

五積散 厚朴陳皮桔梗白芷枳殼當歸白茯苓香附半

夏各 川芎乾薑各 蒼朮柴胡各 青皮六分 薑片三分 葱根一分 水煎服。

第二十四經逆上行 經從口出此因過食椒薑熱毒之物其血

亂行急用犀角地黄湯數劑立效

犀角地黄湯二十 犀角白芍丹皮枳實各錢黃芩橘紅槿白

草霜錢生地二錢甘草三分水煎空心服

第二十五經從口鼻出咳嗽氣緊宜推血下行當用紅花散七

帖次用冬花散止嗽下氣不須五七帖熱去全安

紅花散二十 紅花黃芩蘇木各錢花粉六分水煎空心服

冬花散二十 冬花蓬萊殼各錢桔梗枳殼蘇子紫苑知母各錢桑

皮炒石羔杏仁各錢水煎服一方多飲韭菜汁立效

第二十六逐日經來此症經水日幾點則止或五日十日又來

數點一月三四次面色青黃先宜艾膠湯三帖。

艾膠湯二十

阿膠炒

熟地各

艾葉三

川芎八

棗三

水煎空心

服後用紫金丸方詳第三症服之次月即愈。

第二十七經來狂言如見鬼神 此症經來或因家事觸怒阻逆

血攻心不知人事狂言鬼神先用麝香散安心定志

麝香散二十

麝香辰砂甘草各

柴胡

桔梗

茯神各

遠志去心

二錢

木香五人參八水煎不拘時服後用茯苓丸即愈

茯苓丸三十

茯神遠志去

茯苓各

硃砂三

豬心一

用早米糊

為丸桐子大金銀湯送五十粒即愈。

第二十八經來常嘔吐 經來常嘔吐不思飲食宜用丁香散

丁香散

二十

丁香乾薑

各五分

白朮

錢

為末每清晨米湯送

匙

第二十九經來飲食即嘔吐 此症乃痰在胸膈掛在米穀不能

下胃投烏梅丸化去痰涎後用九仙散

烏梅丸

三十

木香雄黃

各錢

草果

一個

乳香沒藥

各錢

烏梅煉丸如

彈子大每早口噙化一九

九仙奪命丹

三十

草果

一個

厚朴茯苓豆蔻枳殼木香山查陳

皮蒼朮

各錢

共為末羌湯下

第三十經來遍身浮腫 此因脾土虛弱不能充變而為腫宜用

木香調胃散

木香調胃散四

木香甘草乾薑各三錢 莪朮木通山查大腹皮

各八分 砂仁蒼朮各錢六分 陳皮紅花各五分 香附車前各錢二分 葶藶各錢二分 水煎

空心服

第三十一經來泄瀉。若經動之時五更滯瀉如兒尿。此乃腎虛

不必治脾。用調中湯三五帖即安。

調中湯五

人參白朮

各八分

五味子甘草

各三分

乾薑

五分

水煎空心服即愈。

第三十二經來大便俱出。此名蹉經。因吃熱物過多積久而成。

宜用分利五苓散調其熱毒調其陰陽即安。

分利五苓散

三十

豬苓澤瀉白朮赤茯苓

各錢

阿膠

炒

當歸川

芎各八分水煎空心服

第三十三婦人白帶。用白種鷄冠花煎老酒服之即愈。

第三十四經來帶咳嗽。此症咽中出血乃肺金枯燥急用茯苓

湯退其嗽。用鷄蘇丸除其根。

茯苓湯

三十

茯苓川芎蘇葉前胡半夏桔梗枳實乾薑陳皮

各八分

當歸白芍生地

各錢

人參

五分

桑白皮

六分

甘草

三分

薑片

三分

水煎空

心服即愈

雞蘇丸

三十一

蘿蔔子

九錢 貝母四兩

共為末蜜丸桐子大空心白

滾水下每服五十粒即愈

第三十五經來腹大如鼓

此症月水不來二三月或七八月腹

大如鼓人以為孕一日崩下血水其胞血中有物如蝦蟇子

迷不知人事體壯者可服十全大補湯方詳第五十症體瘦者死

第三十六經來小便如白虫

經來血內有白虫如鷄腸滿腹疼

痛只宜推去虫於大便出無事先用追虫丸後用建中湯補之

追虫丸

三十一

續隨子 檳榔 牽牛 大戟

各五分

麝香 甘遂 堯花

各錢

米麪丸 桐子大 每服十丸酒送下

建中湯 四十

白芍

兩

黃芪 肉桂 甘草

各五錢

共末米湯下愈

第三十七經來潮熱終日不思飲食

此症經來胃氣不開不思

飲食須開胃不用別樣只宜鴨血酒將雄鴨頭頂上取血調酒

飲之立效

第三十八女子閉經

室女月水初行不識保養用冷水洗手足

血見冷水則凝不出血海面色青黃遍身浮腫人作水腫治之

不效宜用通經丸通其血消其腫

通經丸

四十

三稜 莪朮 赤芍 川芎 當歸 紫苑 剉 寄奴

各八分

山甲

片

共末米糊丸酒送下愈

第三十九血水崩 此症宜用十灰丸若久崩乃虛宜用鷄蛋湯

若小腸痛宜用加味四物湯

十灰丸 四十 阿膠 五錢 側柏葉 棕櫚 艾葉 苧根 百草霜 各錢 綿絹

白茅根 一 丹皮 茜根 各錢 各燒灰存性為細末 白滾湯送下 或

用大小薊 各錢 用藕煎湯送下甚妙

鷄蛋湯 四十 鷄脊肉 的子用葱 三根 薑片 一 共搗為泥用麻油燭

內炒去渣酒服要趁熱吃加味四物湯方詳第八症

第四十經來吐衄 此症經來寒熱四肢厥冷大汗吐衄痰氣

緊滿自死無生

第四十一胎前惡阻 此症胎前阻逆不思飲食腹中作痛乃胎

氣不和因而惡逆宜用和氣散加丁香木香一劑而安。

和氣散 四十 陳皮桔梗厚朴益智小茴香藿香 各八分 蒼朮 四分

廿草丁香 各三分 木香砂仁 各五分 水煎飽服。

第四十二胎前潮熱氣痛 此乃受毒氣所致宜五苓散數帖安。

五苓散 四十 赤茯苓豬苓澤瀉白朮 各五分 水煎溫服。

第四十三胎前寒熱 胎前瘧疾小腹作痛口燥舌乾因受熱多

又傷生冷陰陽不和服草果散即安

草果散 四十 草果 二錢 青皮柴胡黃芩 各八分 甘草 三分 煎空心服

第四十四 孩子頂心不知人事 因過食椒薑鷄肉熱毒積在胸

中如五六月蓋絮被受熱亂動母胎俱不安也先用調經中和

氣散後用勝紅丸子母皆安

調經中和氣散 四十 大黃石羔 各錢 檳榔枳殼知母 各八分 黃連

六分柴胡 三分 黃栢 五分 水煎濃大半碗空心服愈

勝紅丸 四十 江子 去壳油 百草霜 二錢 共為細末米糊為丸白

滾水送下七粒。

第四十五 胎前氣緊不得臥 此症過食生冷兼有風寒中胃肺

經生痰宜用紫蘇湯又宜安胎散。

紫蘇湯四蘇葉桔梗枳實大腹皮貝母知母桑皮各八分五

味子石羔甘草各三分當歸八分水煎溫服。

安胎散十五人參生地當歸阿膠炒茯苓各錢小茴香八角各八分

川芎甘草各五分水煎空心服。

又方出達生編黃芪蜜炒杜仲薑汁炒茯苓各錢黃芩半錢白朮生用五分阿膠珠

錢廿五分續斷八分胸中脹滿加紫蘇陳皮各八分下紅加艾葉地

榆錢阿膠多用引用糯米百粒酒二杯煎服如腹痛火煎服。

安胎銀芎酒 治孕妊胎動欲墮腹痛不可忍及胎漏下血芎

根二紋銀五酒一碗如無芎用芎音根五加水煎服愈

藥酒 治孕婦腰痛如折黑料豆二合白酒一斗炒焦碗煎七分空心服

當歸補血湯大補陰血退血虛發熱如神 黃芪壹炙當歸一兩錢

水二碗煎至一碗一服立愈分兩不可加減

第四十六胎前咳嗽 此因每食生冷又吃椒薑中傷胎熱當買氣

不勝故作此疾宜用五虎湯嗽止人安

五虎湯五錢杏仁枳實石羔各錢蘇子陳皮知母桔梗各八分五

味子甘草各三分麻黃四分水煎溫服

第四十七胎前衄血常從口鼻中來 此是傷熱血熱亂行冲傷

胎絡只用涼胎法不用四物湯用衄血立效散

血立效散

丹皮側柏葉黃芩

分蒲黃錢共為末

糊丸白滾湯送下愈。

第四十八胎前瀉痢

此乃椒薑鷄肉熟物入脾大腸太熱變成

痢也初起二日用甘連湯立效如瀉久孕婦形瘦精神短少者子母不能治也

甘連湯

五十錢

甘草

五錢

川連

炒

乾薑

各錢

水煎溫服

第四十九胎前血漏

有孕紅來如行經應期一至此是漏胎宜

用小烏金丸

小烏金丸

五十錢

海金沙

煨三錢

薑蠶側柏葉小茴香白草霜川

芎錢防風當歸各八錢厚朴六分蒼朮四錢早米糊丸白滾湯送百粒

第五十胎前白帶

此乃胎氣虛弱先用白扁豆花炒酒服後用

閉日丸即愈。

閉日丸五十

五

龍骨海鱧硝牡礪赤石脂

各五錢

米糊丸酒送

百粒

第五十一胎前赤帶

漏紅如豬血水日夜不止其婦精神短少

急用側栢葉丸

側栢葉丸

五十

側栢葉黃芩

各四兩

蜜丸白滾湯送百粒愈

第五十二胎前氣緊咳嗽

凡氣緊動紅久嗽不止其紅每月應

期而來于午心熱氣緊人皆作癆治不效先用逍遙散退熱後

用紫苑湯方復詳第四症內

第五十三胎前血動。此因飽食跌傷惡血破來如水不止急用

艾膠湯立止血次用安胎散固胎體壯者二三帖可愈。體弱者

不治。艾膠湯方詳二十六症。安胎散方詳三十五症。

第五十四胎前小便不通。此症名為轉脬。急用車前八珍散如

不效再用八味丸。

車前八珍散五十白茯苓上當歸川芎各二人參白芍

各錢車前熟地各炙甘八水煎溫服

八味丸五十山萸澤瀉丹皮各二錢附子甘草各三錢熟地五

分山藥錢肉桂分湯丸俱可服

第五十五胎前小產 懷胎三五月或七八月皆曰小產若不調

治再孕亦然宜用益母丸治之

益母丸九 益母草四兩 當歸四兩 蜜煉丸空心滾湯服

第五十六胎前怔忡 心常恍惚遍身煩熱乃氣血衰弱受孕之

過宜用硃砂湯六 豬心一個 不下水用水一碗煎湯研硃砂調服

第五十七胎前浮腫

此血氣衰切忌通利之藥恐傷胎也用大腹皮湯爲主
大腹皮湯六 大腹皮五 加皮陳皮 青皮姜皮 絡水煎空心服

第五十八胎前遍身酸懶 此症面黃瘦不思飲食精神困倦形

容憔悴因血少不勝難養胎氣宜用四物湯

四物湯

當歸川芎熟地

各二錢

芍藥

八分

水煎服

第五十九胎前陰戶腫

乃胎不運動而致宜順血散治之訶子

水一鍾煎七分溫服

第六十胎前下血動胎

若婦人壯盛者三五日內急以安胎散

救之若形瘦有冷汗面色如灰四肢無力乃積久之病神色已

去不必醫治安胎散方詳四十五症

第六十一胎前脚腫

此症乃血氣衰弱下元又虛亦兼風邪宜

用止血行氣之劑須烏

藥順氣散治之二方俱詳二十二症

第六十二胎前中風

牙關緊閉痰氣壅滿不知人事因食生冷

兼坐風中而致用黃蠟膏搽上牙關再進排風湯三帖

黃蠟膏六十黃蠟枯礬麻黃各等為末共熔化擦牙上

排風湯

六十

防風白朮白蘼皮甘草川芎當歸茯苓獨活

各八

分麻黃四薑片三棗二煎服

第六十三胎前癱瘓。此症手足不能動。乃胃中有痰凝聚血氣所致。宜用烏藥順氣散。方詳二十二症。

第六十四胎前腰痛。此乃血蔭胎不能養腎。腎水不足。以致腰

痛。宜用豬腎丸。

豬腎丸

六十

豬腰二青鹽四

八腰子內蒸煨乾為末。蜜煉丸。

空酒服愈

第六十五胎前頭痛

此乃寒邪入腦陽氣衰也宜投茅芷湯三

服即愈

茅芷湯六十

川芎白芍白芷菊花藜木茯苓

各八分甘草九分薑

二片煎服如不止加細辛八分原有頭風病者不能即愈

第六十六胎前泄瀉

此症隨四時治之再宜臨症斟酌春宜平

胃散夏宜三和湯秋宜霍香正氣散冬宜理中湯

平胃散七十

七十

茯苓甘草

炙

山藥廣皮各等服餘方未載

第六十七胎前心痛不可忍

亦是胎氣不順宜順胎散治之

順胎散

六十一

草果

一個

元胡滑石

各八分

五靈芝

一錢

酒煎牛飢服

第六十八胎前忽倒地

此乃血養兒胎母欠精神承胎不佳目

花眼昏一時倒地不須服藥只飲食補之可也

第六十九胎前大便虛急

此症脾土燥大腸澀只宜理脾通大

腸不可用硝黃宜用枳實湯

枳實湯

六十九

枳實

二兩

水二碗煎七分不拘時服

第七十胎前遍身瘙癢出風脾

此症有風用樟腦調酒擦即愈

第七十一胎前陰門癢甚

此症有孕房事不節陽精蓄因而

作癢宜服川椒白芷湯并洗之

川椒白芷湯

七十

川椒一兩白芷

兩半水煎服渣洗之

第七十二胎前乳腫

或兩乳或一乳腫痛。乍冷乍熱名爲內吹。

用皂角一條燒灰存性爲末酒送下立消不復發矣。

第七十三胎前咽痛

此乃寒攻下咽胃有痰涎宜去寒化痰用

升麻桔梗湯二劑卽安。

升麻桔梗湯

七十

用升麻桔梗甘草

各八分

防風元參

各錢

水煎服

第七十四胎前消渴

此乃血少三焦火熾而然宜四物湯加生

地川栝共六味丸自愈。四物湯方詳五十八。

第七十五胎前不降生

臨產水乾。孩子不下用益母散生其水。

水至胎下。若閉不生者死。

益母散

辛

白芷當歸滑石

各錢

益母

三分

肉桂

八分

麝

一分

水煎溫服。

第七十六胎前耳鳴

此乃腎虛宜豬腎丸方詳六十四。

第七十七秘傳速產

用墻土蛇脫

一條

頭向下者佳。瓦上焙乾為

末

一錢加麝香

三分

乳調為膏。貼臍上即產。速去。切不可久貼。

第七十八胎衣不下

此症多因身弱血少水乾而胎衣不下。宜

用川歸湯。在胸膈者難治。若在小腹用破靈丹。婦人面色青黃

口舌黑指甲青。此子死也。當用朝爛散。打下死胎急救其母。若

面色青黃指甲紅色。其子尚生。不可輕用破靈丹。

川歸湯

七十

當歸

一錢

川芎益母草

取汁水各二錢

和老酒煎服即下

破靈丹

七十

紅花蘇木

各五錢

老酒煎服

朝爛散未載

第七十九產後血氣痛

此乃餘血不盡。腹中痛。遍身熱。惡血在

腹當去其血。則熱自退。宜紅花當歸散。方詳第六症。

第八十產後血盡則痛

此乃腹中虛痛。若有潮熱。亦有虛潮。宜

用四物湯加烏藥。方詳五十八症。

第八十一產後惡血發熱

此乃內傷外感之症。其方未載。

第八十二產後咳嗽

此乃產後傷風。變為咳嗽。宜小青龍丹。

小青龍丹

七十

甘草乾薑

各五分

五味

三分

杏仁

半錢

半夏

一錢

薑片

水煎服。

第八十三產後子宮突出。用鯉魚燒灰青油調搽愈。

第八十四產後痕疽突出。先用蓮翹散。後用黃蠟膏立效。

蓮翹散

七十

連翹花粉防風梔子黃芪

各一錢

甘草

三分水煎服

黃蠟膏方詳六十二症。

第八十五產後月餘惡露重來。如血水不止。昏迷倒地不知人事。

此乃生產一月。夫婦交媾。搖動骨節。以此血崩不止。急用金匱

散方詳第七症。

第八十六產後氣急或泄瀉氣緊不止。煩熱日渴。此乃內虛外

熱必死之症。

第八十七產後舌黑如塵口乾無津液。此乃腎敗必死之症。

第八十八產後譫語又水瀉。此惡血攻心上盛下虛必死之症。

第八十九產後弔陰產後浮腫。俱詳調經門第十七症。

第九十難產方。用活雄鼠腎一對加麝香三分同搗爛分作三丸。

好硃砂爲衣。白滾湯送下一丸。男左手女右手握出如死胎頭頂出也。按此方屢經奇驗。凡出急用清水洗淨。尙可再用一次。收藏甚勿洩氣。

第九十一凡人難得受孕未期之時。先服此方。卽能受孕矣。

白歸身白芍 酒炒 川斷去蘆 香附 杜仲 丹參 各二錢 川芎 半錢 覆盆子 炒

廣皮 各錢 熟地 三錢 砂仁 一錢 薑片 四分 黑棗 二枚 水煎 空心熱服 臨期

去棗 熟地 加紅花 半錢 蘇木 三錢 搗碎 老酒一杯 服二帖 口忌淨 要緊

知味芎歸湯 百試百驗 臨產催生胞衣 不下服之如神 達生編

當歸 一兩 川芎 七錢 龜板 手大一片 婦人頭髮 如雞蛋大 水 二碗 煎一

碗服 如人行五里即生 或死胎或交骨不開 服此方如神

如手散 治六七月後傷胎 或子死腹中 疼痛不已 口噤昏悶 或

心腹疼痛 血上衝心 服之生胎即安 死胎即下 又治橫生倒產

及產後腰痛發熱頭疼 除敗血生新血 能除諸病

當歸五錢 川芎三錢 水七分 酒三分 同煎七分如橫生倒產子死腹中者

加黑豆合一炒焦乘熱淬入水中加童便一半煎服少刻再服

王化湯 治產後兒枕痛及惡露不行腹痛等症

當歸一兩 川芎四錢 桃仁 甘草 乾薑炒各五錢 水一盃童便一盃煎服若

惡血已行腹痛已止減去桃仁再多服數劑不妨

聖陀愈風散 治婦人產後中風口噤手足抽扯及角弓反張或

產後血暈不省人事四肢強直或心頭倒築吐瀉欲死

荆芥穗除根不用焙乾研末 每服三錢童便調服口噤挑口灌之齒噤不研

末荆芥童便煎候溫灌入鼻中其效如神

忘救難產仙方無憂散 全當歸酒浸 川芎各錢 川貝一錢 羌活細

甘草各五分 荆芥穗生 黃芪蜜炒各八分 厚朴薑汁製 蘄艾醋炒各七分 兔絲

餅酒泡一分 枳殼炒六分 白芍冬天一錢 春夏秋每用一錢二分 水二碗薑片煎入

分温服。此方務須秤足。分兩不可加減。如三兩月胎動不安

者一服即安。五七月預服一劑。則臨產平安易生。如臨月服一

劑。順利無比。或橫生逆產。五七日不下。三二日不養者。按方服

一劑。立刻順生。母子平安。此方救過千萬人者。如有仁人君

子。轉刻施送。則功德無量矣。

女胎催生仙方李氏存仁家傳秘方 凡婦人懷孕三五個月。或感冒寒熱

胎動不安。及未足月之時。服之即安。如足月當產服之即產。不論體之強弱。年之老少。皆可煎服。其效如神。

當歸白芍各錢貝母黃芪各八分紫蘇枳殼各六分黃芩厚朴各五分藿

香蘼艾各三分甘草二分兔絲子一錢四分水兩碗煎八分熱服一二劑

或三四劑自然快生順養母子兩全。但此藥要戩子秤足分兩方效。不可任意手撮。孩子落地。此藥一滴不許入口。曾有悞服

至不便者。至囑慎之。歌曰當歸一錢貝母八蘇殼六分絲錢

四白芍一錢苓朴五藿艾三分甘草二此二方神效無比萬勿

輕視。傳方之家一十八代並無小產之患。真仙方也。

通脈湯治無乳或少乳

生黃芪

兩當歸

錢七孔豬蹄一對煮湯

吹去浮油煎藥一碗服之覆面睡半時即有乳或未效再服無不通矣亦有不用豬蹄只用酒水各半煎藥服之亦通體壯者加紅花三五分以消惡露

胎前保胎礬石丸

淮山藥

四兩

杜仲

去粗皮淨三兩

川續斷

酒炒

二共為末糯米糊為丸如綠豆大每服三錢米湯送下方雖平

常而實奏奇效此乃異人所授凡胎欲墮者一服即保在慣小產者宜常服之或每月數次無不保全足月而生