

大吐衄此血脫也十者曰溢可去月生此氣聚血脫兼以血聚亦兼氣聚氣者血之帥也陽微者見鬼陰脫者目盲此神脫也當補陽助陰非清劑所能收也

禁

赤石脂禹餘湯

仲景

治便祕腹滿藥下利不止小便短少腹脹服後渴已

復以藥下之利不甚以理中陽之利益甚理中者理中使此利在

下焦赤石脂禹餘湯

主下焦主分下焦

利不止者當利其小便水折

以實大腸也

赤石脂禹餘糧等分杵碎煎

此半陽藥也滴可去脫毒達下石脂餘糧之滴止脫惡以黑  
甘以益氣

李先知曰下焦有病人難會須用餘糧赤石脂

桃花湯

仲景

治陰瘧三日至四五日腹痛小便不利大利不止便脹

血著

成氏曰陽明下利便膿血者熟也少陰下利腹痛便膿血老下焦不約而裏糞也○凡下利便膿而身沒脉小者勿治身熱脉大

冬瓜子酒

卷下赤石脂禹餘湯

桃花湯

四三

者難

治

赤石脂一錢

一梗米一升

此足少陰藥也李時珍曰赤石脂之重漬入木焦血分而脫乾薑之

意溫煖下焦氣分而補虛硬水之濕佐石脂乾胃而潤腸胃也

牛乃

次曰

桃花湯主下焦血虛且寒非乾薑之溫石脂之重滯不能止血用梗米之甘以引入腸胃準繩曰便膿血熱勢不流也成氏釋爲裏寒非也桃

花湯雖川乾薑然分兩最微石脂粳米居多以調正氣滯滑脫佐以乾

薑用辛以散之之義諸便膿血皆傳經之熱邪也吳鶴星曰少陰腎水主禁固二便傷火所灼寇伐太陽庚金故

下利膿血石脂而能勝熱滯可收脫用乾薑者假其辛熱以從治用梗米者忠石脂性寒出者也生

歸之明而猶昧此况其下乎程郊倩曰此症終是以衰不能生上未可指爲傳經之熱邪也不知此而漫云滲泄嘔瀉一徹前後泄利而陽神

陷矣晁成氏生于千載之後而能昌明仲景之書使後學有所據八其功非小余何後起之士動輒非之成氏之死已久安能起而辨其是

非乎如此症成氏以爲寒而王肯堂吳鶴

皇皆以爲熱窈謂便膿血者

固多屬純然豈無下焦虛寒腸胃不固而亦便膿血者乎若以此爲便

經熱邪仲景當用寒劑以散其熱而反用石脂固蔥之藥使熱閉于內

而不導世豈非闕門養盜自拾伊飭也耶

視仲景之治協熱利加甘草

已聊

亦石膚禹餘糧湯比類以觀斯可見矣此症乃因虛以見寒非大寒者  
故不必用熱藥惟用甘辛溫之劑以鎮之耳本草言石脂性溫能益  
氣調中固下未聞寒能損胃也若牽繩則執凡傳經者皆屬熱邪一語  
遂以爲然耳程郊倩每以百中爲寒邪傳經爲熱邪古今相傳二語  
豈未盡然不爲無見若學夫深治而輕議古人多見其不知量也矣

泄脫

刺子散

東垣

滌寒泄濕水穀不化腸鳴腹痛脫肛及作嘔口渴無瘦

御米

去蒂密河子

炮去核七分

乾姜

炮六分

橘紅五分

右參心服

此手足陽明藥也御米穀酸澀微寒醫瀆腸訥酸苦溫收脫  
瀉燥寒熱能逐冷補陽順皮辛溫能升陽調氣以固氣脫亦可收形

脫也

泄濕爲氣脫

河間訥散訥子

一兩半

木香

五錢

白芷

一錢

蘿連

三錢

香附

錢

木香黃連各一錢半水牛膝各一錢半桑白皮一錢半  
大黃一錢半甘草一錢半枳壳一錢半桔梗一錢半  
甘草一錢半木香黃連各一錢半水牛膝各一錢半桑白皮一錢半  
大黃一錢半甘草一錢半枳壳一錢半桔梗一錢半

強脾厚朴除湿散滿平胃調  
平故更藉之以去餘邪也

腹痛  
脫肛

黃人養藏湯

治瀉痢日久者

已盡虛寒脫

之肛門爲大腸之使大

和腸受熱受寒皆能脫

肛口大腸者停導之官腎者強作之官酒色過度則腎虛而泄母氣肺  
因以虛大腸氣無所主故脫肛小兒血氣未壯老人血氣已衰皆因肛

亦治下痢亦自腹痛日夜無度

瞿麥散

去帶蜜炙子 姜裹煨一兩

肉荳蔻

五錢 麝畏煨

李子

二兩 八錢

肉桂

參

炒一兩 炒一兩

生甘草

一兩

每服四錢

附下一方無歸歸

此手足陽明藥也脫肛由于虛寒故參木甘草以補其虛肉桂肉荳  
蔻以其寒水香溫以調營歸腎以和血方藥散以收斂可子瞿麥散  
濟以止脫也

此虛寒脫肛之劑宜大補元氣或加升提之又有氣熱血熱而肛

反按出直宜用芩連你相或

四物加升麻柴胡

孟汗

當歸六黃湯 治陰虛有火盜汗

于內者爲血死于外者

裏之陽皆心主之以行其變化隨其陽氣所在之處而生津亦隨其火擾所在之處泄而爲汗是汗盡由心出也醒而出汗曰自汗屬陽虛腎而出汗曰盜汗屬陰虛汗者心之陽寢者腎之陰陰虛腎熱衛外之陽乘虛陷入陰中表液失其固衛故微汗然汗出竟則陽氣復而汗止矣因熱邪乘陰虛而出者汗必熱固寒邪乘陽虛而出者汗必冷有火者謂有面赤口乾唇燥便赤音重脉數諸症○凡傷風傷濕中暑風溫柔症氣虛血虛脾虛胃熱亡陽瘡飲管肺勞役房至癰瘍產蓐等症皆能令人出汗經又云飲食飽甚汗出于胃驚而奪精汗出于心持重遠行汗出于腎疾先恐懼汗出于肝搖肺劳苦汗出于脾凡頭汗左額屬肝右額屬肺鼻屬脾額屬腎額屬心津液自胃府旁達于外爲手足汗有胃熱胃寒二症自汗亦有實者故外感初症多自汗

當歸

生地黃 熟地黃 黃芩 黃柏 黃連

分量倍加

柏連所以濕

濕無熟不作汗湿得汗出

熟蒸則令人汗出 汗由腠理不固偏用黃耆所以固

表李時珍曰當歸六黃湯加麻黃根治盜汗甚建蓋其性能行周身凡表引諸經至衛分而固腠理也按此盜汗與傷寒盜汗不同傷寒盜汗邪在半表半裏故以和表爲主古法小柴胡加桂主之此屬陰虛故以補陰爲主李士材曰陰虛則元氣有降而無升而復用此苦寒肅殺之劑得無犯虛虛之戒乎惟火實氣強者宜之不然苦寒損胃陽深耳○隼絳白陰虛陽必湊故發熱盜汗當歸六黃湯加地骨皮陽虛陰必乘故發厥自汗黃耆建中湯甚者加附子或晉附湯有濕熱合邪汗出不休以厚葉勝其溫甘葉泄其熱羌活勝溫湯有痰症冷汗自出宜理氣降痰痰去則汗自止有用固澁葉汗愈不收止可理心血汗乃心之液心失所養不能攝血故溢而爲汗宜大補黃耆湯加酸棗仁有微熱者更加石斛下靈砂丹王海藏曰晉郎中童子盜汗七年諸藥不效予與涼子散三黃丸三日病已蓋腎主五液化爲五臟腎水上行乘心之虛心火上炎而入肺欺其不勝皮毛以是而開爲汗出也先以涼膈散涼胸中相火次以三黃丸瀉心火以助陰則腎水還本藏玄府閉而止矣

汗孔  
汗自

附撲汗法白朮茶末川芎各二錢半米粉兩爲末細袋盛週身撲之治汗

不止又方龍骨牡蠣橘核等分爲末撲之

陽虛  
止癲散 治陽虛自汗

朱東齋醫學

卷之二

此手太陰少陰藥也陳來章曰汗爲心之液心有火則汗不止杜蟠浮小麥鹹涼去煩熱而止汗陽爲陰之衛陽氣虛則衛不固葛根黃根之溫走肌表而固衛

盜汗  
陰虛

柏子仁丸 治陰虛盜汗

柏子仁炒取去油二兩、人參、梔、牛蒡、五味子、牡蠣、麻黃根一兩

麩錢五 東肉丸大蜜丸飲下五十丸日三服

此手太陰少陰藥也陳來章曰心血虛則睡而汗出柏子仁之甘辛平養心寧神爲君牛蒡麥麩之鹹涼靜躁取脫爲臣五味子以酸清收牛夏和胃燥濕爲佐湿能化火作汗麻黃根耑走肌表引人參以固衛氣爲使

造精  
白潤

柏子仁丸

治遺精自淫及強中消渴

心腎爲水火之藏法天施地生之道心神傷則火動火動不已則腎

柏子仁丸

柏子仁丸

茯苓丹

吳

水受傷腎主藏精所受主藏六府輸至之精皆不得藏而時下矣故爲遺精夢泄戴氏曰遺精有用心過度心不攝腎以致失精者有因思色慾不遂致精失位輸泄而出者有色慾太過滑泄不禁者亦有年壯氣盛久無色慾精滿而泄者赤濁屬血由心小腸屬火也白濁屬氣由肺大腸屬金也又曰赤濁爲心虛有熱因思慮而得白濁爲腎虛有寒出嘔慾而得渴症下消者名強中腎水虧心火亢也

菟絲子十五味子八石蓮肉

兩

白茯苓

三山藥六兩

將菟絲用酒浸浸

過餘酒着山藥糊爲丸漏精益湯下赤濁燈心湯下白濁茯苓湯消渴飲下

此手足少陰藥也菟絲辛甘和平強陰益陽治精寒遺泄五味滋腎生津石蓮清心止濁山藥健脾利濕皆潤精固氣之品也茯苓能通心氣于腎利小便而不走氣取其淡滲于腎中能泄腎邪也

濁香

濁固本丸

治胃中湿熱滲入膀胱下濁不止

淋病在濕聚屬肝胆部

部或由湿熱或由虛寒大抵熱者多而寒者少赤屬血自屬氣

此少陰太陽太陰裏也精濁多由濕熱痰黃重瀉心火黃柏瀉腎火所以清熱二禁所以利濕一夏所以除痰濕熱之由下轉滯砂仁益智辛溫利氣又能固腎強脾既以散留滯之氣是濟通柏之寒甘草和中而補土惟蓮鬚之清則所以固其脫也朱丹溪曰巢氏原病候論曰白瀉者由勞傷腎脾氣虛冷故也歷代宗其說不惟白瀉之理不明所治之法亦悞不思內經本無白瀉之名惟言少陰在泉客勝瀉便變少陽在泉客勝則瀉白又言思想無窮入房大甚發爲白淫典脾移熱于腎出白二者皆隨瀉而下夫非白瀉之源乎原病式因舉內經謂諸病水液瀉濁皆属于熱言天氣熱則水渾濁寒則清潔可謂發聖人之旨以正于載之誤矣予嘗聞先生論亦白瀉多因濕熱下流膀胱而成卽靈樞所謂中氣不足波便爲之變是也必先補中氣使升舉之而後分其藏府氣血亦白瀉實以治與夫其他邪熱所傷者固在濕熱補虛設腎氣虛甚或火熱亢極者則不宜過用寒涼之劑必以反佐治之在權衡輕重而已矣葉氏曰遺滑多作腎虛補滯之而固効不知此因脾胃濕熱所乘飲酒厚味啖

火之人多有此疾。腎雖藏精，其精本于脾胃飲食生化而輸于腎。若腎胃受傷，濕熱內鬱，中氣濁而不清，則所輸皆屬氣邪。火擾動水，不得而安靜，故冷遺滑也。

### 少陸二仙丹 治遺精

目濁

精與濁所出之竅不同。便濁即是膏淋。肝胆

不足，淫火薰蒸

故精離其位也。

### 金櫻膏

取牛黃者，熬膏一斤。熟則全甘，而失澁味。

大實

熟爲粉。

和丸鹽酒下

此足陰藥也。金櫻其實，既能益精潤腎，陰潛能止脫。生于山，故名少陸二仙丹。

### 龜固精丸

治精滑不育

精滑者，火炎上而水移，下心腎不交也。

### 沙苑蒺藜

芡實

熟用，去皮，研末。

桑螵蛸

鹽水煮，一日一服。

### 九益湯

辰砂磁石龍骨之類鎮之痰飭迷心者猪苓丸之類導之思想傷陰者  
潔古珍珠粉丸黃柏蛤粉等分滋陰降火思想傷陽者謙甫鹿茸蓉  
菟絲等補陽陰陽俱虛者丹瀉作心虛治用珍珠粉丸定志丸補之附  
本事猪苓丸猪苓末二兩先將一半炒半夏令黃取半夏爲末糊丸更  
用猪苓末一半同炒微熟砂鉢養之申未間空心酒鹽湯任下釋曰

半夏有利性猪苓導水益腎開導氣使通之意也定志丸見目門

上挾熱者謂挾各熱及飲

## 參櫟皮散

治藏毒熱下血久痢膿血不止

酒煎次之熱也久痢不

止氣  
虛也

## 人參

櫟根白皮

東引者去粗皮醋炙

等分爲末水飲或酒調下

此手足陽明藥也人參之甘以補其氣櫟皮之苦以燥其濕寒以解其  
熱清以收其脫便虛者補而陷者升亦去劑也初起勿用

桑螵蛸散

治小便數而久

數便頻也欠便短也溺雖出于膀胱然秘別者小腸也小腸虛則便數小腸熱則便

短能安神魂補心氣昏健忘

人參  
桔梗

一田  
桔梗神遠志

石菖蒲

搗水  
炒系螺蛸直水

龍骨

煅  
龜板方用

醋炙一  
齡

甲醋  
多當歸等分爲末臨卧服二錢人參湯下

此足少陰手足太陰藥也虛則便數故以螺蛸龍骨固之  
則便矣故以羸虛板滯之人參補心氣菖蒲開心竅茯苓能通心氣  
于腎遠志能通腎氣于心並能清心解熱心者小腸之合也心補則小  
腸不虛心清則小腸不熱矣

殺蟲之劑

閔尹子曰人之一身內包蟻蛔外蒸蟻虱萬物有侵人身  
以爲生者是吾身一小天地也蟻蛔爲人所當有之虫倘

寒侵火迫則不安其位亦能爲病若飲食不慎氣血虛衰又能變生  
諸虫不可名狀如髮癧盤瘻勞瘵傳尸之類至十殺身滅門虫之爲  
忠若斯其酷也是以先賢以法殺之

苟人不能殺虫則虫必日殺人矣

烏梅丸

仲景

治傷寒厥陰症寒厥吐衄

傷寒藏厥者死藏厥者脉微而厥  
死者上八喝則煩須臾復止得食則嘔而又煩丸間下

烏梅三百個

細辛 桂枝 參

炮黃柏一錢連升乾薑兩川桂

汗當歸去  
當歸兩

苦酒也

醋

浸烏梅二宿去核熟和藥丸

此是陽明厥裏也孰得酸則伏故以烏梅之酸佐之孰得苦則安故

以達相之苦安之蛇翼而動故以桂附薑椒溫其中藏而以細辛當

歸潤其腎肝人參用以助脾烏梅者欲使吐蛇爲胃寒之故則成蛇

粒梔榔五分吞烏梅丸程郊倩曰烏梅丸干辛酸八肝藥中微加苦寒

納上逆之陽邪而順之使下也名曰安蛇實是安胃故併主久利見陰

陽不相順接而下利之症皆可以此方治之也○經曰丸陰陽不相順

接便爲厥方時行曰經曰手之三陰從腹走手手之三陽從手走頭足

之三陽從頭走足足之三陰從足走腹是三陰三陽俱相接

于手足者也陽氣內陷不與陰氣相順揖故手足逆冷也

卷之九 三 治蟲噦腹痛作止有時或耕起來往腹痛有作止者虫滿則  
來者風不

安于胃也

大黃

炒而半

鶴虱

炒而

梔榔

訶子皮

炒而

木香

乾薑

炒而

附子

七錢

五分

蜜丸食前烏梅湯下婦人醋湯下

此手陽明藥也更喜溫惡酸而喜苦角薑附之熟以渴之烏梅訶  
梔以快之大黃梔榔並黃鶴虱之苦移之木香辛溫以順其氣  
也

雜櫃丸

治腹痛胃痛乾痛有時乾痛者不吐不瀉而但痛也有時者淡

食而食則痛厚味而飽則否此爲虫也

薑

梔榔

白芍

等分

飯丸

每五分

食遠服

此手足陽明藥也薑之辛梔榔之苦降白芍之酸清燥熱之品  
也故合用以治之

化氣丸

治腸胃虛爲寒

腸胃之中無物不容所以變生諸虫者緣正氣虛或誤食生冷之物或溫熱蒸鬱而成

亦猶物必先腐而

爲未酒者麵糊作丸入大小服之一歲見可五分

此子定喝藥也數匙皆殺虫之品單用尙可治之類恭爲丸而  
焉著不死草

吳鶴臯曰古方殺虫如雷九貴眾乾漆蠅礬百部鉛灰  
苦參黃連者虫得苦而伏也加烏梅

訶子者虫得酸而軟也加藜蘆瓜

蒂者欲其帶虫吐出也加芫花黑丑者欲其帶虫瀉下也用雄黃川椒

蛇床樟脂水銀柏榔者治瘻疥之虫也用胡桐淡良君子推子蠅頭者  
治癰齒之虫也用川槿皮海桐皮者治風癬之虫也用青箱子粟盆華  
者治九駁齧蝕之虫也用敗鼓心桃符拔虎

威骨死人枕懶瓜鵲骨者驅勞瘵之虫也

聖經使君子丸

治熱脹腹痛及食勞發黃

養茶番炭二兩勿飲食停滯溫

諸風至眼瞼瞼痛或發面身腫高

食生米芥葉土炭者虫之所嗜也

使君子丸

去殼二兩

葛根一兩

使君子

去殼二兩

柏榔一兩

使君子

去殼二兩

葛根一兩

使君子

去殼二兩

使君子

去殼二兩

使君子

寒食禁藥用本葉炒食炭土用炭火炒取藥爲末并入每服以糖水

下

此手足陽明藥也使羣之甘南星之毒橫柳之苦皆能殺蟲炒以諸物因其所嗜少以砂糖誘之以甘虫

付尸額頭

用

治鬼疰傳尸勞瘵

此五症

之一其症使人寒熱沉沉然不

甚而無處不惡死後傳人乃至滅門

額頭

彼

一具須從額身

取下不

爾多僞

陰乾爲末水服一錢日三次

獺肝取下不爾多僞此三陰藥也更鶴臚曰獺肝治鬼疰此相以故凡物入而辟虛蟲而夜出者皆屬類也故假之以治陰瘡獨用其肝者肝爲陰藏魂之藏也昂按物之惡人僻處晝伏夜出者狐風皆然不獨獺也本草云諸肝皆有葉狀惟獺肝一月一葉其間又有退葉獨異于他獸此其所以能治鬼疰也歟

消渴殺虫方治  
消渴石蠶堅

吉東民

又言之二屋刀音人也

上至八段至八段至八段至八段至八段至八段

此陽明熱也滑渴二症者更耗其精液而成者蓋飲食後積成實  
濕熱生血理固有之體爲宜謹審也

### 明旦之劑

日之在人特主一藏或兼二藏目雖爲肝臟而五藏六府之精氣皆上注于目而爲之精精之

精爲絡氣之精爲白眼肉之精爲約束裏頭滌骨氣血之精而與脉并爲系上属于肺後出

方亦廣故集限于篇章以通用者則散見于各門○目有五輪白精爲氣輪屬肺金故獨堅火小皆赤者爲虛火兩肝爲肉輪屬脾土土藏萬物故包四輪開動角大小皆爲血輪大皆屬心火大皆赤者爲實火小皆屬心包相

火小皆赤者爲虛火兩脾爲肉輪屬脾土土藏萬物故包四輪開動爲陽爲應用閒靜爲陰則睡矣目中有神膏此由胆中滲潤精汁積而成者能涵養瞳神有神水先天真氣所化潤澤之水也有神光原于命門通于胆發于心是火之用也有真血肝中升運滋目經絡之血也有真氣目之經絡中往來生用之氣先天之元陽也有真精先後天元氣所化精汁起于胃施于胆而及瞳神也目有堅殼數重真血滋神水神水包神膏膏中一點青瑩乃胆腎所聚之精華惟此一

站監胎萬物宗潤無窮爲水輪屬腎水入之邪正  
詩天貴財皆可驗日而得之豈非人身之至寶乎

並陰升陽

滋陰地黃丸

黃九東垣  
一名熟地

治血弱氣虛不能養心心火旺盛肝自實

子散大視物不清所爲心母子能令母實故心火旺則肝木作實肝主

火則清和之氣乘亂而精液達之走散矣精液走則光華失故視物不清也○納目日心脉挾目系肝脉連目系手足少陽之脈絡于目外小皆風熱從此道上攻頭目致頭痛腫瞳子散大視物昏花血虛陰弱故也宜涼血養血收火散火而除風熱

熟地黃

一生地黃

一方二兩牛一牛一

柴胡八錢

黃芩酒炒當歸五錢

天門冬

地

骨皮

五味子

黃連酒

二錢人參

甘草

炙朮炒

密丸

清下

曰二服是食辛熱之物助火寒冷之物損胃使藥不行

此是少陰足厥陰少陽藥也熟地歸養血生地地骨涼血裏瀉

肺火草連爲肝火天冬清肺而滋潤苦胡散肝而升陽王味收耗而斂

散參甘草以益氣補中枳殼以利氣行帶也木草去枳者中壳皆能

省

加減歸元丸

治肝腎虛而目昏暗也

柏子仁

五味子

遠視子

菟絲子

川椒

熟地黃

當歸

菟絲子

八兩

窯酒浸

菟絲子

川椒

炒二錢

熟地黃

當歸

此足少陰厥陰乘也

地榆

杞子

柏子仁

菟絲子

當歸

耗散而助金水

五味子酸

故居多能斂肺

當歸和氣血而益肝脾

肝血脾

車前子清

統血目得川椒補火以遂

下焦壅塞

車前子利水而瀉肝腎邪熱也

川椒補火以遂

肝明目利小便而不走氣

得此泻邪則補藥更爲得力

張子和曰目赤腫是厥陰肝經風熱利小便能去肝經風熱

得此泻邪則補藥更爲得力

王海藏曰目能近視責其有水

不能遠視責其無火法宜補心常

定志丸

不能遠視

眼盞心強竅能察健忘

遠志

菖蒲

八參

遠志

八兩

密珠砂爲衣

張子柏方舞鬚痛

加茯神柏子仁蜜仁亦

定志丸酒糊丸湯

安魂定驚

柏子仁

蜜仁亦

定志丸酒糊丸湯

此少陰藥也人參補心氣當補開心竅後才能交氣于腎遠竅能

通督氣于心殊矯色赤活肝鎮心屬離火火旺則光能及遠也

不能近視

王海藏曰目能遠視責其有火

地之九垣

治目能遠視不能近視

王海藏曰目能遠視責其無水法當補腎

生地黃

焰

天冬

四枳殼炒

甘菊花

去蒂

蜜丸末清或酒不

用茶者欲

火熱之下

降用酒者欲

藥力之上行

此足少陰藥也生地涼血生血天冬潤肺滋腎桔梗竇腸甘菊降

火除風

參耆湯

治勞後食慾不節內障目病

內障若晴果腎暗與不病之眼無異唯嘔人內有隱上清

自者李東垣曰五藏六府之精氣皆稟受于脾胃而一貫于目脾者諸

陰之首也目者血氣之宗也故脾虛則五藏之精氣皆失所司不能歸

明于目矣心者君火也至神宜靜而妄招火逆行具合相火者胞絡也

主百脉皆榮于目既勞役運動勞乃妄行及因邪氣所并而損其血脉

故諸病生焉醫者不理胃及養

血安神治標不治本不明理也

日服本方加升麻葛根名益氣聰明湯

別見補門

此足太陰脾肺也參耆甘草大補中氣以強脾腎兼清陽而通九窍。是入陰而和營。而能視黃柏除濕熱而滋養水。目得血而目明氣虛而精氣足而清陽升則藏府和而暗退矣。安全善日治日不明氣虛而未脫可于參耆中微加連柏若氣已脫連柏等涼劑不可用矣。

陽症  
赤腫

消風毒血湯

治目赤痛

風熱傷血則赤風熱在實則屬風熱攻注則

口目外向面者爲外皆在內近鼻者爲內

皆上爲外皆下爲內皆上爲外皆在內近鼻者爲內從下上者爲陽明症宜寒之下之從外走內者爲少陽症宜和解之

荆芥 茉莉子 菊花 白芷 麻黃 防風

桃仁去皮去核酒

桑白皮炒

芎

五分當歸酒

白芍

甘草

一錢

此足太陰陰藥也荆芥防風桂枝白芷菊花桑白皮浮上升並能清

首尾

目赤

消風養血湯

一錢

風散熟桃仁紅花川芎歸芍辛散收並能養血去瘀而決明皆除肝經風散草治目疾瘀去血活則脾消風散熱除則痛止又目爲肝所搜風養血皆以和肝加甘草者亦以緩肝而止痛也保命集云目病在府右藏則爲裏當養血安神暴發則爲表當除風散熱

者爲表易瘀久病者在裏難治

洗肝散局 治風青上攻暴作赤腫痛凡目赤者或大

者爲有裏證宜微利之瀉青丸

洗肝散之類是也眼膏鴟脂

薄荷羌活防風當歸川芎梔子黃芩甘草等分  
爲末每服二錢無裏症者略金梔子大黃

此足厥陰陽明也肝屬木而主目喜綠達風熟鬱而故用薄荷  
差以升之散之肝藏血故用歸川芎以和之蓋天黃芩甘草而

甚寒之藥反劉者自白以屬陽白珠痛者則書甚

黑珠屬陰黑珠痛者則夜甚

夏枯草五錢香附一兩每服五錢煎茶下丹溪方夏枯草香附各二兩加

甘草五錢

此足厥陰藥也夏枯草遇夏天陰生則枯盡稟純陽之氣有破瘀除  
血脈之功夜病及用苦寒藥反甚者夜與寒皆陰也夏枯草能治之者  
陽勝陰也香附行氣散肝和中船鬱推陳致新故用以為佐

風熱

發寒

退翳九

皇統間醫官

劉昌世傳

治風熱

翳有翳膜有氣血虛實或挾痰挾濕

陰虛火動七情六淫種種不同

當歸半

川芎

地骨皮

白蒺藜

密蒙花

甘菊花

羌活

荆芥

木賊二

天竺粉

蔓荆子

薄荷

枳實

甘草

炙五

川椒七錢

黃

連蛇蛻

蟬蛻三

錢

每丸

每兩作十九

每服一丸

日三服

者米泔下

晴暗歸陽下內障水香港下

此足太陰陰也羌活荆芥蔓荆薄荷以升陽散風當歸川芎以和肝氣血通地骨花粉清火熟枳實破滯氣川椒溫下焦不貳蛇蠍蟬蛻以退翳蜜蒙藜甘菊目翳難治以潤肝補腎涼金玄草補中以和諸藥也

一  
切

石膏羌活散

宜明

治久患雙目不明遠年近目內外氣障風氣毛倒睫  
一切翳

羌活 荆芥 白芷 藜 芍藥 紫草 蔡 甘菊 密蒙花  
藜子 麻子 木賊 黃芩 石膏 甘草 緣分無每服二  
錢食後臨卧兼調下或茶凍酒亦得

馬時  
塞毛

目藏木賊退瘧麻子起筆細辛草起倒睫  
退熱甘菊降火除風甘草調和諸藥

風飲子 治目

倒睫

卷毛由目急皮縮之故也蓋伏熱內攻陰氣外行當去其內熱并火邪使眼皮緩則眼毛

立出

黃連

炒甘草多

人參一錢

當歸半錢根

防風五分

細辛三分

葛蒲子三分

食

後服避風寒熱

此是太陰陽明藥也參甘以補其氣歸身以清真血黃連以清其火防葛後風熱細辛入少陰而潤腎荆走頭面而升陽

李方賢人參葛黃連加黃耆名神效明目湯

東漁

退瘧兼赤爛癰瘍

溪多形

目  
參下石膏羌活散 防風飲子 羊肝丸

內障

又法摘五采毛以風血點數次卽愈

羊肝九顆 治目疾內障免仲賢曰經曰心者五藏之專精目者其竅也又爲肝藏腎主骨骨之精爲神水故肝木不平內挾心火爲勢妄行火炎不制神水受傷上爲內障此五藏病也諸脉皆属于目相火者心包絡也三百脉上榮于目水盛則百脈沸騰上爲內障此虛陽病也膀胱小腸三焦胆脈俱循于目其精氣亦上注爲目之精四府一衰則精氣盡敗邪火乘之上爲內障此六府病也神水黑眼皆發于陰白眼赤脉皆發于陽陰齊陽侔故能爲視陰微不立陽盛即經經曰壯火食氣壯火散氣上爲內障此弱陰病也四者皆爲陰弱不能勝

陽也

夜明砂淘淨蟬蛻少去木賊去節當歸一兩羊肝四兩煮酒洗羊肝或生用以羊肝去筋膜者搗爛和丸

此是厥陰裏也蟬食之重夜明砂皆蟲眼也蟲眼中惡血而明偏食蚊而眼不本木賊輕揚而潔木能平王文仲而去障蟬性化其矢爲夜明砂

經曰

玄府

者汗

蒸土

爲采

酒調

服或

不服  
養生丸

濟生丸黃連一兩羯羊肝一具去筋膜用搗爛和丸本事石  
燉搗用治肝經有熱目赤睛痛及內障青目細目云但是目疾及障翳  
裏全善曰誠哉河間之言日盲耳聾鼻不聞臭舌不知味手足不能運動  
用者皆由玄府閉塞而神氣出入升降之道路不順利也故先賢治目  
昏花如羊肝丸用羊肝引黃連等藥入肝解肝中諸鬱益肝王目肝鬱  
解則目之玄府通利而明矣黃連之煩解熱鬱也梔目之類解溫鬱也  
茺蔚之類解氣鬱也芎歸之類解血鬱也木賊之類解橫鬱也羌活之  
頬解經鬱也磁石之類解頭目鬱墜邪氣使下降也蔓菁下氣通中理  
亦同也凡此諸劑皆治氣血鬱結目昏之法河間之言信不誣矣至于  
東垣丹溪用參者補氣血亦能明者蓋目主氣血盛則玄府得利出入  
升降而明虛則玄府無以出入升降而昏此  
則必用參者四物等劑助氣血運行而明也

## 死矢湯 治瘡久眼又昏暗翳翳

死矢

二錢

茶清調下或吞服須待瘡癒後服之

此足厥陽明藥也若明月之精得金之氣真金青砂能解毒

殺蟲散能明目又可兼治勞疳也

赤痛  
流火

一百味

趙謙

治目赤流淚或痛或癢不能視夜懶灯光目赤肝

熱則多淚熱微則痒甚則痛亦腫

昏眊故晝不能視陽勝故夜惡火光

則惡火光

煅羊膽

蜂蜜

入蜜膽中蒸熟候乾細研爲膏每食許或點目中

又蜜腎入蜜膽中紙籠套住懸屋簷下待霜出掃取點眼

此足陽厥陰藥也

胆苦寒益胆濕熟蜂蜜甘潤補中緩用曰三百

味草花膏者

美食百草蜂採白花也

李時珍曰肝開於目目胆汁減則目暗目者肝之外候胆之精

華也故諸胆皆治目疾點服說云病有內外治各不同內疾既發非服不除外疾既成非點不退內疾始盛治流不如塞源伐枝不如去根不服藥而除者未之見也外障既成如物汚穢須洗淨不點而去者未之有也若內障不服而外障反激其火動其血氣無益反損若外障已成雖服藥不發不長而所結

不除當內外攻方盡其妙

黃連人參湯  
此足厥陰藥也猶義以心盡肝藏血目受血而能視益火全經  
其益乃成又曰上則爲孔下則爲會水故知乳汁當也以腎  
者不相宜者皆取之於黃連者以清心肝之火也

歸

鼻瘡

東治鼻瘡人如雲氣障隔

黃連

二錢以水一碗煎至半碗再入後藥

黨

甘草

六分防風八分

桂仁研三分

一同熬

去皮尖

一司散

水不散去渣入蜜少許再煎少時要病入淨心服之至日微細

度一日五七點使藥力相續故曰鼻瘡

妙

此足厥陰藥也黃連爲火防風散風是蜜和中當歸養益參仁酒散

熱益水生光

內障

歸

鼻瘡

東

治內障生翳及瞳子散大因怒心過度飲食失節

百點眼方

百點膏圓眼膏

桂仁酒散

桂仁酒散

桂仁酒散

桂仁酒散

柴胡 麻黃 黃連 生地五錢歸身三錢  
錢紙裏 重皮二錢 柴

溫紙裏  
煨二錢

二碗水煮麻黃至一碗水後去渣華滴水不散渣入密封

再熬點之

此足少陽厥陰藥也柴胡麻黃發表散邪當生地和肝養血清  
火甘草和中止暍子散六故加訶子以收之也

目

括略

陳星 濃鹽點之

瘡癰之劑朱丹溪曰瘡疽皆因陰陽相滯而生蓋氣陽也血陰也血爲不及熱與火搏之則沸騰而行逆爲大過氣得邪而慘津液稠粘爲痰爲飲積久滲入脈中血爲之濁此陰滯于陽也血得邪而慘滯道阻滯或滯或結積久滲出脈外氣爲之亂此陽滯于陰也百病皆由于此不止癰疽而已也內經曰榮氣不從逆于內理乃生癰腫又曰諸痛癰瘍皆屬心火外科方症至爲繁多茲取可通用者量據數

羊 腸管

消癰  
散毒

真人活命飲 治一切癰疽瘡毒起委者

金銀花

二錢

陳皮

半錢

桔酒

先洗

七分

防風

一分

皂角刺

五分

穿山甲

三大片剉碎

粉炒去粉用

用好酒

燒酒

收性

酸物

勿食

鐵器

數

几葉

天穆

幾

具母

幾

天穆

幾

此是陽厥陰藥也金銀花散熱解毒陳皮散寒以爲君花粉清燉  
降火自正除濕祛風並能排膿消腫當歸和陰而活血陳皮燥濕而行  
氣防風鴻臚疏利咽喉散結甘草化毒和中故以爲臣乳香調氣  
托裏護心能使毒氣外出不致內攻沒藥破瘀消腫止痛故以爲佐穿山甲善能  
散足角刺辛散剽銳厥陰陽明正藥實宜經絡直達病所而燉

鐵

多忌

真人活命飲

此是陽厥陰藥也金銀花散熱解毒陳皮散寒以爲君花粉清燉

降火自正除濕祛風並能排膿消腫當歸和陰而活血陳皮燥濕而行

氣防風鴻臚疏利咽喉散結甘草化毒和中故以爲臣乳香調氣

托裏護心能使毒氣外出不致內攻沒藥破瘀消腫止痛故以爲佐穿山甲善能

散足角刺辛散剽銳厥陰陽明正藥實宜經絡直達病所而燉

初起  
癰疽

破壘故以爲便加酒者欲其通行週身使無邪不散也

此藥常服于未  
潰之先未成者

散已成者潰君  
已潰後不可服

### 金銀花酒

治一切癰疽瘡毒發在何處或肺癰陽瘧初起便服奇

効

癰疽之生始于喜怒憂樂之不時飲食居處之不節或金石草藥之  
發動寒暑燥溫之不調致陰陽不和而蘊結榮衛凝滯而腐潰輕者

起于六府浮達而爲癰重者發于五藏沉滯而爲疽淺者爲癰實者爲  
癰深則爲疽矣口發于外者爲皆疽腦疽眉瘻等疽發于內者爲肝癰  
肺癰腸腑等癰外症易識內症難明太陽經虛從背而出少  
陽經虛從鼻而出陽明經虛從足而出督脈經虛從胸而出

### 金銀花

王兩乾者亦可  
不及生者力速

甘草一

水二碗

一碗

再入酒一碗

密勿

三服

日一夜服盡

重者日二劑

服至小觔通利則藥力到分

者燭酒調敷毒四圍

此是太陰陽明藥也金銀花寒能清熱解毒甘草能養血補虛爲知醫聖  
藥草亦大自解毒之正利也

湯治瘡色總要

附金銀花一  
金銀花一名忍冬藤  
四月採鮮花搗汁熬蜜酒化貼服  
陰退陽補  
虛風尤宜于火熱熾盛之人  
水無疔瘡之患  
九酒亦往花葉同功而

花堯勝

托東  
護心

蠅礬丸  
李述 治一切瘧癰瘍毒先服此丸護膜托裏使毒不攻心或爲毒  
虫蛇犬所傷更宜服之

黃蠅白礬

一兩

雨

雨

雨

雨

雨

雨

雨

雨

雨

雨

雨

雨

雨

雨

雨

雨

雨

雨

雨

雨

雨

雨

雨

雨

此半陰藥也心爲君主不易受邪凡患瘧瘍及蛇犬所傷上恐

國朝集解 卷之二十一 由卷之二十一

則命立領黃蠟甘溫自馨酸澀並能回膜護心解毒定痛托裏排膿使毒氣不致內攻故爲患諸症者所必用也

托裏  
內消  
毛囊散治一切惡瘡發癢疔瘧便毒如破膜弦洪實腫甚欲作膿者

脉弦洪實乃實熱  
塗滿之症故宜下之

金銀花 當歸 兩 大黃 朴硝 花粉 連翹 牡蠣 皂角刺 三 黃芩  
赤芍一錢 每五錢半酒半水煎

此足陽明厥陰藥也金銀花清熱解毒養血王樂當歸亦均調榮血大黃芩硝蕩胃熱黃芩清肺火牡蠣軟堅涼血粉散結排膿角刺鉤錐直達病所而濃散之也

李東垣曰瘰瘍及諸病而赤雖伏火劫禁不得攻裏爲陽氣拂鬱邪氣任經宜發表以去之故曰火鬱則發之雖大便數日不見宜多攻其表以發散陽氣少加

潤燥秘滯尤宜潤之慎不可下九樁不利瘻瘍空胃皆不可下汗之則乾燥秘滯尤宜潤之慎不可下九樁不利瘻瘍空胃皆不可下汗之則

外感而行表散如此害人甚速  
牧鷹勝靈丹方

一名救苦化堅湯東垣

治癰瘡馬刀挾腫從耳下或耳後下頸至

肩或入缺盆乃手足少陽經氣鬱在頭或至頰車乃是陽明經之急脈之邪而作寒將痰食治之

一切雜病皆有六經所見之症外利亦然

黃耆

膠皮毛實元氣活血能散諸經血凝氣聚十

血生血瘡家聖藥

三經營業中不可無也

淮薑

升麻各一去腸胃中毒

葛根

五分此三味足生陽明本經藥也

丹皮

留滯宿血當歸此三味和血

白芍

名三分散寒能補中益肺治腹痛方必用之夏月倍之冬寒則不可用

防風

羌活一錢此必用之

胡

八分功全連翹如瘡去之不在此少陽經去之

風柴子

解毒無用此三分能散結積陰症瘡瘍當少用之此寒

火益胃氣亦去瘧邪

桂因熱用之意又爲陰寒覆蓋其瘡用大辛

熱以消浮凍之黃連

以去瘡柏三分如有熱或腿脚無力加之如氣煩燥者去之

無此昆石二分鹹能軟堅三棗煨三分比三味瘡堅不用昆石瘡堅硬者宜用三分矣甚者用之不堅不用益智分垂多者胃不和也病人吐沫食胃寒者加之交趾一錢治腹中結神曲炒能厚朴一錢二分否則勿用。蒸餅為丸每服三錢氣不順加陳皮木香大便不通加酒製大黃血燥加桃仁大黃風燥加麻仁大黃參皂角子煨。

此是陽明不足少陽藥也解陽垣諸藥東垣此法以聽暑之進發能隨症加減竊能統治諸藥加惠後人無窮之心也。

活  
散  
風

散  
風  
濕  
湯

東  
垣  
治  
前  
症

葛根

八錢半酒

半生用知母

黃柏

酒

炒茱萸

酒

炒花粉

酒

桔梗

昆布

五

柴胡

四

連錢

四

黃芩

升麻

連翹

甘草

炙

三稜

酒

廣遠

酒洗

炒葛根

酒

葛根

酒

葛根

酒

葛根

酒

連錢

每服大七錢先潔淨口而食後熱服後仰卧取藥在上脣旁

此手足少陽足陽明藥也柴胡通裏清熱甘草和中  
粉桔梗清肺排膿歸尾力藥潤肺活血甘草和中化毒  
三稜莪朶破血行氣三稜破血中之氣  
莪朶破氣中之血黃芩柏連龍胆知母大瀉三焦  
之火而桔梗又能載諸藥而上升也

以毒  
攻毒

飛龍奪命丹

治一切疔腫瘍瘍初發或發而黑暗毒氣內攻者

刀發

天南星

雄黃

巴豆去油一錢

黃連

乳香

硇砂

信石

五分斑蝥十六個去壳

炒頭足守少許

爲末蟾酥和爲丸如黍米大每服十九或十四五丸量

人虛實好酒送下瘡在上者食後服瘡在下者食前服忌油膩魚肉草

辛之物

此十二經通行之藥也毒氣內攻瘡瘍黑陷非平劑所能勝南星雄黃  
黃丹味辛性燥能殺毒破瘀巴豆硇砂大毒大熟能祛寒化積斑蝥

酥辛寒能拔疔腫下惡物

斑貓能瀉毒從小便出  
巴豆能瀉毒從大便出

信石燥烈去熱

麝香香氣通經乳香能使毒氣外出不致內攻引之以酒便行經絡而

毒不燭也此乃厲劑所謂藥不瞑眩厥疾不瘳此類是也

王機微義曰此方世俗多

用之然香竄燥毒之劑蓋無經不至者備汙吐下三法病因食一切飲獸毒發及瘡脉沉細緊效毒蘊在裏并濕毒用之神妙若大熱大渴毒氣激發脈浮洪在表及膏梁積熱之人不宜輕用世人多不分此又有以牛黃代雄黃者殊不知雄黃治諸瘍及百節中大風中惡者之意也

纏喉

風症

丹

治纏喉急癢

咽在後主食喉在前主氣十二經中唯足太陽主表別下項餘經皆內循咽喉盡得

以治之而纏在君相二火候主天氣屬肺金變動爲燥燥則清而閉咽主地氣屬脾土變動爲湿湿則腫而脹皆火鬱上焦致痰溼氣血結聚于咽喉腫達于外麻痒且痛爲纏喉風腫于兩旁爲喉痺

雄黃一錢

金二

巴豆十四粒

金錢

巴豆

去皮油

上然火吹息帶烟刺入喉中出紫血惡

涎即寬此以熱攻熱熱則流通之義也

醋糊爲丸每服五分津喉下

或用巴豆

油蘸紙擦

七手足少陰少陽經口鼻喉舌

口鼻喉舌

口鼻喉舌

口鼻喉舌

耆

卽城雙娥木舌子舌脹纏喉風走馬喉人最速張于和曰治喉瘡用斜出血最爲土策內經

六慾發之發謂發汗出

血者乃發汗之一端也

皇

九

金

治肺腫咳逆氣時時嘔濁但坐不眠

肺者五藏之華蓋也處于胸中主氣係在

皮毛空傷血氣腠理虛而風邪乘之內感于肺

汗出惡風咳嗽短氣鼻塞項強胸膈脹滿久不瘥則成肺痿風傷皮毛熱傷血脉風熱相搏

氣血稽留蘊結于肺則成肺癰多唾涎沫而無膿者肺痿也口乾喘滿

咽燥而渴甚則四肢微腫咳吐膿血胸中隱痛者肺癰也痿爲正氣虛癰爲邪

氣實

皇

九

刮去皮

爲末盜丸以膏和湯服三丸

此手太陰藥也喻嘉言曰火熱之毒結聚于肺表之裏之溫之清之會不少應堅而不可攻者令服此丸庶幾無堅不全成洗湯之功奇以藥之微賤而少之也

千金方用桂枝湯去芍藥加皂角名桂枝去芍藥加皂角湯治肺癰  
沫本方加蛤粉等分爲末名皂蛤丸治婦人風邪客于乳房而成妙癰  
每服二錢酒下此藥能導其汙散其風邪汙出而病自愈矣

解表  
托裏

桂裏十補散

局方卽外利精要十宜散

治癰瘡初發或已發邪高痛下瘡盛形羸脉

無力者

若癰疽不因膏梁丹毒火熱因虛勞氣鬱者止宜補形氣調經脉自當消散不待汗之下之也

頭着人參

當歸

川芎

桂心

白芷

防風

厚朴

桔梗

甘草

一錢

每服二錢加至六錢熟酒調下

本方加芍藥連翹木香乳香

沒藥亦名托裏散治發背疔瘡

此手足太陰足厥陰陽明藥也參耆補氣散歸活血甘草解毒桂枝白芷桔梗排膿厚朴瀉實滿防風散風邪爲表裏氣血之藥共成助陽內托之力也朱丹溪曰若冬月腫瘍用之可轉重就輕若潰瘍夏月用之

調和榮衛三法內之外者其脉沉實殷熱煩躁外無病亦無外形症外  
邪深於宮疎藏府以絕其源外之內者其脉浮數微腫在外形症外  
頭恐邪氣極而內行當先托裏內外之中者外無燥惡之氣內亦藏府

宜通知其在經當和柴衆用

此三者雖未卽瘥必無變症

潰後  
托裏黃耆湯

治謹養後膿多膿

潰後膿血出多陰陽  
兩端宜大補氣血

黃耆 人參 當歸 桂心 芍藥 遠志 麥門冬 五味子 炒等

分服五錢食遠服

此手足太陰足陽明藥也人參黃耆補氣固衝當歸生心活血生肌  
芩參潤健脾麥門冬熟補肺遠志散血通經散瘀生津助筋骨五味酸  
溫散腫大丹參白蘿蔔消後補氣血理脾腎爲切要否則數月半  
年之瘧症仍負轉成他病也

瘧

托裏溫中湯

孫珍

治癰瘍爲寒結而內陷膿出清稀皮膚涼心下痞滿

和

瘧久

托裏黃耆湯

托裏溫中湯

七

腸鳴切痛大便繼瘧食則嘔逆氣短呃逆不得安時發長憤

此孫珍加治王

伯祿管瘧方也六脉沉微色變膚涼加以呃逆胃中虛寒極矣遂于盛夏用此大辛熱之劑益捨時從症之變法也

附子

炮四兩

生

姜三錢水香

錢半

茴香

丁香

沉香

益智仁

陳皮

砂糖

皮

甘草錢一錢

加生薑五片煎

此足陽明二陰藥也衛生寶鑑曰經曰寒溼于內治以辛熱佐以苦溫附子乾薑大辛熱溫中外發陽氣自裏之表爲君羌活味辛苦溫透閉節炙星溫補脾胃行經絡通血脉畏寒則嘔吐呃逆不下食益智仁香砂入辛熱以散寒邪爲佐瘧氣內攻聚而爲滿者茴香陳皮辛苦溫追滯散寒爲使

止痛

止痛  
醫方錄  
治腸鳴瘧寒痛

**毒化膿**毒化成膿者藥和酒以飲之日日以繼之則痛自減

月則漏朝止有藥和酒以飲之日日以繼之則痛自減

齊德之曰世人皆謂乳沒珍貴之藥可住疼痛不知臨病制宜殊非

一端熱涌涼之寒痛溫之風痛除其風濕痛等其溫燥煩澀之寒痛通之虛痛補之實痛溫之風痛除其風濕痛等其溫燥煩澀之寒痛之陰陽不和者調之經絡閉澀者利之不可執一而無權也

鎔  
長肉

**生肌散**

飲燒長肉

鎔初起禁用

**寒水石**

煅

二兩龍骨海螵蛸一錢僧

定粉

即鎔

五分

即鎔

五分

即鎔

五分

即鎔

**脂鉢**

共爲細末

摻瘡口上

**此陽明毒**

陽明主

肌內

時珍白唐宋諸方

寒水石即石膏

滑石解肌熱龍骨枯礬善收瘡肉脂活血解蠚螺蛸

蛇骨是粉收濕燥能斂瘡而生肉也

**又左橫枕**

各一

它僵黃丹血竭

各一錢

輕粉分

蜜生肌散

張子和

左青童三錢右赤僊五錢用臘裹一分錢左黃輕粉各二錢亦名生肌散治同  
方法治一切癰疽瘡

凡人初覺發者欲結未結赤腫焮痛以濕紙覆其上先乾處即癰頭也  
取獨頭赤白皮安于頭上用蒸之三壯換一赫痛灸至不痛  
不痛灸至痛時方住最要覺早爲上若有十數頭者卽用赫杵  
作餅鋪頭上聚艾于頭上燒之若發赤腫一片中間有黃粟米粟  
便用獨蒜片安于頭上着艾灸十四壯或四十九壯使毒氣外出則易  
愈本近曰癰疽用灸勝于用藥三壯一易百壯爲宜但頭頂以上切不可用恐引氣上更生大禍也史源曰有灸至八百壯者約艾二節初  
始切不痛且灸至好內方痛至夜火厥滿皆高車頭乳百數則毒外出  
否則內通五藏而危矣納曰日精要謂頭上發毒不得灸此言過矣頭  
爲諸陽所聚艾炷宜小壯數宜少小者如椒粒少者三五壯而已按東  
垣灸元好問腦疽以大落炷如兩核許者灸至百壯始覺痛而疮由是  
推之則頭上發毒灸之者艾炷宜小壯數

一切癰疽腫毒用芙蓉或薑或根皮爛搗或乾研末，酒滌四物。

開留頭草見頻換初替者即覺清涼痛止，睡酒已成微暎出，日署

則易效。葛根之名爲清涼，葛根散鐵鍼散皆此物也。或加赤豆

未或着燒存性爲丸，入赤芍、芙蓉辛平性滑，涎粘清肺。

經產之劑

婦人之病與男子同惟行經

妊娠經帶數方以治採用諸方

男女可通用者茲不重出

妊娠

養陰湯

海藏

治妊娠

細辛

細辛

四物湯

四兩每味二兩

麻黃

細辛

五分

此足太陽藥也。凡婦人傷寒六經治例皆同，惟妊娠則以安胎爲主。藥中右犯胎者則不可用也。海藏宣四物爲養益安胎餘同傷寒例分症而治。麻黃細辛發汗解表散加用之治表裏無汗者。

安胎解表散法

表實六合湯

四物四兩加桂枝地黃皮各七錢蜜臘虛大滷湯治妊娠傷寒表虛  
汗身熱惡寒頭痛頸強脈浮而弱地骨皮涼血故四物四兩加防風  
杏仁去核各風濕六滷治妊娠寒中風濕氣肢節疼痛頭面熱  
脈浮四物四兩加麻黃六合湯治妊娠傷寒下後  
過經不愈湿毒發癰如錦紋者四物四兩加柴葛黃芩各七錢蜜臘  
大滷湯治妊娠傷寒胸膈滿痛而脉弦少陽經腸四兩加大黃  
錢桃仁各炒炙大黃六合湯治妊娠寒大便秘小便赤氣滿而  
脉沉數大陽弱不病也急下之太黃桃仁妊娠所忌然傷寒間有用  
之者調藥病相當也經曰婦人重身  
毒之如何岐伯曰有故無  
殃亦無殃也此之謂歟

四物四兩加參五味各五錢大麥合  
湯治妊娠傷寒汗下後嘔嗽不止四物四兩加厚朴桔實炒各五錢

四物加石膏知母各五錢名石膏大陰湯治妊娠傷寒大濕而煩躁長  
而大渴四物加桃仁澤瀉各五錢名桃仁大陰湯妊娠傷寒小便  
不利大陽本病木膀胱一方加甘草一方治妊娠傷寒汗下後血漏不止損動胎氣者四物湯  
加甘草黃耆乾薑治妊娠傷寒汗下後血漏不止損動胎氣者四物四  
兩加附子肉桂各五錢名附子大陰湯妊娠傷寒四肢拘急身涼微  
汗腹中痛脉沉遲者少陰病也桂附亦辛熱動胎之藥間有不得已而用之者四物四兩加生  
地黃酒浸各五錢名

四物大黃湯治妊娠傷寒血症歌曰婦人妊娠  
仁莫妄施要教母子但無損大黃四物對分之吳綏曰產後傷寒不可  
輕易發汗蓋有產時傷力發熱有去血過多發熱有惡露不盡發熱有  
三日到熱發熱或早起勞動飲食停滯亦皆發熱此類傷寒要須詳辨  
九抵產後氣血空虛若汗之則裏筋湯內瞞或昏迷不醒或搖搖不定  
或大便閉塞其害非輕凡有發熱且與四物湯當歸爲君最多白芍須  
炒過酒蒸熟地黃生之加款苗柴胡乾薑人參主之最妙益氣薑辛熱

能引血入血分氣治熱深合內經之旨少者加白水茯苓有四物爲主乃養血務雜症從增損四物宜詳察脉症而用之

藥人氣分且能去惡生新有陽生陰長之道以熱如惡露不盡者益母丸黑神丸必兼用之胃虛食痰嘔逆者如陳皮半夏其餘六經治例皆同必以本之要也劉河間曰大抵產病天行從增損柴胡

半產漏下

參之湯

金匱

下孕產後下血不絕或妊娠下腹痛爲胞阻

漏下者懷姪而經來五月而墮胎墮胎必

以陽不足謂之激絃半產者四個其血海血因續下不絕也

亦損傷衝任

水過多淋瀝不斷此即

崩漏

阿膠 蒼朮 茯苓

二味

當歸

芍藥

川芎

熟地黃

原方末

而草薢

註分兩

水五

升酒

升酒

升酒

升酒

升酒

治胎動經漏腰痛腹滿急短氣如暑天金匱從高墜下損傷

藏吐血及金瘡經肉絕者加乾薑

至方呵膠一斤蛤粉炒熟裝盒亦名膠湯

良方治胎動不安腰腹疼

痛或胎上捲心去血腹痛指述名泰丸

婦人受胎一月形如露珠乃太極動而生陽天一生水謂

之胚足厥陰脉主之經水卽閑飲食稍異二月如桃花瓣乃太極靜而

生陰地二生火謂之娠足少陽脉所主若吐逆惡食名曰惡阻有孕明

矣或偏嗜一物乃一藏之虛如愛酸物乃肝經只能養胎而虛也三月

如清鼻涕先成鼻與雌雄二器乃分男女手厥陰相火所主胎最易動

四月始受水精以成血脉形像具手足順成手少陽脉所主五月始受

火精筋骨四肢已成毛髮始生足太陰脉所主六月始受金精以成筋

口目皆成足陽明脉所主七月始受木精以成骨遊其魄能動左手手

太陰脉所主八月始受土精以成皮膚九竅皆成遊其魄能動右手手

陽明脉所主九月始受石精百節畢備三轉其身足少陰脉所主十月

神氣備足乃生足太陽脉所主惟手少陰太陽無所主者君主之當無

爲而已隨胎須妨

三五七日

宜服清熱涼血安胎之藥

胎動

治胎動不安

胎癓手足抽掣也執爲陽風主動肝風相火爲病也

二十五

金匱要略

鈎藤

當歸

夜神

人參

桔梗

錢

桑寄生

風熱加黃耆

子柴胡吳茱萸加半夏南星防風勝加全蝎僵蚕

此足厥陰藥也。葛根之甘寒以除心熱而散肝風柴胡桔梗之辛涼黃芩橘子之苦寒以平肝陽厥陰之風熱風熱去則癰癥止矣。入參大補氣血而宣神當服。生以養血而安胎也。

于瘡

羚羊角散

小事

治姪娠中風

巡湖忽自昂口噤口反張名子癇主

靜陽主動風陽邪也。諸風眩痺皆屬肝木故有指搦眩冒反張之症。

羚羊角屑一錢

獨活

防風

菖蒲

當歸

枣仁

炒挾神

杏仁

薏苡仁

甘草

仁分五分

杏仁分二分

甘草半分

大棗一方

赤皮一分

此足厥陰藥也。羚角之辛涼以平肝火防風獨活之苦寒以散肝邪。神農以歸薦歸身以活血杏仁養利氣慧甘草以調脾神。

實相火旺盛舉胎  
而上上通心胸也

蘇葉七步分青曉 右藥參陳皮 大腹皮五甘草三加

葛根心服心腹痛者加杏仁立胡索

此手足太陰厥寒藥也味來草豆葛根以和其氣蘇橘大腹以順其氣氣順血和則腹安矣既利其氣復以入參甘草養其氣者順則順其形逆之氣蓄養其冲和之氣也

孟氣

益母散陳景台 治子氣婦人衝任素受血風因妊娠而足腫喘悶初妨食甚則脾指出黃水病名子氣非水也

天仙藤自生木香

微炒

香附

炒

桑葉

炙

陳皮

甘草

炙

等分加紫蘇三葉

杏仁隻各三片空心煎服或爲杏薤湯調下曰三服

此手足太陰藥也天仙藤之苦溫疏氣活血能解母之風氣香附烏

藥陳皮之辛溫以行鬱氣紫蘇生髮之辛溫以疏表氣甘草之甘緩

和正氣少加木瓜以除濕熱利筋骨調榮衛也

泉散金

治子腫

目肢體虛附如水狀

胎中挾濕水與血搏濕氣流

胎水原因煩渴引飲過多或泄瀉損傷

脾胃虛不能治水五六箇月多有之

白朮

分

爲未來飲下指迷者

桑

白皮

此卽五

丹溪

腹皮加川芎通補導水行

氣

此症有服鯉魚

湯鰐魚粥者

此足太陽之經也水病當上下分消薑皮橘皮辛而能散使水從毛竅出腹皮苓皮淡而能泄使水從溺竅出小盛于土衰故用泉之甘溫以扶脾土而啜防之不致泛濫也

痰積欬滯于胸膈以致煩躁者

加竹葉

麥門冬

錢一錢

分次

竹葉

子

一方煎取爲君無入參有

防風一方無入參有防

風知母如有蜜加竹蔗

此手太陰少陰藥也

薑清火養陰安肺心火乘肺故

麥門

寧心參補虛姪姪心

煩惱驚也

如相火盛者單知母九君火盛者

單黃連丸心神不安者礞砂安神

丸切不可作虛煩

用桔梗等藥治之

紫菀湯

良治子嗽

紫菀

天冬

錢一錢

桔梗

分

分次

竹葉

三

竹占

二

入密服

此手太陰藥也子嗽由

于火邪當清火潤肺爲務桔梗桑皮之涼以

瀉之大苦寒之寒以清之紫菀參之溫杏仁白芍之澤以潤之也

安榮散

本草

事方治子嗽

散

竹葉湯

安榮散

問亦有因房勞內傷胞  
任虛者宜八珍湯或腎氣丸

氣丸

木通

滑石

麥冬養

炙甘草來潔

細辛兩當歸

甘草

燈草錢

此手太陰足太陽少陰

藥也

陳水

熟地黃

首補

火降則

火氣下降而來火能

生火則

火氣生

淋閉不通故用木通燈

草之滑石之滑

燥熱則火氣升

而火能潤之

經曰地氣上爲雲天氣下爲雨

而火能潤之

上下交陰陽和而後便得通也

血燥則濁濁不濡而當

歸能滋之也

轉胞

桑飲丹治任娠轉胞

轉胞者胎通及胞壓在一邊胞系轉戾膀胱急

痛瘦數或閉也

因氣血虛弱瘀飲壅滯以致之

病者

朱丹溪曰

轉胞之病婦之稟受弱者憂鬱多者

性躁急者

食味厚者多有之古方用滑利藥鮮

朱丹溪曰

轉胞之病婦之稟受弱者憂鬱多者

性躁急者

食味厚者多有之古方用滑利藥鮮

朱丹溪曰

轉胞之病婦之稟受弱者憂鬱多者

性躁急者

食味厚者多有之古方用滑利藥鮮

此是太陰厥陰乘脾

虛羸以

君血虛補以四物療飲消以二陳使

氣得升舉而胞自通也

朱丹溪曰

轉胞之病婦之稟受弱者憂鬱多者

性躁急者

食味厚者多有之古方用滑利藥鮮

朱丹溪曰

轉胞之病婦之稟受弱者憂鬱多者

治不部通每用吐法

以上藥與服隨以指探喉中吐出藥汁喉氣定又與之八貼而安此恐偶中後治數人皆効伸景云婦人本胞盛今反羸瘦胞系了戾但利小便則愈宜服腎氣丸以中有茯苓故也地黃爲君功在補胞

又治婦人歸倒堅胞轉而少便者通矣

附丹溪參耆公參

二錢白朮二錢裏耆牛膝錢芩皮桃仁各一錢

炙草

五用豬羊胞湯入藥煎服治產後胞損成淋症

丹溪曰收生不謹以致損胞而得淋

瀝有徐氏婦壯年患此方有治診其悟尤甚因

悟曰難產之人多是氣虛難產之後血氣甚虛因用峻補以參木膏煎以猪羊胞極飢時與之每剂一兩

黑散局治癰瘍恐露不盡攻衝作痛變胞衣不下胎死腹中

由血帶不行也

熟地黃歸尾赤芍

蒲黃炒桔梗乾薑炒甘草四兩黑豆炒去皮母母

每服一錢酒童便各金箭使產須知有生地黃

此是大陰厥陰藥也前症因血瘀不行熟地歸尾之潤以濡血瀉黃

行血下胎

黑豆之酒以行血

按按行血則  
浦黃當生用

桂心乾薑之熱以破血

乾薑辛熱能去  
惡生新故產後

發熱必用甘草者緩其正氣用童便者散其瘀逆加酒者引人血分以

用之而作

助藥力也

產後惡露不行坐摩勞傷者以前四味悉能治之若挾宿冷

氣滯血凝胞衣不下則宜全用快行之也綱目曰寒多及秋

冬宜之若性急形瘦有火及

夏月當審用此丹溪之論

真武散有當霜真正等各二錢入童便醋少許和服治橫痃

瘻及瘻瘍後虛損崩漏等症

秦散局

治惡露不行心包絰痛或死血腹痛

惡血阻而不行上衝于包絡下陷于腹中皆悶

而作

桔黃靈脂篆篆爲末鹽醋調服

此手足厥陰藥也需其滑而行血靈脂氣燥而散血氣躁其能

八脉合而舌血止病效合而口神

種心痛

產後  
竈

清魂散

嚴

治產後惡露已盡心量不知人

產後氣血虛弱  
又感風邪也

澤蘭葉

人參

川芎五錢

荆芥一錢

甘草三錢

分三錢

爲末溫酒調下更宜燒

漆器燒醋於床前使聞其氣

此足厥陰藥也氣血虛弱故以晉卿澤蘭養血人參甘草補其氣外  
感風邪故以荆芥疏其風風邪去氣血生則神清矣肝藏魂故曰清魂

荆芥最散血中之風故以爲君

調經

利產

返魂丹

即益母草

消經不調赤白帶下胎前產後一切諸病

五月五日六月六日或小暑日益母草花正開時連根採收陰乾用花  
葉裹子石自搗末蜜丸或搗汁干砂鍋內文武火熬成膏服長鐵如胎

產後年產

益母草

失笑散

清魂散

返魂丹

七

動腹痛下血不止當歸湯下橫生逆產胎衣不下炒鹽湯下產後血量  
口渴狂言產後中風失音口喫及血結奔肺時發寒熱面赤心煩或鼻  
衄黑口乾並重便和酒下產後喘噦惡心吐酸脇痛無方酒下產後  
漏血寒涼下產後痢疾米湯下產後漏糯米湯下產後帶下膠艾湯  
下產後便不通煩躁口苦薄荷湯下凡產後以童便化下一丸能要  
魂魄調經絡破血癆經不調者服之則調久無子者服之則孕

此半定厥陰藥也益母草功擅消水行血去瘀生新利大小便故爲經  
產藥而又能治疔腫散乳癰也益母草一名茺蔚李時珍曰益母草  
明目調經用子爲良若胎產癰腫根莖花葉實皆可用若治血分風熱  
可並用益根莖花葉耑于行子則行中有補也

歸薑湯 治產後發熱自汗肢體疼痛名曰屢勞

生有氣加細辛

此半足太陰厥陰藥也參耆補氣固衛當歸養血而調榮生薑者  
引氣入氣分而生血羊肉甘熱用氣之屬以補虛勞孰退而浮  
收矣

養血  
寒症

本方除人參耆用羊肉一斤當歸二兩名當歸生薑羊肉湯金治產後  
腹痛及寒症腹痛虛勞不足絞急痛也

虛勞

病音鳩又音

急痛也

當歸散

婦人妊娠常服之

婦人血少有熱胎動不安及數牛產難

者並宜服之胎無疾苦臨盆易產產

後百病悉  
皆主之

當歸

芍藥

黃芩

白朮

牛

羊

肉

湯

金

治

產

後

散

三

此足太陰厥陰衝任藥也衝任血盛則能養胎而胎安歸芍藥能養

血

黃芩能清熱

白朮能健脾

牛羊能補氣

金散能退熱

散

後

散

散

散

散

散

散

血而益衝任又懷姪宜清熱涼血不妄行則胎安黃芩養陰退陽能除胃熱白朮補脾燥濕亦除胃寒胎氣係于脾脾虛則脾胃虛則能運帝無所附故易落脾胃健則能運化精微取汁爲血以養胎自無甚阻塞逆之患矣故丹溪以黃芩白朮爲安胎聖藥也

易簡方加山茱萸治經三月不行或一月再至數月不行者血少也

之以白朮山茱一月再至者脾虛有熱也

白朮能補脾黃芩能涼血山茱能固經

不孕  
體肥

慇望丸

治子宮脂滿不能孕育

婦人肥盛不孕者以子宮脂滿壅塞故不能受胎也

服  
葛根 白朮 半夏麵 香附兩 蔴蔴 神曲五錢 橘紅 甘草一錢 粥

此足太陰厥陰藥也橘半梟燥濕以除其瘀膏肓神曲理氣以消其

達生散

亦名束胎散丹溪

婦人妊娠八九月服數十劑易有

計云誕彌順

月先生如達

達小羊也其生甚易產難多因氣血虛弱榮衛滯滯服此則易生如達矣

當歸

酒洗

芍藥

炒酒

參

泉

上

紫蘇

二十

甘草

多三

大腹皮

三十

大腹

三

人參五錢黃楊腦子七個煎

黃楊木王產難

或加枳殼砂仁或加川芎

丸其量多如分方或者別症以意湊

此是太陰厥陰藥也當歸芍藥以益其血人參白朮以益其脾皮大腹皮以疏其壅氣血不盛不滯則臨產自無留難之患

朱丹溪曰產難往往見于鬱悶安樂之人富貴奉養之室若貧賤者鮮有之古方有痰胎飲爲湖陽公主而作恐非至到之言予族妹苦于難產過胎則觸而去之予甚懼焉視其形肥而動十女正知其氣血久坐不逕見目母氣虛亦不能自重耳當補母氣則兒建易生令其有孕五六月以大全良方紫蘇飲加補氣藥與之數十貼得男甚快因以其方隨母之性稟與時令加減服無不應因名曰達生散云○昔湖陽公主難產方士

通乳

進瘦胎飲用枳殼四兩炒甘草二兩炙五月後日服一錢潔古改爲於  
木名東胎丸寇宗奭明其不然蓋孕婦全賴血氣以養胎血氣允實胎  
乃易生彼公主奉養太過氣實有餘故可服之若一槩濫施誤之甚矣  
按瘦胎飲又各相投散治胎肥難產臨月服之張氏加香附行氣寬服  
舊陽下許學士云大率妊娠惟在抑陽助陰其方甚多亦惡羣隊枳殼  
散所以抑陽四物湯腸以養陰然枳殼散差渠宜以內補丸佐之即當  
歸一兩地黃二兩爲九也

猪蹄湯

治乳少

猪蹄隻

通草即不通一兩

煮食

此是陽明藥也猪蹄鹹能潤下通草淡能通經

廣濟方用猪蹄四隻者汁加土瓜根漏蘆通客三兩

土瓜漏蘆煎看通經下乳

少米葱豉煮稀粥食治同或以猪蹄湯調益元散服以木梳梳乳房乳

汁自下又穿山甲不不留行皆通乳之藥

日穿山甲王不留行皆通乳之藥

血風

參附散

合血風

去血厥勞者血脉虛寒感受風邪

荆芥五分 防風 茵草 蒴蒼 當歸 桂心三分 口苦煎

此在太陰厥陰于少陰藥也味來毫白血中之風銅外防風散之太  
陰養魚紫草之陰虛發熱地黃當歸之氣痛滯尿不調  
薦當歸桂心枳殼調之煩渴多少盜汗心忡人參泉石墨仁補  
收之

經少

柏子仁丸

良方

治經行復止血少神

女子苦懷每多痰多則傷心  
心傷則不能生血而血少血少則

肝無所藏而衝在之脉枯故經閉不行也○經曰月事不來者胞脈閉  
也胞脈者屬心而絡于肥中令氣上逼肺心氣不得下峰故月事不來也

柏子仁

去油

牛膝

酒浸

柏子仁澤蘭

續斷二熟地黃一

冤水飲下

此手足少陰厥陰藥也柏子仁安神而養心地黃續斷牛膝補肝腎而  
益衝任養柏澤蘭活而脉而通經門

卷相生用破血久用止血李梃曰婦人以血爲王天真氣降血脉流

行一月一見其來有常故曰月經或外被風寒燥濕暑熱或內傷生冷  
或七情鬱結爲痰爲瘀凝滯于內曰血滯或用力大過人房太甚或服  
食燥熱以致火動邪氣盛而津液衰曰血枯若經後被驚血氣錯亂而  
妄行逆上則出于口鼻水血相搏則爲水腫怒極傷肝則有眩暈嘔血  
瘍歷瘡瘍等病濕熱相搏則爲崩帶凝結于內則爲癥瘕絲綿百出不  
出血帶與血枯而已血滯經閉宜破者原因飲食熱毒或暴怒健癥積  
痰直須大黃乾漆之類推陳致新俾舊血消而新血生矣若氣時血枯  
起于勞役憂思却宜溫補或兼痰人濕熱久宜清之每以肉桂爲  
佐者熱則血行也但不可純用麥芽以虧陰漢至平耗氣益血之說又  
女科要法但氣虧血配氣熱則熱氣寒則寒氣刑則升氣降則降氣行  
則行氣滯則滿如果鬱火氣盛于血者方可用單香附散抑氣散加木  
香梗榔枳殼行氣調鬱若氣亂則調氣冷則溫氣虛則補男女一般陽  
生則陰自長氣耗則血  
亦涸豈可專耗其氣哉

### 皆歸六養湯 治經水後期其症

形豐巴多體肥而經水後期尚

形消月令少者氣虛而瘀滯于

經絡

也

當歸

芎藭

人參

白朮

茯苓

甘草

橘紅

牛蒡

如意煎

七正合

金英丸

東台

芙蓉散

大補丸

氣虛氣行則

吉言

七正合

如意煎

連四物湯治水過量成塊塊氣滯也或風冷乘之也苦淡

白者虛也苦淡涼水以溫之也如烟

虛豆汁屋漏水混濁

模砌者濕痰也

四物湯

見血

加香附蓮

此末陰手足厥陰藥也四物以益陰養血加蓮以清血熱香附以行氣

四物加芩木湯

亦名溫經湯治水過多

黃芩抑陽白朮補脾脾能統血

四物加芩連湯治

經水適斷五心煩熱經來色黑或如豆汁

或如豆汁熱兼濕也芩連若燥濕而寒勝熱

四物

加梔連爲熱六合湯加當歸爲寒六合湯加陳朴爲氣六合湯加羌活

爲風六合湯皆婦病與經產通用之藥也

固經丸

治經行不止崩中漏下

黃芩芍藥成丸損傷則血氣和平血氣

調逆矣其勞動過度指傷寒府衝任之氣虛不能約制經血故經多漏下或由陰虛陽轉爲熱所乘致傷衝任血得熱則妄行也脉數疾小爲順大者爲逆紫黑成塊者熱甚而反兼水化非寒也  
玉機微義曰血得寒則凝既行而紫黑故知非寒也

龜板

炙四兩

芍藥

酒炒三兩

黃柏

酒炒三兩

白芍

酒炒二兩

甘草

炒二兩

童便

炒二兩

鴟皮

炒半兩

潤丸

此足少陰厥陰藥也

經多不止者

陰虛不足以制胞絡之火故越甚常

度也崩中漏下者虛而挾熱也

紫黑成塊者火極似水也

黃芩清上焦

之火黃柏瀉下焦之

龜板

若寒滋陰而養血皆歸水以制陽光也

附辛以散鬱

舌皮清

止崩

益火

升陽舉經湯

東垣治崩

切熱自汗短氣倦怠食

此由勞傷所致

補中益氣湯

見氣門

加白芍黑梔子

薑三片生二枚煎

此足太陰陽藥也

補中湯以益氣升陽追熱收汗加芍藥以和血欬

錢獨活附子

炮甘草各一錢  
大半

參五分

地骨皮各一錢

六分

桃仁一分研紅

花肉桂

盛夏勿用

芍藥各五分

每服三錢

加至五錢治經水不止

原文自如

之空虛是氣血俱脫大寒之症輕手其脉數疾舉指弦緊或濇舌陽脈

之症陰火亦亡見熱症十口鼻眼或渴此皆陰虛陽欲先亡也當溫之

舉之升之燥之當大丹浮

氣血切補命門之下脫也

漏止崩

蠶散治崩漏不止

凡非時血行淋煙不已謂之漏下忽然黑  
下如山崩然謂之崩中有五色以應五藏

慢榔

廣烏梅兩

僵蚕

勝半

每服二錢

烏梅湯下

此足厥陰藥也清能止血散角慢榔酸能收斂故用烏梅溫能守中故

用乾薑能止血

火也古云煅用

特皮散

良方

治血瘕

瘕者瘀血凝聚而成也伏于陰僻之處盤結膠固并攻伐之不易平也

丹皮 桂心

歸尾

延胡索

三生膝

赤芍藥

莪术

六分

三稜

四分

管長年經卷下升陽舉經湯

如聖散

牡丹皮散

長

水酒各半煎

此是厥陰藥也桂心丹皮杏牛膝以行其血中氣滯氣中血滯氣血週流則結者散矣

氣滯  
經阻

氣滞散

組珠

治一切諸氣氣上滯心胸咳嗽助刺痛水不調

婦人多憂鬱故氣病爲多氣爲血配氣滯則血亦不能行故月候不調也

香附

八味藥

陳皮

蘇葉

五分

甘草

五分

無大錢煎

此手太陰足厥陰藥也薑陳皮竈火氣分而理氣香附紫蘇能入血分而行氣引以乾姜使入氣兼入血分諸瀉以魚子散肝氣調而血和則經行有當無痛楚之患

氣盛  
下血

抑氣散

治婦人氣壅血變生諸症頭暈胸滿

凡人吸氣和平則無

絲

血變生諸症頭暈胸滿

諸疾苟血少氣多疾

血變生諸症頭暈胸滿

諸疾苟血少氣多疾

血變生諸症頭暈胸滿

溫  
帶

此等太陰少陽藥也經曰高者抑之否而能散鬱氣陳皮能調諸氣茯苓能安心氣且能緩逆氣氣得其平則無之害之患矣若移其意當于理氣門中諸方選用不必泥此按氣盛于血固當抑氣若過用行氣血兩虛矣是方平和爲可常用或用滋而之藥使陰血充足而陽火自平亦正治之一法蓋補其不足重所以制其有餘也

固下丸

子和

治赤白帶

下帶下起于風寒溫熱所傷入于胞中或中經脉

流入藏府陰虛陽清某氣不升衛氣下降濡于

下焦奇經之分因帶脈而得名故曰帶脉者屬血白者屬氣其狀如帶相連而下言帶者亦病形也有湿熱流帶下焦者有肝腎陰淫溫勝者有驚恐而不乘土位濁液下流者或思想無窮而爲白淫者或經溫熱屈滯于小腹之下者病不雖殊皆爲氣血虛損榮衛累滯而成其標

則一

木皮

雨生

白芍

五味子

黑豆

柏子仁

黑柏子

黃柏

煨黑

米飲

下

此足少陰厥陰藥也陳莝草曰樗皮善燥濕寒勝熱澣固下故赤白帶

正氣天香散

抑氣散

固下丸

也

卷之三

正氣天香散

抑氣散

固下丸

也

虛熱  
帶下

因干溫熱者用之爲君古方有皆相  
標皮側柏樗皮芩柏樗皮芩木樗  
及等丸隨症加香芎歸芍葛芷及星夏等藥  
芍藥之酸欽陰氣收下陷爲臣良薑之熱以散寒溫黃柏之寒以祛熱  
溫並炒黑以止血收脫爲佐使也

當歸丸

歲六氏 治赤白帶下腹中痛不飲食羸瘦

此血虛有熱之症法當  
涼補肺訣崩漏日久

爲白帶漏下多時晝本枯言崩久則血  
少復生其陽故白滑之物下漏不止

此足少陰厥陰藥也歸芍熟地續斷阿膠補肝滋腎以治血虛牡蠣地  
榆清熱收脫以止帶赤芍酸寒能散惡血去瘀所以生新散之所以  
收之也

以上八味醋  
糊凡米飲下

白芷散

良方口帶下由于風寒溫熱所傷傷肝  
經者色白如泥傷心經者色赤如津傷

脾經者色白如泥傷心經者黃  
如鶴子傷腎絰者黑如瘀血

白芷一每票白二個合之二茶

爲末酒服一二錢

而和血鬚蓄血之餘補陰消於煩躁又能止血也

救急方

人之以疾病而得終其天年者雖不幸也乃有暴橫之遭大如絃弱則盡此大之傷小如骨哽刀斧湯火之害坐視其轉死到莫之能救者多矣茲取簡便良方

以備緩急倘用此而技活一命于人心獨無快乎

暴死

凡人延潮干心卒然倒仆急扶入暖室扶策正坐用火炭沃體使

醋氣衝入病人鼻中更久自甦或搗薑汁灌鼻或用皂角末吹入  
鼻中得嚏則醒倉卒無藥急于人中穴及兩足大拇指離甲一毫集許

各灸三五壯即活

凡人卒然昏倒身冷無痰此名氣厥亦名中氣若身溫有痰者

則名但扶正坐氣順卽安或用皂角末咬鼻令嚏亦佳

凡冬月中寒

卒倒身強口噤手足厥冷如無審藥當濃煎當湯灌之

凍死有氣者

以灰炒熟盛囊裹其心頭冷卽易之若還以火烘冷與火爭必死浴

以熱湯亦死或用苦汁熱酒各半溫服 凡暑道中中熱卒死以路上熱土圍臍令入尿其中卽活苦湯童便乘熱皆可灌之或用熱大蒜等分搗水灌之或置口中或令近火以熱湯灌之卽活切勿飲以冷水反卧冷地正如凍死人若遠近火卽死

絆死急令手裹衣物繫塞穀道抱起解絆安放正平擎髮向上揉耳頭遺捨圓喉管脚端兩肩以兩管吹氣入耳內或刺雞熱血滴口巾男用雌女用雄鼻卽氣轉或再屈伸其手足捫手摩之或氣不接將腰打三四拳或以皂角末搐鼻切不可割斷絆死雖且至暮身冷猶可活溺死急倒提出水用牛一頭令橫卧以腹含牛背上升徐行令吐出腹中之水以薺擦牙卽活口噤者開橫一筋手牙間使不得閉如無生以馬糞也并用人乳汁搗水灌之以牛毛煮水煎服之

水卽涼切忌火燃還寒入內不救

麗屍 賀者燭卽得急火照裡桶鑿孔或咬舌指撲而噀面

或以皂末吹入鼻中得吐而醒

毒 凡虫蟲毒嘗是不濟食墨豆不腥卽半青濃黑石榴

汁飲之或熟茶花胆擎錢探吐出蠍毒或米飲調蜜茶末三錢令下

凡中砒霜毒急飲以人溺及人糞汁或搗鴉柏樹根葉汁或鹽汁令

服或刺羊血熱服或取生螺研冷水服 中砒毒者從飲生豆腐漿解  
之中諸草毒又喫入膾黃土和水飲之 緑豆湯甘草湯罷

解百毒

銀粉 以麻油調蜜加餌糖服

舊本集年急救卷下 繼死 溺死 麻死 中毒服銀粉 十

蛇咬大咬傷 凡惡蛇傷着于傷處上下緊繩使毒不散走隨浸裹鑊內  
食熟飲酒令飽使毒不攻心或礬石甘草等分冷水服三錢更搗蒜  
敷處如艾圓聚之此法兼治百虫毒蛇又方五靈脂二兩雄黃五錢  
酒調服冷敷患處又方貝母爲末酒調點醉飲之頃酒冒傷處衆  
流出候水盡以藥渣敷瘡上垂死可活 凡蜈蚣傷取大蜘蛛放傷處  
吸去其毒頭投蜘蛛于水中令吐毒以至其命又方生鷄血傅之不效  
鹽水洗淨鷄涎或糞塗之 壁虎咬用桑柴灰水煎數沸濃汁調白  
礬末塗之 蝎子螫用白薯半夏等分醋調塗之外臺曰凡遇一切毒  
向之亦不得殺之若輒殺之後必遭蟄憤之 蟑之物不得起惡念  
凡瘋狗咬傷着用茱萸半個碎切斑蝥

個去頭翅足若過一日加一個糯米一撮慢火炒脆去斑蝥取米研末  
好酒調服取下惡勿多日則首頭止口口無後舌之苦乃日復日

草解之三月不可聽羅鼓聲音發則難治。身不得拿。大肉稍著急。手無處捏。去惡血孔乾。針刺出血用小便或鹽湯洗淨。搗葱貼上。若咬。洗净血水。用虎骨煅。數處燙。杏仁傳之。

癰傷。鷄子清調大黃。紫金之粉。蜜未亦一洗。以冷燒酒澆淋甚妙。

刃傷。割海螺肉傳之。血立止。廣瓦爲末傳之。亦集金鎗出。不止。用蚕蛾炒爲末敷之。

囊。凡骨骨哽。食橄欖即下。如無。用橄欖核磨水飲之。橄欖木作舟。稻魚觸若即死。物之相畏有如此者。又猫涎亦能下骨骨哽。凡鷄骨哽。用野草根。搗爛如龍眼大。鷄湯化下。如魯骨哽。魚湯化下。猪膏嚼用。用一足取其涎。

誤吞金珠吞髮燒車不合喉逆吞白石  
砂糖砂石

徐徐嚥下或用硼砂井花水洗化下或加或雞

子煎湯嚥下

凡治哽之法可以類推如鷗鴟脚掌治魚哽砂石  
治針哽髮灰治髮哽虎大治骨哽亦各從其類也

誤吞銅鐵金銀但多食肥肉自隨大便而出吞針者齧豆同棗食  
針與棗自從大便出誤吞銅者食薺菜即化

吞髮燒喉不出取鼠糞燒灰白湯調下一錢

蟹螯不能食醉之睡中用皂角末吹其鼻竇透鼻

呃逆不止用紙撲刺鼻得嚏即止

舌脹滿口刺鷄冠邊紙撲蘸麻油擦要法以生獐皮塗之或加

乾糞

乳蛾喉痺凡乳蛾水藥不入者先用魚子點破再取杜牛膝汁和醋  
金燕又云丈叢寫十二金丸八重自正葉面良良又後續有

聚大指上以髮繩扎集指姆針刺指甲縫邊盅如放沙一般卷拿  
皆聳聳即寬

霍亂腹少 以針甚指近甲處一分許出盜即安仍先煖臂  
挿入令惡血聚手指頭後刺之

鼻効不正 倒熨燒谷存性細研水服俱吹入鼻中又白芨末新汲水調  
下又紙數十層水浸濕安頂中以灰炭之紙乾立止又角線扎中指  
節左孔出血扎左指右孔出血則俱扎之又以蒜  
搗餅貼足心

更入耳中 用獺濱耳中更即出

以生薑擦獺  
鼻猫即尿

跌打損傷 青汁和童便飲其瘀血骨折者和葱白搗匀厚封酒調

萬全集序 救急方下 雜創後膿沙鼻効不正 更入耳中 跌打損傷

白芨末 磨服

磨婦鼻竇 拔坐燒灰 酒或燒舊漆器 烟入其鼻竇甦

廣陵子賜不收 醋三分令水七分和藥產婦同一巽一縮三巽節收又  
法以華陵子十四粒去殼搗蕩頂心卽收卽安之又清草角未咬

鼻出喚作五正

忽樂之詮人之有生備五官百骸之軀且聖知中和之

德所係非細也  
父母之生成不祥孰大焉故內經曰聖人不治曰病治而後藥之譬猶渴而穿井閒而鋤兵不亦晚乎茲取

地之賦畀高

未病夫病已

近易行者仰錄數則以曉信士之修持又將飲食起居之禁忌撮其  
大要以爲縱恣者之防範使人知謹疾而却病不猶勝于修藥而求

醫也

平

內經上古真論曰上古之人淳于陰陽和于術數保生食飲有節起居

有時不妄作勞能形與神俱而終盡其天年被服衣裳乃扶杖持杖

持滿恐傾不時御神移候于逆于生樂起虛節故牛百而最也矣  
上堯大之教下也虛邪贊遲之有時恢復虛實氣從之精神

### 守病安從來

調息 調息一清貫徹三教大之可以入道小用可以養生 故迦文釋  
以視鼻端白數出入爲正觀初門莊子南華經曰至人之寢以晦天  
易曇卦曰君子以嚮晦入寢王龍潛古之至人有息無睡故曰  
晦入寢寢之法當向晦耳無聞目無覓四體無勤 心無思慮如  
種火相似先天元神元氣停育相抱真意綿綿老子曰編老子曰編若存開闔自聰  
虛同體故能與虛空同壽也世人終日營擾精神因憲 夜間弃此一  
睡寢一早之用一點靈光盡爲後天濁氣所掩是謂陽陷于陰也

調息之法不拘時候隨便而坐平直其身縱任其體喬不仰俯衣綏帶

腰帶不竟則土氣不流通

不得通

有聲

鼻中微

微納之或三五遍或一三遍有津嚥下叩齒數遍舐上脣唇齒相着

兩目聚令胞胞微次調息不喘不粗或數息出或數息入從二至

十從十至撮心在數勿散亂如心息相依雜念不生則止勿數任

其自然久愈妙若起身須徐舒手足勿得遽起能勤行之靜

中皆這種奇特可明心隨道不但養身全生而已也調息有四相

呼吸有聲者風也守風則散雖無聲而鼻中濛濛者喘也守喘則結不

呼吸有聲者氣也守氣則勞不聲不滑者火綿綿者存者

神氣相依息相也息動則心安氣從來自能養天地之造化息

便入室不拘晝夜坐卧自便惟在攝身使如木偶常思一念此  
恭少動搖如蠶繭許便墮地獄如南柯法如孫武事在必行有死無  
犯又用佛語及老聃語禦蠶繭數日人息編繩着角之不勤數至  
數百此心寂然此身兀然與虛空等不煩禁制身榮動數至數千或  
不能數則有一法強名自隨意俱復頭俱人噴之不已一旦自往  
不出人知覺此氣從毛竅八萬四千雲蒸雨散舞始以來諸病皆  
除諸障滅自然明晝<sub>走能晝</sub><sub>生慧</sub>譬如盲人忽然看眼此時何用求人指路  
是莫大言盡于此

小迴天先要止念身心澄定面東跏坐<sub>平坐亦可但前膝不可低腎子不可着物</sub>呼吸和  
用三昧口<sub>口指無名指右掌加左掌上</sub>按于脣下叩齒三十六通以養神亦龍龜海

內外三十六遍亦龍舌也內外齒也雙目隨舌轉運舌抵上腭靜心數息三百

六十週天畢待神水滿漱津數遍用四字訣

眼抵閉吸也撮提殺道舌抵上腭日閉上視鼻吸莫

呼從往脰撮過穀道到尾間以意運送徐徐上夾脊中門漸漸速些閉

口視鼻吸莫呼撞過玉枕頸後將自衛前一忍直轉臍頭倒下鵠

橋舌也分津送下重樓入離宮心也而至氣海坎宮是二竅用前法連

行三十六中之津分三次嚥下所謂河水逆流也並半時將手左

右擦丹田二百八下連臍抱脰放手時將表被圍住臍輪勿令風入古

養得丹田煖煖熱此是神仙真妙訣次將大指背擦熱拭目十四遍志火擦鼻三十

遍涌肺擦耳十四遍補腎擦面十四遍健脾雙手掩耳鳴天鼓徐徐將

手往上卽朝天揖如此者徐徐呵山燭氣四五口收清氣雙手抱肩

多筋骨益氣正元固二十百下察要良一頁

道經六字訣呵呼咽噏嚙

每自午至巳爲六陽時向東靜坐不必

閉竅亦不令風入叩齒三十六通攬口中候水滿時漱鍊數遍分三

口咽嚙下以意送至丹田微微撮口念呵字呵忠中濁氣念吐不

得聲反損心氣節閉口鼻吸清氣以補心吸時亦不得聞聲但呵

岑短啜入令長如此次恩呼字一遍以治脾再念噏字一遍以

治肺再念嚙字一遍以治肝再念噏字六遍以治三焦熱再念吹字

六遍以治腎並如前法謂之三十六週天也

詩曰春嘘明日外扶肝  
夏至呵心火自閑秋咽

定收全氣潤冬吹惟要坎中安三焦噏那除煩熱四季長呼肺化液切忌出声聞口耳其功尤勝保神丹

一秤金訣曰一吸便提氣氣歸肺一提便喫水火相見不愴行住坐舌

攬華池抵上腭候津生時漱而嚙下咽有聲人去身之水皆鹹惟舌入華池之水甘淡又日

吸下咽嚥隨于鼻中吸清氣一日以意自力周渾送至腋下丹田畧百脉自調勿隨于鼻中吸清氣一日以意自力周渾送至腋下丹田畧存一存謂之一吸隨將下部輕輕如忍便吸以意自力從尾問提起上來脊髓透玉枕人先腦謂之一呼周而復始久行精神強旺無病不生

金丹秘訣曰一擦一拋左右換手九九之功焉陽不走亥二時陰陽衰之候一手拋外腎一手擦腰左右換手各十二半月精神大而彈佳

李東垣曰恣心靜坐片時此生發過身元氣之要也

積補生氣積氣生精此自無而之有也鍊精化氣鍊氣化神鍊神還鑑此自有而之無也

養真移積石首參熟歸元腎真元歸元丹田真氣歸元頭腦歸元四肢歸元

宜常搖足心宜常擦皮膚常乾沐浴即擦太小便宜閉口勿言

譴傷久視傷目久臥傷氣久傷而久立傷骨久行傷筋久傷陽怒傷肝窮思傷脾極憂傷心過悲傷肺多恐傷腎驚傷膽多食傷胃醉飽久傷精竭力勞作傷中春傷于風夏爲淫泄夏傷暑秋爲疹瘡秋傷于濕冬必咳嗽冬傷于寒春必病溫夜寢語言大損元氣故聖人戒之

風寒傷 沐浴臨風則病風痛風飲酒向風則病酒風漏風勞汗鼻  
當風則病中風暑風露乘風則病寒熱卧起受風則病痺厥衣涼  
貢冷則寒外侵飲食寒則寒內傷寒訛作陰症非也凡令物不宜多食不獨房勞爲然也周揚俊曰房勞未嘗不病陽症头痛发热是也但不可輕用涼藥耳若以冒犯房勞使用溫藥殺人多矣昂按諸書從未

有發明及此者世医皆罕知之  
周子此論可謂有功于世矣

陰至則病身熱近寒多食涼水瓜菜則病泄而腹痛更火途貪涼食  
冷則病瘧痢

濕傷 坐卧濕地則病痺厥癲風衝風冒雨則病身重身重着汗衣則  
病麻木癰黃勉強涉水則病脚氣癰痺飢餓溼浴則病骨節煩痛出  
見濕則病瘧瘧病也  
坐平声

飲食傷 經曰飲食自倍腸胃乃傷嘔瀉之變是能生脾胃之疾消  
瘦痿厥飽食太甚筋脈橫解腸澼爲痔飲食失節損傷腸胃始病熱中  
未傳寒中怒後勿食食後勿怒醉後勿飲冷引入腎經則有  
腰脚臍痛之病食便卧 飲酒過度則藏府受傷肺因之而痰嗽脾因之而倦怠胃因之  
而嘔吐心因之而昏狂肝因之而善怒加因之而志懼腎因之而燶精

膀胱因之而溺赤一陽因之而泄瀉其則勞噦失血消渴黃疸痔漏瘧  
疽爲害窮鹹味能瀉腎水損真陰辛辣大熱之味皆損元氣不可  
多食

發傷 男子二八而天癸至女人二七而天癸至未合太早斬喪天  
乃死之由男子八八而天癸絕女人七七而天癸絕精血不生入房  
禁是自促其壽算 人身之血脉貫通及營事作撮一身之血毛  
命門化精以泄人之受胎皆稟此命火以有生故莊子曰火傳也不知其盡也 天精者神倚之如君  
水神必簡物方有附麗故關尹子曰精無人也水神無我也 楊玄經曰火性無我寄于諸緣 氣依之如靈體渾不知  
節竅血脉枯槁交接無度必損腎元外雖不泄精已離宮室有真精  
數吉遭陽之痿而溢出如火之有烟焰豈能復返于薪哉