

然，选派这  
經过考驗的  
中農方面的  
“私訪”的  
，以便分工  
一方面要深入进行艰苦的宣传教育工作，在和群众同吃、同住、同劳动中，采取个别談心、小型座谈，以至逐户訪問等方式，启发群众把对干部使群众不敢暢所欲言的  
防止那种害怕干部使群众不敢暢所欲言的  
群众說話的措施，使群众不敢暢所欲言的  
偏向。只有把束缚群众手脚的思想障碍打  
破以后，群众才能說出内心的话，問題所  
在才能够清楚地反映出来

卷之三

農業合作的，他們在他們是在他們財眾、經手上存在着問題上存在著紀、錯誤嚴橋鄉合作社計是完全符對这种估計謂“整整可我們的經驗如何，不僅不解的，即使群眾談話，還是有距離被誇大了件一件查況。例如上共二百零四鄉干部反病是相當嚴重乎所有干部八條意見四十七條，三條，屬於屬于土理其他方面的提的，有許多確在不同程必須加以糾清況有距離一百一十三說他們高元。但逐條污了一百二十一宣一百零五四百四十八只占四千一

評干部的詞句，必須堅持正確子虛的依靠、團結、教育、提高的方針。工作組一入社，就應對社干部開誠相見，敢不直諭他，而不迴避他。把在運動前和運動中有关工作風方面的材料加以整理，先在社內（吸收非黨社干參加）的會議上擺開來，進行批評與自我批評，讓被批評的干部也把話說淨，並分析問題的危害性，剝清是非界限，分清責任所在，然後在社員代表大會上分別進行系統的檢討。在干部個人檢討之前，應由工作組同志和社委指定的代表分別對上級機關和社委會的缺点、錯誤進行自我批評，干部個人主動檢討以後，問題就會解決不少，再在繼續進行批評自我說淨，並分析問題的危害性，剝清是非界限，分清責任所在，然後在社員代表大會上分別進行系統的檢討。在干部個人檢討之前，應由工作組同志和社委指定的代表分別對上級機關和社委會的缺点、錯誤進行自我批評，干部個人主動檢討以後，問題。

标准，开展充分討論，才能在大多數人的思想上弄清是非；有的是些心怀恶意的攻击、破坏、謾罵等等，則應等他說完以后，組織群众采取說理的态度，把它駁翻。这样，就会使犯錯誤的干部从思想上接受批評，使社員意識到無原則的不信任干部是不对的，同时使那些对合作化別有誤，有的是錯誤的意見，就需要樹立正確标准，开展充分討論，才能在大多數人的思想上弄清是非；有的是些心怀恶意的攻击、破坏、謾罵等等，則應等他說完以后，組織群众采取說理的态度，把它駁翻。这样，就会使犯錯誤的干部从思想上接受批評，使社員意識到無原則的不信任干部是不对的，同时使那些对合作化別有用心的人在群众面前把自己的狐狸尾巴暴露出来。

邊整邊改，分散解決。有許多問題，

上云桥鄉的上中農的情況是：有3人是擁護合作社的，他們有的是在增加了收入或保持了收入的，有的是後翻身的鄉上中農、干部家屬、軍等，他們是這個階層的左翼。有45人對合作社是半信半疑的，一般對合作社的發展也抱有希望，但他們當中有的減少收入，有的雖然增加了收入，但對管理、互利政策等有意見，風吹草動就容易發生動搖，他們是這一層的中間派。有25%的人是不滿意的，他們有的入社後減少收入很大，留戀單干時的剝削收入，想走資本主義路，他們在社內不是暗中搞“自發”公開退社，這是上中農當中的右翼。云橋鄉在處理上中農問題上，是根據中農的政策，加以分別對待的，在政策上尊重他們的民主權利，安排他們的農物參加社的各種管理組織和監察組，不給以擔任主要職務，人數也不超過之一。在思想上要進行社會主義的不斷地批判其資本主义思想，對僥幸、有嚴重的資本主义思想和行為應拿到社員當中來進行批判，以便取限。在經濟上，對減少收入太多者給予照顧，並注意貫徹互利政策。上云橋鄉在處理上中農問題上，是根據中農的政策，加以分別對待的，在思想上要進行社會主義的不斷地批判其資本主义思想，對僥幸、有嚴重的資本主义思想和行為應拿到社員當中來進行批判，以便進一步解

## 五、關於改進經營管理 和整社與生產兩

營管理的工作中，給了我們一個很大  
的指示，就是採取群衆路線的方法來解  
決管理中的問題。外來的成功的經驗，  
有關經營管理工作的指示，對改善我  
們的經營管理，有很大的作用。我們在  
經營管理工作中，給了我們一個很大  
的指示，就是採取群衆路線的方法來解  
決管理中的問題。外來的成功的經驗，  
有關經營管理工作的指示，對改善我  
們的經營管理，有很大的作用。我們在  
經營管理工作中，給了我們一個很大  
的指示，就是採取群衆路線的方法來解  
決管理中的問題。外來的成功的經驗，  
有關經營管理工作的指示，對改善我  
們的經營管理，有很大的作用。

因此，当走訪他的時候，他是極力的避開成就，只談了談克服困難的情況。好吧，那麼我們說說克服困難的精神究竟發源于那裡？吳隊長笑了笑，答案很簡單：因為龍岩是紅色的城，向紅城邁步有誰不賽跑呢？再一點，是讓我們用建設的奇跡來給右記老店貼緊封條，讓他們信口雌黃來說我們沒有成就吧！我明白了，原來這支走在工程之前的尖兵，他們的思想也正走在別人的前面。

尖兵們！建設社會主義的尖兵們！祝你們好。



大鍋要什么？  
鸡蛋。  
要小机器就办得了的事，却要设立一个  
（人民日报社論）

### 苏田

丰收山歌响满嘴，  
各人唱的各不同；  
歌声不同心一致哪，  
声声都是感谢毛泽东。

唱起山歌没尽头，  
好比江河水长流。  
远跟着共产党走呀，  
往后年年要丰收！

腐草叢生的沼澤地帶，或者是日夜蹲在油井和機器的旁邊弄得滿身油污，還是甘之如飴。他們看出自已劳动的意义和前途，忍受任何“諱”和“苦”都是心甘情願的。

農村呢？比較起來，還是不算怎样“諱”和

## 晚 年

我回家的第二天傍晚，沿着一片葱綠的菜地向溪邊走去。這裡的莧菜長得很好，東邊的一畦的菜葉子又大又青，格外顯得可愛，我正看得出神，忽然地里一位老大媽抬起头來瞧見了我，便向我招手說：“蔭生，是你，快下來給大媽瞧瞧，長高了長胖了！”

大媽已經六十六歲，膝下無男無女，我正要了解這幾年來她是怎樣生活的，她高興的告訴我：“合作社每年給我五百四十八斤糧，這塊地也是社里揀給我種蔬菜的。入社時社長說：‘大媽，你是五保戶，別操心，只要你說一句，我們什麼都會來給你忙！’果然，過了幾天，幾個小伙子和姑娘們在嘁嘁喳喳的商量什麼，隨後他們便每天到我家來，小伙子劈柴，姑娘們挑水，總是給我料理得停停當當的才走。有一天，我看著他們奔忙著，忍不住流了淚，這可把他們吓住了。我說：‘我不是傷心，我是想我這輩子怎能報答你們！’他們說：‘大媽你不要感謝我們，感謝毛主席吧！’

大媽顯得很得意，話也說得起勁，這不由使我想起八年前一個老太婆沿門求乞的情景。她哆哆嗦嗦的站在人家飯桌旁邊，蓬散着頭髮，兩只灰白眼睛定定的看着地下。她要飯從不希求什麼，人家愛給什麼她就收什麼。當人們有喜慶事時，她也只站在厨下要些剩飯菜。但她几乎向人們訴說同一句話：“鄉親們修修好，布施點！我孩子被抓去當兵，也許他還能回來報答你們。是的，他會回來的。”然後她把筐子伸前去，有時候她把筐子拿回來，裏面却只有兩塊石头。譬如有的錢的趙先生就頂討厭她說的話。“報答，嘻嘻，也許你把孩子的骨頭給我們當鼓槌吧！”老太婆全身顫動一下，張着顫抖的嘴唇說：“先生你這樣說話可要修修來世。”“放你屁！”猛的一

下，趙先生把老太婆推進筐子，哭了起來，……

一個多可憐的老陳大媽。“蔭生，呀，當年我們閩西外奔跑，那時我家瞓着眼闔我：‘你沒地的閒，要臉不福活到咱們這時代是，誰不是。’廿三歲姑娘，挑着一挑草拔好了嗎？我來喜地抬起头來說：‘了！’‘不，我分起水瓢，一瓢一瓢搭拉在腦後，忽然

## 开 天

以前有兩兄弟，信息：“沾泥的腳不不入耳，就勸他：來，有何不好！”吃的魚肉，穿的綢緞。

這年八月十五，傳并全部答應世人的。一眨眼工夫又閉上。

中秋晚上，李五一更時刻，李五眼李五累了，接連打哈。就在这時，忽然連忙搖醒弟弟，“

李五揉着眼睛，李四就對天門禱告他，沒病沒痛，快

急救諸方

解救諸毒

誤吞諸物

烟酒醉傷

人畜咬傷

蛇虫咬傷

湯火傷

跌打損傷

刑杖傷

銅鍊竹木

雜物入肉傷

筋骨軟痛

中風症

傷寒症

感冒風寒

驗方新編

卷拾參 卷拾肆

驗方新編卷十二目錄

急救

五絕

溺水死

腹破腸出

冰死

雷擊死

治夢魔

鬼打死

壓死跌

睡魔死

中邪死

驚嚇死

癥厥死

中風死

尸厥死腹響如雷

暴厥死

解救諸毒

解救百毒

解鴉片烟毒

解野菌毒

菌音那

解黃藤草毒

解野葛毒

氣厥死

戶厥死

忽然胡言亂語昏迷倒地

發花風死

中毒七孔流血

解砒霜毒

解斷腸草毒

解野草毒

水莨菪毒

解鹽滷毒

解鹼水毒鹼音檢

解煤火毒

解迷悶藥

解百藥毒

解巴豆毒

解附子烏頭天雄毒

解芫花毒

解狼毒

解木鱉毒

解硃砂毒

解冰片毒

解水銀毒

解鉛粉毒

解輕粉毒

解斑貓毒

解硫磺毒

解食桐油

解蠍蛇毒

解花椒毒

解食蛇毒

蜈蚣入腹

解各虫毒

解螞蝗毒

解各色魚毒

解蝦蟆毒

解螃蟹毒

解大馬肉毒

解馬肉毒

解食鱉毒

解黃白鱉毒

鱉音義

解食十肉毒

解鵝鴨毒

解雞肉毒

解野雞毒

解鬱肉漏脯毒

解諸肝毒

解自死各物毒

解藥箭射傷鳥獸毒

解杏仁毒

解百藥毒

解木瓜毒

解豆腐毒

解中山洞生金生銀及銅鐵鉛錫等毒

解飲田澗山溪水毒

解隔夜茶水毒

諸毒須知

誤吞諸物

誤吞鐵器

誤吞金銀銅鐵錫鉛

誤吞銅錢

田螺卡喉

竹葉卡喉

桃杏卡喉

鐵鍼卡喉

頭髮卡喉

誤吞鐵針

誤吞金箔

諸骨卡喉

稻穀卡喉

竹木卡喉

諸豆卡喉

鐵鉤卡喉

蜈蚣卡喉

煙酒醉傷

水旱烟醉傷

洋烟醉傷

酒醉傷

酒醉心痛

酒醉小便不通

酒頂大小便不通

酒病

酒龜

醉後嘔吐視物顛倒不正

戒洋烟癮

戒酒方

驗方新編卷之十二

急救

凡自刎縊死溺死及一切自盡等症人多畏懼不救亦有以為已死不能復活者不知救治得法亦可回生救得一人可全兩家性命後列各方果能如法施治必有奇效即使萬無生理亦當盡人事以聽天命不可見死而不救也

五絕

凡五絕卒死急取韭菜搗汁灌鼻中或加皂角末射香同灌更為快捷

縊死

回生丹

見後跌打損傷門

灌之立活真仙丹也

又方不可割斷繩索急以衣裹手緊抵糞門若係婦女則連陰戶抵住緩緩抱住解下安被放倒

急將所縊之索用碗裝好用火蒸之其活更快

一人踏其兩肩以手緊提其髮不可使頭垂下一人微微燃整喉嚨一人

擦摩心胸又輕輕摩其肚腹一人摩擦手足緩緩彎動若已硬直

但漸漸強彎屈之又用腳裹衣緊抵糞門陰戶不使洩氣以兩人

用竹管吹其兩耳不可住口或用雞冠血滴鼻中男左女右

男用雄雞雌雞

如此一飯之久即有氣從口出不可鬆手少刻以淡姜湯或

女用

粥與食令潤咽喉漸漸能動乃止凡縊死從早至晚雖已冷可活  
自夜至早稍覺難救總之身體稍軟心下微溫者雖一日以上若  
依此救法多次多摸無不活勿謂已冷畧忽不救

又方 照前法救治再將其兩手大指姆並排平正以小帶縛定  
於兩指縫中離指甲角一分半之處名鬼哭穴用艾火燒三七次  
並燒兩脚心三次即活凡無故中邪而自縊者以多燒鬼哭穴為  
要

又方 炒熱生鹽二大包從頸喉熨至臍下冷則隨換不可住手  
其痰盡下並用人對口以氣灌之其活更快

又方 陳皮八分 厚朴 製半夏各壹錢  
肉桂 乾姜各五分 甘草分參

水煎服

又方 葱心刺耳鼻中有血出即活

又方 用手緊掩其口勿令通氣兩時詐氣急即活

又方 用皂角細辛等分為末如豆大許吹兩鼻孔

又方 用真野山羊血二三分研極細末以好酒灌下立活

溺水死

撈起時急急將口撬開橫啣筷子一根使可出水以竹管吹其兩耳屎生半夏末如豆大吹其鼻孔又用皂角末置管中吹其穀道

如係夏月將溺人肚腹橫覆牛背之上兩邊使人扶住牽牛緩緩而行腹中之水自然從口中出大小便流出再用生姜湯調蘇合丸灌之或生姜汁灌之並用生姜擦牙若無牛用一人覆臥躬腰令溺人如前將肚腹橫覆於活人身上令活人微微搖動水亦可出或用大鍋一口覆寬櫈上將溺人覆於鍋上亦可要對溺人臍對鍋臍俯卧手托其頭如係冬月急將濕衣更換一面炒鹽用布包熨臍一面厚鋪被褥取灶內草灰多多鋪於被褥之上令溺人覆卧於上臍下熱以棉枕一箇仍以草灰將渾身厚蓋之灰上再加被褥不可使灰迷於眼內其擗口唧筒灌蘇合丸生姜湯吹耳鼻

穀道等事俱照夏天法冬天甦醒後宜少飲湯夏天宜少飲粥湯按灰性燥而能拔水凡蒼蠅溺水死者以灰埋之即活此明驗也溺人倘或微笑必急掩其口鼻如不掩住則笑不可止不能救矣又不可急於見火一見必大笑而死又以酒罇一個紙片一把燒放罇內急以罇口覆臍上冷即燒紙片放罇內覆臍去水即活又初救起時尚有微氣或胸前尚暖速令生人脫貼身熟衣為之更換抱擔身上將屍微微倒側之令其腹內水流出若水往外流即有生機一面用粗紙燒撚取烟燻其鼻竅稍燻片時即用皂角研細末吹入鼻竅但得微有嚏噴即可得生又灌酒湯不可太熱恐

傷齒盡落 又方 先打壁泥一堵置地上以溺人仰卧其上更  
以壁土覆之止露口眼自然水氣噙入泥間其人遂甦雖身僵氣  
絕用此法亦可救 又醋灌鼻中綿裹石灰納糞門及陰戶水即  
出 又方 鴨血灌之即活終身戒食鷺鴨

割喉 腹破腸出

均見卷十三跌打損傷門

二般毒

方見後解救諸毒門

凍死

冬月凍極之人雖人事不知袒胸前有微溫皆可救倘或微笑必為急掩其口鼻如不掩則笑而不止不可救矣切不可驟令近火但一見火則必大笑而死

凍死四肢直口噤有微氣者用生半夏末如豆大少許入耳鼻內又用大鍋炒灰布包熨心腹上冷則換之候目開以溫酒及清粥少少與之不可太熱恐傷齒盡落如已救活用生姜搗碎陳皮旋碎各等分  
用水三碗煎一碗溫服

又方 用氈或草薦捲之繩索繫定放在平穩處令二人相對踏令滾轉往來如扦氈法候四肢溫即活

又方 用雄黃焰硝等分為末點兩眼內角

壓死跌死

急扶起盤腳坐地以手提其髮將生半夏末約豆大吹兩鼻中以生姜汁灌之只要心頭微溫雖至一日亦活再用白糖調水與服散其瘀血或加童便灌之

又方

回生丹

見後跌打損傷門

灌之立活真仙丹也

雷擊死

又方

回生丹

見後跌打損傷門

灌之亦可活也須戒殺生

蚯蚓

又名地龍  
又名曲蟮

搗融敷臍上半日即活仍禱謝雷神度心懺悔或

用回生丹

見後跌打損傷門

灌之亦可活也須戒殺生

睡魔死

與後中邪死鬼打死各方參看

原有燈即存燈無燈切不可用燈照急用生半夏末約一豆大吹入兩鼻取母雞冠血搽面上乾則再搽即醒

又方 樟木燒烟燻之即醒

又方 不得用燈火照並不得近前急喚但痛咬其足跟及足大拇指頻頻呼其名以口水唾其面再灌姜湯即活

又方 移動些小卧處徐徐喚之即醒

又方 用管吹其兩耳以皂角末如豆大許吹兩鼻得噴嚏則氣通三四日者尚可救

又方 酒調蘇合丸灌之

又方 用艾燒兩足大拇指趾向上生毛處三七次或燒鬼哭穴亦可鬼哭穴見前綻死方內

治夢魔

大塊明雄硃砂  
更妙戴頭上並繫左腋下可免鬼魅並解惡夢

又方 卧時以鞋一仰一覆或以紅毡紅布之類枕頭即安

中邪死

用薤菜心於男左女右鼻內刺入六七寸令目開血出即活或韭搗汁灌鼻更視上唇內有如粟米粒者以針挑破取出 或皂角

末或生半夏末如豆大各吹兩鼻中燒炭一爐以陳醋燄炭土使患者聞得醋氣即活須捉其兩手勿令驚或灌醋於鼻中或用樟木燒烟熏之亦可

鬼打死睡魔死中邪死俱可用此方

白毛烏骨雞血搽心前並將雞煮湯灌之極效 或用雞冠血滴口中仍破此雞搗心下冷即將雞埋之甚效

驚嚇死

回生丹見後跌打損傷門灌之立活真仙丹也 又方 醇酒一二杯溫熱灌之自活或用生半夏末大一豆吹兩鼻中亦可

痰厥死

巴豆搗爛綿紙包壓取油作燃燒烟熏鼻中片刻吐出痰血即愈  
或用生半夏末如豆大吹入兩鼻中

氣厥死

照上痰厥方治之

中風死

方見中風門卷十四或照上痰厥方治之

尸厥死由入廟弔喪問病而得者

附子七錢重者泡熱分為二服每服酒三盞煎一盞如無附子生  
去皮膀爲末

姜汁半盞和酒同煎百滚連灌二服即醒或照上癥厥方亦可  
尸厥死腹響如雷

硫黃壹兩焰硝五錢研細分作三服好酒煎至烟起則止溫灌下  
片時再服即安

忽然胡言亂語昏迷跌倒

此症不省人事切勿挪動動則難治急用大爆竹放頭腳兩處頭  
邊一個脚底一個一齊點放其人自醒無恙大小皆治屢試如神

暴厥死

凡人卒然倒仆急救入暖室扶住正坐用火炭沃醋使醋氣冲入

鼻中良久自醒或搗蕷菜汁灌鼻或用皂角末吹鼻得嚏卽醒如倉卒無藥急於人中穴及兩足大拇指趾離甲一蕷菜許各用艾火灸三五次卽活

發花風死

此症多死於牀上見腎俞穴背脊下腰眼處卽是有一紅扁者可治若黑者不治急用射香填於臍眼加姜一片蓋射上艾火炙而生

上



卷十一

徐子餘與魏人中穴父而吳大師北進甲一班英傑各用文火

舉出身於自點之將進某代擊壤送風皇承末知是將兒與點也

解救諸毒

本凡解救毒藥俱宜冷服大忌飲熱湯水飲熱則不可救矣若見酒必死

解救百毒

乾淨地上黃土地挖三尺深入水一桶用棍攪動名曰地漿能解

更好

首毒凡食隔夜菓餅菜蔬茶水酒漿等物或飲田塘溪澗井溝之

水誤中無名百毒者取飲數碗極為神效愈後戒食鱠魚

又方 巴牆草搗爛煎湯冷服能解百毒屢試屢驗神方

中毒七孔流血

刺蝟皮 性 蝦存為末每服三錢酒調下立止

解鴉片烟毒

急用活鴉血多多灌之凡服鴉片烟者最為神效若身冷氣絕似乎已死如身體柔軟則臟腑筋絡之氣尚在流通實未死也乃鴉片烈性醉迷之故耳將其人放在潮濕陰地用筷子擡開牙齒或磁調羹或用烏梅擦之亦開芳用銅鐵等物反不能開矣以筷子橫放口內使口常開以冷水時時灌之或白沙糖調冷水灌之更妙外用手帕二三條以冷水泡透放胸前輪流更換或用整塊豆腐亦可又用冷水一盆將頭髮散放盆內時時換水切不可見太陽一見日照則不可救三

四日後鴉片之氣散盡卽活如

身不硬雖七日內亦可回生切不可以為無救遽行棺殮此法會  
救多人無論服毒輕重雖手足青黑照此救法無不活也切忌灌  
服醬油恐受鹽滷之毒反致誤事若服藥雜亂亦不可救慎之慎  
之活後多服白沙糖水及生菜豆末沖水服最效有老仵作云  
檢服鴉片烟屍骨伏者居多側者亦常有之平仰者甚少蓋因其  
人埋在土中鴉片每氣退盡仍復生活輾轉棺中不能復出久則  
真死矣故其骨殖不伏即側實為服鴉片烟可救之確證也道光

七八年間廣東省有吳姓者寄居客店窮極無聊吞鴉片烟而死  
店主入不敢收斂知此人有親屬在三水縣地方遣人往告其親屬  
四日後始至而此人已於前一日活矣 又有人吞服鴉片烟百  
藥不效死後降乩云當日因用藥雜亂是以不效惟用真南硼砂  
黃色如膠冷水調服可以立解試之屢有奇驗  
者為真

又方 用清油灌之立解緣鴉片烟粘滯腸胃見油即散也  
又方 巴牆草搗爛煎湯冷服屢試如神

解砒霜毒即信石也此症如用鴨血治須終身戒食鴨

防風壹兩研末冷水調服或用四兩冷水擂汁灌服亦可屢試如

神萬無一失

又方 殺白鷗取血對口急急灌下即活遲則血冷如已服防風必能回生可以不必服此以免雜亂反致不救

解野菌毒菌音郡

照前取地漿水三四碗入喉即活至神至妙切勿輕視亦不必用別藥

解斷腸草毒

此症治好須戒殺生

此草有尖圓兩種如服尖葉者不過一二日肉即消化急用活羊血灌一二碗即活最有神效有人以此草放猪尿脬內草自走動

胞漸澆薄後以羊血灌入即不動矣或服羊油二三兩亦如此草惟羊食之最肥故飲羊血羊油即解

又方 蕺音甕菜搗汁灌之其效如神如不見信以蕨菜汁洒生斷腸草上草即萎黃而死或照後解野葛毒方治之亦效

又方 菲菜搗汁灌入亦效

又方 用抱過雞蛋兩三個破開和清油灌入或未抱過雞蛋亦可

解黃藤草毒

即水莽草或云即斷腸草

黑豆一升煮濃汁候冷透飲之立解或照前解斷腸草毒及後解

野葛毒方治之均極神效

解野葛毒

殺鴨白鴨更好取自然熱血對口急急灌入即活屢試如神不可灌遲遲則血冷恐難見功終身戒食鴨

解野草毒

照上解斷腸草及解野葛毒各方治之或飲甘草水或飲地漿見前均效

水莨菪毒

菜中有水莨菪葉圓而光誤食發狂狀如中風或作嘔吐用甘草

煮汁冷服即解或飲地漿亦可

解鹽滷毒

生豆腐漿冷服二三碗至神至妙如一時難得以黃豆擂碎冲冷水去渣服之或用活鵝鴨血多多灌之即解戒食鵝鴨

又方 白沙糖五六兩用冷水調服亦極效驗

又方 淘米水冷服三四碗亦可

解鹹水毒  
鹹音檢

照上解鹽滷毒各方治之

解煤火毒

中煤炭毒土炕漏火氣而臭穢者人受燻蒸不覺自斃其屍極軟  
與夜卧夢魘不能復覺者相似房中置水一盆並使媳戶有透氣  
處則煤炭雖臭不能為害飲冷水可解或蘿蔔搗汁灌口鼻移向  
風吹便醒

解迷悶藥

飲涼水即解重則飲藍靛汁立愈如牙關緊閉由鼻灌入亦可  
又方 白沙糖調冷水服更妙

解百藥毒

凡服藥過多致生瘡毒頭腫如斗唇破流血或心口脹悶或肚腹

撮痛者用小黑豆  
菉豆各壹升  
煮濃汁即解須冷服

又方 甘草熬膏日服數次解毒如神雖然泄瀉亦無害也

又方 糯米糖食之即解此孫真人方也或食白沙糖亦可

又方 如已氣絕只要心間溫煖者乃是熱物犯之只用防風二錢煎水冷服即活又或照前解百毒方治之極效

解巴豆毒

口渴面赤五心煩躁泄痢不止者是用黑豆壹升煮汁冷飲即解

又方 川黃連煎水冷服亦效

解附子烏頭天雄毒

防風貳錢煎水飲或照前解百毒方治之

解芫花毒

治法與上附子毒同

解狼毒毒

狼毒藥名飲鹽水可解或照前解百毒方治之

解木鱉毒

身發抖戰者是急用好肉桂貳錢煎服立愈或用白沙糖貳兩灌之亦可或照前解百毒方治之

解硃砂毒

藍靛音殿葉汁飲之即解

解米片毒

服米片過多口渴心煩飲地漿一冷水即解

解水銀毒

服水銀欲死者用真川椒數斤炒熱鋪席下令患者脫衣蓋被睡之過一夜水銀從毛孔中鑽入花椒內矣真奇方也

解鉛粉毒

婦人因打胎而服鉛粉生子痴呆身體多發瘡毒用活鴨血乘熱服之極為神效

又方 白沙糖三四兩冷水調服或用蘿蔔搗汁飲之均極效驗  
解輕粉毒

輕粉性最燥烈楊梅等瘍服此最易收功其毒竄入經絡或口齒腫爛或筋骨疼痛攣縮久而潰爛經年累月甚至終身不愈致成

殘廢用

土茯苓壹兩薏米

銀花 防風

木通

白蘚皮各

錢

木瓜

壹錢伍分

皂筈子

肆分

氣虛加頂上黨參

壹錢

血虛加當歸

七分

煎服日服

三次忌飲茶

並牛羊雞鵝魚肉燒酒奶食辣椒及一切

發物並謹戒房事半年服至十日漸次痊愈功效異常

又方

紅棗丸

見癟毒諸症  
楊梅瘡內

服之最為神效

又方 用黑鉛打成酒壺一把約五六斤重內盛好燒酒十五斤土茯苓半斤乳香參錢封固隔水煮一白夜埋土中七日出火毒早晚隨量飲用瓦盆接小便看有粉出為驗服至筋骨不痛乃止屢試如神

解斑貓毒

黑豆壹升煮濃汁冷飲即解或照前解百毒方治之

又方 涼水調六一散七錢服二三次必痛止而愈

又方 玉簪花根煎水冷服即解

解硫磺毒方內生羊血為解硫磺神藥愈後須戒殺生並戒食羊為要

用真烏梅肉

焙乾壹兩烏梅有李子  
假充者以家製為真

白沙糖伍錢煎服

又方 白羊生熱血飲一碗神效

又方 防已貳錢煎水冷服即解

又方 黑鉛貳兩煎湯服即解

解花椒毒

口吐白沫身冷氣欲絕者是照前解百毒方治之即愈

解食桐油

急飲熱酒即解

又方

糯米蒸熟晒乾炒炮食之

又方

蓮蓬煎水服甚效

又方

真乾柿餅食之亦效

解食蛇毒

烟油又名烟屎即烟桿中烟氣結成如用冷水洗出二三碗飲之  
醬者是烟桿以用過多年者為佳

凡受蛇毒飲之其味必甜並不難飲屢試如神或蛇遺毒在食物內亦效

又方 雄黃調水冷服效或照前野葛方治之

又方 蟒蚣一條焙枯研末冷水調服一服即解如恐蟒蚣有毒過一二日照後解蟒蚣毒各方服之決無後患

解蜈蚣毒

凡誤食蜈蚣毒者用樟樹葉煎水冷服極效

又方 十指甲磨冷水多飲之其效無比

又方 照前地漿及野葛方治之均效

蜈蚣入腹

生雞血灌之甚效 又方 食生雞蛋二三個畧過半刻再飲生油一盃即吐出絕妙方也

解各虫毒

照前野葛方治之極效

解沙虫水毒

萬苣菜即萬筍菜搗汁飲之即解或照前解百毒方治之

解螞蝗毒

又名水蛭

此物入腹久必生子食人肝血腹痛不可忍面目黃瘦不治必死

馬方集解卷十二  
用桂圓肉荔枝肉亦可包烟油烟油查上解蛇毒方便知吞之即死隨於大便而出屢試如神此經驗第一方也

又方 用白蜜頻頻食之至一二斤方愈螻蝗火燒為末見水即活惟以蜜浸之即化為水故服蜜最佳以多為妙少則不效如食蜜不愈即食羊肉可化如不信將螻蝗入羊肉內亦化為水白蜜體虛不可多服不如第一方之妙

又方 田中泥壹兩雄黃貳錢為丸分作四服開水下其虫入泥隨大便而出有時螻蝗行至鼻孔血流不止只用田泥泡水一碗放鼻孔前必然乘泥而下

又方 活小魚數條猪板油貳兩加黃泥共搗為丸涼水下馬蝗  
即和泥而出又青龍音殿調水飲即瀉出

又方 蘆藜即蓼蒿炒為末水調服一錢必吐出

解河豚魚毒

槐花微炒與乾胭脂等分同搗成粉冷水調服極效

又方 多食橄欖並用橄欖核磨水服極效

又方 照前解百毒方治之如口渴不止者服小便坑中水一小

盞數次即愈 又方 飲真麻油一二杯亦效

解各色魚毒

紫蘇煎濃汁冷服極效以多為妙

又方 多食橄欖又名青果並用橄欖核磨水服最效

又方 冬瓜生搗汁飲之 又方 魚鱗燒灰冷水調服二錢

又方 食魚過多腹脹面黃者用紅麴三合煮爛連渣服即從大便出臭不可聞連服三次愈

解食蟹毒又名甲魚水魚腳魚團魚

飲藍靛音殿汁即解 又方 冷水調鹽飲之亦可

又方 淡豆豉壹合搗爛用冷水冲入取汁服即愈

又方 白馬尿飲之即解蟹與莧菜同食者此方尤妙

解蝦蟆毒 又名青蛙 又名田雞 又名水鷄

照上蟹毒各方法治之

解黃白鱠音善毒

生螃蟹搗融冲冷水飲之或照上蟹毒各方法治之極驗

解螃蟹毒

紫蘇煎濃汁冷服一二碗即解生藕汁生大蒜汁生冬瓜汁生黑豆汁俱可解 又食螃蟹牙根肉腫出者用牙皂角數條火上燒焦泡生地黃汁內半日取出再燒再泡三次後焙乾研末冷透敷之

解鷓鴣毒

馬力集卷一  
有人好食鷓鴣後喉間生癰潰爛膿血不止百藥不效一名醫令先食生姜一斤陸續煎水服完然後下藥治之遂愈蓋此鳥好食半夏係因半夏毒發故以姜治之也

### 解犬馬肉毒

凡食犬馬肉腹脹口渴發熱亂言者用淡豆豉貳兩杏仁參兩同蒸搗爛服之日服二三次或煮蘆芽根飲之俱效

又方 杏仁貳兩去皮蒸熟研爛用滾水和勻取汁服服後必然肚泄俟泄三次後再服冷醋一茶鍾或冷粥一碗即愈

又方 萝蔔皮焙枯研末七分紫背浮萍焙枯研末參分共和勻開水調服有人

食犬停滯久而肚腹腫脹數月不愈後服此方腹響如雷大吐大  
泄而愈各種食積腹脹如鼓者服之皆效

解馬肉毒

人乳飲之即解或照前解百毒方治之

解食牛肉毒

苦瓜皮搗爛冲水服神效 又方 蘆茅根煮汁溫服甚妙

又方 牛腸中未化草色如青苔者是煎汁調姜鹽醋服之即解

又方 鳥柏樹根皮酒煎服或菊花連根搗汁酒服均效

又方 人乳飲之即解 又方 照前解百毒方治之

解鵝鴨毒

糯米半斤淘水去米溫服一碗即愈

解雞肉毒

地漿飲之可解

解野雞毒

此症吐泄不止用生犀角末三分冷水調服即解

解鬱肉漏脯毒

藜鴉汁飲之即解

凡各肉密器緊蓋過夜者為鬱肉屋漏沾著者為漏脯皆有毒並

解諸肝毒

熟豬油一斤拌飯或炒飯亦可分作一二日食盡此一二日內勿食別物為要。又方 照前解首毒方地漿飲之極效。

解自死各物毒

黃柏研末冷水調服一二錢即解或飲人乳一碗極效。

解藥箭射傷鳥獸肉毒

先以鹽水服之次以黑豆煮濃汁飲之即解。

又方 蘆茅根煮熟連湯食極效或照前解百毒方治之更妙。

解杏仁毒

杏仁生熟服之都不為害若火炒不透半生半熟者服十數粒即死其屍眼閉舌唇耳竅手足十指俱青色肚腹有青色塊每有食以詐人者人不易防最難禁化惟急取吐吐出可解用杏樹皮煎湯飲之雖迷亂將死者皆可救或用射香一分沖水服亦可

解百藥毒

射香壹分煎湯服即解 又方 白藜頭煎湯服一二次即愈

解木瓜毒

舌大滿口者是用好醋調黃糖紅糖亦可含口中吐出涎水數次即愈

解豆腐毒

蘿蔔煎湯飲之即解

解中山洞生金生銀及銅鐵鉛錫等毒

照前解野葛方鴨血灌之即活

解飲田澗山溪水毒

凡田澗山溪往往有蛇遺毒在內誤飲其水用水調雄黃多服數次自愈

解隔夜茶水毒

服雄黃或地漿均可解

諸毒須知

馬方集卷之二十一  
飯落水缸毒 飯落水缸日久生毛食之生疔難治最宜留心檢點

久閉空房毒 凡屋宇久閉陰濕閉結不散或邪魅借以潛踪蛇虺惡獸從而盤踞宜大張聲勢或先以火驚散

山洞園林毒 凡偏僻山洞及年久園亭藤蘿花樹之下不可飲食恐有蛇虺毒虫遊行其上遺毒於食物中為害不小

衣有暑毒 夏日汗透之衣向日中晒晾忽暴雨將至急為收檢則烈日之毒即蘊於內如遇酷暑汗出時偶一衣則暑以引暑立中其毒又夏秋晒晾冬衣必須冷透收檢若未攤冷而收入箱篋

將來穿着必受暑毒宜於臨穿時先放當風吹透再穿方免其害  
草藥毒 山有毒草入山採藥須細心揀淨 瓶花水毒 凡瓶  
內挿過花枝其毒最甚不可誤飲 開夜茶水食物毒 凡夜間  
茶水食物未經蓋好必有虫鼠遺毒不可誤飲

雞毒 雞食蜈蚣百虫久則食之傷人故養生家雞老不食又夏  
不食雞又黃蜡白蜡炒雞食之脹悶氣塞三日而死無可救也凡  
服藥有蜡者前後十日忌食

鰣音善魚毒 白鰣黃鰣昂頭出水者食之必死

魚荆並食毒 昔一婦以魚湯米飯餉夫路過荆樹荆花落於湯  
中食之遂死凡服藥有荆芥者前後數日忌食魚蝦等物

蜜酢併食毒 韶州有僧飽食新蜜還至半道遇賣鮓者買食半斤至家而死

河鯢藥並食毒 凡服藥前後數日俱不可食河鯢食之有毒  
鱉貁並食毒 蟹與貁菜同食腹生小鱉即死飲白馬尿即化  
游波虫毒 凡食海蛤慎防游波虫其殼骨相似惟以面上無光  
可辨若誤食之令人狂走欲投水似有祟狀惟醋解之立愈  
屋漏水毒 屋漏滴食物上食之有毒

獸雙尾及蟹獨螯羊一角雞四足白鳥烏首烏雞白首白馬青蹄  
黑蹄肉落地不沾塵經宿尚暖曝炙不燥入水自動又皮肉無異

腸臟變改者如肝色青黯腎氣紫黑魚無腸胆牛肝孤葉鮑魚同鹿肉羊肉同鱠酪羊肝同生椒多食猪肉得胡荽俱殺人

生魚同酥乳變諸虫牛猪肉同食成寸白虫猪肉以桑楮柴煮炙食之亦成寸白虫

柿子同蠣食羊肉食必致患病腹痛或至不救

諸菜有異樣者根下必有毒蛇菓未成核者食之發癰瘡並發寒熱菓落地有虫緣過者食之生九漏有雙蒂者有雙子者有沉水者均有毒不可食

猪肉忌 蕃麥 蔽菜 胡荽 梅子 炒豆 龜蟹 鵝鴨

驢馬肉

羊肉忌 梅子 豆 蕎麥 魚膾 柿餅

牛肉忌 栗子 韭菜 茄子 犬肉 粟米

犬肉忌 菱角 牛肉 雞肉 鯉魚 鯧魚 蒜 葱

驢肉忌 荆芥食之有大毒

兔肉忌 生姜 橘皮 芥末 雞 鹿 獺

雞忌 黃蜡食之必死 蒜 芥菜 李子 獺 兔 犬 蟹

野雞

鴨忌 李 蟹

鵝鴨忌

菌子

木耳

猪肉

雀忌

李 醬

生肝

鱉

諸色魚忌

荆芥食之死見前

又忌棗

鯽魚忌

猪肝

芥末

蒜 糖

鱠忌

莧菜食之死見前

雞蛋 鴨

兔

雀

桃

李

薄荷

芥末

鯽  
音鰐

善鯿忌

桑柴火煮

螃蟹忌

荆芥

柿 橘

棗

諸瓜忌

油餅

馬方集錄 卷十二  
一  
蕎麥忌 猪 羊 鯉魚

綠豆忌 椒子食之死 鮸 鯉魚 鮓

核桃忌 酒 野雞

筍忌 糖 鯉魚 羊心肝

葱忌 蜜食之斷腸 雞 犬 藥 楊梅



誤吞諸物

誤吞鐵器

炭皮研末調粥二三碗食之炭末即裹鐵器由大便而出神效第  
一方也

誤吞鐵針 鐵針卡喉見後

蚕豆煮韭菜同食針與菜從大便而出

無蚕豆用  
鹽蛋亦可

又方 生癩蝦蟆眼珠一對冷水整吞下其針兩頭穿珠立刻吐  
出或從大便而出神效永戒食蝦蟆

又方 照前木炭皮研末和粥食之亦出

### 誤吞金銀銅鉄錫鉛

羊脛骨即羊前腿膝蓋骨也燒枯為末米湯調服二三錢一日必出有人吞金鏹三日不下服此即出屢試神驗真百發百中之方也

又方 橄欖核燒枯研末開水調服自出神效

又方 韭菜一把滾水煮軟不切斷淡食之少頃即吐出或從大便而出 又方 糯米糖食半斤亦效

### 誤吞金箔

此物吞下或閉喉管或閉肺管遲則難救急取羊血灌之最為神效

誤吞銅錢

多食荸薺自然消化其效無比

又方 砂仁二兩煎湯服之亦可化也或照土誤吞金銀等方治之亦可

諸骨卡喉

此症宜急治之若飲食難進餓倒胃氣亦屬難救凡係獸骨及鷄鴨等骨卡者用狗一隻倒吊取涎緩緩嚥下其骨即化屢試如神以狗善食諸骨故也 又方 虎骨研末水調服亦佳

又方 魚骨卡者用鷄鴨或鴨子倒掛垂取涎令患人仰卧時時

灌下其骨盡化 又有人被魚骨橫梗胸中半月不下疼痛難忍  
用橄欖核磨濃汁滾水調服愈真仙方也

又方 灰麪四兩用冷水調稠敷兩膝頭上一時之久不知其骨化  
於何處真奇方也一切禽魚獸骨皆治

又方 有人因一骨橫喉百藥不下夢人告之服真南硼砂黃色如膠者最妙遂取一塊含之即愈硼砂多有假充如非真者亦不見效  
如咽喉腫爛用真南硼砂加頂上梅花冰片和勻吹入藥店冰硼  
散斷不可用亦恐其假而無功也 又食山楂膏甚效或以山楂  
煎濃汁服之亦可緣雞骨入山楂膏即化故能治一切骨梗也

又方 貴衆培枯研末每服一二錢神效或煎濃湯含口中緩緩嚥下亦可 又方 白糖含口中令其自消則骨與俱化矣

又方 魚骨卡者以本魚骨插耳尖縫內左卡插左右卡插右或藏髮中亦可神效 又方 大蒜塞鼻不令透氣其骨自下

又方 家用苧麻根搗融為丸如桂圓大魚骨用魚湯下雞骨用雞湯下或用苧麻根搗汁飲之亦可

又方 栗子內薄皮瓦上焙枯存性研末吹入喉中即下栗子又名板栗 又方 人指甲瓦上焙枯研末吹入極效

又方 砂仁 草菓 威靈仙各參錢加白糖壹兩水煎連服三四

碗無論何骨俱化神效此林屋山人極驗仙方也

又方 製灯心炭製法見藥物備要研極細末吹入三四次神效此亦林

屋山人經驗方也

又方 茄子又名茄頭食之即下

又方 魚胆飲 冬天取鰯魚膽懸掛陰乾遇有各骨示喉即

取一個大者半個亦可

水煎溫服下少時嘔吐骨即隨出如尚未吐再服

溫酒以吐為度酒隨量飲若再未出再煎魚胆服之無不出者如各

骨在腹內日久刺疼黃瘦者服之皆出草魚鯽魚胆俱可竹木卡喉

者服之亦極效驗存心濟人者宜收藏以救急也

又方 吳茱萸煎濃汁飲一碗骨刺腹中者亦軟而易下

又方 五月五日午時在韭菜地內面東勿語取蚯蚓泥又名收瓦上培

之每用少許擦喉外其骨自消 又方 鯉魚背脊鱗枯研末涼

水服之其刺自跳出雖三四日不出者亦神效諸色魚鱗皆可用

又方 凡卡某魚之骨即用某魚生眼珠以豆皮又名豆腐衣包好拚

命吞之無不神效 又方 輕者用糯米糖為丸吞下即出

田螺卡喉

鴨壹隻以水灌口少頃將鴨倒弔取涎與服即化

稻穀卡喉

急取鵝口中涎灌之即下蓋鵝涎能化穀也鵝涎亦可

又方 紫花地丁細嚼吞下神效

又方 食糯米糖亦下或照前魚胆飲灯心炭各方亦可

竹葉卡喉

此物易閉喉管遲則難救急取牛口涎以滾水對服即化此外夷  
秘傳也

竹木卡喉

老絲瓜

又名水瓜線瓜

燒灰每服三錢兑酒下

又方 照前各骨卡喉魚胆飲方服之極效

又方 木卡喉者鉄斧磨水灌下即愈或用鉄鋸放炭火內燒紅

淬入黃酒

甜酒亦可

服之亦可勿令人見

又方 竹卡喉者製灯草

炭

製法見前諸骨卡喉方內

開水送下即愈外用燈草灰放膏藥上貼喉痛處

一夜即消

又方

舊籬笆竹燒灰冲水服亦可

桃杏卡喉

諸豆卡喉

狗頭煮湯服並搽頭頂即愈

土狗虫數個又名蠍蟻搗爛敷喉外腫處其豆自下

鈦鍼卡喉

用癩蟆蟆數個將頭剝去倒垂流血以盆接之得一盃許嚥入喉中移時連鍼吐出鍼自軟衆戒食蛤蟆

鐵釣卡喉 照上鈦針卡喉方治之

又方 有童子誤吞釣釣將釣線一扯釣已穿入喉管片時頸如  
斗大後用佛珠大香珠亦可穿入釣線漸漸將珠挨進直至喉管輕輕  
將珠向內一推其釣已脫出在珠上緊緊執着珠繩抽出即安

頭髮卡喉

舊木梳燒枯為末酒沖服 又方 亂髮燒灰水調一錢服髮灰  
須令燒盡如有生髮未經燒盡者食之害人

蜈蚣卡喉

急取生豬血飲之少頃以清油灌口中蜈蚣滾在血中即吐出出  
後以雄黃末水調服以解其毒

烟酒醉傷

水旱烟醉傷

胡黃連壹錢煎水兑茶服即解

洋烟醉傷

飲鹽水即解或飲醬油或飲糖水均效

酒醉傷

凡酒醉死者急解醉人頭髮放新汲井水盆內將衣解開用豆腐遍身貼之無豆腐用布少刻再換換至數次必醒惟寒天不宜又方 樟樹子四錢酒三盃煎滾候溫灌之即醒或用樟木貳兩

煎水服亦可此仙方也屢試如神

又方 用鍋蓋上熱氣衝上之水半盞灌下半時即醒如牙關緊閉用烏梅擦牙以磁調羹即匙子撓開灌下或打開一牙灌入切不可以身冷脈絕而不救也 又方 射香半分放口中即醒

又方 黑豆壹升煮汁乘溫灌下三盞即醒

又方 白蘿蔔汁或熟尿灌之俱效 又急用生蚌瀝水灌之

酒醉心痛

白沙糖參肆兩淡酒冲服止痛如神

酒醉小便不通

葛花三錢 灯心七根 酒煮服即通

酒頂大小便不通 雙頂十四日 單頂七日

生姜汁一茶鍾 黃蜡一錢 白礬五分 共煎滾加燒酒一碗 冲入飲之

立能止痛 再用藤菜煎水 燻前後陰 大小便即通 百藥不效者

此方用之如神 忌食雞肉十日

### 酒病

好飲之人 酒毒發作 頭痛目眩 或咽喉悶閉 或下利 清水日數十次 形神痠頓 若誤作陰寒自利妄用溫熱之劑者 非矣 宜用

陳皮五錢 甘草二錢 川連三錢 以上三味俱微炒為末 再配松花

粉壹兩和勻每服二錢早晚以開水送下一服兩日即愈

又方 麥粉五錢即小粉炒黃研末白湯調服不過一二次即止其效

如神

酒龜

用麻雀一對又名瓦雀連毛搗爛煮酒服少時酒龜自出從此滴酒不飲亦無恙也

又方 一人好飲酒每飲一二杯必奔走三五十次有時心痛口吐黃水後用藥吐出一物如蛇乃酒癥也 又一人好飲酒終日沉醉無酒則叫號不絕日就瘦弱家中令人用繩縛住手足取好

酒一罇於口邊使酒氣衝入口中須臾吐出一物如猪肝樣上有  
多孔其人從此不飲亦無他恙

醉後嘔吐視物顛倒不正

甜瓜蒂  
藜蘆即藜蒿煎水服使再嘔吐而愈蓋醉傷嘔吐倒胆視

物倒顛服藥再吐以正其胆自安

戒洋烟癮

四物飲  
赤沙糖壹斤生甘草壹斤川貝母壹兩去心研細老姜四兩先  
用鴉片灰五錢熬膏更入前藥同熬去渣如一錢癮者食藥伍錢  
逐日減少並以赤沙糖冲水代茶即斷如癮極重者取已煎之汁

重煎之十杯煎成一杯再服必效有入二十餘年老癰照此戒斷不可輕視

又方 南瓜藤取汁調紅糖黃糖亦可飲之神效 又已戒烟癰之人平時多食南瓜免生別病否則烟雖戒斷一二年外仍有後患此西洋秘傳也南瓜北人呼為倭瓜

又方 栗壳壹斤半  
蜜炙透台黨參壹斤 川杜仲 六兩 薩砂仁二兩  
研末炮姜  
五兩 廣陳皮 二兩 竪雲苓 四兩 焦楂肉 六兩 用水一大鍋煮半日  
許將渣瀝淨再用微火熬成膏將砂仁末攪入磁罐收貯癰發時隨癰之大小白開水化服無論癰之新久無不斷也 癰來時腹

痛加肉桂壹兩 炙草貳兩 咳嗽加苦杏仁壹兩研 麥冬壹兩 蜂蜜

成泥

四兩陳皮貳兩 漚身發攤黨參

加倍

瀉者加茯苓

炮姜加倍

腰痛者加杜仲叁兩

不欲食者加砂仁壹兩

氣下墜者黨參

加倍 大便滯者加蜂蜜叁兩

肝氣發者加當歸兩 姜香附兩

又方 真淮山藥

茯苓

法夏

杜仲

鶴虱

旋覆花

欵

冬花以上各錢 加公烟灰參錢

河水熬成一麪碗去渣分十餘次兑

酒服早癮早服晚癮晚服無論新久無不斷者已驗多人甚效

又方 罂粟壳八錢陳皮八分杏仁壹錢焦朮五分炮姜八分杜

仲壹錢 甘草貳錢炙芪參錢香附七分真台黨壹兩上藥每日一

馬大東經 卷之二  
服服至月餘其引必斷已驗多人並無後患

又方 每日用鱈魚一二條滴血冲酒輕者吃四五十條重者百餘條飲酒大補氣血魚又可以膾食依此飲之不斷自斷見烟遠避

又方 用甘草一味熬膏調入烟中吸食二三日即漸不欲吸此方最易既不費錢又不傷人斷後並無烟癆之疾癆深者照法治之一月卽斷

又方 頂上台黨貳兩金銀花 旋覆花 大生地各五錢  
天冬 炒白芍 真從苓 木瓜各參一錢 吳萸 柴胡各壹錢 沙苑味此

以皮貨店為真各杜仲各四錢加烟灰或錢同熬膏一  
藥店均係假充

與熬炬

或加紅糖

伍錢亦可以後每一料減烟灰伍分

至第五料則不可用烟灰癒

重者四五料即斷輕者三料除根有人食烟二十餘年百藥不效  
照此服之五料即安然戒斷並無難過之處無論早中晚癒總於  
飯前熱水冲服如一錢癒者每服二錢戒烟方多且多有用鹿茸  
人參及各補藥方能見效者此方藥極平淡不拘體氣壯弱服之有效  
無害屢著奇功不可輕視

奇  
金  
山  
古  
文  
獻

奇  
金  
山  
古  
文  
獻

奇  
金  
山  
古  
文  
獻

奇  
金  
山  
古  
文  
獻

奇  
金  
山  
古  
文  
獻

奇  
金  
山  
古  
文  
獻

奇  
金  
山  
古  
文  
獻

奇  
金  
山  
古  
文  
獻

奇  
金  
山  
古  
文  
獻

奇  
金  
山  
古  
文  
獻

奇  
金  
山  
古  
文  
獻

奇  
金  
山  
古  
文  
獻

奇  
金  
山  
古  
文  
獻

奇  
金  
山  
古  
文  
獻

奇  
金  
山  
古  
文  
獻

奇  
金  
山  
古  
文  
獻

驗方新編卷十三目錄

人畜蛇虫咬傷

人咬傷

狼傷

家犬咬傷

猪咬傷

猫咬傷

蛇咬傷

蛇入七竅

虎傷

癩犬咬傷

馬咬傷

猿猱抓傷

鼠咬傷

毒蛇纏身不脫

蜈蚣咬傷

蠍蟄傷

黃蜂傷

毛虫傷

蜘蛛傷

多足虫傷

蚕咬傷

仙鶴毒

各項毒虫咬傷

壁虎咬傷

射工溪毒傷

狗毛沾身

蟾蜍傷

蚯蚓傷一名曲蟮

鳥龍刺傷

狐尿刺毒

湯泡火傷

火爆傷眼

跌打損傷

蘇散丸

跌打損傷藥

損傷諸方

百草藥

跌壓傷死

破口傷

即期不食

止血法

即期止血

跌打吐血不止

蘇散丸

破口傷風

割頸斬喉

蘇散丸

截傷腸出

內外蘇散

耳鼻打落

手指砍斷

接骨法

內敷

傷損縮筋年久不愈

跌打損傷愈後行動不便

脚趾割破久不收口

跌打青腫

跌打青腫內傷

打傷眼睛

閃跌手足

閃跌傷腰

跌打損傷濕爛不乾

損傷碎骨在內作膿

跌打損傷內有積血大小便不通

跌打損傷胸脹不食

騎馬傷股破爛

跌打損傷百藥不效

舊傷日久作痛

增補止血補傷方

刀箭傷馬踢傷跌傷  
一切物打傷無不驗

增補傷科聖藥七厘散

增補被敵傷風方

刑杖傷

夾棍傷

杖傷

銅鐵竹木雜物入肉

鉄針入肉

鉄針並銅鐵錫鉛入肉

鉄彈入肉

箭簇銅鐵砲子並一切雜物入肉

磁片入肉

魚肉各骨入肉

竹木入肉

水銀入肉

銅鐵竹木等物入肉雖已拔去傷口腫爛不愈

藥箭入肉箭已拔出傷口腫爛不愈

銅鉄入骨

珠銀入肉

鵝卵入肉

頭肉各骨入肉

鐵頭髮絲入肉

頭髮絲入肉

鵝卵入肉

頭骨入肉

鵝卵入肉

頭骨入肉

鵝卵入肉

頭骨入肉

鵝卵入肉

頭骨入肉

驗方新編卷之十三

人畜蛇虫咬傷

凡各物咬傷日久不愈者人咬傷第二方甘草治之極效

人咬傷

凡被人咬傷其牙最毒若有牙黃入肉則痛不可忍咬手指者指與手掌俱漸漸爛落年久難愈重則喪命無論日久初起雖至腫爛總宜用童便用淘米水洗亦可洗淨污血洗時雖痛至不省人事亦須忍住若護痛洗之不淨終難愈用人糞敷之或用中黃煎湯時洗較諸治法尤覺神妙不可嫌汚穢而自誤也

又方 照前洗净之後用甘草自己嚼融厚敷乾則隨換日夜不斷三日必愈屢試奇驗並治各物咬傷亦效有人被鼠咬指數年不愈照此洗净敷治三日收功真神方也

又方 鱉甲燒灰敷之奇效

又方 先用童便洗净用荔枝核

焙研篩細摻之外用荔肉蓋貼雖入水不爛神效之極

又方

好柿餅一個令人嗽口潔淨將餅嚼爛盛碗內飯鍋上再蒸極爛敷之三日全愈治過多人皆效仍先用童便洗净汚血方能見效

### 虎傷

凡被虎咬傷血必大出傷口立時潰爛疼不可當急用猪肉貼之

隨貼隨化隨化隨換速用地榆一斤為細末加入三七末三兩苦參末四兩和勻摻之隨濕隨摻血即止而痛即定蓋地榆涼血苦參止痛三七末止血合三者之長故奏效如神

又方 樟樹嫩葉嚼食並令人將此葉嚼融敷之絕無後患

又方 但飲酒常令大醉當吐毛出而愈或用白砂糖調水多食

極效 又方 嫩松毛搗融如泥將傷口內塞滿極效

又方 蕺菜白搗汁飲之渣敷傷處

又方 內服生姜汁外以生姜汁洗過用白箬末敷之

### 狼傷

乾姜末敷或胡椒末敷初覺腫痛少刻即腫消痛止三日而安

癩犬咬傷

此症最怕七日一發發時天本無風病者但覺風大入帳朦頭躲避此非吉兆過三七之日無此畏風情形方可為治被咬時先看頭頂如有紅髮二三根趕急拔去最為緊要隨於無風處以冷茶洗淨污血用杏仁搗融敷之內服韭菜汁一碗隔七日再服一碗四十九日共服七碗傷口上再用煮熟雞蛋白蓋上用艾絨在上燒數十次百日內忌醋鹽一年內忌豬肉魚腥酒色終身忌食狗肉蚕蛹紅飯豆方得保全否則十有九死此係葛仙妙方有癩犬

一日咬三人止一人用此方得活親見有效切不可誤吃班蝥毒藥以致小便疼痛難忍欲解班蝥之毒查解救諸毒門本方治之又方 花盆內栽種之萬年青連根搗融絞汁灌之腹內如有小大變成血塊由大便而出不論久近皆治一切不忌真仙方也萬年青其葉寬約一二寸高約八九寸老而且厚者是

又方 從來瘋犬咬人不治必死投以打藥則小便痛不可忍百日內忌聞鑼炮聲又藥有斑蝥者終身忌近苧麻處否則即發今得一方服之能陰消又不忌鑼炮苧麻但半年內忌酒色並忌豬肉魚腥鹽醋葱蒜藠頭及一切發物方用點銅錫參錢剉碎明雄參錢打碎

馬前子十個甘草參錢長燈心一根用長流水煎服屢試如神切不可疑而自悞也

又方 初被咬時即用砂酒壺兩個壺內盛好燒酒盪滾去酒以壺按在傷口拔出污黑血水滿則自落再以一壺去酒仍按傷口輪流提拔以盡為度奇效無比或用 癩蝦蟆即蟾蜍目紅腹無破開連腸雜敷傷口一日一換換過即埋土內八字文者不可用並另取癩蝦蟆煮食最為神妙仍照前處食一切終身忌食蝦蟆

又方 被咬時即用豆豉研末香油調稠為丸如彈子大常在傷處時時滾擦丸內如有茸茸狗毛此係毒氣已出換丸再擦至無

毛為止神效仍照前禁忌一切常食杏仁以防其毒或用蚯蚓糞

又名曲蟮香油調為丸擦之亦可

又方 核桃壳半邊將人糞填滿取槐樹皮蓋傷口再將核桃壳覆上用艾火在核桃壳上燒之燒至遍身汗出其人大困而愈簡便而極神效或用人糞厚敷傷口以煮熟雞蛋白蓋之用艾火燒數十次更佳

又方 龍牙齒又名馬鞭草和荸薺煎水飲之神效之極

又方 照後毒蛇咬傷服烟油之法治之烟油味辣服之味不辣者即可治緣犬因嗅蛇毒而瘋故可與蛇咬同治

又方 地骨皮

即桐杞根

搗爛熬酒服一二日當茶飲永無後患

家犬咬傷

胡椒

研細末

敷之雖傷重亦不過數日收功惟初敷必痛而且腫少

刻痛止腫消有人被犬咬傷血流不止用此藥隨敷隨流敷至第三次後血止數日而愈其效如神

又方 用木一截向傷處指定以火在木尾燒之間其痛否痛則多燒數次不痛乃愈犬本屬土此木能尅土之意也

又方 甘草煎水洗盡毒氣以熟牛糞敷之即時痛止

又方 番木鱉切片瓦上炙焦存性研末摻上二三日收功破爛

日久者半月必愈

又方 刮肉店墩板上油膩拌白糖敷之效

又方 甜杏仁去皮尖嚼爛敷之

馬咬傷

白煮豬肉一大片同飯本人自嚼貼患處立時痛止即愈

又方 先以艾火炙患處復用馬糞及人糞燒存性猪油調搽即愈

又方 馬齒莧一握煎湯日服之以愈為度外栗子嚼爛敷之  
又方 打馬鞭子或籠頭索燒灰摻之即愈其毒入心者此二方  
亦效 又方 益母草搗爛調醋烘熱敷之

又方 鷄冠血塗之牝馬用雌雞壯馬用雄雞效

猪咬傷

生龜板炙研細麻油調搽即愈藥店多以熬過龜板假充必不見效須用生的自炙為要 又方 熟松香貼傷處數日愈

猿猴狐傷

金毛狗脊藥名焙研末掺之或麻油調搽立愈

貓咬傷

用薄荷煎水洗之或用川椒煎水洗之

又方 陳鴨頭嚼爛敷之次日結痂神效

人鼠咬傷

荔枝嚼融敷卽愈或用斑貓燒灰加射香少許口津調敷或用貓兒口水搽之

蛇咬傷

烟精膏 凡遇毒蛇咬傷惡毒攻心半日必死急取竹木桿烟筒內烟油又名烟屎其色如醬用冷水洗出飲一二碗受毒重者其味必甜而不辣以多飲為佳傷口痛甚者內有蛇牙多用烟油揉擦必出此為蛇咬第一仙方切不可疑而自誤道光八九年間粵西崇善縣地方有農人被毒蛇咬住繞纏不放急服烟油水數碗並以烟油

滴蛇口內蛇即鬆口落地而死其人無恙又有人被蛇咬傷即刻昏死臂腫如股少頃遍身皮脹黃黑色一道人以新汲井水調香白芷末一斤灌之覺臍中聲響黃水從傷口流出良久便愈

又一人蛇傷一足百藥不效後用新汲水洗淨腐肉以白芷末加胆礬射香少許摻之惡水流出一月平復

又方 川貝母末酒調盡量飲之少刻酒自傷口流出候流盡以

渣敷上垂死亦效

又方 用兩刀在水內相磨取水飲之雖痛苦欲死可救此蛇醫化人所傳方也

又方 用雞蛋破一孔對傷口按住少刻蛋內色即變黑黑則又換以蛋色不變為止要雞蛋不要鴨蛋 有人被蛇咬傷即刻腫大異常當將腫處用頭髮捆緊毒氣不致散開照此方治之立愈至穩至便百發百中之方也或內服烟油外用此法更妙

又方 用蝦蟆拔毒法見卷十一 瘰門治之或用蜘蛛拔毒法見卷二 手部 用蜘蛛拔毒法見卷二 手部 治之均極神效

又方 五靈脂壹兩 雄黃伍錢共為細末每服二錢酒調服不飲酒者開水調服並敷傷處雖至垂危亦可救也

又方 嫩黃荆葉生于野地生藥店有買探取生者以七葉為佳 捣汁敷之極效

馬王堆  
毒蛇纏身不脫

蛇纏人身愈纏愈緊最難解脫急令其人在地遍身轉滾蛇自骨軟而解放也神效 又方 用草刺蛇尾上小眼亦極神妙

蛇入七竅

割母猪尾血滴入即出 又方 以胡椒末入蛇尾小眼內蛇自退出或用草刺蛇尾小眼亦妙

蜈蚣咬傷

十指甲磨水敷立效如神萬無一失有人被蜈蚣咬傷其色碧綠腫大如碗痛不可忍百藥隨敷隨乾其毒不散後用此方治之應

手而愈此法最爲簡便毋庸第二方也各項毒物咬傷雖未試過  
想亦可治

蠍蟹傷

雄者傷人痛在一處雌者傷人痛牽遍體用井底泥敷之乾則再  
換或用新汲水以青布隨痛處搭之濕則再換亦效

又方 用二味拔毒散見癰毒  
譜方 更妙

又方 痛牽遍身者用屋上瓦溝泥調水敷之

又方 畫地作十字取土煎水服少許亦可

又方 用木碗蓋於痛處過半日即愈神驗之至

又方 蝎牛一條搗融敷之其痛立止或照上蜈蚣咬傷方治之  
壁虎咬傷又名守宮又名蛇醫又名四脚蛇

桑葉煎濃汁調白礬末敷之或照前蜈蚣咬傷方治之

黃蜂傷

蚯蚓糞井水調敷其痛立止 又方 苦頭梗搗融敷極效

又方 如傷處麻木難過用臭虫血塗之立愈

又方 用二味拔毒散見癰毒諸方 敷之效或照前蜈蚣咬傷方治之

射工溪毒傷此水中射工又有樹上毛虫 亦名射工者見後毛虫傷方

射工一名溪鬼虫又名射影又名水弩出南方有溪毒處長二三

寸許形扁前寬後窄腹軟背硬如鱗又如鱉六七月甲下有翅能  
飛作鉤鉤聲寬頭尖嘴嘴頭有角如爪長一二分有六足如蟹足  
兩足在嘴下大而一爪四足在腹下小而雙爪口有弩形以氣射  
人影去人三四步即中令人發瘡不治即死病有四種初得皆如  
傷寒或似中惡一種遍身有黑點子四邊微紅犯之如刺一種作  
瘡久則穿陷一種突起如石一種如火燒狀又有溼毒中人一名  
中水一名中溪一名水病似射工而不見形春月多有此病症頭  
痛惡寒狀如傷寒二三日則腹中生虫食人下部漸食五臟注下  
不禁雖良醫難治初得則下部有瘡紅赤形如截肉為陽毒最急

若瘡如虫齧為陰毒其勢稍緩皆能殺人過二十日不治方家用藥與傷寒癰病相似須用蒼耳草絞汁服一二升並用棉蘸汁濃敷下部或以小蒜煮微熱湯不可太熱太洗之若身發赤斑其毒熱則無力洗之若身發赤斑其毒已出也

又方 取豉母虫

壹枚

含入口中立愈雖死亦活或用

鹽梅裹含之亦可此葛仙肘後方也 豉母虫一名豉虫光黑如

豆浮遊水上者即是 又方 猪血飲之即解

又方 知母連根葉研末服或投水絞汁飲一二升煮湯洗浴亦

佳夏天出行多帶知母連根投水上流可辟此毒

又方 雞糞要白色者與糯米糖調敷甚效

又方 蒼耳草嫩苗生草藥  
店有賣 取汁和酒溫灌之其渣厚敷傷處甚  
效 又方 芥菜子末和酒厚敷半日止痛

又方 馬齒莧搗汁一升服以渣敷之日四五次

又方 皂角長尺餘者好醋煮濃汁如膏敷之

又方 白鵝血飲之並敷其身極效

又方 夜睡時以手摩身體有竦痛熟視當有赤點如針頭急捻  
之以芋頭葉入內刮出細沙以蒜敷之即愈

又痛處有刺如蝦鬚用芋頭及甘蔗葉屈角入肉勾出其根則愈  
遲則其根入骨難治

毛虫傷

毛虫俗名楊竦子又名射工能放毛蟄人初癢次痛勢如火燒久則外癢內痛骨肉皆爛諸藥罔效用豆豉搗融清油調敷少時則有毛出去豆豉用白芷湯煎洗之如肉已爛用海螵蛸末擦之即愈 又二味拔毒散見癰毒諸方最效或照前蜈蚣咬傷方治之

又方 先以水洗之隨用馬齒莧搗爛敷之一二次即愈或以熟蜜搽之亦效

狗毛沾身

因搔癢而破爛者用青蘋欖即嫩絞汁搽數次即愈或照上毛虫傷

人各方治之更妙

蜘蛛傷

有人蜘蛛咬傷腹大如鼓遍身生絲飲白羊乳數日而愈  
入方 藍靛汁一碗入雄黃 射香少許點患處並服其汁神異  
之至一人被傷頭面腫痛幾致不救服此而愈蜘蛛入藍靛中即化  
為水故有奇效也 入方 用羊肝遍體擦之極效

又方 飲好酒至醉則肉中自出小虫而愈

又方 熟甜酒洗之即消或照前蜈蚣咬傷方治之

蟾蜍傷

此物形似蜘蛛而大一名壁錢一名壁鏡又名嬉子時作白窠如  
錢大貼壁上咬人最毒不治必死用桑樹枝燒枯煎濃汁調白礬  
末敷之極效又方用花盆內鋪地錦敷或用陳醋搗敷即愈  
又方以刀燒紅置白紙於上汁出乘熱滴之立愈神效之至  
又方或照前蜈蚣咬傷方治之

多足虫傷

一名蠍螋又云即是搔甲子藏於壁間以尿射人若悞中其毒令人皮膚起燎漿泡痛如火烙初如飯粒次如豆大若不早治傷處周圍交合則難救急用棉蘸熱鹽水敷數次即消甚則毒延及遍

身癰癧不芷宜用二味拔毒散見癰毒  
敷之神效或用大黃末敷亦效或照前蜈蚣咬傷方治之

蚯蚓毒又名曲蟻

凡受蚯蚓毒形如麻瘋髮眉脫落或夜間身體作鳴急以鹽湯或  
石灰煎湯時時洗之其毒自去或以白鴨血搽之或用白雞糞和  
雞蛋清調搽更妙或照前蜈蚣傷方治之

蜘蛛咬傷

凡蠶蟲人毒入肉中令人發寒熱以家用苧麻葉搗汁塗之神效  
又方 蜜調射香敷之亦效或照前蜈蚣咬傷方治之

烏龍刺傷

又名火刺  
把焦

刺入泥中人若足上簽踏比蛇咬更毒從腳腫至大腿猶然可救若至肚腹則無救矣急用蛔虫無則用糞坑數條搗爛敷患處消腫刺出而愈

仙鶴毒

仙鶴其毒在頭養鶴之家其鶴或傍樹枝或臥叢草將頭搔癢遺有頭毒粘在樹草間人或不知誤以手摸脚踏登時赤腫疼痛異常急以青松毛和糯米飯同搗敷之立愈

狐尿刺毒

一名狐狸刺由螳螂盛暑交媾精汁染於諸物乾久有毒人之手  
足悞觸之則成此患初起紅紫斑點肌膚乾燥悶腫掀痛不眠若  
時至十日後腐開則瘡口日寬初起未潰者以蒲公英連根煎濃  
溫洗若得鮮者搗汁塗之更妙內服黃連解毒湯即愈若已潰爛  
照前人咬傷甘草諸方治之或照癰毒諸方治之

又方 腫痛欲死者用雄雞破開敷之或照前蜈蚣咬傷方治之

各項毒虫咬傷

三三六

用二味拔毒散見瘡毒  
諸方 敷之其效更速

又方 照前人咬傷甘草方敷之神妙

又方 如毒重者急照疔瘻方內蜘蛛拔毒法治之見卷二手部 最為  
神效或照前蜈蚣咬傷方治之

各處毒瘻

此方用銀花根皮甘草大半升水煎服之

中止口瘻內開口日食味或未解之者

水銀頭子酒水炒熟研細加蜜酒服之無問寒熱可服不取其  
一多處黑瘻出瘻如是文散者十粒外者亦可入本毒人之

湯火傷

湯泡火傷

凡湯泡火傷無論輕重急用童便灌之以免火毒攻心或用白沙糖熱水調服或用蜂蜜調熱水灌之均可第一不可用冷水及井泥溝泥等物即使痛極難受亦必忍住倘誤用冷水淋之則熱氣內逼輕則爛人筋骨手足彎縮纏綿難愈重則直攻入心則難救矣先用真麻油敷之再用糯米泔水去米取汁加真麻油一茶鍾多加更妙用筷子順攬一二千下切莫倒攬可以挑起成絲用舊筆蘸油搽上立刻止痛愈後並無疤痕神效無比

又方 尿桶中陳尿新尿或泡或淋一時之久再用真蜂蜜和真  
麻油加上敷之

又方 先用真桐油真麻油亦可 敷之敷後上加食鹽少許再用生大

黃研末撒上立刻清涼止痛愈後亦無疤痕至神至驗

又方 蚯蚓數條又名曲蟮加白糖拌入用碗蓋住半日即化為水搽之  
神效且速無蚯蚓用蜒蚰俗名鼻涕虫亦可

又方 鴉片烟敷之立刻清涼止痛有人火藥燒傷百藥不效痛  
不能止後用此方而愈

又方 清涼膏 新出窑石灰用冷水化開水宜多次日水面上

結一層如薄氈樣者取起以真桐油和入調極濃厚敷之立刻清涼止痛日數三五次無論初起日久皆效

有人被火燒傷起泡臭爛數月不愈用此敷之五日收功屢試神效並治一切遊風丹毒破與不破皆極效驗真仙方也

又方 先用麻油熬滾次入白蜡熬數滾再入白蜜熬至放冷水  
中半日拔去火氣用鴨毛舊筆亦可調敷其痛即止若傷重者並可內服不至攻心

又方 猪毛一籃入鍋內炒之俟猪毛化成黑汁取起冷定加大黃數錢共研末再加冰片一分香油茶油蠟燭油俱可調搽至神

至驗之方也

又方 用蚶子殼又名瓦 粉子 蝦枯研細末配米片少許濕則乾敷乾處麻油調搽數次收功真仙方也

又方 湯火傷治不得法以致焮赤腫痛毒腐成膿用麻油四兩當歸壹兩入麻油再入黃蜡壹兩攪化隔水拔火氣以布攤貼立能止痛生肌神效之至

又方 人乳和鹽敷之 以上各方簡便神效雖傷及遍身勢在垂危或潰爛已久均有奇效

又方 虫蛀竹灰平時收存用時以麻油調搽極效

又方 茶葉嚼爛將口嚥敷之立愈

又方 南瓜用蟬裝貯埋土內數月即化為水愈陳愈佳遇有湯火傷者取水搽之隨手而愈南瓜北人呼為倭瓜倭音或用王瓜亦可屢試如神

又方 菊花泥油搽之越陳越佳

又方 真麻油貳斤生大黃半斤切片銅鍋熬至藥色焦黑瓦罐連渣收貯遇有湯火傷者用鴨毛舊筆蘸油搽之止痛如神二日即愈平時製出可備急用

火爆傷眼

三七葉搗汁點入數次即愈或用三七磨水滴入亦可屢試如神  
又上二方 南瓜水葵花油點入亦極神效  
又鉄打損傷打傷眼睛南瓜方亦效

跌打損傷

損傷諸方

回生第一仙丹

治跌傷壓傷打傷刀傷銃傷割喉吊死驚死溺

水死等症

雷擊死雖未試  
遇想亦可治

雖遍體重傷死已數日只要身體稍軟

用此丹灌服少刻即有微氣再服一次即活大便如下紫血更妙惟身

體僵硬者難救此豫章彭竹樓民部家傳秘方道光初年民部宰

直隸時有人被毆死已三日矣民部往驗見其肢體尚軟打開一

齒以此丹灌服一分五厘少刻其屍微動再灌一分五厘而活其

餘甫經毆殺或毆死一二日者全活尤多終歲無一命案維時磁

州地震壓斃甚眾民部製丹遣人馳往救活不下千人大有起死回生之妙誠千古第一仙丹如能施藥傳方救得一人之生可全兩人之命造福真無量也

活土鱉虫

又名地鱉又名簸箕虫形扁不能飛大小不等色黑

而亮皆有橫楞音輪前窄後寬以大如大指頭為佳小者功緩雄的更好用刀截為兩節放地上以碗蓋住過夜其虫自接而活方

是雄的隨處皆有多生米店有糠之處及堆白下倉底灶脚冬天壯脚更多或生麪鋪或油榨坊並空屋乾燥之處總在鬆土內尋覓取活的去足放瓦上小火焙黃研細用淨末五錢自然銅放瓦死的不效假的更不效蓋古有乾的賣一看便知

自然銅

上木

炭內燒紅入好醋內淬半刻取出再燒再淬連製力

次所未要親身自製藥店製多不透不效用淨末參錢真乳香如乳頭黃色如膠者為真不真不效每壹兩用燈草貳錢五分同炒枯與燈草同研細吹去燈草用淨末貳錢真陳血竭淨

貳真珠砂飛淨巴豆去壳研用紙包壓數次

真射香

參分要以上當門子以上

各藥揀選明淨眼同研極細末收入小口磁瓶

口大藥易洩氣用蜡封口

不可洩氣大人每用一分五厘小兒七厘酒沖服牙關不開者打

開一齒灌之必活

要藥稱準方效灌時多活後宜避風調養若傷

後受凍而死須放暖室中最忌見火仍照卷十一急救門凍死法

參酌治之如活轉心腹疼痛此瘀血未淨服白糖飲自愈見後玉

真散。治跌打損傷已破口者無論傷口大小不省人事或傷口

潰爛進風口眼渴斜手足扯動形如灣弓只要心前微溫用此藥

敷傷口

如膿多者用溫茶避風洗淨再敷無膿不必洗

另用熱酒沖服三錢不飲酒者滾

水沖服亦能起死回生惟嘔吐者難治藥雖平淡效最神奇功在

七厘鐵扇諸方之上藥料易覓無假其價亦廉或施藥功德亦非淺也 明天麻 羌活 防風 生南星姜炒 白芷各一兩 各壹白附子

兩十二 以上藥料須揀選明淨眼同研極細末收入小口磁瓶以蜡封口不可洩如濕爛不能收口用熟石膏貳錢黃舟參分共研極細加入敷之

當歸湯 治跌打損傷未破口者功能散瘀活血雖已氣絕打去

一牙灌之亦活此少林寺教師方也 當歸 澤泄各伍錢 川芎

紅花 桃仁 丹皮各參好蘇木貳錢 酒水各一碗煎六分服

頭傷加 藁本壹錢手傷加 桂枝壹錢腰傷加 杜仲壹錢

腸傷加 白芥子壹錢脚傷加 牛膝壹錢

白糖飲 凡跌打損傷如已氣絕牙關緊閉先用半夏在兩腮邊擦之牙關自開急用熱酒冲白沙糖二三兩灌入不飲酒者水服亦可愈多愈妙無論受傷輕重服之可免瘀血攻心至穩至靈不可輕視

又方 如氣絕不省人事者急用生半夏研末水調黃豆大塞鼻孔立能蘇醒男左女右醒後鼻痛用老姜汁搽過即不痛也

又方 先用活雞連毛破開去腸雜不用着水敷傷處雖至垂危只要胸前微溫即時立醒然後用藥治之仍服白糖為要

又方 野菊花連根陰乾每用一兩加酒與童便各一碗煎服但

有一絲之氣無不活也

又方 仙桃草連根陰乾研末每服一二錢開水送下雖傷重垂危服之立見功效江南一盜身受多傷臘卧道傍一人路過見而憐之村中乞水與飲盜出此藥調水服下服後半刻遍身傷處作響立即起而行矣詢之此草生麥地中葉小梗紅有子如胡椒大內有一虫在小暑節內前後十五日採之早則虫尚未生遲則虫已飛去無虫則無功效聞廣西陽朔一帶亦有此種名麥桿草八九月內方有虫生可採 酒取白粉絲二三兩蟻入不燬蘸藥水服  
跌壓傷死

凡跌壓傷重之人口耳出血昏暈不醒只要身體尚軟皆可救活  
切忌人多嘈雜只令親人呼而扶之且就坐於地緊為抱定曲其  
手足如和尚打坐樣隨以熱童便灌之馬尿更妙或用白糖沖熟  
酒灌之灌亦可尤為神妙但能強灌得一二杯下喉便好然後輕  
移於懷中抱入室內如前坐法更以足緊抵糞門若係婦女連陰  
戶一並頂住恐其氣從下洩以致不救並將窗櫺遮住以房中黑  
暗為佳一面查照前後各方取簡便者用之傷重者瘀血必多用  
前當歸湯白糖飲最妙其餘簡便易得者不妨兼用急切不可令  
出大便恐其氣脫而死必俟其腹中動而有聲上下往來數遍急

一切不可令出大便恐其氣脫而死必俟其腹中動而有聲上下往來數遍急不能待方可使解所下盡是紫血毒已解下方可令睡倘瘀血未盡當歸湯白糖飲尤宜多服

又一切撲折及從高墜下木石傾壓落馬墜車以致瘀血凝滯氣絕欲死者倉卒無藥急以熱小便灌之免惡血攻心或服白糖更佳再取地上三尺下黃土數升搗碎甑蒸熟舊布重色二包輪流熨傷處數次痛止傷消但不可太熱恐傷皮肉

破口傷

龍眼核剝去光皮不用將核研極細摻瘡口即定痛止血此西秦

巴里坤營中急救方也大有功效如口渴者不可飲水但食油膾之物以解其渴更忌食粥食則血必湧出而死或用前玉真散最妙 又方 魚子蘭葉珠蘭葉  
更好 捣融敷之立刻收口接骨傷口寬

大者加白鹽少許第二次敷即不用鹽其效非常功在諸方之上

又方 月季花又名月紅 取葉搗爛敷之立能止血消腫雖斷筋亦

可速愈 又方 葱白沙糖等分搗爛研如泥敷傷口其疼立止

又無疤痕屢試神驗

又方 生半夏研末敷上即刻止痛且易收口

又方 生松香熟松香和勻敷之立愈或加生半夏末亦可此軍

營急救方也 又方 老姜嚼融敷之數日平復如常此方屢試屢驗可保不致進風惟敷時痛極忍耐片時可耳

又方 胡椒末敷之不惟速愈且免縮筋忍痛必效

又方 端午日採野麻葉去筋搗融如綿遇破口傷敷之立能止血結痂又後接骨白炭方治破口傷亦效

止血法

瘦豬肉切厚片貼上無論傷口大小血流不止者立效如神或用猪皮亦可此急救止血第一方也 又方 穿山甲片炒枯研末候冷敷上此亦止血神藥凡身上毛孔無故血出不止此二方俱

有奇效平時製出以備急用最妙不可洩氣

又方 草紙燒灰候冷敷上亦止

又方 老姜燒枯存性研末敷亦神效也

跌打吐血不止

乾荷花焙乾研末酒調服一日二三次數日即愈其效如神乾荷葉亦可或多服白糖飲更妙見前

破口傷風

凡破傷風寒熱交作口閉咬牙或吐白沫手足扯動或頭足扯如灣弓傷口平塌者最為險症用前玉真散可以起死回生最為神

妙如倉卒製藥不及用手指甲腳趾甲各一錢香油炒黃研末熱酒調服汗出即愈終不如玉真散之妙  
凡破傷風先以自手三指並連直插揮入病人之口如可插入者易治若止有二指插入者其症必危即婦人產後驚風亦用此法驗之可知生死

凡人或以烟筒竹木戳傷喉嚨恐呼吸之氣出入亦有風擗如頸項漫腫口張不大飲食難下亦防破傷風此是內吸風終不息無藥可治醫者遇此先須告病家庶免歸咎

割項斷侯

急宜早救遲則額冷氣絕乘初割時輕輕扶住仰睡將頭墊起  
合攏刀口將血拭去用大雄雞一隻快手輕去其毛生鷄頭皮乘  
熱貼傷口內服玉真散凡前自愈愈後雞皮自落

又方 照前扶住仰卧合攏刀口用生松香熟松香各半或加生  
半夏末亦可將傷口厚厚敷緊或用葱頭和白蜜搗融敷亦可外用膏藥不論何項膏藥  
周圍連好肉一併粘貼再用布條圍裹釘線縫好每日服玉真散  
三錢方見前覺傷處生肌即不必服未生肌則日日常服無論食嚥  
氣嚥俱斷一月必愈屢試如神若食氣嚥俱未斷照前損傷各方  
治之亦可如氣嚥已斷氣絕只要身體微軟一面照前敷治一面

馬文正公集卷之三

以回生丹見前服之亦可治也

截傷腸出

好醋煮熟洗之不可太熱亦不可冷隨洗隨入外用活撥雞皮乘熱貼上再服玉真散見前自愈有人腸出三日腐變如法治之而愈愈後雞皮自落

耳鼻打落

治法見耳鼻各部

手指砍斷

將接上用蘇水細末敷之外用蠶繭包縛牢固數日即愈

又方 老姜嚼融敷之舊棉包裹簡便神效不可以平淡而輕忽也

### 接骨法

杉木炭研極細末用白沙糖蒸極融化將炭末和勻攤紙上乘熱貼之無論破骨傷筋斷指折足數日可愈屢試屢驗不可輕視忌食生冷發物無杉木炭用杉木燒枯亦可

又方 凡骨斷痛極者先用鳳仙花根壹寸以肥大者為佳磨酒服之操動則不知痛然後可用藥治或用麻藥見癰毒諸方敷之亦不痛也

又方 當歸七錢川芎五錢乳香各貳錢半木香壹錢川烏四錢

五分黃香六兩骨碎補五錢古錢照前製三錢共為細末入香油一兩五錢調成膏貼患處雖骨筋碎斷能續神效

又方 旱公牛角壹個火上炎乾壹層刮壹層黃米麪不拘多少榆樹內白皮  
不拘川椒六七粒楊樹葉不拘多少如無不用亦可共研細末以陳釀醋發成稀糊用青布攤貼再用長薄柳木片纏住時刻聞骨內響聲不絕俟定即接如牛馬跌傷及樹木被風吹折者以此藥治之俱效

又方 古銅錢燒紅淬入好醋內再燒再淬連製七次研末用酒沖服二錢傷大者服三錢其骨自接無古銅錢用新銅錢亦可不如古錢之妙有人因雞足折斷如法試之果接續如故及烹此

雞驗其骨折處銅末周圍束住又有人腳骨折斷以銅末沖酒服之即愈後因病故十餘年改葬視其脛骨折處亦有銅末束之真神方也 又方 大紅月又名月季花月採花辦陰乾為末一歲一

厘好酒調服蓋被睡卧一個時辰渾身骨響此是接骨不必畏懼又方 公雞一隻重十兩上下白毛烏骨者更妙用手扭斷頭竹刀割下不用水乾拔去毛竹刀剖開去肚臟不用剝下皮去骨將肉放石臼內加真五加皮二兩骨碎補二錢桂枝一錢生大黃三錢松香一錢共為細末同搗融爛先將傷骨整好將藥敷上將雞皮包在藥外再用杉木皮夾好過一對時取去久則必生多骨

又方 五加皮

四兩

小雄雞壹隻去毛連骨不去血不沾水

同搗極爛敷斷處骨

即發響聽至不響即將藥刮去遲則多生骨矣

又方 活螃蟹

一二隻生搗爛

滾酒沖服極為神效

又方 取路旁牆脚來往人小便處日久碎瓦片洗淨燒紅淬入好醋內再燒再淬連製五次刀刮為細末每服三錢好酒下雖骨折筋斷痛不可忍者亦極神驗

跌打傷筋

用蕪菜搗爛敷過一夜即愈或照前月季花及碎瓦片方治之亦可  
又方 生旋覆花根搗汁滴入並敷日換三次敷至半月雖

筋斷亦續其效如神

傷損縮筋年久不愈

楊梅樹皮晒乾研末和頂好燒酒蒸熟調敷用布紮好每日一換  
不過三五次即愈屢試如神不可輕視又見腰部三仙方最效

跌打損傷愈後行動不便

罐乘小便火上燒熱時時熏之熏至數次即愈有人手骨跌斷愈  
後其手直硬不能活動照此薰之平復如常

脚趾割破久不收口行走不便

雞腳骨燒枯研末敷即愈甚效

跌打青腫

整塊生大黃用生姜汁磨融敷之一夜紫者轉黑黑者即白矣。一日一換其效如神。又方 生半夏水調敷一夜即消。

跌打青腫內傷

凡一切跌打損傷遍身青腫瘀停作痛及墮仆內傷一服即愈用白木耳四兩如白未有黑亦可用焙乾為細末每服一兩麻油拌勻好酒送服已服二次藥完其患若失百發百中神妙非常。

打傷眼睛火爆傷眼見湯火傷門

凡眼睛打出或跌傷或碰傷或火爆傷用南瓜瓢搗爛厚封外用

布包好勿動漸即腫消痛定乾則再換如瞳人未破仍能視也瓜  
以愈老愈佳有鮮地黃處用地黃亦可南瓜北人呼為倭音瓜

又方 生豬肉一片以當歸赤石脂二味研末掺肉上貼之拔出

瘀血眼即無恙

閃跌手足

生姜 葱白搗融和灰麪炒熱敷之或用生大黃和生姜汁磨敷  
均妙

閃跌傷腰

方見腰部

跌打損傷濕爛不乾並治凍瘡濕爛

羊皮金紙以金面貼傷處過夜即愈神效之至

又方 寒水石二錢煅研細末敷之立見功效

損傷碎骨在內作膿

田螺搘爛加酒糟和勻敷四圍中留一孔其骨即出

跌打損傷內有積血大小便不通

歸尾貳錢生地 川芎 桃仁 生大黃 紅花錢各壹錢水酒各半  
煎服不飲者無酒亦可

跌打損傷胸膈脹痛不食

白沙糖用酒冲服水冲服亦可以多為妙

騎馬傷股破爛

鳳凰衣即抱過雞蛋壳新瓦上焙枯研末麻油調搽即愈或照跌打破口各方治之

跌打損傷百藥不效

恐是中邪照邪怪門鬼擊傷方治之內有狗糞燒薰一法尤妙極也

舊傷日久作痛或天陰作痛

治法見腰部閃跌歐打腰痛方又方益母草熬膏忌鐵器為丸

馬本新編 卷十一 增補止血補傷方

每服數錢熱酒送下十日全愈其效如神

增補止血補傷方 刀箭傷馬踢傷跌傷  
一切物打傷無不驗

生白附子

十二兩

白芷

天麻

生南星

防風

羌活

各一兩

各一

研

極細末就破處敷上傷重者用黃酒浸服數錢青腫者水調敷上  
一切破爛皆可敷之即愈地方官平時預製以治鬥傷可活兩命  
價不昂而藥易得亦莫便之陰功也

增補傷科聖藥七厘散

上硃砂

壹錢貳分

水飛淨

真射香

壹分

梅花冰片

壹分

淨乳香

壹錢

紅花

伍分

壹錢

明沒藥

壹錢

伍分

瓜兒血竭

壹兩

粉口兒茶

貳錢

四分

以上共藥揀選道地於五月五日午時共為極細末磁瓶收貯  
黃蜡封口貯久更妙每服七厘不可多服孕婦忌服

右藥專治金瘡跌打損傷骨斷筋折血流不止者先以藥七厘  
燒酒冲服復用藥以燒酒調敷傷處如金刃傷重或食嚥割斷  
不須雞皮包紮急用此藥乾摻定痛止血立時見效并治一切  
無名腫毒亦用前法調服得此方者調治門毆諸傷無不應手  
止痛

凡受傷之時或倉卒無藥或鄉僻無良醫恐傷輕變重傷重致  
死者多矣地方官平日如度合此藥遇有驗傷隨時施用不獨

傷輕者立愈即傷重者亦可救不啻救二命實陰德無量也

增補被毆傷風方

荆芥 黃蜡 魚鱠魚鱠炒黃色 三味各五錢 艾葉三片入無灰酒一

碗煮一柱香熱飲之汗出立愈惟百日內不得食雞肉耳凡被毆後以傷風致死者在保辜限內於律不能不擬抵此一方可活二命須廣布之

刑杖傷

夾棍傷

速用熱童便一盆將足浸入如便冷燒紅磚二塊淬<sub>青</sub>之即熱直  
浸至童便面上浮起白沫其傷盡出矣再用跌打損傷各方治之  
自愈如已骨損亦照跌打損傷門內接骨方治之

杖傷

血竭壹錢輕粉 黃丹各貳錢水飛淨白礬壹錢共為末掺上忍痛一時  
次日其肉四圍生起兩日即平杖傷久爛不愈中有深眼不能收  
口用此最效或照跌打損傷各方治之亦可

又方 杖後即飲童便一碗或用酒冲白糖服之不飲酒者水服亦可以免瘀血攻心再用熟豆腐鋪在杖傷處其氣如蒸其腐即紫換腐數次令紫色散盡轉淡紅色為度若杖後腫疼用明雄二分蜜陀僧一分冰研調敷極妙又受刑杖極重者杖後日用白芨末米湯飲下神效

少陽經風寒客熱之症宜用葛根湯葛根一錢半生甘草一錢半

銅鉄竹木雜物入肉

鐵針入肉

針入肉內隨氣遊走若走至心窩甚險急用烏鵲翎數根瓦上焙焦黃色研細末酒調服一錢外用車輪上油垢調真磁石末攤紙上如錢大貼之每日一換自出

又方 生磁石壹兩研末用菜油調敷皮外離針入處寸許漸漸移至針口由受傷原口而出神效

又方 生癩蝦蟆眼珠放針口半日後自出神效

鐵針並銅鉄錫鉛入肉

馬王家集

卷十三

七

陳腌肉皮 陳火腿  
皮更妙 捶融敷之即出極妙

鐵彈入肉

扁魚肚胆俗呼邊魚 煮融和糯米飯搗爛敷之換兩三次即出此在兩股及手足用之若在身上及肚腹內用土狗又名蠍同扁魚肚煮融搗爛敷雖不能取出其彈漸落下部不能為害矣

箭簇銅鉄砲子並一切雜物入肉

蟻螂參個俗名推舉虫 共搗如泥敷傷處先止痛後作癢少刻其物必出神效之至 又方 搔蝨子又名搔甲虫又名 蜜油漣江蘇人呼 為鱗娘查藥物備要便知 揭融敷之一日即出神效  
物備要便知

又方 南瓜北人呼為倭瓜江蘇等處亦有呼為北瓜者搗搣搣融四圍敷之隔日必出極效

又方 乾蕡菜搗爛和紅沙糖敷之自出奇效

又方 真象牙刮末水調敷乾則加水潤之甚驗

又方 紅膏藥見癰毒諸方 敷之無不出也

磁片入肉

白蘿要三角形者去壳與心不拘多少浸菜子油內取出搣融貼之日換一次雖入肉多年爛而不出者三次即愈

魚肉各骨入肉 以上各方通治

山查研末調敷如在口中牙縫等處山查煎濃汁含一二時自出

竹木入肉以上各方通治

鹿角

燒枯存性研末以水調敷久不出者不過一夜即出

又方 松香敷上用布包裹三日必出不痛不癢甚妙

又方 生蒲公英搗爛敷雖腫爛日久亦效

又方 鮮牛膝搗爛敷縱傷口已合刺亦自出

又方 草麻子搗爛敷痛止即出神效

水銀入肉

真川椒研末生雞蛋白調敷用布包繫過夜即出

銅鐵竹木等物入肉雖已拔去傷口腫爛不愈

葱頭和白沙糖

又名洋糖  
又名鹽糖

搗融敷之極效如再不愈即用玉真散

見跌打損傷門 治之無不愈也

藥箭入肉箭已拔出傷口腫爛不愈

明雄末敷之有水流出即愈

銅鉄入骨

昔邢曹進箭中左目入骨拔之不出痛苦欲死其家廣修佛事後夢一僧告以用寒食餳敷之俟發癢時將本人捆縛床柱用力拔之而見龍威祕書集異記寒食餳即寒食日所做米糖也如無即

平日所做米糖亦可用

第一首者又曰寒食勝火病發寒熱本入頭腦和主風火在  
舌頭上生諸火也曰《寒火方》以苦酒治諸火其藥更妙於  
前人之法

附錄全書

用藥不嫌多麻水出頭會

藥酒入夜半引火酒服口無服不愈

此藥古來不傳

寒食勝火方名寒食酒醫寒火病故取名不復問臣王真英  
曰此方以大寒火之虛弱可接半身而重陽不愈

卷十四目錄

中風

中風症

中風口眼喎斜

中風不語半身不遂

中風諸方

中風不語

自頭麻至心而死或自足麻至膝而死

中風角弓反張

眼珠上翻手足灣曲狀如中風時發時愈

忽然跌倒口吐白沫不省人事時發時愈

中風癱瘓手足不舉並治風濕脚氣

風濕癰瘍手足難動

風濕癰瘍半身不遂

腰脚風痛不能履步

風濕癰瘍諸方

筋骨

週身骨軟

週身痛不可忍

服過輕粉筋骨疼痛

風濕疼痛

筋骨疼痛不拘風濕氣滯或楊梅瘡毒或婦女月經諸病  
筋縮不舒疼痛不止

歷節風由下而上逐節疼痛

箭風痛俗名鬼箭打或頭項肩背手足腰肢等處筋骨疼痛

不安

手足筋骨疼痛

肩背筋骨疼痛

腋肋手足腰脇等處忽如火熱腫硬如石痛不可忍或彎曲

不伸

腰脚風痛不能履地四肢筋絡不舒兩手牽絆不能抬起  
尾脊骨上下左右疼大小便不通

身中忽有一處作痛

皮膚中痛

皮膚偶觸衣物痛徹連心似手無皮之狀

身麻皮厚如鐵

皮膚枯如魚鱗

增補積受潮濕四肢不仁方

傷寒

傷寒症

傷寒外治諸方

傷寒發狂目不識人或見鬼神

傷寒發狂兼發斑疹

傷寒舌出

傷寒隔食

傷寒口渴不止

傷寒毒攻手足腫痛欲斷

傷寒五六日周身發黃

傷寒後行住坐卧不定如有鬼神

陰症傷寒

夏月身冷畏寒

卷之十四

感冐風寒之十四

中風寒頭痛燒熱

參看

中寒面色青黑或不能言

風寒作痛

凡中身受風寒心腹疼痛飲食少進大便閉塞小便短澁上下閑蘇合丸格不通渾身絊緊甚至手足殼硬不省人事涼熱難分末吹  
一、閉住風邪體虛不能發表是暴風身如冰冷二證如牙關緊  
發寒發熱或麻木或不麻木丸藥店或三生飲見後治之苦口

寒氣侵人和木爻不和木神

閑卦風從蠶處不謂發毒 暴風其吸水命

傷寒不能軍農職事甚至手足僵硬不省人事或燒藥食  
食受風寒必頭眩面煩食少數大則閉塞小則頭眩土下關  
風寒亦散日周身發黃

風寒體羸數寒不定如有鬼中寒面白青黑夜不寐言

鬼冒風寒寒

夏月身冷畏寒

驗方新編卷之十四

中風 與筋骨門參看

中風症

凡中風忽然昏倒不省人事須先順氣然後治風用竹瀝姜汁調蘇合丸如口噤抉開灌之如抉不開急用牙皂生半夏細辛為末吹入鼻內有嘆可治無嘆則死最要分別閉與脫二證如牙關緊閉兩手握固即是閉證用蘇合香丸藥店有買或三生飲見後治之若口開心絕也手撒脾絕也眼合肝絕也遺尿腎絕也卽是脫證更有吐沫直視內脫筋骨痛髮直擗頭上擗而赤如血汗出如珠皆脫絕之症宜大劑理中湯灌之及灸臍下

亦可救十中之一若誤服蘇合香丸牛黃至寶之類即不可救矣  
惟中臟之症是閉而非脫者宜蘇合香丸牛黃丸至寶丹活命金丹之類若中腑與中血脉之症斷不可用

### 中風諸方

三生飲 治中風牙關緊閉兩手握緊若口開手撒則不可服  
生南星二錢生川烏去皮生附子去皮臍各一錢木香四分氣虛加人參  
煎服如無人參用高麗參真台黨亦可

稀涎散 治中風昏昏如醉口開手撒或口角流涎頃刻不救急  
用此散灌之得吐即愈 新皂角四條去黑皮筋明礬一兩共為末每用  
一錢或一錢多溫水緩緩調灌毋使大吐恐過劑傷人屢效不可

具述醒後再用藥調理方免後患

開闢散 中風卒急先用此藥開闢 皂角貳錢北細辛叁分共

研細末吹少許入鼻中即醒如買細辛不及即皂角一味亦可

磁針砭法 用鋒利碎磁片刺少商穴使出血即解 少商穴在

兩大指頭指甲之兩傍與出指甲之處相齊只離指甲兩邊各一  
韭葉寬是也先從手背上抹至指間使血行下方刺

須破竹筷頭夾住磁片只露磁鋒一分在外用線紮緊以兩指捏  
着筷稍直按穴上再用竹筷一隻橫敲繫線處使磁鋒刺入則輕  
重有準此為不善刺者說法

柏葉飲 中風不省人事得病之日即服此免成廢人 側柏葉

壹把葱白連鬚壹把共搗如泥用無灰酒一大碗煎一二十沸去

渣候溫灌服不善飲者分數次服

中風脫證忌服

又方 中風中痰皆治 生石膏壹兩辰砂五分各研末和勻每

服三錢用生蜂蜜調下立效

中風脫證忌服

又方 用生姜口嚼碎不拘多少向患者面上天庭等處頻擦又以生姜汁滴男左女右眼內角即醒

中風口眼喎斜

用活鱉背魚一條搗爛左斜敷右右斜敷左嘴正即將鱉魚血洗

淨免口又扯斜一邊屢試皆驗

又方 皂角為末陳米醋調塗口上左斜敷右右斜敷左乾則頻換數次愈

又方 草麻子參錢去壳冰片五分共搗融左扯貼右右扯貼左以正為止或照後癱瘓各方治之

中風不語

用泥捏成圈圍住肚臍令人痢尿在圈內一時甦醒然後用藥又方 黃耆雨防風各數煎水一大盆放床前使熱氣薰之時時不斷薰至一日即語其效如神

又方 見卷一咽喉部

中風不語半身不遂

草烏壹斤  
菜豆半升 同煮以豆熟為度去豆將草烏刮去皮切片  
晒乾為末燒酒對服雖老年久病亦愈此人祖傳秘方屢試皆驗

中風角弓反張

凡中風頭足往後扯動彎屈不伸其形如弓名角弓反張

雞屎

白參錢酒五杯用竹筷子順攬一千遍飲之小兒減半日服二次

此葛仙方也 又方 見卷十小兒科

自頭麻至心而死或自足麻至膝而死此症有類中風故列此

小兒糞要乾的不  
要稀的陰乾放瓦上燒枯燒至烟盡為止每服用三錢

生豆腐調服或用豆腐漿調服亦可甚效

又方 吳萸末參錢熱醋調服敷兩脚心一週時一換以愈為止

眼珠上翻手足灣曲狀如中風時發時愈

此症名拘麻生木耳滾水  
發開病未發時取木耳細嚼一二兩飲黃酒三四盃蓋被睡出微汗服至二三斤除根

忽然跌倒口吐白沫不省人事時發時愈

此名羊癲風 用菜葉不論  
何菜或青草塞口中即醒屢用極效

中風癱瘓手足不舉並治風濕腳氣

穿山甲

左癱用右甲  
右瘻用左甲

大川烏頭

紅海蛤

如基  
子大

各二兩為末每用

五錢搗葱白汁和成厚餅徑寸半隨左右貼脚心縛定密室安坐以腳浸滾水盆中待身麻汗出急去藥宜謹避風自然手足可舉半月再行一次除根忌口並女色一年

風濕癰瘻手足不能舉動

癩蝦蟆一隻打死後方去頭足剝皮剖開去肚腹腸胆須凈洗過畧砍碎用擂鉢擂極融細以燒酒冲入攬勻用布瀝淨渣其酒炖熱飲之連服十餘個其效無窮因飲酒多而得者更效此仙方也蝦蟆紅目紅皮腹無八字文者有毒切不可用其胆最宜取净胆

破者不用再蝦蟆口噴毒氣不惟沾着生瘡瘡愈至期仍發須謹  
防之愈後終身戒食蝦蟆又腿足無力寸步難移者飲羊腎酒見外備用  
諸方數日即能行走神妙非常

風濕癱瘓半身不遂

有人風癱一身四體不能轉動百藥不效後服馮了性藥酒一錢  
渾身出汗上嘔下瀉半日後行動如常用藥調理霍然全愈神效  
非常又有一少年風癱先飲此酒五錢不效後漸加至一兩始見  
功效此少年體壯者飲之無碍若體虛及老年人不宜多飲是所  
切囑此酒廣東佛山鎮並省城及廣西省城有買並有藥單凡患風癱

先飲一錢如不見效酌量加飲總以見效為度此酒性烈不可過  
多體虛者不飲為妙若照單飲之必致悞事慎之慎之再此酒飲  
後汗出不止此病從毛孔出也切勿止汗聽其自收

腰脚濕風作痛不能履地

松毛燒灰布包乘熱熨之神效無比此仙方也

又方 松毛壹斤搗如泥用燒酒三斤泡七日隨量飲甚妙

又方 生川烏頭參個去皮臍為末醋調用布攤貼立能止痛

又方 黃荆根四五月間生於野地藥店少有須向生藥店採取生者入蟬中燒烟熏兩足

心及痛處汗出為愈

又方 威靈仙乾為末洗淨培入竹筒內以酒潤之九蒸九晒乾則加酒  
製過用白蜜為丸梧子大每服二十九溫酒下有人手足不遂不  
能下地者數十年服之數日便能步履久服全愈體虛者少服

風濕癱瘓諸方

薰藥法 治左癱右瘓半身不遂手足腰肢疼痛並酒風腳痛等  
症 真降香 真千年健 生草烏 開羊花各壹生川烏叁錢  
真射香參分要當門子陳艾六錢鑽地風五分百草霜貳錢即鍋共研細  
末攤紙上捲成筒用麪糊緊外用烏金紙包好紮緊以火點燃薰  
患處薰時用棉祫隔住漸薰漸痛痛則風濕易出越痛越好務必

忍住薰半時後暫歇用手在患病四圍揉撚如有一處撚之不甚痛者即於此處再薰風濕即從此而出薰完此藥一料即愈有人風癱年餘照此治愈愈後戒食魚腥生冷等物一月體虛者其功稍緩。

豨莶毬 此藥明目烏鬚健脾胃壯筋骨能治中風口眼喎斜骨節疼痛腰膝無力手足癱瘓等症屢試神驗 五月五日採豨莶草去根花併子淨用莖葉加酒與蜜拌勻三炷香久取出晒一日加酒蜜再拌再蒸以九次為度晒乾磨細末煉蜜為丸如梧子大每服三錢米湯送下或六七月七八月八九月九日修合俱可本

草蓎簽草有二種南北不同南方一種名曰花菜  
蓎桐丸 治男婦感受風濕或嗜飲冒風內濕外邪傳於四肢脉絡壅塞不舒以致兩足軟痺疼痛不能行步或兩手牽絆不能仰舉凡辛勞之人常患此症狀似風癱服此丸立能全愈其藥價廉而效速誠秘方也幸勿輕視

地梧桐 俗謂臭梧桐不論花葉梗子俱可  
用採取切片晒乾炒磨末子一斤 蓎簽草 炒磨末子八兩 右二味和勻煉蜜丸如桐子大早晚以白滾湯送下四錢忌食豬肝羊血番芋等物或單用臭梧桐二兩煎湯飲以酒送之連服十劑其痛即愈或煎湯洗手足亦可

馬人集卷  
拘脊飲 治氣血俱虧手足麻木感受風濕不能行動無論男女  
一方分作五服每日一服六日全愈如未全愈用酒十斤將藥泡  
服此方試驗數百人神妙非常不可輕視

金毛拘脊 川牛膝 海風藤 宣木瓜 桑樹枝 松樹節

續斷 杜仲

秦艽

桂枝

上身不用  
要用下身熟地錢各壹

大歸身貳兩虎

骨膠

壹兩此味  
不用亦可

用河水二碗煎六分用紹酒一小盃同飲

癰瘍藥酒

治一切風濕癰瘍甚效

蒼朮

白芷

羌活

獨

活 黃芩

川芎 薄荷

厚朴

荆芥

木瓜

桑寄生

白

細辛

各貳錢

杜仲

牛膝

續斷

當歸

靈仙

鑽地風

千年

健各壹錢 防風壹錢 川烏 草烏 五加皮 秦艽 桂枝各壹  
伍分

猪筋四兩 用雄雞一隻重一斤者為率輕重俱不可用殺之燒去毛不可見水不要腸肚臍用瓦鍋同前藥入糟燒酒伍斤蒸好取雞先食酒早晚隨便飲忌生冷寒涼滯氣等物宜逸不宜勞宜避風濕節房事病輕者服雞後即愈重者飲酒完即愈極重再服一料全愈但飲酒時其痛更甚須要忍耐痛止即痊

松豆酒 治風氣骨節疼痛半身不遂 黑料豆小扁如腰子者為佳壹升  
油 松節剉碎四兩 白蜂蜜壹斤 好燒酒十五斤蒸一炷香久取出泡水  
中過十四日早晚隨量飲有人癱瘓不能行動飲此半月行走如

常其效無比

二妙湯 治一切風濕癱瘓筋骨疼痛無不神效

生甘草 威靈仙各一斤  
各壹 用水一石將藥煎五六滾入大缸內用板  
檻坐其中周圍用布圍住乘熱薰之待水溫渾身洗透務使汗出  
謹避風寒即愈

筋骨皮膚病附後與腿足及中風各門參看

周身骨軟

一人愛食燒炙炒煎厚味以致周身筋骨疼痛軟弱漸至手足不能舉動經年不愈後食冬瓜一二百斤而愈

周身痛不可忍

一人遍身作痛或云中風或云中濕或云脚氣百藥不效後一醫云是氣血凝滯用延胡當歸肉桂等分為末溫酒調服四錢而愈或加天麻亦可

服過輕粉筋骨作痛

凡生楊梅等瘡服過輕粉之人必致筋骨疼痛攣縮或破爛日久不愈查解救諸毒門治輕粉毒方治之

風濕疼痛

生紫蘇壹把如無鮮者即乾的亦可 葱頭連鬚壹把 生老姜壹塊大陳皮貳錢共 揭融爛用菜子油一茶盃放鍋內煎過再加灰麪攪勻作成一餅乘熱敷上冷即解下再用菜子油少許放鍋內將舊藥餅溫熱再敷冷則隨換日夜不斷其風即散而愈矣有人手痛不能抬起十年不愈敷至數日全安不用菜子油用頂好燒酒亦可

又方 姜汁壹兩葱汁壹兩陳米醋五錢牛皮膠叁兩另用陳皮

八錢熬濃汁去渣和入漫火煮成膏冷透火氣青布攤貼止痛神  
效 又方 糯小米舂極熟小米有粘糯兩種以糯為佳炒熱用布包好於痛  
處頻頑熨之其痛立止

又方 老姜壹塊切去壹面用廣東馮了性藥酒炒透取出另用馮了性  
藥酒炖熱以姜蘸酒於痛處避風擦之極妙

又方 樟樹皮切細加老姜搊融和糯米酒糟炒熱冷則再換日  
夜不斷三日全愈

又方 真淨銀硃參錢枯礬四錢為末鋪紙上作紙撲三條每早  
以一撲蘸麻油點火向肚臍薰之蓋被睡取汗即愈

風濕炙法 凡肩背腰脇手臂腿膝環跳大腿外側貼骨等處感

為環跳

受風寒濕氣以致漫腫無頭皮色不變惟痠疼麻木筋拘抽痛不

能轉側動搖等症即將手按擊其着骨極痛之處用墨點記隨依後法炙之即能消散若耽延日久致生腫毒難以收功沈香研丁

香

研木香各五分研

射香貳分乳香

六分研同炒研

穿山甲

五分研末炒

右臨用

時共研勻以大核桃壳半個將藥末裝滿覆於墨記之處再用乾

麪水調做成饅頭麪式作一圈子圍住核桃壳不致移卸上用濕

荷葉一張蓋護以防火星落下仍挖一孔留出核桃壳將艾絨作

龍眼核大放桃壳上以線香點火炙之初炙一二次不覺其熱至

王六次方有艾熱之氣鑽透於內能受熱者可炙十四次不能受  
熱者止炙十一次炙過其毒自消如病甚者加炙兩三次決不成  
毒灸畢隨愈屢治多人應驗之至

子龍丸 治人忽患胸背手足腰項筋骨牽引鈎痛走易不定或  
手足冷痺氣脉不通此乃痰涎在胸膈上下誤認癰瘍非也又治  
喉中結氣狀似梅核條有條無冲咽氣絕又治腳氣疼痛及遍身  
或起筋塊如榴如栗皮色不變不疼不痛但覺酸麻或自潰串爛  
流水如涎經年不愈有若管漏此乃痰滯經絡所致常服此丸自  
能全愈 方見陰疽門每服三分淡姜湯送下痰猛加數丸如脚

氣加枳榔 木瓜 松枝 卷柏 热痰加 益硝 寒痰加

胡椒 丁香 乾姜 肉桂

筋骨疼痛不拘風濕氣滯或楊梅瘡毒或婦女月經諸病

先用此藥止痛然後調理 乾馬齒莧一斤又名生馬齒莧二斤

真五加皮半斤茅山蒼朮四兩共春碎煎湯洗之洗後急用葱頭  
生姜搗爛冲滾開水服三碗避風睡卧取汗立時止痛

筋縮不舒疼痛不止

當歸壹兩 白芍 茜仁 生地 元參各五錢 柴胡壹錢 水煎服神

效如脚膝轉筋加木瓜五錢極妙

歷節風由下而上逐節疼痛

凡男婦先自兩踝骨痛起次日流上於膝三日流於兩股上至於肩肩流於肘肘流於後灣每至一骨節或如撻鑽或如虫竄痛不可忍日輕夜重諸藥不效六脉緊此名歷節風又名白虎風用炭灰五升蚯蚓糞壹升又名曲鱠地龍紅花參錢和醋炒熟布包作兩起輪流熨之甚效

又方 真紅川椒去子及閉目者以草紙二層隔住炒出汗放地上用瓦鉢蓋住四圍用熱灰遮住約一時久取出研末用酒和米糕為丸梧子大每服四十九空心鹽水送下服至一斤自愈神效體虛者

少服

箭風痛俗名鬼箭打或頭項肩背手足腰肢等處筋骨疼痛  
又不安

川山甲左邊痛用右邊甲  
右邊痛用左邊甲一錢炒黃研澤蘭葉參錢酒煎服此藥專行血絡通瘀散邪屢試如神永不再發

又方 延胡索 肉桂 五靈脂 當歸 白芷 防風各壹錢水煎服另用 木香壹錢水磨兌服極效此林屋山人經驗方也  
手足筋骨疼痛

熟地四兩搗爛浸入頂好燒酒貰斤蒸熟用竹筷攬勻放水中三

日取出每日隨量飲至愈為止並取所泡熟地送酒甚效此林屋  
山人經驗方也

肩背筋骨疼痛

槐花子 胡桃又名脂麻 核桃 芝麻 俗名細茶葉各五錢 細茶葉各五錢 用水伍碗煎至半熱  
服神效

腋肋手足腰脇等處忽如火熱腫硬者如石痛不可忍或灣  
曲不伸

急用熱糯米飯加食鹽葱頭少許敷之冷則薰熱再敷敷至過夜  
即鬆連敷兩日全愈其糯飯洗净喂鼠喂魚不可暴棄

腰脚風痛不能履地四肢筋絡不舒兩手牽絆不能抬起俱見前中風門

尾脊骨上下左右疼痛大小便不通

服八味地黃湯見備用諸方甚效再發再服如不見效加左歸丸右歸

丸見同上合服必愈此症水火俱虧初愈即當以八味地黃湯作丸

常服方可斷根

身中忽有一處作痛

浮面不痛按之覺痛或咳嗽牽扯作痛此平時閃跌內傷氣血凝滯或肩挑重物傷損初時不覺日久始發也照腰部閃跌毆打傷

腰第二方治之

皮膚中痛

名癩症用醋調燕窩泥敷之甚效

又方 杏仁炒黑研如泥敷之即愈。

皮膚偶觸衣物痛徹連心似手無皮之狀

此名駁音尖痛乃暴寒襲入肌膚故也用

胡椒四錢好燒酒四兩

煎滾用布蘸酒乘熱擦之

身麻皮厚如鉄

苦參貳錢酒煎服外用苦參研末酒調敷之久敷自愈極效

皮膚枯如魚鱗

牛骨髓用真蘇合油煎炒空心熱酒服一酒杯半月即愈

積受潮濕四肢不仁方

歌訣云。十大功劳三兩重八稜麻根五錢輕淫羊藿與千年健紅  
花當歸五加皮陳皮六勑足再加無灰酒十勑封罐七月隨量飲  
一月之後見奇功

傷寒

卷之二  
傷寒症

傷寒傳變症候繁多大抵自霜降後春分前寒邪所感者為正傷寒春夏別感者謂之四時傷寒而兼雜症惟得病之初宜先審辨則調理不差夫傷寒症候大類傷暑但傷寒惡寒而身寒傷暑惡熱而身熱脉繫惡寒謂之傷寒脉緩惡風謂之傷風脉盛壯熱謂之熱病脉虛身熱謂之傷暑傷暑脉浮大而散或絃而遲蓋熱傷氣散而脉虛也外症見頭痛身熱煩渴口乾面垢自汗倦怠少氣或背寒惡寒甚則迷悶不省手足抽動或嘔瀉腹痛下血發黃出

斑等症行路得之謂之中熱靜室得之謂之傷暑又胸膈脹滿頭  
痛發熱時有止歇者勞役食積也惟頭痛惡寒發熱身足酸痛晝  
夜不歇傷寒也依此看過果係傷寒若無良醫幸莫用藥蓋此症  
死於病者少而死於醫者多惟宜密室避風勿食粥飯米粒謹靜  
自守只以姜汁熱酒或姜茶等類與飲待七日傳遍經絡雖不服  
藥亦自然痊愈古云傷寒不藥得中醫正此謂也至於過經傳隔  
經傳兩感傳之症病本至危尤非良醫不治若用藥一誤是速之  
死耳可不慎歟

傷寒外治諸方

點眼法 粉甘草六分頂上梅花冰片四分共研細末凡傷寒病  
起一日至六日用此藥點眼內角男左女右點之出汗而愈如過  
七日不論男女兩眼並點神效

葱姜熨法 治傷寒胸膈不寬作痛一切熱結寒結食結痰結痞  
結水結等症並中氣虛弱不堪攻擊內消者須以此法熨之則滯  
行邪散其效如神。連鬚葱頭壹大把老生姜貳大塊生蘿蔔四  
個無則以蘿蔔子一合代之三味共搗爛炒熟酒炒更妙用布作兩包輪換久久罨  
熨心胸脇下痛處自能豁開散汗出而愈乾則加酒炒不宜太  
熱恐炮烙難受若大便結兼熨臍腹又卷四飲食停滯門有外治

一法亦可用

葱熨法 寒中三陰口禁失音四肢強直攣急疼痛兩手無脉似乎中風者或厥逆唇青男子腎囊俗名縮入婦人乳頭縮入或男婦交合後氣絕等症俱用葱白壹斤微搗炒熱分二包輪換熨肚臍下久久俟氣透入自愈並以葱白三寸搗爛酒煎灌之陽氣即回此華陀救急方也或用罐裝熱火或裝滾水放炒熱葱上熨之更妙病重者更以艾丸如豆大燒氣海穴臍下壹寸五分關元穴臍下參寸各七次則脉漸現手足漸溫可得生矣

蛋熨法 傷寒症不能分陰陽醫生不識不能下藥目定口呆不

省人事 身熱大小便不通而無汗者用雞蛋拾個煮熟留殼切去一頭留七八分合在病人臍上用銀簪插入雞蛋內取出黑色蛋冷即換俟銀簪不黑病人大汗即愈用神仙粥見備用諸方調養可無後患此秘方也或照後陰症傷寒外治各方亦妙

吳萸熨法 治法同上用吳茱萸壹升搗碎酒拌濕布袋二個分色覩蒸透多熨兩足心兼熨肚臍下候氣透手足暖為度或加麥麵食鹽葱白等分同炒熱熨亦可冷則隨換

紫蘇熨法 傷寒內傷積食小腹硬脹大小便不通不能言語神思欲脫兩目直視手足強仆証候危篤難以下藥者用紫蘇數兩

煎滾熱湯將手巾在湯內泡熱扭乾乘熱攤病人肚上及小肚上  
令人以手在手巾上盤旋摩擦冷則隨換如此數次一切宿糞硬  
塊積血自下其效如神如肛門閉結不通以蜜糖和猪胆煎成條  
子徐徐插入此法屢效但積糞下後須用藥調理

又方

土熨法見卷十一備用諸方亦妙

又方 野芋頭切片磨擦背上第三節骨如覺痛癢者即非傷寒  
若不知痛癢即是仍用野芋頭片周身骨節用力擦勻並用芋片  
炒熟煎濃汁服二三次即愈忌食葷並飯

又方 急取巴豆十粒搗爛入麪壹錢捻作餅安臍內以小艾火

灸五次氣達即通

傷寒發狂目不識人或見鬼神

大蚯蚓半斤去泥用童便煮汁飲或生絞汁兒童便飲亦可此葛仙方也

又方 用新挖出雞子的蛋壳煎湯服即安奇方也

又方 灶心土煎水日服三次即愈或用下蝦蟆貼心上方最妙

傷寒發狂兼發斑疹不發斑疹者亦效斑重者多用

癩蝦蟆貼之惟肝不宜多用

凡傷寒發狂眼赤舌強或發斑發疹急用銅錢於脊背兩手彎兩乳傍兩腿彎刮出青紫色隨取癩蝦蟆一隻目紅皮紅腹無破八字文者勿用破開

去腸肚各物貼心坎上取蝦蟆肝煎水服之並用煮熟整雞蛋去  
壳於刮傷處乘熱滾擦隨滾隨換其病頓減有起死回生之功滾  
過雞蛋埋入土內不可使雞犬誤食此苗人秘方也無癩蝦蟆用  
雞亦可不必食肝終不如蝦蟆之妙

又方 先用紋銀放臍上再取燕子窩泥搗融和雞蛋煎成一餅  
敷上冷則隨換數次即愈

傷寒舌出

巴豆壹粒研細去油以紙捲納鼻中舌即收上

又方 頂上梅花冰片以牙色者為上半分為末挾之即收

傷寒隔食

方見噎膈門

傷寒口渴不止

百合一斤水泡一夜煮湯洗身並以百合食之

傷寒毒攻手足腫痛欲斷

水牛肉貼之腫消痛止或用清涼膏敷最妙

見湯火傷門

菜子油敷或用六安州茶葉研末

別項茶葉亦可惟功效少緩耳

調菜子油敷或

用馬齒莧子菜

又名瓜子菜

搗爛敷或用螺蛳入鹽少許搗融敷均效

傷寒五六日周身發黃

生姜火煨去皮布包扭汁蘸香油點兩目大小眼角效或照卷十五黃疸各方治之最妙

傷寒後行住坐卧不定如有鬼神

名百合病如已發活者用百合七個用泉水泡一夜次日另用  
泉水煮汁一升再用知母貳兩用泉水二升煮汁一升同百合  
汁再煮取汁一升半分服已經吐後者用百合七個照前煮入  
雞蛋黃壹個去白分服已經下後者用百合七個照前泡煮再用

赭石壹兩滑石貳兩水二升煮汁一升同百合汁再煮取汁一升  
半分服未經汗吐下者用百合七個照前泡煮加入生地黃

汁一升同煮取汁二升半分服此仲景方也

陰症傷寒

以下各方非因陰症而起者無論男女亦治

男女交合後或外受風寒或內食生冷等物以致肚腹疼痛男子

腎囊俗名卵胞

內縮婦女乳頭內縮或手足灣曲紫黑甚則牙緊氣絕

謂之陰症傷寒又名夾色傷寒急用磚燒紅隔布數層在肚腹上  
熨之或照前葱熨法治之輕則用前蛋熨法治之

又方 男婦交合後陽物縮入絞痛欲死者急取本婦陰毛燒灰  
水調服並取洗陰戶水飲之此急救良方不可嫌穢自誤以速為  
妙遲則不能救矣

又方 紋銀一塊搘扁燒紅如病人未絕氣止燒滾熱放在臍上  
再用雞一隻連毛破開不去腸包於銀上用布縛住以手接緊即  
愈若人已死揭雞看視如雞青銀黑另換雞銀再包即愈如無銀  
只用雞亦可

又方 胡椒四十九粒連鬚葱頭四十九個共搗成泥加鍋底烟  
又名百草霜  
取燒草者佳一撮再搗勻分二處布攤一貼臍上一貼龜頭用線  
捆住少頃即愈

又方 胡椒四十九粒飛礬壹錢黃丹壹錢共研細末以好酒和  
為丸男置左手心女置右手心正對陰眼合之緊緊按定少頃腹

內燥熱不可搖動即愈女人尤效

又方 以布貼臍上取滾水一壺熨之

又方 急使小兒溺小便於病人床前令人用足男左女右將尿浸濕

泥推擦成團作餅敷臍上再用滾水一罐在泥餅上熨之甚效

又方 用武營烏鎗火藥貳錢碎研滾水冲服熱酒冲服更妙如  
得吐瀉即可回生此症寒中三陰命在頃刻非此猛烈之藥驅寒  
回陽不能急救此方屢試甚驗不可遲疑誤事此藥必以武營為  
佳爆竹店火藥功緩無力

又方 純陽救苦湯 生姜壹塊約貳參兩者切片 大黑豆參合炒熟 用水三碗

同黑豆煮數滾瀝去姜豆不用取汁服之汗出即愈神效

又方 白朮參兩 肉桂參錢

丁香

吳萸各一錢

水煎

服一劑而陰

消陽回不必再劑此方名蕩寒湯妙在獨用白朮之多則腰臍之氣大利又得肉桂以溫熱其命門之火丁香吳萸更止嘔逆而反厥逆則陰寒之邪自然潛消故一劑而即愈也

又方 人參五錢白朮參兩附子壹兩乾姜五錢肉桂六錢水煎

急灌之此症最重最急若不用此等猛烈大熱重劑斬關直入何以逐陰寒而追亡魂祛毒氣而奪陽魂故人參猶可少用而桂附不可不多況貧寒之家無力買參故方中又特多用白朮以驅駕

桂附以成其祛除擗蕩之功而奏返魄還魂之效無人參以高麗參代之或用頂上黨參一兩亦可

又方 蜣蛻虫七隻即鼻涕虫搗爛滾水冲隔去渣溫服有起死回生之功

夏月身冷畏寒

症候治法均見中暑門

玉劍閣  
東中書門

夏侯良  
令異寒

父女  
漸知重才更榮由  
狀貌體識深木相師志奮顯良多張回  
外之過風雨上嘗卷一而亦可

其惟以知其好  
之而奏以輔國事之於人卷以高靈矣

感冒風寒

此偶為風寒所感其症較輕與前傷寒症不同或照前傷寒外治各方治之亦可

風寒頭痛燒熱

用蕎麥敷見頭部第一方敷之最效或用黃糖紅沙糖亦可加老姜葱頭煎湯或加豆豉並酒煎服或用豆豉葱姜煮粥亦可均宜避風蓋被睡臥取汗為妙或照以後各方治之

中寒面色青黑或不能言語

食鹽一撮放刀口上燒枯用好汾酒或燒酒一鐘煎液服立效如

神 又方 核桃連壳打碎 連鬚葱頭各七細茶葉參錢共入  
大碗中用滾開水冲入向頭面熏之通口飲盡蓋被睡卧汗出即  
愈加生姜煎服亦可

又方 黑豆一合炒焦以酒冲入熱飲微醺蓋被卧之汗出即愈

風寒作痛

橘子葉老姜葱頭不拘多少和酒炒熟用布包裹於患處頻頻熨  
之其病若失

身受風寒心腹疼痛飲食少進大便閉塞小便短澀上下關  
格不通渾身絞緊甚至手足殭硬不省人事涼熱難分

用土熨法

見內外水桂散

人參附子散

治之最妙又身發寒熱四肢堅硬如石敲之

作鐘磬聲方

見卷十六奇病門

閉住風邪體虛不能發表

有人外感風寒誤服補藥致將風邪閉住體極虛弱難以發表後用大藥店中整包細辛中泥土一斤多煎水乘熱先熏周身用布圍住取氣薰身後洗發汗而愈洗時避風為要

暴風身如冰冷

用蜡溶化攢舊綢上布亦隨患大小貼之並裹貼兩手足心冷則隨換甚效或土熨法

見內外水桂散

人參附子散

用諸方亦可

發寒發熱或麻木或不麻木

此症恐是疔瘡其形大如粟粒隨處皆生急尋遍身尋認凡鬚髮  
眼耳口鼻肩下兩腋手足甲縫脣眼前後陰處尤宜一一細看如  
有形跡雖小如粟米亦是急查卷十一疔瘡各方治之