

小兒

杭州圖書館



主燥

咳嗽

嗽膿血

喘

馬脾

風

悲哭

夜啼

瘡

鼻

龜胸

龜背

脫肛

肛瘻

咳嗽

八九月
數痰盛
者宜下

嗽者肺感微寒八九月間肺氣大旺病嗽者其病必實非久病也其症面赤痰盛身熱法當以葶蘆丸下之若久

者不可下也

葶蘆丸治乳食衝脾傷風咳嗽面赤痰盛身熱喘促

甜葶蘆 去土隔
香畧炒

黑牽牛 微炒

漢防已

杏仁 去皮尖炒另研
如膏各一兩

右為末研入杏膏拌勻蒸陳肉和再搗為劑丸如麻

子大每服五丸至七丸淡生薑湯下乳食後或臨夜服

醫學綱目卷三十九

量兒加減

潔人參荆芥散治身熱痰嗽胸膈不利宜下痰去熱

人參 兩半 荆芥穗 兩 大黃 錢二

右為細末水煎調檳榔末香細末五分輕粉一字乳後

服如身熱潮熱宜服清涼飲子去大黃三服之後一二

日却入大黃服之令踈利則愈不可便動臟腑

十一月十二月嗽者乃傷風寒嗽也風寒從背第三椎

肺腧穴入當以麻黃湯汗之有熱證面赤飲水痰熱咽喉

不利者宜以甘桔湯兼治之若五七日其證身熱痰盛唾

粘加減三拗湯下之

麻黃 去根節三錢水
煮去沫焙乾

桂枝 錢二

杏仁 七箇去
皮尖炒

黃芩 另研
如膏 甘草 錢一

右為齋末入杏膏拌勻每服一錢水六分煎至四分去

冬月嗽
有表者
宜汗

查溫服無時以汗出爲度量大小加減若自汗者不宜服之

百部丸治小兒肺寒壅嗽微喘有痰

百部炒

麻黃去節各三兩 杏仁四十箇去皮尖微炒研入

右爲末熟菓子丸如皂子大溫水下二三丸無時日三四服此本方也仲景加松子仁五十箇蜜丸更加胡桃肉含化大妙一方加甘草二錢

紫蘇子散治小兒咳逆上氣因乳哺無度內挾風冷傷於肺氣或小兒啼氣未定與乳飲之與氣相逆氣不得下

紫蘇子

訶子去核

杏仁去皮尖炒

蘿蔔子

木香

人參去蘆各三兩 青皮

甘草炒各一兩半

右爲細末每服二錢水一盞生薑三片煎至五分去渣不拘時服量兒加減

醫學綱目卷十九

二

肺盛

有肺盛者欬而後喘面腫欲飲水有不飲水者其身卽熱以瀉白散瀉之若傷寒咳嗽五七日無熱證而但嗽者亦葶藶丸主之後用化痰藥瀉白散方見虛實法

肺虛

有肺虛者咳而硬氣長出氣喉中有聲此久病也以阿膠散補之痰盛者先入脾後以楸銀丸微下之涎退速卽補肺如上去補肺法方見治虛實法

黃芪湯治小兒咳嗽喘逆身熱鼻乾燥者是熱入肺經

爲客熱呬呀有聲

黃芪兩

人參二錢半

地骨皮五錢

桑白皮三錢

甘草二錢半

右咬咀水煎放溫頻服之

涎嗽四君子加杏仁桑白皮等分半夏麩減半同煎○

咳嗽四君子末煎紫蘇湯調下

秋冬嗽
為實春
夏嗽為
虛

咳嗽 肺之生病而成嗽大抵秋冬則實春夏則虛更
詳五臟兼見之證以辨虛實若實則面赤飲水身熱痰涎
盛涕唾稠粘咽乾不利喘嗽面腫吐食皆當先補脾益黃
散後瀉肝瀉青丸若咯膿血是肺痿也用清肺散治之若
虛則面白脫色氣少不語喉中有聲唾痰清利法當阿膠
散補之若亡津液用白朮散主之

肺實腹
脹喘初
下為實
宜

治嗽大法盛即下之久即補之更量虛實以意加減
福銀丸治風涎膈實上熱及乳食不消腹脹喘驚

巴荳去油膜皮心

水銀五

黑鉛二錢半

沙結

研細半兩

麝香五分

好墨研八錢

火燒醋煉

右將巴荳末并墨再研勻和入砂子麝香陳米粥和丸
如菉豆大捻福一歲兒一九三二歲一三九五歲已上
五六九煎薄荷湯放冷送下不得化破更量虛實加減

入醫學綱目卷五

三

並食後服

虛人先以益黃散實脾後以此方下之

後

嗽而吐水或青綠水者百祥丸下之方見 嗽而吐痰涎

乳食者白餅子下之方見

小兒痰嗽必用吐法詳見喘條

白附丸治咳嗽有痰方見 脾

勝金方治小兒咳嗽蜂房二兩淨洗去蜂糞及泥土以火

燒為灰每服一字飯飲下

塗唇膏治襁褓小兒咳嗽吐乳久不愈石燕一味為末

每用一捻蜜少許調塗見唇上日三五次無時

杜氏子五歲自十一月病嗽至三月未止始得嗽而吐

痰乃外風寒蓄入肺經令肺病嗽而吐痰風在肺中故也
宜以麻黃散葷發散後用涼藥壓之即愈時醫與珠粉丸
半夏丸福銀丸諸法下之其肺即虛而嗽甚至春三月間

診

雜方

尚未愈召錢視之其候面青而光嗽而喘促更氣又時時長出氣錢曰病困十已八九然所以面青而光者肝氣旺也春三月者肝之位肺衰之時也嗽者肺之病肺自十一月至三月肺卽虛痿又胃下之脾肺子母俱虛復爲肝所勝此爲逆也故嗽而喘促更氣長出氣也錢急與瀉青丸瀉之後與阿膠散實肺次日面青而不光錢又用補肺而嗽如前又與瀉肝未已而又加肺虛唇白如練錢曰此病必死不可治也何者肝大旺而肺虛絕肺病不得時而肝勝之今三瀉肝而肝病不退三補肺而肺病尤虛此不久生故言死也此證病於秋者十救三四春夏者十難救一果大喘而死

嗽膿血

有喘而咯膿血者乃肺熱食後服甘桔湯久嗽者肺亡

肺虛熱

八 醫學綱目卷三九

四

津液阿膠散主之咳而痰實不甚喘而面赤飲水者可編

銀丸下之阿膠散卽補肺散方見治虛實法編銀丸方見前

甘桔散

桔梗米泔浸一宿焙乾

甘草炒各二兩

右爲細末每服一大錢水一大盞入阿膠半兩炮過煎至五分食後溫服

甘桔湯仲景少陰咽痛藥也孫真人治肺癰吐膿血用生甘草加減二十餘條

小兒咯血黑豆甘草陳皮煎服

錢段齋郎子四歲病嗽身熱吐痰數日而咯血前醫以桔梗湯及防已丸治之不愈涎上攻吐喘不止請錢氏下匾銀丸一大服復以補肺湯補肺散治之或問段氏子咯血肺虛何以下之錢曰肺雖咯血有熱故也久則虛痿今涎

上潮而吐當下其涎若不吐涎則不甚便蓋吐涎能虛又生驚也痰實上攻亦能發搐故依法只宜先下痰而後補脾肺必涎止而吐愈為順治也若先補其肺為逆耳此所謂識病之輕重先後為治也

喘

肺虛則喘而少氣先益黃散後補肺散二方並見治虛實法

京東轉運使李公孫八歲病嗽而喘滿短氣醫者言肺經有熱用竹葉湯牛黃膏治之三日加喘錢氏云此肺氣不足復有寒邪即便喘滿當補肺脾勿服涼藥李曰醫已用竹葉湯牛黃膏錢曰何治也前醫曰退熱退錢曰何熱之所作曰肺經熱而生嗽嗽久不除生涎錢曰本虛而風寒所作何熱也若作肺熱何不治其肺而反調心蓋竹葉湯牛黃膏治心藥也李師有慙色錢治愈

醫學綱目卷五

五

喘而氣盛為肺實

肺實則喘而氣盛瀉白散方見治虛實法

溫冷用藥○東都張氏孫九歲病肺熱咳嗽他醫以珠犀龍麝牛黃藥治之一月不愈其證咳嗽喘急悶亂飲水不止全不能食錢氏用史君子丸益黃散張曰本有熱何以又行溫藥他醫用涼藥攻之一月尚無效錢曰涼藥久則胃寒不能食小兒虛不能食當與補脾候飲食如故即瀉肺經病必愈矣服補脾藥二日其子欲飲食錢以瀉白散瀉肺遂愈張曰何以不虛錢曰先實其脾然後瀉肺故不虛也

小兒結熱上氣喘者四順散一名清涼飲子

寒實
治小兒哮喘

黃丹 砒霜

右各置製為末用葱肉為丸如麻子大每服三九臨臥

冷茶下

瘵

痰嗽痰喘並用涌法吐之重劑用瓜蒂散輕劑用苦參赤小豈末須蝦蟇汁調服之

肺中風

萬金丹治洩痰涎喘急方見瘵大通用

治肺中風多因嗽而始但服嗽藥不能散其風邪入於肺臟之絡其候喘急面色青黃目能認人口不能言醫不能明其證坐以待盡不亦陋乎紹興王尚書女伴老嫗得此病半月相繼而死庸醫俱不能識又張南軒亦得此疾而逝醫師滿目環視而立待盡余悔不得一見豈非天命也哉後有親樓八哥之子病此症是時乃一氣之行諸醫皆言無術而退子父來告急但欲得別是何疾亦不望其活矣余徃視之尚留殘喘以橘皮桑白皮罌粟殼三件煎湯化百部九二服急灸肺膈其喘立定而忽能言繼時索

醫學綱目卷三九

六

診

辨自此生矣嗚呼是病有法不遇余者多矣可深惜哉帝曰乳子中風熱喘鳴肩息者脈何如岐伯曰喘鳴肩息者脈實大也緩則生急則死通評虛實論

馬脾風

暴喘而脹滿也

實

暴喘俗傳為馬脾風也大小便硬宜急下之用牛黃奪命散後用白虎湯平之

牛黃奪命散治小兒肺脹喘滿胸膈起急兩脇扇動陷下作坑兩鼻竅張悶亂嗽喝聲啞而不鳴痰涎潮塞俗云馬脾風若不急治死在旦夕

白牽牛

黑牽牛 各一兩半 生半熟

川大黃

檳榔 各一兩

右為細末三歲兒每服二錢冷漿水調下涎多加膩粉

少許無時加蜜少許

無價散治風熱喘促悶亂不安俗謂之馬脾風

辰砂半錢

輕粉五錢

甘遂

麩裏煑焙
乾一錢半

右為細末每服一字用溫漿水少許入滴油一點挑藥
在上沉下去却以漿水灌之立效

診

又一法小兒喘脹俗謂之馬脾風又謂之風喉者以草莖
量病兒手中指裏近掌紋至中指尖截斷如此二莖自乳
上微斜直立兩莖於稍盡頭橫一莖兩頭盡頭點灸灸三
壯此法多曾見愈

診

世馬脾風在百日內者不治

悲哭

心脾

本治小兒拘哭龍齒散

龍齒

蟬殼去翅足
泥土

鈞藤有鈎
子者

羌活

醫學綱目卷三十一

七

茯苓

人參各等
分

右為末每服一大錢煎六分去查溫熱服

子凡一小兒悲苦彌日不休兩手脈弦而緊戴人曰心火
甚則乘肺肺不受其屈故哭肺主悲王太僕云心燥則痛
甚故燥甚悲亦甚先令浴以溫湯漬形以為汗也肺主皮
毛汗出則肺熱散浴止而啼亦止矣仍命服涼膈散加當
歸桔梗以竹葉生薑朴硝同煎服瀉膈中之邪熱

小兒驚啼邪熱乘心也當安心安神丸主之

小兒騫然忽大啼作聲者必死此火大發則虛其氣故

也

夜啼

大法

小兒夜啼有四証一曰寒二曰熱三曰重舌口瘡四曰
客忤寒則腹痛而啼面青白口有冷氣腹亦冷由腰而啼

此寒證也。熱則心躁而啼，面赤，小便赤，口中熱，腹煖，啼時或有汗，仰身而啼，此熱也。若重舌口瘡，要吮乳不得，口到乳上，卽啼，身額皆微熱，急取燈照口，若無瘡，舌必重也。客忤者，見生人，氣忤犯而啼也。各隨證治之。

出腰面
清白而
啼為寒

蒜乳丸治腹痛夜啼。當歸丸治臍寒腹痛。二方見
腹痛

五味子散治小兒夜啼及腹痛，至夜輒劇，狀似鬼祟。

五味子 當歸 赤芍藥 白朮 各半
兩

扶神 陳皮 桂心 甘草 炙各二
錢半

仰身面
赤而啼
為熱

右為麤末，水煎量見大小加減。錢三黃丸治腹熱痛夜啼，面赤唇焦，便赤，用人參湯吞下。熱痛腰不曲
肢不冷也

無燈花散治熱證，心燥夜啼，以燈花三四顆，研細用燈心煎湯調塗口中，以乳汁送下。日三服。一法用燈花塗乳。

八 警學綱目卷三十一

上令小兒吮之，無燈花用燈心燒灰亦妙。又二法燈花七枚，鵬砂一字，辰砂少許，研細蜜調，抹唇上立安。

丹小兒夜啼

人參 二錢 黃連 一錢 甘草 炙五
分 竹葉 片

生薑 片 水煎服

澹寮龍齒散治小兒夜啼不止。方見拘哭卽上本，事龍
齒散但無羌活一味

世又方：蠟蛻二七枚，去足為末，入硃砂一字，蜜調送下。

丹馬齒燒研細，傅乳上吮之妙。小兒夜啼黃連薑汁炒。

甘草竹葉煎服

只瘡重
舌夜啼

世治小兒夜啼，青黛半錢，細研清水調下。無蒲黃散治小兒重舌。方見 牡礪散治小兒口瘡。方見

客忤夜
啼

治客忤夜啼，法用本家廚下燒殘火柴頭一箇，以火焦頭為上。朱書云：吾是天上五雷公，將來作神將，能收夜啼鬼。

一樽永不放急急如太上老君律令勅書了勿令兒知立
在牀下倚牀前脚裏立之男左女右效
發
明夜啼灸中衝一壯卽止

瘡

熱痰
世通關散治小兒驚風已退只是聲啞不能言百藥不效
者以大天南星一箇炮爲末每服一錢猪膽汁調下入喉
便能言語

鼻

表
丹治小兒赤鼻

雄黃 黃丹分等 用無根水調傳

或用菖蒲半葉酒蒸爲末調服解食毒無根水者天落
雨水用殘盛之
者是也

辛夷葉先焙乾 細辛 木通

醫學綱目卷三九

白芷 木香各五錢 杏仁去皮尖

右爲細末用杏仁泥羊骨髓猪脂各一兩同諸藥和勻
於瓦石器中熬成膏赤黃色爲度於地上放冷入腦麝
各一錢拌勻每用少許塗顙上并鼻中神效

龜胃

熱
錢肺熱腸滿攻於胸膈卽成龜胸

聖治龜胸方

大黃炒一錢 天門冬去心焙 百合 杏仁去皮尖炒

木通 桑白皮灸蜜 甜葶蘆炒 川朴稍各半兩

右爲末煉蜜丸如芡實大溫水食後化下三歲已上化
二丸

丹治小兒龜胃

蒼水 黃栢酒 芍藥酒 陳皮

防風

山查

葳靈仙

加當歸

又利後加生地黃

為末煉蜜丸食後溫水下

灸

回小兒龜背緣肺熱脹滿攻胃膈所生又綠乳母食熱麪五辛轉更高起宜灸兩乳前各一寸五分上兩行三骨罅間六處各三壯炷如小麥大春夏從下灸上秋冬從上灸下若不依此法十灸不愈一二也

龜背

雜

錢兒生下血風入脊逐於骨髓即成龜背治之以龜尿擦骨骨取龜尿法當以蓮葉安龜在上後用鏡照之其尿自

出

針灸

聖小兒龜背由令兒坐早有客風吹入脊骨而入於骨髓故使背高如龜之狀也雖有藥方多成痼疾以灸法為要當灸第三椎骨節下兩傍各一寸半肺膈穴又第五椎骨

大醫家綱目卷三十九

十

診

節下兩傍各一寸半心膈穴又第七椎骨節下兩傍各一寸半膈膈穴以小兒中指節為一寸艾炷如小麥大三五壯即止此法累用十有一二得效亦無全效之功世龜背在百日內不治

脫肛

膿可去

湯治大腸虛弱肛門脫下

龍骨

訶子

煨去核一枚沒石子二枚嬰粟殼去核

錢二

右為末白湯點服仍用蔥湯薰洗令軟欸欸以手托入

用新磚瓦一片燒紅以醋澆之氣上即用脚布疊數重

壓定使熱氣上透不可過熱令病者以臀坐於布上如

覺布溫逐旋減之以常得溫熱為度并常服前藥

潔五倍子散治小兒脫肛

五倍子 地榆分等

敷藥

右為細末每服半錢或一錢空心米飲調下
赤石脂散治小兒因痢後努軀氣下推出肛門不入難
建反用力
勞服也

真赤石脂 伏龍肝各等分

右為細末每用五分傅肛頭上頻用按入

世治小兒脫肛用五倍子為末量多少摻患處以物襯手
揉入切忌食發風毒物

世脫肛治法用蒲黃一兩猪脂二兩煉猪脂和蒲黃成膏
塗腸頭上即縮入

世水聖散治小兒脫肛不收用浮萍草不以多少杵為細
末乾貼患處

世脫肛用東北方陳壁泥土湯泡先洗下後薰上又方見脫囊條

醫學綱目卷三九

十一

針灸

世小兒脫肛瀉血秋深不痊灸龜尾一壯炷如小麥大春
端穹骨也 小兒脫肛者灸臍中三壯 小兒脫肛久不
瘥及風癩中風角弓反張多哭言語不擇發無時節盛即
吐沫者取百會一穴灸七壯在鼻直入髮際五寸頂中央
旋毛中可容豆炷如小麥大

世治久痢脫肛見瀉門

脫肛痒

雜方

世治小兒蛻虫攻下部痒取匾竹葉一握切以水一升煎
取五合去查空腹飲之虫即下用其汁煮粥亦佳心

治虫狀如蝸牛食下部痒取匾竹葉一握水二升煮熟五
歲兒空腹服五合隔宿不食明日早食之尤佳楊氏

腎主虛寒 解顛 顛填 行遲齒遲髮

遲 停耳 呵欠 額黑 唇青為寒

解顛

解顛 小兒解顛乃是母氣血虛與熱多耳用四君子四物有熱加酒炒黃連生甘草煎服外以綿束緊用白藜末傳之

解顛治法宜用生地散 解顛生下而顛不合者腎氣不成故也長必少笑更有目白睛多眇白色瘦者多愁少喜也

湯解顛者 顛大頭縫不合如開解故曰解顛此由腎氣不成故也腎主骨髓而腦為髓海腎氣不成則腦髓不足故不能合也凡得此者不過千日其間亦有數歲者乃廢人也人之無腦髓如木無根古人雖有良方吾所以不錄者勞而無功也亦不可束手待斃宜依錢氏補腎萬一有可生之理 補腎地黃丸方見勞瘵

天南星散治顛開不合鼻塞不通天南星大者微泡去

醫學綱目卷五

主

皮為細末米醋塗調緋帛上貼顛上灸手頻熨之立效

無三辛散治小兒骨應合而不合頭骨開也名曰解顛

細辛

桂心各半兩

乾薑七錢半

右為末以薑汁和傳顛上貼之兒面赤即愈

又方用蛇蛻炒焦為末用猪頰車中髓調傳頂上日三四度曾有人作頭巾裏遮護之久而自合亦良法也

明顛門不合 齊上齊下各五分 二穴各灸三壯灸瘡未發先合

世父精不足則解顛眼白多

顛填

診

診

針灸

湯氏小兒顛填其顛高大如物填在上汗出毛髮黃而短是也若寒氣上衝則牢韌 頭坵起腫硬 熱氣上衝則柔軟又小兒臟腑積熱氣上衝於腦亦致顛填而又肝氣盛風熱衝上而成此候也王環集歌曰顛門腫起定為風此候

應須也不中或若加坑如盞足七日之間命必終

行遲齒遲髮遲

虛

陽小兒稟受血氣不足者則髓不滿骨故軟弱而不能行
腎主髓治法當用錢氏補腎地黃丸加鹿茸五加皮麝香
則髓生而骨強自然行矣外甥黃虬知錄之子三歲不能
行遂合此方服之有驗

行遲

無五加皮散治小兒三歲不能行者由受氣不足體力虛
怯腰脊脚膝筋骨軟足故不能行用真五加皮為末粥飲
調次入好酒少許每服一栗殼許日三服效

羚羊角丸補腎肝五六歲不能行

羚羊角

虎脛骨醋炙

桂枝

生地

黃芪

防風

當歸

白茯苓

酸枣仁炒各

醫學綱目卷三九

三

齒遲

右為細末蜜丸皂子大食後溫水化下久服取效
陽芩黃散治小兒齒不生

大川芩

生地各半

山藥

當歸

甘草各

右焙為末熟湯調服用搽齒脚

髮遲

本尿坑中竹木主小兒齒不生正旦刮屑塗之即生
陽香需煎治小兒白禿不生髮燥痛

陳香需二

胡粉一

猪脂半

右用水一大盞煎香需取汁三分去查入胡粉猪脂相
和合勻塗於頭上日頻用之

治小兒頭生白禿髮不生用椿楸樹葉心取汁傳之大

效

診

小兒長大不行行則脚細齒久不生則不固髮久不

生生則不黑皆屬氣血虛也宜大劑補之

停耳

紅王散治小兒膿耳

枯白礬 乾臙脂 麝香 各一錢

方同研勻先以綿裹杖子擦淨搽之

龍黃散治小兒停耳汁出不止

枯白礬 龍骨末 黃丹 各半兩 麝香 一錢

右同研細先以綿杖子擦膿水盡用散一字半分為兩

處吹入耳內日二次

停耳硫黃末傳之曰一夜一妙

用蚰蟻灰末吹入立效有瘡者傳之孫真人方同

呵欠

呵欠面赤者風熱也 面青者驚風也 面黃者脾虛驚

醫學綱目卷三十九

也 多睡者內熱也 氣熱者傷風也

額黑唇青為寒

寒

補陽湯初冬間一小兒二歲大寒證明堂青脈額上青

黑腦後青絡高起唇青舌上白滑喉鳴而喘大便微青耳

尖冷眼溢常常淚下出仍多眵胷中不利臥而多驚無搖

柴胡 三錢 升麻 二錢 麻黃 三錢 吳茱萸 五分

地龍 五錢 蝎梢 少 生地 五分 歸身 三錢

甘草 一錢 黃芪 二分 黃柏 一錢 陳皮 一分

葛根 連翹 各一錢

右為釐末作一服水一盞煎法如常乳食後熱服始漸

喜睡精神出氣和順乳食旺

血氣虛怯為冷所乘則唇青

雜病 寒熱 瘡 繼病 五硬五軟

寒熱

食積

食積寒熱如瘧渴瀉氣急要合地臥此候先當取下積

只用平胃散次常服進食丸

平胃散方見大人泄瀉進食丸方見藥

曹宜德子三歲面黃時發寒熱不欲食而飲水及乳不止眾醫以為潮熱用牛黃丸不愈及以止渴乾葛散服之反吐錢曰當以白餅子下之後補脾乃以消積丸磨之此乃解也後果愈何以故不食但飲水者食伏於脾內不能消致令發寒熱用止渴藥吐者藥衝脾故也故下之即愈

實熱

高巡檢子八歲病熱醫者皆為傷冷治之以熱藥欲

飲冰水禁而不與內水涸渴煩躁轉生前後皆閉口鼻俱乾寒熱往來咳嗽時作遍身無汗又欲灸之適遇戴人戴人責其毋曰重裊厚被煖炕紅爐兒已不勝其熱尚可灸乎其毋謝以不明戴人令先服人參柴胡飲子連進數服下爛魚腸之類臭氣異常渴欲飲水聽其所欲冰雪冷水連進數杯節次又下三四十行大熱方去又與通膈丸牛黃丸復下十餘行兒方大痊前後約五十餘行畧計所用冰雪水飲至一斛向灸之當何如哉

瘡

治小兒瘡疾多與大人同法以出汗為瘥宜桂枝柴胡麻黃參苓等輩又視其病食病痰以意消息之大抵多是飲食失節得之須以消導為先可也

濕痰

萬金丹治大人小兒瘡并哮喘涎喘急黑豈四十九粒

信一錢先以黑豆浸去皮端午日以乳鉢研細拌勻作大小丸之黃丹為衣陰乾治哮喘茶清吞一九治瘡空心井花水吞一九忌熱物蠶腥一日如食熱物即吐

醫方治癰瘡但熱不寒方用黃丹煨通紅臨發蜜湯調下能

飲酒用酒調一法專服小柴胡湯次服人參前胡湯

草果飲治寒多熱少手足厥冷遍身浮腫肚腹疼痛

厚朴薑 青皮 草菓 藿香

甘草炙 丁皮 神麴 良薑

半夏麴 等分咬咀薑棗煎空心服

治久瘧露星散

秦艽 柴胡 白朮 白茯苓

檳榔 常山 黃芩 甘草炙

半夏麴 官桂

右等分咬咀酒醋一半煎露一宿次日早取再溫瀉去

查服陳舍人令嗣久瘧服驗

小柴胡湯 治小兒瘧疾往來寒熱

醫學綱目卷三九

人參 半夏 柴胡 黃芩

甘草各等

右咬咀薑三片棗一枚煎服

青皮湯 治小兒瘧疾作浮腫兼寒熱不退飲食不進

白朮 茯苓 厚朴 青皮

陳皮 半夏 大腹皮 檳榔

三稜 蓬朮 木通 甘草各等

右咬咀每服三錢薑水煎服

養胃湯 治外感風寒內傷生冷溫中快膈能辟山嵐障

氣寒瘧脾胃虛寒嘔逆惡心並宜服之

蒼朮 厚朴 半夏 藿香

草果 人參 茯苓 甘草

陳皮

久瘡
右吖咀每三錢
鬼哭散 止瘡疾久不愈者效

常山 大腹皮 白茯苓 驚甲醋

右吖咀每服三錢
出涎效

驚甲飲子 治瘡久不愈腹中結為癥瘕名曰瘡母

驚甲醋 白木 黃芩 草果

檳榔 芫薺 橘紅 甘草

厚朴 白芍藥各等

右吖咀薑棗煎服

瘡腫

大腹皮湯 治小兒瘡疾用藥太早退熱變作浮腫外腎腫大飲食不進

大腹皮 檳榔 三稜 蓬木

醫學綱目卷五元

枳殼 蒼木製各 甘草三錢

右吖咀每服三錢加薑皮蘿蔔子同煎

四獸飲 治五臟氣虛喜怒勞逸不節致陰陽相勝結聚

痰飲發為瘡疾兼治暈瘧

半夏 人參 白木 茯苓

草果 陳皮各一兩半 甘草二錢半

右吖咀加烏梅棗子各一枚生薑三片每服三錢煎服

經效截瘡丹治瘡母結癖寒熱無已

真阿膠 雄黃各二錢 硃砂半錢

右研為細末稀糊丸如桐子大每服一九人參湯候冷

空心服瘡瘡桃枝湯冷服臨發時磨一丸塗鼻口畔效

瘡脈自弦弦數者多熱弦遲者多寒弦小緊者宜下

之弦遲者可溫之弦緊者可發汗浮大者可吐之弦數者

風發也以飲食消息止之

疰瘧脈自弦微則為虛代散則死

針灸

小兒瘧久不愈灸內庭在足大指次指外大椎百

會各隨年壯

繼病

藥方

小兒瘧病母有娠乳兒有病如瘧痢他日亦相繼腹大或瘥或發他人相近亦能相繼北人未識其病懷妊者取百勞鳥毛帶之又取其蹄枝鞭小兒令速語鄭禮註云鴟博勞也楚詞云在外見鳴鴟言其鳴惡也白澤圖云屋間鬪不祥即百勞也以此治繼病本草云百勞味平有毒其毛用之治小兒繼病

治小兒生十餘月後母又有姪令兒精神不爽身體萎瘁名為瘧病用伏翼燒灰細研以粥飲調下五分日四五

醫學綱目卷三九

大

服效若灸令香熟嚼哺兒亦效即蠟

千金論小兒有瘧病者是娠婦被惡神導其胎中如疾小兒令生此病瘧亦小鬼也其證微微下利寒熱往來毫毛髮鬢鬢不悅者是也宜服龍膽湯凡婦人先有小兒未能行而母更有娠使兒飲此乳亦作瘧也令兒黃瘦骨立發熱髮落

龍膽湯治嬰兒出腹血脈盛實寒熱温壯四肢驚掣吐乳者若已能進哺中滿食不消壯熱及變蒸不解中客入鬼氣并諸驚癇方悉主之

龍膽草

柴胡

黃芩

桔梗

鈞藤皮

芍藥

甘草

茯苓

蜚琅

大黃

各二

錢半

右為剉散以水一升煮取五合為一劑十歲已下小兒

皆可服若兒生一日至七日分一合為三服八日至十日分一合半為三服十六日至二十日分二合為三服二十日至三十日分三合為三服皆以得下即止此劑為出腹嬰兒所作若日月長大者亦依此為例必知客忤及有鬼氣者可加人參當歸各二錢半一百日兒加一錢一字二百日兒加二錢半一歲加半兩餘藥皆做此

診

生者為相繼 死者為傳尸 有脈而無氣謂之尸厥 有氣而無脈謂之行尸 丁奚露哺客忤無辜四異病也 陽易陰易百合狐惑四奇病也

五硬五軟

診

仰頭取氣動搖難氣壅滯連胸腹間脚手心如冰冷硬頭仰為風命不還

六 醫學綱目卷五

九

喫食如何不長肌肉少皮寬軟自離莫教瀉痢當時作靈藥難醫命必危

五歲孩兒不肯行脚軟氣羸命不亨細小不妨榮衛氣長大須應肉自生宜用參芪等藥錢氏地黃丸治之

右五硬 疰之屬經所謂暴強直皆屬於風是也 五軟即疰 獨治見疰雜方條

一錢一字二百日兒服二錢半一歲服半兩餘藥皆
客忤及有鬼氣者加人參當歸各二錢半一百日兒
候出腹嬰兒所作若日月長大者亦依此為例必知
期二十日至三十日分三合為三服皆以得下即止此
五百日一合半為三服十六日至二十日分二合為三
頭發生一日至七日分一合為三服八日至十日分

補遺方

中風

至寶丹療卒中急風不語中惡氣絕中諸物毒暗風中熱
客毒陰陽二毒山嵐瘴氣毒蠱毒水毒產後血暈口鼻血
出惡血攻心煩躁氣喘吐逆難產悶絕死胎不下已上諸
疾並用童子小便一合生薑自然汁三五滴入於小便內
溫過化下三九至五九神效又療心肺積熱伏熱嘔吐邪
氣攻心大腸風秘神魂恍惚頭目昏眩眠睡不安唇口乾
燥傷寒狂語並皆療之

烏犀角

生研

朱砂

飛研

雄黃

研

玳瑁

屑生研

琥珀

研各

麝香

研

龍腦

研各

金箔

五十片

半為

銀箔

五十

牛黃

五錢

安息香

半兩

去沙土慢火熬成膏

右將生犀玳瑁為細末入餘藥研勻將安息香膏重湯

醫學綱目補遺方

煮凝成後入諸藥中和搜成劑盛不津器中並旋丸如
桐子大用人參湯化下三九至五九又療小兒諸癩急
驚心熱卒中客忤不得眠睡煩躁風涎搐搦每二歲兒
服二九人參湯化下

桂苓甘露飲

官桂

人參

去芦

藿香

各半

茯苓

去皮

白朮

甘草

炙

葛根

澤瀉

石膏

寒水石

各一兩

滑石

一兩

木香

一分

右為細末每服一錢白湯下新水生姜湯亦可

消渴

順氣散消中熱在胃而能飲食小便黃赤以此下之不可
多利微微利至不欲食而愈

朴硝

製一兩

大黃

四錢

枳實

二錢

右咬咀每服八錢水二盞煎八分去渣通口服

滯下

膠艾湯治衝任虛損月水過多及妊娠胎動不安男子腹
痛下墜

阿膠炒

川芎

甘草各

當歸

艾葉微炒各

白芍藥

熟地各四兩

右剉每服五錢水一盞酒六分煎至八分去渣稍熱服
空心食前日三服甚者連夜併服

滯下

震靈丹此丹不犯金石飛走有性之藥不借不燥奪造化
冲和之功大治男子真元衰憊五勞七傷臍腹冷疼肢體
酸痛上盛下虛頭目暈眩心神恍惚血氣衰微及中風癱
緩手足不遂筋骨拘攣腰膝沉重容枯肌瘦目暗耳聾口
苦舌乾飲食無味心腎不足精滑夢遺膀胱疝墜小腸淋
瀝夜多盜汗久瀉久痢嘔吐不食八風五痺一切沉寒痼
冷服之如神及治婦人血氣不足崩漏虛損帶下久冷胎

醫學綱目補遺方

二

藏無子服之無不愈者

禹餘糧火煨

紫石英

赤石脂

代赭石如上

用炭一十斤煨通紅去盡灰度入地出火毒二宿

乳香研

五靈脂去石研

沒藥去石研 朱砂水飛過

右件前後共八味並為細末以糯米粉熬糊為丸如小
雞頭大晒乾每一粒空心溫酒下冷水亦得常服鎮心
神駐顏色溫脾腎理腰膝除尸疰蠱毒辟鬼魅邪癘久
服輕身忌猪羊血恐減藥力婦人醋湯下孕婦不可服
極有神效

滯下

駐車丸治一切下痢無問新久及冷熱膿血腸滑裏急日
夜無度臍腹絞痛不可忍

阿膠搗砂炒如珠子為末

當歸去苳各黃連

去贛三

乾姜炮

十

泄瀉

甘草乾姜湯

甘草四兩

乾姜二兩

暴厥

乾姜附子湯

乾姜兩

附子一枚
用去皮

右二味水煎頓服

臂痛

茯苓丸治臂痛如神

赤茯苓

防風

細辛

白朮

澤瀉

官桂各半

瓜蒌根

紫菀

附子

黃芪

芍藥

甘草各一分

醫學綱目補遺考

三

生地

牛膝酒

山芋

獨活

半夏酒

山茱萸各一分

右十八味為細末煉蜜為丸如桐子大每服十九丸溫酒送下食前

瘵血

當歸四逆加茱萸湯

當歸

桂枝

芍藥

細辛各一分

通草

甘草各六錢

茱萸三錢

右水六盞煎服

升麻葛根湯

升麻

葛根

芍藥

甘草等分

每服六錢水一盞半煎至八分去渣服寒多即熱服熱多即溫服

開胃丸治乾嘔氣逆不止

半夏微炒

人參一兩

白朮去皮

陳皮去白

小兒吐瀉

小兒瘵出不快

白朮各一兩

右為細末用生姜汁同末肉和丸如桐子大每服二十丸至三十九不拘時用粥飲送下

小兒驚風辰砂丸

辰砂

麝香

牛黃各二錢半

半夏制

丁香

白附子

鐵粉

天麻

南星制各半兩

右為細末煮粳米飲丸如麻子大每服五丸用荆芥湯

不拘時下

小兒驚風

軟金丹各一名聖丹

治急慢驚風五癩瘕癰頭項動搖目睛

上視或牽和偏搐背脊強直或反折如弓口噤牙緊或屈指如救或溫壯連綿或服涼藥過多內生虛風或因傷寒變搐發渴或因吐痢生風為癩一切諸症乳食不化昏胃

醫學綱目卷之十

四

不省凡此急候服之皆愈但不喘急者此藥必效如已喘急者更須詳虛實苦涎實者可同水銀丸化下此二藥引化驚涎則潮搐立止虛者但只服此藥即便服效如兕涎熱風熱有諸驚症者服之即瘥

又治大人卒中風病涎潮不省此藥神聖救人不可具載

香墨各一錢全蝎三十箇

丁香半錢

蟾酥一皂

牛黃另研丹砂飛

雄黃飛

生犀鎊研

半夏麴制

天麻

姜蚕炒

木香

蟬殼洗焙

史君子肉各一分

肉果麴製

天南星炮

白附子炮各三錢膩粉一錢

螺青一兩

水銀鉛各三錢半炒

射香一錢

龍腦半錢

白花蛇

烏蛇各取項後粗處肉各一兩酒浸一宿去皮骨曬乾不見火

附子一箇炮去

皮蜈蚣二條赤足槌拍筒

筒

原方有大贏虫二十五箇去殼本草無考

右逐旋入研細勻用不蛀皂筴一錠刮去皮弦以好酒半升浸一宿搽去查取汁入石腦油三錢銀石器內文武火熬數沸放冷別煉蜜少許投內和諸藥得所大者丸枣大小者皂子大以金銀為衣每服一九金銀薄荷湯化下涎實者同水銀丸化下量兒大小與服神效

水銀丸治急驚痰壅發搐悶亂口噤

水銀

一分入羊肉少許同研至無星

膩粉一分

南星炮裂一分

全蝎

微炒

再研束肉為丸如黍米大每服五七丸

乳香湯化下無時量大小加減

太乙神精丹治客忤霍亂腹痛脹滿尸疰惡氣顛狂鬼語盡毒妖魅溫瘧但是一切惡毒無所不治

丹砂

曾青

雌黃

雄黃

醫學綱目卷補遺方

五

磁石

各四兩

金牙

二兩半

右六味各搗縮下篩惟丹砂雌黃雄黃三味以醱醋浸之曾青用好酒於銅器中漬紙密封訖日中曝百日經憂急五日亦得無日以火煖之然後各研令如細粉以醱酢拌使乾濕得所內土釜中以六一泥固濟勿令泄氣乾後安鐵環施脚高一尺五寸置釜上以漸放火無間軟硬炭等皆得初放火取熟兩秤炭各長四寸置釜上待三分盡即益如此三度盡用熟火然後用益生炭其過三上熟火已外皆湏加火漸多及至一伏時其火已欲近釜即便滿就釜下益炭經兩度即罷火盡極冷然後出之其藥精飛化凝著釜上五色者上三色者次一色者下但色光明皎潔如雪最佳若飛上不盡更令與火如前以雄鷄翼掃取或多或少不定研和東膏丸

如黍粒 治偏風大風惡疾癩癧癰瘡毘打等最良服
法平旦空腹一丸如黍米為度其瘡病積久百方不瘥
又加心腹脹滿上氣身面脚等並腫垂死者服一丸吐
即瘥亦有不自吐瘥者若不吐復不瘥者更服一丸半仍
不瘥者後日增半丸漸服無有不瘥氣亦定當吐出青
黃白物其因瘡兩脇下有癍塊者亦當消除若心腹不
脹滿者可與一丸日日加之以知為度不必專瀆吐亦
可一丸即瘥勿併與服亦可三日一服皆須以意斟酌
量得其宜或腹內有水便即下者勿怪若患瘡日近精
神健亦可斟酌病人藥性併與兩丸作一丸頓服之皆
至午後食勿使冷勿使熱鼓漿粥任意食之若病瘡盜
汗虛弱者日服一丸至三日吐即止若患瘡不汗氣復
不流脚冷者服一丸至三日若不汗氣復脚即煖有潤

八 醫學綱目卷補遺方

汗不至三日吐即止若患瘡無顏色者服藥後三日即
有顏色亦有瀆吐差者亦有服少許而差者亦有殺藥
強入服三四丸始覺藥行者凡人稟性不同不可一槩
與之但作黍米大服之為始漸加以知為度藥力驗壯
勿併多服特慎油麩魚肉蒜當清淨服之若有患久不
瘥在牀羸瘦併腹脹滿及腫或下痢者多死但與藥救
之十人中或瘥三四人也又癰疽積聚服一刀圭以飲
漿水送下治諸卒死中惡客忤霍亂腹滿體帶五尸症
惡風症忤大病相易死亡滅門狂癩鬼語已死氣絕心
上微煖者扶起其頭按開口不可開球去兩齒以漿飲
送藥藥下即活諸久病者日服一刀圭覆令汗汗出即
愈不愈者不過再服亦有不汗而瘥復有不汗不愈者
服如上法加半刀圭以瘥為度常以絳囊帶九刀圭散

男左女右小兒繫頭上辟瘴毒惡時氣射公小兒患可
以苦酒和之塗方寸紙上著兒心腹上令藥在上治之
亦有已死者冬二日夏一日與此藥服得藥下便活若
加金牙磁石者服至五服內必令人吐逆下利過此即
自定其藥如小豆大為始從此漸小不得更大大風惡
癩可二十服偏風癱瘓諸惡風癩病等亦可二十服自
餘諸惡病者皆止一二服量入輕重強弱不得多與若
欲解殺藥但爛煮食肥猪肉服此藥後小應頭痛身熱
一二日來大不能得食味後自漸得氣味五日後便能
食若貪食過多者宜耶之若服藥下悶亂可煮木防已
湯服之即定凡言刀圭者以六粟為一刀圭一說云三
小豆為一刀圭

作土釜法

醫學綱目卷補遺方

七

其法取兩箇瓦盆各受二大斗許以甘土塗其內令極
乾又一法作一瓦釜作一熱鐵釜各受九升瓦在上鐵
在下其狀大小隨藥多少不必依此說

作六一泥法

赤石脂

牡礪

滑石

礬石

黃礬

鹵土

蚯蚓屎各二兩

右取醱酢以足為度若無鹵土以鹽代之先作甘土泥
以泥各別裹前黃礬等五種作團裹之勿令泄氣以火
燒周三日最好一日亦得出火破團取藥各搗碎絹篩
然後與蚯蚓屎鹵土等分以酢和之如稠粥既得好酢
可用二分酢一分水和用取前瓦盆以此泥塗之會青
如蚯蚓屎如黃連佳世少此者好崑崙碌亦得瘥病丹
砂亦搗粟砂亦得舊不用磁石金牙今加之 用治萬

種惡風神良凡有患連年積歲不可治者宜湏合此一劑皆以王相日天晴明齋戒沐浴如法合之

述曰古之仙者以此救俗特爲至秘余以大業年中救以合和而苦雄黃曾青難得後於蜀中遇雄黃大賤又於飛鳥玄武大獲曾青蜀人不識今滇識者隨其大小但作蚰蜍屎者即是如此千金可求遂於蜀縣魏家合成一釜以之治病神驗不可論宿癘風氣百日服者皆得痊愈故叙而述焉 凡雄黃皆以油煎九日九夜乃可入丹不爾有毒慎勿生用丹必熱毒不堪服宜慎之

出千金方

◎ 杭州圖書館