

醫方類聚卷之二百二十二

婦人門 十七

姪娠 二

千金方

姪娠惡阻

凡婦人虛羸血氣不足腎氣又弱或當風飲
冷太過心下有痰水者欲有胎而喜病阻所
謂欲有胎者其人月水尚來顏色肌膚如常
但苦沉重憤悶不欲食飲又不知其患所在



脉理順時平和則是欲有胎也如此經二月
 日後便覺不通則結胎也阻病者患心中憤
 憤頭重眼眩四肢沉重懈惰不欲執作惡聞
 食氣欲噉鹹酸果實多卧少起世謂惡食其
 至三四月日已止皆大劇吐逆不能自勝舉
 也此由經血既閉水滯於藏藏氣不宣通故
 心煩憤悶氣逆而嘔吐也血脉不通經絡否
 溢則四肢沉重挾風則頭目眩也覺如此候
 者便宜服半夏茯苓湯數劑後將茯苓九淡

水消除便欲食也既得食力體強氣盛力足
 養胎母便健矣古今治阻病方有十數首不
 問虛實冷熱長少殆死者活於此方半夏茯
 苓湯治妊娠阻病心中憤悶空煩吐逆惡聞
 食氣頭眩體重四肢百節疼痛煩沉重多卧少
 起惡寒汗出疲極黃瘦方

半夏簡易方湯生薑各叁拾銖○簡乾地

黃簡易方茯苓各拾八銖○簡橘皮簡易方二

兩旋復花簡易方細辛人參芍藥

芎藭 桔梗 甘草 各拾貳銖〇簡
 右十二味咬咀以水壹斗煮取三升分三
簡易方每服三錢水一盞煎七分去滓服 服若病阻積月日不
 得治及服藥冷熱失候病變客熱煩渴口
 生瘡者去橘皮細辛加前胡知母各十二
 銖若變冷下痢者去乾地黃入桂心十二
 銖若食少胃中虛生熱大便悶塞小便赤
 少者宜加大黃十八銖去地黃加黃芩六
 銖餘依方服一劑得下後消息看氣力冷

熱增損方調定更服一劑湯便急服扶苓
 丸令能食便強健也忌生冷醋滑油膩菘
 菜海藻 簡易方忌猪羊 〇和劑局方治姪
 娠惡阻心中憤悶頭目眩運四肢怠惰百
 節煩疼胃隔痰逆嘔吐惡心嫌聞食氣好
 酸鹹酸多臥少起全不進食旋復陳花皮
 去穢 甘草 多微 人參 白芍藥 桔梗 芎藭
 各半 地黃 熟乾者三分 赤茯苓 去皮 半夏
 兩 湯洗拾遍切焙壹兩壹分 右為釐末每服
 〇徐氏胎產方壹兩二錢

二錢衛生寶鑑胎產方五錢水壹盞半生薑四片拔
方胎產同煎至七分一本及實去滓稍熱
方三片鑑八分

食前服醫方集成右咬咀每服三錢水一

盞姜四片煎八分空心熱服南北經驗方

經方此下云鄭氏無旋復加細辛紫蘇

葉有客熱煩渴口瘡去陳皮細辛加前胡

知母腹冷下利去地黃加桂心胃中虛熱

大便秘小便澀去地黃加黃芩六分大黃

乙錢二分炮濟生依局方加次服茯苓圓

即痰水消除便能食三因方治證與和半

夏湯洗七次三兩茯苓熟地黃各一兩橘皮細辛

人參芍藥川芎紫蘇葉桔梗甘草各一兩二錢

右為剉散每服四大錢水二盞姜七片煎

至七分去滓空腹服有客熱煩渴口生瘡

者去橘皮細辛加前胡知母腹冷下利者

去地黃入桂心炒胃中虛熱大便閉小便

澀加大黃壹兩去地黃加黃芩六錢婦人大

全良方山千金以對之此思邈處方之妙

也若孕婦羸弱胎孕不牢則動必成咎全

在醫者相人強弱以投之又何慮焉半夏

泡洗七生薑兩茯苓熟地黃各參兩橘紅北

細辛人參芍藥紫蘇川芎各壹兩○玉機微義各二兩

苦梗甘草各半兩右咬咀每服四大錢拔粹方五錢

水二錢薑七片煎至七分去滓空心溫

服兼服茯苓圓局方與崔氏無紫蘇細辛

有旋覆花壹兩有客熱煩渴口搶去橘皮

細辛加前胡知母各三兩腹冷下痢者去

地黃加炒桂心貳兩胃中虛熱大便秘小

便赤澁加大黃叁兩去地黃加黃芩壹兩

然半夏雖能動胎若炒過則無妨

茯苓圓治妊娠阻病患心中煩悶頭眩重憎

聞飲食氣便嘔逆吐悶顛倒四肢垂弱不自

勝持服之即效和劑局方常服此藥消痰水令能食強力養胎要先

服半夏茯苓湯兩劑後可服此方

茯苓局方婦人大全良方拔粹方徐氏胎產方赤茯苓聖濟總錄白茯苓去黑

皮人參局方去蘆總錄桂心熬○局方總錄錄各壹兩

乾薑諸方半夏局方湯洗七橘皮各壹兩

去白焙乾拔粹方胎白朮葛根總錄甘

草諸方炙拔粹方枳實各二兩○局方去
上八味各三兩拔粹方一方加麥門冬肘後方加五味子

右十味為末蜜和為丸如梧子飲服二十
丸漸加至三十片良方拔粹方承類鈐方

三五日三局方鈐方温米飲下空肘後不
用乾薑半夏橘皮白朮葛根只五味又云

妊娠忌桂故熬良方鈐方云壹方有麥門
桃李雀○醫方集成治妊娠惡阻停痰惡

聞食氣當與茯苓湯兼進葛根枳實去白

黃白朮甘草灸各二兩赤茯苓去人參陳皮

乾姜剉肉桂去皮○南北經驗方半夏湯

七次焙右為末煉蜜丸如梧桐子每服五

十丸衛生寶鑑空心米飲下袖珍

治妊娠惡阻嘔吐不下食方

青竹茹各十橘皮各十茯苓各壹半

夏參拾

右五味咬咀以水六升煮取二升半分三

服不瘥類作

橘皮湯治妊娠聖濟總錄此下有惡阻二字嘔吐不下食方

橘皮 竹茹 人參 白朮各十生薑八厚朴拾貳 兩

右六味咬咀以水七升煮取二升半分三服不瘥重作○總錄陳橘皮湯浸去白焙竹茹人參白朮各叁兩厚朴去麤皮塗生薑右五味麤擣篩每服三錢匕以水壹盞生薑五片同煎至七分去滓溫服不拘時候

徐之才逐月養胎方

妊娠壹月名始胚飲食精熟酸美受御聖惠方甘

美更御宜食大麥母食腥辛是謂才正

妊娠壹月足厥陰脉養不可針灸其經足厥陰內屬於肝肝主筋及血壹月之時血行否澁不為力事寢必安靜無令恐畏
妊娠壹月陰陽新合為胎寒多為痛熱多卒驚舉重腰痛腹滿胞急卒有所下當預安之宜服烏雌鷄湯方

烏雌雞壹隻治如食法 茯苓 阿膠各貳兩 吳茱

萸升壹 麥門冬五合 婦人參去心 大參 芍藥

白朮各叁兩 甘草 生薑各壹兩

右十味咬咀以水壹斗二升煮雞取汁六

升去雞下藥煎取三升內酒三升并膠烱

盡取三升良方去滓 放溫每服壹升日三〇聖

惠方烏雞壹隻理如食法 甘草壹兩炙 麥門冬壹

去心 茯苓兩 吳茱萸半兩湯浸七 白芍藥

壹兩白朮兩 人參壹兩去蘆頭 生薑壹兩 黃明膠兩

搗碎炒令黃燥 右件藥細剉先以水壹斗煮雞取

汁五升去雞內諸藥於雞汁中煮取三升

下清酒二升更煎取四升去滓每服壹少

盞食前溫服

補胎湯若曾傷壹月胎者當預服此方

細辛壹兩 防風貳兩 乾地黄 白朮各叁兩

良方已上二 生薑肆兩 吳茱萸 大麥各五

烏梅壹兩

右八味咬咀以水七升煮取二升半分三

服先食服寒多者倍細辛菜萹熟多渴者
 去之加栝萹根二兩若有所思去大麥加
 柏子人三合一方有人參壹兩良方忌生
 李雀肉菜蕪萹桃
 等物 ○聖惠方細辛壹兩洗防風一兩
 頭去苗土烏梅肉一兩白朮壹兩熟乾地黃二兩吳茱
 萸半兩湯浸七大麥壹合揀人參壹兩去
 右件藥細剉和勻每服半兩以水壹大盞
 入生薑半分煎至五分去滓食前溫服
 妊娠二月名始膏無食辛燥居必靜處男子

勿勞百節皆痛是為胎始結
 妊娠二月足少陰脉養不可針灸其經足少
 陽內屬於膽主精二月之時兒精成於胞裏
 當慎謹驚動也

妊娠二月始陰陽踞聖惠方經有寒多壞不
 成有熱即萎悴中風寒有所動搖心滿臍下
 懸急腰背強痛卒有所下乍寒乍熱宜服艾

葉湯方
 艾葉 丹參 婦人大全 當歸 麻黃 各貳

良方三兩

人參 阿膠 各參兩○良方各二兩 甘草 肆分○良方壹兩

生薑 陸附大棗十貳枚

右九味咬咀以酒三升水壹斗煮減半去

滓內膠煎取三升分三服 良方忌海藻菘菜 壹方

用烏雌雞壹隻宿肥者治如食法割頭取

血內三升酒中相和次以水一斗二升先

煮取汁去雞內藥煎取三升內血酒并膠

煎取三升分溫三服○聖惠方雞艾湯烏

雞 壹隻理如食法 艾葉 壹兩微炒 阿膠 二兩擣碎 甘草

壹兩炙 生薑 壹兩 麻黃 壹兩去根節 丹參 壹兩 當歸

壹兩 剉人參 壹兩去蘆頭 大棗 十二枚 右件藥細

剉和勻先以水壹斗煮雞取汁五升去雞

內藥煮取三升入好酒二升煎至四升去

滓食前溫服壹小盞

黃連湯若曾傷二月胎者常預服此方

黃連 人參 各一兩 吳茱萸 五合 生薑 參兩 生地

黃川阿膠 五兩一方

右五味咬咀以酢漿七升煮取三升分四

服日三夜壹十日壹修合若頗覺不安加
 烏梅壹升加烏梅者不用漿直用水耳壹
 方用當歸半兩婦人大全良方云忌猪肉冷水蕪荑○聖惠
 方治若曾傷二月胎當預服黃芩散方黃
 芩壹兩去阿膠一兩搗碎當歸半兩
 劉微吳茱萸一分湯浸七右件藥搗篩為
 散每服四錢以水壹大盞入生薑半分煎
 至五分去滓食前溫服如覺大段不安加
 烏梅一兩

妊娠三月名始胎當此之時未有定儀見物
 而化欲生男者操弓矢欲生女者弄珠璣欲
 子美好數視璧玉欲子賢良端坐清虛是謂
 外象而內感者也○聖惠方凡妊娠第三月
 名始當此胎時形像始化未有定儀見物而
 變欲令見玉侯貴人端庄美兒不欲見貧窮
 殘疾偃僂侏儒醜惡刑人猿猴之類無食蔬
 鬼無懷刀繩其欲生男者持弓矢逐雄雞乘
 壯馬於田野觀虎豹及走犬其欲生女者著

珥璫施環佩弄珠璣衣錦繡欲子美好者玩
 白璧看珠珍觀孔雀食鯉魚欲生男多智刀
 者噉牛心食大麥欲子賢良者宜矜莊務和
 雅又生無斜席立無偏倚行無邪經口無邪
 視耳無邪聽口無邪言心無邪念食無邪嚮
 □無斜身無作勞傷無大喜怒味須芳馨□
 □饑臭是謂外象彰而內有所感也
 妊娠三月手心主脉養不可針灸其經手心
 主內屬於心無悲哀思慮驚動

妊娠三月為定形有寒大便青有熱小便難不
 赤即黃卒驚恐憂愁嗔怒喜頓仆動於經脉
 腹滿繞臍苦痛或腰背卒有所下雄鷄湯方

雄鷄壹隻治黃芩白朮生薑各壹兩

如食法麥門冬五合○良芍藥肆兩大棗貳十

方切甘草良方人參二茯苓阿膠各貳兩

右十壹味咬咀以水壹斗三升良方壹煮

鷄臠半出雞內藥煮取半內清酒三升并

膠煎取三升分三服一日令盡當溫胃一

方用當歸芎各二兩不用黃芩生薑良方忌海

藻菘菜酢物○聖惠方雄雞壹隻肥者

桃李雀肉等○聖惠方 草一兩炙 人參壹兩去 麥門冬一兩去心 白茯苓壹兩去

芎壹兩 白朮兩壹 阿膠二兩搗研 當歸壹兩到

芎壹兩 白芍藥兩壹 大棗十二枚 右件藥細剉

先以水一斗煮雞取汁五升去雞肉諸藥

又煮至三升入清酒二升更煎至四升去

滓食前溫服壹小盞

茯神湯聖惠方名 若曾傷三月胎者當預服

此方

茯神 丹參 龍骨各壹兩 阿膠聖惠方搗

當歸聖惠方 甘草聖惠方 人參各貳兩

方去大棗二拾壹枚 聖惠方二十枚

赤小豆二拾壹粒 聖惠方合炒熟

右九味咬咀以酢漿壹斗煮取三升分四

服分食服七日後服一劑腰痛者加桑寄

生二兩深師有薤白二兩麻子壹升良方忌同

前 ○聖惠方右件藥細剉和勻每服半兩

以水壹大盞煎至五分去滓食前溫服
妊娠四月始受水精以成血脉食宜稻粳羹
宜魚鴈是謂盛血氣以通耳目而行經絡
妊娠四月手少陽脉養不可針灸其經手少
陽內輸三焦四月之時兒六腑順成當靜形
體和心志節飲食

妊娠四月婦人大全良方此有寒心下愠愠
欲嘔胃膈滿不欲食有熱小便難數數如淋
狀臍下苦急卒風寒頸項強痛寒熱或驚動

身軀腰背腹痛往來有時胎上迫有心煩不
得安卒有所下菊花湯方

菊花鷄子大壹升○良大棗十貳

人參壹兩甘草各貳兩麻黃良方阿

膠各參半半夏四兩○良薑五

右十味咬咀以水八升煮減半內清酒三

升并阿膠煎取三升分三服溫卧當汗以

粉粉之護風寒四五日壹方用烏雌雞壹

隻煮水煎藥良方忌羊肉海

調中湯若曾傷四月胎者當預服此方

白芍藥

生薑

各四兩

厚朴

婦人大全良方貳兩

生李

根白皮

枳實

良方貳兩

白朮

柴胡

各叁兩

續斷

芎藭

甘草

各一兩

當歸

一兩

烏梅

壹升

右十二味咬咀以水壹斗煮取三升分四

服日三夜膏八日後復服壹劑

良方云一

二兩忌海藻菘菜桃李雀肉

○聖惠方治曾傷三四月

胎者預服白芍藥

壹兩

甘草

壹兩

白朮

壹兩

柴胡

壹兩

烏梅肉

壹兩

續斷

壹兩

芎藭

壹兩

枳實

壹兩

生李根

壹兩

皮厚朴

壹兩

薑汁炙令香熟

右件藥細剉

和勻每服半兩以水壹大盞煎至五分去

滓食前溫服

妊娠五月始受火精以成其氣卧必晏起沐

浴浣衣深其居處厚其衣服朝吸天光以避

寒殃其食稻麥其羹牛羊和以菜蕒調以五

味是謂養氣以定五臟

類聚卷之三十三

十一

妊娠五月足太陰脉養不可針灸其經足太陰內輸於脾五月之時兒四肢皆成無大飢無其飽無食乾燥無自炙熱無大勞倦聖惠方此下云無火喜怒也

妊娠五月婦人大全良方五月毛髮初生有熱苦頭眩心亂

嘔吐有寒苦腹滿痛小便數卒有恐怖四肢

疼痛寒熱胎動無常處腹痛悶頓欲仆卒有

所下阿膠湯主之良方又名旋覆花湯

阿膠四兩良方炙人參一兩生薑六兩當歸 芍藥

甘草良方炙黃芩各貳兩旋復花貳合良方貳兩吳

茱萸七合良方去心麥門冬青升良方去心

右十味咬咀以水九升煮藥減半內清酒

三升并膠微火煎取三升半分四服日三

夜一先食服便愈不瘥再服良方忌海藻壹

方用烏雌鷄壹隻割取咽血內酒中以水

煮雞以煎藥減半內酒并膠煎取三升半

分四服

安中湯曾傷五月胎者當預服此方

本草綱目卷之二十三

卷之二十三

黃芩雨當歸 芎藭 乾地黄 人參各二

兩甘草婦人大全良方炙芍藥各參兩生薑陸兩麥門

冬豈升○良方去心五味子 大麻人各五合大棗

參拾五枚

右十二味咬咀以水七升清酒五升煮取

三升半分四服日三夜一七日復服壹劑

良方忌如前

妊娠六月始受金精以成其筋身欲微勞無

得靜處出遊於野數觀走犬及視走馬食宜

驚鳥猛獸之肉是謂變腠理紉筋以養其力以堅背脊

妊娠六月足陽明脉養不可針灸其經足陽

明內屬於胃主其口目六月之時兒口目皆

成調五味食甘美無太飽

妊娠六月卒有所動不安寒熱往來腹內脹

滿身體腫驚怖忽有所下腹痛如欲產手足

煩疼宜服麥門冬湯方

麥門冬豈升○婦人大全良方去心人參 甘草良方炙已

類聚卷之三十三

十一

藥類彙編

十一

上二味各一兩黃芩各二兩乾地黄各三兩阿膠各四兩生薑各五兩陸大棗十五枚

右八味以水七升煮減半內清酒二升并

膠煎取三升分三服良方云每如人行三四里中間進

糜粥良方忌海藻菘菜蕪荑壹方用烏雌雞壹隻煮

水以煎藥

柴胡湯若曾傷六月胎者當預服此方

柴胡四兩從蓉二兩白朮二兩芍藥青作甘草八兩

大全良麥門冬良方去心三兩芎藭各貳兩生薑陸

乾地黄五兩大棗各拾枚

右十味咬咀以水壹斗煮取三升分四服

日三夜一中間進糜粥勿食生冷及堅硬

之物七日更服一劑○良方云忌海藻菘

菜蕪荑桃李雀肉等一方有黃芩二兩

妊娠七月始受木精以成其骨勞身搯肢无

使定止動作屈伸以運血氣居處必燥飲食

避寒常食稻粳以密腠理是謂養骨而堅齒

妊娠七月手太陰脉養不可針灸其經手太

黃芩

十一

陰內屬於肺主皮毛七月之時見皮毛已成
 无火言无號哭无薄衣无洗浴无寒飲
 妊娠七月忽驚恐搖動腹痛卒有所下手足
 厥冷脉若傷寒煩熱腹滿短氣常苦頸項及
 腰背強葱白湯主之方

葱白長三四寸半夏婦人大全良方洗切炒麥門冬
各壹升○旋復花貳合○良黃芩壹兩人參
良方去心當歸良方黃耆各叁兩阿膠兩
 甘草良方生薑八兩

右十壹味咬咀以水八升煮減半內清酒
 三升及膠煎取四升每服壹升日三夜一
 温臥當汗出若不出者加麻黃二兩煮服
 加前法若秋後勿強責汗良方忌羊肉魚
 一方以黃雌雞壹雙割咽取血內酒中煮
 鷄取汁以煎藥
 杏人湯若曾傷七月胎者當預服此方

杏人婦人大全良方甘草各貳兩○紫葳
去雙仁皮尖碎乾薑各叁兩○良方日麥門
 兩鍾乳良方研乾薑上二味各二兩

冬良方吳茱萸壹升粳米五合五味子三合。
合良方五

右九味咬咀以水八升煮取三升半分四

服日三夜一中間進食七日服一劑良方

薄荷菜一方用白鷄壹隻煮汁煎藥忌海

妊娠八月始受土精以成膚革和心靜息無

使氣極是謂密腠理而光澤顏色

妊娠八月午陽明脉養不可針灸其經手陽

明內屬於大腸主九竅八月之時兒九竅皆

成無食燥物無輒失食無忍大起

妊娠八月中風寒有所犯觸身體盡痛乍寒

乍熱胎動不安常苦頭眩痛繞臍下寒時時

小便白如米汁或青或黃或使寒慄腰背苦

冷而痛目眩眩芍藥湯主之方

芍藥婦人大全良方四生薑各四兩厚朴貳兩

方良方甘草壹兩白朮良方神珍方壹兩人參

各叁兩 薤白切壹升

右八味咬咀以水五升清酒四升合煮取

三升分三服日再夜一良方袖珍方忌海藻菘菜桃李雀肉

等一方用烏雌雞煮汁以煎藥

葵子湯若曾傷八月胎者當預服此方

葵子貳升甘草婦人大全良方炙三兩厚朴各貳兩白朮

柴胡各叁兩芍藥四兩〇良方二兩生薑陸兩大棗拾

枚

右八味咬咀以水九升煮取三升分三服

日三凡十日壹劑良方壹日服壹劑忌海藻菘菜桃李雀肉等

一方用烏雌雞壹隻煮水以煎藥

妊娠九月始受石精以成皮毛六腑聖惠方五歲六

自持而待之是謂養毛髮致才力聖惠方緩衣寬帶

妊娠九月足少陰脉養不可針灸其經足少

陰內屬於腎腎主續縷九月之時兒脉續縷

皆成無處濕冷無着炙衣聖惠方作無飽飲食

妊娠九月若卒得下痢腹滿懸急胎上衝心

腰背痛不可轉側短氣半夏湯方

半夏婦人大全良方洗麥門冬良方去心各五合吳茱萸

良方洗 麥門冬 良方去心 吳茱萸

類聚書

當歸 阿膠 各參兩 良方炙 乾薑 壹兩 大棗 十貳枚

右七味咬咀以水九升煮取三升去滓內

白蜜八合微火上溫服四服痢即止 良方

血物 壹方用烏雌雞壹隻煮汁煎藥

猪腎湯若曾傷九月胎者當預服此方

猪腎 壹 茯苓 桑寄生 乾薑 乾地黄

芎藭 各參兩 白朮 四兩 附子 中者一枚 良方炮大

豆 合參 麥門冬 一升 良方去心

右十味咬咀以水壹斗煮腎令熟去腎內

諸藥煎取三升半分四服日三夜壹九十

日更壹劑 良方忌猪肉冷水燕 黃桃李雀肉酢物等

妊娠十月五臟俱備六腑齊通納天地氣於

丹田故使關節人神皆備但俟時而生

妊娠壹月始胚二月始膏三月始胞四月形

體成五月能動六月筋骨立七月毛髮生八

月臟腑具九月穀氣入胃十月諸神備日滿

即產矣宜服滑胎藥入月即服

丹參膏養胎臨月服令滑而易產方

丹參半斤 芎藭 當歸各貳兩 蜀椒五合 有熱者以大麻

人五合代

右四味咬咀以清酒洩濕停壹宿以成煎猪膏四升微火煎膏色赤如血膏成新布絞去滓每日取如棗許內酒中服之不可逆服至臨月乃可服舊用常驗

甘草散令易生母無疾病未生壹月日預服過三十日行步動作如故兒生墮地皆不自覺方

甘草兩 黃芩壹兩 乾薑 吳茱萸 大豆

黃卷 麻子人 桂心 大麥蘖各參兩 壹方用

梗米

右八味治下篩酒服方寸匕日二暖水服

亦得○產寶小品預服散令易產母無疾

病未生壹月已前預服過三十日行步不

覺兒生廿身八分 黃芩二分 大豆黃二分 粳米

合壹分 乾薑二分 桂心二分 吳茱萸二分 冬麻人二分 搗如

泥右八味搗篩為散空心煖酒調方寸匕

忌

千金圓主養胎治產難顛倒胞不出服壹丸
傷毀不下產餘病汗不出煩滿不止氣逆滿
以酒服壹丸壹名保生丸

甘草 貝母 秦椒 大豆黃卷 乾薑

桂心 黃芩 粳米壹作糯米 石解 石膏各陸

銖拾貳當歸 麻子叁合

右十二味爲末蜜和丸如彈子大每服壹
丸日三用棗湯下一方用蒲黃一兩

蒸大黃圓治妊娠養胎令易產方

大黃叁拾銖蒸枳實 芎藭 白朮 杏仁各十

銖八芍藥 乾薑 厚朴各十銖 吳茱萸壹兩

右九味爲末蜜丸如梧桐子大空腹酒下
二丸日三不知稍加之

滑胎令易產方

阿膠八兩 滑石叁兩 車前子壹升

右三味治下篩飲服方寸匕日再至生月
乃服藥利九竅不可先服

妊娠諸病

第一胎動及數墮胎

治妊娠二三月上至八九產寶月胎動不安

腰痛婦人大全良方已有見方

艾葉 阿膠肘後方芎藭肘後方當歸各參

甘草貳兩良方鈐方一

右五味以水八升煮取三升去滓內膠肘後

方云更令消分三服日三〇產寶方芎藭

當歸各四艾葉二兩甘草一兩阿膠三兩右以

水煮取二升分溫三服

治妊娠胎動去血腰痛方

阿膠二兩芎藭 當歸 青竹茹各

兩〇肘後方各三兩婦人大

右四味以水壹斗肘後方煮銀二斤取

六升去銀內藥煎取二升半內膠令烱分

三服不瘥重作一方用甘草二兩〇良方

右以水十瓊內銀壹斤煮至五瓊去銀入

上件藥三味煮至二瓊半去滓入膠再煎

膠烱分溫三服空心自早至暮盡未效再作

葱白湯治妊娠胎動不安腹痛方

葱白切壹升阿膠二兩當歸續斷芍藥各

右五味咬咀以水壹斗先煮銀六七兩取七升去銀內藥煎取二升半下膠令烱分三服不差重作

治妊娠胎動晝夜叫呼口噤脣拳肘後方及

下重痢不息方艾葉咬咀以好酒五升煮

取四升去滓更煎取壹升服口閉者格口

灌之藥下卽瘥神方萬亦治妊娠腰痛及

妊娠熱病并妊娠卒下血○肘後方取已

成艾葉壹莖好酒五升煮取四升去滓更

煎取壹升壹服之口閉者開口灌之藥下

卽安

旋復花湯治妊娠六七月胎不安常服之方

旋復花兩壹半夏兩芍藥兩生薑各二枳實兩

厚朴 白朮 黃芩 茯苓 各參兩

右九味咬咀以水壹斗煮取二升半分五

服日三夜二先食服 婦人大全良方忌羊肉錫醋桃李雀肉

○袖珍方治療妊娠六七月胎不安常處

亦名阻病旋覆花 壹兩 厚朴 白朮 枳殼 黃芩

半夏 炒壹兩 芍藥 生姜 各二兩 右咬咀每服壹

兩水棧半煎至壹棧去滓溫服食前

治妊娠數墮胎方取赤小豆為末酒服方寸

七日二亦治妊娠數月月水尚來者 婦人大全

良方 ○聖惠方治懷胎數落而不結實者

此是子宮虛冷所致赤小豆 二升於濕地種令牙生曝乾

右搗細羅為散每於食前以溫酒調下二

錢

第三漏胞

治妊娠下血如故名曰漏胞胞乾便死方生

地黃半斤咬咀以清酒三升煮三沸絞去

滓服之無時能多服佳姚大夫加黃雌鷄

一頭治如食法崔氏取雞血和藥中服○
備預百要方妊娠下血不止名漏胞胞乾
則死方生地黄半斤清酒壹升煮三兩沸
去滓無時服

治妊娠血下不止名曰漏胞血盡子死方乾
地黃搗末以三指撮許酒服婦人大全良方酒服方寸
七日三不過三服夜一○簡易方地髓湯治
妊娠漏胎下血不止胞乾子死若因房附
名曰傷胞生乾地黃右爲末酒調方寸匕

或止川生地黄汁壹升酒五合和煎三五
沸分五服日三夜二

又方生地黄汁壹升清酒備預百要方暖酒四合煮

三四沸頓服不止頻服胎產救急方生地黄酒煎服又爲末

酒調○產實療妊娠下血不止血盡子死

若因房室下血名傷胞同此療方生乾地
黃壹味爲末酒服方寸匕日三服夜一服

衛生易簡方酒即愈又方生地黄亦得若
腹內冷加乾薑等分依前服王嶽產書治

胎漏下血不止宜服藥止之血盡則子死
生地黃汁壹升以無灰酒四合同煎三五
沸分作四度服立差

又方乾薑

二兩○王岳產書半兩炮
婦人大全良方二兩半

乾地黃

四兩○產書二兩良方
五兩備預百要方等分

右二味

產書此下有
剉熬二字

治下篩以酒服方寸

匕日再三服

產書無灰
酒調兩錢

○產寶療妊娠下

血如月信來若胞乾非但只損子亦傷其

母方乾地黃

五兩
附乾薑兩

右以為散酒服三

錢七日夜三四服

時後方等分未服膏
七不過三服姚同

聖

濟總錄治妊娠胎漏下血不止腹痛地黃

散方熟乾地黃

焙乾薑炮各三分

右二味搗羅

為散每服二錢匕食前溫酒調下衛生易

簡方治胎漏下血及因事下血用生乾地

黃乾薑等分為末每服二錢溫酒調下

第三子煩

竹瀝湯治妊娠常苦煩悶

徐氏胎產方此
下云心膽怯

是子煩

竹瀝壹升○胎產方 麥門冬胎產方 防風

黃芩各叁兩 茯苓四兩

右五味以水四升合竹瀝煎取二升神巧萬全
方二分三服不瘥再作○胎產方右咬咀
每服四錢淡竹葉數片同煎服不得眠加

酸棗仍

又方時時服竹瀝隨多少取瘥止神巧萬全
方全良

方同

第四心腹腰痛及脹滿

治如娠心痛方青竹皮一升以酒二升煮三

兩沸婦人大全良方煮取頓服之○聖惠

方青竹茹二兩右以水二大盞煎至一大盞

去滓分溫三服肘後方刮青竹皮以水煮

濃汁服三升聖濟總錄竹茹湯青竹茹剉

兩右壹味參麤擣篩每服三錢匕水壹大盞

煎七分去滓溫服不拘時

又方破生雞子壹枚酒和服之婦人大全良方同

又方白蜜參兩○神巧羊脂八兩青竹茹壹

右三味合煎食頃婦人大全良方食前服如棗核大三枚日三

又方蜜壹升和井底泥泥心下

又方燒棗二七枚為末尿服之立愈○婦人

大全良方治妊娠四五月忽心腹絞痛大

紅棗十四枚燒存性產寶則後方衛生為易簡方燒令焦

末以童子小便調下管見大全良方同

治妊娠腹中痛方生地黃三斤搗絞取汁用

清酒壹升合煎減半頓服婦人大全良方同

又方燒車釭脂內酒中服亦治妊娠欬嗽并

產難三日不出

又方取蜜壹升頓服良

治妊娠腹中滿痛又惡心不得飲食方

黃芩參兩芍藥四兩白朮六兩

右三味以水六升煮取三升分三服

半日令藥盡微下水令易生月飲一劑為

善

治妊娠忽苦肘後方心腹痛方燒菹令赤熱

備預百要 方候冷 三指撮許酒服之立產○產寶

療妊娠心腹痛不可忍方 煇壹斤燒令赤以

三指婦人大全良方兩指取一撮酒調服即差聖惠

方 搗錢右於炭火上燒如火色候冷以温

酒調服之

治妊娠傷胎結血心腹痛方 取小兒尿二升

頓服之立瘥大良

治妊娠中惡心腹痛方 新生鷄子二枚破著

杯中以糯米粉和如粥頓服亦治妊娠卒

胎動不安或但腰痛或胎轉搶心或下血

不止

又方水三升洗夫靴剔汁温服

治妊娠中蠱心腹痛方 燒敗鼓皮酒服方匕

須臾自呼蠱主姓名

治妊娠腰痛方 聖惠方婦人大全良方時後

方 聖酒 大豆二升以酒三升煮取二升頓服

之亦治常人卒腰痛者○聖惠方 大黑豆

二合炒熟○右以酒壹大盞煎取七分去

滓食前分爲二服良方去豆空心頓備預服寶鑑去粗溫服百要方黑豆壹升酒三升煮取七分去豆空心食之

又方麻子三升以水五升煮取汁三升分五服亦治心痛○聖惠方治妊娠心痛煩悶宜服此方大麻人壹合右以水壹大盞煎至六分去滓不計時候分溫二服肘後方同婦人大全良方療妊娠心痛大麻子三升研水八升煎取五升分爲五服

又方鼓二兩榆白皮參兩

右二味熟搗蜜丸如梧桐子大服二七丸聖惠方以溫酒下二十九亦治心痛

又方燒牛屎焦末水服方寸匕日三服

又方地黃汁八合酒五合合煎分溫服

治妊娠脹滿方取秤錘燒之滓酒中服良亦治妊娠卒下血肘後方同○食醫心鑑以鐵秤

鍾壹枚燒令赤投壹升酒中適寒溫頓服之備預百要同

第五傷寒

治妊娠傷寒頭痛壯熱肢節煩疼方

石膏入兩大青 黃芩各參兩葱白切一升前胡

知母 梔子人各四兩

右七味咬咀以水七升煮取二升半去滓分五服相去如人行七八里久再服

治妊娠頭痛壯熱心煩嘔吐不下食方

知母四兩粳米五合生蘆根壹升○時青竹茹兩

參

右四味以水五升時後方煮取二升半時後

方煮取二升稍稍飲之盡更作瘥止

治妊娠傷寒服湯後頭痛壯熱不歇宜用此

湯拭其身

麻黃半斤竹葉切壹升石膏參升為末○神

右三味以水五升煮取壹升去滓冷用拭身體又以故布揜頭額眉心燥則易之患瘧者加恒山五兩

治妊娠傷寒方

葱白拾莖○是齋方生薑貳兩切○是齋方
醫方連根用二十片經驗良方

右二味以水三升是齋方二大盃煮取壹

升半頓服是齋方煎取八分取汗○

王嶽產書治妊娠傷寒方身體壯熱增寒

嘔逆頭痛腰脚酸疼心腹有氣此之狀候

宜用後方葱十莖生薑兩半右以水壹大盃

煎取半盃無時頻服無求子活人書葱白

湯妊娠傷寒憎寒發熱當發其汗葱白拾莖

生薑貳兩切○婦人右剉如麻豆大以水

二盞煎至壹盞連服取汁南陽活人書澹

同

治妊娠中風寒熱腹中絞痛不可針灸方承

鈐方治妊婦熱病 鯽魚一頭燒作灰擣末酒服方

寸匕取汗

治妊娠遭時疾令子不落方瑣碎錄妊娠得

不傷胎產救急方龍肝散取籠中黃土水

治妊娠得熱病護胎不落 和塗臍乾復塗之一方酒和塗方五寸又

泔清和塗之並佳無求子活人書婦人大全良方同○聖

惠方右取伏龍肝聖濟總錄三兩擣羅爲末用水

調塗臍下二寸方總錄方五寸乾即易之疾差

即止得效方治傷寒熱病護胎方伏龍肝

末水調塗臍下乾則換徐氏胎產方同永類鈐方

時氣傷寒大熱護胎不落伏龍肝即竈心

土作末酒水調塗臍下三寸門五寸乾再

塗

又方犬尿泥塗腹勿令乾

治妊娠熱病方

葱白五兩豉壹升

右二味以水六升煮取二升分二服取汗

○聖惠方治妊娠心煩熱不止方葱白壹

豉心二合右件藥以水二大盞煎至一盞婦人

大全良方去滓分温三服無求子活人書

葱白豉湯葱白貳兩豉半升右以水三升煎

取一升分二服取汗胎產救急方葱豉湯

治妊娠熱病胎不安葱白壹兩香豉兩右

以水三升煎取二升分二服取汗

又方無求子活人書名葱白一物葱白壹把

湯胎產救急方名葱白湯永類鈐方活人書鈐方壹壹把三兩以水三升升活人書鈐方煮令

熟服之取汗食葱令盡亦主安胎若胎已

死者須臾即出○婦人大全良方治胎上

逼心煩悶方又治妊娠六七月已後胎動

困篤葱白二七莖濃煮汁飲之即安若胎

已死服之即出未死即安未效再服

又方車轄脂酒服聖惠方温水大良

又方井底泥泥心平三寸立愈胎產救急方

○聖惠方治妊娠得時氣婦人大全良方

子不落護胎得效方永類鈐方治傷寒熱病護胎方時氣身大熱令令胎不傷方右

取井底泥塗心下乾即易之疾退即止徐

氏胎產方妊娠傷寒護胎法壯熱甚則以

井底泥敷心下令胎不傷

又方青羊屎塗腹上聖惠方水

又方無求子活人書水服伏龍肝一雞子大

徐氏胎產方調服彈子大佳○聖惠方右以伏龍肝擣

羅細研不計時候以水調下壹錢婦人大亦可調為泥塗臍下備預百要方
娠熱病方伏竈

肝水下

治大熱煩悶方王氏集驗方娠傷寒熱病方經驗良方治娠熱

病心悶欲絕 葛根汁二升分三服衛生易簡方云或每服用

葛壹兩水壹盞煎如人行五里久進壹服半盞服日三大效

○無求子活人書葛根一物飲治熱煩悶

葛根如無生葛用乾葛亦得右咬咀煎濃汁每服壹

小盞如人行五里又進壹服

又方燒大棗七枚為末酒和服

又方槐實燒灰取方寸匕酒和服

第六瘧病

治妊娠患瘧湯方

恒山貳兩甘草貳兩黃芩叁兩烏梅拾四枚石膏八兩

右五味咬咀以酒水各壹升半合漬藥壹

宿煮三四沸去滓初服六合次服四合後

服二合凡三服○聖惠方治妊娠瘧疾忽

患不差恒山散方恒山壹兩甘草半兩黃

芩半兩烏梅十四枚故炒○徐石膏壹兩右

竹藥細剉以酒一大盞胎產方作水一大

盞和浸一宿平旦煎至壹盞去滓分爲二

婦人大全良方同胎產方分二服臨發日

又方恒山竹葉各叁兩石膏八兩○婦人粳

米壹伯粒崔氏外臺作糯

右四味咬咀服三錢以水六升簡易方

煮取二升半二盞去滓分三服第壹服

取未發前一食頃服之第二服取臨欲發

服之餘壹服用以塗頭額及胷前五心藥

滓置頭邊常壹日勿近水及進飲食過發

後乃進粥食良方忌生葱菜集

第七下血書久合飲代三氣不動重引

治姪娠忽暴下血數升胎燥不動方牛大散

榆白皮叁兩當歸生薑各二乾地黃四葵

子壹升附薄賦黃阿膠兩四當歸艾

右五味以水五升煮取二升半分三服不

瘥更作服之卒瀉奔去效益高劑不暴出

馬通湯治妊娠卒驚奔走或從高墮下暴出血數升方以水五升煮取二升分三服不

馬通汁壹升 乾地黄 阿膠各四兩 當歸 艾

葉各叁兩

右五味咬咀以水五升煮取二升半去滓

內馬通汁及膠令烊分三服不燒重作

膠艾湯治妊娠二三月上至七八月其人頓

仆失踞胎動不下傷損腰腹痛欲死若有所

見及胎奔上搶心短氣方以水五升煮取二升

艾葉各兩 阿膠 芍藥 甘草 當

歸各貳兩 乾地黄四兩

右七味咬咀以水五升好酒三升合煮取

三升去滓內膠更上火令盡消分三服日

三不瘥更作○聖濟總錄阿膠炒令燥 當歸

切艾葉炒 芍藥 甘草炙 芍藥剉 生乾地黄

焙各壹兩

右七味麤搗篩每服三錢匕水半盞酒半

盞同煎至七分去滓溫服日三三因方治

妊娠不問月數深淺因頓仆胎動不安腰

腹痛或有所下或胎奔上刺心短氣安胎

熟地黃二兩○嚴氏濟生方醫方集成南

兩艾葉炒當歸諸方去甘草炙芍藥諸方

藥川芎阿膠炙各壹兩○諸方黃芪○諸

方去右為剉散每服四錢水一盞半諸方

薑五片煎七分去滓食前集成經驗方

事壹枚溫服胃中逆冷加生姜五片棗三枚

同煎

治妊娠卒下血方葵子壹升以水五升煮取

二升分三服備預百要燒止肘後○聖惠

方治妊娠卒尿血不止方葵子二兩右以

水二大盞煎毛壹盞去滓食前分爲二服

又方婦人人大全良方療娠生地黃切一升以

酒五升煮取三升分三服良方酒四升煮

三亦治落身後血

又方胎產救急方治傷損胎動痛不可忍漏

皆取葵根莖燒作灰以酒服方寸七日三

○聖惠方治妊娠卒尿血不止方葵根莖
燒為灰細研食前以粥飲調下二錢
蟹爪湯治妊娠僵仆失據胎動轉上搶心甚
者血從口出逆不得息或注下血壹斗丑升
胎不出子死則寒熨人腹中急如產狀虛乏
少氣困頓欲死煩悶反覆服藥母得卽安下
血亦止其當產者立生方

蟹爪壹升甘草壹升桂心各貳尺阿膠貳兩胎
救急方
炒各一兩

右四味改咀以東流水一斗煮取三升去
滓內膠烱盡能為一服佳不能者食頃再
服救急方不能盡若口急不能飲者格口
灌之藥下便活也與母俱生若胎已死獨
母活也若不僵仆平安妊娠無有所見下
血服此湯卽止或云桂不安胎亦未必爾
○聖惠方治妊娠僵仆胎轉動上搶心困
篤蟹爪二兩甘草叁分桂心半兩鹿角膠壹兩
微赤剉
右件藥搗令黃燥羅為散每服四錢以

水壹中盞煎至六分去滓不計時候温服

治妊娠胎墮下血不止方

胎產救急方丹參飲治墜墮傷胎下

血腹痛

川參十二兩

時後方

咬咀以清酒

五升煮取三升分三服

婦人大全良方徐氏胎產方同温

日三〇聖惠方治因損娠下惡血不止丹

參

二兩

右件藥以酒壹大盞半煎至壹盞

去滓食前分温二服衛生易簡方治胎漏

下血及因事下血用丹參壹兩半酒五盞

煎三盞分作三服無時大效

又方地黄汁和代赭爲末服方寸匕〇聖惠

方治妊娠落胎下血不止方右研取生地

黃汁壹小盞調代赭末壹錢日三四服婦人

大全良方永類錄方同

又方桑蠶蟲屎燒灰酒服方寸匕〇聖惠方

因損娠下惡血不止右取桑蝎蟲燒灰細

研於食前以温酒調下一錢

香豉湯治半產下血不盡苦來去煩滿欲死

方香豉壹升半以水三升煮三沸漉去滓

內成末鹿角一方寸七頓服之須臾血白
下鹿角燒亦得

第八小便病

治妊娠小便不利方

葵子壹升榆白皮壹把

右二味以水五升煮五沸每服一升日三

○聖濟總錄榆白皮湯榆白皮判冬葵子各一

右二味麤擗篩每服三錢匕以水壹盞煎

至七分去滓空心食前溫服廿三○聖濟

又方聖濟總錄葵子總錄冬茯苓各壹兩○

葵去黑皮

右二味為末以水服方寸匕總錄每服二錢匕以溫水

服廿三小便利則止仲景云妊娠有水氣

身重小便不利洒淅惡寒起即頭眩○簡

易方全生茯苓散治妊娠小便不通特避

寒藥赤茯苓葵子等分○徐氏胎產方黃

子右麤末每服五錢水二盞煎取壹盞去

滓服醫方集成南北經驗方袖珍方同胎產方又去如不通恐是轉胞加髮灰

少許調服極妙易簡方又云或為末每服
 二錢米飲調下不拘時兼治身重惡寒眩
 暈如轉胞加髮三因方用赤茯苓三兩葵子
 五兩細末每服二錢米飲調下治妊娠小
 便不利身重惡寒起則眩暈及水腫者服
 之小便利則愈名葵子散一方入榆白
 皮一兩

治妊娠患子淋方葵子膏升以水三升煮取
 二升再服肘後方衛身婦人大全良方療
 妊娠卒下血及子淋方葵子壹升研水五

升煮取二升分溫三服

又方葵根壹把以水三升煮取二升分再服

肘後方衛身易簡方同 ○聖濟總錄治妊娠患子淋

及小便不通冬葵根湯方葵根壹握判用

亦在壹味以水三盞煎取壹盞半去滓分

溫二服

治妊娠小便不通利方蕪菁子七合聖濟總錄五合

為末水總錄溫水和服方寸匕日三衛生易簡方日二服

○聖惠方蔓菁子叁兩右件藥搗細羅為散

每服不計時候煎葱日湯調下壹錢

治妊娠尿血方黍穰燒灰酒服方寸七日三

○肘後方取黍藁燒末服壹七日三服

治婦人無故尿血方龍骨五兩治下篩酒服

方寸七空腹服日三久者二十服愈

又方爪甲亂髮

右二味並燒末等分酒服方寸七日三飲

服亦得

又方桂心鹿角屑大豆黃卷各一兩

右三味治下篩酒服方寸七日三

又方取夫爪甲燒作灰酒服之

又方取故舡上竹茹曝乾搗末酒服方寸七

日三亦主遺尿

治婦人遺尿不知出時方婦人大全良方永

滿故也三因方名白薇芍藥散簡易方嚴氏

濟生方良方聖濟總錄醫方集成南北經驗

白薇芍藥各壹兩○得效方集成經驗

方白芍藥

右二味治下篩酒服方寸匕濟生方良方得效方集成

袖珍方經驗良方易簡方每服二錢食前總錄青錢匕日三三日三因方

○鈴方右細末溫酒調又桑螵蛸二十个

炙為末每三錢空心米飲調

又方礬石 牡蠣各二兩

右二味治下篩酒服方寸匕亦治丈夫

又方胡鷲窠中草燒末酒服半錢匕亦治丈夫

夫

又方燒遺尿人薦草灰服之瘥

第九下痢

治姪娠下痢方

人參 黃芩 酸石榴皮各參兩 檉皮四兩

米合參

右五味咬咀以水七升煮取二升半分三

服

又方白楊皮一斤咬咀以水一大升煮取三

小升肘後方水壹斗煮取二升分三服

又方燒中衣帶三寸為末服之

又方羊脂如碁子大十枚温酒壹升投中頓服之日三

治妊娠患膿血赤滯魚腦白滯臍腹絞痛不可忍者方

薤白切壹升酸石榴皮各叁兩黃蘗實作黃連

阿膠貳兩地榆四兩地榆寶三兩

右五味咬咀以水七升煮取二升半分三

服不瘥更作產寶忌生冷肥膩○婦人大全良方

阿膠兩地榆兩酸石榴皮兩薤白切壹升黃

連壹方是黃蘗皮存用水七升煎取二升

温分三服

治妊娠注下不止方

阿膠附後方艾葉各貳兩酸石榴皮兩

右三味以水七升附後方煮取二升去滓

內膠令烊分三服

治妊娠及產已寒熱下痢方

黃連升黃蘗升梔子叁拾枚

右三味咬咀以水五升漬壹宿煮三沸服

壹升壹日壹夜令盡嘔者加橘皮壹兩生

薑二兩亦治丈夫常痢○婦人大全良方

療妊娠挾熱下痢冷熱不調千金翼方同黃連

一升黃蘗壹升○徐氏胎產方各壹兩梔子仁二十枚○胎產方十

枚右為末每服五錢水二錢浸三時久煮

十沸頓服嘔者加橘皮壹兩生薑二兩亦

治丈夫常痢拔粹方同

治婦人欲痢輒先心痛腹脹滿日夜五六十

行方

石榴皮 麴各八兩黃蘗壹作麥蘗烏梅 黃連

艾各壹兩防已貳兩阿膠 乾薑各叁兩附子五兩

右十味為末蜜和丸如梧子大飲服二十

丸日三漸加至三十四丸

第十水腫

治妊娠體腫有水氣心腹急滿湯方

茯苓 白朮各四兩崔氏無朮黃芩 杏仁各叁兩

旋復花貳兩

右五味咬咀以水六升永類鈔方七升煮取二升

半分三服鈴方分温三服忌桃李雀肉酢物 ○聖濟總錄

治妊娠胎間水氣子滿體腫茯苓飲方赤

茯苓去黑皮 白朮各貳兩 杏仁去皮尖雙 旋復

花各壹兩 黃芩去黑心 右五味籠擣篩每服

五錢匕水壹盞半煎七分去滓温服空心

食前日二

鯉魚湯治妊娠腹大胎間有水氣方

鯉魚壹頭貳斤 白朮 生薑各五兩 芍藥 當

歸各叁兩 茯苓四兩

右六味咬咀以水壹斗二升先煮魚熟澄

清取八升內藥煎取三升分五服

治妊娠毒腫方蕪菁根淨洗去皮擣酢和如

薄泥勿令有汁猛火煮二三沸適性薄腫

以帛急裹之日再易寒時温覆非根時用

子若腫在咽中取汁含咽之

又方燒犛牛屎酢和傅之乾則易亦可服方

寸七日三

治妊娠手脚皆腫急方

赤小豆五升商陸根壹斤切

右二味以水三斗煮取一斗稍稍飲之盡

更作一方加澤漆壹斤○三因方商陸赤

小豆湯得效方名赤小豆湯治妊娠手脚腫滿舉急

赤小豆商陸乾各等分右為剉散每壹兩水

壹椀簡易方每服三錢水壹盞煎至七分盞汁清服婦人

大全良方云集驗千金方有澤漆產寶方無澤漆有桑白皮

治妊娠得病須去胎方以鷄子一枚搯三指

撮和服立下此與阮河南療難產同

又方麥蘖一升為末和蜜一升服之立下

又方七月七日神麴三升酢壹升煮兩沸宿

不食平旦頓服之即下

又方大麥麴五升酒一斗煮三沸去滓分五

服令盡當宿勿食其子如糜令母肥盛無

疾苦千金不傳

治動胎見血腰痛小腹疼月水不通陰中腫

痛方

蒲黃 當歸貳兩切 葱白壹斤切 吳茱萸 阿

膠各壹兩

右五味以水九升煮取二升半去滓內膠令烱分三服

治姪娠爲夫所動欲死單行竹瀝汁方取淡竹斷兩頭節火燒中央器盛兩頭得汁飲之立效千金翼方同

海上仙方

婦人胎前瘧疾

婦人胎前遇瘧疾此病寒熱不能治急取夜明沙三錢空心爲末茶調服

安胎

安胎紫蘇陳艾煎砂仁爲末酒煎同胎氣不和揆心下腹脹疼痛有神功

產寶

姪娠安胎方

療姪娠三四箇月腹痛時時下血方

續斷八分艾葉六分

常歸六分

良藥六分

婦人六分

大六分

全六分

各六分

六竹茹四分良方
乾地黄六分良方

阿膠四分雞蘇四分良方
成湯各四錢

右以水壹升煎取六合去滓空心服再腹

痛隔日再服○聖濟總錄治妊娠漏胎下

血不止臍腹疼痛續斷飲方續斷判貳艾

葉去梗熟乾地黄焙當歸切焙各壹兩竹茹新

阿膠炙雞蘇去根莖右七味持為麤末每

服三錢匕用水一盞煎至七分去滓空心

溫服早晚各一

方 療妊娠六七箇月忽胎動下血腹痛不可忍

芎藭八分桑寄生四分當歸十二分

右以水一升煎取八合下清酒半升煎取

九合分作三分溫服如人行五六里再服

療妊娠下血時時漏血盡子死方

生地黄汁三合清酒三合

右相和煎三四沸分溫兩服

療妊娠心頭妨滿兩脇脹不下食方

檳榔三枚 人參四分 柴胡五分 枳殼四分 肉豆蔻

二分 生薑二分 桑寄生四分

右以水二升煎取六合分溫三服

療姪娠傷寒頭痛壯熱脈節煩痛方

前胡六分 石膏十二分 大青四分 子芩五分 知母四分

山梔四分 葱白七莖 甜竹茹三分

右以水二升煎取八合食後分溫三服

療姪娠胎動腰痛及下血安胎方

當歸 芎藭各四分 葱白貳七莖 艾葉貳分 茅根

六分 鹿角膠六分 雨湯下

右以水二升煎取八合空服熱喫三服

療姪娠嘔吐不能食兼口痰水方

生薑根十分 橘皮四分 生薑六分 青竹茹四分 前胡

四分 大腹貳分 檳榔貳分

右以水二升煎取七合空心熱服

療姪娠脇滿腹脹心兇痰見飢卽吐漸加羸

瘦方

赤茯苓六分 前胡四分 半夏四分 生薑五分 白朮壹分

麥門冬壹分大腹五枚檳榔五枚紫蘇葉四分

右以水二升煎取八合空心分為三分溫服

瘕妊娠恒若煩悶此是子煩宜服此方

麥門冬拾二分伏苓八分防風六分知母六分竹瀝

三合湯用

右以水二升煎取七合下竹瀝食後分為

二服

療妊娠胎動不安煩悶方

當歸四分芎藭叁分阿膠叁分葱白二七鼓

八合桑寄生四分

右以水煎空心服如前○婦人大全良方

治妊娠無故胎動不安腹內絞痛煩悶當

歸桑寄生各四分川芎叁分鼓八合阿膠二分葱十

右以水二升煮取八合下膠空腹溫分二

服一方無鼓用銀器煎集驗無寄生鼓有

續斷三分銀多少先煎後入藥

益氣消胎令子易產方

療妊娠宜服此潤胎益氣令子易產訶子丸

訶子皮二分赤茯苓五分芍藥四分厚朴三分大

黃五分芎二分檳榔八分柴葛五分

右壽篩為散煉蜜為丸如梧桐子大空心

酒下十九至二十九自七八箇月服至分

解

妊娠惡菹嘔吐不食方

夫菹病之候心中潰潰頭悶眼眩四肢沉重

慙怠惡聞食氣好喫酸鹹菓實多卧少起三

月四月皆多嘔吐百節不得白舉者療之方

人參八分厚朴六分茯苓十二分葛根八分白朮

十二分橘皮六分生薑十分

右以水七升煎二合分温三服忌桃李醋

等

療妊娠三四月嘔吐不食惡聞食氣方

橘皮二分青竹茹貳兩神巧一兩生薑三兩茯苓

三白朮二兩〇萬

右以水六升煎取二升分溫三服忌食如

前

療妊娠菹病心中潰悶見食嘔吐憎聞食鼻
肌節煩疼身體沉重多卧嗜睡黃瘦方

人參各八分 橘皮各八分 麥門冬二十分去心〇

拾貳分 茯苓十二分〇 良生薑拾貳分 甘草八分

〇良方拾貳分 大棗拾貳枚〇良方

右以小五升煎取二升分溫三服忌菘菜

醋等〇良方又云凡妊娠惡食者以所思

食任意食之必愈壹方無棗子有半夏竹

茹如陳皮分兩聖濟總錄治妊娠阻病心

中煩悶嘔噦吐逆惡聞食氣頭眩重四肢

百節疼瘦嗜臥汗出疲極黃瘦人參飲方

人參麥門冬去心 白茯苓去黑皮 生薑各參兩 陳

橘皮湯浸去白焙 甘草炙各半兩 大棗五枚 右七味剉

如麻豆大分爲二劑每劑以水五盞煎取

二盞去滓食前分爲三服如人行三五里

再服

凡妊娠惡食者以所思食任意食之必愈
妊娠胎動不安不常處方

夫安胎有其二法因母病以動胎但療母疾
其胎自安緣胎有不堅固致動以病母但療
胎則母差其理甚效不可違也胎不動不知
可否者但看母唇口青者兒死母活口中青
沫出子母俱死口舌赤青沫出者母死于活
也

療胎數落而不結實或冷或熱方

黃耆二兩 茱萸一兩 甘草三兩 芎藭二兩 人參白

木 乾地黄各二兩

右擣篩為散空服酒調兩錢匕忌如前

療胎動不安方取好銀煮取水著葱白作羹

食之佳婦人大全良方

療胎動下血心腹絞痛兒在腹死活未分服

此湯死即下活即安簡易方名

當歸三兩 芎藭六兩 ○簡易

右以水四升酒三升煮取三升分爲三服

效簡易方右吹咀每四錢水酒各一盞煎至一半去滓連數服

○胎產

救急方外臺方君臣散治胎動不安及傷

胎漏胎死胎口噤痛悶者皆治之用此探

胎痛止胎安損者立下救急方經心錄並

同川芎二兩川當歸三兩張氏方二味右剉散

每三錢水煎服一方入酒半盞煎太醫方

名芎藭湯催生及漏胎產後下血過多並

治之張文仲方治血上衝心滿悶者如湯

沃雪玉機微義當歸湯治子死不下川當歸

參川芎二兩右爲末水酒各半調下四錢末

下再服一方只用川芎末酒煎服

療妊娠搶心下血不止腰腹痛不可忍方

上銀壹斤水壹斗芎藭當歸各四兩生地

黃五兩阿膠叁兩

右以前銀水煮水取二升分溫三服

療妊娠無故胎動不安腹內絞痛方

葱白切斤阿膠叁兩當歸各四兩芎藭各四兩

寄生兩

煎銀水七升以煎前藥取二升半分三服

療妊娠五六月胎猶不安不常處方

白木參旋覆花兩厚朴兩黃芩兩芍藥兩

炙令生薑兩枳殼兩茯苓兩

右以水七升煮取二升半食後分五服

療胎動不安方

熟艾兩葱白兩阿膠兩

右以水四升煮取一升半分二服管見人全良方

參

又方芎藭兩葱白兩

以水七升煮取二升半分為三服婦人大全良方

同胎產救急方水

療妊娠冷熱腹內不調致胎不安方

當歸兩乾薑兩芎藭兩艾葉兩

右以水四升煮取二升分為四服不過兩

劑差管見大全良方同

療妊娠經八九箇月或胎動不安因用力勞

乏心腹痛而目青冷汗出氣息欲絕山勞動
驚胎所致也方聖惠方名

鈞藤兩伏神人參聖惠方當歸各二兩

方對枯梗參兩○聖惠方寄生壹兩○聖惠方

微炒上各壹兩

右以水五升煎取二升分為三服忌猪肉

菘菜若煩熱加石膏五兩臨月加桂心二

兩○聖惠方右件藥擣羅羅為散每服四

錢以水壹小盞入生薑半分葱白七寸煎

至六分去滓不計時候溫服婦人大全良

方鈞藤當歸伏神人參各乙苦梗乙兩桑

寄生兩右為粗末每服五大錢水二盞煎

至膏殘去滓溫服無時候忌猪肉菘菜若

煩熱加石膏二兩半臨產月加桂心壹兩

療姪娠因夫所動困絕方右取竹瀝飲壹升

立愈神巧萬全方婦人大

療姪娠被驚惱胎向下不安小腹痛連腰下

血方袖珍方名當歸散

當歸

芎藭

各捌分

阿膠

六分炙

人參

六分

艾葉

四分

茯苓

十分

大棗

拾二分

○ 二十個

右以水四升

煮取二升

為三服

○ 聖惠方

當歸

剉微炒

芎藭

阿膠

搗碎炒

人參

去蘆頭

白

茯苓

已上各壹兩

艾葉

半兩微炒

右件藥

搗篩為散

每服四錢

以水壹中

煮煎至六分

去滓不

計時候

溫服

袖珍方

右

咬咀

每服八錢

水

壹錢半

煎至八分

去滓

溫服

食前

療墮胎

忽因倒地

忽舉動

擊重

促請

腹中不

安及子死腹中方

芎藭

壹兩

右搗為末

服寸匕

時後方

酒須臾

三服

卽

出

神巧萬全方同

○ 簡易方

川芎散

治妊婦

從高

墜下胎

不能轉

膝重

腹疼

及舉動

傷胎而

死於腹中

聖濟總錄

妊婦墜

損胎

不

川芎

總錄

右為末

每二錢

酒調下

醫方集成

南

珍方

永類鈴方

徐氏

胎產方

鈴方

又云

鄭

氏名

探胎湯

娠三

個月

經不

行以

此驗

之濃煎艾湯下腹中微動則有胎若在臍
 下動者乃血癥也若不動為血不行有痛
 非娠也胎產救急方專治婦人方順氣散
 治妊娠胎動不安及傷胎不轉動腹痛腰
 重或胎已死服之立下甚者不過三服用
 芎青味為末每服壹錢溫酒調服婦人大全良
 方治妊娠因墜倒損胎不轉動腹內疼痛
 腰重及子死腹中不出須臾三服立下川
 芎乙南為細末以熱酒調服方寸匕日三四

服

療胎動衝心煩悶欲死安胎止痛方

甘草二兩炙 當歸 芎藭各二兩 人參 阿膠

各二兩 葱白切壹斤

右以水七升煮取二升分為三服

療妊娠忽黃汁下忽如膠又如小豆汁方

糯米壹升 黃耆五兩

右以水七升煎取二升分為四服

療妊娠胎動欲落肚痛不可忍方

茅根

去黑皮 切二升 上銀壹斤

右以水九升煎銀汁取二升入清酒壹升煎茅根取二升分爲三服立安○婦人大全良方銀芎酒治妊娠胎動欲墮腹痛不可忍方芎根二兩銀五兩清酒乙右以水壹大瓊煎至壹大瓊去滓分溫二服衛生易簡方用芎根二兩剉碎銀五兩酒水各壹盞同煎去滓溫分二服或單用水二盞煮服

療妊娠腹內冷痛忽胎動方

薤白

切壹斤○婦人當歸四兩良方切

右以水五升煎取二升作三服○良方又云亦將小便服將去壹炊頃出

妊娠漏胞下血等方

療漏胞下血不止胞乾卽死

得效方經驗良方胞乾子母卽

死宜急理之方

生地黃

汁壹升 酒五合○得效方

右二味合煎三五沸分三服頻喫差婦人

良方分叁服以止為度得效 ○肘後方生

方良方或地黃為末温酒 地黃汁壹升漬酒四合煮一四沸服之不

止頻服聖濟總錄生地黃汁合貳清酒合貳右

二味相和煎三四沸空腹分温二服衛生

易簡方治胎漏下血及因事下血用新地

黃汁二升酒四合同煎三五沸分作二三

服

療 妊娠無故卒下血不止方阿膠二兩炙○

良方三兩衛生易簡 清酒壹升半煎取壹

方叁兩炙搗為末

升作壹服之差肘後方同 ○聖濟總錄右壹味

以酒壹升半煮膠令消分三服連併服之

備預百要方阿膠炒末粥下五錢

又方生地黃八兩搗了以酒浸之絞過去滓分

為二服以止為度

療 妊娠下血不止胎上衝心四肌冷悶絕欲

死方

青竹茹壹大艾葉貳兩阿膠壹兩白蜜六兩

右以水六升煎取二升內蜜更煎壹兩沸

爲分二服差○聖濟總錄青竹茹拳大艾
 葉阿膠炙令燥白蜜各貳兩右四味以水六升
 煮三味取二升去滓內蜜又煎壹沸分二
 服立差經驗良方治妊娠忽下血胎上衝
 手足逆冷欲死右用生艾汁貳盞阿膠白
 蜜各貳兩煎壹蒸半稍熱服之無生艾卽
 濃煎熟艾一方加竹茹壹大塊同煎 又
 如胎動口噤唇青下利不止用熟艾壹兩
 酒參盞煮貳盞去滓灌之卽安

妊娠忽心腹痛腰痛方

療妊娠二月三月腹腰痛有所不安方

當歸貳兩阿膠炙甘草各貳兩葱白切壹斤

右以水七升煎取二升作三服忌如前

療妊娠遍身或衝心欲死不能食飲甚効方

白米兩黃芩兩芍藥四兩

右以水六升煮取二升半爲三服緣胎間

有水致此痛兼易產

療妊娠卒心痛氣欲絕方

芎藭 當歸 茯苓 厚朴各三兩炙

右以水六升煎取三升分爲兩服立愈忌
如前

療妊娠腰痛反覆不得如折方鹿角一枝

長五六寸燒之令赤酒中淬之冷又燒淬

以角碎爲度即取酒飲之作散調服亦得

管見大全良方婦人大全良方同 ○肘後方鹿角屑酒服

方寸七日五六可熬令焦黃服衛生易簡

方治妊娠卒腰痛用鹿角五寸燒赤內酒

壹升中浸冷又燒浸如此數過研細爲末
空心酒調方寸匕服

療有所觸動良方此下以致腰痛及背痛方

杜仲 五茄皮 當歸各參芍藥三兩芎

藭婦人大全良方三兩人參 革薺各二兩○

右良方此下有細對以水七升煮取二升半分爲

三服○聖惠方治妊娠或有所觸胎動不

安以致腰痛及臍腹內痛杜仲散方杜仲

壹兩去麩皮五加皮壹兩當歸壹兩剉赤芍

藥壹兩芎藭兩壹兩人參壹兩去草薺一兩右件

藥搗麓羅為散每服四錢以水壹中盞煎

至六分去滓不計時候溫服

療妊娠先患冷氣忽衝心腹刺痛如刀刺方

拔粹方名

芎藭 人參 茯苓 桔梗各三兩 吳茱萸

當歸各三兩 厚朴一兩 芎藥一兩

良方

右以水九升煎取三升分為三服氣下即

差永類

療妊娠患腹痛兼胎動方

葱白切 人參 厚朴 阿膠 芎藭各

兩婦人大全

右以水七升煮取三升作三服良方又云

草無厚

療妊娠疼痛不可忍方○拔粹方五加皮散

治妊娠腰疼不可忍或連胯痛先服此散永類

同

五茄皮三兩杜仲四兩阿膠婦人大全良方拔粹方鈐方炒狗

脊良方金防風毛狗脊芎藭細辛芍藥各二

兩○良方拔粹方鈐草薺三兩杏仁良方拔粹方鈐

方白芍藥各三兩

去皮尖炒方八十個右以水九升煮取二升去滓內膠為三度

服鈐方云壹○聖惠方治妊娠腰痛疼痛或

連月不已五加皮散方五加皮三兩杜仲四兩

去蠶皮炙草薺叁兩阿膠二兩擣碎拘脊

微黃到二兩防風二兩去蘆頭芎藭二兩杏仁二兩湯浸去皮尖雙

人姓少細辛二兩右件藥擣篩為散每服四

錢以水壹中盞入生薑半分煎至六分去

滓不計時候溫服

療妊娠二三月腰痛不可忍痛方○拔粹方

五加皮丸治妊娠腰痛不可忍者次服此丸

婦人大全良方同

續斷良方杜仲各二兩半芎藭獨活各

兩狗脊五茄皮草薺芍藥暑藥

訶子已上六味各八分○良方拔粹方各八兩

右搗為散蜜丸

良方拔粹方煉蜜丸如桐子大

空復酒下

四十九日再服

良方拔粹方日三服

○聖惠方續斷

丸方續斷

青杜仲

壹兩去龍皮

芎藭牛獨

活兩狗脊

三五加皮

三車僻

三分赤芍藥

分薯蕷分訶梨勒皮

分右伴藥搗羅為末

鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服

不計時候以溫酒下三十九

妊娠傷寒熱病防損胎方

非節之氣傷寒妊娠婦熱毒之氣侵損胞胎

遂有墜胎漏血俱害子母之命

療妊娠傷寒百節疼痛壯熱若不急理即胎

落方

葱白六前胡

葛根

知母

石膏

各壹分

大青木梔子

升麻

拾二分

右以水七升煎取二升半作三服

療妊娠壯熱頭痛嘔吐不下食心煩熱方

淡青竹茹

葛根

知母

三

蘆根壹升生麥

門冬四兩

右以水七升煎取三升分爲三服

療妊娠時氣頭痛腰氣強壯熱方

升麻 大青 前胡 黃芩 山梔子

各二兩 葛根 石膏

右以水五升煎取二升半分爲三服

療妊娠六七月傷寒熱入腹大小便秘塞不

通蒸熱方

大黃 知母 黃芩 伏苓 生薑

石膏 梔子仁 前胡

右以水八升煎取二升半下大黃三兩沸

分爲三服○聖惠方治妊娠熱病六七日

熱入腹大小便秘澀燥熱大黃飲子方川

大黃 知母 石膏 梔子

前胡 黃芩 赤茯苓 甘草

剉右件藥細判拌令勻每服半兩以水壹

大盞入生地黃壹分煎至六分去滓不計

時候溫服

療妊娠傷寒苦熱不止身上班出忽赤忽黑

小便如血欲絕胎欲落聖惠方氣方

梔子人四兩升麻四兩大青兩石膏八兩葱白

切一黃芩生地黄 分 十

右以水九升煎取三升為三服忌熱物○

聖惠方梔子人飲子方梔子人兩川升麻

二大青兩石膏三兩黃芩兩生地黄兩右

件藥細剉和勻每服半兩用水壹中盞入

葱白七寸豉四十九粒煎至五分去滓不

計時候溫服

療姪娠患淋小便澀不利小腹水道熱痛方

冬葵子壹升芍藥二兩黃芩兩茯苓兩車前

參 兩

右以水七升煎取二升分溫二服差

又方車前五兩葵根一斤

右以水五升煎取壹升半分為二服空溫

服○聖濟總錄治姪娠小便澀車前子湯

方車前子貳合冬葵根兩半右二味麤搗

篩每服五錢匕以水壹盞半煎至八分去

萍空心溫服徐氏胎產方車前子壹兩葵
 根半兩切右二味以水升半煎至膏半空
 心溫服備預百要方妊娠淋疾方車前子
 葵根各切水濃煮服
 妊娠下麻黃水赤白方

妊娠下痢皆因悞食生冷肥膩冷即色白熱
 皆赤氣不和赤白相兼攪刺疼痛脾胃不調
 之所致也

療任娠痢白膿腹內冷方

乾薑四兩赤石脂六兩粳米一升熬

右以水七升煮取二升分爲三服忌如前

婦人大全良方
忌生冷肥膩

療妊娠腹痛下痢不止方婦人大全良方下
痢赤白不可忍

黃連良方云壹
方是白木石榴皮 當歸各壹
兩阿膠

二兩艾葉膏兩
半

右以水六升煮取二升分爲二服良方溫
分叁服

忌如前

療妊娠下痢腹內痛膿不止方○拔粹方黃

連湯治妊娠下痢赤白膿血不止徐氏胎產方同

黃連八分○拔粹方厚朴六分○胎產方

阿膠六分○胎產方艾葉五分○婦人大

承類方六錢艾葉五分○婦人大

胎產方四錢當歸六分○胎產方黃蘗四分

四錢乾薑五分○胎產方右擣篩為散空服以飲服壹匙諸方米飲調下方寸

七日三服

療妊娠臍下刺痛大便白晝夜三五寸行方

根黃厚者塗白蜜大蒜炮令爛熟

右以大蒜研如膏川九根黃末丸如梧桐

子大空心空肚粥飲下三十九日三兩服

極妙○婦人大全良方又云一方不用根

黃川當歸以芍藥煎湯吞下

療妊娠痢黃水不絕方徐氏胎產方

荳蔻五枚和厚朴三兩○婦人大全良

汁黃連二兩拔粹方承類方黃

右以水二升煮取壹升頓服忌如前良方

臍冷肥

療妊娠忽被驚奔走急墮胎下血不止兼痛

方

乾地黄四兩黃芩兩阿膠貳兩艾葉兩芍藥兩

三兩

右以水七升煎至二升半分為三服腹痛

更加杜仲五茄皮二味各三兩

妊娠水氣身腫腹內脹滿小便少方

藏氣本弱因產重虛土不尅水血化散入四

肌遂致腹脹手足面目並皆浮腫小便秘澀

療妊娠身體腫有水氣心腹脹滿小便少方

茯苓兩檳榔人三兩白朮兩旋覆花兩杏仁壹

三兩郁李仁兩壹

右以水六升煎取二升分溫作二服小便

通即差

療妊娠四肌皮肉拘急及腫方

桑白皮升樟陸根兩赤小豆升

以水壹斗二升煎取二味取七升下小

豆更煮令熟先食豆候渴即飲其汁小便

利卽差

療妊娠遍身洪腫不能食方拔粹方徐氏胎

葶藶子拾分○拔粹方二兩白朮貳分茯苓

胎產方各十二分○婦人大全良

白茯苓各十二分乘白皮各十二分胎產方已上二

二兩郁李仁分八右以水六升煎取二升分作二服良方拔

產方小便利卽差

又方永類鈴方治妊娠體

澤瀉胎產方各貳兩葶藶胎產方各貳兩白朮六兩

穀一兩茯苓婦人大全良方拔粹方鈴方

右以水六升煮取二升分爲三服諸方小

便利卽差

聖惠方一

治妊娠中風諸方

夫四時八方之氣爲風也常以冬至之日候之若從其鄉來者長養萬物若不從其鄉來名爲虛邪賊害萬物人體虛則中之若風邪客於皮膚入於經絡卽頑痺不仁若入於筋

脉挾寒則攣急喎僻挾溫則弛縱若入臟腑則恍惚驚悸凡五藏俞皆在背臟腑虛風邪皆從其俞而入隨所傷藏腑經絡而為諸病也妊娠中風若不早治則令墮胎也治妊娠中風卒倒心神悶亂口噤不能言四肢急強防風散方

防風壹兩去蘆頭 葛根兩壹 細辛兩半 當歸兩半 微炒
甘菊花兩半 漢防已兩半 羚羊角屑兩半 秦芫兩半
去蘆 桂心兩半 茯神兩半 桑寄生壹兩 甘草兩半 炙微

赤判

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分婦人大全良方煎至六分去滓入竹瀝半合不計時候溫服○袖珍方有改咀每服八錢水壹盞半煎至八分去滓竹瀝半合溫服不拘時候治妊娠中風四肢腰背強直言語蹇澀心神煩悶芎藭散方

芎藭兩壹 防風兩壹 去蘆頭 犀角屑兩半 生乾地黃

三葛根兩半麻黃三分去獨活兩半漢防已兩半
 杏人雙三分湯浸去皮尖微黃赤箭兩半羚羊角屑
 甘草兩半微赤剉入右件藥擣篩為散每服四錢以水壺中煮
 入生薑半分煎至六分去滓入竹瀝半合
 不計時候溫服不計時候
 治妊娠中風身如角弓反張口禁語澀拔粹
類鈞方此下云謂之風宜服麻黃散方拔粹
痙亦名子癇亦名子冒
獨活防風湯

麻黃青兩去獨活壹兩去防風壹兩去桂心兩半
 芎藭叁分當歸三分剉微炒○拔粹羚羊角兩
 屑兩半酸棗人壹兩○婦人大全良方川
 麻兩半秦艽兩半杏人兩半湯浸去皮尖雙
 方製甘草兩半微赤剉入右件藥擣篩為散每服四錢水壺中煮入
 生薑半分良方拔粹方薑四煎至六分去
 滓入竹瀝半合不計時候溫服
 治妊娠中風頭項強直筋脉攣急手足不隨

言語蹇澀羚羊角散方

羚羊角屑兩一獨活兩壹薏苡人分二防風分壹

頭酸棗人兩壹五加皮分叁當歸分壹芎藭分壹

蔓荆子兩半草薺分叁海桐皮分叁甘草分壹

赤剉

右件藥擣篩為散每服四錢水壹中盞入

生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

○王嶽產書治妊娠傷寒後變成中風頭

項強直筋脉攣急手足無力言語澁滯痰

涎不止宜服羚羊角屑壹分獨活壹分薏苡人

五防風五銖酸棗人壹分當歸五銖五加皮壹分芎

藭五銖草薺五銖蔓荆子叁銖海桐皮五銖甘草叁銖

炮右件剉熬擣羅為散每服四錢以水壹

盞人生薑三片煎取六分不勒時候去滓

溫服

治妊娠卒中風不語四肢強直心神昏昧宜

服生犀角散方

生犀角屑壹兩防風叁分去蘆頭赤箭叁分羌活叁分

麻黃壹兩去根節當歸叁分剉人參叁分去蘆頭葛

根叁分赤芍藥叁分秦艽半兩去苗甘草半兩炙石

膏壹兩半

右件藥搗篩為散每服四錢水壹中盞煎至六分去滓入竹瀝半合不計時候溫服

治妊娠中風心神恍惚驚悸胎動不安言語

失次四肢抽掣扶神散方

茯神壹兩麥門冬壹兩去心人參三分去蘆頭獨活半兩

防風三分去蘆頭龍齒壹兩生乾地黃叁分桑寄生

叁分犀角屑半兩釣藤半兩白鮮皮半兩遠志半兩去心

石膏壹兩甘草半兩炙

右件藥搗篩為散每服四錢以金銀水壹中盞煎至六分去滓不計時候溫服

治姪娠中風口眼不正手足頑痺宜服木防

已散方

木防已壹兩羌活壹兩防風壹兩去蘆頭羚羊角屑

壹兩桂心半兩荆芥穗半兩薏苡人半兩麻黃壹兩去根

節桑寄生半兩黃松木節壹兩甘草半兩炙

右件藥擣篩為散每服三錢水壹中盪入
 生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服
 治妊娠中風牙關緊急身體強直言語不得
 痰涎壅滯心胃煩悶天麻散方

天麻 壹兩 獨活 兩 白殭蠶 叁分 白附子 三分
 麻黃 壹兩 去 於羊角屑 三分 防風 叁分 去
 夏 半兩 湯洗 七遍 去滑 以生 犀角屑 兩 阿
 膠 叁分 搗碎 甘草 兩 炙 鈔霜 壹分
 半分 炒令黃燥 微赤 到 研入 龍腦 研入

右件藥擣細羅為散入研了藥令勻每服
 不計時候以竹瀝調下壹錢

治妊娠因洗頭中風身體強硬牙關緊急失
 音不語獨活散方

獨活 壹兩 赤箭 兩 麻黃 壹兩 去 烏犀角屑 叁分
 羌活 叁分 防風 叁分 去 天蓼木 叁分 白附子 叁分
 漢防已 兩 桂心 兩 芎藭 兩 白殭蠶 兩 阿膠 壹兩
 炒令黃燥 龍腦 壹分 研入
 右件藥擣細羅為散入研了藥令勻每服

不計時候以薄荷湯調下二錢○王嶽產
 書治姪娠因洗頭中風身體強硬牙關緊
 急失音不語口面不正獨活赤箭麻黃各
 分犀角屑五銖羌活壹分防風白朮炮白附子
 各八分漢防已一分桂心五銖芎藭五銖阿膠壹分
 炙白殭蠶四銖龍腦二銖右件剉熬搗羅為
 散煎薄荷湯熱調三錢日十服
 治姪娠中風口噤心膈痰涎壅滯言語不得
 四肢強直白殭蠶散方

白殭蠶壹兩天麻壹兩獨活壹兩麻黃壹兩半
 烏犀角屑叁分白附子半兩藿香半兩半夏半兩
 湯洗七遍去滑以生薑半兩天南星半兩龍
 腦壹錢研入

右件藥搗細羅為散入研了藥令勻每服
 不計時候以生薑薄荷湯調下一錢

治姪娠中風心神恍惚在言妄語驚悸煩亂
 不得睡卧鐵精丸方

鐵精一兩龍齒壹兩犀角屑壹兩茯神壹兩天

竹黃參分去 人參參分去 遠志參分去 防風參分去

麥門冬壹兩半焙 菖蒲參分 白鮮皮參分 生乾地

黃壹兩 金薄二十一 銀薄二十一 龍腦半分

右件藥搗細羅為散入研了樂令勻鍊蜜

和搗三二百杵丸如梧桐子大每服不計

時候以竹葉湯放冷下二十九

治姪娘中風手足不遂筋脉緩急言語蹇澀

皮膚不仁赤箭丸方

赤箭壹兩 草薺兩 防風參分去 芎藭參分 麻黃

根節壹兩 獨活兩 當歸參分剉 薏苡人參分 阿

膠參分搗碎 五加皮參分 羚羊角屑壹兩 鼠黏

子壹兩 秦艽去苗 漢防己參分 栢子人參分 酸棗

人參分 丹參參分 熟乾地黄一兩

右件藥搗細羅為散鍊蜜和搗三五百杵

丸如梧桐子大每服食前以豆淋酒下二

十九

治姪娘中風口面喎僻言語蹇澀身體拘急

烏犀角丸方

治姪娘中風口面喎僻言語蹇澀身體拘急

烏犀角丸方

烏犀角丸方

烏犀角屑壹兩 防風壹兩 去蘆頭壹兩 天蓼木壹兩 羌活壹兩

麻黃壹兩 去根節壹兩 獨活壹兩 赤箭壹兩 羚羊角屑壹兩

芎藭壹兩 秦芎叁分 天門冬壹兩 去心焙壹兩 桑寄

生叁分 阿膠壹兩 搗碎壹兩 大麻人壹兩

右件藥搗細羅為末鍊蜜和搗三二百杵

丸如梧桐子大每服食前以薄荷湯下三

十九

治姪娠中風手足緩弱口面喎斜言語謇澀

肢節疼痛桑枝煎丸方

桑枝 槐枝 柳枝已上各一斤 黑豆壹升 淘洗

過天蓼木半斤

已上藥以水二斗煎至五升濾去滓入

酒壹升更熬令如稀飭

天麻二兩 獨活壹兩 海桐皮一兩 草薺壹兩 芎藭壹兩

防風壹兩 去蘆頭壹兩 五加皮壹兩 酸棗人壹兩 微炒壹兩 薏苡

人壹兩 桂心壹兩 生乾地黄一兩

右件藥搗細羅為末入前煎中拌浚更入

少鍊了蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大

每服食前以温酒下二十九

治妊娠中風口眼不正言語蹇澀手足不遂
酸石榴煎方

酸石榴 十顆并皮細切研絞更入水 鵝梨

十顆搗中蓋再研絞取汁去滓

綬取汁荆芥 五兩細剉入水一 薄荷 五兩

入水膏中蓋 牛蒡根 半斤淨洗切 竹瀝 壹

研絞取汁 生地黄汁 壹中 白蜜 三兩

已上諸藥汁相和於銀石鍋中慢火熬如
錫入後藥末

赤箭 二兩 獨活 壹兩 羚羊角屑 壹兩 防風 壹兩 去

桑寄生 壹兩 阿膠 壹兩搗碎炒令黃燥

右件藥搗細羅爲末研令細入前煎中攪

令勻瓷器中盛每服不計時候以温酒調

下壹大匙頭

治妊娠中風筋脉攣急口眼喎斜皮膚頑麻
言語常澀生地黄煎方

生地黄 五斤搗取汁 黑豆 壹升以水四升煮大

甜石榴 五顆搗取汁 荆瀝 半升 枸杞根 壹斤細剉

蓋搗絞 桑根白皮 壹斤細剉入水壹斤 竹瀝 取汁

半白蜜 五兩 已上諸藥汁相和於銀石鍋中慢火熬

如稀餈入後藥末

羚羊角屑 天門冬 去心焙 天麻 酸棗人

微炒 當歸 剉微炒 羌活 薏苡人 蠶沙 微炒

各壹兩 右件藥搗細羅為末研令細入前煎中攪

令勻瓷器中盛每服不計時候以温酒調

下壹大匙頭

治姪娠中風語澀頭疼心神煩悶胎動不安

烏金煎方

黑豆 壹升淘洗令淨 獨活 壹兩 羚羊角屑 壹兩 防風 壹兩

去蘆 茯神 壹兩 牡荊子 壹兩 生乾地黄 壹兩 牛

蒡根 壹兩 桑椹 壹兩 桑寄生 壹兩 薄荷 壹兩 荆芥 壹兩

右件藥搗篩以水壹斗五升煎至五升去

滓入白蜜三兩竹瀝半升更熬令如稠餈

瓷器中盛每服不計時候以金銀温湯調

下壹大匙頭

下壹大匙頭

治妊娠中風語澀舌不轉心煩悶荆瀝飲子
方

荆瀝貳合生葛根汁貳合竹瀝參合白蜜半合

右件藥相和令勻煎壹沸每服溫飲壹小
盞

治妊娠中風失音不語心神冒悶梨汁飲子
方

梨汁二合竹瀝二合生地黃汁二合牛乳壹合白蜜

半合

右件藥相和令勻每服溫飲壹小盞

治妊娠中風口面喎斜語澀舌不轉獨活飲
子方

獨活壹兩竹瀝二合生地黃汁二合

右件藥先以水壹大盞煎獨活至六分去
滓下竹瀝地黃汁攪勻更煎壹沸分溫二

服

治妊娠中風語澀心煩項強背拘急眼澀頭

疼昏昏多睡阿膠飲子方

阿膠半兩搗碎竹瀝五荆瀝合

右件藥相和令勻每服溫飲壹小盞

治妊娠中風口噤言語不得白朮酒方

白朮壹兩獨活壹兩黑豆壹合炒

右件藥細剉以酒三升煎取壹升半去滓

分溫四服拗口灌之得汗即差婦人大全良方同

治妊娠中風痙諸方

夫妊娠體虛受風而傷太陽之經絡後復遇

風寒相搏發則口噤背強名之為痙其候悶

胃不識人須臾惺惺復發此是風傷太陽之

經作痙也亦名子痙亦名子冒也

治妊娠中風痙口噤憤悶不能言身體強直

或時反張羌活散方

羌活參分防風參分芎藭參分葛根三分秦

芫參分麻黃二兩犀角屑半兩杏仁壹兩

浸去皮尖雙甘草半兩微赤剉

右件藥搗羅為散每服四錢水壹中盞

入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

治妊娠中風腰背強直時時反張名為風瘧

防風散方

防風三兩去蘆頭 葛根二兩剉 芎藭二兩 麻黃一兩半去

根桂心兩 獨活壹兩 漢防已兩 生乾地黄兩

節甘草壹兩炙 杏仁一兩半湯浸去皮

右件藥搗篩羅為散每服四錢水壹中盞

煎至六分去滓不計時候溫服

治妊娠中風腰背強直或時反張名為風瘧

獨活散方

獨活壹兩 防風壹兩去蘆頭 葛根半兩剉 羚羊角屑

三分 赤箭兩 當歸三分 酸棗人三分 芎藭兩 秦

芫半兩 麻黃壹兩去根節 五加皮兩 甘草半兩炙微

剉赤

右件藥搗篩為散每服四錢水壹中盞入

生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

治妊娠中風瘧身體強直或時反張口噤失

音天麻散方

天麻兩一天南星半兩犀角屑三分獨活兩防

風半兩去阿膠三分炒令黃燥芎藭兩酸棗人

牛兩麻黃三分去白附子半兩炮裂羚羊角屑

微炒兩龍腦壹分研入

右件藥搗細羅為散入研了藥令勻每服

不計時候以竹瀝調下壹錢

治姪娠中風口面喎僻言語謇澁身體強直

或時反張烏犀角丸方

烏犀角屑兩赤箭兩麻黃一兩去天南星

半兩秦芎去苗漢防已半兩獨活叁分羚羊角

屑叁分防風壹分去白附子叁分炮裂白殭蠶叁分

微炒芎藭叁分當歸叁分炒酸棗人壹兩桑寄

生叁分阿膠壹兩炒令黃燥龍腦壹分研入

右件藥搗細羅為末入研了藥令勻鍊蜜

和搗三五百杵丸如梧桐子大不計時候

以薄荷酒下二十九

治姪娠中風瘳口噤四肢強直反張羌活酒

方

羌活一兩防風壹兩去黑豆每用壹合

右件藥前三味搗麤羅為末以好酒五升

王嶽產書好無灰酒壹升漬一宿每服用黑豆壹合炒

令煙出投入藥酒一大盞候沸住去滓切

開口分兩度灌之

治妊娠中風痙通身冷直口噤不開白朮酒

方

白朮壹兩獨活壹兩已上各

右件藥搗麤羅為散以酒二大盞煎至一大盞去滓分溫二服初開口灌之

治妊娠中風痙口噤荆瀝飲子方

荆瀝三合竹瀝五合梨汁叁合

右件藥相和令勻分溫兩度灌之

治妊娠中風痙口噤煩悶竹瀝飲子方

竹瀝五合人乳壹合陳醬汁半合

右件藥相和分溫二服初開口灌之

治妊娠傷寒諸方

夫冬時嚴寒人體虛而為寒所傷即成病為傷寒也輕者淅淅惡寒巢氏病源翕翕發熱微欬鼻塞數日乃止重者頭疼體痛先寒後熱巢氏病源久不愈者亦傷胎也

治妊娠傷寒煩熱頭痛胎氣不安或時吐逆不下食白朮散方

白朮一兩陳橘皮壹兩湯浸去白氣焙麥門冬壹兩去心甘草半兩炙人參壹兩去蘆頭半夏半兩湯洗前胡蘆頭壹兩去赤茯苓兩壹芎藭兩壹

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞入生薑半分婦人大全良方拔粹方南北經驗方袖珍方永類鈐方徐氏胎產方四片淡竹茹一分煎至六分去滓不計時候溫服

治妊娠傷寒身體重發熱惡寒肢節煩疼微嘔心下支滿外證未去柴胡散方

柴胡壹兩去苗黃芩兩半人參半兩去蘆頭赤芍藥兩半甘草半兩炙犀角屑兩半半夏半兩湯洗七遍去滑麥門冬半兩去心

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞
入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計
時候溫服

治姪娠傷寒頭痛身體壯熱及四肢不利升
麻散方

川升麻兩 蒼朮壹兩剉 黃芩半兩 麥門冬壹兩
去大青半兩 徐氏胎胎 石膏二兩 胎胎 麻
心壹兩 去去 根節去

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞

入生薑半分拔粹方南北經驗方袖淡竹

葉二口片煎至分婦人大全良方拔粹方

二七片 去滓不計時候溫服

治姪娠傷寒頭目旋疼壯熱心躁前胡散方

前胡壹兩去 旋復花半兩 白朮叁分 人參三分
頭麻黃叁分去 黃芩分 赤芍藥兩 石膏兩
甘草半兩炙 微赤剉

右件藥搗篩為散每服四錢用水一中盞
入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫

服

治妊娠傷寒四日至六日已來加心腹脹上
氣渴不止食飲不多腰疼體重枳實散方

枳實一兩麩炒微黃麥門冬半兩去心陳橘

皮三分湯浸去白穰焙

右件藥搗篩為散每服三錢袖珍方以水

壹中盞袖珍方入生薑半分葱白七寸煎

至六分袖珍方去滓不計時候溫服無求子活

人書婦人大全良方同

治妊娠傷寒加腹脹大便不通喘急金花散
方

川大黃壹兩剉碎微炒鬱金壹兩青橘皮壹兩湯浸去白穰焙

牽牛子二兩微炒甘草三分炙微赤剉

石件藥搗細羅為散每服不計時候以生

薑湯調下二錢以利便差

治妊娠傷寒身體壯熱增寒嘔逆四肢微冷

頭痛腰脚疼心腹有氣至三日內未差者

宜服此方右取生薑壹分研濕紙裏燒熟

温酒調下後喫粥飲投之汗出為効
治妊娠三兩月傷寒頭痛壯熱嘔逆丹參散
方

丹參 當歸剉微 人參蘆頭去 麻黃去根節

產書 艾葉微炒 阿膠搗碎炒 甘草炙微赤剉

無 兩○產書 各壹分

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞
入生薑半分棗二枚煎至六分去滓不計
時候温服○產書右件七味剉了熬搗細

羅為散每服兩錢以水七分入生薑一片

京棗半箇煎五七沸無時熱服日三服

治妊娠三兩月傷寒壯熱嘔逆頭疼不思飲

食胎氣不安人參散方

人參蘆頭去 石膏壹兩 前胡三分去蘆頭 子芩三分

麥門冬半兩去心 葛根半兩

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞

入生薑半分棗三枚淡竹茹壹分煎至六

分去滓不計時候温服

治姪娠三兩月傷寒頭痛煩熱嘔噦胎氣不

安前胡散方

前胡壹兩去蘆頭赤茯苓壹兩阿膠壹兩擣碎炒令黃燥

當歸叁分判微炒芎藭叁分白朮壹兩麥門冬兩

去甘草半兩炙人參壹兩去蘆頭

右件藥擣篩為散每服三錢以水壹中盞

入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計

時候溫服

治姪娠三四月傷寒頭痛壯熱吐逆不思食

麥門冬散方

麥門冬一兩去心半夏叁分湯洗七遍去滑甘菊花壹分麻

黃叁分大根節阿膠三分擣碎炒令黃燥人參叁分去蘆頭當

歸半兩判微炒甘草半兩炙微赤判

右件藥擣篩為散每服三錢以水一中盞

入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫

服

治姪娠四月傷寒胃中有冷心中欲嘔得膈煩悶不思飲食時有虛熱或小便如淋臍下

急滿或頸項強痛有時胎上迫心心中煩悶

大腹皮散方

大腹皮三分前胡三分厚朴壹兩去蘆

汁炙令香熟雞蘇莖葉三分木香兩枳實三分麩

白朮三分桑根白皮三分赤芍藥兩續斷兩

扶神分甘草半兩炙

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

入生薑半分煎至六分去滓不計時候稍

熱服

治妊娠四五月傷寒壯熱頭痛心脅煩悶嘔

吐痰涎不思飲食半夏散方

半夏三分湯洗七遍去滑旋復花兩當歸微炒人

參分去麻黃根節去麥門冬去心黃耆

剉參分甘草壹分炙阿膠壹兩搗碎黃燥

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞

入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫

服

治妊娠六月傷寒頭痛壯熱欬嗽氣急杏人

散方

杏仁叁分湯浸去皮尖 甘草半兩炙 乾薑微赤剉

半兩炮 麥門冬一兩去心焙 五味子叁分 紫苑兩

洗去 鍾乳粉半

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水壹中

盞入棗三枚煎至六分去滓不計時候溫

服○王嶽產書妊娠傷寒六月杏仁去尖

鍾乳研 乾薑炮 吳茱萸洗 甘草炮 紫苑丑

味子麥門冬去心已上 右件八味剉熬搗

羅為散每服三錢以水壹盞煎取七分溫服日三服

治妊娠五月六月傷寒頭疼壯熱四肢煩疼

麻黃散方

麻黃壹兩去根節 桂心兩 甘草半兩炙 赤芍藥

膏兩 柴胡壹兩去苗

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫

服

治姪娠五月六月或七月卒患傷寒煩熱四體疼痛不得安附宜服通表散方

麻黃壹兩半 去根節 赤芍藥壹兩 甘草半兩 炙 微赤判

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計

時候溫服

治姪娠七八月傷寒煩熱心胃妨悶欬嘔逆不下飲食蘆根散方

蘆根壹兩 判 前胡壹兩 去蘆頭 陳橘皮壹兩 湯浸 去白穢焙

甘草半兩 炙 微赤判 赤茯苓壹兩 半夏叁分 湯洗 七遍去滑

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候溫服

治姪娠七八月傷寒煩熱喘嗽不欲食百合散方

百合 桔梗去蘆頭 貝母煨微黃 赤芍藥 紫

苑洗去土 桑根白皮判 前胡去蘆頭 赤茯苓上

各壹兩 甘草叁分 炙 微赤判

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞
 入生薑半分煎至六分去滓不計時候服
 ○王嶽產書治妊娠壹月至十月傷寒煩
 熱咳嗽不欲食胃前滿悶百合壹分桔梗八分
 去蘆貝母壹分赤芍藥壹分紫菀壹分桑白皮八分
 前胡壹分赤茯苓壹分甘草四錢右件
 剉熬擣羅為散每服三錢以水壹盞入生
 薑壹片煎取六分去滓不勒時候服日四
 服嚴氏濟生方治妊娠風壅相交咳嗽痰

多心胃滿悶袖珍方心胃不利煩滿不食百合蒸紫菀
 茸洗貝母去心白芍藥去蘆赤茯苓去皮桔
 梗去蘆炒甘草炙半兩右咬咀每服四錢水
 壹盞半醫方集成南北經驗薑五片煎至
 八分去滓溫服不拘時候得效方同
 治妊娠七八月傷寒頭痛壯熱心腹虛脹四
 肢少力柴胡散方

柴胡壹兩續斷壹兩芍藥壹分當歸半兩剉白
 朮壹兩赤芍藥兩厚朴壹兩薑汁香煎枳

散三分 麩炒甘草半兩 炙

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫

服

治妊娠八月傷寒頭痛壯熱小便赤黃心腹

氣脹不思飲食赤芍藥散方

赤芍藥壹兩 當歸半兩 白朮壹兩 前胡壹兩

頭赤茯苓壹兩 枳殼壹兩 麩炒壹兩 麩炒壹兩 人參參分 去

厚朴半兩 薑汁炙令香熟 甘草半兩 炙

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞

入生薑半分葱白五寸煎至六分去滓不

計時候溫服

治妊娠九月傷寒頭痛壯熱心中煩悶小腹

冷疼芎藭散方

芎藭參分 吳茱萸一分 湯浸七 白朮壹兩 當歸

參參分 赤芍藥參分 阿膠半兩 擣碎半 夏半

湯洗七 前胡壹兩 去枳實 炒微黃 甘草一分

赤芍藥

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞
入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計
時候溫服

治妊娠九月傷寒煩熱或覺胎不穩腹滿懸
急腰疼不可轉側阿膠散方

阿膠半兩搗碎 陳橘皮半兩湯浸 半夏半兩
湯洗七芎藭半兩 白朮三分 當歸半兩剉 赤芍
藥三分 麥門冬去心

入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計
時候溫服

治妊娠十月傷寒頭痛壯熱欬嗽煩悶石膏
散方

石膏二兩 人參壹兩去 麥門冬壹兩去心 杏仁兩
湯浸去皮尖雙人 細辛半兩 柴胡壹兩去苗 赤芍藥
兩 甘草半兩炙 葵子三分

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞
入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫

服

治妊娠十月傷寒煩熱吐逆不欲飲食赤茯苓散方

赤茯苓 白朮 麥門冬 去心 人參 去蘆頭 黃

者 剉已上 半夏 半兩湯洗七遍去滑

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞

入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計

時候溫服

治妊娠傷寒頭痛壯熱肢節煩疼麻黃散方

麻黃 壹兩去根節 前胡 一兩去蘆頭 人參 壹兩去蘆頭 赤

芍藥 壹兩 知母 壹兩 石膏 二兩 黃芩 壹兩 桔梗 壹兩去蘆

頭 壹兩 右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞

入葱白五寸生薑半分棗三枚煎至六分

去滓不計時候溫服

治妊娠傷寒壯熱頭疼躁悶犀角散方

犀角屑 半兩 柴胡 壹兩去苗 梔子 半兩 薺芩 壹兩 石

膏 二兩 甘草 半兩炙 微赤剉

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞入淡竹茹壹分煎至六分去滓不計時候溫服

治妊娠傷寒熱病護胎救生散方

浮萍草壹兩 川朴消兩 蛤粉壹兩 川大黃壹兩

微炒 藍根壹兩

右件藥搗細羅為散水調封臍上安胎解

煩熱極效

治妊娠傷寒百節疼痛壯熱心躁若不早療

卽胎落不安升麻散方

川升麻一兩 柴胡一兩 葛根半兩 知母半兩

石膏兩 大青叁分 梔子人叁分 甘草壹分 炙

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞

入葱白五寸煎至六分去滓不計時候溫

服

治妊娠傷寒頭痛身體煩熱脅氣滯嘔逆

不止前胡散方

前胡壹兩 去子壹兩 貝母壹兩 煨麥門冬壹兩

一兩半夏半兩湯洗人參一兩去赤茯苓
去心七過去滑木香兩湯浸甘草半兩炙
壹兩陳橘皮去白穢焙右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞
 入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫
 服

治妊娠傷寒心胃不利壯熱頭痛細辛散方
 細辛三分前胡壹兩去白朮二兩訶梨勒皮三分
 甘草半兩炙烏梅肉壹兩右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞

煎至六分去滓不計時候溫服

治妊娠傷寒壯熱心煩頭痛柴胡散方

柴胡二兩去黃芩二兩石膏二兩阿膠二兩擣
柴胡黃麥門冬叁兩甘草半兩炙

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞
 入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計
 時候溫服

又方葱白五生薑青竹茹二兩
 右件藥以水壹大盞半煎取壹盞去滓不

計時候分溫三服

治妊娠傷寒頭痛身體煩熱厚朴散方

厚朴半兩去麤皮塗生薑汁炙令香熟皂莢壹分去皮塗酥炙令焦黃

去甘草半兩炙

右件藥搗細羅為散每服不計時候點好

茶調下一錢

醫方類聚卷之二百二十二