

銀海精微
卷二


銀海精微卷之三

突

起

睛

高



突起睛高險峻利害之症也同前旋螺尖大不祥矣皆因五臟
毒風所蘊熱極充眼者內屬五臟外屬五輪五臟之氣毒攻五
輪之瞳初起麻木疼痛汪汪淚出病勢洶湧卒暴之變莫測非
精於龍木之奧旨不能措手全諺云眼不翳不瞎正此也苟非
其人殆有甚焉非徒無益而反害也治法揚湯止沸莫若去薪

是少言抄述言首海京書生九不... 幸抄... 易三車之
突起消除疼痛洗以白芷細辛當歸蒼木麻黃防風羌活未可
與點藥宜息口葷腥將息避風治若稍遲或控膿或突出一寸
高者至此之際須鋒針針出惡水疼痛方止睛高取平耳無尤
之效也

當歸

甘草

赤芍藥

菊花

羌活

桑螵蛸

羌蔚子


防風

荆芥

木賊

右各等分水煎食後加酒三盞溫服

硬臉硬睛



硬臉硬睛者胞臉睛珠俱木痛濕難運隔閒積熱肝風上壅氣
血凝滯睛臉堅硬血旺氣虛膩之人或飲酒大腸堅結多受是
症先患一眼後乃相牽俱損漸生翳膜治法初發時宜摩風膏
摩去風邪散運血氣或煎生地黃當歸川芎赤芍白芷羌活薰
洗日三度宜瀉肝膈之熱點以時藥若積年久臉有瘀血宜刺
洗黑睛有翳有膜可吹可點

閉不行故也治法宜剗洗服用當歸活血煎助陽和血湯點用

重藥加辛熱姜粉之類


當歸活血湯

方在前兩臉粘睛症內

助陽和血湯

方在前傷寒熱病症內

白陷魚鱗



白陷魚鱗者肝肺二經積熱充壅攻上致黑睛遂生白翳如魚

鱗鋪砌之狀或入棗花中有白陷發歇不時或發或聚疼痛淚
出然婦人多生此病何也苦樂不由已出七情鬱結不舒毒蘊
於肝腑者血之室也婦人以血爲主血傷則肝風黑仁風輪多
生是翳甚至白陷釘入黃仁引血相授漸成大患額頭兼痛用
摩頂膏摩擦封貼於額頭處用陰二陽四丹吹點或用青鹽黃
泥固濟包煨熟研末以鴨毛蘸點於魚鱗中日一次又能除此
翳耳

問曰黑睛生白翳凹入不平成陷者何也答曰肝虛血衰也故肝
虛則受風風甚則作痛血衰則成陷治法點用珍珠二八丹之類
痛甚宜服

睛高病內

羞明而不痛者宜服

蟬花散


蜜蒙花散

二方在兩臉
枯睛症內

桑螵蛸酒調散

方在暴風
客熱症內

花翳白陷



人之患眼生翳如蘿蔔花或魚鱗子入陷如碎米者此肝經熱毒入腦致眼中忽然腫痛赤澁淚出不明頭痛鼻塞乃是肝風熱極腦中風熱極致使然也宜服瀉肝散如味脩肝散主之

瀉肝散

黑參

大黃

黃芩

知母

桔梗

車前子

各一兩 羌活

龍膽草

當歸

芒硝

右為末等分水煎服

加味脩肝散

羌活

防風

桑螵蛸

梔子

薄荷

當歸

赤芍藥

甘草

麻黃

加連翹

菊花

木賊

川芎

白蒺藜

大黃

黃芩

荊芥

各一兩

右為末各等水煎入酒溫服

蟬花散

蟬蛻

菊花

蒺藜

蔓荊子

草決明

車前子

防風

黃芩

甘草

右等煨水煎服

補腎明目丸

方在前蠅翅黑花症內

密蒙花散

方在前兩臉粘睛症內

水 蝦 翳 深



水蝦翳深者黑睛上生翳如水蝦形狀因而名曰水蝦也大抵與魚鱗白陷同也亦因肝經有熱微微小小占在眼之風輪黑睛含糊清眵填粘於翳之低處乍時赤澁淚出眵滿矇蔽瞳人一重如鼻涕或黃或白看則如膜遮障一般離却又生日久能損眼發歇來往治法宜陰二陽四二夜吹一次稍退宜點侵晨用菊花側柏葉黃連歸鬚桑白皮之類煎湯日洗二三次服撥雲退翳散

撥雲退翳散

楮實子

薄荷各五錢

川芎

一兩五錢黃連

菊花

蟬蛻各五錢

瓜蒌根

生用三錢

蔓荊子

密蒙花

蛇退各五錢

荊芥穗

香白芷

木賊

防風

甘草

各五錢

右為末煉蜜為丸如櫻桃大每二兩作十九丸每服五二日二服
治眼引子於後

氣障木香煎湯下


眼當昏暗菊花好茶下

眼睛無端懶視當歸下

婦人血暈當歸湯下

虛弱之人十全大補湯下

玉翳浮瞽



玉翳者風充入腦積熱肝腸發歇疼痛失於調治日久積累血
凝不散結成白翳遮瞽瞳人如玉色相似立名玉翳遮瞽如此
之狀有進有退有紅有淚發歇未定治法用陰三陽二藥次點
一次眼淚帶藥汪汪流出如此之狀甚翳膜必能漸漸收捲滙
如磨鏡塵埃去淨明必復矣若發年久無進無退不紅不痛縱
有丹藥之驗刀針之利終無措手之處撥雲墜翳聖藥之聖功

效不能施爲縱然公侯王孫若受此疾爲廢人矣雖有千金之貴天下之醫孰近莫能其出手也

問曰人之患眼翳如玉色遮瞞烏睛者何也答曰此同肝風充入腦積熱在於肝膈之間久乃腎虛致眼中常發熱或赤痛初則紅腫赤脉穿睛漸漸生白翳膜初起如碎米久則成片遮瞞烏睛凝結如玉色名曰玉翳遮睛治之宜服瀉肝散明目菊花散通明補腎丸

瀉肝散 治胃中熱

歸尾 大黃 黃芩 桔梗 知母 羌蔚子 芒硝

車前子 防風 赤芍藥 梔子 連翹 薄荷

右各等分每服六錢水煎服

明目菊花散

菊花 車前子 熟地黃 木賊 蒙花 薄荷

連翹 白蒺藜 防風 川芎 荆芥穗 甘草

右各等分水煎服


通明補腎丸

楮實子 五味子 枸杞子 略一 人參 兔絲子 肉蓯蓉

菊花 熟地黃 當歸 牛膝 知母 黃柏 青鹽各二兩

右煉蜜為丸每服五十九丸空心鹽湯下

月八水輪



膜入水輪者肝腦積熱邪在肺經此金尅木之候也故黃仁在
時生瘡白色可後又發日往日來致膜漸入水輪此翳之根也
如水之得土變化異常遂生瘡不退日積月累久成大患謂之
膜入水輪流汁流膿痛澁難開右患傳左左患傳右治法宜明
藥之類加以葱艾吹以丹藥服以湯散無有不效若傷日久不
痛不疼不淚不紅如釘入木如玉之有瑕玷如玳環之有黑點

此黃仁與水輪變白定矣雖使岐黃龍木再世亦不能為也

問曰風輪生瘡或突起愈後變成白翳久不散者何也答曰肝

木衰金氣甚也此病初患時有痰有淚治宜退血瀉肺金脩肝

活血無痰無淚淡白色者宜服補煖活血之劑治之

馮肺散

當歸

黃芩

各一兩

桔梗

麻黃

枳殼

各半兩

秦皮

葶藶

菊花

旋覆花

生地黄

防風

白芷

甘草

玄參

梔子

各一兩

地骨皮

八錢

右為末每服三錢桑白皮煎湯下

脩肝活血湯

皇眉

五錢

川芎

五錢

五錢

防風

黃連

大黃各三錢

薄荷

連翹

白蒺藜

菊花各兩

右每服四錢水煎服

風輪釘翳



釘翳根深者與膜入水輪同也此乃勞傷肝經或性燥急促之人啼哭含情之婦欲強制鬱傷於肝赤澁難開痛牽頭腦淚出羞明怕日釘翳日深接引黃仁根深血援終不移治法宜用退

熱飲去風散血之劑或痛甚服酒誦散一二貼頭痛熨以葱艾
洗以防風川芎菊花歸尾白芷麻黃羌活荆芥之類量脈弱大小
輕重改以丹藥將息避風大忌淫慾嗔怒不疼不痛亦爲不治
之症也

問曰風輪生翳如針如麻米者何也答曰肝虛火動也此証多
是性燥之人或思慮太過所致治法疼痛甚者宜服洗肝散糖
煎散點用珍珠散加涼膈散 俱在前

脩肝散

梔子 薄荷 防風 當歸 甘草 連翹 大黃 黃芩
蒼朮 羌活 菊花 木賊 赤芍藥 麻黃

右依等分爲末每服二錢食後蜜水調下或煎日進二三服


糖煎散

龍膽草 防風 防已 大黃 荆苓 赤芍藥

當歸 甘草 川芎

右各等分爲末水煎臨時服入砂糖少許同服

黃膜下



積膜下垂者脾胃熱風結血凝氣滯膏脂塞塞血運不能通故

生是疾發歇無時痛澀淚出漸生黃膜下垂發則膜舒退則膜
捲胸皮下垂羞明怕日雖舉不張黃膜漸長遮瞞瞳人也甚至
滿目皆黃難辨人

治法雖不是拳毛倒睫之症亦可夾些眼皮使露黑睛黃膜氣
舒發歇年久可夾乍發不宜夾治宜通脾瀉胃撥雲入正之劑
以對克之丹片腦少許如有淚退之速無淚退之遲忌口齋戒
使衰其血易於調理也又有一症黃膜從下生上爲之黃膜上
充大抵治同厚者宜挑剪

問曰白睛黃赤生翳如赤膜者何也答曰脾胃得肝木克土之
候也治宜省味金花丸去其黃膜後用針砂平胃丸收功點用

重藥腦不可用少下

針砂平胃丸

久服平胃氣去肝邪

蒼朮

厚朴

陳皮

甘草

針砂

右各等分咬咀為末煉蜜為丸如棗豆大每服五十九空
心米湯下

省味金花丸

治脾胃積熱致生黃膜

梔子

黃芩

黃柏

桑白皮

地骨皮


桔梗

知母

甘草

右為細末煉蜜為丸茶清送下

赤膜下垂



眼胞下生赤膜垂下遮於黑睛疼痛者乃胃熱也治法紅痛甚者服鬱金酒調散大黃當歸散微退後用撥雲湯生地黃散點用重藥加清源散藥以上方俱在前

大黃當歸散

治胃中有熱生膜疼痛

當歸

赤芍藥

川芎

菊花

大黃

黃芩

杏仁

薄荷

右各等分咬咀食後水煎溫服


生地黄散 治眼下赤膜發歇無時久服則不發

生地黄 黃柏 知母 防風 荆芥 升麻 乾葛

天花粉 黃芩 甘草 桑白皮 白茯苓 赤芍藥

右咬咀每服七八錢重水煎食後服

逆 順 生 翳



逆順生翳與赤膜下垂與黃膜下垂上充之症頗同然此順逆

者五臟虛勞風熱沖於肝膈上胞陽明經毒壅血氣凝滯故毒
膜垂下謂之垂簾翳此為順下臉太陰肝經毒壅故翳膜下生
向上謂之逆翳治法宜服瀉脾胃之劑太抵去翳之藥隨其輕
重增減用之宜忌口諸毒

問曰眼上下逆順上翳者何也答曰肝經虛損積毒熱甚至生
翳四起侵黑睛治宜明目流氣飲蟬花無比散點用珍珠散次
用三七丹腫者亦可煎洗

明目流氣飲方在前傷寒熱病總內治脾得邪熱或逆順生翳

蟬花無比散 治風毒傷目昏暗漸生白翳遮睛

白茯苓

甘草炙助

防風各四兩

川芎

赤芍藥各三兩

石決明研極細

白芍藥四兩

蚶蜆兩

蟬蛻去頭足 四兩

蒼朮一兩

當歸酒浸 二兩

右為末每服三錢食後米汁調服茶亦可忌食毒物

漏

眼

膿

血



漏眼膿血者有甚於釘翳并膜入水輪二症之利害也此症未發之時其頭先覺昏悶四肢如勞五臟多積風熱壅毒攻充於黑睛黃仁生出毒瘡灌溉水輪控血潰爛流膿治法宜慈艾八

白芷錫內炒熟以綿裹熨於眼胞上屢按熱的散其惡血消其
敗膿止其惡痛生地黄搗爛煨於有瘡處更妙用陰三陽四
丹對於有瘡處吹或單用枯礬輕粉血竭乳香研細對着瘡處
吹點亦可洗以桑白皮入鹽花明礬熨洗服以墜血明目丸沒
藥散忌動風動血之物


墜翳明目丸 方在前血灌瞳人症內

沒藥散

沒藥 大黃蒸少用 朴硝

右為末每服三錢酒調下茶亦可

飛塵入眼



飛塵入眼者此症全然無事誤被物或飛塵飛絲入眼者此外傷也只爲塵物粘在胞臉之間粘定不出痛澁難開碇澁淚出致生障膜初患之時治法用絲線纏耳環脚沓轉上下胞臉撥出塵物卽可若初時不諳此法少療日久必生翳膜遮瞞瞳人須有丹藥吹點胞臉內仔細查看有物粘處必定有血積成塊或肉疙瘩此是病之發縱處宜小鋒針挑撥或有刺塵處針去

血出可其為病之根也曰外病也初起宜將絲線捲銅匙脚擦
撥出塵物灸者宜審轉看上下有積處刺洗至平點用清涼散
服以散血退熱之劑

酒調散

當歸

甘草

大黃

赤芍藥

菊花

桔梗

蒼朮

桑螵蛸

麻黃

羌活

羌蔚子

連翹

各一兩

右為末每服三錢酒調下

脩肝散

防風

羌活

當歸

生地黃

黃芩

梔子

赤芍藥

大黃

甘草

蒺藜

各一兩

拳毛倒睫



拳毛倒睫者此脾與肺二經之得風熱也肺為五臟之華蓋主一身之皮毛肺虛損則皮驟而毛落也脾家多壅濕熱致令上胞常腫大抵肝家受熱不時淚出痛痒羞明怕日赤澁難開常以手摩引致令上下胞臉皮漸長眼漸緊故睫毛奮倒裡面刺眼碍澁瞳人漸生翳膜欹頭側視不能正觀治法先宜剝洗痰

血後用竹夾夾起眼皮炙四五壯為妙使毛生向外其症瘥矣
睛中有翳用陰二陽五升吹點翳即消磨其夾須依口訣務令
緊夾不可滋水恐潰有疤痕若脫下痕處用光粉調香油逐早
搽抹久則肉色一般眼目光明如舊

細辛湯 治脾經腫得風熱宜服

細辛

防風

知母

羌蔚子

林大黃

桔梗

羚羊角

黑參

右咬咀每服四錢用水煎食後溫服

防風飲子

黃連 一兩

細辛

蔓荊子

錢各三

葛根

防風錢各五 當歸身錢 甘草錢 人參

右水煎食遠服避風忌口

除濕壓熱飲

細辛 蒼朮各一兩 防風 知母 羌蔚各兩

桔梗二兩 大黃 黃芩 梔子仁 朴硝

右水煎服

阿膠丸

阿膠蛤粉炒 鼠粘子炒 甘草 糯米炒各一兩 馬兜鈴

欬冬花 紫菀 桔梗

右為末煉蜜為丸如彈子大每服一丸食後細嚼薄荷湯下


密蒙花散

密蒙花 羌活 菊花 石決明 木賊 黃柏

白蒺藜 黃芩 蔓荊子 青箱子 枸杞子

右每服三錢茶送下水煎亦可

充 風 淚 出



充風淚出者症非一也有腎虛不生肝木肝經受風而虛損故水動也迎風而淚出也肝經虛者宜服止淚補肝散止之大止

淚之法點用重藥熱淚者服川芎茶調散點用清涼散肝風者宜蒼朮止之不赤不疼淚出是謂之風淚腫痛赤澁淚出者此熱淚也若迎風而出汪汪冬月多夏月少拭却還生又不分四季皆有此冷淚也冷淚者乳香川烏九川烏一箇草烏二箇去皮明礬一錢白麩塊一箇爲末棕豬膽汁爲丸如黍米大每用一丸夜卧時放在眼之大眦頭淚止卽止或灸止之又有肺臟久冷大眦有竅名爲淚堂淚堂通肺腑此淚難治久流則能令目昏暗血氣虛弱之人不腫不赤但淡紫紅者澁痛淚出是虛淚

灸法

以流冷淚灸上迎香二穴天府二穴肝膈二穴第九骨開各對半

止淚補肝散 治肝虛迎風淚出不止宜夜睛明二穴係大指頭

風池二穴臨泣二穴

蒺藜 當歸 熟地黃 川芎 白芍藥

木賊 防風 夏枯草 血虛者不用

右各等分爲末每服二三錢茶酒任下

蒼朮散 治風濕傷肝流淚昏花

蒼朮 木賊 香附米 夏枯草 蟬蛻 甘草

蒺藜 白芷 防風 蔓荊子 川芎 姜蚕

右依各等分爲末每服二三錢茶清下酒亦可


川芎茶調散 治一切熱淚眼眩濕爛

川芎 防風 羌活 甘草 木賊 石膏

石決明 荆芥 薄荷葉 菊花各一兩

右爲末每服二三錢食後茶下

肝風積熱



肝風積熱者肝家勞苦七情鬱結二三年間來來徃徃一發一歇遂生翳膜或聚或散亦澁淚出此症多是夜勤燈光觀書更或雕畫打銀細巧之人久累用家積熱成風肝若受風必有翳

痛不覺漸漸昏蒙治法有驗者吹以丹藥內服瀉肝省風之劑
除肝家之風熱息口將息一年半載病根除矣其洗眼照依痰
痛腫澁眼之方載在前症條下

問曰眼目遞年舉發無時者何也答曰肝經積熱也經云肝勞
則氣逆肝寧則氣順氣急則發氣順則歇治宜發時痛甚者服
洗肝散省風湯之類常服此數方則能除此病也點用清涼散
洗肝散 方在天行赤眼症內

瀉肝散 治肝經積熱

- 黑參
- 大黃
- 黃芩
- 知母
- 桔梗
- 芒硝

右等分爲末每服二三錢食後熱水調下日二次


省風湯 治肝熱大旺瞳人不清或細小宜服

防風 犀角 大黃 知母 玄參

黃芩 羚羊角 肝虛不用 桔梗

右為末每服二錢水煎入燈心竹葉食後服

坐起生花



坐起生花者此是內障此症肝血衰膽腎二經虛也太陽不與故又坐傷血起則頭暈眼花或前常見花發數般或赤或黑或

白繚亂昏暗不明良久乃定瞳人開大不清此症宜補肝腎或
明目固本丸不治恐久變為青盲因同變為五風難治之症也
固本丸只生熟二地黃天門二冬加人參也

問曰人之坐起眼前見花數般茫茫如蠅翅者何也肝腎二經
氣之也經云肝腎之氣充則精彩光明肝經之氣乏則昏蒙眩
暈治法宜補腎丸補肝重光散還睛丸明目固本丸補腎明目
丸隨人氣體虛實加減用之

補腎丸 治血氣虛弱變成內障宜服

磁石 大煨醋淬七次
水飛過三兩 肉苁蓉 酒浸

五味子

熟地黃 酒蒸

枸杞子 兔絲子 淘淨酒浸蒸
另研各二兩

楮實子

覆盆子 酒

車前子一兩 石角五錢 沉香五錢 黃柏五錢 青鹽五錢 或加知母

右煉蜜丸如桐子大每服五十九空心鹽湯下

補腎明目丸 治肝腎血虛視物不明諸眼服涼藥裏愈後少神光

羚羊角 生地黃 肉蓯蓉 枸杞子 防風 草決明各

楮實子五錢 乾菊花 羌活 當歸各二兩 羊子肝四兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九空心鹽湯送下日午清


茶下臨臥酒下不飲酒人參當歸湯下

明目固本丸 治心熱腎水不足用少睛光久服生精清心

生地黃 熟地黃 天門冬 麥門冬 枸杞子 乾菊花

石各研末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十九空心鹽湯下

黃昏不見



人之兩目至日落西之時漸漸不見亦係內障俗謂之雞毛眼也此乃腎之虛也眼雖屬於竅阿乃歸腎而為主腎盛則眼目昏或貪淫樂慾酒色過度使腎臟衰憊真受天直不全精神短少致瞳人神腎水不清故目之無光也治之須有還睛補腎看人老少虛實斟酌藥餌以平之飲食以補之戒色斷慾使會陰水自然明矣

還睛補腎丸 治內障方在日眼白花症內

補腎明目丸 治諸內障欲變五風變化視物不明

川芎 當歸 熟地黃 菊花 山藥 知母 石菖蒲

黃柏 青礬鹽 遠志 白茯苓 川巴戟 五味子

白芍藥 桑螵蛸 羌蔚子 兔絲子 青箱子

密蒙花 枸杞子 肉蓯蓉 石決明

右為天煉蜜為丸如梧桐子大每服四十九丸空心鹽湯下

十味還睛丸 治下元虛憊一切內障

防風 羌活 密蒙花 青箱子 川芎 葵藜

甘草 白朮 木賊 兔絲子酒浸三宿
生用焙乾

右為未煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九空心鹽湯下

瞳人乾缺



瞳人乾缺者亦係內障與外障無異但因頭疼痛而起故列外障條中按此症因夜臥不得肝藏魂肺藏魄魂魄不安精神不定而少臥勞傷於肝故金井不圓上下東西如錐齒偏缺參差久則漸漸細小視物朦朧難辨人物相障俱損治法宜瀉膽補腎之劑一本無皆瀉飛內有肝腎俱虛火旺也用猪肝煮熟露

宿侵晨切薄難夜明沙細翳此藥能通明益膽之功瞳人小者
肝之實瞳人大者肝之虛此症失於醫治久久瞳多鎖緊如小
針眼大內結有雲翳或黃或青或白陰看不大陽看不小遂成
瞽疾初起時眼珠墜痛大省微紅猶見三光者宜服五瀉湯省
風湯同補腎丸及補腎明目丸久服效方俱在前

五瀉湯

治瞳人乾缺肝火旺及五臟虛火旺動此藥能瀉火

黃柏

知母

木通

梔子

生地黃

甘草

黑參

桔梗

黃芩

防風


熱甚加羚羊角

犀角

黃連

右咬咀每服六七錢用水煎食後服

癢極難忍



癢極難忍者肝經受熱膽因虛熱風邪攻克肝含熱極肝受風
 之燥動木搖風動其癢發焉故諸癢屬虛虛則癢諸痛為實實
 則痛黑珠癢者有眼眩癢者點以丹藥或煨姜摩擦淚通癢止
 或濕癢用碧天丹洗侵晨洗以鹽湯或入桑白皮防風荆芥薄
 荷之類

問曰眼迎風受癢者何也答曰脾肝二經受風邪也治法癢時

用三霜丸撥雲散綿裹散洗用去風藥

三霜丸 治痒極難忍用此丸即愈。

姜粉 枯礬 白朋砂

右為末口津液調和如粟大要用時將一丸放於大眥止之


綿裹散 治眼濕淚爛弦眼目

當歸 黃連各一錢 銅青七分 枯礬四分 朴硝

右各為細末用細絹色線縛緊每一箇約龍眼核大要用時將

一箇用白湯半盞洗之一日二次

眼肉風痒



問曰人之患眼渴風痒極者何也答曰此因肝虛含者風熱膽
經風毒上充入眼遂遇風受痒宜刺洗服藁本烏蛇湯補膽湯

藁本烏蛇湯

藁本

烏蛇

防風

白芍藥

羌活

川芎

細辛

右浸酒煎服亦可

補膽湯

前胡

馬兜鈴

茯苓

各一兩

柴胡

人參

桔梗

細辛


黑參

石煉蜜為丸每服三錢水煎服亦可

垂

簾

翳



問曰人之患眼生翳如珠垂簾遮睛者何也答曰此因心火虛炎肝經風熱上攻入腦中熱毒流下住於風輪故眼赤澀淚出

腫痛無時年久烏睛白紅色故名曰垂簾翳宜服洗心散加味脩肝散

洗心散

荆芥 薄荷 連翹 麻黃 赤芍藥

梔子 黃連 大黃各一兩

右每服五錢水煎服

加味脩肝散


梔子 薄荷各二兩 羌活一兩 當歸 大黃

連翹各五 黃芩 赤芍藥 菊花 木賊

白茯苓 川芎各一兩 麻黃 甘草

右為末每服三錢用酒調下痛用酒不痛水煎服

鸛眼凝睛



鸛眼凝睛此驟然所感非久患之症因五臟皆受熱毒致五輪
振起堅硬不能轉運氣血凝滯睜然如鸛鳥之眼凝視不運之
貌難辨人物因形而名之曰鸛眼凝睛治法宜用香油調妻粉
汗於額面部摩擦及面上或厚風膏摩擦更好服以酒煎散以
被蓋出汗其眼即活動面用燈火燒之斷其風路此症多是

小兒急慢驚風之症大人少有此患

桑螵蛸酒調散

方在前暴風客熱內眼障初服


導痰消風散

陳皮 半夏 甘草 白芷 全蝎 羌活

防風 荆芥 升麻 細辛 蘆香

右咬咀各等分水煎姜三片溫服

開展 轆 轆



轉輻展開者與鵲眼凝睛症同鵲眼凝睛者睛凝不運之貌轉輻展開而大者此瞻睛之冰散焉瞳人之大小隨黃仁之展縮黃仁展則瞳人小黃仁縮則瞳人大人不知瞳人能大小者非也此乃肝受風而不展轉輻則瞳人圓圓也隨肝輪而縮瞖寬瞳人大不收號曰轉輻展開症風克入腦眼帶吊起此症小兒急慢驚風受之治法昔前姜計謂香油摩風膏摩擦藥用蚌殼頻頻灌下乳母忌口

問曰瞳人開大不收而展縮者何也答曰肝受風痰盛也治法僻異錠子牛黃丸石楠散初起者宜發表小兒如此患治法亦同僻異錠子治肝瞻受風變成前症小兒通睛瞳人濶大並皆治之

牛膽南星七錢 防風

乾姜各三錢 白附子五錢

牛黃三錢

川烏

白芷

薄荷

木香

白朮

白茯苓 人參

各五錢 硃砂

一錢

別香五錢

白姜蚕

廿箇生用

片腦五分

右將前藥俱研為細末冬用蜜二斤甘草半斤煎作膏稀稠得宜將次藥末和作錠子金泊為衣小兒急慢驚風手足搐搦金銀箔磨湯化下一錠大人破傷風酒化下三四錠子約一錢一箇或七分一箇舉此麻黃一斤甘草半斤用水三四碗砂鍋內煎至三鍾之時入蜜一斤緩緩熬煉滴水內成珠方將前藥攪和為丸即作錠子也

牛黃丸 能去風痰

牛黃 三分 白附子 全蠍 肉桂 川芎

石膏 各一兩 白芷 三分 藿香 五錢 麝香 少許 硃砂 二錢

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服二三丸臨臥薄荷湯下

通頂石楠散 能利膈開風痰

石楠藤 藜蘆 各一兩 瓜蒂 一分

右為末米湯下一匙日一二服灌入口內去風痰

小兒通睛



小兒通睛與鶻眼凝睛輓輻展開等三症頗同然此症或因外物打着頭額或被諸般人物驚心遂成驚風之症風熱傷肝魂不應目風邪上壅黃仁不成闕鎖瞳人開惟直視不辨人物致眼通睛通者黃仁水輪皆黑似無黃仁瞳人水散似無瞳人此黃仁與瞳人通混不分號曰通瞳亦風藥摩擦二法發散風邪宜服牛黃丸不須點藥只服藥然前症牛黃丸通頂石楠散亦可用也

牛黃丸 通頂石楠散二方俱在前症條下

五七犀角飲

犀角

人參

茯苓

甘草

遠志各一


右咬咀水煎服

小

兒

疹

痘



小兒疹痘者名爲百歲瘡也不論大小俱患一慶疹痘入眼疹
有兩分痘瘡初上皮膚之際眼閉不開眼上卽有痘瘡點在黑
睛上易治急取益母草煎湯燻洗日三度更以陰一陽五丹調
鱗魚血點忌口及佞啼初發亦忌口須疹痘痊可其眼漸開眼

中之痘小隨而痊矣又有一症疹痘之後瘡痂落盡肌體肥壯
眼中忽然紅澁此乃餘毒鬱結於肝而發出此症十分利害失
治多能害目只用車前草搗水頻與吃下洗却肝經之熱毒洗
以益母草點以鱖魚血調藥經曰疹痘之後毒氣鬱結發肝而
氣不能泄攻發於眼傷於瞳人者素無治法也

問曰小兒此症八眼者何也答曰小兒痘瘡之發五臟皆熱毒
之氣壅塞停留熱氣在肝膈充八眼使疼痛淚出怕日羞明難
開遂生瘡於眼內久發變爲白膜初覺瘡入眼中赤澁之時急
將藥泄其毒外以退翳之藥若不能爲終身之患也先將秦皮
湯洗目眼紅花退翳散服之効

秦皮

秦艽

防風

細辛

各一兩

甘草

一錢

右將水二盞煎至一半熱洗

紅花散

紅花

連翹

當歸

生地黄

紫草

大黃

甘草

赤芍藥

右燈心竹葉水煎服

撥鬚散

即猪肝散

真蛤粉


谷精草

夜明砂

右為細末用猪肝二兩切開摻藥於內以麻扎定煮水冷將肝

同藥細嚼煮肝本汁燕諸般毒物莫吃

小兒眼翳生翳



小兒眼生翳者脾胃宮熱所致或是胎中受毒或因乳母好食
熱物皆能令小兒患眼是病之大小疾之遠近輕重一週半載
者其藥須令母吃或蛤殼灌入小兒吃可也二三歲者此是胎
毒也離母之後患眼者此是小兒自受之症與母無預此藥須
令小兒吃忌以油膩煎炒糖甜菓子之類不獨患眼所忌不忌

參在藥中必變為必傷元氣者目甚是不化之病其病且另有食
條欵此乃小兒生翳症也黑睛如麻豆大如蘿蔔花與疳眼大
不侔矣一倍三黃丹一倍珍珠散點用


加味脩肝散

梔子 薄荷 連翹 麻黃 赤芍藥 羌活 當歸

大黃 黃芩 菊花 木賊 白蒺藜 川芎 甘草

右水煎食後服

痘疹入眼



問曰小兒痘疹入眼者何也答曰小兒於母胎中受其毒必發
疹痘出之時五臟俱有熱相攻或肝臟熱甚必有痘生於目內
宜服

涼肝散

草決明 天花粉 甘草 赤芍藥 綠豆皮 谷精草
右為末每服六錢蜜水調下

凡小兒痘疹傷眼者何也谷曰內臟虛弱上攻也治法經云
切不可瀉餘毒宜用微涼劑和解此症初起睛上紅紫澹痛可
用通神散或車前草搗蜜水頭頻與吃洗去肝中火邪若至喪
明睛中有翳或凹入者經云痘疹之後毒氣鬱結於肝傷於瞳
治素無治也

通神散 治小兒疹痘用此能解毒

白菊花 菘豆皮 谷精草 石決明 煨過

右各等分爲末每服二錢乾柿一箇米汁水一盞同煎候水乾
不拘時服能服湯藥只將本方煎服亦可

救苦觀音散

桔梗

當歸

連翹

藁本

細辛

蒼朮

龍膽艸

羌活

黃連

知母

黃芩

黃柏

川芎

柴胡

防風

升麻

生地黄

紅花

右各等分煉蜜爲丸能吞者每四五十丸服小者量服之

通神散

菊花

谷精草

蜜蒙花

蒙豆皮

蒼朮

石決明

甘草


黃芩

蟬退

木賊

右各等分水煎食後溫服

小兒雀目



問曰大人小兒雀目至申酉時不見物者何也答曰肝虛受邪
熱所傷經絡凝滯不和陰陽不和榮衛不通夜至昏也治法宜
服五膽丸蝙蝠肝散又宜服蒼蠅散猪肝散主之不用點藥虛
極者諸補藥亦可增減用之

蒼蠅散

用蒼蠅翅草及花爲細末用白水煮猪肝露一宿空心煎丸

又可服猪肝散

猪肝散 卽退翳散方在前小兒疹痘症內

五膽丸

熊膽一箇 黃牛膽二箇 青魚膽一箇 鯉魚膽二箇 青羊膽一箇

石決明二兩 夜明砂一兩 麝香少許

右爲末將前膽和爲丸如菘豆大每服三十丸空心茶下

蝙蝠散

蝙蝠肝一箇 石膏一兩 黃丹 石決明煨 白蒺藜炒各二兩

若無蝙蝠肝用羊肝加夜明砂

右將前藥研細末每服二錢米湯調下無蝙蝠肝用羊肝一塊

切作四塊以藥一二錢糝肝內以麻縛定用米汁水水確內煮
熟次早取出羊肝藥細嚼以煮肝汁同食效如體虛弱之人亦
可服補藥爲丸尤妙

胎風赤爛



胎風赤爛者其症有三初時血露入眼洗不乾淨而生是疾遂
至赤爛又有在母胎中其母不知忌口多食壅毒之物酒麵五
辛之類至產生三箇月兩眼雙赤眵粘四皆紅赤濕爛此是胎

毒所致此小兒在腹中飲母血血毒於兒生出方發此症也又有乳母壯盛之人抱兒供乳之際兒口未哺乳頭汁脹滿其汁洒然射出充八兒眼亦能生此爛濕若充射面部則能生疵濕瘡痒大抵此三症通號曰胎風赤爛孰知內有三因之由血露不淨與乳充射宜碧天丹洗胎毒者須母服三黃丸忌口小兒亦用三黃湯燻洗點以時藥可也服宜小防風湯小承氣湯小菊花膏導赤散此數方隨冷熱用之或童子患眼者治法亦用此數方知減點用時藥

小防風湯 此數方治小兒胎風赤爛小兒眼生翳

大黃 梔子 甘草 赤芍 歸尾 防風 羌活

右等分水煎食後服

小承氣湯

大黃

薄荷

杏仁

蠟退

甘草

羌活

天麻

當歸

赤芍藥

防風

右水煎服

小菊花膏丸

治小兒風毒眼

黃連

枯黃芩

大黃

乾菊花

羌活


蒼朮

荆芥

防風

右為細末煉蜜為丸每服四五十九或為膏

小兒疳傷



小兒疳傷之症富貴之家多生是疾蓋由父母速愛之由也小兒如草木之萌蘗怎受風日寒露之欺且小兒五臟六腑未實氣血柔弱怎禁油膩煎炒及諸般葷腥或一週半載縱口菓子糖甜之物及鵝鴨雞豬牛羊等肉或飯方了又哺以乳或乳方飽又與其飯此出於父母至情富貴之家有是症焉貧賤之家豈有是患何也一食諸物不消不化先傷於脾致腹脹午後發

蓋至夜牛方退日夕頭髮稀疎轉作流瀉頭爛甚具漆至夜
肝膽眼之白仁鮮紅羞明怕日漸生翳膜遮睛黑珠或突起如
黑豆如香菽之狀治法先治內後治外用雞卵入輕粉一二分
史君子仁一箇半熬珠幾顆濕綿包煨與吃宜空心連吃五七
彈止又宜煮羊肝露宿蘸夜明砂吃或猪肝亦可切宜忌口葷
腥其白膜用陰一陽七藥調乳煎煎胡宣三連服側柏藥燻洗
若瘡傷肝瞻眼珠突出或瞎盡爲不治之症不獨瞎眼甚至喪
命若聲啞口乾脚手俱腫十死八九

問曰小兒瘡傷眼目疼痛羞明不開爲睛上青翳如黑珠子或
白膜遮睛者何也答曰此因飲乳之際好食菓子雜物油膩及

熱毒物多使脾胃生疳或瀉泄不止夜間潮熱久則疳蟲傷脾
上攻眼目初覺紅澁羞明急瘰若烏睛上變成有黑翳如珠泄
瀉不止者多是不治宜服除熱飲等方

五疳丸 治小兒疳眼面瘦皮黃羞明怕日食乳不消

綠礬成巢
泥淨 彌佗僧煖
適 夜明砂各一
兩

右為末用蒸棗肉搗前藥末為丸如黍米大每服三四十九量
兒之大小空心米湯下

除熱飲

大黃 知母 防風 黃芩各一
兩 墨參

菟蔚子 菊花 木賊各一
兩半

右水煎食後服三匙用雞蛋一箇使君子仁三箇輕粉二分同
研末入蛋內煨熟空心服至二三箇即去疳蟲後服五疳丸
五疳丸

胡黃連

五錢

牛黃

一錢

彌佻

一錢

夜明砂

一兩

綠礬

一兩

右用棗肉爲丸綠豆大空心服三十九丸米湯送下

蕪荑丸

治小兒五疳

蕪荑

黃連

神曲


麥芽炒

石各等分爲末麵糊爲丸綠豆大每服十九至十五丸水湯下

五疳陳皮湯下

寒熱往來薄荷湯下

風弦赤眼



問曰人之患眼兩臉時常赤爛者何也答曰大人患者因脾土
蘊積濕熱脾土衰不能化濕故濕熱之氣相攻傳發於胞臉之
間致使羞明淚出含在胞臉之內此淚熱毒以致眼弦赤爛治
法春夏爛者為熱爛服用三黃湯洗用綿裹散金錢湯有瘀血
宜剗洗與服瀉脾湯秋冬爛者為冷爛又曰迎風洒淚洗用碧
大丹點用重藥臉厚剗洗之後宜火焙之小兒患者因母胎中


受熱或寒地之眼，翳膜入目，淋漓不消，拭之未乾，却感外傷風邪，使邪入目，亦生此疾。治之小兒服黃芪湯，大人服茶調散。熱甚，洗金錢湯，風甚，洗碧天丹。先剃洗，後用藥。

黃芪湯

黃芪 車前子 細辛 黃芩 五味子 蒼朮 黃連 各

右各等分水煎服

肝風目暗 痛爽



此症肝風目暗者乃是肝腎虛勞肝氣不足血虛故也不時疼
痛舉發無時痛則惟眼珠墜疼頗有赤澁淚出看物依稀眼前
多見花發數般或黃或白或黑見一物如見兩般形狀不清療
治恐損眼也此症實有內外相兼病也非徒治外而不治內曷
濟哉內則白蒺藜散補外則陰二陽八丹調乳汁點二三夜點
一次片腦少加洗以生黃菊花赤芍側柏葉秦皮白芷川芎更
加忌口五辛諸熱物莫吃

補肝活血散 虛者宜服

藁本 白芷 石決明 天麻 防風 細辛 羌活

黃芪 菊花 當歸 生地黃 黃連

本名專方前用

補腎丸 治目暗疼痛恐變成黑風內障先宜服之

澤瀉去土 細辛去苗 兕絲子酒浸 五味子炒各一兩

茶調散 卽川芎茶調散方在前充風淚出症內

三黃湯在努肉攀睛症內 綿裹散在痒極難忍症內 碧天丹

金錢湯 治久年爛弦

古錢卽老銅錢生鏽者 七箇 黃連初末 二錢 白梅乾五箇 梅自落者為白梅

右將此三味用老酒二小盞於磁罐內煎至半盞至夜時冷可

洗用不過三四日卽愈日二次

爛弦火穴法

魚尾二穴 睛明二穴 上迎春穴 攢竹二穴 太陽二穴

爛弦風之症因脾胃壅熱久受風濕更加吃諸毒物日積月累致成風爛胞臉之內變成風痘動則發痒不時因手拂拭甚則連眼眶皆爛無分春夏秋冬皆如是眵淚滿腮有不近人手之怕治法番轉眼臉利洗瘀血二三度或小鋒針針出瘀血亦可若因摩引有紅筋者宜老醋燒爐甘石淬七次加以陰丹量輕重搽點眼弦或次點眼內無妨忌動風動血之物不食可也

芫薊子

焙二兩

山藥

一兩五錢

熟地黃

焙二兩

右爲末研均煉蜜爲丸如梧桐子大每服二十九空心鹽湯下

白痰藜散

各等分水煎食後溫服

迎風洒淚症



問曰迎風洒淚者何也曰肝之虛也是亦腦冷迎風淚遂出拭却還生夏月即少冬月即多後若經二三年間不以冬夏皆有此疾乃淚通於肝肝屬木目乃肝之外候為肝虛風動則淚流故迎風淚出即服補肝散治冷淚

補肝散 治冷淚

當歸 熟地黃 川芎 赤芍藥 防風

木賊 右等分水煎服

菊花散 治熱淚

菊花 川芎 木賊 香附子 夏枯草

羌活各一兩 草烏錢一 防風 甘草 荆芥 皂莢各五錢

右為末每服三錢茶下水煎亦可

又方 治實淚

菊花 蒺藜 防風 羌活 川芎 夏枯草

木賊 甘草各三兩

川芎茶調散 治熱淚方在前充風淚出症內

蒼朮止淚散

木賊 香附子 白芷 石膏 菊花 荆芥 白蒺藜

薄荷 當歸 白芍藥 川芎 蟬退 夏枯草

右為末每服三錢食後茶清下冬淚酒下

紅霞映日



赤芍藥 白芍藥

問曰人之患眼赤溢腫痛年深有紅翳於烏睛上濃淚如紅霞
映日者何也答曰此乃三焦積熱肝膈風熱上攻致然也治之
須用去風散血清涼之藥

脩肝散 治肝氣不順

防風

羌活

當歸

生地黃

黃芩

梔子

赤芍藥

甘草

藜蘆

大黃

白蒺藜

右各等分水煎服

撥雲撒

黃芩

甘草

藜蘆

梔子

防風

蘇花 蘇家花 連翹 桔梗 薄荷

赤芍藥 白蒺藜

右水煎食後服

加味脩肝散

方在小兒眼生翳內

創製 治眼疾

參照 治眼疾

知 治眼疾

治眼疾