

沈氏書

白

書

生

雜病源流三十卷
傷寒論綱目十六卷
婦科玉尺六卷
幼科釋謎六卷
要藥分劑十卷

同治甲戌湖北
崇文書局重雕

1874

沈氏尊生序

近儒顧亭林之言曰古之醫者能生人能殺人今之醫者不能生人亦不能殺人惟置人於不生不死之間而卒至於死諒哉斯言不徒為醫發也顧吾謂亭林能言其然未嘗抉

其所以然所以然者何一曰不學一曰
失之偏夫醫之道微矣非明於陰陽
五行消息衰旺之故不足以察民病
之本源非燭乎表裏藏府羸不足
之數不能識其傳變之緩急以酌施
治之先後能察而識之矣制方不諦

齋藥失真猶無損於病况夫運氣微
渺色脉隱約自非積數十年之力破
數百卷之書而運以至靈至靜之神
明其能洞垣一方灼然不惑哉今之
人六脉不辨藥性不熟朝從事而夕
定方甚或執一家之言膠柱鼓瑟繆

希雍之末泓苓葉動至於傷生張介
賓之頰波復桂亦足以速死其書充
棟其人肩摩入主出奴黨同伐異姑
以千百人性命試其不可知之方此
吾之所大感也錫山芊綵孝廉乾隆
中以通博聞其始未嘗學醫偶讀史

記扁鵲傳而茫然或姍之曰一事不知
儒者之耻於是發憤遍求古方書誦
之厯四十年悅若有得晚乃著尊生
書七十二卷自靈素以迄宋元明諸大
家博觀而約取之參互脉證剖晰幾
希條理秩然具有端委於寒溫攻補

無所偏主推審其病之所在而以藥從之可謂能廣稽又能精研者矣夫抑陰扶陽天之道也然陰極而至於戰陽極而至於亢坤不復乾不姤造化或幾於息素問云亢則害承乃制沈君其深有得於此者乎余心儀有年覓舊本

不可得近。日始從張月卿尚書假鈔
授梓與海內共之所願。讀是編者善
體作者之意。根據古義而得其變通。
斟酌時宜以求其微。驗寒熱勿拘成
見。攻補無所偏施。於以拯濟生民。同
登壽域。民不夭疾。而物無疵癟。以廣我

國家仁育之心培養潤濡之澤而毋為
亭林氏之所譏然則余之言又豈獨
為醫者告哉

同治十三年仲春月
背楚使者合肥

李瀚章序



原序

戊寅歲余猶未冠卽受書於芊綠先生先生於書無不誦習自六經三傳聖贊旨歸以及醫卜之家皆窮極本源嘗謂余曰吾輩讀書無論事之鉅細皆當懷利濟天下之心非沾沾於制舉文字博功名便一己爲也後屢試京兆不售歎曰昔人云不爲良相當爲良醫余將以技濟人也益肆力於靈樞素問諸書以搜探其奧衍而發明之迨先生還錫山復謂余曰子仁而好學數年後當有予民之責其慎之勿替利濟之意余於己丑歲登進士官刑曹每理讞獄必求其可生者而生之以上體

聖天子明慎用刑之意亦實由於先生提命之言也閱十年奉命觀察粵東道經錫山造先生廬是時先生已捐館五年矣嗣子捧遺書並是集以屬於余余受而讀之卒業喟然曰嗚呼先生之行堅

矣先生之志遠矣學不克用而托之技技不竟用而筆之書既已
博綜前人矣又恐泥古者未通其變於是條分而縷晰之釐爲七
十二卷凡症形脈象之疑似丸散主治之異同在在皆有指南數
語使迷於學者讀之而能悟倦於學者讀之而能興是書之作其
功寧有量哉攜至粵欲刊未果遂遷黔臬夜郎地僻鮮梓人復不
果壬寅冬蒙

恩旨授以皖藩瀟水錫山一舟可達余喜曰是可托諸棗梨載歸沈氏
用廣先生之志矣自癸卯十月開雕迄甲辰三月工竣知醫者咸
乞余早綜卷帙而借觀焉書成爰誌其顛末如此

旨

乾隆四十九年歲次甲辰季春月

賜同進士出身安徽等處承宣布政使司受業奇豐額盟手拜撰

沈氏尊生書總自序

予自弱冠時讀左國史漢一人一事必究其詳知扁鵲倉公輩皆醫之神者其所以能神處務切求而根據之遂搜閱古人方書如靈樞素問等帙古奧質實直追漢魏可與史漢參論筆法乃益愛讀焉嗣是而後積數十年稽古之功往往兼習不廢得徧悉仲景以下諸名家或論傷寒或言雜病或明脉法或詳藥性分門別戶各有師承正如諸子百家流派不一而匯歸于是未嘗北轍南轅甚哉醫之道大而深也蓋醫係人之生死凡治一症構一方用一藥在立法著書者非要于至精至當則遺悞後世被其害者必多在讀書用法者非審乎至精至當則冒昧從事被其害者更多又况古人之書或議症而無方或存方而畧症

或闡脉而遺藥。或論藥而置脈。神明變化。每紛見雜出。于殘編剩簡中。醫者以庸陋之姿。膠執之見。貪鄙之心。相與從事。甚且讀書而不通其義。雖淺近之語。亦謬解訛傳。吾見其治一病必殺一人。卽或有時偶中微倖得生。在醫者并不知其所以然。然猶張目大言。自據其功。以爲非我莫治。不亦可愧之甚矣乎。吾愧之。吾又憫之。因統會平日所讀方書。研審其意理。或採前人之語。或抒一已之見。叅互攷訂。輯爲脉象統類一卷。諸脉主病詩一卷。雜病源流犀燭三十卷。傷寒論綱目十八卷。婦科玉尺六卷。幼科釋謬六卷。要藥分劑十卷。共七種計共七十二卷。總名之曰沈氏尊生書。蓋以人之生至重。必知其重。而有以尊之度。不至草菅人命也。係以沈氏者。以是書之作。寔由予憫人生

命思有以尊之而成。故不妨直任爲已書也。雖然沈氏尊人之生而成是書。亦沈氏自藏之自閱之而已。何敢表示於人。自詡爲著述也哉。特書以誌意。

乾隆三十八年癸巳季夏上澣芊緣沈金鰲自書

沈氏尊生書總序

沈氏尊生書七十二卷錫山沈君芊綠所著也沈君著作等身而此書之成最晚將付梓問序于予予曰君非業醫通於醫者也予不知醫喜讀醫書者也予不能序醫書也請卽以所聞于君者序之君之言曰醫之難人知之人不能盡知之誠知其難則習者寥寥自謂爲醫師者益寥寥矣何今日醫者之多也夫神明於醫者必有博愛濟眾之仁方便慈悲之力而後病無不可救否則具通乎陰陽之智三折肱之手倉公之目而後灼見而無疑下此則虛心謹細按經切脉定症立方從源溯流亦良醫矣是尊生書之所由作也或曰靈樞等經巨細亥備望問聞切內外不遺古名家疏解述作主治簡誤旣詳且盡循而行之可以

無過又何必矻矻曉曉爲應曰子言誠然其不能已于言者寔有因焉如瀉南方補北方經語也丹溪主以治虛勞胃弱者服之陰未滋而陽已消非兼會東方寔西方虛之語經意不全識得標只治本經語也景岳主以治虛勞火盛者服之陰日削而陽轉空又未會急則治標之經旨也學古稍偏遺害匪細卽虛勞一症如此他槩可知望以辨色聞以審聲而病人聲色有早暮數易者矣問以知受病之由乃有旁人不能知病者亦不自知而聽命於醫者矣屈鐵爲環屈必以漸引繩而截截必有處不得其源何由下藥切以定脉而脉更難測人之有病七情所感六淫所侵重則臟受輕則腑受深則經受淺則膚受象現于脉脉胗於指人與人異指與肉隔氣有長短質有清濁且陰陽

殊其稟寒熱虛實互其發而欲于三指之下頃刻之間臍
腑畢現洞幽徹微不有犀照何能毫釐不差因著脈統類
一卷諸脉主病詩一卷雜病源流犀燭三十卷至於傷寒
全匱備矣諸家之言亦復可採最初發熱辨內傷外感及
傳經依次越次或只在一經不傳變證百出莫定春溫夏
熱與正傷寒不同至難辨晰臨病施治必斟酌盡善乃無
弊悞因著傷寒論綱目十八卷婦人之性善補惡瀉婦人
所患非氣卽血其他雜症多半由肝諱疾忌醫以實爲虛
種種隱幻不可枚舉主見不定鮮不爲惑因著婦科玉尺
六卷小兒啞科厥有專家隨病用藥亦貴圓通如執古方
謬守家法病變而方不變天札者眾矣呱呱小兒寃將誰
訴苟有惻隱能不矜憐因著幼科釋謎六卷古人十劑分

藥大法莫外宣通補瀉輕重滑澀燥濕靈通無碍顛撲不
破而藥材必道地炮製必如法尤不可不慎蓋藥不良不
止病反增病不如不服藥爲中醫也因著要藥分劑十卷
沈君之言如是是齋俞琨爲述而序之

雜病源流犀燭序

余弟芊綠博古明經一生篤學大約四十以前專志儒書四十以後專攻醫學故著作甚富於儒則有芊綠草堂稿若干種于醫則有沈氏尊生書若干種余于所著儒書能讀之以余所知也于所著醫書雖讀之實不能知也然不知者醫之理猶能知者醫之文茲讀雜病源流犀燭共計長短一百七十餘篇篇各一法法各宗諸家史無一散亂無一重複于所著儒書知其能獨發心裁成一家言則于所著醫書卽文法之變妙亦可知其能獨發心裁成一家言也此余不知其醫書而猶能卽所知者以知之也特書此以弁雜病源流犀燭云愚兄岵瞻書

奉贈再平號記

庚寅仲冬至梁溪，有周文俊者，素識之。見其若久病狀，詢知九月間患肝疾，醫者誤以溼治，投燥劫藥，延二十餘日，咽乾舌縮，齒禠皆黑，胸膈如焚，手自爬搔，肌肉粉裂，日夜不寐，自分必死。舉家惶皇，幸獲沈芊綠先生力排眾議，投以平肝清火之劑，日向愈，獲再生，并述其病劇假寐時，若有人連呼「方平」，救汝。翌日卽遇沈先生，乍服其藥，便得臥，夢中聞呼「方平」，救汝，如故。因悟沈先生卽方平也。夫芊綠爲余兄事友，能文章，其學無所不窺，數奇不遇，僅貢于鄉，其及門掇巍科登上第者，不勝指屈出其餘力。爲人治病，歷著神效，藉非方平，曷克如是？因贈以號曰「再平」。芊綠蹙然曰：「是惡言歟！」方平爲宋賢相功蹟甚偉，罕有其匹，余何人斯，而謬推爲後身耶？時在座有前輩儲玉蓀、華烟麓兩先生暨秦天門俞是。

齋顧宸熙嵇範亭洪誼昆季咸以余言爲然因共倩秦君紹曾鑄
小印其文云贈君之號曰再平余復篆心是所學青田章以贈并
爲敘其顛末如此

姑蘇教弟章汝亮寅少拜書

凡例

一是書之成，每病各著源流一篇，便記誦也。每篇之中，無不究其原委，悉其形症，攷其方治，與夫病情之變幻，病勢之緩急，病體之輕重，一一推極而詳言之。或有奇變百出，篇中所未之及，是在醫者隨時審量焉。

一每篇正文，余所自撰，其中援引古人論說，必載明書。日如靈樞曰內經曰之類，而古人之論，有精當不磨，篇中卻不及援引，而其義又足補篇中之未逮也。則于每篇之後，低一字，採錄之，仍各冠名目，使人曉然知誰氏之語。

一每病必有病脈，而脈法準的，莫備于古人。故每篇之後，必于第一條先錄脈法，蓋欲知病必先知脈，既知脈方可識病也。

一書中如春溫夏熱，瘟疫，眼目，咽喉，跌撲，閃挫等篇，皆採取前人

議論而成各于本篇後註明。不敢掠美也。

二病之成。或臟腑。或六淫。要各有所因之處。因于每篇首句。卽爲提明。如咳嗽肺病也。霍亂胃虛病也。之類。其有兼及他因者。則于篇中分析言之。以賓主不可紊也。

一每病旣各有因。其病卽隸于所因之臟腑。或所因之六淫。及內傷外感。與身形面部之所屬。閱者庶益曉然于病所由來矣。

一臟腑內因也。六淫外因也。旣詳臟腑六淫之病。而又必立內傷外感一門者。以所屬病。傷于內者。並不專由臟腑。感于外者亦不專主何淫。故必另立此一門也。

一臟腑先後之次。則以臟腑經脉之連屬爲主。如肺脉注于手陽明大腸。大腸脉注于足陽明胃。胃脉注于足太陰脾。故以爲次也。餘悉倣此。

面部身形之病亦由臟腑六淫然症既現于面部身形則必立此二門從部位也。

一奇經八脈所以總持十二經不明乎此并不知十二經之綱維十二經之出入如肝藏血其人本血病治其肝而勿愈必求其原于衝衝爲血海也肺主氣其人本氣病治其肺而勿愈必求其原于督督爲氣海也其任帶蹻維六經可以類推。

一古人治病溫涼補瀉各有偏主是書所引諸方惟祈有當于病當溫則溫當涼則涼當補則補當瀉則瀉因病用方不敢稍存成見。

一導引運功本養生家修煉要訣但欲長生必先卻病其所導所運皆屬卻病之法今各附于篇末病者遵而行之寔可佐參藥力所不逮

一瘡瘍之病。無不傳染。六淫而發于臟腑。雖症之未成。脉必先現。若不審此。有診其脉。而不知所由。且誤認爲內症。而錯治者。古名家内外必兼及。良有以也。

一跌撲閃挫。古謂之傷科。雖傷于外。必致侵及于內。有害于臟腑。經絡。今列爲篇。庶不至臨時束手。并詳金瘡杖傷諸瘡。諸傷等以類及也。

沈金鰲誌

沈氏尊生書目錄

雜病源流犀燭

卷一 腸腑門

肺 肺病源流

肺萎

肺癰

息貴

咳嗽

哮喘

喘

卷二 腸腑門

肺 諸氣 疹子

卷三 腸腑門

大腸 大腸病源流

肚門

大腸癰

職毒

腸鳴

脫肛

胃 胃病源流

肚門

胃癰

胃痛

霍亂

諸瘻

卷四 腸腑門

脾 脾病源流

泄瀉

痞氣

嘔吐

噦

塞反胃

關格

卷五 腸腑門

脾腫脹 痘滿

卷六 腸腑門

心 心病源流 伏梁 心痛 恢忡 升慾 驚悸
悲 恐 喜 怒 夥 想 煩燥 健忘 不寐

卷七 腸腑門

心 癲狂 諸汗 淚淚涎唾

小腸 小腸病源流 小腸氣 小腸癰

膀胱 膀胱病源流 膀胱氣 轉胞症 小便閉癃
小便 黃赤 遺溺 交腸症 飲後即便

卷八 腸腑門

腎 腎病源流 奔豚 腎癰 腎俞發 虛損癆瘍
五勞六極 七傷 前厥症 解㑊症 食㑊症 二陽病

卷九 腸腑門

腎 遺洩 五淋 二濁 尿血 白淫 諸厥 諸癰
大便秘結 二濁 二濁 脾約症

卷十 腎腑門

心包絡 心包病源流

三焦 三焦病源流

膽 膽病源流

肝 肝病源流 肥氣 肺脇肋痛 腋臭漏腋

卷十一 奇經八脉門

衝脈 衝病源流

任脈 任病源流 七疝

督脈 督病源流

帶脈 帶病源流

二維脈 陽維陰蹻病源流

二蹻脈 陽蹻陰蹻病源流

卷十二 六淫門

風 風病源流 附毒風論 感冒 中風

卷十三 六淫門

風 諸痺 白虎歷節風 麻木 破傷風 痘瘡

卷十四 六淫門

寒 寒病源流 惡寒 發熱 痛冷 寒厥暴亡
積聚癥瘕痰癰癆痞息積病

卷十五 六淫門

暑 暑病源流 伏暑 暑風 暑瀉 痙夏 諸瘡
諸病

卷十六 六淫門

溼 溼病源流 痰飲 諸疸 黃胖

卷十七 六淫門

燥 燥病源流 三消 消癰

火

火病源流

諸血

畜血症

脫血症

卷十八

內傷外感門

內傷

內傷外感病源流

色慾傷

脫營失精

傷食

不能食

卷十九

內傷外感門

外感

春溫

夏熱

濕溫

陽毒陰毒

卷二十

內傷外感門

外感

瘟疫

邪祟

卷二十一

內傷外感門

內傷外感

痧脹

卷二十二

面部門

面部

面部病源流

面瘍

目

眉稜骨

卷二十三

面部門

面部 耳 鼻 口齒唇舌

卷二十四 面部門

面部 咽喉 聲音

卷二十五 身形門

身形

身形病源流

附周身諸穴圖

附周身癰疽圖

頭痛

眩暉

頭風

頭瘡

筋

骨

皮

肉

毛髮

頭瘡

頭痛

眩暉

頭風

卷二十六 身形門

身形

項

瘰疬

瘻瘤

肩膿

肘臂腕手

瘻瘍

腋脇

脇肋瘻瘍

卷二十七 身形門

身形

胸膈

脊背

乳

胸膈脊背乳瘻瘍

腰

臍

卷二十八 身形門

身形

腹少腹

腰臍瘻瘍

腹少腹瘻瘍

前陰

後陰

腰

臍

卷二十九 身形門

身形腿股膝膩踝足
附癱疽兼症方論 腿股膝膩踝足瘡瘍

卷三十 身形門

身形跌撲閃挫
金瘡杖傷夾傷

沈氏尊生書卷上

脈象統類 直看橫推

提綱要脉不越浮沉遲數滑濇六字。以足該表裏陰陽冷
熱虛實風寒燥濕臟腑氣血也。蓋浮爲陽爲表沉爲陰爲
裏遲爲在臟爲冷爲虛數爲在肺爲熱爲燥爲實滑
爲血有餘濇爲氣獨滯能于是縷晰以求之而疢疾莫能
逃矣顧浮沉以舉按輕重言若洪芤弦虛濡長散皆輕按
而得之類故統于浮短細實伏牢革代皆重手而得之類
故統于沉遲數以息至多少言若微弱緩結皆遲之類故
統于遲緊促動皆數之類故統于數至如滑雖似數濇雖
似遲而其理自殊緣遲數以呼吸察其至數滑濇則以往
來察其形狀且滑濇二脉多主氣血故也故此二脉雖無

所統亦平列於後。以爲六綱云。

浮曰浮以候表。其象輕于乃得重于不見。動在肌肉以上。

浮爲風虛眩掉之候。陽脉浮表熱。陰脉浮表虛。秋爲正肺脉宜久病則忌。

左寸傷風發熱頭疼目眩風痰。兼虛遲心氣不足心神不安。

兼散心耗虛煩。兼洪散心熱。

左關腹脹。兼數風熱入肝經。兼促怒氣傷肝心胸滿逆。

左尺膀胱風熱小便赤澀。兼芤男子尿血女子崩漏。

兼遲冷症臍下痛。

右寸肺感風寒咳嗽鼻塞清涕自汗體倦。兼洪肺熱而咳。

兼遲肺寒喘嗽。

右關脾虛中滿不食。兼大澀宿食。兼遲脾胃虛。

兼滑痰飲。

右尺風邪客下焦大便秘。兼數下焦風熱大便秘。

兼虛元氣不足。

浮而有力爲洪。

浮而無力爲芤。

浮而端直爲弦。

卽大脈又名鈎脈
其象極大而數。按

其象浮大而稟接

其象接之不移舉

新之應手端直如新

之滿指。如羣波之
湧來盛去衰。來大

也。

空兩邊寃指下成
窟。診在浮舉重接

之間得之。

洪爲經絡大熱血。

氣燔灼之候。夏爲

正心脉宜。

血久嗽忌。瘦多

氣者死。凡脈洪

則病進。

爲表裏皆熱。爲大

燥咽乾。

左寸心經熱。目赤

口瘡頭疼痛。

煩。

左關腹中瘀血動

左寸心血妄行。吐

生卒病死。

虛而大爲芤之狀。
火犯陽經。血上溢。
火侵陰絡。血下流。
三部脉芤。久病

弦緊數勁爲太過。
弦緊而細爲不及。
弦而更病。輕弦而硬病重。輕虛以滑者平。寃滑如循長竿者病勁急如新張弓弦者死。春爲正肝脉宜。若肝木

之狀。

弦爲血氣收斂爲

陽中伏陰或經絡間爲寒所滯之候。

弦緊數勁爲太過。

弦緊而細爲不及。

弦而更病。輕弦而硬病重。輕虛以滑者平。寃滑如循長

左關肝熱身痛。四肢浮熱。

左尺膀胱熱小便赤濁。

左寸肺熱毛焦唾粘咽乾。

右關胃熱反胃嘔吐口乾。

右寸脅滿胸中。

右尺腹滿大便難或下血。

右尺大便血。古人云前大後細脫血也。夫前大後細非芤而何。

右寸小便血。女子月事爲病。或胸有積血。或血不食。

冠士而至不食難治。瘧病自弦。

凡脈弦爲痛爲瘧爲病爲飲爲冷。脾爲勞倦爲拘急爲寒熱爲血虛盜汗爲寒凝氣結。

左寸頭疼心惕勞傷盜汗乏力。兼長中。

左關脇肋痛痠冷。兼小寒。

左寸滑腰脚痛。兼寒。

右寸咳嗽胸膈間。兼寒。

右尺小腹痛。兼寒。

右寸肺經受風寒。兼寒。

有寒。

右關脾胃傷冷宿食不化心腹冷痛又爲飲。

浮而遲大爲虛

浮而遲細爲濡

浮而迢亘爲長

其象遲弱散大舉

卽弱脉其象虛弱無力應手細散如

其象不大不小迢亘自若指下有餘過于

按少力豁豁然空不能自固

即濡脉得重手按之

本位

虛爲氣血俱虛之

而沒即隨手

長爲氣血皆有餘

候氣血虛則脉虛主多在內不足之症久病脉虛多

濡爲氣血兩虛之候亦主脾濕病後

有一部之長按之如牽繩則病矣長

不治

濡難治

屬肝宜於春診無病肝脉自見

凡脉虛爲傷暑爲虛煩爲自汗爲小

凡脉濡爲疲損爲自汗爲脾爲下冷

兒驚

風

爲無氣

少氣

寸血不榮心恆忡

恍惚驚悸

關腹脹食不易化

尺骨蒸瘦精血虧損

力

左寸心虛易驚盜汗

汗

左關榮衛不和精神離散體虛

凡脈長爲壯熱爲癲癇爲陽毒內蘊爲三焦煩熱爲陽明熱甚

右寸

開熱憎寒氣乏髓虛

右關

脾胃弱食不化胃虛食不進

右尺

下元冷篤腸虛瀉

浮而虛大爲散

其象有表無裏有

陰無陽接之滿指
散而不聚來去不明漫無根柢始不指

散不收

散爲氣血耗散

脈主虛陽不斂

脈主虛陽不斂

脉氣絕之候在病

主心氣不足大抵

非佳兆也心浮

大而散肺短濶而

散猶爲平脉若病

婦脉散臨盆之兆

如未到產期必至

墮胎

寸 息懶。雨汙。

關 溢飲。筋腫。

尺 腎絕

沉 ⊖ 沉以候裏

其象輕手不見重手乃得按至肌肉以下着於筋骨之間

沉爲陰逆陽虛之候。主陰經。主氣。主水。主寒。主骨。太過病在外。不及病在內。冬爲正。女寸男尺俱宜。

凡脈沉爲停飲。爲癖癥。爲脹脹。爲厥逆。爲洞泄。
兼滑。宿食。滯。兼遲。痼冷。內寒。兼伏霍亂。吐瀉。兼數。內
熱甚。兼少火。

左寸 心內寒邪痛。胸中寒飲脇痛。

左關 伏寒。在經兩腸刺痛。 兼弦。痃癖。內痛。

左尺 腎臟寒腰背冷痛。小便濁而頻。男爲精冷。女爲血結。兼
細。脾。陰。滯。陰。溼。有餘。渴。寒。熱。皮毛焦乾。 兼繁滑咳嗽。兼細滑骨蒸。

右關

胃中寒積。中滿吐酸。兼勞懸飲。

右尺 痘水。腰脚痛。

兼細下利。小便滑。臍下冷痛。

沉而不及爲短○

其象兩頭無中間有不及本位。應手而回。

短爲氣不足以前導其血之候。但主不及之病。短脉只見寸尺。若關部短則上不通。寸下不必死。故關不診短。

沉而微弱爲細○

其象小於微而常有細直而弱。指下尋之往來如蚕絲狀。

細爲血冷。氣虛不足以充之候。故主諸虛勞損。或濕侵腰腎。應病則順。否則逆。吐衄得之生。春秋與少年不利。秋冬與老弱可治。

沉而弦長爲蹇○

其象舉按不絕迢亘而長。不疾不徐。動而有力。

實爲三焦氣滿之候。俱主有餘之病。凡脈實爲膈。爲痛。爲利。爲氣寒。爲氣聚。爲食積。爲伏陽在內。

左寸

心中積熱。口舌瘡。咽喉痛。兼大頭面痛。熱風煩燥體赤。

短屬肺，宜于秋診。
無病肺脈，其形自

可見。

凡脈短爲三焦氣
壅爲宿食不消。
兼浮血濁，兼沉

痞塊，兼滑數酒

傷腸，俱冷，積爲
積爲痛。

胃，寸頭痛。

尺腹痛。

憂勞過度者，脈亦
細。凡細脈，病俱

在內，在下。

凡脈細爲元氣不足，
足之力無精，內外俱冷，
瘻弱，洞泄爲

止。

寸嘔吐。

關，胃虛，腹脹。
尺丹田冷，洩痢遺

精。

左關，腹脹，痛滿。
少腹，中痛，淋瀝，不
止，赤色，兼滑，壅，熱，
兼大膀胱，熱結，小便難。
左尺，少腹，中痛，瀉，
兼緊，腰脊疼。

右寸，胸中熱痰，或
煩滿，兼浮。

右關，伏陽蒸，內
寒，喘，嗽，氣壅，而

虛食少，胃氣壅，善

脾熱，消中，善

饑口乾。

右尺，腰下，勞倦。
或時，利，痛，便，難。

沉極幾無爲伏

(一)

其象極重。按之至
于透筋着骨。指下
始覺隱隱然。

伏爲陰陽潛伏。關
格閉塞之候。關前
得之爲陽。伏脈後
得之爲陰。伏一脉。

痛甚者脉必伏。

凡脉伏爲積聚。爲
瘕癥。爲霍亂。爲水
氣爲食不消。爲榮
衛氣閉而厥逆。

左寸心氣不足。神
不守常。憂鬱。

沉而有力爲牢

(一)

其象似沉似伏。寔
大而長。少弦。按之
動而不移。若牢固
然。

牢爲裏寔表。虛胸
中氣促勞傷瘦極

之候。大抵牢脉近
乎無胃氣者。故爲

危殆之脉。如失血

人宜沉細。若浮大

而牢。必死。以虛病

反見寔脉也。

凡脉牢爲氣居于
表。爲骨節疼痛。

沉失常度爲革

(一)

其象沉伏寔大。如
按鼓皮一般。

革爲虛寒失血之

候。其寔卽芤弦。二

脉相合。二脉相合

之象。芤爲虛。弦爲

寒。虛寒相搏。故主

男子亡血失精。女

子半產漏下。又爲

中風感濕之症。久

病死。卒病生脉來

渾濁變革。急如湧

左關

血冷，腰脚痛。
脇下寒氣。

左尺

腎寒，精虛，瘕。
胸中冷滯，寒。

右寸

痰積，冷。
寒，痛。

右關

中脘積塊。作
痛，脾胃閒停。

積。
滯，病。

右尺

臍下冷痛，下
焦虛寒，或痛。
腹中痛，少。

腹痛。

沉而更代爲代。②

其象動而中止，不
能自還，因而復動。
由是復止尋之良
久，乃復強起而動。
代爲臟氣多衰形。
容羸瘦，口不能言。

寸

木乘土而心腹
寒，疼。

尺

癰，瘡，癥瘕。

尺，關，寸

泉出而不反，病進
而危，去如弦絕者
死。

之候若不病而羸瘦。脉代止是一臟無氣。他臟代之必危。若因病而氣血驟損致元氣卒不相續。或風家痛家祇爲病脉。故傷寒亦有心悸而脉代者。復脉湯主之 腹心疼亦有結濇止代不匀者。久痛之脉不可準也。妊娠脉代

必懷胎三月代脈

有生有死非定爲

死脈宜辨之

凡脈代爲腹痛爲便膿血爲洩利吐

瀉爲下

元虛損

遲○遲以候臟其象呼吸之間脈僅三至去來極慢。

遲爲陰盛陽虛之候陽不勝陰故脈來不及也居寸爲氣不足氣寒則縮也居尺爲血不足血寒則凝也。

凡脈遲爲寒爲虛

兼沉裏寒

左寸心上寒精氣多慄。

左關筋寒急脇下痛手足冷

左尺腎虛便溺女人不月。

右寸肺感寒冷痰氣短。

右關中焦寒脾胃傷冷。物不食食不化。兼沉爲積。

右尺臟寒泄瀉小腹冷痛腰脚重。

遲而細弱爲微。○

其象極細而弱。若
有若無多兼于遲。
按之如欲絕。

微爲久虛血弱之
候。又主陰寒或傷
寒畜熱在裏。脉道
不利。亦有微細濡
弱不可爲寒者。當
以標本別之。總之

遲而無力爲弱。○

其象極弱而沉細。
快快不前無息。以
動。按之如欲絕。暑
舉手卽無。

弱爲陽陷。入陰精。
氣不足之候。亦主
筋脉弱以滑。是有
胃氣。脉弱以濇。是
爲久病。陽浮陰弱。
應爲血虛筋急惡。

遲而有力爲緩。○

其象比浮而稍大。
似遲而小疾。一息
四至來往。緩呼吸徐徐。

緩爲氣血向衰之
候。若不沉不浮。從
容和緩。乃脾家之
正脉。四季亦爲平。
脉非時。卽病。和

緩而勻。無浮沉徐

氣血微。脈卽微。

凡脉微爲虛弱爲少

兼浮陽不足必身惡寒冷。兼沉陰

不足心臟寒不利。血不足。

左寸心虛憂惕榮

左關胸滿氣乏四肢惡寒拘急

左尺男子傷精尿血女子崩漏

右寸敗血不止或上焦寒凝結不化中寒

右關胃寒氣服食不能化脾虛食少氣

右尺下焦冷痛大便滑洩不禁

右關胃寒氣服食不能化脾虛食少氣

寒發熱之病老得

之順壯得之逆。

凡脉弱爲病冷爲閑熱爲洩精爲虛汗爲元氣虧耗爲瘦弱不前。

左寸陽虛心悸自汗。

左關筋痿無力女

左尺人主產後客風面腫。

右寸小便頻數脣

右關元虛耳鳴或聾骨肉間癰疼。

右尺身冷多寒胸中短氣。

右關脾胃虛食不化。

右尺下焦冷痛大便滑洩不禁。

疾微弱之偏卽爲

胃氣脉。

凡脉緩爲風爲虛爲痺爲弱爲疼。在上爲項強。在下爲脚弱。兼沉血氣弱。

左寸心氣不足恆感風。兼沉血氣弱。

左關風虛眩暎腹痛。

左尺腎元虛冷小便頻數女人主月事。

右寸肺氣浮言語過多。

右關胃弱氣虛。

右尺短氣主月事。

右關胃弱氣虛。

右尺短氣主月事。

右尺膩寒。洩濶臍下冷痛。

右尺

下寒脚弱。風氣秘滯。兼浮腸風泄濶。

感

兼沉小腹

遲而時止爲結

④

其象來時遲緩時
一止復又來

結爲陰獨盛而陽
不能相入之候此
爲陰脉之極按

之纍纍如循長竿
曰陰結藹藹如張
車蓋曰陽結又有
如麻子動拙旋引

旋收聚散不常之
結。此三脉名雖同

而寔則異。

凡脈結爲亡陽爲
汗下爲痼痕爲癥
結爲老痰滯結爲
氣血凝結爲七情
鬱結內爲積聚
外爲瘤腫。兼浮
寒邪滯結。兼沉
積氣在內。

又爲氣爲血爲疾。
爲飲爲食益先因
一氣寒脉緩五者有
一留滯其間因而
爲結。故仲景謂促
結皆病脉。

數。數以候脉。其象

一息六至數數然來

數爲君相二火炎熱之候陰不勝陽故脉來太過小兒吉肺病

秋深皆忌

寸頭疼。上熱咽喉口舌瘡。上血咳嗽。

關胃火。脾熱口臭。煩滿嘔逆。肝火目赤。

尺腎火熾。小便黃赤。大便秘滯。兼浮表熱。兼沉裏熱。

數而弦急爲緊

○

其象來時勁急。按之長。左右彈指舉

狀

若牽繩轉索之

緊爲寒風搏急伏

○

於營衛之間之候

凡緊脉皆主寒與

痛。內而腹外而身

有痛必見緊象亦

數而時止爲促

○

其象來時數時一止。復又來徐疾無

一定之狀

促爲陽獨盛而陰

不能相和之候怒

氣逆上亦令脉促

此陽脉之極

數見關中爲動

○

其象數見關中形圓如豆。無頭無尾

厥厥動搖尋之有舉之無不往不來

不離其處

動爲陰陽相搏之

候。關位前半屬陽後半屬陰。陰與陽搏。陽虛則陽動。陰

凡脉促爲氣瘤。爲狂濶。爲毒疽。爲瘻。

有熱痛者必兼寔數熱爲寒束故急數如此但須有神氣爲妙。

凡脈緊人迎傷寒氣口傷食兼浮傷寒而身痛兼沉腹中有寒或爲風

左寸頭熱目痛項強兼沉心氣逆或多寒冷兼寒身痛繫甚傷寒兼寒

脾是寒

血發斑爲三焦鬱火爲痰積咳嗽或喘逆又爲氣爲血爲食爲痰爲飲蓋先因氣熱脉數五者有一留滯其間則因之而促此促與結非定爲惡脉也雖然有加卽死能退則生。

虛則陰動。動脈卽滑數二脉相兼爲極甚者故女人心脉動甚妊娠凡脈動爲痛爲驚爲洩利爲拘攣爲崩脫爲虛勞體痛陽動汗出陰動發熱。

左尺

腰連臍下及脚痛小便難

右寸

兼沉滑肺壅。鼻塞膈壅。
咳嗽或多痰。

右關

吐逆脾腹痛。繫太盛腹

右尺

下焦築痛。食。脈弱。

滑○滑以候氣

其象往來流利如珠走盤不進不退

滑爲血。蹇氣壅之候。血不勝於氣也。主痰飲諸病。脉爲血府。血盛則脉滑。惟腎宜之。女人脉滑斷絕不匀。經閉之驗。諸脉調尺獨滑必有胎。上爲吐逆。下爲氣結。滑數爲熱結。

左寸

心獨熱。兼蹇大心驚舌強。

左關

肝熱頭目爲患。

左尺尿赤莖中痛。小便淋漓。

右寸疾飲嘔逆。

兼寃肺熱。毛髮焦膈壅。咽乾痰嗽。頭目昏涕。

唾稠黏。

右關脾熱口臭吐逆宿食不化。

兼寃胃熱。

右尺因相火炎而引飲多膾冷。腹鳴或時下利。女人主血熱氣壅月事不通。若和滑爲有孕。

濇○濇以候血

其象虛細而遲往來極難。或一止復來三五不調。

濇爲氣多血少之候。故主血少精傷之病。益氣盛則血少。脉因

濇惟肺宜之。女人有孕而脉濇爲胎病。無孕而脉濇爲敗血。

凡脉滑爲無汗
或爲血瘀痛。

左寸心肺虛耗不安。冷氣心痛。

左關肝虛血散。肋脹脇滿身痛。

左尺男子傷精癩疝。女人月事虛敗。若有孕。主胎漏不安。

右寸榮衛不和。上焦冷痛。氣短臂痠。

右關脾弱不食胃冷多嘔

右尺大便秘津液不足少腹寒足脛逆冷經云滑者傷熱濁

傷霧露

附載人迎氣口脈法

以土統類所載二十七脉皆按各脉之寸關尺三部診候人迎氣口二脉無從

列入故特

附于後

人迎○人迎候天六氣

左手關前一分爲人迎寸關尺每部各有前中後三分關前一分者乃是關部上

之前一分非言關部之前寸部上之一分也切勿悞認氣口同

六淫之邪襲于經絡而未入胃腑致左手人迎脈緊盛大于氣口一倍爲外感風寒皆屬表陽也腑也人迎之脈浮傷風緊傷寒虛弱傷暑沉細傷濕虛數傷熱洪數傷火皆屬外因法當表散滲洩又陽經取決於人迎左人迎脈不和病在表爲陽主四肢士材曰左關前一分正當肝部肝爲風木之臟故外傷於風者內應風臟而爲緊盛也又曰但言傷于風勿泥外因

而槩以六氣所傷者亦取人迎也。

氣口○氣口候人七情

右手關前一分爲氣口

七情之氣鬱於心腹不能散飲食五味之傷留於腸胃不得通致右手氣口脈緊盛大于人迎一倍爲內傷七情飲食皆屬裏陰也臟也氣口之脉喜則散怒則濡憂則濁思則結悲則緊恐則沉驚則動皆屬內因診與何部相應卽知何臟受病法宜溫潤以消平之又陰經取决于氣口右氣口脈不和病在裏爲陰主腹臟士材曰右關前一分正當脾部脾爲倉廩之官故內傷於食者內應食臟而爲緊盛也又曰但言傷于食勿泥內因而槩以七情所傷者亦取氣口也

人迎氣口俱緊盛則爲夾食傷寒內傷外感俱見

附載奇經八脉此八脉亦以不能混列統類二十七脉中。故又附人迎氣口二脉之後。八脉不拘制于

十二正經無表裏相配故名曰奇。凡診八

脉所見統兩手皆然其從寸部斜至外斜至內者左手之外卽右手之內左手之內卽右手之外相反推之自見

陽維○○○陽維候一身之表者是也右手反看下同本脈起于諸陽之會所以維于陽蓋人身之衛分卽是陽陽維維陽卽維衛衛主表故陽維受邪爲病亦在表寸爲陽部外亦爲陽位故陽維之脈從寸斜至外不離乎陽也

陰維○○○陰維候一身之裏者是也右手反看以左手爲主其脈從寸部斜至內

本脈起于諸陰之交所以維于陰蓋人身之營分卽是陰陰維維陰卽維營營主裏故陰維受邪爲病亦在裏寸雖爲陽部內寢爲陰位陰維之脈從寸斜至內是根于陽而歸于陰也陽蹻○○○陽蹻候一身左右之陽其脈從寸部左右彈者是也不論左右手

本脈爲足太陽經別脈起跟中循外踝上行于身之左右所以

使機闢之躋捷也。

陽躋在肌肉之上。陽脈所行通貫六腑。主

持諸表。故其爲病亦表病裏和。

陰躋○○○陰躋候一身左右之陰

不論左手其脈從尺部左右彈者是也

本脉爲足少陰經別脉。起跟中循內踝上行于身之左右。所以使機關之躋捷也。陰躋在肌肉之下。陰脈所行通貫五臟。主持諸裏。故其爲病亦裏病表和。

督○○○督候身後之陽

不論左手其脈三部中央俱浮直上直下者是也

本脉起腎下胞中。循背而行于身之後。爲陽脉之總督。故曰陽脉之海。故其爲病往往自下冲上而痛。

任○○○任候身前之陰

不論左手其脈丸丸橫于寸口者是也


本脉起腎下胞中。循腹而行於身之前。爲陰脉之承任。故曰陰脉之海。故其爲病亦往往自下冲上而痛。

衝○○○衝候身前之陰不論左手其脈來寸口中央堅昇徑至關者是也

本脈起腎下胞中夾膚而行直衝于上爲諸脈之衝要。故曰十二經脈之海。又以其爲先天精血之主。能上灌諸陽。下滲諸陰。以至足跗。故又曰血海。而其爲病多氣逆而裏急。

帶○○○帶候諸脈之約束不論左手其脈來關部左右彈者是也

本脈起少腹之側。季脇之下。環身一週。絡腰而過如束帶狀。所以總約諸脈。故名曰帶。而衝任二脈循腹脇夾膚旁傳流于氣街。屬於帶脈。絡于督脈。衝任督三脈同起而異行。一源而三歧。皆絡帶因諸經上下往來。遺熱于帶脈之間。客熱鬱抑。白物淫流。男子隨瀆而下。女子綿綿而下。皆濕熱之過。故帶脈爲病即謂之帶下。



沈氏尊生書卷下

諸脉主病詩

沈金鰲撰

瀕湖脉訣各有主病歌辭然只言其梗槩余撰脉象統類各脉所主之病已詳但瑣碎無文義相貫難于記識因倣瀕湖法作二十七脉主病詩閱者讀此復按核統類則某脉主某病某病合某脉庶益洞然於中矣

浮其象輕手乃得重手不見動在肌肉以上

浮脉爲陽表病真遲風數熱緊寒因。是浮脉兼遲兼數兼緊也。各脉相兼倣此。浮而有力是風熱無力而浮血弱人。此首總言

浮脉病

寸頭疼眩目熱因風更有風痰左寸中滿右欬攻右寸肺感病關右脾虛不食左腹脹溲多赤澀左尺膀胱風熱糞難通右尺風邪作欬客下焦故大使秘

浮而有力爲洪即大脈其象極大而數接之滿指如羣波之湧起米盛去袁來大去長。

脈洪陽盛血應虛相火炎炎熱病居脹滿胃翻須早治陰虛洩痢

急當除

此首總言
洪脈病。

心經火盛內多煩

左寸病
目赤口瘡頭疼

又兼肺熱毛焦咽更乾

右寸病
又兼涎唾稠粘

肝火身疼

左關病
又兼四肢浮熱

又兼胃虛咽

右關病
又兼口枯舌乾

膀胱熱小便赤濇

右尺

腹滿大便難

或下血

浮而無力爲芤

其象浮大而軟

按之中空兩邊寔指下成窟

左芤吐衄兼心血

左寸病
診在輕舉重按之間

關上爲瘀腸痛真

腹中瘀血腸間血

氣痛吐血目暎

左尺

男人小便血女人月事病相因

此首單言左寸病

手太陽病

右芤積血在于胸

右寸病
兼衄血嘔血

關內逢之腸胃癰

氣痛吐血目暎

左尺

血尺多血痢與腸紅

此首單言右寸病

手太陽病

浮而端直爲弦

其象接之不移舉之應手端直如筩弦

左弦頭痛還心惕盜汗勞傷力懶牽

關左脅疼兼痃癖尺疼小腹

脚拘攣

此首單言左
首弦脈病

右寸膈痰多咳嗽。

田肺受
風寒

右關胃冷腹心疼

脾胃傷冷宿食不化多飲

下焦停

水弦逢尺陰疝常從臍下侵

此首單言右
手弦脈病

浮而遲大爲虛

其象遲弱散大舉按無力

豁然空不能自固

脉虛

血氣虛故
脉亦虛

身熱爲傷暑虛損疲煩汗自多發熱陰虛宜早治

養榮益氣莫蹉跎

此首總言
虛脉病

怔忡驚悸寸常虛血不榮心奈

口何腹脹診關食不

化

尺痺瘦損傷

精血骨蒸俱

此首統言左右
兩手虛脈病

浮而遲細爲濡

卽弱脈其象虛弱無力

應手如散如綿絮之在水中輕手乃得重按隨手而沒

濡爲亡血陰虛病髓海丹田暗已虧汗雨夜來蒸入骨血山崩倒

濕侵脾

此首總言
濡脉病

左寸心虛

故驚悸

還短氣精神離散左關濡

又兼榮衛不和體虛

少力尺男精

敗女脫血。自汗淋漓洟數俱。

此首單言左手濡脈病

憎寒。闊熱濡右寸。氣乏身疲。怎得安。

關上胃虛。飲食不進。脾更弱。食不消。

尺腸虛瀉。下元寒。

此首單言右手濡脈病

浮而迢亘爲長位。其象不大不小。迢迢自若。指下有餘。過于本

氣血有餘。長脉見。

長脈主其之病

陽明熱勢自然深。

若非陽毒。陽毒內蘊癲

和癟。即是焦煩壯熱侵。

浮而虛大爲散。

其象有表無裏。有陰無陽。按之滿指。散而不聚。去來不明。漫無根柢。漁散不收。

左寸征忡。右寸汗溢。飲左關癰。散腫脇。散居兩尺魂當斷。

沉。其象輕手。不得重手。乃得按至肌肉以下。着于筋骨之間。

沉潛脉主陰經病。數熱遲。寒滑有痰。無力而沉虛。與氣沉而有力。

積兼寒。

此首總言沉脈病

寸沈瘻鬱病

寸飲停胸病

左寸關主中寒痛不通

病同

尺部濁遺

精血冷

左尺病

男精冷女血冷

腎虛腰及下元痛

右尺病

言左右手沉脈病

此首統

沉而不及爲短

其象兩頭無中間有不及本位

應手而回

短脈只見寸尺

若在關部將上不接寸下不接尺矣故前人

云短不診關

短脈內虛真氣弱三焦氣壅是真因胃衰宿食多停滯寸主頭疼

尺腹疼

左右同

沉而微弱爲細

其象小於微而常有細直而弱指下尋之往來如蚕絲

寸細應知嘔吐頻入關腹脹胃虛形尺逢定是丹田冷洩痢遺精

號脫陰

此首統言左右

兩手細脈病

沉而弦長爲寃

其象舉手不絕迢迢而長不疾不徐動而有

力血寃則脉寃

實脈爲陽火鬱成發狂譫語吐頻或爲陽毒或傷食

古云脉寃者水穀爲

大便不通或氣疼

此首總言

實脈病

病

寶脉病

寸心與面熱兼風。

左寸寔心中積熱。口舌瘡咽喉痛。

痰嗽中煩氣積胸。

右寸寔胸膈中熱痰

嗽煩肝火。

左關寔腹脇痛滿。右關寔脾虛少食。

又關上見尺臍腹

滿

痛便難通。

左尺寔小腹痛。右尺寔脅下痛。

或時下痢。

此首統言左右手脈寔病。

沉極幾無爲伏。

其象極重。按之着骨。指下隱隱然。

傷寒病見陰爲診。乃火邪內鬱。不得發越。陽極似陰。

故脉伏也。必得大汗乃解。

父夾陰傷寒。先有伏陰在內外。又感寒陰盛。陽衰。四肢厥逆。

六脉沉伏。須投姜桂。脉乃復出。若太絳衝陽。

皆無脉。則必死矣。古云。伏爲真氣不行。邪氣積伏。文云。病甚者。脉必伏。

伏爲霍亂。食常停蓄。飲頑痰積聚。真榮衛氣凝凝閉。

而厥逆散寒。

溫裏莫因循。

此首總言伏脈病。

憂憇傷心神不守。

左寸病。胸中氣滯冷痰凝。右寸當關腹痛分寒食。

左關伏脇下有寒。氣血冷。腰脚痛。

右關伏中腕積塊。脾胃停滯。

尺部腹疼與疝疼。

左尺伏腎寒。右尺伏膚下冷。痛下焦虛寒。旋中冷。

此首統言左右手伏脈病。

沉而有力爲牢。

其象似沉似伏。是大而長少弦。按之動而不移。牢而疾必發熱。牢而遲必發寒。遲疾不

常寒熱往來。

牢爲喘氣促息皮膚腫病。兩寸心腹寒疼肝脾病。兩關癰瘕疝癩猶可治。陰虛失血怎相宜。兩尺病失血脈宜沉細。反浮大而牢是虛病見寔脉必死。此首統言左右手牢病。

沉失常度曰革

其象沉硬寔大如按鼓皮一般。革爲陰陽不交之名。

革合芤弦寒與虛。芤爲虛弦爲寒。虛寒相搏故芤弦相合而成革脉。革因爲虛寒失血之候。中風感濕脹兼醫。女人半產并崩漏。男子營虛或夢遺。此首總言

沉而更代爲代

其象動而中止不能自還因而復動又復止尋之良久乃復強起而動。

代脈原因臟氣衰。腹疼便膿下元虧。或爲吐瀉兼洩病。女子懷胎三月兮。

此首總言代脈病。

遲其象呼吸之間。脉僅三至來去極慢。

遲司臟病或多痰沉痼癥瘕仔細看。有力而遲爲冷痛。遲而無力

是虛寒。

此首總言
遲脈病

寸遲心左肺右上焦寒。

右寸遲心上寒。精氣多慄。肺受寒。冷痰氣短。關主中寒痛不堪。

左關筋寒急。手足冷。脇下痛。右

關中焦寒。脾胃傷冷。食不化。

左尺腎虛。

故便

濁

女不月。右爲洩。

瀉疝牽丸。

臍寒洩。小腹冷痛。腰腳重而無力。

此首統言左右兩手遲脈病。

遲而細弱爲微。

其象極細。而弱若有若無。多兼于遲接之如欲絕之狀。

女作崩中帶下醫。

此首總言
微脈病

寸微氣促與心驚。

右寸中寒少氣。又兼上焦寒。痞冷。痰不化。

左寸心憂煩榮血不足。

關脉微時

脹滿形。

左關微。中滿氣乏。四肢寒冷拘急。

右關微。胃寒氣脹。食不化。脾虛噫氣。心腹間冷疼。

血弱精尿血。

左尺微傷。臟寒洩。痛呻吟。右尺微臟寒。洩疝。臍下冷積痛。

病。

此首統言左右兩手微脈病。

遲而無力爲弱。其象極弱而沉細。快快不前。按之如欲絕舉。手即無。弱猶愈于微。

脉弱陰虛陽氣衰。氣虛則脉弱。寸弱陽虛。關弱胃虛。尺弱陰虛。惡寒發熱骨筋萎多驚多汗精多洩。益氣調營。宜補及早醫。此首總言。

弱脉病

寸汗心虛。左寸弱陽虛。右身冷。右寸弱病。右身冷。又兼短氣。關中筋萎。肝主筋。左關力。又兼女人主風面腫。胃脾虛。右關弱。脾胃虛。而食不能化。欲知陽陷陰微。病骨痛耳。聲虛之故。糞數遺痛。右尺弱大便滑。又兼下焦冷。

遲而有力爲緩

其象比浮而稍大似遲而小疾一息四至來往緩呼氣徐徐緩脈有二從容和緩者爲正脈。前人所云諸病脈緩爲胃氣回不治自愈者是若氣血衰而遲緩則爲緩病脈。

緩脈緩營衛衰或痺。緩而或濕。沉而細。緩而或濡。沉而細。緩而上爲項強。下

腳軟。浮風

緩兼浮傷風

沉弱

緩兼沉血

細區分。此首總言

緩脈病

寸緩心虛

左寸緩心氣不足。性坤多肺忘。

肺則浮

右寸緩肺氣當關風

浮言語短氣當關風

眩左關緩風虛眩量

胃虛求右關緩胃

腎虛冷

尺爲腎冷便頻數。左尺緩

又兼腹脇氣急

胃虛求右關緩胃

腎虛冷

尺爲腎冷便頻數。左尺緩

腎虛冷

五

小便下寒風秘便常憂，右尺緩下寒脚
多

弱風氣閉滯。

遲而時止時結

其象來時緩甚時一止復又來。

前人云。陰

凝則結。又云結脈亦因思慮過度。脾氣不足。

又云脉結者亦病四肢不快爲氣所結。

結脈皆因氣血凝老痰結滯苦沉吟內生積聚外瘡腫。疝瘕亡陽

汗自淋。凡結脈主疝瘕癰結。七情鬱結老痰滯結。一切氣血凝結。

又爲亡陽爲汗下。內爲積聚外爲瘡腫。兼浮寒結。兼

沉氣結。此首總言結脈病。

數其象一息六至數數然來。

數脈爲陽熱可知只將君相火來醫寔宜涼瀉虛溫補。肺病秋深
却忌之。此首總言數脈病。

寸數咽喉右寸數口舌左寸數瘡吐紅咳嗽肺生瘍。左右寸同又當

關胃火右關數胃火脾熱并肝火。左關數肝火目赤。尺用滋陰降火湯。右

尺同主腎火熾。小便黃赤大便閉塞。此首統言左右兩手數脈病。

數而弦急爲緊。其象來時勁急。按之長。左右彈指舉之若牽繩轉索之狀。又名急脈。

緊爲諸痛主于寒。癖積風痛吐冷痰。浮緊汗之。

緊兼浮表。沉緊下寒身痛。

緊兼沉裏。寒腹痛。

人迎因傷

寒氣口食

更須看。

此首總言緊脈病。

左頭目項

左寸緊頭熱。目痛項強。

右鼻膈

右寸緊鼻塞膈壅。

關從心腹脇筋尋。

左關心腹滿痛。脇痛。右尺腰脚

關脾腹痛吐逆。右尺腰脚。小便難。右尺下焦氣築痛。

只爲腰脚脅下痛。

知是奔豚與疝疼。脅下痛又

此首總言左右緊脈病。

數而時止爲促

其象來時數時一止復又來。徐疾無一定。有迫促之狀。凡脉促者亦病氣痛。亦病拂鬱。

亦病氣血不疏通。

脈促惟將火病醫。

三焦有

其因有五細推之。

氣血熱

時時咳嗽皆

痰積或發狂癲與毒疽

皆瘀血之故。此

數見關中爲動

首總言促脈病。

其象數見關中形圓如豆。無頭無尾厥厥動搖。尋之有舉之無不往不來。不離其處。動脈亦爲神氣不

安。脫血虛勞。

動脈專司氣與驚汗。因陽動熱因陰。或爲洩痢拘攣病。男子亡陽。

女子崩。

此首總言動脈病。

滑 其象往來流利。如珠走盤。不進不退。

滑脈爲陽元氣衰。痰生百病。食生災。

浮滑風痰滑數。痰火短滑宿食。

上爲吐逆。下

蓄血。女脉和時定有胎。

女人督脈滑。血熱經不通。和滑爲有孕。

此首總言滑脈病。

寸滑膈痰生嘔吐。

右寸病。

心驚舌強緣熱故。

左寸病。

當關宿食肝脾熱。

左關肝熱。頭目爲患。右關脾熱。口臭吐逆。宿食不化。渴痢癲淋看尺部。

左右同。

此首統言左右手滑脈病。

濡 其象虛細而遲。來往極難。一止復來。三五不調。

濡緣血少或傷精。反胃亡陽。汗雨淋寒。濕入營痺爲血。女人非孕

卽無經。女人左尺濡無孕。主血少。有孕

胎病或漏。此首總言濡脈病。

寸心虛痛乖營衛。

左寸

心肺虛耗不安。及冷氣心痛。右

脾弱

右關

冷多嘔。

肝虛

左關弱。肝虛血散。

脅滿身痛。

關內逢。左尺傷精兼及疝。右寒

弱不食胃。

肝虛

左關弱。肝虛血散。

冷多嘔。

脾弱

右關

濡脾

右關

小腹足腎病。又兼大便

津液不足

此首統言左右

兩手濬脈病。

人迎左手關前一分爲人迎

表候人迎屬腑陽。

人迎主外感六淫屬表腑也陽也。

風浮暑弱緊寒傷。

如人迎脉浮主傷風

六淫溼應沉細火熱敷。

熱虛數火洪數

四末清寒表散良。

人迎又主四肢病

氣口右手關前一分爲氣口。

氣口爲陰裏臟看。

氣口候內傷七情及傷飲食屬裏臟也陰也。

怒濡憂濬散因歡。

如氣口脉濡

濡卽因傷怒餘皆倣此。

恐沉思結驚多動悲緊還推何部干。

診得氣口濡濬等脈并看與何

部相關卽知何臟受病如氣口脉濡卽屬肝病而肝脉又適弦硬是也。

此首單言氣口內傷七情之病。

飲食傷留脾臟因通腸快胃法相應人迎氣口俱沉緊夾食傷寒

病曰增。

此首言氣口內傷飲食之病。

陽維以左手爲主其脈從寸部斜至內矣。

陽維脈起會諸陽。

陽維脈從少陰斜至太陽。發足太陽之金門，而與手足少陽陽明五脈會于陽白。故所會皆陽。

根柢於陰表是彰。

陽維主一身之表。風池風府二穴陽維之會也。仲

景法先刺二穴。却與桂枝湯。

陰維以左手爲主。

其脉從寸部斜至內者是也。右手反看，則從寸部斜至外矣。

陰維主裏會諸陰。

陰維主一身之裏。其脉從少陽斜至厥陰。發足少陰之築賓至頂前而終。故所發所至皆陰也。

却起於陽根自深。

陽根陰。陰根陽。故此二經所起也。又按仲景法太陰症用理中湯。少陰症

四逆法堪尋。

潔古云陰維爲病苦心痛。其治在足少陽三陰交。乃陰維所起也。

用四逆湯厥陰症用當歸四逆湯酌其劑以治

陰維之病。

潔古所以治足少陽三陰交也。

陽蹻不論左右手。

其脉從寸左右彈者是也。

一身左右陽專候。

陽蹻主一身。左左右之陽。

脈得陽蹻六腑和。表病裏安陽分

愆。

陽蹻在肌肉之上。陽脈所行。通貫六腑。主持諸表。故其爲病亦表病裏和。

法兼汗下治無訛。

潔古云陽病則寒。若在陽表當汗。桂枝湯麻黃湯。若在陰裏當下。大小承氣湯。

陰蹻不論左右手其脈從尺部左右彈者是也。

諸裏相持通五臟。陰蹻在肌肉之下。陰脈所行通貫五臟。主持諸裏故其爲病亦裏病表和。脉行左右有陰蹻。陰蹻主一身左右之陰。病來陽緩陰多急。陽蹻病陰緩陽急。診察須

從陰熱調。

潔古云陰病則熱甘草乾姜湯。

督不論左手右手其脈三部中央俱浮直上直下者是也。

督司陽脉稱爲海。循背而行遍後身。督脈起胞中循背而行于身之後爲陽脉之總督故爲陽脈之督。督脈爲病是則脊強。上衝作痛苦吟呻。督脈爲病是則頭重而發厥虛則頭重。

又往存自下冲上而痛。

任不論左右手其脈丸丸橫于寸口者是也。

任承陰海因名任。任脉亦起胞中循腹而行于身之前爲陰脉之承任故曰陰脉之海。天癸從生陰有陽。任主天癸乃天之元氣任脉充然後衝脉旺月事時下而有子故真陰之盛必由真陽之旺若使結陰陽氣絕疝瘕崩帶腹前殃任脉病非陰自病是由陰中無陽故疝瘕崩帶皆結陰之故。

衝不論左手，其脈來寸口中央堅塞徑至關者是也。

衝俱督任起胞中。獨主先天精血充二經脉之海。又爲先天精血之主。故又曰血海。本病須分寒火逆也。更傳肝腎患無窮。

經云衝病傳肝腎發爲瘻厥

帶不論左右手。脈來關部左右彈者是也。

約持諸脉遍腰環。帶脉起少腹側季脇下。環身一週絡腰而過如束帶狀。所以總約諸脉。肝腎心脾上下安。帶之上心脾。帶之下肝腎。濕熱滯留中間斷。淫淫白物下無端。心脾上帶之肝腎。下虛停濕爲熱。留滯中分必病作而流白物。

附錄運功規法

余輯雜病源流。凡脈症方藥。所以講明調治之者。似已詳備。然劉海蟾云。醫道通仙道。則修煉家導引運動之法。所以却病延年者。未始不可助。方藥所不逮。蓋旣已却病。首可延年。在修煉家。固以延年爲主。而欲求延年。必先却病。在醫藥家。則以卻病爲主也。故雜病源流中。於每病方論後。有導引運動之法。可以却此病。卽附載于末。總期醫者病者。展覽

衝脈亦起胞中夾臍而行。直衝于上爲諸脈衝要。故曰十

足也。一日火逆。陰不足。

及之以備採用庶獲萬病回春也。但其法有專治一病者既分載于各病之後。而又有總法數條不必每病皆爲適用。而時有必採取者亦不必一病全用總法。而或有此病則用何法。彼病又用何法者既不得贅列于各病之末。而又無處可以混入。故特附于此。如于各病運動中。見有宜用歸元迴天艮背行庭。及緣法。通關滌穢等法者。查明此處所載諸法。應如何引運。遵而行之。無漏無遺。自可邦病。且可延年也。

南北規中引

諸法皆本保生秘要係明俞俞道人曹士玲元白氏所著

凡人妄念奔馳。不思回頭。蓋不知有已然學道初入門。及乎鄰病初下手。每云先要築基煉己者何也。己者意中之土也。時時返念守中。然崑崙至於湧泉。週身前後之竅。雖各家傳授。各取其善。若能精守其一。皆可起病。不必得一望二持。兩可之見。而辨孰是孰非。余訣云。總之攝心歸一。專其一處。皆可止念。故取身中前後。二竅爲則。其歸元取

用父母生前受炁初而能聚氣之原運動週天可參艮背
通關之效然艮背者昔林子闡教爲最余受之家傳捷徑
而更妙若夫運動則貫徹任督二脈兼以導引助神功槩
見矣

南旋式

歸元訣竅 彙元者父母生人受炁之初剪斷臍帶一點落根
元也有生之後情欲雕琢未免精耗氣散不能返本須求安土
敦仁之法蓋土者歸元也人者仁也以一點仁心敦養于土六
根皆歸于元心有所注久久凝定便覺真種常在方可用意運
行行之之法提意出上斡旋造化從左而右先運臍輪收而放
放而復收以還本位不離這個念自歸真矣。

週天先立安土守中得訣純熟後行週天流通一身散徹四

肢滯氣。其法從前運于膕輪由小而大。而收小。依次而上。至璇璣穴。向左臂打圈而下。至曲池經內關。迺掌心。及指尖。圈出手背外關。而上肘後。肩井。及大椎而下。運于尾間。由上復下。迺玉枕。逾崑崙泥丸。面部。上鵲橋。降重樓。達胃口。遇臍。至玉柱。復氣海。行于右腿。歷膝關。由鞋勞穴穿足背。至指尖。轉湧泉。踵後上。運過陰谷。通尾閨。又圈至頂門。如前下鵲橋。依次送左腿似右法。而落湧泉。又昇泥丸。及璇璣穴。右行。照左手轉過肩背。貫崑崙而下。攝元海。如此將週身經脈宣暢。徐徐回轉。但意至。而氣相隨。是爲有作之週天法。亦可與造化參。

北旋式

艮背訣竅。易曰。艮其背。艮者止也。其象屬土。背從北方水。屬於陰。心從南方火。屬於陽。人能以南火。而投于北水之中。得以

水火交而既濟。所謂洗心退藏于密也。蓋五臟六腑根蒂皆係於此。所謂止者。先立內念之正。而止外念之邪也。然大道貴無念。雖立正念。亦是念也。當明內外兩忘。以妄而離妄。必先忘其外者。而後定其心。自忘其內也。故初學之士。靜坐片時。將萬慮掃除。凝神定志。于本穴之中。背之腔子裏。平心元虛處。初起口念太乙救苦咒四。而漸歸于心。歸于背。存無守有。念茲在茲。有復冥於無。神自虛而靈矣。

行庭 吾身一小天地也。週身三百六十骨節。七孔八竅。一竅相通。竅竅光明。而乾旋坤轉。前屬於天。後屬於地。前從左旋後運右轉。前後相通。周乎其天。則知人與天一矣。其法從艮背。守念念而提出腔子。行其背數十回。復收歸腔。稍空又運行至兩腎之間。念刻許。從腎中思想邇尾閭。起運上泥丸。經明堂。人中

接下承漸降重樓至於心臍之間約以臍上三指爲則不前不後不左不右之中而爲立極定樞懸一斗杓行於臍下一寸三分斡旋上升左轉于心之後右旋下降于腎之前循環不息上行由背之北下行由臍之南如北極定樞斗柄推旋者若轉則以意隨之不轉則以意引之久而煉度所以混其氣且所以和其神也

通關 從北極定樞斗柄大旋三遍天地包羅行於臍下分開兩路旋下兩腿之前聯絡不絕雙行轉脚底向後透元海上至命門會合從右轉左大旋三遍從椎骨下分行兩肩經肘後外關達掌心循內關過肩井由頸後透泥丸行明堂漸落雙瞳自面部下胸膈會心窩從左轉下降大旋三遍如前臍下分開循環遍體週流運行卯酉二辰行之或九度或二十一度而止橫

勿執着。若有若無，此所謂煉其形和其氣也。

絲法 從歸元法念起用意左邊運絲過腰從右旋上至左肩膀，絲至胸前行旋過右膊後下旋至腰如法運數十回，而又復絲上行週而復始不必計籌使前後融洽或從艮背起手轉絲而前左右次序會意行之。

滌穢 其法在胃口旋入憑虛而行運入大腸由左繞右回旋九曲以真氣滌垢轉出穀道嚦往吸回自右而左旋出胃口收歸元海靜念刻許以還本位此法不宜輕用凡送濁氣出穀道外即隨念吸轉慎洩真氣丹法有云勿使尾閭墜蓋謂此也。

運規十二則 身若安和氣不必運宜當守靜定息節飲除欲則百病不生若身稍有絲毫不快宜速行運動免氣久滯積成大病故設調養之功用之須得其宜然運法如風車樣

不疾不徐。皮裏膜外。挨次運去可大可小。任意收而放。放而復收。男左女右。陰陽之分。一動一靜。天之行也。

行功之時。目視頂門。微露一線。迎天地之光。返照內景。勿全下視。免致昏沉。馳念。

却病坐功。不比真修磨煉。每按時坐香後。欲睡卽睡。睡則病者精神完足。若心血少。不寐可定意想歸元。或依法運轉。神自安而寐矣。

開關之說。學者不必用意。候到自然通透。蓋靜中運用。無念。自是水升。不然則爲火矣。或腹中響聲。或兩腎微動。或背或眉端隱隱如蟻行。手足似一綫。冷風皆現真境也。亦有陽火冲病根。腸內有聲。卽用真意逐響。運旋撤而散之。

凡行氣過腋處。或崑頂。須多旋遠。數十匝。令氣浸灌爲妙。閑

時如不守前後二竅，懸心于空虛地，四大皆空，無人無我。極爲養火之法，又名休息以養其氣。若運法無時度，則神敝疲。譬如伐兵勞頓，而又遇勁敵，豈不危乎。

觀燈玩月，目向外射，則傷神。返照于我，多益于我。其他自可以類推。

知病工夫，須立課程。逐日檢點，勿失其時。日日如是，提醒緝密，自不間斷而效。

運氣當由後而前，以取西北方水，而灌東南方火，不可逆此。或有傳法各關節處，不必打圈直行亦可。行後定要收歸元位，退慾火法，注念氣海。記數斡旋，或記運尾閭，升降之法。邪火自散，大固元陽。


入定看書，易于通悟。坐下止念爲先。定神元海，不以目覩，而

以心視不以心視。而以內觀。蓋神有所斂。不至散于外。受益自無窮盡矣。

嘻笑場中最易耗神。令人疲倦。得以內斂音聲。言語少減。或氣穴中發神氣。亦不覺其耗。

上丹田穴最可養性。亦可注念。爲藏神之府。運法旋至鼻柱七竅之宗。幹行入內些些。則耳目口三寶皆有靈矣。

想湧泉穴最能健步。行動畧得運法。血脉自可以漸漸流通。而不傷筋省氣。



沈氏尊生書卷一

雜病源流犀燭臘肺門

肺病源流肺脹肺萎肺癰息責

沈金鰲撰

手太陰肺脈起于中焦下絡大腸還循胃口上膈到肺從肺系橫出腋下下循臑內行少陰心主之前下肘中循腎內骨上廉入寸口上魚際出大指之端少商穴止其支者從腕後直出次指內廉之端次注于手陽明大腸經每日寅時周身氣血俱薈萃而注于肺手太陰肺經多氣而少血

肺主氣上連喉系下通心肝之竅司呼吸出入居上以鎮諸臟而壓糟粕以行於大腸出納清氣以出濁物所受者太陽之陰以固陽氣所司者太陰之陽以行陰物又與足太陰脾同行氣以給眾臟故亦名太陰其屬則位西方金其配則爲秋令秋則氣化清肅萬物賴以成遂金則爲水之母其氣恆下行靜時下澄於腎宮與水相通經所謂母隱子胎是也但腎爲眞水天一所生肺旣爲其

母故居華蓋之頂。猶據天河之上。源以注崑崙而入龍門。以匯於海也。其輸精臟腑。猶在天之雨露。廣沛羣生也。然嘗病燥與寒熱。以輸精布眾。或太過。未及滋化。或邪乘。不得行令。故反病燥。宜滋飲

反病寒熱也。

寒宜紫蘇子熟宜瀉肺湯

古人嬌臟之名所由來矣。夫肺主皮毛。

飲

而皮毛則純屬太陽之部。太陽之傷風傷寒。汗出中風。與形寒飲冷。皆能傷肺。故其現症。如鼻塞。聲重。喘咳。氣逆。肩背痛。嚏噴。胸滿。煩心。亦與太陽同。五志之火上炎。陰虛內燥。肝火挾心而刑金。亦能傷肺。故其現症。如肺萎。肺癰。瘻蹙。吐血。聲嘶。息有音。趺衄。掌熱。喘不休。口血出。皮毛焦。皆由火燥焦卷之故。若虛。則有少氣不能報息。耳聾嗌乾諸症。而此諸症。或由外傷治。與足太陽所感病同法。或邪盛鬱塞。必於足太陽瀉之。若傷於內者。正氣衰。金被殘賊。必於足少陰養之。使子能助母。而金氣不至耗。洩於足太陰培之。

使母能生子而金氣得以涵育。昔人云：補水培土是養金善法。洵有然也。抑猶有進者，金性下沉，隱於子胎，腎家水火兩病，肺俱能受其害。故有時腎水上泛爲痰，肺受之則喘壅而嗽。有時腎火上升，凌其母肺，受之則喘息而鳴。皆腎氣上逆而爲病也。要不外足太陽足太陰足少陰三經，從而治之。

脈法 脈經曰：肺傷者，其脈細緊浮數，其人勞倦歟唾血。

肺病症 經曰：風寒入舍於肺，名曰肺癆。發欬上氣，又曰：大骨枯大肉陷，胸中氣滿，喘息不便，其氣動形，期六月死。真臟脈見乃與之註曰：肺之臟也。難經曰：外症，面白善噫，悲愁欲哭，內症，右有動氣，按之牢若痛，其病喘咳，酒淅而寒熱也。靈樞曰：肺氣虛，則鼻息不利，少氣寢則喘咳，胸頻伸息。

肺病門甚 經曰：肺病者，下晡慧，日中甚，夜半靜。

肺病治法 經曰肺苦氣上逆急食苦以泄之。註曰此肺氣有餘也。肺欲收急食酸以收之用酸補之辛瀉之。又曰肺病禁寒飲食寒衣。

肺絕候 經曰手太陰氣絕則皮毛焦。太陰者行氣溫于皮毛者也。故氣不榮則皮毛焦。皮毛焦則津液去皮節傷。皮節傷則爪枯毛折。毛折者毛先死。丙日篤丁日死。又曰肺絕三日死。何以知之。口張但氣出而不返。一云口鼻虛張短氣。仲景曰汗出髮潤喘不休者此爲肺絕。

肺氣滯濇保養法 保生秘要曰凡人氣旺則血榮而潤澤氣絕則血枯而滅形。故氣虛弱滯濇而成病。如濇于肺則肺氣不清液凝滯而爲痰。諸痰贍鬱皆屬肺。上焦之疾或傳于大腸。秋月金旺宜常咽吸以和其氣慎勿用諸肺則不厭其魄。時秋初

夏末熱氣酷甚宜少貪風涼

一切行立坐臥飲食衣服皆慎之

免傷背之肺穴。

中風之症，蓋感此也。肅殺之天，殺中有生，秋分之日，戒傷生命，大抵時至萬物收斂，人心更要持守，勿爲馳逞，發揚以散其氣。肺脹，肺家氣分病也。仲景曰：欬而上氣煩燥者爲肺脹。欲作風水，發汗自愈。又曰：欬而上氣，此爲肺脹。其人喘，目如脫狀。脈浮大者，越婢加半夏湯主之。又曰：肺脹，欬而上氣煩躁而喘，脈浮者，心下有水氣，小青龍湯加石羔主之。丹溪曰：肺脹而嗽，或左或右不得眠。此痰挾瘀血，碍氣而病。宜養血以流動乎氣，降火疏肝以清痰。四物湯加桃仁、訶子、青皮、竹瀝之類，據二家說可知。肺脹本爲肺經氣分之病，故宜以收斂爲主。宜訶子青黛丸清化丸卽挾痰挾血者，亦不離乎氣，不得專議血，專議痰也。

肺萎久嗽，氣虛而熱，在上焦病也。其症之發，必寒熱往來自汗。氣

急煩悶多睡或帶紅線膿血宜急治之。

宜舉肺湯元參清肺飲

切忌升散辛

燥溫熱仲景云或有患此症吐涎沫而歎者

宜生姜甘草湯

有吐涎沫而

不歎者其人不渴必遺尿小便數所以然者以上虛不能制下故

也此爲肺中冷必眩多吐涎必溫之

宜甘草乾姜湯

又有火盛者宜人參平肺散

有喘急而面浮者

宜葶苈子湯

大約此症總以養肺養氣養血清金降火

爲主若肺萎將變爲癰又必兼理膿毒

宜紫苑散

脉法 脉經曰左寸脉數虛澀肺萎也

肺萎之因仲景曰熱在上焦者因歎爲肺萎此從何得之蓋

以或從汗出或從嘔吐或從消渴小便利數或從便難又被快

藥下利重亡津液故得之又曰寸口脉數其人渴口中反有濁

唾涎沫者此爲肺萎之病脉經曰肺萎咳唾咽燥欲飲水者

自愈自張口者短氣也

肺癰肺熱極而成病也。其症痰中腥臭或帶膿也。總治宜清金散皆緣土虛金弱不能生水陰火燥金之敗症故補脾亦是要着而其條治之法如初起咳嗽氣急胸中隱痛吐膿痰急平之宜麥冬或咳吐膿痰胸膈脹滿喘氣發熱急清之宜元參或病重不能臥急安之桔梗湯或已吐膿血必以去膿補氣爲要宜排膿散勿論已成未成總當清熱滌痰使無留壅自然易愈宜金鯉湯凡患肺癰手掌皮粗氣急脈數顴紅鼻煽不能飲食者皆不治。

脉法 脉經曰右寸脉數定肺癰也。但色白而脉兼短濶者生色赤而脉兼浮大者死。

肺癰之因 仲景曰寸口脉數若口中辟辟燥欬胸中隱隱痛脉反兼滑此爲肺癰。

息竇肺積病也在右脇下如覆盆狀令人洒酒寒熱背痛嘔逆喘息。

咳發肺癰。脉必浮而長。皆由肺氣虛。痰熱壅結也。息竚丸。當以降氣清熱。開痰散結爲主。

治肺病諸藥要品及方五

肺寒宜降氣清潤

蘇子

桑皮

天冬

貝母

枇杷葉

杏仁

瓜萎根

竹茹

石膏

黃芩

白前

知母

車前子

肺虛宜順氣清熱

蘇子

桑葉

貝母

百部

沙參

枇杷葉

麥冬

百合

桑皮

杏仁

天冬

葶苈子

五味子

半夏

滋燥飲

無熱可加人參

天冬

麥冬

生地

花粉

白芍

紫蘇飲子

肺寒

蘇葉

桑皮

青皮

杏仁

麻黃

人參

陳皮

甘草

五味子

各一錢

半夏

甘草

生地

桔梗

桑皮

枳壳

杏仁

酒大黃

七分

甘草

山梔

黃芩

薄荷

枳壳

杏仁

大黃

二錢

地骨皮

桑皮

枳壳

杏仁

甘草

一錢

甘草

知母

貝母

桔梗

山梔

生地

麥冬

亦可

肺寒

連翹

桑皮

桔梗

甘草

薄荷

地骨皮

或加知母

貝母

桔梗

山梔

生地

麥冬

亦可

瀉白散

肺熱

山梔

黃芩

薄荷

枳壳

杏仁

瀉肺湯

連翹

桑皮

桔梗

甘草

薄荷

地骨皮

或加知母

貝母

桔梗

山梔

生地

麥冬

亦可

補肺散

肺虛 阿膠二錢 牛蒡 炒糯米各一錢
馬兜鈴七分 杏仁炒九個 甘草五分

治肺脹方五

越婢

加牛夏湯

主治

麻黃 石膏 甘草 半夏 姜 蔗

小青龍湯

水氣

桂枝 麻黃

乾姜

酒白芍

炙甘

四物湯

草 捜瘀

細辛 川芎

半夏

當歸

白芍 生地

訶子青黛丸

葉敍

訶子

青黛

杏仁

海粉

便香附

清化丸

總治

貝母

半夏

姜汁蜜

丸含化

杏仁

五錢

青黛

二錢

治肺萎方七

生姜甘草湯

吐咳

生姜五錢

炙甘草三錢

人參二錢

甘草乾姜湯

吐而不咳

炙草四錢

炮乾姜二錢

人參平肺散

火盛

桑皮二錢

知母

人參

地骨皮

炙草各一錢

天冬

赤苓各八分

陳皮

青皮各五分

五味子二十粒

姜三片

夢棗散

喘急面浮 炒蕁蘆爲末 大棗十枚煎湯去
棗調末二錢服

舉肺湯

總治 沙參 茶樹甘草 百合
桔梗 元參 柴胡 桔梗 陳皮 地骨皮

元參清肺飲

又 茯苓 元參 柴胡 桔梗 陳皮 地骨皮
麥冬 茯苓 元參 柴胡 桔梗 陳皮 地骨皮
加童便一小杯冲服

紫菀散

肺萎成瘡 紫菀 人參 知母 五味子
桑皮 茯苓 貝母 甘草 茯苓 阿膠 姜

治肺癰方六

清金飲

總治 茯苓 桔梗 黄芩 花粉 貝母
桑皮 茯苓 茯苓 牛蒡 白蒺藜

麥冬平肺飲

初起 茯苓 麥冬 人參 赤芍 檀榔
桔梗 陳皮 茯苓 桔梗 陳皮 桔梗
桔梗 人參 桔梗 桔梗 甘草 甘草

元參清肺飲

吐膿 茯苓 元參 柴胡 陳皮 桔梗
麥冬 茯苓 人參 甘草 桔梗 甘草
加童便一小杯冲服

寧肺桔梗湯

不卧 桔梗 貝母 當歸 黃芪 桔梗
桑皮 防已 瓜蔞仁 甘草節 五味子
百合 茯苓 茅蘆杏仁 地骨皮 五味子
咳甚倍百合 身熱加柴胡 地骨皮 知母
便祕加大黃

排膿散

已成 人參 黃芪 白芷 五味子 等分

金鯉湯

總治 鯉魚重四兩者去腸勿見水人貝母末
二錢 縫好童便半碗浸之重湯煮至晴出去鱗
骨將肉仍浸童便內頓熟一日分三次便肉俱
食之其效至速

治息賁方二


調息丸

總治 桔梗 陳皮 菖仁 射干 紫菀 桑皮

息賁丸

又 桔梗 石蠅 海浮石 旋覆花 水泛丸
芩 川連 一兩三錢 厚朴八錢 乾姜 茯苓
各一錢 紫菀 川椒各錢半 人參二錢 桂枝

桔梗 三棱 天冬 陳皮 川烏 菖仁
青皮五分 巴霜四分 茯苓另研
餘爲末篩出和茯苓末研勻再入巴霜研勻蜜
丸梧子大初服二丸每日加一丸漸加至大便
微溏再從兩丸加服積去大半便勿服



咳嗽哮喘源流

沈金鳌撰

咳嗽肺病也。然雖爲肺之主病，五臟六腑皆有之。蓋肺不傷不咳，脾不傷不久咳，腎不傷火不熾，咳不甚其大較也。而咳與嗽異先不可辨。有聲無痰曰咳，非無痰，痰不易出也。病在肺，肺主聲，故聲先。而痰後，有痰無聲曰嗽，非無聲，痰隨嗽出，聲不甚响也。病在脾，脾藏痰，故痰出而嗽。二者總因心火困土，冠金所致。因咳有痰，重在咳，肺爲主，急宜順氣。肺惡溫燥，橘紅貝母桔梗桑皮知母麥冬紫菀爲要藥，因痰致嗽重，在痰，脾爲主，速宜消痰。脾惡寒潤，二术南星半夏爲要藥，清火兼之，最是要法。而致咳之由，則有兩大頭腦。一曰內傷，七情饑飽是也。一曰外感，風寒暑濕是也。而風寒暑濕所感，竟有不咳者，感太重徑傷臟腑不留於肺，故不咳。不然先中皮毛，以次傳及五臟，故亦不復咳。七情饑飽所傷，竟有不

嗽者病尙淺。止在本臟。不上干於肺。故不咳。否則臟氣受傷。以次病及上焦。故一時不遽咳。所以傷寒以有嗽爲輕。七情之咳。必久

而後見也。自表入者。病在陽。若用寒涼收斂。必連綿不解。變生他症。故宜辛溫。寧嗽湯或二陳湯。加防風紫蘇之屬。以求其屬。散其邪。肺清而嗽自愈。

自內生者。

此內傷

傷其陰。陰虛陽浮。水涸金燥。喉痒而咳。最忌辛香助陽。

故宜甘潤。

宜保和湯滋

陰。清化丸。

而虛者

以滋養肺水。旺氣暢而咳自愈。然外治雖

此外感

宜散。

若病氣形氣俱虛。又當補益。以溫解。如參蘇飲之用。參桂枝湯之用。甘芍。寃脾也。脾寢則肺金得養。前邪易出。後邪難入矣。內治雖宜潤。若命門火衰。氣不化水。不得概執滋陰之說。而參羌附桂。不妨酌用也。然則內傷外感之殊。不可先悉其源流乎。而其發於五臟。移於六腑者。可更條析言之。經曰。肺咳之狀。喘息有音。甚則唾血。宜以肺母瓜蒂。

之如桔梗貝母花粉等。

咳不已。大腸受之。咳則遺尿。

引上加升麻引下加心咳之狀。心痛。喉中介介如梗狀甚則咽腫
喉痺。宜以心經藥治之。如黃連、細辛、鬱金、麥冬、遠志等。
咳不已。小腸受之。咳則失氣。氣與
痰俱失。引上加桔梗引下加木通。脾咳之狀。右胠下痛。引肩背甚或
不可動。動則咳劇。宜以脾經藥治之。如半夏、二冬、陳皮、腹皮之屬。
肝咳之狀。右胠下痛甚則不可動。動則咳劇。宜以肝經藥治之。如柴胡、
葛根、芍藥等。引上加升麻引下加石膏。肝咳之狀。左胠下痛甚則不
可動。動則咳劇。宜以肝經藥治之。如柴胡、葛根、芍藥等。益智厚朴主治烏梅丸。肝咳之狀。左胠下痛甚則不
可動。動則咳劇。宜以肝經藥治之。如柴胡、葛根、芍藥等。引上加川芎引下加前胡。肝咳之狀。左胠下痛甚則不
可動。動則咳劇。宜以肝經藥治之。如柴胡、葛根、芍藥等。青皮主治黃芩湯。腎咳之狀。腰背相引痛。舌本乾
咽作鹹甚則咳涎。活天冬山萸故紙等。宜以腎經藥治之。如獨活、天冬、山萸、故紙等。
咳不已。膀胱受之。咳則遺溺。引上加羌活引下加橘核主治茯苓湯。久嗽不已三焦又受之。咳則腹滿。不欲
飲食。引上加川芎引下加青皮主治木香順氣散。心包絡咳。心胸間隱隱作痛。宜以心經藥治之。如丹皮、山梔肉桂等。此經言臟腑相因之咳。所當分別而治者也。其餘又
有肺脹痰挾瘀血。或左或右。不得眠。動則喘急者。宜四物湯加山梔紅花詞子青

皮竹瀝姜汁等。又有肺勞熱，生亟如蚕，咳逆氣喘，謂之膏肓病。針不得卧者不治。

灸不至者。

宜驅

二

又有脾胃先虛，不能制水，水泛爲痰，水冷金寒。

而咳者。

宜六君子湯加減

又有過服涼冷，脾胃受傷，寒水挾木勢而上侵。

肺胃前病未除，新病更甚，若進寒涼，必至危殆者。

急補土母

宜八味丸

六君子湯加炮附。

又有因火燶肺金而咳者。

清金降火，誰不知之。

苓連二

冬知柏悞用，必至更甚，急補北方。

以鴻南方。

宜六味丸

桔梗湯補陰後隨。

用參芪救肺，使金土相生，方可謂識先後者。

若用參芪于壯水之

先陽火愈旺，金愈傷矣。

以上皆臟腑餘症，未可忽視者也。

且夫咳

之爲病，有新久虛實之殊。

新咳者，肺有實邪，風則散之。

宜參蘇飲

寒則發之。

宜二陳湯加紫蘇

熱則清之。

宜金沸散去麻黃半夏加薄荷

葛根杏仁桔梗

火則瀉之。

宜清火瀉則除之

宜白

之屬

桔梗

茶

五味杏仁桑皮貝母茯苓桔梗

止咳湯瀉則除之。

宜加味

木湯

痰則滌之。

宜二陳湯

有久

病忽咳，病雖久而咳則暴亦爲新咳，必新傷風食也。

風則疏之。

宜消

風寧食則消之。宜大安丸去連翹黃卽愈矣。久咳者屬虛屬鬱。有
嗽湯。連加桔梗枳實等。由氣虛者。宜補中益氣湯。有由血虛者。宜阿膠
者。宜芩連四物湯。有氣血兩虛者。宜寧四物湯。有由血虛火盛喘咳聲嘶。
者。宜芩連益氣湯。有由血虛者。宜阿膠四物湯。有由血虛火盛喘咳聲嘶。
虛勞咳嗽痰喘者。宜五膏有虛勞嗽一二聲無痰。夜則發熱過則冷。
睡多夢者。宜劫勞散有火鬱於肺。咳則有聲無痰者。宜桔梗湯有濕痰內鬱。
痰出則咳少止。少頃又咳者。宜加味二陳湯而又有咳。久傷脾滿面生瘡
者。宜人參蛤蚧散。有久咳失音者。宜杏仁膏清肺湯。有久咳失氣者。宜劫散丸。有久咳
面目浮腫者。宜薄蘇散。有久咳不止諸藥不效者。宜噙化丸。有久咳成
癆者。宜保和湯。有久咳經年百藥不效餘無他症與勞嗽異者。宜百部
膏。有痰鬱火邪在中成乾咳者。此症極難治。先用開劑。宜逍遙散重加
桔梗後用補陰之品。宜本事鼈甲丸加熟地當歸。咳之爲病又有四
時晝夜之異。春嗽春氣上升也。宜清氣加川芎。凡咳遇春卽發。

爲脾病健脾爲主。宜異功散。加桔梗湯。

加石膏。加止嗽藥。

夏嗽炎火逼肺也。無黃連不愈。

宜桔梗湯。

加石膏。秋嗽燥金用事也。

宜二陳湯加桑皮。天冬、加秋末發嗽。交夏方愈。乃寒

黃連。

包熱也。還須解表。

宜二陳湯加柴胡葛根。

冬嗽風寒外束也。亦須發散。

宜二

加麻黃杏仁。

羌活防風。

五更嗽或五更痰多。或清晨痰多。總皆脾虛所致。

宜六

君子湯。

日夜不咳。但朝晨咳幾聲。火空則發也。

宜二陳加黃芩桔梗桑皮。

日夜

亦嗽。惟早晨嗽更甚。胃中有食積。至此時火氣流入肺中也。

宜白散。

加知母或二母。

上半日咳痰稠黃。胃火也。

宜二陳湯加竹白散。

散五更嗽同。

上半日咳痰稠黃。胃火也。

宜二陳湯加竹白散。

痰黑粘滯陰虛火動也。

宜六味作湯。

君子湯間服。

黃昏咳腎經陽衰陰弱虛火。

上炎也。

當補肺脾生腎水不可專用嗽藥。

宜六味丸。不論大人

小兒黃昏熟睡中忽咳嗽兩三聲。

食積痰也。消其痰而咳自止。

宜二陳湯。

如山楂神曲麥芽。

後半夜嗽風也。

宜二陳湯加防風。

日輕夜重咳血少也。

宜二陳湯多加

當歸。即止。

凡黃昏五更上半夜咳屬實。後半夜咳屬虛。此又不可不知。

者總而言之。咳嗽之因。共十有六。一曰風嗽。風乘肺也。其脉浮。必兼鼻塞。流涕聲重。口乾喉痒。憎寒發熱。自汗惡風。煩躁語未竟而咳。宜款冬花散 二曰寒嗽。肺肺皆受寒邪也。其脉弦微。必兼面白。口甘水反侮土。寡於畏也。腹中大寒痰白作泡。口甘涎沫者。胃寒不和。必以辛甘熱去之。宜紫蘇飲子 或有遇寒卽發者。乃寒包熱也。解表則熱自除。半夏溫肺湯 加麻黃防風杏仁陳皮紫蘇木通黃芩。大概寒傷肺而咳者。其脈緊。必兼鼻塞聲重。憎寒發熱。無汗煩燥。不渴。胸緊甚至音啞。宜二陳湯加麻黃杏仁桔梗 三曰熱嗽。傷於暑熱而得嗽也。其脉數。必兼口燥聲嘶。煩熱引飲。或吐涎沫。甚至咯血。宜洗肺散芩半夏丸 連化痰丸須知咳嗽面赤胸腹脇常熱。惟足乍有時冷。其脉洪滑者。必熱痰留滯於內。故嗽而胸滿也。宜小黃丸 小陷胸湯四曰濕嗽。濕傷脾也。其脉濡細。必兼骨節痠疼。四肢沉重。或有汗。小便不利。痰多。宜白朮湯 五曰鬱嗽。卽火

軟也。其脉數必兼面赤或肺脹喘急睡不安。痰少甚者乾咳而無痰。乃腎水枯涸邪火獨炎所致。宜清化丸清金降火湯六曰勞嗽虛勞咳嗽。

也。其脉細數必兼盜汗出。痰多作寒熱火升喘促。蓋緣酒色過度虛勞少血津液內耗。心火上炎遂使燥熱乘肺。睡咯膿血。上氣涎潮其嗽連續不已也。宜人參清肺湯訶黎勒丸人參芩歸湯

七日食積嗽傷食生痰

久積發咳也。其脉數硬必兼胸滿噫酸發熱或膈痰壅滯喘滿皆由胃火上炎冲逼肺氣久而不愈也。此非青黛瓜蔞不除。二母寧嗽湯

九日食積者必面青黃白不常面上如擗爪路一黃一白

者此又可望色而知也。八日氣嗽七氣積傷成咳也。其脉浮洪滑數必兼上氣喘急痰涎凝結或如敗絮或如梅核滯塞咽喉吐不出咽不下多因七情鬱結或勞傷脾肺甚而多吐膿血漸成肺萎將作勞瘵也然氣嗽一症婦人多有之。宜圃參飲紫蘇子降氣湯星香丸九日痰

嗽。嗽。動。便。有。痰。聲。痰。出。卽。嗽。止。也。其。脈。浮。滑。必。兼。胸。膈。滿。痰。涎。多。
或。寒。熱。交。作。面。浮。如。盤。緣。濕。痰。在。胃。上。干。于。肺。也。宜。半。瓜。丸。滴。其。
有。一。種。發。咳。時。直。至。頭。吐。飲。食。痰。物。俱。盡。方。小。安。者。此。乃。肝。木。魁。
脾。土。風。痰。壅。盛。所。致。也。宜。白。圓。子。十。日。乾。嗽。肺。中。無。津。液。也。其。脈。細。濇。
必。兼。氣。弱。或。促。乃。痰。鬱。火。邪。於。肺。中。輕。則。連。咳。數。十。聲。方。有。痰。出。
重。則。雖。多。咳。亦。無。痰。故。爲。乾。咳。嗽。極。難。治。始。宜。用。苦。桔。梗。以。開。之。
再。用。補。陰。降。火。之。劑。不。已。則。成。勞。瘵。在。不。得。志。者。多。患。此。宜。乾。嗽。
加。味。二。母。
丸。瓊。玉。膏。十一。曰。血。嗽。嗽。而。多。唾。瘀。血。也。其。脈。浮。芤。而。數。必。兼。喉。
中。有。腥。氣。或。因。上。焦。有。熱。血。瘀。沉。悶。嗽。聲。連。併。氣。不。得。透。宜。柔。皮。散。或。
因。打。撲。損。傷。肺。氣。作。咳。多。吐。黑。血。歸。散。十二。日。酒。嗽。傷。酒。而。成。也。
蓋。酒。大。熱。有。毒。或。冷。熱。兼。飲。日。久。漸。傷。胃。菀。其。氣。結。聚。不。流。致。成。
濕。痰。作。嗽。宜。瓜。萎。青。黛。丸。瓜。姜。丸。十三。日。久。嗽。諸。般。嗽。久。也。蓋。積。痰。留。

■ 肺 咳嗽哮喘

聚肺脫粘滯如膠。以致氣不升降。或上氣喘急。宜蜂羨丸。貝母并

有至數十年不愈者。

宜馬兜鈴丸。潤肺除嗽飲十四日火嗽。

火熱嗽也。其脈洪

數。必兼面赤。煩渴引飲。有聲痰少。或由肺家積熱。

宜清肺飲。或由傷寒

潮熱痰盛。胸脇痛。

宜柴胡枳桔湯。

或由火鬱肺脹。氣急息重。

宜海青丸。蓋以肺

腎二經乃人身之化源。二經有虧則化源絕。故痰火益盛而嗽發

不止也。

宜滋陰清化膏十五日

夜嗽陰虛嗽也。多屬腎氣虧損。火炎水涸

或津液壅而爲痰。故夜間屬陰分。陰氣相感。故咳聲不絕。至曉方

緩。或兼口苦。胸痞。脇痛。多吐涎沫。不進飲食。故夜咳必用知母。切

忌生姜。以其辛散恐復傷陰也。古人多以六味丸加知柏天冬貝

母橘紅治之所以滋化源也。

宜滋陰清化膏十六日

天行嗽感時行之氣作咳也。蓋因時令不正。人多感冒。以致痰盛寒熱。或鼻塞

聲重。

宜人參散。一服散

而亦有四時感受風寒作嗽不盡。由一時天行之

氣者。宜參蘇飲。由是以治諸咳。庶幾用藥皆有關竅。而罔弗奏功矣。

脈法。咳嗽。哮喘。

內經曰。喘鳴肩息者。脉實也。緩則生。急則死。

也。

脈訣曰。咳嗽所因。浮風緊寒。數熱細渴。房勞濤難。右關濡

者。飲食傷肺。左關弦短。疲極肝衰。浮短肺傷。法當咳嗽。五臟之

嗽。各視本部。浮緊虛寒。沉數實熱。洪滑多痰。弦濤少血。形盛脉

細。不足以息。沉小伏匿。皆是死脉。惟有浮大而嗽者。生外症。內

脉。參攷調停。正傳曰。關上脉微爲咳。脈弦或緊爲寒。脉浮爲

風。脈細爲濕。脈數爲熱。脈沉爲留飲。沉數爲實熱。洪滑爲多痰。

脈浮軟者。生。沉小伏匿者。死。又曰。喘脉滑而浮者。生濤而數者

死。大抵宜浮遲。不宜急數。又曰。咳逆脉浮而緩者。易治。弦急而

按之不數者。難治。脉急或促或微。皆可治。脉代者死。右關脉弦

者。木乘土位。難治。仲景曰。咳唾膿血。脉數虛爲肺萎。數實爲

肺癰。脈經曰。喘脉滑而手足溫者生。脈濇而手足寒者死。數者亦死。爲其形損故也。又曰。肺癰。唾血。脉緊强者死。滑者生。回春曰。喘急脉沉。肺脹停水。氣逆填胸。脉必沉取。沉而實渭。身溫易愈。身冷脉浮。尺澁難補。入門曰。欬逆上氣。脉散者死。散卽數也。咳逆脉數。爲火刑金。故必死。

咳嗽之因。內經曰。人感于寒。微則爲咳。甚則爲泄爲痛。河間曰。經云。秋傷于濕。冬生咳嗽者。蓋傷濕積于脾也。大抵秋氣宜清肅。若反動之氣必上冲爲咳嗽。甚則動脾濕而爲痰也。是知脾無留濕。雖傷肺氣。亦不爲痰。若有痰而寒少熱多。故咳嗽。是咳嗽非專主於肺病。以肺主皮毛而司于外。故風寒先能傷之也。經云。五臟六腑皆能使人欬。非獨肺也。各以其時主之而受病焉。非其時。則傳以與之也。所病不等。風寒燥濕火。皆能令

人咳惟濕病痰飲入胃留之而不行上入于嗽則爲嗽假令濕在心經謂之熱痰濕在肝經謂之風痰濕在肺經謂之氣痰濕在腎經謂之寒痰各隨症用藥又曰無痰有聲曰咳肺氣傷而不清也無聲有痰曰嗽脾濕動而爲痰也有痰又有聲則曰咳嗽耳。

喘咳由腎家虛。直指曰：腎虛不能納氣歸元，故氣逆咳喘。痰盛或喘或脹，髓虛多睡，足冷骨痺，胸腹百骸俱爲牽掣。咳愈重聲愈乾，當于受病之處圖之。又曰：肺出氣，腎納氣。凡咳嗽暴重動引百骸，自覺氣于脐下逆奔而上，此腎虛不能納氣也。當以補腎爲主，毋徒寧肺。

咳嗽不治症。靈樞曰：咳而羸瘦，脉堅大者死。咳而脫形發熱，脈小堅急者死。大門曰：凡咳喘至肺脹有咽瘡，失音者必死。

脉數有熱。喘嗽吐血。上氣不得卧者死。正傳曰。久嗽不止。成
癆聲啞。或喉中生瘡者不治。丹溪曰。咳嗽肺脹。鬱遏不得眠
者爲難治也。

禁忌法。入門曰。凡久嗽忌用。人參半夏陳皮等燥藥。久喘亦
忌人參。凡氣嗽忌。瞿粟壳肉荳蔻等溫藥。丹溪曰。凡咳嗽口
乾咽燥而有痰者。忌南星半夏。宜瓜蒌仁貝母。若有飲水者。又
忌瓜蒌恐膩膈。

導引。保生秘要曰。伸足坐定雙惶兒訣。用力擰起。低頭躬身
漸下。以兩手扳足尖三次。隨原訣用力仰起。次咽津下降幽闕。
如此躬法二十四回。養靜半香效。

運動。炎於肺竅。但用歸元凝神一法封固。火不上行。肺竅不痒。其

嗽自止。却寒嗽持守微用閉法。卻火嗽但用封固取靜後引腎水澆灌肺火。周旋度數。肺得水潤。嗽自然止。

哮肺病也。當先辨哮與喘與短氣三症之相似而不同。李氏士材曰。喘者促促氣急。嗰嗰痰聲。張口擡肩。搖身擯肚。哮者與喘相類。但不似喘。開口出氣之多。而有呀呷之音。呷者口開呀者口閉。開口閉口俱有聲音。呀呷二字合成哮字。以痰結嗽間與氣相繫。故呷呀作聲。短氣者呼吸雖急。而不能接續。似喘而無痰聲亦不抬肩。但肺壅而不能下。按士材分別三症。致爲精細。臨症時所當詳察。哮之一症。古人事主痰。後人謂寒包熱。治須表散。宜陳皮湯
冬加桂枝窃思之。大都感於幼稚之時。客犯鹽醋。滲透氣膜。一遇風寒。便窒塞道路。氣息急促。故多發於冬初。必須淡飲食。行氣化痰爲主。宜千金湯
能治一切哮禁涼劑。恐風邪難解也。禁熱劑。恐痰火易升也。蘇子枳壳

青皮桑皮桔梗半夏前胡杏仁山梔皆治哮必用之藥。士材謂先於八九月未寒時用大承氣下其熱。至冬寒無熱可包此法大妙。而又有食哮。宜清金丹有水哮。宜水哮方有風痰哮。宜千緝導痰湯。有年久哮。宜兒角丸。青皮散若服青皮散愈後宜用半夏八兩石膏四兩蘇子二兩丸服皆當隨症治之無不可以斷其根也。宜定喘湯

哮病症治 入門曰：哮以聲响言，喘以氣息言。綱目曰：哮遇冬則發者有二症。一由內外皆寒，須用東垣參蘇溫肺湯。一由寒包熱，須用越婢加半夏湯表散之。正傳曰：喘促喉中如水鷄聲者謂之哮。氣促而連續不能以息者謂之喘。

喘肺病也。內經論喘之因甚多。獨諸病喘滿皆屬乎熱一語足爲綱領。王海藏云：盛氣有餘便是火。氣盛當作氣衰。有餘當作不足。肺氣果盛有餘，則清肅下行，豈復爲喘？皆以其火入肺，炎爍真陰。

氣衰不足。故喘所謂盛有餘者。非肺之氣。肺中之火也。海藏誠發于古之精奧。而猶未究火所由來。火之有餘。卽水之不足。諸逆冲上。皆緣壯火食氣銷爍。肺金真陰虛。故火益旺。其症多自小腹下火起。而上左尺大而虛。非因物陰血之劑可燎。下焦龍火亦非寒涼可降。其挾痰者。乃水挾木火而上。非竹瀝枳半能消。必當補瀉。兼行。宜六味作湯加麥冬五味子大劑濃煎服之則水自升。火自降。痰自消。若六脉俱沉。遍身痰氣火氣。坐卧不得。則又不在此例。宜黃連膏總之喘因雖多。而其原未有不由虛者。元氣衰微。陰陽不接續。最易汗脫而亡一時難救。古人言諸般喘症。皆屬惡候是也。蓋人身氣血陰陽。如連環式樣一般。日兩圈交合之中。一點真陽命也。牽扯和勻。卽呼吸調息也。若不接續。卽見鼻扇唇青。掀胸抬抬。張口搖肩等狀。脉亦不續。無神卽死。故凡喘皆不可忽視也。試條列之。火鬱喘。六脉。

俱濶。或沉伏。四肢厥冷。拂拂氣促而喘。以爲有餘。肺却不緊。數以

爲陰虛。尺脉又鼓。指寒熱俱難投。惟當宣散畜熱。宜逍遙散加黃連吳萸丸

之發汗既愈。再養陰和陽。宜六味丸乃佳水氣喘促。乃水氣逆行乘肺。肺得水而浮。喘不能卧。氣不宣通。當從小便去之。宜桂苓甘朮湯腎氣丸風

寒外束。喘必有力。其氣粗有餘之喘也。宜三勞碌氣虛喘必呼物湯

吸急促。宜六君子湯胃虛。喘抬肩擗肚。喘而不休。宜五味子湯食喘。凡病初

起卽喘急多食。或放屁。或咬人。或見壯脈。皆食重之。故消其食自

愈。宜資生丸痰喘。動作便有痰聲。宜先服定喘湯加瓜萎三劑次照痰症治

甚。喘不休。宜神仙住喘湯氣喘。呼吸急促無痰聲。宜定喘湯火喘乍進乍退食

則減。已則發。宜桔梗二陳湯暑喘。遇暑熱卽病。宜清暑益氣湯濕喘。不論內蒸外

感。皆胸滿張口促急。以利水爲要。宜滌陰虛喘湯火自腑下上冲便

喘不休。宜四物湯加知柏麥冬五味子丸肺癌喘。必口燥。胸中隱隱痛。吐膿。右

寸脉數寔以保全化毒爲主

宜桔梗湯加防風橘紅金銀花麥冬

肺萎喘有膿血

或濁痰。宜紫散。肺脹喘，上氣煩躁，目如脫狀。

脈浮而大宜越婢加半夏湯

浮心下必有水氣。

宜小青龍湯加石膏藥後喘

病後用攻伐藥太過，以致喘不能收。

宜補中益氣湯忽作喘必因感風感

氣或多飲酒而然。須兼所感治之。

宜以定喘湯爲主各加所感藥似喘非喘之

喘由陽明之氣下行胃絡不和逆而上出也。

宜六君子湯似火非火之

喘真元耗極，腎氣上奔。四肢厥冷，面赤煩躁惡熱。此非邪火乃命

門真火離宮不歸。兩寸浮數，兩尺微弱。用涼藥似稍快，少頃依然。

此當細求其緒與以助元接真鎮墜之品。

宜六味丸參麥散送下覺氣稍

定復用大劑以鎮於下，或可回生。

宜大劑參芪加丸參紙牛膝阿膠小兒行走氣急

作喘，必是食。食喘必兼感，如感風疏風，感氣開氣，受驚鎮驚，加入

消食藥中自愈。

宜以平胃散爲主各加所感藥老人動卽作喘皆由虛衰必用補

益不可專任定喘之劑，宜嵩崖

脾胃丸

遇秋冬卽發寒包熱也。解表則

愈宜陳皮湯。喘不休汗出如油氣脫也。不治惟獨參湯濃煎多服或可

少延時日。種種喘症皆當詳察治之。至用藥通忌斂瀉升發燥熱

酸鹹之品降氣清火潤肺方爲治喘平和之法

宜通丹蘇子桑皮

枳壳半夏山梔元參知母青黛黃芩梨肉貝母杏仁花粉桔梗橘紅天冬麥冬等

孫慶曾先生云凡喘皆

不可輕視言易治旨哉言乎誠見乎喘病之重而治喘之難也。臨

症者慎旃。

喘急形症內經曰肺主氣形寒飲冷則傷肺故其氣逆而上行衝衝而氣急喝喝而息數張口抬肩搖身掀肚者是爲喘。

丹溪曰喘急者氣因火鬱而成稠痰在肺胃也。入門曰呼吸

急促者謂之喘喉中有聲响者謂之哮虛者氣乏身冷痰如冰寢者氣壯胸滿身熱便破又曰有起居如故而息有音者乃肺

絡脉逆而不得隨經上下也。又曰喘非風寒傷肺則痰火脹急。風寒則祛散痰火則疏導。但火熱者亦不可純用苦寒。宜溫以劫之。又曰凡喘未發以扶正爲主已發以散邪爲主。

喘由腎虛得效曰下元虛冷腎氣不得歸元上喘氣急安腎丸八味丸主之。

喘嗽聲嘶丹溪曰聲嘶者由血虛受熱也蛤粉青黛蜜丸時常含化。

喘病不治症仲景曰凡喘煩躁無脈身冷神昏者死。髮汗如油汗出如珠不流抬肩擯肚喘而不休及膈前高起手足厥冷脉散及數者皆死。直指曰汗出髮潤喘者爲肺絕身汗如油者爲命絕直視譫語喘滿者不治諸有病篤正氣欲絕之時邪氣盛行都壅逆而爲喘然則喘之危急又何可以尋常小症

目之哉。

導引

哮喘同

保生秘要曰用手法於十一椎下脊中穴掐之大

十四度擦亦如數兼行後功喘自然安

運功

哮喘同

保生秘要曰以手摩擦兩乳下數遍後擦背擦兩

肩定心嚥津降氣以伏其喘

治咳嗽方八十四

寧嗽湯

表病嗽

葛根

桔梗

半夏

枳壳

陳皮

前胡

加姜葱

桑皮

茯苓

蘇葉

杏仁

甘草

二陳湯

味二陳湯

半夏

陳皮

茯苓

保和湯

內傷咳

桔仁

知母

天冬

麥冬

欬冬薄

芍

馬兜鈴

百部

紫菀

桔梗

百合

地小薊

痰多加橘紅

紫蘇

荷加蘇子

桑皮

陳皮喘者去

滋陰清化丸

內傷咳

天冬

麥冬

生地

熟地

知母

草 蜜丸

彈

芍藥湯

小腸咳

白芍

甘草各四錢煎

餘糧湯

大腸咳

禹餘糧

赤石脂

烏梅丸

胃咳

烏梅

細辛

炮附

桂枝

人參

黃柏

乾姜

黃連

當歸

鵝漆

飯丸

胆咳

黃芩

生姜

半夏

甘草

茯苓湯

膀胱咳

茯苓

桂枝

青皮

陳皮

厚朴

木香順氣散

三焦咳

木香

香附

青皮

砂仁

甘草

四物湯

肺咳

川芎

當歸

白芍

地黃

驅二竇湯

肺勞生虫

麥冬

炮姜

川椒

黃芪

人

參

肉桂

百部

白术

遠志肉

細辛

蜜丸含化

水冷金寒咳

廣皮

杏仁

人參

茯苓

白术

甘草

六君子湯

半夏

水冷

金寒咳

廣皮

人參

茯苓

白术

甘草

八味丸

過服寒涼

地黃

萸肉

山藥

茯苓

丹

六味丸

火燶肺金

地黃

山藥

萸肉

丹皮

澤

桔梗湯

火燶于肺

桔梗

香附

山梔

萸肉

丹皮

參蘇飲

風嗽

人參

紫蘇

葛根

半夏

前胡

金沸草散

熱嗽

金沸草

麻黃

葛苓

甘草

木香

清火止咳湯

火嗽

枳壳

杏仁

黃芩

加姜棗

石膏

白术湯

濕嗽

白术三錢

半夏

橘紅

茯苓

五

人參飲子

天行咳嗽

人參

桔梗

五味子

赤苓

半

麻黃蒼朮湯

夜嗽

麻黃

蒼朮

黃芪

草蔻仁

柴胡

加味二陳湯

痰嗽

茯苓

陳皮

半夏

甘草

枳壳

桔梗

瓜萎仁

杏仁

黃芩

前胡

山梔

加姜子

羌活

防風

歸尾

炙草

生草

桔梗

瓜萎仁

黃芩

前胡

山梔

黃芩

消風寧嗽湯

新風嗽

桔梗

枳壳

半夏

陳皮

前胡

六安丸

食嗽

陵芽

茯苓

白术

山楂

橘紅

半夏

桑皮

甘草

補中益氣湯

氣虛嗽

歸身

升麻

柴胡

甘草

陳皮

白术

阿膠四物湯

血虛嗽

阿膠

川芎

當歸

白芍

當歸

白芍

地黃

芩連四物湯

聲嘶

黃芩

黃連

麥冬

川芎

當歸

白芍

當歸

寧肺湯

氣虛

白芍

人參

當歸

白芍

桑皮

阿

五汁膏

虛勞咳血

天冬

麥冬各二錢半

生地

萊菔子

貝母

丹皮各一錢

茯苓八

薄荷各二錢

貝母

丹皮各一錢

茯苓八

分

犀角

羚羊角各五分

梨汁

萊菔子

貝母

丹皮各一錢

茯苓八

分

犀角

羚羊角各五分

梨汁

諸藥煎至三杯

大渣入五汁

煉成膏

收蜜二兩

重湯

頓半日

諸藥煎至三杯

大渣入五汁

人參蛤蚧散

久嗽生瘡

人參

蛤蚧

杏仁

知母

貝母

姜汁

砂糖

失音

桑皮

杏仁三兩

木通一兩

五錢

姜汁

紫菀

五味各一

杏仁膏

久嗽

生瘡

人參

蛤蚧

杏仁

桑皮

白蜜各一

甘草

咳嗽

哮喘

喘方

一兩 將後四味先熬三炷香
去渣入前四味煉成膏含化

劫勞散

虛勞嗽

白芍 黃芪

人參 甘草

熟地 半夏

清肺湯

失音

五味子

五倍子

黃芩

甘草 等

劫噦丸

久嗽失氣

阿膠 詞子

百藥煎

荆芥

蜜丸含

葶藶散

浮腫

葶藶隔紙炒

郁李仁

柔皮各一錢

大腹皮七

分

半加

噙化丸

久嗽

熟地

阿膠

五味子

貝母

欬冬

立效方

花

杏仁

人參

炙草

蜜丸

瓜萎各五錢

白七根

蘇梗

川椒每歲一粒

貝母

款冬花八錢

杏仁

荷葉包蒸熟

五更作一次食

盡大妙否則留第

二日五更再食同淡燒酒食食完另飲陳酒少

許安卧至曉

少

百部膏

經年咳

百部

只一味煎膏每含化

烏梅膏

又

烏梅

只一味煎膏每含化

逍遙散

乾咳

白术

當歸

柴胡

甘草

茯苓

本事鱉甲丸

湯下

補陰

鱉甲

五味

地骨皮

蜜丸食前鹽

異功散

春嗽復發

人參

白术

茯苓

甘草

陳

瀉白散

晨嗽

桑皮

地骨皮

甘草

粳米

人參

欬冬花散

風嗽

桑黃

地骨皮

阿膠

杏仁

炙草

紫蘇飲子

寒嗽

桑葉

半夏

欬冬花

加姜

陳皮

半夏溫肺湯

胃虛冷嗽

桑黃

半夏

細辛

桂心

旋覆花

桔梗湯

寒包熱嗽

桔梗

去白陳皮各一兩

半夏

爲粗末每三錢

姜五片煎

桔梗湯

寒包熱嗽

桔梗

去白陳皮各一兩

半夏

爲粗末每三錢

姜五片煎

洗肺散

熱嗽

桔梗

半夏各一兩

黃芩

天冬各一兩

麥冬各二錢

芩半丸

湯下

五七十九

黃芩

半夏各一兩

黃連

麥冬各一兩

黃連化痰丸

又汗

等分入砂

梨汁

藥細火熬膏

以匙挑服

生薄荷

肺咳喘方

又汗

等分入砂

糖細火熬膏

以匙挑服

生薄荷

生薄荷

半黃丸

熱痰嗽 黃芩一兩半 南星 半夏各一兩
姜汁打糊丸 姜湯下三五十丸

小陷胸湯

濕嗽 白术一兩半 南星 半夏各一兩
姜汁糊丸 姜湯下五七十丸

清化丸

肺胃痰火 陳皮 杏仁各一錢半 赤苓
半夏 桔梗 貝母 前胡 瓜蔞仁 黃芩
石膏各一錢 枳壳八分 甘草三分 姜

清金降火湯

勞嗽 一片水煎食後服 訶子皮五錢 海粉 瓜蔞仁 青黛三錢
便香附 杏仁 貝母各二錢半 姜汁和

詞黎勒丸

蜜丸 櫻桃 姜三片 桑二枚 川芎 白芍各一錢半 赤苓
當歸 人參 陳皮 半夏 阿膠 細辛 五味
大含化 甘草各七分 加

人參芎歸湯

食嗽 甘草各七分 加 川芎 白芍各一錢半 赤苓
瓜蔞丸 分 石膏二錢 知母 各一錢半 山楂
人參 陳皮 半夏 阿膠 細辛 五味
大含化 甘草各七分 加 川芎 寧夏曲 神曲 等
二母寧嗽湯

又 梔 石膏二錢 知母 各一錢半 山楂
黃芩各一錢 二分 瓜蔞仁 赤苓 桑

皮陳皮名一錢枳實七分甘草二分

圓參飲子

肺萎癆瘵人參半夏紫菀阿膠百合天冬款冬花杏仁桑葉各一錢細辛甘草各五分五味子十五粒加姜

蘇子降氣湯

氣嗽橘紅半夏當歸前胡厚朴各二錢炙甘草沉香各五分加姜

星香丸

又南星半夏去白陳皮各三兩香附二兩皂角水浸一伏時晒乾姜汁糊丸

半瓜丸

痰嗽半夏瓜蒌仁各五兩貝母桔梗各二兩

滴油散

又滴入麻油數點調眼三錢蚌壳煅一兩青黛二錢研和淡糞水

澄清飲

痰嗽他藥不效蚌粉南星半夏知母

乾嗽補肺膏

乾嗽各四兩生地二斤杏仁二兩生姜白蜜

搗如泥飯上蒸五七度每于五更挑

三匙

咽下

加味二母丸

又知母貝母全巴霜十粒炒黃色入明礬白芨四味等分姜汁蜜丸含化

肺咳軟喉喘方

卷一

三

瓊玉膏

又

生

地十六斤搗絞取汁

人參細末二十

四兩

白茯苓細末四十八兩

白蜜煉去渣

十斤

一方加天冬麥冬地骨皮各八兩各益

桑皮散

血嗽

甘草一錢半

薄荷一錢半

桔梗

川芎

蘇葉

柴胡

川芎

當歸飲

又

川大黃

蘇木

生地

當歸

赤芍

當歸

當歸

當歸

瓜蔞青黛丸

酒嗽

瓜蔞仁

一兩

青黛三錢

蜜丸

谷化

瓜蔞杏連丸

又

瓜蔞仁

杏仁

黃連

等分

竹瀝姜

蜂姜丸

房

杏仁

神曲

等分

姜汁

竹瀝

加蜜

和

丸噙化

一方無

貝母湯

久嗽

貝母姜製

乾姜

五味子

陳皮

半夏

柴胡

內桂

各五錢

黃芩

二錢半

木香

甘草

各一錢

二分半

共爲

粗末每

五錢

人杏仁

七枚

姜五片煎

加味百花膏

人咳不愈

紫菀

款冬花各一兩

百部

錢

每用末

三錢

姜三片

梅一枚

煎湯下

百部五

馬兜鈴丸

又 馬兜 香仁 半夏各二兩 丹研巴豆
二十粒去皮心油 皂角煎膏和丸雄黃爲衣
每用十丸空心烏梅二个煎湯送下以能利

潤肺除嗽飲

又 款冬花 紫菀 麻黃 陳皮 百脣
半夏 桔梗 桑皮 枳壳 烏梅肉 醬粟

清肺飲

火嗽 前胡 芥子 甘草各五分 五
知母 貝母 加姜三片 五
阿膠 杏仁 薄荷 甘草三分
海青丸

柴胡枳桔湯

又 海蛤粉 杏仁 枳壳 桔梗 柴胡 黃
芩 半夏 知母 石膏 葛根各一錢 甘
草五分 加

滋陰清化丸

又 生地黃 相熟地並酒浸天冬 麥冬各二
兩 相鹽酒炒一兩半 酒白芍 桔梗
山藥 枳子 元參 茯苓各一兩 五味子
七錢 甘草五錢 蜜丸彈子大空心含化下

入陳皮貝母各一兩
如痰嗽太甚加

一服散

天行嗽 大半夏三个 杏仁七个 罂粟壳
二个 乌梅二个 阿膠一錢 生姜十片

治哮方九

紫蘇十葉 茯草一錢

表散 陳皮

半夏

茯苓

甘草

枳壳

紫蘇 桔梗

蒼朮

黃芩

冬加桂枝

黃芩 總治

麻黃

桑皮

黃芩

杏仁 白果

清金丹

食哮 存性

三錢

蘿蔔子

蒸熟爲末

一兩 猪牙皂角燒

水哮方

水哮 爲標

清水煮熟

恣意食之

姜汁糊丸

三味搜

皂莢丸

久哮 仁

皂莢去皮子

炙蜜丸

二錢

明礬 杏

百部 風痰哮

白

菖蒲頭末各

一錢

紫菀 炙甘草

千緝導痰湯

赤苓 風痰哮

半夏

七個炮

切四片

南星 陳皮

石菖蒲

半夏

各二錢

前藥

胆星一錢半

姜五片煎服

並蜜炙 加

參蘇溫肺湯

內外皆寒 味子

人參

紫蘇

木香

肉桂

桑皮

陳皮

半夏

白朮

茯苓

各五

一錢

甘草五分
加姜三片

越婢加半湯

半夏一錢
寒包熱
石膏四錢
麻黃二錢
半夏一錢

定喘湯

除根
甘草一錢
麻黃八分
杏仁一錢半
棗二枚
黃芩半
生

治喘方二十三

六昧丸

總治
澤瀉
地黃
山藥
山萸
丹皮
茯苓

黃連膏

端難坐臥
煎二碗再用水六碗煎一碗再用
水二碗煎半碗共成膏入人乳一
碗童便一碗姜韭拍田螺
汁各一碗薄蜜收貯器中漸漸服

逍遙散

火鬱
當歸
茯苓
白术
白芍
柴胡

桂苓甘木湯

水氣
草二錢
茯苓四錢
桂枝
白术各三錢
甘

金匱腎氣丸

又
芩
附子
風寒
麻黃
不去節
肉桂
牛膝
車前子
三拗湯

三拗湯

炙
等分
加姜取汗
肺
咳嗽哮喘方

六君子湯

勞碌
陳皮

人參 茵苓 白术 甘草 半夏

五味子湯

胃虛
白术

五味子 人參 杏仁 麥冬 陳皮

資生丸

食喘
神曲

人參 白术 茵苓 橘紅 山楂

定喘湯

痰喘
芥窠

白扁豆子 麥芽 白蔻仁 洋瀉 橘梗 滌瀉

神仙住喘湯

分 痰甚

桑皮 蘇葉 杏仁 半夏 枳壳 加蘇葉

子厚朴
火喘
黑丑頭末一錢
木香三分
汗調下十服

生姜
甚者加葶苈

明礬三分 皂角四
共爲末用萊菔

桔梗二陳湯

火喘
枳壳

茵苓 黑山梔 黃芩 黃連 甘草 桔梗

清暑益氣湯

暑喘
陳皮

人參 神曲 黃芪 蒼朮 白术 升麻 洋瀉
葛根 甘草 當歸 青皮 麥冬

滲濕湯

濕喘
橘紅

五味子 蒼朮 白术 甘草 乾姜 茵苓
丁香 加姜棗

四物湯

陰虛

川芎

當歸

白芍

地黃

桔梗湯

肺癰

桔梗

貝母

當歸

瓜萎仁

枳壳

百合
杏仁

紫苑散

肺萎
甘草

紫苑

知母

貝母

人參

桔梗

越婢加半夏湯

肺脹
大棗

麻黃

石膏

生姜

甘草

半夏

小青龍湯

水氣
乾姜

麻黃

桂枝

白芍

細辛

甘草

補中益氣湯

藥後喘
陳皮

升麻

五味子

柴胡

歸身

白朮

生脉散

似火非火
升麻

人参

黃芪

麥冬

五味子

平胃散

小兒
似火非火

蒼朮

厚朴

陳皮

甘草

加姜棗

嵩崖脾腎丸

老人
仁

熟地

山藥

補骨脂

益智

附子

膝車前子

砂仁

丹皮

茯苓

澤瀉

桂

附子

牛

蜜丸

生地

十八斤

搗絞取汁

人參末

一斤半

生地

三斤

白蜜

煉去渣

十斤

右和勻

瓊玉膏

乾咳

生地

十八斤

搗絞取汁

人參末

一斤半

生地

末三斤

白蜜

煉去渣

十斤

右和勻

和勻

人磁缸內以油紙五重厚布一重緊封缸口置
銅鍋內水中懸胎令缸口出水上以柔柴火煮
三晝夜鍋內水減用緩水添之日滿取出再用
蠟紙緊封缸口納井中浸一日夜取出再入舊
湯內煮一日夜以出水氣乃取出先用少許祭
天地神祇然後每取一二匙溫酒調服如不飲
酒白湯下日進二三服如夏熱天置陰涼處或
藏水中或埋地中須于不聞雞犬聲幽淨處不
令婦女喪服人見之製時終始勿犯鐵器服時
忌食葱蒜萊菔醋酸等物

此膏填精補髓調真養性返老還童補百損除
百病萬神俱足五藏充溢髮白還黑齒落更生
行如奔馬日進數服可免飢渴功效不可盡述
一料分五劑可救癱瘓五人一料分十劑可救
勞瘵十人