

05981

西漢書

卷之七  
題簽

新刻太醫院發刻醫家必究杏苑生春目錄

一卷

醫學習業

習醫先用明經

論醫

診候定式

聲色脉診

脉病逆順

論脈

脉有損至

異常生亥脉

在脉

結脉爲病

用藥法象

藥性要旨

用藥宜禁

藥味專精

用藥中病不必畫劑

君臣佐使

制方之法

治法綱要

湯散丸例

異法方宜

標本陰陽

諸陰諸陽

陰海陽海

三陰三陽氣絕

陰陽應象

陰陽虛實

陰陽主病

陰陽生死

陽有餘陰不足

問病求因

論病

主病標本

感病所因

治未病已病

病原診候

病症虛實

辯疑病名

察病輕重

病得其宜

諸夢爲病

藏腑相移

諸痛

關格

人迎氣口說

論本

上古天真

血榮氣衛

男女氣血則一

男女尺脉辯

男女天數

養老

慈幼

無子服藥戒

房中補益

相火

茹淡

夏月伏陰在內

倒倉法

飲食所傷

勞役所傷

內傷治戒

傷寒溫病熱病說

亢則害承乃制

中暑中熱辨

積熱沉寒

煎厥

小便原委

瀉南方補北方

真邪離合

脫營

育釋附卷首

二卷

脫血

汗法

下法

吐法

陽虛陰盛陽盛陰虛

春宣

藥戒

攻擊說

習醫規法

病源症治

臟腑虛實爲病

陽明病

內外傷辯

醇酒宜冷飲

受胎

乳硬

癰疽當分經絡

論診候肺疽肺痿法

論灑疽

論五發疽

論三陰三陽時日所旺

勞極傷症

臨機應變

紀用備論

臟腑配天地

運氣政令

運氣勝復

天符歲會

天符

太乙天符

歲會

同天符

同歲會

三合

歲之所直名曰承歲

藥劑評

病分氣血晝夜衰旺

病熱分治

臟傳生歟

一息

二儀

二陽病

三才

三焦

三部

四氣調神

三因說

四知

四氣所傷

四肢

四損

四失

五臟生病

五臟虛實

五臟脉氣

五臟生成

五臟損益

五臟苦欲補瀉

五臟氣味補瀉

五臟相平

五臟別論

五精所并

五鬱

五臟正病

五邪爲病

五絕治病

五勞

五過

五病所發

五邪所亂

五邪所見

五行相尅

五法

六經氣血多少

六不治

六腑

七情藥性

七衝門

七訟

七表脈狀

八裏脈狀

奇經八脉

八風

八會

九道脈狀

九候

九藏

九鍼

九蟲

九竅

九氣爲病

十變

十法治病

十二經絡

十二經見症

十二原

十二官

十二月人氣所在

十二多

十二經水

十二經脉之終

十二經是動所生之病

十二經絡始終流注

十二經治法

十三陰

十五絡

二十問

臟形正面踪源

臟形背面踪源

十二經絡序

形穴

手太陰肺經形穴

總歌訣二十

十一法

手陽明大腸經形穴

總歌訣有二十法

足陽明胃經形穴

總歌訣四十有五法

足太陰脾經形穴

總歌訣二十有一法

手少陰心經形穴

總歌訣有九法

手太陽小腸經形穴

總歌訣一十有九法

足太陽膀胱經形穴

總歌訣六十有三法

足少陰腎經形穴

總歌訣二十有七法

手厥陰心包經形穴

總歌訣有九法

手少陽三焦經形穴

總歌訣二十有三法

足少陽膽經形穴

總歌訣四十有三法

足厥陰肝經形穴

總歌訣二十有三法

任脈形穴

總歌訣二十有四法

督脈形穴

總歌訣二十有七法

三卷

約方之法

藥品製度

用藥增損

六經引藥

瀉六經火藥

藥劑準則

煎熬服法

風

中氣

中惡

寒

暑

濕

疫癆

大頭天行瘟疫病

溫病

熱病

外感

內傷

四卷

上 下

瘧症

痢證

霍亂

泄瀉

嘔吐

噎膈

嘈雜吞酸睡酸

脾胃

諸氣

六慳

痰飲

積

五卷

上 下

咳嗽

喘證

虛勞

諸血

汗證

虛煩

消渴

諸熱

痺瘡

瘡瘻

咳逆

瘡瘻

面部

頭痛

六卷

上 下

眩暉

眼目

眼眶眉骨痛

鼻

耳

口舌

牙齒

咽喉

水腫

鼓脹

積聚

疝

心胃腹痛

肩背臂痛

腰脇痛

健忘怔忡

小兒科

調治癆疚

五臟病治

吐

瀉

驚

疳

內外傷感

斑疹痘瘡

夜啼

解顛

變蒸

小兒雜症

七卷

上下

狂癩驚癇

瘡瘍

脚氣

瘻風

白虎歷節

瘻瘍

厥瘡

諸淋附小便不通

本草生卷  
大便閉結

腸澼下血

赤白濁

夢遺

白淫

遺尿不禁

脫肛

墜傷金瘡

中諸毒

脫陽

尸厥

雜症

邪祟

外科

諸瘡

八卷

上 下

疔腫

瘰疬

附骨疽

陰瘡

楊梅瘡

時毒

癩風

痔疾

漏瘡

破傷風

陰部

婦女科

總說

月經不調

月經不通

經漏崩中

帶下

諸積

胎前

產後

雜用奇法

目錄終

新刻太醫院史

列醫學家必究杏苑生春卷之四

太醫院史

紹庄

徐文元

發刻

醫正

活溪

芮

經彙集

秣陵後學

文麓

紀夢德

次編

太醫院醫官雲林

龔廷賢

校正

金陵書坊

蔣氏

石渠閣

梓

○瘡

夫瘡得之夏傷於暑熱氣盛藏於皮膚之內腸胃之外此乃榮氣之所含也令人汗空疎腠理開因得秋之氣或遇風寒客於皮膚與衛氣并居此氣得陽而外出得陰而內薄内外相薄以一日一作其含已淺也若內薄於陰陽氣獨發陰邪內著陰與陽

爭而不得出。是以間日一作其含深也。經曰夏暑汗不出。秋成風瘡爲正當。暑汗時得之涼臺水閣陰木冷地。他人揮扇泉水澡浴。不得喘泄。鬱而成瘻。其初感也。胃氣尚強。全不自覺。又復恣意飲食。過於勞動。竭力房事。胃氣大傷。纏綿日久。邪入陰分。故三日一作名曰瘧瘬。瘧瘬老瘬也。深根固蒂。宜其難愈。作於子午卯酉日少陰瘬也。作於寅申巳亥日厥陰瘬也。作於辰戌丑未日太陰瘬也。殊不知瘬得於感風感暑。皆外邪也。當以汗解所感。既深決非一二升汗。其疾可除。然而汗解。胃氣少回。宜守禁忌。倘有觸冒。舊邪未去。新邪又感。展轉沉滯。變成劳瘵。有之汗鮮。因宜。但恐過多。亦致體虛。須用參芪等。補助衛氣。況此疾雖感於外。必得風寒而作。若先傷於寒。而後傷風。必先寒而後熱。或寒多熱少。名曰寒瘬。若先傷於風。而後傷寒。必先熱。

而後寒或多熱少名曰溫瘡若陰氣先絕陽氣獨發少氣煩  
冤熱甚而唯不寒者名曰癰瘡病在陽脉必弦數而多熱病在  
陰脉必弦遲而多寒又有內傷七情飢飽勞役咸月山嵒瘴氣  
致令脾胃不和觸動外邪亦成此疾法當辨其外感內傷隨證  
施治病初切不可妄用截藥若截早遏住邪氣變異不得卽愈  
若熱多宜小柴胡湯咳嗽宜參蘇飲夾食宜清脾湯寒多者宜  
養胃湯勞役所傷以補中益氣湯發散不退然後以常山飲截  
之截而不愈致元氣衰弱者惟宜六君子湯之類養脾祛痰使  
脾氣一虛自然平復瘡久不愈脇下痞滿腹中結塊名曰瘡毋  
仍有寒熱時作不可以僻積治之

○癰瘡

要畧云癰脈自弦弦數多熱弦遲多寒弦而小緊者下之瘡○

弦遲者宜溫。弦緊者可發汗。針灸浮大者宜吐之。○脉經曰。瘧  
脉有弦。○微則爲虛。代散者久。

○治瘧法則

瘧之爲病因狀極多。是以陳無擇謂外感四時。內動七情。及飲食飽飢。房事勞役。皆能致之。其內經謂夏傷于暑。秋必病瘧者。此乃因時而感耳。又不可專執此語。當要分別。内外二因而療。如外所因有寒有瘧。不可不辨。

如溫熱者。其狀寒熱身重。骨節煩痛。脹滿自汗善嘔。乃因汗出復浴。及冒雨濕。濕氣舍于皮膚所致。

如壯瘧者。其狀寒多不熱。慄怛慄懾。振慄。病以時作。此乃多感陰濕。以坎陽不盛。陰大抵外。因瘧證除。瘧瘧獨熱。溫瘧先熱後寒。壯瘧無熱。其餘諸瘧。皆先寒後熱。其內所因。症由

喜怒憂思恐五者之分不可不察。

如蓄怒傷肝。氣鬱所致。名曰肝瘡。

如思傷脾。氣鬱涎結。名曰脾瘡。

如憂傷肺。肺氣凝痰。名曰肺瘡。

如失志傷腎。精濃成痰。名曰腎瘡。

故此五種瘡症。皆由氣血不和。鬱成痰飲所致。

又有疫瘡。其症一歲之間長。初相似。又有鬼瘡。其症夢寐不祥。

多生恐怖。又有瘧瘡。其症乍寒乍熱。乍無乍有。又有勞瘡。

其症稍勞即不經年不瘡。結成癥癖在腸腸間。名曰老瘡。

又名瘡母也。已上諸症當分經各治。

如在太陽症。謂之寒瘡。法當汗之。

如在陽明經。謂之熱瘡。法當下之。

如在少陽經。謂之風瘡。法當和之。

乃三陽受病。謂之暴瘡。其發多在夏至後處暑前。此乃傷之淺者近而暑也。

如在陰分。不分三經。但以太陰爲主。總謂濕瘡。其發多在處暑後冬至前。此乃傷之深者遠而重也。

如暑瘡。宜用人參白虎湯之類。

如瘧瘬。宜用二陳湯加常山檳榔草葉柴胡黃芩。

凡瘡不能食者。必因飲食上得之。當從食治。

凡瘡若原有汗。要無汗。宜養正氣。主原無汗。要有汗。以散邪爲主。

凡瘡症。大渴大熱者。用小柴胡去少萸。加知母黃連黃柏梔子。天花粉。或用生地。麥門冬。天化粉。牛膝。知母。炒黃連。乾薑。

生甘草煎服。

發寒熱甚，頭痛如破，渴而飲水多汗，宜以人參、黃芪、芩連、梔子、川芎、蒼朮、白朮之類。如久瘧不愈者，宜以二陳湯加川芎、蒼朮、柴胡、葛根、白朮，此乃一補一發之法也。

如久瘧不得汗，亦宜二陳湯加蒼朮，佐以檳榔。

如痰癆胸滿，熱多寒少，大便燥實者，宜大柴胡湯利之。

凡瘧母，宜以蠻甲爲君，三稜、莪朮、香附、海粉、青皮、桃仁、紅花、神麩、姜芽之類，加減爲丸，用醋湯送下。其症係邪居陰分，宜用撫芎川歸、紅花、蒼朮、白芷、黃柏、甘草煎湯露一宿，次早溫服之。

凡瘧二日一發，名曰瘧瘧，乃陰經受病，蓋瘧得於暑，當以汗解。

或取風涼冷濕。不得踰泄。鬱而成癰。又得嗜慾縱飲。及夏經劫峻之藥。胃氣大傷。故此難愈。必先與人參白朮陳皮。芍藥等劑。佐以本經引使藥。若得汗。已體氣必虛。又須大補。候汗通身下過。委中方見佳兆。

凡小兒癰疾。有痞塊。用生地芍藥各錢

川芎一錢。黃芩酒炒

半夏各一分。甘草三分。加生葛三片。

煎湯調醋。久服甲末効。

丹谿征癰活法

癰症有六經辨。其發癰有早裏不同。連日間日之異。且患者又有虛實不井。最宜詳变別各類而療。

如惡寒發熱。腰背頭項俱漏。此乃太陽經之癰。宜二陳湯加麻黃。羌活。藁本。防風之類。

如先寒後熱。或寒少熱多。或熱不寒。咽痛臭燥。此陽明經癰。宜

二陳加乾葛升麻白芷之類

如先熱後寒或寒熱間作脇痛口苦或嘔吐惡心此少陽經瘧

宜二陳湯中多加柴胡黃芩人參青皮

如作於子午卯酉日者此少陰瘧宜二陳加歸芍黃柏黃連柴

胡之類

如作於辰戌丑未日者乃太陰瘧宜以二陳湯加蒼术柴胡芍

藥之類

如作寅申巳亥日者乃厥陰瘧宜以二陳湯加桂枝附子乾薑

之類

大抵瘧在三陽者則宜汗宜吐如麻黃葛根柴胡常山草葉烏

梅之類

如瘧在三陰者宜下宜溫宜和如大柴胡湯加薑桂及附子理

中湯之類選而加減用之

癰病古名瘡瘍其症不一故素問有五臟癰六腑瘍之分。

凡瘍初發一二次其邪正熾不可據截正經所謂避其來銳是

也不問寒熱多少宜用青皮飲或草菓飲或二陳加草菓

半錢或平胃散加草菓柴胡各五分或養胃湯加川芎草

菓各五分熱少者取微汗寒多者宜快脾湯服後寒仍多

者用養胃湯加桂附各五分獨寒者宜休此如仍不動者

用七味湯

如熱多者宜驅瘍飲或參蘇飲每服加草菓五分及香蘇飲如

前加草菓大熱不除宜小柴胡湯甚者以五苓散加辰砂

少許如獨熱無寒亦與小柴胡如熱雖劇不甚渴者以小

柴胡桂枝湯候可散則截之

如久瘧者宜西獸飲間服山甲湯

但瘧疾寒多熱少或少食易飽惡心痰吐以人參養胃之劑治

之方見三  
卷內

國中氣虧敗津液鬱聚成痰阻塞經隧以致榮衛不清而成瘧或脾臟氣虛喜怒不節致陰陽相勝結聚延飲與衛氣相搏亦發爲瘧

法當補中氣爲本。踈鬱豁痰爲標是以用人參白朮茯苓甘草大棗諸甘溫以補中益氣橘紅生薑草蔻仁等諸辛溫之劑以踈豁。助烏梅半夏以豁痰。

方三因四獸飲

人參三錢 白朮二錢 茯苓一錢 甘草炙五分

大棗二枚 橘紅八分 生薑三片 草蔻七分

烏梅一枚 半夏八分

右㕮咀水二壘煎一鍾露一宿熟服

病瘧症熱而不寒。或熱多寒少。口苦咽乾。大小便澀。脈來弦數此乃肝邪乘脾。

右法當益肝溫脾。是以用柴胡。青皮抑肝無助。厚朴陳滯白朮。茯苓草菓和脾。半夏豁痰。黃芩清熱。一方有炙甘草七分

方清脾飲

柴胡一錢

青皮八分

厚朴七分

白朮苓八分

白朮一錢

草菓一錢

半夏八分

黃芩一錢

右剉一劑水二鍾煎一鍾食遠服

一切瘧疾已服調理藥餌不止者。無問寒熱多少。以七寶飲或常山飲截之。

方錢瘡常山散

知母一錢

草藥

常山各八分

甘草五分

烏梅三分 穿山甲一錢

右㕮咀用酒一錘半煎七分露一宿至清晨冷服服後如吐

則順之

益但熱無寒發渴者以柴胡桔梗根湯主之

方見三卷內

病寒多熱少者以柴胡桂枝湯主之

方見三卷內

病勞役所傷飲食失節變成瘡疾虛弱自汗以補中益氣湯主之

方見三卷內

病瘡疾自汗日甚不能止已此必表虛不能衛護因致大泄以

人參寶衛湯主之方

見三卷內

病瘡母之症由鬱積而成

(治)法當消宿積踈鬱滯以消宿積豁痰化食行瘀血以消癰瘕  
兼清蒸熱

方瘡母丸

青皮一兩

香附二兩

神翹一兩

麥芽一兩五錢

三棱七錢

莪朮八錢

海粉

紅花各一兩

桃仁尖八

鱉甲 腹灸一兩

右件修合爲末以糊丸如梧桐子大每服白湯下五七十丸  
(治)陽明瘡此方用白芷以止頭疼知母石膏以清熱  
方白芷石膏三拗湯

白芷三錢

知母五錢

石膏五錢

右㕮咀用水煎八分溫服

方治諸瘡七味湯

用附子泡，又以鹽水浸。再泡如此七次，去皮臍，或用沸湯泡陳壁上爲稀糊如前，浸泡七次，分作二服，每服水一鐘，薑七片，東七枚，煎七分，臨發日早溫服。

五草菓飲 治諸瘡神効 用草菓川芎柴胡白芷良薑灸甘草青皮陳皮各等分，水煎臨發日三服。

癩 三日一發，名曰癩瘡，以四神散主之。兼治虛瘡，若痰嗽加半夏一錢，生薑五片。

#### 五、四神散

常山

二錢五分，虛人量爲

白茯苓

檳榔

各一錢五分

甘草

右㕮咀，隔夜先用好酒一小盞，拌一宿，臨發日早入水煎五

更時服。

病瘧疾久不愈脇下痞滿腹中結塊名曰瘧母以鰲甲飲子主之方見四卷內

方鰲甲飲子

鰲甲 草菓仁 黃芪

白术 白芍藥

厚朴 檳榔 橘紅

川芎各八分甘草炙四分

生薑七片 李子一枚 烏梅半個

右㕮咀用水煎熟食遠溫服

邪入肺經咳嗽有痰寒熱如瘡以參蘇飲主之

方見三卷內

病飲食所傷停滯心胸不得消化變成瘧疾以枳確二陳湯加

草菓主之

方見三卷內

病暑瘧三陽合病經云邪之所湊其氣必虛故用人參甘草以補正氣爲本石膏知母柴胡黃芩等以清熱爲標半夏豁

痰桂和柴衛

方桂枝黃芩湯

人參

二錢

甘草

炙五分

石膏

一錢五分

知母

八分

黃芩

一錢

柴胡

一錢五分

半夏

一錢

桂枝

五分

右㕮咀水二鍾煎一鍾溫服。

病處暑前發頭項痛脉浮無汗惡風此乃風寒客於太陽所致也

治法當疎散風寒經云風寒外襲治以辛溫汗之則愈故用麻黃辛溫發表羌活防風等散風佐甘草緩中和藥。

麻黃

二錢

羌活

錢半

防風

一錢

甘草

炙五分

右㕮咀半煎一鍾熱服取汗。

若有汗惡寒去麻黃加桂枝名桂枝羌活湯。

治夏傷於暑成瘧。經云邪之所湊。其氣必虛。法當補正氣爲本。  
清邪熱爲標。是以用人參。梗米。甘草等諸甘溫以補正氣。  
知母。石膏等辛寒。以清熱佐桂枝和榮衛。

方金匱人參白虎桂枝湯

人參

二錢

梗米

一撮

甘草

炙六分

知母

一錢

石膏

錢半

桂枝

七分

右㕮咀水鍾半煎七分溫服

治食積瘧。法當導積滯。故用三稜。莪术。阿魏以消積。胡椒溫胃。  
散寒。青皮。踈鬱滯。

方三因紅丸子

三棱

柴胡

知母

各一錢

枳殼

八分

常山

一錢

貝母

一錢

右每分爲末。先將阿魏用陳米粉以醋攪糊。丸如梧桐子。以硃砂爲衣。每服一錢。送下。五七十九。

此方用草菓溫脾胃。柴胡知母清熱。檳榔破滯氣。常山貝母以豁痰。

左 草菓一錢 柴胡一錢 知母一錢 檳榔八分

常山一錢 貝母一錢

右咬咀水酒各七分。煎一錘露一宿。臨發時預服。

病瘡發寒熱。頭痛如破。渴飲冰水。外多自汗。此乃中氣不敗。火熱上炎所致也。

治法當補中氣爲本。清火熱爲標。是以用人參白朮補中氣。黃芪實腠理。以自汗。川芎陳鬱滯。止頭疼。蒼朮半夏以豁痰。芩連梔子以清熱。佐天花粉。生津止渴。

方治瘡方

人參二錢

白朮半錢

黃芪二錢

川芎七分

蒼朮一錢

半夏八分

黃芩一錢

黃連七分

山梔子八分

天花粉二錢

右㕮咀水二鍾煎一鍾溫服。

病此症用人參補正氣常山貝母烏梅等理痰草菓溫胃白芷

檳榔破滯知母柴胡清熱

方六和湯

人參一錢

常山二錢

貝母一錢

烏梅一枚

草菓一錢

白芷八分

檳榔七分

柴胡一錢

知母一錢

右咀薑三片東二梗水二鍾煎一鍾溫服

夫痢古人謂之滯下是也得病之由有從外感六氣腸胃鬱結遂成此症當隨其溫涼寒熱之勢以調之有臟氣發動干犯而得者須察其何臟相乘以平治之有因酒食失節而得者則審其何物所傷以消尅之以其受病之初腸胃怫鬱脾胃枯裏急後重元氣壯實必須推湯使積滯已去正氣易復此通因通用也病久氣脫陽氣下陷腸胃虛滑不禁治當溫瀉兼用升發此下者舉之也蓋溲便膿血血之滯也則行血自愈奔迫後重氣之實也則調氣自除赤者乃自小腸來白者乃是大腸來皆濕熱爲本赤白帶濁同法白者鴟氣赤者鴟血赤自相兼則鴟氣血赤黑相兼乃鴟湿熱青綠雜色屬風火湿下如凍膠或如臭涕或下青色乃鴟風寒下如豆汁此鴟湿也暑毒中深絕下

鮮血疫氣傷胃下如煤色甚至舌黑身熱又有嘔吐全不准食謂之禁口痢此乃痢毒衝心胃口畜熱也癧久大孔作痛此熱流於下也有氣行血和積已去少但虛坐努力此亡血也肚熱繩痛此有積也去如蟹渤海此有氣也夫胃爲水穀之海常熱四肢無物不受故五色相雜當先通利此迎而奪之之義病久氣虛則不可行治法熱痢症雖可下不許用巴豆之藥爲其熱暴也赤血者清之冷白者溫之風者散之濕者利之赤白相兼溫涼調之煤色純血解其熱毒痢虛肛脫升舉其氣痢久不愈動經年月名曰休息痢須節飲食調養元氣充實方得痊愈又有瘻痢交作者先理脾胃令元氣平和飲食美進而服瘻痢之藥大凡痢疾有胃氣爲本若胃失生長故惡物而不欲食但得思食無分何物與之遂獲愈者此胃勝之故也下如魚腦半死半

生下如塵褐色至漏水鮮血赤豆汁者皆以身寒脉小微弱則生身熱脉大洪數則外臨症再當審焉

○ 脘症備詳

經曰：腸癖下膿血，脉沉小，留連者生洪大數，身熱者死。又云：腸癖筋挛，脉細小，安靜者生浮大而緊者死。

凡痢症盡由湿熱甚於腸胃，怫鬱而成，治法必以苦寒之劑，燥

濕勝熱爲主，如黃連之類少佐辛溫之劑升鬱行滯，如木香、枳榔之類，再當分其新久施治。

若初起一二日前後必須用仲景法承氣湯之類，滌蕩脾胃中積垢，而後用參木之類補之。若久痢滑脫不禁，先以固腸丸或粟殼訶子之類止瀉之，仍用溫補藥中兼以升舉之劑可也。

如凡一方一家皆病痢乃時疫痢法當推其歲運而療。

如下痢而嘔者其因有五曰腎虛曰火逆曰毒氣上攻曰陰虛

火炎必在詳因而治。

凡下痢腹痛皆由內氣鬱結不通所致理宜行氣散鬱爲先亦有挾虛挾火而痛者不可不求其所原。

凡下痢大孔痛者乃因火熱之氣流於下也。

凡痢之爲病乃外感挾內傷之候有氣虛有溫熱有食積有風邪感受不一法當分治大要在乎散風邪行滯氣開胃脘清熱勝溫而已不可遽用肉蔻訶子白朮等補助其邪亦不可用龍骨粟殼等閉滯腸胃室邪於內不得外泄變症百出爲禍甚大學者不可執一必須分因而治之。

如表邪盛心惡寒發熱身手俱痛宜小柴胡去參加二朮川芎

白芍陳皮等微汗以散之。

如裡邪盛必後重窘迫腹痛下積宜仲景承氣湯或河間酒煎  
大黃之類推蕩之。

如餘邪未盡更用芍藥湯香連丸之類以散其邪

如積汚已盡而更衣不止者此乃大腸不行收斂故也宜以固  
腸丸參香散之類以止澁之。

知或腹痛後重小水短少不利宜和中疎氣炒枳殼厚朴芍

藥陳皮甘草石膏煎湯服

如或下墜異常積中有紫黑血此乃血症法當用陳皮桃仁滑

石等以行之如口渴燥辣者是挾熱加苦芩如不口渴身

不熱喜熱手熨盪者是挾寒加乾薑當分別寒熱虛實寒

則溫之熱則清之虛陷則提補之汚露則行滌之

如或力倦自覺氣少惡食此扶虛症宜以白朮當歸陳皮甚者再加人參使虛回而痢自止

如或氣血和積止但虛坐如潰者此乃無血症宜倍用當歸身爲君是以用白朮藥生地黃桃仁陳皮之類使血生自然安矣

久痢後精粕未實或因食稍多或因飢甚方食以致腹中作痛者當以陳皮白朮各半煎湯和之自安矣

久久痢不已體氣虛弱滑脫不止者宜以诃子肉蔻白芍龍骨牡蠣等器而用之仍必以陳皮爲佐不然忒滯又能作痛甚者灸天樞氣海穴

久痢腹痛宜以白朮爲君當歸白朮爲臣惡寒痛者加肉桂惡熱痛者加黃柏達者更參以葛根時令則藥萬舉萬全無

有不愈者矣。

○治痢血方法

古曹宮公痢血百餘日國醫無能療者陳應之取鹽水梅條核研一枚合臘茶加醋湯沃服之一啜而瘥大丞相莊肅梁公亦痢血應之曰此挾水穀當用三物散亦數服而愈三物散用胡蘿蔔烏梅肉杜心土等分爲末臘茶清調下食前飲服

大司寇劉公年近稀古患痢腹痛諸醫不如胗之六脉微數此肥甘大過內有積熱當服酒蒸大黃一兩清利之公曰吾衰老恐不勝惟茲補平和之劑可也再四寬釋公意始從遂服之逾日而愈

又有一人患痢赤白晝夜無度遍身瘡痒心中煩躁胗之六脉

大數人迎偏盛此風邪熱毒也以人參敗毒散加防風荆芥黃芩人參三服即愈又胗六脉仍崩大數予曰數則煩心大則病進將來必有痰喘之患不起後逾月復舉果如斯言

又有一人病後兩足浮腫胸膈脹滿小便短少用分利之劑過身浮腫無氣喘書云兩足浮腫脾氣下陷也胸膈脹滿脾虛作痞也小便短少肺不能生腎也身腫氣喘脾不能生肺也用補中益氣之劑加附子而愈半載後因飲食勞倦兩目浮腫小便短少仍服前藥頓愈又見病之根源脉之存亡藥之甘苦可不審哉

久後重乃積血氣壅下之故蒸升無清宜木香枳榔丸之類不愈用秦艽皂角根大黃當歸桃仁黃連枳殼或煎湯剂或

作丸若大腸氣盛惟宜作丸

凡腹痛乃肺金之邪鬱於大腸如實者以劉先師丸下之虛則以苦梗之劑開之然後用利藥氣用氣藥血用血藥有熱用芩芍有寒用桂桂

凡血痢久不愈者乃屬陰虛宜以四物湯爲主加以涼血和血之劑

凡欲升散者宜胃苓湯或防風芍藥湯神木散芩芍防風湯敗毒散之類皆可選用

凡欲攻裡因水濕者宜導水丸並薺宜承氣湯和中丸有痰積宜聖餅子脾積丸如冷積宜局方蘇感丸如濕熱甚者宜

玄明玄青膏

凡下痢久發乃下多亡陰屬陰虛宜以寒涼補陰藥爲君佐以

升舉之劑

凡溫熱下利。小便短澁。煩渴。除食脈洪大而緩。腹痛後重。宜行  
滯清熱。如桂苓甘露飲送下。保和丸之類。若濕多熱少。脾  
胃不和。食少腹痛。後重。夜多下痢。宜胃苓湯送下。保和丸  
三十粒。若怯弱之人。下痢頻併腹痛。脉細弱。或微汗時出。  
宜黃芪建中湯送下。保和丸。

若脾胃不和。食少腹脹。滿痛後重。脈弦緊。宜平胃散加芩。木芍  
桂乾姜煎湯送下。保和丸。

是小兒痢疾。用大黃甘草煎服。如赤痢。加紅花桃仁。白痢  
加滑石末。

凡下痢純血。如墨腐色者。或如屋漏水者。或大孔如竹筒不飲  
者。或唇如硃抹者。皆久不治。或如魚腦者。或身熱。脈大俱

半死半生難治若身涼脉細者主生

癰

白痴下如魚腦或如凍膠以除濕湯加木香治之

方見三  
卷內

風

入腸胃下痢青綠雜色以神木湯主之

因

神木湯

蒼朮

一錢  
五分

藁本

川芎

羌活

各一錢

甘草

細辛

各五  
分

生薑

三片

右咀片水二錘煎一錘食前服

感暑下痢鮮血以黃連香薷散主之

方見三  
卷內

治

下痢腹脹血裏急後重此乃濕熱壅鬱經云苦可去濕寒可勝

熟人云辛以散之故用黃連之苦寒勝濕熱爲君木香之

苦辛疎滌散鬱爲臣

因

香連丸

黃連

序二十兩以呂大藥更十兩  
共炒褐色去茶葉不用

木香

四兩

右共爲細末。以醋糊丸如梧桐子大。每空心或食前米湯下。

五十丸。一本加石蓮肉。石菖蒲。治禁口痢極妙。

**病** 濕熱壅鬱。氣血不得宣通。下劑。膿血。

**治** 宜清熱行滯活血。是以用芩連之苦寒。以清濕熱。木香檳榔之辛溫以行滯氣。白芍歸尾活血養血。大黃下濕熱之鬱。積桂心通和榮衛。甘草緩中和藥。

**方** 芍藥湯

黃連

一錢

黃芩

一錢

木香

六分

檳榔

六分

白芍藥

八分

歸尾

二錢

大黃

一錢

桂心

五分

甘草

生五分

右咀片。水二鉢。煎一鉢。食前服。

○如病瘧疾追其倍大黃生研一錢滑石加枳實一錢職身  
血加青柏地榆

下痢赤白大便欲去不去而攻前急以木香導氣湯主之○或  
用導滯香連丸下之

方木香導氣湯

木香六分 厚朴 檳榔各一 甘草五分枳殼二分  
大黃看人虛實  
生研用 薑半六分 黃連四分  
治氣食加青皮五分 檗皮六分 白茯苓八分

右㕮咀用水二錠煎一錠空心服

方導滯香連丸

木香生 黃連生 白朮 姜 茯苓各二錢八 巴豆十  
粒研細去

右件共六味細末。已晝暮和用茶餅糊爲丸，如芥子大。大人壯者每服十三丸。心白湯服。虛弱人止可七丸。八九小兒以長幼虛實量減與服。忌行積滯，不許過度。  
久病不止滑脫不固。四肢倦急。精神短少。飲食不消。此乃中氣下陷脾員虛敗所致耶。

治法當補中益氣。溫養脾胃。故用人參。白朮。甘草。半夏。黃芩。白朮。溫脾和胃。陳皮。木香。行滯氣。地榆涼下焦。之血。澤鴻利小便。以滋潤升麻。升提清氣上騰。佐薑。糞以固滑脫。當歸分理氣血。各歸其所。

五參太飲

人參三錢

黃芩二錢

白朮一錢

甘草錢五分

白朮

一分陳皮七分

木香一錢

地榆一錢

汗麻一錢

粟殼八分

當歸全用一錢

仙仁七分

澤鴟八分

右咀小煎溫服

下痢熱毒衝心嘔而不食名曰禁口痢此症胃口有熱以人參三分黃連薑炒一分煎湯頻呷但吐再飲以止為度參連飲不可用溫藥但得此湯一兩呷下咽可救

方倉廩湯

人參一錢

白茯苓一錢

五分

川芎

鬼活

獨活

柴胡

前胡各八分

甘草各八分

桔梗八分

枳殼八分

生薑五片

蜜子二枚

二枚

陳倉老米一錢

右㕮咀水二鍾煎一鍾不拘時服。

治一切濕熱痢疾法當清理溫熱也經云苦可以勝熱是以用白頭翁黃連苦柏陳皮等諸苦寒之劑以勝濕清熱

卷一百一十一

白頭翁湯

白頭翁二兩

黃連三兩

黃柏二兩

陳皮二兩

皮咀水一斗煮五升去渣每服一升

病下利赤白或如膿血膠脣脛腹疼痛或酒毒便血以養陰湯  
主之但見血加黃連半錢

方養陰湯

粟殼去黃密炒一錢五分

人參五分

當歸

河子去核八分

白芍藥一錢

白朮九分

肉桂熱則去之三分

木香四分

甘草炙一錢

肉豆蔻七分

○右咀水煎食前服

治瀉痢腹痛身熱用黃芩清熱白芍益陰以止腹痛甘草緩中

和藥

方苦寒方藥湯

黃芩

五錢

白芍

五錢

甘草

五錢

右咬咀用水煎熟溫服

病風邪乘虛客於腸胃水穀不化注下腹疼及湿毒下如豆泣或丁菸血以胃風湯主之薰治氣血虛利後重加大木香楂榔熱赤或血以朱萸和炒黃連去茱入連煎服

五胃風湯

人參

白朮

白茯苓

川芎

當歸

白芍藥

名一錢五分

官桂

五分

粟米一撮

右咀用水煎熟空心溫服

病感暑下痢鮮血以黃連香薷散主之方見三卷內

治一切痢用黃連清溫熟爲主下多不無亡陰故加當歸益陰

血爲臣

分黃連湯

黃連 五錢 當歸 三錢

右咬咀水煎熟溫服。

病下痢滑泄不禁，日夜無度。以養臟湯去木香，加升麻、龍骨主之間，送豆蔻固腸丸。

方 養臟湯

粟殼（去蒂蜜炒）一人參各一錢五分 當歸

調子（去鬚）

白芍藥

白朮各一錢

當歸

調子

木香

甘草炙各四分

肉桂（熟則去之）七分

右咬咀用水煎熟，食前服。

方 豆蔻固腸丸

木香 赤石脂 乾薑 硝砂仁 厚朴

肉荳蔻 各等分

右件依法修合熟米麪糊爲丸如梧桐子大每服六十丸米飲空心送下。

病下痢膿血以三物桃花湯主之 方見三卷內  
病久滑瀉不止此乃大腸不固

治法當收斂大腸爲主經云酸以收之澀以止之是以用樗根皮之酸澀收斂大腸以止滑脫

方 固腸丸

樗根白皮

不拘多少

右爲末以糊爲丸如梧桐子大每空心以陳倉米飲下五七十丸或以炒芍藥炒黃芩炒白朮蜜丸甘草煎湯送下丸妙

病臟氣虛怯下痢赤白日夜滑泄無度以參香散主之。

方參香散

粟殼一錢五分

白薑荳炒六分

人參一錢五分

木香五分

肉荳蔻六分

茯苓

陳皮名一錢

右㕮咀水煎熟食前溫服。

病下痢紅白前攻後急虛人不宜下者以八味芍藥湯主之

見方

內三卷

病久痢不禁乃虛脫之故也

治宜補中健脾爲主故以諸甘溫補中健脾諸酸澀以止滑脫

燥濕導滯之劑

方和中飲

甘草炙五分

白朮三錢

茯苓一錢

草藥一錢

砂糖

芍藥各一錢  
烏梅二枚  
栗子七分

蒼朮一錢  
橘紅五分

右㕮咀用薑二片枣二枚水煎服

霍感暑下痢鮮血以黃連香薷散主之

方見三卷內

病休息痢久而不愈此乃大腸不固所致也

治法當收斂大腸經云酸以收之澀以止之故酸澀固腸以止

滑脫以清溫熱

四 三根湯

五倍根  
臭樗木根

蒼耳草根各三錢

右件加生薑三片東二枚大黑豆三十九粒水煎熟食前溫

服

瘧下痢身熱舌黑或下黑色取去瘀血以犀角人參湯主之

方

病痢後涉水履霜以致兩足痛腫脹腫大不能行步名鶴膝  
風此因久痢氣血兩虛風濕乘虛內襲所致也

治法當補益氣血爲主經云養正而邪自除是也故以補氣補  
血驅風散濕行經絡且散風寒壯筋骨以健行步

方二防飲

人參

五錢

黃芪三錢

白朮二錢

甘草一錢

川芎五錢

川芎

七分

熟地黃二錢

五分

白芍八分

防風一錢

防紀

八分

草薢一錢

羌活一錢

附子六分

牛膝八分

杜仲

錢

生薑二片

東子三枚

右㕮咀用水煎熱溫服

下痢腹血相雜裏急窘痛日夜無度以安胃散主之有瀉血  
如注以四物湯加參术地榆炒黃連

方見一卷內

安胃散

茯苓

白朮 車前子各一錢 五味子五分

烏梅 枣栗殼一錢 五分

右㕮咀用水煎熟食前溫服

久痢大腸滑脫肛門下墜日夜十數次登廁用鯛一個或青魚亦可用生薑米粉作羹入砂糖一小塊食之良効蓋此症乃脾土虛敗肺与大腸俱失其源乃母能令子虛是以大腸不行收斂所致蓋鯛乃介魚屬金而有土其性溫能補金土二臟况久痢不无過服苦寒之劑是以加生薑之辛溫以和苦寒佐鯛魚補大腸之表裏用砂糖之甘溫助鯛魚以補脾胃收化令行其症自然安矣故曰鯛糖湯。下痢身熱頭疼以倉廩湯主之兼治將瘧手足疼痛。

方

倉廩湯

人參

五分川芎

羌活

獨活

柴胡

前胡

甘草

桔梗

枳殼

各八分

生薑

五分

東子

一枚

陳倉老米

一撮

右咬咀用水煎熟不拘時服。

病一切濕熱惡痢休息不止。

治法當清溫勝熱經云苦可以燥濕寒可以勝熱是以清溫熱爲君下痢不無傷血故救陰血爲臣也。

方

芍藥柏皮丸

黃柏二兩

黃連三兩

當歸一兩五錢

白芍二兩

右件共爲末以水丸如小豆大每服空心薑湯下五七十丸爲愈。

氣純下血痢以四物湯加黃連白朮甘草血加桃仁紅花通加地榆主之

方見三卷內

病如大便閉或裏急後重數至圊而不能便或少白膿或少有血慎勿利之舉其陽則陰氣自降矣以升陽防風湯主之

方見二  
卷內

病下焦積冷陽氣虛脫滑利不禁是也

治法當補中散寒爲本經云酸以收之澁以止之故以收熱止脫凡下多則傷血必須行滯氣濕厚腸胃而止痢也

方嚴氏當歸丸

白朮二兩炙草七錢乾薑五錢附子一枚烏梅一兩去核  
蛤粉一兩川歸二兩白芍一兩阿膠一兩厚朴七錢薑製

右爲末醋糊丸每食前米泔水下三五十丸

病熱毒入胃下痢膿血以黃連阿膠丸土之

方 黃連阿膠丸

黃連 炒二兩

山梔仁 五錢

阿膠

黃蘆 炒各一兩

右件依法修合醋煮麪糊爲丸如梧桐子大每服三四十丸。

白湯食前送下

病休息痢經久不已以四君子湯加陳皮木香煎下駐車丸。

方 四君子湯

人參 三錢

白朮 二錢

白茯苓 一錢五分

甘草 少許

右㕮咀水煎熟食前溫服

方 駐車丸

黃連 二兩

當歸 一兩五錢

乾薑 炮一兩

右件共爲細末用阿膠四兩切炒成珠爲末用好米醋四合。

敷成膏爲丸如梧桐子大每服五十丸食前米湯送下  
痘利疾未愈癰症又作以六和湯主之蒸治暑毒下痢方見卷三  
瘧瘧疾未止因生冷不節飲食傷胃變成下痢以四獸飲主之

五 四獸飲

人參

白朮

白茯苓

半夏

橘紅

名一錢  
五分

草藥

甘草

炙各八分

生薑

五片  
烏梅一枚

右用鹽少許醃少時以厚紙包裹水濕透煨乾香與前空心  
服之。

一切下痢積熱虛脫滑利並皆治之

方 詞子散

乾薑

大分

粟殼

蜜炙一錢

訶子

七分

橘紅

七分

右剉一劑用水煎熟空心服

病下痢積已少。但虛坐者是血少也。以胃風湯去桂加熟地黃。

主之

方見本卷前

病下痢大孔痛。此熱流下也。以木香檳榔黃芩黃連各等分。加些少炮乾薑。煎服外用火燒過瓦塊一片。再於炭火中燒通紅入槐花湯淬候溫貼在肛門上。一日易換十餘次神效。

病痢後脚痛緩弱不能行履。名曰痢風。以大防風湯主之。

方見三卷

病一切濕熱痢症滑脫不禁等症是也。

治法當清理溫熱爲主。經云苦可以勝溫寒可以勝熱是以清  
濕理熱調血理氣故用烏梅丸主之。

方烏梅丸

黃連

當歸

枳殼

烏梅

石爲末醋糊丸空心米臥下三五十丸。

下痢身熱讝語氣實者以小承氣湯治之

方見三卷內

中暑下痢煩渴燥熱治以黃連香薷散加人參主之

方見二卷內

通下痢鮮血不止此乃大腸經血熱所致也。

通法當清熱涼血爲主是以用黃連槐花理大腸經熱用歸爲地芍以補涼血阿膠艾葉以止下痢之血粟殼以固脫滑

五加味四物湯

黃連

三錢

槐花

二錢

川歸

一錢

川芎

六分

粟殼

七分

生地

一錢

白芍

八分

阿膠

一錢

艾葉

七分

○右㕮咀水煎食前溫服。

下痢清白手足厥冷腹收不已以附子理中湯主之

方見三卷內

病下痢血腹脹裏急後重夫痢皆由腸胃濕熱而成也。

治法當用苦寒之劑以下陽胃中濕熱爲主經云苦可以去濕寒可以勝熱丹谿又云調血則便腹止已行氣則後重除故用芩連大黃等諸苦寒以清腸胃中濕氣爲本佐歸芍調血木香檳榔導氣二者爲標。

方導氣湯

黃連一錢 黃芩一錢 大黃一錢 川歸一錢五分  
白芍八分 木香三分 檳榔七分

右㕮咀水煎熟空心服。

時疫痢疾長幼傳染率皆相似以倉廩湯加陳皮煎服。卷前 方見本  
下痢脫肛以參朮湯加升麻去木香或升陽防風湯煎服。卷前 方見本  
亦白芍疾以杏連茱萸丸或駐車丸可。卷前 方見本

香連茱萸丸

黃連

如豆大

吳茱萸

湯泡小火去  
梗四兩

石朱同炒香微黃色地上去火毒掠各一慶另爲細末每末一兩入木香末二錢醋煮透研爲丸如梧桐子大每服一百丸若白痢用茱萸丸赤痢用黃連丸赤白夾雜各半赤先起先服連丸白先起先用茱萸看赤白多少丸藥和服俱用溫酒送下不能飲以米湯亦可

治下痢血夫痢由濕熱而成法當清熱理濕爲主故用黃連清熱茯苓滲濕阿膠理血

方黃連阿膠丸

黃連

二兩

茯苓

二兩

阿膠

熬成味另研  
角末二兩

右件先將滾水化開研末成糊爲丸食前米湯下五十丸

一切病疾皆由濕熱怫鬱而成虛量清熱藥以根爲主是以用  
黃連黃柏大黃等諸苦寒以消濕熱木香檀榔青皮陳皮  
廣木枳殼丑末香附等諸辛溫以散鬱氣

方木香檀榔丸

黃連

四兩

黃柏

二兩

大生地

二兩

木香

一兩

損榔

七錢

丑未

五錢

香附

八錢

廣木

五錢

青皮

七錢

陳皮

七錢

枳殼

一兩

右爲末以水丸如梧桐子大食前米飲下或五十九六七十

丸量人虛實加減

治虛怯人久痢不止嘔吐等症是以用人參白朮茯苓火甘草等補中益氣以止利木香調氣養胃既溫胃以止嘔

列藏氏白朮散

人參二錢

白朮一錢

茯苓八分

甘草五分

木香七分

藿香七分

乾薑五分

右咬咀水煎熟食後溫服。

積滯成痢急促去不通泰量人壯實以萬靈丹下之○若熱痢  
以導水丸○白痢燒寒丸。

○萬靈丹

川烏

一隻重八錢者泡

石菖蒲

桂心

黃連

人參

桔梗

乾薑

杏仁

厚朴

附炙

威靈仙

漫火灸

吳茱萸

湯泡七次研

晒乾山梔

紫苑

柴胡

防風

猪牙皂角

甘遂

白茯苓

巴豆

益炒黃各二錢五分另研

右件依法製度爲末。八巴豆和勻。煉蜜成劑。杵一二千下。磁  
器收貯。臨服丸如梧桐子大。每服大人服五丸。氣實者七  
丸。氣虛者七丸。

丸。小兒看大小虛實斟酌用。溫酒或白湯空心送下。

方導水丸

黑牽牛

取頭末二兩

滑石

另研二兩

黃芩

取末一兩

大黃

取末一兩

右件和勻。滴水爲丸。如梧桐子大。每服壯實人六十丸。小弱

量虛實與服。

方燒魚丸

巴豆

去殼

丁香

硇砂仁

杏仁

去皮尖

白礬

如杏各一粒

大

右用大肥棗子一枚去核。包前五件在內。用粗紙三五重裹水濕紙於慢灰火中煨紙乾。待礬銷爲度。杵極爛爲丸。如梧桐子大。壯實人每服三丸。小弱人量減與服。

○瘧亂論

卒瘲亂皆因醉飽過度傷于胃土。脾弱不能運化。加以風寒暑濕之氣所感。致陽盛於外。陰生於內。邪正相搏。陰陽交爭。揮霍慄亂。吐利交作。邪在上則吐。邪在下則瀉。邪在中焦。既吐且利。所以此疾多生於夏秋。縱寒月有之。亦有伏暑而然病之。將作必先肚腹疼痛。吐瀉之後甚則轉筋。此薰風也。手足厥冷。氣少唇青。此薰寒也。身熱煩渴。氣麗口燥。此薰暑也。四肢重着。骨節痠疼。此薰濕也。又有上不得吐。下不得瀉。邪結腹中。疼之至極。名曰乾灌亂。此係內有所傷。外有邪氣所遏。升降不通。最爲危證。急用薑鹽飲煎湯灌下。通達其氣。但得吐利方爲佳兆。若手足厥冷。將欲絕者。宜用艾於脐中灸之。投以附子理中之類。俟甦醒。審其寒熱用藥。若陽氣已脫。遺尿不知。或膏汗如珠。或大躁欲入水。或四肢不收。或氣少不語。誠爲難治。臨症一際不可

連進粥飲使碍氣道。審其風者散之。寒者溫之。暑者清之。濕者利之。不可執一而泥也。

○癰亂脈辨

脉微而濶。代而散。或隱而伏。或大而虛。或又關滑。皆爲癰亂吐瀉之候。○洪者爲熱。弦者爲飲。氣口脉滑。膈間有宿食閑飲。宜順其性以鹽湯吐之。

○癰亂法則

霍亂之症。內因飲食。七情所傷。外因風寒暑濕。六淫所遏。水火相干。陰陽相搏。上下失離。榮衛失統。甚則筋挛掣痛。均其吐瀉過後。津液重亡。筋失所養。而致治療大法。在乎分利陰陽。散風行滯。降火引清。氣上升。使濁氣下降。如陰虛加以參木等。補則如六和湯之類。

○丹溪治法

霍亂之症。揮霍撩亂。起於一時。多由內傷。挾外感。陰陽乖隔。而致偏陽多熱。偏陰多寒。卒然而來。上吐下瀉。名濕霍亂。其症雖危。仍多可治。蓋由所傷之邪。因吐利而解之故也。如欲吐利而不得吐利者。名乾霍亂。其證必危。不治。蓋由所傷之邪。不得發越。壅閉正氣。關格陰陽。不得通接之故。治法大要。必在探吐升提。氣中而寓發散之意焉。餘則詳其虛實寒熱。加減用藥。

如有寒。腹滿而痛。四肢拘急。轉筋下利者。宜理中加附子。官桂。如中暑霍亂。煩燥大渴。心腹撮痛。四肢冷汗。脚轉筋。宜藿香正氣散。或理中湯加石膏。

如霍亂吐瀉心腹疼痛。宜先用瀉湯探吐。後用藿香正氣加大

香五分。若頻欲卷周而不通。再加枳殼一錢。

如夏月多食寒冷。乘風取涼。以致苗不化。否隔上下。而成霍亂。

宜六和湯。倍加藿香。

凡轉筋。多由血熱。宜四物加酒。今紅花。南星。蒼术。

凡霍亂不渴。宜以生薑。理中湯最妙。如渴者。用五苓散。加五味。

麥門冬滑石

如冬月霍亂。理中湯爲主。夏月黃連香需飲。井中浸冷服。

二陳湯加藿香。蒼术。厚朴。砂仁。白芷。人參。神麃。善治霍亂吐瀉。

遇寒月。加乾薑。甚則加附子。

凡轉筋。男子以手挽其陰。女子牽兩乳近兩傍。其筋自得此異得之妙法也。

治霍亂轉筋惡風。此風暑合病。以石膏理中湯主之。

另石膏理中湯

石膏

人參

白朮

各二錢

甘草

炙一錢

乾薑

五分

右㕮咀水二鍾煎一鍾食前服。

甲寒霍亂吐瀉以理中湯主之。

方見三卷內

○手足寒厥轉筋加黑

附子

炮二錢

暑熱霍亂。霍亂之症皆由中氣虧敗外邪干之而成。

治法當補中氣爲本理外邪爲標是以用人參。黃芪。白朮。甘草。補益中氣。茯苓。澤瀉。滑石等分利小水以泄火。石膏。寒水石。以清熱。木香。和氣導滞。葛根解肌止渴。桂枝。通血脉。

榮衛。

芍桂苓甘露飲

人參三兩

黃芪二兩

白朮二兩

甘草

炙一兩

桂枝

一兩

茯苓二兩

澤瀉一兩

滑石一兩

石膏

一兩五錢

寒水石

兩半

葛根

一兩

桂枝

五錢

木香

五錢

右共爲細末。每白湯調服二錢。

霍亂多寒肉。冷脉絕。以通脉四逆湯治之。

方通脉四逆湯

吳茱萸

八分

黑附子

一錢五分

桂心

去皮不見火

木通

細辛

白芍藥

當歸

各一錢

甘草

炙五分

右㕮咀薑七片。枣二枚。水一鍾酒半鍾。煎七分溫服。

霍亂吐瀉不止。此乃中氣虧敗。脾胃不和所致也。

治法當補中氣和脾胃。故用人參。白朮。甘草等。補中氣。以止瀉。  
砂仁。藿香。白蘆薈。以止嘔。半夏。杏仁。降逆氣。厚朴。陳皮。香薷。  
薷以清暑。赤茯木。瓜等。以理濕。

五  
六和湯

人參二錢

白朮二錢

甘草六分

砂仁七分

藿香八分

白扁豆一錢

半夏七分

杏仁七分

厚朴七分

香薷二錢

赤茯苓一錢

木瓜七分

右咬咀用薑三片，棗二枚，水二鍾，煎一鍾，溫服。

病七情鬱結，五臟之間，互相刑尅，陰陽不和，揮霍變亂，吐利交作，以七氣湯治之。

方七氣湯

橘紅二錢

茯苓去皮

半夏各一錢

厚朴薑鹽

人參各一錢

白芍藥

紫蘇各五分

官桂三分

甘草四分

錢四分

右咬咀，水二鍾，酒半鍾，生薑七片，棗二枚，煎七分，空心溫服。霍亂嘔吐不止，以正氣散主之。方見三卷內

中暑霍亂轉筋煩渴引飲以枇杷葉散治之

方見三卷內

中暑霍亂吐利交作以香薷散主之

方香薷散

香薷一錢

黃連

薑汁製炒

白扁豆

厚朴各五分

甘草五分

猪苓

三分

澤瀉

赤茯苓

右㕮咀水煎熟不拘時服。

暑濕相搏霍亂轉筋煩渴以藿薷散主之

方見三卷內

霍亂腹攻氣食不和以治中之劑治之

方治中湯

人參二錢

白朮二錢

乾薑炮

橘皮

青皮各一錢

甘草炙五分

砂仁七枚

右㕮咀水煎熟食前服。

病乾霍亂欲吐不吐欲瀉不瀉以薑鹽之翻爲愈

方  
薑鹽飲

生薑

五錢

鹽

一兩

右件同搗碎炒令色變以水一碗煎熟去渣服甚者加童子小便一錘不拘時急服。

病霍亂已愈煩熱多渴小便不利治以參冬人參等。

方  
小麥門冬湯

人參

去蘆

白茯苓

去皮

小麥

來門冬

去心各

橘皮

半夏

各六分

白朮

八分甘草

四分

烏梅

半枚

生薑

五片

右咀水煎熟不拘時服。

治霍亂轉筋吐瀉不止頭目昏眩須臾不救者。

方吳茱萸湯

吳茱萸

生薑

各五錢

人參

二錢五分

東子

二枚

右咬咀水煎熟不拘時服。

霍亂後惡心懶食口乾多渴以白朮散主之

方見三卷

霍亂吐利并脾痛心疼不可忍者

伍訶子散

訶子

厚朴

乾薑

草果

陳皮

良薑

茯苓

神麌

來葉

各八分

甘草

五分

鹽

少許

右咀片水煎熟食前服。

霍亂吐利轉筋四肢逆冷須臾不救急以茱萸湯入鹽同煎如

無用枯白朮末一錢沸湯點服亦無白朮以鹽一撮醋一

鍾煎入分服或鹽梅鹹散皆可表服。

列傳食鹽湯

吳茱萸

木瓜

食鹽

各五錢

右三味同炒焦。另用磁瓶盛水三升。煎百沸入藥。煎至一升。  
隨患者意。冷熱服之。

治暑食不和。吐瀉之後。腹脹腸鳴。小便不利。或瀉不止。以胃苓

湯主之。

方見三卷

○泄瀉

泄瀉之由非一。蓋脾泄者。腹脹滿悶。泄注食則嘔逆。胃泄者。飲食不化。色黃。大腸泄者。食已窘迫。大便色白。腸鳴切痛。小腸泄者。溲而便曠。血少腹痛。大瘕泄者。裏急後重。數至圊而不能便。甚至中痛。此皆外傷風寒火濕。內爲七情飲食。及厥陰經動。并胃氣下降而然。蓋風瀉者暎。下必帶血。久爲飧泄。火熱瀉者。腹

疼瀉水腹鳴。痛一陣瀉一陣。或下黃赤。肛門焦扇。糞出穀道。猶如湯澆煩渴。小便不利。黑瀉者。瀉水腹不疼。腰脚冷痺。小便不利。腸若雷鳴。不瀉。其色黃黑。脉必沉緩。寒泄者。腹中攻刺作痛。洞下清白。腹內虛鳴。米穀不化。脉必沉細。法當風者散之。火熱者清之。濕者分利之。寒者溫之。七情氣鬱。濕者去不通泰。欲去不去。或升或降。下氣不絕。腹常虛痞。宜調順其氣。使鬱滯得舒。瀉亦止矣。脾虛瀉者。飲食入胃。完穀不化。因久虛之。不受飲食。食則腹急腸鳴。盡下所食之物。經方寬快。不食則無事。甚至氣衰滑泄不禁。動經年久不愈。須當健脾益氣。使胃中清氣得升。其泄自止。飲食所傷瀉者。腹痛甚而瀉。瀉後則痛減。或噫酸臭腐。或下如抱環鷄卵。先當消羶所傷之物。氣壯者下之。痰積瀉者瀉時或不去。或多或少。此因痰積上焦。以致大腸之不固。則

當去上焦之痰而下治其瀉。也有日夜無事五更洞泄一二次。此病在腎。名脾腎瀉。宜固補下元。有交腸瀉者。大小便易位而出。此因氣不循故道。清濁混淆所致。治當分利陰陽。使氣順。各安其位。大凡治瀉。一皆壯健脾胃。分別清濁。然後斷下。大法如此。遇他證兼瀉。當以糲米滑泄一證。最忌五虛。脈細皮寒。少氣。前後泄利。飲食不入。是北。但得糜粥入胃。泄瀉稍止。則可治也。脉急弦數身熱直視。則難治矣。

○風傷脾。飧泄。身熱。脉弦。腰重。微汗。頭疼。皆風壅肝木。損傷脾土。不能輸布水濕。是以飧風爲陽邪。是以身熱。風邪入木爲患。是以脉弦。蓋弦乃肝脉。脾濕壅盛。是以腰重。風熱薰蒸脾濕。故用微汗。經云。風先傷於上。是以頭痛也。

○宜散風邪。健脾疎壅。是以用麻黃解熱助表。防風以散風邪。

蒼朮白朮補中健脾疎壅濕以止泄

方防風蒼朮湯

麻黃八分

防風一錢

蒼朮二錢

白朮三錢

右㕮咀水煎熟熱服取汗

傷風泄濕下必帶血以胃風湯主之

方見本卷前

臟腑停寒泄濕不止治以附子理中湯

方附子理中湯

黑附子

白朮

人參各二錢

五分甘草各一錢

乾薑一錢五分

○右㕮咀水煎熟食前服

泄瀉久不止以實腸散煎下戊巳丸

方見三卷

方實腸散

肉荳蔻

诃子

砂仁

陳皮

蒼朮

茯苓各八分

木香

甘草各五分

厚朴一錢

右㕮咀水煎。生薑三片。棗子二枚。煎熟空心服。○如手足厥冷。加乾薑炮一錢。

病中氣虛敗以致津液凝聚成痰。阻塞經絡。妨礙升降。以致水液不能回滲。獨流大腸而爲溏泄。小便短少是也。

治法當補中健脾豁痰。飲利小便是以用白朮補中健脾。生薑半夏豁痰。開鬱。茯苓澤泄利小便。分消水濕。

方 半夏湯

白朮三錢

生薑三片

半夏八分

茯苓一錢

澤瀉八分

右咀水煎熟空心服

中暑泄瀉煩渴引飲。其下如水。以香苓散主之。

方見本卷前

問進戌巳丸

方

卷內

治內傷飲食泄瀉不止以胃苓湯加草薑

方見三卷前

○腹痛

加乾薑氣壯先用感應丸之類去食積以治中湯主之

見前

## 感應丸

百草霜

一兩

杏仁

一百二十粒另研

巴豆

三十五粒另研

丁香

七錢五分

肉荳蔻

十箇

南木香

一兩二錢五分

乾薑

五錢

右件依法製度爲末和勻用蠟三兩好酒半升同煮蠟燭數  
沸頓出候酒冷蠟浮以春夏用清油半兩秋冬七錢半於  
銚內熬香熟次下酒煮蠟二兩同化作汁乘熱拌和藥末  
成劑以油紙裹之臨服丸如麻子每服十丸空心用薑湯

送下

病過食傷脾健運無力致食不得消化鬱於腸胃之間而爲泄

瀉是也

治法當消宿食下鬱積是以用神麴快脾消宿食枳實消鬱滿大黃下腸胃中之宿積此乃通因通用之義也

方導痰湯

神麴三錢

枳實二錢

大黃二錢

右先以水煎臨熟下大黃滚一二沸空心服如利之後以人參白朮等劑補之

心脾不調吐瀉寒熱小便赤澁治以六和湯主之方見三卷

一日大便三四次溏而不多有時泄瀉腹中鳴小便黃以升陽湯治之

方升陽湯

柴胡五分

當歸身

桂皮

升麻各一錢

黃芪二錢

甘草半錢

益智仁八分

紅花二分

右㕮咀水煎熟食前服。

固瀉泄無度不思飲食腸鳴腹痛四肢無力此乃土風虧敗脾濕壅盛抑遏陽氣不得上升所致經云清氣在下則生飧泄是也。

治法當補中疎壅濕升陽氣是以用白术陳皮炙甘草麥芽神曲益智等以補中健脾和胃化宿食進飲食防風羌活葛根等以疎壅濕用麻柴胡升引清陽之氣上騰猪苓澤瀉利小便滲濕導濁陰之氣下降半夏以降逆氣。

升陽除濕湯

白术一錢

陳皮一錢

甘草六分

麥芽七分

神曲一錢

益智仁八分

防風一錢

卷活八分

蒼术

一錢

升麻

七分

柴胡

一錢

猪苓

一錢

澤瀉

一錢

半夏

八分

○右咀水煎用薑三斤蜜二枚

煎熟食後服

感濕泄瀉腰脚冷痺不渴以參濕湯治之

方見本卷前

停滯塞物不消或飲食積聚泄瀉治以香稜丸

方香稜丸

香附

八兩

二稜

醋浸

蓬朮

苦浸

陳橘皮

青皮

良薑

乾薑

各炒微黃

唐求

晒乾各四兩

右件依法製度爲末

醋煮麵糊爲丸如梧桐子大每服五十

丸米飲湯食前服

泄瀉滑脫不禁以臘湯去木香加龍骨治之

方見本卷前

暖丸

方固陽丸

卷之四  
十四  
病  
訶子

龍骨

另研各六錢

赤石脂

各五錢

白枯礬

各三錢四分

木香

各五錢

丁香

一兩

肉荳蔻 砂仁各六錢七分右件依法製度爲細末。粟米飲爲丸。如梧桐子大。每服三十丸。米湯食前送下。

病臟寒之人。過食冷物。以致腹中陰寒之氣忒甚。暴注如水。周身出汗。渾身通冷。脉微而弱。氣少不能言語。甚至嘔吐。此皆陽氣虧敗。不勝陰寒所致。其周身汗出者。陽氣外脫也。一身通冷者。陰寒所勝也。脉微氣少不能言語者。陽衰是也。

治法當溫復陽氣。以散陰寒。經云。辛甘爲陽。故用乾薑。肉桂。附子。良薑。炙草等。合辛甘溫中散寒。以復陽氣。半夏散逆氣。以止嘔。

方梨水飲

乾薑一錢

肉桂一錢

附子二錢

良薑八分

甘草炙五分

半夏八分

右㕮咀水二鍾煎一鍾溫服。

寒瀉清白腹疼足冷以附子理中湯治之

方見本卷前

熱瀉口乾喜冷肛門如火所下亦熱以五苓散去桂加黃連白

芍藥主之

方見三卷內

下如鴨溏糟粕不化大便黃黑此脾虛大腸有寒也治以吳萸丸或附子理中湯加厚朴

方見本卷前

方吳茱萸丸

吳茱萸

乾薑炮

赤石脂

神麃

當歸

厚朴

各等分

右件依法製度爲末。凍蜜爲丸。如梧桐子大。每服三十丸。素飲空心送下。

病水泄注下。困弱無力腹疼。此乃山氣虧敗。不能舒布水濕。以致流於大腸是也。

治法當補中健脾爲主。是以用白朮。甘草。補中健脾。舒布水濕爲本。白朮收歛陰濕。以止腹漏爲標。

方名  
白朮芍藥湯

白朮 五錢 甘草 二錢 白芍 一錢

右㕮咀。水二鍾。煎一鍾。溫服。

病日間無事。將脯腹膨。一夜腸鳴。不得寢。寒冷早洞泄。此名頓瀉。是脾虛濕盛也。治以胃苓湯加砂仁。方見三卷內 脾中氣虛敗。不能舒布水濕。以致流於大腸。而爲泄瀉是也。

臨法宜補脾土以勝水濕故用白朮健脾上補中氣爲君茯苓利小便滲濕爲臣

方  
茯苓湯

白朮七分

茯苓五分

○右咀水煎溫服

病清氣在下則生飧泄清濁交錯食不化而清穀出矣腹內疼痛此風入中也治以小白朮湯

方  
小白朮湯

白朮二分

厚朴

當歸各一木

龍骨

艾葉各五分

右㕮咀生薑五片水煎熱空心服

○夏月感受濕熱而作腹痛泄瀉法宜燥濕清熱爲主故用蒼朮燥濕黃芩清熱白芍益陰以止腹痛桂枝和榮衛以通血脉

方  
蒼木芍藥湯

蒼术

五木

黃芩

二木

白芍

木

桂枝

右咬咀水煎熟溫服。

泄瀉煩渴治以白朮散。氣鬱瀉者以枳硝二陳湯加木香主之。

二方俱見  
三卷內。

病春傷於風至夏生飧泄頭與肢節疼痛是也。

治宜散風疎濕爲主故用羌活藁本細辛川芎等驅風以除肢節與頭疼痛兼助蒼朮疎雍瀉粉草補脾土。

方  
神木散

羌活

一木

藁本

七分

細辛

七分

川芎

八分

蒼朮

一木

粉草

八分

○如欲汗加葱白三根同煎

右咬咀加生薑三片用水煎熟溫服。

痰積鴻者以二陳湯加白朮。神麌治之。方見三卷

氣虛久瀉陽氣下陷以四君子湯加白朮藥升麻柴胡○久瀉

日夜無度以豆蔻固腸丸

二方俱見本卷前

病吐瀉發熱咽乾口渴此皆中氣虛敗所敗蓋水穀入胃脾與行其水液爲津爲潤脾氣既虛胃中水液不能四布是以獨流大腸而爲泄矣泄多則亡陰陰虛則陽盛陽盛則上炎是以嘔吐發熱之症作其水飲下流津液不得上達是以咽乾口渴是也。

治法宜補中益氣爲主故用人參白朮茯苓甘草等補中健脾爲主藿香木香調氣加胃氣止嘔吐爲標佐乾葛輕揚之劑鼓舞胃氣上行以生津解熱必以本方白朮散等分爲末每米飲調下三五錢

一本去木香加白扁豆蓮肉炒服之愈妙。

泄瀉惡心欲吐或水上不伏或冒風氣而瀉以正氣散治之

方見

三卷內

固侵晨泄下二三次此腎虛不能攝水以成泄瀉故用肉蔻溫

補脾胃破故紙補攝腎水。

方四神丸

肉荳蔻

四錢生

破故紙

八錢

木香一錢

茴香

二錢

右件依法製度爲末用生薑煮枣去核取肉研爲膏作劑丸如梧桐子大監湯空心送下。

病水泄注下日夜無度小便短少口渴咽乾腹中疼痛或變成赤白痢疾此乃中氣不充脾濕壅盛鬱遏陽氣不得上達以致水液不得舒緩獨流大腸是以水泄注下日夜無度

注泄則津液下流不得上達是以咽乾口渴陽氣鬱久變成火熱腹中濕氣並熱蒸搏是以肚腹疼痛或下痢膿血是也

治法當補中健脾疎壅濕熱故用蒼朮白朮茯苓甘草等補中健脾猪苓瀝瀉利小便分消水濕升麻升陽氣上行兼助柴胡黃芩消熱生草泄火下多則亡陰故佐歸芍以助陰血

方加味茯苓湯

蒼朮二錢

白朮三錢

茯苓一錢

甘草炙五分

猪苓八分

澤瀉一錢

升麻五分

肉桂七分

柴胡六分

黃芩一錢

生草五分

川歸一錢

白芍七分

右咬咀水二鍾煎一鍾溫服

治寒泄經云辛以散之熟可以勝寒是以用吳茱萸乾薑肉桂丁香等諸辛熟以散寒陳皮木香行鬱人參補氣當歸益血

方八味湯

吳茱萸

二兩

乾薑

二兩

肉桂

兩半

人參

三兩

丁香

一兩

陳皮

七分

木香

一兩

川歸

一兩

右共爲末每以五錢水煎溫服

治一切寒泄用草撥等諸辛熟以溫中散寒

方大已寒丸

草撥

四兩

乾薑

四兩

肉桂

四兩

良薑

五兩

右共爲末以糊丸如梧桐子大每空心米飲下三十九丸

酒積鶯痢以五苓散加酒炒黃連葛根主之

方見三卷內

○嘔吐

嘔吐之症。有實有虛。難執一法而治。是以有因食傷太陰。不能克化而吐者。有因火氣上冲而作者。有因胃氣傷敗。不能容納者。有因脾病不磨。致胃無由傳化。而上壅者。雖然種々不同。未有不由火氣上炎所致。經云。諸嘔吐酸皆屬於火是也。大要重在胃經。蓋胃乃水穀之總司。上系咽喉之故。而東垣又分嘔吐。噦爲三。而以聲物之有無。與夫各經氣血多少之殊異。謂嘔者。有聲有物。氣血俱傷。屬於陽明。陽明多氣少血之故也。吐者。有物無聲。乃血受傷。屬於太陽。蓋太陽多血少氣之故也。噦者。有聲無物。乃氣受傷。屬於少陽。多氣少血之故也。而河間又謂胃膈熱盛。則爲嘔。其證有三。曰氣日積日寒。皆從三焦爲主。蓋上焦在胃口。上通天氣。主納而不出。中焦在中脘。上通天氣。下

通地氣主腐熟水穀下焦在脾下。下通地氣主出而不納故上焦吐由於氣分其狀或有聲而無物或聲多而物少或食已而卽吐其脈浮而洪渴而欲飲水大便燥結氣上冲胸而作嘔治法在乎降氣而和中中焦吐者多由乎積其狀聲物並盛或食已良久始作乃由新食觸積所致其脈洪而長或先吐而後痛或先痛而後吐治法在乎行氣去積爲先下焦吐者由於血分其症或有物而兼聲或物多而聲少或朝食而暮吐或暮食而朝吐或小便清而大便秘其脈沉而遲治法在乎溫中散寒通其閉塞而仲景又謂有因傷寒陽明實熱太甚而吐逆者東垣又謂有胃熱而吐者有胃寒而吐者有久病氣虛胃氣衰甚聞穀氣而噦呕者有脾濕太甚不能運化精微以致清痰流飲鬱於上中二焦時時惡心而吐清水者衆論不同學旨宜求各類

而治不可拘執一法而泥也

大都治嘔吐者必用生薑自然汁取其味辛能散胸中之鬱其性溫能下氣和胃之故也若肺氣中酒妊娠中諸藥毒俱有嘔吐各以類求脉得虛緩易愈若緊濤者難治吐如青菜汁者難治此是乍然嘔吐非<sub>輕</sub>胃比也

○嘔吐脉訣

經曰嘔而脉弱小便後利身有微熱厥者難治○跌爲脉浮胃氣虛寒氣在上緩氣在下二氣相爭但出而不入其人卽嘔而不得食恐怖則死實緩則差。

又云陽緊陰數其人食已卽吐陽浮而數亦吐○關上脉數其人卽吐○脉弦者虛也胃氣無餘朝食暮吐暮食朝吐變

爲翻胃

○嘔吐去則

凡嘔吐症切不可下。蓋逆之故也。必在分因而察。如久病吐者。乃胃氣虛不能痛疼之故也。宜以人參黃芪白朮香附生薑之類。

如痞悶短氣而嘔者。乃中氣虧也。宜以補中益氣湯。或調中益氣之類。

如吐蟲而嘔。宜以黑錫炒成灰。加檳榔末。米飲調服。

如因多食生冷。以致脾胃不和。嘔吐惡心或頭眩。或胃脘懊悶。不惺或發寒熱。宜二陳湯。加丁香。烏梅煎服。如心下痺。而

痛者。再加草豆蔻仁。

如惡心嘔吐氣盛者。宜導痰湯。加薑炒黃連。砂仁。竹茹。

凡嘔吐噯氣惡心吞酸等症。悉以二陳湯。加梔子。蒼朮。川芎。香

附生薑砂仁姜炒黃連山谷神麌木香之類選而用之

如久虛病人前方加人參白朮

如胃寒而吐者前方加益智仁草豆蔻乾薑桂心之類甚者加

丁香附子去梔子黃連

凡嘔吐不已腸肋脾疼痛右關脉弦此木乘土之分前方加參

木升麻柴胡青皮川芎芍藥砂仁神麌之類

如時常吐清水或口乾不喜食冷涎自下湧上者乃脾熱所致

前方加白朮白芍土炒黃連梔子神麌麥芽生薑或爲丸  
或作湯皆可

如時常惡心吐清水心胃作痛得食暫止飢則痛甚乃胃中行  
蛇宜以前方加苦練根史君子煎服或用黑錫灰柏梢末  
等分末飲調服

治嘔吐以二陳湯爲主。如氣食者加白芷蔻砂仁熱吐者加黃連冷涎吐者加丁香氣升吐者加沉香氣不和吐者加木香俱煎入生薑自然汁少許勿見三卷內

病嘔吐惡心不能飲食此乃脾胃虛弱不待腐熟故嘔吐食物是也

治法當補中養胃是以用人參陳皮補中以健運動藿香丁香溫胃止嘔吐以進飲食

方藿香安胃散

人參五錢 陳皮一錢 藿香一錢 丁香六分

右咬咀水錘半煎八分溫服

治吐久胃寒吐出蛻蟲者以理中湯加烏梅二箇川椒十粒檳榔一錢蛻見椒則頭伏也若胸悞間如蟲狀欲吐者前藥

內加黃芩一錢

方見三卷

病中氣虛敗肝火上乘而作嘔吐是也

治法當補中氣爲本理肝氣爲標是以用人參灸甘草補中氣柴胡青黛輔黃芩以瀉肝火生薑半夏散逆氣止嘔吐

方鎮骨丸

人參一錢

甘草一兩

柴胡一兩

黃芩五錢

生薑二兩

半夏一兩

青黛七錢

另研爲末

右共爲末薑汁浸蒸餅丸如梧桐子大每食後薑湯送下七

十九

嘔吐之間雜以延血者治以八珍散主陳皮主之

方八珍散

當歸

一錢

赤芍

一錢

熟地

一錢

川芎

一錢

人參

一錢  
五分

茯苓

一錢  
五分

甘草

炙一錢  
五分

砂仁

七分

右咬咀生薑五片棗子二枚水煎空心服

病七情鬱中變成嘔吐或作寒熱眩暉痞悶不思飲食以大霍

香散主之

方 大霍香散

藿香

一錢

半夏麯

白术

白茯苓

枇杷葉

人參

各一錢

木香

官桂

各四錢

桔梗

五分

甘草

炙三分

右咬咀生薑五片棗子二枚水煎食前服

治中氣挾痰作吐法當補中豁痰是以用白术。炙草補中茯苓。牛夏豁痰木香檳榔散逆氣以止嘔吐。

方 白术湯

白术

一錢

甘草

炙七分

茯苓

一錢

半夏

二錢

木香七分 槟榔七分

右咬咀生薑五片水煎温服

治脾胃有寒宿食留滯以致嘔吐更甚或風寒外束內鬱發作  
是也

方丁香茯苓湯

木香五分 肉桂五分 乾生薑四分 丁香四分  
黑附子 檘紅各一錢 半夏一錢二分砂仁七枚

右咬咀生薑五片，棗子二枚水煎食前服

病內傷飲食脾濕壅塞而作嘔吐是也

治法當導宿食疎壅滯是以用神麃砂仁化宿食厚朴蒼术疎

壅滯藿香沉皮生薑和中散逆氣以止嘔吐

方東垣藿香平胃散

卷之四  
神龜一錢

砂仁八分

厚朴七分

蒼朮八分

藿香八分

生薑二錢

陳皮

右㕮咀水一中煎六分溫服

翻胃不食食入卽吐

方天半夏湯

生夏二合

人參三錢

右水和白蜜一合揚之二百四十遍煮藥服

病中氣虧敗之人殗食生冷不化以致心腹疼痛嘔噦不已是

也

方法當補中散寒是以用人參白朮甘草大棗等以補中氣丁  
香附子乾薑等溫胃以散寒青皮削堅滯兼助陳皮生薑  
等散逆氣以止嘔吐用于附治中湯主之

人參

五錢

白朮

二錢

大棗

三枚

甘草

炙七分

丁香

六分

附子

七分

乾薑

六分

青皮

七分

陳皮

一錢

生薑

三片

右㕮咀水二鍾煎一鍾溫服

聞食氣則嘔此中脘有食以二陳湯加青皮砂仁白荳蔻神曲山楂仁主之

方見三卷內

煩渴飲水水入卽吐者名水逆治以五苓散

方見三卷內

脾胃虛弱神思倦怠嘔噦惡心懶進飲食治以白朮散

方見三卷內

嘔而胸滿或乾嘔涎沫治以莫桑萸湯

方見本卷前

嘔吐不已痰涎噦逆治以丁香二陳湯

立丁香二陳湯

丁香

四分

半夏

五分

茯苓

一錢

甘草

五分

橘皮 二錢

藿香 五分

生薑 五片

生薑汁 半許

右咬咀水煎不拘時服。

胃虛嘔噦吐逆咽膈不通。

方 丁香茱萸湯

乾生薑

柴胡 各四分

黃檗 三分

丁香 三分

升麻

三分

吳茱萸

三分

甘草

炙各五分

橘皮

六分

草豆蔻

黃芪

各八分

人參一錢

當歸身

一錢 蒼朮

一錢 二分

右咬咀水煎熟食前服。

胃熱多渴嘔噦不食以橘皮等類

方 橘皮竹茹湯

橘紅

一分

枇杷葉

六毛夾門冬

青竹茹

半夏

赤茯苓

人參各一錢

甘草炙四分

生薑五片

右㕮咀水煎熟食前服

病陰多陽少手足厥冷氣壅胸滿心下堅痞嘔噦酸水治以正氣主之。

方三香正氣散

木香四分

丁香三分

香附子

橘紅各一錢

益智仁

砂仁七分

厚朴九分

甘草炙四分

烏藥六分

乾薑炮四分

丁香皮三分

蓬木六分

右㕮咀生薑三分枣子一枚水煎食前服

嘔吐不止胸膈痞寒治以香附砂仁之類

方香砂安胃湯

香附子

枇杷葉

一錢

砂仁七枚

橘紅一錢

五分

茯苓

一錢

半夏

一錢

甘草

三分

桔梗

四分

藿香

四分

生薑

五片

右咬咀入生薑汁一蛤殼。如覺寒加丁香三分。

胃氣虛弱，身重有痰，嘔吐惡心，少食。以香砂六君子湯加藿香葉主之。

方 香砂六君子湯

橘皮

白术

人參

各一錢

半夏

茯苓

各一錢

甘草

各五分

生薑

五片

香附

一錢

砂仁

七枚

右咬咀水煎食前服

嘔而腸鳴，心下痞者，以甘草瀉心湯。

方 甘草瀉心湯

甘草

四錢

黃芩

人參

乾薑

各三分

黃連

一錢

半夏

一合

大棗

三枚

右㕮咀水二鍾煎一鍾食前服

乾嘔而利者以黃芩半夏之類

方黃芩半夏湯

半夏

四錢

甘草

炙一錢

白芍藥

一錢

黃芩

生薑

三錢

大棗

二枚

右咀水煎食遠服

諸嘔吐穀不得下者以小半夏湯

方小半夏湯

半夏

一合

生薑

八錢

右咀水煎食前服

嘔而脉弱小便復利身有微熱手足厥者以四逆湯治之

方見三卷

似喘不喘似噦不噦心中無奈何以生薑半夏湯。

方生薑半夏湯

半夏八錢

○右水二鍾煮減三分之一納生薑自然汁

一合煎熟食前服

乾嘔噦手足厥者治以小橘皮湯

方小橘皮湯

橘皮

八錢

生薑

八錢

○右咀水煎不拘時服。

病惡心者無聲無物心中欲吐不吐欲嘔不嘔名曰惡心非心

經之病皆胃口有痰以生薑半夏湯治之

方見本卷前

○或集

香寶屑常嚼些需。

方集香寶屑

白荳蔻

縮砂仁

白茯苓

甘草

橘皮

香附子

各等分

右件細剉和勻入鹽少許時常細嚼