

坤王琢崖合訂

七

侶山堂類辭卷下

清盧子諤輯正

學古診則第一帙

三上

歐書十二種

卷之九

人譜樓文

倡山堂類辨卷下

西陵隱菴道人撰

本草綱領論

錢塘楊元如參訂

天地所生萬物皆感五運六氣之化故不出五氣五味五色五行寒熱溫涼升降浮沉之別經云五味陰陽之用辛甘發散爲陽酸苦湧洩爲陰淡味滲洩爲陽鹹味湧洩爲陰六者或收或散或緩或急或燥或潤或更或堅隨所利而行之此物性之綱領也五氣五味各歸所喜酸先入肝苦先入心甘先入脾辛先入肺鹹先入腎肝色青宜食甘心色赤宜食酸肺色白宜食苦脾色黃宜食鹹腎色黑宜食辛辛散酸收甘緩苦堅鹹更毒藥攻邪五穀爲養五果爲助五畜爲益五菜爲充氣味合而服之以補益精氣四時五藏之病隨五味所宜也又肝苦急急食甘以緩之欲散急食辛以散之用辛補之酸瀉之心苦緩急食酸以收之欲更急食鹹以更之用鹹補之甘瀉之脾苦濕急食苦以燥之欲緩急食甘以緩之用苦瀉之甘補之肺苦氣上逆急食苦以泄之欲收急食酸以收之用酸補之辛瀉之腎苦燥急食辛以潤之潤爲能開發腠理致開發腠理致走骨骨病無多食苦津液通氣也欲堅急食苦以堅之用苦補之鹹瀉之又辛走氣氣病無多食鹹苦走骨骨病無多食苦更極苦走血鹹走骨甘走肉肉病無多食甘酸走筋筋病無多食酸此五味補瀉宜忌之綱領

也。夫百病之生也。不出乎表裏陰陽。寒熱虛實者補之。實者漏之。寒者熱之。熱者涼之。客者除之。勞者溫之。凡甘溫辛溫者從補。結者散之。留者攻之。燥者濡之。急者緩之。散者收之。損者折之。壅者平之。高者抑之。下者舉之。微者逆之。甚者從之上之下之摩之浴之薄之劫之開之發之適事爲故。逆者正治。從者反治。此治病之綱領也。萬物各有自然之性。凡病自有當然之理。卽物以窮其性。卽病以求其理。得其性理。豁然貫通。則天地所生之萬物。人生所患之百病。皆歸一致矣。用之可十可百。推之可萬可千。豈不綽然有餘裕哉。

藥性形名論

按本草綱目。金石草木禽獸果穀。自神農及今。計一千六百餘種。命名之義。各有思存。如黃連白芷青黛元參之類。以色而命名也。甘草苦參酸棗細辛之類。以味而命名也。寒水石溫肺臍火硝香薷之類。以氣而命名也。桑皮橘核杏仁蘇子之類。以體而命名也。夏枯草款冬花長春葵之類。因時而命名也。防風續斷決明益智之類。以功能而命名也。鈞藤兜鉢狗脊烏頭之類。以形象而命名也。命名之義。不能枚舉。施於治道。各有功用。如五氣分走五藏。五味逆治五行。皮以治皮。節以治骨。核以治丸。松節杉節及草根之類。治骨。葛核橘核。子能明目。藤蔓者治筋脈。血肉者補血肉。各從其類也。如水草石草。其性主升。梢杪子實。

其性主降。甘香之品能橫達於四旁。寒熱之氣性浮沉於上下。在土之根荄本乎上者親上本乎下者親下在外之枝幹在根者治本。在枝者行於四支此物性之自然也。又如夏枯之草夏收之朮半夏之生薑麥之成皆得火土之氣而能化土秋英之菊秋鳴之蟬感金氣而能制風凌冬不凋者得寒水之氣而能清熱先春而發者秉甲木之性而能生升此感天地四時之氣而各有制化也。甘溫者補苦寒者瀉色赤者走血色白者走氣赤圓者象心白瓣者象肺紫尺者益脾香圓者入胃徑直青赤者走肝雙仁圓小者補腎以形色之相類也藏詳金匱要略陽者主上陰者主下陰中之陽升陽中之陰降輕清者主上重濁者主下濁中之清升清中之濁降凡物感陰陽之氣而生各有清濁升降之質性者也。又如山梔炒黑而降黑豆黃卷而升紅艷生血神艷化杭此假造釀而得化功者也。因名而取實因象以用形得其性之升降浮沉氣之溫涼寒熱色之青黃赤白味之甘苦酸辛一千六百餘種大概不越乎此矣。

草木不凋論

草木寒不黃隕及花發於冬者得冬令寒水之資也。木生於水水通於天水火相濟水由地行水氣之通於四藏者也。如麥門冬款冬花枇杷葉側柏葉山豆根巴戟天之類腎之肺藥也黃連菖蒲山梔南燭茶花梅花之類腎之心藥也厚朴豆蔻丁香枳橘之類腎之脾藥也蘭桂筆竹蜜蒙花女貞實之類腎之肝

藥也。夫腎爲水臟。受藏五臟之精。而復退出於四臟。入肝爲淚。入心爲血。入脾爲涎。入肺爲涕。上下交通。而外注於九竅。是以得寒水之草木。能啟陰氣。上滋四臟。復能導四臟之氣。而下交於陰。又則獨腎氣之通於四臟。五臟之氣。皆相貫通。而藥性亦然。如棗仁。脾之心藥也。石斛。脾之腎藥也。芍藥。脾之肝藥也。柔皮。脾之肺藥也。類而推之。總不出五行之生化。

四氣逆從論

經云。升降浮沉。則順之。寒熱溫涼。則逆之。謂春宜用升。以助生氣。夏宜用浮。以助長氣。秋時宜降。以順收令。冬時宜沉。以順封藏。此藥性之宜順四時者也。春氣溫。宜用涼。夏氣熱。宜用寒。秋氣涼。宜用溫。冬氣寒。宜用熱。此用氣之宜逆四時者也。而病亦如之。然時氣病氣。又皆有常。有變。知其常。變。反其逆從。可以把握。陰陽裁成造化矣。

大棗

棗色黃味甘。脾家果也。夫木末之實。而爲心家果者。生化之道也。木末之實。而爲脾家果者。制化之道也。蓋天地所生之萬物。咸感五運六氣之生化。明乎陰陽生克之理。則凡物之性。可用之。而生化於五藏六腑矣。○元如曰。桃爲肺之果。核主利肝血。杏爲心之果。核主利肺氣。亦制化之理然與。

梔子

梔子冬不隕葉。五月感一陰之氣。生花六出潔白芬香。得金水之氣也。其實結於枝梢。圓小赤色。味苦性寒。乃陰中之陽腎之心品也。故炒黑而成離中之虛。導心火以下交於腎。○元如曰。大者陰之終也。花多五瓣。如雪花。梔子花玄精石皆感陰氣生成。

枇杷

枇杷四季長青。葉上多毛。凡草木之生毛者皆主治肺。多刺者花開於秋者皆得堅金之氣而能制風。枇杷初秋結蕊。深秋放花。夏時果熟。又得冬令之氣。能引寒水以上滋利肺氣以下降。故主治欬嗽卒呃。并下氣消痰。

款冬花

款冬花氣味辛溫。生於關中及雍州山谷溪水間。冬時發條結蕊於冰雪中。故名款冬。西北氣寒。冰雪至夏不消。款冬辛溫。可為大土人謂之看燈花。又曰敵冰取款冬。謂在正月前半月採之。如過元宵燈節。花即大放矣。此陰中熱者矣。土人謂之看燈花。又曰敵冰取款冬。謂在正月前半月採之。如過元宵燈節。花即大放矣。此陰中之陽升也。如形寒飲冷。肺氣虛寒作喘者宜之。若陰火上炎。肺燥焦渴。恐益謂燥毀傷矣。

澤瀉

澤漏水草也。凡水草石草皆屬腎。其性主升。蓋天氣下降。地水之氣上升。自然之理也。凡物之本乎上者。性升。本乎下者。性降。澤漏形圓。無下行之性矣。春時叢生苗於水中。獨莖直上。秋時白花作叢。腎之肺品也。易曰。山澤通氣。能行在下之水。隨澤氣而上升。復使在上之水。隨氣通調而下漏。故名曰澤漏。○元如曰。如何首烏形圓莖蔓。其性惟升。牛膝形細而長。其性惟下。故主治在下。諸品可類推之。

芍藥

芍藥氣味苦平。苦走血。故爲血分之藥。苦下洩。故本經主邪氣腹痛。除血痹。破堅積寒熱。因其破洩。故太陰篇云。太陰爲病。脈弱。其人續自便利。設當行大黃。芍藥者。宜減之。以其人胃氣弱。易動故也。今人咸云。芍藥主酸斂。而不知有大黃之功能。○元如曰。芍藥乃神農中品之藥。本經曰。氣味苦平。後人增曰。酸而實未嘗酸也。盧子由曰。市肆一種赤芍藥。不知爲何物。草根見醫癒醫多用之。此習已而不察。其爲害殊甚。

牡丹皮

牡丹皮色赤。氣味辛寒。血分之藥也。不緣子生。故名曰。牡陰中之陽升也。其味辛。故主發散中風寒。熱邪氣除。癰瘍。寒能涼血。故主癰瘍燒爛。凡骨蒸勞熱。癰腫瘡瘍。丹皮爲要藥。若吐血。衄血。大非所宜。以其上升故也。○元如曰。若因風寒而衄血者。宜之。如陰火上炎者。大忌。

插樓

凡草木之根。其性上升。梢杪子實。性復下降。物之理也。括樓蔓延。結實則根粉盡。消黃赤而子白潤。氣味苦寒。是以天花粉能散陰液以上滋於心肺。括樓實復能導心肺之氣以下行。故本經主治胸痹。○元如曰。如蘇子。蘿葡子。白芥。雲苓之類。性皆下行。所謂上行極而下也。

麥芽

麥春長夏。成得木火之氣。故爲肝之穀。透發其芽。能達木氣。以制化脾土。故能消米穀之實。經云。食氣入胃。散精於肝。淫氣於筋。人之飲食不化。而成反胃。咽膈者。多因肝氣鬱怒所致。予治此證。於調理脾胃藥中。倍加麥芽。多有應手。蓋醫者。但知消穀。而不知疏肝。○玉師曰。可類推於穀芽。黍芽。大豆黃卷。

薯蕷

薯蕷古名也。避唐宋帝諱。改名山藥。種植之法。切作薄片。隨所杵之竅而長之。盧子由先生治一血利久矣。山藥隨所杵之竅而長滿。性能塞管用。又百合之白花者。摘碎埋於土中。一瓣卽生百瓣。而成一蒲。夫凡物切碎。皆成腐穢。二品所生之異。蓋得本體之精。感氣化而生長。山藥肉內多涎。仲景用百合湯。以水浸一宿。出其白沫涎沫。乃其精也。氣生於精。二品得精氣之盛。故主補中益氣。長肉強陰。○元如曰。凡物。

多精汁者皆主養精補血益氣生肌。

枸杞

神農本經總名枸杞。無地骨皮枸杞子之分。蓋枸杞字諧狗杞字諧己。狗屬戌而戌主右腎。腎主骨而已。屬陰土故有地骨之名。而久服能堅筋骨。氣味苦寒能清熱中消渴。蓋能助水土之氣上滋心肺者也。其子色赤性寒能補兩腎之精氣。骨之精爲瞳子。故助瞳子之光明。

紅花

紅花色赤多汁。生血行血之品也。陶隱居主治胎產血葷。惡血不盡絞痛。胎死腹中。金匱方紅蘭花酒治婦人六十二種風。又能主治痃癥。臨川先生曰。治風先治血。血行風自減。蓋風乃陽邪。血爲陰液。此對待之法也。花葉莖葉且多毛刺。具堅金之象。故能勝制風木。夫男女血氣相同。仲祖單治婦人六十二種風者。良有以也。蓋婦人有餘於氣不足於血所不足者。乃衝任之血散於皮膚肌腠之間。充膚熱肉。生毫毛。男子上唇口而生髭鬚。女子月事以時下。故多不足也。花性上行。花開散蔓。主生皮膚間散血。能資婦人之不足。故主治婦人之風。蓋血虛則皮毛之腠理不密。而易於受風也。此血主妊娠。故事治胎產惡血。樞經云飲酒者。衛氣先行皮膚。故用酒煎以助藥性。癰邪亦伏於募原之腠理間。故能引其外出。夫血有。

行於經脈中者有散於皮膚外者而所主之藥亦有不同如當歸地黃茜草之類主養脈內之血者也紅蘭花主生脈外之血者也川芎芍藥丹皮紅薑之類又外內之氣劑也學者能體認先聖用藥之深心思過半矣

石膏

石膏氣味辛甘微寒神農本經主中風寒熱心下逆氣驚喘口乾舌焦不能息腹中堅痛除邪鬼產乳金瘡仲景用麻黃配石膏能發陽明水液之汗白虎湯解陽明燥熱之渴又主風熱發斑是神農仲景皆用爲發散之品蓋氣味辛甘而體質疎鬆如肌理但其性沉重色白若金故直從陽明而達於外也後人咸謂清內熱而主降下乃不明經義物性故耳夫凡物有可升可降者配發散之藥則升配破洩之藥則降如厚朴之氣味苦溫本經主中風傷寒頭痛寒熱乃發散之藥也仲景承氣湯配枳實大黃芒硝爲急下之劑經云酸苦湧泄爲陰蓋酸苦之味能上湧而下洩也同升藥則升同降藥則降立方配合乃醫家第一義誰可忽諸

女貞寶

女貞子乃本經上品氣味苦平主補中安五藏養精神除百病久服肥健輕身不老強陰健腰膝變白髮

明目卽蠟樹也。立夏前後取蠟蟲種子。裹置枝上。半月後其蟲化出。延緣枝上。造成白蠟。堅白如凝脂。猶蠶食桑而成絲。連綿溫煖。皆得樹質精華。是以桑根白皮主傷中。五勞六極。羸瘦崩中。絕脈補虛。益氣。女貞雖與冬青同名。其種實異。冬青名凍青。葉微圓。子赤色。蟲不造蠟爲別也。世俗混用凍青實一物。功用迥別。采擇者不可不辨。

蓮實

蓮子本經上品。氣味甘平。主補中養神。益氣力。除百疾。久服輕身耐老。不飢延年。夫蓮莖色青味澑。中通外直。具風木之象。花紅房白。鬚黃子老而黑。有五行相生之義。故能補五臟不足。五臟主藏精者也。腎爲水臟。受藏五臟之精。石蓮子色黑味澑。故用之以固精氣。今市肆一種。狀如土石。味極苦澑。不知爲何物。盧子由先生曰。食之令人腸結。宜於建蓮子中揀帶殼而色黑者爲是。有云假石蓮子乃樹上

桑上寄生

桑寄生生於近海州野。及海外之境。地暖不蠶。桑無剪採之苦。氣厚意濃。氣之鳥食榕實。蕊落桑上。乘氣而生榕。乃易生之木。枝葉下垂。卽生根作本。故其樹極大。多生於海山中。是以子附於桑。則爲桑上寄生。蓋感桑之精氣。故其功力一本於桑。若寄生他木上者。不惟氣性不同。且反生災害矣。今市肆者。乃柴枝。

也有一種色黃而脆狀如金釵石斛者庶幾可用。寇宗奭曰予從官南北徧搜不可得故非親採難以別真僞。要知市賣者皆僞也。予故以依附桑上之藤葉如三角楓者取之安胎甚效。蓋亦得桑之精氣者也。

紫草茸

按本草綱目紫草發明下李時珍曰紫草氣味苦寒如痘疹欲出未出血熱毒盛大便閉滯者宜之已出而紫黑便閉者亦可用若已出而紅活及白陷大便利者切宜忌之。直指方云紫草治痘能導大便使發出亦輕。活幼新書云紫草性寒小兒脾氣實者猶可用脾氣虛者反能作濁故古方惟用紫草茸取其初得陽氣以類觸類所以用發痘瘡今人不達此理一概用之非矣夫所謂茸者卽初生之蒙茸非紫草之外另有茸也又有如麒麟竭者謂之紫草茸非也乃紫鉢耳。酉陽雜俎云紫鉢樹出眞臘波斯二國樹高盈丈枝葉鬱茂經冬不凋天有霧露及雨沾濡則枝條出鉢狀如糖霜紫紫紫赤破則鮮紅能出痘毒此物產於異域殊不易得近有市利之徒以僞物假充索價甚厚非徒無益而反害之不若用草之爲當也。

枳實

考工記云橘逾淮而北爲枳蓋橘得江南溫熱之氣故氣味辛溫能達中土之氣通瀆於四旁枳乘江北寒涼之氣性味苦寒能去寒熱之邪下洩是一物而性不同因天地之氣也本經主大風在皮膚中如麻

豆苦癘者能散寒水之發以對待其陽邪。夫橘至成熟而後採摘天氣充滿故能橫徧於四體枳乃初生之小者其氣收斂故專主下泄若夫枳殼之苦洩其性又能橫充所以本經止云實而無殼至宋時始有殼實之分如病胸腹實而當下者應用實而以殼代之乃識見淺而無力量處。

橘皮

橘皮臭香色黃味甘而帶辛甘香黃主土辛主金夫胃土主脈絡胃又屬陽明秋金其色白脾土主肌肉肺金主皮毛橘皮在內之白膜如胃府所主之絡脈皮內之白若肌肉皮外之宗眼如毛孔是從中達外由脈而絡絡而肌肌而皮也橘皮能宣發陽明之汗解胃氣之逆呃蓋能宣達胃氣外出於皮毛若夫皮腠之邪逆於內而爲喘急膈上之痰結於上而爲咳嗽欲消痰降氣而從下解者是又從肌而絡絡而脈脈而胃也是邪正之氣欲出欲入而用橘皮爲導引者皆藉皮內之白膜如去其膜白則斷截出入之道路故本經止曰橘皮而並無留白去白之分。

麥門冬

經云人之所受氣者穀也穀之所注者胃也胃者水穀血氣之海也海之所行雲氣者天下也胃之所出血氣者經隧也經隧者五藏六府之大絡也是藏府受水穀之精氣由胃府之大絡通於藏府之經麥門

冬主傷中傷館。胃絡脈絕。以其根鬚從中而貫。如絡脈之貫於募原之中。是通胸絡之氣。藉中心之貫通也。麥冬經冬不凋。能散陰氣。上滋於心肺。故主心腹結氣。咳嗽虛勞。腎脈上貫肝膈。入肺中。從肺出絡心。是腎氣之土。交於心肺。心肺之痰熱。欲從下解者。又咸藉麥冬之心。而導引於脈中也。蓋凡物之寒涼者。其心必熱。熱者陰中之陽也。人但知去熱。而不知用陽。得其陽。而後能通陰中之氣。

防己

經云。水道不行。則形氣消索。是水有隨氣而運行於膚表者。有水火上下之相濟者。如氣滯而水不行。則爲水病。痰病矣。防己生於漢中者。破之。紋作車輻。莖蔓空通。主通氣行水。以防己土之制。故有防己之名。金匱方治水病。有防己黃耆湯。防己茯苓湯。治痰飲。有木防己湯。防己加茯苓硝湯。孫思邈治小便閉澀。有三物木防己湯。蓋氣運於上。而水能就下也。今相沿爲下部之藥。緣前人創論於前。後人隨文附會爾。果曰。防己如瞞健之人。幸災樂禍。首爲亂階。若善用之。亦可敵兕突瞞。此眩眩之藥也。故聖人存而不廢。如上焦氣分之病。皆不可用。乃下焦血分之藥耳。噫。如此議論。不知從何處參出。夫氣化而後水行。防己乃行氣利水之品。反云上焦氣分不可用。神農本草分上中下三品。以養生補益。延年不老者爲上品。治病者次之。毒藥爲下。防己能運行去病。是運中有補。故本經列於中品之前。奚爲存而不廢。且氣味辛

平無毒奚爲瞑眩之藥。如此議論不能枚舉。無裨治道。反疑惑後學。予觀今世惟盧子田先生學識淵博。惟宗聖經。獨不爲前人所鼎。

附子

附子如芋。子附母生。故名附子。旁之小子曰側子。土人欲重其斤兩。用木坯將側子敲平於上。然母子之體不相合。故須揀子之少者。又當估去小子。有一兩餘方可。用若連子而重一兩五六錢。更爲有力。近時俗人。咸謂一兩外者爲天雄。不知天雄長三寸以上。旁不生子。故名曰雄。土人尤忌生此。以爲不利。卽禳禱之。謂其不能子母之相生也。今人多取重一兩者。若側子多而去其二三錢。則母身止重七八錢之川烏矣。此緣失於考究。故沿襲時俗之說。又如附子之尖。乃下行之根。其性趨下。有欲治上而用其尖者。類倒物性。尤爲可笑。

丹雄雞

羽蟲三百六十。乘火運而生。故飛翔於上下。雞在卦屬巽。冠羽皆丹。感木火之氣者。也在支屬酉。又得金之制化。故鳴於寅酉二時。鳴則先鼓其翼。風之象也。鳴者金之聲也。五師曰木其性好動。秉肅殺之氣也。蓋主女子崩中漏下赤白。蓋崩中漏下。肝主之血也。夫凡物各有自物之性。得其物性。施於治道。若合符

歸故舉一以推之。

黑豕

猪屬亥水之畜也。故氣味鹹平。豕性甚躁。躁屬陰證行不舉足而惟奔。故無病之人食之補腎生精。如感於風寒者食之生痰發喘。以其善奔水氣於上也。按毛蟲三百六十感木氣而生。而牛羊犬馬又秉火土之化。豕屬水而性寒。羽蟲感火氣之化。而生長於水中者。又居其半。鵝鴨鳬鷺之類生長於水中蓋五類之蟲。雖感五行之氣而生。而五行之中有變。有化。明乎變化之道。可與參天地之生物矣。

鱗類

鱗蟲三百六十而龍爲之長。感水運而生水者至陰也。陰極陽生。故戊癸合而化火。火生於水也。玉師曰龍身有火是以魚屬火而有水火相濟之功。

蚌蛤

介蟲三百六十皆具堅甲之象。感金氣而生金。生水也。外剛內柔離之象也。故蚌蛤之肉皆主清涼在外之殼。又能燥濕。是一物而有水火寒熱之分焉。非惟蚌蛤之爲然也。如坎爲水。水生木。其於木也爲堅多心。是木皮之清涼者。其心則熱。又非惟木之爲然也。凡物之極寒者必有熱。極熱者必有寒。蓋物極則變。

變則生化。○玉師曰：如麻黃大發汗而根節又能止汗。西瓜大涼而子性大熱。

血餘

腎藏精。其榮在髮。心主血。髮乃血之餘也。夫血乃所生之精汁。奉心神而化赤。故曰血者神氣也。本經髮鬚主五癥。鬚格不通。療小兒驚。大人瘧。仍自還神化。謂血化之餘榮。仍自還於神化也。血脈流通。精神交感。則關格通。而驚瘧自解。是以痘方用血餘者。取其能導腎精中之毒氣歸於心神。行於脈絡。而又能敗毒。

龜板鹿茸

李時珍曰：龜鹿皆靈而有毒。龜首常藏向腹。能通任脈。故取其甲以補心。補腎。補血。皆以養陰也。鹿尾常反向尾。能通督脈。故取其角以補命。補精。補氣。皆以養陽也。乃物理之玄微。神工之能事。按任脈起於中極之下。以上毛際。循腹裏。上闕元。至咽喉。上頤循面。督脈環遶一身。循腰脊。歷絡兩腎。龜板治小兒顛不
合。鹿茸主生齒不老。蓋二品皆屬於腎。腎主骨也。任督二脈為陰陽百脈之宗。又皆出於腎。故痘方用之者。一取其養陰而清熱。一取其透頂以敗毒。導腎中之火毒。從百脈而外出於皮膚。故主治四肢重弱。○

上古卜葬烹而用之。若敗龜板者乃病死枯敗之物。絕無靈氣。又何所取焉。

半夏天花粉

月令五月半夏生。當夏之半也。其形圓。其色白。其味辛。陽明胃府之藥也。陽明秉秋金之燥氣。半夏取一陰之氣。上與戊土相合。戊癸合而化火。故陽明爲燥熱之府。能化水穀之精微。天花粉別名瑞雪。根粉潔白。氣味苦寒。莖引藤蔓。能散陰液。從脈絡而上滋於秋金。走經脈者。故有天花瑞雪之名。蓋水陰之氣。上凝於天而爲雪。天花者。天雨之六花也。一起陰氣於脈外。上與陽明相合而成火土之燥。一起陰液於脈中。天癸相合而能滋潤其燥。是以傷寒金匱諸方。用半夏以助陽明之氣。渴者燥熱太過。卽去半夏。易花粉以滋之。先聖賢立方加減。豈輕忽歟。

百合紫蘇

庭前植百合紫蘇各數莖。見百合花晝開夜合。紫蘇葉朝挺暮垂。因悟草木之性感天地陰陽之氣而爲開闔者也。如春夏長秋成冬。四時之開闔也。晝開夜合。朝出暮入。一日之開闔也。是以一歲之中有四時。一日之中有四時。而人物應之。百合色白氣平。其形象肺。能助呼吸之開闔。故主邪氣腹脹心痛。蓋氣行則邪散而脹痛解矣。主利大小便者。氣化則出也。主補中益氣者。氣之發原於中也。蘇色紫赤枝莖空通。其氣朝出暮入。有如經脈之氣。晝行於陽。夜行於陰。是以蘇葉能發表汗者。血液之汗也。赤走氣分

枝莖能通血脈。故易思蘭先生常用蘇莖通十二經之關竅。治咽膈飽悶。通大小便。止下利赤白。予亦常用香蘇細莖。不切斷。治反胃脹食。吐血。下血。多奏奇功。蓋食氣入胃。散精於肝。潤氣歸心。肝主血。而心主脈。血脈疎通。則飲食自化。經云。陽絡傷則吐。陰絡傷則下。血通其絡脈。使血有所歸。則吐下自止。夫茜草歸萼之類。皆能引血歸經。然不若紫蘇。晝出夜入之行速耳。於戲。陰陽開闔。天地之道也。進乎技矣。

羌活防風

按神農本草三百六十種。以上品一百二十種爲君。中品一百二十種爲臣。下品一百二十種爲使。羌活防風。皆本經上品。有謂羌活治一身盡痛。乃却亂反正之君。主防風治一身盡痛。乃卒伍卑賤之職。隨所引而至。噫。神農列於上品之君。後人改爲卑賤之卒伍。何防風之不幸也。夫君令傳行。亦隨郵使所引。徧及萬方。若以隨所引至爲卑賤。則羌活亦可爲卒伍矣。如此議論。雖不大有關係。但使後人從而和之。則陋習終不可挽回矣。

雞子金銀花王不留行

天地之形如鳥卵。仲景即以雞子白補氣。卵黃治血脈。金銀花。花開黃白。藤名忍冬。得水陰之氣而蔓延。幽隱君謂能行榮衛陰陽。主治寒熱腹脹。敗毒消腫。蓋榮衛行而寒熱脹脹自消。得陰氣而熱毒自解。故

又治熱毒下痢。飛尸鬼疰。喉癰乳鵝王不留行亦花開黃白。故名金盞銀臺。其性善行。言雖有王命不能留其行也。陶隱君亦取其能行氣血。主治金瘡癰腫。痛癆癰瘍。下乳汁。利小便。出竹木刺。去血氣。留阻百病。皆生榮衛。運行精神。自倍。故二種皆爲上品。並主輕身耐老。益壽延年。雞卵用形。二花取色。一因其延蔓。一取其善行。夫醫者意也。本草大義。亦以意逆之。則得矣。○開之曰。人但知金銀花敗毒消腫。不知有行榮衛血氣之功。得冬令寒水之氣。

沙參人參黃耆

沙參人參黃耆。皆神農本經上品。咸。主。補。養。元。氣。沙參色白。氣味甘苦微寒。主補中。益肺氣。養胃府所生之宗氣。上出於肺。以司呼吸。人一呼則八萬四千毛竅皆閑。一吸則八萬四千毛竅皆開。故肺主皮毛。補中者。宗氣生於胃府也。人參色白微黃。氣味甘溫。資胃府之精氣者也。故主補五藏。安精神。定魂魄。止驚悸。除邪氣。明目。開心益志。蓋五藏之精氣。神志。胃府之所生也。黃耆色黃。氣味甘溫。補益脾氣者也。脾氣者。元真之氣也。元真者先天之真。三焦通會。元真於肌腠。故脾主肌肉。黃耆主癰疽久敗。排膿止痛。大風癩疾。五痔鼠瘻。補虛小兒百病。蓋血氣留滯於肌肉。則爲癰腫。肌腠之氣運行。則肌肉生而膿腫消矣。大風癩疾。乃風邪傷榮。而熱出於附肉。其氣不清。故使其鼻柱壞而色敗。皮膚瘍潰。經云。腸澼爲痔。蓋

脾氣孤弱。五液注下。則生痔漏。鼠瘻者。邪氣陷於脈中。而爲瘻。留於肉腠。則爲馬刀。俠廻。蓋脾土盛。而元氣行。則癰瘻諸病皆解矣。補虛者。補肌肉羸瘦也。主小兒百病者。小兒五藏柔脆。中土之氣未足。若過於飲食。則脾氣傷。而不能運化矣。脾弱則胃強矣。胃強則消穀善飢。脾弱則肌肉消瘦。胃熱則津液不生。而熱疳食疳之病生焉。是以黃耆白朮黃連枳實。爲小兒之要藥。蓋清其胃熱。脾氣運行。則無五疳五瘻之病矣。腠理固密。則無急慢驚風之證矣。三者皆補中之品。而各有所主之分。按本草千種有奇愚所論者。錯綜辨證。百不及一。同志高明。引伸觸類。一可貫。十可驟。百至參閱。前人議論。是則曰是。非則曰非。闡先聖之奧義。以開來學。是予所深望焉。

薑附辯

乾薑甘草人參白朮黃耆。補中氣之品也。是以吐傷中氣者。用理中圓。乃人參甘草乾薑白朮四味。附子乃助下焦之生氣者也。是以手足厥冷。脈微欲絕者。用四逆湯。乃附子乾薑甘草三味。夫取下焦之生氣者。宜生附。補下焦之元氣。或汗漏不止。而陽欲外脫者。宜熟附。以固補之。蓋元氣發原於下。從中焦而達於四肢。故生氣欲絕於下者。用下焦之附子。必配中焦之甘草乾薑。或加人參白朮。若止傷中氣而下焦之生原不傷者。止用理中。而不必附子矣。不格物性中下之分。不體先聖立方之意。有以生附配乾薑補。

中有發附子得生薑則能發散之說者。有以附子無乾薑不熱得甘草則性緩之說者。蓋以薑附爲同類。疑惑後人誤事匪細。如生氣欲絕於下。所當急溫者。若不用附而以薑試之。則不救矣。○元如曰。不敢用附。而先以桂代之者。亦誤事不淺。

炮製辨

上古以司歲備物。謂得天地之事精。如君相二火司歲。則收取薑桂附子之熱類。如太陽寒水司歲。則收取芩連大黃之寒類。如太陰土氣司歲。則收取者尤參芩山藥黃精之土類。如厥陰風木司歲。則收取羌活防風天麻獨活之風類。如陽明燥金司歲。則收取蒼朮桑皮半夏之燥類。蓋得主歲之氣。以助之。則物之功力倍厚。中古之世。不能司歲備物。故用炮製以代天地之氣。如製附子曰炮。製蒼朮桑皮曰炒。蓋以火助熱。以炒助燥也。製白朮以土拌。製黃連以水浸。皆所以助之也。近有製附子以水煮曰陰。製用芝麻炒朮。以蜜拌桑皮曰潤。以薑酒炒芩連。按傷寒金匱諸方。芩連俱生用。以半夏作麵餅。此皆由狐疑而無力量故也。昔齊相徐之才論藥。有宣通補洩輕重滑滯燥濕之十劑。元人王安道。補出寒熱二種。是宜用寒者專取其寒。用熱者專取其熱。宜澀者專取其燥。宜洩者專取其滑。若反制其性而用之。何異束縛手足而使之戰鬪哉。

畏惡反辯

藥之相須。相使。相惡。相反。出北齊徐之才藥對。非上古之論也。聿考傷寒。金匱。千金諸方。相畏。相反者多。並用。有云相畏者。如將之畏帥。勇往直前。不敢退却。相反者。彼此相忌。能各立其功圓機之士。又何必膠執於時襲之固陋乎。

奇偶分兩辯

至真要論曰。近者奇之。遠者偶之。汗者不以奇。下者不以偶。夫近奇遠偶者。謂奇上而偶下。猶天地之定位也。下宜奇而汗宜偶者。以降者謂天。升者謂地。地氣升而後能爲雲。爲雨也。天天地陰陽之道。天氣下降。氣流於地。地氣上升。氣騰於天。不則天地四塞。而汗從何來。有不明天地氣交之道者。泥於近奇遠偶之句。反改爲汗不以偶。下不以奇。此不通之甚也。大要曰。君一臣二。奇之制也。君二臣三。偶之制也。君二臣三。奇之制也。君二臣六。偶之制也。近而奇偶制小其服。遠而奇偶制大其服。大則數少。小則數多。多則九之少。則二之蓋。數少而分兩重者爲大方。數多而分兩少者爲小方。是以上古之方。少者一二三味。其分兩者。三兩。四兩。多者不過八九味。分兩亦各有兩數。古之二兩。今皆有君臣佐使之分焉。有獨贊東垣。能用大方。如韓信將兵。多多益善。噫。此但知有東垣。而不知有內經者也。夫東垣之大方。不過以數方合。

用是爲複方。如清暑益氣湯以補中益氣湯內加二妙生脈二方焉能如先聖之大方乎。間或用之試觀鱗甲煎丸用至二十四味其間參伍錯綜如孔明陣圖人莫能識。

寒熱補漏兼用辯

夫治病有專宜於寒者。熱者。補者。漏者。又宜寒熱補漏之兼用者。如傷寒有附子漏心湯。用大黃芩連附子。寒熱之並用者。有柴胡加龍骨牡蠣湯。以人參大黃芩桂枝。補漏寒熱之並用者。金匱有大黃附子細辛湯。有大黃乾薑巴豆之備急丸。此皆先聖賢切中肯綮之妙用。當參究其所用之因而取法之。今時有用涼藥而恐其太涼。用熱藥而恐其太熱。是止知藥之寒熱。而不知病之邪正虛實也。然亦有並用寒熱補漏而切當者。反爲不在道者笑之。○開之曰。寒熱補漏兼用在邪正虛實中求之則得矣。

官料藥辨

所謂官料藥者。乃解京納局之高品。近時有謂火痺黃疸腫脹諸證。不宜服官料藥者。眞齊東野人之語也。夫官料亦多係草根木皮。又何分草藥之非官料。而官料之非草藥乎。夫草藥自神農至今。計六百一十餘種。又雜草九種有名未用者。一百五十三種。內多有名而不識其草者。有草而不知其名者。若按圖經以對草之形。以草之主治何病以對。經未嘗不可。若憑荷擔之野人在彼亦不能識。而胡亂以命名。即

欲按經索草。彼亦胡亂付之。在所取之人。亦不知其是與非也。是烏可嘗試哉。

金匱腎氣丸論

腎氣丸乃上古之聖方。藏之金匱。故名金匱方。夫。人。秉。先。天。之。陰。陽。水。火。而。生。木。火。土。金。之。五。行。此。方。滋。補。先。天。之。精。炁。而。交。通。於。五。臟。故。名。腎。氣。丸。用。熟。地。黃。八。兩。以。滋。天。乙。之。精。八。者。男。子。所。得。之。陰。數。也。用。附。子。一。枚。重。一。兩。者。以。資。地。二。之。火。兩。爲。陰。數。之。終。一。乃。生。陽。之。始。助。陰。中。所。生。之。陽。蓋。兩。腎。之。水。火。互。交。陰。陽。相。合。是以。用。地。黃。附。子。以。助。先。天。之。水。火。精。炁。者。也。用。桂。通。腎。氣。以。生。肝。桂。色。赤。而。爲。百。木。之。長。肝。主。血。而。屬。木。也。古方原用桂枝用牡丹皮通腎氣。上。交。於。心。脾。丹。屬。火。而。主。血。牡。乃。陰。中。之。陽。升。也。夫。腎。與。肺。皆。積。水。也。澤。漏。能。行。水。上。復。能。漏。水。下。行。主。通。水。天。之。一。然。是以。配。肉。桂。丹。皮。澤。漏。者。導。腎。臟。之。水。火。上。交。於。四。臟。者。也。茯。苓。歸。伏。心。氣。以。下。交。山。藥。培。養。脾。土。以。化。水。山。茱。萸。乃。木。末。之。實。味。酸。色。赤。復。能。導。肝。氣。交。通。於。腎。是以。配。茯。苓。山。藥。山。萸。澤。漏。者。導。四。臟。之。氣。而。下。交。於。腎。也。心。肺。爲。陽。故。用。三。兩。之。奇。肝。脾。爲。陰。故。用。四。兩。之。偶。此。培。養。精。神。氣。血。交。通。五。藏。五。行。之。神。方。不。可。缺。一。者。也。宋。錢。仲。陽。以。爲。陽。常。有。餘。陰。常。不。足。去。桂。附。而。改。爲。六。味。地。黃。丸。夫。精。血。固。宣。補。養。而。神。炁。可。不。資。生。乎。後。人。因。而。有。加。知。母。黃。柏。者。有。加。枸。杞。菊。花。者。有。加。麥。冬。五。味。者。竟。失。本。來。面。目。矣。夫。加。減。之。法。因。陰。虛。火。盛。之。人。以。之。治。病。則。可。

若欲調攝陰陽存養精氣和平水火交通五行益壽延年神仙不老必須恒服此金丹矣○元如曰精生於五藏而下藏於腎腎氣上升以化生此精是以五藏交通而後精氣充足

枳朮湯論

金匱要略用枳朮湯治水飲所作心下堅大如盤蓋胃爲陽脾爲陰陽常有餘而陰常不足胃强脾弱則陽與陰絕矣脾不能爲胃行其津液則水飲作矣故用朮以補脾用枳以抑胃後人不知胃强脾弱用分理之法咸謂一補一消之方再按局方之四物湯一陳湯四君子湯易老之枳朮丸皆從金匱方套出能明乎先聖立方大義後人之方不足法矣

膠艾湯論

艾名冰臺削冰令圓以艾向日取火是能啟兩腎水火之氣上交於心肺者也故曰陷下阿膠用阿井水則灸之則交於兩腎者也水火交而地天泰則血氣流行陰陽和合又何病之有明乎陰陽升降之道五行生化之理立方大意思過半矣鐵壘申先生之交感丸亦從此中化出

戊癸合化論

順治辛卯歲予年四十有二八月中生一胃脘癰在鳩尾斜下右寸許微腫不紅按之不痛隱隱然如一雞卵在內姚繼元先生視之曰此胃脘癰也一名搥心癰速宜解散否則有性命之憂與一大膏藥上加末藥三錢午間烘貼至暮手足痺軟漸至身不能轉側仰臥於書齋心煩意亂屏其家人至初更時癰上起一毒氣從左乳下至肋下脇入於左腎入時如燒錐刺入眼中一陣火光大如車輪神氣昏暈痛楚難言火光漸搖漾而散神昏始蘇過半時許其氣復起其行如舊痛楚如前如此者三四次予思之此戊與癸合也然腑邪入藏自分必死妄想此毒氣不從脇下入腎得從中而入於腸胃則生矣如此靜而行之初次不從二次卽隨想而仍從左乳下入於腸中腹中大鳴無從前之痛楚矣隨起隨想因悟修養之道氣隨想而運用者也運氣法大能起鬱隔至天明大泄數次胸膈寬疎繼元先生復視之曰毒已解散無妨事矣予因問曰膏藥乃毒藥耶曰非也上撒之末藥名曰端午藥純用砒霜巴豆於端午日配制無毒矣膏藥攻疾有如此之妙也至次年中秋復發仍用膏藥末藥毫無前番之狀而腫亦不消予因想運氣之妙經行坐臥以手按摩意想此毒氣仍歸腸胃而出如此十餘日而散至次年中秋又發予對繼元先生曰去歲膏藥不應今須另法治之姚曰部院劉公之夫人生此毒曾另置末藥比前藥更毒貼之要

起大泡此藥用去無有不應。貼上數日並不起泡腫亦不消。予想此證已頑不受毒藥之制。管藥尚不外病乎。卽揭去膏藥用大艾圓迎頭灸九壯其毒隨火氣四散嗣後永不發矣。予想陽明之毒準在中秋金旺之時而發初從毒攻而解次隨氣運而散後因勝制而消因悟氣運制化之道有如此之妙用五行合化之理人與天地相參卽以此理推治百病奇妙異常王紹隆先生曰業醫人須病經過始得之矣。

太陰陽明論

三陰三陽者天之大氣也五藏六府者有形之五行也。胃屬土而陽明主秋令之燥陽明者胃之悍氣別走陽明猶膀胱乃津液之府而太陽之氣爲巨陽五行六氣之有別也。夫兩陽合明故曰陽明陽盛之氣也。故胃土之氣柔和土主柔順而陽明之氣燥熱是以陽明得中見少陰之漏化則陰陽相和矣。胃土得戊癸之合則火土之氣盛矣。故陽明之氣宜於和柔胃土之氣宜於強盛如火土之氣弱而又秉太陰之漏則水穀不消而爲虛泄矣此宜人參橘皮甘草半夏之類以助胃白朮蒼朮厚朴茯苓薑棗之類以益脾甚者加附子以助癸中之火若陽明悍熱之氣盛而不得太陰之化則陽興陰絕漸能食而瘦矣此又宜黃連枳實之類以抑胃者朮薑棗之類以扶脾易老東垣以枳朮丸爲半補半消之法皆不得五行六氣之理先聖立方之意。

蛻蟲

余於南軒臨窗註書，十有餘歲矣。自晨至暮，未嘗離此窓前，增砌雖小，而甚清潔。每於夏月大風雨後，即有蛻蟲如拇指大者，蝸牛如田螺者，生長極易。此感天地之風濕而生，所謂四生中之濕生也。人秉天地之五行六氣而生，身中亦具此六氣。如傷寒病在厥陰，感厥陰之風氣，而蛻生於中土，蓋亦因風濕所生。一時卽能長大，亦如蚰蜒之易生易大者也。又常聞人之藏府與猪相似，余因見剖猪處，稍住足觀之，偶見一猪小腸內有蛻蟲長尺許，盤旋於內，與人之蛻蟲無異。要知人病蛻厥作痛，或常吐蛻便，蛻多因脾胃濕熱而生，無病之人，未常有蛻也。俗人相沿云：胃中有蛻，故能消食。謬矣。

聞之耆老自順治至康熙之初四十年間，外郡人稱武林爲醫藪，蓋其時盧君晉公以禪理參證醫理，治奇疾輒效名動一時。張君隱菴繼之而起，名與相埒。擣侖山堂招同學友生及諸門弟子講論，其中參考經論之同異，而辨其是非，於是談軒岐之學者咸向於兩君之門，稱極盛焉。兩君所著書皆堪傳世。張氏所輯者，俱已授梓行世。甫及百年，流傳日少。其針灸祕傳及侖山堂類辯二種，已難得購。余尋之有年，始得類辯一種，觀其準古衡今，析疑糾謬，足爲後學規矩準繩，亟爲重梓以廣其傳。後之學者苟以此爲指南，庶能得正道而由之，甯有岐路之迷邪？徑之誤哉？隱菴初爲糧道書。

更糧道癰癧閉諸醫用藥皆罔效或薦隱菴以補中益氣湯投之一劑而愈或問之曰人治以降利之藥而不效子易以升提之藥而效其理安在隱菴曰公不見夫水注子乎閉其上而倒懸之點滴不能下也去其上之閉而水自通流非其法耶今闕編中所釋將欲下之必先舉之而引轆轤之繩以喻正是此理人能以此法觸類而通之醫法固無盡藏哉茲事余蓋聞之黃君觀石者如是近又聞張君東扶言盧晉公事糧道患內閉渴不得下勢甚亟諸醫皆束手晉公先生以人參麻黃各一兩定劑諸醫囁嚅不敢謂是糧道不疑而飲其藥不踰時渴下糧道羸以千金贈晉公與予前所聞者異辭予意盧張二君所治各一當事而傳者均屬之糧道致有異同之疑耳黃張二友皆非妄言者故並紀之以爲治癰癧之法并以證此帙中名言精理所蘊不少人當殫思細參以收其益慎毋視爲淺近而忽之也

乾隆己丑三月戊子胥山老人王琦跋

憶甲子歲暮以事往來橫山大嶺間道中憇一農家農家方解豕析其前蹄有清水流出約一升許異而詢之農家子曰此豕自久時即患足弱不能行立恆臥而食此其病之所由來也予因是悟人之病手足不良而不任持行者蓋因水濕之氣留滯其中者亦如此矣茲闕隱菴所記因猪腸之狀

而知無病之人未嘗有蚊其事固可類觀也穀雨後三日庚子校勘已畢重閱此條因泚筆附記於

後

醫家以望聞問切爲四要夫聞與問按式而行之如以燈取影罔有不合無難也若望色一端所恃者目力之精巧辨之於隱微之間用之稍難矣至於切脈憑之於指會之以心易了指下難明乃難乎其難者也晉唐以後脈學之書日增矣各抒所見互有短長僞訣流傳更相淆惑學人於此不能無多岐亡羊之患盧子綸先生獨采內經之微言參以越人仲景之說薈萃成書分爲四帙名之曰學古診則明當從古先聖哲之言以爲則而無事勞心於後人之紛爭云耳先是子綸遵其父遺命著本草乘雅年二十八耳越十八年而乘雅乃成於是注傷寒越五年而傷寒金鉢亦成於是注金匱自言參駁本草畢而右目眇疏鈔金鉢終而左目又眩大抵由心勞血耗所致至五十六兩目遂瞑於時論疏全匱前及其半不能復親書卷時從冥目晏坐中摩索其義有所得口授子壻陳曾臺錄出之遂以摩索名其書年屆六十始獲成編此皆其書中自敘有歲月可考者也診則不知起手何時小敘中并不紀歲月大抵先已具稿草創至摩索告成始著意剪裁未及六年子綸卽世臆揣此編殆未成之書耶觀其前半縱橫錯綜俱有條貫然二帙之末所謂六部四時寸口三條祇列其目其辭缺焉若三四兩帙則文字譌落無有錯亂所引內經刪節字句全失義理者有之又其敘次分起條目與一帙之連章累牘脈絡貫注者迥乎不同核以小序所云一意就緒恐難節會者殊不相合又云簡闕診則破譌轉甚扶疾命曾臺對讀庶得無

漏者亦殊不然大抵由易稿時書人倦墮故遺落其字句子既抱西河之疾不能親自校勘卽命子壻對讀一時未遑卒業遷延歲月而觀化之期已至故前後異同若此斷以爲未成之書殆無疑矣世之讀是書者於前半苦其段落之聯綴而起止難辨於後半苦其文義之有重有缺而頭緒紛錯至援引靈樞素問之辭文奧意深理精旨遠俱無訓詁扳會兀難往往讀未終帙倦而思棄者有矣余爲此惜乃詳加考訂隨其文義區分而界隔之使檢閱者易於尋索詮論者便於研求至於理旨深邃者博采名賢之論而折衷焉音釋未明者旁求字學之書而參考焉庶幾疑義可以冰釋誦讀得無舛錯乎若夫魚豕混淆文句遺漏或更字以正其謬或增字以昭其義纏繆究此甚之眉目而不使有殘缺失次之嫌亦無以啟後人之憤悱而得以有辨惑釋疑之益非敢於先哲妄起異同也後之學人於此四帙果誦而能解解而能明而能會通以用之又安有心中之末了而指下之難明哉雖然診脈特四要之一耳昔人謂醫有四要猶人有四肢一肢廢不成完人一要缺不成上醫余嘗晤先生之曾孫玉成知其家藏固有未刊色診一編也學人更能精究於是而復益之以聞參之以問四要全而藏府陰陽虛實自能辨晰其精微矣奚待飲長桑君聽而始有洞垣之視也夫

乾隆三十五年歲次庚寅五月丁丑朔胥山老人王琦述

學古診則目錄

第一帙

第一則言脈生原始

第二則言診則十法

第三則言指法密因

第四則言寸口行度并詳營衛生會脈度之原

第五則分尺寸關爲陰陽所治

第六則言覆溢關格陰陽相乘之脈

第七則言按脈有輕重分析形屬爲五合肺心脾肝腎五神藏之效象叶越人一脈變而爲十之剛柔邪氣參以靈樞一脈微甚變而爲十一之邪氣藏府病形

第二帙

第八則詳言三部九候之法錯引內經難經異同博約之說

第九則辨越人脈有損至之說

第十則言不滿五十動而一止之脈

第十一則言六十首王時之脈

第十二則言內外之絕難經與靈樞有氣脈之殊

第十三則言脈分六部缺

第十四則言脈變四時缺

第十五則言脈有寸口缺

第三帙

第十六則引金匱要略論寸口三部象證

第十七則言尺寸之脈男女有恒而相反之變

第十八則言脈有伏匿之變

第十九則言運氣分南政北政而脈之尺寸有不應之變

第二十則言寸口脈平而死之變

第二十一則言人迎氣口分別陰陽內外以定藏府虛實補漏治法

第二十二則言十二經脈運行身中終而復始之逕道

第二十三則詳言十二經脈之病形證狀

第二十四則詳言十五絡脈之病形證狀

第二十五則詳言十二經正別六合之分配

第二十六則詳言十二經筋之病形證狀

第二十七則申言脈行之度明其當然與所以然之故以結本帙全篇之意

第四帙

第二十八則詳明六陰六陽之根結爲開闔樞之機發

第二十九則詳言左右十二偶經經穴

第三十則詳言身中前後督任二脈奇經經穴

第三十一則詳引莊季裕別傳膏肓穴法

第三十二則言五藏六府各有腧穴以及腹背經穴各分行次并禁刺之穴

第三十三則詳九針形式之用

第二十四則申言十二經絡終始當合之五運天干太過不及子復母讐之意察其脈之絕否以決死生

第三十五則申言十二經脈資始資生及諸脈顯微之異

第三十六則詳言奇經八脈起止郄會及爲病形證

第三十七則申言三絡脈爲陰陽諸絡之統攝與二十四則中所言微有不同蓋前則本之靈樞此則本之難經故不同也

第三十八則詳言會歸三焦天眞水穀胃氣本原爲營爲衛以及男女天癸盛衰爲原始要終之大法

第三十九則合參難經金匱所言肝肺虛實并詳黃帝岐伯藏氣法時過與不及爲補爲瀉治法以廣脈外之義

第四十則推言內經所載諸法雖與脈無涉亦當參究以窮醫道之玄而明其化所以廣書中未及無輯之義而斬學人皆爲十全之上工也

原稿目錄祇就上格標題摘錄數語以爲眉眼而條目未及分析初學者難於檢閱茲倣學府章句之例分爲四十則俾學人尋行數墨卷卽是故與原稿微有不同

學古診則第一帙

錢塘盧之頤子繇甫輯正

拙言原疏卒病論辨脈首條未及申之以鈔已滿三百餘紙合以後章繁簡不均恐失仲景先生立論本義另帙就正有道其有未盡者詳疏平辨兩脈而此診則亦不敢妄騁臆說惟知進法上古遵經數衍稍備診家則式較之中古各自恃其法者恐不合時宜倘不以鄙說爲謬質之靈索嚴加勘駁則不才旅有異時論者罪戾無遁矣戊戌中秋後三日拙稿金鑄炎木苟完重訂訛讀句大費安排故金匱摩索先慎之於始再率子培曾篁逐字朗誦按句點較金鑄先生所著卒病論疏鈔之名已梓行傳世摩索先生所著金匱要略名也迄今尚未梓授更簡診則破訛轉甚旅不得不扶疾命每篁對讀庶得無漏第此三百紙者一意就緒恐難節會續與曾篁演說分科標題格類俾覽者易于尋索庶不致散漫無稽而節目有次也東城河上廢衲蘆旅原名之頤稽首識

金匱水經諸脉圖說原始水經脉圖見諸經脉圖生身

夫脈者水穀之精氣分流經隧灌滌藏府。運行四體貫串百骸。資始于腎間動氣資生于胃中水穀者之爲脈也。盧國秦越人扁鵲氏八難云諸十二經脈者皆係于生氣之原所謂生氣之原者謂十二經之根本也謂腎間動氣也此五藏六府之本十二經脈之根呼吸之門三焦之原一名守邪之神張世賢曰原猶

保合太
真傳先天
寶資于此
乃得形與
神俱盡終去
其大年度
人以胃爲本

此江腹本
水穀胃氣
因時效形
以體常變

根本也。腎屬水。三焦屬火。氣出于水火之中。三焦之氣始于是故曰三焦之原。由是故曰三焦之原。由此氣建中立本。育氣固形。守其內而固其外。使諸邪不能傷其身。故曰守邪之神。故氣者。人之根本也。根絕則莖葉枯矣。六十六難云。十二經皆以前爲原者何也。愈音怒五藏之俞。在於背上者。然五藏俞者。三焦之所行氣之所留止也。滑伯仁曰。然者。三焦所行之前爲原者何也。然臍下腎間動氣者。人之生命也。十二經之根本也。故名曰原。三焦者。原氣之別使也。主通行三氣。上中下三焦之氣。經歷于五藏六府。原者。三焦之尊號也。故所止。輒爲原。原爲三焦之尊號而所止。輒爲原。原猶天子所在。總稱行在所也。五藏六府之有病者。皆取其原也。黃帝素問內經玉機真藏云。岐伯曰。五藏者。皆粟氣于胃。胃者。五藏之本也。胃爲水穀之海。以養藏氣者。不能自致于手太陰。必因于胃氣。乃至手太陰也。故五藏各以其時自爲。而至于手太陰也。如春脈爲弦。夏脈爲鉤。秋脈爲毛。冬脈爲石。此平人之常氣。粟于胃者。平人之脈也。故邪氣勝者。精氣衰也。故病甚者。胃氣不能與之俱。至于手太陰。故眞藏之氣獨見。獨見者。病勝藏也。故死此皆逆四時之氣。無胃氣者。眞藏之變脈見矣。胃爲五藏之本。故五藏脈中必帶胃氣。若胃氣不見。而眞藏之脈。獨見則邪氣盛而正氣衰。胃脈之敗可知矣。

右第一段言脈生原始

若運行之過與不及。氣位主客之相得與否。病傳之所勝不勝。本標之層。署陰陽。亦莫不各隨邪正之淺深微甚。實虛新故。著見脈狀者。總不越診法之十則。爲綱。如度形體以別大小。至數以紀遲數。上數字音。特傳爲目。車北並量。

音。往來以循滑濇部位以度長短舉按以驗浮沉浮者陽大者陽數者陽滑者陽長者陽也沉者陰小者

陰遲者陰濇者陰短者陰也故曰脈有陰陽亦有一陽一陰而單見亦有二三四五陽二三四陰而並呈亦有一陽一陰二三四陰一陰一陽二三四陽而兼著亦有二陽一陰二陰二陽一陽二三陽或三陽一二陰三陰一二陽或四陽一陰四陰一陽而錯顯悉屬十綱脈之互見未列異相之脈名至脈狀多端咸憑診則各以類從條分之爲目矣如診以形體之大者爲綱則曰肥曰洪曰散曰橫曰弛曰革皆目矣診以形體之小者爲綱則曰弱曰瘦曰細曰微曰繁繁如蜘蛛絲皆曰矣診以至數之數者爲綱則曰急曰疾曰擊曰搏曰躁曰喘曰促曰動曰奔越無倫皆目矣搏音診以至數之遲者爲綱則曰緩曰脫曰少氣曰不前曰止曰歇曰停曰代曰結曰如漏漆之絕者皆目矣診以往來之滑者爲綱則曰利曰營曰噤曰翕曰章曰連珠曰替替然皆目矣診以往來之濇者爲綱則曰緊曰濡曰行遲曰爲不應指曰參伍不齊曰往來難且散曰如雨沾沙曰如雨淪沙曰如輕刀刮竹皆目矣診以部伍之長者爲綱則曰憊曰高曰涌曰端直曰條達曰上漁爲溢皆目矣診以部伍之短者爲綱則曰抑曰卑曰退曰不及指曰入尺爲覆皆目矣診以舉按之浮者爲綱則曰盛曰毛曰泛曰芤曰如循榆莢曰肉上行曰時一浮曰如水中漂木曰營譬如羹上肥皆目矣診以舉按之沉者爲綱則曰潛曰堅曰伏曰匿曰過曰減曰陷曰獨沉曰

時一沉曰如綿裹砂曰如石投水皆目矣種種諸目可以單見可以並呈可以兼著可以錯顯亦可綱與目交相見呈著顯隱躍於指端者也雖然巧不在模象之畢肖而喫緊又在形體至數往來部位舉按之十法夫如是則不待揣摹而形真已畢露無遁矣至若前大後小前小後大亦不越乎形體上盛下衰下盛上衰上虛下實上部有脈下部無脈下部有脈上部無脈中手長者中手短者亦不越乎部位中手促而上擊者亦不越乎至數沉而堅浮而盛沉而渴沉而橫沉而喘固不越乎舉按更兼乎形體往來至數矣脈盛滑堅往來氣乎形體小實而堅此亦形體小弱以濡形體氣乎往來滑浮而疾往來兼乎舉按至數矣緩而滑至數兼乎形體盛而堅不越乎往來洪大而長形體兼乎部位乍數乍疎乍短乍長至數兼乎部位浮大而短舉按兼乎形體部位矣累累如連珠如循琅玕此亦形體喘喘連屬其中微曲至數兼乎形體前曲後居如操帶鉤此亦形體厭厭聳聳如落榆莢此亦舉按不上不下如循雞羽此亦形體如物之浮如風吹毛此亦舉按曳弱招招如揭長竿末梢形體兼乎往來部位矣盈實而滑如循長竿形體氣乎往來急益勁如新張弓弦至數兼乎形體和柔相離如雞蹠地形體至數往來部位舉按咸備矣來實而盈數如雞舉足往來兼乎形體至數舉按矣來而銳堅如鳥之喙鳥之距屋之漏水之流去來兼乎形體往來兼乎至數蓋往來者脈之源如水之流去來者脈之抑與揚如浪之起興伏來可

迎去可追至若往來但有其來而無其往卽其來亦不易見何則但覺浪濤之起伏不覺水流之不息此比水流之平者又非湍急之逝者如斯夫是故去與來亦不越舉按之浮沉至脈來喘喘累累如鈎按之而堅此又去來兼乎往來形體兼乎舉按來如引葛按之益堅往來兼乎形體形體兼乎舉按發如奪索辟辟如彈石往來兼乎形體舉按兼乎去來氣來更弱輕虛而滑端直以長往來形體兼乎舉按部位來實而強去來兼乎形體來不實而微此亦形體來盛去衰來盛去亦盛來不盛去反盛往來兼乎去來來輕虛以浮來急去散往來形體兼乎舉按去來來毛而中央堅兩旁虛來毛而微舉按兼乎形體沉以搏舉按兼乎至數形體來如彈石去來兼乎至數形體中外急如循刀刃責責然如按琴瑟絃至數形體兼乎往來舉按堅以搏如循薏苡子累累然形體至數兼乎舉按往來大而虛如以毛羽中人膚形體兼乎舉按往來搏而絕如指彈石辟辟然至數兼乎往來去來兼乎形體弱而乍數乍疎形體兼乎往來渾渾革至如涌泉絲縷其去如弦絕形體兼乎往來往來兼乎形體來疾去徐上實下虛來徐去疾上虛下實去來兼乎部位往來兼乎舉按俱沉細數沉細數散浮而散舉按兼乎形體至數浮而不躁此則舉按浮而有躁舉按兼乎至數細而沉形體兼乎舉按數動一代至數兼乎往來一呼一動一吸一動一呼三動一吸三動而躁一呼四動以上此皆至數脈絕不至有往無來矣乍絕乍續至數兼乎往來形體懸絕弦

純乎形體。懸絕浮。懸絕沉。純乎舉。按。懸絕濡。純乎往來。懸絕沉濡。舉。按。兼乎形體。脈靄如車蓋者。陽盛此。則現乎往來。而靄靄如車蓋者。陽結。此又著乎去來。脈累累如循長竿者。陰結。此又形體兼乎往來。舉按者矣。至脈弱而滑。是有胃氣。所謂和柔相離。如雞蹠。地形體往來。咸相若也。故人以胃氣爲本。斯春應規。夏應矩。秋應衡。冬應權。陽氣微上。則陰氣微下。陰氣微上。則陽氣微下。陰陽有時。與脈爲期。此之謂各以其時。自爲而至于手太陰者。脈之常期。而相失。知脈所分者。脈之變。

右第二段言診則十法

脉也變也。所重固。診切之十則。而喫緊。又在指法之捷取。如以目視色。以平稱物。此秋毫之無可避者。甚矣。指法之難言也。世多習矣而不察。猶令無目人而辨皂白。無針平而衡分兩矣。蓋人中指上兩節長。無中指無名指。指三指。指成三指。指成部各十則。爲中指諸條。爲宗十則。爲指成單指。爲指成形。爲各別其五法具形。爲自萬端效。爲不勝。爲兩判。爲繩而兩判。爲若還形。爲後節節相對。自不待腕之能舒。而節無不轉。轉無不活。卽無名指之屈而未伸者。伸矣。衆指之伸而未屈。

狀現前法
無定見法
之與指發
體之與用
甚矣指性
法推尤爲
體

者屈矣。真類針平輕重毫末無容隱者。故指法之宜早辨也。第惟食指肉薄而體中指則厚。無名指更厚木。故必用指端稜起如線者。名曰指目。以按脈中之脊。無論洪大弦革。卽小細絲微。咸有脊焉。不啻晴之視物妍醜畢具。故古法稱診脈曰看脈。可想而知其功用矣。每見有惜爪甲之長美留而不去。祇用指厚肉分。或指節下。以馮診視者。譬若目生頸腋脇胸間。設有指頭肥禿者。業屬不慧。反藉口謂診視一法。不過敲門磚耳。得善望聞巧問答。漏病者一二證。便可數衍酬應。何必窮研奧旨。摩揣刻肖。自取勞苦耶。又下一等昧望聞拙問答。不識受何衣鉢。作放利訛頭。此更難言矣。若果因人之病苦起見。憇憫爲行者。此又診切之所宜辨也。至于診法。尤爲喫緊。

右第三段言指法密因

從上脈狀統論寸口未及條分諸種診法。至若正變呈象。各引經論之異。同辨析于左。

此言法取寸口井添補衛生會。謂度之源。一脈獨取寸口行度。陰陽營衛周會。越人一難云。寸口者。脈之大會。手太陰之脈動也。人一呼脈行三寸。一吸脈行三寸。呼吸定息。脈行六寸。人一日一夜。凡一萬三千五百息。脈行五十度。周于身。漏水下百刻。營衛行陽二十五度。行陰亦二十五度。爲一周也。故五十度復會于手太陰寸口者。五藏六府之所終始。故法取于寸口也。夫脈之終也。始也。固本于營衛。謂榮行脈中。衛行脈外也。而營之行衛之行會也。分也。

大有徑庭。諸以營言之。營者水穀之精粹。其清者爲營。奉心化赤。命曰營氣。乃得獨行經隧。以奉生身。莫貴于此。故曰營行脈中。脈者猶川河溪澗之道。營者卽川河溪澗之水。其始也。巡脈從中焦。自手太陰肺。肺注手陽明。大腸注足陽明。胃注足太陰脾。脾注手少陰心。心注手太陽小腸。小腸注足太陽膀胱。膀胱注足少陰腎。腎注心。主手厥陰心包絡。心包絡注手少陽三焦。三焦注足少陽膽。膽注足厥陰肝。此十二經脈者。計長一十六丈二尺。人一呼脈行三寸。一吸脈行三寸。呼吸定爲一息。合計脈行六寸。漏水下一刻。呼二百七十有五吸。一百七十有五。合計息二百七十有五。脈行一十六丈二尺。盡爲一周子體。躬周而復始。如環無端。日夜漏水下百刻。合計脈行五十度。周于身。人一日一夜。凡一萬三千五百呼。一萬三千五百吸。合計一萬三千五百息矣。陰陽經脈。無分晝夜。陽兩陰兩。相間而行。在陽固脈行陽五十度。周于身。在陰亦脈行陰五十度。周于身。非僅行陽。只二十五度。行陰亦只二十五度也。若夫衛者。亦水穀之精粹。既以其清者爲營。因以其次者稱衛。遂云濁者爲衛耳。不同乎混濁之濁。而以之稱衛也。衛氣出入形藏。分子晝夜。以固生身。莫祕于此。故曰衛行脈外。其始也。從中焦。平旦陰盡。陽始生。而人寤。陽氣出于目。目張則氣上行于頭。循項。下足太陽。循背。下至小指之端。其散者。別于目銳。皆下足太陽。下至一手小指之間。外側。其散者。別于目銳。皆下足少陽。注小指次指之間。以上循手少陽之分側。下至小指之

間。別者以上至耳前合于頸脈。注足陽明以下行至跗上入五指之間。其散者從耳下下手陽明入大指之間。入掌中其至于足也。入足心出內踝下行陰分復合于目此之謂衛行脈外行身之陽道爲一周。非循行經隧之爲衛行脈外也。周而復始合計二十五周于身爲衛獨行陽二十五度非合營並行陽二十五度也。陽盡于陰陰受而人寐其始入于陰常從足少陰注于腎腎注于心心注于肺肺注于肝肝注于脾脾復注于腎此之謂衛行脈外藏舍之陰道爲一周亦非循行徑隧之爲衛行脈外也。周而復始合計二十五周于藏爲衛獨行陰二十五度亦非合營並行陰二十五度也。合計晝行陽二十五度與夫夜行陰二十五度斯之謂一周于身一周于身盡日下脊骨之一節二十一日至骶骨其氣上行九日出于缺盆復會于大椎斯之謂盡歷行身度之一周大會于體躬也蓋衛行遲昔終月始歷盡一周之體躬猶日行遲一年十二月巡行周天三百六十五度四分度之一爲年也營行疾者一日夜五十度周于身猶月行疾一月三十日日超天一十三度半有奇一月一周天三百六十五度四分度之一爲月也顧營衛之行周猶氣之有節節之有候衛平銓度無容暫失此營衛生會與行以及脈度岐伯備述諸篇精詳無漏第本難博約增損固幼學之捷徑設未博靈素全文多安苟簡轉致古今多無定見至衛行日下一節二十一日窮歷骸骨上行九日出于缺盆岐伯氏補載瘡論世未知合觀融貫并夫衛度起止終始不才祇

遵經參訂。非敢強作解事。變亂常法也。在古聖診切法。取三部三而三之。合爲九候。乃可盡察統體府藏陰陽虛實新故。四時五行氣運傾移。三因交顯。大法斯備。至若獨取寸口。以決五藏六府死生吉凶之法。謂統體脈隧。不越水穀發端中胃。徧見諸經。惟寸口動脈。乃鴻濛始判。必清必靜。了無分屬。效象病形。毫髮無容混者。三部九候。固各圓形身府藏專屬。然遞流貫注。間氣不無雜還。因以診馮寸口。爲發萌之始。此爲最的。乃無岐分孽生之疑惑。故經云。水穀徧見寸口。猶努之發機。矢之中。的應規。應矩。曰寸曰口。而後周匝迴旋。轉相灌漑。如環無端。法取寸口者。以此然所謂寸口者。槩左右三部而言也。以辨右爲氣者之非

右第四段言法取寸口并詳營衛生會脈度之源

一脈有尺寸。二難云。寸口者。脈之大要會也。從關至尺。是尺內陰之所治也。從關至魚際。是寸口內陽之所治也。故分寸爲尺。分尺爲寸。故陰得尺中一寸。陽得寸內九分。尺寸終始。一寸九分。故曰尺寸也。蓋診脈定穴。以關爲界。關者。掌後高骨是也。清伯仁曰。關者掌後高骨之分寸也。後尺之前兩際之間。陰陽之界限也。從關至尺澤。得同身寸之一尺。屬尺內之陰。從關至魚際。得同身寸之一寸。屬寸口之陽。從魚際至尺澤。共得一尺九分。故越人云。從關至尺。是尺內陰之所治也。從關至魚際。是寸口內陽之所治也。故分寸中之一分。以成一尺。分尺中之一分。以成一寸。是陰得尺中一寸。陽得寸內九分。故曰尺寸也。然關之前者。陽之動。門穴後者。陰之氣也。臂骨之上。臂骨之下。掌掌下。高骨之爲。高骨之爲。掌掌上。所治浮沉。過與不及。不越水位。而言也。

也脈當見。九分而浮。九分陽位脈當浮也。診法之指去其無名指。用中指按關之上。次聯食指按關之前。兩指令平。先按後舉。舉至與皮毛相得有脈之處。其脈始見而浮過者。法曰太過者。多出于皮膚之上。爲浮之太過減者。法曰不及者。多出于皮膚之下。爲浮之不及。若按至筋膜之間。則無脈矣。滑伯仁曰過謂常脈不及謂不及本位。過于本位過于常脈不及謂不及本位

不及常脈是皆病脈也。故曰浮者陽也。如衛關以後陰之動也。脈當一寸而沉。一寸陰位脈當沉也。診法之指去其食指亦用中指按關之上。次聯無名指按關之後。兩指令平。先舉後按。按至肌肉相得有脈之處。其脈始見而沉過者。法曰太過者。多出于肌肉之下。爲沉之太過減者。法曰不及者。多出于肌肉之上。爲沉之不及。若舉至皮膚之間。則無脈矣。故曰沉者陰也。如權。

右第五段分尺寸及關爲陰陽所治

一脈有陰陽相乘。有覆有溢。有關有格。越人云。遂上魚爲溢者。卽九分陽位應浮之脈。遂上溢魚際之外。致一寸陰位應沉之脈。由內而外。至關前九分之陽位。故曰爲外關內格。此陰乘之脈也。蓋關卽神門高骨之爲關格。卽自內之外之爲格。乘卽陰乘陽位之爲乘。溢卽溢出魚際上魚之爲溢也。遂入尺爲覆者。卽一寸陰位應沉之脈。遂入覆經渠穴後。致九分陽位應浮之脈。由外而內。至關後一寸之陰位。故曰爲內關外格。此陽乘之脈也。蓋關卽神門高骨之爲關格。卽自外至內之爲格。乘卽陽乘陰位之爲乘。覆卽

此言陰陽
相照覆溢
規吸附
此死不生而
當生立而
此當死而
生不立而
此當死而
生不立而

陰覆經渠尺後之爲覆也。然則一寸九分之曰尺寸。總不離乎部位。九分而浮一寸而沉亦不越乎舉按。太過不及固同。舉按此又無乎去來。若上魚之溢。陰乘之陽。外關之格。則獨驗其來。八尺之覆。陽乘之陰。內關之格尤獨著。其往至陰生于寸而動于尺。效水逝之迴波。陽生于尺而動于寸。類水出之源始而出而入以關爲界。是故陰陽之所由分也。此越人發靈素之所未發。定權衡度浮沉。察順逆。審覆溢以決死生。此二指法也。

右第六段言覆溢關格陰陽相乘之脈

一脈有輕重。蓋肺心脾肝腎舍神之爲神藏。皮毛血脈肌肉筋骨形骸之爲形藏。經云。神與形俱。盡終其天。年度百歲乃去。是以皮者。肺之合。血脈者。心之合。肌肉者。脾之合。筋者。肝之合。骨者。腎之合也。欲知藏脈。當合藏形。然非部位。非舉按。則不得矣。至舉按有輕重之殊。固始于舉而終歸于按。宜分爲五。曰如三菽之重。如六菽之重。如九菽之重。如十三菽之重。按之至骨。舉指來疾也。其法以三指截齊。先按後舉。舉復漸按。若毛之柔者剛者。脈之弛者縱者。肉之肥者瘠者。筋之强者柔者。骨之堅者脆者。更驗統體身形。或急或緩。均分爲五。雖菽粒有數。而輕重各有量也。故曰初持脈。如三菽之重。初持。猶言初舉。如字傳神。知古人用力之巧。至三菽之重。亦猶言漸按之始。與毛皮相得者。令指按至與皮毛相親相著之爲相

爲十也此
三指之法
人體圖
標樞之部
分別多難
會歸一
元詳言下
輕重視也

得也。所謂皮毛者肺之合。此卽肺部便可得診。肺藏之脈浮而短濶者是蓋藏真高于肺以行營衛陰陽也。其時秋其令降。其主金。其機衡自外而內。故脈見浮濶而短。與得皮毛之深者以候肺淺以候府之大腸。大腸側微浮微濶微短矣。如六菽之重。與血脈相得者。令指按至與血脈相親相著之爲相得也。所謂血脈者心之合。此卽心部便可得診。心藏之脈浮大而散者是蓋藏真通于心。心藏血脈之氣也。其時夏其令出其主火。其機衡自內而外。故脈見浮大而散。與得血脈之深者以候心淺以候府之小腸。小腸則微浮微大微散矣。如九菽之重。與肌肉相得者。令指按至與肌肉相親相著之爲相得也。所謂肌肉者脾之合。此卽脾部便可得診。脾藏之脈第脾者土也。孤藏以貫四旁善者不可得見。蓋藏真濡于脾。脾藏肌肉之氣也。其時四季其令中。其主土。其機衡保持四維。而象不可指。與得肌肉之深者以候脾淺者以候府之胃。胃則善惡多端。診切之例亦不在中土之境。如十二菽之重。與筋平者。令指按至於筋相親相著之爲相平也。所謂筋者肝之合也。此卽肝部便可得診。肝藏之脈牢而長者是蓋藏真散于肝。肝藏筋膜之氣也。其時春其令升。其主木。其機衡自下而上。但其脈應更弱。輕虛而滑。端直以長而乃牢而長者有類太過之實而強矣。蓋其氣來更弱。輕虛而滑。端直以長者屬春時統體之診切。今則層分五部。漸按至重脈體不無堅牢而長。不同因時效象之比。設此部按之亦更弱輕虛。便非歸藏之爲神藏形藏矣。故其

脈見牢而長也。與得筋膜之深者以候肝淺以候府之膽。膽則微牢微長矣。按之至骨者所謂骨者腎之合此卽腎部便可得診腎藏之脈。第脈行肉中骨上無脈。此欲得腎藏之真故必按指至骨而後腎真乃發。第腎爲水物入則沒故按則濡。濡柔也讀與軟軟之軟同然水性至剛物起則涌故舉指來疾者是如欲得其詳還須隨舉隨按。隨按隨舉似非一舉指之勞而能盡其性者蓋藏真下于腎腎藏骨髓之氣也。其時冬其令入其主水其機衡自上而下故其脈按之沉而濡舉指來疾與得骨之深者以候腎淺以候府之膀胱膀胱則微濡微疾矣。此輕重五診之法爲五脈應有之常咸以按爲則惟腎則按中有舉舉中有按雖然其持以按如肺部之得浮濶而短則按中復自具舉按往來部位諸法如心部之得浮大而散則按中復自具舉按形體諸法如肝部之得牢而長則按中復自具形體部位諸法如腎部之得按之濡舉指來疾亦復各自具舉按形體至數往來去來諸法矣蓋析形層五者以候藏微以候府微者計層按部及層少輕故效象者亦肖形之少微爾然非副之以五不足以盡藏府之常謝希孫曰寸闢尺所主藏府各有分位而一部之中脈又自有輕重段陽虞氏曰假令左手寸口如三菽之重得之乃知肺氣之至如六菽之重得之知本經之至餘以類求之乃知五藏之氣更相灌流六脈因茲亦有准繩可以定吉凶言疾病矣闢尺皆如是至心主三焦緣有名無形另注脈經故不與于形藏之例是以一脈輒變僅載其十曰急甚者肝邪也微急者膽邪也大甚者心邪也微大者小腸邪也緩甚者脾邪也微緩者胃邪也濶甚者肺邪也微濶者大腸邪也沉甚

者腎邪也。微沉者膀胱邪也。甚者爲剛。微者爲柔。微于干府甚于藏。各有剛柔邪故令一脈輒變為十也。但以心爲式。餘可例推矣。第未例有病狀耳。按越人十難曰。一脈爲十變者何謂也。五邪剛柔相逢之意。不離自干。外干曰府。內生變之內。所因越人七越也。參見之氣。樞運。過十有二。易陽引經比義。引經比義。開生東之子。平陽引經比義。引經比義。則為十變法也。

微沉者膀胱邪于小腸也。滑伯仁曰。五邪者謂五藏五府之氣失其正而爲邪者也。剛柔者陽爲剛陰爲柔也。剛柔相逢。謂藏逢藏府。逢府也。五藏五府各有五邪。以脈之來甚者屬藏。微者屬府。按十難原文極爲明顯。節去數字。便靈樞邪氣藏府病形篇。一脈輒變。則十有一焉。假令肺部應得浮而短濶者爲當。而覺晦澀。故特全引之。

靈樞則曰。肺脈急甚者爲懸。微急者爲微懸。微懸者爲外干之變。而濶甚者爲自干之變。此越人十變法也。

靈樞則曰。肺脈急甚者爲懸。微急者爲微懸。微懸者爲外干之變。而濶甚者爲自干之變。此越人十變法也。

微急者爲肺寒熱。怠惰歟。吐血引腰背胸。若鼻息肉不通。緩甚者爲多汗。微緩者爲痿瘦。偏風頭以下汗出不可止。遲音漏大甚者爲頸腫。微大者爲肺癆。引胸背起惡日光。療音界。小甚者爲泄。微小者爲消。微緩者爲消瘦也。滑甚者爲息竇上氣。資音奔息。急也。微滑者爲上下出血。濶甚者爲嘔血。微濶者爲鼠瘻。在頸支腋之間。下不勝其上。其應苦痠。痛也。假令心部應得浮大而散者爲常。急緩沉濶爲外干之變。大甚微大爲自干之變。此越人十變法也。

靈樞則曰。心脈急甚者爲癰癧。引急曰癰。弛長曰癧。微急者爲心痛。微大爲心癉。引背食不下。緩甚者爲狂笑。微緩者爲伏梁在心下。上下行時唾血。伏梁心大甚者爲喉吟。吟音介喉吟。聲微大者爲心癉。引背善淚出。小甚者爲善噦。噦於決音貌。氣逆而作聲也。微小者爲消痺。滑甚者爲滑微。微者爲心癉。引背善淚出。小甚者爲善噦。噦於決音貌。氣逆而作聲也。

微滑者爲

精寒而時冷者。大筋皮毛之著。此言第一。

直著眼。引經比義。則微變。則微變。則微變。

形神合肺。與足肺得。

血氣多少。

陰陽爲氣。盛衰以標形之爲大法也。此言第二。

微微甚以

形略合心

以候心得

脉之正變

以參證

此言第三

形感合脾

以候脾得

微微甚以

形合骨之

微微甚以

此言第四

形合筋之

此言第五

心痛引臍。少腹鳴濇甚者爲瘖。瘖音音微濇者爲血溢厥耳鳴癲疾。瘖逆也。假令脾部應得和而緩者爲常。急大沉濇爲外干之變。緩甚微緩爲自干之變。此越人十變法也。靈樞則曰。脾脈急甚者爲瘦。瘦者爲風痺。四肢不用。心微急者爲脹。中食飲入而還出。後沃沫。沃音屋水汪然貌。言緩甚者爲痿厥。微緩者爲風痺。四肢不用。心病在經絡而心藏無恙故。四肢不仁而心體如故。大甚者爲擊仆。擊仆如有人微大者爲瘤氣。腹裏大脰血在腸胃之外。小甚者爲寒熱。微小者爲消瘅。滑甚者爲膿瘍。膿與癰同音。頸癰音蓬。膏癰音病。病又一云。癰疽也。癰勝胱不利也。微滑者爲蟲毒。蛔腹熱。噏音回。蛔音中蟲也。濇甚者爲腸澼。微濇者爲內瘖。多下腹血。假令肝部應得牢而長者爲常。緩大沉濇爲外干之變。急甚微急爲自干之變。此越人十變法也。靈樞則曰。肝脈急甚者爲惡言。微急者爲肥氣。在脇下。若覆杯。肥氣肝之積緩甚者爲善嘔。微緩者爲水瘕。瘕音加亦音假。大甚者爲內癰。善嘔。訛泥六七八急縮也。微大者爲肝癥。陰縮歟引少腹。小甚者爲多飲。微小者爲消瘅。滑甚者爲膿瘍。微滑者爲遺溺。音吐鼻微大者爲肝癥。陰縮歟引少腹。甚者爲溢飲。微滿者爲瘕掣筋癆。掣音懸筋急縮也。假令腎部應得按之。濡舉指來疾者爲常。急緩大濇爲外干之變。沉甚微沉爲自干之變。此越人十變法也。靈樞則曰。腎脈急甚者爲骨癰疾。微急者爲沉厥。奔脈足不收。不得前後溲。至心下。若豚狀或上或下無時。緩甚者爲折脊。微緩者爲洞。洞者食不化。下陷還出也。大甚者爲陰瘻。微大者爲石水。起臍以下至小腹。腫腫然上至胃脘。死不治。石水者水凝結于少腹沉。堅仕下也。腫音重壓也。

此考經
人六五
之異同生
克邪氣病
形之差別

此言既得
諸狀之真
參之尺澤
之應

此統言脉
狀大小緩
寒多熱多
故邪為多
急滑濶之
氣少血虛
藏皆少陽

甚者爲洞泄。微小者爲消痺。滑甚者爲瘡瘍。微滑者爲骨痿。坐不能起。起則目無所見。濶甚者爲大癲。微濶者爲不月沉痺。靈樞五脈之變。計得六十。越人則去滑如沉。並去其小。五脈之變。計得五十。各不同也。夫析形成部。此上古定制。爲診切第一義法。如按部診脈。得本部應顯之脈爲常。異本部應顯之脈爲變。卽循所變。微甚。便可識六邪相逢之病狀。六邪謂寒熱血氣陰陽六者之邪也。所謂調其脈之緩急。大小滑濶而病變定矣。
調察病變既定。更驗脈急者。尺之皮膚亦急。脈緩者。尺之皮膚亦緩。脈小者。尺之皮膚亦減。而小脈大者。尺之皮膚亦實而起。責音奔大脈滑者。尺之皮膚亦滑。脈濶者。尺之皮膚亦濶。凡此變者。亦有微甚。脈微尺亦微。脈甚尺亦甚。更察本部應顯之藏色。與六邪剛柔相干之氣色。而後法始備。夫脈色與尺之相應也。如桴鼓影響。不得相失也。此亦本末根葉之出候。故根死則葉枯矣。色脈形肉。不得相失者也。張景岳曰。病人肉之盛衰。可得可知矣。夫有諸中必形諸外。故色之與脈。脈之與形肉。亦與桴鼓影響之相應。本末根葉之候不失也。桴音掌擊鼓杖也。雖然善調尺者。不待于寸。善調脈者。不待于色。能參合而行之者。可以爲上工。上工者十全九知。三而神且明矣。中工者十全七知。二則爲神。下工者十全六知。一則爲工也。觀夫諸急多寒。諸緩多熱。諸大多氣少血。諸小血氣皆少。諸滑陽氣盛。微有熱。諸濶多血少氣微。微有寒。蓋六邪剛柔之本因有別。五行之殘賊宜歸。寒熱之偏勝。血氣之多少。陰陽爲氣之盛衰。以爲告者也。是故微急之見于肺者。爲

氣盛微有寒

熱多有寒

氣微有寒

此言急脈

之效見于

五位形層

法也

此言緩脉

之效見于

五位形層

法也

此言大脈

之效見于

五位形層

法也

此言小脈

之效見于

五位形層

法也

肺寒熱。急情。欬唾血。引腰背胸。若鼻息肉不通。見于心者爲心痛。引背食不下。見于脾者爲脇中。食飲入而還出後沃沫。見于肝者爲肥氣在脇下。若覆杯見于腎者爲沉厥奔豚。足不收。不得前後。沒急甚之見于肺者爲癲疾。見于心者爲癥癰。見于脾者亦爲癥癰。見于肝者爲惡言。見于腎者爲骨癰疾。此皆多寒。之所致也。微緩之見于肺者爲瘈瘲。偏風頭以下汗出不可止。見于心者爲伏梁。在心下。上下行時唾血。見于脾者爲風瘻。四肢不用。心慧然若無病。見于肝者爲水瘕。見于腎者爲洞。洞者食不化。入嗌還出緩甚之見于肺者爲多汗。見于心者爲狂笑。見于脾者爲瘈厥。見于肝者爲善嘔。見于腎者爲折脊。此皆多熱之所致也。微大之見于肺者爲肺癆。引胸背。起惡日光。見于心者爲心癆。引背。善淚出。見于脾者爲癟。氣腹裏大。臍血在腸胃之外。見于肝者爲肝癆。陰縮欬引小腹。見于腎者爲石水。起臍以下至小腹。睡然上至胃脘。死不治。大甚之見于肺者爲頸腫。見于心者爲喉吟。見于脾者爲擊仆。見于肝者爲內癰。見于腎者爲消痺。此皆多氣少血之所致也。微小之見于肺者爲消痺。見于心者亦爲消痺。見于脾者爲寒爲消痺。見于肝者亦爲消痺。見于腎者亦爲消痺。小甚之見于肺者爲泄。見于心者亦爲消痺。見于脾者爲寒。見于肝者爲多飲。見于腎者爲洞泄。此皆血氣皆少之所致也。微滑之見于肺者爲上下出血。見于心者爲心疝。引胸小腹鳴。見于脾者爲蠭毒。煩渴腹熱。見于肝者爲遺漏。見于腎者爲骨痿。坐不能起。則此言滑脈之效見于五位形層。此言消脈之效見于五位形層。此言小脈之效見于五位形層。此言大脈之效見于五位形層。此言急脈之效見于五位形層。此言緩脈之效見于五位形層。此言骨痿之效見于五位形層。此言內癰之效見于五位形層。此言消痺之效見于五位形層。此言泄之效見于五位形層。此言洞泄之效見于五位形層。此言擊仆之效見于五位形層。此言喉吟之效見于五位形層。此言擊仆之效見于五位形層。此言內癰之效見于五位形層。此言消痺之效見于五位形層。此言泄之效見于五位形層。此言洞泄之效見于五位形層。此言擊仆之效見于五位形層。此言喉吟之效見于五位形層。

此言濡潤之效見于五位形屬俱屬驗證法也

此言濡潤者爲腫瘤。此皆陽氣盛微有熱之所致也。微濁之見于肺者爲鼠瘻。在頸支腋之間下不勝上其應。瘻見于心者爲血溢。維厥耳鳴癲疾。見于脾者爲內瘻。當下膿血。見于肝者爲瘕掣筋痙。見于腎者爲不月。

沉痺。濁甚之見于肺者爲喘血。見于心者爲瘻。見于脾者爲腸瘻。見于肝者爲溢飲。見于腎者爲大瘻。皆多血少氣微有寒之所致也。斯之謂爲諸急。爲諸緩。爲諸大。爲諸小。爲諸滑。爲諸濁也。自諸急之多寒。多屬于寒也。諸緩之多熱。多屬于熱也。諸大之多氣少血。多屬于多氣少血也。諸小之氣血皆少。多屬于氣血皆少也。諸滑之陽氣盛微有熱。多屬于陽氣盛微有熱也。諸濁之多血少氣微有寒。多屬于多血少氣微有寒也。是故刺急者深。內而久留之。內音納下同刺緩者淺。內而疾發針以去其熱。刺大者微渴其氣。語出其血。張景岳曰脈大者多陰虛。故戒以無出其血。刺滑者疾發針而淺內之。以漏其陽氣而去其熱。刺濁者必中其脈道。其逆順而久留之必先按而循之。已發針疾按其病無令其血出。以和其脈。循摩拔也。堵諸小者陰陽形氣俱不足。勿取以針而調以甘藥也。張景岳曰脈小者氣血俱虛。必不可刺而當調以甘藥。甘之一字聖人則金王。金王則水充此。所以土爲萬物之母而陰陽俱虛者必調以甘藥也。黃帝曰五藏六府之氣榮俞所入爲合。令何道從入安連過。五藏六府之脈氣所出爲井所溜爲榮所注爲俞所行爲經所人爲合井者脈氣由此而出如井泉之發其氣正深故曰井濁急流也。榮小水前言因皮毛內脈之形脉合肺心脾肝腎之部迎否法針各施諸其爲井榮命經合也。

則因合審
大推及六
府微諸經
形法取穴
以審宜
恐為順逆
也比之柔
千府剛干
有

也脈出于井而流于此其氣尚微者如之故曰榮注灌注也。俞輸運也。脈注于此而輸于彼其氣漸盛者如之故曰俞經者。脈氣大行經營于此爲正盛之處故曰經合者。脈氣至此漸爲收藏入合于內故曰合。則針之此。則因合審。大推及六府微諸經形法取穴。以審宜。恐為順逆也。比之柔。千府剛干。有

張景岳曰五藏六府皆有五俞五俞之所入爲合即各經之合穴也。然手之三陽岐伯曰此陽脈之別入復有連屬上下氣脈相通者亦謂之合故以此入安連過爲問○榮音榮俞音憩岐伯曰此陽脈之別入于內屬于府者也。言六陽之經內屬於府因以。明手之三陽下合在足也。曰榮俞治外經合治內府脈浮淺故可治外經之病合則氣脈深入故可治內府之病曰治內府奈何曰取之于合曰合各有名乎曰榮俞治外經合治內府脈浮淺脈深入故可治內府之病曰治內府奈何曰取之于合曰合各有名乎曰胃合于三里大腸合于巨虛上廉小腸合于巨虛下廉三焦合于委陽膀胱合于委中央膽合于陽陵泉曰取之奈何曰取之委中者屈伸而索之委中者屈而取之陽陵泉者正豎膝子之齊下至委陽之陽取之取之外經者。揄申而從之。揄音于引也。抒也言取外經者當引。伸四體使經脈流通然後從取之也。曰願聞六府之病曰伸四體使經脈流通然後從取之也。曰願聞六府之病曰足面爲跗兩面熱者。足陽明病魚絡血者。手陽明病上之高肉。兩跗之上脈豎陷者。足陽明病此胃脈也。足面爲跗兩陽脈也。豎者堅而實陷者弱。大腸病者。腹中切痛而鳴濯濯。冬日重感于寒即泄。當臍而痛不能久立與而虛皆是足陽明胃脈之病。胃同候。取巨虛上廉。胃病者。腹脹。當心而痛。上支兩腋。膈咽不通。食飲不下。取之三里。膚韻膜肉與噴同昌真切隔胸膈在心脾之間。脾名曰屬。小腸病者。小腹痛。腰脊控掣而痛。時瘡之後。當耳前熱。若塞也。管上下使氣與穀不相亂也。咽食管也。小腸病者。小腹痛。腰脊控掣而痛。時瘡之後。當耳前熱。若寒甚。若獨周上熱甚。及手小指次指之間熱。若脈陷者。此其候也。手太陽病也。取巨虛下廉。引也。舉音高腎丸也。張景岳曰小腸氣化于小腹後附腰脊下引睾丸。三焦病者。腹氣滿。小腹尤堅。不得小便。瘡急溢其爲堵痛及不得大小便而時瘡之後。蓋即所之屬也。

時權實有其異者
其一也
先坐後坐
其引異之
並引異之
所由來立
而就結連之
樞踏難之

則爲水留。卽爲脹候。在足太陽之外大絡。大絡在太陽少陽之間。亦見于脈。取委陽膀胱病者。小腹偏腫而痛。以手按之。卽欲小便而不得。肩上熱。若脈陷。及足小指外廉。及逕踝後皆熱。若脈陷。取委中央。逕音脹以下附以上之長骨也。踝音跨骨在跨上之兩旁。確然隆起者。膕病者。善太息。口苦。嘔宿汁。心下澹澹。恐人將捕之。嗌中吟吟然。數唾。在足少陽之本末。亦視其脈之陷下者灸之。其寒熱者。取陽陵泉。脈也。吟音介。呻吟有聲也。曰。刺之亦有道乎。曰。刺此者。必中氣穴。無中肉節。中氣穴。則針染于巷。中肉節。卽皮膚。痛。張景岳曰。經氣所至。是謂氣也。巷道也。中其氣穴。則針著脈道。而經絡通。穴肉有節界。是謂肉節。染著中其肉節。則子病無當。而反爲皮膚痛害。補寫反。則病益篤。中筋則筋緩。邪氣不出。與其真相搏亂而不去。反還內著。用針不審。以順爲逆也。由此觀之。其府干府。藏干藏。剛爲藏。柔爲府者。似非拈定五藏。博乘之遞次。五邪五干之疊移。顧此寒熱血氣陰陽之爲邪。是卽肺心脾肝腎五神藏。皮毛血脉肌肉筋骨。五形藏。各具寒熱血氣陰陽微甚而成病。誠所謂皮毛者。肺之合。血脉者。心之合。肌肉者。脾之合。筋者。肝之合。骨者。腎之合。是以諸急。尺之皮膚亦急。諸緩。尺之皮膚亦緩。諸大。尺之皮膚亦大。諸小。尺之皮膚亦減而少。氣諸滑。尺之皮膚亦滑。諸澀。尺之皮膚亦澀。澀則多血少氣。微有寒。滑則陽氣盛。微有熱。小則血氣皆少。大則多氣少血。緩則多熱。急則多寒。形與藏相參。藏與形相應。陰陽血氣寒熱。交相參應。而病作矣。至六府雖未徵有脈狀。亦不越寒熱血氣陰陽微甚之爲眚。總難踰靈樞立論之本意。第人未之

思耳。至若靈樞藏府病形法。交互行持無往非評脈審疾析理窮源之捷徑。故不才語多支蔓意多重複。至疊引經言。非無故也。語多支蔓意多重複是先生一片苦心承人處。恐人不會其意。故于更得推而廣之。亦可假緩急大小滯滑諸法。施于三部六位。左右手上下部推上下。推內外四時六十首氣口人迎互爲證明。十二經脈。交相料簡。陰陽二十五人各有宣忌。所謂化而裁之存乎。繩推而行之存乎。通神而明之存乎人矣。

右第七段言脈有輕重分析形層爲五合肺心脾肝腎五神藏之效。象叶越人一脈輒變爲十之剛柔邪多靈樞一脈微甚輒變一十有二邪氣藏府病形

此言上部之確候。然
腿二陰度。固屬易
記。然。據。且。部。
各有異脈。則隨形。古法不踰。
此言上部。記法天地人。
此言下部。人之法天地人。

部之專而後效象乃確。倘中部之候雖獨調而與衆藏相減者。或與衆藏相減者。則莫可依據。不若遵古
九候者。之無疑。二也。岐伯云。天地至數。始于一。終于九。一者天。二者地。三者人。因而三之。三者九以應
九野。故人有三部。部有三候。以決死生。以處百病。以調虛實。以除邪疾也。所謂部有三。上中下也。部各三
候。天地人也。必指而導之。乃以爲真。上部天。兩額之動脈。在額兩傍。動應于手足少陽脈氣之所行也。上
部也。兩頰之動脈。在鼻孔下兩傍。動應于手足陽明脈氣之所行也。上部人耳前之動脈。在耳前陷者中。
動應于手。手少陽脈氣之所行也。中部天。手太陰。也在掌後寸口中。是謂經渠。動應于手。手太陰肺脈之
所行。中部地。手陽明。也在手大指次指歧骨間。合谷之分。動應於手。手陽明大腸脈之所行。中部人。手少
陰。也在掌後鋸骨之端。神門之分。動應於手。手少陰心脈之所行。下部天。足厥陰。也在羊矢下一寸半陷
者中。五里之分。臥而取之。動應于手。女子則取太衝。在足大指本節後二寸陷者中。動應于手。咸屬足厥
陰肝脈之所行。下部地。足少陰。也在足內踝後跟骨上陷者中。太谿之分。動應于手。足少陰腎脈之所行。
下部人。足太陰。也在魚腹上。越兩筋間直五里。下箕門之分。寬章足單衣沉取乃得之。動乃應於手。足太
陰脾脈之所行。蓋裏。若候胃氣者。當取足跗之上。衝陽之分。穴中之脈。動乃應於手。足陽明胃脈之所行。
故下部之天以候肝。足厥陰之脈行其中也。地以候腎。足少陰之脈行其中也。人以候脾胃之氣。足太陰

此言下部
法地
以候肝脾
此言上部
法天

脾法而脾
與胃相連

人以胃爲
本故候脾

必讓候胃

此言中部

以候肺首

中心法

此言上部

以候頭角

口齒耳目

法三法由

地謂天三

才之道備

此統百三

部九候以

之法兼度

形之肥瘦

此言之虛實

以決死

之脈行其中也。脾與胃相連。人以胃爲本。故候脾兼候胃矣。

脾與胃以膜相連

中部之天以候肺。手太陰脈當其處也。

張景岳曰。大腸小腸皆屬於胃。胃腕通於胸中。故以候胸中。

人以候心。手少陰脈當其處

也。上部之天以候頭角之氣。位在頭角之分。故候頭角之氣也。

雨額之動脈當頭角之分。地以候口齒之氣。位在口齒

之分。故候口齒之氣也。

雨頰之動脈當口齒之分。

人以候耳目之氣。位在耳前。脈抵於目外。皆故候耳目之氣也。

耳前之動脈當耳目之分。

脈兼抵于目之外。皆故候耳目之氣也。

耳前之動脈當耳目之分。

目之外皆蓋三部者。各有天。各有地。各有人。三而成天。三而成地。三而成人。三而三之合則爲九。九分爲

九野。九州分野天上之二十八宿。其山川郡縣各有分屬也。九野爲九藏。故形藏四。神藏五。合爲九藏。蓋九野者。天分之爲

九州。其山川郡縣各有分屬也。九野爲九藏。故形藏四。神藏五。合爲九藏。蓋九野者。天分之爲

九野。地別之爲九州。而人應之爲九藏。非謂九藏稱九野也。神藏五者。肺藏魄。心藏神。脾藏意。肝藏魂。腎

藏志。是爲神藏五。形藏四者。一頭角。二耳目。三口齒。四胸中。是爲形藏四。合爲九藏也。所謂五藏者。爲五

神所居之處。所謂四藏者。如器外張。虛而不屈。含藏於物而不洩。是以五藏已敗。四形乃壞。其色必夭

必死矣。天者其色枯槁而不候之之法。必先度其形之肥瘦。以調其氣之虛實。實則瀉之。虛則補之。必先

去其血脈而後調之。無問其病。以平爲期。總以體中血氣和平方爲全愈。如形盛脈細。少氣不足以息

者。危。形瘦脈大。胸中多氣者。死。形氣相得者。生。參伍不調者。病。三部九候有相得者。有相失。三部九候皆

相失者死。上下左右之脈。相應如參春者病甚。上下左右相失不可數者死。脈欲其和。若上下左右如以

許春米參差不齊。則病甚若。

相失而至于不中。中部之候雖獨調於衆藏相失者死。中部之候相減者死。中部之脈雖調而上部下部衆部之脈減于上下二部。目內陷者死。五臟六府之精皆上注于目而爲至病之所在。察九候獨小者病。死者中氣大衰也亦死。目內陷者陽精脫矣故必死。至病之所在察九候。獨小者病。獨大者病。獨疾者病。獨遲者病。獨熱者病。獨寒者病。獨陷下者病。下者脈沉伏不起。以左手足上上去踝五寸而按之。庶右手當足踝而彈之。庶者近也。近右手足之當踝而彈之也。其應過五寸以上。蠕蠕然者不病。其應疾。中手渾渾然者病。中手徐徐然者病。其應上不能至五寸。彈之不應者死。蠕音如蠕蠕蟲行和平有若蟲之蠕動也。疾急疾也。渾渾濁而不分明之狀。是以脫肉身不去者死。身不去者身不能行也。肉脫者脾胃敗敗也。中部指兩手寸口之脈乍其脈代而鈎者死。病在脈絡。張景岳曰代而鈎者俱知病在九候之相應也。上下若一不得相失。一候後則病。二候後則病甚。三候後則病危。所謂後者應不俱也。應不俱者應之不同一也。察其府藏以知死生之期。後者是或先或後而不齊。必先知經脈然後知病脈經脈者平人不病之常脈也。知常乃可達變爾。如真藏脈見者勝死。若肝之懸絕弦心之懸絕鈎肺之懸絕毛腎之懸絕石脾部若雀之喙水之流屋之漏下。此皆真藏脈見無胃氣者之爲逆也。逆者死。謂其大異于常。如肝木本絃今乃弦之至于極甚而胃氣全亡矣。下倣此喙音晦雀之勝死者謂勝死於喙言堅銳不柔也。水之流去而不返也。屋之漏下點滴無倫也。俱是無胃氣之怪脈。勝死者謂勝死於己之時則死矣。故肝見庚辛死。心見壬癸死。脾見甲乙死。肺見丙丁死。腎見戊己死。是謂勝死也。然此真

二氣之病
當微之皮
毛血筋骨
肉筋膜骨
體之合以
決死生之

藏脈見者。見太陰之氣口而以九候交相參應。以決死生者也。真藏脈見于寸口。變端呈矣。然又必兼足。

太陽氣絕者。其足不可屈伸。死必戴眼。張景岳曰。足太陽之脈下者合。脈中貫。蹠內出外踝之後。上者起

血枯筋急。足不可屈伸。死必戴眼。目內皆其脈有通順入于腦者。正屬目本名曰眼系。故太陽氣絕

戴眼。戴眼者精上視而瞪也。經脈云。手太陰氣絕。則皮毛焦。太陰者行氣溫於皮毛者也。故氣不榮則皮

毛焦。皮毛焦。則津液去皮節。津液去皮節者。則爪枯。毛折。毛折者。則毛先死。丙爲丁死。火勝金也。手太陰

主皮毛。手少陰氣絕。則脈不通。脈不通。則血不流。血不流。則面色不澤。故其面黑如漆柴者。血先死。壬爲

癸死。水勝火也。主血脉而屬火。足太陰氣絕者。則脈不榮。肌肉。唇舌。肌肉之本也。脈不榮。則肌肉軟。肌

肉軟。則舌萎。人中滿。人中滿。則唇反。唇反者。肉先死。甲爲乙死。木勝土也。足太陰脾也。脾主肌肉而屬土。足少陰氣絕。則

骨枯。少陰者。冬脈也。伏行而濡骨髓者也。故骨不濡。則肉不能著也。骨肉不相親。則肉軟却。肉軟却。故齒

長而垢。髮無澤。髮無澤者。骨先死。戊爲己死。土勝水也。足少陰腎也。腎主骨而屬水。濡音潤澤也。足厥陰氣絕。則筋絕。厥陰

者。肝脈也。肝者筋之合也。筋者聚於陰器。而脈絡於舌本也。故脈弗榮。則筋急。筋急。則引舌與卵。故唇青

舌卷。卵縮。則筋先死。庚爲辛死。金勝木也。足厥陰肝也。肝五陰氣俱絕。則目系轉。轉則目連。目連者爲志

先死。志先死。則達一日半死矣。張景岳曰。五藏之精皆上注于目。故五陰氣絕。則目轉。運爲志先死之

所見者正陰。氣竭絕之候。六陽氣絕。則陰與陽相離。離則腠理發泄。絕汗乃出。故曰。古夕死。夕占旦死。張景岳曰。汗本

當微之皮毛。血筋骨。肉筋膜骨。體之合以決死生之。

陽氣絕則陰陽相離而勝理不辨脈云脈浮而洪身汗如油喘而不休水漿不下形體不仁乍靜乍亂此

閉脫汗乃出死在須刻間矣辨脈云脈浮而洪陽氣外越也身汗如油陰精外洩也喘而不休真氣將脫也

爲命絕也水漿不下胃氣已敗也形體不仁肝腎將絕也乍靜乍亂陰陽相離也又未知何藏先受其災

若汗出髮潤喘而不休者此爲肺先絕也汗出如油之變文陽反獨留形體如烟熏直視搖頭者此爲

心絕也人之生也全藉陰陽二氣而陽氣爲尤要所謂分陽未盡則不死是也然陰氣既脫陽氣無所附

氣已經孤陽失依故唇吻反青四肢聚習者此爲肝絕也

柔音發方中行曰柔汗出現習鳥數飛也言手足顫搖如鳥之習飛奮振而已環口

黧黑柔汗發黃者此爲脾絕也

柔汗冷溲便遺失狂言目反直視者此爲腎絕也又未知何藏陰陽先絕

若陽氣前絕陰氣後竭者其人死身色必青陰氣前絕陽氣後竭者其人死身色必赤腋下溫心下熱也

並錄以補遺闕辨脈以下之詞乃仲景傷寒論錄之以補靈樞經脈內未及詳言之遺闕本論云九候之脈皆沉細懸絕者爲陰主冬故必夜半死盛躁喘數者爲陽主夏故以日中死是故寒熱病者以平旦死熱中及熱病者以日中死病風者以

日夕死病水者以夜半死其脈乍疏乍數乍遲乍疾者日乘四季死日乘四季者日乘辰戌丑未四季日

時而死也以一日攝一歲平旦者春也日中者夏也日暮者秋也夜半者冬也夜半陰盡陽生故陰極者

死日中陽盡陰生故陽極者死平旦爲陰陽之分故寒熱病者亦于陰陽出入之時死風木同氣木值秋金則克故病風者以日夕死夜半水旺之時故病水者以夜半死乍疏乍數者

乍遲乍疾其脉變遷不常者中虛無主也四季者五行之墓地故敗竭之藏遇之而死形肉已脫九候雖

謂猶死七診雖見九候皆從者不死從順所言不死者風氣之病及經月之病似七診之病而非也故言

此言別見
經絡與孫
法針以平
期切從
死生之要
先微从脉
避所見以

不死。若有七診之病。其脈候亦敗者死矣。其死也必發嘯噦。噦於決切呢通也。應音伊又音隘。噦氣也。必審問其所始病。與今之所方病。而後各切循其脈。視其經絡浮沉。以上下逆從循之。其脈疾者不病。其脈遲者。病脈不往來者死。皮膚著者死。陽俱脫皮膚著者皮膚乾槁善骨血液已竭也。其經病者治其經。孫絡病者治其孫絡。血病身有痛者。治其經絡。脈道之正者爲經。其支而橫者爲絡。絡之別而浮于肌膚者也。其病在奇邪者。奇邪之脈則繆刺之。奇邪者。奇縹不偶之氣。而與經絡繆處也。故繆刺之繆刺者。刺絡脈。左取右。而右取左也。奇邪者不入于經。而病于絡也。邪客大絡。則左注右。右注左。其氣無常處。故當繆刺之。繆刺與裡同。留瘦不移。節而刺之。留瘦者淹留病氣。減瘦形容。證不移易。則消息節級養而刺之。所謂無問其病。以平爲期也。上實下虛。切而從之。察其結絡脈。刺出其血。以見通之。索其結者。先去血脉而後調之。明其結脈乃先去也。切切其脈而求其病之所在也。從從滯于絡脈之間。當刺出其血。結滯既去。而後氣血之流通與否。可以見矣。瞳子高者。太陽不足。戴眼者。太陽已絕。以決死生之要。不可不察也。瞳子高者目上視也。戴眼者上視之甚而定直。不動也。此又重明足太陽之證。而分其輕重以決死生。

右第八段詳言三部九候之法。錯引內經難經異同博約之說。

此引韓人
言至難損
脉之別
下上上下
大宜體會

一脈有損至。越人云。至之脈。一呼再至曰平。三至曰離經。四至曰奪精。五至曰死。六至曰命絕。此至之脈也。何謂損。一呼一至曰離經。再呼一至曰奪精。三呼一至曰死。四呼一至曰命絕。此損之脈也。至脈從下

上損脈從上下也。平人之脈一呼再至一吸再至呼吸定息脈凡四至加之則爲過越人所謂至脈蓋脈之數甚者也減之則爲不及越人所謂損脈蓋脈之遲甚者也。損脈之爲病奈何。一損損於皮毛。皮聚而毛落。蓋皮毛者肺之合。以皮毛之損卽知其肺之損也。損其肺者益其氣。二損損於血脈。血脈虛少。不能榮於五藏六府。蓋血脈者心之合。以血脈之損卽知其心之損也。損其心者調其營衛。三損損於肌肉。肌肉消瘦。藏食不能爲肌膚。蓋肌肉者脾之合。以肌肉之損卽知其脾之損也。損其脾者調其飲食。適其寒溫。四損損於筋。筋緩不能自收持。蓋筋者肝之合。以筋之損卽知其肝之損也。損其肝者緩其中。五損損於骨。骨痿不能起於牀者死。蓋骨者腎之合。以骨之損卽知其腎之損也。損其腎者益其精。此治損之法也。肺主氣故治肺損者宜益其氣。心主血脈故治心損者宜調其榮衛。榮衛者血脈之所貫也。脾主飲食故治脾損者宜調其飲食。適其寒溫。適其寒溫者如春夏食涼。秋冬食溫。食熱且不特飲食。凡衣服起居各當其時。皆是也。肝主血脈虛則中不足。一云肝主怒。怒能傷中。氣故治肝損者宜緩其中。經曰。肝苦急急食肝以緩之。緩者和也。腎主精。受損則精必不足。反此者至。蓋所謂至者先筋緩不能自收持。次肌肉消瘦。飲食不能爲肌膚。次血脈虛少。不能榮於五藏六府。次皮聚而毛落。此至脈之爲病也。至脈從下上者。下筋骨而上皮毛。故從下上者皮聚而毛落者死。損脈從上下者。上皮毛而下筋骨。故從上下者骨痿不能起於牀者死。某氏曰。下上之爲至。卽勞傷之從內而外也。上下之爲顧損也。至也不越統體之至數。其爲病也不外肺心肝脾胃之五神藏。參合皮毛血脈肌肉筋骨之五形藏。請形藏致于神藏亦可。神藏致于形藏亦可。卽于神藏也。亦屬藏形之爲

此言脈增
于常者爲
體

此言脈減
于常者爲
體

告故獨著形軀之剝落而無與藏神之勝魁。所謂形不神俱。此爲自傷氣之削也。脈來一呼再至一吸再至不大不小曰平。一呼三至一吸三至爲適。得病謂前大後小卽頭痛目眩前小後大卽胸滿氣短一呼四至一吸四至病欲甚。脈洪大者苦煩滿沉細者腹中痛滑者傷熱濁者中霧露大者苦煩滿病在高也。脈沉細者腹中痛病在下也。滑爲傷熱。熱傷氣而不傷血。血自一呼五至一吸五至其人當困沉有餘故脈滑也。濁爲中霧露霧露之寒傷人榮血血受寒故脈濁也。滑伯仁曰脈洪細夜加浮大晝加不大不小雖困可治。其有大小者爲難治。滑伯仁曰脈至一呼五至一吸五至其人以見二脈人雖困猶可治。大小卽浮大沉細也。一呼六至一吸六至爲死脈也。沉細夜死浮大晝死一呼一至一吸一至名曰損。人雖能行猶當著床。所以然者血氣皆不足故也。再呼一至再吸一至再呼吸一至名曰無魂。無魂者當死也。某氏曰無魂無人雖能行名曰行屍。此亦不越統體至數與往來復兼形體部位舉按去來諸法矣。蓋病形別異于前證者。謂不獨形藏之爲告。或復具有身相之三停。或內或外或不內外之爲因。或陰或陽或魂魄之消耗。爻相顛錯以爲病態者耳。至上部有脈下部無脈。其人當吐不吐者死。法當吐也。若無吐證是上無邪而下氣竭也。故當死。上部無脈下部有脈雖困無能爲害。所以然者人之有尺。譬如樹之有根。枝葉雖枯槁。根本將自生。脈有根本人有元氣故知不死。此則罔與乎呼吸之至數。宜應獨著乎往來之部位者矣。蓋脈來之損至卽脈至之疾徐至固不離于至而損能獨外乎

至乎其爲病也。先皮聚而毛落。漸骨痿不能起于床者有之。先筋緩不能自收持。漸皮聚而毛落者亦有之。其皮聚毛落必參夫脈至之徐爲損。其筋緩不能自收持必應夫脈至之疾爲至則亦未盡然矣。何也。緣損至之爲病未盡徵有損至之爲脈或至病而脈至徐者有之或損病而脈至疾者亦有之。由此觀之但可云從下上者至之病從上下者損之病不可云損脈之爲病至脈之爲病也。卽至病與損病本玉機

雖人稱損
至之爲病
水之玉機
流藏之玉機
虛之異者

真藏之五癥。痹閉也如邪閉于肺卽爲肺痹邪閉于肝卽爲肝痹藏有五故有五癥。此獨統徵之皮毛筋骨而曰損與至也。玉機云大骨枯槁大肉陷下胸中氣滿喘息不便其氣動形期六月死。

皆大骨也。尺膚骨肉皆大肉也。肩垂頸傾腰重膝敗是大骨枯槁也。尺膚既削肉亦枯是大肉陷下也。腎主骨骨虧則腎敗矣。脾主肉內肉陷則脾敗矣。肺主氣氣滿喘息則肺敗矣。氣不歸原形體振動則孤陽外浮而真陰虧矣。三陰虧損死焉不出六月六月者一歲陰陽。

陽之五病。先大骨而接毛折龍。先皮毛而辨遺食氣。先筋骨而入胃散精。先脈而治之。先皮毛而始也。堅而搏如循薏苡子者短實堅強而非微鈎之本體乃心之真髓脈也赤本火色而兼黑不澤者水克火也故死毛折義同前

大骨枯槁大肉陷下胸中氣滿喘息不便。張景岳曰內痛引肩項期一月死又甚期一月死一月者斗建移而氣易也。蓋火精外絕陽浮上燔金罹火刑內痛引肩項心先絕矣。真藏脈見堅而搏如循薏苡子累累然色赤黑不澤毛折乃死。張景岳曰堅而搏如循薏苡子者短實堅強而非微鈎之本體乃心之真髓脈也赤本火色而兼黑不澤者水克火也故死毛折義同前

大骨枯槁大肉陷下胸中氣滿喘息不便。張景岳曰堅而搏如循薏苡子者短實堅強而非微鈎之本體乃心之真髓脈也赤本火色而兼黑不澤者水克火也故死毛折義同前

內痛引肩項。身熱脫肉破脣。期十日之內死。或一月之內死。

張景岳曰。身熱者陰氣微也。脫肉者肌肉消

盡也。破脣者臥久骨髓而筋肉敗也是爲五臟俱傷而真藏脈又見當十日內死十日者天干盡而旬氣易也。○脣動尤切音塞筋肉結聚之處也。啓

元子曰。肝膝後肉如塊者或一月之內死。今素問中無此六字或別本有之否則盧君有所證而以意增

之。蓋陰氣微竭陽氣內焦。身熱如灼。脣肉破脫。脾先絕矣。真藏脈見。竭而乍數乍疎。色黃青不澤。毛折乃

死。張景岳曰。弱而乍數乍疎則和緩全無而非微弱之本體。乃脾之真藏脈也。黃本土色而兼青不澤木克土也。大骨枯槁。大肉陷下。肩髓內消。動作益衰。真

藏未見。期一歲死。未全真藏未見而敗竭已兆。僅支一年歲易氣新不能再振矣。蓋精涸髓消缺益益

也。如指彈石辟辟然沉而堅也。皆非微石之本體乃腎之真藏脈也。黑本水色兼黃不澤者土克水也。

大骨枯槁。大肉陷下。胸中氣滿。腹內痛。心中不便。肩

項身熱。破脣脫肉。目眶陷。蓋肝氣通于心。抵腹布脇。開竅于目。目神精墮。肝先絕矣。真藏脈見。中外急如

循刀刃責責然如按琴瑟弦。色青白不澤。毛折乃死。目不見人立死。其見人者至其所不勝之時則死。張

景岳曰。五藏敗證俱見而目眶陷真藏脈顯目不見人。神氣俱脫故當立死。若能見人者。神氣猶在可以延

至危賊之時而死。其脈中外急如循刀刃責責然如按琴瑟絃。細急堅搏而非微絃之本體乃肝之

真藏脈也。青本木色而兼白不澤者金克木也。顧藏分五辨。亦不越形體外內下上之次第。此則先大骨而後毫毛也。至呼吸疾

徐之曰。損至者亦本平人氣象脈至之常變。曰人一呼脈再動。一吸脈亦再動。呼吸定息脈五動。閏以太

息。命曰平人。出氣曰呼。入氣曰息。一呼一吸爲一息。平人之脈一呼兩動一吸亦兩動。呼吸定息謂前息已盡而後息未起之際脈又一動故曰五動閏餘也。常息之外間有一息甚長者是爲閏以

此皆歸人
精損至之
爲脉本子
平人氣象
脈至之常
變因文有
增加體有
同異遠古

大息蓋猶閏月之義。五平人者不病也。常以不病調病人。醫不病故爲病人平息以調之爲法。不病者其急或緩或急而不勻。醫者不病乃能爲病人調息以知其脈之情狀。人一呼脈一動。一吸脈一動。曰少氣。脈爲血氣之徑路而脈之運行全藉乎氣。若一呼一動一吸一動。誠于平人之半知。人一呼脈三動。一吸脈三動而躁。尺熱者曰病溫。既躁且疾。復參應尺之皮膚亦熱者。病溫之所以致也。尺不熱脈滑者曰病風。不躁而滑。此又病風之所以致也。脈濇曰痹。不躁而濇。此又痹閉之所以致也。躁者急也。尺熱者。言尺中近脣之處有熱。當知其通身皆熱也。脈數躁而身有熱。當知其病溫。濇爲血不調。一呼脈四動以上曰死。乍疎乍數曰死。脈絕不至曰死。其肌肉雖不脫。真藏雖不見。猶死也。故當病癥。譬如墮溺不可爲期。一呼脈四動則一息八至矣。是藏氣已竭而失其常度之微。乍疎乍數者。陰陽將離。未脫真藏之未見而決其未至于死。譬之墮者越人復演呼吸六至。前大後小。卽頑痛目眩。前小後大。卽漏者。其死之時刻不可以常理論矣。○數音弱。越人復演呼吸六至。前大後小。卽頑痛目眩。前小後大。卽胸滿氣短。吸呼八至。洪大者苦煩滿。沉細者腹中痛。滑者傷熱。濇者中露霧也。至呼吸十至。其人當困。沉細夜加浮大晝加不大不小。雖困可治。其有大小者爲難治。呼吸十二至。沉細夜死。浮大晝死。以決陰陽之短期。經則曰。呼吸八至。以上者皆死脈也。一呼一至。一吸一至。名曰損。再呼一至。再吸一至。名曰無魂。無魂者當死也。人雖能行。名曰行屍。死固其常。及上部有脈。下部無脈。其人當吐。不吐者死。上部無脈。下部有脈。雖困無能爲害。此但可存其脈狀。未始不參應夫病形。設必局守至數疾徐之爲損。至恐未暇察。

及上下內外根枝本末以決死生矣。

右第九段辯越人脈有損至之說

一越人曰。經言脈不滿五十動而一止。一藏無氣者。何藏也。然人吸者隨陰入。呼者因陽出。今吸不能至腎。至肝而還。故知一藏無氣者。腎氣先盡也。此卽四難呼出心與肺。吸入腎與肝。呼吸之間。脾受穀味也。其脈在中。爲析形層五部。舉按之浮沉。以驗神形藏狀之呈象。亦可推及統體至數。往來行止者矣。倘吸不至腎而至肝還。則宜五動一止。似難五十動而後止。第止必由代。乃可予以短期。否則終屬陰陽氣結之爲時一止也。張景岳曰。後世以結促代並言。均目之爲止義。夫緩而一止爲結數。而一止爲促其至則或三或五或七八至不等。然晉至數分明。起止有力。所主之病有因氣逆痰壅而爲閭阻者。有因血氣虛脫而爲斷續者。有因生平稟賦多滯而脈道不流利者。此自結促之謂也。比之代脈。則有不同。根結篇云。人一日一夜五十營。以應五藏之精。不應數者。名曰狂生。營運也。人之經脈。運行于一身者。不應晝夜五十。所謂五十營者。五藏皆受氣。持其脈口數其至也。五十動而不一代者。五藏皆受氣。數乍疎或斷而復起。蓋因藏有所損。則氣有所虧。故變易若此。均名爲代。若五十動而不一代。張景岳曰。代更代之義。謂于平脈之中。而忽見弱弱或乍者。五藏受氣皆足。乃爲和平之脈。四十動一代者。一藏無氣。三十動一代者。二藏無氣。二十動一代者。三藏無氣。十動一代者。四藏無氣。不滿十動一代者。五藏無氣。張景岳曰。靈樞根結篇。但言動止之數。以和乃添出死期歲數。曰脈來四十投而一止者。一藏無氣。却後四歲。春草生而死。脈來三十投而一止者。二藏無氣。却後三歲。麥熟而死。二十投而一止者。三藏無氣。却後二歲。桑椹赤而死。脈來十投而一止者。二藏無氣。却後二歲。桑椹赤而死。脈來三十投而一止者。

四藏無氣歲中死。脈水五動而一止者五。藏無氣却後五日而死。自後諸家言脈者。予之短期要在終始。要在終始者數其至數之代。計其終始如一也。所謂五十動而不一代者。以爲常也。以知五藏之期。予之短期者。乍數乍疎也。張景岳曰。欲知其短期則在乎乍數乍疎。此其時相變代乃與常代者不同。蓋以藏氣衰敗無所主持而失常如此。故三部九候等論皆云乍疎乍數者死。蓋代者。動而中止不能自還。因而復動。名曰代也。滑伯仁曰。動而中止不能自還。因而復動。由是復止。尋之良久乃復強起爲代。良久強起四字傳神妙筆。

右第十段言不滿五十動而一止之脈

一六十首者。三陰三陽之王時日大要也。王各六十日。六六三百六十日。以成一歲。蓋陰氣流行則爲陽。故冬至之後得甲子。則少陽王。陽氣微上。則陰氣微下。是以少陽之至。乍大乍小。乍短乍長。乍大乍長。顯諸陽。乍小乍短。存乎陰也。復得甲子。陽明王。陽氣漸盛。則陰氣漸衰。是以陽明之至。浮大而短。浮大顯諸陽。短則仍存乎陰也。復得甲子。太陽王。陽氣已隆。陰氣已息。是以太陽之至。洪大而長。純著三陽之陽氣矣。陽氣凝聚則爲陰。故夏至之後得甲子。則太陰王。陰氣微上。則陽氣微下。是以太陰之至。緊大而長。緊始顯諸陰。長大存乎陽也。復得甲子。少陰王。陰氣漸盛。則陽氣漸衰。是以少陰之至。緊細而微。三象純著乎陰者。以少陰藏體唯藏。前此之陽既衰。後此之陽未育。故若伏若匿。統體之惟陰也。復得甲子。厥陰王。陰氣既隆。即陽氣胚兆。是以厥陰之至。沉短而敦。沉短顯諸陰。敦厚存乎陽也。此皆王脈也。非病脈也。言

其時則見此脈。然則昔之陽卽今之陰。今之陰卽昔之陽。總一元之氣爲之環運耳。故曰陰氣流行則爲陽。陽氣凝聚則爲陰也。以上是越人難經。越人本平人氣象。太陽脈至洪大而長。少陽脈至乍數乍疎。乍短乍長。陽明脈至浮大而短。按時第次復補三陰脈至之數。以惠來學。豈小補云乎哉。至至真要大論三百六十五日而一至者。六三計一千八百日。又六六計三百六十日。又六五計三十日。共計二千一百九十日。以成六期。未之備也。六期六年也。每六年而始一週難經中未備此說如下文所言者是也。如巳亥厥陰之至。其脈弦。子午少陰之至。其脈鈎。丑未太陰之至。其脈沉。寅申少陽之至。其脈大而浮。卯酉陽明之至。其脈短而濶。辰戌太陽之至。其脈大而長。王各三百六十五日。六期還位。周而復始也。第至而和則平。至而甚則病。至而反者病。至而至者病。未至而至者病。陰陽易者危。或脈從而病反。其至也從。按之不鼓。諸陽皆然。諸陰之反脈至而不得。按之鼓甚而盛也。和者無太過無不及。是爲和平之脈。甚者太過而失其中。和之氣如但弦無胃但鈎無胃之類。反者反見相背之脈。如應浮反沉。應大反小也。時已至而脈不應。來氣不足也。時未至而脈先至。來氣太旺也。故皆主病。乃若一氣之中。又例有司天之至。在泉之至。上下左右間。陰陽交易。正氣錯亂。失其常度。病必危殆矣。乃若一氣之中。又例有司天之至。在泉之至。上下左右間。陰陽交易。正氣錯亂。失其常度。病必危殆矣。

初二三四五終之至。各宜甄別。庶不至混淆莫辨也。

石第十一段言六十首王時之脈

按素問方盛衰論云奇恆之勢乃六十首。然篇中初不詳言其義。王氏注謂奇恆六十首。今世不存。張景岳謂六十首即禁服篇所

謂九針六十篇。今失其傳。張隱菴則謂奇恆之勢各以六十爲首。即診要經終篇脈解篇所論是也。蓋以六十日而氣在一藏爲首。五臟相通而次序旋轉者也。難經第十六難云。問脈有六十首篇中。

並不答所問故謝氏注亦謂疑有缺文晉公直取七難中六甲王時之脈一段以補其闕千古之
疑一朝頓解隱菴與晉公同時略有後先宜乎熟聞其說故其素問之注亦與診則相同如此也

一五藏脈已絕于內用針者反實其外五藏脈已絕于外用針者反實其內此則層分五部循形藏之皮毛血脈部。診肺合與心合之爲外也筋膜骨髓部。診肝合與腎合之爲內也所謂實其外者補其心肺實其內者補其腎肝陽絕補陰陰絕補陽是謂實虛虛損不足而益有餘如此死者醫殺之耳。以上是越人難經中第十二靈樞九針十二原篇有曰凡將用針必先診脈視氣之劇易乃可以治也五藏之氣已絕于內而難之義靈樞九針十二原篇有曰凡將用針必先診脈視氣之劇易乃可以治也五藏之氣已絕于內而用針者反實其外是謂重竭重竭者必死其死也靜治之者輒反取其腋與膺腋與膺者諸藏穴之標也外也。竊氣已絕于內陰虛也針者反益其陽益陽則陰愈五藏之氣已絕于外而用針者反實其內是謂逆厥逆厥則必死其死也躁治之者反取其四末四末井榮俞經合諸藏穴之本也內也。竊氣已絕于外益其陰益陰則陽愈虧必病逆厥而死蓋四末之爲內腋膺之爲外心肺之爲外腎肝之爲內宜兩審矣。陽并于陰則陽氣有餘故其死也躁蓋四末之爲內腋膺之爲外心肺之爲外腎肝之爲內宜兩審矣。

右第十二段言內外之絕難經與靈樞有氣脈之殊學者所宜兩審

第十三段言脈有六部

第十四段言脈有四時

第十五段言脈有寸口

以上三段余所見諸本皆闕其詞蓋遇文也黨海內藏書之家或有全文得賜借鈔續付梓人以成完璧爰以嘉惠後學古今一大快事也

卷終

學古診則第三帙之上

錢塘盧之頤子錄甫輯正

一金匱要略單言寸口與關分尺寸統言寸關尺三停以及單言寸或關與尺者凡三十則藏府經絡先後病脈證篇曰寸口脈動者因其王時而動假令肝王色青四時各隨其色肝色青而反色白非其時色脈皆當病色脈俱當應所王之時如春時肝木王色宜青今反白則色不合脈宜弦今反毛曰寸口脈沉而滑沉則爲實滑則爲氣實氣相搏血氣入藏則死入府卽愈此爲卒厥其唇口青身冷者爲入藏如身和汗自出爲入府也張隱菴曰實者邪也邪入於經則沉以內薄故沉則爲實也夫陰陽相搏其脈則滑氣入於經而與血相搏故滑則爲氣也邪在經絡則漸入藏府氣主煦之血主體之者爲入府入藏者死不治入府者可以治而愈○書中言搏字皆作聚字合字解下倣此中風歷節病脈證篇曰寸口脈浮而緊緊則爲寒浮則爲虛寒虛相搏邪在皮膚浮者血虛絡脈空虛賊邪不漏或左或右邪氣反緩正氣卽急正氣引邪喝僻不遂邪在於絡肌膚不仁邪在於經卽重不勝邪入於府卽不識人邪入於藏舌卽難言口吐涎邪初本在皮膚因絡脈空虛邪反內陷而不能外出所謂賊邪不脈遲而緩遲則爲寒緩則爲虛營緩則爲亡血衛緩則爲中風邪氣中經則身癢而癰疹心氣不足邪氣入中則胸滿而短氣曰寸口脈沉而弱沉卽主筋弱卽主筋沉卽爲腎弱卽爲肝汗出入水中如水傷心

歷節黃汗出。故曰歷節也。張隱菴曰：歷節者，節節歷到心者，神之至也。節之交三百六十五會，神氣之所遊行水氣傷心則神氣遊越是以汗隨心氣而出者爲歷節黃汗也。否則止爲黃汗而非血痹。虛勞病脈證篇曰：血痹病脈微滯在寸口關上小緊者，此尊榮人骨弱肌膚盛重困疲勞汗出，臥不得時動搖如被微風，遂得之。宜針引陽氣令脈和，緊去則愈。經言血凝於膚者爲痹，血行而不得返於經隧，遂成痹閉。曰：血痹陰陽俱微。寸口關上微尺中小緊外證身體不仁如風痹狀也。陰陽俱微者，氣血兩虛，肺痿肺癰，欬嗽上氣病脈證篇曰：寸口脈數其人咳口中反有濁唾涎沫者，肺痿之爲病也。若口中辟辟燥欬，卽胸中隱隱痛脈反滑數，此爲肺癰欬唾膿血也。若脈數而虛者爲肺痿數而實者爲肺癰。肺居屬金，畏火克如上焦有火銷燬其肺中津液以致肺葉乾枯，時患欬嗽口中常有濁唾涎沫是爲肺痿。若口中辟辟欬出，燥痰附中隱隱作痛，則肺益熱而涎沫并竭矣必成肺癰。陰陽相搏脈則爲滑，肺居脈不應滑今見滑脈，故曰脈反滑數。凡肺痿肺癰其脈皆數但數而虛者爲肺痿肺葉之形尙未殘毀數而實者爲肺癰肺葉之形必致傷爛矣。曰：寸口脈微而數微則爲風數則爲熱微則汗出數則惡寒風中於衛呼氣不入熱過於營吸不出風傷皮毛熱傷血脈風舍於肺其人則咳口乾喘渴咽燥不渴時唾沫時時震寒熱之所過血爲凝滯畜結癰膜吐如米粥始萌可救膿成則死也。胸痹心痛短氣病脈證篇曰：寸口脈沉而遲關上小緊數喘息咳唾胸背痛短氣胸痹之爲病也。胸痹者胸中陽氣爲陰氣所搏閉而不舒致有喘息欬吐胸背痛短氣腹滿寒疝宿食病脈證篇曰：寸口脈弦者卽脇下拘急而痛其人齶齒惡寒也。弦肝脈也。肝脈循脇裏而塞主拘急故脇下拘急曰寸口

此或有
足趺陽
及少陰
參照者
爲少陰

脈浮而大。按之反濇。尺中亦微而濇。故知有宿食也。宿食在中阻礙中氣。故脈之浮大者。按之而反濇也。張隱菴曰。經脈之所生。自尺而關寸。由沉而中。浮寸阻塞。是以按之濇而尺中亦微而濇。五藏風寒積聚病脈證篇曰。積者藏病也。終不移聚者府病也。發作有時。展轉痛移。爲可治。馨氣者。胸下痛。按之則愈。復發者。爲馨氣。馨字原文作稊字。馨氣卽金匱首篇所謂馨飪之邪。從口入者。但彼則指審食而言。此則指飲食之氣停積留滯者而言也。張隱菴曰。夫食氣入胃。散精於肝。淫氣於筋。肝虛而不能散。穀精之氣以養筋脈。故脇下痛。按之則氣散而愈去。其按則氣復聚而痛又發矣。氣本無形。故按之可愈。若有形之食積。大法脈來細而附骨者。乃積也。張隱菴曰。諸積之脈。無論上下陰陽。其大法以脈來接之。則益痛也。諸積大法。脈來細而附骨者。知是積也。蓋血積故脈細。病陰藏之氣。故細而附骨也。寸口積在胸中。微出寸口。積在喉中。關上積在膚旁。上關上積在心下。微下關積在少腹。尺中積在氣衝。脈出左。積在左。脈出右。積在右。脈兩出。積在中央。各以其部處之痰飲欬嗽病脈證篇曰。欬逆倚息不得臥。小青龍湯下已。多唾。口燥。寸脈微。手足厥逆。氣從少腹上衝胸咽。手足癥。其面翕熱。如醉狀。因復下流陰股。小便難。時復冒者。治其氣衝。欬息因欬逆氣不順。故傾欬而通其息也。小青龍湯本無陽。尺微則知其陰虧。以致陰陽不能順接。而厥逆遂作。而熱如醉狀者。胃熱上衝薰其面也。冒者。眩廻而昏冒也。治其氣衝者。治其上衝胸咽之氣衝。氣得平而諸證亦止矣。水氣病脈證篇曰。寸口脈浮而遲。浮脈則熱。遲脈則潛。熱潛相搏。名曰沉。趺陽脈浮而數。浮脈卽熱。數脈卽止。熱止相搏。名曰伏。沉伏相搏。名曰水。沉則絡脈。虛伏則小便難。虛難相搏。水走皮膚。卽爲水矣。曰寸口脈弦而緊。弦則衛氣不行。卽惡寒。水不沾。走於腸間。曰寸口脈沉而遲。沉則爲水。遲則爲寒。水相搏。趺陽脈伏水。

穀不化脾氣衰則驚。驚者少陽脈卑少陰脈細。男子則小便不利。婦人則經水不通。經爲血。不利則爲水。名曰血分。驚鴻也。鴻矢多濤其道也。必有聲故以喻大便。一遺卽已稍復。遺無定限者曰驚瀉。曰寸口脈沉而緊。沉則爲水。緊則爲寒。沉緊相搏結在關元始時當微。年歲不覺。陽衰之後。營衛相干。陽損陰盛。結寒微動。腎氣上衝。喉咽塞。噎。脇下急痛也。曰寸口脈遲而濶。遲則爲寒。濶爲血不足。趺陽脈微而遲。微則爲氣遲。則爲寒。寒氣不足。則手足逆冷。手足逆冷。則營衛不利。營衛不利。則腹滿。腸鳴相逐。氣轉膀胱。營衛俱勞。陽氣不通。卽身冷。陰氣不通。卽骨痛。陽氣前通。則惡寒。陰氣前通。則痹。不仁。陰陽相得。其氣乃行。大氣一轉。其氣乃散。實則失氣。虛則遺尿。名曰氣分。陽氣不通者。身冷若陽氣先通而陰氣未和。雖身冷已愈。猶覺畏寒。陰氣不通者。骨痛若陰氣前通而陽氣未暢。雖骨痛已愈。尙有痹閉不仁之患。故必陰陽之氣同運。而後周身之氣乃行。大氣者正氣也。正氣流轉於一身。而無所阻滯。則身中邪氣之爲者。自皆散逐。不能留矣。實則失氣。虛則遺尿。蓋言氣散之從二陰而出者。有此二樣。遺尿蓋言小便之多。不作遺失之遺解。今之病氣。服者往往從後陰頻失氣而愈。病水脹者。往往從前陰小便。輒下而愈。所謂實者。乃氣閉不行之爲實。所謂虛者。綠氣虛不能化而後水生。其間之爲虛也。黃疸病脈證篇曰。寸口脈浮而緩。浮則爲風。緩則爲痹。非中風。四肢苦煩。脾色必黃。瘀熱以行也。風邪內閉致于苦煩。並不同於風中四肢之痺邪。在於脾身必發黃。蓋內之瘀熱發。竊脾之在內。外所當分別。驚悸吐衄下血。胸滿瘀血。病脈證篇曰。寸口脈動而弱。動則爲悸。弱則爲悸。曰寸口脈弦而大。弦則爲減。大則爲芤。減則爲寒。芤則爲虛。虛相擊。此名曰革。婦人則半產漏下。男子則亡血失精。則空如芤草之中空。故曰芤。則爲虛。虛寒相擊。其脈

爲革蓋緣外寒故。似皮革緣內虛故。按之如鼓而空虛較之絃則內空大較之芤則外有力別其名曰革爲亡血失精之病○芤音樞嘔吐噦下利病脈證篇曰寸口脈微而數微則無氣無氣則營虛營虛則血不足血不足則胸中冷曰下利寸脈反浮數尺中自滿者必圓臘血也。下利脈當沉緩今寸脈反見浮數陽熱之氣反盛於外也。尺中自滿者經血滯血矣○圓音清廁也。瘡癰腸癰浸淫病脈證篇曰寸口脈浮微而濡法當亡血若肝出設不汗者云何答曰若身有瘡被刀斧所傷亡血故也。盧晉公脈浮浮脈者在肉上行若所病在外者第浮而微濡微則中行無力濡則將行濡濡法當亡血出汗蓋榮行脈中血者榮氣之所生汗者血氣之所成在奪汗者無血脉應如是今無汗何爲見此脈象或身有金瘡或被刀斧所傷亡血所致脈亦效之爲不內外因也張隱菴曰此論奪血者無汗也寸口以上寸口尺脈浮而微者陽氣虛也。濡者無血也當主亡血及汗出所致設不汗者此因金瘡亡血故也。寸口尺三停諸脈之常變及兩手關前關後陰陽之盛衰左人迎右氣口以前關上神門以後之實虛寸關尺浮沉滑濶等脈之變常更合前寸口六部陰陽府藏衆脈效象何莫非寸口尺中三停之過與不及。第單拈寸口者則關尺三處常變同等也。設尺寸參差斯變無經常三部不同斯病各異端故太過可怪不及亦然邪不空見中必有奸知其所含消息診看料度藏府獨見若神矣若三部流行不失衝銓隨時動作效象形容此正平人之常氣稟於胃者平人之常脈也由此觀之凡脈效形罔非寸口之常變以一推十十推百不啻百千計矣。

右第十六段引金匱要略論寸口三部象證

至有常中之變。變中之常者。如寸之與尺。男女有恆而反者。曰。男子生於寅。寅爲木陽也。女子生於申。甲爲金陰也。故男脈在關上。女脈在關下。此言男女之始生也。金木交。寅申合。而作少陽之乳宇。故得少陽寅木之陽者。男生焉。得少陽申金之陰者。女生焉。紀天錫曰。生物之初。其本原皆始於子。子者萬物之所於。已是男女婚嫁之數也。自已而懷娠。男左旋十月而生於寅。女右旋十月而生於申。滑伯仁曰。陽之體輕清而升。天道也。故男脈在關上。陰之體重濁而降。地道也。故女脈在關下。比男女之常也。第金孕於巳。木孕於亥。巳亥合水火濟。而作厥陰之胞胎。故木藏火裏。而孕男。金藏水裏。而孕女。所謂龍從火裏。得金。向水中求。攢簇五行。胞胎乳宇之機彀乎。蓋乾資大始。天道也。父道也。以垂象。坤作成物。地道也。母道也。以成形。子午爲經。卯酉爲緯。辰戌丑未爲四維。寅申巳亥爲四長生。地而後水火濟。金木交。地道備矣。斯留愛爲種。納想成胎。便裹胞衣。範圍神室。仍賴十干。以成經之手。十有二支。以成經之足也。乃得藏府神形之若。天干有十。應人之十。手指地支有十二。應人之十二。見靈樞邪客篇。足指及宗筋。舉九爲十二。胚胎將兆。男乘寅木而生。女載申金而育。是以男子寸脈恒盛。尺脈恒弱。女子尺脈恒盛。寸脈恒弱也。蓋陰必本乎陽。故陰生於寸。而動於尺。女故陰有餘。是以尺脈恒盛者之爲常也。陽必本乎陰。故陽生於尺。而動於寸。男故陽有餘。是以寸脈恒盛者之爲常也。反者。男得女脈爲不足。病在內。左得之。病在左。右得之。病在右。隨脈言之。此常中之變。亦似變中之常也。左得之。病在左右。得之。病在右。隨脈言之。此常中之變。亦似變中之常也。

右第十七段言尺寸之脈男女有恒而相反之變

脈有伏匿。皆謂陰陽更相乘。更相伏也。脈居陽部。在也。陽部者。關前九分陽位應浮之脈也。而反陰脈見者。沉澑弱弦微之爲陰。陰形呈見陽位者。此爲陰乘於陽之脈也。脈雖時或浮滑而長。此謂陰中仍伏有陽也。是謂重陽。重陽者狂。是謂脫陽。脫陽者見鬼。脈居陰部。陰部者。關後一寸陰位應沉之脈也。而反陽脈見者。大浮數動滑之爲陽。陽形呈見陰位。此爲陽乘乎陰之脈也。脈雖時或沉澑而短。此謂陽中仍伏有陰也。是謂重陰。重陰者癲。是謂脫陰。脫陰者目盲。舉按亦可見。上下亦可見。此又變中之變也。狂與癲之疾相類而不同。狂者妄言妄走或笑罵或悲哭舉止乖異者也。蹶者痴迷昏默懵若無知甚者僵仆瞶視若死而生者也。狂者陽疾其寸口三部必陽脈俱盛。癲者陰疾其寸口三部必陰脈俱盛。滑伯仁謂狂疾發於陽其狀皆自有餘而主動癲疾發於陰其狀皆自不足而主靜是也。重讀如重復之重即俱陽俱陰之謂。脈陽見鬼者陰盛已極陽遂脫矣。鬼者陰幽之氣陽氣已絕故陰氣現形也。脫陰目盲者陽盛已極陰遂脫矣。目得血而能視陰氣已絕陰血并竭故目盲也。按是謂重陽以下四句是謂重陰以下四句皆就上文乘脈伏脈之外而推廣言之不緊承上文而言也。連用四是謂字乃先哲一時趁筆之誤後賢宜善會其義不可以文害辭以辭害意作承接文句解也。丁能用難經補注云此非特言寸爲陽部尺爲陰部以上下言則肌肉之上爲陽部肌肉之下爲陰部此則所謂舉按可見者即是肌肉之上肌肉之下義也。所謂上下可見者謂關之上下卽是寸部尺部之義也。

右第十八段言脈有伏匿之變

如北政之歲。少陰在泉。則兩手寸口不應。厥陰在泉。則右寸不應。太陰在泉。則左寸不應。南政之歲。少陰

尺寸之應否

司天則兩寸口不應厥陰。司天則右寸不應太陰。司天則左寸不應諸不應者。反其診則見也。故北政之歲三陰在下。則寸不應。三陰在上。則尺不應。南政之歲三陰在天。則寸不應。三陰在泉。則尺不應。左右同法。此皆變中之常也。不應者脈之沉細不應手指也。若著極沉極細於伏而不可見。第覆病者之手而診之則見也。凡值此不應之脈。乃歲運合宜。命曰天和之脈不必治之。若誤治之反伐天和矣。故曰必先歲氣無伐天和。所謂北政之歲者是乙丙丁戊庚辛壬癸八年所謂南政之歲者是甲己二年。蓋甲己二年爲土運。土位中央有君集焉。面南而行令。故曰南政。其乙庚二年爲金運。丙辛二年爲水運。丁壬二年爲木運。戊癸二年爲火運。四運各居偏位。有臣集焉。北向而受命。故曰北政。

右第十九段言運氣分南北政而脈之尺寸有不應之變

如寸口脈平而死者。越人云。諸十二經脈者。皆係於生氣之原。所謂生氣之原者。謂十二經之根本也。謂腎間動氣也。此五藏六府之本。十二經脈之根。呼吸之門。三焦之原。一名守邪之神。故氣者。人之根本也。根絕則至衰枯矣。寸口脈平而死者。生氣獨絕於內也。生氣獨絕於內者。謂少腹之動氣獨絕也。少腹之動氣。乃先天一氣。所謂元陰元陽者也。此與三部九候中所云。中部雖獨調。與衆藏相失者死。又不同。蓋彼猶云與衆藏相失。此祇是腎間動氣之絕。遂不可救藥。此又常中之變也。

右第二十段言寸口脈平而死之變

此演識人八脉寸口脉平而死者之說。從古而上所陳諸脉之說。皆能逐歌詳論。理深源一無事。後學耳目體力。能行斯稱善者也。

此才寸口脉平以人

一人迎寸口。別陰陽。分外內者。人迎足陽明胃脈也在頭下夾結喉旁一寸五分主陽。蓋手太陰肺藏也。主外以候府寸口手太陰肺脈也。主陰主內以候藏。

配府經
藏區內區
外分陽分陰以較盛衰是為十
二經脉圖而察其名者

陰也。內也。手陽明大腸府也。陽也。外也。成雌雄之匹配。以爲表裏者也。故肺手太陰之脈絡大腸而屬肺。大腸手陽明之脈絡肺而屬大腸。故曰肺合大腸。大腸者傳道之府也。大腸在小腸下主出糟粕爲陽胃變化之傳道故曰傳道之府是以藏盛者。寸口大三倍於人迎。虛者寸口反小於人迎也。府盛者人迎大三倍於寸口。虛者人迎反小於寸口也。三倍者以兩脈相較而知其一倍二倍三倍之殊足太陰脾藏也。陰也。內也。足陽明胃府也。陽也。外也。成雌雄之匹配。以爲表裏者也。故脾足太陰之脈絡胃而屬脾。胃足陽明之脈絡脾而屬胃。故曰脾合胃。胃者五穀之府也。胃主受納飲食故曰五穀之府。是以藏盛者。寸口大三倍於人迎。虛者寸口反小於人迎也。府盛者人迎大三倍於寸口。虛者人迎反小於寸口也。手少陰心藏也。陰也。內也。手太陽小腸府也。陽也。外也。成雌雄之匹配。以爲表裏者也。故心手少陰之脈絡小腸而屬心。小腸手太陽之脈絡心而屬小腸。故曰心合小腸。小腸者受盛之府也。小腸居胃之下受盛胃中水穀而分其清潤水液則滲入膀胱由前陰而由糟粕則傳入大腸。由後陰而出故曰受盛之府。是以藏盛者。寸口大再倍於人迎。虛者寸口反小於人迎也。府盛者人迎大再倍於寸口。虛者人迎反小於寸口也。足少陰腎藏也。陰也。內也。足太陽膀胱府也。陽也。外也。成雌雄之匹配。以爲表裏者也。故腎足少陰之脈絡膀胱而屬腎。膀胱府營衛生會篇曰水穀俱下而成下焦。是以藏盛者。寸口大再倍於人迎。虛者寸口反小於人迎也。府盛

者。人迎大再倍於寸口虛者。人迎反小於寸口也。手厥陰心主包絡藏也。陰也。內也。手少陽三焦府也。陽也。外也。成雌雄之匹配。以爲表裏者也。故心主手厥陰心包絡之脈。歷絡三焦而屬心包絡。三焦。手少陽之脈。散絡心包絡而屬三焦。三焦者。中瀆之府也。水道出焉。屬膀胱是孤之府也。是六府之所與合者。瀆者。謂如川如瀆源流皆出其中。凡水穀之入於口出於便自上而下必歷三焦。故曰中瀆之府。水道出焉。膀胱受三焦之水。而當其疏泄之路。氣本相依體同一類。故三焦下輸出於委曲並太陽之正入絡膀胱。下焦也。然於十二藏之中。惟三焦獨大諸藏無與匹者。故曰是孤之府也。○三焦雖爲水瀆之府。而實總護諸陽。亦稱相火。是又水中之火府。故在本篇曰三焦屬膀胱。在血氣形志篇曰少陽與心主爲表裏。蓋其在下者爲陰屬膀胱而合腎水。在上者爲陽合包絡而又曰少陽屬腎。腎上連肺。故將兩藏。少陽三焦之正脈。指天散於胸中。而腎脈亦上達於肺。三焦之脈屬於膀胱而膀胱爲腎之合。故三焦亦屬於腎也。夫三焦爲中瀆之府。膀胱爲津液之府。腎以水藏而領水府理之。當然。故腎得兼將兩藏。將頭也。本藏篇云。腎合三焦膀胱。其義即此稱三焦。是以藏盛者。寸口大一倍於人迎。虛者。寸口反小於人迎也。府盛者。焦膀胱爲兩藏府。亦可以稱藏也。是以藏盛者。寸口大一倍於人迎。虛者。寸口反小於人迎也。府盛者。人迎大一倍於寸口虛者。人迎反小於寸口也。其非表裏以爲雌雄者。則因相盤絡而連屬矣。故禁服篇云。寸口主中人。迎主外。兩者相應俱來俱往。若引繩而大小齊等。春夏人迎微大。秋冬

較其真相配府藏之
故於秋冬必微大
謂之平人也。人迎大一倍於寸口病在足少陽。一倍而躁病在手少陽。人迎二倍病在足太陽。二倍而躁病在手太陽。人迎三倍病在足陽明。三倍而躁病在手陽明。人迎足陽明胃脈也。湯明主表而行氣於三陽故人迎大一倍於寸口病在足經之少陽矣。凡二部三部病皆在足而躁則皆在手義相同。盛則爲熱虛則爲寒。緊則爲痛痹代則乍甚。乍間盛則寫之。虛則補之。緊痛則取之分肉代則取血絡且飲藥。陷下則灸之。不盛不虛以經取之。名曰經刺。人迎陽脈也。盛則陽太過故爲熱虛則陽不足故爲寒乍甚乍間猶言時作時止也。緊則爲痛痹故當取分肉代因血氣不調故當取血絡且飲調和之藥脈陷下不起者有寒帶故宜灸之。若不因血氣之盛虛而病有留於經絡者則當隨經所宜或飲藥或灸刺以取之也。經刺者刺大經之結絡經分也。人迎四倍者且大且數。名曰溢陽。溢陽者外格死不治必審其本末察其寒熱以驗其藏府之病。人迎偏盛至於四倍寸口且大且數乃陽氣盛極而盈溢與陰相格拒而不與之相通是爲外格乃不治證也。若一倍二倍三倍不過爲病而但有輕重之分耳故當審按其致病之本末察其寒熱驗其藏府而施治焉。若溢陽外格必死不治之證無所用其審察與驗矣。寸口大於人迎一倍病在足厥陰。一倍而躁病在手心。主寸口二倍病在足少陰。二倍而躁病在手少陰。寸口三倍病在足太陰。三倍而躁病在手太陰。寸口手太陰肺脈也。太陰主裏而行氣於三陰故寸口大一倍於人迎病在足經之厥陰。而躁病皆在手心亦相同。○人迎寸口相爲表裏故人迎一倍者病在足少陽寸口一倍者病在足厥陰。膽與肝爲表裏也。一倍而躁人迎在乎少陽寸口在手心主三焦包絡爲表裏也。二倍三倍之表裏皆相應。盛則脹滿寒中食不化。虛則熱中出糜少氣滯色變緊則痛痹代則乍痛乍止。盛則寫之虛則補之緊。

寸口微大如是著名曰平人。太陰行氣於藏故寸口主中陽明行氣於府故人迎主外一表一裏往來相應此所謂寸口人也。遇彼急此減絕諸十倍三以上爲陽爲格經刺則輕利補滿以瀉補久服膏根參俱木禁勿迎極始歸之寸口人迎極終始盡之大體悉歸陽溢法無所不備者會

同盛則脹滿寒中食不化。虛則熱中出糜少氣滯色變緊則痛痹代則乍痛乍止。盛則寫之虛則補之緊

則先刺而後灸之。代則取血絡而後調之。陷下則徒灸之。徒也。陷下者脈血結於中。中有著血。血寒。故宜灸之。不盛不虛。以經取之。名曰刺經。寸口陰脈也。陰盛則陽虛。故爲脈滿。塞中飲食不化。陰虛則著血。不起。因寒氣著於血。而血結爲滯。得火氣逐之。則寒氣去。而結滯散。故但灸之而愈。不必刺也。餘同上。寸口四倍者。名曰內關。內關者。且大且數。死不治。必審察其本末之寒溫。以驗其藏府之病。寸口偏盛。至於四倍。人迎且大。且數。乃陰氣盛極而盈。溢與陽阻隔。有若關塞閉而不通。故曰內關餘同上。通其營輸。乃可傳於大數。大數曰。盛則徒寫之。虛則徒補之。緊則灸刺。且飲藥。陷下則徒灸之。不盛不虛。以經取之。所謂經治者。飲藥亦曰灸刺。脈急則引。脈大則弱。則欲安靜。用力無勞也。營經脈也。輸音怒榮輸也。大數引去之脈大以弱者。陰不足也。終始篇云。凡刺之道。畢於終始。明知終始。五藏爲紀。陰陽定矣。陰者主藏。宜安靜。以養陰。用力無勞也。營經脈也。輸音怒榮輸也。大數引去之脈大以弱者。陰不足也。終始篇云。凡刺之道。畢於終始。明知終始。五藏爲紀。陰陽定矣。陰者主藏。陽者主府。陽受氣於四末。陰受氣於五藏。陽主外。故受氣於四末。故寫者。迎之。補者。隨之。知迎知隨。氣可令和。迎者。迎其來而奪之。隨者。隨其去而導之。總和氣之方。必通陰陽。五藏爲陰。六府爲陽。傳之後世。以血爲盟。敬之者昌。慢之者亡。無道行私。必得天殃。未曾謂明陰陽終始之道。而行其私心。謹奉天道。請言邪詖之術。以欺人。必爲天理所不容。謹奉天道。請言終始終始者。經脈爲紀。持其脈口。人迎以知陰陽有餘不足。平與不平。天道畢矣。脈口卽寸口也。脈口在處。可以察五藏之陰。人迎在頸爲陽。所謂平人者。不病。不病者。脈口人迎應四時也。上下相應。而俱往俱來也。六經之脈。不結動也。本末之寒溫之相守司也。形肉血氣。必相稱也。是謂平人。春夏人迎微。大秋冬寸口微大。所謂應四

體迎人迎在上寸口在下往則俱往來則俱來相應如一若引繩大小齊等也結濶者不足動疾者有滿
皆肺六經之平脈也。藏氣爲本肌肉爲末時寒而寒時溫而溫司守不至相失故外之形肉內之血氣無
一不相稱者。是謂平人。少氣者脈曰人迎俱少而不稱尺寸也。如是者陰陽俱不足。補陽則陰勝。如是
者。以甘藥不口飲以至劑如此者勿灸。不已者因而寫之。則五藏氣壞矣。少氣者元氣虛也。兼陰陽
必皆衰少無力而兩手之尺寸亦不相稱如是者陰陽之氣俱不足矣。治之者不可偏一蓋偏於補陽則
陰竭。偏於濁陰則陽敗。故祇可以甘藥將之。甘藥之說最是妙用。欲補虛羸非至甘至純之藥不可也。至
謂純於補陽。純於補陰。固至之刺又言若有如此之證。捨甘藥之外。刺之固不可灸之亦不可。而言主之人迎下之氣口
不可灸者。以火能傷陰也。若勿已而必欲刺之。以寫其有餘。則五藏敗壞而生意盡矣。戒之也。人迎一
盛病在足少陽。一盛而躁病在手少陽。人迎二盛病在足太陽。二盛而躁病在手太陽。人迎三盛病在足
陽明。三盛而躁病在手陽明。人迎四盛且大且數。名曰溢陽。溢陽爲外格。一盛二盛三盛四盛卽上文大
倍二倍三倍四倍之義下此脈口一盛病在足厥陰。一盛而躁病在手心主脈口二盛病在足少陰。二盛而躁病在手少陰脈口三
盛病在足太陰。三盛而躁病在手太陰。脈口四盛且大且數者。名曰溢陰。溢陰爲內關。內關不通死不治。
死則人迎一盛寫足少陽而補足厥陰。二寫一補日一取之。必切而驗之。疎取之上氣和乃止。人迎一盛
陽脈經肝膽相爲表裏膽實而肝虛故當寫足少陽之府補足厥陰之藏寫者二補者一寫倍於補凡三
陽盛者俱二寫一補也。疎取之者欲其從容不宜急也。上氣言氣之至也。氣至而和。穀氣至矣。故可止針
下微人迎二盛寫足太陽而補足少陰。二寫一補二日一取之。必切而驗之。疎取之上氣和乃止。人迎二
盛病在

是太陽膀胱經膀胱與腎相爲表裏

膀實而腎虛故當寫足太陽補足少陰人迎三盛寫足陽明而補足太陰二寫一補日一取之必切而驗

之疎取之上氣和乃止人迎三盛病在足陽明胃經胃與脾相爲表裏

裏胃實而脾虛故當寫足陽明補足少陰

脈口一盛寫足厥陰而補足少陽二補一寫補

補一寫日一取之必切而驗之疎而取之上氣和倍於寫几三陰盛脈口二盛寫足少陰而補足太陽二補一寫補

者當補倍於寫也脈口二盛寫足少陰補足太陽

實而膀胱故當寫足厥陰補足少陽二補一寫補

倍於寫几三陰盛脈口二盛寫足少陰補足太陽

裏腎實而膀胱虛故當寫足少陰補足太陽

脈口三盛寫足太陰而補足陽明二補一寫日二取

乃止脈口二盛病在足少陰腎經腎與膀胱相爲表裏

腎當補倍於寫也脈口二盛寫足少陰補足太陽

脈口三盛寫足太陰補足太陽所以日二取之者太陽

主腎大富於穀氣故可日二取之也此重釋上文脾胃二經之治也太陽主胃謂太陰主脾陽明主胃蓋

人迎之治治三陽也皆曰二寫一補氣口之治治三陰也皆曰二補一寫蓋三陽主表病在表者宜寫倍

於補三陰在裏病在裏者宜補倍於寫皆以臟氣爲重惟恐其或傷耳又如厥陰少陽肝膽木藏也東方

多實故可一日一取之太陰陽明脾與胃也脾胃大富於穀氣故可日二取之惟少陰太陽則二日一取之蓋腎與膀胱爲天一之藏真陰之原故宜保重如此聖人之顧根本豈惟鍼刺爲然哉人迎與

脈口俱盛三倍以上命曰陰陽俱溢如是者不開則血脈閉塞氣無所行流滯於中五藏內傷如此者因

而致之則變易而爲他病矣俱盛三倍以上卽四倍也不開不通也血脈閉塞氣無所行流滯於中五藏

證生機末由凡刺之道氣調而止補陰寫陽音氣益彰耳目聰明反此者血氣不行張景岳曰此陰陽以

死損益促矣凡刺之道氣調而止補陰寫陽音氣益彰耳目聰明矣若作陰陽之正氣解謂陰常不足故當補陽常有餘故當寫者大誤所謂氣至而有效者

所當補也故曰補陰邪自外入所當寫也故曰寫陽外邪去而真氣王自然音聲益明耳目聰明矣若作陰陽之正氣解謂陰常不足故當補陽常有餘故當寫者大誤所謂氣至而有效者

寫則益虛。虛者脈大。如其故而不堅也。堅如其故者。適雖言。故病未去也。虛之專者。欲其虛也。既寫之後。雖其脈大。如舊。但得和緩不堅。即其虛之效也。若脈堅不減。雖病人適言。身體平復如故。而病實未除。過則又發。未見其效也。補則益實。實者脈大。如其故而益堅也。夫如其故而不堅者。適雖言快。病未去也。病之虛者。補之補者。欲其實也。實則脈必堅。乃其效也。既補之後。而脈之大小不堅。如舊者。雖病人適言已快。而病尚未去也。

二節所謂大者。乃概指脈。故補則實。寫則虛。痛雖不隨針。病必衰去。病雖未能隨針。即愈而視其脈之宜之進退。而言非洪大。之謂故補則實。寫則虛。痛者。卽指病之一證。而必先通十二經脈之所生病。而後可得傳於終始矣。十經脈各有左右上下。其受病之處。亦有先後必治。其病所從生而後可得終始之義。終始卽本末之謂。故陰陽不相移。虛實不相傾。取之其經。移易也。或陰或陽。無所改易。不相移也。虛者自虛實者自實。不相傾也。此則無所從生。而各病其病。但求其經。而取之。凡刺之屬。三刺至穀氣。邪僻妄合。陰陽易居。逆順相反。浮沉異處。四時不得。稽留溼決。須針而去。邪辟妄合六句。詳言病變也。凡此者。皆須用針治以三刺之法。而後可去。故一刺則陽邪出。再刺則陰邪出。三刺則穀氣至。穀氣至而止。所謂穀氣至者。已補而實。已寫而虛。故已知穀氣至也。初刺之在可出陽分之邪。再刺之在於深遠。故可出陰分之邪。三刺之在候。穀氣。穀氣元氣也。止出針也。蓋邪氣之來也。緊而疾。穀氣之來也。徐而和。必邪氣去而後穀氣至。故已補而實。則脈之虛者。堅已瀉而虛。則脈之堅者。軟知穀氣獨去者。陰與陽未能調。而病知愈也。邪氣獨先去而穀氣尙未至。故陰陽尙未調然。氣之已至也。邪氣既退。正氣自然漸復。故知其病之必愈也。故曰補則實。瀉則虛。痛雖不隨針。病必衰去矣。陰盛而陽虛。先補其陽。後寫其陰。而和之。陰虛而陽盛。先補其陰。後寫其陽。以和之也。張景岳曰。治病者。宜先顧正氣。後治邪氣。蓋攻實無難。伐虛當畏。觀於此節之義。可見用針用藥。其理無不同也。靈樞動輸篇云。經脈

十二而手太陰足少陰陽明獨動而不休者何也曰是明胃脈也。胃爲五藏六府之海其清氣上注於肺。肺氣從太陰而行之其行也以息往來故人一呼脈再動一吸脈亦再動呼吸不已故動而不止。明胃脈經之動皆因之曰氣之過於寸口也。上十焉息下八焉伏何道從還不知其極之十分何以過此脈遂息焉於胃脈也。曰氣之過於寸口也在上得尺中而不動其在下得尺中之八分何以脈當此猶伏而未現不知從何道徑而祐於此一寸九分之中往還不息如此此中至極之理有所未明故問之。曰氣之離藏也卒然如弓弩之發如水之下岸上於魚以反衰其餘氣衰散以逆上故其脈微言氣之離於臟而發見於寸口也卒然下岸有其勢焉不可遏也天機所動皆自然之理也過此而上於魚則餘氣已衰散矣而猶逆以上行故其勢微也以上詳言手太陰肺脈之動。曰足之陽明何因而動曰胃氣上注於肺其悍氣上衝頭者循咽上走空竅循眼系入絡腦出顱下客主人循牙車合陽明并下人迎此胃氣別走於陽明者也故陰陽上下其動也若一故陽病而陽脈小者爲逆陰病而陰脈大者爲逆。陰陽俱靜俱動若引繩相傾者病。張景岳曰牙車卽曲牙當是頰車也顰音坎又海殼切顰之釋義曰飢而面脈立已癲狂篇曰治狂者取頭兩顰蓋皆言頭面之部位也此節言自腦出顱下客主人則當在腦之下脣之前客主人之上疑卽齒骨之上兩太陽之間爲顰也陰陽上下統上文手太陰而言也蓋胃氣上注於肺本出一原雖胃爲陽明脈上出於人迎肺爲太陰脈下出於寸口而氣本相貫故彼此之動其應若一也然人迎屬府爲陽之病則陽脈宜大而反小爲逆寸口屬藏爲陰之病則陰脈宜小而反大者爲逆陰陽大小脈各有體設陰陽不分而或則俱動或則俱靜若引繩之勾者則曰足少陰何因而動曰衝脈其陰陽之氣非此則彼必有偏傾而致病者矣以上詳言足陽明胃脈之動曰足少陰何因而動曰衝脈者十二經之海也與少陰之大絡起於腎下出於氣街循陰股內廉邪入腦中循脛骨內廉並少陰之經。

此承十二經原之原
起始注於二經
輪還逆為周
期百五十無分晝夜
歲終年為究

下入內踝之後入足下。其別者邪入踝出屬跗上。入大指之間。注諸経。以溫足脛。此脈之常動者也。足少陰之脈動者以衛脈與之並行也。衛脈與少陰之絡同起於腎。下出於足。易明之氣街循陰股而下。處以入足下。其別者斜出屬跗上。注諸絡。以溫足脛。此太谿等脈所以常動不已也。以上詳足少陰腎脈之動。曰營衛之行也。上下相貫。如環之無端。今有卒然遇邪氣。及逢大寒。手足懈惰。其脈陰陽之道。相輸之會。行相失也。氣何繇還。營衛之行周流上下。終而復始。無有止息。若遇邪氣阻隔其間。則陰易所當。四末陰陽之會者。此氣之大絡也。四街者。氣之徑路也。故絡絕則徑通。四末解則氣從合。相輸如環之無端。莫知其紀。終而復始。此之謂也。四末四支也。十二經皆終始於四支。故曰陰陽之會。而爲氣之大絡也。然大絡雖會於四支。復有氣行之徑路。謂之四街。所謂胸氣有街。腹氣有街。頭氣有街。脰氣有街。乃胸腹頭脰之氣所聚。所行之道。路故謂之氣街。凡邪之中人。多在大絡。故絡絕則徑通。及邪已去。而四末解。彼絕此通。氣從而合。迴環轉輸。無有相失。所謂如環無端。莫知紀極者也。蓋藏陰府陽。小大盛衰。虛實寒熱。何莫非以人迎氣口。別陰陽。分外內。成診切之大法。世多目爲刺灸之用。棄置勿顧。甚至併經取飲藥而盡昧之。卽前文所云以經取之取之致令後學失此大法耳。未之聞目未之見矣。殊不知刺灸之分補寫卽處方之操機穀也。此二句是晉公先生以金針度與人處嘉惠後學陰德不小。用是備錄經文者三文。雖三見理。則一貫誠能於此研窮。合諸法而歸一。不獨十二經脈。卽形神藏舍。四體百骸。以及氣運。統御標本病傳。證因常變。若指諸掌矣。

右第二十一段言人迎氣口分別陰陽內外以定藏府虛實補寫治法

是知經脈終始貫注環周不可不受持讀誦者也。否則舉指便錯檢徧方書亦何益耶。附錄經脈少稠數

字以顯經義毋嫌誕妄其幸大矣。

經脈是靈樞經中之第十篇下文所引雷公問於黃帝云云是其文也

雷公問於黃帝曰禁服之言凡刺

之理經脈爲始營其所行制其度量內次五藏外別六府願盡聞其道度量言裁度其分數也五藏屬裏

故言內次六府屬表故言外別此數語卽靈樞第四十八禁服篇中之文但此章內次外別字彼章作內刺外刺爲不同耳

黃帝曰人始生先成精精成而髓生骨

爲幹脈爲營筋肉圓肉爲牆皮膚堅而毛髮長穀入於胃脈道以通血氣乃行以植立百體者也身之有

脈猶地之有川所以通行血氣者也筋力剛勁故能約束骨骼肉爲垣牆故能周衛血氣雷公曰願卒聞經脈之始生也

卒蓋胃循巡繞也膈膜居心肺之下

黃帝曰經脈者所以能決生死處百病調虛實不可不通也

藏肺手太陰之脈經接起端於中焦中焦當胃之中脘在脾上四寸之

脈脈於此凡後手三下旋盤絡府配之大腸復還循於胃口上本藏之膈膜前齊鳩尾後齊十一椎周圍

相著所以遮隔濁氣不使上衝心肺也歸屬本藏之肺舍乃從肺系岐分橫出左右之腋下

肺腋音亦肺之下脇之上也

不使上衝心肺也

歸屬本藏之肺舍乃從肺系岐分橫出左右之腋下

肺腋音亦肺之下脇之上也

下循肱肉嫩裏爲膕內行少陰心主之前行

肱之內側上至腋下至肘肉之隆起裏白者曰膕膕音無又奴刀切音深少陰心經也心主手厥陰心包絡也手之三陰

太陰在前厥陰在後下肘中循臂內上臂之下廉

脅與臂之交處曰肘中骨掌後高骨也脅音也背之千廉角

依側入寸口上魚循魚際出大指之端

手腕二頭大指本節之間其肉隆起形如魚者號謂之魚寸口之

字解入寸口上魚循魚際出大指之端即少商穴手太陰經脈止於此

其支者斜從腕後直出次指內廉出其端

支者是正経之外有旁通之絡如樹木旁出之枝故曰支也

其直然此經脉各經脉不生焉諸經脉皆乘而後按

其直然此經脉各經脉不生焉諸經脉皆乘而後按

水標化令部署形層萬端造疾無能不宗於此世人僅作一經一路讀者失之遺矣凡又多畏謬為其句古卒難點鑒不才帝覽題字筆釋語詞易於行持以資考經討也

之側而出其端以府大腸手陽明之脈經並接起兩手大指次指之端。大指次指謂大指旁之次指即今接於手陽明經也。府大腸手陽明之脈經並接起兩手大指次指之端。人所謂食指也。恐人誤以無名指當之故云次指之端。有商陽穴手陽明之脈起於此手之循指上廉。出合谷兩骨之間。指上廉指之上側三陽從手走頭故手陽明脈發於此。凡後手三陽經皆然。循指上廉二間三間也。外陰行於內後諸經皆同循指上廉二間三間也。指上廉指之上側也。凡經脈陽行於合谷穴在大指次指後兩岐骨間所謂虎口也。上入兩筋之中合循臂上廉入肘外廉上臑外前廉筋池穴以下爲臂自曲池穴以上爲肘。上肩出肩端髃骨之前廉。上出於桂骨之會。上下入缺盆。髃音魚懶於督脈之大椎是爲會上缺盆在頸之下膺前橫骨之上兩旁陷者中也。盤絡藏配之肺下本藏之膈膜歸屬本大腸之府器。其支者岐分別從左右缺盆上頸貫頰入下齒中還出挾口交互人中。左者之右右者之左。上挾鼻孔。頰耳下曲處也。人中卽督脈之水溝穴由人中而左右交互入挾鼻孔爲迎香穴。手陽明經止於此乃自山根交承泣穴而接於足陽明經也。府胃足陽明之脈經接起鼻之交頰梁骨中。頰音遇鼻董今人所謂山根也。其脈左右互交於此故曰交頰中岐。分旁納太陽之脈。納入也。足太陽脈起於目內眞精明穴下循鼻外入上齒中還出挾口環唇下交唇下之承漿環繞也。承漿任却循頤後下廉出曲頷前之大迎循頰車上耳前過開口則合之客主人循髮際至頤頭。頭下爲頤領中爲頤大迎穴在頤之前頰車穴在耳下上耳前下關穴也。客主人其支者別從大迎前下結喉兩旁動脈之人迎循喉入缺盆下膈膜歸屬本胃之府器。盤絡藏配之脾。其直者別從缺盆下乳內廉下挾腋入動脈之氣街中。直者直下而外行之脈也。氣街卽其支者別起胃下口循腹三言足陽明胃之脈也。言足陽明大腸之脈也。陽明之脈起於足大指端也。陽明之脈起於足大指端也。

裹下至氣街中而合直經。胃之下口當下腕之分難經所謂幽門者也循腹裏過足少陰育陰穴之外此以下股外髀交紋中之髀關抵髀前起肉之伏兔入膝端蓋骨之膝頸中下循脛膕之外廉下足跗上八中指內間。股大脰也髀音婢又音比股之骨也一曰髀外爲股髀關穴在伏兔上有交紋處抵至也伏兔而也足中指內間。股陽明經止於此其支者下廉三寸而別下入中指外間。下廉謂巨虛下廉也相去三寸即豐隆穴是爲陽明別絡。其支者別跗上入大指間出其端。又其支者自跗上別行入大指間斜出足厥端故太陰起於此凡後足三陰皆然。循指內側白肉際過核骨後上脛骨內踝前廉核骨即大指本節端。起於足大指端足之三陰從足走腹循指內側白肉際過核骨後上脛骨內踝前廉核骨即大指本節後內側圓骨也滑氏言爲弧拐骨者非蓋弧拐骨卽是踝骨古人所謂擊踝卽今人所謂打弧拐是也。上股起肉曰內循核骨惟一踝骨則二有內外之分滑氏以足跟骨爲踝者亦非蓋彼曰跟踵非踝也。

脛骨後突出厥陰經脈之前行上膝股內前廉入腹歸屬本藏之脾舍盤絡府配之胃上脣岐挾咽連舌本散舌下咽以嚥物居喉之後所謂食管也舌本舌根也足太陰經至舌下而止其支者復從胃別上膈注於心中足太陰經外行者由腹膀胱別上膈注心中而接於手少陰經藏心手少陰之脈經接起於心中出屬本藏之心系心通五藏之氣起於心中不與他藏同也位當五椎之下其系有五上系連肺腑下系心心下三系連肝脾腎下膈盤絡府配之小腸其支者從心系岐分上挾咽繫目系其直者復從心系却上肺岐分下出腋下陰經行於外者始此下循膕內後廉行手太陰心主之後之三陰少陰居太陰厥陰之後下肘循臂內後廉抵掌後銳骨之端踝爲銳骨入掌內後廉循小指之內出其端小指之

陰經止於此乃交小指外側而接於手太陽經滑伯仁曰府小腸手太陽之脈經並接起兩手小指之端。心爲君主之官尊於他藏故其交經授受不假支別云。府小腸手太陽之脈經並接起兩手小指之端。上循臑外後廉出肩兩旁脅上兩角曰肩解繞肩解下片骨內肩胛交肩上。肩解下成片骨爲肩胛卽肩膚也交肩上。肩後骨縫曰肩解滑氏曰脊交於兩肩之上會於督脈之大椎。脚音甲入缺盆。盤絡藏配之心循咽下膈抵胃歸屬本小腸之府器。其支者別從缺盆循頸上頰至目外角之銳皆却入耳中。自入缺盆而下是本經之行於內者若其支行於外者又從缺盆循頸上行入耳中手太陰經止於此皆其支者別從頰面骨之顴抵鼻至目大角之內皆斜絡於額。目下爲頤目內角爲內眞頤卽頰骨手音資經頤音拙府膀胱足太陽之脈經並接起左右目內眞上額交互於顴頂。上額左右斜行而交於頂端。其支者別從顴至耳上角其直行者別從顴入絡於腦還出別下項循肩胛內夾脊抵腰中入循夾脊爲膂。直行之脈自作四行其內之兩行夾脊兩旁各相去一寸五分下抵腰中入循夾脊兩旁之筋肉脊背中之椎骨也夾脊之肉曰督脈音博督音旅。盤絡藏配之督歸屬本膀胱之府器。其支者別從腰中下夾脊貫臀入上膝後曲爲膕中處曰蹠脈音屯蹠音國其支者別從脾內左右別下貫臂內脊肉曰脾夾脊內過股外捷骨之下曰髀樞從髀外後廉下合膕中。此支脈指外之兩行而言其支脈別從脾內左右下行貫脾。脾音去脊各三寸脾音甲背兩膕間所謂背脾是也髀樞在髀骨之上捷骨之下當環跳穴處爲脾之樞機支脈由此下行復與內兩行貫臂入膕中之脈相合矣。以下貫端內出外踝之後循足外側大骨下去白肉際陷中爲京骨至小指外側之端。蹠音足跟也京骨足小指本節後之大骨也足小指之端足太陽經至此乃

八言足少陽
經屬之脈
經隨注起
於注屬

九言手厥
陰心包絡
之脈經屬
於注屬

卷一

十首少
陽三焦之
經屬注
於注

交於足小指之下。藏腎足少陰之脈經。並接起兩足小指之下。邪趨足心。邪與斜同足心是湧泉穴處。出內踝前大骨下陷中。然谷之下。循內踝之後。別入足跟中。上端內出膕內廉。上股內後廉貫脊歸屬本藏之腎舍。盤絡府配之膀胱。其直者。則從腎上貫肝膈。入肺中。岐分循喉嚨挾舌本。其支者。別從肺出絡心。並注於胸中。胸中當兩乳之間亦曰膻中。足少陰經止此而接於手厥陰經。心主手厥陰心包絡之脈經。並接起於胸中。出屬本心包絡之藏舍。滑伯仁曰或問手厥陰經曰。心主又曰心包絡何也。曰君火以明相火以位手厥陰代君火行事以用而言。故曰心主以經而言。則曰心包絡一經而二名。實相火也。張景岳曰。心主心之所主也。心本手少氣而復有手厥陰者。爲心包絡之經。如邪客篇曰。心者五藏六府之大主也。諸邪之在心者。皆在心之包絡。包絡者。心主之脈也。其脈之出入曲折行之疾徐皆如手少陰心主之脈行也。故曰心主手厥陰心包絡之脈。下膈。歷絡府配之三焦。張景岳曰。心包絡包心之膜絡也。包絡爲心主之外衛。三焦爲藏府之外衛。故爲表裏而相絡。諸經皆無歷字。獨此有之。蓋指上中下而言。上焦卽膻中。中焦卽中脘。下焦卽臍下。卽濟下。故任脈之脉。卽三焦募也。其支者。別循胸岐分出脇下腋三寸。脇下際爲腋。腋下三寸。天池穴也。手厥陰經始此。上抵腋下。下循膕內。行太陰少陰之中間。手之三陰厥陰在中。故行太陰少陰之間。入肘中。下臂行兩筋之間。入掌中。循中指出其端。掌中勞宮也。中指端手厥陰經。接起兩手小指次指之端。上出兩指之間。即小指與無名指之間。循手表腕。出臂外兩骨之間。上貫肘。循膕外上肩。交出於足少陽之後。入缺盆。交布脾大絡。左乳下其動應衣者曰膻中。按脾之大絡名曰大包。出漏其動應衣者。乃胃之大絡。名曰虛里者也。至膻中位居上焦。亦名上氣海。爲宗氣積聚之處。主奉行君相之令。而布施氣化。蘭臺祕典論所謂臣使之官。喜樂出焉者也。昔人謂十二經表裏有心包絡而無離中。

心包之位正居膈上爲心之譴衛脈論曰。膈中者心主之宮城也。正合心包臣使之義。意者其卽指此夫三者經絡並不相錯。靈樞原文但曰入缺盆布膻中散絡心包下膈循屬三焦云云。先生此節乃與經文不同。其詳見後二十七段經穴。故絡藏配之心包下膈徧屬本三焦之府氣。謂其有名而無形也。此節言於內者自上焦下膈循中焦下行並足太陽之正入絡。膀胱以約下焦故足太陽委陽穴爲三焦下輔俞也。其支者別從膻中上出缺盆上項夾耳後直上出耳上角以曲屈下頰至顎。此節言其支之行於外者顎音抽目下也。其支者別後耳入耳中出走耳前過客主人前交頰至目銳皆目銳皆目之外角也。手少陽經府膽足少陽之脈經並接起於左右目銳皆上抵頭角下耳後循頸行手少陽之前行至肩上却交出手少陽之後入缺盆其支者別從耳後入耳中出走耳前至目銳皆後其支者別從目銳皆下人迎合手少陽抵於顎下加頰車下頸合缺盆以下胸中。與前從肩上人缺盆之貫膈盤絡藏配之肝歸屬本膽之府器循脇裏出氣街繞毛際橫入脾厭中。脾厭卽脾樞也。氣街腹中之謂曲骨之兩旁其動脈卽氣街也。毛際橫入脾厭中。脾厭下小肋也直下之衝穴也。脾厭中卽環跳穴也。其直者則從缺盆下腋循胸過季脇下合脾厭中。脈過季脇下行復與上文所云入脾厭以下循髀外行太陽陽明之間歷中瀆陽關爲髀陽出膝外廉下骭外輔骨之前。髀陽髀之中之脈相合。謂曲骨之兩旁其動脈卽氣街也。毛際橫入脾厭中。脾厭下小肋也直下之骨髓爲髀骨大指爪甲後一節間爲三毛少陽經支行足厥陰之脈經並接起於兩足大指叢毛之際。叢毛在足大指爪甲之橫紋後蓋橫骨也。足大指次指本節後之脈出三毛而接於足厥陰經也。藏肝足厥陰之脈經並接起於兩足大指叢毛之際。叢毛在足大指爪

卷之三
起始於桂
終歸於注

此謂一始
而終有終
也謂二經

紋之前爲三毛機。上循足跗上廉去內踝一寸上踝八寸交出太陰經脈之後行上膚內廉循陰股內入毛中環繞陰器。入陰毛中之急脈遂左右相交。環繞陰器而會於任脈之曲骨抵小腹挾胃歸屬本肝之藏。舍盤絡府配之膽。上貫膈布脇肋。足厥陰經止於此。循喉嚨之後上入咽之頸。頸連目系。上出額與督脈會於顙。頳音杭顙音桑上聲顙頤咽頭顙之百會穴處。其支者別從目系下頰裏環唇內。其支者復從肝別貫膈上注肺以製肺。貫膈注肺下行至中焦挾中脫之分復接於手太陰肺經以盡十二經之一。竟脈度一十六丈二尺。是爲行身之一周。計水下二刻爲營行一度也。蓋經有陰陽。兩陽兩陰而週行脈。唯胃氣通乎晝夜而無間。第手之三陰從藏走手。手之三陽從手走頭。足之三陽從頭走足。足之三陰從足走腹。手則維手。足則維足。一陰一陽互爲盤絡。聯府藏成四配。稱表裏。分外內非其所絡。不相偶矣。然則經分十二者徑。胃成水穀者脈徑陰則稱陰。徑陽則稱陽。故晝有陰陽。夜亦有陰陽。固同於衛氣之流行也。衛氣流行晝惟陽。夜惟陰。得陰則止而寐。得陽則起而寤。如輪日之升沉平分以成晝夜者也。十二經徑行各有紀。一周大會終而復始。如環之無端矣。

右第二十一段言十二經脈運行身中終而復始之經道