

新刻醫家必究杏苑生春

卷下

○治濕大法

濕在表宜微汗而解。經云：濕熱甚，治汗爲効。而止是也。又不欲汗，故不用便大抵自外而至者，皆宜汗散。自中乃濕家通用之藥。其功甚烈。凡諸濕故也。

○丹谿治濕活法

濕木土氣太熱，則能生之。故夏熱也。大法以二陳湯加酒芩羌活防抵治濕，宜利小便。

○如一身盡痛，或無汗，乃濕流關

○邪氣在表宜五苓散加羌活蒼

者白朮甘草亦効

○小便自利色青白大便泄瀉自

芩散加附子蒼朮木瓜

○如風濕身痛微腫惡風宜杏仁

麻黃各錢半杏仁十枚薑

○如濕致腫脹宜利小便健脾

○夫治濕因蒼白二朮爲君補

又不可執此當要行氣利

緩急而治不可無變

○蒼朮治濕上下部皆可用

○二陳湯加酒令羌活蒼朮散風行溫

○上部濕蒼木功効極速。下部宜升麻提之。

○如風濕相搏。黃芪防已湯尤効。

○如濕勝氣實者。宜佑神丸。舟車丸。

○如虛氣者。宜人參茯苓。佐桑白皮葶苈木香之類。

○凡肥白人沉困。睡怠惰。多是氣虛受濕。宜人參白茯苓蒼术。或佐之以滑石。凡黑瘦人。沉困怠惰。多是濕熱。宜白朮黃芩。

○飲食不節。脾胃受傷。不能傳送濕熱。宜枳朮丸加減。如上焦濕熱。宜用黃芩。

○肺有虛熱。宜二門冬。知母黃芩。但不宜多用。恐傷脾氣。

○如脾胃虛熱。不能健運。而鬱悶。宜黃芩白朮。人參陳皮或少

佐厚朴。

○如<sub>下</sub>焦濕腫極痛。膀胱有大邪者。必用酒洗防已。龍膽草。黃柏蒼木。

○戴元禮云。東南地土脾濕多病者。多從外入。多自下起。其患脚腿氣病者。多治宜汗散。久則宜疎通滲泄。西北地高風寒燥緊盛。人多食潼銘濕熟之物。以衛外寒。濕熟拂鬱於內而作。多致肚腹膨脹。或通身浮腫。治宜詳其元氣虛實。大小二便須要通之。此乃責其根在內也。雖然方七之中。亦或互相有者。但多寡之不同耳。必須詳症以治。不可執一之見也。

治寒濕所傷身體重着。如坐水中。小便澀。大便溏。以滲濕湯主之。

方滌濕湯

蒼朮

白朮

各一錢  
五分

甘草

炙四

茯苓

二錢

乾薑

橘紅

各一

丁香

五枚

生薑

三片

棗子

二枚

右咀片水煎熟食前服

病風濕相搏一身盡疼額上微汗身體微腫以麻黃薏苡湯生之。

方麻黃薏苡湯

麻黃

薏苡仁

各五錢

杏仁

十枚

甘草

二錢  
五分

右剉一劑水煎熟食遠服。

○寒濕所傷身體重着腰脚酸疼大便溏泄小便或澀或利以

除濕湯主之。

方除濕湯

半夏麌

二錢

厚朴

各一錢

蒼朮

五分

藿香

五分

橘紅

白茯苓

白术

各一錢

甘草

炙五分

生薑

五片

枣子

二枚

右剗一劑。水煎熟。食前服。

○暑濕相合。肢體重疫。煩渴引飲。小便不利。大便反快。以五苓散主之。

方見本卷前項內

治其人傷濕。因而中暑。名曰濕溫。兩脰逆冷。胸滿。頭目重疼。妄言多汗。其脉陽濡而弱。苔小而急。切不可而汗。汗之必死。以茯苓杏仁湯或白虎加蒼朮。

方  
茯苓杏仁湯

茯苓

六錢

杏仁

十枚

甘草

二錢

右咀片。水煎熟。食前服。

○白虎蒼朮湯

知母

石膏

各二錢

蒼朮

各一錢

甘草

一錢

粳米

一合

右剉一劑水煎熟食遠服

治久雨傷濕大便多溏小便閑者此雨淫腹病是也以五苓散

煎下戊己丸

五苓散見前

○戊己丸

吳茱萸

湯泡七次揀淨四兩先用慢火炒汗  
出入黃連同培色變亦不可焦了

黃連

白芍藥

另研各四兩

右件依法製度爲末麵糊爲丸如梧桐子大每服六七十丸  
米湯食前送下

○傷食發熱惡寒身重自汗骨節疼痛腰脚痺冷以除濕湯主

之

方見本卷前款內

○濕入腎重則腰疼冷如水腹重不可轉然亦濕盛腹重相似

此名腎著。以腎著湯。或滲濕湯主之。方見本卷前項下。

方 腎著湯

乾薑

二錢

茯苓

三錢

甘草

炙一錢

白朮

一錢五分

右剉一劑。水煎空心服。

○汗漬衣濕。坐臥當風。以致風濕相感。惡風身熱。額上有汗。以滲濕湯。方見本卷前項內。○桂枝各半和服。

方 桂枝湯

桂枝

三錢

白芍藥

一錢五分

甘草

二錢

右剉生薑七片。枣子四枚。水煎熟。或同煎藥各半。如不同依照證另服。○合微發汗。若已得汗。熱猶不退。以人參敗毒散加蒼朮。㕮已主之。

方 人參敗毒散

計三方

柴胡一錢

前胡

羌活

獨活

桔梗

枳殼

人參

茯苓

川芎

各一錢

甘草

五分

生薑

五片

○如風盛加荆芥六分防風六分名荆皮敗

毒散

○加蒼朮一錢大黃一錢名加味敗毒散○皮膚痒

者加蟬蛻五分

○右剉水煎熟食遠服

○傷濕兼感於寒無汗惡寒慄慄身體煩疼以五積散除濕湯各半和服得微汗復熱而渴者除濕湯五苓散各半主之

二方俱見  
本卷內

○浴出身上未乾忽爾熟睡致及腎經腫痛腰背牽曲以五苓散加真芷少許煎下青木香丸

方青木香丸

黑牽牛炒香取頭末

一兩

補骨脂

草澄茄

青木香

檳榔

栗火飯裹外用濕紙包灰  
火中煨令紙焦去飯四錢

右爲細末。入牽牛末和勻。清水和爲丸。如棗大。每服三十丸。茶湯。熱水任下。

治外感濕邪。經云風可以勝濕。又云。辛以散之。是以用羌活。獨

活。藁本。蔓荆子。川芎。防風。諸辛味風藥。以勝肌表之濕。灸草補脾土。以勝濕故。以羌活勝濕湯。

勝濕  
湯

羌活

辛溫  
二錢

獨活

辛溫  
八分

藁本

苦甘溫  
八分

川芎

辛溫  
一錢

防風

甘辛溫  
一錢

甘草

炙八分

蔓荆子

苦辛溫  
一錢

右咀片水鍾半煎七分服。○如身重腰疼。沉沉然。乃經中寒濕加酒洗漢防已一錢。附子五分。甚加川芎六分。

治濕熱內鬱致成黃疸等證。治宜清熱勝濕可也。是以用黃芩

黃連。梔子以清熱陳皮。青皮枳實以散鬱。猪苓。澤瀉。赤茯

利小便以參濕茵陳驅濕熱以退黃疸。

玄菟芩參濕湯

黃芩

苦寒二分

黃連

苦寒一錢五分

梔子

苦寒二錢

陳皮

辛溫二分

枳實

苦辛寒八分

青皮

苦辛寒一分半

猪苓

淡平一錢

赤茯苓

甘平八分

澤瀉

苦寒一錢

茵陳

苦辛涼二錢

○右咀水二鍾煎一鍾溫服

治一切水濕腫滿腹大脹硬用大黃甘遂大戟芫花以瀉水濕  
陳皮木香牽牛踈行鬱氣以脹滿。

方舟車丸

大黃

苦寒二分

甘遂

苦甘寒

牽牛

苦辛利水各八分

芫花

逐水八分

陳皮

苦辛溫八分

木香

苦辛溫二分

大戟

苦甘寒七分

右剉一劑水鍾半煎入分溫服。

治水濕致膀胱腫或作疝痛宜逐水踈利膀胱小腸之薦可也。

是以用牽牛逐水。下氣消脹滿。茴香疎小腸。膀胱壅滯之氣除疝疼。

方禹功散

牽牛

苦辛寒  
四兩

茴香

苦辛溫  
六兩

○右二味共爲細末。每以

生薑自然汁調服三五錢。○一本加白朮五兩。

治諸濕症。用蒼朮燥濕爲君。陳皮甘草扶脾爲佐。厚朴行氣逐濕爲使。

平胃  
散

蒼朮

苦甘溫  
八兩

陳皮

辛溫  
四兩

甘草

炙甘溫  
三兩

厚朴

辛溫  
三兩

右爲細末。每以薑末煎湯。或鹽湯點服。三五錢。

治濕熱內甚。水腫腹脹。小便赤澁。大便注瀉。中氣不足。運動失常。遂使水飲不得。四佈所致。治宜補中滲濕。是以用白朮。茯苓。炙草。補中健脾。葶藶逐水消浮腫。猪苓澤瀉滑石。木

通利小便滲濕木香行氣肉桂通血脉和榮衛。

方草薑木香散

白术

苦甘溫  
四兩

茯苓

甘溫  
三兩

甘草

炙甘溫  
二兩

草薑

苦辛寒  
八分

猪苓

淡平  
二兩

澤瀉

甘一寒  
二兩

滑石

利竅  
二兩

木通

淡平  
二兩

木香

苦辛溫  
一兩

肉桂

辛甘溫  
五錢

右剉爲細末。每以白湯調下。五七錢。日服二次。

治中氣不足。風濕外乘。脉浮身重。自汗惡風。或痛。大脈浮虛也。汗出惡風。乃風傷衛不能固護皮毛也。身重者濕也。痛者。風濕相搏也。四肢倦怠。關節煩痠。惡風自汗。治宜散風濕。補中氣實。腠理可也。故用防已驅風濕。白木甘草補中燥。濕。黃芪補衛。氣實腠理。以上汗。

方黃芪防已湯

黃芪

苦寒  
五錢

白朮

苦溫  
四錢

甘草

炙甘溫  
三錢

黃芪

甘溫  
六錢

右咀片水二鍾內加薑三片枣二枚煎一鍾服愈如喘者加麻黃半夏有汗不必加麻黃氣上冲加桂枝寒加細辛。

治一切水濕致脚細脹大實脹喘滿用輕粉燥濕大黃芫花甘

遂大戟牽牛逐水消脹滿

方二花神祐丸

輕粉

辛寒  
五錢

大黃

苦寒  
一兩

芫花

苦辛寒  
七錢

甘遂

苦甘寒  
六錢

大戟

苦甘寒  
一兩

牽牛

辛寒  
一兩

右剉爲細末滴水爲丸如棗大每以白湯下五七丸或十丸一日三次不拘時服

○疫癘

載論附議

疫癘之病乃天地不時之疫氣其形質虛弱之人感而受之狀

若傷寒始起於一人續而傳染一方一邑皆患此症但中有輕重之分若體氣壯盛之人感之淺者輕而易療若元氣虛敗感之深者重而難愈其證自外而入當從仲景傷寒法治療但木可大汗大下宜從中治而用少陽陽明二經之藥如小柴胡升麻葛根湯之類大要仍在補養元氣爲主經云養正而邪自除學者宜致意也。

疫癘者皆溫熱寒涼失候四時不正之氣流行里巷長幼感病率皆相似謂之天行時氣與傷寒溫病熱病不同故仲景云疫氣之行無以脉診宜隨時施治以平爲期不可過汗四時通用人參敗毒散解之若熱極煩渴神思昏亂須開門牖使邪熱舒散用青布浸新汲水內絞乾搭在胸項去其熱毒傷寒溫熱亦然此證易於傳染故使人有不相通問欲其不令染者以雄黃

爲末常抹鼻孔中。凡入患所要行從容。知其避忌。男子病穢氣出於口。女子病穢氣出於陰。坐立對語之間宜當向背。診視之際。伺病人手出被窩。少頃氣散方可近前。亦須飲酒少啖蒜薑。進過飲食方許省視。不可空心造次逕詣。

○治疫脉法

陽濡弱。陰弦緊。而爲瘟疫。○二三日體熱。腹滿。頭痛。飲食如故。脉急而疾者。八日死。○四五頭痛。腹滿而吐。脈來細而長。十二日死。○八九日頭身不疼。目不赤。色不变。而反利。脈來澀。按之不見。舉時大心驚。十七日死。○汗不出。出不至足者死。○厥逆。汗自出。脈堅強急者。生虛軟者死。○如下利。腹中痛甚者死。

○疫癘大法

治療之法有三。宜補。宜散。宜降。用芩連大黃。人參。蒼朮。防風。滑。

石香附桔梗人中黃等共爲末以神麌打糊丸如梧桐子大。如氣虛宜四君子湯血虛宜四物湯多用二陳湯送下火甚加童便。

○再谿治疫傳變活法

瘟疫之證與衆一樣病者是俗謂之天行時氣與時傷寒相似宜分經而療。

○如在少陽經宜以小柴胡加防風羌活微發之。方見本卷前款內。

○如兼陽明以小柴胡合升麻葛根二湯煎服。

○升麻葛根湯

升麻

葛根

白芍

藥以上各一分

甘草

一錢

右咀片水煎熟不拘時服。

○如男太陽症或大便泄以小柴胡去黃芩加五苓散丸當看

患者之寒熱如無寒去五苓之肉桂留小柴胡之黃芩。如小便不利倍加去桂五苓散。二方俱見前。

○若入太陰經無熱症用理中湯。○若腹痛而泄則可用若痛泄止仍以小柴胡和之。二方俱見前。

○若入少陰及厥陰者以陰症傷寒傳經法治之。

○若預看未有端的者先以敗毒散治之看歸在何經再隨經治之。方見本卷前款。

○若發黃以小柴胡合去桂五苓散如不退以茯苓滲濕湯治之如作渴加知母石膏。方見本卷前項下。

○如濕甚以蒼朮白虎湯

方見本卷前項內。

○如發狂不識人以大柴胡加當歸。

方大柴胡湯

柴胡

五錢

黃芩

三分

白芍藥

半夏

枳殼

各一錢

大黃

量人肥瘦  
加減用

○右咀片生薑七片。東子五枚食前服

○如大便瀉以三黃石膏及柴芩湯之類。

即小柴胡  
五苓散。

○如胸膈滿悶加枳殼橘紅黃連與前三黃石膏等湯。

○如大便不通或承氣湯或大柴胡微利之前。

方見

○如陽明之邪則首大腫少陽爲邪多見於耳之前後宜防風

通聖散加減用之或用小柴胡加防風荆芥薄荷桔梗煎

服外以側柏葉攬汁調火煅蚯蚓糞敷之或以丁香尖附

子尖南星調醋敷之或以五葉藤車前草皆可搗汁敷之

多有獲功。

治臟腑積熱發爲腫毒及時疫疼痛頭面紅腫咽喉填塞而藥不下一切危要疫癆經云濕勝則腐腫大法在乎清熱爲

主。故用漏蘆升麻。大黃。黃芩。澤蘭葉。玄參等。諸苦寒。以清熱。

方漏蘆湯

漏蘆

苦寒通小腸

升麻

苦寒

大黃

苦寒下實熱

黃芩

苦寒

澤蘭葉

玄參

苦鹹寒散結熱清利  
咽膈泄無根之火

右各等分咀片。每一兩水煎熟服。如腫甚加芒硝二錢。  
○春時應溫而清氣抑之。故身熱頭疼。目眩以升麻葛根湯見。

○熱甚嘔吐以小柴胡湯

前見

○或葛根解肌湯

方葛根解肌湯

葛根

五分

麻黃

各一錢五分

白芍藥

二錢

黃芩

三分

甘草

六分

桂枝

五分

○右咀片

東子二枚

水煎熟食

遂溫服

○夏時應熱。而寒氣抑之。骨疼。身熱頭痛。以人參敗毒散

方見前

○若暴寒熱伏於內咳嗽咽吐以大麝干湯

麝干

當歸

麻黃各一錢

肉桂三分

桑皮一錢

枳殼

紫苑

獨活

杏仁各六分

半夏二分

甘草五分

○右咀生薑五片水煎熟不拘時服。

○若腹痛自利以理中湯○往來寒熱以小柴胡湯主之見前

○秋時應涼而大熱抑之身熱咳嗽以金沸草散。

方  
金沸草散

金沸草 荆芥

麻黃各一錢

甘草五分

赤芍藥

半夏

前胡

各一錢

生薑三片

棗子二枚

右剉一劑水煎熟食後溫服。

○若煩渴以白虎加蒼朮湯

方見本卷前款內

○若熱蓄發痘以茵陳五苓散。

五菌陳五苓散

茵陳

一錢  
五分

澤鴻

一錢  
二分

茯苓

猪苓

白朮

各一錢  
錢

官桂

三分

枳實

六分  
六分

○右咀水煎食前服

○若患痢疾以人參敗毒散加陳金粟主之

方見本卷前條內。

○冬時應寒而大溫抑之身熱頭疼咽痛以人參敗毒散

方見前

○或甘桔湯主之

方甘桔湯

甘草

一錢  
五分

桔梗

三錢

○加犀角一錢名犀角甘桔

湯

○右咀片水煎熟食後服

○或玄參甘草湯

方玄參甘草

玄參

一分

升麻

五分

甘草

一錢

右咀片水煎不拘時服

○喘咳癢痛。以萎蕤湯。

方萎蕤湯

萎蕤

石膏

名一錢

麻黃

羌活

各八分

青木香

白薇

杏仁

各五分

甘草

四分

川芎

六分

葛根

二錢

右剉一劑。水煎不拘時服。

○或生赤疹。以升麻葛根湯。

方見本卷前。

○發癰者。以陽毒升麻湯主之。

方陽毒升麻湯

升麻

一两五分

犀角

麝干

黃芩

人參

各一錢

甘草

生丑分

○右咀片。水煎熟食。遠服。

治四時不正疫氣。倘感病隨時變染。與前四氣病狀不同。當臨時應候調治。不可執一而取。宜於外感類中。相參施用。若

久陰雨得患身熱頭疼惡心以正氣散隨證加減治之

方見

本卷前項內

○大頭天行瘟疫病

大頭疫病乃濕熱在高顴之上或臟腑積熱而發爲腫毒疙瘩頭面洪腫咽喉堵塞不下宜以羌活及酒炒黃芩并酒蒸大黃隨病加減切不可用降藥東垣謂此症乃陽明邪熱太甚挾少陽相火而成其邪多見於頭或兩耳前後治法不宜速藥速則反過其病正所謂上熱未除中寒復生是也宜用緩藥緩服慢慢少與當視其腫勢在何部分隨經治之大都此症多發於冬溫之後備具外科時毒類中相參施治。

治天行大頭瘟毒蓋此由濕熱之毒挾相火火炎所致法當清濕熱爲主經云苦可勝濕寒可勝熱是以用芩連之苦寒

勝濕清熱。生草之甘寒。以爲火。

方三黃湯

黃芩

苦寒酒浸  
晒乾五錢

黃連

苦寒酒浸  
炒七錢

生草稍

甘寒  
二錢

右咀片水煎頻頻熱服。

○如未退用鼠黏子不拘多少煎熟入芒硝等分亦時時押之以大便利爲度。

○如渴甚者前方少加引經藥如陽明渴加石膏少陽渴加天花粉。

○如陽明行經以升麻芍藥葛根少陽行經以防風荆芥。

○頭面洪腫疙瘩咽喉不利以漏蘆湯主之。

方見本卷內。

○時毒疙瘩惡證以消毒殭黃丸主之。

方消毒殭黃丸

杏林生春

卷之三

大黃

酒蒸各等分

五十六

右件依法製度各爲細末。煉蜜爲丸如彈子大。每服二丸。新汲水化下。○一方加桔梗。

頭面洪腫喉痺不利。一味消毒丸主之。

方 二味消毒丸

殭蚕 一兩

大黃 酒蒸一兩

右件依合製爲末。生薑自然汁爲丸如彈子大。每服二丸。蜜水化下。

病初覺增寒體重。次傳頭面腫盛。目不能開。上喘咽喉不利。舌乾口燥。此亦疫癘之病。以消毒之劑主之。

方 普濟消毒飲

黃芩

黃連

各五錢

人參

三錢

橘紅

玄參

各一錢

甘草生三錢

柴胡

桔梗各二錢

連翹

鼠黏子

板藍根

馬勃各一錢

白僵蚕

升麻各七分

防風

薄荷

川芎

當歸各五分

一錢

或依法製度爲細末。每服三錢。白湯食後調服。

或用煉熟蜜爲丸。如彈子大。每服一丸噙化。

如大便硬。加酒浸煨熟大黃量人虛實多少。

○溫病

大溫之爲病。蓋因冬月傷胃。寒氣伏藏肌骨。至春而作。此不卽病之傷寒也。有春溫。風溫。溫毒三種之名。所以自春未於夏至前也。若夏至後則爲熱病矣。治法不與相同。但可以申和之劑輕於解肌爲佳。若施汗吐下三法太峻。則反變異症。所忌者風溫切不可汗。汗之爲大逆。多不可救。經曰。冬不藏精。春必病溫。

又曰冬傷於寒春必病溫此之謂也

春溫病脈數而大散發熱頭疼不惡寒以升麻葛根湯

方見本卷前

若春感而發作者以葛根解肌湯○熱盛嘔吐以小柴胡湯○煩燥大便閉脉實方可大柴胡湯微利之

三方俱見本卷前

初感春溫發汗後身猶灼熱自汗喘息嘿嘿欲眠四肢不收名

曰風溫再汗之則爲逆必譏語亦不可下及燒針但用萎  
蕤湯

方見本卷前

○熟甚以知母葛根湯

方知母葛根湯

知母

葛根

石膏

各一錢

甘草

升麻

南星

杏仁

川芎

羌活

萎蕤

麻黃

以上各五分

黃芩

防風

各六分

木香

四分

人參

七分

右咀片水煎熟食前服

○熱渴嘔吐脇腋以小柴胡湯

方見本卷前項內

○大渴者以括薑根湯。

括薑根湯

石膏

二錢

括薑根

人參

各一錢

防風

五分

乾葛

七分

甘草

五分

○右咀片水煎食前服。

○身重汗出以防已黃芪湯主之

方見本卷內

冬時觸冒寒邪至春治發初在表已發汗或吐下表證未解發爲斑癰疹以黃連橘皮湯。

列黃連橘皮湯

黃連

橘皮

枳實

麻黃

杏仁

葛根

各一錢

厚朴

甘草

各五分

右剉一劑水煎熟食遠溫服。

心煩嘔逆。以葛根橘皮湯。

方葛根橘皮湯

葛根二錢

橘皮

知母

黃芩

麻黃各一錢

甘草

杏仁各五分

○右咀水煎食遠服。

○甚者黑膏主之。

方黑膏

生地

二兩六錢六分

豆豉

一兩六錢五分各碎

右件以猪膏十兩含露之煎。令三分減一絞去渣另研雄黃麝香如豆大納入攪和分三服毒從皮中出則愈忌蕷芻

○熟論

火熱本是一氣但有輕重之殊故元戎云熟者火之微火者熱之熾乃心與小腸主之經云諸嘔吐脫暴注下迨轉筋小便混

濁腹脹鼓之如鼓癰疽。痒疹瘍氣結核吐下霍亂。聳聳腫脹。鼻塞。鼽衄。衄血。溢渴。瀉秘。二熱惡寒。戰慄驚忽。笑悲謔妄。齶齦血汗。皆屬於熱是也。但中有陰陽虛實。內外表裏之殊。經云。陰虛生內熱。陽盛則外熱是也。如晝發熱而夜安靜者。乃陽氣自旺於陽分。謂之重陽無陰。如晝安靜而夜發熱者。乃陽氣下入陰中。謂之熱入血室。治療之法。實者瀉之。虛者補之。在外者汗之。在裏者下之。鬱熱躁之濕熱清之。陰虛補陰。陽盛瀉陽。是以經云。小熱之氣涼以和之。大熱之氣寒以取之。甚熱之氣以汗發之。發之不盡。求其屬以哀之。是也。學者宜深詳焉。

又云。夫熱病亦冬月傷寒。伏藏在內。至夏月時熱兩感而發。爲不即病之傷寒也。只宜寒涼之劑解其内外之煩毒。是以桂枝麻黃湯。其性頗熱。於此難用。

卷之三  
○熱脉訣

經曰。人熱病氣熱脉滿是謂重實。尺寸俱虛是謂重虛粗大者。陰不足陽有餘。又云浮數熱在表沉數熱在裏。

是以難經云。熱病之脉。陰陽俱浮。浮而滑沉之散。濇脉。經云弦數多。熟數爲熟極。又云數乃爲虛爲熱。

○治熱要訣

凡熱症在外者。以辛涼散之。在內者。以苦寒下之。經云。苦以治臟。辛以治腑是也。又宜養血益陰。其熱自愈。

○丹谿活訣

凡熱症重手按之熱甚。輕手按之熱不甚。乃熱在肌肉之內。宜東垣升陽散。火湯火鬱陽之類以發之。

○凡熱症輕手按之熱甚。重手按之不熱。乃熱在表。宜清之。如

地骨皮。麥門冬。竹茹之類。

○飲酒人發熱難治。不飲酒人因酒發熱亦難治。

○如上焦實熱須用酒洗黃芩。心肺有實熱方可。如虛熱必以天門冬。保定肺氣然後瀉之。

○如去中焦實熱須用黃連。若脾胃虛不能轉運。及中焦鬱熱者。宜白朮。茯苓。黃芩。葛根代之。

○如胃中實熱須用梔子。

○如虛煩須用人參白朮。黃芩。白芍藥。茯苓。麥門冬。大棗之類爲主。佐以竹葉。

○如身熱頭疼煩渴。不惡寒。以小柴胡湯。

方見本卷內

少加川芎。若渴甚加天花粉。葛根。麥門冬。若熱極譏語加

黃連

○如身熱神昏。晝夜不眠。以退熱寧神之劑主之。

方退熱寧神湯

柴胡

二錢

黃芩

一錢

黃連

六分

甘草

生五分

山梔仁

人參

酸棗仁

麥門冬

茯神

各一錢

○身熱泄瀉煩渴。以柴胡三白湯主之。  
○右剉一劑水煎熟。食前或不拘時服。

方柴胡三白湯

柴胡

三錢

人參

一分

半夏

五分

白芍藥

白木錢

白朮

各一錢

白茯苓

一錢

甘草

五分

黃連

八分

生薑

五片

○身熱自汗不已。以黃芪六一湯加人參黃連主之。

方黃芪六一湯

方見本卷前

易朝熱大便結實口乾讝語以大柴胡清熱之劑

方 大柴胡湯

柴胡

五錢

黃芩

三分

芍藥

半夏

枳殼

各一錢

大黃

多少量人加入

右咬咀用生薑七片棗子五枚水煎食前服。

病內外實熱大便閉結用連翹大黃芒硝通大便下內熱梔子黃芩薄荷清表熱是以用涼膈之劑。

方 涼膈散

連翹

大黃

各二兩

芒硝

二兩五錢

梔子

一兩

黃芩

二兩

薄荷

三兩

甘草

一兩五錢

右件共爲細末以青竹葉煎湯入蜜少許調服二三分。

病風濕熱毒身熱頭疼喘是以散風止頭疼發表除身痛消

卷之三  
六  
熱豁痰喘潤肺補中行氣散鬱。

方知母葛根湯

防風八分羌活七分萎蕤二錢川芎七分升麻八分

葛根

知母各一錢

黃芩二錢半南星

杏仁各一錢

人參二錢

甘草五分木香六分生薑二大片

右㕮咀水煎熟溫服

病口乾發熱小便自濁治以清熱瀉火救肺清心滋補元氣利小便

方清心連子飲

地骨皮八分

柴胡

麥門冬各一錢

黃芩二錢

石蓮肉

人參各二錢

茯苓一錢

黃芪二錢

甘草生七分

右㕮咀用水煎熟溫服

病心神煩亂怔忡兀兀欲吐似懊憹狀經云心惡熱火熱上是以心繁神亂心爲熱擾使血不足怔悸足矣

治宜瀉火熱益陰安心神可也是以用黃連生甘草瀉火熱川歸生地益心血佐硃砂以安心神

方硃砂安神丸

硃砂

另研五錢

甘草

黃連

各一兩

川歸

酒浸

生地黃

各三兩

右件共五味內除砂另研餘四味爲細末入砂末拌勻以湯浸蒸餅丸如黍米大外用硃砂五錢研末爲衣每以津吐熱下三五十丸如津吐不足嚥者薄荷湯可下

治下焦積熱止便閉澁用大黃通大便瀉腸月中之積熱瞿麥木通滑石扁蓄車前山梔利小便瀉膀胱之鬱熱生草瀉

二焦之火热

方入正散

大黃一兩

瞿麥六錢

木通七錢

滑石八錢

扁蓄七錢

車前子一錢

山梔二兩

生甘草一兩

鐵

右件共爲末每以五錢水煎食前服

屬肝氣熱防風羌活以散風龍胆草山梔大黃以勝熱風能燥血熟能耗血是以加當歸川芎以救血

方鴻清丸

防風

羌活

龍胆草

梔子

大黃各一兩

當歸二兩

川芎一兩

右件共爲細末煉蜜爲丸如芡實大海用薄荷湯下二三丸爲愈。

病脾胃中鬱熱。口臭咽乾。或嘔吐等症。用梔子清胃院。熟石膏瀉胃火。藿香和胃止嘔。生甘草瀉火和藥。

方瀉黃散

梔子一兩

石膏二兩

藿香二錢

防風

甘草生各一兩

右件共爲細末。蜜酒拌炒香。每服二三分。

治肺熱用桑白皮瀉火。地骨皮退熱。生甘草通瀉三焦火熱。

方瀉白散

桑白皮

地骨皮各二兩

生甘草一兩

右件共爲細末。每以棗門冬湯調下二三錢。

治腎熱用黃柏知母。佐肉桂補腎陰以勝熱。

方滋腎丸

黃柏

知母各八兩

肉桂一兩

右件共爲細末。以鹽攬量便作糊丸梧桐子大空心鹽湯下  
五七十丸。

病 切蒸熱積熱及血虛發熱脉洪實弦數用人參當歸芍藥  
益陰血以勝陽熱黃芩解肌熱柴胡退蒸熱大黃下積熱  
生甘草瀉火兼和藥。

方 柴胡飲子

人參 當歸各一錢白芍一錢五分黃芩一錢

柴胡二錢 生甘草

大黃各一錢

如骨蒸潮熱去柴胡加黃柏一錢若內無實熱大便不閉去  
大黃加黃連一錢。

右㕮咀水煎溫服一本有生薑二片以緩寒。

病 因風邪發熱頭疼癲癇氣喘經云邪之所湊其氣必虛是

以用人參茯苓。甘草。補中益氣。葛根。紫蘇。發表。前胡。桔梗。半夏。治痰定喘。枳殼。橘紅。木香。利氣。

方參蘇飲

人參二錢。茯苓一錢。甘草多少五分。紫蘇七分。乾葛八分。前胡。桔梗。橘紅各七分。半夏一錢。枳殼六分。

右咬咀。用薑二片。棗一枚。煎熟食後溫服。

治

夏熱嘔吐。以小柴胡湯加香薷。黃連主之。

方見本卷前。

病熱甚。六脉皆無。神昏不醒。以生脈之劑主之。

列生脉散

人參

五味子

麥門冬

右咬咀。用水煎熟。不拘時服。

病身熱煩渴。發出紅斑。以人參化班之劑。

方人參化班湯

知母 石膏 人參 各一錢 甘草一錢 糯米一合

右㕮咀。用水煎熟。食遠溫服。

治中暑熱。嘔吐眩暉。及大病後。調理失宜。勞復如初。及脾胃虛損。面色萎黃。飲食不美。口吐酸水。滑泄腹鳴。飲食霍亂。吐瀉。並宜服之。

二因白朮散

白芷 甘草 青皮 去白  
白茯苓 桔梗 山藥

香附子 各三兩 乾薑 五錢 白朮

陳皮 各二兩

右㕮咀。生薑三片。枣一枚。木瓜一片。紫蘇葉三皮。煎食前服。病小腸蓄熱。小便赤澁。用生地黃益陰勝熱。生甘草佐木通利小便。以瀉小腸中火。