


葛氏方醫心方采輯本 上

ヤ 9
471
1





容麻唐麻鈔本

以下  
8丁  
白紙

容麻唐麻鈔本

葛氏方卷上

森氏開萬  
冊府之記

凡腫有五不治面腫倉黑肝敗不治掌腫無理滿  
心敗不治脘滿腫反者脾敗不治腹滿無文理肺敗  
不治陰腫不起腎敗不治

凡服藥不言先食後食者皆在食前其應食後  
者自各說之 凡服湯云分三服再服者要視  
病源候或疎或數足令勢力相及毒利之藥皆  
須空腹補湯間中自可進粥丸散日三者當  
以且中暮四五服者一日之中優量均分之 丸  
服丸散不云酒水飲者本方如此



**風症**若身直石得屈申反兩復者方

取槐皮黃白者切以酒若水六升煮得三升去滓  
稍服 三十九

治中緩風受不收者方

豉三升水九升煮取三升分三服日二作亦可酒漬煮  
飲 三十七

治患風頭每天陰輒發眩冒者方

取鹽一升以水半升和塗頭髮中裏一宿當黃汁  
出愈附子屑一合內鹽中尤良

又方以桂屑和苦酒塗頂上 三十八

治口噤不用者方

取大豆五升熬令黃黑以五升酒漬取汁秦強  
菽以灌之

又方獨活四兩桂二兩以酒水各三升合煮取一升半  
分三服溫卧 三十九

治口喎僻者方

銜秦灸口吻中橫文間竟大契便去艾即愈  
忽勿盡艾則大過左喎灸右右喎灸左

又方蠶五和烏頭塗之欲心即拭去 三十五

治中風不語方

上

豉菜黃各二升水五升煮取二升稍服之 三升六分

又方灸第二第三椎上百五十壯

治卒中冷聲嘶啞方

甘草二兩桂心二兩五味二兩杏仁廿枚生薑六兩

切以水七升煮取三升分三服 三升七分

治卒失聲、噎不省方

橘皮五具水三升煮取一升頓服

又方針大椎旁一寸五分 三升六分

治人心下虛悸方

麻黃半夏各等禱蜜丸服如大豆三九日三 世

若骨節疼痛不得屈伸近之則痛短氣自汗出或欲腫者方

附子二兩桂四兩朮三兩甘草二兩

水六升煮取三升分三服汗出愈 三升七分

若手足不隨者方

取青布燒作炷於小器中燻痛處佳

又方豉三升水九升煮取三升分三服 三升七分

若身中有掣痛不仁不隨處者方

取干艾葉一斛汗丸之內凡翫下塞餘自唯一目

以痛處著翫目上燒艾以燻之三升七分時向愈

上

又方好木削之以水煮令濃熱的以漬痛處良  
癩病方灸陰莖上宛中三壯得少便通便愈

又方灸足大指羸毛中七壯

又折雞冠五瀝口中 三ノ四ナラ

治卒茲狂方

燒蝦蟆搗末服方寸匕日三

又方煮三年陳菘去滓服之 三ノ四ナラ

狂言鬼語方

針其足大母指爪甲下入小許即止 同上

若旬中熱結煩滿悶乱狂言起走者方

以芫花鹿一升水三升煮取半升以布漬湯中搗旬中

上煖復易 三ノ四ナラ

聾有五种風聾者掣子痛勞聾者黃汁出乾聾

者疔聾生虛聾者蒸之作聲耳聾者膿汁出

治之方 鯉魚腦以竹筒盛蒸之炊下熟熱氣以

灌耳 綿塞莫動半日乃拔塞用膽之良蒸

畢塞耳

又方灸手掌後第二橫文中央隨聾在右依年

壯

又方化翼血內耳中甚良腦中五尤妙



又方鼠腦綿裹內中良 五ノ五

耳中恒鳴方 生地黄切斷仍以塞之日夜數十易

之治齧

卒得風耳中吼者方 急取塩七升飴中並使契

以耳枕塩上冷易之 五ノ四

治耳疼痛方 蒸塩尉之

痛有汁出者方 焚杏仁令赤黑就搗如膏赤

殼裹塞耳日二三易

耳卒腫出膿者方

末樊石著管中吹入耳 三四過當愈 五ノ五

膈耳痛膿五方

釜月下反吹滿耳令深入无苦即自丸出

又方搗桂心與膏和塞耳不過三四

又方桃人煎搗以赤殼裹塞耳中 五ノ五

治百虫入耳方

好苦酒漬棗灌之以起行便出

又方綿裹猪肪塞耳須虫死出著綿

又方閉氣令人以蘆管吹耳

又方温湯令的以灌之

又方搗生薑汁灌之薑汁方佳

又方以兩刀於耳前相敵作聲虫即出

又方燒干鯢頭屑綿裹塞耳立出

又方以草帶鈎向耳孔即諸虫皆出勿令鈎羅耳孔中内虫即死耳中

治疔瘡塞耳而強堅不可得桃出方 五七方

搗曲蚯蚓取汁以灌耳中不過數灌極之皆出

吳公耳方 五八方

取新契狍突若灸猪突以當耳孔中安之即出  
虫蚯蚓者世呼為土蛛似吳公黃色而細長治耳方  
以水銀如大豆一枚寫耳中

又方焚胡麻以葛囊盛枕之虫聞香覺出即差

治蟻入耳方 灸脂膏香物安耳孔邊則自出

又方燒陵鯉甲末水和灌耳中 五九方

治飛蛾入耳中方 以筆管吹之立走出

治目失明世年不識人鍾乳雲母散方

鍾乳四分 伏苓四分 遠志四分 細辛四分 雲母四分

右五味搗下篩為散服半錢上稍增至一錢

治目膜不明方

黃連一分 決明子一分 麩核一分 秦皮二分

右四物切以水八合煎取三合沾綿洗目中

又方三歲雄鷄冠血數傳之自差 五千少

治雀盲方

以生雀頭五傳目可比夕作之

又方鼠膽傳之最良 五千少

治卒生翳方 灸手大指節上橫理三壯左目灸右

目灸左

又方貝齒細篩仰卧令人以著翳上日三一時

拭去 五千十五少

治目癆生淫膏赤白膜方

取生依牛一枚去其廐內米粒中著火上令沸錦注

取以傳管中

又方搗楊杞汁洗之日五六

又方取雀矢細直者以人乳和傳膜上自消爛盡也 五千

治目中生完稍長欲滿目及生珠管方

搗貝齒縮菘真丹分等攪令和以注完上日三四 五千

治目卒生珠管方 搗牛膝根葉取汁以洗目名入目中

佳 五千

治目卒赤痛方 搗薺菜根以汁洗之

又方當灸耳輪上七壯

又方鷄舌二十七枚 黃連一兩 大葉一枚

右三物切以水一升煮取三合先以冷水洗滌綿拭目  
日三大良

治風目常苦痒淚出方 以塩注背脊中 五ノ三三ノ

治數十歲眼爛背方 摘胡荽中心一把著鎗中以五升  
水煮之小拌覆上穿拌作孔目臨孔上癢痛當飯  
項淚出二升便差 五ノ三三ノ

治目淚出不止方 黃連四兩以水二升煮取一升綿半兩  
肉中曝復肉盡汁恒以拭目 又云風目常苦痒  
淚出方 以塩注背脊中 又方末黃連和乳汁傳  
背脊中 又方帚杖根煮汁以洗目 五ノ三三ノ

治鼻衄方 苦酒漬綿塞鼻孔 又方釜底墨  
末以吹內鼻中 又方水和粉如粥狀以書和服  
之多少在意立愈 又方以綿裹白馬矢塞  
鼻雜文馬矢悉可用若大甚者絞馬矢汁  
飲一二升可用干者絞取汁用之 五ノ三三ノ  
大衄口耳皆血出不止方 蒲黃五合以水一升和  
一頓服 又方鐮鐸以柱鼻下 又方熬塩三  
指撮以酒服之不止更服也 五ノ三三ノ  
治喉口中及舌生瘡爛方 含好淳苦酒即愈  
又方剉黃蘗恒含之 五ノ三三ノ

若口表裏皆有瘡者方 搗白芷藜荷根酒漬

含汁 又方劉黃蘗恒含之 五ノ三十四

治口中忽血不止者方 灸頰上入髮際一寸五十

壯便愈 五ノ卅五

舌上出血如替孔者 以戎塩傅之 五ノ卅六

人九竅四支指間皆血出此暴驚所致也 以井

花水澀其面當令卒至勿令病人先知 又方

粉一升水和如粥飲之 五ノ三六

治卒歐血腹內絞急胃中隱然而痛面色紫黑

或從溺出方 灸臍左右各五分四壯 又方末

桂一尺羊角一枚炙焦搗末分等合服方寸七日

三四 五ノ三十七

治卒吐血方 服蒲黃一升 又方濃煮鷄蘇飲

汁亦治下血漏血良 五ノ卅七

治卒唾血方 取茅根搗服方寸七亦可絞取其汁

稍々飲之勿使頓多 又方服桂屑方寸七日夜

令汁許服亦治下血神方 五ノ三十九

治口中熱干燥者方 烏梅棗膏分等以蜜

和丸如棗含之 又方生薑汁一合甘草二分杏

人末二分棗卅枚蜜五合 微火上煎丸如李核

含一枚日四五

治口臭方 蜀椒一升 桂心一尺 朱三指撮以酒服之 又方剪栝子含之 五

治舌卒腫起如吹猪胞狀滿口塞喉息欲不復通須臾不治則斂人方 直以指撞決舌皮若不尔夕可以小鉞刀決之當近舌兩邊又莫深傷之令裁足以開其皮出血而已不可當舌下中央舌下中央有大脉中此脉則血出不可斂人也若決皮而不愈者視舌下兩邊脉復判破此脉血出數升乃燒鐵令小赤以灼瘡數過

絕其血 又方濃煮甘草湯含少時取釜底墨苦酒和厚塗舌上下脫去更塗須臾便消若先決出汁竟与弥佳 五

治卒重舌方 末赤小豆以苦酒塗和舌上 又方烏賊魚骨蒲黃分等末傅舌上 又方灸兩足外踝各三壯 五

治懸心癰卒長數寸隨喉出入不得食方 搗塩綿纏筋頭注塩就以指之日六七 又方開口以筋抑舌乃燒小鐵於管中灼之若不頓為者可三為之畢以塩塗燒處 五

治齩齒方 灸足外踝上三寸隨齒痛左右七壯  
又方鷄舌香置虫齒上咋之 又方取李枝削  
取裏白皮一杷以少水煮令十沸小冷含之不  
過三當吐虫長六七分皆黑頭 又方作竹針一  
枚東向以針柱先咒曰冬多風寒夏多暖  
暑公甲病齩七星北斗光鼓織女教我斷汝  
便珠之針之時並咒曰珠之虫下不得動作三  
咒珠畢去勿及顧可千里遙治人但得姓名  
耳至秘五ノ四六ノ

治人病齩齒稍碎壞欲盡方 恒能以綿裹

樊石銜咋之咽其汁 五ノ四六ノ

治齒根動欲脫方 生地黄根綿裹著齒上咋  
咀以汁漬齒根日四五為之能十日為之長不復  
動 五ノ四六ノ

治齒間津液血出不止方 樊石一兩以水三升煮  
取一升先拭血乃含之漱吐 五ノ四六ノ

喉痺水將水不得入七八日則教人治之方 隨病  
所近左右以刀鋒裁刺手父指爪甲後半分中  
令血出即愈 又方隨病左右刺手小指爪甲  
下令出血立愈當先將縛令向聚血乃刺之

又方熬杏仁蜜丸如彈丸含咽汁 又方夜干三兩  
當歸三兩水三升煮取一升稍含之吐去更  
含之 又方菘子若芥子搗苦酒和以薄鹽  
治喉卒癰腫食飲不通方 用韭一把搗熬以薄  
腫上冷復搜之苦酒和之為佳 又方吞薏苡  
子二枚 又方燒荊木取其汁稍咽含之 又方  
燒稱錘令赤內二升苦酒中沸止取飲之三五  
治胃痺之病令人心堅痞急痛肌中苦痺絞急  
如刺不得俛仰其胃前皆痛手不得犯胃滿短  
氣咳唾引痛煩悶自汗出或徹引脊脊不知治

九批堂藏

之數日斂人方 橘皮一升 枳實四枚  
生薑半斤 水四升煮取二升分為再服六ノ二  
若已差復更發者 取韭根五斤搗絞取汁飲  
之立愈日ノ  
治脇卒痛如得打方 以繩橫度兩乳中間屈繩  
從乳橫度以起痛脇下灸繩下屈處卅壯  
治卒心痛方  
當力以自坐若男子病者令婦人以一坏水与飲  
之若婦人病者令男子以一坏水与飲之得新汲  
井水尤佳 又方吳茱萸五合 桂一兩 酒二升

乙斤堂藏



煮取一升分二服 又方吳茱萸二升 生薑四兩

豉一升酒六升者煮取二升半分三服 又方切生

薑若干薑半升以水二升煮得一升去滓

頓服之 六ノ四ノ

又方取竈中熟灰從去炭芥燔熨心上冷復

易日土

治卒腹痛方 書舌上作風字 又方搗桂下篩

服三方寸七苦參亦佳干薑亦佳 又方食塩大

握多飲水送之當吐即差 又方掘土作小坎以水

滿坎中熟攪取汁飲之 又方令人騎其腹溺脊

中之 又方米粉一升水二升和飲之 六ノ八ノ

凡心腹痛若非中惡霍亂皆宿結冷熱所為也治

心腹痛俱脹痛短氣欲死或已絕方 桂三兩切以

水一升八合者得八合去滓頓服无桂者干薑二

佳 六ノ九ノ

若心腹痛急似中惡者方 擣生薑蒲根汁服少

々令下咽即差 六ノ九ノ

治卒苦心腹煩滿又胃脘痛欲死方 以漿湯令

的尔漬手足冷復易秘方 又方灸乳下一寸七

壯 又方搗香薷汁服三升 又方劉薏苡根

煮取汁服三升 六ノ十ウ

治卒腰痛不得俛仰方 正倚立竹以度其人足下至脊

断竹反以度之背後當脊中灸竹上頭處退年

壯畢藏竹勿令人得之 又方去窮骨上一寸灸七

壯其左右各一寸灸七壯 六ノ十三ウ

概腰者是反腰忽動轉而挽之治概腰痛欲死

方 生葛根削之嚼咽其汁多益佳 又方生

地黄搗絞取三升煎得二升内白蜜一升日三服

不差更作 凡母 六ノ十四ウ

治反腰有血痛方 搗桂下篩三升許以苦酒和以

塗痛上干復塗 又方灸足踵白穴際三壯 上日

治陰丸卒縮入腹急痛欲死名曰陰疝方

狼毒四兩防葵一兩附子二兩 右三物蜜丸服如

梧子三九日夜三過 七ノ七ウ

治卒大便脫肛方 灸頂上迴髮中百壯 又方猪

膏和補黃柳肉但以粉之灸佳 又方熬火石灰

令熱故綿裹之坐其上冷又易之并豆醬清合

酒塗之 七ノ十ウ

若腸隨肛出轉廣不可入者 搗生枯樓取汁温

以猪膏内中手洗隨按抑自得縮入也 又方

熬石灰令熱布裹以熨之隨按令入 又方  
以鐵精粉之 七ノ七ウ

作鯖魚鱠薑芥食之多少任人 七ノ七ウ

治三虫方 搗桃葉絞取汁飲一升 七ノ三ニウ

治寸白方 多食榧子亦佳 又方煮猪血宿不食

明旦飽食之 濃煮猪櫛榔飲三升虫則出

盡 七ノ三ニウ

治蛇虫方 用龍膽根多少任意煮令濃去滓宿不

食清朝服二三升不過二 又方搗生艾絞取汁宿

不食朝飲一升常下蛇 七ノ三ニウ

脚弱滿而痺至少腹而小便不利氣上者死 ハノセウ

若脛已滿捻之没指者方 酒若水煮大豆飲汁又恒

食小豆 ハノ十四ウ

若步行足痛不能復動方 蒸大豆兩高裹盛更燔

以熨之 ハノ十四ウ

治脚氣疼痺屈弱不仁時冷時熱方 先取好豉一升

三蒸三曝干以好酒三升漬之三宿便可飲隨人

多少以滓薄脚其熱得小退也 又方以酒煮豉

服之 ハノ十六ウ

其灸法孔穴亦甚多恐人不能悉知處今止疏要者

必先從上始若直灸脚氣上不泄則危矣

大椎一穴灸百壯 肩井二穴灸百壯 面且中一穴灸五十壯 巨闕一

穴灸百壯 凡灸此上部五穴亦足以泄其氣若能灸

百會風府胃管及五藏俞亦佳視病之寬急耳

次風市二穴灸百壯 三里二穴灸二十壯 上廉二穴灸百壯 下廉

二穴灸百壯 絕骨二穴灸二十壯

凡此下部十穴並至要猶餘伏菟犢鼻耳凡

灸此壯數不必頓畢三日中報之令竟八升四升

上氣喘嗽肩息不得卧手足逆冷及面浮腫者死治

治卒得欬味方 皂莢 干薑 桂心 分小搗丸服

三九日三 又方生薑汁百部汁和煎服二合分升

度手毋指中折以度心下灸三壯即差九ノハヲ

治卒上氣鳴息便欲絕方 搗韭絞飲汁一升許立愈

又方末人參服方寸七日三 又方桑根白皮細切三升

生薑切半升 吳茱萸半升 酒五升合者三沸

去滓盡服之入口則氣下此千金秘方九ノハヲ

治卒之氣不復報肩息方干薑三升吹咀以酒一升漬

之服一升日三 又方度手毋指折度心下灸三壯即差

又方麻黃三兩先以水五升者三沸去沫乃內甘草

二兩杏仁六十枚煮取二升半三服九ノハヲ

治胸中多痰頭痛不欲食及飲酒人痰僻菹淡方

恒山二兩 甘草二兩 松蘿十兩 菴蒂三七枚以酒  
水各一升半煮取升半初服七合取吐不盡餘更分  
二服後可服半夏湯 又方先作一升湯投一升水名  
為生熟湯乃食三合塩以此易送須臾欲吐便搯出  
未盡更服二合 若胸中常有淡冷水飲虛羸不  
足取吐者方 半夏一升洗生薑半斤 伏苓三兩  
水七升煮取一升半分再服 九ノ十六ウ

治腹中冷澀水穀癥結心下停淡兩脇痞滿案之鳴轉  
逆宮飲食方 大黃三兩 甘草二兩 蜜二升二合 棗廿七

枚以水三升煮棗取一升內諸藥煮取一升七合分  
再服 又方伏苓二兩 棗三兩 搗蜜丸如梧子服

五九日三九ノ十九ウ

治胃反不受食食畢輒吐出方 大黃四兩 甘草二兩  
水三升煮取一升半分再服之 九ノ廿ウ

治脾胃氣弱穀不得下遂成不復受食方 大麻子八  
一升 大豆黃卷二升并熬令黃香搗篩飲服三方  
寸七日四五九ノ廿四ウ

治胃中虛冷不能飲食食輒不消羸瘦嘔之四支疴  
弱百疾回此牙生方 雞白一斤 枳實三兩 橘皮二兩

大棗十二枚 粳米二合 豉七合 以水七升 先煮棗 得五升 內諸藥 煮取二升半 分三服 日作之 九ノ廿四ウ

治飽食竟便卧得穀勞病令人四肢煩重 咀之欲卧

食畢輒甚方 大麥蘗一斤 枳一兩 干薑三兩 搗

末服方寸七日三四服 治食過飽煩悶但欲卧而

腹脹方 熬麥麵令微香 搗服方寸七得麥大麵

益佳無麵者蘗子可用 九ノ廿六ウ

治人忽惡心不已方 薤白半斤 茱萸一兩 豉半升

米一合 棗四枚 枳實二枚 塩如彈丸水三升 煮

取一升半 分三服 又方但多嚼豈菹子及噉櫛

榔亦佳 九ノ廿七ウ

人食畢噫酢及酢心方 人參二兩 茱萸半升 生薑

三兩 大棗十二枚 水六升 煮取二升 分再服 九ノ廿八ウ

治卒嘔哕又厥逆方 生薑半斤 切 橘皮四兩 水七

升 煮取三升 適寒温服一升 日三 九ノ三十ウ

治干嘔不息方 搗葛根絞汁服一升 許 又方灸兩

手腕後兩筋中一夫名間使各七壯 九ノ三十一ウ

治卒哕不止方 飲新汲井水數升 又方但閉氣抑引

又方痛爪眉中央閉氣 又方好豉二升 煮取汁 飲

之又方 枇杷葉一斤 水一斗 煮取三升 再服 又方

煮葶藶根為佳 又方以物刺鼻中若以少許皂  
莢內鼻中令嚏即止 九ノ三ニウ

露宿丸治大寒冷積聚方 與石 干薑 桂 桔梗  
附子 皂莢 各三兩 搗篩蜜丸服如梧子十九日  
三稍增至十五丸 十ノ五ウ

治寒疝去來每發絞痛方 吳茱萸三兩 生薑四兩  
豉二合 酒四升 煮取二升 二服 十ノ九ウ

治心下有物大如杯不得食者方 亭歷二兩 大黃二兩  
澤漆四兩 搗篩蜜丸搗千杵服如梧子二九日  
三ノ十六ウ

水病脣黑唇突出死水病脉出者死 十ノ廿四ウ

治大腹水病方 防己 甘草 亭歷 各二兩 搗苦酒和服  
如梧子三九日 三恒將之取都消乃止 又方白茅根一  
大把小豆三升水五升 煮訖去茅根食豆水隨小便  
下 又方恒噉小豆飯并汁佳 十ノ二十六ウ

治卒腫身面皆洪大方 凡此腫或是虛氣或是風冷  
氣或是水飲氣此方皆治之 用大鯉魚二頭以淳  
苦酒三升煮之令苦酒盡乃食魚勿食飯及塩  
豉他鮭也不過再作便愈 又方大豆一升熟煮  
漉飲汁食豆不過三作必愈 小豆三佳 又方大豆

一斗以水五升煮取二升<sup>斗</sup>去豆內酒八升更煎取九升  
分三四服腫老後渴頓不可多飲 又方灸足內踝  
下白肉際三壯 治腫入腹苦滿急窄飲食方  
亭歷七兩 枳實三兩 伏苓二兩 吳茱萸二兩 搗  
蜜丸如梧子服十九日三 又方大戟 烏扇木各三  
兩 搗篩蜜丸如梧子且服二丸當下 若腫從脚  
起稍上進者入腹則斂人治之方生猪肝一具細切  
頓食勿与塩乃可用苦酒耳 又方煮豉汁飲之  
以滓薄脚 十一 三十四  
黃病有五種謂黃汗黃疸穀疸酒疸女勞疸也

治黃疸一身面目悉黃如橘方 生茅根一把細切  
以猪膏二斤合作羹美盡食 又方搗生麥苗水  
和絞取汁服三升小麥勝大麥 十一 三十五

灸脾愈百壯 又方灸手大陰隨年壯 又方灸  
錢孔百壯 十一 三十六 又方灸胃管百壯

治穀疸方 茵陳蒿四兩 水一斗煮得六升去滓  
內大黃二兩支子二十七枚煮取二升分瀉當去黃  
汁 十一 三十七

治黑疸者多死急治之方 去依根搗絞取汁頓  
服二升至三時項病當隨小便去不去更服之 十一 三十八



凡所以得霍亂者多起於飲食或飽食生冷物雜以肥鮮酒膾而當風履濕薄衣露坐或夜卧失覆之所致也治之方初得之便務令温暖以火炭布其卧床下大烝滅並垂被絮若衣絮自抱冷易烝者又方可燒地令烝水液敷蔣席卧其上厚覆之又方可作的尔烝湯著中漬足令至膝并銅器若凡器盛湯以著腹上衣藉之冷復易湯又方可以熨斗盛火著腹上而不靜者便急灸之但明案次第莫為亂灸須有其病乃隨病灸之霍亂艾丸苦不壯

數若不多本方言七壯為可四五壯元不活便火下得眠十一ノ三ウ四

治霍亂若心腹痛急似中惡者方 擣生昌蒲

根飲汁少令下咽即著 卒得霍亂先腹痛

者方灸齊上二夫十四壯名大倉若繞齊痛者

灸齊下三寸四壯名關元十一ノ六ウ

治霍亂心腹脹痛煩滿短氣未得吐下方生薑若

干薑二升以水五六升煮三沸頓服若不即愈更

可作 治若煩悶溲滿者方 灸心下三寸七壯

名上管又方以塩内齊中灸上二十七壯 治煩嘔腹

脹厚朴湯方厚朴四兩桂二兩枳實五枚生薑三兩  
以水六升煮取二升分三服十一ノセウ

治霍亂下利不止者方 灸足大指本節內一寸側白  
完際左右各七壯名大都十一ノクウ

霍亂吐下不止方干薑菜菔各二兩水二升煮取一升  
一服同上

灸兩乳邊里外近腋白完際各七壯十一ノクウ  
先洞下者灸齋邊二寸男左女右十四壯同

吐而下不止者灸齋下一夫幼中七壯同  
霍亂若宛者 灸手腕第一約理中七壯名心主當

中指也十一ノセウ

霍亂干嘔者方 灸手腕後三指大兩筋間左右各七  
壯名間使 又方取薤一膚以水二升煮令得一升  
半服之不過三作十一ノセウ

治霍亂吐下後大渴多飲則斂人方  
可以黃粟米五升水一斗煮得三升

澄稍飲之勿飲餘飲之十三ノ

霍亂轉筋者方 灸蹠心下五六壯名涌泉 又方

灸大指上爪甲際七壯 又方苦酒和粉塗痛上十三  
轉筋入腹痛者方 今四人捉手足灸齊左一寸十四壯

若轉筋入腹中如欲轉者方 燒編薺索三指撮  
酒服之 又方釜底墨末酒服之

腹中已轉筋者方 當倒搭病人頭在下勿使及地腹  
中平乃已

若兩臂脚及胛骨轉筋者方 取塩一升半水一斗  
煮令熱火清手足在胛骨者湯洗之轉筋入腹中  
若劇者列陰、縮必死猶在倒搭之可異也廿九  
先手足逆冷者方 灸足內踝上一夫兩足各七壯  
治下不止手足逆冷方 枳百枚 附子一枚 水三升  
煮取一升一服十六、十七

治霍亂欲死不能語方 生薑一斤切水七升煮取二  
升分三服 又方飲竹瀝少許 又方蘆蓬茸大  
把濃煮飲二升即差 又方干薑三兩甘草二兩  
附子二兩水三升煮取一升分三服十八、十九

治霍亂神秘起死灸法 以物橫度病人口中屈之從  
心鳩尾度以下灸度下頭五壯橫度左右復灸五  
壯此處先灸中央 又方灸脊上以物圍令心厭  
又夾脊左右一寸各七壯是腹背各灸三處也十六、十七  
華他治霍亂已死上屋喚魄者諸治皆至而猶不  
老者方 捧病人覆卧之申臂對以繩度兩肘頭

依繩下夾背脊大骨中去脊各一寸灸之百壯无不  
活者已試數百人皆即起坐他以此術傳其子度世  
秘不傳也十一ノ六ノ

注利不吐而轉筋入腹欲死方 生薑三累柏破以酒  
升半者煮三四沸頓服之十一ノ六ノ

治霍亂心腹脹痛煩滿短氣未得吐下方 生薑  
若干薑一二升以水五六升煮三沸頓服十一ノ九ノ

治霍亂後煩躁卧不安方 葱白廿枚大棗廿枚  
水二升者取一升頓服之十一ノ三ノ

下利手足逆冷灸之不暖或无脉微喘者死下利舌萎煩

躁而不渴者死下利不禁腸垢出者死十一ノ三ノ

下色白食不消者為寒下方 干薑赤石脂各等末  
以白飲和九如梧子日十九日三夜十一ノ三ノ又方

酸石榴皮燒末服方寸匕 又方生薑汁二升蜜合煎  
取二升頓服 又方豉一升薤白一朶水三升煮取二升及

契頓服之有大棗肉七枚良十一ノ三ノ  
有心患冷者淳下白如鼻涕治之方 龍骨 干薑

附子 各等搗蜜丸服如梧子五丸至十九日十一ノ三ノ  
下色黃者協毒丸下也治之方 支子十四枚去皮搗蜜

丸如梧子服三九日十一ノ三ノ

挾熱者多下赤膿或雜血治之方 薑連甯寗中

塵末涓服二方寸七日三 十一ノ三十九

又方薤<sub>白</sub>把煮鯽魚鮓內林米食之多多老 十一ノ三十九

治赤白雜瘕下方 赤石脂一升 烏梅卅枚 干薑三兩

合粳米一升水七升煮取米熟去滓一服七合 又方

鼠尾草濃煮煎如薄粘服五合至一升日三赤下

用赤花者白下用白花者佳 十一ノ卅五

治水下積久不老腸垢已出者方 赤石脂桂干薑附

子分等鴆末蜜丸如小豆服三九日三 又方石榴皮

一枚黃蔞亦一兩干薑二兩半以水三升煮取一升

二合內膠頓服 十一ノ卅七

若久下經時不愈者名息下治之方 龍骨四兩鴉

如小豆水五升煮取二升半冷分五服 又方黃連

如鴨子大一枚膠如掌大一枚孰艾一杷水五升煮

二物取二升去滓內膠、洋分再服但濃者干艾

葉飲之亦佳 又方常煮忍冬飲之 十一ノ卅八

重下此謂今赤白瘕下也今人下部疼重故名重

下去膿血如鷄子白日夜數十行繞脊痛治之方

熬鼓令小焦鴉服一升日再三 又方烏梅廿枚打

破以水二升煮取一升頓服 又方赤石脂一升烏

梅卅枚 干薑三兩 粳米一升 水七升 煮取米熟  
去滓 一服 七合 十一十四

若時歲盡注毒下者方 黃連 黃蘗 分等搗

藍汁 九如梧子 服六七丸 至十四五日 三 又方 林米

一升 燒成炭水 三升 和飲之 十一十四

治卒消渴小便多方 多作竹瀝 飲恣口數日愈

又方 破故屋 凡煮之多 飲汁 又方 石膏半斤 搗碎

以水一斗 煮取五升 稍服 又方 枯樓根 薄切炙

五兩 水五升 煮取四升 飲之 十一十四

治大渴利日飲數斛小便亦尔者方

枯樓 黃連 防已 鈔丹 分等搗末 以苦酒

一合 水一合 和作漿 服方寸匕 日三 十一十七

治卒患淋方 灸足大指前節上十壯 良 又方

灸兩足外踝中央 退年壯有石即下 又方 但

服葎草汁一升 不過三升 灸治石淋 又方 豉

一升 水三升 漬少時 以塩一合 內中頓服 十一十九

石淋者方 取鷺矢末 以冷水服 錢五上 清旦服

至食時 當溺石 又方 取故甑 敲燒 三指撮 服

即通 又方 石首魚頭中石 一升 貝齒一升 合搗

細篩 以苦酒和 分為三分 宿不食 明旦服 一分 日

中服一分暮服一分明日旦石志下三ノセニラ

熱淋方 取白茅根四斤剉之水一斗五升煮令得

五升汁服日三 又方末滑石屑水服三合ナニテ

治卒關格大小便並不通支滿欲死二三日則斂人方

取塩以苦酒和塗三脊中干復易之ナニナセウ

又方自取手十指爪甲燒末以酒漿服ナニナセウ

又方葵子二升水四升煮取一升頓服之內猪膏

如鷄子二丸ニノ佳日

治大便不通方 研麻子以米雜為粥食之ニノ可直

者煮麻為飲服之 又方剥烏梅皮以清醬豆中

道寸下部十九ウ

脾胃不和常患大便堅強難者 大黃三兩夕藥三兩

厚朴三兩 枳實六斤 麻子八五合

搗篩蜜丸如梧子服十九日三稍增以通利為度可

恒將之ナニナセウ

治卒下血方 豉一升以水三升漬煮三沸去滓頓服

汁一升日三冬天每服輒温 又方豉二升以酒六升

合煮得三升服一升日三 又方煮香茅末極令濃去

滓服一升日三 又方乱髮如鷄子大燒末水服之不

過三 又方三指撮塩燒向東服之 又方灸兩足

父指迴毛中迴年壯即愈十三ノ廿五ノ

治小便不通方 熬塩令熟火内囊中以尉火少腹上

又方以塩滿齊灸上三壯 又方末滑石水服方寸七

又方以衣中白魚虫内小孔中廿八ノ

治小便卒太數復非淋一日數十過令人疲瘦方灸兩足

下第二指本節第一理七壯 又方不中水猪膏如

鷄子者一枚灸承下取肥汁盡服之不過三此二

方并治遺溺也 又方鷄腸草一把就火搗酒一升

漬一時絞去滓分再服十三ノ廿二ノ

治小便血方 茅根一把切煮去滓數飲之 又方搗葱

白取汁服一升十三ノ廿五ノ

治男子溺精如米汁及小便前後去精如鼻涕或

溺有餘瀝汚衣此皆内傷令人虛絕治之方

桔樓二分 滑石二分 石韋一分 搗末以麦粥服方

寸七 又方甘草 赤石脂分等搗末服方寸七日

三十三ノ廿三ノ

治失精精中有血方 父蛾ヲヒル二枚陰干之玄參稱半

分合搗末以米汁向日一服令盡之十三ノ廿三ノ

治卒苦連時不得眠方 暮以新布火炙尉火目并

蒸大豆囊盛枕之冷復易終夜常枕立愈十三ノ



治嗜眠喜睡方 父鼠目一枚燒作屑魚膏和注目  
外背則不肯眠兼又取兩目絳帛裏帶之 又方  
麻黃木各五分 甘草三分日中向南搗末食後服  
方寸匕日三 又方孔公薛子末五兩 通草三兩 茗  
茶一斤 水一斗煮取五升向暮服之即一夕不睡眠  
凡服五石護命更生及鍾乳寒食諸散失將和節度皆  
致發動其病無所不為若發起倉卒不漸而至者此  
皆是散熱也宜時救解  
若受身外有諸一切疾痛違常者皆以冷水洗數百過  
契有所衝水漬布巾隨以搗之又水漬冷石以熨之行  
飲暖酒道遙起行

若心腹內有諸一切疾痛違常煩悶惛恍者急解衣取冷  
契溫酒飲二三升漸稍進覺小寬便冷食其心痛者  
寢急

若肉冷已噤但折齒下熱火酒便開

若腹內有結堅熱癖便生衆疾者急下之熱甚口發瘡  
者下之癖實猶不消惡食畏冷者更下之 十九ノ廿三ヲウ  
任身卒胎動不安或胎轉捨心或不血不口方

葱白一把以水煮令葱熟飲其汁

又方生魚二斤秫米一升調作臠頓食之 廿二ノ廿ヲウ

治胎墮血露不盡方

艾葉半斤酒四升煮取一升頓服之 廿二ノ廿ヲウ

治墮胎後心腹絞絞痛方

鼓三升 生薑五兩 葱白十四枚 酒六升 煮取三升  
分三服 サニノサニウ

治任身胎上迫心方

取弩弦急帶之立愈

又方生麴半斤 碎水和絞取汁三升 分二服

又方生艾搗絞取汁三升 膠四兩 蜜四兩 合煎取一升

五合頓服之 サニノサニウ

任身月水不調名為漏胞治之方

阿膠五兩 干地黄五兩 酒五升 煮取一升半 未食

温再服 サニノサニウ

刮取青竹皮以水煮令濃絞去滓服三升 サニノサニウ

秤錘燒正赤以著酒中令三沸出錘飲酒 サニノサニウ

治任身腰背痛如折方

末鹿角酒服方寸匕 又方葱白煮汁服之驗

又方膠桂各一斤 槁以酒三升 煮得二升 去滓盡服

サニノサニウ

治婦人任身之腫方

大豆二升 酒三升 煮取二升 頓服之 サニノサニウ

治任身尿血方

取赤蒿燒末服方寸匕 日三 サニノサニウ

取井中泥心下三寸 サニノサニウ

甕中黃土末以鷄子白丸如梧子吞一丸 サニノサニウ

或不以理欲去胎方

斑苗燒末服一枚即下 サニノサニウ

密取馬鬣自毛繫衣中勿令知耳サ三ノ九ヲ  
吞大豆三枚 又方吞槐子三枚 又方戶根下土三指撮  
酒服之サ三ノ三ニウ  
塩以湯和塗兒蹠下并摩婦腹上

又方真丹塗兒蹠下  
又方取釜月底墨以交牙書兒蹠下  
又方丹書左足下作千字右足下作黑字サ三ノ十四ヲ  
服水銀如大豆二枚

又方取梁上塵三指撮服之  
又方燒鐵杵令赤內酒中飲之 又方燒斧如サ三ノ  
子上迫心方取為犬血小飲之立下  
先出手者サ三ノ塩塗兒掌手中

先出足者以并書兒左足下作千字右足下作里字即  
生サ三ノ十五ヲ

以苦酒煮大豆令濃漙取汁服三升死胎即下

又方飲夫小便一升サ三ノ十六ヲ  
月水布燒末以服少 又方末皂莢內鼻中得嚏即  
下

又方解髮刺喉中令得嘔之良サ三ノ  
治血氣逆心煩滿者方

生竹皮一升水三升煮取一升半分三服サ六ヲ

治產後惡血不除方

生薑三斤吹咀以水一斗煮取三升分三服當下惡  
血サ七ヲ

治產後腹癢痛方

末桂温酒服方寸匕日三 又方燒芥令赤以溲酒

中飲之 廿三ノ廿九ヲ

若中風若風

治產後虛羸白汗出鯉魚湯方

鯉魚肉三斤葱白一斤香豉二升 凡三物水六升

煮取二升分再服微汗即止 廿五ヲウ

若產後虛煩不得眠者方

枳實夕藥分等並炙之末服方寸匕日三 廿五ヲ

治產後煩熱苦渴或身重痒方

熬大豆酒淋及熟飲二升温覆取汗 廿三ノ廿六ヲ

凡去乳汁勿置地虫蟻食之令乳无汗可以浚東

壁上

治產後而乳无汗者方

燒鵲巢末巨指撮酒服之 又方末蜂房服三指

撮 廿三ノ廿六ヲ

乳汁溢滿急痛者但温石以尉之

若回乳兒汁出不可引者燒鷄子黃食之 廿三ノ廿九ヲ

治妬乳方

梁上塵醋和塗之亦治陰腫 又方掄白皮搗醋

和封之 廿三ノ卅ヲ

產後月水不通方

桂心為末酒服方寸匕 又方鐵杵鉅燒內酒中服之

卅五ヲ

治婦人不生子方

以戊子日令婦蔽胫卧上西北首交接五月七月庚子壬子日尤佳

又方桃花未舒者陰干百日搗末以戊子日三指撮酒服廿四ノ四ウ

覺有任三月滿雄鷄浴處

又方密以大力置卧席下廿四ノ十ウ

凡小兒生後六十日目瞳子成能咳嗽識人百五日任脉生能反覆百八十日尻骨成能獨坐二百十日掌骨成能匍匐三百日髓骨成能獨倚三百六十日為一基棘骨成乃能行

治少小初變並時有者服之發干已以黑散方

杏仁二分 大黃一分 麻黃二兩 去節

右三物先搗大黃麻黃下篩杏仁令如脂內散令調更篩篩之盛以韋囊廿日兒以汁和之如小豆一九分為二丸易吞厚衣芑之令汗出畢下煨燃火解衣溫粉之百日兒取散如棗核大以小陽和服之汗出之後消息如上法當豫溫粉不可解衣乃溫粉廿五ノ十五ウ治已服黑散發熱不歇服之熱小老便以勿復與紫

九方

赤石脂一兩 巴豆卅枚 代赭二兩 杏仁卅枚一方五十枚 去皮

右四物先治巴豆杏仁搗三千杵乃內代赭赤石脂更搗三千杵絕也藥勢即成一方云相和与少蜜和之盛以密器无令藥燥〇則元熱以巴豆杏仁自

九常苦不能盡屑當稍內之令相九廿日兒服如  
黍米一丸許小乳之令藥得下却兩食頃乃  
復乳之勿令飽耳平旦一服茶日中執火盡日西夕  
時復小增九至鷄鳴時若復与一丸愈者以卅日  
兒服如大黍米一丸卅日兒服如麻子一丸六七十日兒  
如胡豆一丸百日兒服如小豆一丸不下故執火者增半  
九以下利為度

又方說服紫九當須完出若不出不完為病未盡  
當更服之有執火乃服紫九元執火但有寒者熱服  
乳頭單當歸散黃耆散變蒸服茶後微執火者  
急可與除熱黃芩湯方

黃芩湯少小輩變蒸時服藥下後有朝夕執火利

除熱方

黃芩二兩 甘皮六朱 人參二兩 干地黄六朱

甘草半兩

大棗五枚去核

凡六物切之以水三升煮取一升絞去滓三百日兒服  
半合三百日兒服一合日再執火若以變蒸兒有微  
熱亦可服

經曰天不星西北故令兒腮後合地不足東南故兒  
體後生成人法於三故令齒後故腮合乃而言體  
成乃而行大陰氣不足而大陽氣有餘者故令  
兒高羸瘦骸胫三歲乃而行 廿五ノ十六ヲウ  
禱栢子人以一刀圭飲之 五上ウ  
方臨發時禱六附子和苦酒塗背上

又方石上昌蒲補濃煮浴兒 五十二  
恒山四分小麦三合淡竹葉切一升石以水三升煮  
取一升服之 五十二

治小兒卒不知何所疾痛而不知人便絕死方  
取雄鷄冠血臨兒口上割令血出瀝兒口入喉  
便活 五十三

取生韭根搗以猪膏煎稍服之

又方就火灸鼠完若伏翼完以哺之 廿五ノ五十九  
下利不<sub>レ</sub>方末赤小豆和苦酒涂<sub>レ</sub>踐上

又方猪完灸哺之 五十六  
取蜂房熬末以酒若水服少許  
又方以白魚虫磨齊下至陰 廿五ノ五十八

取衣中白魚虫塗齊中內溺道中

又方取故席多垢者坐一升以水三升煮取升  
去滓飲之 廿五ノ五十六

大便血方刮鹿角作屑以米汁服五分匕

又方燒鵲巢為屑飲之少許 廿五ノ五十九

取鷺巢中葶苈燒服一錢上即老 廿五ノ六十一

乳子枕中神效方 龜甲 龍骨 遠志 石上昌蒲

分等未食後服方寸匕日三

治人心孔惛塞多忘善誤方

七月七日取蜘蛛網著衣領中勿令人知則不忘

又方丙午日取鼈爪著衣領帶中

又方常陸花多採陰干百日搗末暮水服方寸匕





