

卷
二十三
二十四



浙江圖書館



浙江圖書館

醫學綱目卷之二十三

脾胃部

泄瀉滯下

大法

潔古保命法

分凡寒暑熱

濕滯下屬熱

潔論曰歲府瀉利其証之多大抵從風濕熱論是知寒少

熱多寒則不能久也故曰暴瀉非陽久瀉非陰論曰春

宜緩形形緩勤則肝木乃榮反靜密則是行秋令金能

制木風氣內歲夏至則火盛而金去火木旺則脾土

損矣輕則瀉泄身熱孤洪穀不能化重則下利膿血而

稠粘皆屬於火經曰溲而便膿血知氣行而血止也宜大

黃湯下之是為重劑黃芩芍藥湯是為輕劑是實則瀉

其肝木能自虛而脾土厚矣故經曰春傷於風夏必霍

泄此逆四時之氣人所自為也此一節熱泄經所謂滯



泄瀉屬濕

久泄屬風

暴泄傷寒
隨証施治

有自大陰經脾受濕而為水泄虛滑微滿身重不知穀
味假令春宜益黃散補之夏宜瀉之法曰宜積宜瀉宜
止宜和假令和則芍藥瀉是也止則呵子瀉是也久則
防變而為膿血脾經傳焉謂之賊邪故難愈若先利而
後滑謂之微邪故易安此皆脾土受濕天所為也雜至
智不能避口食味鼻食氣從鼻而入留積於脾而為水
瀉此一節濕泄所謂泄瀉也有厥陰動下痢不止其脈沉
而遲手足厥逆涕唾膿血此証難治宜麻黃湯小續命
湯汗之法曰謂有表邪束於內當散邪而安此一節凡
泄所謂久泄也有暴下無聲身冷自汗小便不清利大便
不禁氣喘布息脈微嘔吐急以重藥溫之則漿水散是

不辨不氣雖布息脈微嘔吐急以重藥溫之則將水水散是

也此一節寒泄所謂暴泄也故法曰後重則宜下腹痛則宜和身重則宜除濕

脈弦則去風膿血稠粘則重藥竭之身冷自汗以重藥

溫之風邪內縮宜汗之則安驚瀉為痢宜濕之又曰在

表者發之在裏者下之在上者涌之在下者竭之身表

熱者內疎之小便清者分利之又曰盛者和之去者

送之過者止之兵法曰避其未銳擊其隨歸此之謂也

凡病泄而惡寒太陰傳少陰為土未剋水也用除濕白

朮在芍安脾芍藥桂黃連破血也火邪不能勝水也太

陰經不能傳少陰而反火邪上乘肺經而痢白膿也加

常歸芍藥之類也又裏急後重脈大而洪實為裏証而

甚蔽是有物結滯也宜下之若脈浮大甚不可下雖裏

惡寒太芍芍藥連白膿歸芍

裏急後重

脈實宜下

脈浮忌下

脈細宜瀉

閉甚宜調

困倦食共木芍
卷腹不痛加芍
未見膿加連
膿痛加歸芍
見血加連桂陽

分上中下
先膿後血黃
先血後便地榆
脈沉臍痛黃連

急厚重脈沉細而弱者謂寒邪在內而氣散也可溫養
而自安裏急後重閉者大腸經氣不宜通也宜加枳榔
木香宣通其氣着四肢慵倦小便少或不和大便走沉
困飲食減少宜調胃去濕白朮芍藥茯苓三味水煎服
白朮除脾胃之濕芍藥除胃之濕枳四支困倦茯苓能
通水道走濕如發熱惡寒腹不痛加黃芩為主如未見
膿而惡寒乃太陰欲傳少陰也加黃連為主桂枝佐之
如腹痛甚加當歸倍芍藥如見血加黃連為主桂當歸
佐之如煩燥或先便白膿後血或發熱或惡寒非黃芩
不能止上部也血如惡寒脈沉先血後便非地榆不除
下部血也如惡寒脈沉或腰痛或臍燥痒非黃連不除

脈沉痛者連下部血也如惡寒脈沉或隱痛或悸燥汗黃連不除

此中部血也如便血相雜而脈浮大慎勿以大黃下之

必死謂氣下竭也而湯無所收凡陰不和惟可以分陰

陽和之治法又曰暴泄非陰久泄非陽有泄者脈疾身

動身亮暴注下迫此陽也寒者脈沉自用鼻息微者姜

附湯身重不卒亦附湯主之

渴引飲者是泄在胃上水入則下高入胃胃本無泄

不勝其水曰水泄故使水穀一時下此証當灸大椎三

五壯立已乃督脈瀉也如用藥使車前子雷丸白朮茯

苓之類五苓散之可

又有寒泄者大腹滿而泄又有驚悸者寒泄也驚者鴨

也大便如水其中有少結糞是也如此者當用天麻附子

今寒泄虛實

泄則大渴引飲

宜參

寒則腹滿驚

溲宜溫

虛則泄出不

禁宜澀

實則虛坐努

責宜調

乾姜之類也

又法曰泄有虛實寒熱虛則無力粘衣未便已泄出謂不能禁固也

實則數至圍而不便俗云虛坐努責也裏急後重皆依進退大承氣法主之也

太陽病為協熱利涼葛散

表皆誤下因而下利不止為協熱利

陽明為痼瘕進退大承氣主之

太陰濕勝濡泄不可利可濕四逆湯主之

少陰蟄封不動禁固可瀉赤石脂乾姜湯主之

厥陰風泄以風治風小續命湯消風湯主之

保五泄傷寒乃分三部

分新久

分六經

太陽協熱宜涼

胃陽明後重

宜承氣

太陰濡泄宜蓮

少陰虛滑宜石

脂厥陰久泄宜

續命

初以暴法
中川的對
末以久法

東垣謹甫法
傷冷食滯泄温
而消之
傷熱物便血寒
而疎之
凡邪滯升奉之
湿氣盛分利之
滑泄脉細温之
收之
後重脉實
下之寒之

初說暴

次說中

後說久泄

此說 是難經五十七難是三節內包十五法初以暴藥中
以的對証候得中也末治之久泄仲景論厥陰中治法是也
恒胃氣和平飲食入胃精氣別輸于脾上歸於肺行於百
脈而養榮衛也若飲食入胃一傷起居不時損其胃氣
上升精華之氣及下降是為滯泄久則太陰傳少陰而為
腸癖假令傷寒冷飲食瞋滿而脹傳為滯泄者宜温熱
之齊以消導之傷温熱之物而成膿血者宜以苦寒之
劑以內疎之凡邪下陷者升奉之湿氣內盛者分利之
裏急者下之後重者調之腹痛者和之洞泄腸鳴無力
不及括衣其脉弦細而弱者温之收之膿血稠粘數至

諸泄利皆用
芍藥為主隨
証加藥

圍而不能使其脈洪大而有力者下之寒之大抵治病
皆求其兩曰察何氣於勝取相剋之藥平之隨其兩利
而利之以平為期此治之本體也

羅諸瀉久利不止或暴下皆太陰受病不可高於芍藥若
不受濕則不利故瀉用白朮至人主法若四時下利於
芍藥白朮內春加防風夏加黃芩秋加厚朴冬加桂附
然更詳外証寒熱處之如裏急後重瀉加大黃如身困
倦瀉加白朮通身逆氣息微加桂附以溫之如或後重
膿血稠粘雖在盛冬於溫藥內亦加大黃

難有胃泄有脾泄有大腸泄有小腸泄有大瘕泄者曰

後重

難經法
胃泄大化而下
脾泄脹嘔宜溫

胃泄者飲食不化色黃瘡泄也保命云承氣湯下之

脾泄者腹脹滿泄主食即嘔吐逆保命云建中理中湯主之

大腸泄者食已窘迫大便色白腸鳴切痛保命云干姜附子湯主之

小腸泄者溲而便膿血少腹疼保命云承氣湯下之

大瘕泄者裏急後重數至圍而不能便莖中痛保命云胃小腸大瘕三証

皆清涼飲子主之其泄自止厥陰証莖中痛如甘少見陰証裏急後重者加大黃也此五法也

丹泄瀉之病水穀或化或不化並無努責惟覓困倦者滯

下則不然或膿或血或膿血相雜或腸垢或無糟粕或

糟粕相雜雖有痛不痛之異然皆裏後重逼迫人

仲大腸有寒者多驚瀉有熱者便腸垢

靈腸中寒則鳴瀉腸中熱則出黃如糜師傳篇

診
不膿急後重便
水為泄瀉
裏急後重便
膿血為滯下
寒則驚瀉
熱則腸垢
寒則瀉泄
熱則出黃

下利身抵者脉
弱者自金
汗出亡自金

一利脉
虚小沉清者顺
实大浮者死

仲下利脉微弱数者为欲自止，虽发抵不死。

下利有微热而渴，脉弱者，今自金。

下利脉数而渴者，今自金，更不差，火清，脓血以有抵故也。

下利脉反弦，发抵身汗者，自金。

下利脉数有微热，汗出，今自金，设脉坚为未解。

下利脉沉而迟，其人面少赤，身有微热，下利清穀者，必

鬱，**目**汗出而解，病人头微厥，所以然者，其戴阳也。
下虚故也

素胃脉虚，则泄，脉精要微论。

脉滑按之虚，绝其人又下利。

肺脉小甚，为泄。
全文见治虚实证法
文小者气血皆少

肾脉小甚，为闭泄。
小者血气皆少，肾主闭藏，合
血气虚少，无以闭藏故也。

素尺寒脉细谓之後泄 平大气象论

尺膚寒其脉小者泄少气 全文見診

仲下利脉沉弦者下重

下利寸口反浮数尺中自濡者必膿血 不

唯病若腹大而泄者脉常微細而濡反緊大而滑者死

脉泄注脉緩時小結者生浮大數者死

素泄而脉大者难治 玉棧真載論

痛泄脉洪大是逆也 全文見論生死

仲下利脉大者為未止

下利日十餘脉反實者死

靈大便赤辨飧泄脉小者手足寒唯已飧泄脉小手足温

下利手足
濕者生
厥者死

下利死候
下利燥者死
下利脈按者死

泄易已 論疾論人篇

下腹鳴而滿 四支清泄其脈大是逆也 云、如是者不過

十五日死矣 全文見論症死

腹大脹 四末清脫形泄甚 是逆也 云、如是者不及一

時死矣

仲夫六腑氣絕於外者 手足寒 上氣 跗縮 五藏氣絕於內

者利不禁 下甚者 手足不仁

下利手足厥冷 無脈者 矣之不溫 若脈不還 反微喘者

死 少陰負 跌陽者 為順也

下利後脈絕 手足厥冷 晬時脈還 手足溫者 生 脈不還

者死

利血胸屋漏
純血死

肛如竹筒直死

五虛死

泄瀉不止又
吐痰不已死

病者痿黃燥而不渴胸中寒實而利不止者死

假令下利寸口關上尺中悉不見脈然尺中時一小兒脈

再牽頭者腎氣也若見損脈來為難治

丹下利如魚腦者半死半生 下利如麀腐色者死

下純血者死 下如屋漏者死

下直如竹筒者不可治



五虛泄者經云脈細皮寒氣少泄利前後飲食不入

此謂五虛五虛死其漿粥入胃泄注止則虛者活予

嘗治數人在下則泄瀉不止在上則吐痰不已者皆

死蓋氣脫無所膏攝故也昔用多朮膏救之早者十

泄瀉

產後泄瀉遺尿

瀉泄

下利水穀不化重急後重是也

平胃散一名對金飲子治脾濕太過泄瀉

平胃散

五苓散各等分

右利水並服極效

羅內經曰濕勝則泄泄甲乙經云寒氣客於上焦傳為濡

泄夫脾五藏之至陰其性惡寒濕之氣內客於脾故不

能裨助胃氣腐熟水穀致清濁不分水入腸間虛莫能

制故洞泄如水隨水氣而下為之濡泄法當陰濕利小

便也治之以對金飲子

平胃散 五苓散

五苓散 草豆蔻

草豆蔻

藜蘆煨熟

右件相和作四服水一盞半生姜三片枣二枚煎至一

盞去查温服食前上都史丞相七月间三服愈

垣加減平胃散治脾胃不和不思飲食心腹脇肋脹滿刺

痛口苦無味胸滿短氣嘔穢惡心噫气吞酸面色痿黃

肌体瘦弱急墮嗜卧体重節痛常多自利或發霍亂及

五噫八噎噦气反胃

厚朴

去皮姜制炒
香三月二日

蒼朮

去粗皮
汆浸五日

陳皮

二日
二日

甘草

制炒
二日

右為細末每服二升水一盞入生姜二片枣二枚同煎至

七分去查温服或去姜枣帶煎空心食前入鹽一捻

沸湯正服亦得常服調气暖胃化宿食消疾飲辟風寒

冷濕四時非節之氣

如小便赤澀加白茯苓澤瀉

如米穀不化食飲多傷加枳實

如胸中氣不化快心下痞氣加枳殼木香

如脾胃困弱不思飲食加人多黃芪

如心痞白腹脹者甘少減半夏加黃苓炒

如遇雨水濕潤時加茯苓澤瀉過有痰加半夏陳皮

凡加時除蒼朮厚朴依例加之

如一服五女有痰加半夏一女

如軟飲食減少脈弦細加骨歸黃芪用身

如脈洪大緩加黃苓黃連

如大便硬加大黃三升芒硝二升先嚼麩炒桃仁爛以藥送之

又海藏加減例

若瀉脾濕加茯苓丁香白朮為調胃散一法加藿香半夏若加干姜為厚朴湯

若瘟疫時氣二毒傷寒頭痛壯熱加連鬚白五寸豆豉三十粒豈三二服微汗出愈

若五勞七傷脚手心熱煩躁不安百節酸疼加柴胡

若痰嗽瘡疾加姜制半夏

若本藏氣痛加茴香

若水氣腫滿加茱白皮

若婦人赤白帶下加黃芪

若酒傷加丁香

若飲冷傷食加高良姜

若滑脫泄瀉加肉豆蔻

若風痰疾四肢沉困加荆芥

若腿膝冷痛加牛膝

若渾身虛擁拘急加地骨皮

若腿膝濕痺加兔絲子

若白痢加茱萸

若赤利加黃連

若頭風加藁本

浙木通附子白朮一志以藁本半夏

圖書

若轉筋霍亂加楠木皮

若七邪六極耳鳴夢泄盜汗四支沉重腿膝酸疼婦人
宮藏久冷月脉不調者加桂

若胃寒嘔吐多加生姜

一法加茯苓丁香各三兩共成六味

若氣不舒快中脘痞塞加砂仁香附子各三兩生姜煎
若與五苓散相半為對金飲子

若與六乙散相合為黃白散

若與錢氏異攻散相合為調胃散

若欲進食加神曲麥月吳茱萸蜀椒干姜桂為吳茱萸湯
若加藁本桔梗為和解散治傷寒吐利

若加藿香半夏為不換金正氣散

若瘧疾寒熱者加柴胡

若小腸氣痛者加苔練苗香

丹或曰平胃散之溫和可以補養胃氣吾子以為何如予

曰蒼朮性燥氣壯行濕解表甚為有功厚朴性溫散氣

非脹滿實急者不用承氣用之可見矣雖甘草之緩亦

是決烈耗散之劑實每純和可以補土經謂土氣太過

曰敦阜亦能為病况胃為水穀之海無所不受曰病之

多濕故用此以瀉其本經有餘之氣使之平耳又須察

其挾寒氣得寒物者而後投之胃氣和平便須却藥謂

之平者初非補之、謂其可以為補劑而常用之乎

之平者初非補之、謂其可以為補劑而常用之乎

或曰調胃承氣亦治胃病謂之調者似與平胃之平意
義相近何用藥之相遠也予曰調胃之治熱中下二焦
藥也經曰熱淫于內治以酸寒佐以苦甘功在平導利
而行之以緩平胃散之治濕上焦藥也經曰濕上甚而
熱治以苦溫佐以甘辛以行為故而止或曰治濕不利
小便非其治也此非仲景法耶何子言之悖也予曰淡
滲以治濕因其濕在中下二焦今濕在上宜以微汗而
解不欲汗多故不用麻黃葛根輩

五苓散泄瀉水多者 方見傷寒

濕瀉四苓散加蒼朮白朮甚者二朮必用炒

白朮

三分加
至五半

茯苓 三分

猪苓 三分

澤瀉 一又一分

蒼朮 三分

本事沿水馮用羊草烏半生半燒灰存性為末酸丸空
心井花水下七丸

河間益元散治身熱泄瀉小便不利

桂府膩白滑石 六分
炙甘草 一分

右為末每服三匙少許溫湯調下無蜜亦得曰三服
如解 寒葭汗並葱白豆豉湯調下四匙併三服效
為度

丹參萸丸治濕熱帶氣者濕熱甚者用為白道上可治吞
酸不可治自利

太乙散 一料七丸
即益元散

吳茱萸 一分煮過

太乙散 一料七散 吳茱萸 丹麥過

一方吳茱萸加干姜一兩名温清丸 太乙散即益元散也

本草歐陽文忠公嘗得暴下國醫久不能愈夫人云市人

有此藥三文一帖甚效夫定買之以國醫藥雜進之一

服而愈後召賣藥者問其方但用車前子一味為末米

飲下二升云利水道

丹黃芩木通入四苓散並服治大多泄瀉

固腸丸方見虛滑条

水煮金花丸治泄不止干嘔方見干嘔而利

世本香和中丸腹滿泄瀉脉滑者神效累驗方見治虛寒法

仲下利脉遲而滑者實也利未欲止急下之宜大承氣湯

方見傷寒

乾嘔泄不止為
風痰
心腹堅滿脉
滑伏為實
脉滑者按之
堅者下之

脉伏者心下滿者去

下利脉反滑者當有所去下乃愈宜大承氣湯

脉下利脉中堅者當下之

下利三部脉皆平按之心下堅者急下之宜大承氣湯

病者脉伏其人欲自利反快雖利心下續堅滿此為

雷飲欲去故也甘遂半夏湯主之

甘遂

大者三枚

半夏

十二枚以水二升煮取半升去渣

芍藥五枚

甘草

如指大炙

右四味以水二升並取半升

去滓以蜜半升和藥汁

並取八合頓服之

丹仁七姪之子肚泄有積與小胃丹并粒作二次吞之

小胃丹方見內傷飲食

熱積

寒積

積熱作泄再宜下之

保治寒積痢男子小兒婦人皆不同赤白或清瀉利如水
不後重者寒也

經曰澄澈清冷皆屬於寒也此為虛寒中積也宜附子

巴豆輩下之見利則愈空心脹

仲下利氣者當和其小便

圖

潔治太陰脾經受濕水泄注下體重微滿困弱無力不欲

飲食暴泄無數水穀不化先宜白朮芍藥湯以和之身

重暴下是大勢來亦和之白朮芍藥湯

白朮

芍藥 各一斤

甘草

五斤已上三味俱用火炒黃切

右細末每一兩水二盞煎至一半盞溫服

利氣者利小便
食少困倦脈
弱弦為虛
潔古補脾和
胃

如腹痛甚者宜蒼朮芍藥湯主之

蒼朮 二升

芍藥 一升

黃芩 半升

右剉每一兩入淡桂半升水一盞煎至半盞溫服

如脉弦頭痛者宜蒼朮防風湯主之

蒼朮

防風 各二升

右剉同前法並服

如下血宜蒼朮地榆湯主之 方見滯下

已上証如心下痞每加枳實一升如小便不利每服加茯苓

苓二升

如腹痛漸已泄下漸少宜訶子散止之 方見後

丹氣虛泄瀉人參白朮炒芍藥升麻主之

丹溪補脾行
濕

垣異攻散治脾胃虛冷腹鳴腹痛自利可思飲食 方見小兒

吐瀉人參白朮茯苓甘草陳皮等分為末每五錢姜枣煎

丹婦人肚泄左手脉弱此自來欠血面帶黃多半當作虛

而濕治之

滑石 六分
白朮 半分
陳皮
當歸 三分
厚朴

木通
川芎 二分
炙甘草 半分

分六帖姜一片

四八官寒瀉泄小便赤少食少倦怠脉弱此受濕為病

當補脾涼肺

白朮
活石 二分
黃芩
人參
川芎 半分

木通
陳皮 三分
干姜 一分
甘草

分八帖

王兒腹泄此受寒涼者病

白朮 蒼朮 各二分

干姜

茯苓

厚朴 各一分

甘草 三分

並和查服須作末每服一分半細末

丈夫腹瀉胸痞不渴

半夏 三分

蒼朮

白朮

青皮 二分

木通

紫蘇 一分

良姜 半分 甘草

分三帖 姜三片 水三盞

輝五孺人瘰癧已好止是食少乏力肚泄自汗

牡蠣 一分半

白朮 二分

干姜 半分

陳皮 半分

牡蛎一分半 白朮二分 干姜一分 陳皮一分

著二分 當歸一分

賈宅婦人六十八歲腹泄面黃乏力脉浮大而數此有熱積

活石 炒白朮各二分 茯苓 炒神曲

陳皮各五分 黃連 黃芩各三分 干生薑一分

粥為丸山查湯食前下五十粒

丈夫病熱退未及食太平日渴倦甚吐泄心煩脚冷

人參 滑石三分 柴胡 白朮

陳皮二分 木通一分半 甘草一分

分四帖前七分下保和丸十五丸

右丸方丹溪東垣治泄瀉之法大率皆用白朮滑石

補脾行濕其餘隨証加減也第一二方專治泄之挾

泄也第三方治

脈弦者升陔
除濕

熱也第四五六方治泄之挾寒也第七八方治泄之
飲食積也

垣子病脾胃久衰視聽半失此陰盛乘陽加之氣短精神
不足此由脈弦今虛多言之過也皆陽氣衰弱不得舒
伸伏匿於陰中耳癸卯歲六七月間淫雨陰寒踰月不
止時人多病洩利濕多成五洩故也一日予体重支節
疼痛大便洩并下者三而小便閉塞思其治法按內經
標本論大小不利無問標本先利大小又云在下者引
而竭之亦是先利小便也又云諸洩利小便不利先分
利之又云治濕不利小便非其治也皆當利其小便必
用淡味滲洩之劑以利之是其法也噫聖人之法雖布

用淡味淺之劑以利之是其法也噫聖人之法雖布
在方冊其不盡者可以求責耳今客邪寒濕之淫從外
而入裏以暴加之若從已上法度用淡滲之劑以陰之
病雖即已是降之又降是重複益其陰而重竭其陽氣
矣是陽氣愈削而精神愈短矣是陰重強陽重衰矣及
助其邪之謂也故必升陽風藥即羌活獨活柴胡
升麻各一升防風根截半子甘草截半子同吹咀水四
鍾並至一盞去渣稍熱服大法云溫寒之勝助風以平
之又曰下者舉之得陽氣騰而去矣又法云客者除之
是目曲而為直也夫聖人之法可以類推舉而知百病
者也若不達升降浮沉之理而一槩施治其愈者幸也
升陽除濕湯治脾胃虛弱不食飲食減瀉無度小便黃四

支困弱自下而上引而去之

升麻

柴胡

羌活

防己

各半斤

蒼木一斤

炙甘草五分

神麩

澤瀉

猪苓

陳皮

各五分

大麥麩

三分

都作一服水三盞煎至一盞去查早晨空心服之如

胃寒腸鳴加益智仁半斤半夏半斤生姜枣同煎非

腸鳴不用

人參升胃湯治一日大便三四次澹而不多而有時洩

瀉腹鳴小便黃

黃芪三斤

炙甘草二分

升麻六分

柴胡

橘皮

當歸身

益智仁各三分

紅花少許

人參六分

當歸身 益智仁各三分 紅花少許 人參六分

右判如麻豆大作二服水二大盞煎至一盞去渣稍

熱服食前

丹止瀉姜曲丸

臨泄必痛者
實積
病淺者消導

陳曲 六分陳
麥亦好

茴香 半斤

生姜 二斤

右為丸每服五七十九

痰積洩瀉

海石

青黛

黃芩

神曲

右為丸每服三五十九病久者必用吐法吐之方愈

積滯洩瀉腹必耕痛方泄者是也或腹脹滿按之

堅者亦是也受病淺者宜神曲之類消導病深而

頑者必用滯下門後重多熱條進退承氣之類下

病深者吐下

無痛且久
者虛滑
熱滑者寒
止之

下之方也

丹固腸丸

擣皮四升 滑石三升

右為末粥丸丹溪云固腸丸桂燥若滲氣未盡者不可處用

保訶子散治洩久腹痛漸已瀉下漸少宜此藥止之

呵子 一升半 生羊熟 木香 半升 甘草 三升 黃連 三升

右細末每二升以白朮芍藥湯調下如止之不已宜

歸而送之也呵子散加厚朴一兩竭其邪氣也

虛滑久而不止者多待變為痢疾太陰傳待少冰是為

鬼邪先以厚朴枳實湯防其傳變

厚朴 枳實 各一升 呵子 一升半 生 熟各半 木香 半升

寒滑者執止之

黃連二分 甘草炙三分 大黃三分

右為細末每服三分或五分水一盞半煎至一盞去渣

溫服 已上皆治熱滑

丹補脾丸

白朮半斤 白芍藥二分

右為細末飯丸冬月去芍藥加薑蔥肚瀉炒丸服之

又不止者於內加飛凡二分半

仲氣痢訶黎勒散主之

訶黎勒十枚煨

右一味為散粥飲和頓服 林隱云疑非仲京方

垣扶脾丸治脾胃虛寒腹中痛洩瀉無度飲食遲化

白朮

茯苓

炙甘草

呵子皮

烏梅 各二分

紅豆

乾姜

藿香 各一分

桂 半分

麥蘖 炒

神曲 炒各四分

橘皮 二分

半夏 二分

右為細末荷葉燒飯為丸如桐子大每服五十丸溫水

下食前

保治痢久歲府不止虛滑積不化用蒼朮湯下桃花丸

蒼朮 二分

防風 二分

右剉水一椀益至一大盞取清水下桃花丸或赤石

脂丸小便利則安桃花丸即滯下門桃花湯為丸

赤石脂干姜二味是也

衍義有人病大腸寒滑小便精出諸熱藥服及一斗二升

未甚效後教服赤石脂干姜各一两胡枳半兩同為末
醋糊為丸如梧子大空心及飯前米飲下五七十九終

四劑遂愈

本治脾胃不和泄瀉不止諸藥不效訶子丸

訶子皮

川姜

肉荳蔻

龍骨

木香

赤石脂



附子各等分

右細末糊丸如梧子大每服四十丸米飲下

赤石脂禹餘糧湯方此治大腸洩方

赤石脂

禹餘糧各四兩

右剉碎每服五升水一盞半煮至八分去渣每溫服

孫尚治氣虛傷冷暴作水瀉日夜三二十行腹痛不止夏

寒批
暴泄驚瀉
為寒

月路行備急朝真

丹真硫黃二兩半角研令極細枯白礬半兩同細研勻水

浸蒸餅去水脉了和如梧子大朱砂為衣每服十五丸

至二十九温米飲鹽湯下已上止寒泄

丹治暴水洩不止

肉豆蔻

三个用湿麩裹定慢火内煨令麩焦去麩丹溪云肉豆蔻屬金屬土温中補脾為有力日華子稱其下氣以補而善運化氣自若香附陳皮之腹泄

右將肉豆蔻為細末只作一服陳米飲調下食前服之

神驗

潔古治暴洩如水周身汗出一身尽冷脉沉而弱氣少而

不能語甚者加吐此謂緊病宜以捋水水散

不能語甚者加吐此謂緊病宜以捋水水散

半夏 二升
良姜 三升半
乾姜
桂 各半升
甘草 炙半升

右細末每服三五升水二盞並至一盞同查執服甚者三四服若太陽經動下利為鶩溏大腸不能禁固卒然而成中或有硬物欲起而又下欲了而不了小便多清此寒也宜溫之春夏桂枝湯秋冬白朮湯

羅謙甫云鶩溏者大便如水其其中有少結糞是也

桂枝湯

桂枝
芍藥
白朮 各半升
甘草 炙二升

右切每服半兩水一盞並至七分去查溫服其清

白朮散

白朮
芍藥 各三升
干姜 炮半升
甘草 炙二升

右粗末前如服之甚則除去干姜加附子三分謂辛

能發散也

羅翹木丸治時暑暴瀉吐脾溫胃進食美味及飲食所傷

胸膈痞悶

神曲

蒼朮

泔浸一宿各等分

右為細末麩糊為丸如梧子大每服三十九丸溫米飲

湯送下

丹止洩丸

肉豆蔻 五斤

活石制

右為末搗丸惟活石夏二兩半秋二兩春冬一兩三分

羅中寒治驗。恭政商公時年六旬有二原有胃虛之証

身冷便清不渴脈沉遲為寒

至元己巳夏上都住時值六月霖雨大作連日不止目
公勞後過度飲食失節每日則臍腹疼痛腸鳴自利頃
去一二行少定不喜飲食懶於言語身體困倦召予治
之予診其脈沉緩而弦恭政年高氣弱脾胃宿有虛寒
之証加之霖雨及勞役飲食失節重虛中氣難經云飲
食勞倦則傷脾不足而注有餘隨之歲火不及寒乃大
行民病驚瘡今脾胃正氣不足腎水必挾木勢反乘侮
土乃薄所不勝乘所勝也此疾非甘辛大熱之劑則不
能瀉水補土雖夏暑之時有用熱遠熱之戒又云有假
者反之是從權而治急也內經云寒淫于內治以辛熱
干姜附子辛甘大熱以瀉寒水用以為君脾不足者以

甘補之人參白朮甘草陳皮若甘溫以補脾土胃寒則
不欲食以生姜草豆蔻辛溫治客寒犯胃厚朴辛溫厚
腸胃白茯苓甘平助姜附以導寒濕白芍藥酸微寒
補金瀉木以防熱傷肺氣為佐也不數服良愈
附子溫中湯治中寒腹痛自利米穀不化脾胃虛弱不喜
飲食懶言語困倦嗜臥

黑附子

炮去皮劑

干姜

炮各七分

人參

甘草

灸

白芍藥

白茯苓

去皮

於朮

各五分

草豆蔻

麩裏煨去皮

厚朴姜制

陳皮

各三分

右剉每服五升或一兩水二中半姜五片薑一中溫服食前
易簡理中湯治洩瀉加橘紅茯苓各一兩名補中湯若瘧

易簡理中湯治洩瀉加橘紅茯苓各一兩名補中湯若瀉

洩不已者於補中湯內附子一兩不喜飲水穀不化者
宜加縮砂仁一兩共成八味理中湯方見傷寒

本事治脾胃中風濕藏府洩滑鞠藭丸

芎藭

神曲

白朮

附子

等分

右為細末丸如梧子大每服三五丸米飲米下左氏

述楚子園蕭、將漬無吐告申并展曰有麥曲乎有山

鞠乎鞠藭芎藭也意欲令此水中以避調是知芎藭能

除濕予嘗加朮附以制方若脾濕而洩者萬無不中六

治飧泄

無擇桂香丸治藏府虛為風濕所傳冷滑注下不禁老人

虛人危芎藭累效

身熱便赤口
渴脈洪濁為
挑

上下表
理中不止者理
下焦

附子炮去皮脐

肉豆蔻炮

白茯苓各一牙

桂心

白姜炮

木香炮各半牙

丁香一分

右為末糊丸加五倍子大米湯下五十九丸空心服

孫真人治水瀉無度干姜末粥飲調一服立效

泄而身熱小便不利口渴者益元五苓也火多者四

苓加木通黃芩也方見濕熱條泄而困倦小便赤黃

脈數者虛熱宜參朮活石苓連也方見補脾行濕條

泄而脈滑堅者實熱宜火水氣湯方見實條

丹玉龍丸治一切伏暑洩瀉神效方見傷寒部署門

仲下利不止豎以理中與之利益甚理中者理中焦此利

在下焦赤石脂禹餘糧湯主之復利大止者當利小便

在下焦赤石脂禹餘糧湯主之復利大止者當利小便

下利身疼者
先溫後改

大小腸三焦

運氣

土助脾濕
感泄

木攻脾濕虛
改

下利腹脹滿身體疼痛者先溫其裏乃攻其表溫裏宜

四逆湯攻表宜桂枝湯

大腸小腸為洩全文見診

一陽散病少氣善欬善洩全文見診病傳變

運氣泄瀉有六

一曰土助脾濕感而洩瀉經云歲土太過雨濕流行病

澹泄腸鳴又云歲水不及濕乃不行民病身重濡泄又

云歲火不及寒乃大行土復則病驚澹腹痛腸鳴泄注

又云土鬱之散民病飲散注下又云濕勝則濡瀉治以

苦溫是也

二曰風木攻脾虛而泄瀉經云厥陰司天風淫所勝民

熱泄

寒泄

熱中寒中泄

燥泄

病冷泄澹泄又云春傷於風邪氣留連乃為洞洩治以

辛涼是也

三曰熱泄經云少陽所至為暴注又云少陽之勝腹滿

澹泄又云火鬱之叢民病注下治以寒劑是也

四曰寒泄經曰歲水太過寒氣流行病腸鳴澹泄又

云太陰所出為流洩禁止又云太陰之勝寒下焦

傳為濡治以熱劑是也

五曰熱中寒中泄經云太陰司天之政三之氣寒氣行

民病寒反熱中注下者是外寒內熱泄也又云長夏善

病洞洩寒中者是外熱內寒泄也治以寒熱煎施是也

六曰燥泄經云歲木不及燥乃大行民病腸鳴澹泄又

六日燥泄經云歲木不及燥乃大行民病腸鳴澹泄又

云陽明司天燥淫所勝民病腹中鳴注泄驚澹又云陽明之復腹脹而洩治以温劑是也

雜方

針灸上

當臍痛泄取

巨虛上廉

針灸下

子和昔聞山東楊先者治府主洞洩不止楊初未對病人與衆人談日月星辰纏度及風雷雲雨之變自辰至未而病者聽之忘其圍楊嘗曰治洞洩不已之人先問其所悲之事好碁者與之碁好樂者與之笙笛勿輒

針灸洩瀉獨取大腸一經、云大腸病者腸中切痛

而鳴濯、冬日重感于寒即泄當臍而痛取巨虛上廉

羅治水漬入胃為溢飲滑泄渴能飲水、下復泄、而大

渴此無藥証當灸大椎

脉諸下利皆可灸足大都五壯商丘陵陰泉皆三壯

甲澹泄不化食寒熱不節陰陵泉主之

玉龍治久洩瀉內天樞必撮要摘英同

天樞

二寸半灸摘英分書
十呼灸百壯

脾俞

集成自利不止

天樞

中極

世又法

合谷三里陰陵泉

不應取
下穴

中脘闕元天樞神闕

東陽洩痢不禁小腹絞痛

丹田灸百壯三振之

洩痢不嗜食

五十壯三振之在掖臍旁利去五寸一名涌元六

宜忌

長谷

五十壯三根之在挾臍旁利去五寸一名循元六

衍義石硫黃今人用治下元虛冷元氣將絕久患寒洩脾胃虛弱垂命欲盡服之無不效中病當便已不可盡劑世人蓋知用而為福不知用而為禍此物損益兼行若俱矣而不用當倉卒之間又可闕乎

產後洩瀉

圖

景

雜方

丹治產後洩瀉惡露不行此余血滲入大腸為瀉洩洩不禁下青白黑色

張氏的奇散荆芥大者四五穗於盞燒灰不得犯油火入射香研湯一二呷調下此藥名微能治大病

產後洩方

茯苓

川芎

黃芩

白朮

干姜

活石

陳皮

芍藥炒

右水煎服之

飧洩

書

飧洩米穀不化而完出是也

素清氣在下則生飧洩

脾賦應象論云王注云挽氣在下則穀不化故飧洩東垣云清氣在

脾者乃人之脾胃氣衰不能升發脾氣故用升麻柴胡助辛甘之味以引元氣之升不令飧洩也

上下宜忌
脾虛清以下
陷為飧泄

羅內經云清氣在下則生飧泄又曰久風入中為清氣下

降而不升則風邪久而干胃是木賊土也故衝和之氣

不能化而令物完出謂之飧洩或飲食太過腸胃所傷

亦致米穀不化此俗為水穀利也法當下者舉之而消

剋之也以加減木香散主之

木香

良姜

升麻

檳榔

人參

各七分

肉豆蔻

煨

吳茱萸

炮

陳皮

干姜

炮
縮砂仁各半升

神曲

炒二分

右十一味為細末每服四升水盞半煎至一盞去渣

食前溫服

圖

河間白朮湯治飧洩風冷入中洩利不止脈虛而細日夜數行口干腹痛不已

白朮

厚朴

生薑制

當歸

去苗

龍骨

各一分

艾葉

半升炒

右末每服三升水一中生薑三片同煎至八分去渣

空心溫服

治飧泄宜奪食

垣凡洩利米穀不化謂之飧洩是清氣在下乃胃氣不升
上古聖人皆以升浮扶持胃氣一服而愈知病在中焦
脾胃也脉訣曰濕多成五洩濕者胃之別名也病本在
胃真氣弱真氣者穀氣也不能剋化飲食乃濕盛故也
以此論之止以脾胃弱之謂也初病奪食或絕不食
一二日胃氣日勝泄不作也今已成大泄矣經云治濕
不利小便非其治也又云下焦如瀆人云在下者引而
竭之唯此証不宜此論其病得之於胃氣下流清氣不
升中道不行宜升宜舉不宜利小便外經云頭有疾取
之足謂中道病在脾也是有疾取之上謂陰病在脾也經
云脾病在陰、病在脾此之謂也中有病旁取之傍者

云此病在陰、病在脾此之謂也中有病旁取之傍者

次用升柴升陽
妙曲化食

甲膽是也中者脾胃也脾胃有疾取之足少陽甲膽者
者中風是也東方春也胃中穀氣者便是風化也一
体作而認故曰胃中濕勝而成洩瀉助甲膽風勝以剋
之又是升陝助清氣上行為法也又一說中焦元氣不
足波便為之變腸為之苦鳴亦緣春氣不升故法甲風
上升又云風濕也大抵此証胃氣弱不能化食奪食則
一日而可止奪食之理為胃弱不能克化食下則為泄
如食不下何以作泄當先以藥滋養元氣令和候泄止
漸與食胃勝則安矣若食不化者升陽風藥內加炒麩
同煎薑食入頃至心頁者胃之上口也必口沃沫或食
入及出皆胃土停寒其右手闔脈中弦按之洪緩是風

反胃加半夏

肌肉消尽勿治

寒執一

熱濕相合穀氣不行清氣不升為弦脈之寒所隔不
下也麩之執亦能去之若反胃者更加半夏生薑入於
風藥內同煎奪食少食欲使胃氣強盛也若藥劑大胃
不勝藥洩亦不止當漸、與之今病既久已至衰弱當
以常法治之不可多服餌也人之肉如地上之豈可人
而無肉故肉消尽則死矣消瘦人有必死者八經內經
中有七外經中有一若病肌肉去尽勿治之天命已矣
如肌肉不至瘦尽當急療之當先奪食而益胃氣使與
升陽先助真氣次用風藥勝濕以助升騰之象可已矣
餘皆勿論此治之上法 治法并陟除濕湯之類是也

羅加減木香散 方見上條

汗出肢厥脉
細為寒

身热口渴
脉弦為執

風水

仲下利清穀裏寒外热汗出而厥者通脉四逆湯主之方見傷寒

河間白朮散治飧洩脉虛細方見上下条

垣治洩利飧洩身热脉弦腹痛而渴及頭痛微汗宜防風

芍藥湯

防風 芍藥 黃芩

右粗末每半兩或一兩水二盞煮至一半温服清

梅師治水穀痢久不差厚朴三兩黃連三兩劉細水三升

並取一升空心服

素春傷於風夏生飧洩生氣通天論

久風為飧洩全文見診法

久風入中為臍風飧洩風論

渴飲過者水
從內出宜灸
宜溼
不渴飲者風
從外入宜下
宜表

有久風入中為飧泄經云虛邪之中人也始於皮膚
番而不去傳舍於絡脉名而不去傳舍於經番而不
去傳舍於輸番而不去傳舍於伏衝之脉番而不去
傳舍於腸胃在腸胃之時責嚮腹脹多寒則腸鳴飧泄
食不化此久風入中為飧泄之義同也

潔古云大渴飲水多目致水穀一時下者宜灸大推三五
壯或用車前子雷凡白朮茯苓及五苓散等藥溼之詳
見大法条也如久風為飧泄者則不飲水而穀完出治
法當以宣風散導之後服蒼朮防風湯

宣風散方見小兒痘發熱服之大便利服後藥

蒼朮防風湯

蒼朮 去皮

麻黃

防風

右粗末每一兩生姜七片水二盞煎至一半去渣溫

服如止後服後藥

枳朮丸

蒼朮 二升

小枳朮 一升去目炒

右為極細末醋糊丸梧子大每服五十丸食前溫服

水下一法惡痢不効者弥佳如小兒丸如米大

子和趙明之米穀不消腹作雷鳴自五月至六月不食諸

醫以為脾受大寒故併與聖散子荳蔻丸雖止一二日

藥力尽而復作諸醫不知藥之非反責明之不思口裁

人至而嘆曰春傷於風夏必飧洩者飧洩者米穀不化

而直過下出也。又曰米穀不化，熱氣在下，風入中，
者脾胃也。風屬甲乙，脾屬胃，戊己甲乙能剋戊己，腸中
有風故鳴。經曰：歲木太過，風氣流行，脾土受邪，民病飧
洩。診其兩手脈皆浮，穀為病在表也。可汗之，直斷曰風。
隨汗出以火二盃，暗置床下，不令病人見火，恐增其
熱。結之入室，使脈滿，刮以麻黃投之，乃閉其戶，從外鎖
之，汗出如洗，待一時許，開戶滅火，一半須臾汗止，洩亦止。
內經曰：春傷於風，夏生飧洩。此以風為根，風非汗不出。昔
有病此者，腹中雷鳴，洩注米穀不分，小便瀦滯，皆曰脾
胃虛寒。故耳豆菴烏梅、鬻粟殼、干姜、附子，曾無一効。中
脘臍下灸已數壯，燥熱轉甚，小溲涸瘦，削無力飲食。

脫胛下炎已數壯燥熱轉甚小渡涸竭瘦削無力飲食

減少命予視之余以應象論曰熱氣在下水穀不分化

生飡洩寒氣在上則生膜脹而氣不散何也臥靜而臥

動故也診其脈兩手皆浮大而長身表微熱而桂枝麻

黃湯以姜枣並大劑連進三服汗出終日至旦而愈次

以胃風湯和平藏府調養臥臥食進而愈

河間木香丸治傷痺多飲不渡時發飡洩腹痛

木香 白朮 官桂 薑黃

良姜 呵子皮各一兩 甜子炮去皮劑 厚朴生薑制各二兩

干姜七兩半 肉豆蔻各二兩 浙甘草半兩

為末曲麵糊為丸梧子大每服二十九丸姜湯空心下

運氣飡洩皆屬風木攻脾經云歲木太過風氣流行脾土

風寒濕成腸痺
多飲不渡為腸痺

運氣

風木攻脾治
宜涼劑

針灸上

受邪民病飧洩食減又云歲土不及風乃大行民病
飧洩體重腹痛又云土不及曰卑監卑監之紀上角
與正角同其病飧洩治以涼劑是也

刺灸飧洩有三法

其一取脾經云腹虛則腹滿腸鳴飧洩食不化取其經
足太陰陽明又云飧泄補三陰之上補陰陵泉皆久
留之執行乃止又云飧泄取三陰者是也三陰者即
太陰也

其二取腎經云腎藏志、有餘則腹脹飧洩焉然筋血
者是也玉註然筋謂然骨視血絡盛則洩之

其三取肝經云肝足厥陰之脈所生病者胸滿嘔逆飧

其三取肝經云肝足厥陰之脈所生病者胸滿嘔逆

針灸下

洩是也視盛虛寒熱陷下施法也

渴飲水多水穀一時下者灸大椎三五壯立已

詳見大法

甲飡洩巨虛上廉主之

飡洩太衝主之

遺尿

雜方

大全治產後遺尿

取故燕窠中草燒為末酒調下半錢亦治男子

又方

礬石

枯

牡蠣

熬

浙

右等分為末酒服方寸七日三亦治男子

華陀病人卧遺尿不覺者死

診

大法

發熱惡寒
身痛宜解
表

久熱者陰虛
初熱有裏者
亦宜下惡寒
者忌下

滯下 久洩久痢 胎前痢 產後痢

俗謂之利疾是也

丹痢初得時一二日間以痢為法有熱先退熱 後重者

當利氣木香檳榔 腹痛用溫藥姜桂之屬 下血

當涼血和血當歸桃仁之屬

下痢發熱惡寒身首俱痛此為表証宜微汗和解用

蒼朮 川芎 陳皮 芍藥 甘草

同姜蔥

下痢身發熱者有外感小柴胡去參

下痢發熱久不止者屬陰虛用寒涼藥必煎升藥并執

藥用

下痢初發熱必用大承氣下後看証用藥

發熱不惡寒脈洪者宜大承氣若惡寒者忌下

下痢有熱者先退熱

下痢腹痛後重小水短下積此為裏証宜和中疏氣用

後重腹痛
尿少宜和
裏

陳皮

芍藥

滑石

甘草

枳殼炒

厚朴制

圖

潔古芍藥湯治下血調氣澁而便膿血知氣行而血止行
血則便自安調氣則後重除

芍藥 一升

當歸 半升

黃連 半升

檳榔 二升

木香 二升

甘草 炒 二升

大黃 二升

黃芩 半升

桂 二升半

小便不利者利之

重痛能食
脉滑初病
為實

右粗末每服半兩水二中並至一半食後溫服清如血痢

則漸加大黃如汗後歲毒加黃柏半兩同煎服

丹一老人年七十面白脉弦數独胃脉沉滑日飲白酒作

作利下淡血水膿腹痛小便不利裏急後重以參朮為

君甘草滑石栝榔木香蒼朮最少下

保和丸廿五丸第二日前証俱減独小便不利只以益元

散之服下

河間益元散治身發熱下利赤白小便不利蕩胃中積聚

方見泄瀉

丹痢初得之必用調胃承氣及大小承氣實者用此下之

下萎男子年五十餘肚痢昼有積淡紅色夜有積食自進

脚...
為...
下...

下委男子年五十餘肚荊昼有積淡紅色夜有積食自進

先吃小胃丹兩服先四十九次六十九去積却與斷下

羅玄青丸治下利勢惡頻併窘痛或久不愈諸藥不能止

須吐之下以開除濕熱痞痛積滯而使氣液宣行者宜

以逐之兼宣利積熱酒食積黃瘦中滿水氣腫腹脹蕪

瘵小兒驚疳積熱乳癖諸証

黃連

黃柏

大黃

甘遂

芫花

醋拌炒

大戟

各半斤

牽牛

四斤取液末二斤

輕粉

青黛

右為末研勻水丸小豆大初服十丸每服加十丸空

心日午臨臥三服以快利為度後常服十五丸數日

後得食久病未痊除者再加取利、後却常服以意

消息病去為度後隨証止之小兒丸如黍米大退驚

疳積熱不瀉下者常須十丸

玄珠利疾丸

宣連 四丸

天水末 八丸

當歸 二丸

乳香

羅白子 四丸

巴豆

一丸 一匙 用黃連一匙 炒

右為末醋糊丸梧子大弱者十五丸實者二十五丸

治下利赤白腹滿脹痛裏急上渴引飲下水赤瀉此

積滯下宜利其熱中用清腸丸導氣丸推其積滯而

痢自無矣凡治積聚之証輕則溫而利之清腸丸是

也重者天真散舟車丸下之下之後切勿補之

丹其或力倦自覺氣少惡食此為挾虛証宜加白朮當歸

身尾甚者加人參若又十分重者止用此藥加陳皮

力倦惡食
甘虛之病
為虛

補之虛而利自止

予從林年近六十夏門患滯下病腹微痛所下褐色後重
頗併飲食大減時有微熱察其脉皆弦而濇似數稍
長却喜不甚浮大两手相等視其神氣大減予曰此
非滯下憂慮所致心血虧脾氣弱也與參朮為君歸
身陳皮為臣川芎炒白芍藥伏苓為佐使時熱甚加
黃連為使與兩月而安

隱

金氏婦年近四十秋初尚熱患滯下腹但隱痛夜重於晝
全不睡食亦稍減口乾不飲已得治痢靈砂兩貼矣
予視之两手脉皆濇且不勻神思倦甚飲食全減與
四物湯倍加白朮以陳皮佐之與十數貼而安

脈虛者積
者先補後
攻

義一姪治瘡間日作黃痢脈虛甚身痛宜活血補胃待虛

稍回却換精

全人參三分

白朮一分半

蒼朮一分

陳皮一分

白芍

炒半份

芎藭半份

書滑石

炒份

炙甘草

研苑仁七個

藥後病退惟脈少弦身倦急方此調補

人參九份

蒼朮三分

半夏九份

芎二份

陳皮三分

木通

二分半

甘草

煎取三之一飲之可粥淡帶少飢靜坐養之

葉先生患滯下後甚逼迫正合承氣証氣口虛形雖實

而面黃稍白此必平昔食過飽而胃受傷寧忍二三

而面黃稍白此必平昔食過飽而胃受傷寧忍二三

日辛苦遂與參朮陳皮芍藥等補藥十餘貼至三日

後胃氣稍完與承氣二帖而安為不先補完胃氣之

傷而遽行承氣吾恐病安之後寧免瘦憊乎

世治痢罔蠟丸黃蠟不拘多少用銀篋挑於真香油灯火

上燒薰溶下水碗內凡如此者七次為丸羅白子大

每二十丸白痢甘草湯下赤痢烏梅湯下本草云蜜

蠟主下利膿血補中又云白蠟主後重白膿

葛氏治重下此即赤白痢也熬鼓令小焦杵服一合日

三無比又熬鼓令焦水漸升淋取汁冷服冷則酒淋

日三服有效

食鑿治肺胃虛下痢日夜不止腸滑不下食野雉一隻

噤口痢屬
虛熱

如食法細研白橘皮枳殼鹽醬調和作餛飩熟煮空
心食下

丹噤口痢胃中熱甚大虛大熱

人參二分 姜炒黃連一分

終日細、呷之如吐再吃但一呷下咽便開封臍引

熱下行田螺肉搗碎盒臍中入射香些少

世痢疾不納飲食者俗謂之噤口以脈証辨之如脾胃勝

不弱問而知其頭疼心煩手足溫熱未嘗多脹涼

藥者此乃毒氣上冲心肺所以嘔而不食宜用敗毒

散每服四分重陳倉米一百粒姜三片棗一枚水一

盞半煎八分溫服其脈微弱或心腹虛膨手足厥冷

蓋半並八分温服其脉微弱或心腹虛膨手足厥冷

初病則不嘔目脈嬰粟殼烏梅苦參熇凉藥太過以致聞食先嘔此乃脾胃虛弱用山萸一味劉如小豆大一半銀丸鈹內炒熟一半生用同為末飯飲調下治噤口痢

石蓮槌碎去殼置心并肉碾為末每服二升陳米飲調下此疾蓋是毒氣上冲心肺借此以通心氣便覺思食

後重甚者
多屬熱

暴注下迫皆屬於熱 全文見診

局方香蓮丸治下痢赤白裏急後重

黃連 去芦二十升用茱萸十升 同炒令赤色去茱萸不用 木香 四升以水八分不見火

為細末醋糊丸梧子大每二十九空心飯飲下

錢芫菑香連丸治洩瀉不問寒熱赤白陰陽不調腹脹攻

痛可用如神

黃連 三升炒

肉豆蔻

南木香 各一分

為末，粟米飯丸，米粒大，每服米飲下十九丸，至二十

九日夜各四五服，食前

杜壬治氣痢瀉裏急後重神妙方宣連二兩乾姜半兩各

為末，每用連二分，姜半分，和勻，溫酒下

羅黃連阿膠丸治脾胃氣虛冷熱不調下痢赤白狀如魚

腦裏急後重臍腹疼痛口燥煩渴小便不利

黃連 三升去須

茯苓 三升去皮

阿膠 一升炒

右黃連茯苓同為末，水調阿膠和藥，衆手丸如桐子

右黃連在苓同為末水調阿膠和藥象手九如桐子

大每服二十丸温米飲湯下

仲熱痢下重者白頭翁湯主之方見傷寒

丹後重積與氣滯下之故煎升無消

保下痢膿血裏急後重日夜無度宜導氣湯

芍藥 二升 當歸 五升 大黃 二升半 黃芩 二升半

黃連 木香 檳榔 各一升

不能食者 進承氣 能食者退

承氣 兼寒者感

涼 兼寒者感

右為細末每服三升水一盞煎至七分去渣温服如未止再服不後重則止

潔太痲泄者裏急後重數至圜而不能便莖中痛用清涼

飲子主之其洩自止莖中痛者屬厥陰加甘草裏急

後重多者屬少陰加大黃令急推去物也則輕矣內

經曰回其重而減之又云在下者引而竭之清涼飲子方見

治發裏急後重數至圜而不得便皆宜進退大承氣

湯主之口進承氣法治太隄証不能食是也當先補

而後瀉之乃進藥法也先益厚朴半兩製水一盞益

至一半盞服若三二服未已胃有宿食不消又加枳

實二分同益二三服未止如加食尚有熱毒又加

大黃三分推過洩者謂腸胃久有塵垢滑粘加芒硝

半合垢去尽則安也後重蕪無虛証者宜之若力倦氣少脈虛不能食者不宜此法

蓋厚朴枳實大

退承氣法治明証能食是也當先瀉而後補謂退

藥法也先用大承氣湯五升水中依前益法至

藥法也先用大承氣湯五
水一中依此法至

至圍後重隨
減脈虛固滑

七分稍熱服如洩未止去芒硝稍熱減退大黃一半
並二服如熱氣雖已其人心腹滿又減去大黃但與
枳實厚朴湯又並二三服如腹脹滿退洩亦自安後
服厚朴數服則已

垣 威應丸治下利赤白後重 羅謙甫方見內傷飲食門

或曰治後重當疎通之 羅謙甫水煮木香膏東垣白

木安胃散等分治後重用 御米殼等固澁之劑亦愈

者何也曰後重本日邪壓大腸墜下故大腸不能收

上而重是以用大黃枳榔輩寫其所壓之邪今邪已

寫其重乃在者知大腸虛滑不能自收而重是以用

御米殼等瀉劑固其滑收其氣回亦愈也然大腸為

重而有紫黑
血者
宜活血

邪墜下之重其重至圍後不減大腸虛滑不收之重
其重至圍後隨減以此辨之百發百中也

木香膏安胃散等方 見大腸虛滑條

丹其或下墜異常積中有紫黑血而又痛甚此為死血証
法用細搗桃仁滑石行之或口渴及大便口燥辣是名
挾熱即加黃芩或口不渴身不熱喜熱手慰盪是名挾
寒即加干姜

八蟻將產患痢脉細弦而稍數後重裏急

滑石 研 二分 芍藥 二分 枳殼 炒 二分 木通 二分

甘草 半斤 芩 一分 白朮 二分

堯仁每用九枚研同煎

青田人肚痢紅紫血下墜逼迫不渴不熱

白朮

芍藥 一兩

陳皮

枳殼 炒

當歸身

活石 半兩

炙甘草 五分

桃仁 五個

分八帖下寒腸丸三十粒

丈夫目酒多下血肚疼後重成痢

活石 半兩

連翹

黃芩

木通

芍藥

枳殼

白朮 五分

甘草 半兩

桃仁 十個

分四帖

又方

秦芫

皂角子

煨大黃

當歸

桃仁

黃連

枳殼

血活之重者謂
氣

自古治裏急後急重但用檳榔木香調氣及大黃下積
至丹溪始用桃仁滑石活死血如鼓應桴實後前人之
所未發也

其或下墜在血活之後此為氣滯証宜於前藥加檳榔一枚

後當動和氣積與氣墜下當煎升煎麻消升謂升麻消謂木香檳榔之類

仲泄痢下重者以水五升煮薤白三升煮取三升去渣以

四逆散方寸匕內湯中煮取一升半分溫再服東垣云

薤白洩滯氣

食墜生赤白痢下薤白一握切煮作粥食之

丹其或氣行血和積少但虛生勞責此為無血証倍用當

歸身尾却以生地黄生芍藥生桃仁佐之復以陳皮和

氣行血和積
少而虛坐骨
責者補血

以不運也
青者補血

歸身尾却以生地黃生芍藥生桃仁佐之使以陳皮和

之血生自安

垣虛坐而不得大便者皆血虛也血虛則裏急皆加當歸身

凡後重逼迫而得大便者為有物而然今虛坐努責

而不得大便知其血虛也故用當歸為君生血藥佐

之

凡諸用承氣等藥揆積之後仍後重者乃陽不升也

藥中當加升麻升其陽其重自去也

垣升陽除濕防風湯治裏急後重數至圍而不能便或少

有白膿或少有血者慎勿利之

升陽除濕防風湯方見下血

丹其或成在下則纏滯在上則嘔食此為毒積未化胃氣未

平証當忍其寒則溫之熱則清之虛則用參朮補之

諸揆積後仍
重者升陽

重不能便或少
有膿血者亦升

陽

下重上嘔者

毒積

毒解積下食自進

治痢

蒼朮

白朮

條芩

當歸

白芍藥

生地黄

青皮

黃連

滑石

甘草

作一服水並裏急後重加黃連活石桃仁枳榔甚者
大黃嘔者加半夏用姜汁

腹痛甚者
多屬寒

世仲景小建中湯治痢不分赤白久新但腹中大痛者神
知其脉弦急或濇或浮大按之空虛或舉按皆無力
者是也 方見傷寒

丹婁長官年三十餘奉養厚夏秋間患滯下腹大痛有人
教服單煮干姜與一帖痛定少頃痛作又與又定由是

教服單煮干姜與一帖痛定少頃痛作又與又定由是

服乾姜三斤八日後召予治之左脉弦大似數右脉弦

而大稍減亦似數重取之似緊予曰必此醉飽後吃寒

涼太過當作虛寒治之曰其多服干姜遂教與四物湯

去地黃加人參白朮陳皮酒紅花茯苓桃仁並生姜汁

飲之一月而安丹溪云下利腹痛必用姜桂溫散此湯用于姜并小建

聖惠治冷利腹中不能食肉豆蔻一兩去皮以醋麴裹煨

令麴熟為度搗為散非時粥飲下一分七

右下痢腹痛必溫散而愈者蓋本於內經所謂寒氣

客於小腸、不得成聚故腹痛後洩及所謂大腸

病冬日感寒即洩當臍而痛之病

垣芍藥黃芩湯治洩痢臍痛或後重身熱久不愈脉洪疾

痛而脉洪疾
為熱

者及下利膿血稠粘

黃芩

芍藥 各一兩

甘草 半兩

右咬咀每服一兩水一中半 煎至一半 溫服 無時 如痛

加桂 少許

潔當歸導氣湯治膿血痢無度小便不通腹中痛

當歸 一兩

甘草 一兩半

芍藥 一兩

青皮 七分

槐花 七分

生地黃

一兩半 或二兩 酒浸陰干

木香

檳榔 各三分

澤瀉 半斤

為末水煎食前溫服如小便利去澤瀉

仲下痢腹痛紫參湯主之

紫參 半斤

甘草 三兩

將欲利時作痛者撲積
久病漸後初病當下

二味以水五升先煮紫參取二升內甘草煮取一升
分溫三服

潔厚朴丸治処暑後秋冬間腹痛下利大効 方見及胃

世治痢疾定痛黑丸子

黃臘五斤

杏仁廿八斤

滑子廿八斤

縮砂廿八斤

三件香油灯上燒存性溶臘和勻加乳香些少每服

十餘粒丸如米大

本事治積痢定痛靈砂丹

硃砂一分

朱砂一分並極細研

用黃臘半斤巴豆三七粒去壳皮膜同於銀石共內

重湯煮一伏時候巴豆紫黑為度去二七粒止將一

七粒與前藥二味同再研極勻再溶蠟匱藥每旋丸
菴豆大每服三丸至五丸水寫生姜湯下白痢艾湯
下赤利烏梅湯服時須極空腹服畢一時不可吃食
臨卧尤佳次食淡粥一日瘡疾乳香湯面東不背自
晚間服此藥不動氣服之瀉者小瘡者漸瘳者愈有
積者內化亦不動藏府大凡利有沉積者不先去其
積雖暫愈後必為害嘗記陳侍郎涇中庚戌秋過儀
真求診初不覺有疾及診視肝脉沉弦附骨取則牢
予曰病在左脇有血積必發痛陳曰誠如是前此守
九口被召冒暑涉長江暨抵行朝血痢已數日矣急
欲登黃鑿者以剛劑燥之雖得止數日臍下一塊大

欲登第者以剛劑燥之雖得止數日脘下一塊大
如稱句日如攪痛大發則不可忍故急諸公相以歸
之奈何予曰積痢不可強止故血結於脘脇下非抵
當丸不可渠疑而不肯服次年竟以此終

羅陳麩丸磨積止泄痢治腹冷痛

陳麩

一又半炒黃

干姜炮

官桂

白朮

當歸

厚朴

人參

炙甘草

各半又

為末煉蜜為丸如梧子大每服三五丸溫酒送下或淡
醋湯亦得食前一日三服發時不拘增數

右久病漸揆其積

漸

脈下利而腹滿痛為寒實當下之

丹初下利腹痛不可用參朮然氣虛者可用胃虛亦可用

肺氣鬱大腸者宜葷

食多作疼者宜和宜奪食

飲多作疼者宜

初得之可用大承氣調胃承氣下之以看其氣病血病而加減用藥

氣用參朮

血用四物

曰積作後重者保和

丸五日後不可下脾胃虛故也

腹痛有肺經之氣鬱在大腸之間者也以苦梗葷之後用利藥氣用氣藥血用血藥

其或利後糟粕未實或食粥稍多或飢甚方食肚中作疼切未可驚恐當白朮陳皮各半煎湯寬和之自安

粥多及食肉作痛者宜奪食奪食減其粥食絕其肉味也

垣 茯苓湯治目吃傷冷飲便水瀉六日一夜走十變作白

痢腹中寒痛減食熱燥四支沉困無力

花苓湯治目吃傷冷飲便水瀉六日一夜走十變作白

痢腹中疼痛減食熱燥四支沉困無力

茯苓六分 澤瀉 當歸身 四分 芍藥一升半

蒼朮二分 生姜五分 肉桂五分 生黃芩三分

猪苓六分 炙甘草 半升 升麻 柴胡各二升

剉如麻豆大作二服水二大盞煎至一盞去渣稍執食前服

羅神效越桃散治下利之後亦便利而腹中滿痛不可忍

此名陰陽反錯不和之甚也

大梔子 三升 良姜 二升

為末米飲調或酒調下三升

內經膿血稠粘皆屬於火夫太陰生瀉少陰生利是先洩

忘津液而火就燥居下焦血分其受邪者故便膿血然

利後腹滿痛 名反錯

赤黃為熱 青白為寒

熱宜堅中香
連宜交香木
香

赤屬鼻
皆是挑

赤黃為熱青白為寒治瀉兩審治熱以堅中丸豆蔻丸
香連丸治寒白膠香散或多熱少寒水煮木香膏虛滑
頻數宜止宜瀉宜養藏湯木香膏養藏湯並見虛酒條
白膠香散未考
堅中丸治脾胃受濕泄滑注下

黃連

黃柏

赤茯苓

澤瀉

白木各一

陳皮

肉豆蔻煨

白芍藥

人參

官桂

半夏曲各半

右末湯浸蒸餅為丸如梧子大每服五七十九丸温米

飲送下食前

丹下血用四物為主

下血當涼血和血當歸桃仁之屬

瘦而更膿血小腸燥也脈得五至之上洪大者宜七宣丸

秋至春宜香連
春至秋宜芍藥
四時通宜加減
平胃

下血當涼血和血當歸桃仁之屬

澁而便膿血小腸洩也脉得五至之上洪大者宜七宣丸
潔脉平者立秋至春分宜香連丸春分至立秋宜芍藥相
皮丸四季通用宜加減平胃散如有七宣散証候者亦
宜服之此藥去其餘邪蕪平胃散 香連丸見後重条

芍藥相皮丸方

芍藥

黃柏皮 牛分

為細末醋糊丸梧子大每服五十九丸食前温湯下

加減平胃散經云四時皆以胃氣為本久下血則脾胃
虛傷血不流於四肢却入於胃而為血痢宜服此滋養
脾胃

白朮

厚朴

陳皮 各一

煨榔 三

食積下血

甘草 七分
木香 三分
菝葜仁
人參

黃連
阿膠
白茯苓 各半兩

為細末每服五分姜三片棗一個水煎溫服無時○
血多加桃仁○熱洩加黃連○小便澁加茯苓○氣
不下後重加檳榔木香○腹痛加芍藥甘草○膿多
加阿膠○濕多加白朮○脈洪加大黃
丹下血多主食積與熱或有因朴硝者

小兒八歲下純血以食積治

蒼朮
白朮
黃芩
芍藥
滑石

茯苓
甘草
陳皮
炒曲

並下保和丸

世治痢食積

附米

神曲

芎

梔子

滑石

山查

紅曲

蓬

桃人

濕熱下血

丹青六丸去三焦濕熱治洩瀉多與他丸同服並不單服

產後腹痛或自利者補脾補血藥治血痢効

六乙散

三升即益元散

紅曲

炒半升活血

右飭為丸一方酒糊丸

二十九官壯痢食少下墜赤積身熱

木通

一分

芍藥

炒

陳皮

白朮

滑石

各半升

甘草

半升

分四帖同益下保和丸與点丸各十丸

潔蒼木地榆湯治脾經受濕下利血

蒼木

三月

地榆

一

剉每一兩水二盞煎至一半溫服

槐花丸治血痢久不止腹中不痛不裏急後重

青皮

槐花

荆芥穗各等分

為末水煎空心熱服

內寒下血

仲小腸有寒者其人下重便血

集驗治血痢神効干於火上燒黑不令成灰麤碗合放

冷為末每服一升米飲調下

垣大便後有白膿或只便白膿曰勞役氣虛傷大腸也以

黃芪人參補之如裏急頻見者血虛也更加當歸

白屬氣非
皆是寒

如便白膿少有骨頻見汚衣者冠脫加附子皮甚則如

皆是寒

黃芪人參補之如裏急頻見者血虛也更加當歸

勞挑

如便白膿少有滑頻見汚衣者迷脫加附子皮甚則如
米穀如氣瀦者只以甘藥補氣當安卧不言以養其氣
氣瀦則忌米穀但服甘藥安卧不言也
丹丈夫辛苦勞後吐利白積

滑石 一升 陳皮 白朮 芍藥 半升

黃芩 三升 炙甘草 半斤 桃仁 三十个

分六帖水二中半並取一半食前飲之

飲積

孫郎中曰飲水過多腹脹瀉痢帶白

蒼朮 白朮 厚朴 茯苓 滑石

下保和丸

治痢挑多者

寒挑恭伍
身挑脈決
為挑

大黃

黃連

黃柏

黃芩

枳殼

白芍

當歸

滑石

甘草

桃仁

白朮

等分為末麩糊丸

世不問赤白痢赤苦蕒根不拘生于搗取汁以生薑蜜水

調服未効再進分半碗許立愈

經驗夷赤白利山豆根搗末蜜丸空心薑水下二十九丸三

服自止

千金治下利批諸治不差方

烏梅一斤

黃連一斤

二味為末蜜和丸如梧子大二十九日三夜二神效

二味為末蜜和丸如梧子大二十九日三夜二神如

世似痢丸治似痢非痢挾熱者

苦凍根皮 去粗皮晒干

為末粳米飯為丸米飲下

腹寒脉法理
為安

羅至元乙亥廉臺王千戶年四十五歲領兵鎮連水此地
卑濕目勞役過度飲食失節至秋深瘡痢併作月餘不
食飲食全減形容羸瘦乘馬驕以歸時已仲冬求治於
予其陳其由診得脉弦細而微如蛛系身體沉裏手足
寒逆時復脉麻痺皮膚痲疥如厲風之狀無力以動心
腹痞悶嘔逆不止皆寒濕為病久淹也真氣衰弱形氣
不足病氣亦不足脉沉皆不足 針經曰脉沉皆虛針
所不 為灸之所宜內經云損者溫之勞者溫之十劑

云補可去弱先以理中湯加附子溫養脾胃散寒濕澁
可去脫養藏湯加附子固腸胃止洩痢仍灸諸穴以併
除之經曰府會太倉即中脘也先灸五七壯以溫養脾
胃之氣進美飲食次灸氣海穴百壯生元氣滋百脈
充實肌肉復灸足三里胃之合穴三七壯引陽氣下交
陰分赤助胃氣後灸陽轉二穴七壯接續陽氣令足脛
溫暖散清濕之邪追月余後病皆退漸至平復今累年
侍衛親軍所指揮使精神不減壯年理中湯方見傷寒
部加附子名附子理中湯

海上六脈沉緊按之不鼓脬腕小腸也或瀉利不止而腹
脹或純便赤黃或雜之以血膿便雖多而不渴精神短

少或面白色脫此失血故也或面黃氣短此未氣損少

脹或純便赤或雜之以血膿便雖多而不渴精神短少或面白色脫此失血故也或面黃氣短此木氣損少之故也小腸者手太陽丙火也膀胱者是太陽壬水也是壬水乘兩小腸之位小腹被剋而外走也諸手經短而足經長並五行相剋論之俱足剋手經此火受於寒水之証宜溫之則其與雜經一証寒熱相反亦名曰小腸溷此雜病火投于水變為寒証又外傷足太陽膀胱經左脉俱浮表陽之候也芤變為內寒亦旺火投盛水而就壬化脉反不浮而微沉此內病與外病俱有此大例非精於脉診者孰能之

石脂神砂丹

生附

生于姜

各半又

赤石脂

一又水
半碗

朱砂

一又細研

為末酒糊丸黑豆大每服十五丸米飲或茯苓湯下
太平廣記正觀中太宗苦於氣痢眾醫不較詔問殿前
左右有能治其病者當重之有術士進以乳汁並草烏
膠之之差

本治水洩并赤白痢

草烏大者一升半

將一半燒灰一半生用為細末醋糊為丸如菘豆大每
服七丸赤利甘草湯下白利干姜湯下水瀉并花水下
並空心服之忌腥燥執毒生冷

世俗治夏月中暑痢疾用黃連香薷飲加甘草芍藥生姜
神效者蓋夏月之利多屬者也潔古治此暑後秋冬間下

處暑前嘗治
處暑後以寒治

神效者蓋夏月之利多屬者也潔古治此暑後秋冬間下

大腸

初病閉塞宜

宣通

閉塞退減宜

實腸

久病者產滑

宜固脫

虛寒者執固

虛熱者寒固

痢用厚朴丸大效者蓋秋冬之痢多屬寒也經所謂必

先歲氣無伐天和者是也厚朴丸方見鬲氣及胃

初病大腸閉塞裏急後重治法並見前及重多熱條

丹其或纏滯退減十之七八穢稍未盡糟粕未實當以炒

芍藥炒白朮炙甘草陳皮書茯苓煎湯下固腸丸三

十粒然固腸丸性燥恐尚有滯氣未及行者但當單飲

此湯固腸丸未宜遽用蓋固腸丸有去濕實腸之功

其或以久痢體虛氣弱滑洩不止又當以訶子肉豆蔻白

礬半夏等藥瀉之甚者添牡蛎可擇用之然須以陳皮

為佐恐太瀉亦能作疼又甚者灸天樞氣海此穴大能止泄

仲下利便膿血者桃花湯主之
方見傷寒若一服愈余勿服
丹溪云桃花湯意謂病屬下

焦血虛且寒非干姜之溫石脂之瀉且重不能止血粳米之甘引入腸胃

羅水煮木香膏治脾胃受濕臧府滑洩腹中疼痛日夜無度腸鳴水聲不思飲食每欲痢時裏後重或下赤黃或便膿血並宜服之

木香 一兩

丁香 一兩

枳實

去炒 半兩

米壳

蜜炒 半兩

乳香 研一兩

呵子皮 一兩

當歸 一兩

肉豆蔻

一兩半

縮砂 一兩半

藿香 一兩

黃連

白芍藥

青皮

陳皮 去白

厚朴 制

甘草

炙各 一兩

干姜 炮 半兩

為末煉蜜丸彈子大每服一丸水一大中折半並至

六七分和棗稍熱服食前

海易簡斷下湯治下利赤白無問新久長幼

白朮

茯苓各一斤

甘草 羊不

草果 連皮 一个

右父咀用罌粟殼十四枚去筋膜并萼蒂剪碎用醋
 淹為初末同煎作一服水一大碗姜七片枣子烏梅
 各七个並至一大盞分二服、之赤痢者加烏豆二
 粒白痢者加干姜半斤重丸嬰粟殼治痢服之如神
 但性緊瀉多令人嘔逆既以醋制加以烏梅不致為
 害然嘔吐人則不可服大率痢疾古方謂之滯下多
 曰腸胃素有積滯而成疾始得之時不可遽止先以
 巴豆、感應丸十余粒用白梅茶下令大便微利仍以
 茲藥服之無不應手作效○若脾胃素弱用豆蔻橘

紅罌粟殼各等分為末醋煮麵糊為丸梧子大每服
五十九丸烏梅湯下○蕪治洩瀉下暴不止一服即愈
更令藥力相倍為佳如覺要心却以理中湯四君子
湯加豆蔻木香輩調其胃氣仍以二陳湯水煮木香
丸定其嘔逆大凡痢疾乃腹心之患尊老年人尤非
所宜若果首尾用平和之劑決難作效必致危篤雖
欲服此則已晚矣其如秦芫地榆黃蘗木相之類其
性苦寒却難輕服○血痢當服胃風湯并膠艾湯之
類○白者宜服附子理中湯震靈丹之屬更宜審而
用之○若五色雜下洩瀉無時當用絜烏頭一两厚
朴甘草干姜各一分生姜並服○今之治利多駐車

丸黃連阿交丸之類其中^止有黃連肥腸其性本冷若
所感稍輕及余利体息不已則服之弥効若病稍重
非此可療若調之穩當則悠、之乃自取用頓也

世治痢

御米殼主項核湯洗三次晒干蜜拌炒黃用之一分久者加之 側柏葉 一分

甘草 三分

右吹咀水一盞苴半盞澄清入蜜兩呷服之先服木

香檳榔丸却服此藥妙

本方

黑荳 五十粒

陳皮 半斤

罌粟殼 十四个

甘草 三寸

右四味半生半炒水用一椀藥散四分苴至七分空

心温服尽此一剂无不効者

垣白术安胃散治一切瀉利无问膿血相雜裏急寔痛也

日夜無度又治男子小腸痛氣及婦人暗冷下虛冷并

產後兒枕痛亦治產後虛弱寒熱不止者

米殼

三月去頂蒂
醋煮一宿炒干

茯苓一斗

白术一斗

五味子

烏梅

取肉半斗炒干

車前子一斗

為末每服五升水一盞半至一半去渣温服

經驗治腸滑久利神妙無比以石槽一个劈破炭火簇燒

令烟尽急取出不令作白灰用瓷碗盖一宿出火毒為

末用醋石槽一甌水一盞煎湯服二升瀉亦治

至惠治痢下久積不差腸垢已出以烏梅二十个水一盞

至裏治痢下久積不差腸垢已出以烏梅二十個水一盞

煎取六分去渣食前分為二服

山居痢五倍子末為丸赤痢甘草湯下白痢干姜湯下各

二十丸

垣呵子皮散癸卯歲冬十月小雪薄冰天冷應時樞密院

白舉一老僕面塵脫色神氣弱長跪於前曰痛脫肛日久

服藥未驗近日復以赤白膿利作裏急後重白多赤少

不任其苦、予求治遂應其請以料之曰此非肉食膏

梁者也必多疏食或飲食不節其寒一也衣蓋尤薄寒

侵形体其寒二也况天气應時其寒三也不禁而腸頭

脫下者寒也滑也真氣不禁固也形質不收乃血脫也

此乃寒滑氣泄不固故形質下脫也其料之以瀉去脫

腸頭脫下亦宜同

而除其滑微酸之味固氣上收去其下脫也以大熱之
劑而除寒補陽也以補氣之藥升陽益氣是的對其証
也以御米殼之酸微瀆上收固氣去脫主用為君呵子
皮之微瀆酸上收固血治其形脫橘皮微苦溫益其真
氣升陽為使以干姜大辛熱之劑除寒為臣亦為主名
曰呵子皮散

御米殼

半水去者
蔓蜜炒

呵子

七分煨
去核

干姜 六分炮

橘皮 半水

四味為末分作二服水二中並至一中
和滓執服空心
一眼減半再服全食

羅
養臟湯治大人小兒腸胃虛弱冷熱不調
藏府受寒下

痢赤白或便膿血有如魚腦裏後重脛腹痛日夜無
度胸膈痞悶脇助脹滿全不思食及脫肛墜下酒積濕
毒便毒血諸藥不効者並宜服之

人參

當歸 各六分

呵子皮

去核二
分二分

木香

一分四分

肉豆蔻

麩裏煨
五分

書白芍藥

一分六分

甘草

一分

白朮 六分

米殼

蜜炒

三分六分

肉桂 八分

為齋末每服二大錢水一中半煎至八分去渣食前

溫服老人孕婦小兒暴瀉急宜服之立愈

忌酒麵生冷魚腥油膩物藏府滑泄夜起久不差者

可加附子三四片並服此藥的有神効不可具述

保治泄痢膿血乃至脫肛者地榆芍藥湯

大孔不閉宜塞

大孔急痛宜

慰

蒼朮八分

地榆

黃柏各三刀

芍藥三刀

右散每一兩水一大中煎至一半盞溫服病退勿服

世治痢大便不禁其大孔開如空洞不閉者用葱和蒼朮

末爛春塞穀道中并服酸渣固脫之劑收之御米壳呵子

皮之類是也此法神效如無蒼朮只月與胃之類亦可塞

具陳伯大年二十歲性急好酒色奉養厚適有事多憂恐

患久瘡寒熱無時忽一日大發熱大便兩下皆是積滯

極臭大孔極痛呻吟不絕其孔陷下囁付後事予曰此

大虛也脉皆弦大而浮遂瓦片敲令員淨如銅之法狀

燒紅投童子小便中急取起令干以帛裹安在痛處其

時寒恐外寒乘虛而入也以人參當歸陳皮作濃湯飲

時寒恐外寒乘虛而入也以人參當歸陳皮作湯飲
之食淡味至半月而安

久下大孔赤白痛不可忍炒鹽慰之又灸枳實熨之後
痢久大孔急痛亦有寒熱者熟艾黃蠟呵子燒薑之妙
日華子

下痢大孔痛曰熱流于下接柳木香黃芩黃連加干姜

炒

運氣下血有二

圖

其一熱助心血盛而血下經云少冰司天熱淫所勝
民病血泄溺色變又云少冰在泉火淫所勝民病
溺赤甚則血便又云歲金不及炎火乃行民病血便
注下又云厥陰司天風氣下臨火從其暴赤沃下治

以賊寒是也

其二寒攻心血虛而下經云太陰司天寒淫所勝血
變于中民病血泄又云太陽之勝血脉凝泣或為血
泄又云陽明司天之政膏之氣民病血便治以諸執是也
運氣下白皆屬火經云少陽司天客勝甚則下白溺
血是也

運氣下白皆執

運氣下赤白有三

火勝者寒治

風勝者清治

風濕者清濕

治

運氣下赤白有三

其一屬火經云少陰司天火淫所勝民病注下赤白

又云少陰在泉火淫所勝民病注泄赤白小腹痛

又云少陰之勝小腹痛下沃赤白治以諸寒劑是也

其二屬風經云厥陰之勝腸鳴飧泄少腹痛注下赤

其二屬風注云厥冰之勝腸鳴飧泄少腹痛注下赤

白治以甘清是也

其三屬風濕經云太陰司天之政四之氣風濕交爭

民病注下赤白是也

運氣裏急後重有二

館

其一濕助脾盛而重經云太陰之勝小腹滿腰脰重

強內不便善注泄是也

圖

其二風攻脾虛而重經云厥冰司天風淫所勝民病

澹泄痲水閉是也痲謂後重也

本救命延年丈夫婦人一切重痢

黃連

干姜

當歸川者

阿膠各三升

為末用米醋煮阿膠令消盡須用料得醋恰好不可刺

雜方

運氣裏急
後重是也
濕勝者脾盛
風勝者脾虛

却將藥搜醋凡如梧子大每服三十九粒飲送下其

如神疾痢方中之魁

又方

茱萸

黃蘗連

書阿膠

白芍藥

等分同炒

為末麩糊為丸如梧子大每服三十九粒陳米飲下小

兒十丸陳無擇無阿膠名戊巳丸

羅阿膠梅連丸治下痢無問新久赤白者無疼痛諸症

阿膠淨中反燒透明白則碎不細者再炒研細

烏梅肉炒

黃柏炒

黃連

當歸炒

赤芍藥

干姜

赤茯苓各半丸

為末阿膠研勻水丸如梧子大米飲下

為米阿膠研勻水丸如梧子大米飲下

世黃連丸治赤白痢

吳茱萸

川連 各二刀

右一處用好酒浸三日各自為末各自為丸白痢茱

萸丸赤痢黃連丸甘草湯下赤白痢二丸和服妙

右四方寒熱蕪施收散並用之劑寒熱滑滯雜合為

痢者宜之

崔元亮治痢方以生姜切如麻粒大和好茶一二椀呷任

意便差着是熱痢則留姜皮冷則去皮火炒

又方陳皮艾葉濃黃湯服折

滯下獨酌足太陰一徑徑云脾足太陰之脈所生病

者澹痠泄水閉視盛虛熱寒陷下酌之

針灸上

針灸下

東湯泄痢不禁小便痛後重便膿血

腹

丹田下一寸半復溜小腸俞灸七壯不已

天樞

腹哀

冷痢腹痛洩注赤白

關元

窮谷各五十壯

洩痢久下失氣膿血

下腰五十壯穴在八魁正中央脊骨上灸名三宗骨三報之

便膿血久痢下重

小腸俞灸

世裏急後重

合谷外關

甲更腹血寒中食不化腹中痛腹哀主之

禁忌
忌恣飲食

甲便膿血寒中食不化腹中痛腹哀主之

瘡癢腹中痛歲痺地機主之

丹予族外形色俱實痲瘡又患痢自恃強健能食絕無忌
憚一日召予曰却健而能食但苦汗出耳汝能止此汗
否予曰痲瘡非汗不能愈可慮者正在健與能食耳此
非痢也胃熱善消脾病不化食積與積勢已甚矣此時
節擇飲食以養胃氣省出入以避風寒俟汗透而後外
曰世俗謂無飽死痢疾我今能食何謂可慮予曰痢而
能食者知胃氣未病也故言不死非謂恣食不擇節者
不從所言恣口大嚼遇渴又多啖水果如此者月餘後
雖欲求治不可着手矣淹、又月而死內經云以驕恣

不淪於理為不治之病信哉

又周其姓者形色俱實患痢善食而易飢大嚼不擇者五日灸予責之曰病中當調補自養豈可滋味哉 賊遂教其只用熟蘿白吃粥且少與調治半月而安

羅如瀉痢止脾胃虛難任飲食者不可一槩用剋伐之劑

補養氣足然後始飲食也宜錢氏方中異功散設或喜

嗜飲食太過有傷脾胃而心腹痞滿惡心嘔逆不拘此

例則當權用橘皮枳木丸一服快更莫服然飲食謂節

不致有傷則胃氣和而平矣

丹下痢久甚者寒涼藥必益升散并熱藥初下痢不可用

參朮氣虛者用之

每行義載首一男子暑月患血痢醫妄用寒藥遂制專用

海衍義載有一男子暑月患血痢醫妄用寒藥逆制專用
木香黃連阿膠治之此藥始感便用則可今病久腸虛
理不可服踰旬不已、至委頓引此為例他可做之
衍義地榆性沉寒入下焦熱血痢則可用若虛寒人及水
瀉白痢即未可輕便

書

丹石前方用厚朴專為瀉滯之氣然厚朴其大溫而散
久服大能虛入滯氣稍行則去之今滯未去則用炒枳
殼陳皮然枳殼亦能耗物比朴雖少緩比陳亦為重者
滯氣退一半亦當去之只用陳皮以和衆藥然陳皮去
白用有補瀉之兼才若為參木之佐亦純作補藥用

久洩久痢

丹族牝祖年七十稟甚壯形甚瘦夏末患洩痢至秋百方
不應予視之病雖久神不瘁小便瀆少而不赤兩手脉
俱澁而頗弦自言葛微問食亦減因悟曰此必多年沉
積僻在腸胃詢其平生喜食何物曰我甚喜食鯉魚三
年無一日缺予曰積痰在肺為大腸之歲直大腸之不
固也當其清其源而流自清以茱萸陳皮青葱鹿目根
生姜煎濃湯和以沙糖飲一椀許向以指滴探喉中至
半時辰吐痰半升如膠其夜減一半次早又服又吐半
升而利止又與平胃散加白朮黃連旬日而愈
朱仲符年近七十右手風痺多年七月而患洩瀉百藥不
愈診其脉右手浮滑而洪數予曰此太隄分有積疾肺

氣壅鬱不能下降大腸虛而作洩當治上焦遂用蘿蔔
子加漿水蜜探之而吐得痰一塊大如椀如琥珀稠粘
如膠利遂止不服他藥

子和東門一男子病瀉痢不止腹鳴如雷不敢冷坐、則
下注如傾諸醫例斷為寒証官桂干姜丁香豆蔻之屬
枯礬龍骨皆服之何針不熅何灸不炷迂迤一二載矣
一日問于戴人戴人曰兩手寸脉皆滑余不以為寒然
其所謂寒者水也以茶調散涌寒水五七升又無憂散
洩積水數十行乃通回用之法也次以五苓散淡劑滲
洩利水道也又以甘露散止渴不數日而冷食寒飲皆
如故此法王啟玄稔言之矣奈無人用之哉

太康劉倉使病大便少而頻日七八十次常於兩股間懸
半枚瓢芦如十余年戴人見之而笑曰病既頻而少欲
通而不得也何不大下之此通日通用也此一服藥之
力乃與藥大下二十余行頓止

潔治洩痢久不愈膿血稠粘裏急後重日夜無度久不愈
者宜大黃湯

大黃 一升

右剉好酒二大中合浸半日再煮至一中半去渣分
為二次頓服之痢止停服未止再服以利為度服芍
藥湯以和之所以徹其毒也芍藥湯方見瀉下和裏條

保白朮黃芩湯服前藥利雖已除猶宜此次和

保白朮黃芩湯服前藥利雖已除猶宜此方和

白朮一升

黃芩七升

甘草三升

右粗末勻和作三服水一中半並至一半去渣溫服清
丹有人每早須大瀉一行或腹痛或不痛空心與熱藥亦
無効或人教以夜食前又進熱藥一服遂後如此常
服蓋暖藥雖平旦服之至夜力已尽一夜臥氣以無以
敵之也



本事治腎洩五味子散

五味子二升

吳茱萸

半升細粒綠色的

右二味用炒香熟為度細末每服二升陳米飲下頃
年有親識每五更初欲曉時必瀉利一頃如是數日
有人云此名腎洩腎感陰氣而然得此方服而愈

每一日早起瀉一二行俗謂之受肚瀉是也其証有二
一屬積寒在內即此二條之証是也

一屬食積在脾胃治翁仲涵砂久洩早必洩一二行
洩後便輕快脈滑而小弱先與厚朴和中五龍大下
之後以白朮為君枳實茯苓半夏為臣厚朴炙甘草
黃連黃芩川芎滑石為佐吳茱萸十餘粒為使生姜
同煎服十餘貼調之全愈也

仲下痢已差至其年月日時復發者以病不尽故也當下
之宜大承氣湯

本事治痢冷在腸胃間連年腹痛洩瀉休作無時服諸熱
藥不效宜先取去然後調治易差不可畏虛以養病也

藥不效宜先取去然後調治易差不可畏虛以養病也

宜温脾湯

厚朴

干姜

甘草

桂心

附子

生各三

大黃

四分碎切湯一盞漬半日搗去查煎湯時和查下

右細剉水二升半煎八合後下大黃汁再煎六合去滓

澄去脚不要晚十分三服温自夜至曉令尽不食

前更以干姜丸佐之

乾姜丸

干姜

巴豆

去心炒
黃研

大黃

人參

各一丸

右除巴豆餘為末同研煉蜜丸如梧子大服前湯時用

湯吞下一丸米飲亦得

有人因愁憂中傷食結積在腸胃故黃吐利自後至暑

月稍傷則發暴下數日不已玉丞云下利至高年月
日應期而發者此為有積宜下之止用溫脾湯尤佳
如難取可佐以干姜丸後服白朮散

白朮散

白朮

木香

附子

人參各等分

右細末每服二匙水一中生姜三片棗一枚煎六分溫

服之

丹東陽胡兄年四十餘歲患痢百餘日百法治不妨效時
正九月初旬予診其六脉促急沉弦細弱左手為甚晝
夜數十行視之穢物甚少唯下清涕中有螿黑血絲食
全不進予曰此非痢也當作瘀血治之其兄問汚血何

全不進予曰此非痢也當作瘀血治之其兄問汚血何

事而致予曰飽後急走極力叫罵歐打擲撲多受疼痛
盛怒不泄補塞太過火酒火肉皆能之彼云去歲枉受
責杖經涉兩年恐非此等瘀血予曰服吾藥得瘀血下
即生笑遂以桃仁乳香沒藥滑石佐以檳榔木香用神
麩糊為丸以米飲下百粒至夜半又不動又依前法下
二百粒至天明大下穢物如爛魚腸者二升半困頓終
日漸興粥食而安

脈沉版厥者
風邪內縮

久濕先進縮並小續命湯是散其汗使邪氣不能侵於
內然後治其痢秋冬間下痢治番胃加減厚朴丸大如
此証係風邪縮於內其証下痢不止寸脈沉而遲手足
厥逆下部脈不至咽喉不利或涕唾膿血為難治宜麻

子和治久泄
皆用下法愈

黃升麻湯或小續命湯以散之法曰表邪縮於內當散
表邪於四肢布於結脉外無其邪藏府安矣有食積者
加枳實五錢酒入而瀉此熱瀉也加黃芩五分麻黃升麻
湯見傷寒小續命湯見中風

子和李德卿妻曰產後病洩一年余四支瘦乏諸皆斷為

死証當時裁人在朱葛寺以舟載而治焉載人曰兩手

脉皆微小乃痢病之生脉沉瀉洩屬肝經木克土而成

此疾亦是腸瀼者腸中有積水也先以舟車丸四五

十粒又以無憂散三四分下五行寺中人皆駭之病

羸如此尚可過耶衆人雖疑然未敢謂且更看之復以

導飲丸又過之渴則調五苓散向晚使人伺之已起而

導飲丸又過之渴則調五苓散向晚使人伺之已起而

緝床前下後約三四十行以胃風湯咽之半月而能行

一月而安健由此闔寺皆服德卿之昆仲咸大異之

劉德源病洞洩逾年食不化肌瘦力乏行步欹傾面色黧

黑舉治痢之藥皆用之無效裁人先以車舟丸無憂散

下十余行殊不困已頗喜食後以檳榔丸磨化其滯待

數日病已大減裁人以為去之未盡當以再服前藥此

源亦愀然請下之又下五行次後數日更以苦劑越之

往問其家彼云已下村中收索去也

丹丈夫酒多病洩久不愈又自進附枳等食不進洩愈多

滑石 黃芩半斤 生干姜 黃連

檮皮 連翹三分 陳皮二分

酒肉積泄必苦寒食

積利雜方

粥為丸每服一百丸

予男治方憲可二三年久洩下積但食肉則甚脉右關高滑左沉細先以厚朴丸三四十粒下之次奪其食用補劑加二陳及朴連查郎等消導藥並湯下厚朴丸五粒阿魏丸二十五粒服之五六日漸得下氣多而洩不止遂間服固腸丸泄漸止而安是知固腸丸之苦寒治酒肉積之要藥也厚朴丸方見番胃

恒聖餅子治瀉痢赤白臍腹撮痛久不愈者

黃丹 二斤

定粉 三斤

陀僧 三斤

船上硫黃 斤

輕粉 少許

右為細末入白麵四斤七滴水如指尖大捻作餅子

虛寒

陰乾食前溫漿下摩服之大便黑色為效

衍義云黃丹治久積

丹脾泄當大補脾氣而健運切當

潔肉豆蔻丸治腎洩久不食脈沉細無力者效

破故紙炒

肉豆蔻 麩 裹 煨 各 等 分

為末棗肉為丸梧子大棗飲下空心

世固中丸治脾久泄得後與氣則快者

蒼朮 二 斤

肉豆蔻 一 斤 麩 煨 香

粥丸梧子大每五十九

固下丸治久洩屬腎於固中內加破故紙一兩是

丹洩瀉○久病大腸氣泄

熟地黃 半 斤

炒芍藥

知母 三 斤

升麻

虛中有積

又方

干姜二斤

炙甘草一斤

右為末

再灸百會三壯

書 館

炒白朮

炒神曲

炒芍藥

或散或湯作丸子切當

治一老人奉養太過飲食傷脾常洩瀉

白朮 炒二斤

白芍 酒半斤 炒

神曲 炒一斤半

山查 一斤半

半夏 一斤 湯洗

黃芩 半斤 炒

右為末青荷葉燒飯為丸

本事治腎洩五味子散方見早瀉條

大腸虛滑宜

寒滑以塞固

大腸虛滑宜本李治腎淺五味子散方見早瀉條

垣訶黎勒丸治休息痢昼夜腥臭不可近脐腹撮痛諸導不效

椿根白皮一刃

呵子半刃去核称

母丁香三十个

為細末醋麪糊為丸如梧子大每服五十九丸陳米飲

湯入醋少許送下五更三日三服効椿根乃樗根俗所

本木香丸散治高第痢不止并治血痢尤佳

木香

用黃連半刃炒劉

甘草一刃

罌粟殼

劉用生薑半刃全炒

本為末入射香少許每服二匙陳米飲下

雜方

世治久瀉不止用百草霜研細以粥糊丸白湯吞下

張文仲治痢久下徑時不食者此名休息取大虫骨炙令

黃焦持末飲散服方寸七日三即可

千金治赤白痢積年不差飲調服雲母末方寸七兩服

見效也

丹治血痢十年石灰三升熬令黃以水一斗攪令澄清一服一升日三服 崔氏

胎前下痢 書

本治婦人胎前產後赤白痢

生姜 二年少者一伯多老者二伯多重自然一汁

鴨子 一个打碎入姜汁內攪勻

右二味並至八分入蒲黃三升重煎五七沸溫空心服之效

無擇妊娠下痢赤白絞刺疼痛

雞子 一个烏雞者尤佳就頭作窠傾出清者留黃

黃丹 一分入前雞子壳內攪打令黃勻以厚棉帛裹黃泥固脐火上煨取焙干為細末

右每服二升米飲調下一服食者是男二服食者是女

虛寒

大舍治妊娠素弱頻併下痢腹痛羸瘦面色痿黃不美食

厚朴 一兩半

白朮

川芎

白芍藥 熟地黃

當歸 炒一兩

干姜

人參 各半兩

呵子 三分

甘草 一分

右以咀每服四分早三枚水煎

又方治妊娠下利腹痛小便澀

糯米 一合

當歸 炒

黃芩 各一兩

細切和勻以水二盞煮取一升二分去渣分四服

羅大寧散治妊娠下痢赤白及洩瀉疼痛垂死者

黑豆 三十粒

甘草

生薑 炒

米殼 二合炒

半生半炒

右為粗末都作一服生薑三片同煎食前神効

大舍又方治妊娠挾熱下痢亦治丈夫常痢

挾

虛滑者補而收之

右每服二升米飲調下一服食者是男二服食者是女

黃連

黃柏各一升

梔子仁

二十个

為末每服五升水二盞浸三時久煮十沸頓服

若嘔者加橘皮一两生姜二两

黃連湯治妊娠下利赤白膿血不止

黃連

八分

厚朴製

阿膠炙

當歸各六分

艾葉

黃柏各四分

干姜五分

為細末空心米飲調下方寸七日三服

厚朴散治妊娠下痢黃水不絕

厚朴 姜汁炙三升

黃連 二升

肉豆蔻 五个 連皮

用水二升煎取一升頓服

菓草飲治妊娠歲氣本虛脾胃久弱歲府虛滑腹痞痛

滯氣

虛

日夜無度

厚朴 姜汁浸炒者二升

肉豆蔻

不麩果煨

草豆蔻煨

呖咀每服三升姜三片水煎

產後痢

云岐救急散治產後赤白痢腹中絞痛

芍藥

阿膠

艾葉

熟地黄各四升

甘草

當歸各三升

呖咀水二升煎取八合分二服空心

大金當歸芍藥散治妊娘腹中絞痛心下急痛及療產後

血暈崩中久痢 方見妊娘腹痛

楊氏產乳療妊娘血痢阿膠二兩以酒一升半煎取一升頓

白至者散之

虛滑者收之

服

大產後諸痢方煮薤白食之

又方羊腎脂炒薤白空腹食尤佳

經驗治產後產前痢敗龜甲一枚用米醋炙搗為末米醋

調下丹溪云龜甲大補水台勞倦

丹婦人患痢墜胎產後滿食少痢不止脈虛左手尤甚

滑石半斤 白朮一不半 呵子煨二不 干姜四斤

炒芍半斤 茯苓半斤 蒼朮半斤

作細末下保和丸四十粒

執滑以寒收之

云岐產後血痢脘腹疼痛四物加槐花黃連御米壳等分

黃連丸治產後赤白痢腹中絞痛不可忍

寒執

黃連丸治產後赤白痢腹中絞痛不可忍

黃連 四刀

阿膠

蒲黃

梔子仁 各一刀

當歸 二刀半

黃芩 二刀

黃柏 三刀

為末煉蜜為丸桐子大每服六十九丸米飲下日三夜一

仲產後下痢虛極白頭翁加甘草阿膠湯主之脈經作執利重下新產虛極

白頭翁 二刀

黃連

黃柏

秦皮 各三刀

甘草 二刀

阿膠 一刀

六味以水七升煎取二升半內交煇令消分温三服

大令婦人臨產痢梔子不限多少燒灰細末空心熟水調

一亦甚者不過五服

產後血痢小便不通脘腹痛生馬齒莧搗汁三大合煎

一沸下蜜一合調頓服

寒

雜方

虛寒
東垣法
液少年高
而燥者宜
潤之

梅師治產後血洩不禁止餘血弥痛薑塊桂心干姜等分

為末空心酒調服方寸之匕

大愈療產後痢日五十行者

取木裏蠹虫糞炒令黃急以水沃之稀稠得所服之差止

聖惠治產後諸痢神效蒼耳葉搗絞十温脹半中盞日三

四服

大便不通

產後大便不通
產後大小不通

垣津液耗散少而躁者以辛潤之

腎主五液津液盛則大便如常若飢飽勞役損傷胃氣

及食辛熱味厚之物而助火邪伏於血中耗散真津

液虧欠故大便結燥又有年老氣虛津液不足而結者

腎虛燥急食辛以潤之是也

腎惡燥急食辛以潤之是也

潤腸丸

并加減法

治胃中伏火多有便秘瀆或干燥閉塞不

通全不思食乃風結秘血結秘皆亦令閉塞也以潤燥

和血疎風自然利矣

麻仁

桃仁

湯退去皮尖為泥一丹

羌活

半丹

當歸梢五升

煨大黃半升

右除麻仁桃仁泥外為極細末五上火枯蜜為丸桐子

大每服一百五十九空心白湯送下

如病人不大便為大便不通而滋其邪盛者急加酒洗

大黃利之

如血燥而大便干燥者加麻仁大黃

如風瀆而大便不行加煨皂角仁大黃秦艽以利之

如脉澀覺身有氣瀆而大便不通者加郁李仁大黃以除氣燥者也

如寒陰之病為寒結閉而大便不通者以局方中半硫丸或加薑附子干姜湯冰冷與之。其病雖冰寒之証常服湯藥補之若大便不通者亦當十服中與之服藥微通其大便不令閉結乃治之大法。病人雖是冰証或是冰寒之証其病濕燥脉實堅亦宜於吐藥少加苦寒之藥以去熱燥止勿加

如臥躁欲坐井中者其二腎脉必按之虛或沉細而遲

此亦為辨耳此一如知有客邪

之病亦從權而加

其藥以去之今立此一方餘皆倣此

右一方加減法隨証寒熱虛實及血秘氣秘風秘用藥

至為詳盡餘方皆不出此也

垣治血潤腸丸治大便風秘不通常、結燥

當歸梢 一升 防風梢 三升 羌活 一升 煨大黃 一升

麻子仁 二升半 皂角仁 燒存性去皮秤一升其性偏濕則滑去則燥枯用則勿誤 杏仁 二升

右除麻仁桃仁另研如泥外為極細末五上火枯蜜為

丸梧子大每服五十丸三兩次服大便日久再不能結

燥也蜜先去沫以瓷器內盛布封其縫勿令見風

當歸潤腸湯

升麻 二升 當歸梢 一升 熟地黃 一升 生地黃 二升

此亦為辨耳此一如知有客邪之病亦從權而加

生甘草梢一分 煨大黃一分 桃仁泥一分 麻仁一分

红花 半分

右除桃仁麻仁另研如泥外判如麻豆大都作一服

水三盞入桃仁麻仁泥盞至一盞去渣空心宿食消

尽稍热服效

導治通幽湯夫人便難幽門不通上衝吸門不開噎塞不

便燥閉氣不得下治在幽門大便難明之曰下脘不通

通幽湯主之

當歸身一分 升麻梢一分 桃仁泥一分 红花一分

生地黃五分 熟地黃五分 炙甘草一分

咬咀都作一服水二大車並至一中去滓稍热服食前

海計學士治年老虛人祕大麻仁紫蘇子各半合研細取
汁分二服煮粥食之後不服藥而愈

羅潤腸橘杏丸降氣潤腸服之大腸自無滯滯

橘皮

杏仁

去皮夫及仁夫炒黃各等分本少云杏仁

潤氣燥

右等分為末煉蜜為丸如梧子大每服五十九空心
溫水下久服不損胃氣

右桃仁麻仁葶藶潤燥法蓋桃仁麻仁治血燥杏仁

郁李仁治氣燥皂角仁治風燥也

丹楊導三哥大便秘瀆小便如常咽塞不通食下便有痰
出脉瀆左右手同此血虛腸燥為脾約病之甚者人參

散主之

人參 五斤
芪 一斤
炒枳 二斤
炒朴 一斤
炙草 廿

地黃 一斤
桃仁 一斤

煎批入竹瀝姜汁飲之又與鎖 陝饅容 二斤 桃仁

一斤煮粥入竹瀝食之名閨腸散

婦人肚祕補血和血以通之

肉蓯容 一斤
麻子仁 一斤
白芍 一斤
陳皮 一斤
歸身 一斤

右五味同晒干炒神曲糊為丸如梧子大食前白

湯下五十丸一日二次

世蓯容閨腸丸治發汗過多耗散津液大府祕結

肉蓯容 酒浸焙
沉香 一斤

為末用麻子仁汁打糊丸如梧子大每服七十九米飲下

為末用麻子仁汁打糊丸如梧子大每服七十九米飲下

海益血丹治大便燥久虛亡血

當歸 酒浸焙 熟地黃 各等分

為細末煉蜜丸彈子大細嚼酒下

丹大腸虛秘而熱者

白芍藥 一斤半 陳皮 書生地黃 歸身 一斤

條芩 甘草

粥為丸白湯下

右肉從容當歸地黃閏燥法蓋精血枯竭而虛甚者宜之

垣有物有積而結者當下之漸

食傷太陰腸滿食不化腹響然不能大便者以苦泄之

仲京麻仁丸局七宣丸皆以大黃為君之類是也

有物有積而結者宜泄之

潤之泄之仍閉
者宜去風

丹溪法
西北方人宜閉結
東南方人宜潤
燥

東垣治注夏大便瀉滯者血少血中伏火也黃芪人參湯

加生地黃當歸身桃仁泥麻仁泥閏之黃芪人參湯方見注夏

如潤之大便又不快利者少加煨大黃微利之

如加大黃又不快利者非血結血秘是熱則生風病必

是風証也止常服黃芪人參湯只用羌活半兩防風半

兩水四盞煎至一盞去渣空心服之其大便必大走也

丹脾約丸論○成無己曰約者結約之約又束約之約胃

強脾弱約束津液不得四布但輸膀胱故小便數而大

便鞭故曰脾約與此丸以下脾之結燥腸潤結化津流

入胃大便利小便少而愈矣愚切有疑焉何者既曰約

脾弱不能運也脾強則土虧矣必脾氣之散脾血之耗

其所以由也痛大下大干之後水枯槁內火熾灼耗

脾弱不能運也脾弱則土虧矣必脾氣之散脾血之耗

原其所由久病大下大汗之後脾血枯槁內火熾灼耗傷元氣又傷於脾而成此証傷元氣者肺金受火氣無所裨傷脾者肺為脾之子肺耗則津竭心竊母氣以自救金耗則木寡子畏土欲不傷不可得也脾失轉輸之令肺失傳受之官宜大便秘而下難小便數而無藏畜也理宜滋養脾血使孤陰之火不熾而金行清化木邪自制脾土清健運行津液乃能入胃則腸閉而通矣今以大芩為君枳實厚朴為臣雖有芍藥之養血麻仁杏仁之溫為之使用之熱甚而氣熱者無有不效愚恐西北二方地氣高厚人稟壯實者可用若用之於東南之人與熱雖甚而血氣不實者雖得暫通將見脾愈弱而

潔古法
能食便赤為
物祕

而燥矣後之用此方者須知在西北以開結為主在東
南以潤燥為主慎勿膠柱而調瑟

潔藏府之秘不可一槩治療有虛秘有實秘胃實而秘者

能飲食小便赤當以麻仁丸七宣丸之類主之 仲景麻

仁丸方見傷寒秋明病每服二十九丸未知加至五十九日三服以利為度

局方七宣丸

柴胡 五斤

桃仁

去皮尖
炒六斤

枳實

夫炒
五斤

甘少

灸四斤

呵子皮 五斤

木香 五斤

大黃

面裹煨十五斤

為細末煉蜜為丸梧子大每二十九丸米飲下漸加至四五

十丸以利為度

斗門治大便不通用烏臼木方傳一寸劈破以水煎服取

半盞服之立通不用多服其功神聖黃能取水

不能食便清
為氣秘

小半盞服之立通不用多服其功神聖蓋能取水

潔古胃虛而秘者不能飲食小便清利厚朴湯主之

厚朴湯

陳皮二兩 炙甘草二兩 厚朴制二兩 白朮五兩

半夏曲 枳實炒一兩

粗末每三五升水盞半姜五片早三枚煎至一盞去

渣溫服空心實秘者物也虛秘者氣也

世檳榔散治腸胃受濕大便秘穢

檳榔不拘多少

為末每服二升用蜜湯点服不拘時

海桃杏仁俱治大便秘當以氣血分之年老虛人大便秘燥

血氣

脉浮昼閉為
氣燥
脉沉夜閉為
血燥

寒熱

秘者脉浮在氣杏仁陳皮主之脉沉在血桃仁陳皮主
之所以俱用陳皮者以其手陽明病与手太阴為表裏
也又云昼則難便行阴氣也夜則便難行阴血也

陳皮 杏仁 書木香

潤腸丸

陳皮 血 桃仁 丁香

蜜丸

仲問曰脉有阴結阳結者何以別之答曰其脉浮而數能
食不大便者此為實名曰阳結也期十七日當劇其脉
沉而遲不能食身体重大便反鞭名曰阴結期十四之
日當劇

垣有阴結有阳結阳結者散之阴結者熱之

脈浮數者食
為閉結

熱氣畜於小腸、中痛痺熱、佳湯則堅干不得出故痛
而閉不通矣 全文見諸痛

膀胱移熱於小腸、高腸不便 全文見診病傳變

保大黃、牽牛散治相火之氣、走藏府大便秘結

大黃

牽牛

半半

為細末，每服三升，有厥冷用酒調，無厥冷而手足煩熱者，蜜湯調下，食後微利為度。此謂不時動熱者，煩熱也。

凡用大黃，至半及一，大便不通利者，加射香少許，調於藥中，則大便必大也。

右熱秘皆因結之屬，仲景大小承氣及麻仁丸之類是。

方見傷寒因明病

之立效

世治後分閉塞，用萱草根一捻，同生姜搗碎，取自然汁服。

脈沉運不能食
為吐泄

局方半硫丸治年高冷閉虛閉

生硫黃研細半夏為末

右等分和勻生姜自然汁打麵糊為丸梧子大每服

五十九丸空心溫酒姜湯任下

垣麻黃白朮湯治大便不通五日一遍小便黃赤渾身腫
面上及腹尤甚色蒼麻木身重如山沉困無力四支痞
軟不能舉動喘促唾清水吐穢痰吐如膠白沫時燥熱
發欲去衣煩更而過振寒顛額有時如水額寒尤甚頭
旋眼黑目中治火冷泪鼻不聞香臭小腹急痛當臍有
動氣按之堅硬而痛

麻黃不去根

桂枝三分杏仁四个

吳茱萸四分

草豆蔻三分

厚朴三分

妙曲半分

升麻二分

草豆蔻 半分

厚朴 三分

炒曲 半分

升麻 二分

柴胡 三分

白朮 三分

蒼朮 三分

生甘草 一分

澤瀉 四分

白茯苓 四分

橘紅 二分

青皮 去根 二分

黃連 酒浸 一分

酒黃柏 二分

黃芪 三分

人參 三分

猪苓 三分

熟甘草 一分

以咀分作二服每服水一大盞半先煎麻黃沸去沫

再入諸藥同煎至一半去渣搗熱服食遠

此証宿有風濕熱伏於榮血之中其木火土乘於秋

道而上感元氣短少上喘為水傷其氣四支痿在

腎水之間乃所勝之病今正遇冬寒得時乘其肝木

又實其母肺金克凌木却遇冬衰其土以根木之讐

麻黃 不去根

桂枝 二分 杏仁 四個

吳茱萸 四分

運氣

寒閉 濕閉

雜方 導穀道

臣能為君致死子能為父報讐是也其証善怒欠多
嚏鼻中如有米不聞其香臭目視瞢、多悲健忘少

腹急痛通身黃腹大脹面腫尤甚食不下痰吐涕有
血目眦瘍大便不通只書三服皆愈

運氣大便閉有三

一曰熱經云熱至則淋閉又云少陽之腹滿腹不便

二曰寒經云太 少所至為禁止是也

三曰濕經云太陽司天濕淫所勝病大便難是也

仲蜜導法

方見傷寒胃實。丹溪方路公夏中病泄有人
與石脂龍骨干姜利止而勢甚苦而公又不樂

大黃藥遂一各三用蜜導下結矢五十枚遂實若虛人祕者
難與利藥宜用此法

海霹靂

大監與蜜等分熬可食如蜜導前上頭銳用寸許內谷

大鹽與蜜等分熬可捻如蜜導並上頭銳用寸許內谷

道中少許化開則通

一法用蜜並導不退者純用鹽吹入穀道中神效

海藏曰蜜導用鹽相合亦可如用草烏頭末相合亦可鹽

則軟堅潤燥草烏末則化寒滑結可隨証配賦所宜用之

急提盆散 雜病非配候者

草烏頭 不以多少生用

為極細末每用葱一枚肥者削去頭頭圓上有葱汁濕

蘸之任穀道中

仲猪膽汁方 方見傷寒胃實

孟詵大便不通氣奔欲死以烏梅十顆置湯中須臾按

出核杵為丸如棗大納下部少時只通

臍

丹治大小便不通

江子肉

杏子

官皂角

細末作餅放臍上火灸自通陶氏

世通關散治卒閉不通用鹽寒臍中才通即去之

本事宣積手心握藥便通

巴豆

干姜

薤子

良姜

硫黃

甘遂

白揆柳

已上各等分

為末研飯為丸如此○大用早朝便枳湯洗手麻油塗

手掌口握藥一粒移時便瀉欲得瀉止即以冷水洗手

針灸大便閉有三法

其一取胃經云腸中不便取三里盛海之虛補之是也

胃

針灸上

握宣

腎

針灸下

其二取腎經云邪在腎病大便難取之湧泉崑崙視有血者尽取之

玉意大便秘塞

照海 五分補一呼寫館支溝 一寸寫三吸

撮要又法

照海 瀉之立愈 太白 寫之灸

集成又法

照海 半寸灸二 七壯寫之 章門 灸二七壯

太白 半寸灸五壯已上諸穴看虛實補寫虛結補則有實結寫則通寒結先寫後補熱結先補後寫

摘英又法

氣海 八分令病人覺急便三五次 三里 五分竟腹中鳴三五次 為度針訖令人使臍揉之却刺三里 即透

世又法

合谷

東攻大便閉

背七椎兩傍相去各一

書灸三壯

承筋三壯

腸遺 揆玉泉相去二寸 隨年壯

又法

石門寸半

大都五分

摘英急食不通并傷寒水結

三間

此皮下勾至合谷穴三補三寫候腹中通出針

承山七分寫之

甲大便難中注及太白主之大腸大鍾主之大腸是也

丹予觀古方通大便皆用降氣品劑蓋肺氣不降則大腸

宜禁

宜降氣滑燥
忌駛藥走耗

虛

難傳送用杏仁枳殼沉香訶子是也又老人虛人風人
津液少而秘者宜藥以滑之用胡麻、仁阿膠等是也
如妄以駛藥逐之津液走氣血耗雖聲通而即秘矣更
生他病王少府曾疾有人以駛藥利之者累矣後為肺
痿咯膿血卒至不通而死書

產後大便不通

本事婦人產後有三種疾鬱胃、則多汗、則大便秘故
難於用藥惟麻子蘇子粥最且穩

紫蘇子大麻子二味各半合淨洗研極細用水再研取
汁一盞分二次煮粥啜之此粥不惟產後可服大抵老
人諸虛風秘皆得力嘗有一人母年八十四忽尔腹滿

痰

頭疼惡心不下食召醫者數人議皆供補脾進食治風
清利頭目藥數日病愈全不入食其家憂懼予辨說之
藥皆悞矣此疾正是老人風秘藏府壅滯聚於膏中則
腹脹惡不喜飲食又上至於顛則頭痛神不清也若藏
府流暢諸疾悉去矣予令作此粥兩啜而氣泄先下結
屎如胡椒者十余後漸得通利不用藥而自愈

丹產後祕結不通膨滿者氣急難坐卧麥槩末酒下一合
神合效兵部手集

大小便不通

丹有婦人脾疼後患大小便不通此是痰鬲中焦氣聚上
焦二陳加木通初服後吐查再服

山辰大小便不通燒皂角灰粥清調下
本事車狗散治大小便經久不通欲死者

用推車客七个即河車土狗七个在土為土狗在水

為水狗二物新瓦上焙乾為末以虎目樹皮向東南

者濃煎湯服之經驗如神虎目即虎杖其性大能利

小便又解暑毒

一說男子病推車客用頭土狗用身
土狗用頭推車客用身
土狗用身
土狗用身
土狗用身
土狗用身
土狗用身
土狗用身
土狗用身
土狗用身

海廻生神膏治冰証大小便不通及諸雜病冰候大小便

不通者並宜用此治法數日不通為急非急勿用

牡礪 煉粉 乾姜 炮制各一升

為細末男病用女唾調手內擦抵緊掩二卵上得汗

出金七病用男唾調手內擦抵緊掩二乳上得汗出金

卯与乳男女之根蒂坎离之分也

脉盛皮热吐胀前後不通

全法文見治虛实

去掩脐法治大小便不通連根葱一二莖带土生姜一块

淡豆豉二十一粒鹽二匙研爛捏作餅子烘热掩脐

中以帛扎定良久气透自通不然再換一副

桑君大小便不通

大都七分

東陽又法大小便难

環同在小腸俞下二寸横三间寸灸之

又法大小便不利

陽陰七壯水道二十壯

又法

榮衛 在背脊四面各一寸八分在腰目下三寸按脊相去
四寸兩邊各四穴灸十世至百世。此穴未詳

甲三焦約大小便不通水道主

產後大小便不通

雲收療產後大小便不利下血

車前子 黃芩 蒲黃 牡蛎 生地黄

芍藥 各一斤半

為末空心米飲服方寸匕忌麪蒜

心術婦人產後忽小腹脹如盤大小便不通

氣海 三里 關元 三泚 交泚 谷

醫學綱目卷之二十三終

醫學圖書卷之三十三

五經世里圖法三物

南朝入室則必以朝朝

漢唐末空之平

茂藥方百卷

東前名

重如委重

重如委重

重如委重

重如委重

重如委重

館

書

圖

江

浙

上而黃 林西 主好黃

醫學圖書卷之三十三

醫學綱目卷之二十四

脾胃部

水脹通論

水脹本於房勞過度

靈黃帝問曰水穀入于口輸于腸胃其液別為五天寒衣
 薄則為溺與氣天熱衣厚則為汗悲衰氣并為泣中焦
 胃熱則為唾邪氣內逆則氣為之閉塞而不行不行則
 為水脹余知其然也不知其由和生忽問其道岐伯曰
 云、五穀之津液和合而為高者內滲入于骨空補益
 髓髓而下流于陰股陰陽不和則使液溢而下流于陰
 髓液皆減而下一過度則虛、故腰背痛而脛痠陰陽
 氣道不通四海閉塞三焦不寫津液不化水穀并行腸
 胃之中別于迴腸留于下焦不得滲漏膀胱則下焦脹

論汗法

腹股皆腫為

水腫腫脹不腫

為脹內經注

先曰腫腫後腫

大按之隨手起

為水先腫大後

自腫按之隨而

不起為腫膚

脹腹絕不變

鼓脹色蒼黃

筋起

小腹獨腫為

腸覃

石癥石水

腸覃在腸外

經事以時下

水溢別為水脹 五癰津液篇。下過度謂房勞過度也

本專臍腹四支悉腫者為水但腹脹四支不甚腫為蠱張也

黃帝問于伯岐曰水與膏脹鼓脹腸覃石癥石水何以

別之岐伯荅曰水始起也目窠上微腫如新卧起之狀其

胫脈動時欬陰股間寒足胫腫腹乃大其水已成矣以

手按其腹隨手而起如裹水之狀此其候也黃帝曰膏

脹何以候之岐伯曰膏脹者寒氣客于皮膚之間鼓空

空然不堅腹大身尽腫皮膚厚按其腹窅而不起腹色不

變此其候也鼓脹何如岐伯曰腹脹身皆大、與膏脹

等也色蒼黃腹筋起此其候也腸覃何如岐伯曰寒氣

客于腸外與衛氣相搏氣不得榮曰有所繫癖而內著

經事以時下

容于腸外與衛氣相搏氣不得榮目有所繫癖而內著

石瘕在包
月事不以時
石水脉沉

針灸
取脹先寫
脹之血絡

湯虛邪湊

收伯法
微動四極温

惡氣乃起瘕肉乃生其始生也大如鳩卵稍以益大至

其成如懷子之狀久者高歲按之則堅推之則移月事

以時下此其候也不瘕何如岐伯曰石瘕生于胞中寒

氣客于子門子門閉塞氣不得通惡血當寫不寫衄以

留止日以益大狀如懷子日下不以時下皆生于女子

可導而下黃帝曰膚脹鼓脹可刺邪岐伯曰先寫其脹

之血絡後調其經刺去其血絡也水脹論○石水腫以

下腫其脉沉臾未考音切

先因足腫後腫大為水
胎前水
產後水

素帝曰其有不從毫毛生而五藏陽以竭也津液充郭王

注云不從毫毛言生於內也津液者水也充滿也郭皮也蓋陽竭於外津液得以充滿於皮郭而浮腫也

衣以補陽
開鬼門潔
淨府以攻邪

其魄獨居孤精於內氣耗於外形不可與依相保此四
極急而動中是氣拒於內而形施於外治之奈何攻白

日平治於權衡去宛陳莖是以微動四極溫衣膠刺其

處以復其形開鬼門潔淨府精以時復五陽已布疎滌

五藏故精自生形自盛骨肉相保巨氣乃平湯液膠刺

門微汗也潔淨府利小便也。王註云平治權衡謂察其

脈沉也脈浮為在表脈沉為在裏在裏者泄之在表者汗之

故下文云開鬼門潔淨府也去宛陳莖謂去積久之水物猶如

草莖也微動四極為微動四支冷陽氣與以宣行故曰溫衣也

仲諸有水者腰已下腫當利小便腰以上腫當散汗乃愈

凡水脈浮身重汗出惡風者防已黃芪湯主之又云防已

凡水脈浮為在表其人或頭汗出表無他病病者但下重從腰

防已 一升 黃芪 一升 白朮 三升 甘草 半升 炙

右制每服五升七生姜四片棗一枚水盪半煎取八分
去滓温服良久再服腹痛加芍藥一法潔古用此湯調
五苓散治回湿為眠者
皮水為病四肢腫水氣在皮膚中四肢聶、動者防己
茯苓湯主之

防己 三月 黃芪 三月 桂枝 三月 茯苓 六月 甘草 二月

五味以水六升煮取二升分温三服

脈而皮水者蒲灰散主之方見淋。已上利小便法

風水惡風一身悉腫脈浮不得續自汗出無大抵越婢
湯主之

麻黃 六兩 石膏 半斤 生姜 三兩 大棗 十五枚 甘草 二兩

五味以水六升先煮麻黄去上沫内诸药煮取三升分
温三服。恶风加附子一枚炮。恶水加术四两
重水者一身而目黄^腫其脉沉小便不利故令病利水
假如小便自利此亡津液故令渴也越婢加术汤主之
於前越婢湯加白术四两

甘草二升 麻黄四两

二味以水五升先煮麻黄去上沫内甘草煮取三升
温服一升重覆汗出不汗再服慎风寒

水之為病其脉沉小屬少陰浮者為風無水虛脹者為
氣水發其汗即止脉沉者宜麻黄附子湯浮者宜杏子^湯

麻黄三升

甘草二升

附子一枚炮

丹溪法

二本多少

陳以補湯

滑通亦皮

蘇以攻邪

三味以水七升先煮麻黃去上沫內藥煮取二升半溫服八合日三服已上發汗法

丹水腫為脾虛不能制水、積妄行常以多木補脾使脾氣

得實則能健運自然升降運動其拒機則水自行作五

苓之行水也宜補中行濕利小便切不可下常用二陳

湯加白朮人多蒼朮為主佐以黃芩麥門冬制肝木若

腹脹少佐厚朴氣不運加木香木通氣若陷下升麻柴

胡提之隨証加減必逐補中

用大劑白朮補脾如壅滿用半夏陳皮香附監之有枳

者當清肺麥門冬黃芩之屬

赤岸馮令八官素飲食不知飽但食肉必泄忽遍身發

麻黃二升 廿二日 附子一枚炮

腫頸面加多致目亦不可開鬲間滿如築兩足麻至膝
而止渾身不可見風陰器挺長其脈左沉而重取不應右
三部雖短小却有和滑氣象遂令單煮白朮湯飲早晨
空心探而去之食後白朮二錢重麻黃半錢重芎半錢
重防風三錢重作湯下保和丸五十九如此者兩日同
吐中得汗通体上截為多遂得睡寬而眼開氣順進却
於前方中去麻黃防風加白朮三錢木通一草各半
錢重保和丸五十九如此者五日而安此即南星門之法也
盧島婦廿余半日之前夜間發熱面先腫次及身足腫
壯亦累腫口渴思冷水食累減

大腹皮半錢

白朮一錢半

蒼朮五錢

梔子四枚

大腹皮半斤 白木一斤半 蒼朮一斤半 枳子四枚

川芎二斤 麻黃六分 木通一斤 葛二斤 甘枳二斤

朱秀才曰久坐受濕欲飲酒下血以苦澁藥塊之遂成
腫疾而壯足皆遍口渴中喘無力小汗脈濡而短此血
為濕氣所停法當行濕順氣清熱進食化積

滑石六斤 白朮五斤 木通三斤 厚朴五斤 干葛各一斤

蒼朮一斤 甘枳二斤半

分四貼煎蘇葉七片姜一片煎至三分之一抵下保和丸溫中丸五粒

王參九孺人浮腫胃滿腹滑泄口苦而渴小便赤少脈虛
而豁大稍遲此有濕積之病為人性急

滑石一斤 陳皮四斤 蘇梗一斤 白朮一斤 川芎一斤

木通一斤 厚朴各一斤 茯苓皮一斤半 甘枳半斤

分六帖用顺流水煎下保和丸二十五丸抑青十九

吴孺人胃中有稜散为腫成瘡疥身倦食少思散抵脉虚

而沉

白朮 一两五分 活石二两 生地黄 木通 川芎 各半两

黄芩 茯苓皮 連翹 各半两 紫蘇 炙 炙甘 各半两

下保和丸三十五丸

廿五年三十五歲腫病有热服藥得安但两足下節不退

肚内自竟尚有热脉却平矣飲食如昨

白朮 一两 郁李仁 一两半 蘇梗 木通 条苓

寗郎 枳实 炒半两 青皮 一两 甘栢 一两

方十帖細研郁李仁以顺流水三盞盪气起煎一盞食煎抵飲

方十帖細研郁李仁以噴流水三盞盪氣起立一盞血食立止批一帖

張即廿歲秋得睡疾午前上甚午後下甚口渴乏力脉

澁弱食亦少此氣素怯汗不能自出鬱而為疾与灸三

里肺俞大椎合谷分水又与此方

白朮 一各半 陳皮 半各 黃芩 芩蘇 海金沙 廿廿二分

木通 大腹皮 茯苓皮 干葛 炒厚朴 各三分

作一帖

光明人脚腫肚暴急身發微熱脉暴數口干

白朮 各 芩 半各 少葛 五各 蘇梗 半各 大腹皮 三分

炙甘 二分 芩 三分 陳皮 半各

許宅婦人二十已上脚肤腫近日有瘡毒

白朮 各 蒼朮 陳皮 犀角末 川芎 三分

木通

連翹

蘇葉二分

甘梢一分

分七帖並後入姜汁令辣抵飲食

馮百人目內有濕積並時令濕熱在腿少沈分發瘡瘡

如掌大瘡甚兩手脈洪緩零數面目手足俱虛腫蒿中

午前瘡滿午後腫利兩足則馬寬

生犀梢羊分

炒枳殼羊分

陳皮一分

連翹一分

白木一分

木通羊分

甘梢二分

蒼木羊分 苓羊分

研入姜汁

馮定瘡而發腫微渴脈左手虛右手大倉少婦人廿餘歲且乳子

白木一分

陳皮一分

木通羊分

炒朴羊分

大腹皮三分

炙甘草二分

牛膝羊分

蘇梗三分

姜三片

炙甘草二分 牛膝半斤 蘇梗三分 姜三片

馮孺人瘡而浮腫大便自利

人多 三分 半夏一升 芩半升 陳皮一升 芷半升

木通六分 白朮炒 蒼朮炒 炙甘草三分

王官年四十瘡兩日一發始者善啖至春作腫大小便

飲食少而浮腫口渴

朴二分 白朮一升半 通七 陳皮一升 芩半升

大腹皮三分 牛膝一升 炙甘草二分半 滑石一升

右丹溪治水腫之法十五條其法大率皆以甘梢佐白

朮多陳等訓補中氣為君木通滑石郁李仁海金沙行

水為臣厚朴大腹皮蘇梗通滯氣為佐使如氣不化浮

惡寒脈沉者探吐以提之頸面先腫加麻黃微汗之挾

總論前用藥之

潔古謹補法
謹爾先補後攻

積氣者佐以保和溫中抑青等丸摩之接熱者佐以黃
芩之類清之扶瘡癘者佐以連翹犀角散之而隨証加減也
羅治腫以胃氣為本至元戊寅五月間積雨淋漓魯齋汗
仲平先生年五十有八面目肢體浮腫大便溼多腹脹
腸鳴時痛飲食減少命予治之脈浮弦細而緩魯齋曰
年壯時多服牽牛大黃藥面目四肢時有浮腫今日陰雨
故大散予曰營運之氣出於中焦中焦者胃也胃氣弱
不能布散水穀之氣榮養藏府經絡皮毛故氣行而滯
為浮腫大便溼多而腹脹腸鳴皆濕氣勝也四時五藏
皆以胃氣為本五藏有胃氣則和平而身安若胃氣虛
弱不能運動滋養五藏脈不和平本藏之氣盛者其脈

弱不能運動滋養五臟脈不和乎本歲之氣盛者其脈

獨見輕則病過甚則必死故經曰真歲之脈弦無胃氣

則死先生之疾幸而未至於甚尚有可調補人之脈牽

牛大黃為一時之快不知其為終身之害也遂以平胃

散加白朮茯苓草豆蔻仁數服而腹脹漉漉腸鳴而痛

皆金飲管進止有四支浮腫以導滯通經湯主之良金

垣導滯通經湯治脾濕有余及氣不宣通面目手足浮腫

陳皮一升 桑白皮一升 白朮五升 木香五升

茯苓一升 霏雨時加 澤瀉一升

咳嗽每服五升水二盞煎至一盞去渣管前溫服

潔古先改後
潔古
白茯苓湯名變水

白茯苓 澤瀉各二升 郁李仁五升

雜法
補湯攻邪雜
方

吹咀佈一服一水椀煎至一半入生姜自然汁常服
無時從少至多服五七日後覓脹下耳治以白朮散

白朮

澤瀉各半升

為末並取三升茯苓湯調下或丸亦可服三十九並
在苓湯下之末治之法黃芪芍藥建中湯之類調以
養之平復之後忌房室猪魚鹽麪等物

本草大棗湯治四支腫滿

白朮三升

吹咀每服半升水一盞半大棗三枚拍破同煎至九
分去滓溫服日三服不拘時候

梅師治水腫不能服藥膏陸一升羊白六兩以水一斗煮

梅師治水腫不能服藥者用一升半日六兩以水一斗煮

開鬼門雜方

取六升去查和肉苁蓉作腫如常法食之商陸白者好
食醫治十種水氣病不差垂死者鱧魚一頭重一斤已
上者右熟取汁和冬瓜苕白作羹食之

治十種水氣病不差垂死青頭鴨一隻治如食法細切和
米并五味子煮令熟作粥空腹食之

子和鄆之營兵秋家小兒風水諸醫用銀粉、霜之藥

小便及墻飲食不進頭腫如腹四支皆滿煖若水晶家
人以為勉強求治于戴人戴人曰此証不與壯年同壯
年病水者或曰留飲及房室此小兒緣七歲乃風水証
也宜出汗乃置燠室以屏帳遍遮之令不見火若內火
見外火必昏暗也使火服胃風湯而浴之浴訖以布草

重覆之九三五重其汗如此水腫乃減五分減隔一二日乃依前法治之汗出腫減七分乃三汗而全減尚未能食以檳榔丸調之兒已喜笑如常日矣
本事治水氣羌活散

羌活

蘿蔔子各等分

右同炒香熟去蘿蔔子不用末之溫酒調下二分一日
一服二日二服三日三服取效

羅五皮散治他病差後或久痢之後身體面目支浮腫小利皮利脉虛而大此由脾肺虛弱不能運行諸氣、虛不理散漫於皮膚肌腠之間故令腫滿也此藥並宜服之

大腹皮

赤茯苓皮

生姜皮

橘皮

桑白皮

炒各等分

大腹皮 赤茯苓皮 生姜皮 橘皮 赤白皮 炒各等分

右件為末每服五小水一大盞同煎至八分去渣溫服

不拘時候日進三服

香蘇散治水氣虛腫小便赤澀

陳皮二切 防風已 木通 紫蘇葉各半斤

為末每服二分水二盞生姜三片同煎

外臺治水病供腫氣脹不消食干香蒿五十斤焙用濕者

亦得細剉納釜中水浸之出香蒿上每才煮使氣盡去

查清澄之漸微火煎令可丸服五丸如梧子大日三服

稍加之以小便利為度

梅師治水腫作坐卧不得頭面身体悉腫兩東引花桑枝

燒灰淋汁煮赤小葶苈空心食令飽飢則食盡不得吃

壯者岐削

兵部手集治小病初得危急冬瓜不限多少任吃神效無

比丹後去冬瓜性急久病与陰匿者忌之

丹十種水与冬瓜去穰納赤豈在內逐為丸

治痢日久津液枯四支腫言乾冬瓜薑土厚包五寸慢

熱去土取汁飲之應驗

羅白丸于治通身腫及單腹脹滿喘悶不快小便赤墻神效

輕粉半斤 粉霜研炒 硃砂研炒 滑石研炒

寒水石火燒研 折白丁香杵羅米炒

右件特輕粉滑石二味一處研自用薄紙裹了却更和

白麵作餅再裹前菓又用桑柴熟火燒以熟為度取出

与前四味一起和勻水浸蒸餅搗干為丸如芥豆大第一

日服二丸，煎生姜湯下，食前一服，第二日三丸，三
服，第三日四丸，三服，第四日五丸，亦一日三服，如覺小
便多時，腫漸減，便休服白丸子，如小便未多，更服一日。
二日加作六丸，佐一服，一日亦三服，腫消為效。如服藥
至第三日，四丸，三服，覺牙縫內痒痛，口氣時便用漱，口
藥貫衆半斤，黃連半斤，二服為散，每服一分，水一盞，煎
至七分，入龍腦少許，攪勻，溫漱之。每日煎一盞，漱，口如
腫消，忌鹽、魚、肉、冷、硬、果、食，只服粥。百日脈差，如臧府秘
瀉氣，實先服治腫海藻散。此藥親用，救人甚多，神效。

海藻散 方見本門積氣條

仲牡礪澤瀉散治腰已下有腫也 方見傷寒

河間葶藶丸治一切水濕氣通身腫不可帶者

人參一兩

苦葶藶

四兩於鍋內火上炒黃色為度

二味同為末用赤白和丸梧子大每服十五丸黃藥白皮湯下日進三服空心食前屢試多驗

羅聖靈丹治脾肺有濕喘滿腫感小便赤瀉

苦葶藶

炒

木香

檳榔

茯苓

麩

防己

木通

人參

已上各二分半

照二分半也

為細末用赤白為丸如梧子大黃藥白皮湯下

垣赤茯苓丸治脾濕大過四肢腫滿腹脹喘逆氣不宣通小

便赤瀉

葶藶

四兩

防風

二分

赤茯苓

二分

木香

五分

葶藶四升 防風二升 赤茯苓一升 木香五分

為末，粳米丸，如梧子大，每服三十九，黃芩白皮湯下，食前。

續隨子丸治通身虛腫喘悶不快。

人參 漢防己 赤茯苓 麩蒸 木香 半升

賓郎 半升 葶藶 煨 續隨子 五升 海金沙 五升

為細末，粳米丸，如梧子大，每服三十九，黃芩白皮湯下，食前。

海潔古老人方治小腫。

右用蜈蚣去頭尾，與蒲萄心同搗，露七日，曝干，為末，淡。

酒調下，暑月濕用尤佳。聖惠方治小腫喘促不得卧，蜈。

蚣五枚，干薑末，食前湯調，半升，七至一升，小便通效。

仲夫小病人目下卧，蚕面目鮮澤，脈伏，其人消渴，病小腹。

大小便不利，其脈沉絕者，有水，可下之。

脈伏脈實 仲有積者 其 特遠者 輕劑

世治水腫

薏苡仁根君

木香

賓即

黑牽牛

為末酒調服炒

外臺療水病腫鱧魚一頭極大者去頭尾及骨惟取肉以
水二斗赤小豆一大升和魚肉煮可取二升已上汁生
布绞去渣頓服盡如不尽分為三服後服温令暖服訖
當下利、尽即差

本草治身体腫滿水气急卧不得郁李仁一大合搗為末
和麦麩搜作餅子与吃入口即大便利气便差

外臺有人患腫脚肤腫漸上膝足不可踐地大水頭面通
身腫脹滿苦瓠白蘆实搯如大頭立以麩裹煮一沸空

身腫脹滿者飲白蘆實按如大頭立以麩裹煮一沸空

心眠七枚至午當出水二斗三日水自出不止大瘦乃

差三年內填口味也一方治腫者蒲壳以鹽拌壳上燒存性為末煎產便一盞調服差〇苦飲須寧

屬醫細理妍淨者不午有毒

世三腫散治浮腫用陳蘿蔔種去瓢陳蒲壳去瓢烏豆一合

同煎服即時退

羅無瑕丸治脾濕橫流四支腫滿

大腹皮二升 木香半升 莢蓬 京三稜

賓郎 郁李仁各一升

為細末炒麥蘖麩糊為丸如梧子大生姜湯下

本事治腫滿小便不利茯苓散

郁李仁四升 賓郎二升 赤茯苓 白朮

甘遂 切片炒各一升

為細末每服一升姜枣湯調下

治十種水病并根源証狀方法

一青水先從左右肋腫根在肝 大戟

二赤水先從舌根起根在心 葶藶

三黃水從腹腫起根在脾 甘遂

四白水從脚腫起根在肺 藁本

五黑水從陰外腎腫起根在腎 連翹

六玄水從面腫起根在外腎 芫花

七風水從四肢腫起根在腎 澤瀉

八石水從腎腫起根在膀胱 桑白皮

九高水從滿腹腫起根在小腸

巴豆

十氣水或盛或衰根在腹

赤小豆

右十種腫病各有根源種不同看十種病根除一味

倍多餘九味等分逐味用製者依法脩治焙為細末煉

蜜為丸用赤茯苓湯吞下三丸不拘時候其丸如梧子

大每日三服忌鹽一百二十日緣鹽能化水故也外忌

魚鮓麩食一切毒物及生冷等物及不得行房此病

去生甚遠取死將近或得良醫者得余此方慎勿輕

賤雖千金難換但余欲天下人安故也

用此方葭藎之後更用後來捕藥

補藥方

積固者峻劑

肉桂 去初皮

青皮 去皮

乾姜 湯洗

莪朮 醋煮軟

川芎

白豆蔻

檳榔

桔梗 各等分依法制治

右等分脩治為末每服三分百沸湯點服空心前日午
食前晚食前各一服前項二方治水腫病余見鄉人有
患水疾半年後得名醫獲差余遂百計求此醫人多酬
黃白之物遂得此二方余試用之百發百中獲濟者無
數世間所有水病方藥多出此二方之右者
河間三花神祐丸治中滿腹脹一切水濕腫滿

甘遂

大戟

芫花

醋拌濕炒各半升

牽牛子

大黃 一斤 輕粉 一斤

右為末酒水為丸如小豆大初服五丸每服加五丸溫

右為末酒以為丸如小豆大初服五丸每服加五丸溫

下每日三服加至快利悶極甚者便多服則頓攻不開

轉加痛悶則初服二丸每加二丸加至快利為度賈同

知云乃神仙奇絕之藥也得利止後服

恒海金沙散治脾濕大過通身腫滿喘不得卧及腹脹鼓

牽牛 一刃半 一半 生一半 熟 甘遂 半刃 白木 一刃 海金沙 三刃

為細末每服二外並倒流水一盞調下食前得宣利止後服

羅海藻散治男子婦人通身虛腫喘滿不快

海藻 剉碎 大黃 大戟 續隨子 去壳各一刃已上四味好洗 二盞浸一宿取出晒干

甘遂 麩炒黃 色一刃 白牽牛 生取頭末 秤刃 白膩滑石 半刃

肉荳蔻 一介 青皮 橘皮 去白各半刃

右共前藥都一系杵為細末大人每服二外如氣實者三

錢氏保命

虛字

有痰熱宿食

及不同吐瀉

為實

脈微肢冷及吐

瀉後者為虛

氣腫

濕腫

熱腫

寒熱

平
分半明冷茶清調下至夜時所下水三二行腫減五
分
服一冬五歲以下者半冬婦人有胎者不可服

保錢氏論虛實腹脹實則不同吐瀉久病之後亦不同下
利脹而喘急問亂更有痰有熱及有宿食不化者宜大
黃丸白餅子紫霜丸下之更詳別大小便如俱不通先
利小便後利大便虛則久病吐瀉後其脈微細主目胞
胞虛腫手足冷宜先與塌氣丸後與異改散及和中丸
益黃散和其氣因其氣而腫者橘皮黃丸因濕而腫者
黃黃芪湯調五苓散因其熱而腫者八正散又一法燥
熱於肺為腫者乃絕水之原當清肺除燥水自生矣於

熱腫

熱於肺為腫者乃絕水之原當清肺除燥水自生矣於
梔子豉湯加黃芩如熱在下焦尿清不得使氣化者宜

益冰而臥自化如黃連黃柏是也

垣中滿分消丸 方見脹門

丹熱小腫

梔子 五分

木香 五分

白朮 京

急流水煎服

又方山梔子去皮取仁炒搥碎米飲湯送下手勺如胃

脘熱病在上者帶皮用

本事治遊風攻頭面或四肢作腫塊知母湯

知母 牙

麻黃

黃芪

甘中

羌活 母半

白朮

枳壳

各半升

寒腫

右初末每服四冬水一盞半牛旁子百粒研碎至七

分温日三中服生是附覺冷不用牛旁子。有一老母年七十

中風手拘挛平日止是附子之類扶養一日面浮腫手

背亦腫尋常有一國醫供藥診之是水病欲下大戟牽

牛以導之其家大驚憂惶召予議之予曰素問稱面腫

曰風之胫腫曰水此服附子太過正虛風生熱之証咽

必噎塞留中不利誠予乃進升麻牛旁玄參湯維以知

母湯三日即便愈

予擇復元丹次三焦不寧氣脉閉塞樞機不通喘息奔急

水气盈溢滲透經絡皮膚溢滿足胫尤甚兩日下腫腿

腹間冷口若舌干心腹堅脹不得正漚、則咳漱小便

不通夢中虛驚不能安卧

独活

炮二升

南木香煨

茴香炒

川楝

炒汗出

羌活

厚朴

去皮姜制

白朮炒

陳皮

吳茱萸炒

桂心各升

澤瀉

一升半

肉豆蔻煨

檳榔

各半升

為末糊丸如梧子大每服五十九丸葱蘇湯下不以時節
此藥世傳屢驗未嘗示人要當屏去諸藥一日三服先
次後利如頃次乃腫消喘止法當禁慾并絕鹽半年乃
不再作

本事治^脾丸虛浮腫實脾散

大附子

不

小果

干姜

各升

甘草一升

大腹皮

去皮

木瓜

去穢切片一个

諸熱是也

二曰大熱經云諸病附腫皆屬於火又云少陰司天火淫所勝氣下臨肺氣上從寒熱附腫又云少陰司天火淫所勝民病皮膚病色變黃赤傳而為水身面附腫腹滿仰息又云少陰之復渴引水漿化而為水傳為附腫又云少陰司天客勝甚則附腫以諸寒是也

三曰寒經云寒勝則浮是也

四曰燥經云少陰明所至為浮虛是也

素黃帝問曰少陰何以主腎岐伯對曰腎者至陰也少陰者盛水也肺者太陰也少陰者冬脉也故其本在腎其末在肺皆積水也帝曰腎何以能聚水

寒浮

燥浮

針灸上

水俞十七穴

而生病岐伯曰腎者胃之關也開門不利故聚水而從
其類也上下溢於皮膚故為跗腫者聚水而生病也帝
曰諸水皆生於腎乎岐伯曰腎者牝藏也地氣上者屬
於腎而生水液也故曰至陰勇而勞甚則腎汗出腎汗
出逢於陰內不得入於藏府外不得越於皮膚客於
玄府行於皮膚傳於跗腫本之於腎名曰風流所謂玄
府者汗空也帝曰水俞五十七處者是何主也岐伯曰
腎腧五十七穴積水之所聚也水所從出入也尻上五
行、五者此腎俞故水病下為跗腫大腹上為喘呼不
得臥者標本俱病故肺為喘呼腎為水腫肺為逆不為
分為相輸俱受者水氣之所畜也

肺腎之標本其上下分為相輸應之病而俱受

者緣此二藏乃水一伏兔上二行、五者此腎之街也三
陰之所交結於脚也踝上各一行、六者此腎脈之下
行也名曰大衝丸五十七穴者皆藏之陰絡也水之所
客也水熱六論

尻上五行行五

脊中一

懸樞一

命門一

腰俞一

長強一

大腸俞二

小腸俞二

膀胱俞二

中膈俞二

白環俞二

胃倉二

盲門二

志室二

胞育二

秩邊二

伏兔上各二行以五

中注二

四端二

氣穴二

大赫二

橫骨二

外陵二

大巨二

水道二

歸來二

氣街二

皮膚有血絡
尽取之

三陽明大腹
水腫

踝上各一行，六

大鍾二

復溜二

陰谷二

照海二

文信二

築賓二

灵風水膚脹為五十七痛取皮膚之血者盡取之

四時氣篇

刺灸取腫有五法

其一取腎膀胱經前篇云五十七穴者是取其二經之

穴也又徑云腎病者腹大胫腫取其經少陰大陽血者

是取其二經之血也

其二取血絡徑前篇云取皮膚之血者尽取之是也

其三取胃經云胃足陽明之脈所生病者大腹水腫視

盛虛熱寒陷取之

盛虛熱寒陷之也

其四取委陽徑云三焦病者不得小便溢則水取委陽
其五箇針取水先以鉞針一之已刺而筒之引針而納
之實而後出以盡其水必堅末緩則煩惋末急則安
靜問曰一取之水盡乃止也
針灸下撮要浮腫

分水中腕各灸之內廷行間臨泣各寫之灸

東陽水氣皮痛不可近衣小腹敷然小便黃身閏

章門屋翳灸陰交石門刺之

華陀外腰水腫先從腰腫起

肝募水分

內中水腫面痿黃

胃脘通谷氣海水分

胸中水種根在心以赤

心俞

巨關

館

氣海

腹中水腫從脾起以黃書

脾俞

胃脘

圖

水分

肺端水腫從胸起以白

肺俞

肝募

江

云心水腫從心起

白環俞

水分

中

四肢水腫變身浮

膽募

兩脇水腫四支枯瘦從脇腫起

章門

期門

小腸水腫從臍腫起

氣海

保五脉論五水灸法

書

青水灸肝井

弦脉

赤水灸二榮

洪脉

黃水灸脾俞

緩脉

白水灸肺徑

瀉脉

黑水灸腎合

沉脉

甲身腫關門主之

水腫脹水鍾三里主之

風水膝腫巨虛上廉主之

風水面附頰黑解溪主之

脾胃

任咏

風面水附腫衝陽主之

水中畜飲胸脇支滿刺陷谷出血立已

面附腫上星主之先取諍諤後取天牖風池

水腫人中尽滿唇及死水溝主之水腫大脬平灸脬中

無理不治

素目裏微腫如卧蚕之状曰水

目腫曰水

仲病下利後渴後食飲水小便不利腹滿目腫者何也答

曰此法當病水者小便自利及汗自出者當愈

跌陽脉當伏今反數本自有熱消穀小便數今反不利

此欲作水

論目
目腫曰水
足腫曰水
利後渴後利
而腫者水
冲陽脉數小
便秘者水

寸口浮塵中
陽浮數者

水狀

風水脈浮

風

皮水脈浮不
惡風

此欲作水

寸口脈浮而遲浮脈則熱遲脈則潛熱潛相搏名曰沉

跌陽脈浮而數浮脈則熱數脈則止熱正相搏名曰伏

沉伏則搏名曰水沉則絡脈虛伏則小便難虛難相搏

水走皮膚即為水矣

素頸脈動喘疾效曰水 平人氣象論

仲凡水其脈自浮外証骨節疼痛惡風針經論疾診尺篇
視人之目窠上微

瘡如新卧起之狀其腔脈動時按其手足上宜而不
者凡水腫起也又仲景之大陽病脈浮而緊法當骨節疼

痛及不疼身體反重而酸其人不可渴汗出即愈此為風水
治法凡前陽虛條

皮水其脈亦浮外証胕腫按之沒指不惡風其腹如故

鼓不渴當發其汗又云渴而不惡寒者此是皮水蓋法
宜風水惡風不渴皮水不惡風而渴

假冷皮水不渴亦當發汗也 治法見前陽虛條

正水脈沉遲

石水脈沉不喘

黃汗脈沉著

熱

五藏水

正水其脈沉遲外証自喘

石水其脈自沉外証腹滿不喘大奇論云腎肝并沉為石水并浮為風水

黃汗其脈沉遲身發熱胸滿四肢重面腫久不愈必致

癰膿又云身腫而冷狀如血周痺胸中冥不能飲食及腹

仲心水者其身重而少氣不得卧煩而躁其入水腫○肝

水者其腹大不能自轉側脇下腹痛時津液微生小

便續通○肺水者其身腫小便難時鴨溇○脾水者

其腹大四肢苦重津液不生但苦少氣小便難○腎水

者其腹大胛腫腰痛不得溺陰下濕如牛鼻上汗其足

逆冷面反瘦

無擇大抵浮脈帶數即是虛寒潛止亦其間必沉伏沉

面黑者是腎

論生死

長里缺盆臍

是背比且平

治

脈澀者

死

脈洪實生微

細死

禁忌

考誤

伏則陽虛附實為水必矣

附面龐然浮腫脊痛其色焙黑多汗惡風者屬腎風治身諸虛

諸唇黑則傷肝缺盆平則傷心膈出則傷脾之一平則

傷腎背平則傷肺凡此五傷必不可治也

仲脈得諸沉當責有水身體腫重水病脈出者死無擇云

大抵浮脈帶微即是虛寒潛止於其間久必沉伏；則陽虛陰實為水必矣

脈水病脈洪大者可治微細者不可治

水病腹大如鼓脈實者生虛者死

水病以夜半死全文見論生死

仲諸病水者渴而下利小便數者皆不可發汗

素帝曰有病腎風者面附龐然壅言於言可刺否岐伯曰

無擇大抵浮脈帶微即是虛寒潛止於其間久必沉伏沉

虛病誤刺
成目水

虛不當刺不當刺而刺後五日其氣必至帝曰其至何
如岐伯曰至必少氣時熱時熱從胸背上至頭汗出手
熱口乾苦渴小便黃目下腫腹中鳴身重難以行日事
不事煩而不能食不能正偃正偃則咳病名曰目水論
在刺法中帝曰願聞其說岐伯曰邪之所湊其氣必虛
陰虛者陽必湊之故少氣時熱而汗出也小便黃者少
腹中有熱也不能正偃者胃中不和也正偃則咳甚上
迫肺也諸有水氣者微腫先見於目下也帝曰何以言
之岐伯曰水者陰也目下亦陰也腹者至陰之所居故
水在腹者必使目下腫也真逆上氣故口苦舌乾臥不
得正偃正偃則咳出清水也諸水病者不得臥則驚

得正偃正偃則咳止清水也諸水病者不得用則驚

驚則效甚也腹中鳴者病本於胃也薄脾則煩不能食

食不能下者胃腕革必身重雖以行者胃脈在之如月

子不來者胞脈閉也胞脈者屬心而絡於胞中今氣上

迫肺心氣不得下通故月子不來也 評熱論

仲問曰病者苦水面目身體四支皆腫小便不利脈之不

論言水反言胸中痛氣上衝咽狀如炙肉當微熱喘審

如師言其脈何類師曰寸口脈沉而緊沉為水緊為寒

沉緊相搏結在閉元始時當微年盛不覺陽衰之後榮

衛相干陽損陰盛結寒微動腎氣上衝咽喉塞噎脇下

急痛醫以為屈飲而大下之氣擊不去其病不除後重

吐三胃家虛煩相燥欲飲水小便不利水穀不化面目

胸癢氣冲咽

咳喘而陣者

非水

已下不利

小便

宜治冲氣

喘

辨盧砥鏡
水脹說之非

手足浮腫又与葶藶丸下水當時如小差食飲過度腫
復如前胸脇苦痛家苦奔豚其水揚溢則浮咳喘逆當
先攻擊衝氣令止乃治咳、止其喘自差先治新病、
當在後

丹盧砥鏡水脹辨。內經曰諸氣憤鬱皆屬於肺諸濕腫
滿皆屬於脾諸腹脹大皆屬於熱蓋濕者土之氣土者
火之子故濕每生於熱、氣亦能自濕者子氣感母濕
之變也凡病腫皆宜治濕為主所挾不同故治法亦異
類例治腫以治水立說而欲導腎以決去之豈理也哉
脾土衰弱內因七情外傷六氣失運化之既清濁混淆
鬱而為水類例以為本末皆隸於肺腎胃三者而不及

鬱而為水類例以為本末皆隸於脾胃三者而不及

脾下文維以肺金盛而生水以液妄行氣息閉樞機壅
而為腫夫脾土受病肺為之子焉有自盛而生水者哉
若為腫之水果生於肺金之清氣則滋長腎陰奉行降
令為生化之原得病腫之有今滲透徑絡注流溪谷皆
滿腐之氣窒碍津液久灌入遂道血亦化水而欲藉
脾土以制之導腎氣以利之不思脾病則肝木未侮子
氣亦衰木寡于畏脾欲不病不可得矣治法宜清心徑
之火補養脾土金運化之戕肺氣下降滲道開通敗濁
之氣其稍氣者復回而為氣為血為津液其敗濁之甚
者在上為汗在下為溺以漸而分消矣今不明言而曰
制水燥水得非白圭以隣國為壑乎徑言腫病曰津液

表裏
潔淨府

先郭而致而不生於脾金之盛也明矣又言氣拒于內
氣耗于外責其不能滲運敗濁耳又云開鬼門潔淨府
鬼門膚腠也屬肺淨府膀胱也屬腎之府有導腎氣之
說註文明言陰精 指腎氣果可導乎仲景謂治濕利
小便即經中潔淨府之意苟以清淨為腎而導之果於
徑竟有合乎錢仲陽以腎無馮法其可輕易導之乎或
曰徑言疏滌五藏非導腎歟予曰此兩上文五陽已布
而言若鬼門開矣淨府潔矣五宮之陽氣條布彼敗濁
之氣自然疏導滌除於腎氣何其昌

胎前水腫

雲岐防已湯治胎前脾虛通身浮腫心痛腹脹喘
促小便不利

防已 芍藥 白皮 赤茯苓 紫蘇 蘇子 蘇葉 各一兩

防已 芍藥 赤茯苓 紫蘇莖葉 各一升

為初末每服四升姜四片水同煎食前

葶藶散治妊娠遍身洪腫

葶藶子 白朮 茯苓 芍藥 郁李仁 各一升

為初末水六升煮取二升分三服小便利即差

又方

澤瀉 葶藶各一升 茯苓 枳殼 白朮 各六升

細切以水六升煮取二升半分溫二服

子母治妊娠從脚上至腹腫小便不利微渴猪苓末以

熟水服方寸七日三服

母子腫多濕用山梔一撮米飲吞下

大法
汚血

產後水腫

丹產後水腫必用大補氣血為主少佐以蒼朮茯苓使利
大全大調經散治產後腫滿喘急煩渴小便不利

大芫

一丹半
炒去皮

茯苓

真琥珀一不重

細末濃煎烏豆紫蘇湯調下

產後四支浮腫者敗血循經流入四支還不得腐如水
故今四支腫面黃但服小調經散血行腫消則愈

沒藥

琥珀

芍藥

當歸各半

細辛

麝香各半

細末每服半小姜汁酒各少許調停服

虛實
體虛者溫熱

丹婦人產後浮腫小便少口渴寒以無力脉皆沉此體虛

体虛有濕熱
丹婦人產後浮腫小便少口渴惡寒無力脈皆沉此体虛

而有濕熱之積必上焦滿悶宜補中通水行氣可也

白朮 二寸半 陳皮 一寸 川芎 半寸 木通 六分 茯苓 三升

下與点丸廿五丸

大舍奪寬散治產後虛腫喘促利小便則愈

生姜 取汁 白麵 三升 半夏 七升

生姜汁搜麵累半夏為丸餅子煨焦熟為末水調一

盞小便利為效

潔如產後風寒在表面目四肢浮腫宜局方中七聖丸白

湯下日加以利為度 七聖丸方見痔

如浮腫添喘嗽加木香實即倍之謂氣多也

如浮腫加頭痛昏冒加羌活川芎謂風多也

潔古用七聖丸下法

熱

寒

肢寒高利不
效為寒

如只浮腫作七聖丸本方服之

垣中滿分消丸方見脹門熱條用四物等湯吞之

杜張宣微時侍寵產後半月忽患浮腹急召產科醫治經

半月不差疾勢轉劇召杜治之杜至曰諸醫作何病張

曰皆云水氣浮腫杜曰非也且水氣發咳嗽小便清是

也今愛寵小便不清不作咳嗽惟手足寒乃血虛藏氣

寒不通流而生浮腫遂用益血和氣藥治之旬日病去

七八徑半月全愈所用之藥乃靈苑方牡丹散也其方

云治血藏風虛冷今京師產科家多用此藥治

疾如神更名曰損金湯者是也

牡丹散方見產後驚悸門

生丹散方見產後驚悸門

大全加減吳茱萸湯治婦人歲虛宿挾風冷身面虛浮等

疾詳入否

吳茱萸 一分半 苦梗 干姜 甘草 麥門冬

防風 半夏 細辛 當歸 赤茯苓

牡丹皮 桂心 各半

為粗末每服四升水盞半煎至七分去渣會前熱服

雜方

丹虛後風腫水腫擇蘭防已等分溫酒調下二升如不能

飲者醋調下亦可 張氏方

先腹大後四支腫為脹 少腹脹胎前脹

產後脹

或独腹大四腫肢不腫者治法同

大法

膚脹宜溫中

行濕

鼓脹宜補虛

行濕

時減宜溫不減

宜下

虛滿芩同蒼桂

芍收之

芩擇附子萊苳湯治寒客皮膚穀，然而堅腹大身腫按

之陷而不起色不變病名膚脹一劑未知再作

大附子

一个重七斤者
生去皮脂半破

萊苳二升

以生姜一升切水二椀煎至一椀絞去渣分三服空肚溫

服次日將前附子破作四片再用萊苳二升姜一升如

前煎服等三日後將附子作八片如前煎

治鼓脹法並見後行濕寒熱氣血諸条皆其法也

仲腹滿按之不痛為虛痛者為實可下之

腹滿時減復如故此為寒當與溫藥

腹滿不減減不足言當瀆下之宜大承氣湯

海脾虛滿者黃芪湯芍藥停濕

實滿不運者
朴蒼散之

主於補虛行
血濕

脾胃實滿者平胃散 蒼朮 泔濕

東垣云腹脹滿氣不轉者加厚朴以破滯氣腹中芬悶此
非腹脹滿乃散而不收可加芍藥收之是知氣結而脹
宜厚朴散之氣散而脹宜芍藥收之

丹敷脹大補中氣行濕此乃脾虛之甚必須遠音樂斷厚
味

大劑人參

白朮

佐以陳皮

蒼朮

茯苓之類

有血虛者四物行血隨証加減

凡補氣必帶厚朴寬滿

腹脹必少佐厚朴蓋厚朴味辛以氣聚於上焦故也氣
不運加水香氣若陷下升麻柴胡以提其氣水腫當補

飲食房勞致
脾土受傷不運
氣血化於濁鬱
為濕蒸生脹

脾為主白木茯苓陳皮佐之

鼓脹論○心肺陽也居上腎肝陰也居下脾居中亦陰

也屬上經曰飲食入胃遊溢精氣上輸于脾氣散精

上歸於肺通調水道下輸膀胱以精四布五經並行是

脾具坤治之德而有乾健之運故能致心肺之陽降腎

肝之陰升而成天地交之泰是為無病之人今也七情

內傷六淫外侵飲食失節房勞致虛脾土之陰受傷輸

轉之官失胃雖受穀不能運化故陽自升陰自降而成

天地不交之否於斯時也清濁相混墜直壅塞氣化濁

血痰化痞鬱而為熱苗而久氣化成濕熱相生遂

成脹滿徑曰鼓脹是也以其外雖堅滿中空無物有似

於鼓其病膠固難於治療故又名曰蠱若虫侵食有蠱
之義驗之治法理宜補脾又須養肺以制木使脾無賊
邪之慮滋筋水以制火使肺得清化之令却鹽味以防
助邪斷妄想遠樂音以保母氣無有不妥醫者不察病
起於虛急於作効術能希賞病者苦於急脹喜行利藥
以求一時之快不知寬得一日半日其腫愈甚病邪甚
矣真氣喜行利藥以求一時之快不知寬得一日半日
其腫愈甚病邪甚矣其氣傷矣去死不遠古方惟禹余
糧丸又名石中黃丸又名紫金丸制肝補脾殊為切當
亦須隨証亦須順時加減用之

子友俞仁井儒而醫得家難年近五十得此疾自制禹餘

糧丸服之予診其脈弦瀦而數曰此丸新制煅煉之火
邪尚存溫熱之藥太多宜自加減不可執方俞笑曰今
人不及古人此方不可加減服之一月口鼻出血色黑
骨立而死

又楊兄年五十性嗜酒有瘡半年患脹病自察必死求
治診其脈弦而瀦重臥大瘡未愈手足瘦而腹大如蛛
蟻狀遂教以參朮為君當歸川芎芍藥為臣陳皮黃連
梔朮茯苓為佐生甘草些少作濃湯飲之一日定三帖
後亦嚴守戒忌一月後瘡曰汗而愈又半月小便長而
脹愈中間雖少有加減大意只是補氣行濕

又陳氏年四十餘性嗜酒大便而見血於春間患脹色黑

治脹必須補
氣補血為主

而腹大形如鬼診其脈數而瀉雖似弱予以四物加黃
連黃芩木通白朮陳皮厚朴生甘草作湯與之一月而
愈一補氣一補血余藥大率相出入皆獲以保天壽或曰
氣無補法子何補氣而獲也果有說以通之乎予曰氣
無補法世俗之言也以氣之為病痞悶壅塞似難於補
恐增病勢不思正氣虛者不能運行邪滯所客者而不
去所以為病經曰壯者氣行則愈怯者自而成病苟為
氣怯不用補法氣由何行或曰子之藥審則審矣何効
之遲也病者久在床枕必將厭子之迂而求之速効者
矣予曰此病之起或三五年根深勢篤欲求速効自
求禍耳知王道者能治此病也或曰脹病將終不可與

利藥邪予的知其不自度受病亦淺脾胃尚壯積帶不
固而又有可下之証亦宜畧與疏導予若授張子和瀉川
散禹功丸為例行遂故之策實所不敢

潘達可女年十九歲稟受頗厚患胸腹脹滿自用下藥

劑十數行時腫無減增三三以治診其脈皆大畧按即散

而無力全無數意予曰此有表証反攻裏當死賴稟受

好時又在室尚可挽回壽損矣急於四物湯加人參白

朮和白陳皮炙甘草並脹至半月後並不退又自用蘿

蔔種根並深淺兩度時腫稍增予曰表病攻裏已自難

矣今又虛其表事急矣於前藥去地黃芍藥加黃芪倍

白朮大劑濃並湯飲又吞人參白朮丸十日後如初病

時又因吃難化物自利矣參朮少加陳皮為佐肉豆蔻
呵子為君山查子為臣粥和作丸吞之又四五十帖而安
一男子年四十餘患瘧久而腹脹脉不數而微弦重取
則末不滑利輕重又皆無力遂與索氏三和湯三倍加
白朮入姜汁服之數服而瘧愈小便利二三日腹稍減
隨又小便短少予作氣血丹虛於前藥入人參牛膝當
歸身尾大作劑料百余而愈

索氏三和湯三倍加白朮方

白朮 二分 厚朴 四分 陳皮 木通 檳榔 各六分

紫蘇 甘草 各三分 海金砂 二分 大腹皮 白茯苓

枳殼

水煎服

海藏調胃白朮澤瀉散治痰病化為水氣傳變水鼓不能食

白朮半斤 澤瀉一升 芍藥一升 陳皮一升 茯苓一升

生姜一升 木香一升 檳榔一升

為末治腹腫如神

若心下痞加枳實

若下盛者加牽牛

仲心下堅大如盤邊如旋輪水飲所作枳朮湯主之

枳實七枚 白朮二升

二味以水五升煮取三升分溫三服腹中與即當散也

羅真定五君用年一十九歲病積在臍連覆脇如覆杯腹

目瞤滯成脹者補氣消積

者補氣消積
羅真定五君用年一十九歲病積在臍連腹脇如覆極腹

脹如鼓多青絡脈喘不絕臥時值暑而加之自利完較
日晡熱潮夜有盜汗以危急求治予往視之脈得浮
數按之無力謂病家曰九治積非有毒之劑攻之則不
可令脈虛弱如此豈敢以常法治之遂用分滲益胃之
劑數服而便清自調雜以升降陰陽進食和氣而腹大
減胃氣稍平間以消之劑之不月余良愈先師嘗曰潔
古老人有云養正積自除譬如滿座君子中有一小人
自無容他今令真氣實胃氣強積自消矣

十一婦人三十六歲家貧多勞性偏急自七月斷經至八
月小腹下有一塊偏佐如拳大有時塊起即痛作伏則
痛減至半月後腹漸腫脹食減平時三分之一無力夜

遇發熱天明即稍退其脈十月間得虛微短弱牆左丸
甚初與白朮一斤帶白陳皮半斤作二十帖熬服以三
聖膏貼塊上徑宿則塊軟再宿則塊小近下一寸旬日
後食稍進熱減半稍有力又與白朮一斤帶白陳皮半
斤酒當歸身半斤木通三升重每帖研批仁九粒盡此
齊病悉除

一婦人五十餘歲素好怒日食燒猪肉次早面脹飽不
思食身倦急六服沉瀆獨左豁大予作体虛有痰虛氣
為痰所隔不得降當以補虛利痰藥為主每日早以二
陳湯加參朮大劑與一帖服後探令吐出藥辰巳時後
與索氏三和湯三倍加白朮三帖至睡後以神祐七丸

以撓其痰去牽牛者如此服至一月而愈
金壽一婦人七十一歲好濕面至此時得帶下病亦是
寒淋瀝工与荷花鬢菜胡等藥散熱而下愈多工与縮
砂豆菟藥以其食少也腹漸脹滿氣喘滿工又与葶藶
葉不應又与禹余糧丸病愈甚工又与崇土散予脈之
毋手洪濡輕則弦脹而滑實至是喘息甚不得卧此本
是濕而釀成濕在足太陰陽明二徑水穀之氣為濕所
抑不得上升遂成帶下理用升舉之劑以補氣和血次
之而工及與瀉燥宜其展轉身病遂与人參生肺之陰
以拒火毒白朮以補胃氣除濕執行水道桃仁去汚生
新郁李仁行通水以通草佐之犀角屑解食毒消腫悶

頓擲怡再高之氣作濃湯吞下保和丸藥又疑素養養
有肉積加阿魏小丸同嚙之四五日後氣漸消腫漸下
又加補腎丸以生腎水之真陰又丹三日後漸有向
反勢而得睡食有味矣又丹日後加真點丸以驅逐肺
泉積丸

丈夫脾有熱腎有虛胃有積得種疾或進或退口乾或
氣喘醫連月不退脈軟而細以其形肥不以為忌

白朮四分

芍藥

地黃二分

連翹

當歸二分

青皮二分半

人參

木通

羌活

黃芩二分半

甘草

紅花一分

分五帖前下保和丸

楊主首卅日瘡初安之後食豆腐齋飯成脹在臍上小
便赤少不思食口渴脈弦而濡此胃中有瘀血

蘇梗三分 木通 半斤 白朮 一斤 芩 半斤 枳實

芍 半斤 炙甘 二分 陳皮 半斤 朴 三分

研活人散下得和五十語人散即益元散也

丈夫氣上肚或脹膨此下虛所致

陳皮 五斤 人參 歸原 白朮 連翹 各三斤

地黃 芍 冬 二分 木通 一斤 甘 半斤

分五帖煎下保和丸

木香化滯湯

白豆蔻仁 橘皮 大腹子 白茯苓 縮砂 一斤

重可去性又善
行

人參一石 青皮 宿郎 木香 姜黃 冬石

白木一石 甘中多分 白檀二分 藿香葉二分 桔梗半石

為細末水一大盞二分 苜蓿一盞 煎服食可沸湯點

服亦得

又方治目積帶成脹皆以參朮升通等並易補虛行

祐神阿魏等丸消積所謂攻補並施者

小温中丸治脹是脾虛不能運化不可下

陳皮一石 白朮一石 香附一石半 半夏一石湯泡去皮臍

神曲一石炒 蒼朮一石炒 黃連半石炒 甘中三石

茯苓一石 鐵砂一石半醋炒紅

為末醋水各一盞打糊為丸梧子大每服七八十九白朮

六分陳皮一分生姜一片煎湯吞下虛甚加人參一分

冬用本方去黃連加厚朴羊兩忌口病輕者服此丸六

七兩小便長甚者一斤小便始長

無擇禹餘糧丸治十種水氣脚腫上氣喘滿小便不利

便是水氣悉皆未之

許學士及丹溪皆云此方治鼓脹之要藥

蛇含石

大者三月以新鉄鉞盛入炭火中燒蛇黃入鉞子一般通紅用鉞叩鉞子出便傾蛇黃入醋中候冷取出研極細末即止

禹餘糧 三兩

真針砂

五刀先以水淘淨極乾更以

用米醋二升就鉞內煮醋干為度却用鉞并藥入炭火中燒以鉞出鉞子研藥淨磚地上候冷研極細

以三物為主其以量人虛實入下項

治水多是耶轉惟此方三物既月大戟甘

遂芫花之比又有下項藥扶持故虛人老人可服

羌活

木香

茯苓

川芎

牛膝 酒浸

白豆蔻炮

土茴香炒

蓬朮炮

桂心

附子炮

乾姜炮

青皮去穢

京三稜炮

白茯苓

當歸 酒浸各半升

虛人老人全用半升壯實人減之

為末拌勻以湯浸餅揆去水和藥再搗極勻丸如

梧子大食前溫、白湯下三十九至石十九唯忌鹽

雖毫末許不得入口若無以為味即由病去後且以

醋少許調和食不能忌鹽勿服果欲去病切須忌鹽

但試服藥即於小便內旋去不動歲府病去日、三

眼薰以溫和調補氣血藥助之真神方也

丹脉堅實人壯盛者或可用攻藥便收拾白朮為主

壯盛人宜行澤

壯盛人宜行導
升脈堅實人壯盛者或可用攻藥便於拾白木為主

開鬼門行裏道

垣中滿治法開鬼門潔淨府開鬼門者發汗也潔淨府利

小便也又中滿者寫之於內謂脾謂有病當令上下分

消其氣下焦如積氣血自然分化不時洩滓穢如或大

實大滿大小便不利從權以寒熱藥下之或

及味厚之物膏粱之人人或食已便卧使濕熱之氣不

得施化致令腹脹滿此亦是熱脹也治熱脹分消丸主之

仲氣分心下堅太如盤邊如旋杯水飲所作桂枝去芍加

麻辛附子湯主之

桂枝 生姜 芍藥 甘草 附子 大棗 十二枚

麻黃 細辛 各二分 附子一枚炮

七味以水七升煮麻黃去沫內諸藥煮取二升分溫三服

當汗出如虫行皮中即愈

聖惠牛黃琥珀丸治水腫腹大氣息不通危急者應驗

牛黃

昆布

洗炙

海藻

洗炙各五分

牽牛炒

桂各刀

葶藶

炒紫色

枳實

況水者

琥珀各三分

為末七味另研葶藶如泥一處拌勻煉蜜丸如梧子大

每服十五丸米飲下以小便便利為度日再服河間方有

麝香龍膽無琥珀易名葶藶膏治法与此方同

仲腹湍口舌乾燥此腸胃間有水氣已枳藶丸主之

防已

枳實

葶藶熬

大黃各刀

四味末之蜜丸如梧子大先食飲服一丸日三服稍增

口中津液渴者加芒硝半兩

無擇葶藶丸治腫滿腹大四肢瘦小便瀉濁

甜葶藶

紙隔炒

薺菜根等分

為末蜜丸如彈子大每服一丸陳皮湯嚙下只三丸

小便清數丸當依旧已上葶藶樹目行濕

羅白丸子治單腹脹神效方見水腫門

潔治水氣盡服潔淨府楮實子丸

楮實子

一斗水三斗
熬成膏子

白丁香

一斗

茯苓

三斗

二味為末用楮實膏為丸桐子大不計丸數從少至

多服至小便清利為度及腹脹減為度後服中治丸

藥末治藥調養疎啟其中忌甘苦峻補其下五補上

宣丸

已上白丁香行濕口中治丸藥即白木散白木澤瀉
為末以茯苓苧湯調下也未治即黃芪建中湯之類並見水腫門

世治蠱用蛇蛻一枚去內腸入蜈蚣七個新瓦上焙干為

末丸酒服如無蜈蚣用縮砂七立

本草云蜈蚣味辛寒有毒主邪氣破癥堅

素黃帝問曰有病心腹滿且食則不能暮食此為何病岐

伯對曰名為鼓脹帝曰治之奈何岐伯曰治之以雞矢

醴一劑知二劑已帝曰其時有復發者何也岐伯曰此

飲食不節故時有病也雖然有其病已時故當病氣聚

於腹也

腹中論曰王註云鳴矢大利小便微寒用湯浸服之潔右云以瀉調服

矢大利小便微寒用湯浸服

無擇五積之而必心腹脹滿肝為肥氣心為伏梁肺為息

奔脾為痞氣腎為奔豚如斯之類從五積法治之可也

丹米怒八哥肚腫目濕氣起自五月能飲酒左脇有塊兩

足時有腫

氣壯目精成脹者但治積

多時有腫

白朮一分
三稜醋炒半分
木通半分

陳皮半分
大腹皮三分
海金砂半分

甘草二分
炒朴半分
桂三分

茵湯下保和丸廿丸温中丸三十柳青丸十

垣廣茂潰堅丸治中滿腹脹內有積堅硬如石形如盤令

人坐卧不寧大小便瀉滯上喘氣促面色痿黃

厚朴半分生
黃芩半分
黃連六分

草豆蔻半分
益智半分
半夏七分

蓬萊木二分
生甘草三分
紅花一分

柴胡三分
升麻二分
吳茱萸二分

澤瀉三分
麩三分
當歸梢半分

青皮二分

橘皮二分

葛根四分治虛弱

劉如麻豆大作一眼水二盞剪一盞去查稍熱服並

葶時用冰先拌濕並之忌酒濕麵服二眼之後中滿

減半正有積不消再立方名曰半夏厚朴湯

厚朴八分

蘇木三分

半夏一分

吳茱萸一分

肉桂二分

桃仁七分

紅花一分

京三稜三分

當歸梢四分

草豆蔻一分

蒼朮三分

白茯苓三分

澤瀉六分

猪苓四分

干生姜四分

升麻四分

柴胡三分

木香二分

蓮花青皮二分

橘皮二分

生薑一分

黃連一分

甘草三分

昆布少許

黃連一分

甘草三分生

昆布少許

葛根

三分不渴不用

麩六分計丸六分

右剉如麻豆大旋秤作一服依前法服之禁忌如前

服此藥二服後前症又減一半却於前藥中加減服之

厚朴半斤

黃芩二分

炙甘草半斤

吳茱萸一分

益智一分

宿砂一分

草豆蔻三分

半夏四分

廣茂四分

紅花少許

當歸梢一分

黃連一分

右剉如麻豆大作一服水二盞煎至一盞去渣稍煎

食前服忌苦寒藥泄大便又忌魚肉并肉鹽物房

事等項

丹心腹膨亨内多食積所致

南星 一刃半 半夏

瓜蒌仁 研和爛刃

香附 童便浸

連喬 半刃

黃連 姜炒 三刃

礞石 礞煨

茵陳 蒿子 半刃

麝香 少許

右用麵糊為丸

腹腫不寬滿食肉多

黃連 一刃

阿魏 半刃 醋浸搗細

作糊丸同温中丸用白朮湯送下

食肉多腹脹用三補丸加香附下甲炆餅丸三補丸方

見治寒熱條

世四炒枳殼丸治氣血凝滯腹内鼓脹

積氣

積氣
世四炒枳殼丸治氣血凝滯腹內鼓脹

枳殼四兩去穰切作牙指大塊子分四處

一又用蒼朮一又同炒黃去蒼朮

一又用蘿蔔子一又同炒黃去蘿蔔子

一又用乾漆一又同炒黃去乾漆

一又用茴香一又同炒黃去茴香

止用炒加殼為細末

又用前炒蒼朮蘿蔔子乾漆茴香四味用冰二

碗並至一碗去查煮麵糊為丸如梧子大每

服五十九食後米飲下

孫殿中丞某郎中妹十歲病腹脹色不變按之時大陷

心腹痞滿已月餘召予診視按甲乙証云三焦脹者

脉實脉伏積
頑者微利之

氣滿於皮膚中殼然石堅遂與仲景法治之厚朴生
姜二升細切半夏七升甘草半升人參一分每用藥
一升半水六盞分三服一日服之

潔奉一斗鍋內入水有口指用大戟并根苗蓋之遍盆合

之煮熟為度去大戟不用旋、吃每時不束、訣効如神

丹大戟為末束之白丸每十丸泄水少水劫快實者

恒况香交泰丸

治脹大便燥結脉沉之洪緩浮之弦者

沉香三升

枳殼炒二升

厚朴

姜制

吳茱萸

湯炮

白朮三升

白茯苓二升

澤瀉二升

陳皮二升

當歸三升

大黃酒浸一升

青皮 二斤 木香 二斤

為細末湯浸蒸餅為丸梧子大每服五十九加至七十八丸溫湯下食後微止利

沉香海金砂丸治一切積聚脾濕腫脹腹大青筋羸瘦

鬼証

海金砂 一斤半

沉香 二斤

輕粉 一斤

牽牛末 一斗

為末研独料絲如泥為丸如梧子大每服三十九加至五十九並百沸通心灯草湯至空腹送下更量虛實加減丸數取利為度

潔治腫木香散治水腫腹大如鼓遍身皆腫

木香 一斤

白牽牛 各等分

細末每猪腰子一双批片摻末在內煨熟空心服之
如食左腰子則塌左肩臂如食右腰子塌右臂如腫
不能全去於肚上遠睛滿腹塗甘遂細末却飲甘中
水少許其腫便去也 已上沉香木香法

竹香素丸治蠱病氣蠱有十種苦丁香為細末用熟素
肉為丸如梧子大每服三十丸煎素湯送下空心服
之立愈三服

仲病腹滿黃熱十日脉浮而數飲食如故厚朴七物湯生之
厚朴半斤 甘草 大黃各三寸 大棗十枚 枳實五枚

桂枝二寸 生姜五寸

七味以水一斗煮取四升溫服八合日三服嘔者加半

寒熱

丹溪專主濕

東垣有寒有

外一有金多屬

內傷不足之虛

夏五合○下利去大黃○寒多者加生姜至半斤
右下脹諸方蓋本於徑所謂下之則脹已之旨也

丹溪治脹專主濕熱治法見前補虛行濕條

恒諸腹脹大皆屬於熱論○此乃八益之邪有金之証自

外而入是盛寒以之邪傳入於裏寒變為熱此胃實乃

日晡潮熱大渴引飲讖語是太陽陽明併病大實大滿

者大瀉氣湯下之少陽陽明微滿實小瀉氣湯下之內

徑曰下之則脹已此之謂也熱論云寒傷變為熱故下

之不脹者以明寒因寒用故曰下之則脹已非陰盛生

內寒胃寒脹滿之病假令瘧疾為脹滿亦有寒脹熱脹

亦是尺之邪氣傷暑而得之不即時散而至秋散者何

也暑月皆時助正氣故邪不能發至秋暮暑氣不絕瘧疾作矣知其寒也局方用交解飲子者是也知天之邪氣雖有金病瘠瘡猶已為寒况不足病為脹滿者乎是知腹脹多為寒病也何以言之脉經云胃中寒則脹滿靈樞經云夫飲食不節起居不時未傳寒中又云腹脹滿胃脘當心而痛上支兩脇高咽不通食飲不下取胃之三三里又云濁氣在上則生腹脹灵樞經云脹即三陽三陽者以太陽寒水為脹也內經通平虛實論說腹暴滿按之不下取足太陽經絡者胃之募也正同又云腹腹滿膜脹支葦肚脇下厥上胃過過在太陰少明此乃寒乃濕鬱遏又云太陽之厥則腹滿膜脹後不利不欲

寒乃濕鬱過又云太陽之厥則腹滿腹脹後不利不欲

食、則嘔不得卧按內經所說寒脹多如說此老大但

畧舉其端耳病者不悟寒脹之多一切脹滿病作熱治

之多用三花神祐丸大黃牽牛之類下之或藥病不相

應立致大折由是論之當從吳樞素問乎當從俗醫胸

臆之論乎今立治之中滿腹脹寒脹一方熱脹一方評

而用之使上下分消其氣也中滿分消陽治寒脹分消丸
治熱脹二方並見後條

靈胃中寒則腹脹胃中寒腸中熱則脹而且泄師傳篇

適寒涼者脹下之則脹已五常政論
少九方見脈實條

陰并於下則足寒足寒則脹也厥論

恒濁氣在上則生膜脹○陰陽應象論云清氣在下則生

飧泄濁氣在上則生膜脹此陰陽反作病之逆從也夫

濁氣在上生脹
有寒有熱
脈沉洪便結者
宜微利

脉弦细脇痛者也且温散

腹脹者以寒熱温涼論之此何脹曰此飲食失節為脹

乃受病之始也温熱亦能為脹右關脉洪後而沉弦脉

浮於上是以温熱三氣相合為而病也是脾胃之令不

得少火尤甚乘於脾胃感則左遷而陽道不行而六府

之氣已絕於外大感砭令毋實凡氣外絕是氣外絕者

謂氣者不行便是凡氣也 經云虛則無其所不勝上不

勝者肝之邪也是脾胃之土不足火木勝者也經云

濁陰出下竅濁陰走五藏濁陰歸六府濁氣陰歸地此

平康不病之常道及此則為脹也太陰陽明論云食飲

不節起居不時者受陰之陰受之則入五藏入五藏則

腹脹閉塞調經篇云下腕不通則胃氣熱熱氣薰胸中

故內熱下脫者幽門也人身之中上下有七衝門皆下
衝上也幽門上衝吸門吸門者會厭也衝其吸入之氣
不得下歸於腎肝為少火相拒故膈咽不通致濁尿之
氣不得下降而大便乾燥不行胃之滯其客尿之火俱
在其中則腹脹滿作矣治在幽門使幽門通利泄其尿
火潤其燥大血生益新血幽門不閉則大便自然不閉
吸門亦不受邪其膈咽不通膈滿腹脹俱去矣是濁尿
得下歸地也故經曰中滿者泄之於內此法是也
沉香交泰丸治濁氣在上于擾清臥之氣鬱而不伸以
為膜脹方見脈實脈伏條脈之以利為度

右治脈洪便結而脹

范夫驩節中夫人八月中先目勞役飲食失節加之憂
 思氣結病心腹脹滿且食則不能暮食兩脇刺痛診其
 脈弦而細至夜濁臥之氣當降而不降腹脹尤甚大抵
 陽主運化飲食勞倦損傷脾胃臥氣不能運化精微聚
 而不散故為脹滿先灸中脘乃胃之募穴引胃中生散
 之氣上行陽道又以順氣湯助之使濁臥之氣自此
 木香順氣湯治濁氣在上則生腹脹

木香 三分
 厚朴 制四分
 青皮 二分
 益智仁 三分
 陳皮 三分

澤瀉 二分
 香梔 五分
 人參 五分
 升麻 一分
 白茯苓 二分 去皮

柴胡 一分 去芦
 蒼朮 五分
 半夏 二分
 干生姜 二分
 吳茱萸 二分 湯泡

草薢 三分
 麩 三分

內經之垂者行之待者散之以柴胡升麻之苦平行之少
 以陽明二經散待清氣運行陽分為君以生薑半夏草
 豆蔻益智仁之甘辛大熱消散中寒為臣以厚朴木香
 蒼朮青皮之苦辛大溫通順滯氣以當歸陳皮人參之
 辛甘溫調和榮衛滋養中氣濁陰不降以苦洩之吳茱
 萸之苦熱洩之者也氣之薄者為臣中之以秋花
 苓甘澤瀉賦平氣薄引導濁陰之氣自天而下故以
 為佐氣味相合散之淺之上之下之使清濁之氣各安
 其位也 右件吹咀都作一服水二盞至一盞去渣
 溫服食前忌生冷硬物 又治脉弦脇痛而脹
 中滿分消湯治中滿寒疝大小便不通跗蹠足不收四

支厥逆食入反出

上虛中滿腹中寒心下痞下焦燥寒沉厥奔豚之不收
鼓角門蘇大郎治之如神二服愈

黃芪半斤 益智三分 半夏二分 川烏一分 吳茱萸半斤

草豆蔻人半 厚朴半斤 茯苓一分 澤瀉二分 黃連二分

人參二分 木香二分 青皮一分半 當歸一分 生姜一分

麻黃一分不上節 升麻三分 柴胡一分 乾姜二分 葶澄茄二分

黃柏半斤 使藥

剉知麻豆大旋拌秤作一服水二盞煎至一盞去渣

稍熱服食前大忌房勞酒麵生冷硬物油膩

丹治大人小兒目雜果多而腹脹氣急者肉桂細末飯丸

藜蘆大每十粒小兒五丸熱水下 經方

垣靈樞徑云腹滿大便不利腹大赤上走胸臆喘息喘
然取之少陰之宜以辛熱取者瀉也取之少陰

良姜 白桂 益智 草豆蔻人 厚朴

升麻 甘草 独活使 黃柏少許引用

本肺

桔梗 桂枝 人參 青皮少許 橘皮去白

良姜 白朮 澤瀉注 吳茱萸

四支濕腫膠刺先瀉其血後調其真徑刺去其血絡也

千金治 腹脹滿短氣以草豆蔻一兩去刀皮細末木瓜

生薑湯調下半分

垣大腑所主為畜滿。辨云脾為腑中之太腑又云脾為
 腑中之至腑乃坤元亘古不遷之土天為以也火也地
 為腑也水也在人則為脾同陰水之化脾有餘則腹脹
 滿食不化故無陽則不能化五穀脾盛乃大寒為脹滿
 故脉經云胃中寒則脹滿大抵此病皆水氣寒濕為之
 也治宜大熱之劑必愈然亦有輕重
 木香塌氣丸治中滿腹脹下焦虛損者

蘿蔔子

炒黃

陳皮

去白

胡椒

三分

草豆蔻去毒 薑去

木香

青皮

梔子

大每服三十九

溫米飲食後

為細末以糊為丸如梔子大每服三十九溫米飲食後

送下忌服白粥百日重者一年小兒丸如麻子大桑白

口渴脉洪数
為濕熱

皮湯下十九日三服大人陰囊洪腫冰冷須用青鹽干

姜白麵各三分水和膏攤帛上金貼

諸脹腹大皆屬於熱全文見論

諸病有聲鼓之如鼓皆屬於熱

垣分消丸治中滿熱脹鼓脹氣脹水氣不治寒脹

黃芩刮去黑皮爛見黃色對
妙半刀或一兩二分

黃連去須揀淨
坐可炒

姜黃 白朮

人參去芦

甘草炙

猪苓去黑皮
各一分

干姜炙 厚朴去皮炒
一分

知母炒四分

澤瀉二分

橘皮三分

右件茯苓澤瀉生姜各另為末秤外共為細末入上三味
和勻水浸蒸餅為丸如梧子大每服一百丸熱白湯送
下食遠旋看病人大小丸數加減與之

丹有第小娘食積扶濕手足生瘡腹滿面浮口渴食少羸
滿小便少大便實

大腹皮 二分
葛 二分
館 二分
陳皮 五分
朴 三分

芎 三分
炙甘草 二分
白木 二分
木通 二分
姜 二片

牽二孺人面浮肚脹

蒼朮 半斤
炒柏 三分
白木 二分
陳皮 二分
木通 三分

芎 半斤
活石 半斤
炙甘草 二分
朴 半斤

倍嘉人五十二歲氣上羸滿食少此積熱生濕診得左三

部滿小右三部微數重取稍大喜得無弦脈為可治疔

白朮 一分
青皮
陳皮
厚朴 素
大腹皮 二分

片苓
木通 素
蘇梗
川芎 三分
桂枝 二分

甘菊 一分半

分十帖姜二片並飲之 查之湯下保和三十丸

經驗患腹脹喘悶搗山豆根末少許並水調一盞差

女人血氣腹腫以山豆根末三分熱酒下空心服之

仲寸口脈遲而瀆遲則為寒瀆為血不足跌跌脈微而遲

微則為氣遲則為寒 氣不足則手足逆冷手足逆冷

則榮衛不利榮衛不利則腹滿脇鳴相逐氣轉膀胱榮

衛俱勞敗氣不通即身冷陰氣不通即骨夜陽前通則

惡寒臥前通則痺不仁臥臥相得其氣乃行火氣一轉

其氣乃散實則失氣虛則遺尿名曰氣分

氣分謂氣不通利而脹血分謂血不通利而脹非脹病

乃其血
氣分大腹滿先
脹後逆斷
血分小腹滿先
徑逆後脹

藏府

脾胃素大

腎三焦

運氣

之外人別有氣分血分之痛也蓋氣血不通利則水亦

不通利而尿少尿少則腹中水漸積而為脹但氣分心

下堅大而病發於上血分血結胞門而病發於下氣分

先病水脹後經斷血分先經斷後病水脹也平治法見

腹滿腹脹支帶脇脇下厥上胃過在足太陰脾明全又見治

水所謂病脹者六腑也十一月万物氣皆藏於中故

曰病脹 脈解篇

右脾胃脹治法見前補虛行濕條諸方是也

腎氣實則脹全文見治虛實法

二隄一隄發病善脹心滿善氣 全文見論病轉變

運氣脹有七

濕助脾盛脹

以攻脾虛脹

寒脹

一曰濕助脾盛而脹經云諸濕腫滿皆屬脾土又云歲
 土太過甚則飲菽中滿又云歲水不及濕乃大行民病
 腹滿又云土鬱之菽民病心腹脹腸鳴又云大陽司天
 寒氣變物水飲內畜中滿不食甚則胛腫治以諸熱是也
 二曰風攻脾虛而脹經云厥陰在泉以淫所勝病腹脹
 治以辛涼是也

三曰寒脹經云水太過曰流行流衍之紀其病脹又云
 歲水太過寒氣流行甚則腹大胫腫又云水鬱之法民
 病痙堅腹滿又云太陽之勝皮膚癢腫腹滿又云大陽
 司天之改民病寒濕腹滿身臑胛腫三之氣感於寒濕
 民病附腔胸腹滿治以諸熱是也

燥脹

寒鬱於內

脹

寒熱相與脹

火鬱之設脹

雜方

四曰燥脹注云陽明之復腹脹而泄治以溫到是也

五曰寒鬱於中而脹注云少陰司天之政初之氣寒

而化其病中熱脹又云太陰司天之政二之氣大涼反

至火氣遂抑民病氣鬱中滿是也

六曰寒熱相落而脹注云少陰司天之政水火寒熱持

於氣交民病腹大又云大陰司天之政四之氣寒以晚

暮蒸熱相搏民病心腹滿熱腫脹甚則肘腫是也

七曰火鬱之設脹注云火鬱之設民病脇腹胸皆面首

四支膜壞脹是也

梅師若腹滿不能服藥導之方所獨蒜煨熟去皮納下部

中冷即易

針灸上

靈黃帝曰脉之應予寸口如何而脹收伯曰其脉大堅以

瀆者脹也黃帝曰何以知藏府之脹也收伯曰陰為藏

陽為府黃帝曰夫氣之令人脹也在于血脉之中耶藏

府之內乎收伯曰三作三一者皆存焉然非脹之舍也黃

帝曰忽聞脹之舍收伯曰夫脹者皆在於藏府之外

排藏府而郭胸脇膜皮膚故命曰脹黃帝曰藏府之在

胸脇潔之內也若匣匱之藏集器也各有次舍異名而

同延一城之中其氣各異忽問其故黃帝曰未解其意

再問黃帝曰至再問收伯曰夫胸腹藏府之耶也膻中

脊心主之宮城也胃脊太倉也咽喉小腹者傳送胃之

五竅者閭里門戶也廉泉玉英者津液之道也故之藏

六府者各有畔界其病各有形狀黃帝曰忽聞脹形岐

伯曰夫心脹者煩心短氣卧不安甲乙云經云心輪主之并可列缺

肺脹者虛滿而喘欬甲乙云經云肺主之并取太淵

肝脹者脇下滿而病引少腹甲乙云肝俞于之并取太冲

脾脹者善噦四支煩悅体重不能勝衣卧不安甲乙云脾俞主之并取太白

腎脹者腹滿引背央然腰髀痛甲乙云崑俞主之并取太溪

胃脹者腹滿胃脘痛鼻聞焦臭妨于食大便唯甲乙云中脘俞主之并取章門

大腸脹者腸鳴而痛濯冬日重盛于寒則洩飧不化甲乙云天樞主之

小腸脹者少腹膜脹引腰而痛甲乙云申竅主之

膀胱脹者少腹滿而氣癢甲乙云曲骨主之

三焦脹者氣滿于皮膚中輕然而不堅甲乙云石門主之

騰脹者脇下痛口中苦善太息甲乙云陽

凡此諸脹者其道在一明之知逆順針數不失焉虛補

實神去其實致邪失正真不可定粗之所敗謂之失命

補虛寫實神歸其室以塞其空謂之良二黃帝曰脹者

為生何目而有岐伯曰衛氣之在身也常然並脈循分

內行有逆順逆則相隨乃得天和始四時有序

五穀乃化然後厥氣在下榮衛逆上其邪相

攻丹氣相搏乃合為脹也榮氣逆上其邪相

氣並脈循分為膚脹三里而匯近者一下遠者三下無

間虛實工在疾寫榮衛循脈至此三十九字元悞在病各

寫三上宜有狀甲乙云九五歲六府三脹皆取三里三

三里治脹之要
穴五歲六府
脹皆主之

膚脹光形
胃氣脹之真三
里

黃帝曰善何以解惑岐伯曰含之于真三合而得帝曰
善黃帝曰脹論言無問虛實工在疾寫近者一下連者
三下今有其三而不下者其過為在岐伯曰此言陷于
肉盲而中氣穴者也不中氣穴則氣內閉針不陷盲則
氣不行上越中肉則衛氣相亂淅陔相逐其于脹也當
寫不寫氣故不下三而不下必更其道氣下乃止不下
復始可以乃全烏有殆者乎其于脹也必審其脈當寫
則寫當補則補如鼓應桴惡有不下者乎脹論

刺灸脹有七法

其一取血絡經云膚脹先取脹之血絡是也

其二取胃經前篇脹論所謂三里而寫近者一下遠

虛脹補脾

者三下無問虛實二在疾焉是其一法也又云胃者
水穀之海其輸上在氣街下至三里水穀之海有余
則腹滿審守其輸調其虛實又云胃病者腹膜脹取
之三里也又云胃足少明之脉是動則病貴響腹脹
胃中寒則脹滿視盛虛熱寒陷下取之是脹病大法
皆實胃穴三里也



其三取脾經云腹滿食不化腹响然不能大便取
足太陰又云脾足太陰之脉是動則病腹脹喜噫視
盛虛熱寒陷下取之又云脾虛則腹滿腸鳴飧洩取
其徑大厥少明少陰血者又云足太陰之别名曰心
孫去本節之後一寸別走少明其別者入絡腸胃虛

脹則鼓脹取之所別也是脹之虛者多補是太陰也脾穴

其四取腎膀胱經云腎病者腹大腫腫取其經少陰

大陰血者又云腎藏志館有余則腹脹殫洩寫然筋

血者又云邪在腎藏則病腹脹腰痛大便難取之湧

泉崑崙視有血者取之又云腹滿大便不利腹大

亦上走胸嗌喘息喝、逆取之少陰又云男子如蠱

女子如坦身体身体腰脊如解不欲飲食先取湧泉

見血視對上盛者不見血也又云脹取三陰是脹病

多寫腎經諸穴也

其五取三焦委以穴經云三焦滿者腹氣滿小腹大

堅不得小便窘急溢則水留則為脹取委以是也

肺脹而手
大陰脈脹

針灸下

蓋不得小便則水無泄其水溢出皮膚腫者為水畜
於腹中獨腹脹者為脹也

其六取肺經云振寒洒洒然鼓頷不安汗出腹脹煩
悅取手太陰是也

其七取厥病成脹經云少陰之厥腹滿不得卧太陰
之厥腹滿腹脹少陰之厥腹滿心痛厥少陰之厥
腫痛腹脹盛則瀉之虛則補之不盛不虛以經取之是
秘傳鼓脹之狀腹身皆大

臍上左右各刺二分
中腕通關三里手三里

膚脹之狀空而不堅腹身尺腫按之陷而不起

太白公孫復番絕骨三里水分

玉龍腹脹

分以寸半 氣海三里 三陔交人中

腹脹并兩足有巾

館

門庭五分寫灸

睛泣

三分寫用香油抹以可出一身之水

痛其腹暴脹按之乃下

中腕氣海三里

圖

世單蠱脹氣喘

水

分在分中各一寸半 八二寸半灸五十壯

又法分水三里行間內庭

石關海氣各灸二十七壯

東陔腹脹突欽盆中滿尻腰腫

大敦天牖崑崙

甲寒氣腹滿癰滯濡身熱腹中積聚疼痛衝門主之

腹滿嚮然不便心下有寒痛高立主之

腹脹善滿積氣閉門主之

腹中氣盛腹脹逆不得卧陔陵泉主之

腹脹腸鳴氣上衝胸不得久立腹中痛濯、冬日重感

於寒則洩當臍而痛腸遊氣切痛不化不嗜食身腫重

俠臍急天樞主之

腹中有大熱不安腹有大气相和俠暴腹脹滿癰滯濡

氣衝主之

腹滿痛不得息已卧屈一膝伸一肢並氣街針上入三

寸氣至焉之

腸中寒脹滿善噦聞食臭胃氣不足腸鳴脹滿洩食不

化心下脹三里主之

大腸有熱腸鳴腸滿俠胛痛食不化喘不能久立巨虛

上廉主之

腹滿不嗜食衝臥主之

寒滿腹脹厲兌主之

男子如蠱女子如阻寒熱少腹偏腫臥谷主之

胃中寒脹食多身羸腹中滿而鳴腹膜以厥胸脇痞

滿嘔吐吞急痛筋寒食不下胃輸主之

頭痛食不下腸鳴臍脹欬嘔時泄注三焦俞主之

臍滿肚脹大便泄意舍主之

替任穴

胆論

脉盛大緊澀
為脹

診生死

腹脹脉大身
熱為遲

臏脹水腫飲食不下多寒胃倉主之

腹滿不寐食刺脊中

寒中傷飽食飲不化五穀臍滿脹心腹胸脇堵滿脉虛

則生百病上管主之

腹脹不通寒中傷飽食飲不化中腕主之

痲脹水氣行皮中胛交主之

亦腹大及水脹水氣行皮中石門主之

腹滿胃中有熱不嗜食懸鍾主之

素脉盛而緊曰脹 平人氣象論 ○ 脹論 脉大堅以溢為脹

急偏舉者脾偏傾脾偏傾則善滿善脹 全文見診

腹脹身熱脉大是逆也不過十五日死矣 全文見診 紀下目口脹

或黃身熱或黃如瘡皆不可治累驗也

腹脹肢冷形

脫

泄甚脉絕為

逆

腹脹閉塞死

腎
石水脉沉不喘

腹大脹四末清脫形淺甚是逆也如是者不及一時死矣

腹脹便血其脉大時絕是逆也

嘔咳腹脹且澹泄其脉絕是逆也

少陰終者面黑齒長而垢腹脹開塞大陰終者腹脹閉

不得息意氣壅逆、別而赤不逆則面黑

少腹脹滿

臍下脹滿是也若先臍下滿漸延及臍上滿者亦用此法

無擇澤漆湯治石水四肢瘦腹腫不喘其脉沉

澤漆

洗玄腥
五月

桑白皮六月

射干

泔浸

黃芩

茯苓

白朮各四兩

澤瀉

防己各二兩

石中滿上至平
腕不治

咬咀每服五分水三盞烏豆一合苡二盞內導同煎

七分去渣空腹溫服日五

聖惠治腹堅脹滿异石水方用白石英十兩搗如大豆大

以甕瓶盛用好酒二斗浸以泥重封瓶口用馬糞及

糠火燒之長冷酒小沸從卯至午即住火候次日煖

一日盞飲日可三度如吃酒少隨性飲之其白石英

可更一度燒之

素附跌結斜多附少跌曰石水少腹腫

腎肝并沉為石水大奇論漸

腎脉微大為石水起臍下之小腹腫腫然上至胃脘

死不治

氣血

腸覃寒氣

擣腸外作事

肘下

經云腸覃寒氣客于腸外與衛氣相搏氣不得榮日有所繫癰而內有惡氣乃起癰肉乃生其始生也大如雞卵稍以益大至其成如懷子之狀久者為歲按之則堅推之則移月事以肘下試其候也

羅疔露丸治傷內寒氣凝不流結於腸外久為癥瘕時作疼痛腰不得伸

京三稜

廣茂

各刀對二味並酒浸

干漆

洗去腥炒烟尽

茴香

三升鹽炒

礪砂

四升另研

輕粉

一升另研

川烏

半斤炮去皮

青皮

三升去白

雄黃

三升另研

川山甲

炮三升

射香

半升另研

巴豆

三升去皮廣茂三稜同炒深黃去色不用

除另研四味外為細末和勻生姜汁糊為丸桐子大每服二三十丸溫生姜湯送下溫酒亦得食前

無擇烏喙丸治腸覃亦治乳餘

烏喙

炮去皮
去一糸

半夏

湯洗七
日

石膏

煨

藜蘆炒

牡蒙

茯苓

酒浸各
一糸

桂心

干姜

炮各
一糸

巴豆

研膏
七糸

右末蜜丸

如菜豆大每服三五丸食後酒飲任下亦治

男子疝痛

石瘕寒之
血搏胞中作
不時下

經云石瘕生於胞中寒氣客于子門子門閉氣不得通

惡血當瀉不瀉血以留止日以益大狀如懷子月事不

以時下皆生于女子可導而下

羅見親丹治客寒於下焦血氣閉塞而成瘕堅久不消者

附子

四糸炮
去皮臍

鬼箭羽

澤瀉

肉桂

玄胡

木香

各二糸

紫石英

賓郎

血竭

研水
一糸半

桃仁湯浸去皮面尖

京三稜劉五斤

大黃劉碎一斤同京三稜酒浸一宿焙干

除血竭桃仁外同為細末和勻用元浸酒打麵糊為

丸桐子大每服二十九溫醋湯送下酒亦得食前

無擇石莖散治婦人血結胞門或為癥瘕在腹脇間心腹

脹滿腫急如石水狀俗謂之血虫

石莖一斤當歸尾馬鞭草略半紅花炒半烏梅肉半斤

蓬茂炮三稜炮蘇木節沒藥琥珀研各一分

甘草一斤

為末濃二盞蘇木酒調下二升不飲酒姜棗煎湯調服

脉問曰病有血分水分何謂也師曰經水前斷後病水

名曰血分此病為難治先病水後經水斷名曰水分此

血分即石瘕之屬先經斷後脹

病易治何以故去水其經自當下水分即氣分也

仲寸口脉沉而遲沉則為水遲則為寒水相搏跌跌脉

伏水穀不化脾胃氣衰則驚悸胃氣衰則身腫少少脉卑

少脉細男子小便不利婦人則徑水不通徑為血，不

利則為水名曰血分

脉師曰寸口脉沉而數，則為出沉則為入出則為實

入則為沉結跌跌脉微而弦微則無胃氣弦則不得息

少脉脉沈而滑沈則為在裏滑則為實沉滑相搏血結

胞閉其藏不通名曰血分

仲大黃甘遂湯治婦人小腹滿如敷，狀小便微難而不

渴生後者為水與血併結在血室也

大黃 四兩 蒸

甘遂 炮

阿膠 炒各二兩

劉散每服三分以一盞並七分去渣溫服其血當下

無擇萬病丸治室女月經不通臍下堅結大如椀升世執

往來下利和羸瘦此為血瘕若生肉瘕不可為也

乾漆

杵細炒令大炆出烟頃青白一時久

牛膝

酒浸一宿一宿

生地黃

四月八分取汁

以地黃汁入下二味為末漫火熬俟可丸即丸如梧

子大空心米飲下或溫酒下二九日再勿妄服病去

心藥婦人氣血虛徑不行若服破血行徑藥是殺之

也董之

靈小腹痛大上走胃至心析身時寒熱小便不利尿反

針灸

厥陰 雜病篇

甲石少痛引脇下脹頭眩痛身熱閉元主之

振寒大腹石少四滿主之

石少刺氣衝

石少章門及然谷主之

世暘暈之狀少有惡氣乃起瘰癧肉大如雞卵日以益大其

成也如孕椎之則移

中極氣冲天樞五樞

石瘕之狀生於胞中惡血不通日以益大如孕

厥陵泉 去胞中惡血

復瀦 順骨刺下待腹溫方可去

胎前腹脹

滯氣

寒熱

脈強或
痛惡寒

針灸

大生煎蘇飲治胎妊心腹脹滿兩脇妨悶
方見婦人胎遍
上二門

紫枳殼湯治婦人妊胎腹脹

枳殼三兩

黃芩一兩

為粗末每半兩水盞半並溫服

治產前脹滿身體沉重枳殼湯中加白朮一兩

仲婦人懷妊六七月脈弦數熱其胎愈脹腹痛惡寒者少

腹如扇所以然者子藏開故也當以附子湯溫其藏附

子湯見傷寒

婦人傷胎懷身腹滿不得小便從腰已以重如有水氣

狀懷身七月太陰當養不養此心氣實當寫勞宮及關

元小便微利則全愈

產後腹痛

去治產後血与惡露不下日而血脹用杜牛膝杆碎用水
熬成膏去查每服一椀未知再服神效

子母產後穢汚不尽腹痛麻子三兩酒五升煮取一升
分温二服皆下惡物

千金治產後穢汚下不尽腹痛生薑二斤以水煮取汁即出

日華治產後血脹苗葉同功乃益母草子也

保嬰金丹治產後腫滿胸中有物状是噎氣不降

代赭石

羌磨石

細末醋糊丸梧子大每三十五丸酒下胸中痛加川芎

湯下久服治血癖

虛實

實

大金丹虛湯治產後腹脹滿悶嘔吐不定不可用尋常治

脹止吐藥

赤芍藥 半夏 澤蘭葉 人參 陳皮各一分

甘草一分

咬咀用水一椀生姜焙干半升煎至半椀去渣分三服

丹湯理五孺人瘡產後腹滿累渴不飲脈却虛

白朮 功六分

陳皮 五分

白芍

功極熱 二分

厚朴

木通

川芎 各五分

炙甘草

每加海金沙一分

分四帖煎下保和丸二十五粒

大金丹木湯治產後心腹大如盤 方見脹門補虛条

保和方

代赭石 一升
桃仁 三升去皮尖

大黃 五升

細末薄芎水糊丸每三五十九溫水下無時

治產後腹大堅滿不能臥白聖散

樟柳根 三寸
大戟 一升半
甘遂

細末每服二升熱湯下取大府利為度此主水氣之

妙藥也

針灸

甲頰人產後餘疾食飲不下胸脇支滿眩目足寒心切痛
善噫同酸臭酸痺腹滿少腹尤大期門主之

醫學綱目卷之二十四終

書目卷之二十四

館

書

圖

汪

浙

美意國新身頭與頭齒也

甲取八意與新氣身與女子

如美也

副重與頭二


蘇社社三下

美意與頭大

美意與頭大

美意與頭大

本
日



浙江圖書館


浙江圖書館善本

甲登記號：010769


一九 年 月 日



浙江圖書館



卷
二十三
二十四



浙江圖書館



浙江圖書館

