

S252/4727
1446
2部7

外科正宗

午集



外科正宗卷七

海甯許 楣辛木訂

明崇川陳實功著 吳江徐大椿靈胎評

海甯蔣光焄寅昉校

流注論第三十二

夫流者行也乃氣血之壯自無停息之機注者住也因

氣血之衰是有凝滯之患

楣案流注者其毒流走而竄注也此解似非

其

形漫腫無頭皮色不變毋論穴道隨處可生凡得此

者多生於體虛之人勤勞之輩不慎調變夏秋露



縱意取涼熱體當風圖身快爽或中風邪發散未盡

或慾後陰虛外寒所侵又或惱怒傷肝鬱結傷脾榮

氣不從逆於肉裏又或跌打損傷瘀血凝滯或產後

惡露未盡流宿經絡皆成斯疾既成之後當分表裏

寒熱虛實邪正新久而治之初因風寒所中表症發

散未盡者人參敗毒散散之房慾之後體虛寒氣外

侵者五積散加附子溫之附子勞傷鬱怒思慮傷脾

而成者歸脾湯加香附青皮散之跌撲傷損瘀血凝

滯而感者復元活血湯逐之產後惡露未盡流注經

絡而成者木香流氣飲導之此皆初起將成痛

服至三四服皆可外俱用琥珀膏敷貼其中亦每

消者十中五六如服前藥不得內消者法當大養

血徐曰犬培助脾胃溫暖經絡通行關節木香流氣

飲十全大補湯俱加熟附子香附熟附子培助根本

如此則未成者自消已成者自潰已潰者自斂而終

無殘敗破漏不斂之症如有膿宜急開之患者又當

慎起居戒七情遠寒就溫庶可保全若慢用寒涼剋

伐內消等藥終至不救者多矣



徐曰流注有虛痰實痰兩種

又曰流注一證由風寒入膜所致。膜在皮中旁通四達。初無定處。所以隨處作患。此真脈絡之病。故古人製大活絡丹以治之。其餘煎丸皆非正治。蘇州一小兒甫九歲患流注。肩背腰脅十餘處。百端醫治無效。余曰。此惟大活絡丹能愈。服至三十餘丸未破者消。已破者收口。更服補氣血之藥而愈。

此條從河溪醫案采入

流注看法

初起漫腫。皮色光亮。微熱微疼。筋骨不牽強者順。已成
身體微熱。飲食有味。疼痛有時。腫生紅色者順。已潰膿
稠而黃。腫消痛止。身體輕便。起坐如常者順。潰後肉
易生。膿水易止。精神易復。膿口易合者順。初起身體發
熱。脈細而數。皮色微腫。痛徹筋骨者險。已成飲食少思
口乾作渴。身體疼痛。四肢沈重者險。已潰膿水清稀。腫
仍不消。虛熱不退。疼痛不減者逆。潰後膿穢不止。肌膚
瘦削。飲食不食。發熱皮粗者死。

徐曰。看法亦與諸症同。

流注治法

初起風寒表散未盡而後復生腫痛者再宜和解之表邪已盡而後復生流注者宜清熱消腫行散氣血暴怒所傷抑鬱所致胸膈痞悶中氣不舒宜順氣寬中腫硬已成而不得內消者宜和氣血更兼補助脾胃跌撲閃肭瘀血凝滯爲患者宜調和氣血通行經絡寒邪所襲筋攣骨痛及徧身疼痛者溫經絡行氣血產後敗血流注關節致生腫痛者當散敗瘀養氣血潰後膿水不止而形衰食少者宜滋氣血峻補脾胃

徐曰亦與諸症同。

流注治驗

男子風寒表散未盡。兩腮腫痛。微熱不退。用小柴胡

湯加川芎、天花粉。

天花粉 徐勒

桔梗連翹二服熱頓退。又

以二陳湯加桔梗、黃芩、牛蒡子、連翹。四服十日而安。

徐曰此乃風痰非流注也。

男子勞傷受寒。背生三腫。皮色不變。寒熱交作。至之

尤甚。先以萬靈丹洗浴發汗。寒熱頓退。惟腫硬不消。

以琥珀膏敷之。三次腫消痛止。漸平。



徐曰此亦風痰所聚

一婦人因怒脇下結腫將近半年方痛此肝氣鬱結之

症用本香流氣飲四服其腫漸紅蓋病久必欲停

不可內消又以十全大補湯徐曰加木香香附青皮

十餘服腫漸高又以本方加阜角刺五服其膿乃潰

清而且多此元氣已經虧損所致服人參養榮湯加

熟附子此味月餘膿始稠少本方倍參耆歸朮兩月

而愈

一男子元氣素虛因暴怒膊生腫塊疼痛牽強寒熱往



來。飲食日減。以補中益氣湯

此五字徐勒批曰不切

加香附貝

母十餘服。寒熱漸止。又服益氣養榮湯。月餘而腫

間服八珍湯。外用香附餅日灸二次。

徐曰亦不妥

脾胃健

而安

孀婦項間乳上各腫一塊。將近一年。漸大而痛。診之

脈細數而無力。此思慮過傷之症。用歸脾湯加桔梗

香附十餘服。腫漸高。以琥珀膏敷之。色漸紅。欲其作

膿。以十全大補湯加桔梗貝母服之。半月膿熟。針之

頭腐膿清。虛熱復作。食少不睡。仍以歸脾湯間逍遙

散服之。三月而愈。

一男子平素怯弱。腰後微腫。一塊。飲食少思。口乾發熱。

此腎傷也。治當朝以附桂入味丸。以上七字徐勒批曰大誤午用。

人參養榮湯扶植根本為要。彼以口乾發熱為內有

火。徐曰既有此症何得又用熱藥欲投清涼之劑解之。徐曰其死亦不以徒用涼

藥之。故余辭不治。彼請內科治之。以退熱為主。正合其

意。投藥三劑。腹痛作瀉。又以豬苓澤瀉厚朴。此三味徐勒批

日大泄氣等藥投之。大熱發作。形體更變。復請余治。

余曰。死期速矣。因虛致病。法當滋補。況腫在腰間。內



腎受傷。口乾作渴。腎水枯竭。發熱不退。陰虛血少。以有餘之藥而療不足之症。豈有不死者哉。又半月而死。

徐曰。以上所載五案。皆係痰毒。並非流注之病。流注者。纏綿不已。或五或七或九。愈者愈。發者發。變態萬端。若初生一兩箇。旋即消潰。皆非真流注也。

流注主治方

調和榮衛湯

調和榮衛湯。芎歸赤芍白芷。併烏藥。

獨活甘草者。大茴牛膝紅花。兼陳皮。

治流注初起。氣血凝聚。結腫不散。已成未成。並服。



川芎

當歸

陳皮

獨活

各一錢

赤芍

白芷

烏藥

大茴香

黃耆

各八分

甘草

紅花

各五分

牛膝

下部加

水二茶鍾煎入分入酒一杯量病上下服

徐曰通治之方但少痰藥

楣案大茴香一味徐勒批曰此味不解

木香流氣飲

木香流氣飲芍歸
枳殼檳榔防枳實

蘇桔青陳烏澤耆
膝甘半芍大腹皮

治流注瘰癧及鬱結為腫或血氣凝滯徧身走注作

痛或心胸痞悶咽嗑不利脇腹膨脹嘔吐不食上氣



北京中醫藥大學圖書館版權所

喘急咳嗽痰盛或四肢面目浮腫者。

川芎

當歸

紫蘇

桔梗

青皮

陳皮

烏藥

黃耆

枳實

茯苓

防風

半夏

白芍

各一錢

甘草節

大腹皮

木香

檳榔

澤瀉

枳殼

各五分

牛膝

下部

加一錢

水三茶鍾。薑三片。棗一枚。煎八分。食遠服。

徐曰。此流注主方。藥味太雜。宜擇用。

楣案青皮烏藥。大腹皮木香檳榔徐圈。



六鬱湯

六鬱湯內用川芎
甘梔蒼朮砂仁等

半夏陳苓香附同
溼痰流注即時通

治諸鬱結腫及左右二搭相串溼痰流注等症。

川芎

半夏

茯苓

香附

陳皮

山梔

各一錢

蒼朮

砂仁

甘草

各五分

水二茶鍾。薑三片煎服。

附子八物湯

附子八物湯芎芎
甘草肉桂當歸等

熟地人參朮茯苓
木香薑棗效如神

治房慾後陰虛受寒致生腫塊。又或徧身腿腳疼痛。

不能步履。

川芎

白芎

熟地

人參

白朮



茯苓

當歸

附子

各一分

肉桂

五分

木香

甘草

各三分

水二茶鍾。薑三片。棗一枚。煎八分。食遠服。

徐曰。此通治虛寒之方。非流注之方。凡立方總當

兼顧本症一二。不可全不照應。

瘡科流氣飲

瘡科流氣飲芎歸
防風枳殼香烏藥

甘桔蘇橫芎桂耆
白芷人參厚朴隨

治流注及一切鬱怒凝滯氣血作腫疼痛或胸膈痞

悶或風寒溼毒搏於經絡結成腫塊者

當歸

甘草

紫蘇

人參

白芍



官桂

黃耆

防風

枳殼

烏藥

桔梗

厚朴

檳榔

木香

川芎

白芷

各五分

水二茶鍾煎八分食前服

徐曰此亦流注通治之方與前義同

通經導滯湯

通經導滯湯香附 陳丹枳蘇甘草節

赤芍芎歸熟地隨 牛膝紅花獨活宜

治婦人產後敗血流注經絡結成腫塊疼痛者

香附

赤芍

川芎

當歸

熟地

陳皮

紫蘇

牡丹皮

紅花

牛膝



枳殼各一錢

甘草節

獨活各五分

水二茶鍾煎八分。入酒一小杯。食前服。

徐曰。亦與前方相同。皆重出。

香附餅

香附餅用香附末。熨斗將來乘熱熨。

酒和調成。患上安。兼資火力散風寒。

治風寒流注。襲於經絡。結成腫痛。用香附為末。酒和。

量瘡大小。做餅。覆患處。熱熨斗。熨藥上。未成者自消。

已成者自潰。風寒溼毒。宜薑汁作餅。

徐曰。外治良法。

醒脾湯

醒脾湯中參朮耆。茯苓神遠志柴甘桔。

黃連酸棗地骨皮。木香香附龍眼官。



治懷抱鬱結。思慮傷脾。致脾氣不行。逆於肉裏。乃生
壅腫。疼痛不眠。心煩不安。神氣不清。

白朮

黃耆

人參

茯苓各錢

酸棗

地骨皮

遠志

各七分

柴胡

甘草

桔梗

黃連

木香

香附

各五分

龍眼肉

七箇

水二茶鍾。薑三片。棗二枚。煎八分。不拘時服。

徐曰。卽歸脾湯意。

調中大成湯

調中大成湯。朮附。砂仁。遠志。丹。陳草。

苓歸芍藥藿參者。黑棗二枚。薑用煨。

治流注潰後。膿水清稀。飲食減少。不能生肌收斂。



次天白朮

茯苓

歸身

白芍

陳皮

山藥

牡丹皮

黃耆

各一錢

人參

二錢

藿香

砂仁

遠志

甘草

各五分

附子

肉桂

分

水二茶鍾。煨薑三片。棗二枚。煎八分。食遠服。

徐曰。此病後調養方。

黃耆六一湯

黃耆六一湯參草流注膿多併作湯

三味同煎功不小更兼煩躁煎當好

治流注潰後膿水出多口乾作渴煩躁不甯。

黃耆

六錢半生半蜜水炒

甘草

一錢五分半生半炙

人參

一錢



水二茶鍾煎八分。食遠服。

散血葛根湯

散血葛根湯半夏甘草細辛併蘇葉

芎防羌葛芷升麻桔梗香附與紅花

治跌撲損傷瘀血凝滯結成流注身發寒熱者

乾葛

半夏

川芎

防風

羌活

升麻

桔梗

各八分

白芷

甘草

細辛

蘇葉

香附

紅花

各六分

水二茶鍾。葱白三枚。薑三片。煎八分。不拘時服。

徐曰。如果敗血。當更加血分藥。此方尚未到。

先天大造丸

先天大造丸歸杞烏茅巴骨故紙膝

尤地參苓菟菘黃車志青鹽棗二香



其爲細未用大蒜頭去殼搗爛。入上藥耳搗稠。入酒
一二匙調勻。徧敷腫上。紙蓋。或卽熱痛。或不痛。俱待
藥乾便效。次日又有起泡。又有不起泡者。如有起
挑去泡中黃水。膏貼之自效。

徐曰。此弔毒法。亦有必當用之法。

又曰。此提毒之法。毒淺者自消。凡一切無頭腫痛
之症俱效。

榻案余所製消核膏。流注初起。貼之可消。

附錄大活絡丹

治一切中風癱瘓。痿痺痰厥。拘攣疼痛。癰疽流注。跌撲損傷。小兒驚癇。婦人停經。

白花蛇

烏梢蛇

威靈仙

兩頭尖

俱酒浸

草烏

天麻

煨

全蝎

去毒

首烏

黑豆水浸

龜板

炙

麻黃

貫仲

炙草

羌活

官桂

藿香

烏藥

黃連

熟地

大黃

蒸

木香

沈香

心二兩

細辛

赤芍

沒藥

去油

丁香

乳香

去油

僵蠶

天南星

薑製

青皮

骨碎補

白蔻

安息香

酒蒸

黑附子

製

黃芩

蒸



治風寒溼毒襲於經絡。初起皮色不變。漫腫無頭。或陰虛外寒。侵人初起。筋骨疼痛。日久遂腫潰。後膿水清稀。久而不愈。漸成漏症者。

紫河車

一具酒煮搗膏

熟地黃

四兩酒煮搗膏

歸身

茯苓

人參

枸杞

菟絲子

肉蓯蓉

酒洗搗膏

黃精

白朮

何首烏

去皮用黑豆同蒸搗膏

川牛膝

骨碎補

去白微炒

仙茅

浸去赤汁蒸熟去皮搗膏各二兩

川巴戟

去骨

破故紙

炒

遠志

去心炒

木香

青鹽

各五錢

丁香

三錢

黑棗肉

二兩



右爲細末。煉蜜丸如桐子大。每服七十九。空心溫酒送下。此方非獨流注成漏者可用。又補一切氣血虛羸。勞傷內損。及男婦久無嗣息。並有奇功。

徐曰。此通治補藥。病後調養法。

又曰。此虛人潰後補藥。初起禁用。

琥珀膏

琥珀膏中用大黃同蒜搗稠敷患處

南星白芷鬱金香提毒之法此爲良

治一切皮色不變。漫腫無頭。氣血凝滯。結成流毒。毋

論身體上下年月新久。但未成膿者。

大黃

二兩

鬱金

南星

白芷

各一兩

香附酒浸

元參

白朮各一兩

防風

二兩五錢

葛根

虎脛骨炙

當歸

各一兩半

血竭

七錢

地龍

炙

犀角

麝香

松脂

各五錢

牛黃

片腦

各一錢半

人參

三兩

右藥各研稱準。合和再研。蜜丸如桂圓核。大金箔為衣。陳酒送下。須用白蠟為價。收藏以免泄氣。

徐曰。頑痰惡風熱毒疼血入於經絡。非此不能透

達。乃治肢體大症必備之藥。他書活絡丹祇用地

龍乳香等四五味。乃治藜藿人實邪之方。不可用

流注應用方



十全大補湯

人參養榮湯

補中益氣湯

歸脾湯

益氣養榮湯

八珍湯

俱見清
瘍門

萬靈丹

見腫
瘍門

小柴胡湯

二陳湯

俱見癰
瘍門

乳癰乳岩論第三十三

夫乳病者。乳房為陽明胃經所司。乳頭為厥陰肝經所

屬。乳子之母。不能調養。以致胃汁濁而壅滯。為膿。又

有憂鬱傷肝。肝氣滯而結腫。初起必煩渴嘔吐。寒熱

交作。腫痛甚者。宜牛蒡子湯主之。厚味飲食。暴怒肝

火妄動。結腫者。宜橘葉散散之。又憂鬱傷肝。思慮傷



脾積想在心所願不得。致經絡痞澀聚結成核。初如豆大。漸若圍碁子。半年一年二載三載。不疼不癢。漸漸而大。始生疼痛。痛則無解。日後腫如堆粟。或如覆碗。紫色氣穢。漸漸潰爛。深者如岩穴。凸者若泛蓮。疼痛連心。出血則臭。其時五臟俱衰。四大不救。名曰乳岩。凡犯此者。百人必百死。知覺若早。姑用清肝解鬱湯。或益氣養榮湯。患者再加清心靜養。無罣無礙。服藥調理。尚可苟延歲月。若中年已後。無夫之婦。得此其死尤速。故曰夫乃婦之天也。惟初生核時。急用艾

灸核頂待次日起泡挑破用披針針入四分此句徐

必更腫此法用冰蠟散條插入核內此四字糊紙封徐勒

蓋至十三日其核自落用玉紅膏生肌斂口再當保

養庶不再發又男子乳癰與婦人微異女損肝胃男

損肝腎蓋怒火房慾過度以致肝虛血燥腎虛精怯

血脈不得上行肝筋無以榮養遂結腫痛治當八珍

湯加山梔牡丹皮八珍湯口乾作渴者加減八味丸

八味丸腎氣素虛者腎氣丸已潰作膿者十全大補

湯懷孕之婦乳疾因吹因胎氣旺而上衝致陽明



乳房作腫。宜石膏散清之。

此句徐勒批曰不可用寒

亦可消散。

則遷延日久。將產出膿乳汁。亦從膿竅流出。其日難

完。有此者。純用補托生肌。其口亦易完矣。

徐曰。乳病有數種。種種各別。須知之。

又曰。乳腫不同。俱係陽明結氣結痰。各有專方。一

槩。膳藥。皆有損無益也。

乳癰乳岩看法

初起紅赤腫痛。身微寒熱。無頭眩。無口乾。微疼者順。已

成。掀腫發熱。疼痛有時。一囊結腫。不侵別囊者輕。已潰



膿黃而稠。腫消疼痛漸止。四邊作癢。生肌者順。潰後膿水自止。腫痛自消。新肉易生。膿口易合者順。初起一乳通腫。木痛不紅。寒熱心煩。嘔吐不食者逆。已成不熱不紅。堅硬如石。口乾不眠。胸痞食少者逆。已潰無膿。正頭腐爛。腫勢愈高。痛勢愈盛。流血者死。潰後肉色紫黑。痛苦連心。吮氣日深。形體日削者死。

徐曰。乳癰與乳岩各有看法。此乃乳癰看法也。

乳癰乳岩治法

初起發熱惡寒。頭眩體倦。六脈浮數。邪在表宜散之。發



熱無寒。惡心嘔吐。口乾作渴。胸膈不利者。宜清之。憂鬱傷肝。思慮傷脾。結腫堅硬微痛者。宜疎肝行氣。已成者。腫發熱疼痛有時。已欲作膿者。宜托裏消毒。膿已成而脹痛者。宜急開之。脾胃虛弱。宜更兼補托潰而不斂。膿水清稀。腫不消。疼不止。宜大補氣血。結核不知疼痛。久而漸大。破後惟流污水。宜養血清肝。

徐曰。此亦是乳癰治法。乳岩無治法。不過使之遷延歲月。不致痛苦惡具而已。

乳癰乳岩治驗

婦人因怒。左乳腫痛。寒熱交作。服人參敗毒散一劑。

人參敗毒散徐
勒此日不切

表症已退。又用牛蒡子湯二服腫消。

漸安。

一婦人憂思過度。久鬱成癆。左乳結核如桃。

徐曰此半名乳核

年似痛非痛。咳嗽生痰。身發潮熱。診之脈微數而無

力。此真氣雖弱而邪火尙未有餘。如用藥合理尙堪

調治。先用逍遙散加香附貝母十餘服。而咳嗽漸止。

寒熱間作。又用八珍湯加香附牡丹皮柴胡遠志十

餘服。身熱去其八九。又服益氣養榮湯加青皮木香。



兩月餘胸膈得利。噯氣得舒。飲食漸進。肌膚漸澤。腫以阿魏化痞膏貼之。半年餘而消。

一婦人右乳疼痛。腫如覆碗。診之脈數有力。此有餘癰。欲作膿也。用托裏消毒散數服。而脹痛針之出膿。碗許。又用十全大補湯加香附十餘服而安。

徐曰。此是乳癰實症。如乳子之時有此。乃是外吹也。

一婦人暴怒。左乳結腫疼痛。自服仙方活命飲二劑。疼

痛稍止。結腫不消。仍服清涼敗毒之劑。

精京二

字徐勣 腫痛



更作形體日弱。診之脈浮數而無力。此真氣虛而邪
氣實也。非補不可。用益氣養榮湯四五服。其腫始消。
寒熱亦退。又十餘服而膿消。兼服十全大補湯。而
而痊。此症非純補豈能得愈。種補二字徐勒批
日外症無純補

一男子年過五旬。因妻喪子不成立。憂鬱傷肝。左乳結

腫。半年痛甚。作腐。肝脈弦數。先用小柴胡湯加青皮

山梔。遠志貝母數服。而肝脈稍平。又用八珍湯仍加

前藥十餘服。其腫漸腐為膿。更服益氣養榮湯。庶保

收斂。彼為內醫所惑。謂鬱怒傷肝。肝經有火。不必用



補更服降火流氣寬中等劑。致食少便秘發熱作渴。復請余治。肝脈復弦。口乾作渴。邪火內淫。飲食減少。脾土受傷。便秘發熱。陰血竭而爲燥。爲熱已上。俱內損症也。辭不治。後月餘。果死。

徐曰。此卽果子乳岩。本屬難治。

婦人左乳結核。三年方覺腫痛。診之。脈緊數而有力。此陽有餘而陰不足也。況結腫如石。皮肉紫色不澤。乃真乳岩症。辭不治。又一婦左乳結腫。或小或大。或軟或硬。俱不作痛。至半年餘。腫如覆碗。堅硬木痛。近

乳頭纍纍徧生疙瘩。時痛時癢。診之脈弦而數。腫色慘黑不澤。此氣血已死。亦辭不治。又一婦已潰。腫如泛蓮。流血不禁。亦辭之。後果俱死。

徐曰。此段所述。皆真乳岩。無愈理。

楣案。余所製消核膏。凡乳核初起。無內症。貼之無不消者。但除根甚難耳。因循不治。變爲乳岩。則難治。乳岩潰後。宜貼陽和解凝膏。近見刻本經驗良方。載以鴉片灰作糝藥。亦有得愈者。附記于此。又案全生集乳岩治法。初起用犀黃丸。每服三錢。



酒送十服全愈或以陽和湯加土貝五錢煎服敷

木日可消倘誤以膏貼藥敷

楮案貼余消核膏無定辨說見癰瘡門後

主日漸腫大內作一抽之痛已覺遲治倘皮色變

異難以挽回勉以陽和膏日服或以犀黃丸日服

或三藥每日早晚輪服服至自潰而痛者外用大

蟾六隻分作三日每日早晚取蟾破腹連雜蟾身

刺孔貼於患口內服千金托裏散

方見癰瘡門註中

三日

後接服犀黃丸可救十中三四潰後不痛而癢極

者無一毫挽回大忌開刀開則翻花最慘萬無一

活。男女皆有此症。

乳癰主治方

牛蒡子湯

牛蒡子湯 瓜蒌仁 黃芩 連翹 柴花粉

銀花 山桅 甘草 陳青皮 牛蒡阜角針

治乳癰結腫疼痛。毋論新久。但未成膿者。

陳皮

牛蒡子

山桅

金銀花

甘草

瓜蒌仁

黃芩

天花粉

連翹

角針

各二

錢

柴胡

青皮

各五分

水二茶鍾煎八分。入酒一杯和勻。食遠服。

徐曰。此乳症通治方。



楣 棗 瓜 萋 仁 青 皮 徐 園

橘 葉 散

橘 葉 散 內 用 柴 陳 石 膏 連 翹 一 錢 等

川 芎 山 梔 青 皮 芩 橘 葉 廿 片 苳 五 分

治 婦 人 有 孕 胎 熱 為 內 吹 有 兒 喫 乳 名 外 吹 致 乳 結 成 腫 痛 寒 熱 交 作 甚 者 惡 心 嘔 吐

柴 胡

陳 皮

川 芎

山 梔

青 皮

石 膏

黃 芩

連 翹

各 一 錢

甘 草

五 分

橘 葉

十 二

片

水 二 茶 鍾 煎 八 分 食 遠 服

徐 曰 亦 通 治 方



樹案橘葉徐圈

清肝解鬱湯

清肝解鬱湯白芍
青皮生地併蘇葉

桔半芎歸貝志陳
通草香附梔茯神

治一切憂鬱氣滯乳結腫硬不疼不癢久漸作瘰癧
胸膈不利肢體倦怠面色萎黃飲食減少

陳皮

白芍

川芎

當歸

生地

半夏

香附 各八分

青皮

遠志

茯神

貝母

蘇葉

桔梗 各六分

甘草

山梔

木通

各四分

水二茶鍾薑三片煎八分食遠服



徐曰與前法重

鹿角散

鹿角散用角三寸
研服三錢酒調下

炭火煨之令微紅
乳癰新起散無蹤

治乳癰新起結腫疼痛憎寒發熱但未成者俱效鹿

角尖三寸用炭火煨稍紅存性碾末每服三錢食後

熱酒一茶鍾調服甚者再用一服必消

徐曰此單方

回乳四物湯

回乳四物湯四物
加上麥芽能散乳

芎歸地芍不可缺
自然腫脹消無跡

治產婦無兒喫乳致乳汁腫脹堅硬疼痛難忍

川芎

當歸

白芍

熟地

各二錢
麥芽

兩



炒爲粗末

水二茶鍾煎八分食遠服。用腳布束緊兩乳以手揉其腫自然消散。甚者再用一服。

徐曰。此治乳脹消乳之法。宜再加豬苓澤瀉茯苓等以利其水。

楣案熟地徐改生地。麥芽一味徐圈。

灸乳腫妙方

灸乳腫痛方法高將碗覆於患上灸

惱怒勞傷氣不調諸般腫痛寂然消

治氣惱勞傷或寒熱不調。乳內忽生腫痛。用碗一隻。

內用粗燈草四根十字排勻。碗內燈草頭各露寸許。



再用平山粗紙。裁成一寸五分闊紙條。用水溼紙貼蓋碗內。燈草上。紙與碗口相齊。將碗覆於腫乳上。留燈草頭在外。將艾大圓於碗足底內點火灸之。艾盡再添。灸至碗口流出水氣。內痛覺止方住。甚者次日再灸一次。必消。

保安萬靈丹 見腫瘍門

治乳癰初起發熱惡寒頭眩肢體作痛者。

益氣養榮湯 見癰瘡門

治鬱怒傷肝七情內結以致乳中生核不疼不癢日



久方痛甚者胸膈不利吞酸嘔吐頭目昏眩四肢倦
怠或已破潰膿水清稀不能收斂飲食減少口淡
味自汗盜汗肢體羸瘦者

治乳便用方

治乳 蒲公英最良 葱湯 一盞催微汗

酒煎熱服即眠牀 腫痛全消身便康

治乳癰初起腫痛未成膿者用蒲公英春秋間開黃

花似菊者取連根帶葉二兩搗爛用好酒半斤同煎

數沸存渣敷腫上其酒熱服被蓋睡一時許再用連

鬚葱白湯一茶鍾催之得微汗而散此方鄉村偏僻

無藥之所用之極妙亦且簡便



徐曰此單方

下乳天漿散

下乳天漿四物同
王不留行併山甲

茯苓花粉麥門冬
漏蘆甘草與木通

治乳母元氣虛弱。乳汁微少。或生兒日久乳少。

川芎

當歸

白芍

熟地

茯苓

天花粉

甘草

王不留行

炒

麥門冬

漏蘆

穿山甲

炒

通草

各一錢

用健豬前蹄一隻煮爛。取汁二碗。同藥煎至碗半。二

次頓熱食。遠服之。以熱木梳梳其乳房。其汁如泉湧

而來。



徐曰。此催乳法。

稽案王不留行漏蘆穿山甲通草及健豬前蹄徐

俱圈。

木香餅

木香餅用生地黃氣滯腫疼併閃胸

二物和勻患上裝用之一熨自無礙

治一切氣滯結腫成核或痛或閃胸風寒所傷

木香

五錢

生地黃

一兩 搗膏

右木香為末。曰地黃和勻。量患處大小。作餅貼上。以熱熨斗熨之。堅硬木痛者。間日熨之。

徐曰外治良法



乳癰應用方

十全大補湯

八珍湯

見潰瘍門

逍遙散

冰蠟散

小柴胡湯

見癰瘍門

托裏消毒散

見癰瘍門

阿魏化痞膏

見癰疾門

附骨疽論第三十四

附鶴膝風

夫附骨疽者。乃陰寒入骨之病也。人之氣血壯實。雖遇

寒冷而邪不入骨。凡人者。皆由體虛之人。夏秋露臥

寒溼內襲。或房慾之後。蓋覆單薄。寒氣乘虛入裏。遂

成斯疾。初起則寒熱交作。稍似風邪。隨後臀腿筋骨



作痛不熱不紅。疼至徹骨甚者。曲伸不能轉側。日久

陰變為陽。寒化為熱。熱甚而腐肉為膿。此疽已成也。

凡治此症。初起寒熱作痛時。便用五積散加牛膝。紅

花。發汗散寒。通行經絡。或萬靈丹發汗。亦可。次以大

防風湯行經活血。滲溼補虛。又有生於尻臀部位。漫

腫作疼者。徐曰此非真骨癰宜內托芫活湯。腿內近膝股漫

腫木痛者。內托耆柴湯。腿外側者。內托酒煎湯。初起

通用人參敗毒散。人參加木瓜牛膝蘇木紅花虛者徐勒

十全大補湯加羌活防已牛膝已成欲作膿者附子



八珍湯膿成脹痛者卽針之膿稠而黃體實者十全
大補湯膿清色白體虛者保元大成湯食少體倦者
香砂六君子湯脾虛寒熱者補中益氣湯以此調理
可也又有風溼相乘之症初起寒熱交作次傳腿腫
作痛其形光亮微紅發熱按之如泥不卽起者宜當
歸拈痛湯或茯苓佐經湯間服萬靈丹和之以上之
症皆由元氣不足中來不可悞用損脾泄氣敗毒等
藥外禁寒涼等法如悞用之必致氣血冰凝內肉癢
腐日久化爲污水敗膿流而不禁終死又有房慾勞

傷寒熱互變氣血乖違經脈橫解受病日深以成斯

疾者

徐曰此溼毒之症

其患大腿漸漸腫如冬瓜上過膝

下至足底牽連漫腫皮色不紅日久潰膿色白腥穢

腫仍不消痛仍不減元氣日衰身體縮小唇舌乾焦

二便枯秘諸藥不效飲食不進終為不治又有鶴膝

風乃足三陰虧損之症

徐曰又是一病

初起寒熱交作時亦

宜五積散加牛膝紅花或萬靈丹發汗俱可如汗後

腫痛仍不消滅此陰寒深伏以太陽風湯溫暖經絡

重者兼灸膝眼二穴敷以琥珀膏亦可漸漸取效如



以上之法俱不效者。終成痼疾。不必強藥消之。只宜
先天大造丸。史國公藥酒。終年常服。亦可轉重就輕。
徐圖步履也。

附骨疽看法

初起身微寒熱。飲食如常。結腫微紅。疼不附骨者。順已
成。舉動自便。結腫成囊。疼痛有時。膿易成者。吉。已潰膿
稠。腫消痛減。身體輕便。睡穩不熱者。吉。潰後元氣易復。
飲食易進。內肉易實。膿水易乾者。吉。初起身發寒熱。漫
腫色白。肢體牽強。疼痛附骨者。險。已成舉動不便。通腿



漫腫不熱不紅不作膿者險已潰膿水清稀氣穢腥臭
腫痛不消形體日削者死潰後脾胃虛弱飲食無味口
渴不止脣白皮枯者死

徐曰看法亦與諸症同

附骨疽治法

初起發熱惡寒身體拘急腿腳腫痛脈澹緊者散之已
成腿腳腫痛皮色不變上下通腫者散寒滯經絡寒熱
作腫色白光亮按之如泥不起者宜健脾滲溼身體無
熱惡寒脈遲而澹腿腫不熱者養血溫經絡暑中三陰

脈洪而數。腿腳掀腫。口乾便燥者。宜下之。已潰膿水清。稀飲食減少。形體消瘦者。補中健脾胃。潰後腫痛不減。膿水不止。虛熱不退者。溫中養氣血。愈後筋骨牽強。屈伸不便者。宜滋養氣血。通利關節。

徐曰亦與諸症同法

附骨疽治驗

一男子中寒發散未盡。大腿腫痛。脈浮數而無九。此風寒未盡。內虛故也。用五積散去麻黃。加牛膝二服。疼痛稍減。又用內托黃耆酒煎湯四服。全腫俱消。惟腿

外側結腫一塊不消此癰血凝滯欲作膿也。用托裏藥候膿熟針之。更服十全大補湯而斂。

徐曰此腿癰也非骨疽。

一男子勞碌遇寒每發腿痛發則寒熱嘔吐胸痞不食。此因氣惱飲食不節脾胃受傷故不能運化痰滯中脘溼熱動而下注爲腳氣。投以開結導引丸二服行去停痰。又用半夏佐經湯數服嘔止膈利。更服附子六物湯數劑消而不發。

徐曰此寒溼也。

一老人年六旬。過慾腎虛。致筋攣痺縮。腳膝無力。不能步履。外貼追風逐溼膏。內服三因勝駿丸。而愈。

一男子右腿腫痛。兩月餘。余曰：膿成已久。何不開之。彼曰：二老醫同治。俱稱內消無膿。再請二老決之。俱曰：無膿。但病者昏沈不醒。命在危篤。余強開之。出膿盈許。以獨參湯連進二服。而甦。後以十全大補湯調理。百日外而安。

徐曰：此亦腿癰。

一男子房事後受陰寒。大腿無形作痛。至夜尤甚。不能

步履奮以散寒除溼消痰止痛藥治之其疼益增余
診其脈細澹而無力此氣血不足寒氣所乘之故投
以大防風湯二劑疼痛頓減又四劑而痊

徐曰此亦寒溼

一男子暑月慾後當風睡臥寒氣襲於左腿遂致腫痛
寒熱交作胸痞不食以保安萬靈丹葱湯化服洗浴
發汗以散骨髓寒毒後以大防風湯去羌活加紅花
破故紙溫暖腎經通行經絡腫痛漸消血脈漸和又
以三因勝酸丸間服調理兩月而愈

徐曰此外感風寒也

一監生慾後受寒。致成腿痛。余以暖腎氣。温經絡。散寒

邪藥治之。彼以為緩。請內醫投表散之劑。外邪散而

內虛。又以小柴胡湯。等藥調理。小柴胡湯徐勒致虛熱發作

口燥咽乾。煩渴不已。又以知母石膏湯。清其上。防風

木瓜威靈仙等劑。攻其下。此三字徐勒致病愈劇。仍請余

治。其時患腿愈腫。其形縮小。楣案既云愈腫又云縮小必有誤余斷

以必死。此症原屬腎經受寒。非附子破故紙不能通

達關節。非羌活防風牛膝不能通行。閉滯非人參白



尤炙甘草不能使脾氣行達四肢非川芎當歸白芍
熟地紅花不能養血活血凡病從虛而入者先補其
虛後攻其病。以上八字徐又批曰今此症不加溫補
而發散解肌以正風寒有餘之法治之不死何待後
果死。

徐曰以上說症皆非附骨疽名實相背。

附骨疽主治方

五積散 五積芎歸朴桂心 枳殼乾薑併桔梗 蒼半麻陳芍茯苓
白芷甘草共薑行

治風寒溼毒客於經絡致筋攣骨痛或腰腳酸疼或



遍身拘急。或發熱惡寒頭痛者。

蒼朮 二錢 陳皮 桔梗 川芎 當歸

白芍 各一錢 麻黃 枳殼 桂心 乾薑

厚朴 各六分 白芷 半夏 甘草 茯苓 各四分

水二茶鍾。薑三片。煎八分。不拘時服。頭痛惡寒者加

連鬚葱頭三根。蓋汗為效。下部加木瓜牛膝。

徐曰。此方雜亂不切。

內托羌活湯 內托羌活黃柏蒼紅花甘草當歸尾 桂翹藁朮陳耆防

通治下體用此方



治尻臀患癰。堅硬腫痛。兩尺脈緊。數按之無力。

羌活

黃柏

防風

歸尾

藁本

肉桂

各一錢

黃耆

一錢五分

連翹

甘草

蒼朮

陳皮

各六分

紅花

五分

水酒各一茶鍾。煎八分。食前服。

徐曰。此下體通治之方。

當歸拈痛湯

當歸拈痛湯二朮
升麻茵陳草柏葛

羌活防芩澤瀉苓
二參知母要調勻

治溼熱下注。腿腳生瘡。赤腫作痛。或腰腳酸痛。或下

肢肩身重痛。或下部頑麻作癢。或成血風。



羌活

當歸

防風

茵陳

蒼朮

各

錢

苦參

升麻

白朮

各七分

葛根

甘草

黃芩

知母

澤瀉

豬苓

人參

各五分

黃柏

三分

水二茶鍾煎八分食前服。

徐曰。此治溼毒之方。可擇而用之。

內托黃耆湯

內托黃耆湯黃柏柴胡肉桂木瓜同

當歸生地兼羌活連翹一味還煎入

治溼熱。腿內近膝股患癰。或附骨癰初起腫痛。此太

陽厥陰之分也。脈細而弦。按之洪緩有力。



黃耆鹽水拌炒 當歸 柴胡 木瓜 連翹 各

錢

羌活

肉桂

生地

黃柏

各五

水酒各一茶鍾煎一半空心服。

徐曰與前法相近。

楣案木瓜羌活肉桂三味徐圈。

內托酒煎湯

內托酒煎湯桂耆甘草升麻牛蒡子

柴胡連翹黃柏歸水酒同煎治溼宜

治寒溼發於腿外側少陽經分患癱或附骨癱堅硬漫腫作痛或流至足陽明經作腫。

黃耆

當歸

各二錢

柴胡

一錢五分

連翹

肉桂



升麻

牛蒡子

錢各一

黃柏

甘草

分各五

水酒各一茶鍾煎一半食前服

徐曰意重前

茯苓佐經湯

茯苓佐經湯半夏藿香澤瀉柴胡等

木瓜厚朴其薑行

治足少陽經為四氣所乘以致腰腿發熱疼痛頭目昏眩嘔吐不食胸膈不利心煩熱悶等症

茯苓

陳皮

半夏

白朮

蒼朮

各

錢

藿香

澤瀉

甘草

葛根

柴胡

厚朴

木瓜

分各五



水二茶鍾。薑三片。煎八分。食前服。

徐曰。義重前方。

附子六物湯。

附子六物湯。甘草。加薑三片。水煎服。

桂枝。白朮。防已。芍藥。何慮太陰足腫。

治四氣流注於足太陰經。骨節煩痛。四肢拘急。自汗短氣。小便不利。手足或時浮腫。

附子

甘草

各一錢

防已

白朮

茯苓

各八

分 桂枝 五分

水二茶鍾。薑三片。煎八分。食遠服。

徐曰。此治寒溼之方。



麻黃佐經湯

麻黃 佐經湯 葛根 桂辛 甘草 各減半

羌活 二防 蒼朮 芩 更加 薑 棗 效如神

治風寒暑溼流注足太陽經腰足攣痺關節重痛

寒發熱無汗惡寒或自汗惡風頭痛等症

麻黃

葛根

羌活

防風

蒼朮

茯苓

防己

各一錢

桂心

細辛

甘草

各五分

水二茶鍾薑三片棗二枚煎八分食前服

徐曰此亦治寒溼之方義重前

楣案蒼朮桂心細辛徐圈



小續命湯

小續命湯芎白朮
附子麻黃桂枝芍

防風防己共人參
薑汁甘草兼黃芩

治寒溼之氣中於三陽致身不熱所患煩疼或
筋或腫或不腫或膝腿頑痺或時緩縱不隨或
百節攣痛或小腸疝氣攻衝

川芎

白朮

防風

人參

防己

附子

生用

麻黃

有汗去之

桂心

黃芩

白芍

各一

錢

甘草五分

水二茶鍾煎入分入薑汁一匙和勻食前服又暑中
三陰所患必熱去附子減桂枝一半



徐曰此散風寒溼之總方諸方之祖也

大防風湯

大防風湯虎附歸
羌活牛膝併甘草

參芍川芎杜仲耆
熟地還加薑引宜

治三陰之氣不足風邪乘之兩膝作痛久則膝愈大

而腿愈細因名曰鶴膝風乃敗症也非此方不能治

又治附骨疽皮色不變大腿通腫疼痛無奈及痢後

脚痛緩弱不能行或腿膝腫痛

人參

錢二

防風

白朮

附子

當歸

白芍

川芎

杜仲

黃耆

羌活

牛膝

甘草

熟地

各一錢



水二茶鍾薑三片煎八分食前服。

徐曰與前方亦相近。

檳蘇散

檳蘇散內用木瓜羌活木香薑作引

香附陳皮大腹加何愁風溼脚酸麻

治風溼流注脚腫酸痛或麻痺不仁嘔吐不食。

檳榔

紫蘇

木瓜

香附

陳皮

大腹皮

各一錢

木香

三分

羌活

五分

水二茶鍾薑三片葱白三莖煎一鍾空心服。

徐曰此方專治脚氣。

榻案檳榔紫蘇木瓜大腹皮木香徐園。



獨活寄生湯

獨活寄生湯茯苓

芎歸防芍細辛參

治肝腎虛弱風溼內攻足脛緩縱或膝痺攣重

獨活二錢

茯苓

川芎

當歸

防風

白芍

細辛

人參

桂心

杜仲

秦艽

牛膝

熟地

桑寄生

真者各一錢

甘草

五分

水二茶鍾薑三片煎八分食前服

徐曰此亦公共之方

又曰此治下焦風寒溼痰雜犯之方雖藥味不純

而於義無

楣案熟地徐改生地

神應養真丹

神應養真丹木瓜
川芎熟地菟絲子

當歸羌芍共天麻
蜜丸酒服效堪

治厥陰經為四氣所襲脚膝無力左癱右瘓半身不遂手足頑麻言語蹇澀氣血凝滯徧身疼痛者

當歸

川芎

白芍

天麻

羌活

熟地

搗膏

木瓜

菟絲子

各等分

右為細末入地黄膏加蜜丸如桐子大每服百丸空

心溫酒鹽湯任下



徐曰此緩治之方亦無甚妙義

三因勝駿丸

三因勝駿乳麝香
戟廿沒薜櫛蒼蝎

歸麻二木棗羌活
故紙菴蓉熟地黃

治元氣不足真氣虛弱及諸虛被寒溼氣侵襲手足

拳攣脚指連脚面拗急走注疼痛筋脈不伸行步不

隨常服益真氣壯筋骨黑髭鬚滑皮膚一切足弱鶴

膝風症並治

附子

一枚要一兩
以外者製

當歸

明天麻

牛膝

酸棗仁

熟地搗膏

防風

各三兩

木瓜

四兩

全蝎

淨身

二兩

麝香

乳香

沒藥

木香



羌活

甘草

炙各五錢

檳榔

萆薢

肉蓯蓉

破故紙

巴戟

去心

蒼朮

各一兩

右爲細末。煉蜜丸。桐子大。每服七十九。空心淡鹽湯。

溫酒任下。病近者七日。年深者半月見效。

徐曰。此緩治之法。作丸方不外此。

健步丸

健步丸中用川烏。生甘滑石兼花粉。

苦參羌活澤柴胡。防已防風桂酒糊。

治生平好飲燒酒。傷於脾肺。膝中無力。伸不能屈。屈不能伸。膝脊腿腳沈重。行步艱難者。

苦參

酒洗

防已

酒浸

羌活

柴胡

滑石

炒



花粉

甘草 各五分

防風

肉桂 各三錢

澤瀉

五錢 川烏 泡二錢

右為細末。酒糊為丸。如桐子大。每服三十九。空心溫

酒送下。

徐曰。義重前。

大腹子散

大腹子散 蘇木瓜 獨活 桑皮 併枳殼

羌荆 赤芍 木通 加 甘草 青皮 效可誇

治風毒脚氣上攻。寒熱交作。肢節煩疼。心神壅悶。

大腹子

紫蘇

木瓜

羌活

荆芥

赤芍

木通

獨活

桑白皮

青皮

各五



分

枳殼一錢

甘草二分

水一茶鍾。薑五片。葱白三莖。煎八分。空心服。

徐曰。此亦治脚氣之方。重前義。

榻案煎藥加薑。方書皆言幾片。而不言銖兩。蓋以

此物非取諸藥肆。窮僻小戶。不皆有戲也。然薑有

大小。片有厚薄。味又極辛。能掩諸藥。三片已覺其

多。此方各藥銖兩甚輕。而薑至五片。是薑為政矣。

余願後之著方書者。酌改銖兩為錢。不獨此方然

也。



北京中醫藥大學圖書館版權所

加味敗毒散

加味敗毒散人參木瓜枳桔甘蒼朮

羌獨前柴芎茯苓風溼方中此最靈

治足三陽經溼熱毒氣流注腳踝。掀赤腫痛。寒熱如瘧。自汗惡風。或無汗惡寒。或惡聞飲食者。

人參

羌活

獨活

前胡

柴胡

川芎

桔梗

茯苓

枳殼

甘草

木瓜

蒼朮

各八分

水二茶鍾。薑三片。煎八分。食前服。便秘加炒大黃。

徐曰。此治風溼之方。

千里健步散

千里健步散有功草烏加上研爲末

細辛白芷共防風瞬息長安路可通



治遠行兩腳腫痛。若用之。輕便可行千里甚妙。

細辛

防風

白芷

草烏

右等分爲末。糝在鞋底內。如底乾。卽以水微溼。過糝藥著腳行走。自不費力。再不作腫。

徐曰。此風溼外治之方。

雷火神鍼

雷火神鍼功最奇。紙筒丁麝和蘄艾。

風寒溼毒總相宜。急用針之不可遲。

治風寒溼毒襲於經絡爲患。漫腫無頭皮色不變。筋骨疼痛。起坐艱難。不得安臥者。

蘄艾

三錢

丁香

五分

麝香

二分



丁麝研末。與蘄艾揉和。先將夾紙作筒。如指粗大。以艾藥灌入筒內。疊實。臨用以蕭山紙七層平放。患處將筒點著一頭。隔紙捺實針之。待不痛。方起針。病甚者再針一次。七日後火瘡大發。自取功效矣。

徐曰。外治用處甚多。然藥味亦尚多。此未全。

追風逐溼膏

逐溼膏中羌獨活 川草二烏辛芷朮
豨桂麻藤星夏歸 大黃甘草同熬入

治風寒暑溼所傷。致骨節疼痛。筋攣不能步履。或麻木。溼痺等症。

豨薟草

麻黃

川烏

草烏

海風藤



半夏

南星

羌活

草麻子

切桂枝

各

兩

獨活

細辛

當歸

白芷

蒼朮

大黃

各兩

以上藥各切片。用葱汁薑汁各二碗拌藥。先浸一宿。

次日用香油半筋。

桐案諸藥共有數筋之多。而香油止半筋半字必誤。

先將藥

入鍋內。慢火煎至葱薑二汁將乾不爆時。方下油與

藥相煎。渣枯為度。細絹濾清。每油一筋。配飛過炒丹

十兩為準。將前油入鍋內煎滾。至滴水成珠不散。方

下黃丹。徐徐攪入。其膏已成。再下碾淨松香淨末一



筋門兩同熬化。取下鍋來。將盆頓穩。再下乳香木香。胡椒輕粉各末二兩。白芥子細末四兩。漸入以勻。便入鉢內盛貯。用時熱湯頓化。綾緞攤貼。七日後諸痛可痊。百發百中。

徐曰。膏藥方勝。此者甚多。不足取。

楣案油已煎至滴水成珠。而每油一筋。下炒丹十兩。則不待再熬。而已堅不可攤。再下松香一筋。四兩。及各藥末十二兩。其堅如石矣。此蓋著書者忘卻熬膏時分兩。隨筆填註也。

附骨疽應用方

保安萬靈丹

見腫瘍門

十全大補湯

見潰瘍門

小柴胡湯

見癰瘰癧門

外科正宗卷七終



北京中医药大学图书馆版权所有