

中西醫學叢書之二

中西合纂婦科大全

上海大東書局發行

南京中醫學院
圖書館藏書



無錫顧鳴盛編

中 西 彌 合 築 婦 科 大 全

��子書



戊午仲秋上海
大東書局藏版



編輯中西合纂四科大全緣起

醫學操人民生死之大枋得其道則生不得其道則死非可苟焉已也倉扁以前禁方每多不傳之祕宋元而後著述皆屬補救之文前清諸大家雖多所發明然大率各自成家或博而不精或雜而不一甚者自相牴牾轉足惑人此我國醫學所以不絕如縷也為舉諸弊以告學者長沙仲景承周秦之後著傷寒金匱創立方法格式始有法有方為醫宗之正派啟萬世之法程洵醫門聖書也然使仲景當日亦如後人之師古非今罔敢立一言創一法者則後將何所崇仰乎又設令後人悉若長沙不拘拘師承互闡發新理我醫學之進化寧有涯涘惜乎述而不作有因無革千百年來有如一日其弊一學醫初步僅湯頭歌訣脈訣數種其他不過瀏覽近人所述畧一涉獵其高深者動以限於經濟或囿於聞見不知博覽羣經貫徹源流遽



以為得是已足醫學不振職是之由其弊二比年以來西醫之勢日漸膨脹中醫之信用日漸削弱見者流不知旁求遠討為新舊醫學過渡之準備但肆力抨擊異己者是自棄也優勝劣敗天演公理其弊三往歲猶憂時者之請萃中西古今醫籍百數種為纂輯各科專本兩易寒暑始得歲事區其種類曰外科大全曰婦科大全曰幼科大全曰內科大全悉以中為經以西為緯中說之非者去之西說之是者採之苟為師者由是而教為弟子者由是而學寧醫學前途之幸抑亦我國民前途之幸也若夫攷叢之嚴引證之確尤不敢少有懈志如日月之經天並行不悖躋蒼黎於壽域歷劫常新此則區區之苦心也當世君子其教正之他如推拿鍼灸整骨喉科眼科等集當次第續出也

編者識

凡例

人之疾病以婦科為最雜醫家切脉處方亦以婦科為最難故婦科專書能詳備完善者頗不可得是編分總目七章子目一百七十餘節每節論斷病源中西互見不厭其詳處方亦中西並列學者苟能寢饋是編不難窮上工之奧為婦科司命

一 醫家切脉處方最宜謹慎稍一疎忽貽害無窮而於婦科一道尤宜慎之又慎是編蒐引中西古今書籍多至一百二十餘種者不翹集婦科之神髓而匯為一歸學者幸毋忽視之

一 是編引用中西諸籍無不一一悉心考正務使正確無訛而免貽害學者

一 中西醫學有可以貫通者有萬難融會者是編所列西醫

學說與夫中醫學說節節皆可互相印證互相發明其萬
難融會者甯付闕如以昭慎重

一
是編於婦科內外百病一一臚舉無遺故眉曰婦科大全
蓋述者慘淡經營歷數十寒暑遂能成事非尋常坊本可
擬一覽是編便知價值



鹿茸丸

升陽舉經湯

紅花當歸散

大元胡索散

鼈甲丸

白芷丸

加味逍遙散

歸脾湯

四物湯

加味四物湯

二陳湯

越鞠丸

八珍湯

加味小柴胡湯

補肝散

十全大補湯

神芎丸

二氣湯

十味香附丸

柴胡抑肝散

滋陰百補丸

蒼莎丸

青海蒼莎丸

益氣養榮湯

杏林摘要方

補中湯

紫金丸

逍遙散

增損四物湯

通經丸

調經散

通經四物湯

煮附丸

墨附丸

四製香附丸

七製香附丸

陽起石湯

當歸龍骨丸

又方

益母勝金丹

升麻膠濕湯

滋陰至寶湯

桃軍圓

又方

簡易當歸散

西方蘆薈丸

硫酸鐵丸

經水不利

申方牛膝散

牡丹散

產寶方

養榮湯

紫桂丸

萬病丸

土牛膝散

當歸乾漆丸

當歸散

琥珀散

產寶方



千金桃仁丸

三棱丸

紅花當歸散

通經丸

滋血湯

經驗方

經閉導痰湯

掌中金丸

礬石丸

柏子仁丸

澤蘭湯

沈香蠶散

牡丹散

六神湯

桃仁散

土瓜根散

又方

抵當湯

小柴胡湯

杏仁湯

大黃朴硝湯

茱萸蟲湯

龍骨散

桃仁湯

乾漆湯

芒硝湯

七熬圓

黃芩牡丹湯

牡丹圓

乾漆圓

浸酒方

牡礪圓

當歸圓

促經湯

通經散

桃仁承氣湯

通經方

大胡連丸

萬應丸

雄砂丸

烏鵲散

衛生湯

獮膽丸

經驗方

玉燭散

沈香降氣散

通經湯

導經丸

烏藥湯

無極丸

加味四物湯

健固湯

順經兩安湯

益母勝金丹

加味道遙散

消癆丸

五味異功散

八珍湯

通滯散



三和湯

延胡索湯

八味煎

又方

血極膏

單方

西方蘆薈沒藥酒

番紅花酒

龍腦沒藥粉

樟布林末

蘆薈沒藥丸

阿魏丸

過格魯兒鐵酒

又方

硫酸鐵丸

蘆薈丸

砒鐵蘆沒丸

規鐵丸

亞砒酸丸

林檎鐵酒

經來腹痛

中方琥珀散

芎歸丸

失笑散

柴胡調經湯

桃仁散

薑黃散

紫石英丸

大溫經湯

小溫經湯

萬病丸

內補當歸湯

八物湯

交加散

交加地黃丸

交加散

桂枝桃仁湯

延胡索湯

又方

三神丸

柴胡丁香湯

沒藥除痛散

牛膝散

瑞金散

立效散

伏龍肝散

加味烏沉湯

又方

宣鬱通經湯

調肝湯

順經湯

溫脾化濕湯

清熱調血湯

西方歇那設珍散

印麻散

燐古蛭散

流動晞度拉斯酒

加密列花阿片酒

麥角散



南京中医药大学图书馆版权所有

安知必林散

阿片酒五神飲

密兒拉加三聖飲

熱入血室

甲方加味小柴胡湯

乾薑柴胡湯

海蛤散

卷二

調經門下

天癸過期

甲方黃連解毒湯

牡礪丸

安老湯

附婦女經中攝生法

血崩

甲方小牛角鰓散

雲母芍藥散

禹餘糧圓

慎火草散

增損禹餘糧圓

又方

丸方

當歸湯

又方

又方

伏龍肝散

又方

大牛角中仁散

生地黃湯

又方

丹參酒

牡丹皮湯

白堊圓

又方

又方

芎菊湯

又方

又方

又方

馬通湯

馬蹄圓

慎大草散

蒲黃散

獨聖散

六君子湯

八珍湯

加味道遙散

歸脾湯

小柴胡湯

附子理中湯

補中益氣湯

十全大補湯

八味丸

獨參湯

黃芪當歸人參湯



南京中医药大学图书馆版权所有

龍腦雞蘇丸

黃芪膏子煎丸

黃芪膏熬法

芎歸湯

涼膈散

黃連解毒湯

酢附丸

芎歸膠艾湯

百子附歸丸

四製香附丸

墨附丸

內炙散

補陰丸

大烏雞丸

小烏雞丸

芩心丸

四物坎離丸

固經丸

升陽調經湯

升陽舉經湯

五積散

不換金正氣散

升陽除濕湯

橘歸丸

黑神散

女金丹

二宜丸

補中益氣湯

平補鎮心丹

白芷散

窟窿膏

滋陰窟窿湯

大溫經湯

烏藥湯

桂枝湯

理中湯

益母膏

二聖湯

斷源散

荆芥四物湯

子芩丸
當歸龍骨丸

獨行散

白礬丸

又方

震靈丹

三灰散

全生活血湯

七灰散

加減十全大補湯

五灰散

解毒四物湯

黑金散

萬靈膏藥

繭黃散

固經丸

旋覆花湯

半夏丸

備金散

縮砂散



南京中医药大学图书馆版权所有

涼血地黃湯

當歸芍藥湯

柏子仁湯

益胃升陽湯

柴胡調經湯

調經升陽除濕湯

加減四物湯

地黃丸

小薊湯

芎菊酒

奇效四物湯

金華散

又方

立效散

牡礪散

柏黃散

丁香膠艾湯

又方

芎菊湯

斷下湯

又方

熟附丸

神應散

鹿茸丸

赤龍丹

紫金散

白芷緩宮丸

琥珀散

荆芥散

開鬱四物湯

烏金散

又方

無比散

伏龍肝散

地榆散

鹿茸散

柏葉散

補宮丸

鎮宮丸

梅飲子

又方

十灰丸

香礬散

如聖散

上下相資湯

安崩湯

一笑散

獨聖丸

固本止崩湯

加減當歸補血湯

固氣湯

平肝開鬱止血湯

逐瘀止血湯

清海丸

滋血湯

單方

西方法角散

麥角飲



南京中医药大学图书馆版权所有

桂皮酒

醋鐵以脫滴劑

晞度拉斯企錠

晞度拉斯企滴劑

愛爾柯欽飲

過格魯兒鐵注射液

明礬注射液

赤白帶下

中立大補丸

樗皮丸

經驗方

又方

伏龍肝散

補經固真湯

補真潤腸湯

馬蹄丸

白芷散

又方

又方

白薇丸

當歸煎

牡礪散

茯苓散

卷柏丸

艾煎丸

沈香牡丹丸

索桂丸

固真丸

龍骨散

茅花散

苦棟丸

地榆膏

又方

麒麟竭湯

治白崩方

調經補真湯

地黃丸

桂附湯

又方

二豆散

鶴頂丸

白堊丸

養氣活血丹

茱萸浴湯

坐藥龍鹽膏

勝陰丹

回陽丹

酒煮當歸丸

女金丹

白礬丸

溫經湯

玳瑁丸

又方

神仙聚寶丹

經驗方

五味異功散

完帶湯

加減逍遙散

易黃湯



北京中医药大学图书馆版权所有

利火湯

清肝止淋湯

松寄生散

茅根湯

琥珀丸

腰滯二妙湯

當歸附子湯

補血麻霜散

固下丸

四仙散

清王散

血歸湯

又方

又方

大黃圓

桂附湯

單方

西方瀉利鹽

鐵黃散

蓖麻油

單寧酸坐藥

明礬綿球

魚肝油

鐵酒

明礬水

單甯酸水

明礬膏

又方

硼酸水

明礬注射料

硫亞鉛注射

六神丸

滿刺注射料

楊酸注射料

二沃油

甲方薑黃散

內金鹿茸丸

二豆散

烏金散
加味四七湯
鎖金丸
固精丸
又方

卷三 雜證門上

虛勞

中方增損四物湯

六神湯

加減大建中湯

清氣湯

黃芪散

四白散

桔梗飲子

如聖散

叔勞散

筒骨煎

滋血湯

補中丸



南京中医药大学图书馆版权所有
1951

溫中丸

人參丸

秘方十補丸

五聖丸

七補丸

羊乳丸

人參鼈甲丸

艾煎丸

芪味丸

大聖散

渾身碎痛飲子

當歸木香湯

煮肝散

硝砂煎丸

黃芪散

逍遙散

子芩散

知母散

半夏散

秦艽散

鼈甲地黃湯

胡黃連散

犀角散

紅藍花散

鼈甲散

護命方

豬肚丸

胡黃連丸

益母草煎丸

青蒿丸

鼈甲丸

雞蘇丸

河車丸

黃芪丸

地黃煎丸

人參散

赤茯苓散

天門冬丸

牡丹湯

鼈甲丸

黃連散

柴胡散

青蒿散

石膏散

青蒿

鼈甲煎丸

溫金散

治咽喉痛方

含化丸

河車丸

補肺湯

阿膠丸

紫苑散

當歸六黃湯

地黃煎

五味子湯

治咯血方



南京中医药大学图书馆版权所有

犀角地黃湯

白芍藥散

加味逍遙散

玄參清肺飲

五味子散

治肺勞驗方

歸命丹

救陽理勞湯

補肺人參湯

知母茯苓湯

人參養榮湯

人參固本丸

三才湯

七寶散

西方肝油

咖啡肝油

薄荷腦丸

肝油膠囊

薄荷聖古尼涅丸

古阿亞柯爾丸

古阿亞柯爾散

企沃柯爾飲

甘油飲

古阿亞柯爾灌腸料

蒸木油酒

肝油

蒸木油吸料

別拉米冬散

歇貌林散

阿斯必林散

硫規丸

撒曹散

燐古姪飲

歇那設珍散粉

菲沃斯散劑

歇魯因散

印麻散

莫若安茴滴劑

索勿拿粉

醋水外治法

樟腦酸散

麥角丸

晞度拉斯飲

鉛糖散

阿片散

古倫樸阿片飲

挖氏散

林檎鐵酒

又方

林檎鐵丸

沃鐵糖漿

肝油

鹽古嗎啡塗布藥

鹽古鉛糖吹口藥

又方



南京中医药大学图书馆版权所有

又方

薄荷腦油

硝蒼阿片散

撒蒼三收散

撒蒼散

止痛三聖酒

客熱

中方麥門冬散

犀角散

黃氏飲

丹砂散

玉霜散

生乾地黃丸

寒熱

中方地骨皮散

生地黃散

異功散

七寶湯

桃仁丸

青蒿散

生地黃散

加味道遙散

六一散

潤神散

秦艽扶羸湯

人參紫苑散

惡寒 中風

中方防風散

芎窮散

附子散

羌活散

南星散

木香煮散

白僵蠶散

羚羊角散

紫湯

烏蛇丸

天南星散 走馬散

烏蛇散 白木酒 神仙解語丹 防風湯

竹懸湯 三痺湯 獨活湯

烏蛇散 羌活湯 甘草附子湯

羌活湯 獨活湯 增損茵芋酒

大八風湯 繢命煮散 防風白木杜礪散

續命湯 繢斷湯 虎脰骨酒

續命湯 防風湯

續命湯

續命湯

續命湯

續命煮散

續命湯

續命湯

續命湯

續命湯

續命湯

續命湯

續命湯



南京中医药大学图书馆版权所有

千金方

擣鼻散

牛黃丸

三化湯

三生飲

大秦艽湯

二陳湯

地黃飲子

加味逍遙散

貝母瓜萎散

神术散

獨行丸

蘇合丸

排風湯

小引風湯

必效竹瀝湯

星香湯

星附湯

秦艽湯

省風湯

烏藥順氣散
八味順氣散
導痰湯

參蘇飲

秦艽升麻湯

犀角散

薏苡仁散

五味子湯

獨活細辛湯

八味順氣湯

防風通聖散

加減潤燥湯

攝生飲

祛風導痰湯

愈風湯

傷正湯

如程散

木香順氣散

保元湯

通關散
清熱導痰湯
惺忪散

黑錫丹
大竹瀝湯
破傷風秘方

十棗湯

白朮湯

理氣平肝散

大芎黃湯

羌活防風湯

玉真散

保命丹

附木湯

桂心白朮湯

八物白朮湯

三黃獨活湯

小省風湯

愈風湯

通關散

木香順氣散

南京中医药大学图书馆版权所有



青州白丸子

瓜蒂散

二痺湯

五痔湯

西方雙瀉灌腸料

一味灌腸料

雙瀉湯

麝綿灌腸料

麝香散

芫菁松節油

以脫獐腦注射料

索勿拿散

抱格寧神飲

沃剝水劑

人工鹽豫防劑

抱格灌腸料

抱格水劑

臭曹飲

飛尸血厥

中方白薇湯

倉公散

內鼻散

硫黃散

養正膏

益母草丸

獺肝丸

殺鬼方

溫金散

又方

補肝湯

治胸痺方

又方

瓜蔞湯

又方

喉痛方

又方

瘧疾

癲振

中方交加散

驚悸

中方茯神湯

酸棗仁丸

定志丸

養心湯

硃砂安神丸

治要茯苓散

茯神散

龍齒丸

琥珀散

茯苓補心湯

防風丸

遠志湯

補心湯

大補心湯

柴胡湯
青鹽丸

星附丸

獨活湯

茯苓丸



北京中医药大学图书馆版权所有

又方

小定心湯

大定心湯

荆滌湯

大鎮心散

小鎮心散

養血安神湯

安神鎮驚丸

右歸飲

左歸飲

逍遙散

大營煎

甯靜湯

化沖丹

茯苓補心湯

妙香散

半夏湯

獨參湯

單方

西方二臭散

斯篤洛仿滴劑

纈草水劑

毛地黃飲

比林散

歇貌林散

臭刺纈草丸

臭刺飲

臭化樟腦散

癲狂

中方防風散

又方

補心丹

控涎丹

牛黃瀉心湯

薯蕷丸

碧霞丹

二陰煎

六安煎

排氣飲

血風

抽薪飲
生鐵落飲

定瘤丸

河車丸

逐呆仙丹

二陳湯

返魂湯

清心豁痰湯

鉤藤湯

單方

西方臭刺飲

止癇四物丸

一味定瘤丸

三聖丸

臭刺飲

二寧散

臭曹纈草飲

亞篤羅必涅丸

臭刺飲



南京中医药大学图书馆版权所有

〔中方〕酸棗仁散

紫石英散

當歸散

赤芍藥散

草豆蔻散

訶梨勒散

神麴丸

進食散

筋體骨節疼痛

〔中方〕芎藭散

海桐皮散

虎骨散

何首烏散

通靈丸

當歸沒藥丸

四生丸

羚羊角散

羌活勝濕湯

生附除濕湯

加味防己黃芪湯

桂枝芍藥知母湯

防己湯

赤芍藥散

牛膝木瓜湯

擒虎散

經驗方

〔西方〕撒曹散

撒利必林

撒魯兒散

阿斯必林散

撒曹水劑

撒曹膏

歇那設珍散

比林散

企沃諾兒搽藥

依比知阿兒油

沃度沒食子

吳茱萸酒

三物搽藥

石鹼流動擦劑

卷四
雜證門中

走症痛

〔中方〕沒藥散

琥珀散

虎骨散

雄黃散

漏蘆散

四生丸

麝香丸

芍藥知母湯

附子八物湯

小續命湯

又方

清燥湯

滲濕湯

烏頭湯

樟腦膏

撒酸歇貌林散

四物搽藥



大防風湯

活絡流氣飲

痛風主方

中行圓

追命再造散

治諸風

疏經活血湯

羌活湯

療痛風方

治痛風方

又方

西方撒酸油

烏羅鴛羅賓散

炭酸里去謨重曹散

又方

阿斯必林散

比林散

撒曹散

沃度里去謨丸

二沃油

依比知阿兒膏

葛若越幾斯膏

重曹散

人工鹽

雙解散

二曹散

撒魯兒散

複方大黃丸

四物煎

中方養正丹

鉤藤散

獨活散

川芎散

四神散

斗門方

三五七散

清暈化痰湯

天麻半夏湯

玉液湯

香橘飲

羚羊角散

單方

西方以脫製酒

纈草滴劑

臭刺飲

四神丸

硫利腸散

中方旋覆花湯

七生丸

白附子散

川芎茶調散

如聖餅子

玉真丸

又方

鹽規散

頭痛

中西合璧婦科大全



南京中医药大学图书馆版权所有

硫黃丸

偏頭痛方

調中益氣湯

半夏白术天麻湯

羌活附子湯

選奇湯

都梁丸

清空膏

加味清震湯

羌活附子湯

加味升麻湯

半夏白术天麻湯

頭痛秘方

蘆薈散

乳香瑣落湯

透頂散

頭痛神方

治偏頭風

和中散

加減三五七散

大三五七散

點頭散

鈎藤散

芎辛湯

羌活湯

芎半導痰湯

菊芎散

祛風清上散

玉壺丸

消風散

十味芎蘇散

神芎圓

治頭痛方

又方

川芎散

又方

石亭丸

太陽散

都梁丸

西方米庫來寧散

硫規丸

臭化樟腦丸

纈草規丸

枸橼鐵規丸

複方大黃丸

三臭飲

歇貌林散

比林散

咖啡涅散

硫規散

四聖丸

二喜散

三物定痛散

薄荷外搽油

薄荷梗

薄荷外搽酒

薄荷貼膏

至神丸

撒酸重曹散



北京中医药大学图书馆版权所有

二物必效散

獨行散

心痛

〔中〕方烏藥散

阿魏散

雞舌香散

應痛散

陳氏二神丸

抽刀散

靈苑方

沉香降氣散

手拈散

清中湯

保和湯

歸脾湯

化蟲丸

清中湯

加味四七湯

桔梗薤白半夏湯

鶴虱丸

赤石脂丸

〔西〕方鈴蘭葉加二刺丸

亞硝酸曹達飲

猶類端散

亞硝酸亞密兒吸入劑

雙解飲

燐古蛭注射料

沃剝飲

硝酸甘油丸

硝酸甘油錠

臭曹飲

心腹痛

〔中〕方三神丸

沒藥散

延胡索散

琥珀散

牡丹散

八仙散

又方

元胡索散

大效琥珀散

蠲痛散

菖蒲丸

沒藥散

手拈散

木香枳术丸
木香化滯湯

小腹痛

〔中〕方威靈散

當歸散

追氣丸

石灰散

吳茱萸湯

椒紅丸

橘核丸

脇痛

〔中〕方靈寶散

草豆蔻散



南京中医药大学图书馆版权所有

卷之二

人參紫金丸

氣針丸

大腹皮飲

柴胡疏肝散

雄黃散

瓜蔓散

木通散

三腕散

左金丸

當歸龍鬚丸

補肝散

項筋強痛

中方追風散

急風散

蠍附散

木瓜煎

腰痛

中方如神湯

獨活寄生湯

臂痛

普救萬全膏

舒筋散

又方

青娥丸

獨活湯

澤蘭湯

補陰丸

橘核丸

白芥子散

流氣飲

秦艽地黃丸

羌天麻湯

茯苓丸

藁本散

敗龜散

骨碎補散

附子散

養腎散

蠲痺散

松脂酒

虎骨膏九

烏頭湯

脚氣

中方大腹皮散

紫蘇飲

四白散

蒼术丸

檳榔散

羌活導滯湯

七味檳榔湯

平水丸

加減青木香丸

中方柏子仁丸

舒筋湯

茯苓丸

控涎丹

流氣飲

白芥子散

秦艽地黃丸

羌天麻湯

茯苓丸

藁本散

敗龜散

骨碎補散

附子散

養腎散

蠲痺散

松脂酒

虎骨膏九

烏頭湯

七味檳榔湯

平水丸

加減青木香丸



南京中医药大学图书馆版权所有

沉香散

松葉酒

逆衝飲

如神丸

又方

越婢湯

防己茯苓湯

枳木湯

麻黃散

五皮散

治水氣方

牽牛五靈煮散

疏鑿飲子

茯苓湯

木香分氣散

茯苓琥珀湯

通苓散

人參木香散

導水茯苓湯

加味胃苓湯

防己湯

犀角湯

治浮腫方

木香防己湯

五飲湯

禹水湯

禹餘糧丸

復元丹

獨活湯

犀角旋覆花湯

茱萸湯

必效療脚氣方

崔氏方

神效檳蘇散

大黃左經湯

牛膝散

防己飲

沉香湯

[西方]通利健胃湯

樟腦提神散

人工鹽

兩利飲

利水飲

斯篤洛仿飲

鹽古鎮吐滴劑

癰瘍瘻瘡

中方何首烏散

蒺藜散

治癰瘍方



南京中医药大学图书馆版权所有

又方
又方

青羊脂膏

消毒犀角飲子

消毒丸

西方比林水劑

石炭酸洗滌料

炭刺硫肝水

硫苦飲

醋外洗酒

內治三聖丸

薄荷塗藥

白蘭地酒

撒曹粉

秘魯脂油

石炭酸搽藥

抱格搽藥

薄荷塗藥

又方

石炭酸搽藥
以脫香水

莨菪膏

鹽古膏

痰飲

中方旋覆花湯

天南星丸

大半夏湯

導痰湯

柴胡半夏湯

澤瀉湯

甘遂半夏湯

桂苓术甘湯

順妙散

痰飲下藥

活胃散

治痰飲方

白朮散

半夏茯苓湯

二陳湯
滾痰丸

貝母瓜萎散

西方稀鹽酸加百弗聖滴劑

複方規那酒

三味活胃散

六物健胃散

二一錠

三聖酒

二曹散

椒黃重曹散

咳嗽

中方黃芪丸

蛤蚧丸

含化丹

貝母湯

定喘湯

補肺湯

金不換散

橘皮湯



四滿丸

團魚丸

參木調中湯

噙化丸

參芪補脾湯

南星飲

人參歸芎湯

紫蘇散

治十六種哮嗽

貝母湯

細辛湯

杏子湯

滌痰湯

紫苑草湯

麻黃蒼朮湯

觀音救苦散

降氣化痰湯

射干兜苓湯

竹茹湯

人參湯
阿膠湯
百部湯

止嗽散

人參胡桃湯

薑橙膏

九仙散

人參款花湯

杏仁五味湯

人參清肺湯

清氣化痰湯

潤肺除嗽湯

單方

西方五味散

三仙丸

六一膏子

五物膏子

臭刺杏仁錠

四物散

二物散
祛痰止嗽丸
必效散

喘滿

中立杏子散

橘皮半夏湯

棗膏丸

神授湯

天門冬丸

人參補肺湯

人參平肺散

加味甘桔湯

補肺百合湯

青龍丹

參蘇溫肺湯

治喘息方

信良丸

紫金丹

理喘息方

治喘滿方



南京中医药大学图书馆版权所有

〔西方〕沃利嗎啡飲

比林鹽歇散

治喘散

鹽古搽藥

炭酸安母尼亞滴劑

沃利錠

臭刺錠

止喘煙

硝石紙

兩奇熏煙

必效丸

亞篤羅必涅丸

亞比酸丸

嘔吐

〔中方〕益智子散

丁香散

竹茹湯

槐花散

半夏丸

人參七味丸

青金丹

人參安胃散

橘皮竹茹湯

大半夏湯
小半夏湯

檳榔散

大黃甘草湯

清鬱二陳湯

快氣湯

丁香半夏湯

清鬱二陳湯

香砂二陳湯

參苓白术散

單方

〔西方〕止嘔酒

三草酒

橙皮大黃加重曹散

五奇散

嗎啡滴劑

龍膽大黃酒

胃液素錠

兩素錠

卷五
雜證門下
霍亂

〔中方〕加減理中湯

四順湯

四逆加猪膽汁湯

香薷散

訶子散

胡椒湯

四味香薷飲

藿香正氣散

清暑益氣湯

香薷散

六和湯

紅圓子

不換金正氣散

小品人參湯

南京中医药大学图书馆版权所有

良薑散

乾薑茱萸湯
萸瓜湯

神效絞腸痧散

三味飲子

西方十滴藥水

豫防霍亂藥水

甘汞散

十滴藥水

阿片硝蒼散

麝香以脫滴劑

吊腳痧外用藥

阿片樟腦散

阿片吐根加甘汞散

翻胃吐食

[中方]白堦散

白芷散

太倉丸

青金丹

補真丸

神效附子丸

反食方

又方

單方

血膈

[中方]牡丹煎

鼻衄

[中方]刺薊散

伏龍肝散

人參飲子

三奇散

龍骨散

涼榮湯

麝香散

生地黃湯

又方

葛梅丸

生地芩連湯

單方

西方明礬吹藥

枯礬阿仙藥杵

明礬水

過格魯兒鐵液

芒硝散

雙礬水

止血兩味酒

吐血

[中方]雞蘇散

又方

吐血神驗方

柔脾湯

四生丸

又方

犀角地黃湯

乾薑甘草湯

雞蘇散

生地黃散

茯苓補心湯

麥門冬飲子



十灰散
堅中湯

又方

治血散

止血立應散

三黃丸

綠雲散

雲雪散

白术丸

單方

西 方 鉛糖散

麥角硫酸痛劑

過格魯兒鐵液

明礬蓉桂散

阿片過格鐵液

白阿膠飲

亞度來那林滴劑

積聚癰瘕

中 方 順氣丸

勝紅丸

香稜丸
大消石丸

阿魏膏

皂角散

青癥導藥方

療婦人血瘕痛方

又方

桃仁煎

三棱煎

療脂瘕方

導散方

療蛇瘕方

療鼈瘕方

穿山甲散

蓬莪术方

丁香丸

桃仁散

礞石丸

小三棱煎丸
大黃煎
調榮湯
川當歸散

琥珀散

地榆散

麝香丸

葱白散

巴豆丸

又方

四等丸

木香硇砂丸

當歸散

乾漆散

當歸散

硇砂丸

巴豆丸

黑神丸

蟠葱散

蒺藜湯



南京中医药大学图书馆版权所有

定痛散

蘆薈丸

橘核丸

大無神功散

奔豚丸

中立白术散

檳榔散

木香散

香砂和中湯

大橘皮湯

絮矩三和湯

厚朴七物湯

大半夏湯

柴胡厚朴湯

前胡散

人參湯

平肝飲子

大正氣散

強中湯

沉香飲

七氣消集散

吳茱萸湯

鼈甲丸

金陵酒丸

柴胡厚朴湯

西方三物利水散

嘈雜

中立旋覆花湯

侯苓補心湯

西方重曹硝蒼朮石散

小便淋瀝

中立石葦散

木通散

桃膠散

金沙散

雞蘇散

火府方

黃芩清肺飲

五苓散

桃仁湯

木通散

五淋散

草薢分清飲

單方

西方二神散

三物煎

二仁煎

二香散

二仁阿片飲

萸朮坐藥

鹽古坐藥

大麻散

菲沃斯散

小便不通

中立滑石散

又方



北京中医药大学图书馆版权所有

弱葉散

石葦湯

千金翼方

葱白湯

又方

續隨子丸

薰法

導氣除濕湯

八正散

木通散

茯苓升麻湯

單方

西方安息泥菖散

三奇散

小便數

中立鹿茸散

桑螵蛸散

縮泉丸

遺尿失禁

中立鹿茸丸

二白散

秘元丸

參芪湯

滋榮養衛湯

單方

西方安息香飲

樟布林散

規鐵散

麥角角蒸散

硫鐵丸

麥角茴香糖

小便出血

中立鹿茸散

髮灰散

生乾地黃散

當歸散

阿膠散

單方

西方過格鐵液滴劑

礬散

單甯酸散

麥角散

流動睇度拉斯酒

麥角單寧散

規那蘇木飲

腸風黑神散

地榆湯

防風如神散

黃連散

清魂散

槐花湯

香附散

止血散

柏葉湯

清榮槐花飲

玉屑丸



南京中医药大学图书馆版权所有

剪紅丸

滑石散

膩連丸

西方愛爾柯欽注射料

明礬蓉桂散

單寧阿片散

大便不通

中方通神散

大麻仁丸

皂角丸

搜風順氣丸

潤腸湯

三黃湯

潤燥湯

西方蘆黃公英丸

三瀉散

滿那薄水

藥刺巴脂飲

大黃重曹飲

神效散

蘆黃藥脂丸

大便或秘或利

中方皂角丸

疾藜湯

大五柔丸

二仁丸

次硝酸

阿片粉

阿片吐根散

泄瀉

中方香朴丸

桂香丸

豆蔻分氣飲

豆蔻丸

人參豆蔻散

木香散

香連丸

如金丸

防風芍藥湯
茯苓湯

白木芍藥湯

五香散

二神丸

五味子散

固腸丸

加味七神散

六柱飲

快中丸

八珍散

治下痢不止方

治下痢

撒蒼黃滴劑

大黃五倍子酒

撒蒼重曹散

單寧蒼重曹散

阿片酒

阿片吐根散



南京中医药大学图书馆版权所有

阿片酒飲子

又方

協熱下利

中方玉粉丹

四味阿膠丸

滯下

中方白頭翁湯

神木散

六神丸

三黃熟艾湯

四順附子湯

三建丹

加味參附湯

香茸丸

調中湯

胃風湯

水煮木香丸

升陽除濕防風湯
二黃湯

芍藥湯

橘皮乾薑湯

半夏生薑湯

丁香柿蒂湯

橘皮竹茹湯

生薑橘皮湯

退陰散

豬苓湯

倉廩湯

治痢散

朴黃丸

開噤散

元青丸

聖餅子

訶黎勒丸

露宿湯

玄白散

蕘麻子油
硝蒼阿片散

吐根阿片飲

痔瘻

中方鼈甲散

蒼木瀉澤丸

淋洗藥

香穀丸

檳榔子丸

黃連散

加減六味丸

國老散

當歸連翹湯

參芪湯

秦艽防風湯

三神丸

治療漏方

蝸牛膏

三物輕瀉散

痔瘻坐藥
止血敷藥

所有



南京中医药大学图书馆版权所有

定痛敷藥

又方

三物通利散

鞣礬坐藥

痔瘡外搽藥

脫肛

甲方升麻除濕湯

針粉散

提氣散

舉肛丸

單方

前陰諸疾

陰腫

甲方菖蒲散

經心錄方

麻黃湯洗方

白礬散

單方

西方皓礬水

沃度彷謨粉

陰瘡

甲方大黃散

廣濟方

崔氏方

聖惠方

西方石炭酸水

愈瘻神膏

又方

陰痛

甲方太和湯

海螵蛸散

(西方)皓礬水

陰瘡

甲方補心湯

藿香養胃湯

治陰瘡方

肘後方

又方

黃芩湯洗方

雄黃散

當歸湯

單方

西方石炭酸水

鹽古定痛液

沃度彷謨粉

沃度仿謨膏

甘汞硝蒼粉

滿刺水

硼酸水

陰瘡

甲方洗方

傅藥

又方

陰挺下脫

甲方三藥丸

一捻金丸

黃芩散

熏洗法

托藥

摻藥

敷藥



南京中医大學圖書館版權所有

陰冷

甲方五加皮酒浸方

又方

又方

溫中坐藥

交接出血疼痛

甲方桂龍散

又方

單方

與鬼交通

甲方茯神散

桃仁丸

辟溫丹

妙香散

殺鬼雄黃散

別離散

硃砂散

又方

求嗣

甲方六味地黃丸

調理藥

丸子

抑氣散

大五補丸

增損三才丸

紫石門冬丸

白薇丸

蓆蓉免絲子丸

加味香附丸

調經丸

正元丹

溫胞湯

坐導藥

葆真丸

千金種子丹

聚精丸

五子衍宗丸

十子丸

候胎

甲方神方驗胎散

探胎散

保生丸

交感地黃煎丸

琥珀丸

龍鬚湯

佛手散

返魂丹

內炙散

附逐月養胎法

烏雌雞湯

補胎湯

艾葉湯

黃連湯

雄雞湯

茯神湯

菊花湯

加味六子丸
六味合五子丸



南京中医药大学图书馆版权所有

調中湯
阿膠湯
安中湯
安胎當歸湯
麥冬湯
柴胡湯
旋覆花湯
葱白湯
杏仁湯
芍藥湯
葵子湯
縮胎丸
半夏湯
猪腎湯
滑胎枳殼散
張氏方
內補丸
易產滑胎方
神農丸

榆白皮散
縮胎飲
黑神丸
惡阻

〔中方〕乾薑人參半夏丸

半夏茯苓湯

茯苓丸

集驗方

旋覆半夏湯

旋覆花湯

白朮散

人參丁香散

又方

醒脾飲子

人參橘皮湯

歸原散

安胎飲

小地黃丸

衛生湯

白朮散

二香散
又方
單方

〔西方〕鹽古哥羅方滴劑

抱格飲
哥羅方滴劑
鹽古散

沃度酒

嗎啡滴劑

止嘔特效散

半夏湯

薄荷散

薄荷飲

胎動不安

〔中方〕永固孕湯

當歸散

白朮散

集驗方

四物湯

阿膠散



北京中医药大学图书馆版权所有

又方

立效散

胎動湯

寄生湯

黃芪湯

順氣飲子

安胎寄生湯

秦艽湯

黃芩湯

鉤藤湯

葱豉安胎方

護胎法

安胎織罩散

銀苧酒

又方

安胎飲

佛手散

救損安胎湯

子懸

中立紫蘇飲

當歸湯

紫蘇飲

解鬱湯

單方

胎漏

中立大全方

安胎飲

如聖湯

桑寄生散

人參散

二黃散

地黃湯

治漏血方

枳壳湯

桂枝茯苓丸

榆白皮散

大全方

助氣補漏湯

胎傷
單方

中立催生神妙佛手散

集驗方

竹茹酒

秦艽湯

安胎酒

捷徑方

心痛

中立火龍散

產寶方

白朮湯

又方

單方

中立心腹痛

當歸芍藥散

阿膠散

芎歸湯

草豆蔻散

香木散



南京中医药大学图书馆版权所有

地黃當歸湯

丹溪驗方

單方

小腹痛

甲方 婕娘小腹痛方

又方

腰腹及背痛

甲方 通氣散

五加皮散

五加皮丸

大地黃丸

扶氣止喘湯

息焚安胎湯

苧根湯

單方

心腹脹滿

甲方 倉公下氣湯

訶黎勒散

安胎和氣飲

枳壳湯
附子湯

胎水腫滿

甲方 天仙藤散

又方 莼藧子散

又方 防己湯

澤瀉散

防己湯

千金鯉魚湯

腎著湯

五皮散

白朮散

單方

孕癱
甲方 積聚
中方 香附子丸

甲方 烏藥湯

牡丹皮散

神效瓜蔞散

傷食

甲方 木香丸

白朮散

中惡
甲方 當歸散

勝金散

又方 防風散

又方 單方

中風

甲方 防風散

生犀角散

防己散

獨活散

白僵蠶散

赤箭丸

白朮酒

甲方 羚羊角散

葛根湯

風症

甲方 羚羊角散

葛根湯



南京中医药大学图书馆版权所有

羌活酒

羚羊角散

瘧疾

中立消風散

眩晕

驚悸

犀角散

中立大聖散
子瘡
中立竹葉湯

子煩

竹茹湯

麥門冬散
知母飲

麥門冬湯

又方

柴胡散
人參散
淡竹葉湯

升麻散

知母散

葛根散

人參黃芪散
單方

吐血衄血咳嗽血

中立必勝散
單方

咳嗽

中立款冬花散

苦梗散

馬兜鈴散

麻黃散

百合散

紫菀湯

喘

中立平安散

瘧

中立驅邪散

七寶散

柴胡散

又方

霍亂

中立人參白朮散

人參散

白朮散

木瓜煎
縮脾飲

泄瀉

中立加味理中湯

滯下

中立薑蒲飲

黃丹止痛散

又方

黃連湯

厚朴散

草果飲

大小便不通

中立甘遂散

葵子湯

又方



北京中医药大学图书馆版权所有

當歸散

又方

大腹皮湯

滋腎丸

葵子茯苓散

苦參丸

丹溪驗方

獨聖散

淋

〔中方〕地膚大黃湯

安榮散

大腹皮散

地膚子煎

遺尿

〔中方〕海螵蛸散

溺血

〔中方〕續斷湯

薑蜜湯

單方

眼目失明

〔中方〕天門冬飲子
臘燥悲傷

〔中方〕甘麥大棗湯
淡竹茹湯

紅藍花散

白蜜湯

烏金散

紅藍花散

白蜜湯

烏金散

白蜜湯

烏金散

白蜜湯

烏金散

白蜜湯

半產

〔中方〕芍窮補中湯
阿膠湯

杜仲丸

四製艾附丸

刪繁方

生地黃湯

人參湯

人參黃氏湯
龍骨散

當歸酒

澤蘭湯

白蜜湯

豬膏飲

當歸湯

地黃湯

澤蘭湯

白蜜湯

烏金散

白蜜湯

烏金散

白蜜湯

聖愈湯

當歸補血湯

四物二連湯

活血湯

利氣洩火湯

當歸澤蘭湯

當歸澤蘭湯



南京中医药大学图书馆版权所有

固氣填精湯

理氣散瘀湯

黃芪補氣湯

加減四物湯

單方

西 方 阿魏丸

撒汞注射料

昇汞丸

阿片酒

阿片散

又方

阿片坐藥

麥角丸

又方

麥角飲

又方

麥角注射料

麥角吐根散

愛爾柯欽坐藥

愛爾柯欽灌腸料

胎不長

中 方 安胎白朮散

黃芪散

人參丸

集驗方

枳實檳榔丸

早產遲產

中 方 知母丸

槐子丸

單方

鬼胎

中 方 雄黃丸

又方

臨產將護法

中 方 蛇蛻散

保生無憂散

加味八珍湯

華陀順生丹

順生丹

催生如神散

催生法
單方

中 方 催生如神散

又方

催生柞木飲子

開骨膏

催生丹

如意散

勝金丹

催生湯

難產秘方

如聖散

無憂散

催生如聖散

半夏湯

七聖散

勝金散

萬金不傳丹

立聖散



南京中医药大学图书馆版权所有

單方

交骨不開

中方加味芎歸湯

降子湯

下死胎法

中方烏金散

一字神散

卷七

產後門

產後調護法

中方加味四君子湯

四順理中丸

地黃丸

當歸散

四味湯

玉露散

地黃煎

地黃酒

桃仁煎

產後醋墨

黑神散

琥珀散

增損澤蘭丸

黑龍丹

中方失笑丸

牛膝散

補中益氣湯

奪命散

花蕊石散

芎菊散

牛膝湯

牛膝散

備急丹

下胎丸

單方

血晕

厥逆附

中方清魂散

保命荆芥散

來甦散

芎歸加芍藥湯

獨行散

奪命散

牡丹散

花蕊石散

黑神散

救運至聖丹

補氣解暉湯

當歸補血湯

安心湯

單方

惡露不下

中方荷葉散

廣濟方

沒藥丸

保命散

單方



南京中医药大学图书馆版权所有

惡露不止

[中方]芎歸加芍藥湯

獨聖湯

牡礪散

單方

心痛

[中方]七氣手拈散

大巖蜜湯

失笑散

蜀椒湯

單方

腹痛

[中方]延胡索散

黑神散

地黃散

當歸血竭丸

澤蘭湯

卷荷散

芸薹散

下瘀血湯方

腰痛

[中方]獨活湯

補肺散

抵聖湯

又方

[中方]當歸湯

骨脹痛

單方

三香散

枳實芍藥散

增損四物湯

當歸建中湯

當歸生薑羊肉湯

當歸養血丸

紫金丸

香桂散

又方

延胡索散

桃仁湯

保命方

桃仁芍藥湯

大豆酒

救急方

生地黃湯

桃仁湯

五香連翹湯

當歸黃芪湯

桃仁湯

單方

頭痛

[中方]川芎散

一奇散

芎附散

加減四物湯

腳氣

[中方]獨活寄生湯

身痛

[中方]趁痛散

古拜散

中風

[中方]防風湯



川芎散

經效茯苓湯

鹿肉湯

血氣湯

華陀愈風散

濟危上舟

葛根湯

乾葛湯

天麻散

當歸散

伏龍肝散

交加散

羚羊角散

雞矢醴

白术酒

大豆紫湯

羚羊角飲子

防風當歸散

滋榮活絡湯

天麻丸

加減生化湯

單方

癩癰

〔中方〕防風湯

增損柴胡湯

秦艽湯

拘攣

〔中方〕芎窮散

防己膏

不語

〔中方〕七珍散

胡氏孤鳳散

逐血補心湯

譏語

〔中方〕奪命散

烏金散

四物補心湯

調經散

茯神散

柏子仁散

加參生化湯

安神生化湯

滋榮益氣復神湯

單方

〔西方〕吸毒膏

燐酸糖漿

硫規散

比林散

撒曹散

樟腦散

石炭酸水

列曹兒水

酒精水

顛狂

〔中方〕大聖澤蘭散

何氏方

澤蘭湯

〔中方〕白茯苓散

驚悸



熟地黃散

七寶散

牡丹散

遠志丸

白茯苓丸

人參散

琥珀地黃散

茯苓散

抱膽丸

加減榮養湯

養心湯

恍惚

〔中〕方茯苓湯

茯神湯

琥珀散

遠志散

天麻丸

辰砂遠志丸

虛煩

〔中〕方延胡索湯

經效方

金黃散

沒藥丸

竹葉湯

甘竹茹湯

人參當歸湯

薤白湯

芍藥梔政湯

仲景三物黃芩湯

竹皮大丸

單方

參附湯

當歸六黃湯

附湯

芍藥梔政湯

黃芩散

〔中〕方熟地黃湯

七味白朮散

竹葉歸芪湯

延胡索散

桃花散

渴

〔中〕方熟地黃湯

黃芩散

括薑根湯

竹葉湯

七味白朮散

竹葉歸芪湯

延胡索散

桃花散

自汗

〔中〕方全身活血湯

麻黃根散

止汗散

人參湯

當歸六黃湯

參附湯

芪附湯

麻黃根湯

八味地黃丸

〔中〕方犀角飲子

單方

黃疸

〔中〕方丹溪方

發熱

〔中〕方犀角飲子

三之一湯

三合散

加味逍遙散



南京中医药大学图书馆版权所有

人參當歸湯

人參湯

當歸養血丸

當歸黃芪湯

當歸補血湯

當歸散

往來寒熱

〔甲方〕柴胡四物湯

小柴胡加生地黃湯

增損柴胡湯

增損四物湯

熟地黃散

黃芪丸

大調經散

加減烏金散

知母湯

瘧

〔甲方〕草果飲子

生熟飲子

蓐勞

〔甲方〕石子湯

豬腰子粥

人參鼈甲散

猪腎湯

白茯苓散

黃芪丸

牡丹散

黃芪煮散

黃芪建中湯

虛羸

〔甲方〕產後補虛劑

三合散

當歸羊肉湯

十全大補湯

息乏補益方

附蒸骨方

保真湯

加味大造湯

痞悶

〔甲方〕見曉丸

腹脹

〔甲方〕補中益氣湯

健脾湯

養榮生化湯

長生活命丹

水腫

〔甲方〕大調經湯

小調經湯

白朮湯

奪魂散

漢防己散

張氏方

加減吳茱萸湯

金匱加減腎氣丸

加味八物湯

五皮散

轉氣湯

積聚

〔甲方〕瘡積聚方

芍藥湯

治血瘕方

四神散

桂心丸

霍亂

〔中方〕白术散

溫中散

附子散

高良薑散

生化六和湯

附子散

溫中湯

嘔吐

〔中方〕開胃散

石蓮散

加減生化湯

溫胃丁香散

生津益液湯

吃逆

〔中方〕參附湯

石蓮散

丁香散
羌活散

單方

欬嗽

〔中方〕旋覆花湯

知母飲

喘促

〔中方〕血竭散

參蘇飲

旋覆花湯

五味子湯

大補湯

二味參蘇飲

加參生化湯

補氣養榮湯

鼻衄

〔中方〕二味參蘇丸

血崩

〔中方〕固經丸
芎菊湯加芍藥方

熟地黃散
白芍藥散

又方

阿膠丸

菖蒲酒

瑞蓮散

生血止崩湯

升舉大補湯

救敗木生湯

單方

月水不調

〔中方〕琥珀散

薑黃丸

月水不通
瀉利

〔中方〕產後泄方

調中湯

加味生化湯

參苓生化湯

加減生化湯

健脾利水生化湯



南京中医药大学图书馆版权所有

赤白痢

中方救急散

黃連丸

白頭翁加甘草阿膠湯

加減生化湯

青血丸

單方

大便秘澀

中方麻仁丸

單方

大小便不通

中方桃花散

遺糞

中方產後遺糞

又方

單方

淋閟

中方茅根湯

滑石散

單方

小便數

中方桑螵蛸散

括薑湯

小便不禁

中方黃芪湯

又方

單方

固脬散

補脬飲

雞內金散

完胞飲

單方

小便出血

中方治小便利血方

又方

崔氏方

單方

大便下血
附：肉綿出
中方硫黃散

陰脫產門不閉

桃仁膏

硫黃湯

熨法

當歸散

收膜湯

兩收湯

陰蝕

中方千金方

洗搗湯方

甘濕散

狼牙湯

單方

乳少

中方漏蘆散

又方

立效方

又方



南京中医药大学图书馆版权所有

又方

通乳丹

通肝生乳湯

湧泉散

乳泉湯

滴乳湯

釀乳丸

生乳散

瓢蓄湯

當歸補血湯

治乳不出方

治乳無汁方

出乳汁秘方

治乳閉方

又方

單方

西方泌乳散

孕婦酒石散

乳汁自出

〔西方〕三物散
沃剝飲

吹乳

〔中方〕瓜蔞散

又方

單方

〔西方〕規那煎

沃度彷謨搽藥

依比知阿兒搽藥

姑乳

〔中方〕連翹湯

赤龍皮湯

天麻湯

飛烏膏散

黃連胡粉膏散

瓜蔞散

回脉散


十全大補湯

單方




南京中医药大学图书馆版权所有

婦人生殖器圖



娠足月姪圖




2

置之腹胎形之足姪此
也位中兒與腹月婦係。




南京中医药大学图书馆所有

娠卵子圖



化之體而發漸細元此
也變形成育次胞始由

胎兒與盤胎血運圖



雙胎足月圖


此兒頭先出

此兒足先出



也胎謂古形作界壁列上向之足雙胎
是攣所即凹紋有腹所如體月

橫生圖



此兒中先醫出手一食法鹽以舊撮兒心兒即入後順其而矣

仰面生之體勢



此兒之背及前頭
部向母體之左側



此兒之背及前頭
部向母體之右側



南京中医药大学图书馆版权所有
Nanjing University of Chinese Medicine

坐臀生之體勢



坐臀者因胎兒之骨盤向母體之骨盤有全臀位不全臀位之異不全臀位之產出足先下否則足踵緊接臀部而下降也



南京中醫藥大學
南京中醫藥大學圖書館版權所有

無錫顧鳴盛輯

調經門上

經候總論

中醫學說上古天真論曰。女子二七天癸至。任脉通。太衝脉盛。月事以時下。故有子。蓋天癸者。言後天之陰氣陰氣足。而月事通。是即所謂月經也。良以女體屬陰。其氣應月。月以三旬而一盈。經以三旬而一至。月月如斯。經常不變。故謂之月經。又謂之月信。一有不調。則失其常度。而諸病見矣。衝為血海。月經之本。任主胞胎。二脉流通。經血漸盈。應時而下。然陽明胃氣。又為衝脉之本。故月經之本。所重在衝脉。所重在胃氣。所重在心脾。以皆為生化之源耳。他如七情六淫。飲食起居之失宜者。無非心脾胃氣之賊。何者當顧。何者當去。學者於此當知所從矣。婦人月水。不調。由風邪乘虛。客於胞中。而傷衝任之脉。損手太陽少陰之經。蓋衝任之脉。皆起於胞中。為經絡之海。與手太陽小腸。手少陰心。以為表裏上為乳汁。下為月水。然月水為經絡之餘。苟能調攝得宜。則經應時至矣。治婦人之病。當以經血為先。而血之所主。在

古方書。皆言心主血。肝藏血。脾統血。故凡傷心傷肝。傷脾者。均能為經脈之病。久病之肇端。雖或由思慮。或由鬱怒。或由積勞。或由六淫飲食。然多起於心肺。肝脾四者。血色之辨。固可察虛實。亦可審寒熱。血濃而多。血之盛也。血淡而少。血之衰也。至於紫。亦鮮紅濃而成片成條者。皆是新血妄行。多由內熱紫而兼黑。或散或沉。色近敗者。皆因真氣內損。多由虛寒。其他或如屋漏水。或如腐敗之宿血。又皆紫黑之變象也。

西醫學說月經為女子一生最重要之事。自青春期發動期。以至五十歲間。經水必應期而至。少者三日。多者六七日。間有延至十日者。此因女子卵巢內之細胞。按時成熟。產生卵珠。與生殖機能有直接之關係。故月經之來潮。即其堪以生殖之卵珠已成熟之報告也。凡行經時。女子之體力。消耗甚多。倘無月經。即不能生育。尋常經水來時。以卵珠業已成熟。故內起掀衝。而充盈卵巢及子宮之血。亦即化為有臭臭之血液。與粘液而出外。先作淡紅色。後乃漸加濃厚。如普通之血色。終則但有無色之粘液。若久留血管中。則變暗黑色。至每次月經所失之血液。平均約七錢。

半餘。初次經行之遲早。據法國某醫生所調查。謂貧民之女子。大抵在十四歲十個月中等人家之女子。約十四歲五個月。上流社會之女子。約十三歲八個月。惟來潮較早者。其終止亦必早。平均約二十五年。即自十五歲至四十歲之間也。其全無月經。或初有中止。或過多過少。或經來腹痛等。皆病也。宜速延專門婦科醫療之。

經水先期

中醫學說 婦人有先期經來者。其經甚多。人以為血熱極。豈知腎中水火太旺乎。火太旺則血熱。水太旺則血多。此有餘之病。非不足之證也。似宜不藥有喜。但過於有餘。則子宮太熱。亦難受孕。更恐有鑠乾男精之慮。過者損之。乃既濟之道也。然而火不可任其有餘。而水斷不可使之不足。治之之法。但少清其熱。不必洩其水也。方用清經散。又有先期經來。祇一二點者。人以為血熱極。豈知腎中火旺而陰水虧乎。夫同是先期之來。何以有虛實之異。蓋婦人之經最難整調。苟不分別細微。用藥鮮克有效。先期者火氣之冲多寡者。水氣之驗。故先期而來多者。火熱而水有餘也。先期而來少者。火熱而水不足也。倘一見

先期之來。俱以為有餘之熱。但洩火而不補水。或水火兩洩之。有不更增其病者乎。治之之法。不必洩火。祇專補水。水足火自消矣。亦既濟之道也。方用兩地湯。先期三五日者。為血熱。四物湯加芩連。肥人加痰藥。先十數日者。血氣俱熱也。四物湯加黃芩。柴胡。香附。肥人清海蒼莎丸加黃連。白朮。王子亨曰。經者常候也。謂候其一身之陰陽愆伏。知其安危。故每月一至。太過不及。皆為不調。陽太過則先期而至。陰不及則後時而來。其有乍多乍少。斷絕不行。漏而不止者。皆由陰衰陽盛所致。先期而至。有因脾經血燥者。宜加味道遙散。有因脾經鬱滯者。宜歸脾湯。有因肝經怒火者。宜加味小柴胡湯。有因血分有熱者。宜加味四物湯。有因勞役火動者。宜補中益氣湯。凡血熱者。多有先期而至。然必察其陰氣之虛實。若形色多赤。或紫而濃。或去多。其脉洪滑。其臟氣飲食。喜冷畏熱。皆火之類也。治血熱有火者。宜清化飲主之。若火之甚者。如抽薪飲之類。亦可暫用。但不可以假火作真火。以虛火作實火。大抵熱則善流而慾期不止者。如續斷。地榆。丹參。茜根。梔子之屬。皆可用。若微火陰虛而經多早者。治宜滋陰清火。用保陰

煎之類主之。所謂經早者。當以每月大概論。所謂血熱者。當以通身臟象論。勿以素多不調。而偶見先期者為早。勿以脉證無火。而單以經早者為熱。若脉證無火。而經早不及期者。乃其心脾氣虛。不能固攝。而然宜大營煎。大補元煎。或五福飲。加杜仲五味子之類主之。此輩極多。若作火治。必誤之矣。

[西醫學說]月經先期至者。出血往往過多。當月經時。排出血液之分量。各人多少不同。然如因他部出

繩之者。

[中國醫方]清經散 治經水先期而至

丹皮三錢 地骨皮五錢
二錢 九蒸青蒿二錢 白芍三錢 大熟地

白茯苓一錢

黃柏五分 水浸炒

右水煎服。

四物加黃芩黃連湯 治經水如黑豆汁

四物湯四兩 黃芩兩半 右為末醋糊丸服。

[西醫學說]月經先期至者。

出血往往過多。當月經時。排出血液之分量。各人多少不同。然如因他部出

繩之者。

兩地湯 治經水先期

大生地一兩

酒炒

元參一兩

白芍藥五錢

酒炒

麥冬各半

右水煎服。

生地黃 川當歸 白芍藥錢各二 黃柏 知母
條芩 黃連 川芎 阿膠炒各八分 艾葉

溫服 香附 炙甘草各七分 右水二鍾煎一鍾。食前

當歸散 治經脈不勻或三四月不行或一月再至

當歸 川芎 白芍藥炒各一兩 黃芩一兩 白术

山茱萸肉兩半 右為細末。空心溫酒調下二錢。

日三服。如冷去黃芩。加肉桂一兩。

人參養血丸 治女人稟受素弱。血氣虛損。常服補

衝任調經。候暖下元。生血氣。

烏梅肉三兩 熟地黃五兩 當歸二兩 人參

川芎 赤芍藥蒲黃炒各一兩 右為細末。煉蜜

丸梧子大。每服八十丸。溫酒米飲任下。

逍遙散 治血虛煩熱。月水不調。脅腹脹痛。瘕潮熱。

當歸 白术 白芍藥 柴胡 茵苓各一兩 甘

草火半兩 右咬咀。每服半兩。入薑薄荷葉煎服。

薛新甫加牡丹皮山梔炒各五分。名加味逍遙散。神妙萬全方。無當歸芍藥甘草。有人參黃耆各等分。

增損四物湯 治月事不調。心腹疼痛。補血溫經。注

顏 川芎 當歸 芍藥熟地黃 牡丹皮 白术

各半 地骨皮一錢 右作一服。用水三鍾煎全

一鍾食前服。

清經四物湯 治經水不及期而來。乃血虛有熱。

當歸一錢半 生地黃 条芩 香附子各一錢

芍藥 黃連蜜汁炒各八分 川芎 阿膠珠

知母各五分 父葉 甘草各三分 右剗作一貼煎

服。

外國醫方】單寧酸二瓦 右為丸四十粒。每服五

粒。一日數次。

明礬二瓦 桂皮 薄荷葉各四瓦 牡丹皮二瓦

右為煎藥。三日服完。以上皆用於先期而月經過

多者。

經水後期

【中醫學說】婦人有經水後期而來者。人以為血虛之病也。豈知非血虛乎。蓋後期之多少實有不同。不可執一而論。譬如後期而來少。血寒而不足。後期而來多。血寒而有餘。夫經本於腎。而其流五臟六腑之

血皆歸之。故經來而諸經之血盡來附。益以經水行

而門啟不遑迅闔。諸經之血乘其隙而皆出也。但血既出矣。則成不足治法。宜於補中溫散之。不得曰後期者俱不足也。方用溫經攝血湯。血熱者經期常旱。此營血流利。及未甚虧者多有之。其有陰火內燔。血本熱而亦每過期者。此水虧血少燥澀而然治宜清火滋陰。以加味四物湯加減。一陰煎滋陰八味丸之類主之。血寒者經必後期而至。然血何以寒。亦惟陽氣不足。則寒從中生。而生化失期。是即所謂寒也。至於陰寒由外而入。生冷由內而傷。或至血逆。或為疼痛。是又寒滯之證。非血寒經遲之謂也。當詳辨之。凡陽氣不足。血寒經遲者。色多不鮮。或色見沈黑。或澀滯而少。其脉或微或細。或沈遲弦澀。其臟氣形氣必惡寒喜暖。凡此者。皆無火之證。治宜溫養血氣。以大營煎理陰煎之類加減主之。又寒則多滯。宜加薑桂吳茱萸草蔻之類。甚者須加附子。後期三五日者為血虛。四物湯加參芪白朮陳皮升麻瘦人不過血少。四物湯倍當歸地黃。少加桃仁紅花肥人多痰。二陳湯加南星蒼术滑石芍歸香附。

〔中國醫方〕通經四物湯 治經水過期不行乃血

虛有寒

當歸一錢

熟地黃

白芍藥 香附子

蓬萊

蘇木各一

木通八分

川芎 肉桂

甘草

各五分 紅花二分

桃仁二十個

右剗作一貼空

心水煎服

經水過多

〔中國醫說〕婦人有經水過多。行後復行。面色痿黃。身體倦怠而困乏愈甚者。人以為血熱有餘之故。豈知係血虛而不歸經乎。夫血旺經始多。血虛經當縮。今血虛而經轉多。良以血歸於經。雖旺而經亦不多。血不歸經。雖衰而經亦不少。世人見經水過多。每謂血旺。此治之所以多誤也。倘經多果因血旺。自是健壯之體。須當一行即止。精力如常。何至一行再行。致困乏無力耶。惟經多實為血虛。故再行而不勝其困乏。血損精散。骨髓中空。故色不華於面也。治宜大補血而引之歸經。則自無行後復行之病矣。方用加減四物湯。婦人月水不斷。淋瀝腹痛。或因勞損氣血而傷衝任。或因經行而合陰陽。以致外邪客於胞內。滯於血海。故也。但調養元氣。而病邪自愈。若攻其邪。來多或日數多五六日以上者。內熱血

散也。四物加芩术瘦人有火者固經。芩肥人多痰。清海蒼莎丸。經水來太多者不問肥瘦皆屬熱也。四物加芩連湯主之。兼服三補丸。

【西醫學說】慢性便祕。營養不良。脂肪過多。心臟肝臟等患病。精神感動等。俱能使月經過多。其證候則

日數延長或分量增多。終必全身貧血。陷於衰弱。

月經過多者。兩次月經作一次來。或但有異常之出血而不兼排卵也。此蓋為子宮粘膜或鄰接筋層增

加生殖之病。如子宮內膜炎。良性及惡性粘膜腫瘍。茸狀粘膜下纖維筋腫。增生之粘膜壁內纖維筋腫等是也。此等出血。其甚者每致異常貧血。若因子宮

癌崩壞。或患生筋腫而出血者。其面色且黃如蠟。令人惻然。其因多種之急生器病。如子宮及附屬器患生淋病。或敗血性病而致過多者。幸尚不甚劇

烈。中國醫方。加減四物湯。治經水過多。大熟地一兩。白芍三錢。當歸五錢。川芎二錢。續斷酒洗。白术五錢。黑芥穗三錢。山萸三錢。續斷土炒。甘草各一錢。右水煎服。四劑血歸經十劑後。

加人參三錢。再服十劑。下月行經適可而止矣。

膠艾湯 治勞傷血氣衝任虛損月水過多淋瀝不

斷

阿膠炒

川芎

甘草二兩

當歸

艾葉三兩

熟地黃

白芍藥兩

右咬咀

每服半兩水

煎一方有黃耆

續斷丸

治月水不斷口乾心煩四肢羸乏飲食減少

川續斷

當歸

烏賊骨

黃耆

牛角鰓燒

五味子

甘草

龍骨煅研

赤石脂

熟地黃

地榆

半兩

各一

艾葉

附子

乾薑

右為末

煉蜜丸

梧子大

每服三十丸

空心

溫酒下。

禹餘糧丸

治久冷月水不斷面黃肌瘦虛煩減食

禹餘糧

二兩

鹿角膠

七錢半

粉炒

紫石英

續斷

赤石脂

熱地黃

川芎

各一

乾薑

艾葉

柏葉炒

當歸炒

人參

白茯苓

右為末

煉蜜丸

梧子大

每三十丸

空心米飲

牡蠣丸

治血海虛損月水不斷

牡蠣粉

赤石脂

代赭石各一

阿膠

川芎

中醫藥大學圖書館版權所有

當歸 鹿茸 繢斷 乾薑 各三
甘草 半錢

右為末。煉蜜丸梧子大。每服三十丸。空心溫酒下。

經驗方 治經血不止

黃芩 五分 當歸 柏葉炒 蒲黃各四
艾葉炒一分 生地黃二分 伏龍肝十二分

右咬咀。用水二升。煎取八合。分二服。
又方 蓬蓬殼 护霜花等分。為末。每服二錢。空心

米飲調下。

固經丸 治經水過多不止。乃陰挾熱所致。法當補

陰清熱

黃柏 三兩 龜板 火四 黃芩 二兩 白芍 三兩

樗根皮 一兩 香附子 童便製 右為細末。酒

糊。凡梧子大。每以空心食前。白湯下五七十丸。

過期飲 治經水過期不行。乃血虛氣滯之故。法當

補血行氣

熟地黃 白芍藥 當歸 香附各二 川芎一錢

紅花七分 桃仁泥六分 蓬莪茂 木通各

分 甘草 肉桂各四 右水二鍾。煎一鍾。食前

溫服。

滋血湯 治婦人心肺虛損。血脈虛弱。月水過期

人參 山藥 黃耆各一 白茯苓 去皮 川芎

當歸 白芍藥 熟地黃各一 右作一服。水

二鍾煎至一鍾。食前服。

當歸龍骨丸 治月事失常。經水過多。

當歸 白芍 離骨 黃芩各一 木香一分

右為末。滴水為丸。如小豆大。溫米飲下三四十丸。食前日

三四服。

黃藥子散 治月事不止。煩渴悶亂。心腹急痛。肢體

困倦不欲飲食。

黃藥子 當歸 茜藥 生地 黃芩 人參

白朮 甘草 知母 石膏各一 川芎 桔梗

紫菀 槐花子 柴胡各一分 右為粗末。抄三

錢水一盞。煎至七分。濾汁溫服。食前。

二味散 治經水常不止。

牡蠣 阿膠各等分。右二味同為末。服之即止。後

去四物湯內之川芎。加黃連黃芩山梔子為藥末。

單方 經水不止。用白箬葉灰蠶紙灰等分。為末。每服二錢。米飲下。又方。用船茹一斤。淨洗河水四

升半。煮取二升。分二服。又方。服地黃酒良。又方。
用羊前左脚胫骨一條。紙裹泥封。令乾。煅亦入櫻櫟
反各等分。每服一錢。溫酒服之。又方。白芍藥香附
子熟艾葉各一錢半。水煎服之。又方。木賊炒三錢。
水一盞。煎七分。溫服。日一服。經水不斷。面色黃瘦。
血竭暫止。數日復發。小勞輒劇。用桑黃即桑耳。焙研。
每服二錢。食前熱酒下。日三服。久疾失治者。皆可服
之。又方。用槐蕊即槐耳。炒黃赤石脂各一兩。為末。
食前熱酒服一錢。又方。柏葉焙棕櫚皮灰各等分
為末。每服二錢。酒調下。又方。用側柏葉炙芍藥各
等分。每三錢。水酒各半。煎服。月水不止。日漸黃瘦。
用紫礦末。每服二錢。空心白湯下。又方。用雞冠花
一味。曬乾為末。每服二錢。空心酒調下。忌魚腥猪肉。
又方。牡蠣研米醋捏成團。再煅研末。以米醋調
青竹茹炭為末。每服三錢。水一盞。煎服。又方。五靈
脂炒煙盡研。每服二錢。當歸兩片。酒一盞。煎六分。熱
服三六度。取效。

〔外國醫方〕宜用麥角內服。或用愛爾柯欽注射皮
下。外部貼置冰袋。用溫水灌腸。或以明礬單寧灌注。

陰內。或以沃度仿誤和入綿球納陰中。皆妙。其最簡
便者。莫如以潔淨冷水。入白帶筒。自行灌注陰內。日
約二次。頗效。但不得過用。過用則經血轉多。慎之。
明礬二瓦 桂皮 薄荷葉各四瓦 杜丹皮二瓦
右為煎藥。三日服完。
單寧二瓦 右為丸四十粒。每服五粒。一日數
次。

經水不調

〔中醫學說〕寸口脉微而濇。微則衛氣不足。濇則血
氣無餘衛不足。其息短。其形燥。血不足。其形逆。榮衛
俱虛。言語謬誤。趺陽脉浮而濇。濇則胃氣虛。虛則短
氣。咽燥而口苦。胃氣濇則失液。少陰脉微而遲。微則
無精。遲則陰中寒濇。則血不來。此為居經。三月一來。
婦人月水。一月一來。如期。謂之月信。其不來。則風
熱傷於經血。故血在內不通。或內受邪熱。脾胃虛損。
不能飲食。食既不充。榮衛凝澀。肌膚黃燥而不光澤。
事沉滯。數月不行。肌肉不減。內經曰。此名為瘕。為沈
也。沈者。月事沈滯不行也。急宜服桃仁承氣湯。加當
歸大作劑料服。不過三服。立愈。後用四物湯補之。更

可用宣明方。檳榔丸。肥胖飲食過度之人。而經水不調者。乃是濕痰。宜蒼术半夏滑石茯苓白朮香附川芎當歸。月候不調之由。或前或後。或多或少。凡行後作痛者。虛也。少而淡者。血虛也。多者。氣虛也。要之當以四物湯為主治。月候不調之中。有兼疼痛者。有兼發熱者。有趨前者。有落後者。則趨前為熱。落後為虛也。疼痛之中。有當時作痛者。有經前經後作痛者。則當時與經前作痛者為血積。經後為血虛也。發熱之中。有當時發熱者。有經行發熱者。則當時為血虛有積。行為血虛有熱也。婦人每月經水。應期而下。不使有餘。猶太陰之缺也。其有或先或後。或少或多。或欲來先痛。或來而斷續。皆謂之不調。和氣飲加香附子半錢。兼喫獨附丸。經事來而腹痛者。經事不來而腹亦痛者。皆血之不調故也。欲調其血。先調其氣。四物湯加吳茱萸半錢。香附子一錢。和氣飲加茱萸半錢。亦可用。痛甚者。延胡索湯。然又恐感外邪。飲食致痛。痛不因血。尤宜詳審。和氣飲却能兼治。有因驚氣上逆。致月不通。涎多神昏。昏則不知人。或妄言歌笑。似心癲。似五癇。醒時又似正人。或病來身如搖動。手足如搐搦。四七湯。大溫經湯各半貼。和勻。

服有經候失期。或過二三月。變生諸證者。和氣飲須用桂枝者。性最動血。和氣飲加蘇木紅花乾漆各半錢。桃仁一錢。或酢或酒。煎去滓。入麝香少許。仍以頭調黑神散。因經候不調。血不循故道。從糞後出腹。或疼或不疼。勿作尋常便血治。宜順其經。四物湯去地黃。加阿膠香附子各一錢。仍以黑神散和調氣散。白湯點服。婦人病多是月經乍多乍少。或前或後。時發疼痛。醫者一例呼為經病。言為陰勝陽。抑陽勝陰。所謂天寒地凍。水凝成冰。故令乍少而在月後。若陽氣乘陰。則血流散溢。經所謂天暑地熱。經水沸溢。故令乍多而在月前。當別其陰陽。調其血氣。使不相乘。以平為期。宜紫石英丸。以期言之。對期者。性和血。足易受孕。祇差一二日者。亦不為害。以色言之。心主血。陰從陽。故以色紅為正。雖不對期而色正者。易調來少色和者。四物湯點滴欲閉。潮煩脈數者。四物湯去芍。加澤蘭葉三倍。甘草少許。十味香附丸。內寒血澀。來少或日少五六日以上者。四物湯加桃仁。紅花牡丹皮葵花。婦人經候不調有三。一曰脾虛。二曰衝任損傷。三曰脂液凝塞。治病之工。不可不審。

脾胃虛弱者。經曰。二陽之病發心脾。女子不月夫二陽者。陽明胃也。胃主受納五穀。長養血氣。灌溉臟腑。流行經隧。乃水穀之海。血氣之母也。惟憂愁思慮。則傷心。心氣受傷。脾氣失養。鬱結不通。腐化不行。胃雖能受。而所謂長養灌溉流行者。皆失其令矣。故脾胃虛弱。飲食減少。氣日漸耗。血日漸少。斯有血枯血閉。及血少色淡。過期始行。數月一行之病。衝任損傷者。經曰。氣以虛之。血以濡之。故氣行則血行。氣止則血止也。女子之性。執拗偏急。忿怒妬忌。以傷肝氣。肝為血海。衝任之系。衝任失守。血氣妄行也。又褚氏曰。女子血未行而強合以動其血。則他日有難名之疾。故女未及二七天癸之期。而男子強與之合。或於月事適來未斷之時。而男子縱慾不已。衝任內傷。血海不固。由斯二者。為崩為漏。有一月再行。不及期而行者。矣。脂痰凝塞者。蓋婦女之身。內而腸胃開通。無所阻塞。外而經隧流利。無所凝滯。則血氣和暢。經水應期。惟彼肥碩者。膏脂通滿。元室之戶不開。挾痰者痰涎壅滯。血海之波不流。故有過期而經始行。或數月而經一行。及為濁為帶。為經閉。為無子之病。經血為水穀之精氣。和調於五臟。灑陳於六腑。乃能入於脉。

也。凡其源源而來。生化於脾。總統於心。藏受於肝。宣布於肺。施泄於腎。以灌溉一身。在男子則化而為精。婦人則上為乳汁。下歸血海。而為經脈。但使精血無損。情志調和。飲食得宜。則陽生陰長。而百脉充實。又何不調之有。苟不慎則七情之傷為甚。而勞倦次之。又或為慾不謹。強弱相陵。以致衝任不守者。亦復不少。此外則外感內傷。或醫藥誤謬。但傷營氣。無不有以致之。凡人有衰弱多病。不耐寒暑。不勝勞役。雖先天稟弱者常有之。然有以氣血方長。而縱情慾損。或精血未滿。而早為斲喪。致傷生化之源。則終身受害。此未病之先。所當深察而調之者也。若欲調其既病。則為虛實陰陽四者為要。凡女人血虛者。或遲或早。經多不調。此當察臟氣審陰陽。參詳形證脉色。辨而治之。庶無誤也。蓋血虛之候。或色淡。或澀少。或過期不至。或行後反痛。痛則喜暖喜按。或經後則困憊難支。腰膝如折。或脉息微弱弦澀。或飲食素少。或形色薄弱。凡經有不調。而值此不足之證。皆不可妄行尅削。及寒涼等劑。若再傷脾腎。以伐生氣。則惟有日甚矣。凡肝脾血虛。微滯微痛者。宜四物湯主之。或加肉桂。或加黃芩。隨寒熱而用之。自無不可。若

三陰虧弱無熱無寒平臟者宜小營煎五福飲六物
煎之類主之此常人最宜之劑或八珍湯十全大補
湯之類皆宜擇用三陰虧弱兼陽虛者宜大營煎理
營煎之類主之憂思過度心脾受傷者七福飲歸脾
湯之類主之脾土不健飲食減少宜燥宜溫者溫胃
飲理中湯之類主之脾土虛陷不能統攝營氣而為
漏為頻者宜五福飲歸脾湯壽脾煎祕元煎或四君
子加芎歸主之肝虛不能藏血或多驚惕或多小腹
急痛宜三陰煎補肝散之類主之若陰血虛水不制
火而邪火盛者或為夜熱盜汗或為煩渴生痰是即
癆損之漸速宜調治用一二三四五陰等煎擇宜治
之否則恐成血枯此血虛經亂也婦人因情慾房室
以致經脈不調者其病皆在腎經此證最多所當辨
而治之凡慾念不遂沈思積鬱心脾氣結致傷衝任
之房室縱肆不慎者必傷衝任之流而腎氣不守
真陰不足而經脈不調宜左歸丸六味地黃

丸之類主之若右腎真陰不足而經脈不調宜右歸
飲右歸丸八味地黃丸之類主之若思鬱不解致病
者非得情舒願遂多難取效房室不慎致病者使非
勇於節慾亦難全恃藥餌婦人有經來斷續或前
或後無定期人以為氣血之虛豈知為肝氣鬱結乎
夫經水出諸腎而肝為腎之子肝鬱則腎亦鬱矣腎
鬱而氣必不宣前後之或斷或續正腎之或通或閉
耳或謂肝氣鬱而腎氣不應未必至於如此殊不知
肝氣之或開或閉即腎氣之或去或留相因而致又
何疑焉故治宜舒肝之鬱即以開腎之鬱也肝腎之
鬱既開經水自有一定之期不至或先或後矣方用
定經湯婦人有數月一行經者每以為常亦無或先
或後之異亦無或多或少之殊人莫不以為異而不
知非異也無病之人血氣本兩無虧損而經水乃必
一季一行者蓋以季為數不以月為盈虧也世人不
知見經水不應月來誤認為病妄用藥餌本無病而
治之成病是治反不如其不治也然嗜慾損失之人
世間亦復正多又不可不立一療救之方以助之
行則反常而災珍至矣方書以趨前為熱退後為寒

其理近似然亦不可盡拘也。假如臟腑空虛經水淋瀝不斷。頻頻數次未可便斷為熱。又如內熱血枯。經脈遲滯不來。未可便斷為寒。必須察其兼證。如果脈數內熱。唇焦口燥。畏熱喜冷。斯為有熱。如果脉遲。腹冷舌淡口和。喜熱畏寒。斯為有寒。陽臟陰臟於斯而別。再問其經來。血多色鮮者。血有餘也。血少色淡者。血不足也。將行而腹痛拒按者。氣滯血凝也。既行而腹痛喜手按者。氣虛血少也。以益母勝金丹及四物湯加減主之。應手取效。

西醫學說 婦人身體如有障礙。則經時往往不順。或白帶下。且覺精神不適。甚則便血下痢。少腹疼痛。發汗過多。腰部拘攣。種種困苦。殆難舉擧。則謂為子宮變常可也。

中國醫方】定經湯 治經水先後無定期

兔絲子	一兩	酒炒	當歸	一兩	大熟地
五錢			白芍	一兩	
九蒸	白朮	三錢	酒炒	酒洗	
柴胡	五分		山藥	五錢	炒
			荆芥穗	二錢	炒黑

右水煎服。二劑經水可淨。四劑經期定矣。

冷舌淡口和。喜熱畏寒。斯為有寒。陽臟陰臟於斯而別。再問其經來。血多色鮮者。血有餘也。血少色淡者。血不足也。將行而腹痛拒按者。氣滯血凝也。既行而腹痛喜手按者。氣虛血少也。以益母勝金丹及四物湯加減主之。應手取效。

兔絲子 二錢 酒炒 **山藥** 三錢 炒 **杜仲** 一錢 炒黑 **甘草** 一錢
右用河水煎服。四劑之後。如果仍舊不可再服。
香附子 擦去皮。不拘多少米醋浸一日用瓦鍋煮令醋盡 **艾葉** 四兩。當歸二兩。製同。名艾附丸
梧子 大日乾。每五十丸。淡醋湯下。一方。香附一斤 **沈香降氣散** 順氣道通血脉

烏藥 **木香** **香附子** **縮砂仁** **甘草各等分**
右為細末。每服二錢。空心鹽湯調下。
抑氣散 治婦人氣盛於血。變生諸證。頭暉脹滿。香附子四兩。梔神。甘草各一錢。陳皮二兩
右 為末。每二錢。食前沸湯調下。

助仙丹

白茯苓 陳皮 各五

白朮 土炒 三錢

白芍 三錢

酒炒

黃芪 二錢

益胃升陽湯

少水泄日二三行

白朮 三錢

炒麵一錢

當歸身

陳皮 炙甘草

黃芩半錢秋去之

人參各一錢 升麻 柴胡各半錢

生薑三片煎至一鍾食前服

膠炒 酸棗仁

甘草各半錢

右作一服水二鍾

大溫經湯 治衝任虛損月候不調或來多不已或

過期不行或崩中去血過多或經損瘀血停留

小腹急痛五心煩熱並皆治之

吳茱萸湯泡 牡丹皮 白芍藥 肉桂去皮

人參當歸去蘆

芍藥 阿膠鹿角 甘草炙

當歸去心

半夏半錢 右作一服用水二

鍾生薑五片煎至一鍾食前服

小溫經湯 治經候不調血臟冷痛

當歸附子等分炮各 右哎咀每服三錢水一盞煎

八分空心溫服

溫經湯

治婦人血海虛寒月水不調

川芎各二錢 莊藥各一錢 蓬木各一錢半 人參

牛膝

二鍾煎至一鍾不拘時服

滋血湯 滋養榮血補婦人治血海久冷

當歸半錢 川芎麥門冬去心 牡丹皮

參 菖藥 琥珀另研各一錢 半夏麵 官桂

芍藥喫去人參

黃芩

去之

右哎咀每服半兩水煎

腹痛加柴胡錢半

加味吳茱萸湯 治衝任衰弱月候愆期或前或後

或崩漏不止赤白帶下小腹急痛每至經脉行時

頭眩飲食或少氣滿心怯肌肉不澤悉皆治之

半夏二錢 吳茱萸當歸各一錢半

乾薑 白茯苓 苦梗

丹皮 甘草各一錢半 官桂

北細辛合半錢

南木香 防風

右

作一服水二鍾生薑三片紅棗一枚煎至一鍾食

前服

桃仁散 治婦人月水不調或淋瀝不斷斷後復來

狀如瀉水四體虛倦不能飲食腹中堅痛不可行

動月水或前或後或經月不來多思酸物

桃仁

半夏

當歸

人參

蒲黃

牡丹皮

川芎

澤蘭葉各一錢半

生地黃各一錢半

粉草半錢

石作一服水二鍾

生薑三片煎至一鍾食前服

董黃散 治血臟久冷月水不調臍腹刺痛

董黃片子

白芍藥各二錢

元胡索

牡丹皮

當歸各一錢半

蓬木 紅花

桂心 川芎各一錢

牡丹皮

吳株莢湯
半兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐

子大每服五十丸空心用溫酒或米飲湯送下。

鹿茸丸 治衝任虛損又為風寒所乘尺脉微小甚

者可灸關元穴

鹿茸炙 赤石脂 禹餘糧各一
柏葉 附子炮 熟地黃 當歸 酒浸 艾葉各

半錢 右為末酒糊丸梧子大每服五十丸空心溫酒下。按此足少陰厥陰藥也今人多用之故收入

治血虛濕勝帶下甚捷

升陽舉經湯 治經水不調右尺脉按之空虛是氣血俱脫大寒證輕手其脈數疾舉指弦緊或澀皆陽脫之證陰火亦亡見熱證於口鼻眼或渴此皆陰躁陽欲去也當溫之降之引之燥之此法大升浮血氣補命門之下脫也諸藥言根近苗處去苗便是

柴胡根 當歸根 白朮 黃芪
錢各三 藁本去土

羌活根 防風根各二 紅花 白芍藥各五

獨活根一錢半 桃仁去皮尖 細辛六分

熟地黃 沉者人參去蘆 黑附子炮去

甘草梢炙各一錢 肉桂去麌皮秋分夏不用
右為粗末每

紅花當歸散 治婦人血臟虛竭或積瘀血經候不調或斷續不定時作腹痛腰脅重疼攻刺小腹繫硬及室女月水不通並皆治之

服二錢水二盞煎至八分空心稍熱服

紅花紫葳牛膝白芷蘇木細碎各

心半錢當歸尾劉寄奴各二赤芍藥三錢

甘草半錢右作一服水一鍾酒一鍾同煎至一

鍾空心服

大元胡索散 治婦人經病並產後腹痛或腹滿喘

悶或癥瘕痞塊及一切心腹暴痛

元胡索 赤芍藥 川棟子去核 蓬莪术 京

三稜根 厚朴薑製 當歸 黃芩 川芎 桔

梗 檳榔各一 木香 官桂去蘆 甘草各半

大黃二錢右作一服水二鍾煎至一鍾食前

服

龍甲丸 治婦人月經不調肌肉黃痺脇下積氣結

痛時發刺痛漸成勞狀

龍甲去腥
琥珀桂心三稜醋煮

牡丹皮牛膝
桃仁去皮尖雙
土瓜

根 大黃根以上等分
右為細末煉蜜為丸如梧桐

子大每服十五丸食前用桃仁湯送下。

白堊圓 治婦人月經一月再來或隔月不來或多

或少淋瀝不斷或來而腰腹痛噓吸不能食心腹

痛或青黃黑色或如水舉體沉重

白堊 白石脂 牡蠣 禾餘糧 龍骨 細辛

鯿鮑骨兩半各一 當歸 茜草 黃連 黃芩

乾薑 桂心 人參 瞿麥 石葦 白芷 白

薑 附子 甘草兩半各一 蜀椒 半兩 右為末蜜

丸如梧子大空心酒下二十九日三至月候來時

日四五服為佳

加味逍遙散 治肝脾血虛有熱

柴胡 丹皮 山梔炒五分 甘草 炙

芍藥酒炒 茗苓 白术炒各一錢 右水煎服

歸脾湯 治經候不准晡熱內熱

人參 白术炒 黃芪炒 白茯苓 龍眼肉

當歸 遠志 酸棗仁炒各一錢 木香 甘草 右

薑衆水煎服

四物湯 血家要藥亦治月水不調脣腹疼痛

熟地黃酒蒸三錢 當歸酒拌 白芍藥炒 川芎各一錢

錢 右水煎服

加味四物湯 治血分有熱

四物湯 柴胡 牡丹皮 山梔 右煎服

二陳湯 治中脘停痰飲食少思嘔逆等證女人經

病 陳皮去白 茗苓 半夏各一錢 甘草五分 右

水煎服

越鞠丸 治鬱傷氣滯腎隔痞悶肚腹膨脹飲食少

思吞酸嗳腐女人經病

香附分等 蒼朮炒 川芎 桀子炒 神曲炒

楂分等 右為末用神曲糊丸菉豆大每服六十一

九或七十丸食遠白湯送下。

八珍湯 治脾胃傷損惡寒發熱煩躁作渴女人經

病

當歸酒拌 茜草 炙甘草 川芎各一錢 人參

柴胡二錢 黃芩炒一錢 人參

加味小柴胡湯 治肝膽經風熱

柴胡二錢 黃芩炒一錢 人參

白木 茗苓各二錢 熟地三錢 右水煎服

補肝散 治肝腎二經氣血虧損經候不調

山萸肉 當歸 五味子炒杵 山藥 黃芪 炙

草炙五分 山梔 牡丹皮 隨宜 右薑衆水煎服

甘 分

川芎 木瓜各半 熟地黃 白朮炒一兩 獨服

酸棗仁炒四兩

右為末每服五錢。薑茶水煎

十全大補湯 治氣血俱虛經候不調及培補一切

虛證必用之藥

當歸

甘草炙各二錢

芍藥 川芎各一錢

人參 白肉桂

桂隨宜

右水煎服。

神芎丸

治婦人經病

大黃

黃芩各二兩

牽牛 滑石四兩

右為細末滴水為丸如小豆大溫水下十九至十五丸。每服加十丸。日三服。冷水下亦得。或煉蜜丸愈佳。以利為度。如孕婦及婦人經病產後血下不止者。則不宜服。

二氣湯

治月水不調斷絕不產面黃肌瘦飲食不甘

內有燥熱以柴胡飲子相參服之

大黃升慢大熟成膏子一兩別為末。醋一

當歸 白芍藥各二兩

右為末。以膏子和丸如桐子大。每服二十丸。淡酢湯下。食前日進三服。如月水不通。加乾漆三錢。炒出火毒。沒藥半兩。硇砂三錢。研官桂二錢。蟹螯三

十味香附丸 治經候不調
錢去足炒熟用生則令人吐濁。

四物湯四兩 白朮 陳皮

澤蘭葉各二兩

蘆甘草各一兩 香附青鹽水各浸七日焙乾。使

右為末。醉糊丸。梧子大。每服七十丸。空心溫酒下。

柴胡抑肝湯 治寡居獨陰寒熱煩瘡等證。女人經病。

柴胡二錢半 連翹 生地各五分

山梔仁各一分 川芎七分

地骨皮 香附

甘草三分 神翹八分

滋陰百補丸 治勞傷氣血不足乍寒乍熱心腹疼痛不思飲食倦羸乏力女人經病。

益母草半斤 當歸六兩

川芎 熟地黃 白朮各四兩

芍藥三兩 人參

白茯苓 延胡索

四製香附一斤 右為末。蜜丸梧子大。每五十九室。心砂仁煎湯下。

蒼莎丸 調中散鬱

蒼朮各四兩 香附各四兩

黃芩二兩 右為末。蒸餅丸

清海蒼莎丸 治肥人瘦多占住血海地位因而下

多者日必漸昏

南星 蒼术 川芎 香附 右為末蜜丸梧子

大

益氣養榮湯 治經事久不調變成瘵疾

白术

炒二錢
當歸 酒拌 人參 茯苓 陳皮 貝母 香附

炒各一錢

甘草 炙

桔梗各五錢
杏林摘要方 治子宮虛寒下元虛月水不調或閉

或漏或崩中帶下或產後敗血未盡內結不散無

子

紅娘子

枝六十枝
右為末棗肉為丸彈子大以錦裏留繫。

巴豆

千枚二枚
用竹筒送入陰戶一時許發熱渴用熱湯一二盞

解之後發寒靜睡要安三日方取出每日空心以

雞子三枚胡椒末二分炒食酒下以補之入則子宮暖矣。

補中湯

治經行胃寒用此加表藥

升麻

柴胡

各二錢

當歸身

二分

澤瀉

四分

五味子

一粒

炙甘草

八分

黃芪

半錢

神翹

三分 紅花 少許 大麥蘖 五分 右作二服水煎食前服

紫金丸 治久有瘀血月水不調黃瘦不食亦治產

後惡露不快腰腹痛寒熱頭痛

五靈脂水淘淨炒

真蒲黃末分兩

酢調稀慢火熬膏入真蒲黃末五靈脂末和丸龍

眼丸每服一丸以水與童子小便各半盞煎至七

分溫服少頃再服惡露即下經閉者酒磨服之

逍遙散 治血虛煩熱月水不調腰腹脹痛癥嗽潮熱

當歸 白术 白芍藥 柴胡 茯苓各一錢半

桂心 青皮 大黃 乾薑 川椒

增損四物湯 治月事不調心腹疼痛補血溫經注顏

川芎 當歸 白芍藥 熟地黃 牡丹皮

木各一錢半

地骨皮一錢半

右作一服用水二鍾至

至一鍾食前服

通經丸 治婦人室女月候不調或成血瘕

桂心 青皮 大黃 乾薑 川椒

炮 蓬莪术 乾漆

煙 當歸 酒炒

仁炒各等分

右為末先將四錢用米酢熬成膏和餘

桃

陽起石湯 治月水不調或前或後或多或少乍赤

乍白

赤石脂三兩

陽起石

甘草 繢斷 乾薑

人參 桂心各二兩

附子一兩

伏龍肝五兩

生地一斤

右十味水一斗煮取三升二合分四服日三夜一。

當歸龍骨丸

治月事失常經水過多

當歸 白芍藥 黃連

染槐子 艾葉炒 茯苓

芩各半 龍骨 黃芩各一兩

木香一分

右為

末滴水為丸如小豆大溫米飲下三十丸食前

日三四服

又方 治婦人氣滯血澀月經不調或前或後色紫

口苦大腿外膝麻木大便閉滯

麻子仁 桃仁

芍藥各二兩 枳殼 白朮 歸

頭 威靈仙 詞子肉 生地黃

陳皮各五錢

大黃 鐵七

右各為末粥丸如桐子大白湯下五六十丸

益母勝金丹

治月經不調

大熟地 砂仁酒拌

當歸酒蒸

白芍酒炒四兩

芍酒蒸

丹參酒蒸

茺蔚子酒蒸

香附酒蒸四兩

益母勝金丹

治月經不調

益汁鹽水 白术四兩陳 右以益母草八兩酒各一兩

水各半熬膏和煉蜜為丸每早開水下四錢血熱加丹皮生地各二兩血寒加厚肉桂五錢

升麻滲濕湯 治經水不調赤白帶下

當歸 川芎 芍藥 生地黃 白术

升麻

蒼术 陳皮 香附子 砂仁 半夏各一錢

茯苓

薑七分 黃柏 知母 柴胡 升麻各五錢

乾

滋陰至寶湯 治婦人經水不調因鬱生勞潮熱咳嗽兼有盜汗者

當歸 白朮 芍藥 茯苓 陳皮 貝母 知

母 香附子 地骨皮 麥門冬各八錢

甘草

桃軍圓 治月水不順

太黃二兩 芒硝二錢 桃仁 桂枝 甘草各

各

兩 蕎麥五錢 右以蜜為圓白湯送下

各

又方 治月經不調兼有腹脹

鼠尾草 石菖蒲 紅花各等 右三味水煎服

各

又方 治月水二三月不行者或血塊下

延胡索 牛膝各一香附子二兩

右三味水

煎服

簡易當歸散 經行不調三四月不行或一月再至

或天癸已通期而經脈不調者以此為主方

川芎 當歸 茜草藥 黃芩 白朮各半兩 山茱萸

右為末空心溫酒送服

外國醫方

蘆薈膏一瓦 番紅花末四瓦 沒藥

膏四瓦 右為丸藥分百六十粒每服五粒早晚

硫酸鐵安 母尼亞四瓦 右為丸藥分八十粒

每服五粒一日二次

經水不利

中國醫說 婦人經水不利。抵當湯主之。經水閉不利。臍堅癥不止。中有乾血。下白物。礬石丸主之。婦人月水不利。由勞傷氣血。體虛而風冷客於胞中。傷於衝任之脉故也。若寸脉弦。關脉沉。是肝病也。兼之腹痛。孔竅生瘡。尺脉滑。血氣實。經絡不利。或尺脉絕不至。兼主小腹引腰痛。氣攻胃膈。寡婦悶鬱百端。或慕夫不能顧忘。或門戶不能支持。或望子孫昌盛。心火無時不起。加之飲食厚味。遂成痰火。其證惡風體倦。乍寒乍熱。面赤心煩。或時自汗。肝脉弦長。當抑

肝之陰氣。柴胡抑肝湯。抑陰地黃丸。越鞠丸。主之。貧苦淡食者。四製香附丸主之。有每日上午神思昏憤。畏見明處。惡聞人聲。至午後方可。及頭昏腰痛驚惕。稍涉勞動。與月經來時。其證尤劇。此不得遂志之故也。宜清神養榮四物湯。加人參。茯神。陳皮。柴胡。羌活。甘草。香附。婦人之病。因虛積冷。結氣為證。經水斷絕。至有歷年。血寒積結。胞門寒傷。經絡凝堅。在上嘔吐涎唾。久成肺癰。形體損分。在中盤結。繞脣寒注。或兩脅疼痛。與臟相連。或結熱中。痛在關元。脉數無瘡。肌若魚鱗。時著男子。非止女身。在下未多。經候不勻。令陰擊痛。少腹惡寒。或引腰脊。下根氣衝。氣衝急痛。膝脛疼痛。煩奄忽眩冒。狀如厥顛。或有憂慘。悲傷多嗔。此皆帶下。非有鬼神。久則羸瘦。脉虛多寒。三十六病。千變萬端。審脉陰陽。虛實緊引。行其針藥。治危得安。月事不來者。胞脉閉也。胞脉屬心。而絡於胞中。今氣上迫肺。心氣不得下通。故月事不來也。婦人月經不通。或因醉飽入房。或因勞役過度。或因吐血失血。傷損肝脾。但滋其化源。其經自通。若小便不利。苦頭眩痛。腰背作痛。足寒時痛。久而血結於內。變為癥瘕。若血水相併。脾胃虛弱。壅滯不通。變為水腫。若脾氣衰弱。

不能制水。水漬肌肉。變為腫滿。當益其津液。大補脾胃。方可保生。有病。腎骨支滿。妨於食。病至則先聞腥臊臭。出清液。四肢惰。目眩。時時前後血。病名曰血枯。此年少時因大脫血。或醉而入房。虧損腎肝。蓋肝藏血。受天一之氣以為滋榮。其經上貫隔布脅。若脫血失精。肝氣已傷。肝血枯涸不榮。而腎骨滿。妨於食。則肝病傳脾。而聞腥臊臭。出清液。若以肝病而肺乘之。則唾血。四肢惰。目眩。時時前後血出。皆肝病血傷之證也。年少醉入房室。氣竭肝傷。故經衰少。不來。肝傷則血涸。脾胃相傳。大脫其血。目眩心煩。故月事不來也。烏魚骨圓主之。婦人有月事不來者。室女亦然。可用茶調散吐之。吐訖。可用玉燭散。當歸散。或三和湯。桂苓白朮散。柴胡飲子。量虛實選而用之。降心火。益腎水。開胃進食。分陰陽。利水道之藥是也。慎勿服峻熱之藥。若服之。則變成肺瘻。骨蒸潮熱。咳嗽。咯膿。嘔血而喘。小便澀滯。寢汗不已。漸至形瘦脉大。雖遇良醫。亦成不救。婦人女子。經脈不行。有脾胃損傷而致者。不可使認作經閉。血死輕用通經破血之藥。遇有此證。便須審其脾胃如何。若因飲食勞倦。損傷脾胃。少食惡食。泄瀉疼痛。或因誤服汗下攻伐。

藥傷其中氣。以致血少而不行者。只宜補養脾胃。用白朮為君。茯苓芍藥為臣。佐以黃芪。甘草。陳皮。麥芽。有飲食積滯。致損脾胃者。亦宜消積補脾。若脾胃無病。果有血塊凝結。方宜行血通經。婦人以無為玉川芎。當歸。柴胡等藥。脾旺則能生血。而經自行矣。入故曰月經。經行與產後一般。若其時餘血一點未淨。或外被風寒。及濕冷暑熱邪氣。或內傷生冷。七情鬱結。為痰為瘀。凝積於中。曰血滯。或經止後。用力太過。入房太甚。及服食燥熱。以致火動。邪氣盛而精血衰。曰血枯。良方云。經後被驚。則血氣錯亂妄行。逆於上。則從口鼻而出。逆於身。則水血相搏。變為水腫。恚怒則氣血逆於腰腿心腹背脅手足之間。重痛經行則發。過期則止。怒極傷肝。則有眩運嘔血癆歷血風瘡瘍等病。加之經血滲漏於其間。遂成竅穴。生瘡。淋瀝不斷。濕熱相攜。遂為崩帶。血結於內。變為癥瘕。凡此變證百出。不過血滯與枯而已。但血滯亦有虛熱。血枯亦有虛熱。故重則經閉不通。以滯枯分言。輕則經水不調。止言虛與熱而已。血滯經閉宜破者。原因飲食熱毒。或暴怒。凝瘀積痰。直須大黃乾漆之類。推

陳致新。俾舊血消而新血生也。若氣旺血枯。起於勞役憂思。則宜溫和滋補。或兼有痰火濕熱。尤宜清之涼之。每以肉桂為佐者。熱則血行也。但不可純服峻藥。以虧陰道。至於耗氣益血之說。雖女科要法。但血為氣配。氣熱則熱。氣寒則寒。如果鬱火氣盛於血者。方可單香附散。抑氣散加木香檳榔枳殼以開鬱行氣。若氣亂則調。氣冷則溫。氣虛則補。男女相同。蓋陽生則陰自長。氣衰則血亦涸。豈可專耗其氣耶。論者多泥叔和血旺氣衰。不知叔和論肝肺二脉。則宜肝旺於肺。其實氣血平和。乃能有孕。故繼曰兩臟通和。但婦人見偏性鄙。婢妾志不得伸。鬱怒無時不起。故香附為女人仙藥。經曰。邪氣盛則實。正氣奪則虛。可不悟諸。其有七情心氣鬱結不行者。分心氣飲去羌活半夏桑皮青皮加川芎當歸香附莪术延胡索。或火者更加黃芩。或小調經散單香附丸氣血盛實。經絡遏閉。或時挾痰者。單大黃膏。或馬鞭草取汁。熬膏為丸。或燒存性紅花當歸煎湯下。內傷飲食勞倦損傷脾胃氣弱。體倦發熱。腹痛腸鳴。飲食減少而不生血者。補中益氣湯。加川芎。生地。天花粉。腸鳴月水來者。病在胃。胃虛不生血氣。宜單厚朴五錢。空心水

煎。或單蒼朮膏水泄少食者。升陽益胃湯。不泄少食者。二陳湯加白朮黃芪童便製香附當歸芍藥牡丹皮麥門冬山楂麥芽。因飲食積者。更加莪术枳殼。濕痰占住血海而經閉者。導痰湯加川芎黃連。不可服地黃。泥膈故也。如用須薑汁炒過丹溪之言。洵不可易。胃熱消渴。善食漸瘦。津液為熱燥渴者。宜瀉胃熱。四物湯合調胃承氣湯。名玉燭散。再合涼膈散。名三和散。輕者小柴胡湯合四物湯。去人參半夏。加天花粉。素虛形瘦。口燥善食厚味。鬱為痰火。有潮熱者。逍遙散加黃芩。無薄荷。或四物湯加桃仁紅花。或加味養榮丸亦可。大抵經水不通。肥人多氣弱。有濕痰瘦人多血怯。有火。墮胎及多產。育傷血。或誤服汗下。或血漸少而後不通。曾墮胎及產多者。謂之血枯。原因心事不足以致脾不磨食。故肺金失養而氣滯不行。腎水不旺而血益日枯。初時參前參後淋瀝無時。脾胃衰甚。變為溏泄。身腫失治。甚為癥瘕癆瘍。總而言之。經水不通。不出虛熱痰氣四證。不調亦大相同。隨證調治。飲食調和。自然血氣流通。更有凝滯。然後可用紅花當歸散。紫葳散。通經丸。導經丸之類。虛

者只用當歸散以通之。通後又須養血益陰，使津液流通，苟不務氣血充和，而惟以毒藥攻逼，必死。而後已。室女行年十四，衝任盛而月事下，必近二十方。可匹配。可見陰氣之難成也。或恣食鹹酸煎炒熱燥，以致氣血上壅不通者，紅花當歸散、紫葳散、單大黃膏。如逾年未嫁，或年未及而思男，思傷心血。火炎脾虧，肺鑠腎枯，而血閉成瘍者，十分難治。宜四物加黃芩、柴胡，或逍遙散加炒山梔芩連，以養血涼血降火。或腎氣丸加子芩、紅花養陰。柏子仁丸亦妙。因怒逆者，四製香附丸加黃芩生地，因驚者抱膽丸經絕不通者，瓦松散。若婦人經閉腹大，僅一月間便能動作，乃至過期不產，或有腹痛，此必蟲證。雄砂丸或萬應丸主之。女子月事不行，亦謂之隱曲不利。脾胃損傷，血枯不行者，用加減補中益氣湯主之。更宜服參术大補丸、烏雞丸，以經行為度。氣鬱血閉不行者，用開鬱二陳湯主之。更宜服四製香附丸，以經行為度。由於痰滯者，用蒼莎導痰丸治之。更宜服開鬱二陳湯去莪术。枳殼服之，至如愆期未嫁之女，偏房失寵之妾，寡居之婦，庵院之尼，欲動而不能遂，感憤而不能言，多有經閉之疾，含羞強忍，不欲人知，致成

癆瘵之病，終不可救者，宜用四製香附丸、參术大補丸，攻補兼行，庶幾可瘳。此七情之變，難以法治者也。經閉不行，骨蒸潮熱，脉虛者，用增損八物柴胡湯。王之如熱太甚，服此不平者，加黑乾薑灰。神效。經閉發熱，咽燥唇乾，脉實者，用四物涼膈散主之。血枯之與血隔，本自不同。蓋隔者阻隔也。枯者枯竭也。阻隔者，因邪氣之隔滯，血有所逆也。枯竭者，因衝任之虧敗，源斷其流也。凡婦女病損，至旬月半載之後，則未有不閉經者。正因陰竭，所以血枯。枯之為義，無血而然。故或以羸弱，或以困倦，或以欬嗽，或以血熱，或以飲食減少，或以亡血失血，及一切無脹無痛無阻無隔，而經有久不至者，即無非血枯經閉之候。欲其不枯，無如養營，欲以通之，無如充之。但使雪消則春水自來，血盈則經脈自至，源泉混混，又孰有能阻之者。奈何今之為醫者，不論有滯無滯，多兼開導之藥，其有甚者，則專以桃仁紅花之類，通利為事。豈知血滯者，愈枯其與榨乾汁者何異？為不知枯字之義耳。為害不小。切毋蹈此弊也。此之治法，當與前血虛腎虛二條參而用之。張氏云：室女月水久不行，切不可

用青蒿等涼藥。醫家多以為室女血熱故以涼藥解之。殊不知血得熱則行冷則凝養生必用方言之甚詳。此說大有理不可不知。若經候微少漸漸不通手足骨肉煩疼日漸羸瘦漸生潮熱其脉微數此由陰虛血弱陽往乘之少水不能減盛火逼水涸耗亡津液治當養血益陰慎毋以毒藥通之宜用柏子仁丸澤蘭湯婦人有經水忽來忽斷時疼時止寒熱往來者人每以為血凝豈知為肝氣不舒乎肝屬木而藏血最惡風寒婦人當行經之際腠理大開適逢風之吹寒之襲則肝氣為之閉塞而經水之道路亦隨之而俱閉由是腠理經絡各皆不宣而寒熱之作由是而起其氣行於陽分則生熱行於陰分則生寒然此猶感之輕者也倘外感之風寒更甚則內應之熱氣益深往往有熱入血室而變為如狂之證一似遇鬼之狀者若但往來寒熱是風熱未甚而熱未深耳治宜補肝中之血通其鬱而散其風則病隨手而效所謂治風先治血血和風自滅此其一也方用加味四物湯婦人有經未來之前洩水三日而後行經者人以為血旺之故豈知為脾氣之虛夫脾統血也脾虛則不能攝血矣故經水將動而脾先不固脾經

所統之血欲流注於血海而濕氣乘之故先洩水而後行經也調經之法不在先治其水而在先治其血又不在先治其血而在先補其氣氣旺則血自能生濕自能除經自能調矣方用健固湯婦人有行經之前一日大便先出血者人皆以為血崩豈知為經流大腸大腸與行經之路各有分別何以能入乎其中不知胞胎之系上通心而下通腎心腎不交則胞胎之血兩無所歸而心腎二經之氣不來照攝聽其自便所以血不走小腸而走大腸也此時若但止大腸之血必愈止愈多若擊動三焦之氣更拂亂而不可止蓋經水之妄行原因心腎之不交今不使水火之既濟而徒治其胞胎則胞胎之氣無所歸血安有歸之日故必大補其心與腎使心腎之氣交而胞胎之氣自不散大腸之血自不妄行而經亦自順矣方用順經兩安湯室女積想在心思慮過度多至勞損神色先散月水先閉且心病則不能養脾故不嗜食脾虛則金虧故發嗽腎水絕則木氣不榮而四肢乾瘦故多怒鬚髮焦筋骨痿若五臟傳偏則死自能改易心志用藥扶持庶可保生切不可用青蒿蟲蟲等藥涼血行血宜用柏子仁丸澤蘭湯益陰血制心

火。婦人經閉。其治較易。室女經閉。其治較難。婦人胎產。乳子之後。血氣空虛。經水一時不至。俟其氣血漸回。經脈自通矣。室女乃渾全之人。氣血正旺。不應阻塞其閉也。若非血海乾枯。則經脈逆轉。血海枯則內熱。欬嗽。鬢髮焦而成怯。證經脈逆轉。則失其順行之常。而為吐為衄。夫血以下行為順。上行為逆。速宜調其經脈。俾月水流通。庶幾可救。當以益母勝金丹加牛膝主之。若其人肝經怒火熾甚者。則頸生瘰癧。或左脇刺痛。更佐以加味逍遙散。及消瘰丸。若其人脾氣虛弱。不能消化飲食。血無從生。更佐以五味異功散。若其人精神倦怠。晡熱內熱。此氣血兩虛。無經可道。更佐以八珍湯。此治室女經閉之良法。倘妄行霸道。破血通經。其不償事者幾希矣。婦人者坐藥強下其經。目眶為痛。足跟難以踐地。心中狀如懸。

〔西醫學說〕月經異常者。除月經過多。月經困難之外。尚有所謂月經閉止者。月經閉止之原因頗多。或由生殖器有天然之缺陷。或由生殖器受後來之病證。或由肺癆萎黃病等全身衰弱而起。而感動精神。關係月經者亦大。嘗見有因驚恐悲傷等事。致月經突然閉止者。其明徵也。或謂少女及婦人。往往有懼

懷孕而閉經者。更有依一定之時。患衄血咯血。或痔瘡出血等而以之代替月經者。則謂之代償性出血。就中更分持久性與暫時性二種。由於子宮及卵巢之發育不全。則永久閉止。由於懷孕授胎。患消耗病之傷寒體質。病之肺癆。消渴。黃病。肥脈。以及大清感重。眩暈耳鳴。胸內苦悶。腰部作痛。消化不良。或患衄血。治法首須除其原因。其次營適宜之運動。移居空氣潔淨之所。進滋養之食物。且須整調大便。毋令秘結。生殖器之營養。或血行有不良者。當行刺戟。腳浴。溫坐浴等。或以微溫鹽水頻頻滋注陰內。或行轉地壯劑。久之庶有恢復之效。若因有娠或經血鬱滯子宮內而不通者。更須精細檢診之。月經閉止。又名月經不潮。即已屆破瓜之年。而天癸尚缺如也。在室女患此者。非其子宮全不發育。即患畸形。又卵巢發育不全。不能營排卵之機能者。則子宮發育雖全。亦為月經不潮之因。患全身病之萎黃病。即前述之黃病。其甚者月經可停止數年。授乳過久。又足致之。其自鼻腔胃腸。於一定之期。見衄血。吐血。便血者。則名之

曰代償性月經。別有所謂無月經者。其原因有先

天與後天之別。如生殖器閉鎖。子宮畸形。子宮絕不

發育。卵巢發育不全等。皆先天之病。如萎黃病。貧血

癆瘍。胃病。慢性子宮實質炎等。皆後天之病。其證候

為期至無經。而頭痛。眩暈。時耳鳴。心胸苦悶。消化

不良。腰部作痛。甚且衄血。咯血。吐血。來代償月經。俗

所謂倒經者是也。治療之法。養生為第一要義。宜用

滋養之食物。著溫暖之衣服。吸新鮮之空氣。營適宜

之運動。居高燥之房屋。通利二便。溫摩下腹。常行溫

水坐浴。其本有萎黃。貧血。癆瘍。胃炎。後天諸病者。則

須兼服健胃強壯劑。

〔中國醫方〕牛膝散

治月水不利。臍腹作痛。或小

腹引腰。氣攻胸膈。

赤芍藥 桃仁去皮

元胡

牛膝酒製桂心

赤芍藥 桃仁去皮

元胡

索炒當歸酒浸

牡丹皮 木香錢各七

右為

未每服一錢。空心溫酒調下。

牡丹散 治月候不利。腹臍疼痛。不欲食。

牡丹皮 大黃炒各一兩

赤茯苓 桃仁

生地黃

當歸 桂心 赤芍藥

白朮錢半石葦毛去

萬病丸

木香各半 當歸 治月候不利。腹臍疼痛。不欲食。

右咬咀。每服三錢。水一盞。薑三片。

煎七分。空心溫服。

產寶方 治女人月經不利。臍下氣脹。上攻欲嘔。不得睡。

當歸四錢

乾漆三錢

右為細末。蜜丸梧子

大空心溫酒下十五丸。

煙盡

養榮湯 治婦人血海虛弱。心中恍惚。時多驚悸。或

發虛熱。經候不調。

白芍藥 川芎 熟地黃 薑黃

當歸 川薑

青橘皮 五加皮 牡丹皮 海桐皮

白芷

禹餘糧三兩。火煅淬七次

龍骨 艾葉 醋炒

赤石脂

牡蠣殼炮炙地榆各二兩

牡丹皮 厚朴

當歸

阿膠蛤粉炒成珠子附子炮半兩

吳茱萸 香白芷 肉桂各一兩。去

梧桐子大每

紫桂丸 补益血海。治衝任氣虛。經脈不調。腰痛。腹

痛。冷滯崩漏。

右為末。麵糊為丸。梧桐子大。每

萬病丸 治經事不來。繞臍

乾漆杵碎炒。牛膝去苗酒浸一宿。

右為末。以

生地黃汁一升。入二味藥末。銀器內慢火熬至可
丸。即丸如桐子大。每服二丸。空心米飲或溫酒下。

土牛膝散 治婦人室女血閉不通。五心煩熱。

土牛膝 右為細末。每服二錢。桃仁炒另研。紅花各
兩。

當歸乾漆丸 治月經不利。臍下慾逆氣脹滿。

當歸 元胡索 乾漆 右為粗末。每服三錢。薑
三片。水一鍾半。煎至七分。去滓稍熱服。

當歸散 治血脉不通。

當歸 穿山甲 炙炒 蒲黃 炒各 半兩
麝香 小許 右為細末。研勻。每服二錢。食前溫酒
調下。

琥珀散 治心膈迷悶。腹臟撮痛。氣急氣悶。月信不
通等疾。

天台烏藥 二兩 當歸 茼蒿 各一 右為細末。
每服二錢。溫酒調下。後以食壓之。忌生冷油膩。產
後諸疾。炒薑酒調下。

產寶方 治月經不通。腹中痛。
牛膝六分 大黃 桃仁 去皮
芎 當歸 分各四 水蛭 三分
米炒黃

細辛 各五 川

右為細末。煉蜜

九梧子大。每服二十丸。空心溫酒下。
千金桃仁丸 治血積癥瘕。月水不行。

大黃 裏蒸紙
黑 右為細末。醋二升半。銀石器中。慢火熬膏。却

入大黃桃仁蟲蟲末。不住攪。度可丸。却入朴硝再
攪。良久出之。丸如梧子大。五更初溫酒下五丸。至

日午取下如赤豆汁。雞肝蝦蟆衣樣。候鮮紅住服。
仍以調氣藥補之。

三棱丸 治婦人經脉不通。氣痛帶下。兼治血癥。

三棱 醋炒 地龍 浸炒 川芎 牛膝 元胡索 蓬术
蒲黃 蒜頭 牡丹皮 芫花 醋炒 白芷

當歸 醋熬成 膏和藥 乾薑 炮各 一兩
大黃 二兩
未以米

右為細末。以大黃膏和丸。如梧子大。每
服三五十丸。空心醋湯下。或紅花酒煎下。

紅花 當歸散 治婦人經候不行。或積瘀血。腰腹疼
痛及室女月經不通。

紅花 當歸尾 紫葳 牛膝 甘草 蘇木
各二
赤芍藥 九兩 劉寄奴 桂心 白芷 各一
半兩

右為細末。空心熱酒調三錢服之。食前臨卧
再服。若久血不行。膿煎紅花酒下。孕婦休服。一名

凌霄花散即紫葳散。

通經丸 治婦人室女月候不通或成血瘕

桂心

青皮去白

大黃地

乾薑炮

川椒出

炒

仁製炒各

等分

右為末先將四錢用米醋熬成膏和

餘六錢末成劑。白中桔丸如桐子大曬乾每服二

十九用淡醋湯下加至三十九溫酒亦得空心食

前服濟生去川烏加紅花等分

茲血湯 治勞動致臟腑衝任氣虛不能約制經血

以致崩中或下鮮血或下五色連日不止淋漓不

斷形羸血虧倦怠困乏月水閉絕

馬鞭草牛膝荆芥穗各二兩

當歸肉桂

右每服四錢烏

牡丹皮赤芍藥川芎各一兩

右每服四錢烏

梅一個水二盞煎食前服日進四五服服至

半月或一月經脉自通以上統治污血有寒而經

閉者。

經驗方 治月水不通積痰傷經夜則妄語屢試有

經驗

瓜萎子一兩黃連半兩

吳茱萸十兩桃仁

山楂末一兩

紅麴二錢

縮砂三兩

右每服四錢烏

柏子仁丸

治室女經閉成癆兼服澤蘭湯

柏子仁炒另研

牛膝卷柏各半兩

澤蘭葉續

續

柏子仁丸

治室女經閉成癆兼服澤蘭湯

柏子仁炒另研

牛膝卷柏各半兩

澤蘭葉續</

太空心米飲下三十九

澤蘭湯

澤蘭葉三兩 當歸 茜藥各一 甘草半兩

右為粗末每服五錢水二盞煎一盞溫服

沈香鼈甲散 室女經候凝滯或頭目昏悶停痰五

心虛煩少食多因此方主之

沈香 甘草炙 檳榔各三分

當歸 柴胡 人參 半夏 桂心 生地黃

白茯苓 青皮 淨陳皮各一 龜甲半兩

為細末每二錢薑二片水煎七分空心溫服

牡丹散 治血氣虛損內則月水不行外發潮熱肢

體羸困漸成骨蒸

乾漆炒二蘇木 蓬莪术 鬼箭各一 甘草

當歸 桂心 牡丹皮 茜藥 延胡索炒

淨陳皮 紅花 烏藥 没藥別研各一右咬咀

每服三錢水一盞煎七分溫服無時

六神湯 治血氣不足肌體煩熱四物湯加黃芪地

骨皮各等分咬咀水煎又治衝任虛損月水不行

肌膚發熱如瘡狀四物湯各一兩柴胡半兩黃芩

一分水煎

桃仁散 治婦人女子血閉不通五心煩熱

紅花 當歸 桃仁炒

牛膝各等

右為末每

土瓜根散 治帶下經水不利小腹滿痛經一月再

服三錢酒調下空心服

見者

土瓜根 茜藥 桂枝 廉蟲各七

右四味杵為散酒服方寸匕日三服按仲景此方乃破堅下

血之劑則經不及期有瘀血者矣前論所未及也

欲知瘀血有無須以小腹滿痛與不滿痛別之

又方 治經事不來忽行小腹痛有塊血紫色

白芍藥 白朮 陳皮各半 黃芩 川芎 木

抵當湯 治婦人經水不利

水蛭熬通各二

水蛭熬各三十枚

右四味為末水五升煮取三升去滓溫服

又方 治月經不利腹中滿時自減

虎掌 大黃各二 桃仁二十個

四味水三升煮取一升盡服之當下惡血為度

小柴胡湯 治婦人經病間用此加減

柴胡半斤

人參去蘆

甘草生薑兩各三

半藥二兩

人參牛膝各三

桂心六兩甘草半一兩

芍藥一兩

芍藥半兩

夏半升

黃芩三兩

大棗十二枚

右以水一斗

龍骨散治婦人經水不利絕產

藥二兩

大棗二十枚

右㕮咀以酒一斗水之半

二升煮取六升去滓再煮取三升溫服一升日三服。

杏仁湯治月經不調或一月再來或兩月三月一來或月前或月後閉塞不通

杏仁二兩

桃仁一兩

大黃三兩

水蛭蟲

蟲各三

右五味㕮咀以水六升煮取二升分三服

服當有物隨大小便有所下下多者止之少都盡三服方止

大黃朴硝湯治經年月水不利胞中有風冷所致宜下之

大黃牛膝各五兩

代赭一兩

石硝牡丹皮

甘草紫菀各三兩

桃仁蟲

水蛭乾

薑細辛芒硝各二兩

麻仁五合

右十四味

五味五更為首相去一炊頃自下後將息忌見風咬咀以水一斗五升煮取五升去滓內硝令焯分五脣五更為首相去一炊頃自下後將息忌見風

茱萸蟲湯治久寒月經不利或多或少

吳萸三升蟲

水蛭蟲

牡丹皮各一

生薑一片

小麥半升

桃仁五十兩一枚

煮取一斗去滓適寒溫一服一升日三不能飲酒人以水代之湯微成乃內諸蟲不耐藥者飲七合

龍骨散治婦人經水不利絕產

藥二兩

大棗二十枚

右㕮咀以酒一斗水之半

煮取一斗去滓適寒溫一服一升日三不能飲酒人以水代之湯微成乃內諸蟲不耐藥者飲七合

人參去蘆

大棗十二枚

右以水一斗

煮取一斗去滓適寒溫一服一升日三不能飲酒人以水代之湯微成乃內諸蟲不耐藥者飲七合

人參去蘆

大棗二十枚

右以水一斗

牡蠣四兩

芎窮

茯苓各二兩半

蜀椒十兩

茱蘆子七十粒

乾薑三兩

大黃一斤

柴胡五斤

溫臘

通經方

治積痰傷經不行夜則妄語

桔萎子一兩

吳茱萸十粒

桃仁五個

紅翹二錢

硝右十二味

杏仁各合水蛭

蟲各半兩

桃仁七十粒

當歸圓七丸

右為末蜜丸梧子大飲服七丸日三

當歸圓治腰腹痛月水不通利

大胡連丸

治經閉骨蒸

化炊餅為凡桐子大每服百丸空心白湯下

大胡連丸

治經閉骨蒸

砂仁三兩

黃連半兩

右為末生薑汁

當歸圓

右為末生薑汁

當歸圓

治經閉骨蒸

白木

秦艽各八錢

川芎

黃藥

五味子各一兩半

甘草

地骨皮

半夏製

白木

牛黃三錢

右蜜丸梧子大

每六七十丸

白木

川芎

黃藥

五味子各一兩半

甘草

地骨皮

萬應丸

治蟲證經閉腹痛

檳榔五錢

大黃八兩

黑丑四兩

皂角十錢

苦棟根皮一斤

右將檳榔大黃黑丑為末將

皂角苦棟根皮煎汁熬膏為丸梧子大先用沈香

為衣後用雷丸木香為衣每三丸四更時沙糖水

送下善下諸蟲

送下善下諸蟲

送下善下諸蟲

送下善下諸蟲

通經散

治月經不通

甘遂冷水浸過去麪培乾各一兩

右為細末每服三錢溫湯調下臨卧服

桃仁承氣湯治月事沈滯

桃仁十二個去皮尖

如麻豆大每服三五錢水一大盞煎至七分去滓

官桂甘草芒硝各半

右剉

鶴鱉蕪荑

乾漆殼蠶各三錢

貫眾

酸石

中西合璧

榴皮
錢各五

硃砂研

雄黃研
雷丸
甘遂各

半煎七分入胎髮灰服之。
右為末米粉煮糊為丸麻子大每十九五更時粥飲下善殺諸蟲一方加麝香少許尤妙。

烏鵲散 治經脈不通

烏鵲去皮毛三分

當歸焙

好墨各三分

延胡索炒
右

蒲黃炒水蛭以糯米炒過各半兩

茺蔚以糯米炒過一分

為末每服一錢酒下

衛生湯 血枯經閉服芩連三和玉燭之後宜服此

湯

當歸

白芍藥各二兩

黃芪三兩

甘草一兩

右

右為末每服半兩水二盞煎至一盞空心溫服如虛加人參一兩。

獺膽丸 治月水不通

乾獺膽一枚水蛭十枚炒黃

乾狗膽 硼砂 川

椒炒去汗并日各一分

右為末酢糊丸菉豆大每服五丸

當歸酒下日一

經驗方 婦人五十後經水不止者作敗血論用此

方亦治女子經閉

小兒胎髮一枝燒

側柏葉

炒黃芩各五錢

右分六貼每貼水一盞

沈香降氣散 順氣道通血脉
烏藥 木香 香附子 砂仁 甘草各等分
為細末每服二錢空心鹽湯調下
片煎服

沈香降氣散 順氣道通血脉
烏藥 木香 香附子 砂仁 甘草各等分

為細末每服二錢空心鹽湯調下
右

通經湯 治月閉

當歸 川芎 白芍藥 生乾地黃 大黃

桂 厚朴 枳殼 枳實 黃芩 蘇木 紅花

水煎服心氣不下通故月事不來宜用黃連厚朴之類導痰降火則月事來矣此藥是也宜加黃連七分

導經丸丹 治經閉不通腰腹疼痛

大黃二兩 當歸 川芎 白芍藥

仁 甘草各一兩 純米同炒二十箇

右為末蜜丸梧子大酒下三十丸一

方有川芎地雞二十一箇無甘草蟹蠻

右

大學圖書館版

所有

中華人民共和國

人民出版社

印製

北京

1957年1月

版權所有

中華人民共和國

人民出版社

印製

北京

香附子二錢 烏藥一錢 當歸一錢 木香

甘草各五分

右剉水煎服。

當歸一錢 木香

無極丸 治經閉有血塊苦痛

錦紋大黃四兩一兩酒煮一兩醋煮一兩童便煮
鹽水各七次合一處又七蒸七曬

右為末用當歸熟地黃各一兩半濃煎汁煮

糊和丸梧子大紅花湯下三十丸

加味四物湯 治經水忽來忽斷時疼時止

大熟地一兩

白术土炒

粉丹皮三錢

元胡酒炒

甘

白芍五錢

當歸酒炒

川芎三錢

柴胡酒炒

草

白茯苓三錢

白术土炒

巴戟五錢

巴戟五錢

皮

人參五錢

白芍酒炒

白茯苓三錢

白术土炒

柴胡

人參五錢

白茯苓三錢

白术土炒

白茯苓三錢

益母勝金丹 治室女經閉成損

大熟地砂仁酒拌

丹參三兩

白术四兩陳酒蒸

茺蔚子四兩酒蒸

白芍三兩酒蒸

川芎一兩九蒸九曬

丹參三兩

白术四兩陳酒蒸

茺蔚子四兩酒蒸

白芍三兩酒蒸

鹽水各一兩

丹參三兩

白术四兩陳酒蒸

茺蔚子四兩酒蒸

白芍三兩酒蒸

雨酒水各半熬膏

丹參三兩

白术四兩陳酒蒸

茺蔚子四兩酒蒸

白芍三兩酒蒸

每帖加牛膝。

加味逍遙散

治室女經閉肝火旺盛頭生癰癧左

加味逍遙散

治療刺痛

柴胡

白芍

白芍

消瘰丸

與前方同用

元參蒸

牡蠣研醋

貝母去心蒸

皮

黑山梔各一錢

薄荷五分

右水煎服

五味異功散

室女經閉脾氣虛弱不能消化以致

血虧此方主之

人參

白术

茯苓

炙甘草

陳皮各一錢

入大棗二枚生薑三片水煎服。

八珍湯

治氣血兩虛發熱潮熱精神倦怠經水不通

右共為末

人參

白术

茯苓

炙甘草

熟地當歸

升麻四分

右水煎服

人參

白术

茯苓

人參

白术

茯苓

炙甘草

熟地當歸

通滯散 治經閉帶下或痢後腹中生塊手足痿弱

者

香附子

半炒半生

阿膠炒

反鼻

大黃各等

右

四味為末每服一錢日服二次溫酒送下

三和湯 治熱結血閉

生乾地黃

白芍藥

川芎

當歸

連翹

大

黃朴硝

薄荷

黃芩

梔子

甘草各七分

右剗作一貼水煎服此方乃集四物湯調胃承氣湯涼膈散三方為一也

延胡索湯 治婦人經閉腹痛經久者

延胡索一錢

當歸

桂枝各七分

乾薑六分

右四味水煎日二服常服益佳

八味煎 治血塊虛塞經水不行

茯苓三錢

當歸

肉桂

牡丹皮

芍藥

莪

術各錢半錢

甘草牛膝各一錢

右八味水煎服

又方 治月水二三月不行或血塊下

延胡索牛膝各一兩

香附子二兩

右三味水

煎服

血極膏 治婦人乾血氣

川大黃

當歸頭各等

右為末用釀醋熬成膏

子丸如雞頭大每服一丸酒化開臨卧溫服大使利一二行後紅脈自下乃婦人之仙藥也

單方 室女月水不來用雄鼠糞一兩燒存性為細末空心溫酒調下一錢神效

月經不通取葶藶一升為末蜜丸如彈子大綿裹內陰中入三分每丸一

宿易之有汗出止婦人月水滯澀不快結成瘕塊

腹脹大欲死用馬鞭草根苗五斤剗細以水五十煎

至一斗去渣別以淨器盛熬成膏食前溫酒調下半匙

月水不通厚朴不拘多少薑汁炎香細切濃煎

去渣空心服不過三四劑即痊癒驗惟形實氣盛者

宜之室女經閉恍惚煩熱鉛霜半兩生地黃汁一

合調下日三服又方當歸尾沒藥各一錢為末紅

花浸酒面北飲之一日一服婦人宿有風冷留血

積聚月水不通蒼蘭子一升桃仁二升酒浸去皮尖

研勻入瓶內以酒二斗浸封五日後每飲三合日三

服量小者不拘月信灑滯裏荷根細切煎取二升

空心入酒和服又方虎杖三兩凌霄花沒藥各一

兩為末熱酒每服一錢月水不通腹大如甕

膝汁各二斗水一斛浸虎杖一宿煎取二斗入二汁

同煎如餳每酒服一合。日再夜一宿血當下。通經破血用舊屋陰處瓦花活者五兩。熬膏當歸鬚乾漆一兩。燒烟盡當門子二錢為末。棗肉和丸梧子大。每服七十九紅花湯下。月經不通或兩三月。或半年一年者。用麻子仁二升。桃仁二兩研勻。熟酒一升。浸一夜。日服一升。又方。薏苡根一兩。水煎服之。不過數服效。婦人經閉不行至二三年。臍腹痛。腰腿沉重寒熱往來。用芥子二兩為末。每服二錢。熟酒食前服。經脈不通。乾絲瓜一個為末。用白鴿血調成餅。日乾研末。每服二錢。空心酒下。先服四物湯三服。婦人經閉數年不通。面色痿黃。脣口青白。腹內成塊。肚上筋起。腿脛或腫。桃根牛蒡根馬鞭草根牛膝根蓬蘽各一斤。剉以水三斗。煎一斗去滓。更以慢火煎如餳狀收之。每以熱酒調服一錢。女子經閉不通。用酢榴根東生者一握。炙乾水二大盞。濃煎一盞。空心服之未通再服。又方。用茶清一瓶。入沙糖少許。露一夜服。雖三個月胎亦通不可輕視。室女經閉。血結成塊。心腹攻痛。用薑黃川大黃炒各半兩為末。每服一錢。溫水下。月經不通。巴豆去油。如菉豆大三丸。以烏金石末一錢。調湯送下。即通。婦人血閉。

腹痛以新麻布數重包白鹽一合。煅研。溫酒服之。月經久閉。用蠶沙四兩。砂鍋炒半黃色。入無灰酒一壺。煮沸澄去沙。每溫服一盞。即通。又方。用龍胎同瓦松景天各少許。以水兩盞。煎一盞。去滓分二服。少頃腹中轉動。便下。其效甚速。月水不通。心腹滯悶。四肢疼痛。用赤馬肝一片。炙研。每食前。熟酒服一錢。通乃止。又方。用馬駒胞衣煅存性為末。每服三錢。入麝香少許。空腹新汲水下。不過三服。即效。又方。用狸陰莖燒灰。東流水服。婦人月水不通用。童男童女髮各三兩。燒灰。蟹螯二十一枚。糯米炒黃。麝香一錢。為末。每服一錢。食前熱薑酒下。月經逆行。從口鼻出。先以京墨磨汁服止。次用當歸尾。紅花各三錢。水一鍾半。煎八分。溫服。其經即順。女人月經斷絕。甜瓜蔓使君子各半兩。甘草六錢為末。每酒服二錢。經血逆行。用魚膠切炒新綿燒灰。每服二錢。米飲調下。即愈。月水不行。茜根一兩。用水煎服。

外國醫方】蘆薈酒 沒藥酒各四

右混和。每服二十滴至三十滴。一日三次。

番紅花四瓦 大黃十六
瓦 火酒百六十瓦。於其濾液中加稀鹽酸十六瓦。每

服十滴。一日三次。

龍膽四瓦

沒藥二瓦

乳糖八瓦

右為藥粉。

分二十包。一日三次。每服一包。

葎布林白糖各四瓦

右研和。勻分十五包。每二

時服一包。

蘆薈四瓦

沒藥四瓦

遏泥子一瓦

薩昆那葉

阿魏四瓦

右為丸藥。分三十粒。每日三粒。至六粒。

一日二次。

阿魏蘆薈石鹼各四瓦

香附子二瓦。右為丸藥。分二百四十粒。每服兩粒。至四粒。一日三次。凡

多血而月經不通者。適用以上諸方。

過格魯兒鐵酒沒藥酒各四瓦

右混和。每服十滴。一日三次。

過格魯兒鐵酒不拘。右每次用六滴至八滴。

硫酸鐵五瓦。蘆薈末二六丁香末四松

節油十滴。右以黃蠟為丸藥。分三十粒。每服十

粒。一日三次。凡血虧而月經不通者。適用以上諸

方。
蘆薈越幾斯瓦。沒藥末隨宜。右為丸五十粒。一日三次。每服二三粒。

亞硫酸五瓦

硫酸鐵二瓦

胡椒蘆薈沒藥

還元鐵

瓦三

鹽酸規尼涅

瓦二

甘草末適宜右

為丸六粒。一日三次。每食後服兩粒。

蘆薈硫酸鐵各一瓦

右為丸二十粒。一日三次。每

亞硫酸一瓦百

黑胡椒甘油各適右為丸四

十粒桂皮末

為衣。一日三次。食後服一粒。

林檎鐵酒六瓦

胃液素一名百弗

蒸餾水百瓦

一日分三次服。無月經者。服此能開胃補血。

經來腹痛

中醫學說婦人經來腹痛。由風冷客於胞絡衝任

或傷手太陽少陰經。用溫經湯桂枝桃仁湯。若憂思

氣鬱而血滯。用桂枝桃仁湯地黃通經丸。若血結而

成塊。用萬痛丸。經候過而作痛者。乃虛中有熱。所以

作疼。經水將來作疼者。血實也。四物加桃仁黃連香

附。臨行時腰疼腹痛。乃是鬱滯有瘀血。宜四物加紅

花桃仁莪术延胡索香附木香。發熱加黃芩柴胡。紫

色成塊者。熱也。四物加黃連柴胡之類。時行時止。淋

瀝不斷。腹中作痛。乃寒熱邪氣客於胞中。留滯血海。

外疼也。如有積下利不定有所去則愈。脣下逆氣上攻胃膈欲嘔者。桃仁散或用當歸四錢乾漆三錢蜜丸。服如腰脣腹痛者。牛膝散或行或止心痛者。失笑散。經事欲行。臍腹絞痛者。為血滯。四物湯料四錢加延胡索苦棟木香檳榔各一兩。痛甚者萬痛丸。經水臨行時痛者為氣滯。烏藥湯。氣滯血瘀者。大延胡索散或四物加桃仁紅花莪术延胡索香附木香。發熱加柴芩。經水將來陣痛陣止者。為血實。四物湯加陳皮。胡索木香黃連香附。腿腹痛者。內補當歸丸。經水將行被風冷相搏。繞膝病痛者。乃寒氣客於血室。大溫經湯桂枝桃仁湯。經水日來時痛者。四物湯加陳皮。延胡索牡丹皮甘草。經後痛者為血虛。八物湯小烏雞丸。歷年血寒積結胞門。嘔吐涎唾。臍脅疼痛。陰冷徹引腰脊而痛者。酒煮當歸丸。大溫經湯。經前作痛如經水者。行氣血。通陰陽。以榮於身者也。氣血盛陰陽和。則形體通。或外虧衛氣之充養。內乏榮血之灌漑。血氣不足。經候欲行。身體先痛也。經行腹痛。證有虛實。實者或因寒滯。或因血滯。或因氣滯。或因熱滯。虛者有因血虛。有因氣虛。然實痛者多痛於未行之前。經過

而痛自減。虛痛者多痛於既行之後。血去而痛未止。或血去而痛益甚。大都可按可揉者為虛。拒按揉者為實。有滯無滯。於此可察。但實中有虛。虛中亦有實。此當於形氣稟質兼而辨之。當以意察。言不能悉也。又婦人經期。有氣逆作痛。全滯而不虛者。須順其氣。宜調經飲主之。甚者如排氣飲之類。亦可用。若氣血俱滯者。宜失笑散主之。若寒滯於經。或因外寒所逆。或數日不慎寒涼。以致凝結不行。則留聚為痛。而無虛者。須去其寒。宜調經飲加薑桂吳茱萸之類。主之。此五證。但察其有滯無虛。方是真實。若或兼虛。弗得任行。赴伐。凡婦人經行作痛。挾虛者多。全實者少。即如以可按拒按及經前經後。辨虛實。固其大法也。然有氣血本虛而血未得行者。亦每拒按。故於經前亦常有此證。此以氣虛血滯。無力流通。而然。但察其形證脉息。凡涉虛弱不足。而經滯作痛者。惟用決津煎五物煎加減主之。其效如神。或用四神散之類亦可。若痛在經後者。多由血虛。當用大小營煎。隨宜加減治之。或四物八珍俱可用。然必察其寒熱虛

實以為佐使。自無不效。其有餘滯未行者。惟決津煎為妙。凡婦人但遇經期。則必作痛。或食則嘔吐。肢體困倦。或兼寒熱者。是必素稟氣血不足。止宜八珍湯大營煎之類。其虛而寒甚者。宜理陰煎。漸加倍補。久必自愈。有因帶濁多而虛痛者。亦宜大小營煎。隨其寒熱加佐使主之。經事來而腹痛者。不來而腹亦痛者。皆血之不調故也。欲調其血。先調其氣。四物湯加吳茱萸半錢。香附子一錢。和氣飲加茱萸半錢。亦可用。痛甚者。元胡索湯。然又恐感外邪。傷飲食致痛。痛不因血。尤宜詳審。和氣飲却能兼治。因冷而節。因節而痛。宜大溫經湯。冷甚者。去麥門冬不用。抑氣丸治臨經之時腹痛。以四物湯加元胡索陳皮。牡丹皮。甘草。痛甚以豆淋酒。痛少以童便煮香附。入條芩為丸。經水將來而痛者。四物湯加桃仁。香附。黃連。寸關脉調如故。尺脉絕不至者。當患少腹痛。引腰痛。氣滯。上攻胸臆。寸口脉浮而弱。浮則為虛。弱則無血。脉至狀如琴弦。苦小腹痛。月水不利。孔竅生瘡。沈緊細動。皆主腹痛。陽弦頭疼。陰弦腹痛。肝脉若泥。此由血積不散。為氣所冲。新血與故血相搏。故痛。

婦人有經前腹疼數日。而後經水行者。其經血多為紫黑塊。人皆以為寒極。豈知乃熱極而火不化矣。肝舒則通暢。鬱則不揚。經欲行而肝不應。則抑拂其氣而疼生。然經滿則不能內藏。而肝中之鬱火焚燒。內逼經出。則其火亦因之而怒洩。其紫黑成塊。經失其為經者。正鬱火內奪其權耳。治宜太瀆肝中之火。然洩肝之火。而不解肝之鬱。則熱之標可去。而熱之本未除也。其何能益。方用宣鬱通經湯。婦人有少腹疼於行經之後者。人以為氣血之虛。而不知為腎氣之涸。經水乃天之一真水。滿則溢。虛則閑。亦其常耳。何以虛能作疼哉。蓋腎水一虛。肝木必尅脾土。木土相爭。則氣必逆。故爾作疼。治須以舒肝氣為主。而益之以補腎之味。則水足而肝氣益安。肝氣安而逆氣自順。又何疼痛之有。方用調肝湯。婦人有經未行之前一二日。忽然腹疼而吐血。人皆以為熱極。豈知乃肝氣之逆。失肝性最急。宜順而不宜逆。順則氣安。逆則氣動。血隨氣為行止。氣安則血安。氣動則血動。亦無怪其然也。或謂經逆在腎不在肝。何以隨血妄行。竟至從口上出也。是肝不藏血之故乎。抑腎不納氣而然乎。殊不知少陰之火。急如奔馬。得肝火直冲而

其勢最捷。反經而為血亦至便也。正不必肝不藏血。始成吐血之證。但此等吐血與各經之吐血有不同者。蓋各經之吐血由內傷而成。經逆而吐血乃內溢而激之使然也。其證有絕異。而其氣逆則一也。治宜平肝以順氣。不必益精以補腎。雖然。經逆而吐血雖不大損。未血而反覆顛倒。未免大傷腎氣。必須於補腎之中。用順氣之法。始為得當。方用順經湯。婦人有經水將來三五日前。而臍下作疼。狀如刀刺者。或寒熱交作。所下如黑豆汁。人皆為血熱之極。豈知為下焦寒濕相爭。夫寒濕乃邪氣也。婦人有衝任之脉。居於下焦。衝為血海。任主胞胎。為血室。均喜正氣相通。最惡邪氣相犯。經水由二經而外出。而寒濕滿二經。而內亂兩相爭。而作疼痛。邪愈盛而正氣日衰。治當利其濕而溫其寒。使衝任無邪氣之犯。臍下自無疼痛之疾矣。方用溫臍化濕湯。

西醫學說 經來即痛。西名月經困難。又稱月經性病痛。故俗有痛經之稱。其痛有劇烈者。有輕微者。或則來噯氣嘔吐。偏頭痛諸證。此因子宮頸管狹窄。子宮粘膜表層脫離。子宮前屈。子宮纖維瘤。子宮內膜炎。卵巢炎及痛風。僂麻質斯等症而來者為多。就

中由於子宮頸管狹窄者。謂之器械性月經困難。由於子宮前屈。或子宮頸腫瘍者。謂之充血性月經困難。由於子宮內膜炎者。謂之內膜性月經困難。由於子宮頸管狹窄者。謂之內膜性月經困難。普通當經來之時。自覺骨盤脹滿。薦骨掣痛。尿意頻數。發作性之疼痛。自腰及於腹部。其因子宮頸管狹窄者。經血流至頸管。妨其外出。子宮遂發劇甚之拘攣。因而作痛。殊烈。治療之法。第一須探其原因。而祛除之。其對症治法。最妙莫如於下腹部施溫罨法。行坐浴。亦佳。此外則務安靜忌奮興。向有便秘之癖者。宜投瀉藥。有限局性之疼痛者。外塗十倍之依比知阿兒軟膏。頗效。鎮痘藥中之嗎啡。切不可以妄用。必不可已之時。祇可用阿片酒。或鹽酸古加丁。涅經前經中。投曉度拉斯企斯。越幾斯殊佳。經前經後以及經中。生殖器發生疼痛者。謂之月經困難。前人分此症為四種。一曰炎性。二曰充血性。三曰神經性。四曰卵巢性。今則祇分充血性與機械性二種。所謂機械性月經困難者。以極多量之經血。鬱積於狹小之子宮口。苟非子宮努力逼出。萬難宣洩。子宮既努力逼出。遂發疼痛。此即疼痛性之子宮收縮也。其證候不一。有

發痛之後少頃經血即下而痛亦立止者有僅經水來時作痛者痛之部位骨盤為甚亦有放射而遠及於背部者痛之性質或為鈍痛或為灼痛有持久不散者有間歇而來者有輕重迭至者利尿困難亦每與月經困難併發實即疼痛性之尿意頻數至頑固使秘又為常有之證候

[中國醫方]琥珀散 治婦人月經壅滯每發心腹脣疔痛不可忍及尋常氣血痛并產後血上搶心京三稜 蓬莪术 赤芍藥 劉季奴 牡丹皮熟地 官桂 菊花 真蒲黃 當歸各一兩 右前五味用烏豆一升生薑半斤米醋四升同煮豆爛為度焙乾入後五味同為末每服二錢溫酒調下空心食前服濟生有延胡烏藥各一兩無蒲黃

黃菊花

葛歸丸 治經斷而後腫用此調經則水自消當歸 人參 大黃 桂心 瞿麥 赤芍 白茯苓各三兩 茼蒿一錢 右為木蜜丸梧子大每十五丸空心米飲下失笑散 治婦人經水時行時止心痛蒲黃 五靈脂各等分 右為末每二錢先以酢

調成膏入水一盞煎空心熱服

柴胡調經湯

治經水色鮮不止頭項脊骨強痛小

思飲食

柴胡七分

羌活

蒼朮錢各一

獨活

藁本

升麻各五分

乾葛

當歸

甘草各三分

紅花少許

右水煎熱服取微汗

桃仁散

治婦人月水不調或淋沥不斷斷後復來狀如瀉水四體虛倦不能飲食腹中堅痛不可行

動月水或前或後或經月不來多思酸物

桃仁

半夏

當歸

川牛膝

桂心

人參

蒲黃

丹皮

川芎

澤蘭葉各一錢

赤芍藥

生地黃

粉草各一分

右作一服

水二鍾薑

三片煎至一鍾食前服

薑黃散

治血臘久冷月水不調脇腹刺痛

片子薑黃

白芍藥各二錢

廷胡索

牡丹皮

當歸

各一錢半

蓬術

紅花

桂心

川芎各一錢

右作一服

水二鍾酒半鍾煎至一鍾不拘時服

紫石英丸

治婦人月經乍多乍少或前或後時發

疼痛

紫石英

細研水飛

川烏炮

杜仲炒去絲

禹餘糧煅

濟遠志去心

澤瀉

桑寄生

桂心

龍骨

別研

當歸

人生

肉蓯蓉酒浸

石斛乾

薑炮

五味子

甘草炙各一兩

牡蠣煅

川椒去目

炒出并合口者不用汗各半兩

右為細末

煉蜜和丸如梧子大

每服二十丸食前用米飲湯下

大溫經湯

治衝任虛損月候不調或來多不已或過期不行或崩中去血過多或經損娠瘀血停留

小腹急痛五心煩熱並脅治之

吳茱萸湯泡

牡丹皮

白芍藥

肉桂去粗皮

人參

當歸

甘草炙各二錢

麥門冬去心二錢

半夏二錢

右作一服用水二錢。生薑五片煎至一鍾。食前服。

小溫經湯 治經候不調血臘冷痛

當歸

附子泡各等分

右咬啞

每服三錢水一盞。前八分空心溫服。

萬病丸

一名萬痛丸

治經事不來繞脅痛

乾漆

杵碎炒烟盡

牛膝酒浸一宿焙乾各一兩

右為末以生地黃汁炒

一升入二味藥末銀器內慢火熬可丸。即丸如桐子大每服二十丸空心米飲或溫酒下。若內補當歸丸

治血氣虛損月水不調或崩中漏下。

去血過多肌體羸困及月水將行腰腿重痛
當歸炒去蘆也

芎藶炮

甘草炙各四兩

熟地黃半兩

阿膠炒

白芷續斷

乾薑炮

芍藥附子各三兩

蒲黃八錢炒去皮

肉桂各二錢

吳茱萸湯泡

右為細末

煉蜜和丸如梧子大。每服五十丸空心用溫酒送下。

八物湯

治經事將行臍腹絞痛臨經痛者血溫故

也

川芎二錢當歸芍藥熟地黃各二錢

檳榔延胡索苦棟碎炒各一錢

右作一服水二鍾煎至一鍾。食前服。

交加散

治榮衛不和月經瘀濁逐散惡血腹痛經

血諸疾

生薑搗汁

桂心各二錢

生地黃汁存滓

白芍當歸

沒藥另研紅花炒各半兩

右將地黃汁炒生薑

蒲黃隔紙炒各一兩

擦去皮熟布

生薑汁炒地黃滓各焙乾同諸藥為細末。每服三錢溫酒調下。若月經不依常蘇木煎酒調下。若腰痛糖酒調下無惡血去紅花

交加地黃丸

治婦人經不調血塊氣痞肚腹疼痛

西醫藥學圖書館版權所有

生地黃存津一
川芎各半

老生薑搗汁存津一斤

延胡索

甘草錢半

右㕮咀每服四錢水一盞

歸仁去皮失研

人參各半兩

沒藥各半兩

木香各半兩

香附半斤

右為末先以

生薑汁浸地黃津

以地黃汁浸生薑津

地黃乾皆以

汁盡為度

共十一味

作一處曬乾研為末

酢糊為

丸空心以薑湯下

交加散

治婦人榮衛不通

經脉不調腹中撮痛氣

多血少結聚為癥

產後中風

生地黃各五兩

生薑各五兩

右交互取汁浸一名

各炒黃漬汁盡為度

末之如尋常腹痛酒調下三

錢如產後尤不可缺

桂枝桃仁湯

治經候前腹痛

不可忍

桂枝各二兩

芍藥各二兩

生地黃各二兩

桃仁四十粒

甘草一兩

右為粗末每服五錢水二盞薑三片棗一枚同煎去滓溫服

延胡索湯

治婦人室女七情傷感遂使血與氣併

心腹作痛或連腰背或引背背上下攻刺甚作搐

搦經候不調

但是一切血氣疼痛並可服之

當歸去蘆酒浸剉炒

延胡索炒去皮

蒲黃炒去粗皮

赤芍藥良薑炒

甘草炙

沒藥各半兩

木香各半兩

官桂各半兩

薑黃洗

乳香各半兩

沒藥各半兩

木香各半兩

右為末每服五錢溫酒調下

不見火

半

生薑七庵煎至七分

去滓

食前溫服如吐逆用

半夏橘紅各半兩

又方

治瘀血

香附子四兩

當歸各一兩

桃仁去皮尖

牡丹皮大青蒸

細末

橘紅二兩

延胡索醉煮

當歸各一兩

川芎各半兩

紅花各半兩

瓦薑子煅酢煮

右炊餅為丸空心溫酒下三四丸

三神丸

治室女血氣相搏腹中刺痛痛引心端經

行澀少或經事不調以致疼痛

柴胡丁香湯

治婦人年三十歲臨經預先臍腰痛

甚則腹中亦痛經縮二三日

細末

酒煮米糊為丸如梧桐子大每服七十丸加

至百丸空心艾湯送下米飲亦得

蓬木炮一

當歸焙

延胡索五靈脂

肉桂各半兩

右為末

每服五錢

溫酒調下

大學圖書館版權

牛膝散 治經行臍腹作痛或小腹引腰氣攻胃膈
牛膝酒麪 桂心 赤芍藥 桃仁去皮 延胡
索炒 當歸酒 丹皮 木香各半 右為末。每
服一錢。空心溫酒調下。一方有川芎。
瑞金散 治月經不行血氣撮痛
薑黃半錢 牡丹皮 蓬术 紅花 當歸 赤
芍藥 川芎 延胡索 官桂各七
貼水一盞酒半盞煎服。

立效散 治經年積血腹中常痛月經不調
青皮 陳皮 烏藥 乾薑 香附子 蓬莪术
三棱各等 右剉酢煮焙乾為末。空心陳皮煎
湯調下二錢。
伏龍肝散 治血氣勞傷衝任脉虛經血非時注下
或如豆汁或成血片或五色相雜臍腹冷痛月經
不止

伏龍肝 麥門冬 赤石脂各一 熟地黃 茄葉
炒各一 當歸炒 川芎各二 肉桂去皮粗
乾薑炮 甘草各五 分右作一服水二鍾。紅棗二
枚煎至一鍾。食前服。
加味烏沈湯 治婦人經水欲來臍腹疼痛

又方 治頭痛口乾經行後身痛腰甚痛
生地黃 白朮 菖蒲各一 蒼朮歸身尾各
分 黃柏炒 甘草三分 右用水入少酒煎服。
宣鬱通經湯 治經水來腹先疼痛
白芍五錢 炒酒炒 當歸五錢 丹皮五錢
白芥子二錢 炒研 柴胡一錢 山楂子三
鬱金一錢 醋炒 黃芩一錢 酒洗 生甘草一錢
服連服四劑。下月斷不腹先疼而後行經矣。
調肝湯 治行經後少腹疼痛
山藥五錢 炒酒炒 阿膠三錢 白芍三錢
山萸肉三錢 蒸熟 巴戟一錢 鹽水浸
右水煎服。

順經湯 治經前腹痛吐血
當歸五錢 當歸酒洗 大熟地五錢
白芍二錢 麵炒 丹皮五錢
沙參黑芥穗各三 鐵錢 右水煎服。
溫臍化濕湯 治經水將來臍下先疼痛
白茯苓三錢 炒山藥五錢 巴戟五錢

鹽水
扁豆
炒搗
三錢

白果
搗碎
建蓮子
三十枚
不去心

服一包

阿片酒
葛菪酒
菲沃斯酒
纈草酒
曼陀羅

華酒各十

右每日服三四次每次二十滴

哥羅方
一瓦

樟腦
一瓦四分之一

以脫
密兜拉酒各

半
護謨漿
一瓦

蒸餾水
五十五瓦

右每十五分

熱入血室

外國醫方
歇那設珍
半瓦
附子
桃仁
紅花
蓬莪术
延胡索
牡丹
皮各七
右割作一帖水煎服

印度大麻越幾斯
一瓦五分之二

右為一包共製四包

散分作十包每三時服一包

燐酸古姪
一瓦
乳糖
二瓦
右研勻分作五

包一日三次每服一包

流動肺度拉斯
越幾斯七瓦
苦酒
四瓦
蒸餾水

加蜜列花
二百瓦
右一日分三次服

阿片酒
十五瓦
薄荷糖漿
十五瓦

右調和每時服一大匙

麥角越幾斯
分之一一瓦十
白糖
三瓦
右為五包一日

服四五包

安知必林
半瓦
右為一包共製六包一日三次每

中醫學說婦人中風七八日續來寒熱發作有時經水適斷此為熱入血室其血必結故使如瘡狀發作有時小柴胡湯主之婦人傷寒發熱經水適來晝日明了暮則讞語如見鬼狀者此為熱入血室治之無犯胃氣及上二焦必自愈婦人中風發熱惡寒經水適來得七八日熱除脉遲身涼胃脅滿如結胸狀讞語者此為熱入血室也當刺期門隨其實而取之陽門隨其實而瀉之瀉然汗出者愈婦人傷寒傷風明病下血讞語者此為熱入血室但頭汗出當刺期門隨其實而瀉之瀉然汗出者愈徐徐出針凡針期門穴下針病人五吸停針良久徐徐出針

徐徐出針凡針期門穴必瀉勿補肥人二字瘦人寸

半也。按前證若因勞役或怒氣發熱，適遇經行而患前證者，亦用小柴胡加生地黃治之。血虛用四物加柴胡。若病既愈而熱未已，或元氣素弱並用補中益氣湯。脾氣素鬱用濟生歸脾湯。血氣素虛用十全大補湯。婦人經水適來適斷，往來寒熱。先服小柴胡以去其寒熱。後以四物湯調治之。如寒熱不退勿服四物，是謂變證。表邪猶存不能效也。傷寒熱入血室，何以明之？室者屋室也。謂可以停止之處。人身之血室為榮血停止之所。經脉留會之處即衝脈是也。衝脉者，奇經八脉之一脉也。起於腎下，出於氣衝，並足陽明經，夾躋上行至胃中而散為十二經脉之海。王冰曰：衝為血海。言諸經之血朝會於此。男子則運行水精，女子則上為乳汁。下為月水內經。曰：任脈通衝脈。盛月事以時下者是也。王冰曰：陰靜海滿而去血。謂衝脉盛為海滿也。即是觀之衝是血室。可以知矣。傷寒之邪，婦人則隨經而入。男子由陽明而傳以衝之脉與少陰之絡。起於腎。女子感邪太陽隨經便得而入衝之經並足陽明。男子陽明內熱方得而入也。衝之得熱血必妄行。在男子則下血讌語。在婦人則月水適來。陽明病下血讌語。此為熱入血室者。斯蓋

并言男子不止為婦人而言也。婦人傷寒經水適來與經水適斷者皆以經氣所虛。宮室不闢。邪得乘虛而入。針經有言曰：邪氣不得其虛不能獨傷人者是矣。婦人熱入血室有須治而愈者。有不須治而愈者。又各不同也。婦人中風發熱惡寒經水適來得七八日熱除而脉遲身涼。和胃脅下滿如結。胃狀讌語者。此為熱入血室當刺期門隨其實而瀉之。與其婦人中風七八日續得寒熱發作有時。經水適斷者。此為熱入血室其血必結。故使如瘡狀發作有時。小柴胡湯主之。二者是須治而愈者也。婦人傷寒發熱經水適來。晝則明了。暮則讌語。如見鬼狀者。此為熱入血室無犯胃氣及上二焦必自愈。是不須治而愈者也。讌語為病邪之甚者。何不須治而愈耶。且胃脅滿如結。胃讌語。是邪氣留結於胃脅而不去者。必刺期門隨其實而瀉之。寒熱如瘡發作有時者。是血結而不行。須小柴胡湯散之。二者既有留邪。必須治之可行也。若發熱經水適來。晝日明了。暮則讌語。此則經水自下。下者愈。故無犯胃氣及上二焦必自愈。經水既來。以裏無留邪。但不妄犯熱隨血散必自愈。經水妄犯者。謂恐以讌語為陽明內實攻之。犯其胃氣也。

此無胷脅之邪。恐刺期門。犯其中焦也。此無血結。與小柴胡湯。犯其上焦也。小柴胡湯解散。則動衛氣。衛出上焦。動衛氣。是犯上焦也。刺期門。則動榮氣。榮出中焦。動榮氣。是犯中焦也。脉經有曰。無犯胃氣及上二焦。豈謂藥不謂針耶。晝則明了。夜則讞語。熱入血室。無犯胃氣及上二焦。不治自愈。若甚則四順飲子桃仁承氣湯。證相似當下者用之。或問熱入血室。何為而成結胷也。余曰。邪氣傳入經絡。作主氣相搏。上下流行。遇經水適來適斷。邪氣乘虛。入於血室。血為邪所迫。入於肝經。肝受邪則讞語。而見鬼。復入膻中。則血結於胷中。何以言之。婦人平居。以血養肝。方未受孕。則以之為月水。既姪。則中畜之以養胎。及已產。則上壅之以為乳汁。皆血之所為也。今邪逐血。併歸於肝。經聚於膻中。結於乳下。故手觸之。則痛。非藥可及。故當刺期門也。婦人傷寒中風。治法與男子無異。若熱入血室。則不同也。宜以四物湯安養經血。加芍藥。婦人傷寒。脉浮而緊。頭痛身熱。惡寒無汗。恐熱入血室。宜麻黃加生地湯。婦人傷寒。經脉方來初

斷。寒熱如瘡。狂言見鬼。宜用乾薑柴胡湯。婦人室女。傷寒發熱。經水適來適斷。晝日明了。夜則讞語。如見鬼狀。宜小柴胡加生地湯。婦人傷寒。身熱。脈長而弦。屬陽明少陽。往來寒熱。夜躁晝甯。如見鬼狀。經水適斷。熱入血室。不實滿者。小柴胡加牡丹皮主之。大實滿者。桃仁承氣主之。婦人傷寒。頭痛脉浮。醫反下之。邪氣乘虛而傳於裏。經水閉而不行。心下結鞭。口燥舌乾。寒熱往來。狂言如見鬼狀。脉沉而數者。當下之。宜小柴胡加芒硝大黃湯主之。婦人傷寒。表虛自汗。身涼。四肢拘急。脉沉而遲。太陽標病。少陽本病。經水適斷。宜桂枝加附子紅花湯。婦人傷寒。太陽標病。汗解表除邪熱。內攻熱入血室。經水過多。無滿實者。甘草芍藥湯。仲景傷寒不分男女。但婦人以血為玉。血室即衝脉與海也。如傷寒發熱。經水適來。晝則明了。夜則讞語。如見鬼狀。經行盡則熱隨血散。不治自愈。如經盡。熱退身涼。胷滿如結胷。或讞語者。乃邪氣結於胷脅。按之痛者。亦謂之血結胷。宜海蛤散桂枝紅花湯。婦人傷寒。寒熱似瘡。經水適斷者。亦名熱入血室。其血必結而不行。小柴胡湯或黃龍湯加牡丹皮。桃仁。婦人此證最多。切忌汗下。若見喜忘如狂。腹

滿泉清。當以淋血法治之。又不可拘於不下也。然男女均有此血海。在男子血室得熱。則必妄行。多為下血。讞語。頭汗。見陽明證為異耳。男子由陽明而傷婦人隨經而入。若熱因外邪。由表而入者。宜一柴胡飲。或三柴胡飲。或四柴胡飲。或良方黃龍湯加生地。酌而用之。若或怒或勞。火由內生。其人多汗而無表證者。宜保陰煎。清化飲。當歸六黃湯之類。加減主之。若病雖漸愈。但元氣素弱。而熱有未退。血未止者。宜補陰益氣煎。或補中益氣湯。若脾氣素弱。宜歸脾湯。血氣俱弱者。宜十全大補湯。若血熱多滯者。宜小柴胡湯。加丹皮。紅花。當歸。陽明病。下血。讞語者。此為熱入血室。是兼男女而言也。曰婦人中氣七八日續得入血室。是兼男女而言也。曰婦人中氣七八日續得寒熱。發作有時。經水適斷者。此為熱入血室。其血必結。故使如瘡狀。發作有時。小柴胡湯主之。曰婦人中風。脈遲。身涼。而證如結胷者。當刺期門。曰婦人傷寒經水適來。晝日明了。暮則讞語者。無犯胃氣及上二焦。必自愈。按血室者。即衝任血海也。亦血分也。凡血分之病。有畜血者。以血因熱結。而留畜不行也。有熱入血室者。以邪入血分。而血亂不調也。故血畜者去之。則愈。血亂者。調之則安。調之之法。熱者宜涼。陷者去

宜舉虛者。宜滋。瘀者宜行。邪未散者宜解。然此皆病在下焦。故曰無犯胃氣及上二焦。必自愈。是又不可不察。

[中國醫方] 加味小柴胡湯 治婦人傷風續得寒熱。發作有時。經水適斷。此為熱入血室。其血必結。致如瘡狀。
柴胡 三錢 半夏 各二錢 生地黃 人參
錢半 甘草 半錢 右作一服。水二鍾。薑五片。棗二枚。煎一鍾。不拘時服。

乾薑柴胡湯 治婦人傷寒。經脉方來。熱入血室。寒熱如瘡。或狂言。見鬼。

柴胡 一錢 桂枝 三分 括裏根 五分 牡蠣殼
乾薑炮 甘草 炒各三分 右水煎服。汗出而愈。

海蛤散 治婦人傷寒。血結胸膈。宜服此藥及針期門穴。
海蛤 滑石 煅水 甘草 各五錢 芒硝 一兩 右為末。每服二錢。用雞子清調下。小腸通利。其結血自散。更用桂枝紅花湯發其汗。則愈。

中西婦科大全卷一終



調經門下

無錫顧鳴盛輯

天癸過期

中醫學說 婦人年六十所。經水常自下。設久得病利。少腹堅滿者為難治。婦人經脈過期不及腰腹疼痛。或七七數盡而月經下者。宜用當歸散治之。按前證若肝腎虛熱。用當歸散。肝血虛熱。四物湯加柴梔丹皮。肝火內動。小柴胡加山梔丹皮。肝火血燥。加味逍遙散。脾經鬱火。加味歸脾湯。肝脾鬱火。歸脾逍遙兼服。肝腎虧損。歸脾六味兼服。婦人經血終於七七之數。外經血暴下者。火主暴速。亦因暴喜暴怒。憂結驚恐之致。然也。慎不可作冷病治。如下峻熱之藥。則死止可用黃連解毒湯。以清於上。更用蓮殼灰棕毛。以滲於下。然後用四物湯。加延胡索散等涼血和經之藥為是。婦人天癸已過期。經脈不勻。或三四月不行。或一月再至。腰腹疼痛。素問云。七損八益。謂女子七數盡而經不依期者。血有餘也。不可止之。但令得依時不腰痛為善。宜當歸散。女以血為主。七七則卦數已終。終則經水絕。衝任脉虛衰。天癸

絕地道不通。若勞傷過度。喜怒不時。經脈衰微之際。又為邪氣攻衝。所以當止不止。而崩下也。婦人有年五十外。或六七十歲。忽然行經。或下紫血塊。或如紅血淋。人或謂老婦行經。是還少之象。而不知實為血崩之漸。夫婦人至七七以外。天癸已竭。又不服濟陰補陽之藥。何以能精滿化經。一如少婦然。經不宜行而行者。乃肝不藏。脾不統之故也。非大補肝脾之氣與血。豈能驟止。方用安老湯。

中國醫方 黃連解毒湯 治經血暴下

黃連

黃藥

黃芩

大梔子

分等

右劑如

麻豆大

每服五錢

水二盞

煎至八分

去滓溫服

牡蠣丸

治血虛海虛損月水不斷

牡蠣粉

赤石脂

代赭石

各一兩

阿膠

川芎

當歸

鹿茸

續斷

乾薑

各三兩

甘草

二錢

右為末。煉蜜丸梧子大。每服三十丸。空心溫酒下。

安老湯 治年老經水復行

人參

蒸一錢

黃芪

生用一兩

大熟地

九蒸一兩

白朮

土炒五錢

當歸

酒洗五錢

山萸

五錢

阿膠

一錢蛤粉炒

黑芥穗

一錢

甘草

各一兩

香附

五分

木耳炭

一錢

右水煎

服一劑減二劑

尤減四劑全減

十劑愈

附婦女經中攝生法

月經為婦女之常事。本無所用其珍衛。但當其時。子宮一部起暫時之變化。而身體各部之作。多往往從而略減。曾有人於經前後及經中。實驗其體溫。脈搏。血壓。筋力。肺容量。及吸氣呼氣之力。靡不稍稍減退。苟不注意。攝生百病俱易侵襲。而為終身衰弱之原。攝生之法有五一。須清潔。世人於經行期中。無論若何垢穢。例忌洗滌。必俟經期已過。方可見水。實大謬也。經中雖不能如常日之無忘。然以微溫水淨拭外部。固無不可。且每日不妨五六次。若以世俗拘忌。無怪外陰部易發炎症也。二須安靜。一切荷重疾走。升降等勞動。以及競爭體操諸運動。在所必禁。祇可隨意散步。以不覺疲勞為度。三須愉快。最忌七情感動。致影響及於月事。四須選食淡泊之滋養品。最忌油膩燙炙。五須慎避感冒。經中感冒。最易患種種之子宮病。不可不戒。

血崩

中醫學說 漏下曰。革婦人則半產漏下。旋覆花湯主之。婦人有漏下者。有中生後因續下血。都不絕者。有妊娠下血者。假令妊娠腹中痛為胞漏。膠艾湯

主之。診婦人漏血。下赤白。日下血數升。脉急疾者。死遲者。生婦人帶下脉浮。惡寒漏下者。不治。婦人衝任二脉為經脉之海。外循經絡。內榮臟腑。若陰陽和平。經下依時。若勞傷不能約制。則忽然暴不甚。則昏悶。若寸脉微遲。為寒在上焦。則吐血。血。尺脉微遲。為寒在下焦。則崩血便血。大抵數小為順。洪大為逆。大法當調補脾胃為主。婦人崩中漏下之證。按其寸口。脉弦而大。弦則為緊。大則為芤。緊則為寒。芤則為虛。虛寒相搏。其名為革。婦人半產漏下。亦自不止。脉小虛滑者。生脉大緊實數者。死又脉急疾者。死遲者。生。又云。尺寸脉虛者。漏血。脉浮者。俱不治。婦人血崩而心痛甚。名曰殺血。心痛由心脾血虛也。若小產去血過多。而心痛甚者。亦然。用鷄飼魚骨炒為末。酢湯調下。失笑散亦效。崩漏之疾。本乎一證。輕者謂之漏下。甚者謂之崩中。且平居婦人。經脈調適。衝任二脉互相滋養。陰陽二氣不相偏勝。則月事不斷是也。崩中者。忽然暴下。乃漏證之甚者也。其狀

或如猪肝。或如泔如涕如爛瓜汁。又或如豆羹汁。如藍靛色。至有黑如乾血相雜。亦有純下瘀血者。此皆衝任虛損。喜怒勞役之過。致傷於肝而然也。又久不止。面黃肌瘦。虛煩口乾。脣腹冷痛。吐逆不食。四肢虛困。甚則為脹為腫。治之之法。調養衝任。鎮注血海。血海溫和。歸於有用。內養百脉。外為月事。自無崩漏。下之患矣。婦人年及四十以上。或悲哀太甚。內經不順。則心系急。心系急則肺布葉舉。而上焦不通。熱氣在中。故經血崩漏。心系者。血山也。如久不愈。則面黃肌瘦。慎不可與燥熱之藥治之。致血得熱而流散也。當先以黃連解毒湯。次以涼膈散。四物湯等藥治之而愈。四物湯涼血。乃婦人之仙藥。宜量虛實加減。以意消息用之。陰陽別論云。陰虛陽搏。謂之崩。婦人脾胃虛損。致命門脉沈細而數疾。或沈弦而洪大。有九寸關脉亦然。皆由脾胃有虧。下陷於腎。與相火相合。濕熱下迫。經漏不止。其色紫黑。如夏月腐肉之臭。中有白帶者。脉必弦細。寒作於中。中有赤帶者。其脉洪數疾。其熱明矣。必腰痛。或臍下痛。臨經欲行。先見寒熱往來。兩脅急縮。兼脾胃證出見。或四肢困熱。心煩不得眠卧。心下急。宜大補脾胃而升舉血海溫和。歸於有用。內養百脉。外為月事。自無崩漏。下之患矣。

氣可一服而愈。或人故貴脫勢。人事疎少。或先富後貧。心氣不足。其火大熾。旺於血脉之中。又致脾胃飲食失節。火乘其中。形質肌肉容顏似不病者。此心病者。不形於診。故脾胃飲食不調。其證顯矣。而經水不時而下。或適來適斷。暴下不止。治當先勸諭令心不動。而以大補氣血之藥。舉養脾胃。微加鎮降心火之藥。治其心。補陰瀉陽。經自止矣。痿論云。悲哀太甚。則胞絡絕。陽氣內動。發則肌痺。傳為脈痺。此之謂也。女子漏下惡血。月事不調。或暴崩不止。多下水漿之物。皆曰大經空虛。發則肌痺。傳為脈痺。此之謂也。女子漏下惡血。月事不調。或暴崩不止。多下水漿之物。皆由飲食不節。或勞傷形體。或素有心氣不足。因飲食勞倦。致令心火乘脾。其人必怠惰嗜卧。四肢不收。因倦乏力。無氣以動。氣短上逆。氣急上衝。其脉緩而弦急。按之洪大。皆中之下。得之脾土受邪也。脾主滋榮周身者也。心主血。血主脉。二者受邪。病皆在脉。脉者。主屬心系。心系者。包絡命門之脉也。主月事。因脾胃虛而心包乘之。故漏下。月事不調。況脾胃為血氣陰陽之根蒂。當除濕去熱。益風氣。上伸以勝其濕。用升陽除濕湯。即內經火鬱則發之之義也。然此藥乃從

權之法。用風勝濕為胃下陷而氣迫於下。以救其血之暴崩也。若血惡住後。必須黃芩人參炙甘草當歸之類。數服以補之。於補氣升陽湯中加以和血便是。若經血惡物。下之不絕。尤宜究其根源。治其本經。只益脾胃。退心火之亢。乃治其根蒂。若遇夏月白帶下。脫漏不止。宜用此湯。一服立止。
婦人血崩。是腎水陰虛。不能鎮守胞絡相火。故血走而崩也。涼血地黃湯主之。崩漏太多。昏冒不省人事。瞑目無所知覺。蓋因血暴亡也。血去則精神無所養。暴損氣血。豈能久活。今當補而升舉之。以助其陽。則目張而神不昏迷矣。今立一方。補血養血生血益陽。以補手足厥陰之不足。曰全生補血湯。
血崩東垣有治法。但不言熟。其主在寒。學者宜尋思之。急則治其標。用白芷湯調百草霜末。甚者用棲櫚灰。後用四物湯加炒乾薑。調理困勞者。用參芪帶升補藥。因寒者。用乾薑。因熱者。用黃芩。崩過多者。先用五靈脂末一服。當分寒熱。蓋五靈脂能行能止。紫色成塊者。熱也。以四物湯加黃連之類。
婦人血崩。用香附白芷丸。服氣虛血虛者。皆以四物湯加參芪。若漏下。乃熱而虛。四物加黃。

中或清或濁或純下瘀血或腐勢不可止證狀非一
所感亦異其則頭目昏運四肢厥冷並宜艾膠湯
靈丹佐以三灰散或以童子小便煎理中湯或以
沈香降氣湯加入百草霜米飲調下血崩甚而腹痛
人多疑惡血未盡又見血色瘀黑愈信惡血之說不
敢止截大凡血之為患欲出未出之際停在腹內即
成瘀色難盡以瘀為惡又焉知瘀之不為虛冷乎若
必待見瘀血為虛冷而後截之恐併與人無之矣此
腹痛更有說血積而腹痛血通而痛止崩而腹痛血
住則止止宜芍歸湯加乾薑熟附一錢止其血而痛
自定仍以毛蟹殼燒存性米飲下亦有以早黃麻根
燒灰為末米飲下凡非時血行淋瀝不已謂之漏
下忽然暴下若山崩然謂之崩中二者之由虛與熱
而已蓋血虛則滯血熱則流故也治法多端隨證制
宜詳列於下經行犯房勞役過度損傷衝任氣血俱
虛不能制約經血忽然暴下者宜大補氣血大溫經
湯氣虛者四物湯加參芪血虛者四物湯加膠艾炒
乾薑久不止者百子附歸丸墨附丸虛寒脾腹冷痛
者伏龍肝散一切虛證內灸散虛火涼血地黃湯生
地芩連湯補陰丸久者當歸龍骨丸大小烏雞丸

崩之為患。或因脾胃虛損。不能攝血歸源。或因肝經有火。血得熱而下行。或因肝經有風。血得風而妄行。或因怒動肝火。血熱而沸騰。或因脾經鬱結。血傷而不歸經。或因悲哀太過。胞絡傷而下崩。治療之法。脾胃虛陷者。補中益氣湯。婦人崩漏。最為大病。年少之人。火熾血熱。房事過多。經行時而有交感。俱致斯疾。太都涼血固澀升氣益榮。自可愈也。中年已上。人及高年嫠婦。多是憂慮過度。氣血俱虛。此為難治。必須大補氣血。養脾升胃固血。庶保十之二三。斯疾若不早治。則如頽圮之廈。斜倒傾欹。勢難支撐而使之正。又如苗槁而後灌漑。何可使之秀耶。凡血崩證。有因虛。有因熱。虛則下陷。熱則流通。視其緩急。分標本而治之。緩用四物湯加條芩附子。急以立效散神效丸之屬。若血臟虛冷。崩中下血。宜四物湯加阿膠。黃芩。參芪。東垣謂崩帶下久。有屬於寒。不可一逌而論。冷者。脉緊細。手足寒紅而淡黑。當歸建中加白龍骨。煩渴附子。下紫石英丸。震靈丹。熱者。脉洪四肢溫。心煩口苦燥。血沸而成。用黃芩湯。荆芥散。或清心蓮子飲。加竹瀝生地黃汁。甚者生地黃汁磨京墨。百草霜。冷服。虛者。膠艾湯加麥門冬。鹿茸龍骨酸棗仁。或養

榮湯加龍骨血竭。送震靈丹。實者。腹中痛。煮附丸。四物湯加香附子。心虛者。恍惚多夢。健忘舌強。小便多。面紅盜汗。柏子仁湯。酸棗仁湯加龍骨。京墨。百草霜。吞靈砂丹。又靈砂當歸蓮肉龍骨棗肉丸。參湯。送下。崩中作麝香當歸香者。心氣已散。急服靈砂龍骨等。婦人崩中之病。皆因中氣虛。不能收斂其血。加以積熱在裏。迫血妄行。故令經血暴下而成崩。崩久不止。遂成下漏。初止血。次清熱。後補其虛。未有不愈者也。凡婦人女子。初得崩中暴下之病者。宜用止血之劑。乃急則治其標也。四物湯調十灰散治之。以血止為度。血止即服清熱之劑。用涼血地黃湯主之。如血未盡。再吞灰十丸。血已盡。止裏熱已除。宜用補中之劑。加味補中益氣湯主之。更宜早服地黃丸。夕服參术大補丸。以平為期。崩漏不止。經亂之甚者。也益亂。則或前或後漏。則不時妄行。由漏而淋。由淋而崩。總因血病。而但以其微甚耳。百病始生篇曰。陽絡傷。則血外溢。陰絡傷。則血內溢。故凡陽搏。必屬陰虛。思過半矣。惟是陰虛之說。則但傷營氣。無非陰虛而五臟之陰。皆能受病。故神傷。則血無所主。病在心也。

氣傷則血無所從。病在肺也。意傷則不能統血攝血。病在脾也。魄傷則不能蓄血藏血。病在肝也。志傷則不能固閉真陰。病在腎也。所以五臟皆有陰虛。五臟皆有陽搏。故病陰虛者。單以臟氣受傷。血因之而失守也。病陽搏者。兼以火居陰分。血得熱而妄行也。治此之法。宜審臟氣。宜察陰陽。無火者。求其臟而培之。補之。有火者。察其經而清之養之。此不易之良法也。然有火者不得不清。但元清既虛。極多假熱。設或不明真假。而誤用寒涼。必復傷脾胃。生氣日見殆矣。先賢有云。凡下血證。須用四君子輩以收功。又云。若大吐血後。毋以脉診。當急用獨參湯救之。厥旨深矣。故凡見血脫等證。必當用甘藥。先補脾胃。以益發生之氣。蓋甘能生血。甘能營養。但使脾胃氣強。則陽生陰長。而血自歸經矣。故曰脾統血。治崩淋經漏之法。若陰虛血熱妄行者。宜保陰煎加減一陰煎。若火盛妄行者。四物湯丹參散。若營氣不足。血不能調而妄

妄行。五福飲。四物湯。四君子湯。八珍湯。擇宜用之。若脾氣虛陷。不能收攝而脫血者。壽脾煎歸脾湯。四君子加芎歸。再甚者。舉元煎。若脾胃虛寒。兼嘔兼瀉。而畏寒者。理陰煎。五君子煎。理中湯。若陽氣大虛。脫陷者。四維湯。若脾胃陰氣不固者。固陰煎。五陰煎。秘元煎。若肝膽氣虛。不能藏血者。必多驚恐畏怯。宜五福飲。七福飲。八珍湯。兼陽虛者。仍加薑桂。若去血過多。血脫氣竭者。當速用獨參湯。提握其氣以防脫絕。或用當歸補血湯。若崩淋既久。血滑不禁。宜澀宜固者。龍骨散如聖散。七灰散之類。同人參兼用之。凡血淋治法。大約如前。但其穢臭脉滑者。多火。宜從清涼。若腥臭清寒脉細者。多寒。必須溫補。其或久病。則精去骨散如聖散。七灰散之類。同人參兼用之。凡血淋治法。大約如前。但其穢臭脉滑者。多火。宜從清涼。若腥臭清寒脉細者。多寒。必須溫補。其或久病。則精去無窮。尾閭易竭。非大加培補不可。惟固陰煎及十全大補湯之類為宜。崩淋之病。有暴崩者。有久崩者。且血因崩去。勢必漸少而不止。病則為淋。此等證候。未有不由憂思鬱怒。先損脾胃。次及衝任。而然者。暴崩者。其來驟。其治亦易。久崩者。其患深。其治亦難。崩淋既久。真陰日虧。多致寒熱。芤脉見弦數或豁大等證。此乃元氣虧損。陰虛假熱之脉。尤當用參地歸木甘溫之屬。以峻培本源。庶可望生。但得胃氣未

敗受補可救。若不能受補而日事清涼以苟延目前。則終非吉兆也。婦人於四旬外經期先斷之年。多有漸見阻隔。經期不至者。當此之際。最宜防察。如果氣血和平。素無他疾。此固漸止而然。無足慮也。若素多憂鬱。不調之患。而見此過期阻隔。便有崩決之兆。若隔之淺者。其崩尚輕。隔之久者。其崩必甚。此因隔而崩者也。當預服四物八珍之類。以調之。否則恐其鬱久而決。則為患滋大也。若其既崩之後。則當辨其有火無火。有火者。因火逼血。宜保陰煎主之。無火者。因隔而決。或其有滯。當去其故。而養其新。宜調經飲以理之。然後各因其宜。可養則養。用小營煎。可固則固。用固陰煎之類主之。血崩之後。口舌燥裂。不能飲食者。死。蓋亡血自然無血。而津亦涸。此必然之勢也。欲使口舌之乾者重潤。必須使血之竭者重生。補血之方。六味丸最妙。然而六味丸單補腎中之血。不能上補口舌之津也。雖補腎於下。亦能通津於上。然終覺緩不濟急。今定一方。上下兼補。名上下相資湯。此方補腎為君。而兼用補肺之藥。子母相資。上下兼潤。血生而津亦生矣。安在垂死之證。不可慶再生耶。血崩不止。一時昏迷。或有不知人而死者。此病多起

於貪慾。若治不得法。日用止瀝之藥。未有不輕變重。而重變死者。方用安崩湯治之一劑。便止崩。可為安也。蓋崩血之後。惟氣獨存。不補氣而單補血。緩不濟事。今亟因其欲絕之氣。佐之三七。以瀝其氣。固而血自不脫也。紫色成塊者。血熱。四物加黃連。柴胡之類。氣虛血虛者。皆於四物內加參芪。急則治其標。白芷湯調百草霜。甚者棕櫚灰。後用四物加炒乾薑。調理因勞者。用人參帶升補藥。因熱者。用黃芩。因寒者。用炒乾薑。經云。陰虛陽搏。謂之崩。此言熱迫血而妄行也。又曰。陽絡傷則血外溢。陰絡傷則血內溢。外溢者。從上出。內溢者。從下流也。病人過於作勞。喜怒不時。則絡脈傷損。而血妄行矣。前證若因熱迫血而妄行者。用加味四物湯。若因絡脈傷損者。用八珍湯。若瘀血凝積。佐以獨聖丸。若因肝經火旺。不能藏血者。加味道遙散。若因脾氣虛不能統血者。四君子湯加歸芍主之。若因思慮傷脾。不能攝血歸經者。歸脾湯。若氣血兩虧。血崩不止。更用十全大補湯。丹溪云。凡血證須用四君子之類。以收功。若大吐大下。元氣虛弱。假熱之象。尤當用參术調補脾。右服參母。以脉論。當急用獨參湯救之。若潮熱。微數脉。乃

术不相安者。即專以和平飲食調理之。此等證候。無不由脾氣先損。故脈息虛浮而大。須令脾胃健旺。後天根本堅固。乃為可治。設或遇用寒涼。復傷胃氣。反不能攝血歸經。是速其危也。婦人有一時血崩。兩目黑暗。昏暈在地。不省人事者。人皆以為火盛動血。不知此火非實火。乃虛火也。世人一見血崩。往往用止火易於沖擊。恐隨止隨發。以致經年累月。不能全愈者有之。是止崩之藥不可獨用。必須於補陰之中。行止崩之法。方用固本止崩湯。年老血崩。其證亦與前血崩昏暗者同。人皆以為老婦之虛。而不知實由於房帷之不慎。故婦人至五十歲外。天癸斷絕。即宜閉閑守寨。苟或適興。亦祇可草草了事。尚不至腎火大動。倘亦如少婦之少合。鮮不血室大開。崩決而潰矣。方用加減當歸補血湯。少婦甫娠三月。血崩而胎亦隨墮。人皆以為挫閃受傷所致。而不知為行房之不慎。少婦行房。雖亦常事。然元氣衰弱。勢難兩顧。一經行房。洩精則妊娠無所依養。遂致崩而且墮。治法自當以補氣為主。而少佐以補血之品。斯為得之。方用固氣湯。其因懷抱甚鬱。口乾舌渴。嘔吐吞酸。而血

下崩者。人皆以火治之。而或效或不效。是不知為肝氣之鬱結也。肝之性最急。氣結則其急更甚。更急則鬱而不知平。肝崩亦仍不能止。方用平肝開鬱止血湯。其因升高墜落。或閃挫受傷。以致惡血下流。有如血崩之狀者。若以崩治。非徒無益。而又害之也。蓋此證之狀。必手按之而疼痛。久之則面色痿黃。形容枯槁。此係瘀血為害。非血崩可比。倘不知解瘀而但補血。則瘀血內攻。疼無止時。反致新血不得生。舊血無由化。至死不悟。豈不可歟。治須行血以去瘀。活血以止疼。則血自止而愈矣。方用逐瘀止血湯。其因血海太熱而致血崩者。人皆以為胞胎有傷。觸之以動其血。而不知其為貪慾之故。蓋子宮即在胞胎之下。而血海又在胞胎之上。血海者。衝脉也。衝脉太寒。血即海泛濫。有不能止遏之勢。肝欲藏之而不能。脾欲攝之而不得。故精水隨交感而至。若有聲應之捷。是惟

火之為病也。治須滋陰降火。以清血海而和子宮。則終身之病半載可除矣。然必絕慾三月而後可方用。

清潤丸

西醫學說續續不下。久而不止。中醫謂之崩漏。西醫名曰子宮出血。其原因甚多。在產婦則多因胞衣不下。或子宮收縮不全。在尋常之婦人。則由子宮發生病。筋腫息肉。纖維瘤。癌腫。腺腫等腫瘤。或子宮之實質內膜等發炎。皆足以誘發此病。其證候隨各種病原而不同。故殊無一定。經過豫後亦並如之。豫防之法。當月經來時。務須靜養安適。嚴避種種有害之事。毋受煩熱。毋患感冒。平時毋房事過度。已患此者。則詳求原病之所在。而醫治之。又須靜養身體。慎選食物。一切飲料宜冷宜熱。下腹宜施冷罨法。陰內則注射白礬水。內服麥角等止血藥。

射白藜水內服麥角等止血藥
中國醫方 小牛角鰓散 治帶下五崩一曰熱病
下血二曰寒熱下血三曰經來未斷為房事則血漏
四曰經來舉重傷任脉下血五曰產後臟開經利五
貫之病外實內虛

鰣骨 龍骨 各一
右十味治下篩空腹以酒服
方才寸匕日三一方無鹿茸鰣骨。
兩
雲母芎芻散 治五崩身瘦欬逆煩滿少氣心下痛
面生瘡腰痛不可俛仰陰中腫如有瘡狀毛中瘡
時痛與子臟相通小便不利常拘急頭眩頸項急
痛手足熱氣逆衝急心煩不得卧腹中急痛食不
下吞酸噫苦上下腸鳴漏下赤白青黃黑汁大臭
如膠汚衣狀皆是內傷所致中寒即下白中熱即
下亦多飲即下黑多食即下黃多藥即下青或喜
或怒心中常恐或憂勞便發動大惡風寒
雲母 芎芻 代赭 東門邊木燒各一
兩 白僵 蟲皮各六 鹿茸
鱉 魚骨 白堊 蜂蜜八錢 桂心
伏龍肝 生鯉魚頭各一 右十二味治下篩
酒服方才寸匕日三夜一一方有龍骨乾薑一方有
龜甲無龍甲
禹餘糧圓 治崩中赤白不絕因篩
禹餘糧 五兩 白馬蹄 十兩 龍骨 三兩 鹿茸
二兩 魚骨 一兩 右五味為末蜜丸梧子
大以酒服二十九日再以知為度
慎火草散 治崩中漏下赤白青黑腐臭不可近令

雲母	芎菊	代赭	東門邊木燒 雨	白僵
蠶	鷦鷯骨	白堊		
伏龍肝	生鯉魚頭 <small>各六錢</small>	蝦皮 <small>各六錢</small>	蠶甲	桂心
酒服方寸匕	右十二味治下篩。			
日三夜一。一方有龍骨乾薑。一方有 龜甲無蠶甲。				

禹餘糧 圖治崩中赤白不絕因篤
禹餘糧 五兩 白馬蹄 十兩 龍骨 三兩 鹿茸
二兩
鯉魚骨 一兩 右五味為末蜜丸梧子
大以酒服二十九日再以知為度
慎火草散 治崩中漏下赤白青黑腐臭不可近令

人面黑無顏色皮骨相連月經失度往來無常小腹弦急或苦絞痛上至心兩脅腫脹食不生肌膚

令人偏枯氣息乏少腰脊痛連骨不能久立每嗜

卧困懶

慎火草 白石脂 禹餘糧 龜甲 乾薑 細

辛 當歸 川芎 窖 金釵石斛 白芍藥 牡

蠣殼 各二 熟艾 桂心 各一

熟地 各四

寸匕日三稍加至二七。若寒多加附子一枚

熱多加知母黃芩各一兩白多加乾薑白石脂各

二兩亦多加桂心代赭各二兩

增損禹餘糧圓 治女人勞損因成崩中狀如月經

來去多不可禁止積日不斷五臟空虛失色黃瘦

崩竭暫止少日復發不耐動搖小勞輒劇治法且

若是疾久可以常與此圓

禹餘糧 龍骨 人參 桂心 柴石英 烏頭

桑寄生 杜仲 五味子 遠志 各二

當歸 石斛 茶荳 乾薑 各三

蜀椒 各一 右為末蜜丸梧子大空心酒

甘草

下十九漸加至二十九日三服
又方 治女人白崩及痔漏

槐耳 白芨 艾葉 蒲黃 白芷 各二

人參 繢斷 當歸 禹餘糧 乾地黃

皮 茶荳 蒲皮 各三

蹄筋 各二十 白馬蹄 四兩酒浸

丸每日空心酒下二十丸日二加之

又方 治女人忽暴崩中去血不斷或如鵝鴨肝

小薊根 六兩 當歸 阿膠 繢斷 青竹茹

芳窮 各三 地榆 各四 生地黃 八兩 金月下土絹囊裹

和馬通汁煮取三升分三服不止頻服三四劑未

全止續服後丸赤帶用赤馬通白帶用白馬通

丸方 服前藥未全止即服此丸

乾地黃 一兩 繢斷 甘草 地榆 鹿茸 小

薊根 丹參 各三

赤石脂 各一 柏子仁 一兩 芳窮 阿膠炒珠 當歸

各三兩剉 热令黑丸再服稍加至三十丸

丸日再服稍加至三十丸

又方 治女人崩中去赤白

白馬蹄五兩

蒲黃

鹿茸

禹餘糧

小薊根

分三服

日三一方。無伏龍肝。

伏龍肝散

治崩中去赤白或如豆汁

伏龍肝

單子如

生薑五兩

生地四升

甘草

甘草

蜜丸如梧子大。空心飲服二十丸。日再加至四十丸。

當歸湯

治崩中去血虛羸

當歸

芍藥 黃芩 芍藥

甘草各二
雨 生竹

始二升

右咬咀以水一斗煮竹茹取六升去滓。

內諸藥煎取三升半分三服。忌勞動嗔怒禁百日

房事。

又方 治崩中下血極多或月經來過多及過期不

來

吳茱萸

當歸各三

芍藥 人參 芍藥 牡丹桂心 阿膠 生薑 甘草各一
雨 半夏雨

麥門冬一升 右咬咀以水一斗煮取三升分

為三服。

又方 治女人白崩

芍藥

桂心

阿膠

赤石脂

小薊根各二
雨

乾地黃四兩 伏龍肝如雞子大七枚 右咬咀

大牛角中仁散 治積冷崩中去血不止腰背痛四肢沈重虛極

牛角仁

燒枝

續斷

乾地黃

桑耳

白朮

赤石脂

砦石

乾薑

附子炮去皮臍

龍骨

當歸各三
雨

蒲黃

防風

禹餘糧各二

人參一

右十味

治下篩以溫酒未食服方寸匕日三

不知稍加。

又方 治崩中去血積時不止大有起死之力

肥羊肉二斤

乾薑

當歸各三
雨

生地二升

右咬咀以水二斗煮羊肉取一斗三升下地黃汁

及諸藥煮取三升分四服即斷尤宜羸瘦人服之

生地黃湯 治崩中漏下日去數升

生地黃一斤

細辛三兩

右二味咬咀以水一

斗。取煮六升。服七合。久服佳。

又方 治崩中下血羸瘦少氣調中補虛止血

澤蘭 蜀椒各二兩

厚朴各八錢 紫菀十八錢

代赭桂心 防風 細辛 乾薑各一兩半

當歸 茯苓各一兩 右十七味治下篩空心

溫酒服方寸匕日三。一方加白芷龍骨各十八錢

人參一兩十八錢為二十味。

丹參酒 治崩中去血及產餘疾

丹參 艾葉 地黃 忍冬 地榆各五斤 右

剉熟春以水漬三宿出滓煮取汁以黍米一斛炊

飲釀酒酒熟榨之初服四合後稍稍添之。

牡丹皮湯 治崩中血盛

牡丹皮 乾地黃 解脉各三兩 禹餘糧 艾葉

柏葉 龍骨 厚朴 白芷 伏龍肝 青竹

如意 茯苓 地榆各二兩 阿膠一兩 茯藥四兩

右㕮咀以水一斗五升煮取五升分五服相去如

人行十里更再服。

白堊圓 治女人三十六疾胞中病漏下不絕

邯鄲白堊 禹餘糧 白芷 白石脂 乾薑

龍骨 桂心 瞞麥 大黃 石葦 白薇 細辛 茵藥 甘草 黃連 附子 當歸 菝葜

鍾乳 蜀椒 黃芩各半兩 牡蠣 鷄鰓骨

右為末蜜丸梧子大空心酒服五丸日再服

不知加至十九

又方 治女人漏下或癥或劇常漏不止身體瘦弱

食減少或赤或白或黃使人無子

牡蠣 伏龍肝 赤石脂 白龍骨 桂心 鷄

鰓骨 禹餘糧各等分 右治下篩空心酒服方寸

匕日二服一方無白龍骨以粥飲服白多加牡蠣

龍骨鷄鰓骨赤多加赤石脂禹餘糧黃多加伏龍

肝桂心

又方 治婦人漏下不止

鹿茸 阿膠各三兩 鷄鰓骨 當歸各二兩

右治下篩空心酒服方寸匕日三夜再

芎藭湯 治帶下漏血不止

川芎 乾地黃 黃芪炙 白芍藥 吳茱萸

甘草各二兩 當歸 乾薑各三兩 右㕮咀以水一

斗煮取三升分三服若月經後因有赤白不止者除地黃吳茱萸加杜仲人參各二兩

又方 治漏下去黑

乾漆 麻黃 細辛 桂心

各一兩

甘草

半兩

右治下篩。以指撮著米飲中服之。

又方 治漏下去黃

黃連

大黃 桂心

各半兩

黃芩 乾地黃 廉

蟲各六銖

右治下篩空心酒服方寸匕日三

又方 治漏下去赤

白术

二兩 半兩

白薇

各半兩

黃藥

二兩 半兩

白馬蹄 禹餘糧

各四兩

龍骨

三兩 鮑鯷骨

右治下篩

空心酒服方寸匕日三

又方 治漏下去青

大黃 黃芩 白薇

各半兩

桂心 牡蠣

各六銖

黃藥

二兩 半兩

白馬蹄 禹餘糧

各四兩

龍骨

三兩 鮑鯷骨

右治下篩

慎火草散 治女人漏下

慎火草

十兩 蒼黃

當歸 鹿茸

各四兩 阿膠

龍骨

右治下篩

蒲黃散 治漏下不止

蒲黃

半升

鹿茸

當歸各二兩

龍骨

右治下篩

防風去蘆

右為末每服二錢空心食前酒煮白

麪清飲調下更以麪作糊酒投之極驗

行十里久

馬通湯 治漏下血積月不止

赤馬通汁一升取新馬屎絞取乾者水浸絞取

生父葉 阿膠各二兩 當歸 乾薑各二兩 好墨

半兩

右咬咀以水八升酒二升煮取三升去滓

內馬通汁及膠微火煎取二升分再服相去如人

獨聖散 治肝經有風血崩

五分匕日三不知稍加至方寸匕

右治下篩酒服

防風去蘆

右為末每服二錢空心食前酒煮白

內馬通汁及膠微火煎取二升分再服相去如人

四君子湯 氣血俱虛之證用此加減

人參 白朮 茶芩各二錢 甘草炙一分 右薑

棗水煎服。

六君子湯 治同上

人參 白朮 茶芩各二錢

半夏各一錢 右薑棗水煎服

八珍湯 治氣血俱虛

人參 白朮 茶芩各二錢

川芎一錢 當歸酒拌各一錢

熟地自製三錢

右水煎服

加味道遙散

治婦人肝脾虛血崩用此加減

甘草炙各一錢 當歸炒

柴胡 丹皮 山梔炒各五分

白朮土炒

煎服。

歸脾湯

治脾經失血少寐發熱盜汗或思慮傷脾不能攝血以致妄行或憂思傷脾血虛發熱或肢

體作痛大便不調或經候不准晡熱內熱

人參 白朮炒 黃芪炒 白茯苓 酸棗仁炒

龍眼肉 當歸身 遠志各一錢 甘草炙 木

香 分五右薑棗水煎服。

小柴胡湯 治肝膽經證寒熱往來潮熱晡熱身熱默不欲飲食或怒火口苦耳聾欬嗽發熱脅下

作痛甚者轉側不便兩脅痞悶或渴痢欬嗽或吐酸食苦水皆用此藥主之。

柴胡二錢 黃芩炒一錢 人參 半夏各三分

甘草炙五分 右薑水煎服。

附子理中湯

治陽氣太虛血崩諸證

人參 白朮土炒 乾薑炮

甘草炙各等分

子炮隨宜

右每服五七錢或一兩水煎服

補中益氣湯 治元氣虛損或因戰伐惡寒發熱倦怠少食或不能消散生肌或兼飲食勞倦煩熱作渴

黃芪炒 人參 白朮炒 炙草 當歸各一錢

陳皮五分

柴胡 升麻各三分

右薑棗水煎空

心午前服。

十全大補湯 治氣血大虛

人參 白朮 茶芩各二錢

川芎當歸各一錢

熟地三錢

黃芪炙 肉桂

各隨宜 右煎服。

八味丸 治命門火衰致成崩中

熟地黃自製八兩 山茱萸肉 山藥各四兩 茶芩

牡丹皮 澤瀉各三兩

大附子童便製 肉桂用

三分厚者。右為末蜜丸梧子大。每服七八十九。

滾湯下。

獨參湯 治元氣虛弱惡寒發熱等證

人參二兩或三四兩

炮薑五錢

右作一劑水煎徐徐

服人參性滯故薑佐之如不應急加炮附子。

黃芪當歸人參湯 治經水暴崩不止掌中寒脉沈

細而緩間而沈數九竅有不利四肢無力上喘氣短促口鼻氣皆不調皆由平日心氣不足飲食不節得之

黃連一分 生地黃三分 炒神鞠 橘皮 桂枝各五分 草豆蔻仁六分 麻黃去節 黃芪炒

人參各一錢

杏仁五個另研如泥

當歸身一錢

右

哎吐作二服水二大盞半煎麻黃令沸去沫煎至

二盞入諸藥同煎至一盞於巳午之間食消盡服之一服立止

龍腦雞蘇丸 治血帶五淋血崩等疾

薄荷一斤

麥門冬去心兩

甘草半兩

生乾地

黃六兩

黃芪 新蒲黃

阿膠炒 黃連 人

參木通各一兩

柴胡二兩 同木通沸湯浸一日

夜絞取汁 右為細末好蜜二斤先煉一二沸然

後下生地黃末不住手攪時加木通柴胡汁浸熬成膏勿令火繫焦然後將眾藥末和丸如豌豆大。每服二十九。白湯下一方以車前子湯下更好。

黃芪膏子煎丸 治同上

人參

白朮各半兩

柴胡

黃芩各一兩

白芷

知母

甘草炙各半兩

鼈甲一個半寸大者酥炙

右為細末用黃芪膏子丸桐子大每服三五十丸百沸湯下空心服

黃芪膏熬法

黃芪半斤

右為粗末水二斗熬一斗去滓再熬

令不住攪成膏至半斤入白蜜一兩。鴟一兩再熬

令蜜鴟熟得膏十兩放冷丸藥

芎歸湯 一名古芎歸湯治崩中去血

芎藶

當歸各等

右哎吐水煎熱服

若崩中漏下失血不止加附子炒每兩入甘草一錢沸湯點服若有白帶加芍藥半兩乾薑等分米飲調下。

涼膈散 治血熱暴崩

連翹四兩

大黃

甘草

黃芩

薄荷

朴硝

山梔各一兩

右粗末每服三五錢水一盞入蜜

竹葉煎三五沸去滓溫服無時。

中國醫學圖書館版權

黃連解毒湯 治同上

黃連 黃蘗 黃芩 大梔子各等 右剉為麻

豆大每服五錢水二盞煎至八分去滓溫服

酢附丸 治崩漏帶下積聚癥瘕腹疼痛

香附子不拘多少擦去毛用好酢煮出焙乾

酢煮糊為丸如桐子大每服三十丸米飲送下

芎歸膠艾湯 一方用香附子白芷為丸 一名膠

艾四物湯治婦人陷經漏下

川芎 阿膠 甘草各二 芎藥四兩 艾葉

當歸各三 熟地隨宜 右七味以水五升清酒

三升合煮取三升去滓內膠令消盡溫服一升日

三服不差更作一方加乾薑一兩

百子附歸丸 養血順氣調經安胎崩漏日久不止

胎前產後及月事參差有餘不足諸證悉治

四製香附丸 阿膠 艾葉 四物湯各二

右為末用石榴陳久者一枚連皮搗碎煎水打糊

丸梧子大每百丸空心淡酢湯下

四製香附丸 治悲哀成崩

香附一斤分四分用酒酢鹽水童便各浸七日焙乾右為末酢糊丸梧子大每七十丸空心溫酒

墨附丸 治血虛崩久不止

四製香附一斤 白茯苓

當歸 人參 川芎

熟地 微墨火煅紅酢淬各一

淨綿父四兩用酢一碗煮香附與艾二味至乾石

臼搗爛捏成餅子新瓦焙乾

右為末酢糊丸梧

子大每七八十九酒下

積塊硬刺痛等證

藿香葉 丁香皮 苗香 肉桂 熟地各半

甘草 當歸 白朮 山藥 白芷各八

陳皮 乾薑 川芎 黃芪 白芍 木

香各一 右為末溫酒調服三錢或薑艾煎服亦

可

補陰丸 治虛火血崩

熟地五兩 黃蘗 知母 龜板各三 琉陽

天門冬 枸杞子 白芍各二 五味子一兩

炒黑乾薑 五錢 寒月

右為末猪脊髓和蜜丸梧子大每七八十九空心鹽湯下寒月溫酒下一方

以肉桂易黑薑引諸藥入腎為從治法也

大烏雞丸 治血崩久虛不能成胎

四製香附

一兩

熟地

四兩

生地

四兩

當歸

白

芍

人參

兩

川芎

各三

龍甲

兩半

白术

黃

芪

牛膝

柴胡

牡丹皮

知母

貝母

兩

秦艽

半兩

川黃連

地骨皮

茯苓

半兩

延胡索

各一

白毛烏骨雄雞

一隻

死

去毛腸淨用艾葉青蒿各四兩裝一半在雞腹內

將雞并餘艾蒿同入罐內以童便和水浸過雞二

寸許煮爛取出去骨焙乾

右為末和勻雞汁打

糊

丸梧子大每五六十丸

溫酒或米飲下

忌煎炒

菟

梔

如有筋骨疼痛去肉用骨如月水先期加黃

芩黃連地骨皮月水後期加參木黃芪白帶加二

術香附升麻白芷柴胡其雞如得白絲毛烏骨崇

冠者尤妙須另於一處以黃芪炒末為丸喂之不

可近雌雞

小烏雞丸 治同上

吳萸 良薑 白薑 當歸 芍藥 延胡索
破故紙 川椒 陳皮 青皮 劉寄奴 生地
莪朶 川芎各一 荷葉灰四兩 北艾三兩
烏雞肉 右為末用烏雞肉煮爛為丸梧子大

豆淋酒調絲灰下五十丸如腹痛血黑色者加
炒黃連有痰濕加南星蒼朮香附赤帶茶清下腸
風陳米飲調百草霜下心痛菖蒲酒下漏胎下血
烏梅酒下耳聾臘茶清下腰腳痛當歸酒下頭風
薄荷煎湯下血風眼黑甘草煎湯下生瘡生地黃
煎湯下身體疼痛黃芪末調酒下氣塊血塊作痛
與葱白湯間服胎前產後白痢乾薑煎湯下赤痢
甘草煎湯下一切百病酢湯下
下漏紫黑腐臭

芩心丸

治脾濕

下流於腎與相火合為濕熱迫經

芩心丸

治脾濕

三錢 香附二錢

右為末酒糊丸梧子大每五

十九酒下。

升陽調經湯 治飲食勞倦暴崩不止或下水漿急

情嗜卧四肢 倦及夏月帶下脫漏等證

獨活五分

蔓荆子七分

當歸 防風

升麻

藁本各一錢

柴胡 羌活

蒼朮 黃

升陽舉經湯

治同上

升陽舉經湯

治同上

肉桂

白芍 紅花各五分

細辛六分

人參

乾熟地黃

川芎各一錢

獨活 黑附子

甘草

羌活

藁本各一錢

防風各二錢

白术

當歸

空心水煎服

夏月不用肉桂

桃仁十枚

右分作四帖

五積散

風冷血崩加減用之

白芷

川芎 芍藥 甘草

茯苓 當歸 肉

桂分三

陳皮 麻黃各六分

厚朴 乾薑各四分

桔梗半分 枳殼炒五分

桔梗半分

枳殼炒五分

半夏三分

蒼朮

右煎服

不換金正氣散

治風冷血崩

半分

右煎服

厚朴

陳皮

藿香 半夏

蒼朮各一錢

甘草

升陽除濕湯 治濕盛血崩

蒼朮一分 升麻 柴胡 防風

神鞠

澤瀉

猪苓各五分 陳皮 甘草 麥芽各三分

右薑

橘歸丸 治血崩不止

橘皮四兩 當歸三兩 桃仁分等

右為末蜜丸梧子大每

十九溫酒下

黑神散 治婦人崩漏

百草霜 白芷各等分

右為末蜜丸梧子大每

十九溫酒下

便米酢少許調服

女金丹 治崩中淋滌及赤白帶下

白芍 當歸 川芎 人參

白术 茯苓 藁本

牡丹皮

赤石脂各一俱用酒浸三日夜曬乾

沒藥 甘草各五錢

右為末蜜丸梧子大每五

十九溫酒下

二宜丸 血崩後調養用此加減

當歸 生地黃各等用酒蒸七次

右和煉蜜

梧子大每七十丸空心酒下

所有



北京中医药大学图书馆版

服一丸。東湯下。

二聖湯 治血崩如神

何首烏切五錢

甘草三錢

右用黃酒一樽煎

至八分取出入刺刺芽汁一盞同服立效

斷源散 治血崩如泉流不止

棉花子銅器炒盡研右為末每服二錢空心黃

酒調下。

荆芥四物湯 治崩漏初起不問虛實服之立止

荆芥一條芩當歸川芎白芍生地香附

右卦水煎溫服如不止加防風升麻蒲黃炒白术一方加地榆良驗一方加艾葉炒阿膠炒去

香附荆芥

子芩丸 治婦人四十九歲已後天癸當住每月却

行或多不止漸成崩漏

條芩四兩酢浸紙裹煨七次當歸二兩酒洗

右為末酢糊為丸如梧桐子大每服五七十丸酒

下日進三服一方加香附酢製二兩尤妙

當歸龍骨丸 治月事失常經水過多不止及帶下

淋漓無期新久赤白諸證并產後惡物不止

龍骨 黃藥各一當歸白芍白茯苓槐

子 艾葉炒黃連錢五木香半右為末水丸梧子大每七八十九米湯送下一方加黃芩

白朮各五錢累效

獨行散 一名五靈脂散一名抽刀散治腹痛經漏

不止

五靈脂半生半炒右為末童便下二錢

白朮丸 治久崩不止用此濕之

白朮黃狗頭骨燒灰各四兩香附三兩

為末粥丸梧子大每服三十九空心白湯下

又方 治暴崩下血

蠶沙炒阿膠各一伏龍肝半兩

酒調下空心二三錢以止為度

震靈丹 一名紫金丹治婦人氣血不足崩漏虛損

帶下虛冷胎臟無子

硃砂飛一兩滴乳香另研五靈脂去砂石

沒藥石沙各二兩紫石英禹餘糧火煅醋淬

手撫得度代赭石炮製同上赤石脂以上四味

各四兩並作小塊小鍋內鹽泥固濟候乾用炭十斤煅通紅火盡為度入地埋出火毒二宿右共

為細末以糯米粉煮糊為丸如雞頭實大曬乾出

火每一丸空心酢湯下。如有孕不可服。

三灰散 治血崩

乾側柏

五錢
作白灰

右為末分作二服空心糯米飲調下。

全生活血湯

治血崩太多昏冒瞑目無所知覺

白芍藥

一錢

升麻各一

防風羌活

獨活蔓荆子

細柴

胡歸身

葛根一錢

甘草各七分

荳蔻各五分

生

辛各三

紅花一分

藁本川芎各五分

地黃熟地黃各四分

右剉作一帖水煎服

七灰散 治血崩不止

蓮蓬殼

益母草旱蓮草

鶯粟殼

醃蟹

右為末酢點湯調

櫻毛葉

藕節各等分

燒存性

下三錢。

加減十全大補湯 治血崩氣血虛者

十全大補

去桂

炮黑乾薑

阿膠珠分兩隨宜

右煎服

五灰散 治一切失血及血崩

蓮蓬殼

黃絹亂髮

百草霜

棲櫬皮各等分

燒存性

梔子炒蒲黃炒

松煙墨

血竭

右共燒

為細末每三錢以生藕汁生蘿蔔汁調服之或密

火每

中全

加減十全大補湯

九米飲下五十九亦可。
解毒四物湯 一名溫清飲治崩漏面黃腹痛

黃芩黃連黃芩

梔子生乾地黃

當歸

白芍藥川芎各一錢

右剉作一帖水煎服此方

乃黃連解毒湯與四物湯合劑也

黑金散 治婦人血氣虛損經候不調崩中漏下諸

般證候

鯉魚皮一兩

黃牛角觴

棲櫬皮破故紙

亂髮各一兩

鯇鰆魚骨

乾薑炮熟地黃

當歸洗焙

木賊各半兩

右剉拌入磁瓶內鹽

泥固濟候乾炭火五斤煅通赤煙盡埋土內令冷

取研細每三錢入麝香少許米飲空心調下

萬靈膏藥 治元氣虛弱女人赤白帶下子宮虛冷

血山崩等證貼丹田熨一百二十手

香油四斤

白芷赤芍

大黃黃連白芍

黃胎髮頭生穿山甲

熟地

杏仁槐角

黃蘖去粗皮木鼈子五十箇

十二兩化開傾

歸尾兩黃丹二斤飛

米汁內一百次

巴豆一百二十

右各咀片入油內浸春五日。

夏三日。秋七日。冬十日。取傾鍋內熬枯黑色濾去渣。將淨油入鍋文武火熬滴水成珠方細退火。徐徐下黃丹。以槐柳桃杏楮各二枝。不住手攪。再下黃香。去火少冷。又下細藥攪勻。將好瓶貯之。放水內浸一七出火氣用時放滾水內頓化攤開細藥列後。

珍珠五錢

阿魏

丁香

沈香各一兩

麝香

血竭

兒茶

乳香

沒藥各三兩

琥珀三錢

右各為末入前膏內

蘭黃散

治婦人血崩

蘭黃

蠶蛻紙並燒存性少許

晚蠶沙

白僵蠶並炒等分各

麝香少許

右為末每服二錢用米飲送下日三

固經丸 治陰崩不止

艾葉

醋炒鹿角霜

伏龍肝

乾薑各等分

右

為末鎔鹿角膠和藥乘熱丸食後淡酢湯下五十丸

九

旋覆花湯 治半產漏下脉弦而大

旋覆花三兩

葱莖十四根

新絳少許

右三味以

水三升

煮取一升頓服之

半夏丸 治下血吐血崩中帶下疾喘急滿虛腫亦消宿瘀百病

圓白半夏刮淨搗爛薑汁調飛白麪作餅包炙黃

色取麪取半夏

右作末米糊為丸菉豆大

每服

七丸溫熱水下又云

芎歸湯沈香降氣湯各半煎

送下止血之要藥

縮砂散 治血崩

縮砂仁不拘多少於新瓦上炒香

右為細末米

涼血地黃湯 治婦人血崩不止腎水陰虛不能鎮

飲調下三錢

守包絡相火故血走而崩也

生地黃

當歸尾各五分

黃連

黃芩

知母

藁本

川芎

升麻各二分

紅花少許

柴胡

防風

羌活

黃芩

細辛

荆芥穗

蔓荆子

甘草一分

右咬咀作一服水三盞煎至一盞

去滓空心稍熱服

當歸芍藥湯

婦人經脈漏下不止其色鮮紅值七

備金散 治婦人血崩不止

香附四兩

當歸尾二兩

五靈脂一兩

細末每服五錢

酢湯調空心服立效

右為

中華書局影印

北京大學圖書館藏

印

月處暑之間先因勞役脾胃虛弱氣短逆自汗不止身熱悶亂惡見飲食亦不思食沉困懶倦四肢無力大便時瀉後復因心氣不足其經脈再下不止惟覺氣下脫其元氣逆上全無惟覺心腹中氣不行氣短則不能言是無力以言非懶語也此藥主之

黃芪一兩
錢半

白朮

蒼朮去皮
生地各三分

歸身

白芍各五分
甘草炙

柴胡二分

熟地

陳皮去白各五分

柏子仁炒

右十味為粗末

作二服水煎去滓熱服

空心一服之後漸減次日諸證悉去頓喜飲食

所以者何蓋氣通而聞飲食之香故也

柏子仁湯治婦人憂思過度勞傷心經不能藏

血遂至崩中下血不止

柏子仁炒

香附炒去

鹿茸燎去毛蒸焙

芎藭

當歸各一錢半

甘草炙半

續斷二錢

茯神去木

當歸各一錢半

白朮三錢

當歸身酒浸

甘草炙

益胃升陽湯治血崩用此生血納穀

黃芪一兩

黃芩各二錢

人參

神鞠炒各五分

升麻

柴胡各五錢

白朮三錢

當歸身酒浸

甘草炙

陳皮錢各一錢半

右為粗末每服三錢或五錢食添再

柴胡調經湯治經水不止鮮血項筋急脣痛脊骨強痛不思飲食

柴胡調經湯治經水不止鮮血項筋急脣痛脊骨

煎去滓熱服不拘時候腹痛每服加白芍藥三分中口乾加乾葛二分如嗽去人參一方用生地若服此不止却服後方柴胡調經湯大舉大升之

柴胡根七分

獨活

藁本

升麻各五錢

蒼朮一錢

當歸身

甘草各三分

紅花少許

右咬咀作一服水煎去滓稍熱空心服

微汗立止

柴胡防風甘草炙

藁本升麻各一錢

羌活

黃芪各一錢半

蔓荆子七分

獨活

當歸五分

右咬咀水五大盞煎至一大盞去

滓稍熱服空心服藥畢待少時以早膳壓之可一

中西合璧歸科大全卷二

益胃升陽湯治血崩用此生血納穀

黃芪一兩

黃芩各二錢

人參

神鞠炒各五分

升麻

柴胡各五錢

白朮三錢

當歸身酒浸

甘草炙

陳皮錢各一錢半

右為粗末每服三錢或五錢食添再

服而已。

加減四物湯 治室女二七天癸至亦有當時未至

而後至者亦有卒然暴下淋瀝不止有若崩漏者失血過多變生諸證悉宜服之

川芎熟地黃當歸酒焙白芍藥各一
香

附子兩半。在炒咀每服四錢水一盞半生薑五
片煎至二分去滓食前溫服口色辨而不上火。

去熟地黃加生地黃煎服。

地黃丸 治足三陰虧損經行數日不止或兼帶下

無子

熟地黃 山茱萸肉 蕤英仁 白芍藥
代赭石 各一 **乾薑** 地 元蜜炒 陳卜薑

各三錢。右爲末蜜丸桐子大每服五十丸空心。

溫酒下日三服

蘿湯 治崩漏不止色明如水得溫則煩悶者此

陽傷於陰令人下血當補其陰脉數疾小者順大者逆

**小蘿蔔葉研取
生地黃研取汁
白朮半兩**

右三味入水一盞煎減一半去滓溫服。人坐

窮酒 治崩中晝夜不止醫者不能治

生地黃汁一盞。右用酒五盞。煮芍藥一盞。

生地黃汁一盞，右用酒五盞者。

卷之三

一盞去滓下地黃汁再煎二三

熟地四物湯 治有熱久患血崩
全當歸 白芍藥 川芎 熟

阿膠蛤粉炒珠 黃芩去黑者

服四錢水一盞半。生薑五片。煎

金華散 治血室有熱崩下不止
延胡索 瞞夢癩
瞿麥穗 當歸
乾

其故宜
石膏二
桂心 咸靈仙各七
錢半

細末。每服三錢水一盞半空心。

又方 治崩中下血不止小腹痛

炒黃 **相兼** **右用**

酒調二錢。一方有鹿角膠等分。

痛。

立效散 治血崩

當歸 蓮花藥 白絲子 紅

包鹽沉固。濟火煥存。性為未入。

牡蠣散 治月水不止衆藥不愈

牡蠣火煅研細用酢調成丸再煅過通紅候冷研細出火毒右用酢調艾末熬成膏和丸如梧子大每服五十九醉艾湯下。

柏黃散 療經血不止

黃芩一兩二錢半 側柏葉 蒲黃各一 伏龍肝二兩

右㕮咀水二升。煮取八合分為二服。

丁香膠艾湯 治崩漏不止蓋心氣不足勞役及飲食不節所得經脉少時其脈兩尺俱弦緊而洪按

之無力其證自覺臍下如冰求厚衣被以禦其寒白帶白滑之物雖多間下如屋漏水下時有鮮血不多右尺脉時微洪屋漏水多暴下者是急弦脉為寒多而洪脉時見乃熱少合而言之急弦者北方寒水多也洪脉時出者命門包絡之火也黑物多赤物少合成屋漏水之狀也

川芎炒六分 丁香合四分 熟地黃 白芍藥各三

當歸身一分

生艾葉一錢

藥分三

阿膠

末作一服水二盞煎至五沸去滓入膠艾再上火煎至一大盞空心宿食消盡帶熱服三服效。

又方 治血崩

熟艾如雞子大 阿膠半兩 乾薑一錢 右為粗末用水五盞先煎艾葉薑至二盞半入膠消溫分二服空心服。

芎菊湯 一名芎菊溫中湯治帶下漏血不止及風虛冷熱勞損衝任月水不調崩中暴下腰重裏急淋漓不斷及產後失血過多虛羸腹痛或妊娠胎動不安下血連日小便頻數肢體煩倦頭暈目暗不欲飲食

芎菊一錢 黃芪一錢 白芍藥 乾地黃 吳茱萸甘草各二兩 當歸 乾薑各一 右㕮咀以水一斗煮取三升分三服若月經後因有赤白不止者除地黃茱萸加杜仲人參各二兩

斷下湯 治衝任氣虛崩中漏下經脈不調每遇月候將來臍腹腰脚先痛漸減飲食四肢乏力及帶下三十六疾悉能療之

人參去蘆 熟地黃洗培

當歸酒洗各

燒灰

乾薑炮半

川芎七錢

阿膠

七分

去渣食前溫服

又方 治崩漏

四物湯

一兩

人參

二錢

吳茱萸

一錢

右判

每服五十九溫酒下。

治月水過多崩漏帶下淋瀝不斷腰腹重

紫金散

治一切五色帶疾

禹餘糧

水飛赤醋淬七次細研

白芍藥

川芎

熟地

附子

當歸

赤石脂

龍骨並煅各一

乾薑

炮肉桂

右為細末

每服二錢入麝

香少許米飲空心調下

白芷暖宮丸

煖血海實衝任治子宮虛弱風寒客

滯斷緒

不成孕育及數墮胎或帶下亦白漏

五色虛弦少氣

腎腹滿痛心下煩惱自汗下血過多

禹餘糧

製一兩

乾薑

芍藥

川椒

白芷

禹餘糧

製一兩

阿膠蛤粉

炒艾葉

川芎

各七錢半

右為細末

右為細末

密和丸

梧子大

每服四十九米飲溫酒

醉湯任下

琥珀散

一名烏紗帽散

治暴崩不止

烏紗帽

即漆紗

赤芍藥

香附子

枯荷葉

男子髮

水洗頭巾

當歸

搜櫬

燒存性各等分

右除搜櫬

外其餘並用粗片新瓦上

煅成黑灰存性共為細

末每服五錢

空心童便調下

如人行十里再一服

七八服即止若產後血去多

加米酢京墨麝香少

許

赤龍丹

治崩中不止

禹餘糧

炒鰩鮑骨

鹿茸

龍骨

石燕蝦少

阿膠

當歸

乾薑各等分

右為末酒酢糊和丸

右為末酒酢糊和丸

退崩漏未止續服後熟附丸

熟附丸

治崩漏

熟附子

木賦

龍骨

蝦

當歸各一

右為細末

酢糊為丸如梧子大

每服五六十九食前米飲下

桂心

不拘多少炒極焦存性

桂心

右為末每服一二錢米飲調

桂心

不拘多少炒極焦存性

桂心

右為末每服一二錢米飲調

桂心

右為末每服一二錢米飲調

桂心

不拘多少炒極焦存性

桂心

荆芥散 治婦人崩中不止

好麻油點燈多著燈心就上燒荆芥焦色 右為

細末每服三錢童便調下。

開鬱四物湯 治崩漏多因心氣所使而下故貴奪

勢先富後貧皆是也

香附米炒 當歸身 白芍藥酒炒

熟地黃

白朮錢各一

升麻三分

川芎 黃芪 蒲黃炒

地榆 人

參錢各五

烏金散 治血崩不止

棕櫚性雨存性兩

龍骨二錢

右為細末研匀每三

又方 治患崩中不止結作血片如雞肝色碎爛

錢空心好酒調服二服立止

芎菊十二分

阿膠 青竹茹各八分

續斷 地榆

右為細末研匀每三

又方 治患崩中不止結作血片如雞肝色碎爛

小薊根各三分

當歸六分 生地黃 伏龍肝各十

右用水九盞煮取三盞去渣分三服

無比散 治婦人血崩

蠶沙一兩

伏龍肝半兩

右為末溫酒調空心

服二三錢以上為度一方有阿膠一兩

伏龍肝散 治氣血勞傷衝任脈虛經云非時忽然

崩下或如豆汁或成血片或五色相雜或赤白相
崩下或如豆汁或成血片或五色相雜或赤白相

兼臍腹冷痛經久未止令人黃瘦口乾飲食減少
四肢無力虛煩驚悸

伏龍肝 赤石脂各一

芎菊兩

甘草三

肉桂

麥門冬去心一兩半

熟地艾葉微炒各二兩

當歸

乾薑錢半

水煎服

麥門冬去心一兩半

右為粗末每服四錢棗一枚

地榆散 治婦人崩中漏下不止

地榆割

蒲黃

白芍藥

白茯苓

炮桂心

當歸七錢半

伏龍肝半兩

鹿角膠

令黃燥炒

蟹爪微炒

熟地黃

鹿角膠

漏蘆各

炮桂心

甘草半兩

右剉碎每服三錢水

一中殘入竹茹一分煎至七分去渣食前溫服以

上五方俱用伏龍肝蓋燥可去濕也但前三方去

濕熱後二方去寒濕按龍肝為去濕止血之聖

藥先賢治崩用旋覆花半夏治膈間濕痰而崩止

者亦此意

鹿茸散 治崩中漏下不止虛損羸瘦

鹿茸二兩去毛塗

白龍骨

熟地黃

蟹甲酥

鯉魚骨炙

白芍藥

白石脂

續斷

右為細末每

兩各去裙黃令黃

鯉魚骨炙

白芍藥

白石脂

續斷

右為細末每

兩半酒浸一宿

刮去皺皮炙乾

右為細末每

服二錢食前粥飲調下。

柏葉散 治婦人崩中漏下不問年月遠近漸至黃

瘦四肢無力腹內疼痛不思飲食

柏葉 繢斷 川芎 生地黃 當歸 龜甲

鼈甲 各一兩半

禹餘糧 半兩

赤石脂

父葉 鹿茸 各一兩

阿膠 牡蠣 地榆

三錢食前粥飲調下。一方有丹參加鹿茸煉蜜和
丸如梧子大每服三四十丸空心用陳酒送下或
酢湯亦可。

補宮丸 治婦人諸虛不足久不妊娠骨熱形瘦崩
中帶下

白薇 牡蠣 白芍藥 鹿角霜 山藥 茯苓

白朮

鷦鷯魚骨

白芷 各等分

右為細末麪

糊和丸如梧子大每服五十丸空心用米飲送下。

鎮宮丸 治婦人崩漏不止或赤白不定或如豆汁
或狀如豚肝或下瘀血臍腹脹痛頭暈眼花久而不
止令人黃瘦口乾胃煩不食

代赭石 大半兩 紫石英 禹餘糧製並同上

香附 酢黃各半兩

陽起石 大半兩

蒲黃 炒

鹿茸

阿膠 刨碎蛤粉炒成珠 蒸焙去毛

阿膠 炒成珠

浸

芎菊各一兩
煮糯米粉糊丸如梧子大每服七十九空心米飲
下日三次。
血竭研半兩
右為細末用父煎酢汁。

梅飲子 治婦人血崩

鹽白梅

燒灰存性

右為末空心米飲調下。

又方

治崩不定淋淫經年者

白礬 鎔汁一兩

沒藥 一錢

硇砂

黃丹 各五分

右

件將白礬鎔開成汁下餘藥細末一處攪勻就成
丸如彈子大每用一丸新綿裹內陰中立效。

十灰丸 治崩中下血不止

錦片 黃絹

馬尾 藥節

蓮房 蒲黃

並煅成灰存性各等分

右

髮 赤松皮

櫻櫻

柏葉 鯉魚鱗

鯽魚鱗

勺用酢煮糯米糊和丸如梧子大每服七十丸加
至一百丸空心米飲送下。

十灰散 治下血不止

錦片 木賊

櫻櫻

柏葉 鯉魚鱗

鯽魚鱗

艾葉 乾漆 血餘

當歸

並火煅存性各等分

麝香

少許右研勻每服二錢空心溫酒調服

又方 治血崩屢效

當歸

白芍藥

乾薑

櫻櫻各等分

右各煅存

大英中藥書院

药大学图书馆

性研為細末。醋調以有節朱筋。左攬四十九轉。食前服。

香蘇散 治血崩

香附子一宿炒焦為灰存性

右每一兩入白礬

未二錢

米飲

調胞空

心神

一方用荷葉湯尤妙

如聖散

治血山崩

櫻櫛

烏梅肉各一兩

乾薑並燒存性

一兩五錢

右為細

未每服三錢

烏梅酒

調下空心

食前服久患不適

三服愈

上下相資湯

治血崩後口舌燥裂不能飲食

熟地

麥冬各一兩

山茱萸

牛膝

沙參

當歸

歲蕤各一錢

人參

元參各三錢

北五味

二錢

安崩湯

治血崩不止昏運人事不省

人參

黃芪各一兩

三七根末三錢

右

水煎前藥調三七根末服之

一劑即可止崩

一笑散

治婦人血崩

新綿燒灰

右研末空心酒調下立止

獨聖丸

治療血凝積瘀血不去新血不能歸經此

九主之

五靈脂去上炒
右一味為末。醋九茶豆大每服
一二錢。淡醋湯下。清酒亦得。虛人以補藥相間而
用。

固本止崩湯 治婦人一時血崩兩目黑暗昏暈

地不省人事

大熟地一兩

酒洗

黑薑

二錢

白朮一兩土炒

人參

三錢生用

右水煎服

當歸

五錢酒洗

加減當歸

補血湯

治老年血崩

當歸一兩

酒洗

黃芪

一兩生用

三七根末三錢桑葉

白朮

五錢土炒

大熟地

一兩

山藥

四錢

麥冬

三錢

須斷絲始除根

十四片

右水煎服

二劑

血少止四劑不再發然必

根可盡除矣

北五味一錢

右併前方同煎服

百劑後崩漏之

固氣湯 治少婦有娠三月血崩胎墮

人參一兩

白朮五錢

大熟地

五錢九蒸

當歸

三錢

白朮

二錢土炒

大熟地

九蒸

當歸

三錢

杜仲

三錢

山藥

遠志一錢去心

甘草一錢

五味子十粒炒

杜仲

三錢炒黑

右水煎

服一劑止血全愈

平肝開鬱止血湯 治婦人懷抱鬱結口乾舌渴嘔

中西合璧
藥科大金

吐吞酸而血下崩

白芍一兩
醋炒

白朮一兩
土炒

當歸一兩
酒洗

丹皮三錢

單方 崩中漏下。使人無子。好墨一錢。水服日二服。

生地三錢
酒炒

甘草二錢
研末

三七根三錢
研末

黑芥穗

又方。百草霜二錢。狗膽汁攪勻。分作二服。當歸酒下。又方。青礬二兩。輕粉一錢為末。水丸梧子大。每

服三十九。食後薑湯下。赤白漏下。礬石。米煉飯服之良。婦人血崩。代赭石。火煅。醋淬七次為末。白湯

服。又方。用貴衆半兩。煎酒服之立止。婦人漏下。

乾渴除四劑血崩愈。

逐瘀止血湯。婦人升高墜落或閃挫受傷致惡血

下流如血崩狀者以此主之。

大黃三錢

赤芍三錢

丹皮一錢

枳殼五錢
泡炒

當歸尾五錢

龜板三錢
醋炙

桃仁十粒

清海丸 治婦人每行人道經水即來。一如血崩此

右水煎服。連服三劑愈。

因血海太熱之故。此方主之。

大熟地一斤
九蒸

山萸十兩
蒸

山藥十兩

麥冬肉

芍一兩
酒炒

北五味二兩

丹皮十兩

白朮一斤
土炒

白

乾桑葉一斤
兩十
酒炒

地骨皮十兩

龍骨二兩

元參一斤

沙參 石斛各十
兩

右十四味各

滾水送下。半載全愈。

為細末。合一處。煉蜜九桐子大早晚每服五錢。白

滌水送下。半載全愈。

滋血湯 治婦人勞傷衛脈氣虛不能約制其經血

血。血崩。香附子去毛炒焦為末。極熱酒服二錢立愈。

海螵蛸 赤石脂火煅

側柏錢五

右為細末。

見效。又方。益智子炒。碾細米飲入鹽服一錢。下

昏迷甚者三錢米飲下亦可加棗灰。漏血欲死雞蘇黃汁一升服之。又方。大小薊根一升酒一斗。漬五宿任飲亦可酒煎服或生搗汁溫服。又方。大薊根絞汁服半升立瘥。又方。木莓根四兩酒一椀煎四五十煮減三分之一去滓取汁煎至可丸梧子大。每溫酒下十九日三服。崩中漏下用石葦為末每服三錢溫酒服甚效。婦人血崩草血竭嫩者蒸熟以油鹽薑淹食之飲酒一二盃送下或陰乾為末薑酒調服一二錢一服即止。生於磚縫井砌間少在地下也。又方。石花細茶焙為末舊漆碟燒存性各一匙。以碗盛酒放鍋內煮一滚乃入藥未露一宿。早晨連藥再煮一滾溫服。崩中不止麻根水煮服之良。崩中赤白帶下用墓頭回草一把酒水各半瓊童便半掩新紅花一捻煎七分。卧時溫服日近者一服久則三服愈其效如神。血崩不止白扁豆花焙乾為末每服二錢空心炒米煮飲入鹽少許調下即效。崩中漏下使人無子露蜂房末三指撮溫酒服之神效。崩中下血不止用白殭蠶衣中白魚等分為

末井華水服之日二婦人血崩蠶繭煮汁飲。崩中不止蠶故紙一張煎炒焦槐子炒黃各等分為水酒服立愈。又方。用蠶沙四兩沙鍋炒半黃色入無灰酒一壺煮沸澄去沙每溫服一盞即愈。漏血不止水蛭炒為末酒服一錢日二服惡血消即愈。赤白崩中舊壺盧瓢炒存性蓮房煅存性等分研末每服二錢熱水調服三服有汗為度即止甚者五服止最妙忌房事發物生冷。

五靈脂散專治婦人血崩。五靈脂不拘多少炒全煙盡研末每服一錢溫酒調下。血崩不止五靈脂二錢炒熟加當歸酒同煎或水酒各半盞同煎服一方。五靈脂半生半熟為末酒調服一方。水煎服一方。五靈脂半乾去渣澄清再煎成膏入神鈞末為丸如桐子大空心溫酒下五錢七日三服治血崩夏枯草為細末每服二錢米飲調下無時服。又方。葫蘆去子瓤實荆芥穗燒存性飲湯調服。婦人經年血崩香附子二兩炒赤蓮殼五枚燒存性同研細末每服二錢空心陳米飲調下婦人血崩不止檳榔燒灰存性研末以溫酒調下甚妙。

〔外國醫方〕麥角末兩瓦

乳糖三瓦

右研為

散分作十包。每一時服一包。麥角一瓦。橙皮糖漿十五瓦。蒸錠水百瓦。右調和。每時服一匙。桂皮酒五十瓦。右每三十分時服一茶匙。

以脫製醋酸鐵酒十瓦。醋酸以脫五瓦。右調和。每半時服十五滴。

鹽酸晞度拉斯企精。二五瓦。白糖一瓦。右為大錠一個。共製十二個。每日服四個。

晞度拉斯企斯越幾斯二十瓦。右每日數次。每服二十至三十滴。

愛爾柯欽四五瓦。桂皮糖漿二十五瓦。薄荷水常水各七十五瓦。右每時服一二食匙。

過格魯兒鐵液十瓦。右熱至微溫。以布拉溫氏注射器吸此藥入子宮腔內。注射二三滴。

明礬五瓦。蒸錠水二百瓦。右溶和為注射料。注陰道中。

赤白帶下

中醫學說

婦人之病。因虛積冷。結氣為證。經

水斷絕。至有歷年。血寒積結。胞門寒傷。經絡凝堅。在上嘔吐涎唾。久成肺癰。形體損分。在中盤結繞臍寒痛。或兩脅疼痛。與臟相連。或結熱中。痛在關元。脉數

無瘡。肌若魚鱗。時著男子。非止女身。在下未多。經候不勻。令陰掣掣痛。少腹惡寒。或引腰脊下根。氣衝氣衝急痛。膝脛疼煩。奄忽脰。狀如厥癲。或有憂愁。非傷多嗔。此皆帶下。非有鬼神。久則羸瘦。脉虛多寒。三十

六病。千變萬端。審脉陰陽。虛實緊弦。行其針藥。治危

急痛。膝脛疼煩。奄忽脰。狀如厥癲。或有憂愁。非傷

多嗔。此皆帶下。非有鬼神。久則羸瘦。脉虛多寒。三十

屈滯於帶。故女子臍下痛而綿綿陰器中時下也。故經曰任脉自胞上過帶脈貫於臍上。故男子內結七疝。女子帶下。帶脉起於季脅章門。如束帶狀。今濕熱冤結不散。故為病也。經曰脾傳之腎。病名曰瘕疝。小腹冤熱而痛。出白。一名曰蠱。所以為帶下冤結也。冤屈也。屈滯而病熱不散。先以十棗湯下之後。服苦棟丸。大延胡散。調下之。熱去濕除。病自愈也。精選聖惠方二十三卷。論婦人赤白帶下云。婦人帶下者。由勞神過度。損動經血。致令身虛。受於風冷。風冷入於脬絡。傳其血之所成也。巢氏內篇四十四卷。論任脉為經之海。其任之為病。女子則為帶下。手太陽為小腸之經也。手少陰為心之經也。心為臟。主於裏。小腸為腑。主於表。二經之血在於婦人。上為乳汁。下為月水。衝任之所統也。衝任之脉既起於胞內。陰陽過度。則傷脬絡。故風邪乘虛而入於脬中。損衝任之經。傷太陽少陽之血。致令脬絡之間。穢與血相兼帶而下。冷則多白。熱則多赤。二家之說。皆非也。夫治病當先識經絡靈樞十二經中。有是動之病。有所生之病。大經有十二。奇經有八。脈言十二經之外。復有此八道經。舊積也。從肺金故赤白痢不可曲分寒熱止可分新。

脉也。十二經與八道經。脈通身往來。經絡共二十道。上下流走。相貫周環。晝夜不息。與天同度。自手太陰肺經起。行陽二十五度。行陰亦二十五度。復會於手太陰肺經也。然此二十道經絡。上下周流者。止十九道耳。惟帶脉起少腹側季脅之端。乃竇門穴是也。環身一周。無上下之源絡。肺而過。如束帶之於身難。經曰。帶之為病。溶溶如坐水中。衝任者。是經脉之海也。循腹脅夾臍旁。傳流於氣衝。屬於帶脈。絡於督脈者。督領婦人經脈之海也。衝任督三脉同起焉。異脈者。督領婦人經脈之海也。衝任督三脉。以帶脈束之。行一源而三歧。皆絡帶脉。衝任督三脉。皆統於篡戶。巡陰器行廷孔。溺孔之端。衝任督三脉。以帶脈束之。因餘經上下往來。遺熱於帶脉之間。熱者血也。血積多日不流火。則從金之化。金曰從革而為白。乘少腹間。冤熱白物滑溢隨溲而下。綿綿不絕。多不痛也。或有痛者。則壅礙因壅而成痛也。內經曰。少腹冤熱溲出白液。冤者。屈滯也。病非本經。為他經冤抑而成此疾也。冤一作客。客猶寄也。遺客熱於少腹久不去。從金化而為白。設若赤白痢。赤者新積也。從心火。白者。

舊而治之。假如癰癧始亦血。次潰白膿。又豈為寒者哉。而病者未為信也。此金之劉河間常言之矣。皆云寒多則白。以乾薑赤石脂桃花丸治痢雖愈。後必生血疾。如白帶下病。徑以白芍乾薑白帶雖愈。則小溲必不利。治瀉痢與治帶下皆不可驟用峻熱之藥燥之。燥之則內水涸。內水涸則必煩渴。煩渴則小便不利。小便不利。則足腫而浮。漸至不治。內經曰。思想無窮。所願不得。意淫於外。入房太甚。發為筋痿。淫行白物。如精之狀。男子因溲而下。女子綿綿而下。是為思慕色慾。內生侵蝕。甚不可。便用燥熱之藥攻之。漸至形削羸瘦。脉大者必死而不救。且赤白痢者。是邪熱傳於大腸。下廣腸。出赤白也。帶下者。傳於小腸。入脬經。下赤白也。據此二證。皆可同治濕法治之。先以導水丸禹功散瀉訖。次以淡劑降心火。益腎水。下小溲。分水道。則自愈矣。內經云。上有病。下取之。下有病。上取之。又上者下之。下者上之。然有此法。亦不可偏執。更宜詳其虛實而用之。故知精選聖惠方。帶下風寒之言。與巢氏論中赤熱白寒之說。正與難素相違。後學不明。從之而行。不察病人脈息。不究病人經脈。妄斷寒熱。信用羣方。暴熱之藥。一旦有失。雖悔何追。

故婦人赤白帶下。或出自物如脂。可服導水丸禹功散。或單用無憂散。量虛實加減瀉訖。次用桂苓丸五苓散。葶藶木香散。同治濕法。治瀉法治之。或用獨聖散。上涌亦可。室女同。婦人白帶下注癰癧脚氣。腰已下。如在冰雪中。以火焙炕重重厚綿衣蓋其上。猶寒冷不任寒之極也。面白如枯魚之象。肌肉如刃割削瘦。峻之速也。小便不止。與白帶長流而不甚固。自不知覺。面白目青藍如菜色。瞼瞼無所見。身重如山。行步欹側。不能安地。腿膝枯細。大便難秘。口不能言。無力之極。食不下。心下痞煩。懊惱不任其苦。面停垢。背惡寒。小便遺而不知。此上中下三陽真氣俱虛欲竭。嘔嘔不止。胃虛之極也。脉沈厥緊而澀。按之空虛。若脉洪大而濇。按之無力。猶為中寒之證。况按之空虛者乎。按之不鼓。是為陰寒。乃氣血俱虛之極也。腹下痛。陰中亦然。目中溜火。視物矇矇然無所見。齒皆惡熱飲且痛。須得黃連細末擦之乃止。惟喜乾食。宜酒煮。當歸丸。大補大溫。婦人白帶久下。不止。臍大惡湯飲。此病皆寒濕乘其胞內。故喜乾而惡濕。肝經陰火。上溢走於標。故上壅而目中溜火。腎水侵肝而上溢。致目眴眴而無所見。齒惡熱飲者。是陽明經

中伏火也。治法當大瀉寒濕以丸藥治之。故曰：寒在下焦。治宜緩。大忌湯散。以酒製白石脂白龍骨以枯其濕。炮乾薑大熱辛瀉寒水。婦人心胞尺脉微其白帶下流不止者何。按叔和云：崩中日久為白帶漏下。多時骨髓枯。蓋血崩久則血少。復亡其陽。故白滑之物下流不止。是本經血海將枯。津液復亡。枯乾不能滋養筋骨。以本部行經藥為引。用為使。以大辛甘油膩之藥潤其枯燥而滋益津液。以大辛熱之氣味藥補其陽道。生其血脉。以苦寒之藥泄其肺而救上熱。傷氣以人參補之。以微苦溫之藥為佐。而益元氣。名曰補經固真湯。此證之要藥。以黃芩之大寒為引。又為鄉導。故云：古者雖有重罪不絕人之後。又為之伏其所主。先其所因之意。又瀉齒中惡熱飲也。以柴胡為本經之使。以芍藥五分導之。恐辛熱之藥太甚。損其肝經。故微瀉之。以當歸身之辛溫大和其血脉。名曰固真丸。用藥之法備矣。

主治燥濕為先。漏與帶。俱是胃中痰積流下。滲入膀胱無人知。此只宜升提。甚者上必用吐以提其氣。下用二陳湯。加蒼朮白朮。仍用丸子。肥人多是濕痰。以海石半夏南星炒黃芩蒼朮芍藥椿皮青黛之

類瘦人白帶少。如有者多熱。以炒黃芩滑石椿皮川芎海石青黛之類作丸子服。無海石蛤粉亦可。亦可行虛者不可峻攻。此羅先生法也。大抵血虛宜加減四物湯。氣虛參朮陳皮間與之。濕勝用固腸丸。相火動者於諸藥中少加黃芩。滑者加龍骨。亦石脂滯者加葵花。白帶用白葵花。亦帶用赤葵花。性躁者加黃連。痰氣帶下。蒼朮香附滑石蛤粉半夏茯苓丸。脈寒月少加乾薑。臨機應變。必須斷厚味。又治結痰白帶。心下悶。先以小腹丹半錢半飽。津液下數丸。簇鬱虛憊感非一端。叔和云：崩中日久為白帶。漏下多時。骨髓枯。蓋崩久血少亡陽。故白滑之物下流不止。東垣言之詳矣。不可不知。宜與夢遺同法治之。赤沙參末。帶下不止。或尪羸者。四物湯加蝦牡蠣粉半年一發。先血而後下帶來不可遏。停畜未幾。又復傾瀉。此名漏帶。最難治。經曰：小腹冤熱。溲出白液。究者濕熱凝滯。結於五臟。自胞上而過帶脉。出於大

小腸之分。淋泄以下。故曰帶下。赤屬血。白屬氣。其證頭昏目眩。口苦舌乾。咽嗌腫燥。大便或閉或溏。小便澀。皆熱證也。婦人帶下。或因六淫七情。或因醉飽房勞。或因膏粱厚味。或因服燥劑所致。脾胃虧損。陽氣下陷。或濕痰下注。蘊積而成。故言帶也。凡此皆當壯脾胃。升陽氣為主。佐以各經見證之藥。婦人有白帶者。乃是第一等病。令人不能產育。宜急治之。此扁鵲之過邯鄲。聞貴婦人所以專為帶下醫也。帶下之證有三。未嫁之女。月經初下。止而即浴之。以冷水或熱而扇。或當風。此室女病帶下之由也。有家之婦陰陽過多。即傷胞絡。風邪乘虛而入。胞經觸冷。遂使穢液與血水相連而下。產後帶下。由亡血失氣。傷動胞絡。門開而外風襲。肌體虛而冷風入。風與熱氣相連。故成液而下。冷則多白。熱則多赤。冷熱相交。則赤白相下。帶下久而枯涸者。則濡之。凡大補氣血。皆所以濡之。如以四物湯為末。煉蜜丸。梧子大空心米飲。脉微食少。及久病曾經攻下者。俱作虛治。有熱用涼補。無熱用溫補。帶下並腸有敗膿。淋露不已。腥穢殊甚。遂至臍腹更增冷痛。此蓋敗膿血所致。卒無已。

期治須排膿為先。白芷一兩。單葉紅蜀葵根二兩。白芍藥白礬各半兩。礬燒枯另研。餘同為末。以蠟為丸。如桐子大。空心及飯前米飲下十丸。或十五丸。候膿盡。仍別以補藥佐之。帶下之病。婦女多有之。亦者屬熱。兼虛。兼火。治之。白者屬濕。兼虛。兼瘀。治之。年久不止者。以補脾胃為主。兼升提。大抵瘦人多火。肥人多痰。女人之血。謂之七損。上為乳汁。下為月經。交合浸淫之水。與夫漏濁崩中。帶下之物。皆身之血也。赤帶。用四物湯加芩連。再加升麻。丹皮主之。兼服三補丸。白帶。用加味六君子湯主之。兼服蒼莎導痰丸。帶久不止者。宜服十全大補湯。去地黃。加陳皮半夏炒乾薑。更服參朮大補丸。以補脾胃之虛。及服補宮丸。以固下元之脫。凡婦人淋帶。雖分微甚。而實為同類。蓋帶其微。而淋其甚者也。總由命門不固。而不固之病。其因有二。一以心旌之搖也。心旌搖則命門不應。命門應則失其所守。此由於不遂者也。一以多慾之滑也。情慾無度。縱肆不節。則精道滑而命門不禁。此由於太遂者也。一以房室之逆之也。凡男女相臨。遲速有異。此際權由男子。而婦人情興多致中道而止。止則逆。逆則為濁。為濁為淋。此由於遂而不遂。

乃女子之最多而最不肯言者也。以上三證凡帶濁之由乎此者十居八九。而三者之治必得各清其源。庶可收效。然源未必清而且旋觸發。藥餌之功。必不能與情竇爭勝。此帶濁之所以不易治也。此三者之外。則尚有濕熱下流者。有虛寒不固者。有脾腎虧陷而不能收攝者。當各因其證而治之。徐用誠云。帶下白屬氣亦屬血。東垣云。血崩久則亡陽。故白滑之物下流未必全拘於帶脈。亦有濕痰流注下焦。或腎肝陰淫之濕勝。或因驚恐而濁液下流。或思慕為筋痿。戴人以六脈滑大有力。用宣導之法。此瀉其實也。東垣以脈微細沈緊。或洪大而虛。用補陽調經。乃兼責其虛也。丹溪用海石南星椿根皮之類。乃治其濕痰也。實則皆當壯脾胃。升陽氣為主。佐以各經見證之藥。色青用小柴胡。加山梔防風。濕熱壅滯。小便赤澀。用龍膽瀉肝湯。肝血不足。或燥熱風熱。用六味丸。色赤用小柴胡。加黃連。山梔當歸。思慮過傷。用妙香散等藥。色白用補中益氣。加山梔。色黃用六君子。加山梔。色黑用六味丸。氣血俱虛。入珍湯。陽氣下陷。補中益氣湯。濕痰下注。前湯加茯苓半夏蒼朮黃柏。氣虛痰飲下注。四七湯送六味。

丸不可拘肥人多痰瘦人多火而以燥濕瀉火之藥輕治之也。帶下之證方書以青黃赤白黑分屬五臟。其實不必拘泥。大抵此證不外脾虛有濕。脾氣壯旺。則飲食之精華生氣血而不生帶。脾氣虛弱。則五味之實秀。生帶而不生氣血。南方地土卑濕。人稟常弱。故濁帶之證十人有九。以五味異功效。加扁豆薏苡仁山藥之類。投之輒效。倘挾五色。則加本臟藥一二味足矣。夫帶證似屬尋常。然若崩而不止。多至體竭骨枯而成損。寧可忽諸。帶下俱是濕證。而以帶名者。因帶脈不能約束。而有此病。故以名之。蓋帶脈通於任督。任督病而帶脈始病。帶脈者。所以約束胞胎之系也。帶脈無力。則難以提繫。必然胞胎不固。故曰。帶弱則胎易墜。帶傷則胎不牢。然而帶脈之傷。非獨跌閃挫氣已也。或行房而放縱。或飲酒而顛狂。雖無疼痛之苦。而有暗耗之害。則氣不能化經水反變為帶病矣。故帶病者。惟尼僧寡婦出嫁之女多有之。而在室之女。則少也。况加以脾氣之虛。肝氣之鬱。濕氣之侵。熱氣之逼。安得不成帶下之病哉。故婦人有終年累月。下流白物。如涕如唾。不能禁止。甚則真穢者。所謂白帶也。夫白帶濕盛。而火衰肝鬱而氣弱。則脾

土受傷。濕土之氣下陷。是以脾精不守。不能化榮血。以為經水反變成白滑之物。由陰門直下。欲自禁而不可得也。治法宜大補脾胃之氣。稍佐以舒肝之品。使風木不閉塞於地中。則地氣自升騰於天上。脾氣健而濕氣消。自無白帶之患矣。方用完帶湯。帶下色青者。甚則綠如菜豆汁。稠粘不斷。其氣腥臭。所謂青帶是也。治當解肝火而利膀胱之水。則青綠之帶均去矣。方用加減逍遙散。帶下色黃者。儼似黃茶濃汁。其氣腥穢。所謂黃帶是也。治當補任脈之虛。而清腎火之炎。方用易黃湯。帶下色黑者。甚則如黑豆汁。其氣亦腥。所謂黑帶是也。其證必腹中疼痛。小便時如刀刺。陰門必發腫。面色必發紅。日久必黃瘦。飲食必兼人口。中必熱渴。飲以涼水。少覺寬快。治法惟以洩火為主。熱退而濕自除矣。方用利火湯。帶下色紅者。似血非血。淋瀝不斷。所謂赤帶是也。治須清肝火而扶脾氣。庶幾可愈。方用清肝止淋湯。

西醫學說】白帶多因淋毒。或經中產後不攝生蟲。亦皆足以致之。別有一種為腺病性腔炎。如彼癟瘍性體質之少女。多有之也。初至之時。體先發熱。寒戰繼之。無何。陰內流出粘液。子宮疼痛。尿意頻數。交合不歡。病勢加重。粘液愈多。粘液似水似膿。又似鼻涕。其色或白或黃或綠。其質或稀或稠。其量或多或少。時時自陰內洩出。浸潤外陰部。故外陰部每發惡臭。內則自覺麻爛。甚且溫及兩股。致生濕疹而發癢。粘液著於褲間。則永留帶黃白色之斑點。粘液粘附陰毛。則分解而放可憎之臭氣。試觸陰道。則發熱如灼。似此情狀。約繼續兩禮拜。病勢便可減退。如不減退。則變為久病。粘液愈多。體漸衰弱。皮膚黃白。全身倦怠。食慾不振。便祕頗甚。因之孕育無望。或且月經不調。易有血崩及全身衰弱諸證。豫防之法。月經來時。最須留意。如經水多否。經前痛否。均須細心檢查。經水未淨。切戒交媾。體操等事。將出嫁之室女。大便最須調勻。母令秘結。患重劇之感冒者。病後務須注意。父母有淋病者。於看護女孩。益應慎重。因幼女之帶下。多半以觸受父母。或乳母之淋毒而來也。食物祇宜用滋養分多者。其有奇烈性者不可食。酸性及亞爾加里性飲料。亦以屏去為佳。治療之法。有全身局部二種。全身治法。慎擇易消化之食物。服健胃強壯藥。如鐵劑。規那皮劑等。使身體日漸強壯。局部治法。

用防腐藥。殺菌藥。收斂藥等。視病情之如何而斟酌加減。尋常應用最多者。加腐藥中。莫如硼酸水。殺菌藥中。莫如蛋白化銀水。收斂藥中。莫如皓礬水。及明礬水。並禁用過冷過熱之藥液注入子宮。室女及寡居忌手淫。已嫁忌房事過度。除去下腹部臟器。鬱血之原因。故大便最須通利。急性症之局部治法。又宜施冷罨法。或用冷水灌下。如兼發熱。並進酸性飲料。靜卧忌動。

【中國醫方】大補丸 治結痰白帶服小胃丹候

鬱積行

服此

白朮

一兩

蒼朮

五錢

紅白葵花

二錢

白芍

半錢

藥

七錢

右蒸餅為丸空心煎四物湯下二十丸

樗皮丸 治赤白帶有濕熱者

芍藥

五錢

良薑

三錢

黃柏

二錢各

炒成灰

椿根皮

各二錢

右蒸餅為丸空心煎四物湯下二十丸

右為末粥丸每服三五十丸空心米飲吞

半

右為末粥丸米飲下

赤白帶因濕熱勝而下者

半

右為末粥丸米飲下

白芍藥

各一兩

炒

地榆

半兩

甘草

三錢

滑

水

石

炒

乾薑

二兩

右為末粥丸米飲下

又方 治帶下

藥中莫如蛋白化銀水。收斂藥中。莫如硼酸水。殺菌藥中。莫如皓礬水。及明礬水。並禁用過冷過熱之藥液注入子宮。室女及寡居忌手淫。已嫁忌房事過度。除去下腹部臟器。鬱血之原因。故大便最須通利。急性症之局部治法。又宜施冷罨法。或用冷水灌下。如兼發熱。並進酸性飲料。靜卧忌動。

又方 治白帶因七情所傷服數者
黃連 炒 側柏葉 酒蒸 黃柏 炒各
白朮 炒各 白芷 烧存 木香 錢三
白芍 炒 白芍藥 一兩 右為末飯粥為丸米飲湯送
香附子 炒各
椿根皮 錢二
黃柏 炒各
麥皮麵 炒
黃柏 炒各
石

椿根皮 二兩 神龜炒 麥皮麵 炒
芍藥 半兩 滑石 枝殼 各半 蒼朮 一兩
為末糊丸桐子大。每服五十丸。空心下。
下。白朮 炒各 白芷 烧存 木香 錢三
白芍 炒 白芍藥 一兩 右為末飯粥為丸米飲湯送
香附子 炒各
椿根皮 錢二
黃柏 炒各
麥皮麵 炒
黃柏 炒各
石

伏龍肝散 治赤白帶下久患不瘥。冠悴乏力。脈微濡

棕櫚 不拘多少燒赤急以盆蓋陰冷存性

屋梁上懸塵炒令烟盡

右等分研勻入腦麝各少許。每服三錢溫酒或淡醋湯下。患十年者半月可安。

伏龍肝 赤土炒令烟盡於竈直下去取

人參 二錢 橘皮 不去白半錢 乾薑 錢二十六朵去萼碎各一錢

柴胡 甘草 炙 乾薑 錢二十六朵去萼碎各一錢

郁李仁 去皮 生黃芩 尖研

右除黃芩外。以水三大盞煎至一盞去滓空心帶熱服候

七分。再入黃芩同煎至一盞去滓空心帶熱服候少時。以早膳壓之。

二十一

補真潤腸湯 治白帶下陰戶中痛控心而急痛身

黃皮緩身重如山陰中如冰

一名助陽湯

柴胡一錢

二分良薑二錢

白葵花七朵

防風

郁李仁乾薑

甘草各一錢

陳皮生黃芩各

五分

右為細末剉散只作一服水二盞煎至一盞

白芷散 治赤白帶下

白馬蹄禹餘糧各四兩

龍骨三兩

烏鰡魚骨

白僵蠶赤石脂各二兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服十九空心酒送下不止加三十九

馬蹄丸治白漏不絕

白芷散 治赤白帶下

白馬蹄禹餘糧各四兩

龍骨三兩

烏鰡魚骨

白僵蠶赤石脂各二兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服十九空心酒送下不止加三十九

白芷散 治赤白帶下

白芷二兩海螵蛸二個

胎髮一團

右為細

又方 治赤白帶

龜板二兩全酒炙

黃柏一兩炒

乾薑一錢炒

香附子各半兩

山茱萸各半兩

苦參各半兩

柏皮一錢

右為末以酒糊為丸空心米飲

桂皮一錢去粗皮

又方 治帶下脈數者
右為末酒糊為丸日二服每服七十九

枸杞根一斤

酒蒸培

生地黃五兩

右二味以水一斗

白斂丸

治室女衛任虛寒帶下純白

鹿茸二兩

酒蒸培

白斂丸

狗脊燙毛製各一兩

右為細末

父煎醋汁打糯米糊丸如梧子大每服五十九空

心溫酒送下

當歸酒浸

赤芍藥

牡蠣火煅取粉

熟地黃

酒蒸培

右

阿膠白芍藥續斷酒浸各一兩

地榆半兩

右

為末醋糊丸如梧子大每服五十九空心米飲下

當歸散

治帶下兼經水過多或暴下片血不限年

牡蠣散

治赤白帶下

烏鰡骨去甲炒

熟地黃

酒浸各一兩

右

牛角鰐灰

阿膠

右

石斛根

阿膠

右

桑耳各一錢半

乾薑炮

當歸

酒浸各一錢半

右為細末每服

牡蠣殼 地榆各二
阿膠蛤粉炒成珠子 吳茱萸 香白芷 肉桂去粗皮各一兩

附子炮半兩 右為末麪糊為丸梧桐子大每服三

十九濃煎醋湯下。

固真丸 治白帶久下不止臍腹冷痛其寒捫之如冰陰中亦然目中溜火上壅視物暎曉無所見齒皆惡熱飲痛

白石脂燒赤水飛研細蜜乾 柴胡錢各一 白龍骨二錢酒煮水飛

當歸酒洗三錢

乾薑炮四錢

黃柏酒洗

白芍分五錢各五錢

右為細末水煮稀糊為丸如雞頭大每服三十九空心宿食消盡煎白沸湯放溫送下無令胃中停住待少時以早膳壓之是不令熱藥犯胃忌生冷硬物與酒濕麵。

龍骨散 治婦人赤白帶下不問遠年近日並治之龍骨半兩 船上硫黃三錢 右為細末每服半錢空心無灰酒下。

茅花散 治婦人血崩不止赤白帶下

茅花一握

棕樹皮三十寸

嫩荷葉三張

甘草

苦棟丸 治婦人赤白帶下

苦棟二寸

右為細末空心酒調半匙服。

苦棟浸碎酒

茴香炒

當歸各等分

右為末酒糊

丸每服三十五丸空心溫酒下如腰腿疼四物湯四兩加羌活防風各一兩煎湯送下。

地榆膏 治赤白帶下骨立者地榆一斤用水二升煎至一半去渣再煎如稠錫絞淨空心服三合日二服。

又方 治赤白帶下腰痛或少腹痛有熱者

樗皮二兩

延胡索

桃仁八錢

側柏葉

川棟肉

茴香各半兩

當歸

香附子八錢

官桂去粗皮一兩

烏藥

熟地黃四兩

麒麟竭七錢

麥皮麵

炒一兩

地榆

禹餘糧火煅一兩

每服五六十丸神效。

麒麟竭湯

治婦人血傷赤白帶下小腹疼痛

麒麟竭一兩半

黃柏去粗皮一兩

炒各一兩

熟地黃四兩

作生乾地黃一兩

每次

赤芍藥

炒各一兩半

禹餘糧火煅一兩

醋淬

剉碎每服三錢水一盞煎至七分去滓不拘時服

一方為細末粥飲調下二錢。右

治白崩方

棕櫚燒灰

絲瓜

右等分為細末空心酒調下。

調經補真湯

冬後一月白帶再來陰戶中寒一服

立止大進飲食。

麻黃半錢不
去節 分 良薑一錢 杏仁三枚 桂枝少許

甘草五分 當歸身 升

白朮各五分

防風二錢

麻根黃芩各五分

柴胡四分

乾薑炮二分

獨活

藁本各二分

白葵花去萼七朵

澤瀉一錢

羌活四分

升

又方 治赤白帶下年月深久不瘥

白芍藥二兩

乾薑半兩

右各炒黃色同為末

升麻半錢

白朮各五分

防風二錢

麻根黃芩各五分

柴胡四分

乾薑炮二分

獨活

藁本各二分

白葵花去萼七朵

澤瀉一錢

羌活四分

升

右除黃芩麻黃外都為粗末先將二味水三盞煎

麻黃一味令沸掠去沫入餘藥同煎至二盞又再

入生黃芩煎至一盞去滓稍熱服空心宿食消盡

日高服之一時許可食早膳

地黃丸 治婦人月經不調每行數日不止兼有白

帶漸漸瘦悴飲食少味累年無子

熟地黃二兩 山茱萸 乾薑 白芍藥 微炒

代赭石一兩 醋淬各半 厚朴 白僵蠶 各半

右細末煉蜜如桐子大每服四五十丸空心酒下

日三服

桂附湯 治白帶腥臭多悲不樂大寒

肉桂一錢

附子三錢

黃柏

知母各五分

右

為粗末作一服水二盞煎至一盞法如常食遠熱服如少食常飽有時似腹脹加白芍藥半錢不思飲食加五味子二十個煩惱面上麻木如蟲行乃

困

白堊丸 治婦人白帶久而不止腰膝冷痛日漸羸

鶴頂丸 治室女及有家之婦產後三種帶下

當歸三錢鹽泡酒浸半錢半

赤石脂火煅三錢鹽泡附子去皮半兩炮

龍骨鹽泥各半

吳茱萸一錢

右細末研勻醋糊和丸如梧子大以赤石脂末為衣每服五十丸

空心用艾葉鹽湯烏梅煎湯下

李氏藥一兩半

右為細末研勻醋糊和丸如梧子大以赤石脂末為衣每服五十丸

空心用艾葉鹽湯烏梅煎湯下

中西合璧婦科大全

大学图书馆版权所有

白堊
殼

歸酒浸

禹餘糧

鱉甲

烏鰌骨
淬及炙
各用醋

子炮

鵝巢灰

乾薑

紫石英

附香

骨當歸尾

紅豆錢各二

元胡索五錢

厚朴三錢

良薑

內桂

龍

服七十九溫酒下。

狗脊制淨

川芎

鹿茸

附香

大經

木通錢各一

枯礬半錢

右為末

煉蜜丸

蟬子

上並為末

右用醋煮糯米糊丸如梧子大

每

養氣活血丹

治勞傷衝任赤白帶下

大艾葉炒焦取

乾薑炒未二兩半

右二味用醋二升

勝陰丹

三奈子川烏頭

大椒各五錢

柴胡

羌活

中藥書

無灰酒二升

生薑自然汁二升

將薑艾末調於

銀器用慢火熬成膏

入前膏內並炒熟白麵二兩半和為劑杵干下

甘松三分

全蠍三個

升麻一錢

破故紙

燒一錢

麝香少許

崩漏淋瀝不斷

巴戟去心炒

人參五味子各二兩

右為細末

丸梧子大每服五十丸溫酒或米飲下

回陽丹

柴胡各七錢

升麻三條

草烏頭

羌活各三錢

冰水中

茱萸浴湯

治下焦虛冷臍腹疼痛帶下五色月水

吳茱萸湯泡

杜仲炒去

蛇牀子五味子

全蠍

甘松各二錢

草烏頭

羌活各三錢

冰水中

茱萸當歸丸

治癩癪白帶下症脚氣腰以下如在

丁皮各一兩

木香丁香各半兩

右剉如麻豆大

升麻

甘松各二錢

草烏頭

羌活各三錢

冰水中

每用半兩以生絹袋盛水三大碗煎數沸乘熱薰

下部通身沐浴早晚二次薰洗

吳茱萸湯泡

巴戟去心炒

茱萸浴湯

全蠍

升麻各二錢

甘松各二錢

草烏頭

羌活各三錢

茱萸當歸丸

治癩癪白帶下症脚氣腰以下如在

丁皮各一兩

木香丁香各半兩

右剉如麻豆大

升麻

甘松各二錢

草烏頭

羌活各三錢

冰水中

茱萸當歸丸

治癩癪白帶下症脚氣腰以下如在

丁皮各一兩

木香丁香各半兩

右剉如麻豆大

升麻

甘松各二錢

草烏頭

羌活各三錢

冰水中

茱萸當歸丸

治癩癪白帶下症脚氣腰以下如在

丁皮各一兩

木香丁香各半兩

右剉如麻豆大

升麻

甘松各二錢

草烏頭

羌活各三錢

冰水中

茱萸當歸丸

治癩癪白帶下症脚氣腰以下如在

丁皮各一兩

木香丁香各半兩

右剉如麻豆大

升麻

甘松各二錢

草烏頭

羌活各三錢

冰水中

茱萸當歸丸

治癩癪白帶下症脚氣腰以下如在

丁皮各一兩

木香丁香各半兩

右剉如麻豆大

升麻

甘松各二錢

草烏頭

羌活各三錢

冰水中

茱萸當歸丸

治癩癪白帶下症脚氣腰以下如在

丁皮各一兩

木香丁香各半兩

右剉如麻豆大

升麻

甘松各二錢

草烏頭

羌活各三錢

冰水中

茱萸當歸丸

治癩癪白帶下症脚氣腰以下如在

丁皮各一兩

木香丁香各半兩

右剉如麻豆大

升麻

甘松各二錢

草烏頭

羌活各三錢

冰水中

茱萸當歸丸

治癩癪白帶下症脚氣腰以下如在

丁皮各一兩

木香丁香各半兩

右剉如麻豆大

升麻

甘松各二錢

草烏頭

羌活各三錢

冰水中

茱萸當歸丸

治癩癪白帶下症脚氣腰以下如在

丁皮各一兩

木香丁香各半兩

右剉如麻豆大

升麻

甘松各二錢

草烏頭

羌活各三錢

冰水中

錢

右四味剉如麻豆大以好酒一升半同煎煮。

至酒盡為度炭火焙乾同為極細末入

炒黃鹽

丁香各半

全蠍三錢

柴胡二錢

升麻根

木香各一錢

苦棟子

甘草吳各半錢

元

胡索四錢

右與前四味藥末同為細末酒煮麪糊

為丸如桐子大每服二十九空心宿食消盡淡醋湯下忌油膩冷物酒麪。

女金丹

治婦人赤白帶下崩中淋瀝

白芍

當歸

川芎

人參

白朮 茗苓 藥

木白芷

白薇

桂心

延胡索 牡丹皮

赤石脂

各一兩酒浸

沒藥研甘草各五錢

香

附子

右為木蜜丸梧子大每服五十丸酒下

白礬丸

附子二兩

黃狗骨頭上並為末

白礬

四兩

當歸

芍藥

人參 桂枝

吳茱萸

三兩

當歸

芍藥

人參 桂枝

溫經湯

右粥丸桐子大每服三十九

升半

阿膠

牡丹皮

生薑

甘草各二兩半夏

麥門冬一升

右十二味以水一斗煮取三升分溫三服

玳瑁丸

續斷各一兩

安息香 麒麟竭 乳香

酒送下

玳瑁

續斷各半兩

故錦灰半七錢

右為細末以蜜及安息香熬和藥末丸如菜豆大每服二十九食前溫酒送下

沒藥各半兩

故錦灰半七錢

右為細末以蜜及安息香熬和藥末丸如菜豆大每服二十九食前溫酒送下

神仙聚寶丹

治婦人帶下赤白崩漏不止驚怖健忘小便頻數或白時見虛熱盜汗羸瘦此藥不問胎前產後室女並皆治之常服安心去邪逐敗血

養新血令有子

木香另研

琥珀另研

當歸

培作未

沒藥各半兩

滴乳

二錢半研

麝香研

辰砂研各一錢

右為末

酒磨下

胎息不順腹內疼

痛一切產難酒和童便磨

下產後血暈敗血奔心口噤舌強或惡露未盡發渴面浮煎烏梅湯和童便磨下室女月候不調溫

酒磨下

半丸

胎息不順腹內疼

痛一切產難酒和童便磨

下產後血暈敗血奔心口噤舌強或惡露未盡發渴面浮煎烏梅湯和童便磨下室女月候不調溫

五味異功散 治帶下累效

人參 白朮 茶芩 紫草 陳皮各一 右

大棗一枚 生薑一片 水煎服

完帶湯 治婦人白帶下

白朮一兩 土炒 茶芩一兩 山藥一兩 炒

車前子三錢 酒炒 苍朮三錢 製

黑芥穗五分 酒炒 柴胡六分

劑止六劑白帶全愈

加減逍遙散 治青帶

茯苓五錢 土炒 白芍五錢 酒炒

陳皮一錢 茵陳三錢

甘草五錢 生用

黃柏一錢水炒 鹽

白果十枚 碎

右水煎服四劑愈

大黃三錢 黃連三錢 知母二錢 王不

石膏五錢 桔子三錢 劉寄奴三錢

右水煎

留行三錢 脾三劑愈

清肝止淋湯 治赤帶

白芍一錢 醋炒

生地五錢 酒炒

阿膠三錢 炼炒

粉丹皮三錢

小黑豆一兩 當歸兩

松寄生散 治白帶下妙劑

松寄生 益智

黃柏 芍藥 生地黃

茅根湯 繼斷

山藥 蓮肉各等

蒸前陰最效

蒸作一次服

以下為日本通用藥

不再發

者

琥珀丸 治赤白帶下日久者

琥珀 木香 沒藥 當歸 麝香各一

紅棗十個 小黑豆一兩 當歸一
白芍一錢 醋炒 生地五錢 酒炒 阿膠三錢 炼炒 粉丹皮三錢

膝二錢 炒

香附一錢 酒炒

右水煎服四劑全愈十劑

不再發

茅根湯 治帶下諸藥不效者

茅根四錢

丁香 肉桂各一

右三味水煎頻

腰帶二妙湯 治赤白帶下或產後腰弱不能步行

右七味水丸彈子大白湯送下

再以水二合煮取一合

毛茛根 前胡 桑白 蔚藥各一

等分

小黑豆一兩 當歸一
白芍一錢 醋炒 生地五錢 酒炒 阿膠三錢 炼炒 粉丹皮三錢

膝二錢 炒

香附一錢 酒炒

右水煎服四劑全愈十劑

不再發

茅根湯 治帶下諸藥不效者

茅根四錢

丁香 肉桂各一

右三味水煎頻

腰帶二妙湯 治赤白帶下或產後腰弱不能步行

右七味水丸彈子大白湯送下

再以水二合煮取一合

毛茛根 前胡 桑白 蔚藥各一

等分

小黑豆一兩 當歸一
白芍一錢 醋炒 生地五錢 酒炒 阿膠三錢 炼炒 粉丹皮三錢

膝二錢 炒

香附一錢 酒炒

右水煎服四劑全愈十劑

不再發

茅根湯 治帶下諸藥不效者

茅根四錢

丁香 肉桂各一

右三味水煎頻

腰帶二妙湯 治赤白帶下或產後腰弱不能步行

右七味水丸彈子大白湯送下

再以水二合煮取一合

毛茛根 前胡 桑白 蔚藥各一

等分

小黑豆一兩 當歸一
白芍一錢 醋炒 生地五錢 酒炒 阿膠三錢 炼炒 粉丹皮三錢

膝二錢 炒

香附一錢 酒炒

右水煎服四劑全愈十劑

不再發

茅根湯 治帶下諸藥不效者

茅根四錢

丁香 肉桂各一

右三味水煎頻

腰帶二妙湯 治赤白帶下或產後腰弱不能步行

右七味水丸彈子大白湯送下

再以水二合煮取一合

毛茛根 前胡 桑白 蔚藥各一

等分

小黑豆一兩 當歸一
白芍一錢 醋炒 生地五錢 酒炒 阿膠三錢 炼炒 粉丹皮三錢

膝二錢 炒

香附一錢 酒炒

右水煎服四劑全愈十劑

不再發

茅根湯 治帶下諸藥不效者

茅根四錢

丁香 肉桂各一

右三味水煎頻

腰帶二妙湯 治赤白帶下或產後腰弱不能步行

右七味水丸彈子大白湯送下

再以水二合煮取一合

毛茛根 前胡 桑白 蔚藥各一

等分

小黑豆一兩 當歸一
白芍一錢 醋炒 生地五錢 酒炒 阿膠三錢 炼炒 粉丹皮三錢

膝二錢 炒

香附一錢 酒炒

右水煎服四劑全愈十劑

不再發

茅根湯 治帶下諸藥不效者

茅根四錢

丁香 肉桂各一

右三味水煎頻

腰帶二妙湯 治赤白帶下或產後腰弱不能步行

右七味水丸彈子大白湯送下

再以水二合煮取一合

毛茛根 前胡 桑白 蔚藥各一

等分

小黑豆一兩 當歸一
白芍一錢 醋炒 生地五錢 酒炒 阿膠三錢 炼炒 粉丹皮三錢

膝二錢 炒

香附一錢 酒炒

右水煎服四劑全愈十劑

不再發

茅根湯 治帶下諸藥不效者

茅根四錢

丁香 肉桂各一

右三味水煎頻

腰帶二妙湯 治赤白帶下或產後腰弱不能步行

右七味水丸彈子大白湯送下

再以水二合煮取一合

毛茛根 前胡 桑白 蔚藥各一

等分

小黑豆一兩 當歸一
白芍一錢 醋炒 生地五錢 酒炒 阿膠三錢 炼炒 粉丹皮三錢

膝二錢 炒

香附一錢 酒炒

右水煎服四劑全愈十劑

不再發

茅根湯 治帶下諸藥不效者

茅根四錢

丁香 肉桂各一

右三味水煎頻

腰帶二妙湯 治赤白帶下或產後腰弱不能步行

右七味水丸彈子大白湯送下

再以水二合煮取一合

毛茛根 前胡 桑白 蔚藥各一

等分

小黑豆一兩 當歸一
白芍一錢 醋炒 生地五錢 酒炒 阿膠三錢 炼炒 粉丹皮三錢

膝二錢 炒

香附一錢 酒炒

右水煎服四劑全愈十劑

不再發

茅根湯 治帶下諸藥不效者

茅根四錢

丁香 肉桂各一

右三味水煎頻

腰帶二妙湯 治赤白帶下或產後腰弱不能步行

右七味水丸彈子大白湯送下

再以水二合煮取一合

毛茛根 前胡 桑白 蔚藥各一

等分

小黑豆一兩 當歸一
白芍一錢 醋炒 生地五錢 酒炒 阿膠三錢 炼炒 粉丹皮三錢

膝二錢 炒

香附一錢 酒炒

右水煎服四劑全愈十劑

不再發

茅根湯 治帶下諸藥不效者

茅根四錢

丁香 肉桂各一

右三味水煎頻

腰帶二妙湯 治赤白帶下或產後腰弱不能步行

右七味水丸彈子大白湯送下

再以水二合煮取一合

毛茛根 前胡 桑白 蔚藥各一

等分

小黑豆一兩 當歸一
白芍一錢 醋炒 生地五錢 酒炒 阿膠三錢 炼炒 粉丹皮三錢

膝二錢 炒

香附一錢 酒炒

右水煎服四劑全愈十劑

不再發

茅根湯 治帶下諸藥不效者

茅根四錢

丁香 肉桂各一

右三味水煎頻

腰帶二妙湯 治赤白帶下或產後腰弱不能步行

右七味水丸彈子大白湯送下

再以水二合煮取一合

毛茛根 前胡 桑白 蔚藥各一

等分

小黑豆一兩 當歸一
白芍一錢 醋炒 生地五錢 酒炒 阿膠三錢 炼炒 粉丹皮三錢

膝二錢 炒

香附一錢 酒炒

右水煎服四劑全愈十劑

不再發

茅根湯 治帶下諸藥不效者

茅根四錢

丁香 肉桂各一

右三味水煎頻

腰帶二妙湯 治赤白帶下或產後腰弱不能步行

右七味水丸彈子大白湯送下

再以水二合煮取一合

毛茛根 前胡 桑白 蔚藥各一

等分

小黑豆一兩 當歸一
白芍一錢 醋炒 生地五錢 酒炒 阿膠三錢 炼炒 粉丹皮三錢

膝二錢 炒

香附一錢 酒炒

右水煎服四劑全愈十劑

不再發

茅根湯 治帶下諸藥不效者

茅根四錢

丁香 肉桂各一

右三味水煎頻

腰帶二妙湯 治赤白帶下或產後腰弱不能步行

右七味水丸彈子大白湯送下

再以水二合煮取一合

毛茛根 前胡 桑白 蔚藥各一

等分

小黑豆一兩 當歸一
白芍一錢 醋炒 生地五錢 酒炒 阿膠三錢 炼炒 粉丹皮三錢

膝二錢 炒

香附一錢 酒炒

右水煎服四劑全愈十劑

不再發

茅根湯 治帶下諸藥不效者

茅根四錢

丁香 肉桂各一

右三味水煎頻

腰帶二妙湯 治赤白帶下或產後腰弱不能步行

右七味水丸彈子大白湯送下

再以水二合煮取一合

毛茛根 前胡 桑白 蔚藥各一

等分

小黑豆一兩 當歸一
白芍一錢 醋炒 生地五錢 酒炒 阿膠三錢 炼炒 粉丹皮三錢

膝二錢 炒

香附一錢 酒炒

右水煎服四劑全愈十劑

不再發

茅根湯 治帶下諸藥不效者

茅根四錢

丁香 肉桂各一

右三味水煎頻

腰帶二妙湯 治赤白帶下或產後腰弱不能步行

右七味水丸彈子大白湯送下

再以水二合煮取一合

毛茛根 前胡 桑白 蔚藥各一

等分

小黑豆一兩 當歸一
白芍一錢 醋炒 生地五錢 酒炒 阿膠三錢 炼炒 粉丹皮三錢

膝二錢 炒

香附一錢 酒炒

右水煎服四劑全愈十劑

不再發

茅根湯 治帶下諸藥不效者

茅根四錢

丁香 肉桂各一

右三味水煎頻

腰帶二妙湯 治赤白帶下或產後腰弱不能步行

右七味水丸彈子大白湯送下

再以水二合煮取一合

毛茛根 前胡 桑白 蔚藥各一

等分

小黑豆一兩 當歸一
白芍一錢 醋炒 生地五錢 酒炒 阿膠三錢 炼炒 粉丹皮三錢

膝二錢 炒

香附一錢 酒炒

右水煎服四劑全愈十劑

不再發

茅根湯 治帶下諸藥不效者

茅根四錢

丁香 肉桂各一

右三味水煎頻

腰帶二妙湯 治赤白帶下或產後腰弱不能步行

右七味水丸彈子大白湯送下

</div

柴胡七分

良薑乾薑附子各一錢

蠍梢各五分

甘草六分

當歸二錢

黃柏二分

炒鹽三分

右為煎藥

補血麻霜散

長血及白血之妙藥

老麻霜

葛粉各少許

右二味混和白湯送服

固下丸

治赤白帶下

樗皮

二錢

白芍藥五錢

黃柏根

右粥為丸

治婦人白帶

四仙散

治婦人白帶

蒼朮

酒炒兩

川芎

右為末

酒送服

清王散

治赤白帶下

當歸

川芎

芍藥

生地黃

陳皮

半夏

茯苓

蒼朮

香附子

黃芩

柴胡

升麻

牡丹皮

甘草

生薑

黃連

右水煎服

血歸湯

治白帶下

香附子霜

香生附子各一錢

桂心

乾薑各五分

右五味煎服

又方

治白帶下

半夏

一錢

陳皮

茯苓

升麻

白雞冠花五分

右五味水煎服

又方 治一切帶下

牡蠣一錢

梔子 芍藥各五分

甘草三分

四味水煎服

又方

乾薑炒焦

芍藥鬱金各一分

大黃圓

治帶下百病無子

大黃碎如米豆熬令黑

柴胡朴硝乾薑各一

桂附湯

治白帶腥臭多悲不樂

肉桂一錢

附子三錢

黃柏知母各五分

桂枝

三分

桂附湯

治婦人赤白帶下不問年月深遠日漸羸瘦

起止不得用刺鯉根

不拘多少曝乾秤每一斤以童子小便五升浸一伏時取出曬乾

研為細末每服二錢食前暖酒調下

赤白帶用生五靈脂半生半熟為末酒調服累效

狗頭骨燒灰存性酒調服或入藥服治赤白帶下舊蓮房為末入麝香空心米飲下治帶下方用雲母

粉溫水調下三錢立見神效。益母散專治赤白帶下。惡露下不止於益母草開花時採搗為細末空心溫酒下二錢日三服。治赤白帶取草果一枚去皮入麝香一小塊用麵餅裹火炮焦黃留性取出和麵為細末每服二錢陳皮飲調下重者三錢治白帶用椒目為末米飲調服。

治白帶用白芷石灰炒去皮更入茜草少許粥糊丸服五色漏下地榆三兩

剉用醋一升煮十餘沸去滓稍熱食前服一合豆花散治婦人白崩最妙用白扁豆花焙乾為末炒米

煮飲入燒鹽空心服數次即效紫花勿用又方以棕櫚毛為霜茶一服加四物湯以艾葉細辛黃連煎湯服之白雞冠花一味為末白湯服下赤白帶兼

炮半兩同為粗末炒至黃色碾之每服二錢空心溫米飲調下至晚又服

【外國醫方】硫酸苦土十二瓦右作一次服促其通利大黃末各十瓦燐酸曹達六瓦右為藥粉分四十五包一日三次每服一包蓖麻油十二瓦右作一次服促其通利與第一方

含糖炭酸鐵大黃末各十瓦燐酸曹達六瓦右作一次服促其通利

同。

單寧酸八瓦椰子油二十瓦右為些藥六個每日一次送入陰中。

明礬末少許右撒布綿球塞入陰中約五時至半時後取出。

魚肝油十二瓦右分盛膠囊十個每日服五個至八個。

林檎酸鐵酒龍膽酒各十瓦右混和以五滴或十五滴加糖水用之。

明礬四瓦右以水一合溶化洗滌患部單寧酸八瓦右以水一合溶化洗滌患部。

明礬四瓦凡士林羊毛脂各二十瓦右為軟膏塗於綿球納入陰中。

明礬四瓦凡士林三十二瓦右為軟膏塗於綿球納入陰中。

硼酸五瓦蒸餾水二百瓦右溶和為防腐料洗滌陰道。

粗製明礬十五瓦蒸餾水五百瓦右溶和為灌注料注陰道內。

硫酸亞鉛二瓦蒸餾水二百瓦右溶和為灌注

料。注陰道內。

蘆薈三瓦 没藥兩瓦 細草根末一瓦半 大黃

末一瓦半 茄香半瓦 還元鐵半瓦 亞拉昆

亞護謨末適宜。右混和為丸五十粒。一日三次。

每次服三粒至十粒。

過滿俺酸加里半瓦兩瓦多至

常水五百瓦 右為注入料。

入料用法同前。

水楊酸半瓦

常水五百瓦

右為注入料。

沃剝一瓦

沃度一瓦十分之一

甘油三十瓦

右溶和以綿球飽蘸。內入陰中。

白濁白淫

「中醫學說」婦人小便白濁白淫者。皆由心腎不交養。水火不升降。或因勞傷於腎。腎氣虛冷。故如腎主水而閑竅在陰陽。為溲便之道。胞冷腎損。故有白濁白淫。宜服局方金鎖正元丹。或因心虛而得者。宜服平補鎮心丹。降心丹。威喜丹。若因思慮過當。致使陰陽不分。清濁相干。而成白濁者。患傷脾也。宜用四七湯。吞白丸子。此藥極能分利。更宜小烏沈湯。每帖加茯苓一錢。重者益智二十枚。去殼研鹽煎服。前證若因元氣下陷。用補中益氣湯。脾胃虧損。六君加

升麻柴胡。脾經鬱結歸脾加黃柏。山梔肝經怒火。龍膽瀉肝湯。虛則用加味道遙散。宜與帶下參看主治。

【中國醫方】 薑黃散 治血臟久冷腹脹疼痛。小便濃白如泔。

片薑黃二兩

大附子炮一兩

赤芍藥

紅藍子三稜各半兩

木香

牡丹皮

芫花浸醋

炒郁李仁去皮一錢

沒藥

錢半

右為細末。每服

一錢酒煎服。如腹痛用當歸沒藥為末。以水七分。

酒三分同煎熱服。

內金鹿茸丸 治婦人勞傷血脉胞絡受寒。小便白

濁日夜無度。臍腹疼痛。腰膝無力。

雞內金

鹿茸

黃芪

肉蓯蓉

五味子

遠志肉

牡蠣

桑螵蛸

龍骨

附子

各等分

為細末。煉蜜和丸如梧子大。每服五十丸。食前用溫酒或米飲送下。

二豆散 治耳鳴心躁腰疼。重腹內虛鳴臍下冷痛。

頻下白水。如泔名湛濁證。

方見前赤白帶下

烏金散 治身熱口燥氣塊築痛。下黃水如葵汁。

百草霜

紫金皮

米泔浸煮炒黃

粉草

炙各等分

右為

未每服二錢。艾湯或醋湯。空心調下。如心嘈。猪血

入鹽酒下。

加味四七湯

治婦女小便不順甚者陰戶疼痛

半夏湯洗七
次一兩

厚朴薑汁
赤茯苓 香附子炒

紫蘇

甘草各二錢

右㕮咀分四帖。每服水

二鍾薑五片煎八分去滓。加琥珀末一錢調服。

鎖精丸 治小便白濁

破故紙炒

青鹽 白茯苓 五味子各等

右 为末酒糊丸空心鹽湯或酒任下三十九

固精丸 治下虛胞寒小便白濁或如泔或如凝脂

腰重

牡蠣煅粉

兔絲子酒蒸

韭子炒 龍骨 五

味子

白茯苓 桑螵蛸酒炙

白石脂各等

右為末酒糊丸梧桐子大每服七十九空心鹽湯

下。

治婦人久積虛寒小便白濁滑數不禁 右用鹿茸

屑炒黃為細末每服二錢空心溫酒調下。

又方 用雞腔脰炙為末空心酒調服二錢。

無錫顧鳴盛輯

雜證門上

虛勞

中醫學說 病有臟虛腑虛。上虛下虛。狀各不同。宜深消息。腸鳴氣走足冷手寒。食不入胃。吐逆無時。皮毛憔悴。肌肉皺縮。耳目昏塞。語聲破散。行步喘促。精神不收。此五臟之虛也。診其脈。舉指而活。按之而微。察在何部。以斷其臟。又按之沈小弱微。短濶軟濡。俱為臟虛。虛則補益。治之常情。皮膚搔癢。肌肉膩脹。食飲不化。大便滑而不止。診其脉。輕手按之得滑。重手按之得平。此乃腑虛。察在何經。以正其時。頭赤心忪。舉動顛慄。語聲嘶嘎。脣焦口乾。喘乏無力。面少顏色。頤頷腫滿。診其左右寸脉弱而微者。上虛也。大小便難。飲食進退。腳腰沉重。如坐水中。行步艱難。氣上奔衝。夢寐危峻。診其左右尺中脉滑而澀者。下虛也。病入脉微澀短小。俱屬下虛也。

勞者勞於神氣。傷者傷於形容。饑飽過度則傷脾。思慮過度則傷心。色欲過度則傷腎。起居過度則傷肝。喜怒悲愁過度則傷肺。又風寒暑濕則傷於外。饑飽勞役則敗於內。晝感

之則病榮。夜感之則病衛。榮衛經行。內外交運。而各從其晝夜。始勞於一。一起於二。二傳於三。三通於四。四千其五。五復犯一。一至於五。邪氣乃深。真氣自失。使人肌肉消。神氣弱。飲食減。行步難。及其如此。則雖有命。亦不能生也。故調神氣論曰。調神氣戒酒色節。起居。少思慮。薄滋味者。長生之大端耳。診其脉。甚數。甚急。甚細。甚弱。甚微。甚濶。甚滑。甚短。甚長。甚浮。甚沈。甚緊。甚弦。甚洪。其實皆生於勞而傷也。虛勞死證。榮衛耗散。面目浮腫者。死。心絕。則於腎。肩息回盼目直者。一日死。肺絕。則去氣不反。口如魚口者。三日死。骨絕。則腰瘠痛。腎中重。不可反側。足膝後平者。五日死。腎絕。則大便赤澀。下血。耳乾。脚浮。舌腫者。六日死。又曰足腫者。九日死。脾絕。則口冷。足腫脹泄。不覺者。十二日死。筋絕。則魂驚虛恐。手足爪甲青。呼罵不休者。八九日死。肝絕。則汗出如水。恐懼不安。伏臥目直。面青者。八日死。又曰即時死。胃絕。則齒落面黃者。七日死。又曰十日死。神方通治五勞六極七傷虛損者。五勞五臟病。六極六腑病。七傷表裏受病。五勞者。一曰志勞。二曰思勞。三曰憂勞。四曰心勞。五曰疲勞。六極者。一曰氣極。二曰血極。三曰筋極。四曰骨極。五曰

髓極六曰精極七傷者一曰肝傷善夢二曰心傷善忘三曰脾傷善飲四曰肺傷善瘞五曰腎傷善唾六曰骨傷善饑七曰脉傷善嗽凡遠思強慮傷人憂恚悲哀傷人喜樂過度傷人忿怒不解傷人汲汲所願傷人感感所患傷人寒暄失節傷人故曰五勞六極七傷也夫療一證為人之大患凡受此病者傳變不一積年症易甚至滅門可勝嘆哉大抵合而言之曰傳屍別而言之曰骨蒸殼滯復連屍症勞疰盤症毒症熱症冷症食症鬼症是也夫症者注也自上注下病源無異是之謂症又其變則有二十二種或三十六種或九十九種又有所謂五屍者曰蜚屍遁屍寒屍喪屍屍注是也其名不同傳變尤不一感此疾而獲安者十無一二也大凡五臟所傳皆令人憎寒發熱其證狀各異有如傳之於肝則面白目枯口苦自汗心煩驚怪傳之於心則面黑鼻乾口瘡喜忘大便或祕或泄傳之於脾則面青脣黃舌強喉哽吐涎體瘦飲食無味傳之於肺則面赤鼻白痰吐咯血喘嗽毛枯傳之於腎則面黃耳枯胸滿腑痛白濁遺瀝又有二十四種勞蒸者亦可因證驗之蒸在心也少氣煩悶舌必焦黑蒸在小腸也腹內雷鳴大腸或

秘或泄蒸在肝也目昏眩運躁怒無時蒸在膽也耳聾口苦脅下堅痛蒸在腎也耳輪焦枯腰脚痠痛蒸在右腎也情意不定泄精白絮蒸在肺也喘嗽咯血聲音嘶遠蒸在大腸也右鼻乾疼大腸隱痛蒸在脾也脣口乾燥腹脅脹滿畏寒不食蒸在胃也鼻口乾燥腹脅自汗睡卧不甯蒸在膀胱也小便黃赤凝濁如膏蒸在三焦也或寒或熱中脘膻中時覺煩悶蒸在膈也心胃噎塞疼痛不舒蒸在宗筋也筋脉縱緩小腹隱痛陰器自強蒸在回腸也肛門秘澀傳道之時裏急後重蒸在玉房也男子遺精女子白淫蒸在腦也眼眵頭眩口吐濁涎蒸在皮也肌膚鱗起毛折髮黑蒸在骨也版齒黑燥大杼痠疼蒸在筋也肩背脹倦脛骨痠痛蒸在筋也眼昏脛痛爪甲焦枯蒸在脈也心煩體熱痛刺如針蒸在內也自覺身熱多不奈何四肢瞯動蒸在血也毛髮焦枯有時鼻衄或復尿血詳諸病證大略如斯若究其根惟心肺受蟲嚙膏肓俞雀氏穴而得愈者若待其根深蒂固而治之則無及矣虛損之疾寒熱因虛而感也感寒則損陽陽虛則陰盛損自上而下治之宜以辛甘淡過於

胃則不可治也。感熱則損陰。陰虛則陽盛。故損自下而上治之宜以苦酸鹹。過於脾則不可治也。自上而損者一損。損於肺皮聚而毛落。二損。損於心血脉虛少不能榮於臟腑。婦人月水不通。三損。損於胃。飲食不為肌膚。自下而損者一損。損於腎。骨痿不能起於牀。二損。損於肝筋緩不能自收持。三損。損於脾。飲食不能消。赴論曰。心肺損而色蔽。腎肝損而形痿。穀不能化而脾損。感此病者皆損之病也。漸潰之深皆虛勞之疾也。勞瘵主乎陰虛瘦與血病。虛勞漸瘦屬火陰火銷鑠。即是積熱做成始健可用子和法。後若羸瘦四物湯加減送消積丸不做。陽虛蒸蒸發熱。積病最多。勞病四物湯加炒麋竹滌人尿薑汁大補為上。肉脫熱甚者難治。勞瘵之證非止一端。其始也未有不因氣體虛弱。勞傷心腎而得之。以心主血。腎主精。精竭血燥則勞生焉。故傳變不同。骨蒸確碟復連尸疰。夫疰者注也。自上至下相傳骨肉乃至滅門者有之。其證臟中有蟲。齒心肺間名曰瘵。疾難以醫治。傳屍勞瘵寒熱交攻久嗽咯血日見羸瘦先以三拗湯與蓮心散煎萬不失一。夫人之生也稟天地氤氳之氣在乎保養真元。固其根本則萬病不生。四

體康健若不養真元不固根本。疾病由是生焉。且真元根本氣血精液也。嘗言曰。萬病莫若勞證最為難治。蓋勞之由因人之壯年氣血完聚。精液充滿之際不能保養性命。酒色是貪。日夜耽嗜無有休息以致耗散真元。虛敗精液則嘔血吐痰。以致骨蒸體熱。腎虛精竭面白頰紅。口乾咽燥白濁遺精。盜汗。飲食艱難。氣力全無。謂之火盛金衰。重則半年而斃。輕則一載而亡。况醫者不究其源。不窮其本。或投之以大寒之劑。或療之以大熱之藥。妄為施治。絕不取效。殊不知大寒則愈虛。其中大熱則愈竭其內。所以世之醫勞者萬無一人。先師用藥治勞如羿之射。無不中的。今開用藥次第於後。用藥之法如嘔吐咯嗽血者先以十灰散退住如甚者須以花蕊石散止之。大抵血熱則行。血冷則凝。見黑必止。理之必然。止血之後其人必體倦。次用獨參湯一補令其熟睡一覺不要驚動。睡起病去五六分。後服諸藥。保和湯止嗽甯肺。保真湯補虛除熱。太平丸潤肺除痰。消化丸下痰六事加味和之。保真湯內分驚悸淋濁便澀遺精燥熱盜汗六事加味用之。餘無功用服藥之法。每日仍

濃煎薄荷湯灌漱喉中。用太平丸先嚼一丸。徐徐嚥下。次噙一丸。緩緩溶化。至上牀時。亦如此用之。夜則肺竅開。藥必流入竅中。此訣要緊。如瘧壅。却先用飴糖。拌消化丸一百丸吞下。次又依前噙。嚼太平丸。令其仰面卧而睡。服前七藥後。若肺有嗽。可煮潤肺丸食之。如常七藥之前。有餘暇。煮此服之。亦可續煮白鳳膏食之。因其根源完其根本。病可之後。方可合十珍丸服之。此為收功起生之妙用也。

五勞者。五臟之勞也。皆因不量才力。勉強運為憂思過度。嗜飲無節。或病失調理。將積久成勞。其病頭旋眼。運身疼脚弱。心怯氣短。自汗盜汗。或發寒熱。或五心常熱。或往来潮熱。或骨蒸作熱。夜多惡夢。晝少精神。耳內蟬鳴。口苦無味。飲食減少。此皆勞傷之證。五臟雖皆有勞之根。但心主血。腎主精。精竭血燥。則勞生。治勞之法。當以調心補腎為先。不當用峻烈之劑。惟常溫養滋補。以久取效。天雄附子之類。投之太多。適足以發其虛陽。緣內無精血。不足當此猛劑。不可因有熱。純用甜冷之藥。以傷腎氣。獨用熱藥者。猶釜中無水。而進火也。過用冷藥者。猶釜下無火。而添水也。非徒無益。又害之耳。宜十全大補湯。或雙和散。養榮湯。七珍

散。樂令建中湯。皆可選用。間進雙補圓。若有無故身體瘦軟。絕無力氣。別無他證。此平日作勞太過。血氣虛而筋失養。宜劫勞散。或和氣湯倍芎歸。又有言語讀誦過耗神氣。致成虛損。是為呴呼走氣。宜於全大補湯等藥選用。虛勞之疾。百脉空虛。非粘膩之物填之。不能實也。精血枯涸。非滋濕之物濡之。不能潤也。宜用人參黃芪地黃二冬枸杞五味之屬。各煎膏。另用青蒿。以童便熬膏。及生地汁。白蓮藕汁。乳汁。薄荷汁。隔湯煉過。酌定多少。并麋角膠。霞天膏。合和成劑。每用一匙。湯化服之。如欲行瘀血。加入酢製大黃。末元明粉。桃仁泥。韭汁之屬。欲止血。加入京墨之屬。欲行瘀。加入竹沥之屬。欲降火。加入童便之屬。凡虛勞之證。大抵心下引脅俱疼。蓋滯血不消。新血無以養之。尤宜用膏子。加韭汁桃仁泥。微呼吸少氣。懶言語。無力動作。目無精光。面色胱白。皆兼氣虛。用麥冬人參各三錢。陳皮桔梗尖甘草各半兩。五味子二十一粒。為極細末。水浸蒸餅為丸。如雞頭子大。每服一丸。細嚼津唾嚥下。名補氣丸。氣虛則生脉散。不言白朮。血虛則三才丸。不言四物。前言薏苡仁之屬。治肺虛。後言參芪地黃膏子之類。治腎虛。蓋肝心

屬陽。肺腎屬陰。陰虛則肺腎虛矣。故補肺腎即是補陰。非四物黃藥知母之謂也。勞瘵兼痰積。其證腹脅常熱。頭面手足則於寅卯時分。乍有涼時。宜以霞天膏入竹瀝。加少薑汁。調元明粉行之。若頑疾在膈上。膠固難治者。必以吐法吐之。或沈香滾痰丸透膈丹之類下之。甚則用倒倉法。若肝有積痰瘀血結熱而勞瘵者。其太衝脉必與衝陽脉不相應。宜以補陰藥吞。當歸龍鬚丸。古方柴胡飲子。防風當歸飲子。麥煎散。皆用大黃。蓋能折炎上之勢。而引之下行。莫逮乎此。然惟大便實者乃可。若溏泄。則雖地黃之屬亦不宜。况大黃乎。病勞有一種。真臟虛損。復受邪熱者。如經驗方中治勞熱青蒿煎丸。用柴胡正合宜耳。熟去即須急止。若無邪熱。不死何待。又大忌芩連。驟用純苦寒藥。反瀉其陽。但當用瓊玉膏之類。大助陽氣。使其復還寅卯之位。微加瀉陰火之藥是也。有重陰覆其陽。火不得伸。或洒酒惡寒。或志意不樂。或脈弦數。四肢五心煩熱者。火鬱湯。柴胡升麻湯。病去即已。不可過劑。服寒涼藥證。雖大減。脉反加數者。陽鬱也。宜升宜補。大忌寒涼犯之必死。色慾過度者。多成勞損。益人自有生以後。惟賴後天精氣以為立。

命之本。故精強神亦強。神強必有壽。精虛氣亦虛。虛必多夭。其有先天所稟。原不甚厚者。但知自珍而培以後天。則無不獲壽。設稟賦本薄。而且恣情縱慾。再伐後天。則必成虛損。此而傷生。咎將誰委。又年尚未冠。壬水方生。保養萌芽。正在此日。而無知孺子。遽搖女精。余見芭夢未成。而蜉蝣旦暮者多矣。良可悲也。此其責不在孺子而在父師。使子先有明誨。俾知保生之道。則彼以童心。豈識利害。而徒臨期懇禱。號呼悲戚。將何濟於事哉。勞倦不顧者。多成勞損。夫勞之於人。孰能免之。如奔走食力之夫。終日營營。而未聞其病者何也。貪賤之勞。作息有度。無關榮辱。習以為常。何病之有。惟安閑柔脆之輩。而苦竭心力。斯為害矣。故或勞於名利。而不知寒暑之傷形。或勞於色慾。而不知旦暮之疲困。或勞於遊蕩。而忍饑竭力。於是呼盧馳騁之場。或勞於疾病。而剝削傷殘於無術庸醫之手。或為詩書困厄。每緣螢雪成災。或以好勇逞強。遂致絕筋乏力。總之不知自量。而務使勉強。一應妄作妄為。皆能致損。凡勞倦之傷。雖曰在脾。而若此諸勞不同。則凡傷筋傷骨。傷氣傷血。傷精傷神。傷皮毛肌肉。則實兼之五臟矣。嗚呼。嗜慾迷人。其害至

此其故則在但知有彼而忘其有我耳。廣成子曰。無勞女形。無搖女精。乃可以長生。若此二言者。人因其簡。故多易之。而不知養生之道。於此八字而盡之矣。顧可以忽之也耶。少年縱酒。多成勞損。酒本狂藥。大損真陰。惟少飲之。未必無益。多飲之。難免無傷。若耽飲之。則受其害者十之八九矣。且凡人之稟賦臟腑。有陰陽而酒之性質亦有陰陽。蓋酒成於釀。其性則熱。汁化於水。其質則寒。若以陰虛者縱飲之。則質不足以滋陰。而性偏動火。故熱者愈熱。而病為吐血。衄血。便血。尿血。喘嗽。躁煩。狂悖等證。此酒性傷陰。而然也。若陽虛者縱飲之。則性不足以扶陽。而質留為水。故寒者愈寒。而病為膨脹泄瀉。腹痛。吞酸。少食。亡陽。暴脫等證。此酒質傷陽。而然也。故縱酒者既能傷陰。尤能傷陽。害有如此人。果知否。矧酒能亂性。每致因酒妄為。則凡傷精竭力。動氣失機。及遇病不勝等事。無所不至。而陰受其損。多因覺也。夫縱酒之時。固不慮其害之。若此。及病至沈危。猶不知為酒困。故余詳明於此。以為縱酒者之先覺云。疾病誤治。及失於調理者。病後多成虛損。蓋病有虛實。治有補瀉。必補瀉得宜。斯為上工。每見世俗之醫。固不知神理。為何

物。而且并邪正緩急俱不知之。故每致伐人元氣敗人生機。而隨藥隨斃者已無從訴。其有幸而得免而受其殘剝。以致病後多成虛損。而不能復振者。此何以故也。故凡醫有未明。萬母輕率。是誠仁人積德之一端也。至若失於調治。致不能起。則俗云小孔不補。大孔呴冤苦。亦自作之而自受之耳。又何尤焉。虛損之由。具道如前。無非酒色勞倦七情飲食所致。故或先傷其氣。氣傷必及於精。或先傷其精。精傷必及於氣。但精氣在人。無非謂之陰分。蓋陰為天之一根。形質之祖。故凡損在形質者。總曰陰虛。此大目也。若分而言之。則有陰中之陰虛者。其病為發熱躁煩頭紅面赤脣乾舌燥咽痛口瘡吐衄。便尿血。大便燥結。小水痛澀等證。有陰中之陽虛者。其病為怯寒憔悴。氣短神疲。頭暉眩惡食少腹痛飧泄二便不禁等證。甚至欬嗽吐痰遺精盜汗氣喘聲瘡。筋骨疼痛心神恍惚。肌肉盡削。夢與鬼交。婦人月閉等證。則無論陰陽。凡病至極。皆所必至。總由真陰之敗耳。然真陰所居。惟腎為主。蓋腎為精血之海。而人之生氣。即同天地之陽氣。無非自下而上。所以腎為五臟之本。故腎水虧。則肝失所滋。而血燥生。腎水虧。則水不歸

源而脾疾。起腎水虧則心腎不交而神色敗。腎水虧則盜傷肺氣而喘嗽頻。腎水虧則孤陽無主而虛火熾。凡勞傷等證使非傷入根本何以危篤至此。故凡病甚於上者必其竭甚於下也。余故曰虛邪之至害必歸陰。五臟之傷窮必及腎。窮而至此吾未如之何也矣。所貴乎君子知其微而已。凡損傷元氣者本皆虛證。而古方以虛損勞瘵各分門類。則病若有異亦所宜辨。蓋虛損之謂或有發見於一證。或有因憊於暫時。凡在經在臟但傷元氣則無非虛損病也。至若勞瘵之有不同者。或以骨蒸或以乾嗽。甚至吐血吐痰營衛俱敗。厄羸日甚。此其積漸有日。本末俱竭而然。但虛損之虛有在陰分。有在陽分。然病在未深多宜溫補。若勞瘵之虛深在陰中之陰分。多有不宜溫補者。然凡治虛證宜溫補者。病多易治。不宜溫補者。病多難治。此虛勞似乎有異。而不知勞瘵之損即損之深而虛之甚者耳。凡虛損不愈則日甚成勞。有不可不慎也。

虛損兩顏紅赤或脣紅者陰虛於下。逼陽於上也。仲景曰其面戴陽者下虛故也。虛而多渴者腎水不足引水自救也。喑啞聲不出者由腎氣之竭。蓋聲出於喉而根於腎。經曰內奪而厥則為瘡。此腎虛也。虛而喘急者陰虛肺格氣無所歸也。喉乾咽痛者真水下虧虛火上浮也。不眠恍惚者血不養心神不能藏也。時多煩躁者陽中無陰柔不濟剛也。易生嗔怒或筋急痠痛者水虧木燥肝失所資也。飲食不甘肌肉漸削者脾元失守化機日敗也。心下跳動怔忡不甯者氣不歸精也。經曰胃之大絡名曰虛里出於左乳下。其動應衣宗氣泄也。盪汗不止者有火則陰不能守無火則陽不能固也。虛而多痰或如清水或多白沫者此水泛為痰。脾虛不能制水也。骨痛如折者腎主骨真陰敗竭也。腰脊痛者肝腎虛也。膝以下冷者命門衰絕火不歸源也。小水黃濁淋瀝者真陰虧竭氣不化水也。足心如烙者虛火燦陰湧泉涸竭也。陽虛之人因氣虛也。陽氣既虛即不能嘔。仲景曰欲嘔不能此人肚中寒故凡以陽虛之證而忽見嘔者便有回生之兆。凡虛損既成不補將何以復。而有不能服人參熟地及諸補之藥者此為虛不受補何以望生。若勞損吐血失血之後嗽不能止而疾多甚者此以脾肺虛極飲食無能化血而隨食成痰此雖非血而實血之類也。經曰白血出者死故凡痰之最多最濁者不可治。左右者陰陽之道路。

其有不得左右眠。而認邊難轉者。此其陰陽之氣有所偏竭而然。多不可治。凡病虛損者。原無外邪。所以病雖至困。終不憤亂。其有患虛證。別無邪熱。而譖妄失倫者。此心臟之敗。神去之兆也。必死。勞嗽喑啞。聲不能出。或喘急氣促者。此肺臟之敗也。必死。勞損肌肉脫盡者。此脾臟之敗也。必死。筋為疲極之本。凡病虛損者。多有筋骨疼痛。若痛有至極不可忍者。乃血竭不能榮筋。此肝臟之敗也。必死。勞損既久。再及大便泄瀉。不能禁止者。此腎臟之敗也。必死。勞倦所傷。用補中益氣湯證治。乃暴病也。失治而有發熱潮熱盜汗。放嗽諸證出焉。謂之虛勞。又復失治而有皮聚毛落。飲食不為肌膚骨髓中熱。經閉不行。諸證出焉。謂之瘵骨蒸。熟於傳尸之疾。別自一種。其源不起於勞欲。其流或至於滅門。然男以精為主。女以血為主。其致病既殊。其施治亦異。故應別著方法。陳氏良方分勞瘵勞傳尸勞二門而用之。庶無誤失之患矣。初病大法治婦人虛勞。局方中謂首尾六合如大聖散。熟地黃。

丸是治無熱虛勞也。中道藥牡丹煎丸。空心食前人參荆芥散。臨卧食後。是治有熱虛勞也。有病後血虛者。有本體血虛者。其人往來寒熱。或五心發熱。言語無力。面色痿黃。頭目昏暈。變生諸疾。芎歸湯加羊肉少許。或十全大補湯。四物湯。養榮湯。服之血虛而氣旺者。宜抑氣湯。即香附末。婦人冷勞。屬血氣不足。臟腑虛寒。以致腰下冷痛。手足時寒。月經失常。飲食不消。或時嘔吐。惡寒發熱。骨節痠疼。肌膚羸瘦。面色痿黃。立齊言。前證有內外真寒。亦有內外真熱。更有內真熱而外假寒者。有內真寒而外假熱者。若飲食難化。大便不實。腸鳴腹痛。飲食畏寒。手足逆冷。面黃。嘔吐。畏見風寒。此內外真寒之證也。宜用附子理中湯。以回陽。八味地黃丸。以壯火。若飲食如常。大便堅實。胸腹痞脹。飲食喜冷。手足煩熱。面赤嘔吐。不畏風寒。此內外真熱之證也。宜用黃連解毒湯。以消陽。六味丸。以壯水。若飲食如常。大便堅實。胸腹痞脹。飲食喜寒。手足逆冷。面黃。嘔吐。畏見風寒。此內真寒而外假寒也。亦用解毒湯。六味丸。若飲食少思。大便不實。吐酸嗳氣。胸腹痞滿。手足逆冷。面赤嘔吐。畏見風寒。此內真寒而外假熱也。亦用附子理中湯。與八味丸。

當求其屬而治之。婦人熱勞。由心肺壅熱。傷於氣血。以致心神煩躁。頰赤頭疼。眼澀唇乾。口舌生瘡。神思昏倦。四肢壯熱。飲食無味。肢體痠疼。心忪盜汗。肌膚日瘦。或寒熱往來。當審其所因。調補氣血。其病自愈。立齋言前證乃壯火食氣。虛火煎熬。真陰之所致也。王太僕云。如大寒而甚熱之。不熱是無火也。熱來復去。晝夜見伏。夜發晝止。是無火也。當治其心。如大熱而甚寒之。不寒是無水也。熱動復止。倏忽往來。時動時止。是無水也。當助其腎。心盛則生熱。腎盛則生寒。腎虛則寒動於中心。虛則熱收於內。竊謂前證若肝脾血虛。用四物參丸。肝脾鬱怒。小柴胡合四物湯。脾胃氣虛。補中益氣湯。肝脾血虛。加味道遙散。肝經風熱。加味小柴胡湯。心經血虛。天王補心丹。肺經氣虛。人參補肺湯。肝經血虛。加味四物湯。午前熱。屬氣分。腹中堅痛。四肢痠疼。月水或斷或來。面色痿黃羸瘦。又有因產後未滿百日。不謹將護臍腑虛損。百脈枯竭。遂致勞損。久不瘥。則變寒熱休作。有時飲食減少。肌膚瘦瘁。遇經水當至。即頭目昏眩。胸背拘急。四肢

疼痛。身體煩熱。足重面浮。或經水不通。故謂之血風勞。立齋云。喜怒不節。起居不時。有所勞傷。皆損其氣。氣衰則火旺。火旺則乘脾。脾主四肢。故因熱懶言。動作喘乏。表熱自汗。心煩不安。當病之時。宜安心靜坐。存養其氣。以甘寒瀉其熱氣。以酸味收其散氣。以甘溫補其中氣。經言勞者溫之。損者溫之。要略云。平人脈大為勞。以黃芪建中湯治之。立齋云。勞蒸一證。若蒸肺。用天麥門冬桔梗紫苑烏梅肉。若蒸皮。石膏桑白皮。若蒸氣。喘促鼻乾。身熱不安。人參黃芪梔子。若蒸大腸。大黃芒硝。若蒸心。黃連生地黃。當歸。若蒸脉。蒸血。皆用生地黃。當歸。童子小便。若蒸小腸。赤茯苓木通生地黃。若蒸脾。芍藥木瓜苦參。若蒸肉。芍藥。若蒸胃。石膏梗米大黃芒硝。乾葛。若蒸膽。柴胡瓜萎。若蒸三焦。石膏竹葉。若蒸肝。川芎當歸前胡。若蒸筋骨。鰲甲地骨皮。當歸牡丹皮。生地黃。若蒸玉房。知母黃柏當歸芍藥。若蒸脬。澤瀉茯苓生地黃。沉香滑石。若蒸膀胱。澤瀉滑石。凡此諸症。虛勞熱病。食肉與油膩。房勞飲酒而成者。久蒸不除。變為疳症。即死亦有

瘧疾久而不愈以致咳嗽失治漸成骨蒸勞瘵之症當推標本而治之。

【西醫學說】勞瘵即肺勞也。日本名曰肺結核。病由於蟲而基於類似植物之細菌。故曰結核菌。瀰漫於肺臟之實質內。遂發此病。此德國醫學大家古弗氏所發見也。病之經過大抵遲緩。初時病狀不明。在強健之人往往延至命在旦夕。而後乞醫治療。人當登高或疾走之時。自覺心悸亢進。呼吸淺促。或中宵或清晨往往微發咳嗽。身心概覺疲勞。夜間睡眠盜汗極盛。食思缺損。身體羸弱。形容枯槁。胸部嚴重。此為肺勞之初期。漸進則呼吸愈促。咳嗽亦甚。時吐如粘液之黃痰塊。含有血絲。衰弱疲勞二者。至此益著。漸漸陷於虛脫。其後因痰塊梗塞氣道。或咯血甚而昏倒。遂致於死者有之。但精神則與身體大異。雖瀕死尚清明如初。或仍具絕大之志氣者。凡患肺勞者。服藥固重要。而衛生尤為第一。衛生之道有四。其一居處。隨如人生計而異。任擇適當之處。固難。要以山間谿谷或海濱為佳。苟困於經濟。不能得此等所在。則宜避城市而移居田間。室必南向。尤貴通風。如欲稍含濕氣。可於室隅常置水盆。職是之故。當以海濱

之生活。為肺癆所最相宜者。其二衣服。衣服宜溫暖。輕爽柔軟。清潔。襯衣必須用毛絨。薄衣須防感冒。厚衣須防汗濕。其三食物。食物宜滋養盛而多脂肪者。如羊乳牛乳均極相宜。夏日宜擇清淡而滋養多者。食之。如小牛肉。雞肉。雞卵最佳。飲料宜最好之葡萄酒。麥酒。茶。淡咖啡等。未飯不甚相宜。總以常食肉類為佳。其四行動。日暖風和之候。最妙。道遙。谿間。海濱。晚霞漸散之候。決不可至戶外。荷重行遠等劇烈運動。均極有害。行為以嚴肅為主。職務以簡易為貴。若焦思勞神之事。謹避之。弗為也。少年婦女。動情最宜謹慎。身體須時以鹽水摩擦。豫防之法。尤須留意。蓋肺癆既為細菌蔓延而成。故病婦咯出之痰。最須謹慎。切勿任意亂唾。倘或不慎沾污被食衣服間。迨至乾後飛散。滿布於室內之空氣中。則樓止該室中之人。往往傳染。醫治之法。以炭酸古阿亞柯爾為最佳。蒸木油次之。法以炭酸古阿亞柯爾半瓦為末。日服三次。逐漸增加至二瓦。三瓦。連服數月。或可將病菌殺盡。其對症治法。咳嗽。服古塗。乙涅。菲沃斯。越幾斯。蔓岩。越幾斯等。嗎啡不宜用。咯痰困難。宜服祛痰劑。

胸痛。宜貼芥子泥或行溫罨法。咯血。宜令安靜身體並貼置冰袋內服麥角越幾斯或以之注射皮下。食思缺乏用苦味劑稀鹽酸下痢。用收斂劑發熱用益規安知必林別拉米冬。結核固以肺臟為最多。而他部患者亦不少。如結核在喉頭則為喉頭瘡。結核在腸則為腸瘍。結核在關節則為白腫。喉頭瘡之主徵其喉頭之粘膜浮腫變硬其紅色較淡處則發見有數多潰瘍。小者如針眼大者若小豆會厭軟骨尤為饒多。自覺之證狀則為聲音嘶啞。每一發咳痛楚殊甚。痰極粘稠。喚時尤痛以致飲食廢絕。其致死之原因為全身衰弱。聲門水腫及軟骨外結締織炎等。治當用沃度彷謨或沃度殿粉吹入喉頭咯瘍劇痛則塗布十%古加乙涅水咳嗽服鎮咳劑。腸瘍之主徵第一為夜中下痢。糞便多帶黃綠色發一種腐穀下痢。其普通證狀則為嘔吐疝痛或食思異常旺盛然全身則瘦削骨立。久久發熱至死而止。此病僅有用滋養強壯之法。腹痛下痢須試服阿片或硝石。單甯鉛糖等。白腫之主徵為腿膝膝部足部諸關節腫起皮膚變白如蠟。按捺或行動時作痛殊劇。

節強直步行起立並皆障礙。患部發熱久之化膿潰爛成管。其全身證狀則為貧血羸瘦。食思缺乏。治療之法惟有及早安靜關節並紫水玻璃等固定綁帶初起行寒冷壓迫之法。局部塗收吸收藥。養疴村告山間俾得呼吸新鮮空氣。食滋養強壯諸食物藥品中以肝油為佳。如兼貧血宜服鐵劑或須施適當之手術。

【帝國醫方】增損四物湯 治婦人氣血不足。四肢惰怠。乏力少氣。薰治產後下血過多。榮衛虛損。陰陽不和。乍寒乍熱。當歸 川芎 人參 乾薑 地

甘草 炙 白芍藥 各等分 右㕮咀每服四錢水一盞煎至六分去滓服。

六神湯 治脾氣不和。榮衛不足。怠惰困倦。不嗜飲食。服之補養真氣。進美飲食。充澤肌膚。當歸 熟地黃 白芍藥 川芎 黃耆 地骨皮 各等分 煎至八分去滓空心溫服。

加減大建中湯 治婦人胎前產後一切虛損。月水不調。臍腹疼痛。往來寒熱。自汗口乾煩渴。右為粗末。每服五錢水一盞半。煎至八分去滓空心溫服。

芍藥 二兩

當歸

川芎

黃芪

桂 各一

甘

草
半
薑
半
薑
煎
白朮
各七錢半
右為末。每服二錢半。水一盞。
半。薑
煎六分。去滓。溫服。食前。

清氣湯

治肌熱骨瘦者。陰衰陽盛也。是氣弱而血
熱。則外蒸肌肉。內蒸骨髓。煩渴口乾。煩赤頭疼。飲
食無味。心神驚悸。肢體痠疼。或時盜汗。或時欬嗽。
或月經斷絕。或經極少。俗謂血勞。產後曰蓐勞。及
羸瘦之人。與清氣湯羊乳丸治之。

紫蘇子

五味子 大腹子 枳殼 桑白皮
炒微

菖蒲

地骨皮 白朮 柴胡 秦艽 獨活

乾葛

甘草
等分 右吹咀。每服五錢。水一盞。入

紫蘇七片。烏梅一個。煎至七分。溫服。

黃芩散

一名防風湯 治勞氣。食後身疼倦夜間盜汗。此
因失血。榮衛損也。

黃芩
一兩

白芍藥 防風 當歸 乾地黃
各七錢五分

甘草
半兩 右吹咀。每服五錢。水一盞。薑

三片。棗一枚。煎至七分。去滓。溫服。食前。

四白散 治男子婦人血虛發熱。夜多盜汗。不進飲
食。四肢羸瘦。骨節拘攣。腳痛不能行。

黃芩 厚朴 益智仁 薤香 白朮 白扁豆
陳皮
兩各一 半夏 白茯苓 人參 白豆蔻

草
半
白朮
各七錢半

右為末。每服二錢半。水一盞。薑
煎六分。去滓。溫服。食前。

仁

天台烏藥 甘草
各半兩

京南芍藥 檀香

沈香
兩各一 右為細末。每服四錢。水一盞。薑
三片。乘一個。煎至七分。溫服。

桔梗飲子

治心氣不足。解勞倦盜血。

黃芪

人參 麥門冬 苦梗 甘草
各一兩 青皮

半兩

右為末。每服三錢。水一盞。煎至七分。溫服。

如聖散

治婦人所累。血氣不足。不耐寒暑。易冒疾
傷。月水不調。久而心虛。狀若心勞。四肢倦怠。筋骨

少力。盜汗易驚。或時不寐。五心煩熱。肌膚不長。間

作頭昏。飲食無味。胸膈不利。或產前產後受病。並

可服之。

北柴胡

白茯苓 甘草 熟地黃 人參 當

歸
各一兩

龍甲 胡黃連 沈香 知母
各半兩

桑寄生

乾葛
各七錢半 右為細末。每服二錢。水一

蓋。烏梅一個。棗二枚。麥門冬數粒。煎至八分。脈無

熱。過即冷。時有盜汗。四肢倦怠。體劣黃瘦。飲食減
少。夜卧恍惚。神氣不寧。睡多異夢。此藥能治。微嗽

有唾唾中有紅線。名曰肺痿。失治便成羸劣之疾。

劫勞散 治心腎俱虛。勞嗽二三聲無痰。遇夜發熱。

熱過即冷。時有盜汗。四肢倦怠。體劣黃瘦。飲食減

少。夜卧恍惚。神氣不寧。睡多異夢。此藥能治。微嗽

白芍藥
六兩 綿黃芪
蜜炙四兩

甘草
炙 人參
去蘆

當歸 去蘆酒洗

半夏 白茯苓去皮熟地黃燒乾

地黃 洗淨焙乾

桐子大每服五七十九溫水下。

五味子

阿膠 各二兩炒右咬咀每服三錢水一

蓋生薑七片棗三枚煎至九分溫服無時日三服。筒骨煎治諸虛疾羸瘦乏力腰背引痛心煩喘嗽。汗髮焦耳鳴皮寒骨熱一切五勞七傷骨蒸等症。並皆療治。

地骨皮 粉草 北柴胡 前胡 烏藥 麻黃

不去節乾葛

青蒿 苦梗

知母

人參

生乾

地黃

天仙藤

秦艽

鼈甲

兩各半

黃芩

右咬咀

每服三錢

水一盞

酒一

分

一分

猪筒骨一莖炙焦分為四服桃柳枝各七寸杏仁五粒去皮搗碎煎至七分去滓溫服加烏梅半個尤妙一方加當歸芍藥。

滋血湯治婦人經候不通或血聚肢體麻木肌熱身重倦怠少力將成勞瘵不可妄行破血宜滋養潤利。見經開

補中丸治婦人虛損諸疾。

白朮 地黃 各二兩 川芎 白芍藥 當歸 黃

芪 人參 陳皮 各半兩 右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服五七十九溫水下。

溫中丸治衝任虛損血氣虧傷月水斷續來不應期。或多或少腹中疼痛不時寒熱煩壅咽燥舌乾心神忪悸頭目眩暈肢體倦怠腰背引痛筋脉拘急帶下赤白飲食進退或發寒熱。

生地黃 生薑 二味各一斤切碎各研取汁將薑

地黃 汁炒地黃津却將地黃汁炒生薑

白芍藥 二兩酒洗

琥珀另研

白茯苓 去皮酒洗

黃芪蜜炙

延胡索 炒

麥門冬 去心

烏梅肉 一兩焙各

右為

未別用白艾葉一片水一斗煎取濃汁熬成膏。

前藥丸如梧桐子大每服五十九溫米飲下空心食前

人參丸養陰生血補虛。

人參 鹿角膠 炒

熟地黃 芍藥 當歸 白

朮 川芎 各等分

右為末煉蜜丸如梧桐子大每

服三十九空心米飲下。

秘方十補丸治婦人諸虛百損榮衛不調形體羸

瘦面黃背倦口苦舌乾心忪多汗血衰氣盛寒熱

往來一切血崩帶下墮胎落孕此藥皆治孕婦服

之尤有神效。

熟乾地黃 洗淨酒浸蒸過

肉蓯蓉 酒浸

人參

綿黃芩
蜜使

去蘆

白茯苓

去皮

白术

去蘆洗淨
炒各二兩

甘草

炙半兩

肉桂

一兩

川芎

當歸

去蘆酒浸培

白芍藥

浸

五聖丸

調益榮衛滋養氣血

治衝任虛損月水不

調臍腹疼痛崩中漏下

血瘕塊硬發渴疼痛妊娠

宿冷將理失宜胎動不安

血下不止及產後乘虛

風寒內搏惡露不下結生瘕聚

小腹堅痛時作寒

熱

當歸

川芎

白芍藥

熟乾地黃

各一兩

生乾

地黃

二兩

右為細末酒煮麵糊為丸如梧桐子大

每服六七十丸食前溫酒下

七補丸

治婦人氣血虛弱衝任不和腹中經結狀

若懷孕月候尚來未分經脈宜服此方

當歸

芍藥

川芎

各三分

白芷

白术

熟地

大每服六七十丸食前溫酒下

九空心

鹽酒下

羊乳丸

治虛勞羸瘦

秦艽

柴胡

地骨皮

山茱萸肉

黃芪

蜜尖

地黃

酒浸蒸過

右為末煉蜜丸如梧桐子大

每服五六十九空心米飲下

人參鬱甲丸

治婦人一切虛損肌肉瘦瘠盜汗

忪效嗽上氣經脈不調或作寒熱不思飲食

杏仁

湯浸去皮炒

人參

當歸

赤芍藥

甘草

少

艾煎丸

治婦人諸虛

北艾葉

大當歸

各二兩

香附子

四兩

右醋蒸

半日焙乾為末再用醋煮糊丸醋湯下

黃芪

四兩

鹽水

浸久尖

北五味

二兩

右為末秫米糊

大聖散

治婦人血海虛冷久無子息及產後敗血

衝心中風口噤子死腹中臂開口灌藥須臾生下

便得無恙治墮胎腹中攻刺疼痛橫生逆產胎衣

地黃

酒浸蒸過

右為末

煉蜜丸

如梧桐子大

每服五六十九空心米飲下

黃連

錢半

鬱甲

一枝重二兩

肉桂

去粗皮

木香

各半兩

麝香

研

研爛絞汁童子小便五升酒五升同熬至二升次

入真酥三兩白沙蜜三兩再熬成膏冷方下

衆藥末搜和令勻丸如梧桐子大每服五十九溫酒送

下無時

地骨皮

宣黃連

去鬚

柴胡

桔梗

去蘆各一兩

地骨皮

宣黃連

去鬚

艾煎丸

治婦人諸虛

北艾葉

大當歸

各二兩

香附子

四兩

右醋蒸

半日焙乾為末再用醋煮糊丸醋湯下

黃芪

四兩

鹽水

浸久尖

北五味

二兩

右為末

秫米糊

大聖散

治婦人血海虛冷久無子息及產後敗血

衝心中風口噤子死腹中臂開口灌藥須臾生下

便得無恙治墮胎腹中攻刺疼痛橫生逆產胎衣

地黃

酒浸蒸過

右為末

煉蜜丸

如梧桐子大

每服五六十九空心米飲下

黃連

錢半

鬱甲

一枝重二兩

肉桂

去粗皮

木香

各半兩

麝香

研

研爛絞汁童子小便五升酒五升同熬至二升次

入真酥三兩白沙蜜三兩再熬成膏冷方下

衆藥末搜和令勻丸如梧桐子大每服五十九溫酒送

下無時

地骨皮

宣黃連

去鬚

艾煎丸

治婦人諸虛

北艾葉

大當歸

各二兩

香附子

四兩

右醋蒸

半日焙乾為末再用醋煮糊丸醋湯下

黃芪

四兩

鹽水

浸久尖

北五味

二兩

右為末

秫米糊

大聖散

治婦人血海虛冷久無子息及產後敗血

衝心中風口噤子死腹中臂開口灌藥須臾生下

便得無恙治墮胎腹中攻刺疼痛橫生逆產胎衣

地黃

酒浸蒸過

右為末

煉蜜丸

如梧桐子大

每服五六十九空心米飲下

黃連

錢半

鬱甲

一枝重二兩

肉桂

去粗皮

木香

各半兩

麝香

研

研爛絞汁童子小便五升酒五升同熬至二升次

入真酥三兩白沙蜜三兩再熬成膏冷方下

衆藥末搜和令勻丸如梧桐子大每服五十九溫酒送

下無時

地骨皮

宣黃連

去鬚

艾煎丸

治婦人諸虛

北艾葉

大當歸

各二兩

香附子

四兩

右醋蒸

半日焙乾為末再用醋煮糊丸醋湯下

黃芪

四兩

鹽水

浸久尖

北五味

二兩

右為末

秫米糊

大聖散

治婦人血海虛冷久無子息及產後敗血

衝心中風口噤子死腹中臂開口灌藥須臾生下

便得無恙治墮胎腹中攻刺疼痛橫生逆產胎衣

地黃

酒浸蒸過

右為末

煉蜜丸

如梧桐子大

每服五六十九空心米飲下

黃連

錢半

鬱甲

一枝重二兩

肉桂

去粗皮

木香

各半兩

麝香

研

研爛絞汁童子小便五升酒五升同熬至二升次

入真酥三兩白沙蜜三兩再熬成膏冷方下

衆藥末搜和令勻丸如梧桐子大每服五十九溫酒送

下無時

地骨皮

宣黃連

去鬚

艾煎丸

治婦人諸虛

北艾葉

大當歸

各二兩

香附子

四兩

右醋蒸

半日焙乾為末再用醋煮糊丸醋湯下

黃芪

四兩

鹽水

浸久尖

北五味

二兩

右為末

秫米糊

大聖散

治婦人血海虛冷久無子息及產後敗血

衝心中風口噤子死腹中臂開口灌藥須臾生下

便得無恙治墮胎腹中攻刺疼痛橫生逆產胎衣

地黃

酒浸蒸過

右為末

煉蜜丸

如梧桐子大

每服五六十九空心米飲下

黃連

錢半

鬱甲

一枝重二兩

肉桂

去粗皮

木香

各半兩

麝香

研

研爛絞汁童子小便五升酒五升同熬至二升次

入真酥三兩白沙蜜三兩再熬成膏冷方下

衆藥末搜和令勻丸如梧桐子大每服五十九溫酒送

下無時

地骨皮

宣黃連

去鬚

艾煎丸

治婦人諸虛

北艾葉

大當歸

各二兩

香附子

四兩

右醋蒸

半日焙乾為末再用醋煮糊丸醋湯下

黃芪

四兩

鹽水

浸久尖

北五味

二兩

右為末

秫米糊

大聖散

治婦人血海虛冷久無子息及產後敗血

衝心中風口噤子死腹

不下血。運血癖血滯血崩。血入四肢應血藏。有患及諸種風氣。或傷寒吐逆欬嗽。寒熱往來。遍身生瘡。頭痛惡心。經脈不調。赤白帶下。乳生惡氣。胎藏虛冷。數曾墮胎。崩中不定。因此成疾。室女經脈不通。並宜服之。常服暖子宮。和血氣。悅顏色。退風冷。消除萬病。兼療丈夫五勞七傷虛損等病。

澤蘭葉 石膏

研各二兩

防風

去蘆

微炒

桔梗 吳茱萸

湯洗七次焙各一兩

細辛

去苗

乾薑

炮

川椒

去目者

微炒

柏子仁

棟

桑白皮

地骨皮

牡丹皮

棕櫚皮

各一兩焙存性

木香

各半

右為末

每服一錢水一

盞入香油

一二點古錢

一文洗同煎至七分

不拘時溫服

時溫服

木香丸

治婦人冷勞

經脈不調

臟腑氣滯

四肢疼

痛飲食無味

漸加羸瘦

下

木香

琥珀

吳茱萸

炮

當歸

牡丹皮

赤

芍藥

三棱

附子

炮

延胡索

川芎

各三分

右為細末

每服二錢空心

水一盞

煎

木香

各半

右為末

煉蜜

九如梧桐子大

每服三十九空心

水一盞

煎

右

虎骨

五錢

當歸

芍藥

續斷

白术

附子

各二錢

當歸

芍藥

續斷

白术

各二錢

當歸

芍藥

續斷

白术

各二錢

當歸

木香

湯

治婦人血氣虛勞

令人頭目昏眩

語

各二錢

當歸

芍藥

續斷

白术

各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术
各二錢

當歸
芍藥
續斷
白术<br

北柴胡 縮砂仁 蒔蘿 草撥各三 白朮

白芷 胡椒 白薑 陳皮 山茵陳 人參

蕪荑仁 木香 紫苑 白芍藥 北細辛 桂

心各半 右為細末。以獐猪肝一具去脂膜切如

柳葉片。以新汲水洗過入葱白三寸細切。入藥末

半兩於銚內。以新水二大盞入鹽醋少許。以磁碗

合煮令水盡空心以意食之。食前飲下。服後良久。

飲暖酒一盞為妙。晚食前熱服。

硇砂煎丸 治婦人冷勞。心腹積聚。腹脇疼痛。四肢

羸瘦不食。 鹽甲 醋炙

桃仁 去皮尖
炒熟

木香 砇砂
升熟成膏
各一
兩醋一

五靈脂
石炒
去土

當歸
各一
兩半

北柴胡
去皮一
兩半

黃芪
地骨皮
赤芍藥
各一
兩

甘草
右咬咀
錢半
水一盞
薑五片
煎六分
去滓溫服

人參 黃芩
當歸
各七

黃芪散 治婦人熱勞羸瘦。四肢煩疼。心躁口乾。不欲飲食。
子芩散 涼心肺。解勞除熱。使榮衛順。血不絕。有勞熱之證。皆可服之。熱退即止。
黃芩散 涼心肺。解勞除熱。使榮衛順。血不絕。
麥門冬去心 生乾地黃各半 苦梗二錢
右咬咀每服四錢

逍遙散 治血虛勞倦。五心煩熱。肢體疼痛。頭目昏重。心忪煩。赤口燥咽。乾發熱盜汗。減食嗜卧。及血

熱相傳。月水不調。臍腹脹痛。寒熱如瘡。又主室女

血弱陰虛。榮衛不和。痰嗽潮熱。肢體羸瘦。漸成骨

蒸。北柴胡去苗各一
兩半
甘草
兩半
右剉散。每服三錢。當歸半日微炒。去蘿酒浸

白茯苓 白朮去蘆
白芍藥
當歸
去蘆酒浸

北柴胡去苗各一
兩半
甘草
兩半
右剉散。每服三錢。當歸半日微炒。去蘿酒浸

水一盞半。薑三片。麥門冬二十粒。去心。煎服。不拘

時。一方加知母。地骨皮。一方薄荷湯下。無門冬。

一方名人參散。治婦人血熱虛勞。骨蒸。兼治

邪熱客於經絡。痰嗽煩躁。頭目昏痛。夜多盜汗。補

真氣。解勞倦。用人參。白朮。茯苓。柴胡。半夏。當歸。赤

芍藥。乾葛。甘草。黃芩。各等分。咬咀。每服四錢。水一

盞半。生薑五片。棗二個。煎至六分。不拘時溫服。應

為粗末。先用竹葉一握。小麥七十粒。水三盞。薑三

片。煎至一盞半。入藥末三錢。煎至七分。去滓溫服。

知母散 治婦人熱勞體瘦。壯熱四肢煩疼。咽喉不利。少思飲食。

知母 黃芩各七錢半 柴胡去苗 生乾地黃各一兩

赤芍藥 麥門冬去心 射干 川升麻各七錢半

甘草半兩
赤剉 右為粗散。每服四錢。水一中盞。入生薑半分。淡竹葉二十七片。同煎至六分。去滓。不計時溫服。

半夏散 治婦人熱勞。煩渴口乾。體瘦無力。四肢疼痛。或時寒熱痰逆嘔吐。不思飲食。

半夏 知母 呂梗 人參 赤茯苓 秦艽

赤芍藥 麥門冬 烏梅肉各半兩 醬甲醋炙

北柴胡 黃耆各一兩 大腹皮七錢半 甘草二錢半

右為粗末。每服四大錢。水一盞半。生薑三片。煎至七分。去滓。溫服無時。

秦艽散 治血經有熱。月脈凝滯。五心煩倦。

麥門冬 秦艽各一兩 生地黃 當歸各半兩 地

骨皮 鬱金 蘇木各二錢半 右為細末。每服一錢。半水一盞。紅花少許。同煎至七分。溫服。若經脈調

不用紅花。忌酒與熱物。此方可服一年。鼈甲地黃湯 治熱勞。手足煩。心怔忡慄悶。婦人血

室有乾血。身體羸。不為肌肉。

柴胡去蘆

當歸去蘆

麥門冬去心

鼈甲醋炙

石斛

白朮

熟地黃酒浸

茯苓

胡黃連散

治婦人熱勞體瘦。經脈不通。四肢疼痛。

甘草半兩
赤剉

右剉

口乾煩渴。不得眠卧。飲食全少。

鼈甲一兩半
醋炙

柴胡去蘆

生乾地黃

赤芍藥

黃連

當歸

川大黃各一兩
剉微炒

犀角屑

骨皮

黃耆剉

青蒿

鼈甲醋炙

香

麝香細研入

黃芩

赤芍藥

中盞

入生薑一錢三分。

桃柳心各七莖。煎至六分。

去滓。不拘時溫服。

犀角散

治婦人熱勞。心胸煩熱。不思飲食。四肢多

疼。經脈澀滯。

柴芩

地骨皮

麥門冬去心

杜仲

當歸

甘草各半兩
赤剉

赤芍藥

殼麩各七錢半
黃半兩

柴胡去苗

紅藍花

鼈甲醋炙

蘇木各二錢半

右為粗散。每服三錢。以水一中盞。入生

薑半分。煎至六分。去滓。溫服無時。

紅藍花散 治婦人熱勞。四肢羸瘦。經脈不通。

柴胡去苗一兩半 紅藍花 當歸 生乾地黃 赤

芍藥

鬼箭羽

虎杖

大腹皮

剉

麥門冬

去

土瓜根

地骨皮

枳殼

甘草

半兩

赤

右為粗散。每服四錢。以水一中盞。入生薑半分。煎至六分。去滓。溫服無時。

鼈甲散

治婦人熱勞。發渴壯熱。四肢煩疼。漸漸黃

瘦心胸躁悶

鼈甲

去裙襠令黃

柴胡

去蘆各一兩半

麥門冬

去心一兩

赤芍藥

人參

知母

川升麻

元參

人參去蘆

知母

川大黃

剉碎

地骨皮

赤芍藥

人參

去蘆

黃芩

微炒

地骨皮

赤芍藥

人參

赤半兩

黃芪

桑根白皮

各七錢半

甘草

微

人參

右為粗散。每服四錢。以水一中盞。入生薑

半分。葱白五寸。豉五十粒。煎至六分。去滓。溫服無

時。

護命方 治婦人骨蒸勞熱。宮臟不調。因感勞氣。子

母相傳。邪氣干心。非時驚恐。如人將捕。戰慄不安。

等。

益母草煎丸

治婦人熱勞煩悶。四肢疼痛。經脈滯

澀。腹脇妨悶。不欲飲食。

童子小便一升

右五味人銀器中。

生

桑寄生

半兩

獨活

川芎

各二錢半

沈香

九分

木香

一錢半

柴胡

一兩

青蒿

一升

無灰酒

一升

生

桑寄生

去苗半兩

右細杵

羅為末

每服三錢水一盞。煎兩

三分

益母草汁

一升

青蒿

一升

無灰酒

一升

生

銀器中

沸急瀉出空心服。非時和滓喫。

豬肚丸

治婦人熱勞羸瘦。

杜柴胡

赤茯苓

人參

黃芪

各一兩

黃連

三

地骨皮

木香

各半兩

桃仁

籠甲

各兩半

右為

細末用好嫩猪肚一枚。淨洗將藥末入猪肚內。以

線縫合。蒸令爛熟。於砂盆內研如膏丸。如梧桐子

大。食前粥飲下三十九。午食前再服。

胡黃連丸

治婦人熱勞煩悶。四肢黃瘦疼痛。時有

咳嗽不欲飲食。

胡黃連

知母

川升麻

元參

人參去蘆

當歸

甘草

赤半兩

黃芩

沙微

紫苑

洗去苗土

藥

犀角屑

地骨皮

桔梗

去蘆各半兩

各

赤芍藥

川大黃

剉碎

檳榔

杏仁

湯浸去皮

赤芍

各半兩

枳殼

麸炒微黃

秦艽

去苗六雙仁數

赤芍

各七錢半

各

柴胡

去苗一兩

麥門冬

去心培半兩

各

赤芍藥

各半兩

桂枝

沙微

紫苑

洗去苗土

各

赤芍藥

各七錢半

川大黃

微炒

秦艽

去苗六雙仁數

赤芍

各七錢半

各

柴胡

去苗一兩

麥門冬

去心培半兩

各

赤芍藥

各半兩

各

桂枝

沙微

紫苑

洗去苗土

各

赤芍藥

各七錢半

各

各

醫藥大學圖書館版權所有

慢火熬成膏。

柴胡去苗

麥門冬去心

赤芍藥

桃仁湯浸

雞蘇丸

兩各半

右為末。以前膏子為丸。湯使如前。極有效。

雞蘇葉半斤

黃芪

苦梗各半

防風荆芥

生乾地黃

甘草

川芎

甘菊花錢半

真腦子半錢

右為細末。

煉蜜丸。如彈子大。每服一丸。煎桑枝湯嚼下。日可六七服。

寒熱小便赤澀。

加車前子二錢半。每服一丸。煎桑枝湯嚼下。日可六七服。

漸乏力。瘦弱。行步不得。

喘嗽痰涎。飲食不美。或發寒熱。小便赤澀。加車前子二錢半。每服一丸。煎桑枝湯嚼下。日可六七服。

桑枝剉炒香。

每用桑枝三錢。煎至一盞。去滓下藥。

青蒿丸治婦人熱勞欬嗽。肌體消瘦。心膈煩熱。夜多盜汗。四肢痠痛。食少無力。

青蒿

杏仁湯浸去皮尖

貝母

人參

龍膽甲

醋

火

黃去裙

各一兩半

當歸

錢半

麝

半

桔梗

去蘆

桔梗

研細

青蒿

枳殼

黃去蘆

琥珀

研細

地骨皮

白

鹽甲

兩

雞蘇丸

治虛熱昏倦。急下虛上壅。嗽血衄血。

天門冬

去心

柴胡

去苗

龍膽甲

醋

火

黃去裙

各一兩半

當歸

錢半

麝

半

桔梗

去蘆

桔梗

紫苑

枳殼

黃去蘆

琥珀

研細

地骨皮

旋覆花

藏

蕤

川大黃

對微

枳殼

黃去裙

各一兩半

當歸

錢半

麝

半

桔梗

去蘆

桔梗

研細

甘草

枳殼

黃去蘆

琥珀

研細

地骨皮

旋覆花

藏

鵝黃

川大黃

對微

枳殼

黃去裙

各一兩半

當歸

錢半

麝

半

桔梗

去蘆

桔梗

研細

麝香

川大黃

對微

枳殼

黃去裙

各一兩半

當歸

錢半

麝

半

桔梗

去蘆

桔梗

研細

麝香

川大黃

對微

枳殼

黃去裙

各一兩半

當歸

錢半

麝

半

桔梗

去蘆

桔梗

研細

麝香

川大黃

對微

枳殼

黃去裙

各一兩半

當歸

錢半

麝

半

桔梗

去蘆

桔梗

研細

麝香

川大黃

對微

枳殼

黃去裙

各一兩半

當歸

錢半

麝

半

桔梗

去蘆

桔梗

研細

麝香

川大黃

對微

枳殼

黃去裙

各一兩半

當歸

錢半

麝

半

桔梗

去蘆

桔梗

研細

麝香

川大黃

對微

枳殼

黃去裙

各一兩半

當歸

錢半

麝

半

桔梗

去蘆

桔梗

研細

麝香

川大黃

對微

枳殼

黃去裙

各一兩半

當歸

錢半

麝

半

桔梗

去蘆

桔梗

研細

麝香

川大黃

對微

枳殼

黃去裙

各一兩半

當歸

錢半

麝

半

桔梗

去蘆

桔梗

研細

麝香

川大黃

對微

枳殼

黃去裙

各一兩半

當歸

錢半

麝

半

桔梗

去蘆

桔梗

研細

麝香

川大黃

對微

枳殼

黃去裙

各一兩半

當歸

錢半

麝

半

桔梗

去蘆

桔梗

研細

麝香

川大黃

對微

枳殼

黃去裙

各一兩半

當歸

錢半

麝

半

桔梗

去蘆

桔梗

研細

麝香

川大黃

對微

枳殼

黃去裙

各一兩半

當歸

錢半

麝

半

桔梗

去蘆

桔梗

研細

麝香

川大黃

對微

枳殼

黃去裙

各一兩半

當歸

錢半

麝

半

桔梗

去蘆

桔梗

研細

麝香

川大黃

對微

枳殼

黃去裙

各一兩半

當歸

錢半

麝

半

桔梗

去蘆

桔梗

研細

麝香

川大黃

對微

枳殼

黃去裙

各一兩半

當歸

錢半

麝

半

桔梗

去蘆

桔梗

研細

麝香

川大黃

對微

枳殼

黃去裙

各一兩半

當歸

錢半

麝

半

桔梗

去蘆

桔梗

研細

麝香

川大黃

對微

枳殼

黃去裙

各一兩半

當歸

錢半

生乾地黃各一兩 酸棗仁炒 郁李仁 杏仁去皮 百

熟炒雙仁

黃各一兩

人參去蘆

黃芩錢半兩

秦艽各半兩

大清

地黃煎丸

解勞生肌進食活血養心

生地黃汁

杏仁汁

生薑汁

藕汁各五升

薄

赤茯苓散

治婦人骨蒸及血勞等疾面色黃瘦四肢無力煩渴痰涕唾稠粘不思飲食

仁湯浸去皮共雙仁

黃芩

當歸各七錢

右

為細末每服半兩以獐猪肝一具用鹽醋葱白各

少許和煮空心食之後飲溫酒二盞

龍甲製如前

赤茯苓

柴胡去苗

木香

麥門冬心去

人參去蘆

半夏湯法如製

桃仁

製

黃芩

當歸五分

右

合

枳殼去瓤

枸杞子

人參去蘆

黃芩

錢半兩

人參去蘆

秦艽各半兩

大清

粥吞下三十丸無時

地黃煎丸

解勞生肌進食活血養心

生地黃汁

杏仁汁

生薑汁

藕汁各五升

薄

赤茯苓散

治婦人骨蒸及血勞等疾面色黃瘦四肢無力煩渴痰涕唾稠粘不思飲食

仁湯浸去皮共雙仁

黃芩

當歸各七錢

右

為細末每服半兩以獐猪肝一具用鹽醋葱白各

少許和煮空心食之後飲溫酒二盞

龍甲製如前

赤茯苓

知母

秦艽各半兩

大清

粥吞下三十丸無時

地黃煎丸

解勞生肌進食活血養心

生地黃汁

杏仁汁

生薑汁

藕汁各五升

薄

赤茯苓散

治婦人骨蒸及血勞等疾面色黃瘦四肢無力煩渴痰涕唾稠粘不思飲食

仁湯浸去皮共雙仁

黃芩

當歸各七錢

右

為細末每服半兩以獐猪肝一具用鹽醋葱白各

少許和煮空心食之後飲溫酒二盞

龍甲製如前

赤茯苓

知母

秦艽各半兩

大清

粥吞下三十丸無時

地黃煎丸

解勞生肌進食活血養心

生地黃汁

杏仁汁

生薑汁

藕汁各五升

薄

赤茯苓散

治婦人骨蒸及血勞等疾面色黃瘦四肢無力煩渴痰涕唾稠粘不思飲食

仁湯浸去皮共雙仁

黃芩

當歸各七錢

右

為細末每服半兩以獐猪肝一具用鹽醋葱白各

少許和煮空心食之後飲溫酒二盞

龍甲製如前

赤茯苓

知母

秦艽各半兩

大清

粥吞下三十丸無時

地黃煎丸

解勞生肌進食活血養心

生地黃汁

杏仁汁

生薑汁

藕汁各五升

薄

赤茯苓散

治婦人骨蒸及血勞等疾面色黃瘦四肢無力煩渴痰涕唾稠粘不思飲食

仁湯浸去皮共雙仁

黃芩

當歸各七錢

右

為細末每服半兩以獐猪肝一具用鹽醋葱白各

少許和煮空心食之後飲溫酒二盞

龍甲製如前

赤茯苓

知母

秦艽各半兩

大清

粥吞下三十丸無時

地黃煎丸

解勞生肌進食活血養心

生地黃汁

杏仁汁

生薑汁

藕汁各五升

薄

赤茯苓散

治婦人骨蒸及血勞等疾面色黃瘦四肢無力煩渴痰涕唾稠粘不思飲食

仁湯浸去皮共雙仁

黃芩

當歸各七錢

右

為細末每服半兩以獐猪肝一具用鹽醋葱白各

少許和煮空心食之後飲溫酒二盞

龍甲製如前

赤茯苓

知母

秦艽各半兩

大清

粥吞下三十丸無時

地黃煎丸

解勞生肌進食活血養心

生地黃汁

杏仁汁

生薑汁

藕汁各五升

薄

赤茯苓散

治婦人骨蒸及血勞等疾面色黃瘦四肢無力煩渴痰涕唾稠粘不思飲食

仁湯浸去皮共雙仁

黃芩

當歸各七錢

右

為細末每服半兩以獐猪肝一具用鹽醋葱白各

少許和煮空心食之後飲溫酒二盞

龍甲製如前

赤茯苓

知母

秦艽各半兩

大清

粥吞下三十丸無時

地黃煎丸

解勞生肌進食活血養心

生地黃汁

杏仁汁

生薑汁

藕汁各五升

薄

赤茯苓散

治婦人骨蒸及血勞等疾面色黃瘦四肢無力煩渴痰涕唾稠粘不思飲食

仁湯浸去皮共雙仁

黃芩

當歸各七錢

右

為細末每服半兩以獐猪肝一具用鹽醋葱白各

少許和煮空心食之後飲溫酒二盞

龍甲製如前

赤茯苓

知母

秦艽各半兩

大清

粥吞下三十丸無時

地黃煎丸

解勞生肌進食活血養心

生地黃汁

杏仁汁

生薑汁

藕汁各五升

薄

赤茯苓散

治婦人骨蒸及血勞等疾面色黃瘦四肢無力煩渴痰涕唾稠粘不思飲食

仁湯浸去皮共雙仁

黃芩

當歸各七錢

右

為細末每服半兩以獐猪肝一具用鹽醋葱白各

少許和煮空心食之後飲溫酒二盞

龍甲製如前

赤茯苓

知母

秦艽各半兩

大清

粥吞下三十丸無時

地黃煎丸

解勞生肌進食活血養心

生地黃汁

杏仁汁

生薑汁

藕汁各五升

薄

赤茯苓散

治婦人骨蒸及血勞等疾面色黃瘦四肢無力煩渴痰涕唾稠粘不思飲食

仁湯浸去皮共雙仁

黃芩

當歸各七錢

右

為細末每服半兩以獐猪肝一具用鹽醋葱白各

少許和煮空心食之後飲溫酒二盞

龍甲製如前

赤茯苓

知母

秦艽各半兩

大清

粥吞下三十丸無時

地黃煎丸

解勞生肌進食活血養心

生地黃汁

杏仁汁

生薑汁

藕汁各五升

薄

赤茯苓散

治婦人骨蒸及血勞等疾面色黃瘦四肢無力煩渴痰涕唾稠粘不思飲食

仁湯浸去皮共雙仁

黃芩

當歸各七錢

右

為細末每服半兩以獐猪肝一具用鹽醋葱白各

少許和煮空心食之後飲溫酒二盞

龍甲製如前

赤茯苓

知母

秦艽各半兩

大清

粥吞下三十丸無時

地黃煎丸

解勞生肌進食活血養心

生地黃汁

杏仁汁

生薑汁

藕汁各五升

薄

赤茯苓散

治婦人骨蒸及血勞等疾面色黃瘦四肢無力煩渴痰涕唾稠粘不思飲食

仁湯浸去皮共雙仁

黃芩

當歸各七錢

右

為細末每服半兩以獐猪肝一具用鹽醋葱白各

少許和煮空心食之後飲溫酒二盞

龍甲製如前

赤茯苓

知母

秦艽各半兩

大清

粥吞下三十丸無時

地黃煎丸

解勞生肌進食活血養心

生地黃汁

杏仁汁

生薑汁

藕汁各五升

薄

赤茯苓散

治婦人骨蒸及血勞等疾面色黃瘦四肢無力煩渴痰涕唾稠粘不思飲食

仁湯浸去皮共雙仁

黃芩

當歸各七錢

右

為細末每服半兩以獐猪肝一具用鹽醋葱白各

少許和煮空心食之後飲溫酒二盞

龍甲製如前

赤茯苓

知母

青皮 半兩 宣連 二兩 右為細末以猪
肚一個洗淨入藥在內縛定蒸令極軟研如泥為
丸如菜豆大湯下十五丸空心日三服忌濕麪等
物。

石膏散 治女人骨蒸外寒內熱附骨蒸盛之時四
肢微瘦足趺腫者病在臟腑中
真石膏不拘多少研極細每用新汲水和服方寸
匕取身無熱為度此方非實熟能食大便實者不可
服

青蒿鼈甲煎丸 治婦人骨蒸勞退熱解肌進食

九肋鼈甲一個 北柴胡二兩 甘草 杏仁

桔梗 當歸 人參 地骨皮 赤芍藥各一

胡黃連 宣連 各二錢半 官桂 木香各半 膚香

一字 酥蜜 各三兩 右為細末用青蒿一斤童

子小便五升好酒一升熬青蒿汁約二升以來撈

去青蒿不用入酥蜜再熬成膏令後入藥未搜和

為丸如梧桐子大每服十五丸溫酒下米飲亦得

日三服如秋後合再入桃柳枝七莖此藥甚妙即

局方人參鼈甲丸也此方寒熱並用

又方 治心胸痛引兩脇脅悶聲濁熱壅鼻竇或瘧

喘發熱

桑白皮炒

枳殼炒

木通

子芩炒

生地

黃白芍藥

甘草各五分

右水煎服

溫金散

甘草失黃芩炒

桑白皮炒

防風各二錢

甘草失

仁二十七粒製

人參

茯神各半

麥門冬三錢

杏

右前五味用米泔浸一宿晒乾

人人參等三味每

服三錢入蠟一豆大水煎服

治咽喉痛方

百藥煎去黑皮

硼砂

甘草

生白礬

右為末

含化丸

治肺間邪氣胸中積血作痛失音痰喘

蛤蚧

一隻去足

阿膠

麥門冬去心

細辛

甘草炒

生地黃

右為末蜜丸艾實大

食後含化一丸

河車丸

治一切勞瘵虛損骨蒸等疾

紫河車

一具初生男胎者尤良洗淨杵爛本草云人肉治瘵病胞衣主勞損面黑皮黑諸疾

粹度

白茯苓

半兩

人參一兩

乾山藥二兩

右為末麵糊和入河車加三末丸梧桐子大每服

三十九空心未飲下

補肺湯 治勞嗽五臟虧損。肺熱發熱。盜汗自汗。吐

痰喘嗽。

桑白皮炒

熟地黃錢一

人參 紫苑 黃芪

炒 五味子一錢各

右水煎入蜜少許。食後服。

阿膠丸 治勞嗽出血咯血。發熱。晡熱。口渴盜汗。

阿膠炒 生地黃 卷柏葉

山藥炒 大薑根

五味子 枣炒

雞蘇各一

柏子仁炒 人參

防風 麥門冬去心半兩

右為末。煉蜜為丸。彈子大。每服一丸。細嚼。麥門冬煎湯下。

四君子湯加秦艽黃蠅水煎服。尤妙。治勞嗽咯血。

紫菀散 治咳嗽有血。虛勞肺癆。

紫菀 人參各二

麥門冬 桔梗 茯苓 阿

膠 貝母各一

五味子 炒甘草各五錢。散。每服五錢。水煎服。

當歸六黃湯

主盜汗聖藥。

當歸 黃芩錢一

黃芩 黃連 生熟地黃各七分。右為粗末。每服五錢。水二盞。煎至一

盞。食前服。

地黃煎 治肺損吐血嗽。

生地黃 四兩取汁

鹿角膠碎炒黃

右為末。拌和。每

可以透明。阿膠代用。服三錢。童便一盞。煖熱。入薑汁少許。調下。無鹿膠。

五味子湯

治唾中有膿血。胸腸痛。

五味子

桔梗 紫苑 甘草 繢斷各二

茹三兩

赤小豆一升 桑白 地黃各五

右九味。㕮咀。以水九升。煮取一升七合。分為三服。

治咯血方

陳皮 半夏 茯苓 知母 貝母

生地黃一錢

桔梗 梔子各七分

桂皮二分 桑白皮錢

杏仁 阿膠各五

甘草五分 右剉

犀角地黃湯

一切吐血。欬血。咯血。唾血。並皆治之。

犀角一錢

生地黃二錢 杜丹皮

赤芍藥各一錢

當歸 黃芩各一

右剉一劑。水煎熟。入茅

根汁。磨京墨。調服。

白芍藥散

治虛損唾血吐血。

白芍藥

當歸 附子 黃芩 白朮各一

膠二兩

甘草五錢 生乾地黃四兩

右水煎服。

加味逍遙散

治虛勞咳嗽有潮熱者。

當歸 芍藥 白朮 柴胡

茯苓 甘草各一

當歸 芍藥 白朮 柴胡

茯苓 甘草各一

中西合璧婦科大全

人參固本丸 治肺癆虛熱

人參二兩

麥門冬 天門冬

生地黃 熟地

黃各四兩

右為蜜丸

三才湯

治肺脾虛勞咳嗽

天門冬

人參 熟地黃 各等分

右為煎藥或蜜丸

七寶散

已成勞瘵。疑似之間。宜用此方。

半夏

厚朴 良薑各八分

甘草 桔梗

青皮

草果

烏梅各五分

右七味水煎溫服。

蛤蚧散

治勞瘵瘦弱。肺損咳嗽等症。

蛤蚧

二對 蜈母

桑白皮 甘草各二分

人參

一兩

右俱用酥酒溶化入醋等分和勻。炙藥黃色勿焦。茯苓一兩。炒杏仁六兩。炒搗去油。

每二錢水煎。或為散。

瓦

丁香油六滴。右調和。一日三次。每服十六瓦。

瓦

古阿亞柯爾兩瓦。右調和。一日三次。每服十六瓦。

肝油九十六瓦

咖啡末六瓦。右以咖啡浸肝油中三日。絹布濾過。每日服濾液四瓦至六瓦。

薄荷腦

火酒各四瓦。右為水藥。每二時服一滴。

薄荷腦兩瓦 白糖

白樹膠各兩瓦半

右為丸

肝油九十六瓦

白樹膠 白糖各六瓦

薄荷腦

一瓦十分之四

右分入膠囊百五十個。每日服十個至十五個。

薄荷腦一瓦二

桂皮油一瓦五分之一

鹽酸聖

古尼涅一瓦十分之八

蝦性苦土適宜

右以蜜蠟為丸。分製六十粒。一日三次。每服十粒。

炭酸古阿亞柯爾一瓦百分之五至十分之一

鹽酸聖古尼涅一瓦百分之二至十分之一

薄荷

腦一瓦百分之一

假性苦土半瓦至一瓦

護謨

未適宜

右為丸劑。一日分三次服。

護謨未適宜

右為丸劑。一日分三次服。

炭酸古阿亞柯爾二十瓦

右分二十包。每日早晚各服一包。漸次加至一日六瓦為止。

企沃柯爾三瓦

橙皮糖漿六瓦。右一日三次。食後服。

企沃柯爾三瓦

橙皮糖漿六瓦。右一日三次。食後服。

甘油十瓦

含糖火酒十瓦

薄荷油一滴

右儘一日服用。

古阿亞柯爾兩瓦

扁桃油二十瓦

護謨末十瓦

水九十五瓦

右攪和成乳汁狀。作灌腸料。分

中西合璧婦科大全

四次用。

蒸木油一瓦

龍膽酒兩瓦半

火酒二十五瓦

磷酸古塗乙涅一瓦百分之三

葛藴酒十瓦糖漿九瓦

右一日三次至六次每服一茶匙

攝利酒適宜至全量百瓦

右調和一日三次或二次每服一茶匙和開水半盞服

磷酸古塗乙涅一瓦百分之三

杏仁水十瓦

肝油十五瓦

右臨卧時頓服

一日三次每服十滴至二十滴

蒸木油四滴

沃度仿謨一瓦

有加里油八滴

菲沃斯越幾斯半瓦

白糖五瓦右分十五包

哥羅方四十八滴

火酒以脫各十五瓦右

菲斯越幾斯一瓦百分之三

杏仁水蒸錫水各五瓦

右取十五滴和水一盞於咳嗽頻發時頓服

別拉米冬一瓦

右分三包一日三次每服一包

歇魯因一瓦千分之五

乳糖半瓦右為一包共製六包咳嗽甚時吞服一包

阿斯必林三瓦

樟腦酸一瓦

右為六包一日三

印度大麻越幾斯半瓦

白糖五瓦右研和為散

硫酸規尼涅兩瓦

毛地黃葉末一瓦十分之一

次每服一包

食荳越幾斯一瓦十分之三

安母尼亞茴香精兩

吐根末阿片末各半瓦

甘草膏適宜右為

九五十粒一日三次每服一粒

至十五滴以上俱止咳用

至十五滴以上俱止咳用

啟那設珍一瓦

乳糖兩瓦

右為三包一日三次

索勿拿兩瓦至四瓦

右分四包每晚臨卧前服一

撒曹兩瓦至三瓦

右為一包以澱粉紙包之清晨熱退時頓服以上俱退熱用

散那設珍一瓦

乳糖兩瓦右為三包一日三次

每服一包

撒曹兩瓦至三瓦

右為一包以澱粉紙包之清晨熱退時頓服以上俱退熱用

松節油五滴薄荷油一滴

右入膠囊一日服三

個至五個痰多者用之

包不眠者用之

醋水不拘多少 右每晚以之揩拭皮膚治盜汗最效

樟腦酸一瓦至兩瓦 右為一包早晚各服一包

麥角越幾斯兩瓦半 甘草末 甘草膏各適宜

右製丸五十粒每日服五粒至十粒

晞度拉斯企斯流動越幾斯十五至二十滴

日三次和水服用

醋酸鉛一瓦百分之三至百分之五 白糖五瓦

右為一包共製三包一日三次每服一包以上俱

咯血唾血用 阿片一瓦十分之一 單寧酸一瓦 古倫撲根末

兩瓦 右研和為散分作十包每時服一包

古倫撲根煎 十瓦二百瓦 沙列布漿十瓦 水

製阿片越幾斯一瓦十分之一 橙皮糖漿二十

瓦 右調和每二時服一食匙

挖氏散一瓦至一瓦半 右分三包一日三次每服

一包以上俱下痢用 林檎酸鐵酒 苦酒各十五瓦

右調和每日服半茶匙至一茶匙

林檎酸鐵酒三十瓦 橙皮糖漿十瓦 右調和每

日三次每次傾一茶匙沖水或酒服之

林禽酸鐵越幾斯五瓦 蒲公英越幾斯迹宜

右製丸五十粒早晚各服兩粒

沃度鐵糖漿十瓦 橙皮糖漿二十瓦 右調和早

晚各服一茶匙

肝油百瓦 右早晚各服一食匙以上俱貧血用

鹽酸古加乙涅一瓦五分之一至半瓦 甘油 蒸

錙水各五瓦 鴨嘴一瓦十分之二 右調和塗

布喉頭

鹽酸古加乙涅一瓦五分之一至半瓦 鉛糖兩瓦

白糖八瓦 右研和為吹入料

鹽酸古加乙涅一瓦五分之一至半瓦 次硝酸蒼

鈷 白糖各五瓦 右研和為吹入料

鹽酸古加乙涅一瓦十分之三 石炭酸一瓦百分

之五 蒸錙水兩瓦 右調和為吹入料

薄荷腦十瓦 橄欖油百瓦 右調和注入喉頭以

上俱喉頭癆用 次硝酸蒼鉛三瓦 阿片一瓦五分之一 白糖四

瓦 右研和為散分作十包一日三四次每服一

撒里夫爾酸蒼鉛 撒魯兒 沈降炭酸石灰 各

十五

右分三十包每日服三四包以澱粉紙包之

撒里矢爾酸蒼鉛

乳糖各五瓦

右分十包每

日二三次

每服一包

撒里矢爾酸蒼鉛六瓦

單那爾並三瓦 右分六

色一日三次

分二日服以上俱腸瘻用

樟腦七瓦

阿片越幾斯 薑菪越幾斯各五瓦

大酒適宜

右外用噴射關節部以上白腫用

客熱

中醫學說

客熱者因體虛而將溫過度外熱加之

非臟腑自生故云客熱其狀上焦胸膈之間虛熱

口躁心煩手足壯熱者是也立齋云前證若客邪

所侵用補中益氣加川芎防風

肝虛血少六味地黃丸胃火飲冷錢氏瀉黃散胃虛飲湯七味白朮

散潮熱時熱八珍湯

補中益氣湯治怒發熱小柴胡湯鬱怒發熱加味歸脾湯寅卯酉戌時熱升陽益陰湯

中國醫方

麥門冬散治婦人客熱四肢煩悶疼痛飲食不下

麥門冬

赤茯苓 赤芍藥

柴胡各半

桑白

皮 生地黃 黃芩 羚羊角屑各一

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服

甘草錢半

犀角散 治婦人客熱四肢煩悶疼痛飲食不下

犀角肩 赤芍藥 地骨皮 赤茯苓 紅花

人參 枳殼 麥門冬各一

柴胡二錢

黃芩

犀角散 治婦人客熱四肢煩悶疼痛飲食不下

人參 枳殼 麥門冬各一

柴胡二錢

甘草五分

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服

丹砂散 治婦人客熱心神煩躁口乾舌澀飲食無

人參 茯神炒

犀角肩 天竺黃

胡黃連各半

丹砂散

水飛過研各一

水二鍾淡竹葉五片煎至一鍾不拘時服

人參

茯神炒

犀角肩

天竺黃

胡黃連各半

丹砂散

水飛過研各一

水二鍾淡竹葉五片煎至一鍾不拘時服

人參

茯神炒

犀角肩

天竺黃

胡黃連各半

丹砂散

水飛過研各一

水二鍾淡竹葉五片煎至一鍾不拘時服

人參

茯神炒

犀角肩

天竺黃

胡黃連各半

丹砂散

水飛過研各一

水二鍾淡竹葉五片煎至一鍾不拘時服

人參

茯神炒

犀角肩

天竺黃

胡黃連各半

丹砂散

水飛過研各一

水二鍾淡竹葉五片煎至一鍾不拘時服

人參

茯神炒

犀角肩

天竺黃

胡黃連各半

丹砂散

水飛過研各一

水二鍾淡竹葉五片煎至一鍾不拘時服

人參

茯神炒

犀角肩

天竺黃

胡黃連各半

丹砂散

水飛過研各一

水二鍾淡竹葉五片煎至一鍾不拘時服

人參

茯神炒

犀角肩

天竺黃

胡黃連各半

丹砂散

水飛過研各一

水二鍾淡竹葉五片煎至一鍾不拘時服

人參

茯神炒

犀角肩

天竺黃

胡黃連各半

丹砂散

水飛過研各一

水二鍾淡竹葉五片煎至一鍾不拘時服

人參

茯神炒

犀角肩

天竺黃

胡黃連各半

丹砂散

水飛過研各一

水二鍾淡竹葉五片煎至一鍾不拘時服

人參

茯神炒

犀角肩

天竺黃

胡黃連各半

丹砂散

水飛過研各一

水二鍾淡竹葉五片煎至一鍾不拘時服

人參

茯神炒

犀角肩

天竺黃

胡黃連各半

丹砂散

水飛過研各一

水二鍾淡竹葉五片煎至一鍾不拘時服

人參

茯神炒

犀角肩

天竺黃

胡黃連各半

丹砂散

水飛過研各一

水二鍾淡竹葉五片煎至一鍾不拘時服

人參

茯神炒

犀角肩

天竺黃

胡黃連各半

丹砂散

水飛過研各一

水二鍾淡竹葉五片煎至一鍾不拘時服

人參

茯神炒

犀角肩

天竺黃

胡黃連各半

丹砂散

水飛過研各一

水二鍾淡竹葉五片煎至一鍾不拘時服

人參

茯神炒

犀角肩

天竺黃

胡黃連各半

丹砂散

水飛過研各一

水二鍾淡竹葉五片煎至一鍾不拘時服

人參

茯神炒

犀角肩

天竺黃

胡黃連各半

丹砂散

水飛過研各一

水二鍾淡竹葉五片煎至一鍾不拘時服

人參

茯神炒

犀角肩

天竺黃

胡黃連各半

丹砂散

水飛過研各一

水二鍾淡竹葉五片煎至一鍾不拘時服

人參

茯神炒

犀角肩

天竺黃

胡黃連各半

丹砂散

水飛過研各一

水二鍾淡竹葉五片煎至一鍾不拘時服

人參

茯神炒

犀角肩

天竺黃

胡黃連各半

丹砂散

水飛過研各一

水二鍾淡竹葉五片煎至一鍾不拘時服

人參

茯神炒

犀角肩

天竺黃

胡黃連各半

丹砂散

水飛過研各一

水二鍾淡竹葉五片煎至一鍾不拘時服

人參

茯神炒

犀角肩

天竺黃

胡黃連各半

丹砂散

水飛過研各一

水二鍾淡竹葉五片煎至一鍾不拘時服

人參

茯神炒

犀角肩

天竺黃

胡黃連各半

丹砂散

水飛過研各一

水二鍾淡竹葉五片煎至一鍾不拘時服

人參

茯神炒

犀角肩

天竺黃

胡黃連各半

丹砂散

水飛過研各一

水二鍾淡竹葉五片煎至一鍾不拘時服

人參

茯神炒

犀角肩

天竺黃

胡黃連各半

丹砂散

水飛過研各一

水二鍾淡竹葉五片煎至一鍾不拘時服

人參

茯神炒

犀角肩

天竺黃

胡黃連各半

丹砂散

水飛過研各一

水二鍾淡竹葉五片煎至一鍾不拘時服

人參

茯神炒

犀角肩

天竺黃

胡黃連各半

丹砂散

水飛過研各一

水二鍾淡竹葉五片煎至一鍾不拘時服

人參

茯神炒

犀角肩

天竺黃

胡黃連各半

丹砂散

水飛過研各一

水二鍾淡竹葉五片煎至一鍾不拘時服

人參

茯神炒

犀角肩

天竺黃

胡黃連各半

丹砂散

水飛過研各一

水二鍾淡竹葉五片煎至一鍾不拘時服

人參

茯神炒

犀角肩

天竺黃

胡黃連各半

丹砂散

水飛過研各一

水二鍾淡竹葉五片煎至一鍾不拘時服

人參

茯神炒

犀角肩

天竺黃

胡黃連各半

丹砂散

水飛過研各一

水二鍾淡竹葉五片煎至一鍾不拘時服

人參

茯神炒

犀角肩

天竺黃

胡黃連各半

丹砂散

水飛過研各一

水二鍾淡竹葉五片煎至一鍾不拘時服

人參

茯神炒

犀角肩

天竺黃

胡黃連各半

丹砂散

水飛過研各一

水二鍾淡竹葉五片煎至一鍾不拘時服

人參

茯神炒

犀角肩

天竺黃

胡黃連各半

丹砂散

水飛過研各一

水二鍾淡竹葉五片煎至一鍾不拘時服

人參

茯神炒

犀角肩

天竺黃

胡黃連各半

丹砂散

水飛過研各一

水二鍾淡竹葉五片煎至一鍾不拘時服

地黃汁調下一錢無時。

生乾地黃丸 治婦人客熱面赤頭疼口舌生瘡心胸煩壅飲食無味

生乾地黃一兩 黃連半兩 黃芩半兩 黃芪半兩 地骨皮甘草各半兩 麥門冬二兩 墓蕤各半兩 番元參犀角屑各半兩 川大黃一兩 右為細末煉蜜和搗三百杵丸

如梧桐子大。每以溫水下三十九丸無時。

寒熱

中醫學說 陽不足則先寒後熱。陰不足則先熱後寒。皆由勞傷氣血。陰陽不調。寒熱如瘧也。當分氣血虛實而治之。立齋云。前證若寸口脈微。名曰陽不足。則陰氣上入於陽中。用補中益氣湯。若尺部脈弱。名曰陰不足。則陽氣下陷入陰中。用益陰腎氣丸。若因氣血俱虛。用八珍湯。若因怒動肝火。用小柴胡湯。若陰陽俱不足。則氣血不歸其本部。以致寒熱交爭也。

西醫學說 肺癆之發熱與他病不同。其為漸進性者。無顯著之異狀。輕微之發熱。清晨約三十七度二三分。晚間則常在三十八度內外。間亦有無熱。

者。然在勞動後亦往往發熱。至於末期。常為弛張或間歇之高熱。繼續不已。是即謂之消耗熱。乃肺癆病所特有。其熱清晨自三十六至三十八度。晚間自三十九至四十度。若在重篤之證。壯熱稽留。

狀如傷寒。若在大脫力後。則降至常溫以下。是即謂之虛脫溫。更或有毫無原因。突然發熱。且惡寒戰慄者。此則為發生氣胸腦膜炎等合併症之徵也。

中國醫方 地骨皮散 治血風氣虛時作寒熱感

晡熱內熱

柴胡 地骨皮各一 桑白皮炒 枳殼炒 前胡 黃芩炒各七分 甘草桂心白芍藥各半錢水一盞半。生薑三斤。煎至七分。溫服。飲食

生乾地黃 北柴胡各一 羌活 木香 桂心 防風各半 酸棗仁炒 白朮 黃芪 川牛膝 白芍藥 各七錢 右咬咀。每服三五錢水一盞。薑三片。枳殼各五分。水一盞。薑三片。

煎至七分。去滓。空心温服。

異功散 治婦人血氣虛冷時發刺痛頭目昏悶四

肢無力寒熱往來狀似勞倦並宜服之

烏藥 川芎 苦梗

元胡索 當歸 陳皮各半錢

右作一服用水二鍾生薑三片煎至一鍾入酒半

盞再煎一二沸不拘時右三方內有桂惟寒多者

宜之第三方無滯氣汚血尤不宜服

七寶湯 治寒熱往來

防風去蘆 知母 生地黃各半兩

秦艽 甘草去蘆各二錢半 前胡去蘆各二錢半

錢水一盞半加人參三寸煎至七分熱服

柴胡湯 治婦人寒熱體瘦肢節疼痛口乾心煩不欲飲食

北柴胡 赤茯苓 黃芪 白朮各一錢 生地黃各半兩

龍甲醋炙二錢 人參 地骨皮 枳殼麸炒

桑白皮 赤芍藥 桔梗 甘草各半兩

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服

桃仁丸 治婦人頭目昏重心神煩悶或時寒熱肢節疼痛不欲飲食

桃仁湯浸去皮共雙人參去蘆 生地黃

诃梨勒皮各七錢半

右為末煉蜜和搗三百杵丸如梧桐子大每以

生薑荆芥薄荷湯下三十九

青蒿散 治男子婦人肢體倦疾虛勞寒熱用青蒿

八九月間將成實時去枝梗以蒿用童子小便

浸三日晒乾為末每服二錢烏梅一個煎至七分

服右三方熱多者宜之

生地黃散 治寡婦室女患惡風體倦乍寒乍熱面赤心悸或時自汗

生地黃二兩 柴胡 秦艽 黃芩各半兩

右為細末煉蜜丸如桐子大每服三十丸用

烏梅湯吞下日三服不拘時

加味逍遙散 治虛勞咳嗽有潮熱者

當歸 芍藥 白朮 柴胡 茯苓 甘草各一錢

牡丹皮 山梔子各七分

右八味水煎服

菖蒲白朮柴胡去苗

六一散 治咯血發寒熱

黃芪六兩

甘草一兩

右細末如常服乾服亦得

潤神散 治勞瘵憎寒發熱口乾咽燥自汗疲乏

中醫藥大學圖書館版權

人參 黃芩 甘草 桔梗 麥門冬 各等分

右水煎。自汗入淡竹葉小麥。

秦艽 扶羸湯 治膽肺二經虛熱及肺痿骨蒸已成

勞咳或寒或熱聲嗄不出體虛自汗四肢怠惰

柴胡 二錢

人參 龜甲 煎

秦艽 當歸 紫

茺 菟 半夏 各一錢

地骨皮 半錢

甘草 分

右用

水一鍾薑三片。烏梅大棗各一枚。煎七分。食後服。

人參紫茺散 治虛勞唾血痰涎上盛。放嗽喘重寒

熱往來肩背拘急勞倦少力盜汗發渴面目浮腫

桑白皮 二兩

紫蘇葉 四兩

貝母 去心 二兩

白茯苓皮 去

甘草 杏仁 各等分去皮尖炒

右為細末。每服三錢水

一錢生薑五片。煎至七分。溫服。不拘時。

〔外國醫方〕見前虛勞不贅

惡寒

〔中醫學說〕婦人惡寒亦有陰陽二證。發熱而惡寒者。發於陽也。無熱而惡寒者。發於陰也。發於陽者宜解表。脈必浮數。發於陰者宜溫裏。脈必沈細。又有汗後利後。惡寒及背惡寒。經云。惡寒家慎不可過當。覆衣被及近火氣。寒熱相薄。脈道沈伏。愈令病人寒不

可遏。但去被撤火。兼以和表之藥。自然不惡寒矣。婦人惡寒尤不可近火。寒氣入腹。血室結聚。針藥抑不能治。薛立齋云。怠惰嗜卧。洒淅惡寒。乃陽不能伸。藥用升陽益胃湯。若勞傷形氣而惡寒。乃無陽以護衛。用補中益氣湯。若飲食傷脾胃而惡寒。乃元氣虛損。用六君子湯。若加煩躁妄言。或欲飲水。仍進前劑。但加薑桂。若體倦煩渴。頭痛自汗。用補中益氣湯。加五味麥門東垣云。晝則發熱惡寒。是陰氣上溢於陽分也。夜則惡寒。是陰血自旺於陰分也。海藏云。六月大熱之氣。反得大寒之證。當捨時從證治。以薑桂多類丹溪云。久病惡寒。乃痰鬱於脾。抑遏陽氣。不得外泄。治當解鬱。

中風

〔中醫學說〕藥隱云。婦人中風。角弓反張。風痺。手足不隨。偏枯。口噤。口眼喎斜。風眩。頭痛。血風。心神驚悸。癲狂。骨節風。血風走注。瘡瘍。癰癧。頭痛。血風。心神驚悸。方論。亦須先明其大體。察脈之虛實。辨證之冷熱。相人強弱。入臟入腑。在絡在經。首以方調治。未要猛速。用藥。今之治法。先宜順氣。然後治風。萬不失一。蓋有中風。中寒中暎。中痰中氣。皆能令人涎潮昏塞。所謂

朱紫相凌。玉石不分。醫者不可不詳而究之。如中風。若作中氣治之。十愈八九。中氣若作風治之。十無一生。所以疑惑之間。不問中風中氣。首以蘇合香丸。五積散加麝香。中痰則有參蘇飲。中寒則有理中湯。中暎則有白虎湯。若確是中風。有三生飲。木香煮散。排風續命風引大小竹瀝。大八風湯。辨其冷熱虛實而投之。未有不安者也。然此疾積襲之久。非一日所能致。今人服藥三五服。便責無效。其責醫者亦速矣。正宜大劑久服。方能有效。孟子曰。七年之病求三年之艾也。中風者。虛風中於人也。風乃四時八方之氣。常以冬至之日。自坎而起。候其八方之風。從其鄉來者。主長養萬物。若不從其鄉來者。名為虛賊風害萬物。傷於風前後重沓。因體虛則發入臟腑。愈皆在背。中風多從俞入。隨所中之俞而乃發病。婦人血氣虛損。故令中風也。當察口眼開闔以別重輕。延末有無。以明證治。如眼閉口開。手足不關。涎不作聲者。可治。但須分得閉與脫二證明白。如牙關緊閉。兩手握固。之證。不論男子婦人。是風是寒。是氣是食。是痰是濕。但

即為閉證。宜蘇合香丸。三生飲之類。閉之若口開手撒。即為脫證。宜用大劑黃芪人參煎濃湯灌之。雖曰在法不治。亦十救五六。若誤服蘇合香丸之類。即不可救矣。蓋斬關奪門之藥。原為閉證而設。若施之脫證。是人既入井而又下之右也。薛立齋云。中風者。即內經所謂偏枯。風痱風懿風痺是也。而有中腑。中臟。中血脉之分焉。夫中腑者為在表。中臟者為在裏。中血脉者為在中。在表者宜微汗。在裏者宜微下。在中者宜調榮。中腑者多著四肢。如手足拘急。不仁。惡風寒。此數者病淺。皆易治。用加減續命湯之類。中臟者多滯。九竅如眼。督者中於肝。舌不能言者中於心。唇緩便秘者中於脾。鼻塞者中於肺。耳聾者中於腎。此數者病深。多難治。中血脉者外無六經之證。內無便溺之阻。肢不能舉。口不能言。用大秦艽湯主之。中腑者多兼中臟。如左關脈浮弦。面目青。左脇偏痛。筋脈拘急。目瞓。頭目眩。手足不收。坐踞不得。此中腑兼中肝也。用犀角散之類。如左寸脈浮洪。面舌赤。汗多。惡風。心神顛倒。言語蹇澀。舌口乾強。忪惄恍惚。此中大面唇黃。汗多。惡風口渴。語澀身重。怠惰嗜卧。肌膚

不仁皮肉瞶動。腹膨不食。此中胃兼中脾也。用防風散之類。如右寸脈浮濶而短。面色白。鼻流清涕。多喘。胸中冒悶。短氣自汗。聲嘶。四肢痿弱。此中大腸兼中肺也。用五味子湯之類。如左尺脈浮滑。面目黧黑。腰脊痛。引小腹。不能俛仰。兩耳虛鳴。骨節疼痛。足痿善恐。此中膀胱兼中腎也。用獨活散之類。此皆言真中風也。而有氣血之分焉。蓋氣虛而中者。由元氣虛而賊風襲之。則右手足不仁。用六君子湯加鈎藤薑汁。竹瀝。血虛而中者。由陰血虛而賊風襲之。則左手足不仁。用四物湯加鈎藤竹瀝薑汁。氣血俱虛而中者。則左右手足皆不仁也。用八珍湯加鈎藤薑汁竹瀝。其與中風相類者。則有中寒中濕中火中氣。食厥勞傷。房勞等症。如中於寒者。謂冬月卒中寒氣。昏冒口噤。肢攣。惡寒。脈浮緊。用麻黃桂枝理中湯之類。中於暑者。謂夏月卒冒炎暑。昏冒瘡厥。吐瀉喘滿。用十味香薷飲之類。中於濕者。丹溪所謂東南之人。多因濕外侵。良由五志過極。火盛水衰。熱氣拂鬱。昏冒而卒仆也。用六味丸。四君子獨參湯之類。內有恚怒傷肝。

火動上炎者。用柴胡湯之類。中於氣者。由七情過極。者死。食厥者。過於飲食。胃氣自傷。不能運化。故昏冒也。用六君子加木香。勞傷者。過於勞役。耗損元氣。脾胃虛衰。不任風寒。故昏冒也。用補中益氣湯。房勞者。因腎虛精耗。氣不歸源。故昏冒也。用六味丸。此皆類中風者也。夫內經主於風。河間主於火。東垣主於氣。丹溪主於濕。愚之斯論。僭補前人之闕。若天地之南北人之虛實。固有不同。其男子女人。亦大略相似。婦人角弓反張者。是體虛受風。風入諸陽之經。又之陰陽經絡。周環於身。風乘虛入於諸陽之經。則腰背反折。掣急如角弓之狀。宜服小續命湯。薛立齋曰。仲景先生云。太陽病發汗太多。致瘡。風病下之則瘡。三因方云。氣血內虛。風寒濕熱所中。則瘡。以風能散氣。故有汗而不惡寒。曰柔瘡。寒能澀血。故無汗而惡寒。然乃虛象也。竊謂傷寒汗下過度。與產婦潰瘍等病。及因寇伐之劑。傷損氣血而變。若金衰木旺。先用瀉青丸。後用異功散。腎水虛。用六味丸。肝火旺。先用加味小柴胡湯。次用加味四物湯。發熱。用加味逍遙散。

若木侮脾土用補中益氣湯加芍藥山梔脾經鬱結。
用加味歸脾湯脾土濕熱用大承氣湯。大凡病後氣
血虛弱用參术濃煎佐以薑汁竹瀝時時用之如不
應用十全大補湯更不應加附子或用參附湯緩則
不救婦人中風口噤者是體虛受風風入頸頰夾口
之筋也手三陽之筋結入於頸頰足陽明之筋上夾
於口而風挾冷乘虛入其筋則筋掣故引牙關急而
口噤也薛立齋云前證若風邪客於手足陽明經口
眼喝斜用秦艽升麻湯服之自效若風熱傷氣者則
用省風湯當與後方同用婦人失音不語者因心脾
二臟同受風邪故古強不得語也巢氏論曰喉嚨者氣
之所以上下也會厭者音聲之戶舌者聲之機唇者
聲之扇風寒客於會厭之間故卒然無音皆由風邪
所傷故謂之中風失音不語經云醉卧當風使人發
瘡不能言也薛立齋云前證若因痰迷心竅當清心
火若因濕痰舌強當清脾熱若因風熱牙關緊急當
清肝火若因風痰塞喉當導痰涎若因虛火上炎當
壯水之主若因氣虛厥逆當益火之源若因腎虛舌
瘡而不語當補腎氣婦人風瘡者由風寒濕三氣合
而為瘡風多者為風瘡其狀肌膚盡痛諸陽之經皆

起於手足而循行於身體風寒之氣客於肌膚始為
瘡復傷陽經隨其虛處而停滯於血氣血氣相搏行
則遲緩故風瘡而復手足不隨也薛立齋云經曰邪
之所湊其氣必虛前證若風邪淫壯或怒動肝火血
燥筋掣用加味道遙散脾肺氣虛肌膚不仁手足麻
木用三痺湯若腎水虧損不能滋養筋骨或肝脾血
虛而筋痿痺用六味丸服燥藥而筋掣者用四物生
甘草氣血俱虛用八珍湯醫林集要等方新刊丹溪
心法附錄云若人大拇指麻木不仁或手足少力或
肌肉微掣三年內必有大風之證宜先服八風湯天
麻丸防風通聖散以預防之殊不知河間云風者病
之末也所以中風有癱瘓者非謂肝木之風內中亦
有六淫風邪外襲良由五志過極心火息盛腎水虛
衰不能制之則陰虛陽實而熱氣怫鬱心神昏憤筋
骨無用而卒倒無知也治當以固元氣為主若遽服
八風等藥則反傷元氣適足以招風取中藥隱老人
云古治中風方續命排風越婢等悉能除去而千
金多用麻黃令人不得慮虛凡以風邪不得汗則不
能泄也然此治中風無汗者為宜若治自汗者更用
麻黃則津液轉使脫泄反為大害中風自汗仲景雖

處以桂枝湯。至於不住發搐。口眼瞤動。遍身汗出者。豈勝對治。當此之時。獨活湯續命煮散。復榮衛。却風邪。不可闕也。薛立齋云。婦人若膝理不固而自汗者。用桂枝湯或防風白朮牡蠣湯。若過服風藥而自汗者。用白朮防風湯。若陽氣虛弱而自汗者。用芪附湯。若兼盜汗。用補中益氣湯送六味丸。如不應用。當歸六黃湯。婦人偏枯者。其狀半身不遂。肌肉枯瘦。骨間疼痛。神智如常。名曰偏枯也。原其致疾之由。皆因陰陽偏虧。臟腑怯弱。經絡空虛。血氣不足。當風衝坐。風邪乘虛而入。內經云。汗出偏溫。使人偏枯。詳其義理。如樹木或有一邊津液不蔭注。而先枯槁。然後被風。然後被風所苦。其理顯然。王子亨云。舟行於水。人處於風。水能泛舟。而亦能害體。人之身體。或有一邊。血氣不能榮養。而先枯槁者。中在裏也。其人眩仆昏冒。不省人事。或痰聲如曳鋸。宜分臟腑寒熱而治之。假如其人素挾虛寒。或暴中新寒。則風水相遭。寒冰徹骨。而風為寒風矣。假如其人素有積熱。或鬱火暴發。則風乘火熱。火借風威。手握固法。當疏風開竅。先用搐鼻散吹之。次用牛黃丸灌之。若大便閉結。腹滿脹悶。火勢極盛者。以三化湯攻之。為寒風多見脫症。其症手撒脾絕。眼合肝絕。深真氣去。邪氣留。發為偏枯。此由血氣衰損。為風所

容令血氣不相周榮於肌。故令偏枯也。薛立齋云。醫風先醫血。此論得之。大抵此證多因胎前產後失於調養。以致精血乾涸。肝木枯槁。治法當滋其化源。生氣通天論曰。風客淫氣。精乃亡。邪傷肝也。陰陽應象火論曰。風氣通於肝。氣搏則熱。盛則水乾。水乾筋。上夾於口。其筋偏虛。風因虛而乘之。使其筋偏急不調。故令口喝僻也。中風者。真中風也。有中肺中臟。中血脈之殊中腑者。中在表也。外有六經之形症。與傷寒六經傳變之症無異也。中太陽。用桂枝湯。中陽明。葛根湯加桂枝。中少陽。小柴胡湯加桂枝。中臟者。中在裏也。其人眩仆昏冒。不省人事。或痰聲如曳鋸。宜分臟腑寒熱而治之。假如其人素挾虛寒。或暴中新寒。則風水相遭。寒冰徹骨。而風為寒風矣。假如其人素有積熱。或鬱火暴發。則風乘火熱。火借風威。而風為熱風矣。為熱風多見閉症。其症牙關緊急。兩手握固。法當疏風開竅。先用搐鼻散吹之。次用牛黃丸灌之。若大便閉結。腹滿脹悶。火勢極盛者。以三化湯攻之。為寒風多見脫症。其症手撒脾絕。眼合肝絕。

口張心絕聲如鼾肺絕遺尿腎絕更有兩目直視搖頭上竄髮直如瓶汗出如珠皆脫絕之症法當溫補元氣急用大劑附子理中湯灌之若疾延壅盛以三生飲加入參灌之間亦有寒瘻壅塞介乎閉脫之間不便驟補者用半夏橘紅各一兩濃煎至一杯以生薑自然汁對沖頻頻灌之其人即甦然後按其虛而調之要之用附子理中治愈者甚多其用牛黃丸治愈者亦恒有之惟三化湯一方並未舉用此必天時地土人事之不同然寒熱之劑屹然並立古方具在法不可泯故兩存之以備參酌中血脈者中在經絡之中也其症口眼歪斜半身不遂是也大秦艽湯主之偏在左倍用四物湯偏在右佐以四君子湯左右俱病佐以八珍湯並虎骨膠丸此治真中之大法也口噤角弓反張瘙病也但口噤而不反張者是未成瘙也大秦艽湯真瘙病俱見前傷寒兼症中宜細加查核不語有心脾腎三經之異又有風寒客於會厭卒然無音者大法若因痰迷心竅當清心火牛黃丸神仙解語丹若因風痰聚于脾經當導痰涎二陳湯加竹瀝薑汁並用解語丹若因腎經虛大上炎當壯水之主六

味湯加速志石菖蒲若因腎經虛寒厥逆當益火之源劉河間地黃飲子或用虎骨膠丸加鹿茸若風寒客於會厭聲音不揚者用甘桔湯加陳散藥遺尿謂之腎絕多難救然反目遺尿者為腎絕若不反目但遺尿者多屬氣虛重用參芪等藥補之即愈類中風者謂火中虛中溼中寒中暑中氣中食中惡中也共有八種與真中相類而實不同然類中有與真中相兼者須細察其形症而辨之凡真中之症必連經絡多見歪斜偏廢之候與類中之專氣致病者自是不同然而風乘火勢邪乘虛入寒風相搏暑風相炫飲食招風種種變症所在多者務在詳辨精細果其為真中風則用前驅風法果其為類中風則照本門施治果其為真中類中相兼也則以兩門醫法合治之斯無弊耳火中為火之自外來者名曰賊火也火之自內出者名曰子虛火也中火之症良由將息失宜心火暴盛腎水虛衰不能制之故卒然昏倒不可作實火論假如怒動肝火逍遙散心火鬱結牛黃清心丸肺火壅遏貝母瓜蒌散思慮傷脾加味歸脾湯腎水枯涸虛火上炎者六味地黃湯若腎經陽虛火不歸原者八味地黃湯劉河間地黃飲子並主之

此治火中之法也。或問火中而用桂附者何也。答曰。腎陽飛越。則丹田虛冷。其痰涎上壅者。水不歸原也。面赤煩躁者。火不歸原也。惟桂附八味。能引火歸原。虛中者。凡人體質虛弱。過於作勞。傷損元氣。以致痰壅氣浮。卒然昏倒。宜用六君子湯主之。中氣下陷者。補中益氣湯主之。溼中者。即痰中也。凡人嗜食肥甘。或醇酒乳酪。則溼從內受。或山嵐瘴氣。久雨陰晦。或遠行涉水。坐卧溼地。則溼從外受。溼生痰。痰生熱。熱生風。故卒然昏倒無知也。蒼白二陳湯主之。寒中者。暴中於寒也。卒然口鼻氣冷。手足厥冷。或腹痛下利。清穀。或身體強硬。口噤不語。四肢戰搖。此寒邪直中於裏也。宜用薑附湯。或附子理中湯加桂主之。暑中者。或務農於赤日。或行旅於長途。暑氣逼迫。卒然昏倒。自汗面垢。昏不知人也。急用千金消暑丸灌之。其人立甦。此藥有回生之功。一切暑藥皆不及此。村落中各宜預備灌醒後。以益元散清之。或以四味香薷飲去厚朴。加丹參茯苓黃連治之。虛者。加人參。氣中者。七情氣結。或怒動肝氣。以致氣逆痰壅。牙關緊急。極與中風相似。但中風身熱。中氣身涼。中風浮脈。中氣沉。且病有根由。必須細究。宜用木香調氣散主。

之。食中者。醉飽過度。或著惱怒。以致飲食填塞胸中。胃氣不行。卒然昏倒。宜用橘紅二兩。生薑一兩。炒鹽一撮。煎湯灌而吐之。次用神术散和之。其最甚者。胸高滿悶。閉而不通。或牙關緊急。厥暈不醒。但心口溫漸甦。若瀉不止者。以冷粥湯飲之。即止。患中者。登塚入廟。冷屋樓遲。以致邪氣相侵。卒然錯落妄言。或頭面青黯。昏不知人。急用葱薑湯灌之。次以神术散調之。蘇合丸亦佳。

〔西醫學說〕中醫之所謂中風。即西醫之腦出血也。一名腦溢血。亦稱卒中風。省曰卒中。患此者。以生平富饒之人。與酒客。及生平懶惰。或精神過勞者為多。軀體肥壯者最易罹之。其時則在勞力過度之餘。精神發揚之會。推之一咳一嚏。亦足以為其誘因。發作之前。必有眩暈。頭痛。鈍壓。精神遲鈍。諸證候為之先導。或則身體倦怠。精神沈鬱。大便秘結。非常嗜眠。過日。速則數時。便爾奄化。此重症之情狀也。其輕微者。

昏睡既過。由漸醒覺。惟舌根多澀滯。不能任意言語。或記憶力減少。有能憶舊事而反忘近事者。而其辨別事理之智慧。亦非常鈍弱。有時氣質亦且變化溫和者一變而為剛暴。勇毅者一變而為柔弱。智慧者一變而為癡騃。至不一也。其致病之故。初不由於風。而由於腦髓之出血。其部位殊不一致。其變化則在腦中最細之動脈管。發生數多之瘤。大如米粟。久之如遇有憤怒。飽食。飲酒。荷重。久僵。努責諸事故。或際天氣嚴寒。該生瘤之動脈管。一旦破裂。遂致出血。腦髓者。精神之所舍也。一經不應有之血溢出其間。故立即人事不省。又多血。肥胖。嗜酒三者。常為卒中之素因。間有出於祖父之遺傳者。然甚少。故豫防之法。飲酒毋過量。大便毋努責。沐浴毋取熱水。凡此皆所以防血液之上行而發病也。食物以淡泊為貴。大便務須調勻。勿令燥結。平日作事。須有規則。勞逸務得其平。倘已發病。身體最須安靜。切戒大聲喧鬧驚擾。病人病牀被褥。務必展之使平。免致發生褥瘡。更須察視病人面色。測驗病人脈搏。病人若面色泛紅。脈來頻數者。則須高擡頭部。仍用冰袋冷之。病人若面色青白。脈來微弱者。則當於兩太陽穴塗以火酒。鼻

噴硝砂。心窩及肺腸部。均敷芥子泥。病人醒後。如不能嚥下唾液者。切勿與以食物。迨見發熱。頭部仍須冷以冰袋。食物祇宜牛乳。嚴禁一切茶酒。大便尤為緊要。如無大便。須投輕瀉藥。或為灌腸。促其通利。防其秘結。既現癱瘓。不能轉側。腰部及臀部著林之處。每日須以綿花蘸千倍之昇汞水。揩拭該部皮膚二次。更塗擦火酒酸醋等。以防褥瘡。麻痺之肢。日須為按摩一次。其關節部則代為微微運動。俾不終廢。此外更可兼通平流電氣。但終不如按摩之最效耳。中醫之所謂角弓反張。口眼喎斜。與所謂剛症者。西醫謂之破傷風。一名強直痙攣。因土壤中發生之一種細菌。自人身之創傷部而客體中。遂漸蔓延而發為病。初時頭部先起強直。由是面部背部四肢等次第緊張。終至全身不能自如。倒卧牀褥。自三日至五日後。呼吸促迫。心臟麻痺。卒以致死。若更詳細分之。則始發之時。尚有前驅病狀。如疲倦。頭痛。惡寒。頭項強直。脊柱彎曲向前。是謂角弓反張。腹筋之牽縮亦噤不開。是謂牙關緊急。頭不能牽引向後。是謂頸項

甚幸波及上肢者尚少。要之全身筋肉之痙攣俱由漸增劇。至後則嚥下及橫膈膜亦皆痙攣。聲門亦然。覩其容貌既甚駭怪。亦復可憐。此種痙攣苟遇微風吹動。或寢牀稍搖。或室中有人行步。並能加甚。其全身症狀。則發汗淋漓。皮膚及腱之反射。俱甚亢進。筋肉疼痛。獨神識如常清明。體溫惟在發作之時。每有升至四十度以上者。此病輕者可治。重者必死。豫防之法。在謹防皮膚粘膜之受外傷。不幸已發此病。務須安居幽靜室中。禁一切音響訪問。以及其他各種刺戟。最妙以白蠟塞住兩耳。食物宜擇流動性而富於滋養物者。就中以肉羹汁為佳。後頭與脊柱宜常以熱水壓迫。

中國醫方 防風散 治婦人中風言語蹇澀四肢拘急身體壯熱頭疼目眩心胸不利
防風 去蘆一兩 石膏 二兩半 麻黃 去節 漢防已 去皮各七錢
細辛 去苗 川生麻 當歸蘆各半兩 桂心
芎藭 赤茯苓去皮 甘草 羌活去蘆各半兩
右為粗散。每服八錢水一中盞半。煎至一大盞去滓。入淡竹懸一合。更煎一兩沸。溫服。不拘時。
芎藭散 治婦人卒中風四肢不仁善笑不息。

天南星生薑製皮去

麻黃

半夏湯洗七次薑製

赤箭各半研半錢

防風去蘆谷半兩

右為細末。入研藥令勻。每服二錢。溫酒調下。不拘時日三服。

川烏頭皮臍去

桂心

蝎梢各半生用

麝香研半錢

羚羊角散和搗二三百下丸如梧桐子大

研麝香令勻。煉蜜和搗二三百下丸如梧桐子大。每服三十丸。豆淋酒送下。日二服無時。

木香煮散

治左癱右瘓并素有風濕諸藥不效常服調氣進食寬中

羌活

麻黃去節各壹兩

防風七錢半

白术

陳皮

桂心各半

人參

白茯苓

右咬咀。每

黑附子炮

南木香

柏榔

牛膝

大川烏

甘草

杏仁去皮炒

人參

右咬咀。每

炒草豆蔻連皮

當歸

牛膝

大川烏

桂心各半

人參

白茯苓

右咬咀。每

川烏炮

當歸

柏榔

牛膝

大川烏

桂心各半

人參

右咬咀。每

服四錢水一大盞半。生薑五斤。煎至八分。去滓。熱服。大便不通。加大黃。心腹脹加苦葶苈滑石。膈上壅滯。咳嗽氣促。加半夏川升麻。天門冬知母。右

古方專主婦人中風。故收之。率用麻黃桂心。非真中外邪。不宜輕用。只以薛氏法調之為善。

白僵蠶散

治婦人中風角弓反張口噤不能言皮膚頑麻筋脈抽掣

白僵蠶一兩炒

麝香另研

烏蛇肉炒全

烏蛇肉

桂心

人參

白茯苓

右為

白僵蠶散

治婦人中風角弓反張或身體強直牙關

白僵蠶一兩炒

麝香另研

烏蛇肉

桂心

人參

右為

白僵蠶散

治婦人中風角弓反張如弓之狀

白僵蠶一兩炒

三癆湯 治血氣凝滯手足拘攣風痺氣痺等疾

川續斷

杜仲

炒去薑汁

防風

去蘆

桂心

華陰

細人參

蘆去

白茯苓

皮去

當歸

蘆去

白芍藥

酒浸各一兩

秦艽

酒浸各一兩

川芎

酒浸各一兩

獨活

防風

柴胡

錢各一兩

藁本

獨活

茯苓

甘草

炙

陳皮

黃

甘草

兩半各一兩

獨活

去蘆各半兩

黃芪

蘆去

川牛膝

酒浸各一兩

右咬

水煎

生薑五片

棗一枚

桂心

附子炮去

當歸

桂心

赤芍藥

錢半兩

桑寄生

牛膝酒浸

甘草

炙

桂心

桂心

人參

蘆去

白茯苓

皮去

當歸

蘆去

白芍藥

酒浸各一兩

秦艽

酒浸各一兩

獨活

防風

柴胡

錢各一兩

藁本

獨活

茯苓

甘草

炙

桂心

附子炮去

當歸

獨活

去蘆各半兩

黃芪

蘆去

川牛膝

酒浸各一兩

右咬

水煎

生薑五片

棗一枚

桂心

附子炮去

當歸

桂心

赤芍藥

錢半兩

桑寄生

牛膝酒浸

甘草

炙

桂心

附子炮去

當歸

獨活

去蘆各半兩

黃芪

蘆去

川牛膝

酒浸各一兩

右咬

水煎

生薑五片

棗一枚

桂心

附子炮去

當歸

桂心

赤芍藥

錢半兩

桑寄生

牛膝酒浸

甘草

炙

桂心

附子炮去

當歸

獨活

去蘆各半兩

黃芪

蘆去

川牛膝

酒浸各一兩

右咬

水煎

生薑五片

棗一枚

桂心

附子炮去

當歸

桂心

赤芍藥

錢半兩

桑寄生

牛膝酒浸

甘草

炙

桂心

附子炮去

當歸

獨活

去蘆各半兩

黃芪

蘆去

川牛膝

酒浸各一兩

右咬

水煎

生薑五片

棗一枚

桂心

附子炮去

當歸

桂心

赤芍藥

錢半兩

桑寄生

牛膝酒浸

甘草

炙

桂心

附子炮去

當歸

獨活

去蘆各半兩

黃芪

蘆去

川牛膝

酒浸各一兩

右咬

水煎

生薑五片

棗一枚

桂心

附子炮去

當歸

桂心

赤芍藥

錢半兩

桑寄生

牛膝酒浸

甘草

炙

桂心

附子炮去

當歸

獨活

去蘆各半兩

黃芪

蘆去

川牛膝

酒浸各一兩

右咬

水煎

生薑五片

棗一枚

桂心

附子炮去

當歸

桂心

赤芍藥

錢半兩

桑寄生

牛膝酒浸

甘草

炙

桂心

附子炮去

當歸

獨活

去蘆各半兩

黃芪

蘆去

川牛膝

酒浸各一兩

右咬

水煎

生薑五片

棗一枚

桂心

附子炮去

當歸

桂心

赤芍藥

錢半兩

桑寄生

牛膝酒浸

甘草

炙

桂心

附子炮去

當歸

獨活

去蘆各半兩

黃芪

蘆去

川牛膝

酒浸各一兩

右咬

水煎

生薑五片

棗一枚

桂心

附子炮去

當歸

桂心

赤芍藥

錢半兩

桑寄生

牛膝酒浸

甘草

炙

桂心

附子炮去

當歸

獨活

去蘆各半兩

黃芪

蘆去

川牛膝

酒浸各一兩

右咬

水煎

生薑五片

棗一枚

桂心

附子炮去

當歸

桂心

赤芍藥

錢半兩

桑寄生

牛膝酒浸

甘草

炙

桂心

附子炮去

當歸

獨活

去蘆各半兩

黃芪

蘆去

川牛膝

酒浸各一兩

右咬

水煎

生薑五片

棗一枚

桂心

附子炮去

當歸

桂心

赤芍藥

錢半兩

桑寄生

牛膝酒浸

甘草

炙

桂心

附子炮去

當歸

獨活

去蘆各半兩

黃芪

蘆去

川牛膝

酒浸各一兩

右咬

水煎

生薑五片

棗一枚

桂心

附子炮去

當歸

桂心

赤芍藥

錢半兩

桑寄生

牛膝酒浸

甘草

炙

桂心

附子炮去

當歸

獨活

去蘆各半兩

黃芪

蘆去

川牛膝

酒浸各一兩

右咬

水煎

生薑五片

棗一枚

桂心

附子炮去

當歸

桂心

赤芍藥

溫服不拘時

續命煮散 治風氣留滯心中昏憤四肢無力口眼瞼動有時搐搦失津液渴欲引飲此能扶榮衛

去虛風中風自汗及產後中風自汗尤宜服之

防風 獨活 細辛 當歸 人參 葛根 芍

藥 川芎 甘草 熟地黃 半夏 遣志心去

荆芥穗雨 桂心七錢 右咬咀每服五錢水

一盞生薑三大片煎至七分去滓溫服不拘時汗多不止者加牡蠣粉一分半

防風白朮牡蠣散 治中風自汗不止

白朮 牡蠣殼煅 防風各等 右為末酒調下米

飲亦可日三服汗即止如不止可服黃芪建中湯

大八風湯 治中風偏枯失音半身不遂時復恍惚當歸去 蘆

杏仁炒 甘草炙 桂心 乾薑炮各半兩

五味子 升麻各半兩 川烏頭炮去皮臍 黃芩 芍

藥 獨活 防風蘆去根切 茯神木去 石膏 黃

人參各去 紫苑兩去 大豆三皮炒去 右咬咀每服

五錢水二盞酒一合煎至一盞去滓溫服恍惚者不用酒煎一方無茯苓。有遠志赤茯苓

增損茵芋酒 治半身不遂肌肉乾燥漸漸細瘦或時癢痛病名偏枯

茵芋葉 川烏頭炮去皮共 石楠葉

肉桂 天雄炮去皮 北細辛 獨活

當歸 生乾地黃雨各二 秦艽 防己各

炒 陳皮 去苗 白芍藥 細辛 各一兩

二斗漬之冬七日夏三日春秋各五日初服一合

漸增之以愈為度令酒氣相續

續斷湯 治偏枯少血

當歸三兩去蘆 陳皮去 芍藥 細辛

乾地黃雨 右咬咀每服五錢水二盞煎至八分

去滓溫服臟寒多利者入熱附子一兩和前藥服

全生虎骨散 治半身不遂肌肉乾瘦忌用麻黃發汗恐津液枯竭也

當歸二兩 赤芍藥 繢斷酒浸炒 白朮 蕺本

虎骨火各五兩 烏蛇肉火半兩 右為末每服二錢酒

調下骨痛加生地一兩自利加天雄半兩

虎脰骨酒 治中風偏枯四肢不遂一切風痺筋脈

石斛 石楠葉 防風 虎脰骨炙 當歸 茵

芋葉

杜仲
炒酒

牛膝
炒酒浸

續斷
酒浸

芎芻

巴戟

心去
根各一兩

狗脊
去毛各一兩

右以絹囊盛藥用酒

防風湯

去蘆一兩

治卒然口喎斜語言牽急

防風

去蘆半兩

羌活
甘草
右吹哩每

水二盞煎至一盞去滓溫麝香研一字溫

續命湯

療中風口僻噤諸疾卒死不知人補虛起

死神方

人參
防己
麻黃
芍藥
川芎
甘草

右吹哩每

水二盞煎至一盞去滓溫麝香研一字溫

續命湯

療中風口僻噤諸疾卒死不知人補虛起

死神方

人參
防己
麻黃
芍藥
川芎
甘草

右吹哩每

水二盞煎至一盞去滓溫麝香研一字溫

續命湯

療中風口僻噤諸疾卒死不知人補虛起

死神方

人參
防己
麻黃
芍藥
川芎
甘草

右吹哩每

水二盞煎至一盞去滓溫麝香研一字溫

續命湯

療中風口僻噤諸疾卒死不知人補虛起

死神方

人參
防己
麻黃
芍藥
川芎
甘草

右吹哩每

水二盞煎至一盞去滓溫麝香研一字溫

續命湯

療中風口僻噤諸疾卒死不知人補虛起

死神方

人參
防己
麻黃
芍藥
川芎
甘草

右吹哩每

水二盞煎至一盞去滓溫麝香研一字溫

續命湯

療中風口僻噤諸疾卒死不知人補虛起

死神方

人參
防己
麻黃
芍藥
川芎
甘草

右吹哩每

水二盞煎至一盞去滓溫麝香研一字溫

續命湯

療中風口僻噤諸疾卒死不知人補虛起

死神方

人參
防己
麻黃
芍藥
川芎
甘草

右吹哩每

水二盞煎至一盞去滓溫麝香研一字溫

續命湯

療中風口僻噤諸疾卒死不知人補虛起

死神方

人參
防己
麻黃
芍藥
川芎
甘草

右吹哩每

水二盞煎至一盞去滓溫麝香研一字溫

千金方

炒大豆三升令焦以酒三升淋取汁頓服

治口眼喎斜用草麻子七粒去皮研細作餅子置

手心右鳴安左手却用銅盃乘湯坐於藥上繞正

即洗去草麻出本草

治一切中症不省人事用此吹鼻中有嚏

者生無嚏者難治

搐鼻散

治一切中症不省人事用此吹鼻中有嚏

者生無嚏者難治

即洗去草麻出本草

細辛

去葉各一兩

半夏

生用五錢

右為極細

未磁瓶收貯勿泄氣臨用吹一二分入鼻孔中取

嚏

細辛

去葉各一兩

半夏

生用五錢

右為極細

牛黃丸

治中風痰火閉結或瘧癰癱瘓語言蹇澀

恍惚眩暉精神昏憊不省人事或喘嗽痰壅煩心

等症

牛黃

六錢

麝香

龍腦味另研

羚羊角

當歸

洗酒

防風

黃芩

柴胡

白朮

麥冬去皮

阿膠

五分八錢

桔梗

白茯苓

杏仁去皮

川芎

大黃

卷各一兩

阿膠

五分八錢

蒲黃

人參去皮

大黃

卷各一兩

雄黃

四錢另研

甘草

五錢

乾薑

七分

桂枝

各三錢

桂枝

人參去皮

阿膠

五分八錢

桔梗

白茯苓

杏仁去皮

川芎

右

每服一丸溫水化下。

三化湯

治中風入臟熱勢極盛閉結不通便漏阻

隔不行乃風火相搏而為熱風者本方主之設內

有寒氣大便反鞭名曰陰結不可誤用攻藥誤即

不能復救慎之慎之

厚朴

姜汁炒

大黃

酒蒸

枳實

炒

羌活

錢半

右水煎服

三生飲 治寒風中臟六脈沈細痰壅喉響不省人

事乃寒痰厥逆之候

生南星

生烏頭去皮

生附子各一分

生薑

五片

生木香分五

右水煎服

生附子各一錢

生薑

大秦艽湯

治中風經絡口眼歪斜半身不遂或語言蹇澀乃血弱不能養於筋宜用養血疏風之劑

經云治風先治血血行風自滅是也

秦艽

一錢甘草失

川芎當歸芍藥生

神术散 此藥能治時行不正之氣發熱頭痛傷食停飲胸滿腹痛嘔吐瀉利並能解穢驅邪除山嵐

白芷 黃芩酒炒各細辛 右水煎服煩躁口渴加石膏一錢五分陰雨加生薑三片春夏

加知母八分此方初時宜用若日久則以四物四君子為主而以風藥佐之庶收全功

二陳湯

陳皮

茯苓

半夏

姜汁

各一錢半

右加入大棗二枚水煎服

地黃飲子

熟地九兩

巴戟

心去

萸肉核

肉蓯

蓉焙酒浸

石菖蒲去毛

桂心

麥冬去

遠志去心

草

右入薄荷少許

薑一片

棗二枚水煎服

氣虛加人參二錢

柴胡

甘草

茯苓

白朮

當歸

白芍

丹

加味逍遙散

治肝經鬱火胸脇脹痛或作寒熱甚

至肝木生風眩暉振搖或咬牙發瘙一日斜視一

手一足搐搦

皮

黑山梔

錢各一

薄荷

五分

右水煎服

貝母瓜萎散

貝母錢二

瓜萎仁

一錢五分

胆南星

五分

黃芩

橘紅

黃連一錢

甘草

黑山梔

錢各五分

右水煎服

蒼术

陳土

陳皮

厚朴

姜汁炒各二錢

甘草

二兩

藿香

八兩

砂仁

四兩

共為末

每服二三錢

開水調下

獨行丸 治中食胸高滿悶吐法不效須用此藥攻之若昏暈不醒四肢僵硬但心頭溫者抉齒灌之大黃炒酒 巴豆去壳去油 乾薑錢各一 右研細薑汁為丸如黃豆大每服五七丸用薑湯化下若服後瀉不止者用冷粥飲之即止

蘇合丸 治勞瘵骨蒸症忤心痛霍亂吐利時氣鬼魅瘡瘍疫癥瘍血月閉痃癖疔腫驚癇中風中氣疫厥昏迷等證

白术 青木香 犀角 香附炒去毛 研砂水

牛膝取

檀香

安息香酒熟膏

沉香

麝香

蘇合

龍腦

薰陸香研別

香各二兩

右為細末研藥勻用安息香膏並蘇合

香油

煉蜜和丸如彈子大以蠟封固紺綢當心

帶之一切邪祟不敢近

排風湯 治風邪入臟狂言妄語

白蘚皮 白朮 白芍藥炒 桂心 川芎 當

歸 防風 杏仁去皮炒 甘草兩各二 白茯苓

麻黃去節 獨活各三兩

小引風湯 防風 獨活 細辛 川芎 五味子炒 白茯

苓 人參 白芍藥炒 白朮炒 甘草等分 右
每服五錢薑三片杏仁五粒水煎服加麻黃桂薑附子當歸羚羊角等分即大引風湯也必效竹懸湯 治中風痰涎壅盛言語塞滯四肢緩縱

秦艽 防風 獨活 附子炮各一錢 右以水二盞煎半盞入生地汁淡竹懸各半盞再煎四五沸作四服病既去以他藥調治未愈再服最效

星香湯 治中風痰盛服熱藥不得者

南星 木香等分 右每服四錢薑十片水煎

星附湯 治中風痰涎上攻六脈沈伏不知人事

附子生用 南星生用各一兩 木香半兩 右每服四錢

秦艽湯 治中風外無六經之形症內無便溺之阻隔乃血弱不能養於筋手足不能運口強不能言

薑水煎寒甚加天雄川烏多尖關元丹田二穴

生地黃 熟地黃製 白朮 白茯苓各一兩 紅

秦艽 石膏各二兩 甘草炒 川芎 當歸 芍

藥炒 羌活 獨活 防風 黃芩炒 白芷

生地黃 熟地黃製 白朮 白茯苓各一兩 紅

秦艽 石膏各二兩 甘草炒 川芎 當歸 芍

藥炒 羌活 獨活 防風 黃芩炒 白芷

生地黃 熟地黃製 白朮 白茯苓各一兩 紅

秦艽 石膏各二兩 甘草炒 川芎 當歸 芍

藥炒 羌活 獨活 防風 黃芩炒 白芷

生地黃 熟地黃製 白朮 白茯苓各一兩 紅

秦艽 石膏各二兩 甘草炒 川芎 當歸 芍

藥炒 羌活 獨活 防風 黃芩炒 白芷

生地黃 熟地黃製 白朮 白茯苓各一兩 紅

秦艽 石膏各二兩 甘草炒 川芎 當歸 芍

藥炒 羌活 獨活 防風 黃芩炒 白芷

生地黃 熟地黃製 白朮 白茯苓各一兩 紅

秦艽 石膏各二兩 甘草炒 川芎 當歸 芍

藥炒 羌活 獨活 防風 黃芩炒 白芷

生地黃 熟地黃製 白朮 白茯苓各一兩 紅

秦艽 石膏各二兩 甘草炒 川芎 當歸 芍

藥炒 羌活 獨活 防風 黃芩炒 白芷

生地黃 熟地黃製 白朮 白茯苓各一兩 紅

秦艽 石膏各二兩 甘草炒 川芎 當歸 芍

藥炒 羌活 獨活 防風 黃芩炒 白芷

生地黃 熟地黃製 白朮 白茯苓各一兩 紅

秦艽 石膏各二兩 甘草炒 川芎 當歸 芍

藥炒 羌活 獨活 防風 黃芩炒 白芷

生地黃 熟地黃製 白朮 白茯苓各一兩 紅

秦艽 石膏各二兩 甘草炒 川芎 當歸 芍

藥炒 羌活 獨活 防風 黃芩炒 白芷

生地黃 熟地黃製 白朮 白茯苓各一兩 紅

秦艽 石膏各二兩 甘草炒 川芎 當歸 芍

藥炒 羌活 獨活 防風 黃芩炒 白芷

生地黃 熟地黃製 白朮 白茯苓各一兩 紅

秦艽 石膏各二兩 甘草炒 川芎 當歸 芍

藥炒 羌活 獨活 防風 黃芩炒 白芷

生地黃 熟地黃製 白朮 白茯苓各一兩 紅

秦艽 石膏各二兩 甘草炒 川芎 當歸 芍

藥炒 羌活 獨活 防風 黃芩炒 白芷

生地黃 熟地黃製 白朮 白茯苓各一兩 紅

秦艽 石膏各二兩 甘草炒 川芎 當歸 芍

藥炒 羌活 獨活 防風 黃芩炒 白芷

生地黃 熟地黃製 白朮 白茯苓各一兩 紅

秦艽 石膏各二兩 甘草炒 川芎 當歸 芍

藥炒 羌活 獨活 防風 黃芩炒 白芷

生地黃 熟地黃製 白朮 白茯苓各一兩 紅

秦艽 石膏各二兩 甘草炒 川芎 當歸 芍

藥炒 羌活 獨活 防風 黃芩炒 白芷

生地黃 熟地黃製 白朮 白茯苓各一兩 紅

秦艽 石膏各二兩 甘草炒 川芎 當歸 芍

藥炒 羌活 獨活 防風 黃芩炒 白芷

生地黃 熟地黃製 白朮 白茯苓各一兩 紅

秦艽 石膏各二兩 甘草炒 川芎 當歸 芍

藥炒 羌活 獨活 防風 黃芩炒 白芷

生地黃 熟地黃製 白朮 白茯苓各一兩 紅

秦艽 石膏各二兩 甘草炒 川芎 當歸 芍

藥炒 羌活 獨活 防風 黃芩炒 白芷

生地黃 熟地黃製 白朮 白茯苓各一兩 紅

秦艽 石膏各二兩 甘草炒 川芎 當歸 芍

藥炒 羌活 獨活 防風 黃芩炒 白芷

生地黃 熟地黃製 白朮 白茯苓各一兩 紅

秦艽 石膏各二兩 甘草炒 川芎 當歸 芍

藥炒 羌活 獨活 防風 黃芩炒 白芷

生地黃 熟地黃製 白朮 白茯苓各一兩 紅

秦艽 石膏各二兩 甘草炒 川芎 當歸 芍

藥炒 羌活 獨活 防風 黃芩炒 白芷

生地黃 熟地黃製 白朮 白茯苓各一兩 紅

秦艽 石膏各二兩 甘草炒 川芎 當歸 芍

藥炒 羌活 獨活 防風 黃芩炒 白芷

生地黃 熟地黃製 白朮 白茯苓各一兩 紅

秦艽 石膏各二兩 甘草炒 川芎 當歸 芍

藥炒 羌活 獨活 防風 黃芩炒 白芷

生地黃 熟地黃製 白朮 白茯苓各一兩 紅

秦艽 石膏各二兩 甘草炒 川芎 當歸 芍

藥炒 羌活 獨活 防風 黃芩炒 白芷

生地黃 熟地黃製 白朮 白茯苓各一兩 紅

秦艽 石膏各二兩 甘草炒 川芎 當歸 芍

藥炒 羌活 獨活 防風 黃芩炒 白芷

生地黃 熟地黃製 白朮 白茯苓各一兩 紅

秦艽 石膏各二兩 甘草炒 川芎 當歸 芍

藥炒 羌活 獨活 防風 黃芩炒 白芷

生地黃 熟地黃製 白朮 白茯苓各一兩 紅

秦艽 石膏各二兩 甘草炒 川芎 當歸 芍

藥炒 羌活 獨活 防風 黃芩炒 白芷

生地黃 熟地黃製 白朮 白茯苓各一兩 紅

秦艽 石膏各二兩 甘草炒 川芎 當歸 芍

藥炒 羌活 獨活 防風 黃芩炒 白芷

生地黃 熟地黃製 白朮 白茯苓各一兩 紅

秦艽 石膏各二兩 甘草炒 川芎 當歸 芍

藥炒 羌活 獨活 防風 黃芩炒 白芷

生地黃 熟地黃製 白朮 白茯苓各一兩 紅

秦艽 石膏各二兩 甘草炒 川芎 當歸 芍

藥炒 羌活 獨活 防風 黃芩炒 白芷

生地黃 熟地黃製 白朮 白茯苓各一兩 紅

秦艽 石膏各二兩 甘草炒 川芎 當歸 芍

藥炒 羌活 獨活 防風 黃芩炒 白芷

生地黃 熟地黃製 白朮 白茯苓各一兩 紅

秦艽 石膏各二兩 甘草炒 川芎 當歸 芍

藥炒 羌活 獨活 防風 黃芩炒 白芷

生地黃 熟地黃製 白朮 白茯苓各一兩 紅

秦艽 石膏各二兩 甘草炒 川芎 當歸 芍

藥炒 羌活 獨活 防風 黃芩炒 白芷

生地黃 熟地黃製 白朮 白茯苓各一兩 紅

秦艽 石膏各二兩 甘草炒 川芎 當歸 芍

藥炒 羌活 獨活 防風 黃芩炒 白芷

生地黃 熟地黃製 白朮 白茯苓各一兩 紅

秦艽 石膏各二兩 甘草炒 川芎 當歸 芍

藥炒 羌活 獨活 防風 黃芩炒 白芷

生地黃 熟地黃製 白朮 白茯苓各一兩 紅

秦艽 石膏各二兩 甘草炒 川芎 當歸 芍

藥炒 羌活 獨活 防風 黃芩炒 白芷

生地黃 熟地黃製 白朮 白茯苓各一兩 紅

秦艽 石膏各二兩 甘草炒 川芎 當歸 芍

藥炒 羌活 獨活 防風 黃芩炒 白芷

生地黃 熟地黃製 白朮 白茯苓各一兩 紅

秦艽 石膏各二兩 甘草炒 川芎 當歸 芍

藥炒 羌活 獨活 防風 黃芩炒 白芷

生地黃 熟地黃製 白朮 白茯苓各一兩 紅

秦艽 石膏各二兩 甘草炒 川芎 當歸 芍

藥炒 羌活 獨活 防風 黃芩炒 白芷

生地黃 熟地黃製 白朮 白茯苓各一兩 紅

秦艽 石膏各二兩 甘草炒 川芎 當歸 芍

藥炒 羌活 獨活 防風 黃芩炒 白芷

生地黃 熟地黃製 白朮 白茯苓各一兩 紅

秦艽 石膏各二兩 甘草炒 川芎 當歸 芍

藥炒 羌活 獨活 防風 黃芩炒 白芷

生地黃 熟地黃製 白朮 白茯苓各一兩 紅

秦艽 石膏各二兩 甘草炒 川芎 當歸 芍

藥炒 羌活 獨活 防風 黃芩炒 白芷

生地黃 熟地黃製 白朮 白茯苓各一兩 紅

秦艽 石膏各二兩 甘草炒 川芎 當歸 芍

藥炒 羌活 獨活 防風 黃芩炒 白芷

生地黃 熟地黃製 白朮 白茯苓各一兩 紅

秦艽 石膏各二兩 甘草炒 川芎 當歸 芍

藥炒 羌活 獨活 防風 黃芩炒 白芷

生地黃 熟地黃製 白朮 白茯苓各一兩 紅

秦艽 石膏各二兩 甘草炒 川芎 當歸 芍

藥炒 羌活 獨活 防風 黃芩炒 白芷

生地黃 熟地黃製 白朮 白茯苓各一兩 紅

秦艽 石膏各二兩 甘草炒 川芎 當歸 芍

藥炒 羌活 獨活 防風 黃芩炒 白芷

生地黃 熟地黃製 白朮 白茯苓各一兩 紅

秦艽 石膏各二兩 甘草炒 川芎 當歸 芍

藥炒 羌活 獨活 防風 黃芩炒 白芷

生地黃 熟地黃製 白朮 白茯苓各一兩 紅

秦艽 石膏各二兩 甘草炒 川芎 當歸 芍

藥炒 羌活 獨活 防風 黃芩炒 白芷

生地黃 熟地黃製 白朮 白茯苓各一兩 紅

秦艽 石膏各二兩 甘草炒 川芎 當歸 芍

藥炒 羌活 獨活 防風 黃芩炒 白芷

生地黃 熟地黃製 白朮 白茯苓各一兩 紅

秦艽 石膏各二兩 甘草炒 川芎 當歸 芍

藥炒 羌活 獨活 防風 黃芩炒 白芷

生地黃 熟地黃製 白朮 白茯苓各一兩 紅

秦艽 石膏各二兩 甘草炒 川芎 當歸 芍

藥炒 羌活 獨活 防風 黃芩炒 白芷

生地黃 熟地黃製 白朮 白茯苓各一兩 紅

秦艽 石膏各二兩 甘草炒 川芎 當歸 芍

藥炒 羌活 獨活 防風 黃芩炒 白芷

生地黃 熟地黃製 白朮 白茯苓各一兩 紅

秦艽 石膏各二兩 甘草炒 川芎 當歸 芍

藥炒 羌活 獨活 防風 黃芩炒 白芷

生地黃 熟地黃製 白朮 白茯苓各一兩 紅

秦艽 石膏各二兩 甘草炒 川芎 當歸 芍

藥炒 羌活 獨活 防風 黃芩炒 白芷

生地黃 熟地黃製 白朮 白茯苓各一兩 紅

秦艽 石膏各二兩 甘草炒 川芎 當歸 芍

藥炒 羌活 獨活 防風 黃芩炒 白芷

生地黃 熟地黃製 白朮 白茯苓各一兩 紅

秦艽 石膏各二兩 甘草炒 川芎

加知母一兩

省風湯 治中風口噤口眼唱斜筋脈攣急抽掣疼

痛風熱疾實

防風

南星

生用各四兩

半夏水浸洗

黃芩

甘

草二兩生用各

右每服五錢水煎

烏藥順氣散

治風氣骨節疼痛遍身頑麻手足癱

瘧言語蹇澀

宜先疎氣道後隨症投藥

麻黃去

烏藥

陳皮去

川芎

白芷

桔梗

枳殼去

甘草

一兩生用各

乾薑

羌活

殼蠶

雨右每服五錢水煎

右每服五錢水煎

荷。

八味順氣散

白朮

白茯苓

青皮

白芷

陳皮炒

烏藥

人參

兩各一

甘草

一兩生用各

右每五錢水煎服

導痰散

半夏

南星

茯苓

陳皮炒

枳實炒

甘草

石薑水煎服

參蘇飲

治痰積中脘暈眩嘈雜心忡嘔逆或痰停

關節手足痺曳口眼唱斜半身不遂嘔吐惡心頭
疼發熱

人參

紫蘇葉

半夏

茯苓

乾葛

前胡

二谷

錢各半

甘草炒

木香

陳皮炒

枳殼製

黃梗

秦艽升麻湯

治風寒客於手足陽明經口眼唱斜

惡見風寒四肢拘急其脈浮緊

秦艽升麻湯

治風寒客於手足陽明經口眼唱斜

右每劑一兩連鬚葱

防風

桂枝錢各二

甘草

芍藥炒

人參

白二莖水煎服

犀角散

治肝臟中風筋脈拘攣手足不收坐蹠不

得胸背強直脇肋脹滿面赤心煩言語蹇澀或

風

流注四肢上攻頭面作痛口眼唱斜脚膝痛乏

犀角屑錢

石膏

羌活

羚羊角各一

人參

甘菊花

獨活

黃芩炒

天麻

枳殼去

羌活

當歸

黃芪

芎菊

白朮

酸棗仁炒

防風

白芷

各五分

甘草

五分

右薑水煎服

薏苡仁散

治肝臟中風

薏苡仁

麻黃去節各一錢半

防風

附子炮去皮臍

細辛

芎柏子仁桂心

枳殼炒

石膏

細辛

獨活

羚羊角各一錢半

川

五味子湯 治肺臟中風胸滿短氣冒悶汗出噓吸

二十四

愈風湯 治一切風證卒中本病藥治之後調理用

此方

人參

白朮

當歸各二錢

川芎

陳皮

半

夏

茯苓

芍藥酒炒各一錢

枳殼

防風

羌活

傷正湯

治風中經絡口眼斜

右十二味

入薑棗水煎服

烏藥

防風

荆芥

細辛

黃芩

芍藥

當

歸

天麻

川芎

白朮

茯苓

陳皮

半夏

枳殼

白芷

白僵蠶

甘草

生薑

右十

八味

水煎服

如程散

治中風口眼喎斜神方

當歸

川芎

白朮

芍藥

茯苓

陳皮

半

夏

枳殼

白芷

桔梗

白僵蠶

防風

荆

芥

細辛

黃芩

烏藥

甘草

生薑

天麻

右十九味

水煎服

木香順氣散

治中氣暈絕

木香

縮砂各五

桂枝

乾薑

甘草各一

烏藥

香附子

青皮

陳皮

半夏

厚朴

枳殼各一

生薑

右十三味

水煎服

保元湯

治中風虛脫

卒然昏塞不省人事半身不

遂

白芷

錢

白朮

人參各一

黃芩分

當歸

三分

川芎

薄荷

桂枝

南

生附子

分

右水煎服

通關散

治中風傷寒發熱惡風頭痛目眩鼻塞聲

重肩背拘急身體痠痛肌肉瞤動牙關緊急及新

久頭風宜服之

川芎

兩

細辛

五錢

川烏

甘草

白芷

各半

撫芎

兩

龍腦

薄荷

各一

右為細末每服一

大錢葱白茶清調下薄荷湯調亦得

不拘時

清熱導痰湯

中風痰涎壅盛不能言語不省人事

牙關緊急有火有痰有氣或面赤身熱手足溫暖

脈緊盛宜服此方

人參

白朮去

茯苓去

陳皮去

半夏

製姜

枳實

炒

黃芩

黃連

南星

桔梗

瓜萎

枳實

炒

黃芩

黃連

各

甘草減

半

右剉

生薑水煎

惺忪散

治中風

川芎

薄荷

桂枝

南

天麻

當歸

各

白朮

天麻

當歸

川芎

薄荷

桂枝

南

星

陳皮

各等

右水煎

臨服加竹懸一酒盞

薑

汁

二茶匙

調勻同服

十乘湯

太陽中風下利嘔逆表解者

芫花熬

甘遂

大戟

右三味等分各別搗爲散以水一升半先煮大棗肥者十枚取八合去滓內藥未強人服一錢羸人服半錢溫服之

白术湯

治破傷風汗大出不止筋攣手足搐搦

黑錫丹 治卒暴中風痰潮上膈言語艱澀神昏氣亂喉中痙攣

芍藥

白术

葛根

升麻

黃芩

黑錫丹去鎔去滓淨秤 治卒暴中風痰潮上膈言語艱澀神昏氣亂喉中痙攣

甘草

右六味煎服

硫黃 結砂子 各二兩 金鈴子 附子

烏藥

香附

川芎

羌活

枳殼

芍藥

沈香 木香 胡蘆巴 陽起石 破故紙 肉桂

芍藥

柴胡

木香

甘草

右生薑水煎服

桂雨半兩 苗香 肉豆蔻 各一右為細末合一處

大芎黃湯

黃芩

大黃

羌活

川芎

當歸

川芎

藁本

桂雨半兩 肉豆蔻 各一陰乾入布袋內每服三四十粒曾服風藥吊吐不出者宜用此藥百粒煎

川芎

黃芩

大黃

羌活

川芎

當歸

川芎

桂雨半兩 肉豆蔻 各一陰乾入酒糊圓如桐子大陰乾入布袋內每服三四十粒曾服風藥吊吐不出者宜用此藥百粒煎

川芎

黃芩

大黃

羌活

川芎

當歸

川芎

大竹瀝湯 治卒中風口噤不能言語四肢緩縱無常手足不隨方

羌活

防風

當歸

芍藥

川芎

藁本

各一

獨活 芍藥 桂心 防風 白朮 葛根 茵陳

羌活

防風

當歸

芍藥

川芎

藁本

各一

陳細辛 茯苓 黃芩 甘草 生薑

羌活

防風

當歸

芍藥

川芎

藁本

各一

人參 石膏各一兩 麻黃一兩去節 右十九味切以

羌活

防風

當歸

芍藥

川芎

藁本

各一

竹瀝取四升分六服先末汗者取汗 煎取竹瀝煮取四升分六服先末汗者取汗

保命丹

辰砂

麝香

川烏頭

半夏

各一

藜蘆

破傷風祕方

保全

保命丹

治破傷風

辰砂

麝香

川烏頭

半夏

各一

藜蘆

黃蠟 荆芥 魚鱠炒黃色各五錢

艾葉

序

右人無

灰酒一椀重湯熱飲之

治破傷風汗大出不止筋攣手足搐搦

北京中医药大学图书馆版权所有

雄黃分

右為末。棗肉為丸。

附木湯 治手足逆冷筋脈拘急汗出項強口噤疾。

湧

附子炮

白术

獨活各五

川芎

肉桂各三

右棗水煎服

桂心白术湯 治陰經手足厥冷筋脈拘急汗出不止。

白术

桂心

附子炮

防風

川芎

甘草各等分

右每服五錢。薑棗水煎。

八物白术散 治陰經手足厥冷筋脈拘而無汗者。

白术

麻黄去根節

茯苓

五味子炒右每服四錢。薑水煎。凡用麻黃宜斟酌不可過多。

三黃獨活湯 治中風手足拘攣半身不遂失音不語。

麻黃去根節

黃芩半錢

獨活一兩

右每服四錢水煎取汗為效。

小省風湯 治中風癱瘓口眼喎斜口噤不語手足頑麻。

防風

南星三兩湯泡各

甘草二兩尖

右每服四錢。

薑十片水煎。

通關散 治卒然牙關緊急腰背反張藥不得喫。

細辛

薄荷葉

牙皂角

各等分

右為末。每用少許吹鼻內候得噴嚏隨進湯藥。

愈風湯

治諸風肢體

麻木手足不隨不能動復等症。

天麻

牛膝

同酒浸

草薢細另研

玄參各等分

酒或白湯下。

杜仲

羌活

十四兩

當歸

熟地黃

製生地

黃斤各一兩

獨活兩

肉歸兩

右為末。煉蜜丸桐

青州白九子

治半身不遂口眼喎斜瘻延壅塞手足頑木。

半夏

七兩水洗過生用

川烏頭

半兩去皮

南星

三兩生用

白附子

二兩生用

右為末

用絹袋盛之

水浸一日如

急用以糊丸梧桐子大

每服十九薑湯下。

瓜蒂散

赤小豆五錢

右為末。

每夜於鼻內噙之。

二婢湯

治血氣凝滯手足拘攣風痺等疾。

續斷

酒浸炒

杜仲去皮切

姜汁炒

防風

桂心細辛

人參

白茯苓

當歸

白芍藥炒

黃芪炒

甘草五分

各

牛膝

酒浸炒

白茯苓

當歸

白芍藥炒

黃芪炒

各

秦艽

生地黃

川芎

各等分

右為末。每用少許吹鼻內候得噴嚏隨進湯藥。

卷三

中西合璧婦科大全

獨活分三

右薑水煎服

五痺湯 治風寒濕氣客留肌體手足緩弱麻痺不仁

片薑黃

羌活 白朮 防己各一錢

甘草分五錢

右薑水煎服

外國醫方

大黃浸(十五瓦)百五十瓦 范麻子油

二十瓦 右分兩次灌腸

旃那葉浸(三十瓦)二百瓦 硫苦二十瓦 右為

灌腸料

旃那葉浸(或大黃浸)二百瓦 硫苦 覆

盆子糖漿各二十瓦 右每二時服一食匙以上

俱用通利大便用

麝香半瓦 細草根末十五瓦 澱粉兩瓦 右調

和為灌腸料。祇須和適宜之微溫水已可。

麝香一瓦十分之一 白糖一瓦 右為一包共製

五包每半時至一時服一包

芫菁酒五瓦 松節油兩瓦半 右為塗擦料

硫酸以脫二十瓦 樟腦適宜 右於皮下注射一

筒至三筒。以上俱心臟作用衰弱者用

索勿拿一瓦 右頓服

抱水格魯拉爾兩瓦 沙列布漿五十瓦 覆盆子

糖漿十瓦 右分二次服。每服一半。以上俱精神不安者用。

沃剝四瓦

糖漿二十瓦 蒸錠水百八十瓦

一日三次分二日服。於發病一星期後服之。可以促溢出血液之吸收。

人工加爾爾斯泉鹽四十瓦

右分八包每日服中

二包有中風之質者服此可以預防。

抱水格魯拉爾兩瓦 護謨漿

水各五十瓦

為灌腸料

抱水格魯拉爾兩瓦 橙皮糖漿二十瓦 水百瓦

右每十五分時服一食匙

臭刺十瓦至二十瓦 蒸錠水二百瓦 右調和一

日三次每取一匙沖水服用。

臭刺八瓦 蒸錠水百二十瓦 右二日中分二次

服

臭曹八瓦 薄荷水四十瓦 右一日二次沖水一

盞服之以上俱破傷風用。

飛尸血厥

附傳尸

申醫學說飛尸者遊走皮膚穿臟腑每發刺痛變作無常遁尸者附骨入肉攻鑿血脈每發不可得近

見尸喪。聞哀哭便發風尸者。淫濯四肢。不知痛之所。在。每發昏沈。得風雪便作沈尸者。纏骨結臟。衝心腸。每發絞切。遇寒冷便作注尸者。舉身沈重。精神錯亂。常覺晝發。每節氣至。變輒成大惡。皆宜用忍冬葉。剉數斛。煮令濃。取汁煎之。服如雞子大。日三服。人平居無疾苦。忽如死人。身不搖動。默默不知人。目閉不能開。口噤不能言。或微知人。惡聞人聲。但如眩冒。移時方寤。此由汗過多。血少氣併於陽。獨上而不下。氣壅塞而不行。故身如死氣。過血還陰。陽復通。故移時方寤。名曰鬱冒。亦名血厥。婦人多有之。宜服白薇湯。倉公散。丹溪云。凡人忽手足逆冷。肌膚起如米粒頭目青黑。精神恍惚。或錯言妄語。或牙關緊急。或寐仆倒。弔死問喪。入廟登墓。多有此病。先以蘇合香丸灌之。次服調氣散。平胃散。玉機微義云。卒厥利清穀。食入則吐。脈沈。手足冷。用四逆湯。熱厥腹滿。飛尸。客忤鬼擊。口噤。用麻黃湯。寒厥表熱裏寒。則下身重難轉。面垢譖語。遺溺。手足厥冷。自汗。脈沈滑。用白虎湯。傳尸。非一門相染而成也。人之血氣衰弱。臟腑羸虛。中於鬼氣。因感其邪。遂成其疾。其候欬嗽不止。或胸膈脹悶。或肢體疼痛。或肌膚消瘦。或飲食

不入。或吐利不定。或吐膿血。或嗜水漿。或好歌咏。或愛悲愁。或顛風發歇。或便溺艱難。或因酒食而遇。或風雨而來。或問病弔喪而得。或朝走暮遊而得。或因氣聚。或因血行。或露卧於田野。或偶會於園林鍾室。此病死之氣染而為疾。故曰傳尸也。傳尸蠱瘵之證。父子兄弟互相傳染。甚者絕戶。此乃祖父冤債。或風水所係。雖有符文法水。下蟲之法。然蟲去人亡。亦未為全美。若能平素保養。則自愈矣。凡人平素保養元氣。愛惜精血。療不可得而傳。惟夫縱慾多淫。苦間疾。衣服器用中。皆能乘虛而染觸。間有婦人入患者之房。患人見之思想。則其勞氣隨入。染患日久。莫不不免矣。然而氣虛血瘀。最不可入勞瘵之門。弔喪不化而為蟲。故凡親近之人。不能迴避。須要飲食適宜。不可著餓體。若虛者可服補藥。身邊可帶安息香。大能殺勞蟲。內有麝香。尤能辟惡。醫者不可須臾無也。

傳尸之候。在心胸脅滿悶。臂膊煩疼。兩目不明。四肢無力。雖欲寢卧。睡常不寐。脊膂急痛。腰膝酸疼。多午之後。四體微熱。面無顏色。喜見人過。常懷含怒。終

不稱意即多嗔恚。行立脚弱。夜卧盜汗。夢與鬼交。或見先亡。或多驚怖。有時氣息有時欬嗽。雖思飲食不能多餐。死在須臾。精神尚存。或時微利。兩脅虛脹。口燥鼻乾。常多粘唾。有時欲睡。漸覺沈羸。猶如涸魚。不覺死也。傳尸之候。本起無端。不問老少男女。皆有此疾。大抵五行相尅而生。先內傳毒氣。周遍五臟。漸熱羸瘦。以至於死。死語又傳家親一人。故曰傳尸。亦名傳症。以其初傳半卧半起。號曰殮碟。氣息微者。名曰肺痿。疾骨髓。身中熱。稱為骨蒸。內傳五臟。名曰伏連。不解療者。乃至滅門。假如男女虛損得之。名曰勞極。吳楚乃名淋泄。巴蜀亦名勞極。其源先從腎起。初受之氣。兩脰酸疼。腰背拘急。行立腳弱。飲食減少。兩耳颶颶。直似風聲。夜卧遺泄。陰汗痿弱。腎既受訖。次傳於心。心初受氣。夜卧心驚。或多恐怖。心懸乏氣。吸欲盡。夢見先亡。有時盜汗。飲食無味。口內生瘡。心氣煩熱。惟欲眠卧。朝輕夕重。兩頰口脣。悉皆紅赤。如傳臍脂。或時手足五心煩熱。心受已訖。次傳於肺。肺初受氣。欬嗽氣力微痛。有時氣喘。卧則更甚。鼻口乾燥。不聞香臭。如或忽聞。惟覺朽腐惡氣。有時恶心。憤欲吐。肌膚枯燥。時或疼痛。或似蟲行。乾皮細起。狀

若麸片。肺既受已。次傳於肝。肝初受氣。兩目眩。面無血色。常欲顰眉。眼視不遠。目常乾澀。又時赤痛。或復睛黃。朝昏暮憤。常欲合眼。及時睡卧。常睡不著。肝既受已。次傳於脾。脾初受氣。兩脅虛脹。食不消化。又時瀉痢。水穀生蟲。有時肚痛。腹脹雷鳴。脣口焦乾。或生瘡瘍。毛髮乾聳。無有光潤。或時上氣。擣肩喘息。崩赤黑汁。見此證者。則不治也。夫骨蒸殮碟。復連屍疰者。注也。病自上疰也。與人相似。故曰疰。其變有二十二種。或三十六種。或九十九種。大略令人寒熱盜汗。夢與鬼交。遺精白濁。髮乾而聳。或腹內有塊。或腦後兩邊有小結。復連數個。或聚或散。沈沈默默。欬嗽痰涎。或咯膿血。如肺痿肺癰狀。或腹下痢。羸瘦困乏。不自勝持。積月累年。以至於死。復傳症易傳親人。乃至滅門者是也。更有蜚蟲遁尸。寒尸喪尸。尸疰等。謂之五尸。及大小附著等證。不的知其所苦。無處不惡。乃挾諸鬼邪而害人。其證多端。傳變推遷。難以推測。故自古及今。愈此病者十不一得。所謂狸骨獺肝。天靈蓋銅鎖鼻。徒有其說。未嘗取效。惟膏肓俞崔氏穴法。若早灸之。可否幾半。晚亦不濟也。

中國醫方 白薇湯

治飛尸血厥

白薇

當歸各一兩

人參五錢

甘草二錢半

右哎

倉公散 治卒鬼擊鬼疰鬼刺心腹如刺下血即死
每服五錢水二盞煎至一盞溫服

不知人及卧魔醫脚趾不覺者并諸毒氣等疾

瓜蒂末九籥衛生方無瓜蒂末有皂角末

梨蘆末 雄黃研

礬石等分研各

右為細末研停用少許吹入鼻中

得嚏氣通便活未嚏再吹以得嚏為度此藥能起

死人恐皂角者為正

內鼻散 治尸厥脈動而無氣氣閉不通靜而若死

名卒厥

石菖蒲去毛為末 左每用二字納鼻中吹之令入仍以

桂末安舌下

硫黃散 治尸厥奄然死去四肢厥冷不省人事腹

中氣走如雷鳴

焰硝半兩 硫黃一兩 右細研分三服酒調灌下如

人行五里又進一服不過三服即甦

桂末安舌下

桃柳桑枝 天靈蓋用七益大一片酥尖

淡豆豉七克 葱白三寸 安息

龍甲兩 青蒿握

桃仁十四

益母草丸 治婦人骨蒸勞瘦月候不適心神煩熱
入童便半升煎取四合調檳榔麝香末各一錢日
高時頓服以衣覆十指汗出蘿絲漏下如蠶狀甚
者旬日再服

益母草丸 治婦人骨蒸勞瘦月候不適心神煩熱
四肢疼痛不能飲食

益母草

青蒿各二斤

桃枝一尺

柳枝一握

升絞去滓煎成膏

柴胡苗去根 益母草

赤芍藥

犀角屑各二錢

硃砂研水飛

柴胡苗去根 木香

甘草

火微赤各一兩

鼈甲三兩

製桃仁五兩 麝香

細研

地骨皮

知母各一兩

製桃仁五兩 麝香

細研

桃仁

七錢

獺肝一具 龜甲火燄 壮柴胡各一兩半

川升麻

半兩

桃仁

一兩

殺鬼方 治婦人骨蒸傳尸勞瘦鬼氣伏連

麝香 半錢

虎頭骨 黃色

桃仁 去皮去尖炒黃

雄黃 研細如米末研和勻煉蜜丸

如

桐子大溫水下二十九。此藥辟瘟疫亦可帶。

溫金散 治勞嗽

甘草

黃芩 桑白皮 防風

各一兩

杏仁 七枚

製

人參

茯神 各半兩

麥門冬 分

右前五味

以米泔浸一宿晒乾次入人參茯神麥門冬三味同為細末每服二錢水一盞蠟燭一豆大煎八分食後溫服專治勞嗽。

又方 調榮衛消瘀血出聲音治痰嗽

當歸

牡丹皮 白芍 子芩 木通

麥門冬

右吹咀

每服三錢薑三片水煎溫服

甘草 細辛 各半兩

生乾地黃 各一兩

右吹咀

又方 治肌瘦咯血肺痿等疾

蛤蚧 一隻全者酒浸一宿酥尖

知母 貝母 心去

人參 一炒各半兩

右甘

為末每服三錢水一盞入桑白皮溫服

補肺湯 治勞嗽

桑白皮 熟地黃 各二兩 人參 紫苑 黃芪

五味子 各一兩

右為細末每服二錢水一盞入蜜沙

許食後溫服四君子湯加秦艽黃芩煎服尤妙

治胸痺方 治心胸積氣作胸痺引兩脇痛脊悶不

收音聲不清虛熱上壅作鼻衄

桑白皮 分三兩 枳殼 各半

木通 子芩 生乾地黃

右

白芍藥 牡丹皮 各一兩 生犀屑 半兩 生地黃 三分

右吹咀每服半兩水煎溫服

又方 治伏瘀血在心肺時作効心胸微背痛

白芍藥

牡丹皮 各一兩

生犀屑 半兩

生地黃 三分

右吹咀每服半兩水煎溫服

瓜蔞湯 治胸痺

瓜蔞 有熱者除個

枳殼 四枚

厚朴

薤白 各一兩

桂枝 一兩

又方 治積氣堅硬作氣噎胸膈引背痛

白芍藥

一兩

鼈甲 火醋

枳殼 製

北柴胡 各一兩

甘草

赤茯苓 各半兩

右吹咀每服三錢生薑三

片棗一枚水煎溫服

又方 治失聲音

訶子肉 木通 各一兩

甘草 半兩

右吹咀水三升

煎至半升。入生地黃一合。再煎數沸。放溫。分六服。
食後日作半料。善出音聲。

喉痛方

此方專治咽喉疼痛。

百藥煎

去黑皮

硼砂

甘草

生白礬

各等分

右

為細末。每服一錢。食後米飲調。細細呷嚥。屢效。

藥止後可食淡煮豬蹄肉。仍須煮熟肉去元汁。再以白湯熟煮。仍忌房勞。生冷魚腥鹹酸藏等。修合煎藥。忌一切生人男女貓犬雞畜。仍不令病人知藥味。方有效。

瘻癰

中醫學說 瘻者。筋脈急也。癰者。筋脈緩也。急則引而縮。緩則縱而伸。或縮或伸。動而上者。名曰瘻癰。俗謂之發搐是也。凡癰癰風癰破傷風三證。皆能瘻癰。但癰癰則仆地不省。風癰瘻癰。則角弓反張。破傷風瘻癰。則有瘡口竊謂瘻者。乃風熱血燥。或肝火妄動。血傷瘀者。乃血氣不足。或肝火汗多亡血。以致手足伸縮不已。抽搐不利。若因風熱血燥。用羚羊角散加鈎藤鈎山梔。若肝火妄動。用加味四物湯。加鈎藤鈎山梔。若肝經血氣不足。用八珍湯。加鈎藤鈎山梔。若肝火亡血。用加味逍遙散。加鈎藤鈎山梔。如不應須

用六味丸以補腎水。生肝木為主。佐以前劑治之。若其脈長弦者。是肝之本脈。則易治。其脈短澀者。是肺金。肝木也。則難治。其面色青中見黑者。是水生木也。當自愈。青中見白者。是金克木也。必難愈。

顫振

中醫學說 黃帝曰。人之顫者。何氣使然。岐伯曰。胃氣不實。則諸脈虛。諸脈虛。則筋脈懈墮。筋脈懈墮。則行陰。用力不復。故為顫。因其所在。補分肉間。醫學綱目云。顫振與瘻癰相類。瘻癰則手足牽引。而或伸或屈。顫振則但顫動而不屈伸也。胃虛有痰。用參苓以補氣。茯苓半夏以行痰。如實熱積滯。用張子和三法。薛立齋云。顫振者。掉眩也。易曰。鼓萬物者。莫疾乎風。鼓之為言動也。掉眩乃風木之搖運。諸風掉眩。皆屬於肝。治法。若肝木實熱。用瀉青丸。肝木虛熱。用六味丸。肺金。肝木。用瀉白散。肝木虛弱。用逍遙散。加參苓。鈎藤。鈎山梔。脾血虛弱。用六君子加芎歸鈎藤鈎。胃氣虛。用補中益氣湯。加鈎藤鈎。若產後顫振。乃氣血虧損。虛火益盛。而生風也。切不可以風論。必當大補。乃可無誤。

西醫學說 凡年在四十歲以上之人。曾患卒中火

傷神經損傷。傷寒。感冒諸病者。每易有振顫麻痺之證。初起之時。右手之腕搏等處運動漸次減損。無何即變為振顫。既而四肢之隨意筋亦振顫如前狀。其筋肉亦漸堅硬如板頭。微前傾此病之豫後不良。大都難治。陰行原因治法之外。惟冷水治法。電氣治法。及按摩法稍有功效。若時藥物殆無何影響也。

【中國醫方】支加散 治瘧癥或顫振或產後不省人事口吐痰涎

當歸 荆芥穗各等

右為細末。每服三錢。水一盞。酒少許。煎七分。灌下咽。即有生理。

柴胡湯 治產後或經適斷致手足牽搐咬牙昏冒

異證

柴胡

黃芩炒五錢

黃芩炒

石膏各四錢

半

夏錢三兩

知母 甘草各二錢

右為粗末。每服半兩。

薑五片

棗四枚。水煎溫服。

青鹽丸

治肝腎虛損腰膝無力顫振蟬曳

茴香末三兩

兔絲子四兩

乾山藥二兩

青鹽一兩

近火煨炙乾另為細末。和勻酒糊丸梧子大。每服

五七十丸。溫服。或鹽湯下。常服壯筋力。進飲食。

星附散 治中風能言而手足痺曳脈虛浮而數

天南星半夏

半夏薄切片

黑附子炮

白附

子炮

川烏頭炮

白僵蠶炒

沒藥人參

白茯苓各等分

右為粗末。每服二錢。酒水各一盞。

獨活湯 治氣虛感風或驚恐相乘肝膽受邪使上

氣不守正位致頭招搖手足顫掉漸成目睭

獨活去風火

地骨皮 細辛

菖蒲菊花甘味者

防

甘草各等分

右為粗末。每服三錢。水盞半

煎至一盞。去滓。煎取清汁六分。入竹瀝少許。再煎

一二沸。食後溫服。日二服。

扶苓丸 治手臂抽掣或戰掉不能舉物服此藥立

愈又治脾氣虛弱痰邪相搏停伏中脘以致臂內

筋脈掣急而痛

扶苓 半夏姜製各二兩

枳殼麸炒半兩

風化朴硝兩

右為末。薑汁糊丸桐子大。每服二十丸。食後薑湯

下。

驚悸附失血心神不安

【中醫學說】驚悸乃心虛膽怯之所致。且心者君主之官。神明出焉。膽者中正之官。決斷出焉。心氣安逸。

膽氣不怯。決斷思慮。得其所矣。或因事有所。大驚。或聞虛響。或見異相。登高涉險。驚忤心神。氣與涎鬱。遂使驚悸。驚悸不已。變生諸證。或短氣悸乏。體倦自汗。四肢浮腫。飲食無味。心虛煩悶。坐卧不安。皆心虛膽怯之候也。治之之法。寧其心以壯膽氣。無不瘥者矣。怔忡者。心血不足也。心主於血。血為心之主。心為形之君。血富則心自安矣。多因汲汲富貴。戚戚貧賤。又思所愛。觸事不意。真血虛耗。心帝失輔。漸成怔忡。怔忡不已。變生諸證。舌強恍惚。善憂憇悲。少顏色。皆心病之候。難經云。損其心者益其榮。法當專補真血。真血若富。心帝有輔。無不愈者矣。又有冒風寒暑濕。閉塞諸經。令人怔忡。五飲停蓄。堙塞中脘。亦令人怔忡。當隨其證施以治法。婦人血風驚悸者。是風乘於心也。心藏神為諸臟之主。若血氣調和。則心神安定。若虛損則心神虛弱。致風邪乘其虛襲之。故驚而悸動不定也。驚悸不止。則惚恍而憂懼。薛立齋曰。丹溪先生云。驚悸者血虛。用硃砂丸。痰迷心竅。用定志丸。怔忡者屬火。屬痰。思慮便動者屬虛。時作時止者火動也。假如因病而致驚。則神其舍。痰乘而入矣。蓋人之所主者心。心之所養者血。心血一虛。神氣不守。此

驚悸之所由生也。治當調養心血和平心氣。驚者。恐怖之謂。悸者。怔忡之謂。心虛而鬱痰。則耳聞大聲。目擊異物。遇險臨危。觸事喪志。心為之忤。使人有惕惕之狀。是則為驚。心虛而停水。則胸中滲漉。虛氣流動。水既上乘。心火惡之心不自安。使人有快快之狀。是則為悸。驚者。與之豁痰定驚之劑。悸者。與之逐水消飲之劑。所謂扶虛不過調養心血。和平心氣而已。怔忡驚悸之候。或因怒氣傷肝。或因驚氣入膽。母能令子虛。因而心血為之不足。又或遇事繁冗。思想無窮。則心君亦為之不甯。故神明不安。而怔忡驚悸之證作矣。夫所謂怔忡者。心中惕惕然。動搖而不得安靜。無時而作者是也。驚悸者。驚然而跳躍。驚動而有欲厥之狀。有時而作者是也。若夫二證之因。亦有清痰積飲。留結於心胞胃口而為之者。又不可固執以為心虛而治。宜以脈證參究其的。而藥之。毋認非以為是也。心驚非心病也。乃肝血虛而不能養心也。方用白芍當歸麥冬熟地各五錢。生棗仁一兩。茯神三錢。北五味。遠志各一錢。人參二錢。水煎服。此方之妙。全不去治心。治肝正所以治心。治肺正所以益心也。心經之病。怔忡不寐等證。乃心血少也。方用

人參麥冬。茯神當歸各三錢。丹參二錢。生棗仁熟棗仁各五錢。菖蒲甘草五味子各一錢。水煎服。此方之妙。在生熟棗仁各五錢。而以諸補心之藥為佐使。蓋棗仁乃安心治不寐之聖藥。生用使其日間不寐。熟用使其夜間不醒也。日夜既安。則怔忡自定。又何必用虎睛琥珀丹砂之多事哉。怔忡之證。擾擾不甯。心神恍惚驚悸不已。此肝腎之虛。而心氣之弱也。若作痰治。往往殺人。蓋腎虛以致心氣不交。心虛以致肝氣益耗。不治虛而反攻痰。安得不速死乎。用甯靜湯治之。則心肝腎之藥三經同治。陰陽之氣自交。上下相資。怔忡自定。而驚悸恍惚之證亦盡除矣。怔忡治之不得法。多致危亡。此證乃因泄精之時。又得氣惱。更不慎色而成者也。似乎宜治腎為主。不知愈補腎而心氣愈加怔忡者何故。因肝得氣惱。肝氣太旺。補腎則肝氣更旺。反去增心之火。故愈加怔忡也。然則心不可補乎。心不補。則火不能息。補心而又去火之藥。則得生矣。方用化忡丹。失血心神不安。若脾胃鬱熱。用加味逍遙散。脾肝鬱結。用加味歸脾湯。脾胃虛弱。氣血不足。用八珍湯。十全大補湯。脾肺虛弱。氣血不足。用補中益氣湯。六君子湯。痰氣鬱滯。

用六君桔梗貝母。不效。審係氣虛。但補脾胃。不效。用獨參湯。惡寒發熱屬氣血俱虛。內熱晡熱屬血虛。作渴面赤。是血脫煩躁。皆宜甘苦之劑。以補陽氣。而生陰血。經云。血脫補氣。若用寒涼之劑以降火。則誤矣。仍審所屬之因治之。

【西醫學說】神經性心悸亢進之原因。有由於神經衰弱。藏躁心風。惡渡質。失血。手淫。萎黃。病房事過度。貧血。胃病。痔疾。腸蟲。及生殖器病等之反射而來者。有由於濫用煙酒茶等而致者。故不必感動精神。勞苦身體。而竟突如其来。其時怔忡不甯。呼吸緊促。胸部苦悶。脈搏不正。心動失調。而有歇代。眩暈失神。兼酸泉。或服人工鹽。夜中忌勤學。清晨忌晏起。食物須擇多而易消化者。煙酒茶等。概勿過用。作事須有一定規則。更須常常運動。每晨起牀後。即用冷水摩擦身體。發作之時。心臟部施行冷罨法。

【中國醫方】茯神湯 治膽氣虛。冷頭痛。目眩。心神

恐畏。不能獨處。胸中煩悶。

茯神去
酸棗仁炒

黃芪炒

柏子仁炒

白

芍藥 炒

人參

甘草 炒各半兩

五味子

桔心

熟地黃

自製

右每服五錢 薑水煎服。

酸棗仁丸

治膽氣實熱不得睡卧神思不安驚悸

怔忡

茯神去木

酸棗仁 炒

遠志去心各一兩

柏子仁 炒

防風各一兩

麥門冬 半去心各二兩

通草

升麻 各二錢半

驚悸

風雨各半分

枳殼數炒

生地黃 半兩

青竹茹 錢

白湯

右每服七八十丸

大棗一枚

紫苑

桂心 各七錢半

知母 一兩

赤石脂

定志丸

治心神虛怯神思不安或語言鬼怪喜笑

驚悸

人參 茯苓

各一兩

菖蒲

遠志去心各一兩

右

為未蜜丸如前服

養心湯 治心血虛驚悸怔忡不甯或盜汗無寐發熱煩躁

黃芩 炒

白茯苓

茯神去木

半夏麴

當歸 酒拌

安

龍齒 研

茯神去木各一兩

硃砂 飛研水

人參 去

川芎 各半兩

桂心

辣桂去皮

柏子仁

酸棗仁 炒

五

右每服三五

錢。薑棗水煎服

人參各三錢

甘草 細四錢

安

硃砂安神丸

治心經血虛頭暉心神驚悸等證

硃砂 五錢

黃連 酒洗六錢

甘草 灰五分

生地黃

當歸 各一錢

右為末飯糊為丸每服十五丸如

一二服不應當服歸脾湯補之

治要茯苓散

治心經實熱口乾煩渴眠卧不安或

心神恍惚

茯神

麥門冬 半去心各二兩

通草

升麻 各二錢半

安

大棗一枚

紫苑

桂心 各七錢半

知母 一兩

赤石脂

茯神散

治婦人血風五臟

大虛驚悸

安神定志

茯神去木

人參

龍齒研

獨活 蘆

酸棗仁 各

細辛 苗去

白

防風去

甘草 炙

遠志心

桂心

升麻 半兩

右吹咀每服

龍齒丸

治婦人血風上攻心神恍惚驚悸眠卧不

安

大。每服三十丸

薄荷湯送下不拘時

赤箭 錢半各二

麝香

當歸去蘆

天麻各七錢

檳榔

防風去蘆

生乾地

安

黃

犀角屑各半兩

遠志去心

桂心

升麻 半兩

右為細末

煉蜜和搗三五百下丸如桐子

琥珀散

治婦人血風驚悸

三十一

琥珀 研 没藥 研

木香 當歸 茵藥 白芷

羌活

乾地黃

延胡索

川芎 各半 土瓜

根 牡丹皮

去心 白朮 桂心

各一 右為末。每

服一錢水一盞。煎至七分。加酒一分。再煎少時。熱

服重者數服。

茯苓補心湯 治心氣不足。善惡愁怒。血面黃五

心煩熱或咽喉痛舌本作強。

茯苓

四兩 桂心

甘草

炒

麥門冬

去心各三兩

紫

石英

四兩 人參

各一 大棗

二十枚

赤小豆

四十粒

右用水七升。煎二升半。分三服。

防風丸 补虛調中。治肺虛驚跳不定。乍來乍去。小

腸腑寒

防風

桂心 通草 茯神

遠志 麥門冬

甘草

人參 白石英

各三兩

右九味為末。白蜜

和丸如桐子大。酒服三十九。日再加至四十丸。

遠志湯 補心治心氣虛。驚悸喜忘不進食。

大棗

十二枚 遠志 乾薑

白朮 桂心 黃芪

甘草

茯苓

各三兩 五味子

防風 當歸 人參

桂心 甘草

右十八味。咬咀。水一斗三升。

各四合 草 芎芢

大棗

各二兩 麥門冬 半夏

小定心湯 治虛羸心氣驚弱多魘。

茯苓

四兩 桂心

甘草 茵藥 乾薑

遠志

蒲黃

一本作菖蒲 人參 茯苓

各四 右四

煮取三升半。分五服。日三夜二。
補心湯 治驚悸汗出。心中煩悶。短氣喜怒悲憂。心
不自知。常苦咽喉痛。口脣黑。嘔吐血舌本強不通。
水漿

紫石英

茯苓

人參 遠志

當歸 茯神

甘草

紫莞

各二兩

紫莞

麥冬

升一升 赤小豆

合三升

大棗

生薑

六兩

乾地黃

麥門冬

半夏

遠志

桂心

阿膠

各三兩

茯苓

桂心

阿膠

各三兩

生薑

六兩

大棗

志

石膏

各四兩

飴糖

斤一

大棗

二十枚

赤小豆

大棗

二十枚

右十四

大棗

二十枚

右十四

大補心湯

治虛損不足。心氣弱。悸或時妄語。四肢

損變氣力。顏色不榮。

黃芩

附子

各一兩

甘草

乾地黃

麥門冬

黃芩

桂心

阿膠

各三兩

生薑

六兩

半夏

志

石膏

各四兩

飴糖

斤一

大棗

二十枚

赤小豆

大棗

二十枚

右十四

大棗

二十枚

右十四

大補心湯

治虛羸心氣驚弱多魘。

茯苓

各四兩

桂心

三兩

甘草

茵藥

乾薑

遠志

一本作菖蒲 人參 茯苓

桂心 甘草

右四味。咬咀。水一斗。煮取三升半。分三服。

遠志

蒲黃

一本作菖蒲

人參

茯苓

各四

右四

小定心湯

治虛羸心氣驚弱多魘。

茯苓

四兩

桂心

三兩

甘草

茵藥

乾薑

遠志

人參各二

取三升分四服。日三夜一。

大棗十五枚

右八味。㕮咀水八升煮。

大定心湯

治心氣虛慄恍惚多忘或夢寐驚魘志少不足

人參

茯苓

茯神

遠志

石脂

龍骨

乾

薑

當歸

甘草

白术

芍藥

桂心

紫菀

防風各二

大棗

二十枚

右十五味。㕮咀水一斗二升。煮取三升半分五服。日三夜二。

瀝湯

治心虛驚悸不定羸瘦病

荆懸二升

茯神

白蘚皮各三

人參二白

銀十兩。以水一斗煮取二升。

右五味三味。㕮咀

以荆懸內銀汁中。煮取一升四合。分三服。相去如人行十里。久進一服。

大鎮心散

治心虛驚悸夢寐恐畏

紫石英

茯苓

防風

人參

甘草

澤瀉八各

分黃芪

秦艽

白术

薯蕷

白蘚各六

麥冬

當歸

分大黃

大豆卷

桔梗

柏子仁

桂遠志

細辛

分三方

右二十四味

治下篩酒服二方寸匕日三。一方無紫石。茯苓澤瀉乾薑有大棗

四分蜜丸如桐子大。酒下十五丸。小鎮心散。治心氣不足虛慄恐畏悲思恍惚心神不定。惕惕然驚者。

人參

遠志

白术

附子

乾地黃

桂心

黃芪

細辛

乾薑

赤小豆

龍齒

防風

菖蒲

茯苓

右十四味

治下篩酒服二方寸匕。日三。

養血安神湯

治血虛火動驚悸者

當歸

川芎

白芍

陳皮

柏子仁

砂水

黃連

川芎

生地黃

茯神

錢各一

酸棗仁

甘草

右水煎服

安神鎮驚丸

治血虛心神不安驚悸怔忡不寐等

送下。

右歸飲

凡驚悸怔忡係命門之陽衰陰盛者宜此

方加減主之

當歸

白芍

貝母

麥門冬

陳皮

硃

砂水

黃連

甘草

生地黃

酒洗一

右

為細末

煉蜜

丸如菜豆大

每服五十九食遠東湯

方寸匕日三。一方無紫石。茯苓澤瀉乾薑有大棗

送下。

右歸飲

凡驚悸怔忡係命門之陽衰陰盛者宜此

方加減主之

右歸飲

凡驚悸怔忡係命門之陽衰陰盛者宜此

方加減主之

右

送下。

熟地二三錢或
一二兩

山茱萸一錢

山藥炒

枸杞子

杜仲各二錢製

左歸飲 凡驚悸怔忡係命門之陰衰陽勝者宜此方加減主之

熟地二三錢或
一二兩 熟芩半錢 山茱萸一錢 右水二鍾煎七分食遠溫服

山藥 柏杞各二錢

杞子各二錢 右水二鍾煎七分食

遠服

逍遙飲 治婦人思鬱過度致傷心脾衝任之源血氣日枯漸至經脉不調或成驚悸怔忡等證

當歸三錢 白芍藥三錢 茯神各一錢 熟地三錢 遠志三分製 陳皮八分 甘草錢一錢

右水二鍾煎七分食遠溫服

大營煎 治血陰虧損驚悸怔忡等證

當歸二三錢 熟地三五錢 柏杞各二錢 杜仲去絲各二錢 牛膝半錢 炒炙甘草二錢 肉桂各一錢 水二鍾煎七分食遠溫服

甯靜湯 治驚悸怔忡

生棗仁 麥冬 白术各五錢 人參 白芍各三錢 右水煎服

地元參各一兩

化忡丹 治怔忡不甯心神恍惚驚悸不已

人參 生棗仁各二錢 麥冬 白芍各二錢 元參

茯苓

黃連 白芥子各一錢 甘草五錢 右水煎服

甯志膏

治婦人因失血過多心神不安言語失常不得睡卧

辰砂研 酸棗仁炒 人參 白茯神去木 琥珀

右為末和停每服一錢濃煎燈心棗湯空心調下

煎燈心棗湯空心調下一方無神琥珀蜜丸如 茯苓補心湯 此方專補心虛抑肺氣榮衛滋養血脈其疾自然平復

即參蘇飲內除木香與四物湯對分勻和以薑棗煎每服四錢食前溫服

妙香散 治心氣不足精神恍惚虛煩少睡盜汗等證

甘草炒五錢 遠志去心 山藥姜汁 茯苓 桔梗各五錢 辰砂研 錢溫酒調下 膚香另研二錢 人參 木香五分 右為細末每服二

半夏湯 治膽腑實熱精神恍惚寒熱泄瀉或寢汗憎風善太息

半夏
一分
一錢

黃芩

遠志
去骨各
一錢

生地黃
二錢

林米合
一錢
長流水煎服

酸棗
炒三錢

縮砂仁
五分

右作一劑

安知必林兩瓦
澱粉一瓦
右為藥粉分作五包
每服一包

獨參湯 治元氣虛弱惡寒發熱或作渴煩躁疾喘
氣促或氣虛卒中不語口噤或痰涎上湧手足逆
冷或難產產後不省喘急用好人參二兩或三四
兩加炮薑五錢水煎徐徐服蓋人參性寒故以薑
佐之如不應急加附子

單方 心虛驚悸不定荆滌二升緩火煎取一升
六合分溫每服四合日三夜一虛勞驚悸補虛止驚
令人能食紫石英五兩打如豆大水淘一遍以水一
斗煮取三升細服或煮粥食水盡可再煎之驚

慄木饅頭炒白牽牛等分為末每服二錢米飲調下
外國醫方】臭剝 臭素化安母紐謨各十瓦
右為一包每日服二三包臨服沖水
斯篤洛仿資司丁幾 杏仁水各十五
次每次服十滴至二十滴
纈草酒一瓦 橙皮糖漿二十瓦 水八十瓦 右
毛地黃酒兩瓦半 苦扁桃水七瓦半 右一日三
一日三次每次服一食匙

次每服十五滴至二十滴

安知歇貌林一瓦二 丁香 桂皮各一瓦十分之
四 茯苓四瓦 右為藥粉分作五包每服一包
臭剝四瓦 繡草根末八瓦 右為丸藥分製百
十粒每服三十粒一日三次

臭剝六瓦 龍膽酒兩瓦 蒸錙水二百瓦 右一
日六次分二日服

臭素樟腦一瓦十分之一 白糖半瓦 右為一包
共製六包一日三次每服一包

癲狂

【中醫學說】病起於六腑者陽之系也陽之發也或
上或下或內或外或反在其中行之極也有能歌笑
者有能悲泣者有能奔走者有能呻吟者有自委曲
者有自高賢者有寤而不寐者有不能言而聲昧者
各各不同皆生於六腑也喜其通者因以通之喜其
塞者因以塞之喜其水者以水濟之喜其冰者以冰
助之病者之樂喜好勿違背亦不可強抑之也如此
從隨則十生其十百生其百疾無不愈 視聽言動

俱妄者。謂之邪祟。甚則能言平生未見聞事。及五色神鬼。此乃氣血虛極。神光不足。或挾痰火壅盛。神昏不定。非真有妖邪鬼祟。大概內服人中黃丸。照依氣血痰湯藥為便。或單人中黃服亦好。或單石菖蒲末。猪心血為丸服亦可。有婦人夜夢鬼來交者。定志丸料加赤小豆水煎服。有婦人月水崩漏過多。血氣迷心。或產後惡露上衝。而言語錯亂。神志不守者。此血虛神耗也。宜甯神膏。但亦不可純服補心斂神藥。血熱者。小柴胡湯加生薑生地煎服百餘貼。即安。血迷心胞。踰牆上屋。歌唱無時者。逍遙散。加遠志桃仁紅花蘇木。服後病退。用平胃散少用厚朴。倍加蒼朮升麻。常服以絕病根。凡婦人顛狂。病由血氣虛受風邪所為也。人稟陰陽之氣而生。而風邪入。并於陰則為顛。入並於陽則為狂。陰之與陽。有虛有實。隨其虛時。為邪所併。則發也。顛者。卒發意不樂。直視。仆地吐涎沫。口渴目急。手足撩戾。無所覺知。良久乃甦。狂者。少卧不飢。自高賢也。自辨智也。自貴倨也。妄笑。好歌。樂。妄行不休。故曰顛狂也。素問云。陽厥狂怒。飲以鐵落。狂怒出於肝經。肝屬木。鐵落金也。以金制木之意。薛立齋云。有在母腹中受驚者。或有聞大驚而得

者。蓋驚則神不守舍。舍空則痰涎歸之。或飲食失節。胃氣有傷。痰停胸膈而作。當尋痰固元氣。若頑痰膠固上膈。必用吐法。若在腸胃。亦須下之。竊謂此證。若因元氣虛弱。或痰盛發熱等。皆是虛象。如慢驚證。無風可祛。無痰可逐。但補脾胃。生氣健壯。神智自清。痰涎自化。若誤用辛散祛逐。腦麝之劑。必為敗證。婦人如病花癩。見男子抱住不肯放。此乃思慕男子。不可得。忽然病如暴風疾雨。罔識羞恥。見男子則為情人也。此肝木枯槁。內火燔盛。脉必弦出寸口。法當用平肝散鬱祛邪之味。用柴胡當歸麥冬白芍子各五錢。白芍一兩。炒梔子。茯神元參各三錢。甘草菖蒲各一錢。水煎服。如不肯服。用人灌之。彼必罵詈不休。久之一人倦欲卧。卧後醒來。自家羞恥。緊閉房門三日。少少與之飲食。自愈。一劑後不必更與之藥也。呆病。如癡而默默不言。如飢而悠悠如失意。欲癲而不能。心欲狂而不敢。有時睡數日不醒。有時坐數日不眠。有時將己身衣服密密縫完。有時將他人物件深深藏掩。與人言則無語。而神遊。背人言則低聲而泣訴。與之食則厭薄而不吞。不與食則吞炭而若快。此等證雖有祟憑之。實亦胸腹之中。無非痰氣。故治呆無奇。

法治疾即治呆也。然而疾勢最盛。呆氣最深。若以尋常二陳湯治之。安得獲效。方用逐呆仙丹。先將各藥煎湯。調丹砂末與半碗。彼不肯服。以炭給之。欣然服矣。又給之。又服半碗。然後聽其自便。彼必倦怠欲卧矣。乘其睡熟。將其衣服被褥。盡行火化單留身上所服之衣。另用新被蓋之。切不可驚醒。此一睡有睡至數日者。醒來必覓衣而衣無。覓被而被非故物。彼必大哭。然後又以前藥與一劑。必不肯服。即給之炭。亦斷不肯矣。不妨以鞭責之。動其怒氣。用有力之人。將前藥執而灌之。彼必大怒。已而又睡去矣。此時斷須預備新鮮衣服被褥等物。俟其半日即醒。彼見滿房俱是親人。心中恍然如悟。必有大哭不已。諸人當以好言勸之。彼必說出鬼神之事。親人詭幸某人治療。已將鬼神盡行祛遣。不必再慮。彼聽之欣然而病亦全愈矣。此方之妙。妙在大補心脾。以茯神為君。使痰在心者。盡祛之而出。其餘消痰之藥。又得附子引之。無經不入。將遍身上下之痰。盡行祛入膀胱之中而消化矣。白薇。菟絲子。皆是安神妙藥。而丹砂鎮魂定魄。實多奇功。所以用之而奏效也。又呆病乃鬱抑不舒。憤怒而成者有之。羞恚而成者有之。方用人參。柴胡。

當歸。菖蒲。生棗仁。半夏各一兩。白芍四兩。甘草。天南星。鬱金。神麌各五錢。附子一錢。茯苓三兩。水十碗。煎一椀灌之。彼必不肯飲。以雙手執其頭髮。兩人拿其口。一人以手拿住其頭。一人傾藥入羊角內灌之。倘或吐出。不妨益妙。以灌完為主。彼必罵詈少頃。人因欲睡。聽其自醒。切勿驚動。使醒自醒來。則全愈。驚醒來。則半愈矣。此生治之一法也。別有治癲之方。亦奇妙。方用柴胡。白芍。半夏。牛膽。製過。南星。茯神。菖蒲。各三錢。附子。人參。各一錢。水十碗。煎二碗。先與一椀服之。必倦怠。急再灌一椀。必睡熟。有睡至一二日者。切不可驚醒。如死人一般。任其自醒。醒來病如失。即索飲食。說從前之病。不可即與飲食。餓半日。與之米粥。湯內加人參。陳皮。各五分。煎粥與之。再用人參三錢。白朮一兩。甘草一錢。茯苓。白芍。各五錢。陳皮五分。水煎與之。彼必欣然自服。服後再睡。亦聽其自醒。則永不再發。亦奇妙法也。癲狂之病。病本不同。狂病之來。狂妄以漸。而經久難已。癲病之至。忽然僵仆。而時作時止。狂病常醒。多怒而暴。癲病常昏。多倦而靜。由此觀之。則其陰陽寒熱。自有冰炭。

之異。故難經曰：重陽者狂。重陰者癲。義可知也。後世諸家有謂癲狂之病，大概是熱。此則未必然也。此其形氣脉氣亦自有據，不可不辨。察陰陽分而治之。

癲即癲也。觀內經所言癲證甚詳。而癲則無辨。即此可知。後世有癲癇風癲等名。所指不一。則徒滋惑亂。不必然也。又如別錄所載五癲。曰馬癲牛癲猪癲羊癲雞癲者。即今人之謂羊癲猪癲也。此不過因其聲之相似。遂立此名。可見癲癇無二。而諸家於癲證之外。又有癲證。誠屬牽強。無足憑也。又千金方有風癲驚癲食癲及陰癲陽癲之說。皆所當辨。經云：重陰為癲。重陽為狂。而癲症則痰涎聚於經絡也。癲者。癡呆之狀。或笑或泣。如醉如夢。言語無序。識潔不知。此變其常度。妄想頻來。幻覺亦現。甚者且繼以種種狂暴之行動。此等症狀。倏隱倏現。時進時退。遷延至數月或數年。此病防護之法。在於嚴重監視病人。務須全與家人隔離。安心卧養。有充血症狀者。宜於頭部施冷罨法。如係貧血。則宜進強壯食物。有非常狂暴之行為者。必行隔離之法。不能安眠。投催眠藥。如真刺等。癲癇俗名羊癲風。為一種慢性病。兼失神拘掣而有之。其原因在大腦之機能受反射之刺戟而來。此病有輕重二種。重症不論有無預兆。要皆猝然倒地。人事不省。全身肌肉悉起搐搦。大聲咷號。角弓反張。睛珠上視。毫不轉動。面色青白。口噴白沫。呼

為痰涎則一定。癲丸主之。既愈之後。則用河車丸以斷其根。已上三症。皆頻治取驗者也。若妄意求奇。失之遠矣。

【西醫學說】西醫所謂癲狂者。係單純一病之謂。與此對待者。別之為癲癇。癲狂之原因。大半由於遺傳。而其誘因。則為精神過勞。七情感動。生計艱難。飲酒中毒。頭部受傷。血液虧乏。營養不給。以及妊娠等。其前驅證候。大都精神沈鬱。夜不能寐。食思缺乏。全身倦怠。頭痛如裂。如此經一月。或一月半以後。遂忽然變其常度。妄想頻來。幻覺亦現。甚者且繼以種種狂暴之行動。此等症狀。倏隱倏現。時進時退。遷延至數月或數年。此病防護之法。在於嚴重監視病人。務須全與家人隔離。安心卧養。有充血症狀者。宜於頭部施冷罨法。如係貧血。則宜進強壯食物。有非常狂暴之行為者。必行隔離之法。不能安眠。投催眠藥。如真刺等。癲癇俗名羊癲風。為一種慢性病。兼失神拘掣而有之。其原因在大腦之機能受反射之刺戟而來。此病有輕重二種。重症不論有無預兆。要皆猝然倒地。人事不省。全身肌肉悉起搐搦。大聲咷號。角弓反張。睛珠上視。毫不轉動。面色青白。口噴白沫。呼

吸斷續。或且二便不禁。此種症狀。不久即散。呼吸亦漸勻整。面色皮膚如常。於是漸入睡鄉。醒後但覺頭痛。或稱倦怠。或即健康如故。至於輕症。更分三種。其一自覺眩暈。睜眼即過。意識朦朧。頃刻而止。其二意識缺亡。其三舉動粗暴。此病反射之刺。大半來自遺傳。他如婦人生殖器病。腦膜發炎。腸寄生蟲。因而異常驚愕者。與精神過勞者。又皆其誘因也。豫防之法。第一不可發揚精神。觸受驚恐。戒過勞。禁飲酒。忌房事。夜間勿作事。須早眠早起。強壯者。祇可食蔬菜類虛弱者。則選用多滋養易消化之食物。以防便秘。又此病之來。猝不及防。故切戒游行河岸海濱及山路。危險之處。又不可獨擁爐取暖。要之一切危境險事。均屬不可不慎。不幸有發病之兆。立撮食鹽一握吞咽。豫防發生。發作之際。速脫去狹窄之衣服。並以手巾裹箸等物。插入齒間。以防自嚙其舌。服大量之臭素劑。

中醫學說 防風 茯神散 治婦人風邪顛邪。或啼泣不止。或歌笑無度。或心神恐懼。或言語失常。研葛蒲去石膏 牡蠣各一 遠志去龍齒 福餘

糧桂心各半
甘草半
蠆蠆足
右為
粗末。每服三錢。水一盞半。煎七分。去滓溫服。
丸方

羚羊角屑

人參

生乾地黃

錢各七

獨活

遠

志心去

菖蒲毛去

防風雨各半

茯神去

石膏

補心丹

治因驚失心。或因思慮過當。心氣不甯。狂言妄語。叫呼奔走。

硃砂 雄黃各一分。并研。白附子一錢。為末。

右拌勻。以猪心血。丸如桐子大。更別以硃砂為衣。每服二丸。臨卧用人參葛蒲湯下。常服一粒。能安魂魄。補心氣。鎮神靈。

控涎丹

治療迷心竅。狂言譖語。如有所見。

甘遂心去

紫大戟皮去

白芥子微炒各等分

右為末

薑糊丸

每用薑湯下十丸。食後臨卧服。

牛黃瀉心湯

治心經邪熱。狂言妄語。心神不安。

臍子研另研各

牛黃研另研各一錢半

硃砂研另研各一錢半

大黃生一兩

右各研為細末。和勻再研。每服三錢。涼生薑蜜水。

薯蕷丸 治頭目眩冒心中煩鬱驚悸狂癲

薯蕷丸 生甘草 鹿角膠 大豆黃卷

桂心 神曲 當歸 人參

分麥門冬

柴胡 桔梗

茯苓 杏仁

合白蜜棗膏丸

如彈丸

先食服一丸日三

妄等證

碧霞丹 治痰涎壅塞牙關緊急目睛上視癲癇狂

石綠半兩水

附子六 川烏頭六 蟬梢各十個

右為末入石綠合白蜜糊為丸如雞頭實大每服

一丸薄荷湯化下更以溫酒半合飲之須臾吐出

痰涎然後隨證以他藥治之如口噤者幹開灌之

二陰煎 治心經有熱驚狂失志多言多笑等證宜

此主之 生地 麥冬 各二 白茯苓 元參

木通各一 黃連一錢 右水二鍾燈

草二十根竹葉亦可煎七分食遠服

六安煎 治痰滯氣逆癲狂等證

陳皮 半夏 雜芩 甘草 杏仁

白芥子 去皮各一錢

薑三五片煎七分食遠服

排氣飲 治氣逆癲狂等證

陳皮

薑香

枳殼

厚朴

木香

右水

一鍾半煎七

抽薪飲

黃芩

石斛

木通

梔子

澤瀉

細甘草

右水

一鍾半煎七

生鐵落飲

天冬

麥冬

貝母

膽南星

橘紅

遠志肉

石菖蒲

連翹

茯苓

枳殼

辰砂

右用生鐵

落煎熬三炷線香取此水煎藥服後安神靜睡不

可驚駭叫醒犯之則病復作難乎為力凡狂症服

此藥三十餘劑而愈者多矣若大便閉結或先用

滾痰丸下之

定癇丸 男婦小兒癇症並皆治之凡癲狂症亦有

服此藥而愈者

明天麻
一兩

姜汁炒
一兩

川貝母
一兩

膽南星
五錢

半夏
一錢

茯苓
半夏

南星
半夏

陳皮
半夏

瓜蒌仁
半夏

枳實
桔梗

遠志
一錢

丹參
酒蒸

陳皮
七錢

茯苓
兩

梔子
砂分五

右薑水煎服

甘草
錢各一

木香
辰

竹瀝
錢五

真琥珀
燈草研

石菖蒲
粉五錢

茯神
去木

僵蠶
甘草水

洗去嘴

竹瀝
水泡七錢

全蠍
水洗二錢

辰砂
細研水

右用
砂各一

竹瀝
一小碗

蠍汁一杯
甘草四兩

熬膏和藥

右用
砂各一

河車丸

紫河車
具

茯苓
遠志

各一
兩

人參
錢五

逐呆仙丹

善治呆病
丹參

右煉蜜為丸
每早開水下三錢

人參
錢五

人參
半夏

白芥子
附子

兔絲子
分五

白术
丹砂

加牛黃珍珠

研末先將各藥煎湯調丹砂末與半碗後又服其

半

二陳湯 治一切癲癇

單方療癲癇方。大蓼水蛭各為霜等分。右二味每服一錢。白湯送下。日二服至七日。通泄散治風涎暴作。氣塞倒仆。苦丁香為末三錢。加輕粉一字。水半

返魂湯 治瘍積日久口鼻聞燒酒之香乃神氣散化魄魄離亂急服此湯

蓮肉半錢
遠志各八
芍藥四
甘草二
杜仲中
當歸
麥冬
熟地
錢各一
清心豁痰湯 治五鍾癇證並顛狂驚恐

石菖蒲
花粉
貝母
酸棗仁
玄參
黃連
橘紅各
鈎藤湯 治諸癇

橘紅
鈎藤
膽星
天麻
僵蠶
人參
遠志
犀角
石菖蒲
竹茹
右入薑五片水煎服

北京中医药大学图书馆版

合調勻灌之良久涎自出。如未出含砂糖一塊下咽
涎出。又蓼蛭散專理癲癇。以馬蓼水蛭各燒為霜

等分。每服一錢。白湯飲下。日二夜一。

外國醫方 臭刺兩瓦至三瓦。右水沖服。治癲狂

之不眠者。

酸化亞鉛五瓦

硼砂三瓦 繡草根末適宜。右為九百粒。每日

臭刺三瓦 繡草根末越幾斯三瓦

服兩粒至五粒。自此至末方。俱治癲癇用。

臭刺四瓦

大黃末一瓦十分之八。桂皮末兩瓦

右為九百二十粒。每服三十粒。一日三次。

硼砂兩瓦 繡草根末四瓦

吳茱萸末一瓦十分之八。右為九百二十粒。每服三十五粒。一日三次。

臭刺四瓦 右以水一合溶化。一日分二次或四次

服之。

臭刺四瓦 索勿拿兩瓦 右研和為四包。臨卧服

一包。兼患不眠者用之。

臭素曹達 繡草酒各四瓦 水八十瓦 右一日

三次。臨用更沖水或茶服。

硫酸亞鈣羅必涅一瓦百分之一。甘草末及膏各

適宜。右為九五十粒。每日服一粒。

臭刺十瓦 橙皮糖漿十五瓦 水百五十瓦
每二時服一食匙。

血風煩悶及攻脾不能食。

中醫學說 婦人有血風煩悶者。由臟腑勞傷。血氣虛而風邪入之。搏於血脉。使氣不通。致肢節熱疼。口乾少卧而煩悶也。其血風攻脾。致不能食者。蓋諸經俱恃脾之精氣以為榮養。脾與胃為表裏。脾主化穀納食。胃為水穀之海。婦人若勞傷真氣。外邪乘之。則諸症生而不能食。薛立齋云。此證若因為飲食所傷。宜六君子湯。為勞役所傷。宜補中益氣湯。為風寒所傷。宜入參理中湯。嘔吐腹痛。或大便不實。六君子加木香。胸膈虛痞。或肚腹不利。宜六君子湯。鬱怒傷損肝脾。宜歸脾湯。命門火衰。宜八味丸。仍審諸經錯雜之邪而治之。假如不能食而肌肉削。乃脾胃經本病。右關脈緩而弱。乃脾胃之本脈。若見弦緊。或四肢滿開。淋溲便難。轉筋。此肝之脾胃病也。若兼洪大。或肌急。咳嗽痰盛。此肺之脾胃病也。若兼沈細。或善恐善。久。此腎之脾胃病也。各當於本經藥中。加兼證之藥。此東垣先生之治法也。

參去蘆各

桔梗

蘆

乾薑

炮各半兩

右為細末酒

煮麩糊。

和丸如桐子大。

每服三十九空心食前生

薑湯下日進二服。

進食散治脾胃虛寒不思飲食及久病人脾胃虛

全不入食者只兩服能食

陳云此方既

川烏治風攻脾不食

既無良藥

驗青皮

陳皮

粉草桂心

訶子良薑

川烏頭

炮去皮尖

草豆蔻仁

各三枚

為細末

每服一錢水一盞

生薑三片煎七分溫服

肢體骨節疼痛

中醫學說婦人血風身體骨節疼痛者由體虛氣血不調為風所侵故也其狀風邪在於皮膚肌肉。歷於骨節邪氣與正氣交擊故令疼痛也薛立齋曰東垣先生云飲食失節脾胃虛弱乃血所生病故口中津液下行若火熱來乘土位故肢體發熱作渴若肝經血熱用四物羌活黃芩黃柏肝經血虛用逍遙散山梔川芎風濕兼痰用四物南星半夏羌活蒼朮風濕傷脾用羌活脾濕湯暑濕傷氣用清燥湯氣鬱肝脾用四君木香枳殼檳榔胃氣受傷用補中益氣湯丸倦怠無力用補中益氣羌活川芎。

西醫學說此病西醫家名關節痠麻質斯其原因以冒寒為主外傷次之凡氣候變遷及多霧之地每易誘發此病春秋雨季發生亦易婦人患此者較男子為多病未來時先起寒戰繼發三十九至三十九度半之熱候脉搏每分時有百至百二十神識往往模糊食思缺亡煩渴異常舌苔灰白大便燥結尿少而現深褐色發熱之際汗流浹背盛而且久此其特徵所患關節四肢為最如足關節膝關節手關節肘關節肩胛關節等皆其易發者發則步行起立或運動手腕均牽掣作痛他如脊椎下頸披裂軟骨肋骨恥骨諸關節亦有依次發炎者若數多關節同時發作不惟不能轉側即著衣進食大小便等事亦非藉他人之手不可諸證中尤須留意者則為關節之變狀其一更迭而至其一遊走不定是也何謂更迭而至甲愈則乙發是何謂遊走不定一發必再發是各該關節當發病之時微論強自動作痛不可當即關節周圍浮腫而然也治之以撒里矢爾酸或撒曹為最著效其他攝生之法各該關節須以綿花包裹。

運動手腕均牽掣作痛他如脊椎下頸披裂軟骨肋骨恥骨諸關節亦有依次發炎者若數多關節同時發作不惟不能轉側即著衣進食大小便等事亦非藉他人之手不可諸證中尤須留意者則為關節之變狀其一更迭而至其一遊走不定是也何謂更迭而至甲愈則乙發是何謂遊走不定一發必再發是各該關節當發病之時微論強自動作痛不可當即關節周圍浮腫而然也治之以撒里矢爾酸或撒曹為最著效其他攝生之法各該關節須以綿花包裹。

外用繩帶紮定。或將該患肢高吊。塗搽沃度酒。或依
比知阿兒劇痛。投麻醉藥。初發大忌入浴飲酒。發熱
宜飲牛乳。煩渴進檸檬水少許。久病宜通電氣。行按
摩法。

中國醫方

芎窮散

治婦人血風身體骨節疼痛

心膈壅滯少思飲食

川芎

赤茯苓

桂心

桂心

赤芍藥

川芎

當歸

附子

地

調下

不拘時日進二服

何首烏

羌活

當歸

赤箭

附子

地

調下

不拘時日進二服

</

大。每服二十九溫酒送下。或作末酒調半錢亦可。

日進二服。不拘時。

羚羊角散 治血風身體疼痛手足無力心神壅悶

羚羊角屑 酸棗仁炒 生乾地黃 檳榔各一錢

五加皮 防風 赤芍藥 當歸 骨碎補毛去

海桐皮 川芎各七錢半 甘草兩半 右為末每服二

錢溫酒調下。

羌活勝溼湯 治頭痛脊痛腰痛似折項似拔

羌活 獨活各一錢 川芎各二分 薤本 防風 甘草尖各半錢

蔓荊子 川芎各二分 右水煎服如身重腰沈沈

生附除濕湯 治寒濕交攻身體冷痛

附子一兩 蒼朮一兩 白朮 厚朴各半錢

木瓜

甘草各三兩 右薑水煎。

加味防己黃芪湯 治風濕相打四肢無力關節煩

疼

黃芪四錢 防己 白朮各三錢 甘草 蒼朮各一錢

薏苡仁五錢 薑三錢 川獨活錢 紅棗一枚

作一服水二鍾煎一鍾不拘時服。

桂枝芍藥知母湯 諸肢節疼痛此湯主之

桂枝四兩 白朮各五錢 茯苓三兩 甘草各二錢 麻黃各二錢 生薑各二錢

知母兩錢 防風各四錢 附子一枚

九味以水七升煮取二升溫服七合日三服

防己湯 治風壓節四肢疼痛

防己三兩 茯苓 白朮 桂心 生薑各四錢

赤芍藥散 治筋節風骨節疼痛四肢微腫

赤芍藥二兩 附子 茯苓 當歸 防己 海桐

皮 草薢各一錢 桂心二錢 桃仁半錢 右生薑半

分水煎。

牛膝木瓜湯 治肝虛遇歲氣燥濕更勝肩背連尻

陰股膝髀皆痛

牛膝 木瓜各一錢 茯苓 杜仲 柏子 天

麻 黃松節 兔絲子各七錢半 甘草半錢 右入薑

茱萸水煎服。

擒虎散 風寒暑濕毒氣攻注筋骨痛

沒藥 當歸 黑牽牛 大黃各一錢 甘草一錢

經驗方 治諸風一身筋骨肢節不利或頸項強痛

或臂脇攻痛或足膝痺痛

右

穿山甲
炒焦
二兩

烏童便
製條
蛇焰乾

黃柏
炒
鹽水

薑黃
炒

乳香
雨
各一
蘇

沒藥
培

川

芎
各酒

沒藥
培

依比知阿兒
松節油十六瓦
右混和塗患部
沃度酒
沒食子酒各二十瓦
右混和塗患部
十倍吳茱萸酒
右塗患部

松節油四十八瓦
加蜜列花油四瓦
樟腦三寸

石鹼流動擦劑
右塗患部

樟腦四瓦
羊毛脂四十瓦
右為軟膏塗擦

撒里矢爾酸一瓦十分之一
安知歇貌林一瓦百
分之一
乳糖適宜
右混和為散一日三次每
服一包

松節油八瓦
依比知阿兒半瓦
樟腦半瓦
加
里石鹼一瓦
右調和為塗布料常塗患部

撒曹四瓦
薄荷水三十瓦
水七十瓦
右混和
為溶液
一日六次每服一食匙

撒曹
羊毛脂
猪油

各三十瓦

右調和早晚

塗搽患關節上

歇那設珍半瓦
右為一包共製十包每三時服一

包

安知必林
白糖各半瓦
右為一色共製十包一

日四次每服一包

企沃諾兒
火酒
右外用塗搽患部

中西婦科大全卷三終



南京中医大學图书馆版权所有

無錫顧鳴盛輯

雜證門中

走疰痛

中醫學說

風寒濕三氣雜至合而為痹。皆因體虛。腠理空疎。受風寒濕氣而成痹也。痹之為病。寒多則痛。風多則行。濕多則著。在骨則重而不舉。在脈則血凝而不流。在筋則屈而不伸。在肉則不仁。在皮則寒。逢寒則急。逢熱則縱。此皆隨所受邪氣而生證也。大率痹病總而言之。凡有五種。筋痹脈痹皮痹骨痹肌痹是也。脈大而濶為痹。來急者亦為痹。濶而緊者亦為痹。又有風血痹。陰邪入於血經故也。外有支飲。亦令人痹。當隨證施治。白虎歷節。由體虛之人。將理失宜。受風寒濕毒之氣。使筋脈凝滯。血氣不流。蘊於骨節之間。或在四肢。肉色不變。其病晝輕夜劇。其痛徹骨。如虎之嚙。故名白虎也。痛如掣者為寒。多腫滿如脫者為濕。多汗出者為風。多巢氏云。飲酒當風。汗出入水。遂成斯疾。久而不愈。令人骨節蹉跌為癩病者。誠有此理也。痛風者。四肢百節走痛。方書謂之白虎歷節風證是也。大率有痰風熱風濕血虛。因於白

者。小續命湯。因於濕者。蒼朮白朮之類。佐以竹懸。因於痰者。二陳湯。加酒炒黃芩。羌活。蒼朮。因於血虛者。用芍藥之類。佐以紅花。桃仁。大法。用蒼朮。川芎。白芷。南星。當歸。酒黃芩。在上者。加羌活。威靈仙。桂枝。在下者。加牛膝。防己。木通。黃藥。若血虛。宜多用川芎。當歸。佐以桃仁。紅花。薄桂。威靈仙。凡治痛風。取薄桂。味淡者。獨此能橫行手臂。領南星。蒼朮等藥至痛處。遍身骨節疼痛。晝靜夜劇。如虎嚙之狀。名曰白虎歷節風。並宜加減地仙丹。或青龍丸。乳香丸等服之。又有痛風而痛有常處。其痛處赤腫灼熱。或渾身壯熱。此欲成風毒。宜敗毒散。傷濕兼風寒者。汗出身重。惡風喘滿。骨節煩疼。狀如歷節風。臍下連脚。冷痹不能屈伸。所謂風寒濕合而成痹。宜防己黃芪湯。五痹湯。於風濕最宜。若因浴未解裙衫。身上未乾。忽爾熟睡。致濕干腎經。外腎腫痛。腰背攣曲。以五苓散一貼。入真坯少許。下青木香丸三服。臟腑纔通。腫消腰直。其痛自止。筋骨疼者。俗呼為痛風。或痛而游走無定。俗呼為走注風。並宜烏藥順氣散和煎。復元通氣散。燕地仙丹。或青龍丸。未效。用大防風湯。或五積散。調乳香末。有附骨疽。與白虎飛尸歷節皆相類。歷節

痛則走注不定。白虎飛尸痛淺，按之則便止。附骨疽痛深，按之亦無益。又一說：白虎飛尸亦能作膿，著骨而生，及其腐潰，碎骨出盡，方愈。如是則附骨與白虎飛尸同是一病，但淺深不同耳。偏身骨節疼痛，晝夜劇如虎之囁。名曰白虎歷節風，並宜加減地仙丹或青龍丸、乳香丸等。有於窗牖間梳洗卒然如中風，呼為簷風。五積散加防風一錢。形怯瘦者，多內因血虛有火，形肥勇者，多外因風濕生痰，以其循歷遍身曰歷節風。甚如虎啖，曰白虎風痛，必夜甚者，血行於陰也。痛多痰火，腫多風濕，然痰火雖內因七情，六慾或病後亡津，血熱已自沸騰，亦必略感外邪而後發動。骨節痛極久則手足踰攀，風濕雖外因涉冷坐濕，當風取涼，然亦必血熱而後凝滯污濁，所以作痛。甚則身體塊瘡，痰火風濕全者，古龍虎丹主之。傷寒通身節痛，乃風寒入肌骨，雜病週身痛，乃風痰壅滯。二陳湯加南星羌活蒼朮白芷酒芩竹瀝薑汁，抉瘀血者。再加桃仁紅花濕痰瘀血，週身兩脅走痛，控涎丹加桃仁泥為丸，或小胃丹下之。如半身不遂及左右手足踰攀者，烏頭湯微汗之。虛者地仙丹。上體痛者，宜祛風熱，豁痰。二陳湯主之。痰熱客太陽，頸項

強動，則微痛者，加酒芩羌活紅花濕痰鑽注肢節痛者，加二木威靈仙乾薑黃藥羌活白芍。結陽肢痛者，倍加黃芩。疾濕橫行，手臂痛，加南星蒼朮酒芩香附威靈仙。臂重難舉者，加二木羌活桂枝威靈仙黃芩。臂軟難舉者，加南星枳實木香薑黃。如臂痛不能舉，或連指掌腫痛者，舒經湯。肩忽痛者，小柴胡湯去半夏，加防風，當歸生地大黃黃連滑石。肩背痛因食積者，單龜板為丸，薑湯下。肩腿痛者，用龜板一兩，側柏葉香附各五錢，白芥子凌霄花各一錢五分，為末，酒糊丸。四物湯加甘草陳皮煎湯下。背心常一片冰冷者，導痰湯合蘇子降氣湯。下體腫者，宜流濕行氣四物湯主之。陰虛，臂共痛者，膀胱有火，加知母黃藥及桂少許。有痰合二陳湯加澤瀉前胡木香為引，痛甚者，加乳香沒藥。熱者，合大承氣湯下之。兩腿痛者，加牛膝陳皮。吞加味三妙丸。兩腿痛甚，素虛性急，或痢後血流經絡作痛者，加桃仁牛膝陳皮甘草。薑汁煎熟，調潛行散，如兩腿間忽一二點痛，入骨不可忍者，用羌活根為末，酢調敷痛處。以怕緊繫產後有此疾者，亦宜兩足痛，當歸拈痛湯。凡痛風丸散佐使，在上加羌活威靈仙，在下加牛膝，防己木通黃藥，在手臂加羌活威靈仙。

桂枝引至痛處。如遍身痛者。則問所起處加之。痛風百節痠痛無定處。久則變成風毒。痛入骨髓。不移其處。虎骨散。麝香丸。如赤腫灼熱者。敗毒散。肢節腫痛。挾濕熱者。麻黃赤芍湯主之外。因濕證。腫滿身痛。如脫者。除濕湯。寒濕者。附子六物湯。捉虎丸。濕熱者。五苓散。加蒼术防風羌活白芷黃藥竹瀝薑汁。走注者。四妙散。肢節腫脈滑者。加南星木香檳榔蒼术黃藥。防凸濕氣背僵。足癱成廢者。用甘遂一錢為末。入猪腰內煨食之上。吐下瀉風證。黃汗出。面微紅掣痛者。防風通聖散。或小續命湯去附子。加羌活黃芩。虛者。防風順氣散。獨活寄生湯。上體金瘡丹。下體換腿丸。風中肩背。太陽氣鬱。不可回顧。或肺氣鬱熱。小便數而欠伸。宜通氣防風湯。羌活勝濕湯。風濕相搏痛者。甜瓜子丸。神仙飛步丹。龍虎丹。活絡丹。乳香黑虎丹。活血應痛丸。風濕毒生瘡者。單蒼耳加羌活防風十分之二為末。蜜丸如梧子大。每百丸酒下。或單豨莶丸一斤。加四物湯料各五錢。防風羌活各三錢。川烏一錢五分。為末。蜜丸空心茶酒任下。風寒濕熱等分。加虎胫骨。減半為末。水調服。暑濕相搏。面赤尿有大者。調潛行散。有瘀血者。加大黃桃仁紅花微利。

赤者。五苓散合敗毒散。加當歸赤芍。或復元通聖散結陽。肢腫熱毒流注。大使閉者。犀角湯。寒證。肢節掣痛。小筋急癢。五積散合順元散。加麝一釐。鶴膝痛。五積散。加松節杉節。骨髓痛。虎骨散。內因七情。肢節骨刺痛。初必眩運自汗。二陳湯。加香附枳殼木香。如腰背氣動發痛者。枳甘散。流氣飲子。俱加葱白。服後卧少時。如思慮憂心。痛從背起。至胷脅者。人參四分。木通二分。煎湯。吞當歸龍鬚丸。飲食積痛。初必胃滿嘔吐。二陳湯。加烏藥枳殼。或單蒼耳丸。因食厚味積痰。脾胃虛樞左右。發痛一點。延及膝骭腫大。惡寒夜劇者。潛行散。為末。加甘草梢。蒼木犀角川芎。陳皮牛膝木通白芍。入薑汗煎服。病稍減去。犀角加牛膝龜板歸身尾。冬月加桂。夏加黃芩。又有遍身遊走庠痛。狀如蟲齒。遇痒而進。飲食則蟲亦饜飫其間。庶不致頻頻噉也。宜麝香丸留飲。四肢歷節。氣短脈沉。久則令人骨節蹉跌。恐為癲癇。宜導痰湯加減。痰飲者。古半硝丸。氣短倦怠者。六君子湯。加南星酒。濕痛者。用黃藥威靈仙各五分。蒼术二錢。陳皮芍藥各一錢。甘草三分。羌活二分。水煎服。血虛。四物湯。加龜板秦艽。有大者。調潛行散。有瘀血者。加大黃桃仁紅花微利。

之性急發熱者。加酒芩黃芩。肢節腫痛。脈澀者。加桃仁。歷年不愈者。倍加木通。出汗或發紅丹。即愈。若不愈者。痛風。五二妙蒼蘚散。三妙丸。虛氣。歷節痛。如鎰鋸者。四君子湯。加桂附白芍。血氣俱虛。挾痰火者。八物湯。加羌活。防風。黃芩。龜板。勞傷者。趁痛散。血風丸。初起與傷寒相似。宜分表裏治之。表證。九味羌活湯。氣虛表實。骨節痛者。六一散。加香附。黃芩。水煎或薑汁糊丸。散裏證。五積交加散。加大黃。痰濕熱者。導水丸。病愈後。大便閉。稍虛者。麻子仁丸。驟痛不可忍者。用楓寄生培乾浸酒。常服微醉。通用史國公浸酒方。萬應膏。屬內因者。宜消瘀血。養新血。兼理痰火。則血活氣和。痛無不止。又不愈者。間用外降之劑。或專養血補脾。如久病及亡血。產後病。此者俱不宜用風藥。燥血。歷節風痛。是氣血本虛。或因飲酒。腠理開。汗出。關節與氣血相搏而疼痛非常。或如虎之咬。故又有白虎歷節之名。中藏經曰。歷節疼痛者。因醉犯房而得之。此其槩也。大都痛痹之證。多有晝輕而夜重者。

正陰邪之在陰分也。其有遇風雨陰晦而甚者。此正陰邪侮陽之證也。或得煖遇熱而甚者。此溫熱傷營之火證也有火者。宜從清涼有寒者。宜從溫熱。若筋脈拘滯。伸縮不利者。此血虛血燥證也。非養血養氣不可。凡諸治法。總宜如前。又凡諸痹作痛者。俱宜用火龍膏貼之。婦人體虛受風邪氣隨血行。或淫易皮膚。卒然掣痛。遊走無有常處。故名為走症也。加減小續命湯主之。薛立齋曰。東垣云。若人身體沉重。走症疼痛。此溼熱相搏。或風熱鬱而不得伸。附著於有形。也是證多因飲食起居失節。或因七情勞役失宜。脾胃虧損。腠理不密。外邪所侵。以致內熱晡熱。自汗盜汗。或經候不調。飲食不甘。治法。濕熱。腫痛者。清燥湯。兼痰。佐以二陳湯。肝火作痛者。加味道遙散。脾鬱作痛者。加味歸脾湯。血虛作痛者。四物湯。氣虛作痛者。四君子湯。氣血俱虛者。八珍湯。俱加羌活川芎。月經先期而痛者。加味道遙散。頭眩倦怠而痛者。補中益氣湯。大抵按之痛甚者。病氣實。按之痛緩者。元氣虛。勞役而痛者。亦元氣虛也。飲食失宜而痛者。脾氣虛也。惱怒而痛者。肝火盛也。若晝輕而夜重者。血分病也。

〔西醫學說〕痛風。日名尿酸性關節炎。除由於遺傳外。大都發於美食之人。其因肥胖及患腎石而來者亦有之。而其誘因則為感冒。外傷。精神感動。酒色沉溺等。此蓋因血中之尿酸蓄積於骨節之間。或暫時停留。或永久不去。故發為劇痛也。當其發病之前。必先有全身疲倦。心思變調。消化不良。大便秘結。小便少而有澀。惡寒微熱。筋痛拘攣。汗液淫滯。心悸亢進諸證候。既而發作愈劇。其母趾關節。忽於中夜發生劇痛。其痛如鑽如灼。患部腫脹。皮膚紅而灼熱。浮腫若泥。其時又惡寒微熱如前。至來朝痛止。乃發汗退熱。晝間患部爽適。但餘腫脹而已。夜則又發作如故。依此反覆五日至十日。逐漸輕減。終乃腫消痛定。皮膚落屑而愈。但一二年後必屢屢復發。其常年發作。永不減退者。亦或有之。此則成慢性關節痛風也。慢性關節痛風有二種。其一一定不移。謂之固定性關節痛風。其一游走不定。謂之游走性關節痛風。其體中之尿酸及尿酸鹽。著於粘液囊。則為粘液囊痛風。著於腱鞘。則為腱鞘痛風。著於軟骨。則為軟骨痛風。著於內臟。則為內臟痛風。所著處必肥大如結節。故手指足趾患之。其狀遂如防風之根。預防之法。莫

如節減酒肉。多進果實茶水。常行屋外運動。治法。除如前攝生外。並須力求安靜。高舉患部。內服撒曹。摩法。貧婦患此。則須多食肉類。常擇食柑橘橙柚。香櫞等果實。

〔中國醫方〕沒藥散 治婦人血風走疰肢節疼痛
發時往來不定

沒藥另研 乳香另研 芒硝當歸_{炒去}
心漏蘆去蘆 地龍去土微炒 安息香另研 白芷桂
各七錢半 右為細末入研藥拌勻。每服一錢。溫酒調下。

不拘時

琥珀散 治婦人血風走疰疼痛來往疼痛

琥珀另研 當歸去蘆 牛膝酒浸 羌活去蘆
桂心一兩 川大黃挫微炒各七錢半 没藥另研
羚羊角屑各半 乾漆炒烟盡 元胡索防風去蘆
不拘時。日進二服。

虎骨散 治婦人血風走疰疼痛不可忍
虎脛骨酥炙 乾蠍炒 琥珀另研各半 當歸炒

威靈仙

牛膝

酒浸

羌活

去蘆

桂心

各一

漏蘆

去蘆

菖蒲

沒藥

另研各

右為細末

雄黃散

治婦人血風走症疼痛

雄黃

研水

血竭

另研

赤箭

側柏子

炮去皮膚

桂心

沒藥

另研

木香

白芥子

地龍

炒去土

麝香

二錢半

烏蛇

皮骨炒微黃

右為細末入研藥更研令勻每服二錢熱酒調下

不拘時日進二服

漏蘆散

治婦人血風走症疼痛無有常處

漏蘆

當歸

牛膝

分各三

桂心

地龍

去土

防風

羌活

白芷

沒藥

研

甜瓜子

兩各半

虎脛骨

酥炙

敗龜板

醋炙各一兩

右為細末每服

二錢熱酒調下無時

四生丸

治骨節作痛或渾身麻痺

白僵蠶

炒去絲

地龍

去土

白附子

五靈脂

草烏頭

各等分去皮六

右為末糊丸桐子大每服二

十九茶清送下酒調服亦可

麝香丸

治白虎歷節諸風疼痛遊走不定狀如蟲

齧畫

靜夜劇及一切手足不測疼痛

生全蠍

二十個

生黑豆

二十粒

生地龍

去土半兩

大

八角川烏頭

三枚去皮

右為細末

入麝香一字同研煮糯米糊為丸如菉豆大每服七丸甚者十

丸夜卧令膈空溫酒吞下微出冷汗一服便瘥

芍藥知母湯

治諸肢節疼痛身體魁瘞脚腫如脫

頭眩短氣溫溫欲吐

桂心

知母

防風

各四兩

芍藥

黃麻

根去節

甘草

各三兩

附子

二兩炮

右咬咀

每服四錢水一

盞半生薑五片煎七分去滓空心服一方有白朮

川芎杏仁半夏

附子八物湯

治風寒疼痛四肢如鎚錘不可忍

附子

乾薑

芍藥

茯苓

人參

甘草

桂心

心各三兩

白朮

四兩

右咬咀

每服四大錢水二

盞煎七分去滓食前服一方去桂用乾地黃二兩

小續命湯

治白虎歷節痛不可忍

人參

防風

麻黃

去根節

芍藥

川芎

甘草

黃芩

白朮

桂心

附子

炮

防風

各一

生薑

右方以水一斗二升煮取三升分三服不

差更服忌海藻松菜桃李葱生菜雀肉豬肉

中大

藥大學圖書館藏

附子 生

薰陸香

杏仁 研

桂心 當歸 芸

右為末煎服。

滲濕湯 治坐卧濕地或為雨露所襲身重脚弱關節重痛發熱惡寒。

細末

鎔黃蠟五兩攪和諸藥搘作片子包裹痛處立效。

又方

芫花

桂心 各一
兩

漢椒 二兩

桑根白皮 三兩

烏頭湯

陳皮

白术

甘草 各一
錢

乾薑

茯苓 各四
兩

右入薑東水煎服。

拌和蒸令熱用青布裹熨痛處冷即更入散蒸用之。

治婦人血風走疰腰胯脚膝疼痛

天仙子 川烏頭生 附子 生各一
兩

右為細末以酒煎成膏攤於帛上敷貼痛處多年者不過三上

大防風湯 治鶴膝風雨膝腫大而痛

防風

白术

杜仲

當歸

熟地

芍藥

麻黃

芍藥

黃芪 各三
兩

甘草

川烏頭

故五
兩

右五味㕮咀四味以水三升煮取一升去滓納蜜。

更煎之服七合不止盡服之。

效。

清燥湯 治元氣虛濕熱來之遍身酸軟小便赤少

大便不調腰腿痿軟口乾作渴體重麻木頭目眩暉飲食少思自汗盜汗肢體倦急胸滿氣促

黃芪 一錢 五分 炒

紅花

通草

連翹

當歸

羌活

木鱉肉 細

柴胡

神龜 一錢 五分 炒

五味子

川芎

九粒

甘草

各二
分

荳蔻

各七分 去皮

白芷

升麻

各五
分

甘草

四
分

甘草

各五
分

白茯苓

生地黃

澤瀉

各五
分

白柏

一分

白茯苓

芩 人參 當歸酒 升麻各三 黃柏一分
冬去心 陳皮炒 生地黃 澤瀉各五
芩 人參 當歸酒 升麻各三 黃柏一分
芩 人參 當歸酒 升麻各三 黃柏一分

痛風主方

當歸錢 秦艽二 防風一錢
川芎 羌活各

當歸錢 秦艽二 防風一錢
川芎 羌活各

錢

車前子 黃芩 枳殼各五

右水煎午後

臨睡服

中行圓 治風濕毒氣客伏經絡流注作痛

芍藥

兩

犀角屑

兩

甘草

各三

威靈仙

一兩

右

為細末

煉蜜為圓。如桐子大

每服五十丸溫水下。

追命再造散

治歷節風痛

錦紋大黃

兩

獨生皂角刺

半兩

右為末。每服

二錢。臨夜冷酒調下。

治諸風一身筋骨肢節不利或頸項強痛或背脇

攻痛或足膝痺痛

穿山甲

一兩

當歸

炒焦

川芎

俱酒

沒藥

培

川

烏

童便

黃柏

鹽水

薑黃

炒

乳香

各一兩

斬

蛇

一條

右為極細末

每早晚各服三錢。白湯下。

蘗

經活血湯

遍身走痛如刺左足之痛尤甚且晝

輕夜重者以此為主方

川芎 當歸 芍藥 地黃 羌活 茯苓 蒼

木 桃仁 牛膝 防己 陳皮 白芷 龍膽

威靈仙 防風 甘草 右水煎服

羌活湯 遍身骨節疼痛以此為主方

羌活 蒼术 黃芩 當歸 芍藥 茯苓 香

附子 半夏各錢。陳皮 木香各七
羌活 蒼术 白朮 牛膝 乳香 木瓜 黃
芩 當歸 茯苓 芍藥 香附子各二
木香 甘草錢 右為末。煎服

療痛風方

羌活 蒼术 白朮 牛膝 乳香 木瓜 黃
芩 當歸 茯苓 芍藥 香附子各二
陳皮

木香 甘草錢 右為末。煎服

治療風方

延胡索 當歸 肉桂 右等分研為細末以酒

服用

防風 川芎 羌活各等分

右三味水煎服

又方

忍冬 木通 芍藥 川芎各二錢

大黃酒

膽各錢

甘草五分

土骨皮三分

羌活二錢

牛

九味分作七劑。七日服盡。

外國醫方】撒里矢爾酸五瓦 羊毛脂 猪油各

二十瓦。右外用。塗痛處。

炭酸里丟謨一瓦至兩瓦 乳糖一瓦 右分三包。一日三

次。每服一包。

一日三次。每服一包。

炭酸里去謨半瓦 白糖而瓦 右研和為散分作

十包一日二次每服一包

阿斯必林一瓦至一瓦半 右為一包共製六包一

日三次每服一包

阿斯必林三瓦 鹽酸歇魯菌一瓦百分之一右

分三包一日三次每服一包

安知必林半瓦 右為一包共製六包一日三次每

服一包

撒曹六瓦 右分六包一日三次每服一包用澱粉

紙包而服之

沃度里去謨一瓦四分之一 龍膽越幾斯及末各
適宜 右製九二十粒每日服三四粒

沃剝一瓦 沃度一瓦十分之一 凡士林二十瓦

右調和製成軟膏塗搽患部

依比知阿兒三瓦 凡士林三十瓦 右調成軟膏

塗搽患部

菴苔越幾斯兩瓦 猪油二十瓦 右調成軟膏塗搽

患部

重曹八瓦 右分三包一日三次每服一包多沖水服

人工加爾爾斯泉鹽十二瓦 右以水一合溶化一

右研和為散分作

日分三次服

安息香酸曹達四瓦 硝砂兩瓦 右製為散分作

十五包一日二次食前服下

鱗酸曹達四瓦 重曹二十瓦 右製為散分作

三包一日三次每服一包

撒魯兒一瓦 乳糖兩瓦 右研和為散分作三包

一日分三次服

複方大黃丸 右每服五粒至十粒早晚一次

瘧瘈木 土茯苓各十二瓦

荆芥 甘草根各兩

瓦 右為煎藥分二日服

眩暈

中醫學說 婦人頭眩由氣虛風入於腦循脈引於目系目急急也邪甚則必癲素問云頭痛癲疾下虛上實過在足少陰巨陽甚則入腎徇蒙招搖目瞑耳聾下實上虛過在足少陽厥陰甚則在肝下虛者腎虛也故腎厥則頭痛上虛者肝虛也故肝虛則暈徇蒙者如以物蒙其首招搖不定目眩耳聾皆暈之狀故肝厥頭痛不同也薛立齋曰丹溪先生云眩者言其黑運旋轉其狀目閉眼暗身轉耳聾如立舟船之上起則欲倒蓋虛極乘寒得之亦不可一途而

取軌也。若風則有汙寒，則掣痛。暑則熱悶，溼則重滯。此四氣乘虛而眩暈也。若鬱結生痰而眩暈者，此七情虛火上逆也。若淫慾過度而眩暈者，此腎虛也。氣不歸源也。若吐衄漏崩而眩暈者，此肝虛也。不能攝血也。頭風熱也，久則目昏。偏頭風相火也，久則目緊便澀。皆宜出血以開表之。竊謂前證肝虛頭暈，用鈎藤散。腎虛頭暈，六味丸。頭暈吐痰，養正丹。不應八味丸。散地黃丸。不應參苓白朮不應，當歸補血湯。氣虛，四君歸氣。不應補中益氣湯。加茯苓半夏。脾胃有痰，半夏白术天麻湯。風痰上湧，四神散。發熱惡寒，八物湯。七情氣逆，四七湯。傷溼而暈，除溼湯。肝木實瀉青丸。虛用地黃丸。不應川芎散。脾氣虛，二陳參木柴胡升麻。不應益氣湯。眩謂眼黑暈者，頭旋也。古稱頭旋眼花，非天麻半夏不除是也。半夏白术天麻湯主之。有氣虛是也。其中有肝大內動者，經云諸風掉眩，皆屬肝木。是也。逍遙散主之。有溼痰壅遏者，書云頭旋眼花，非君子湯主之。亦有腎水不足，虛火上炎者，六味湯，亦

有命門火衰，真陽上泛者，八味湯。此治眩暈之大法也。大抵治大虛之人，眩暈自汗，氣短脈微，其間有用參數斛而愈者，有用參十數斤而愈者，有用附子二三斤者，有用芪朮教膏近半石者。其所用方，總不離十全八味六君子等。惟時破格投劑，見者皆驚。堅守不移，聞者盡駭。及至事定功成，甫知非此不可。想因天時薄弱，人稟漸虛，至於如此。攝生者可不知所慎歟。

西醫學說 我國婦人所患之眩暈症，大都為反射性眩暈症。如來自胃腸病之胃眩暈、腸眩暈是也。其他凝視流水航行大海，陟登高山，亦能致眩暈者。若毫無其他原因而起者，則謂之真正眩暈。我國人亦間有之。病發之際，儼如己之身體動搖不能自主。又若身體周圍之物體旋轉不已，旁人觀察病者，亦見其坐立不定，甚者竟至仆地。此種證候，每見於蚤起空心之時，間有發於夢中者，則謂之夜間眩暈症。至其時間之長短，來勢之輕重，輒無一定。更有因耳病而致者，其際必兼異常之耳鳴。病人面色青白，體流冷汗，惡心嘔吐，眼球振盪，甚者且稍稍失神。醫治之法，靜為貴。甚者服催眠藥，令得安眠。因頭部充血而發

者。則該部宜冷之。空心時飲食不可過多。貧血極甚者。以及重症恢復之初。慎弗倉猝起立。乘舟車時。最忌疾馳。常發眩暈之人。萬不可凝視運動。如車輪迴轉。波瀾起伏等是。

〔中國醫方〕養正丹

治虛風頭眩吐延不已。蓋此

藥升降陰陽。補接真氣。非止頭眩而已。

黑鉛 水銀 硫磺研各一兩 珠砂研各一兩 右用建殘

一隻火上鎔。鉛成汁。次下水銀。用柳枝子打停。取

下。歇少時。入二味。打停。候冷。取下。研為粉。以糯米

軟飯丸。如菜豆大。每服三十丸。棗湯吞下。空心食

前日二服。

鈎藤散 治肝厥頭暈清頭目

鈎藤 陳皮去白 半夏湯洗七次切為片子 麥門冬去心

茯苓去皮 茶神去木 人參去蘆 甘菊花防風去蘆

各半 甘草二錢半炙 石膏一兩 右咬咀。每服四錢。煎

水一盞半。生薑七片。煎至一盞。去滓。熱服。日進二服。

獨活散 治婦人風眩頭疼。嘔逆身體時痛。情思昏

悶

獨活兩 白术去蘆

防風去蘆

細辛去苗 人參去蘆

川芎散 治風眩頭暈

川芎去蘆 山藥

白茯神去木

甘菊花不帶葉

人參

各半兩

山茱萸肉一兩

右為細末。每服二錢。溫

酒調下。不拘時。日進三服。

四神散 治婦人血風眩暈頭痛

菊花當歸去蘆

旋覆花

荆芥穗分等

君為

細末。每服二錢。水一中盞。葱白三寸。茶末一錢。煎

至七分。通口服。

良久去枕。仰卧少時。

斗門方 治血風頭旋。或不知人事。用喝起草嫩心。

陰乾為末。酒服二錢。其功甚效。即前蒼耳散。

君為

治頭旋如天動地轉。名曰心眩。膽礬一兩。細研。用麵餅劑一個。拌勻。勒如骰子大。瓦上焙乾。每服一顆。為末。燈心竹茹。煎湯調下。此去痰之法。當審而用之。

三五七散 治八風五痺肢體不仁。或風寒入腦頭

痛目旋耳內蟬鳴

芎窮 荆芥各半錢半

半夏湯洗七次切片子

炙甘草

赤芍藥各半兩

石膏二兩

右咬咀。每服八錢水

一中盞半。生薑七片。薄荷七葉。煎至一大盞。去滓

溫服。

不拘時。



附子炮

細辛各三

乾薑炮

山茱萸各五

防風

山藥炒各兩

右為末。每服二錢，溫酒調服。

正元飲

治下元虛敗，痰氣上湧，頭目眩暈，臘腑滑泄時或自汗，手足逆冷，霍亂，轉筋等症。

附子炮去皮

丁香各一

右生薑水煎，仍吞蘇合圓。

木香半夏

橘皮

硼砂各半

兩

紅豆炒

人參去蘆根二兩

附子炮去皮

川芎六一兩

乾薑炮三錢

烏藥

羚羊角散

治風邪乘於陽經，上注頭目，遂入於腦

又上衝頭目一切眩暈

羚羊角

兩

兩

甘草炒

肉桂五錢

白术二兩

乾薑炮三錢

黃芪兩半

右每服三錢，薑棗水入鹽少許，煎送黑錫丹。

附子炮去皮

川芎

白芍

甘草各五錢

枳殼

中

乾葛各一

人參去蘆根二兩

附子炮去皮

川芎六一兩

乾薑炮三錢

烏藥

右每服三錢，薑棗水入鹽少許，煎送黑錫丹。

附子炮去皮

川芎

白芍

甘草各五錢

中

天麻

半夏各一錢

附子炮去皮

川芎六一兩

乾薑炮三錢

烏藥

右每服三錢，薑棗水入鹽少許，煎送黑錫丹。

南星分各六

甘草分各三錢

附子炮去皮

川芎六一兩

乾薑炮三錢

烏藥

右每服三錢，薑棗水入鹽少許，煎送黑錫丹。

清暈化痰湯

附子炮去皮

川芎六一兩

乾薑炮三錢

烏藥

右每服三錢，薑棗水入鹽少許，煎送黑錫丹。

陳皮

半夏各一錢

附子炮去皮

川芎六一兩

乾薑炮三錢

烏藥

右每服三錢，薑棗水入鹽少許，煎送黑錫丹。

芎各八分

白芷各七錢

附子炮去皮

川芎六一兩

乾薑炮三錢

烏藥

右每服三錢，薑棗水入鹽少許，煎送黑錫丹。

天麻半夏湯

附子炮去皮

川芎六一兩

乾薑炮三錢

烏藥

右每服三錢，薑棗水入鹽少許，煎送黑錫丹。

天麻半夏湯

附子炮去皮

川芎六一兩

乾薑炮三錢

烏藥

右每服三錢，薑棗水入鹽少許，煎送黑錫丹。

熱下寒不得安卧

附子炮去皮

川芎六一兩

乾薑炮三錢

烏藥

右每服三錢，薑棗水入鹽少許，煎送黑錫丹。

天麻半夏湯

附子炮去皮

川芎六一兩

乾薑炮三錢

烏藥

以上俱神經性眩暈用。

硫黃華 酒石英各二十瓦

大黃一瓦十分之八 白芷兩瓦

右為藥粉分

二十包一日三次每服一包

癰瘡木脂五瓦

昇華硫磺

純精酒石各二十瓦

杓綠油糖十瓦

右研和為散每日早晚服一

茶匙以上俱因腹部臟器而起之反射眩暈用

鹽酸規尼涅一瓦十分之六至十分之八 右分三

包一日分三次服連服八日至十四日後即行停

止。

頭痛

[中醫學說]婦人患頭風者十居其半每發必掉瞬如在車船之上益因肝經血虛而風邪襲之爾。用川芎當歸散若頭痛連齒時發時止連年不止此風中垣言足太陽頭痛脈浮緊惡風寒川芎羌活獨活麻黃為主手少陽經頭痛脈弦細往來寒熱柴胡為主足陽明頭痛身熱目疼鼻乾惡寒發熱脈浮緩而長升麻湯或石膏白芷為主手太陽頭痛有痰體重或

腹痛為痰癖脈沉緩蒼朮半夏南星為主足少陰經頭痛足寒氣逆為寒厥脈沈細麻黃附子細辛湯為主足厥陰頭頃痛或吐涎沫厥陰脈浮緩吳茱萸湯主之諸血虛頭痛當歸川芎為主諸氣虛頭痛人參黃芪為玉氣血俱虛頭痛調中益氣少加川芎蔓荆細辛瘦厥頭痛半夏白术天麻湯厥逆頭痛羌活附子湯如濕氣在頭者以苦吐之不可執方而治若脈雜亂而病見不一宜補胃為主頭為諸陽之會清陽不升則邪氣乘之致令頭痛然有內傷外感之異外感風寒者宣散之熱邪傳入胃腑熱氣上攻者宜清之直中症寒氣上逼者宜溫之此外復有偏頭風頭風客寒犯腦胃火上衝痰厥頭痛大頭天行破腦傷風眉棱骨痛眼眶痛等症更有真頭痛朝不保暮勢更危急皆宜細辨偏頭風者半邊頭痛有風熱有血虛風熱者筋脈抽搐或鼻塞常流濁涕清空膏主之血虛者晝輕夜重痛連眼角逍遙散主之雷頭風者頭痛而起核塊或頭中雷鳴多屬痰火清震湯主之客寒犯腦者腦痛連齒手足厥冷口鼻氣冷羌活附子湯主之胃火上衝者脈洪大口渴飲冷頭筋杠起者加味升麻湯主之痰厥頭痛者胸膈多痰痛則

眩暈半夏白术湯主之。腎厥頭痛者。頭重足浮。腰膝痠軟。經所謂下虛上實是也。腎氣衰則下虛。浮火上泛。故上實也。然腎經有真水虛者。脈必數而無力。有真火虛者。脈必大而無力。水虛六味丸。火虛八味丸。大頭天行者。頭腫甚如斗。時疫之症也。輕者名發頤。腫在耳前後皆大鬱也。普濟消毒飲主之。更加針砭以佐之。破腦傷風者。風從破處而入。其症多發搐搦。防風散主之。眉棱骨痛。或眼眶痛。俱屬肝經。見光則痛者。屬血虛。逍遙散痛不可開者。屬風熱。清空膏。真頭痛者。多屬陽衰。頭統諸陽。而腦為髓海。不任受邪。若陽氣大虛。腦受邪侵。則發為真頭痛。手足青至節。勢難為矣。速用補中益氣湯。加蔓荆子。川芎附子。並進八味丸。間有得生者。不可忽也。

〔西醫學說〕

頭痛之原因雖多。大約可分為二種。一

曰證候性頭痛。一曰習慣性頭痛。症候性頭痛者。如患流行性感冒。麻疹。天花等熱症而來之頭痛。是也。亦有來自胃腸病者。則每與恶心。膨脹。便秘等同時而起。梅毒及腦膜炎。神經衰弱。藏躁症。心氣病等。神經症。與夫飲酒中毒。亦往往誘起此病焉。習慣性頭痛者。大半由神思過勞。或腦充血。或腦貧血。或濫用

煙酒。或神經衰弱。其痛有如戴籠。或則如裂。或則如刺。有間歇者。有連續者。其時病人精神沈鬱。食慾缺乏。最難醫治。更有所謂勉學性頭痛者。雖為神經衰弱等症誘發而來。而實由於若學悲痛于淫等事。故病人自覺前後頭非常沉重。理解之力非常減退。即目前所讀之書。所作之事。亦恍惚不能記憶。神經銳敏。

消化不良。常常便祕。不能安眠。面色時而絳紅時而青白。至無定也。治法宜居暗室。勿用目力。務守安靜。飲濃咖啡。可期清減。或以冷水澆頭。或以冷手稍打頭部。亦得消散。內服藥中。有安知必林。歇那設珍。別拉米。冬撒。曹諸劑。可選用之。更迭服之亦佳。但終不如米庫來寧之尤效。米庫來寧者。即以安知必林。咖啡。涅枸橼酸三種藥物。等分配合而成也。此外更有用安知必林及撒里矢爾酸。曹達咖啡。涅安。息香酸。曹達咖啡。涅諸劑者。若欲防頭痛之再發。必須探究原因。除其病根。倘行對症之法。則以臭素劑為最良。偏頭痛者。恒發於頭部之一邊。而尤以左側為多。大都因神經過勞所致。此以妙齡纖弱之婦女為甚。若田夫農婦。則罕有此病。其發作也。突如其來。亦有因興奮過度。消化不良而起者。每發於體不安寧。

頭重惡心。閃光惡寒之後。其病處則多在額間與太陽穴痛之劇者。必且誘起嘔吐發痛之半面。皮膚現青白色。其他半面作絳紅色攝生之法。大致如前。患側可以冷水或冰袋冷之。或以醋火酒等洗拭。亦頓覺爽適。食物以滋養多者為宜。勿食脂肪過多之物。飲酒吸煙最是大忌。務須戒絕。靜養精神。亦屬必要。平時務早眠早起。不可深夜作事。不可日高酣睡。山水清秀之區。善療頭痛。能常常戾止。遨遊則益妙矣。

【中國醫方】旋覆花湯 專治一切眩暉。將此方修

合服之。視他藥為驗。

川芎當歸去蘆 羌活去蘆 旋覆花細辛去苗
蔓荆子防風去蘆 石膏藁本去蘆 荆芥穗
半夏麵炙各半兩 乾地黃甘草炙各半兩 右㕮咀。每服五錢。水一盞半。生薑五片。煎至七分。去滓溫服。日進二服。

七生丸 治男子婦人八般頭風及一切頭痛疾厥氣厥。飲厥傷寒傷風頭痛不可忍者。並皆治之。

川烏頭草烏頭 天南星三味並生去皮 半夏冷水洗去皮 乾薑各等分 川芎右為細末研 白芷石膏 加北細辛等分。全蠍減半。為丸服二十粒。即愈。

韭菜自然汁。凡如桐子大。每服七丸。加至十九。嚼生葱茶送下。食後日進二服。頭痛如破。諸藥無效。加北細辛等分。全蠍減半。為丸服二十粒。即愈。

白附子散

白附子一兩 烏頭泡去皮臍

天南星一兩 麻黃去根節各半兩

乾薑一兩 辰砂研各半兩

全蠍炒五錢

麝香另研

右為細末。每服一錢。溫酒調下。不拘時。

治頭風痛不忍

硝石 人中白 腦子分等。右研令極細。每用一字。搐入鼻中。

川芎茶調散

治諸風上攻頭目。昏重偏正頭痛。

薄荷八兩 川芎各四兩 荆芥各四兩 羌活一兩 白芷一兩 防風二兩 甘草炙各二兩 細辛一兩 右為細末。每服二錢。

食後茶清調下。

如聖餅子

治男婦氣厥上盛。下虛痰飲風寒伏留

陽經偏正頭疼痛連腦顛吐逆。惡心目眩耳聾常服清頭目消風化痰暖胃。

防風去皮

生半夏各半兩

天麻各半兩

川烏二兩

甘草炙各二兩

右為細

川芎一兩

天南星洗去皮

川烏二兩

甘草炙各二兩

右為細

未湯浸蒸餅。和九艾實大捻作餅子。晒乾每服五
餅。同荆芥穗三五莖細嚼。茶酒湯任下。無時。若頭
痛筋攣。骨重少氣。噦噫腹滿時。驚不嗜卧。歟嗽煩
冤。其脈舉之則弦。按之石堅。由腎氣不足而內着。
其氣逆而上行。謂之腎厥頭痛。宜玉真丸與硫磺
丸。

玉真丸

硫磺研三兩 硝石研二分 石膏研半夏末各一兩 湯洗為
右研令停匀。生薑自然汁打糊。丸如梧子大

生薑湯下三十丸一方。無半夏有天南星。
硫磺丸 治頭痛不忍或頭風年深暴患無所不
治服此除根。

硝石研二兩 硫磺研二兩 右研令極細。滴水丸如指頭

大空心。臘茶清嚼下一丸。百一方云。中暑者。以冰
水服之下。咽即洒然治。傷冷以艾湯下。

偏頭疼方

用生菜菔汁一蚬殼。仰卧注鼻中。左痛注左右。痛
注右。或兩鼻皆注亦可。數十年患皆一注而愈。

調中益氣湯 治氣血俱虛而頭痛

芍藥分 升麻分 黃芪錢 甘草分 五味子

七
當歸 白朮 人參各三 柴胡 橘皮各
半夏一錢 白朮 神曲炒各一錢 天麻 黃芩
人參 蒼朮 陳皮 澤瀉 淫苓各五
藥半錢 乾薑三分 黃柏酒製二分 右每服半兩。水
煎服。

羌活附子湯

羌活 黑附子炮

白芷 白僵蠶

黃柏各三

升麻各五

選奇湯

治風熱上壅肩稜骨痛或頭目眩暈

羌活 防風各三錢

甘草二錢半

黃芩酒製二錢

右每服三錢。水煎時時服。

都梁丸

治諸風項背不利頭目眩暈腦門作痛或

產前產後傷風頭目暈重血風頭痛

白芷末不拘多少蜜丸彈子大。每服一丸。細嚼。荆
芥煎湯下。

清空膏 治風熱偏頭痛筋脈抽搐鼻流濁涕

羌活 防風各六錢

柴胡分

黃芩一錢二分

半生半炒

未湯浸蒸餅。和九艾實大。捻作餅子。晒乾。每服五
餅。同荆芥穗三五莖。細嚼。茶酒湯任下。無時。若頭
痛筋攣。骨重少氣。喊噫腹滿。時驚不嗜卧。欬嗽煩
冤其脈舉之則弦。按之石堅。由腎氣不足而內着。
其氣逆而上行。謂之腎厥頭痛。宜玉真丸與硫磺
丸。

玉真丸

硫磺研三兩 硝石研二分 石膏煅半夏
湯洗為末各一

右研令停勻。生薑自然汁打糊。丸如梧子大。
生薑湯下三十丸一方。無半夏。有天南星。

硫磺丸 治頭痛不忍。或頭風年深暴患。無所不
治。服此除根。

硝石一兩 硫磺二兩 右研令極細。滴水丸如指頭

大空心。臘茶清嚼下一丸。百一方云。中暑者。以水
水服之下。咽即洒然治。傷冷。以艾湯下。

偏頭疼方

用生茱萸汁一塊。殼仰卧。注鼻中。左痛注左。右痛
注右。或兩鼻皆注亦可。數十年患。皆一注而愈。

調中益氣湯 治氣血俱虛而頭痛

芍藥分 升麻分 黃芪錢 甘草分 五味子

當歸 白朮 人參各三 柴胡 橘皮各二

右水煎服

半夏白朮天麻湯

半夏一錢半 人參半錢 蒼朮一錢 白朮炒各一錢 神曲一錢 天麻炒各一錢 黃芪各五分 大麥

煎服

羌活附子湯

羌活 黑附子炮

白芷 白僵蠶

黃柏各三分

羌活 蒼朮各五分

防風 甘草

升麻各五分

黃芪分量

右水煎服

選奇湯

治風熱上壅眉棱骨痛或頭目眩暉

羌活 防風各三錢

甘草二錢半生半炒

黃芩酒製二錢

右每服三錢水煎時時服

都梁丸 治諸風項背不利。頭目眩暉。腦門作痛。或

產前產後傷風。頭目暉重。血風頭痛。

白芷末不拘多少。蜜丸彈子大。每服一丸。細嚼。荆


芥煎湯下。

清空膏 治風熱偏頭痛。筋脈抽搐。鼻流濁涕

羌活 防風各六錢

柴胡五分

黃芩一錢二分半生半炒



川芎四分

甘草一錢

薄荷三分

黃連六分

右

水煎服

加味清震湯 治雷頭風

升麻一錢

蒼朮一錢

青荷葉一張全用

甘草炙

陳

皮各八分

荆芥一錢

蔓荊子各一分

薄荷五分

右

水煎服

羌活附子湯 治客寒犯腦痛連齒

羌活一錢

附子乾薑各五分

甘草各八分

右

煎服

加味升麻湯 治因胃火上衝頭痛

升麻葛根

赤芍葛根

甘草各一錢

右

石膏二錢

薄

荷分三 右入燈心二十節水煎服

半夏白术天麻湯 治痰厥頭痛

半夏一錢

白术天麻

陳皮茯苓各一錢

右

甘草炙五分

生薑兩片

大棗三個

蔓荊子一錢

水煎服虛者加人參

頭痛秘方 治好飲之人酒毒發作頭痛目眩

松花培一兩

陳皮五錢

黃連三分

甘草二錢

右俱

微炒磨為末與松花和勻。每早晚各服二錢白湯

調服二日即愈。

蘆薈散

治頭風頭痛

蘆薈

防風

丹砂

龍腦各五錢

天麻

附子炮

白芷

白芷

各一兩

右為細末每服半錢

食後葱白薄荷茶清調下。

乳香殘落湯 治男子婦人偏正頭風不可忍

粟殼四兩

柴胡

桔梗

甘草

陳皮

各一兩

燈草十莖水煎

透頂散

治偏頭風痛不可忍

細辛一兩

雄黃半兩

右為細末每用一字此方一

名至靈散

頭痛神方

土茯苓四兩

金銀花

三錢

玄參

八分

蔓荊子

防風

天麻

各一錢

辛夷花

川芎

各五分

燈心

十二

根

黑豆

九粒

右芽茶

五錢

河水

井水各一鐘

半煎

一鐘服

治偏頭風

和中散

治頭痛腹痛

白术 香附子 陳皮各一 縮砂 鐘金 茵

香各五 右為細末

加減三五七散 治陽虛頭痛風寒入腦目旋運轉

山茱萸 茯苓 乾薑各三 防風四兩 細辛一兩

半 附子三枚

右水煎服

大三五七散 治頭風眩耳聾方

天雄

細辛各三兩

山茱萸

乾薑各五兩

薯蕷

防風兩

右六味治下篩清酒服

點頭散

治偏正頭痛

川芎二兩

香附子四兩

右為細末每服一錢好茶

清調下

鈎藤散

治肝厥頭痛

鈎藤

陳皮半夏各五錢

甘草分石膏一兩

人參一錢

蒲

花

防風各五錢

甘草分石膏一兩

右生薑七錢

片水煎服

芎辛湯

治熱逆頭痛

川芎半錢

細辛五錢

白芷一錢

甘草六錢

生

薑片

茶一撮

右水煎服

羌活湯

治頭目昏痛體覺不安

蒺藜

羌活

菊花一錢

川芎前胡黃芩細

辛 枳殼 蔓荆 麻黃 防風 石膏未
草 右為末入石膏令勻每二錢水一大盞薑四
片薄荷三兩煎七分稍熱服

芎辛導痰湯 治痰厥頭痛

川芎細辛南星陳皮

茯苓半錢

枳實甘草各一

半夏

菊芍散治風熱上攻頭痛不止

甘菊花旋覆花石膏防風

甘草

蔓荆

子羌活枳殼各二

右用薑五片水煎服

祛風清上散治風熱上攻胸棟骨痛

黃芩半錢白芷一錢羌活

荆芥分甘草三分

右水煎食後

玉壺丸治風濕頭痛亦治痰患

天南星半夏天麻白木各一

雄黃一錢

右為末薑汁蒸餅丸

消風散治諸風上攻頭目昏痛目眩旋暉

茯苓川芎羌活人參荆芥防風

厚朴陳皮各五錢

右為細末茶酒調下

中藥大學圖書館版權

十味芎蘇散 治頭痛發熱惡寒咳嗽吐痰

川芎分七

半夏分六

柴胡

茯苓分三

葛根

甘草分二

紫蘇各二

陳皮

枳殼

桔梗各一

右水煎服

神芎圓

治一切頭痛昏眩

大黃

黃芩各二兩

白滑石各四兩

黃連

川芎 薄荷各半兩

右為末水圓如小豆

大溫水下十圓

至十五圓日三服

治頭痛方

茄子

川芎各六錢

白芷

天南星 烏頭各一錢

當歸三錢

右水煎服

又方

黃連

黃芩 黃柏 鐵砂各一兩

三錢

石菖 乳

香辰砂

右為末白湯送下

川芎散

治偏頭痛

川芎

柴胡各一兩

半夏

甘草 菊花 細辛

人參

前胡

防風

錢各五分

右生薑三片薄荷

少許水煎服

又方

治頭風偏正頭痛昏眩

川芎

細辛 羌活 槐花 甘草炙

香附子

又方 治偏頭痛頭風神效

甘菊花 石膏 川芎各三錢

右為末每服一錢

清茶送下

石亭丸 治頭痛諸藥不效者

硫磺三兩

硝石一兩

百草霜五錢

右三味為末

糊丸桐子大每服五丸至一錢五分冷茶送下

太陽散 治風寒頭痛如破

荆芥 香附子 石膏生

白芷各等

右為散

白湯下

都梁丸 治壯實上逆頭痛

川芎

石膏各等

右糊丸

外國醫方

米庫來寧一瓦十分之八

乳糖半

硫規一瓦十分之六 茶兩瓦

薄荷腦一瓦百分
之四 右為丸二十四粒一日分三次服

臭素樟腦兩瓦

茶八瓦

右為丸百粒每服十粒

纈草酸規尼涅一瓦二

咖啡末一瓦十分之八

陳各一兩

右為末每服二錢食後茶清調下日三服

石膏各五錢

荆芥

薄荷

菊花

防風

茵

右為丸百粒每服十粒

枸橼酸鐵規尼涅一瓦十分之八 右為丸藥分二

十四粒早晚各服十粒。貧血頭痛者用之。

複方大黃丸 右為丸藥每服五粒至十五粒。通利

大便用。

臭素加里三瓦

臭素那篤留謨 臭素安母紐謨

各一瓦半 苦酒兩瓦 糖漿十瓦 水百瓦

右混和為一日量分三次服。

安知歇貌林一瓦十分之九 右分三包。一日分三

次服。

安知必林五瓦 右分五包。發作之初。每一時服一

包。

臭素水素酸咖啡涅一瓦 白糖兩瓦 右製十包。

早晚各服一包。

硫酸規尼涅半瓦 白糖兩瓦 右製五包。每一時

服一包。

麥角五瓦 菲沃斯越幾斯 印度大麻越幾斯各

一瓦 硫酸規尼涅三瓦半 右分六十包。至頭

痛輕減之時。每三時服一包。以後則每日一包。

臭素曹達一瓦半 歇那設珍半瓦 右製十包。一

日三次每服一包

咖啡末二十瓦 龍腦一瓦十分之四 臭剝兩瓦

右分二十包。一日三次。每服一包

薄荷油一瓦十分之四 橄欖油十滴 羊毛脂兩

瓦 右混和塗太陽穴及額間。

棒狀薄荷桿 右摩擦患部用。

薄荷油兩滴

火酒兩瓦 右溶和。搽患部。

薄荷油兩滴

魚膠四瓦 右加適宜熱水。將膠溶

化冷後滴注薄荷油。

攤絲布或冷紗上。如欲得淡

紅或微綠之色彩。可入洋紅或綠素少許。

臭剝兩瓦 酸化亞鉛兩瓦

纈草膏兩瓦 亞爾答根未適宜

右為丸五十粒。一日二三次。每服

一粒。

撒里矢爾酸一瓦 重曹十瓦 芳香酸五瓦

右 分散十包。一日二三次。每服一包。

枸橼酸咖啡涅一瓦 歇那設珍兩瓦 白糖一瓦

右研和為散。分作十包。以濾粉紙包而服之。每

二三時服一包。

咖啡涅一瓦十分之一 乳糖一瓦十分之三 右

為一包。共製三包。一日三次。每服一包。

心痛

【中醫學說】婦人血氣心痛者。由臟腑虛。氣血不調。風冷邪氣乘於心也。其痛發有死者。有不死而成證者。蓋心為諸臟之主。若心受傷而痛者。名真心痛。朝發夕死。夕發旦死。若心絡為風冷所乘而痛者。故痛發乍輕乍甚而成證者也。薛立齋云。心痛若為寒邪所傷。溫散之飲食停滯。消導之肝火妄動。辛平之下。歧骨陷處屬心之部位。其發痛者則曰心痛。然心不受邪。受邪則為真心痛。旦暮不保矣。凡有痛者。胞絡受病也。胞絡者。心主之宮城也。寇凌宮禁。勢已可危。而況犯主乎。故治之宜亟也。心痛有九種。一曰氣。二曰血。三曰熱。四曰寒。五曰飲。六曰食。七曰虛。八曰蟲。九曰疰。宜分而治之。氣痛者。氣壅攻刺而痛游走不定也。沉香降氣散主之。氣血痛者。痛有定處而不移。轉側若刀錐之刺。手拈散主之。熱痛者。舌燥唇焦。溺赤便閉。喜冷畏熱。其痛或作或止。脈洪大有力。桂主之。飲痛者。水飲停積也。乾嘔吐涎。或咳或噎。甚喜熱畏寒。其痛綿綿不休。脈沈細無力。薑附湯加肉桂。

則搖之作水聲。脈弦滑。小半夏加茯苓湯主之。食痛者。傷於飲食。心胸脹悶。手不可接。或吞酸噯腐。脈緊滑。保和湯主之。虛痛者。心悸怔忡。以手按之則痛。此歸脾湯主之。蟲痛者。面白唇紅。或唇之上下有白斑點。或口吐白沫。飢時更甚。化蟲丸主之。疰痛者。觸冒邪祟。卒而心痛。黑目青黯。或昏憤譫語。脈來乍大乍小。或兩手如出兩人。神木散。葱白酒。生薑湯並主之。此治心痛之大法也。或問久痛無寒。暴痛無火。然乎否乎。答曰。此說亦宜斟酌。如人素有積熱。或受暑濕之熱。或熱食所傷而發。則暴痛亦屬火矣。宜宜熱藥療之。如人本體虛寒。經年累月。頻發無休。是久痛亦屬寒矣。豈宜寒藥療之。且凡病始受熱中。未傳寒中者。比比皆是。必須臨症審確。逐一明辨。斯無誤也。又或謂諸痛為實。痛無補法。亦非也。如人果屬實痛。則不可補。若屬虛痛。必須補之。虛而寒則宜溫補。並行。若寒而不虛。則專以溫補主之。丹溪云。溫即是補。若虛而兼火。則補劑中須加涼藥。此治痛之良法。治者宜詳審焉。

【西醫學說】心痛者。心臟發痙攣也。西名絞心症。一名心胸絞攣痛。亦稱狹心症。有症狀與真性二種。症

狀之心痛。每與血行器症合併而至。如冠狀動脈變硬。慢性心筋炎。脂肪心臟。大動脈瓣閉鎖不全及狹窄。大動脈瘤。心囊與心臟粘合等症。是真性心痛多發於貧血。神經過敏。及肥胖之人。而其誘因尚有多種。一為中毒。如濫用煙茶酒等。是二為中樞性神經病。如臟燥病。神經衰弱諸症。是三為精神興奮。如戀愛過度。是四為反射刺戰。如胃腸肝子宮卵巢諸症之反射。是五為冒寒。此病主要之證候。在於心臟部發劇烈之疼痛。發則不惟限於心臟部。且往往放散於肩胛頭項及左上脅。其時病人苦悶不堪。面容失色。額流冷汗。手足厥冷。脉搏停止。一種恐怖之狀。幾與瀕死無異。痛之甚者。如被穿刺。如受炮烙。又若有人以大力抉摘者。然故此際輒以己手力抵心窩。或力引某物鎮心。促其緩解。每次發痛。少僅一二秒種。多則可數時。其次數之多少亦無定。有一日反覆至數次者。其時間則多在夜中。朦朧欲眠之際。亦有於身心過勞飲食過度之後而來者。其豫後雖不良。然於生命無直接之危險。治療之法。第一須力守安靜。居稍暗之室內。常吸受新鮮之空氣。心窩貼置冰袋。或以醋水芥子精芥子油等浸濕布片。以之揩拭心

口及肩胛上脅等處。或含嚥小冰塊內服。鎮痙劑。間歇之時。則用冷水洗滌。留意勞動飲食。大使諸事。嚴禁吸煙飲酒。其向有神經性心悸亢進症者。宜常服沸騰散或糖水。豫防之藥。沃度曹達為最。

中國醫方 烏藥散 治婦人血氣攻心痛發歇不定

烏藥 菟茂醋浸炒 桂心 當歸炒 桃仁 青皮 木香各等分 右為末。每服二錢。熱酒調下。

阿魏丸 治婦人血氣攻心疼痛及一切積冷氣。當歸 桂心 青皮 附子炮 阿魏麪裹煨度

白朮 川芎各一兩 吳茱萸炮 木香 乾薑

分三 純榔 肉豆蔻煨 延胡索 菟茂各一兩

硃砂細研半兩 右為細末。先以醋一升。煎阿魏成膏。和藥末搗三百杵。丸如桐子大。每服二十丸。食前熱酒下。

雞舌香散 治男子婦人九種心痛。一切冷氣。良薑桂細麻油炒 桂心 赤芍藥各等分 右為細末。每服二錢。水一盞。入鹽木瓜三片。同煎七分溫服。鹽湯點亦可。血氣疝瘕痛。用熟醋湯調下。忌生冷。應痛散 治心脾痛不可忍者。婦人脾血氣作。心脾

痛尤效。前方同。只無桂心。用散醋煎。醋湯點亦可。
陳氏二神丸 治婦人血氣不和作痛不止及下血

無時水月不調

真蒲黃炮

華撥鹽炒

右等分爲細末。煉蜜丸如

桐子大。每服三十九空心溫酒下。如不能飲。米飲

吞下。兩服即止

抽刀散 治婦人血風血氣等疾

五靈脂炒

一兩

義茂

桂心

芸薹子炒各半兩

半兩

右爲細末。每服二大錢。酒半盞。水半盞。煎至八分。

疾作熱服。不拘時。

靈苑方 治婦人卒血氣心痛。只用生五靈脂爲細

末。每服一錢。酒一盞。煎沸熱服。

局方四七湯加良薑。又沉香降氣湯。分心氣飲皆治

心痛良。

沈香降氣散

治氣滯心痛

沈香三錢

細挫

砂仁七錢

甘草炙五錢

香附五兩

鹽水炒

元胡索一兩

酒炒

川棟子根去肉淨一兩

右共爲末。每

服三錢。淡薑湯下。

手拈散 治血積心痛

元胡索醋炒

香附酒炒

五靈脂去土醋炒

沒藥箬上炙乾

清中湯 治熱厥心痛

紅花五分

桃仁十粒。煎酒調下。

保和湯 治傷食心痛

香附

陳皮

黑山梔

金鈴子炒子大

元胡索

各八分

甘草

吳五

水煎服

川黃連

薑汁炒子大

麥芽

山楂

蘿蔔子

厚朴

香附

草

連翹

各五分

陳皮

一錢

歸脾湯 治氣血虛弱以致心痛

黃芪一錢

五分

人參

白朮

檳榔

遠志

分

木香

甘草

炙各五分

化蟲丸 治蟲噉心痛

蕪荑去梗

白雷丸

各五錢

檳榔

五分

木香

白朮

陳皮

各三分

雄黃

一錢

百部二兩。熬膏糊丸如桐子大。每服一錢五分。米

飲下。如取下蟲積。加大黃五錢。酒炒。

右以

米

清中湯 治火痛

草豆蔻

甘草

分七

黃連

山梔各二

陳皮

半夏 茯苓各一錢 右薑三片水煎服。

烏頭一分

附子半兩

乾薑

赤石脂

蜀椒

高良薑湯 治心腹絞痛如刺兩脇支滿煩悶不可忍

高良薑兩

厚朴二兩

當歸 桂心各三

右水

加味四七湯 煎服。

治七氣為病發則心腹刺痛不可忍

乳香三錢

半夏 桂心 玄胡索各一錢

人參

甘草各半兩

右薑七片

棗一枚水煎服。

括薑薤白半夏湯 胸痺不得卧心痛徹背者此湯

主之

括薑實一枚

薤白三兩

半夏半斤

白酒半斗

右同

鶴虱丸 治久心痛經年不止

鶴虱炒一兩

木香

檳榔

橘皮

蕪荑炒

附子

亞硝酸亞密兒五瓦 茴香油十瓦 右於發作之初吸入三滴至十滴。

纈草酒五瓦

葛斯駕僵摸酒一瓦 右一日三四

次每服一食匙。

燐酸古塹乙涅半瓦

蒸溜水十瓦 石炭酸一瓦

百分之一 右於皮下注射一筒至二筒。

沃度加里四瓦

橙皮糖漿十五瓦 水百五十瓦

右一日三次每服一食匙。

鬱金

附子

乾薑各等

右為末

醋糊丸如桐子大

水煎服。

赤石脂丸

心痛徹背背痛徹

心主之

主之

丸食前橘皮湯下。

右為末蜜丸如豆大

每服三十

次每服一食匙。

硝酸甘油一瓦百分之一

蒲公英膏及末適宜

右製丸二十粒

每日服一粒漸加至每日三粒。

忍

煎服。

厚朴二兩

當歸 桂心各三

右水

主之

外國醫方

鈴蘭葉末兩瓦

硝酸加里一瓦

酒食酸加里一瓦

護謨末

甘草末各適宜

右重

研和為丸劑

一日分三次服。

亞硝酸那駕僵摸半瓦

糖漿八瓦

水百瓦

右

猶類端半瓦

右為一包一日三次至六次每服一

包

混和一日三四次每服一食匙。

初吸

至十滴。

中

右

中

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

<

硝酸甘油錠
瓦斯分之

右每日服一錠漸加至

每日三錠

紅花 乾漆
未每服二錢食前溫酒調下。

木香 芍藥各等
右爲細

臭素曹達六瓦

苦酒兩瓦

蒸溜水二百瓦

右

一日三次分二日服

心腹痛

延胡索散 治婦人血氣攻心腹疼痛
延胡索 當歸 川芎 桂心各七
殼 赤芍藥 桃仁各半 熟地黃半
每服三錢水一盞薑三片煎至七分去滓熱服

琥珀散 治婦人血氣攻心腹煩躁悶亂疼痛不止
琥珀另研 没藥另研 當歸炒 赤芍藥
每服一錢溫酒調下

瑞金散 治婦人血氣撮痛月經不行預先嘔吐疼
延胡索 蒲黃 羿茂 桂心各等
右爲末

〔中醫學說〕婦人血氣心腹疼痛由臟腑虛弱風邪乘於其間與真氣相擊而痛其痛隨氣上下或上衝於心或下攻於腹故云血氣攻心腹痛也薛立齋曰前證若滯氣血瘀用沒藥散勞傷元氣用補中益湯。肝脾鬱結用四七湯。怒動肝火用小柴胡湯。肝脾血氣用四物湯。肺脾氣虛用四君子湯。中氣虛弱用補中益氣湯。氣血俱虛用八珍湯。

〔中國醫方〕三神丸 治室女血氣腹中刺痛引

心端經行澀少或月水不調以致疼痛

橘皮二兩 當歸酒浸 元胡索醋煮各一兩

細末煉蜜和丸如桐子大每服五十九空心溫酒送下

元胡索 牡丹皮 紅花各一 片薑黃二錢
赤芍藥 羿茂 川芎 當歸各一 官桂半
右作一服水一鍾酒一鍾同前至一鍾食前服
牡丹散 治婦人久虛羸瘦血塊走注心腹疼痛不思飲食

沒藥散 治一切血氣臍腹撮痛及產後惡露不下

兒枕塊痛

沒藥 血竭 桂心 元胡索 當歸 蒲黃

牡丹皮 元胡索 官桂各一 京三稜 當歸
錢半 各一 義茂 赤芍藥 牛膝各二 右煎服法

八仙散 治血氣心腹疔瘍立驗

當歸

厚朴

芍藥

枳殼製

人參各四分

甘

甘草分各六分

牛膝

赤茯苓分八分

大黃

白芍藥

大醋

草

茯苓各五分

肉豆蔻分二

右為細末水二升

煮取八合空心分三服不拘時

又八仙散

治證同前

棕櫚兩

當歸一兩並

處燒成炭細研一錢溫酒調下

麝香一錢另研

右

元胡索湯

治婦人室女七情所感血與氣併心腹疼痛或連腰脇甚作搐搦一切血氣經候不調

元胡索

蒲黃赤芍藥

片薑黃

當歸去蘆半錢

右

乳香

木香火不見

官桂人火不見

沒藥各一錢

右

甘草半錢

右作一服水二鍾生薑三片煎至一

鍾食前服

大效琥珀散

右

右並生為細末溫

急悶月信不調等疾

烏藥

荅茂各二兩

右

酒調二錢服後以食壓之忌生冷油膩等物。如

產後諸疾炒生薑酒調下。

治血氣不調臍下痛

桑耳

卷鬚子

桂心

土瓜根

川芎各四分

右

蠲痛散

治婦人血氣刺痛

荔枝核半兩

燒存性

香附子去毛炒一兩

右為細末鹽

湯吞下二十丸

右

沒藥散

治婦人血氣疼痛不可忍者

紅花

沒藥研

延胡索炒

當歸各等

右為

細末

每服二錢童便半盞酒半盞

同前至六分熱

服用燒赤秤錘淬過

調服亦可常服只用溫酒

菖蒲丸

治婦人脾血積氣及心脾疼

菖蒲九節者

吳茱萸地

香附子炒去毛

各四兩

右

菖蒲六兩

並挫細

以釀醋五升煮乾為度

焙乾研細末

以好神麪打糊為丸如桐子大空心食前以淡薑湯吞下四五十丸日三服橘皮湯亦好不拘時

木香枳木丸

破滯氣消飲食開胃進食消痰化涎

木香枳實炒各一兩

右每服五錢薑棗

水每二錢溫酒調服

手拈散

治血氣心腹疼痛

草果

元胡索

五靈脂

沒藥各等

右為細末

未每二錢

溫酒調服

右

水煎服。

木香化滯湯 治脾胃虛弱飲食停滯腹脹作痛或

心下痞滿不思飲食若憂怒飲食而致者尤宜用之

木香

紅花錢四

草豆蔻錢各三

橘皮

當歸尾

枳實炒各二錢

每服三五錢

薑水煎服

小腹痛

中醫學說

婦人小腹疼痛者此由胞絡之間夙有

冷風搏於血氣停結小腹因風虛發動與血相擊故

痛也薛立齋云此證若寒氣血結用威靈仙散氣滯

血凝用當歸散肝經血虛用四物湯加參木柴胡肝

經濕熱用龍膽瀉肝湯肝脾氣虛用六君子湯加柴

胡芍藥肝脾虛寒用六君子加柴胡肉桂若兼嘔吐

加木香四肢逆冷再加炮薑書云大腹屬太陰當

臍屬少陰少腹屬厥陰傷寒傳至厥陰少腹痛甚此

熱邪也宜下之若熱結在裏蓄血下焦亦宜下之若

直中厥陰少腹冷痛則為寒邪宜溫之尋常少腹痛

多屬疝瘕奔豚之類書云男子外結疝瘕女子帶下

瘕聚古人更有痃癖癥瘕之名皆一類也痃如弓弦筋扛起也癖者隱辟沈附著骨也癥則有塊可徵猶

積也多屬於血瘕者假也忽聚而忽散氣為之也奔豚者如江豚之上竄冷氣上衝也其癥瘕之氣聚於小腸則曰小腸氣聚於膀胱則曰膀胱氣也小腸氣失氣則快膀胱氣少腹熱若沃以湯濇於小便也凡治少腹痛當用墮降之藥其行氣皆當用核乃能宣達病所以取效也橘核丸奔豚丸並主之。

小腹

失氣

治少腹痛當用墮降之藥其行氣皆當用核乃能宣

達病所以取效也橘核丸奔豚丸並主之。

右

失氣

於火上燒令黃為末。羅過灰一錢同血攬停滯腹脇。服立愈。

吳茱萸湯 治婦人素虛又為風冷乘風停滯腹脅

刺痛

吳茱萸湯

當歸去蘆各二錢

桔梗去蘆 細辛去苗半錢

防風去蘆 乾薑炮各一錢

熟地黃二錢半

甘草錢半

右作一服水二鍾煎至一鍾空心服。治婦人血氣不調。臟腑積冷。臍腹疼痛。肌體日瘦。

體日瘦

椒紅

沉香當歸去附子炮去皮膚各半

荊梨勒核去蓬木

白朮各一兩

肉豆蔻良薑

丁香

麝香另研二兩

右為細末。煉蜜和丸。如桐子大。每服三十丸。空心溫酒送下。

橘核丸 通治癥瘕癖小腸膀胱等氣

橘核丸鹽酒炒各一兩

川棟子肉去核研各五錢

荔枝核去核研各一兩

小茴香微炒各一兩

香附

橘核丸鹽酒炒各一兩

右煮糊為丸。如桐子大。每服三錢。淡鹽水

下。若寒甚加附子五錢。肉桂三錢。當歸一兩。有熱。

加黑山梔七錢。又疝氣症表寒束其內熱。丹溪以黑山梔吳茱萸並用。按此二味若寒熱不調者。加

入丸中更佳。若胞痹小便不利。去小茴香。加茯苓車前子丹參黑山梔。 脳痛

中醫學說

婦人兩脇脹痛者。由臟腑虛弱。氣血不調。風冷之氣客於腸胃。傷於胞絡之間。與氣血相搏。壅塞不宣。邪正交爭衝擊。故令兩脇脹痛也。薛立齋曰。東垣先生云。胸脇作痛。口苦舌乾。寒熱往來。發嘔。發吐。四肢滿悶。淋溲便難。腹中急痛。此肝木之妄行也。竊謂前證若暴怒傷血。用小柴胡芎歸山梔。氣虛血俱虛。用六味地黃丸。若經行腹痛。寒熱晡熱或月經不調。發熱疾。欬少食嗜卧。體痛用八珍柴胡丹皮。若脇脹發熱。口渴吐痰。或小便淋瀝。頭項結核。或盜汗。便血諸血失音。用六味丸。若兩脇作脹。視物不明。或筋脈拘急。面色青。小腹痛。或小便不調。用補肝散。若概用香燥之劑。反傷清和之氣。則血無所生。諸證作焉。丹溪先生云。右脇痛。用推氣散。小龍蒼丸。當歸龍蒼丸。控涎丹。柳青丸。十乘湯。皆病氣氣俱實之劑。用者審之。傷寒脇痛。屬少陽經受邪。用小柴胡湯。雜症脇痛。左為肝氣不和。用柴胡疎肝

散七情鬱結。用逍遙散。若兼肝火痰飲。積瘀血隨症加藥。右為肝移邪於肺。用推氣散。凡治實症脇痛。

左用枳殼。右用鬱金。皆為的劑。然亦有虛寒作痛得溫則散。按之則止者。又宜溫補不可拘執也。

【中國醫方】靈寶散

右為細末。每服二錢。食前溫酒調下。

丁香 分各等

右為細末。每服二錢。食前溫酒調下。

木香 乳香

元胡索 當歸 白芍藥

右為細末。每服二錢。食前溫酒調下。

草豆蔻散

治婦人脾胃虛氣攻兩脇脹痛

草豆蔻 分各等

草豆蔻 訶子肉 甘草 川芎 當歸 乾薑 檳榔

桂心 苦梗 厚朴 各半

桂心 苦梗 厚朴 各半

右為粗末。每服四錢。水一盞。煎至七分。去滓。食前熱服。

卷簡子散 治婦人臍腑虛冷宿冷。攻氣兩脇脹痛。坐卧不安。

卷簡子 延胡索 桃仁 琥珀 當歸 桂心

赤芍藥 没藥 分各半

右為末。每

服二錢。溫酒調下。不拘時。

人參紫金丸 治婦人榮衛不和。心腹刺痛。胸膈脹滿。不進飲食。

紫金皮 蒼朮 石菖蒲 各一 香附子 人

參半 木香 錢 右為末。米糊丸如桐子大。食後
薑湯吞下三十九

氣針丸 治久積風壅疎利氣滯空胸膈止刺痛

牛生半塊 木香 青皮 清去 大黃 炮 檳榔 各一

右為細末。煉蜜丸如桐子大。溫水下

三十九

大腹皮飲 治婦人血癖單腹痛

大腹皮 防己 木通 桑白皮 厚朴 瓜萎

黃芪 陳皮 枳殼 炒 大黃 蒸各一錢 青皮

半 五味子 錢 右作一服。水二鐘。煎至一鐘。入

酒半盞。再煎一二沸。去滓。食前服。

柴胡疏肝散 治左脇痛

柴胡 陳皮 各一錢 川芎 赤芍 枳殼 炒

香附 醋炒各一錢 甘草 炒 炙五分

右水煎服。唇焦口渴。

乍痛乍止者。火也。加山梔黃芩。肝經一條杠起者。

食積也。加青皮麥芽山楂。痛有定處而不移。日輕

夜重者。瘀血也。加歸星紅花桃仁牡丹皮。乾姜。咳

引脇下痛者。停飲也。加半夏茯苓。喜熱畏寒。欲得

熱。手按者。寒氣也。加肉桂吳茱萸。

雄黃散 治右脇痛

枳殼

鬱金

桂心

甘草

桔梗

陳皮

各八

薑二

棗枚

右水煎服

瓜萎

皮搗爛一枚連

粉甘草

錢二

紅花分

右水煎

大瓜萎

皮搗爛一枚連

粉甘草

錢二

紅花分

右水煎

右水煎服

按鬱火日久肝氣燥急不得發越故皮膚起泡

轉為脹痛經云損其肝者緩其中瓜萎為物甘緩

而潤於鬱不逆又加油之洗物滑而不清此其所

以奏功也

木通散

治脇肋苦痛偏效併心下脇肋並小腹牽

引痛者皆主之

木通

去皮一錢

青皮

白一錢

蘿蔔子

炒一錢

炒米

木香一錢

滑石

兩半

川楝子

去皮核一錢

以上三味用巴豆半

兩炒黃去巴豆不用

右為細末

煎葱白酒調三

錢一服愈甚者不過再服

三腕散

治中焦虛痞兩腸氣痛面目手足浮腫大

便祕瀝兼治脚氣

大腹皮

紫蘇一錢

沈香

乾木瓜一錢

獨活

兩

白术

川芎

木香

甘草

陳皮

檳榔

各三分

右咬咀每服三錢水一盞煎至七分去滓空心

熱服日中再服

佐金丸

金九四

治肝火胸脇脹痛或發寒熱或頭

目作痛或大便不實或小便淋秘或小腹疼痛及

一切肝火之證

黃連

兩

吳茱萸

一兩

湯劑

右為末粥丸白

木陳皮

湯下

當歸

一兩

龍膽草

炒焦

施子仁

炒

黃連

炒

黃芩

炒

木香

二錢

大黃

炒

青黛

錢五

木香

二錢

當歸

一兩

麝香

另研

右為末

用神麩糊丸桐子大

每服

二十丸

薑湯下

當歸龍鬚丸

治肝經實火胸脇脹痛或大便秘結

小便澀滯凡屬肝經實火皆宜用之

當歸

一兩

龍膽草

炒焦

施子仁

炒

黃連

炒

蘆薈

青黛

錢五

木香

二錢

大黃

炒

青黛

錢五

木香

二錢

當歸

一兩

麝香

另研

右為末

用神麩糊丸桐子大

每服

二十丸

薑湯下

補肝散

治肝腎二經氣血虧損脇脹作痛或脇脹

頭暉寒熱發熱或遍身作痛經候不調

山茱萸肉

當歸

五味子

炒

山藥

黃連

炒

熟地黃

自製

白朮

炒各一錢

獨活

酸棗仁

炒各四兩

右為細末

每服五錢

棗水

煎服

【中醫學說】頭項之虛乃屬足太陽膀胱之經許太

學亦云是足少陰腎之經蓋腎與膀胱為表裏故也。

以感外邪論之。則在太陽經。先因感風。又感寒溼。致令外證發熱惡寒。與傷寒相似。頸項強急。腰身反張。如中風狀。瘓癰口噤。其身體几几。古人以強直為瘓。其脈沈遲弦細。新產血虛。多汗出。喜中風。亦有此證。

又有挫枕轉項不得者。與三五七散追風散。仍與急

風散搽項上。若因被風吹。頭目昏眩。太陽并腦俱痛。

項背筋脈拘急。可與蠍附散。都梁丸。許太學治項筋強痛不可轉側。以木瓜煎。薛立齋云。前證若因肝木自旺。用瀉青丸。精血不足。六味丸。風熱溼肝。加味逍遙散。怒動肝火。加味小柴胡湯。肝經血虛。加味四物湯。腎不能生肝。六味丸。膀胱氣滯。羌活勝溼湯。大抵肝火旺。則肝血虛而筋燥。頸項強急。或腰背反張。或四肢攣牽。或頸項等處結核。

〔中國醫方〕追風散 治年深日近偏正頭痛。又治

肝臟久虛。血氣衰弱。風毒之氣上攻。頭痛頭眩目

暈心怯煩熱。百節痠疼。腦昏目痛。鼻塞聲重。項背

拘急。皮膚癩癩。面上遊風狀。若蟲行及一切頭風

兼療婦人血風攻疰。頭目昏痛皆治之。

川烏炮去皮 防風去蘆 石膏煅各一兩

荆芥穗 白僵蠶炒去絲 天南星炮 半草

急風散 治天麻 地龍 白附子炮 全蠍去尾
芷各半 雨水飛 草烏頭炮去皮 没藥研 乳香研
雄黃研各二錢半 同調食後及臨卧服。常服清頭目。利咽喉消風化痰。

急風散

丹砂另研

麝香另研

黑豆一錢半

同草

白一處為末

研藥勻停酒調塗

痛處

右為細末

入

蠍附散 治一切風邪頭痛夾腦風痰涎壅盛。嘔逆惡心。口吐清水。暗風旋暈。眼見黑花。牙關緊急。口眼喎斜。面目瞞動。頭項拘急。肩背引痛。耳癢目昏。四肢麻木。及沐浴出曝。感風邪頭目昏痛。雨太陽疼。遠年頭風。服諸藥無效。並皆治之。

全蠍炮

雄黃水飛

硃砂各一錢

附子炮去皮膚

川烏頭炮去蘆

麻黃去節

天南星蔓

防風去蘆

未每服半錢

葱茶調下

食後孕婦不可服。

白僵蠶炒各三錢。藁本去蘆。白芷各半。右為細末。每服半錢。葱茶調下。食後孕婦不可服。

宣州木瓜二枚切頂作益創去瘀。沒藥另研。乳香二錢半。另

右二味入木瓜中用益合好竹籤定之飯上蒸三四次爛研成膏每服三匙生地黃汁半盞無灰好酒二盞調和服之

腰痛

[中醫學說]腎主於腰。女人腎藏繫於胞絡。若腎氣虛弱。外感六淫。內傷七情。皆致腰痛。古方亦有五種之說。如風腰痛。宜小續命湯加桃仁杜仲煎服。脾胃氣痞。及寒濕腰痛。宜積散加桃仁。如虛損及五種腰痛。服青娥丸。神應丸皆可用也。如氣滯腰痛。服如神湯。必效。薛立齋曰。陳無擇先生云。若形體虛羸。面色黧黑。腿足痿軟。不能行立。此失志所為也。腹急脹滿。目視眴眴。宗筋弛縱。白淫下注。此鬱結所為也。肌肉不仁。飲食不化。腸胃脹滿。閉墮腰脇。此憂思所為也。因勞汗出。腰慄脇痛。或墜墮血滯。或房勞精竭。皆屬內。若腰冷作痛。身重不渴。小便自利。飲食如故。九補肝散。憂慮傷脾者歸脾湯。逍遙散。調經腎者。寒則木附湯。虛則腎者。湯。腰膝痛者。寄生湯。養腎散。瘀血滯者。神湯。舒筋散。房勞腰痛。青娥丸。十補丸。

腰痛有風有寒有濕有熱有瘀血有氣滯有痰飲皆標也。腎虛其本也。腰痛拘急牽引腿足。脈浮弦者。風也。腰冷如冰。喜得熱。手熨脈沉遲。或緊者。寒也。並用獨活湯主之。腰痛如坐水中。身體沉重。腰間如帶重物。脈濡細者。濕也。蒼白二陳湯加獨活王之。若腰重疼。腰間發熱。痿軟無力。脈弦數者。濕熱也。恐成痿症。前方加黃柏主之。若因閃挫跌撲。瘀積於內。轉側若刀錐之刺。大便黑色。脈濤或芤者。瘀血也。澤蘭湯主之。走注刺痛。忽聚忽散。脈弦急者。氣滯也。橘核丸止。脈細弱無力者。虛也。六君子湯加杜仲續斷主之。若兼陰冷。更佐以八味丸。大抵腰痛悉屬腎虛。既挾邪氣。必須祛邪。如無外邪。則惟補腎而已。然腎虛之中。又須分辨寒熱二症。如脈虛軟無力。溺清便溏。腰間冷痛。此為陽虛。須補命門之火。則用八味丸。若脈清數無力。便結溺赤。虛火時炎。此腎氣熱。髓減骨枯。恐成骨痿。斯為陰虛。須補先天之水。則用六味丸。合補陰丸之類。不可誤用熱藥。以灼其陰。治者審之。

[西醫學說]腰腹神經痛者為腰髓神經之病。其原

獨活

桑寄生

防風

秦艽

威靈仙

牛膝

腰脚疼痛

茯苓

各一錢

桂心

五分

細辛

甘草

三分

當

澤蘭湯

澤蘭三錢

丹皮

牛膝各二錢

桃仁

十粒去皮去核研

紅

澤蘭湯

澤蘭三錢

當歸尾

廣三七各一錢

赤芍藥

五分一錢

澤蘭湯

澤蘭三錢

丹皮

牛膝各二錢

桃仁

十粒去皮去核研

澤蘭湯

澤蘭三錢

丹皮

牛膝各二錢

桃仁

十粒去皮去核研

澤蘭湯

澤蘭三錢

丹皮

牛膝各二錢

桃仁

十粒去皮去核研

補陰丸

熟地

三兩

丹皮

天冬

當歸

枸杞子

牛膝

澤蘭湯

澤蘭三錢

丹皮

天冬

當歸

枸杞子

牛膝

當

澤蘭湯

澤蘭三錢

丹皮

牛膝

桃仁

十粒去皮去核研

紅

當

澤蘭湯

流通寒則凝塞。通則不痛。痛則不通也。治著脾者。燥濕為主。而以祛風散寒佐之。大抵參以補脾之劑。蓋土旺則能勝濕。而氣足自無頑麻也。通用蠲痹湯。加細膝頭腫大。名曰鶴膝風。此三陰本虧。寒邪襲於經絡。遂成斯症。宜服虎骨膠丸。外貼普救萬全膏。則漸次可愈。失此不治。則成痼疾。而為廢人矣。

〔中國醫方〕虎骨丸

治婦人血風攻注脚腰骨節
疼痛不可忍

虎脰骨炙 賽龜酥 檳榔 牛膝酒浸各半 當歸炒去蘆

川大黃炒 附子炮去皮膚 木香 桃仁浸兩半 炒

地龍去土炒 赤芍藥 桂心 海桐皮

錢半 防風去蘆 没藥另研 右為細末。煉蜜

和搗三百五下。丸如桐子大。每服三十丸。空心食前。溫酒下。日二服。

仙靈脾散 治婦人血風攻注腰脚疼痛

仙靈脾 桃仁炒 檳榔各一 羌活去蘆 海桐皮

牛膝酒浸 當歸去蘆 芎菊 碎骨補延

胡索 桂心 枳殼去瓤 木香 卷筒子錢半 二

蚯蚓炒半 腐香另研 右為細末。每服二

錢。食前用豆淋酒調下。日進二服。

藁本散

藁本去蘆一兩半

散

治婦人血風流注腰脚疼痛不可忍

沒藥另研

血竭研

蟬殼微炒

各一兩

狗脊

天麻

骨碎補

桂心

敗龜炙

穿山甲各二兩

醋炙

麝香另研

右為細

狗脊

天麻

骨碎補

桂心

未入麝香拌勻。

每服二錢。

生薑豆淋酒調下。

空心

食前日二服。

敗龜散

治婦人風毒流注腰脚疼痛行步艱難

敗龜炙

虎脰骨酥炙各半

當歸去蘆

杜仲挫炒去絲

白僵蠶炒

薏苡仁

乳香另研各半

地龍土炒

桂心

錢半

骨碎補散

治婦人血風氣攻脚腰疼腹脇拘急

錢半

附子散

治婦人腰腳積年疼痛不瘥

附子 地去皮臍

桂心

沒藥 研另

威靈仙

乾膝 去炒

右為細末每服二錢溫酒調

另

威靈仙

牛膝一兩酒浸各下食前日進二服

養腎散 治腎經虛弱風寒所以侵致腰脚疼痛不能步履

蒼术一兩
子炮去皮臍各二錢

乾蠍三錢
右為細末每服一錢酒調服

黑附

少時隨愈孕婦勿服此治風寒傷腎膀胱虛寒良藥用之得宜殊有神效

蠲痹湯 通治風寒濕三氣合而成痹

羌活 行上力大各一錢

桂心五分

秦艽一錢

當歸三錢
川芎七分治風先治血

甘草分量炙五分

海風

藤二錢桑枝三錢乳香透明者

木香各八分止痛理氣

右水煎服風氣勝更加秦艽防風寒氣勝加附子濕氣勝加防己草薢苡仁痛在上去獨活加荆芥痛在下加牛膝間有濕熱者其人舌乾喜冷口渴溺亦腫處熱辣此寒久變熱也去肉桂加黃柏三分

松枝酒 治白虎歷節風走注疼痛或如蟲行諸般

風氣

虎骨膏丸 治鶴膝風並治癱瘓諸症

虎骨二兩剉碎洗淨用嫩桑枝金毛狗脊去毛白

九如不足量加煉蜜

當歸三

牛膝一兩山藥一兩茯苓一兩杜仲一兩枸杞一兩

續斷一兩

桑

寄生各二兩熟附子七錢厚肉桂去皮五錢不見

丹

虎骨膏為丸每早開水下三錢

右為末以

普救萬全膏 治一切風氣走注疼痛以及白虎歷

節風鶴膝風寒濕流注癰疽發背疔瘡瘍癰跌打損傷腹中食積痞塊多年瘡母頑癰瘀血停蓄腹痛泄利小兒疳積女人癥瘕諸症並貼患處咳嗽瘧疾貼背脊心第七椎取效神速倘貼後起泡出水此病氣本深盡為藥力拔出吉兆也不必疑懼

記之記之

藿香 白芷 當歸尾 貝母 大楓子 木香
白蘞 烏藥 生地 蘿蔔子 丁香 白芨

殭蠶

細辛 草麻子 檀香 秦艽

檀房 丁皮

防風

五加皮

苦參

肉桂

蟬蛻

高良薑

白蘚

羌活

桂枝

全蠍

赤芍

獨活

元參

南星

鼈甲

荆芥

兩頭尖

獨活

蘇木

枳殼

連翹

威靈仙

桃仁

牛膝

紅花

續斷

花百頭

杏仁

蒼朮

艾絨

藁本

骨碎補

川芎

黃芩

麻黃

甘草

黑山梔

川烏附子

牙皂

半夏

草烏

紫

荆皮

青風藤

大黃

蜈蚣

五十條

蛇脫

榆枝

楨枝

柳枝

桑枝

棟枝

真麻油

十兩研篩過

榆枝

松香

一百兩稱秤

內

霜

十兩研篩過

右冬浸九宿

春秋七宿

夏五宿

分數

次入鍋

文武火熬

以藥枯油黑滴水成珠為度

去渣重稱

每藥油十二兩

下濾淨片子松香四觔

同熬至滴水不散

每鍋下百草霜細末六兩

勿住手攪俟火候成

則傾入水缸中

以棒攪和成塊用

兩人扯拔數次磁鉗收貯

治一切風寒濕氣瘡疽

等症其效如神

又法治瘡疽用血丹收更妙

每油一觔用丹六兩

臂痛

中醫學說婦人臂痛筋脈掣急不得屈伸遇寒則

筋不榮則乾急而痛其脈緊細宜服柏子仁丸舒筋

湯若臂痛不能舉或左或右時復轉移二臂由中腕

伏痰脾氣滯而不行上與氣相搏四肢皆屬於脾脾

氣滯而氣不下上攻於臂故痛其脈沈細宜茯苓丸

控涎丹薛立齋云前證若肝血虛用加味逍遙散中

氣虛用補中益氣湯血氣俱虛用八珍湯風熱血燥

用秦艽地黃湯脾腎虛寒用柏子仁丸脾胃實熱用

茯苓丸水不能生木用六味丸逍遙散怒動肝火用

小柴胡加川芎當歸眩暈晡熱用四物柴梔丹皮膚

熱月經不調用加味逍遙散食少體倦無寐盜汗用

加味歸脾湯肩背痛古方主以茯苓丸謂痰飲為

患也而亦有不盡然者凡背痛多屬於風胸痛多屬於

氣閉其經也亦有背痛連胸者風鼓其氣也治胸痛

者理痰氣治背痛者祛風邪此一定之理理痰氣宜

用木香調氣散並前丸祛風邪宜用秦艽天麻湯挾

寒者加附桂。挾虛者以補中益氣加秦艽天麻主之。
如或風邪痰氣互相鼓煽。痰飲隨風走入經絡。而肩
背腫痛。則前九二方須酌量合用。治法無不效矣。

【中國醫方】柏子仁丸 治臂膊為風寒所搏以致

掣痛

柏子仁 乾地黃各二兩 自製

茯苓 枳殼去瓤 鐵炒

覆盆子炒

北五味子各二兩 炒

附子炮

石斛去根 切酒

燕鹿草酥各一兩 炒

酸棗仁炒

桂心 沈香 黃芪

蜜水各一兩 等分

右為細末

煉蜜丸如桐子大空心酒下三十九丸

舒筋湯 治臂痛又名五痹湯亦治腰下疾

片子薑黃四兩

甘草 羌活各一兩

白朮 海桐皮

當歸 赤芍藥各二兩

右為粗末每服三錢

水一盞半煎七分去滓溫服如腰以下疾空心服
腰以上疾食後服

茯苓丸 治臂痛不能舉手或左或右時復轉移

茯苓兩 半夏二兩 枳殼半兩去瓢炒 風化朴硝半兩

右為末薑汁煮糊丸如桐子大生薑湯下二十
丸食後服

控涎丹 凡人忽患胸背手足頸項腰胯隱痛不可

忍連筋骨牽引釣痛坐卧不甯時時走易不定
甘遂去心 大戟去皮 真白芥子炒各等分 右為細末
糊丸如桐子大臨臥淡薑湯下五七丸如疾猛再
加至十九數服即愈

白芥子散

治臂痛牽引背脾或輶或作由榮衛循行失度
痰滯經絡或似癰瘍

真白芥子 木鼈子各三兩 没藥研

桂心 木香各半兩 右為末每服一錢溫酒下

流氣飲 治七情氣滯胸膈悶痞咽喉不利嘔吐面
浮二便不調或氣攻肩背脇肋作痛或脚氣喘急
腹脹便閉元氣充實者宜用此藥

紫蘇葉 黃芪炒 青皮去白 當歸 半夏製

烏藥 芍藥炒 茯苓 桔梗 防風各五錢

芍二錢半 陳皮各七錢 大腹子一兩 枳實炒

木香各二錢 甘草一錢半 薑末水

秦艽地黃湯 治肝膽經風熱血燥肩臂疼痛或筋
脈引急或時牽痛其內證發熱或寒熱晡熱月經
不調或肢體酸痛等證

秦艽 熟地黃自製 當歸各一 川芎 芍藥
煎服

秦艽地黃湯 治肝膽經風熱血燥肩臂疼痛或筋
脈引急或時牽痛其內證發熱或寒熱晡熱月經
不調或肢體酸痛等證

牡丹皮

白朮

茯苓各一錢
五分

鉤藤鉤一錢

柴

胡甘草炙各三分

右水煎服

秦艽天麻湯

秦艽一錢
五分

天麻

羌活

陳皮

當歸

川芎

炙甘草五分

生薑三片

桑枝三錢

酒炒

右水

煎服。挾寒加附子桂枝。

茯苓丸

半夏各二兩
鹽汁炒

風化硝

枳殼各五錢
麸炒

右水

右薑汁糊丸如桐子大。每服二三十丸。淡薑湯下。

脚氣

[中醫學說] 凡頭痛身熱。肢節痛。大便秘。或嘔逆。而脚屈弱者。脚氣也。輕者可與香蘇散。加木瓜檳榔。生薑煎服。然後隨證治之。要知有脚氣之人。先從脚起。或先緩弱疼痛。或行起忽倒。或兩脰腫滿。或脚膝枯轉筋。或見食嘔逆。惡聞食氣。或胸滿氣急。或遍體酸痛。皆脚氣之候。黃帝所謂緩風濕痹是也。頑弱為緩。風疼痛為溼痹。寒中三陽所患必冷。小續命湯主之。煎成。人生薑自然汁最妙。暑中三陰所患必熱。小續命湯去附子減桂一半。主之。大煩躁者。紫雪最良。若

無紫雪。以自合薄荷煎冷水調服。極妙。大便秘者。牌子則腎臟虛弱。為風濕所乘。女子以胞絡氣虛。為風毒所搏。是以胞絡屬於腎也。腎主於腰脚。又肝脾腎三臟經絡。起於足十趾。若臟腑虛損。則風邪先客於脚。從下而上。動於氣。故名脚氣也。此皆由體虛。或當風取涼。或久坐卑濕。或產後勞損。或恚怒悲傷。肝則心氣不足。致月候不通。因其虛傷。風毒傳入筋骨。則令皮膚不仁。筋骨疼痛。肢體不隨。筋脈拘攣。或時冷疼。或發腫滿。或兩脚痺弱。或舉體轉筋。目眩心煩。見食嘔吐。精神昏憊。肢節煩疼。小便赤黃。大便秘澀。如此證候。其婦人脚氣療之。與丈夫不同。以其氣血不如胎姪產損傷之。是以療寡婦及尼。與妻妾殊別。即其義也。薛立齋曰。嚴用和先生云。前證初患不覺。因他病乃發。先從脚起。或緩弱痹痛。不能行履。或兩脰腫滿。或膝足細小。或心中怔忡。或小腹不仁。或舉體轉筋。或見食作嘔。或胸滿氣急。偏體酸痛。其脈浮而弦者。因於風濡而弱者。因於溼洪而數者。因於熱遲而濶者。因於寒。男子由於腎氣虧損。女子血海虛弱。

七情所致。竊謂前證若足三陰虛弱。用還少丹。若脾氣虛寒。用八味丸。若飲食停滯。臀腿痠脹。浮腫作痛。此辨氣下陷。用六君子加少柴胡升麻。不應須用八味丸。若發熱口渴。月經不調。兩腿無力。此足三陰血虛大燥。用六味八味二丸兼服。前證西方之人多患之。因素食乳酪。脾胃壅滯。腔足腫滿。至於南方亦有因膏梁厚味。濕熱下注而患者。故古人謂之壅疾。所用之方。多疏通發散之劑。然感於勤勞過度。虧損三陰。治法又當以固本為主。故六物附子為元氣虛弱。寒邪內侵之聖藥。脚氣者。脚下腫痛。即辨症之類也。因其痛專在脚。故以脚氣名之。其腫者名濕脚氣。不腫者名乾脚氣。濕腳氣水氣勝也。檳榔散主之。乾脚氣風氣勝也。四物湯加牛膝木瓜主之。

西醫學說 脚氣實傳染病之一。孕婦產婦最易發生。病有三種。證候各異。一曰乾性脚氣。足及下腿疲軟無力。或如蟲行。或若麻木。又次而大腿。又次而少腹。口唇知覺亦漸異常。下腿後部緊張。按之發痛。膝蓋腱反射消失。故步行蹣跚。動虞顛躡。終則心跳加速。即喘形銷骨立。二曰濕性脚氣。即水腫性脚氣。

乾性症諸證候而益以浮腫。始於足背及下腿前面。更漸進而波及全身。三曰惡性脚氣。亦名衝心脚氣。來時體有微熱。脈來頻數。心跳甚。呼吸淺促。心窩苦悶。恶心嘔吐。小便極少。膚色青蒼。麻木益劇。不過數日。終至悶斃。三者之中。此為最險。此病攝生之法。居處宜擇高燥之所。最忌濕地海灘。食物宜麥飯。赤豆及新鮮蔬菜。最忌米飯魚肉等濃厚滋味。及糖果點心諸不消化物。惟生菜虛弱。或已呈衰象者。許食牛肉牛乳雞蛋等滋養物。素飲酒者。速減去三分之二。不嗜者。雖點滴不可入口。入夜即九時。即寢勿遲延。卧後足勿外露。雖盛暑必仍着長襪以寢。室内外隨散步戶外半時或一時。一切費腦力勞筋骨之事。均須謹避。房事尤當切戒。一面佐以藥劑。病或可瘳也。

中國醫方 大腹皮散 治婦人風毒脚氣肢節煩疼心神昏悶並宜服之

大腹皮	桑白皮	木通皮	羌活去	赤芍藥
枳殼炒	荆芥	獨活去	青橘皮去	乾木瓜各一兩
紫蘇葉各二兩				
右㕮咀每服八錢水				

一中盞半。生薑五斤。葱白七寸。煎至一大盞。去滓。
食前溫服。

紫蘇散 治婦人風毒脚氣心腹痞塞痰飲停積不
思飲食。脚重虛腫。

紫蘇葉 木通去皮 茵香 桑根白皮各一
活去蘆 羌活去蘆 乾木瓜 青橘皮去白
大腹皮兩 枳殼去瓤炒二兩 荆芥半
咀每服八錢水一大盞半。生薑五斤。連鬚葱白一
盞。煎至一大盞。去滓溫服。不拘時日進二服。

四白散 治男子婦人血虛發熱。夜多盜汗。不進飲
食。四肢羸瘦筋脈拘攣。脚痛不能行立。

黃芪去蘆 厚朴製 益智仁 陳皮去白 蕤香

白扁豆 白术去蘆各一 甘草炙 天台烏藥各半

半 檀香沈香各半 右為細末。每服三錢水

一盞。生薑三片。棗子一枚。煎至七分。和滓溫服。日
進二服。諸證減退。只有脚攣痛。不能行。服蒼朮丸
治之。

蒼朮丸 大治乾濕脚氣筋脈拘攣。疼痛不能行履。

兼補下部

乳香

另研

沒藥

另研

川牛膝

浸酒

青鹽

各半

熟艾

過研末

米糊

全蠍

一錢

川烏頭

三錢炮研

炒研

馬蹄

浸酒

青鹽

兩半

右件為細末。入研藥令勻。用大木瓜一枚切一
頭。留作益。去瓢入上件藥於木瓜內。將益籤定安
於黑豆中。蒸令極爛。取出去皮。連藥研成膏。却不

生蒼朮末。不拘多少。拌令得所。丸如桐子大。每服
五十丸。空心用木瓜湯下。或溫鹽酒亦得。日進三
服。忌血與蒜。

檳榔散 脚氣謂之壅疾。不宜驟補。

檳榔 牛膝 防己 獨活 秦艽各一
香 天麻 赤芍各八 桑枝錢二
水煎服

羌活導滯湯 治腳氣初起大小便滯結者

羌活 獨活 當歸各二 防己一錢
大黃四分 枳實一

七味檳榔湯 為脚氣疏通之劑

檳榔錢一 大黃 枳實 橘皮各五

草 生薑各三分 右七味水煎服

桂皮 甘遂

平水丸 治脚氣腫滿水病及下部病
商陸兩 吳茱萸 芫花 芒硝各三

甘遂兩

綠豆合

商陸半斤

右同煮候豆熟為度。紙食豆。

水盡從小便出此方甚妙

牽牛五靈煮散 治水氣腳氣肺氣每覺心胸煩滿

奔豚氣上築心胸不可忍

牽牛子炒 檳榔 木香 陳皮 茯苓各三兩

茯苓

琥珀

白术

猪苓各五錢

澤瀉

滑石

海金沙

中

右粗末每服四五錢水一盞煎三兩沸去滓服。

實脾散 治陰水先實脾土

通苓散

治腫滿口燥咽乾小便絕少

猪苓

白术

澤瀉

茯苓

車前

中

疏鑿飲子 治水氣洪腫二便不利熱藥不得者

人參

木香

茯苓

滑石

琥珀

海金沙

中

澤瀉 赤豆炒 商陸 羌活 腹皮 椒目

人參

瞿麥

右入燈心麥冬水煎

木通

茵

中

右薑棗水煎去木瓜木香草果乾薑甘草加入參

木通

秦艽

檳榔

茯苓皮各等

右生薑水煎

中

半夏桑皮車前子沈香名加味實脾散

半夏

桑皮

車前子

沈香

名加味實脾散

中

茯苓湯 治手足浮腫小便秘澀氣急喘滿

茯苓

澤瀉

香附子

橘紅

大腹皮

中

木香分氣湯 治氣滯腫滿虛氣上衝神思不爽

木香

茯苓

澤瀉

右水煎服

中

桑白皮各等 右水煎服

桑白皮

右水煎服

中

茯苓煎 治手足浮腫小便秘澀氣急喘滿

茯苓

澤瀉

香附子

橘紅

大腹皮

中

桑白皮各等 右水煎服

桑白皮

右水煎服

中

茯苓湯 治手足浮腫小便秘澀氣急喘滿

茯苓

澤瀉

香附子

橘紅

大腹皮

中

桑白皮各等 右水煎服

桑白皮

右水煎服

中

茯苓湯 治手足浮腫小便秘澎氣急喘滿

茯苓

澤瀉

香附子

橘紅

大腹皮

中

桑白皮各等 右水煎服

桑白皮

右水煎服

中

茯苓湯 治手足浮腫小便秘澎氣急喘滿

茯苓

澤瀉

香附子

橘紅

大腹皮

中

桑白皮各等 右水煎服

桑白皮

右水煎服

中

茯苓湯 治手足浮腫小便秘澎氣急喘滿

茯苓

澤瀉

香附子

橘紅

大腹皮

中

桑白皮各等 右水煎服

桑白皮

右水煎服

中

茯苓湯 治手足浮腫小便秘澎氣急喘滿

茯苓

澤瀉

香附子

橘紅

大腹皮

中

桑白皮各等 右水煎服

桑白皮

右水煎服

中

茯苓湯 治手足浮腫小便秘澎氣急喘滿

茯苓

澤瀉

香附子

橘紅

大腹皮

中

桑白皮各等 右水煎服

桑白皮

右水煎服

中

茯苓湯 治手足浮腫小便秘澎氣急喘滿

茯苓

澤瀉

香附子

橘紅

大腹皮

中

桑白皮各等 右水煎服

桑白皮

右水煎服

中

茯苓湯 治手足浮腫小便秘澎氣急喘滿

茯苓

澤瀉

香附子

橘紅

大腹皮

中

桑白皮各等 右水煎服

桑白皮

右水煎服

中

茯苓湯 治手足浮腫小便秘澎氣急喘滿

茯苓

澤瀉

香附子

橘紅

大腹皮

中

桑白皮各等 右水煎服

桑白皮

右水煎服

中

茯苓湯 治手足浮腫小便秘澎氣急喘滿

茯苓

澤瀉

香附子

橘紅

大腹皮

中

桑白皮各等 右水煎服

桑白皮

右水煎服

中

茯苓湯 治手足浮腫小便秘澎氣急喘滿

茯苓

澤瀉

香附子

橘紅

大腹皮

中

桑白皮各等 右水煎服

桑白皮

右水煎服

中

茯苓湯 治手足浮腫小便秘澎氣急喘滿

茯苓

澤瀉

香附子

橘紅

大腹皮

中

桑白皮各等 右水煎服

桑白皮

右水煎服

中

茯苓湯 治手足浮腫小便秘澎氣急喘滿

茯苓

澤瀉

香附子

橘紅

大腹皮

中

桑白皮各等 右水煎服

桑白皮

右水煎服

中

茯苓湯 治手足浮腫小便秘澎氣急喘滿

茯苓

澤瀉

香附子

橘紅

大腹皮

中

桑白皮各等 右水煎服

桑白皮

右水煎服

中

茯苓湯 治手足浮腫小便秘澎氣急喘滿

茯苓

澤瀉

香附子

橘紅

大腹皮

中

桑白皮各等 右水煎服

桑白皮

右水煎服

中

茯苓湯 治手足浮腫小便秘澎氣急喘滿

茯苓

澤瀉

香附子

橘紅

大腹皮

中

桑白皮各等 右水煎服

桑白皮

右水煎服

中

茯苓湯 治手足浮腫小便秘澎氣急喘滿

茯苓

澤瀉

香附子

橘紅

大腹皮

中

桑白皮各等 右水煎服

桑白皮

右水煎服

中

茯苓湯 治手足浮腫小便秘澎氣急喘滿

茯苓

澤瀉

香附子

橘紅

大腹皮

中

桑白皮各等 右水煎服

桑白皮

右水煎服

中

茯苓湯 治手足浮腫小便秘澎氣急喘滿

茯苓

澤瀉

香附子

橘紅

大腹皮

中

桑白皮各等 右水煎服

桑白皮

右水煎服

中

茯苓湯 治手足浮腫小便秘澎氣急喘滿

茯苓

澤瀉

香附子

橘紅

大腹皮

中

桑白皮各等 右水煎服

桑白皮

右水煎服

中

茯苓湯 治手足浮腫小便秘澎氣急喘滿

茯苓

澤瀉

香附子

橘紅

大腹皮

中

桑白皮各等 右水煎服

桑白皮

右水煎服

中

茯苓湯 治手足浮腫小便秘澎氣急喘滿

茯苓

澤瀉

香附子

橘紅

大腹皮

中

桑白皮各等 右水煎服

桑白皮

右水煎服

中

茯苓湯 治手足浮腫小便秘澎氣急喘滿

茯苓

澤瀉

香附子

橘紅

大腹皮

中

桑白皮各等 右水煎服

桑白皮

右水煎服

中

茯苓湯 治手足浮腫小便秘澎氣急喘滿

茯苓

澤瀉

香附子

橘紅

大腹皮

中

桑白皮各等 右水煎服

桑白皮

右水煎服

中

茯苓湯 治手足浮腫小便秘澎氣急喘滿

木香各七錢半

右入燈心二十五莖水煎服

加味胃苓湯

治一切水腫功效如神

蒼朮二錢半

陳皮 茯苓 白术 猪苓 澤瀉

厚朴一錢半

紫蘇 香附五錢半

階沿草十葉淡竹葉二十片

生薑三片水煎服

防己湯

治痢後四肢浮腫喘息促急坐卧不安小便不利

防己一錢半

猪苓 桑白皮 茯苓各三錢半

海蛤皮

檳榔 紫蘇 木通各一錢半

右生薑三片水煎服

木香 白术各半

犀角湯

治結陽者四肢腫

犀角一兩

玄參 連翹各半

柴胡

升麻 木通

右水煎服

兩各一錢半

沈香 射干 甘草各一錢半

右水煎服

兩各一錢半

吳茱萸 茶芩 白术 當歸

右水煎服

青木香 海藻 芍藥 大黃各二錢半

右水煎服

木香 防己湯 治四肢沈重浮腫

陳皮 厚朴各一錢半

木香 分 治防己分

木瓜 分

獨活湯 治腳痹

猪苓分五錢澤瀉 茯苓 蒼朮 白术各七錢

甘草三分 生薑皮五錢右水煎服

五飲湯 治肢腫甚效遍身腫脹者亦主之

旋覆花 茯苓 半夏 陳皮各一錢澤瀉分大

肉桂 厚朴各五錢枳實 吳茱萸

甘草各三分澤瀉分大

禹水湯 治水氣腫滿

赤豆二兩

檳榔五錢半

猪苓二兩

澤瀉五錢半

麥芽二兩

神曲一兩

木瓜二兩

木通兩

右水煎服

禹餘糧丸

治十種水氣凡脚膝腫上氣喘滿小便不利

蛇黃三兩

禹餘糧三兩

鍼砂五兩

右蒸餅丸如

桐子大食前白湯下三十九至五十丸

復元丹

治水腫喘息奔急水氣盈溢心腹堅脹

附子二兩

木香根

茴香

川椒

獨活厚

朴一兩

白术 橘皮

吳茱萸

桂心各一兩

澤瀉

肉豆蔻

檳榔各半

右為末糊圓桐子

太每服五十圓紫蘇湯下不拘時

獨活兩四

當歸

防風

茯苓

芍藥

黃芪

人參

甘草

葛根

大豆

附子

牛膝

牛膝散

水煎

治脚氣腫脹小便不利

乾薑

右水

一斗清酒

二升同煎服

大黃

丹皮

防己

肉桂

甘草

芍藥

桃仁

五十粒

犀角

旋覆花

各二兩

橘皮

茯苓

生薑

兩各三

茱萸

治腳氣入腹困悶欲死腹脹

右水煎服

吳茱萸

六升

木瓜

兩個切

右水煎服

必效療腳氣方

大半夏

三兩

生薑

一斤

右水煎服

崔氏方

療腳氣遍身腫

大豆

二升取五升水

一斗煮

桑白皮

一握切

茯苓

二兩切

通

甘草

犀角

分各等

右水煎服

去滓

添酒

二合內藥中隨多少服之忌酸物

去滓添酒

二合內藥中隨多少服之忌酸物

去滓添酒

二合內藥中隨多少服之忌酸物

去滓添酒

二合內藥中隨多少服之忌酸物

去滓添酒

二合內藥中隨多少服之忌酸物

去滓添酒

二合內藥中隨多少服之忌酸物

去滓添酒

二合內藥中隨多少服之忌酸物

神效檳榔散

治腳氣如神

檳榔

三錢

蘇葉梗

防風

羌活

當歸

木瓜

童便

二合再煎三沸溫服

大黃

細辛

茯苓

防己

羌活

黃芩

前

胡枳殼

厚朴

甘草

杏仁

各等分

右薑棗

前

大黃

細辛

茯苓

防己

羌活

黃芩

前

外國醫方

昆蟲蘭護皮煎十五瓦

二百瓦

硫酸

苦土三十瓦

番木鱗酒兩瓦

稀鹽酸兩瓦

錢半

錢半

大黃左經湯

治腳痹痛

二便秘澀

大黃

細辛

茯苓

防己

羌活

黃芩

前

人參

甘草

葛根

大豆

附子

牛膝

牛膝散

水煎

治腳氣腫脹小便不利

羚羊角

檳榔

芒硝

大黃

丹皮

防己

肉桂

甘草

芍藥

黃芪

精製樟腦

一瓦十分之二

乳糖半瓦

右研和為

精製樟腦

一瓦

右研和為

精製樟腦

一包共製十包。一日三次至五次。每服一包。提神

用之。

人工加爾爾斯泉鹽十五瓦。右用溫開水沖服。每日清晨頓服下。功用同第一方。

硫酸苦土十瓦。純精酒石十瓦。苦酒兩瓦。蒸餾水二百瓦。右二日六次分二日服。利大小便用。

毛地黃浸一百八十瓦。醋剝四瓦。糖漿十五瓦。

右一日三次分二日服。強心利小便用之。

斯篤洛仿司酒兩瓦。糖漿二十瓦。蒸溜水百八

十瓦。右一日六次分二日服。

鹽酸古加乙溴一瓦十分之一。苦扁桃水十瓦。

右一日數次。每服十滴至十五滴。嘔吐用之。

癰瘍瘻瘡

[中醫學說]婦人體虛為風邪氣客於皮膚。復傷風寒。所以發為風癰瘻瘡。若赤疹者。由寒濕客於肌中。極熱。熱結則成赤疹也。得大熱則發。取冷則瘡也。白疹者。由風氣客於肌中。熱與風相搏。則成白疹也。得天陰雨寒則發出。風傷亦發。得暖晴則減。着衣暖亦癰。脈浮而洪滑。即為風。洪則為氣。風氣相搏。則生

癰瘍。身體瘻瘡。凡人汗出不可當風露。及浴後出早。使人身振寒熱。以生風疹也。**藥隱老人云**。台婦人遍身時發瘻瘡。或赤腫癰瘍。五心煩熱。血風攻疰。與人參荆芥散。消風散。四物湯。加荆芥。或人參當歸散。或逍遙散。兼服導赤丸。如不通者。食後服皂角丸。氣虛老人。不可久服。如服皂角丸不退者。此凝滯熱甚者。宜先服青木香丸三兩丸。以開氣道。服蒺藜散。立效。薛立齋曰。前證有身發疮瘡。或如丹毒。瘡痛非常。或膿水淋漓。發熱煩渴。或頭目昏眩。日晡益甚。或寒熱發熱。月經不調。皆肝經風熱。血燥。用加味逍遙散為主。佐以四君芎歸。若忿怒。身發疮瘡。痛癢寒熱。乃肝火血燥。用加味小柴胡湯。氣血俱虛。用八珍加柴胡牡丹皮。若夜間發熱。作渴譫語。乃熱入血室。用小柴胡湯加生地黃。血虛。四物合小柴胡。後用加味逍遙散。調理。若鬱結。食少體倦。內熱。晡熱。乃脾經血燥。用加味歸脾湯。寒熱。加山梔熟地黃。若游走瘻瘡。乃血風走症。用何首烏散。血虛逍遙散。風熱。消風散。若專用風藥。復傷陰血。必致筋攣等證。

[西醫學說]西醫家所謂瘻瘡之病有三種。一曰瘻瘍。搔爬甚者。且發邱疹。專發於四肢之伸展面及腹

背兩部。其周圍並不紅腫。入夜則灼熱煩癢。試以針刺破之。則惟漏水些許。間有結痂而成膿泡或濕疹者。是為一種慢性之皮膚病。不易治愈。二曰蕁麻疹。患消渴黃疸。消化器病。瘡疾及女子生殖器病者。每易罹之。其誘因則為蚊刺。蚤蟎受寒或食魚蝦等。初發者輒現紅白不定之高塊。其大如豆。煩癢灼熱。有時且發熱或浮腫。隱現最速。此為其特徵也。以治其原因為第一。仍以曹達明礬冷水等洗拭患部。三曰皮膚癩癧症。亦多因患消渴黃疸尿毒症諸病。及月經不調。妊娠衰老而來。治法與尋麻疹相似。

【中國醫方】何首烏散 治婦人血風皮膚癩癧心神煩悶及血風游走不定。並宜服之。
何首烏 防風 白蒺藜 枳殼 天麻 瘤蠶
胡麻 茉莉子 蔓荆子 分各等
服二錢煎茵陳湯調下無時。

蒺藜散 治婦人風癩皮膚中如蟲行及生癰疹搔之作瘡面腫心煩並宜服之。
白蒺藜炒 菊草炒 羚羊角屑各七分
人參去蘆 苦參去蘆 蛇牀子 泰艽去蘆 防風去蘆
麻黃去節 當歸炒去蘆 甘草炙 枳殼炒去蘆

細草半兩 各等分
右咬咀。每服五錢。水一中盞半煎至一大盞去滓。溫服。不拘時日進二服。

蒼耳花葉子各等分
右為細末。每服二錢。豆淋酒調下。不拘時日進二服。

治癰疹
右用白蜜不拘多少。好酒調下。累試有驗。

治皮膚有風熱遍身生癰疹
浮萍蒸過培牛蒡子水煮一兩淨乾等分
每服二錢。薄荷湯調下。日進二服。

又治風氣客於皮膚搔之不已
蟬蛻洗大葉薄荷右等分為細末。每服二三錢。溫酒調下。無時。

又方
露蜂房洗過蜜蛇蛻炙令焦各等分
右為細末。每服一二錢。溫酒調下。不拘時。

治婦人風癩瘡疹身癢不止。宜用淋漬方。
馬蘭 茉莉子 白蒺藜 茵芋 羊桃
根 淩霄花各二 蒴囊根 草麻葉各一
咬咀以水二斗。煮取一斗。去渣。於避風處洗之。

又方

凌霄花兩 菊蘿根半斤

右件藥以水七升。煮取

三升。濾去滓。入白礬末二兩。攪勻。以棉漬頻拭於
瘡上。後煮槐柳湯浴之。

又方 以醋漿水磨白礬塗之。

治風丹

白木分

枳實炒

黃芩各四錢

右分八帖。食前

又方

又方 治風丹遍身癢因酒得者

浮萍半

防風

黃芪 羌活各三錢

乾葛 麻

黃各一錢

生甘草五分

當歸二錢

右水煎服

又方

天雄

牛膝

桂心 知母各四分

括蔥根 白

术各五分

防風六分

人參二兩

乾薑 細辛各三分

右十味治下篩。酒服半錢。已加至一七為度。

又方 治癩痒皮中風虛

枳實三升

松葉切一升

獨活

旋覆花 黃芪 秦

艽各四兩

丹參

菊蘿各五兩

右八味㕮咀。以酒

二斗。浸六宿。每服二合。日二稍加之。

又方

右件藥以水七升。煮取

三升。濾去滓。入白礬末二兩。攪勻。以棉漬頻拭於

又方

馬蘭子 菊蘿 磁石 菊蔚子

蒺藜子

茵

羊桃

篇竹各二兩

右八味咬咀

以漿水三斗。煮取一斗二升。內磁石。洗之。日三良。

白术兩 戎鹽

磁石各半

黃連

黃芩細

半 芒硝

茵芋各二兩

右八味咬咀

以漿水一斗。煮取三升。洗之。日三良。

又方

菊蘿 防風 羊桃

石南 茵芋

茺蔚子

蒺藜子

茵

藜 磁石各一兩

右八味咬咀

以漿水一斗。煮取

五升。去滓。內磁石。令小沸。溫浴之。

又方

大黃 升麻 黃藥

當歸 防風

芍藥

黃

芩 青木香

甘草各二兩

楓香五

芒硝分

地黃汁一升

右十二味咬咀

以水一斗。煮取三升。

去滓。下芒硝。令消。帛染搗病上一炊。久日四五度。

又方

大黃二升

磁石三升

蒺藜子三升

蛇牀子

茺蔚

子各二升

防風五升

大戟一升

右七味咬咀酒四升。水七升。煮取四升。去滓。內磁石。以帛染拭之。

又方 治風癩瘡瘻在頭面搗洗之

大黃 芒硝各六升

大黃 芒硝各四升

大黃 八分

蒺藜子五合

大黃 十升

大黃 分

大黃 六升

大黃 八分

去滓下硝以帛染搗洗日一度勿近目

又方 治身體赤癰瘻而痒搔之隨手腫起

莽草二分

當歸

片窮

大戟

細辛

芍藥

芫花

蜀椒

附子

蒟蒻

分

四升

右六味咬咀以水七升煮取三升

黃連六升

黃芩八分

黃芩成去滓以傳病上日三

青羊脂膏 治風熱赤疹搔之逐手作瘡

芍藥

甘草各三兩

寒水石

白芷

白芨

黃

芩 防風

黃芪

升麻各四分

竹葉切

石膏

青羊脂四升

右十二味咬咀先以水八升

煮石膏竹葉取四升去滓浸諸藥以不中水猪脂

二升合煎膏成傳病上良

消毒犀角飲子 治癰及癰瘻

牛蒡子六錢

荆芥

防風各三錢

甘草一錢

右咬

咀水煎服

消毒丸 治時毒疮瘻惡證

大黃 牡礪燒

白殼蠶炒各一兩

右為末煉蜜丸

石炭酸半瓦至一瓦 甘油十瓦 再餾火酒九十瓦 右為塗布料

撒曹五瓦 米粉 右研和撒和瘡處

秘魯脂五瓦 甘油三十瓦 右調和塗瘡處以

白蘭地酒百瓦 右塗瘡處

上俱草麻疹用

石炭酸半瓦至一瓦 甘油十瓦 再餾火酒九十瓦 右為塗布料

禪子大新水化下一丸無時內加桔梗鼠粘子尤妙

外國醫方 安知必林五瓦 糖漿二十五瓦

石炭酸一瓦 甘油十瓦 蒸餾水百瓦

右調和為洗滌料

硫肝兩瓦

蒸餾水百瓦

右調

硫酸苦土二十瓦 苦酒兩瓦

蒸餾水二百瓦

右調

醋酸五瓦 大酒二百瓦

右調和為洗滌料

鹽規 紛爾柯欽各一瓦

葛粉越幾斯一瓦百分

之二 甘油適宜

右為丸劑每二時服一二粒

薄荷腦兩瓦

再餾火酒百瓦 右為塗布料

右為塗布料

右一日六次分二日服

右調和為洗滌料

之二 甘油適宜

右為丸劑每二時服一二粒

葛粉越幾斯一瓦百分

之二 甘油適宜

右為塗布料

控水格魯拉爾四瓦 甘油百瓦 右為塗布料。
薄荷腦一瓦至五瓦 再餾酒精百瓦 右為塗布
料。

薄荷腦兩瓦半 橄欖油七瓦半 羊毛脂五十瓦

右為塗布料。

石炭酸一瓦半 大酒二百瓦 右為塗布料。

以脫香水各五十瓦 右為塗布料。

莫若越幾斯半瓦 凡士林十瓦 羊毛脂五瓦

右為軟膏塗敷處。

鹽酸古加乙涅一瓦 凡士林十五瓦 右為軟膏。

用法同前。以上俱皮膚癢瘡症用。

痰飲

[中醫學說]飲凡有六。即懸飲。溢飲。支飲。痰飲。留飲。伏飲。巢氏載之詳矣。龐安常云。人身無倒上之疾。天下無逆流之水。誠哉斯言。以此思之。人之氣道貴乎順。順則津液流通。決無痰飲之患。調攝失宜。氣道閉塞。水飲停於胃腑。結而成痰。其為病也。證狀非一。為喘為咳。為嘔。為泄。為眩。運心嘈。怔忡。為憤懣。寒熱。疼痛。為腫滿。攀躡。為癃閉。痞隔。未有不由痰飲之所致也。診其脈。偏弦為飲。浮而滑亦為飲也。觀夫治飲之法。或下或汗。或溫或利。此固定法愚者之見。溫利之差。可以無害。汗下之錯。為病不淺矣。不若順氣為先。分導次之。氣順則津液流通。痰飲運下。自小便中出。有病喜吐痰唾。服八味丸而作效者。亦有意焉。王叔和云。腎寒多唾。益腎為水之官。腎能攝水。腎氣溫和。則水液運下。腎氣虛寒。則邪水溢上。其間用山茱萸。山藥。輩取其補。附子。肉桂。取其溫。茯苓。澤瀉。取其利。理亦當矣。臨病之際。又加詳審焉。稠濁者為痰。清稀者為飲。按痰之為病。十嘗六七。而內經叙痰飲四條。皆因濕土為害。故先哲云。脾為生痰之源。又曰。治痰不治脾。脾胃非其治也。夫飲入於胃。游溢精氣。上輸於脾。脾氣散精。上歸於肺。通調水道。下輸膀胱。水精四布。五經並行。何痰之有。惟脾土虛濕。清者難升。濁者難降。留中滯膈。瘀而成痰。故治痰先補脾。脾復健運之常。而痰自化矣。析而言之。痰有五。飲亦有五。而治法因之而變。在脾經者。名曰濕痰。脈緩而黃。肢體沉重。在肺經者。名曰濕痰。脈滑而易出。二陳湯。白术丸。扶虛者。六君子湯。傷酒者。白蔻乾葛。抉食者。保和丸。挾暑者。消暑丸。驚者。妙應丸。在肺經者。名曰燥痰。又名氣痰。脈澀面白。氣上喘促。灑淅寒熱。悲愁不樂。其

法。或下或汗。或溫或利。此固定法愚者之見。溫利之差。可以無害。汗下之錯。為病不淺矣。不若順氣為先。分導次之。氣順則津液流通。痰飲運下。自小便中出。有病喜吐痰唾。服八味丸而作效者。亦有意焉。王叔和云。腎寒多唾。益腎為水之官。腎能攝水。腎氣溫和。則水液運下。腎氣虛寒。則邪水溢上。其間用山茱萸。山藥。輩取其補。附子。肉桂。取其溫。茯苓。澤瀉。取其利。理亦當矣。臨病之際。又加詳審焉。稠濁者為痰。清稀者為飲。按痰之為病。十嘗六七。而內經叙痰飲四條。皆因濕土為害。故先哲云。脾為生痰之源。又曰。治痰不治脾。脾胃非其治也。夫飲入於胃。游溢精氣。上輸於脾。脾氣散精。上歸於肺。通調水道。下輸膀胱。水精四布。五經並行。何痰之有。惟脾土虛濕。清者難升。濁者難降。留中滯膈。瘀而成痰。故治痰先補脾。脾復健運之常。而痰自化矣。析而言之。痰有五。飲亦有五。而治法因之而變。在脾經者。名曰濕痰。脈緩而黃。肢體沉重。在肺經者。名曰濕痰。脈滑而易出。二陳湯。白术丸。扶虛者。六君子湯。傷酒者。白蔻乾葛。抉食者。保和丸。挾暑者。消暑丸。驚者。妙應丸。在肺經者。名曰燥痰。又名氣痰。脈澀面白。氣上喘促。灑淅寒熱。悲愁不樂。其

痰澀而難出。利金湯潤肺飲在肝經者。名曰風痰。脈弦面青。四肢滿悶。便溺秘澀。時有躁怒。其痰青而多泡。水煮金花丸。防風丸。川芎丸。在心經者。名曰熱痰。脈洪面赤。煩熱心痛。口乾唇燥。時多喜笑。其痰堅而成塊。小黃丸。天黃湯。在腎經者。名曰寒痰。脈沈面黑。小便急痛。足寒而逆。心多恐怖。其痰有黑點而多稀。薑桂丸。八味丸。胡椒理中丸。其人素盛今瘦。水走腸間。辘辘有聲。名曰痰飲。心下冷極。以溫藥和之。桂苓甘木湯主之。飲後水流在脇下。放唾引痛。名曰懸飲。十棗湯下之。飲水流於四肢。當汗不汗。身體疼重。名曰溢飲。大青龍湯汗之。放逆倚息。短氣不得卧。其形如腫。名曰支飲。五苓散。澤瀉湯利之。膈滿嘔吐。喘放寒熱。腰背痛。目淚出。其人振振惡寒。身瞞惕者。名曰伏飲。倍术丸更有一種。非痰非飲。時吐白沫。不甚稠粘。此脾虛不能約束津液。故涎沫自出。宜用六君子湯。加益智仁以攝之。嗟乎。五痰五飲。證各不同。治法迥別。稍或不詳。妄投藥劑。非徒無益。而又害之。至如脾肺二家之痰。尤不可混。脾為濕土。喜溫燥而惡寒。潤。故二木星夏為要藥。肺為燥金。喜涼潤而惡溫燥。故二母二冬。地黃桔梗為要藥。二者易治。鮮不危困。

世俗惡半夏之燥。喜貝母之潤。一見有痰。使用貝母。若是脾痰。則土氣益傷。飲食忽減。即使肺痰。毋過於涼潤。以傷中州。稍用脾藥。以生肺金。方為善治。故曰治痰不理脾胃。非其治也。痰飲一證。在內經。正有積飲之說。本無痰證之名。此內經之不重痰症。槩可知矣。及考痰之為名。雖起自仲景。後世相傳。無論是痰非痰。開口便言痰火。有云怪病之為痰者。有云痰為百病母者。似乎痰之關係。不為不重。而何內經之忽之也。不知痰之為病。必有所以致之者。如因風因為百病母者。似乎痰之關係。不為不重。而何內經之忽之也。不知痰之為病。必有所以致之者。如因風因火而生痰者。但治其風火。風火息而痰自清也。因虛因實而生痰者。但治其虛實。虛實愈而痰自平。未聞治其痰而風火可自散。虛實可自調者。此所以痰必因病而生。非病之因痰而致也。故內經之不言痰者。正以痰非病之本。乃病之標耳。今舉世醫流。但知百計攻痰。便是治病。竟不知所以為痰。及因何而起。是何異。引指以使臂。灌葉以救根者乎。標本誤認。主見失真。欲求愈病。難矣。若夫痰之與飲。雖曰同類。而實有不同也。蓋飲為水液之屬。凡嘔吐清水及胃腹膨滿。吞酸愛腐。渥渥有聲等證。此皆水穀之餘。停積不行。是即所謂飲也。若痰有不同於飲者。飲清澈而痰

稠濁飲惟停積腸胃而痰則無處不到水穀不化而停為飲者其病全由脾胃無處不到而化為痰者凡察臟之傷皆能致之故治此者當知所辨而不可不察其本也婦人風痰者由臟腑風冷水飲停積在於胸膈所成也人皆有痰少者不能為妨多者成患但胸膈有痰飲停於胸中則令眼昏亦令頭眩頭痛者藥隱老人曰痰之為害多因外感五邪內傷七氣因五邪而得者得風為風痰得寒為寒痰得暑為暑痰因七氣所傷多因婦人情性執著不能容忍而有此證豈特祇因風冷而成哉所以外感五邪內傷七氣乘間而為害也經云清則運為精華濁則凝為痰飲此之謂也然有痰涎飲沫四種相類宜子細詳辨調治因風而生痰者宜服三生飲星香飲青州白丸子化痰丸因寒冷而得者宜服降氣湯黑錫丹養正丹因熱而得者宜服金沸草散柴胡半夏湯因暑而得者消暑丸因氣滯不調鬱結而成为宜服參蘇飲四七湯二陳湯痰在上者以瓜蒂散吐之在下者以控涎丹利之雖曰可吐可下亦要觀人之盛衰察脈之虛實方可投之切記不可猛吐暴下所以初虞世有

金虎碧霞之戒也薛立齋曰前證若肝經恚怒用小柴胡湯肝經風熱用鉤藤散肝腎氣虛用川芎散脾經鬱結用歸脾湯鬱怒傷肝脾用加味逍遙散脾虛肺氣鬱滯用二陳貝母桔梗陰虧水泛用六味地黃丸腎虛陰火加減八味丸腎經其虛大不歸源八味丸仍與前證互相用之凡病未有不發熱不生痰者是痰與熱乃雜病兼見之症然亦有雜病輕而痰飲重則專以痰飲為主治書有五痰之名以五臟分主之也五飲之名隨症見也其實猶未確當大抵痰飲以燥濕為分引以表裏為別濕痰丸脾虛則補之六君子湯兼寒兼熱隨症加藥燥痰濁而難出多生於脾脾實則消之二陳湯甚則滾痰丸脾受大刑不能下降以致真水上泛則滋其陰六味丸飲有在表者乾燥發熱而咳面目四肢浮腫香蘇五皮散飲有在裏者或停心下或伏兩脇咳則相引而痛或走腸間辘辘有聲用小半夏加茯苓湯隨其部位而分治之此治痰飲之大法也書云治痰須理脾以痰屬濕脾土旺則能勝濕耳治痰如此飲亦宜然然脾經痰飲當健脾

以祛其濕。若腎虛水泛為痰為飲者，必滋其腎。腎水不足，則用六君。若命門真火衰微寒，痰上泛者，則用八味。腎氣虛補火生土，開胃家之關，導泉水下流，則痰飲自消矣。

【西醫學說】一名胃風。具痰飲證候之慢性胃炎。大抵如急性胃炎之病狀。食慾缺損。胃部重而微痛。或

且吐酸噯氣。舌被厚苔。大便祕結。雖屬常事。亦間或泄瀉。精神抑鬱。甚於急性。雖堪操作。而不能勞心勞力。雖能思慮。亦往往有始無終。神經證狀。緣茲而起。故微有不豫。憂思隨之。營養漸缺。身體羸瘦。形容枯槁。儼若老人。此慢性炎症。有連絲數月至數年之久。而不能治者。終則因衰弱而斃。要之胃炎不問其為急慢。大抵由飲食不合衛生而來。苟不嚴守攝生之法。縱有靈丹。亦難奏效。故食物以消化易滋養者為宜。如牛乳肉湯雞蛋小牛肉鳥肉少脂肪之魚類。牡礪等。以及生蔬菜澱粉類豆類皆是。飲料則宜陳葡萄酒及良好之麥酒淡茶等。他如行礦泉浴。適當散步。郊外運動亦屬相宜。

〔中國醫方〕旋覆花湯
食頭目昏悶 治婦人風痰嘔逆不下飲

旋覆花 桂心 枇杷葉去毛 川芎 細辛去
薑製各半兩 前胡去蘆人參去蘆半夏
羌活去蘆半兩 枳殼去瓤炒前胡去蘆人參去蘆半夏
天南星丸 治婦人風痰心膈壅滯
天南星薑製 白附子炮 半夏麵各一錢
白礬桔五錢 右為細末酒煮麵糊丸如桐子
大每服二十丸煎生薑薄荷湯送下食後臨卧日
二服

大半夏湯 治痰飲脾胃不和咳嗽嘔吐飲食不入
半夏 白茯苓 生薑各二錢 右薑水煎服胃痞
加陳皮四七湯亦佳

導痰湯 治痰涎壅胸膈痞塞或咳嗽惡心飲食少
思 半夏錢 南星 枳實炒 茯苓 橘紅一錢 甘
草五分 右用薑十片水煎服

柴胡半夏湯 治痰熱頭痛利膈除煩悶手足煩熱
嗜卧少力飲食無味兼治痰癖
柴胡八錢 半夏三兩 人參六錢 甘草 黃芩

麥冬兩各二 白术兩 右咬咀每服五錢水一盞

半薑五斤棗一枚煎至八分去滓服

澤瀉湯 治心下支飲眩冒

蒼木錢八 澤瀉兩 右水煎服

甘遂半夏湯 治痰飲自利心下痞堅滿者

甘遂三枝 半夏十二枚 芍藥半兩 甘草指大一枚 右

為煎藥

桂苓术甘湯 治心下支飲脇腹支滿目眩者

桂枝生薑各二兩 甘草 白术 茯苓各二錢 右

右為煎藥

順妙散

白杜礪二兩 羿术 甘草各二錢 縮砂五分 丁子

右為細末用之

瘧飲下藥

硝石 杜礪各五錢 大黃二錢 黃連 黃芩各一錢半 右為

胡椒 茴香各二錢

九藥

活胃散

牡礪一錢六分 茴香 羿术各八分 肉桂四分 甘草

胡椒各二分 右為細末白湯服

治痰飲方

人參 白术 甘草 丁香 乾薑錢各一

煎藥

白术散 治嘔吐酸水結氣築心

茯苓 厚朴各八錢

橘皮

華撥 吳茱萸各四分

檳榔

大黃

右水

煎服

乾薑丸 治酒癖停飲吐酸水

乾薑

葛根

枳殼

橘紅

前胡

白米

半夏

吳茱萸

甘草

右煉蜜丸

如桐子大

每服三十丸

水飲下

半夏茯苓湯 治心腹痰水心下汪洋嘈雜或水鳴

多唾口吐清水

自出

脇肋急脹痛

生薑

兩

茯苓

三錢

旋覆花

桂心

橘皮

人參

桔梗

芍藥

甘草

右一錢

水

煎服

加細辛

即名旋覆花湯

二陳湯 此方專治濕痰

半夏

茯苓

陳皮

去白各一錢

甘草

錢五分

右生

薑二片

大棗二枚

煎服

加人參白术各一錢

名六

君子湯

右生

水

火

右生

滾痰丸

治實熱老痰變生怪症

大黃
刻片

辰砂
飛二錢
細研水四兩

青礞石
硝煅
金色

沈香
剉細

芳香酒二十瓦
撒曹三瓦
重曹十瓦
右研和散。分作十包。一日

括亞酒
菖蒲酒各八瓦

以蒸溜水適宜。製為錠劑二百個。一日數次。每服四錠至十錠。

貝母瓜蔓散

貝母一錢

瓜蔓一錢

花粉 茯苓 橘紅 桔梗各八分

右水煎服

【西國醫方】

稀鹽酸一瓦

百弗聖一瓦 苦酒兩

水五十瓦 右混和。每食後服十滴至十五滴。

複方規那酒二十瓦 苦酒二十瓦 橙皮酒二十瓦

右每食前服十滴至十五滴。

重曹十瓦 煎製苦土十瓦 大黃末十瓦 茴香油

糖十瓦 右研和。一日三次。食後服一小刀尖。

炭酸苦土十五瓦 甘草末 大黃末 茴香末各十瓦 繡草根末五瓦 番紅花末一瓦 右一

日三次。每次服一小刀尖。

沈降炭酸石灰四十五瓦 炭酸苦土三十瓦 肉豆蔻末兩瓦 護膜末十瓦 白糖五十瓦 右

為老痰要藥。

服一二錢。開水下。此藥但取痰積。並不刮腸太瀉。

蕃椒末一瓦十分之八 大黃末四瓦 重曹二十瓦 右研為末。分十二包。每食後服一包。一日三次。每服一包。

咳嗽

【中醫學說】欬之為病。有一欬即出痰者。脾勝濕而痰滑。也有連欬十數不能出痰者。肺燥勝而痰濕也。滑者。宜南星半夏皂角灰之屬。以燥其脾。若利氣之劑。所當忌也。澀者。宜枳殼紫蘇杏仁之屬。以利其肺。若燥肺之劑。所當忌也。肺欬喘息而有音。甚則吐血。麻黃湯。大腸欬而遺矢。赤石脂禹餘糧湯。桃仁湯。不止。用猪芩分水散心欬心痛。喉中介介鯁狀。甚則咽喉癢。用桔梗湯。小腸欬而失氣。氣與欬俱失。芍藥甘草湯。與夏脈不及病同。益小腸為心之腑故也。肝欬。兩脇下痛甚。不可以轉轉。則兩胠下滿。小柴胡湯。仲景云。欬引脇痛。為懸飲。宜十乘湯。丹溪云。欬引脇

痛。宜疏肝氣。用青皮枳殼香附子等實者白芥子之屬。膽放。嘔膽汁。黃芩加半夏生薑湯。脾放。右脇下痛。陰。陰痛引肩背。甚則不可以動。動則放劇。升麻湯。胃放。嘔。嘔甚則長蟲出。烏梅丸。腎放。腰背相引而痛甚。則咳涎。麻黃附子細辛湯。膀胱放。遺溺。茯苓甘草湯。三焦放。腹滿。不欲飲食。此皆聚於胃。關於肺。使人多涕唾。而面浮腫氣逆。錢氏異功散。凡咳嗽面赤。胷腹脇常熱。惟手足乍有涼時。其脈洪者。熱瘻在胸膈也。宜小陷胸湯。蒙石丸之類。清膈降瘻。甚而已者。宜吐下其痰熱也。面白悲噦。或脇急脹痛。或脈沈弦細。遲而放者。寒飲在胃腹也。宜辛熱去之。乾放嗽者。無痰有聲。是也。比證本於氣滯。滯微者。連放十數聲。方有痰出。滯甚者。雖放數十聲。亦無痰出。是為乾咳嗽也。婦人放嗽者。由肌體虛外。受於寒熱風溼。毛若為寒。熱風濕所傷。邪氣自皮毛而入於肺。中外皆傷。故令放也。大抵治咳不可一槩。當以脈息辨之。其脈浮而弦者。起於風濡而弱者。起於溼。洪而數者。起於熱。遲而澀者。起於寒。風者散之。濕者燥之。熱者涼之。寒者溫之。虛者補之。未有不安者也。薛立齋曰。

丹溪云。春是木氣上升。夏是火氣炎上。秋是溼氣傷肺。冬是風寒外來。當發散行痰。開腠理。用二陳湯。加薑汁。乾咳嗽難治。此證乃痰鬱火邪也。用苦梗。開之。用貝母石膏。午後嗽者。陰虛也。用四物加炒黑黃藥。知母。黃昏嗽者。火氣浮於肺也。用五味子五倍子五夏。用補陰降火。不已則成勞。上半日多嗽者。胃火也。更嗽者。飲食之火。流於肺也。以貝母軟石膏。肺脹而嗽。或左或右。不得眠。此痰挾瘀血。氣滯而病。宜養血疏肝清痰。用四物加桃仁。訶子。青皮。竹瀝之類。嗽而脇下痛。宜疏肝氣。以青皮。挾痰實者。白芥子之類。血凝氣作嗽者。桃仁大黃薑汁丸服。治嗽多用生薑。以其辛散故也。痰因火動。逆上作嗽者。先治火。次治痰。謂前證午前嗽。屬胃火。盛用竹葉石膏湯。胃氣虛。用補中益氣。加炒山梔。午後嗽。屬陰血虛。用四物黃藥。知母。腎水虛。用六味地黃丸。黃昏嗽。用四物五味麥冬。並前丸五更嗽。用六君子。不得眠及兩脇下痛。用六味地黃。補中益氣。若因氣虛。腠理不密。六淫所侵。

當祛外邪而實脾土。若因心火太過。當伐肝木而滋肺金。若肺金氣虛。當補脾土而生肺氣。若因腎水虧損。虛火上炎。當補肺腎以滋化源。大抵風邪胃火此實熱為患易治。惟肺腎虧損。此真臟為患最難調治。初虞世曰。經曰。微寒為嗽。寒甚為腸癖。古人立方治嗽。未有不本於溫藥。如乾薑桂心細辛之屬。以寒氣入裏。非辛甘不能發散。以此準之。未有不因寒而嗽也。又曰。熱在上焦。因咳為肺痿。又實則為肺癰。虛則為肺痿。此人其始或血不足。或酒色滋味太過。或因服利藥。重亡津液。燥氣內焚。肺金受邪。脈數發熱。咳嗽膿血。病至於此。亦已危矣。古人立方。亦用溫藥。如建中之屬。今人但見寒熱咳嗽。率用柴胡龍甲參冬亭煎等藥。旋踵受弊。而不知非可為深戒。就使不可進以溫藥。亦須妙以湯丸委曲調治。無為鹵莽。致傷人命。薛立齋曰。丹溪云。陰分嗽者。多屬陰虛。肺脹不得眠者。難治。肺痿專主補氣養血。清金。肺氣有餘者。宜瀉之。以桑白皮為主。半夏茯苓佐之。瀉其有餘。補其不足。肺燥者。當潤之。屬熱者。大力子桔梗。知母雞子清。足。陰不足者。六味地黃為要藥。或知母茯苓湯。陰虛

氣喘。四物加陳皮甘草。以降其氣。補其陰。竊謂前證嗽而鼻塞聲重。風邪傷肺也。用參蘇飲。面赤喘嗽。參平肺散。寒熱交作。四君子加知母柴胡桔梗。咳嗽短氣。肺虛也。人參補肺湯。體倦少食。脾虛也。參木補脾湯。口乾咽燥。虛火上炎也。六味丸。太凡發熱喘嗽。或咳唾膿血。飲食不入。急補肺脾。滋腎水。多有得生者。脈浮大而面色赤者。皆難治。脈浮短濶者。可療。經曰。感於寒。微則為咳。甚則為泄。益肺主氣。合於皮毛。邪傷皮毛。則咳為肺病。傳於各臟。以時受邪。肺為嫩臟。邪易傷而難治。其嗽有肺心脾腎肝風寒。支飲膽之十種。亦有勞嗽者。華陀謂之邪嗽。孫真人謂之注嗽。此因酒色過度。勞傷肺經。重者咯吐膿血。輕者時發時瘥。或先嘔血而後嗽。或先咳嗽而吐血。此又挾邪傳症。孫真人用通氣丸。夢與鬼交。用四滿丸。蛤蚧以及桃柳枝安息香之類。若肺中有蟲。入喉痒嗽。須以藥合化其蟲。即死而嗽亦止。薛立齋曰。仲景先生云。咳而兩脇痛。不能轉側。兩胠滿。屬於肝臟。用小柴胡湯。咳而嘔苦水。屬於膽腑。黃芩半夏生薑湯。咳而大喉中如梗狀。甚則咽腫喉閉。屬於心臟。桔梗湯。咳而大使失氣。屬於小腸腑。芍藥甘草湯。咳而右胠痛。陰引肩

背甚則不可動。動則咳劇。屬脾臟升麻湯。咳而嘔。嘔甚則出長蟲。屬胃腑。烏梅丸。咳而喘息有聲。甚則唾血。屬肺臟升麻湯。咳而失尿。屬大腸腑。麻黃附子細辛湯。咳而遺尿。屬膀胱。淡芩半夏湯。咳而不止。三焦受之。其狀復滿。不食。涕唾。面目浮腫。氣逆。異功散用之。對證。其效如神。肺體屬金。譬若鐘。然鐘非叩不鳴。風寒暑濕燥火六淫之邪。自外擊之。則鳴。勞慾情志飲食炙燭之火。自內攻之。則亦鳴。醫者不去其鳴鐘之具。而日磨挫其鐘。將鐘損聲嘶。而鳴之者。如故也。鐘其能保乎。吾願治咳者。作如是觀。夫治風寒初起。頑痛鼻塞。發熱惡寒。而咳嗽者。用止嗽散。加荆芥。防風。蘇葉。生薑。以散邪。既散而咳不止。專用本方。調和肺氣。或兼用人參。胡桃湯。以潤之。若汗多食少。此脾虛也。用五味異功散。加桔梗。補脾土。以生肺金。若中寒入裏。而咳嗽者。但溫其中。而咳自止。若暑氣傷肺。口渴煩心溺赤者。其症最重。用止嗽散。加黃連。黃芩。花粉。以直折其火。若濕氣生痰。痰涎稠粘者。用止嗽散。加半夏。茯苓。桑白皮。生薑。大棗。以祛其濕。若燥氣焚金。乾咳無痰者。用止嗽散。加瓜萎。貝母。知母。柏子仁。以潤燥。此外感之治法也。然外感之邪。初病在肺。

肺咳不已則移於五臟。臟咳不已則移於六腑。須按內經十二經見症而加減如法。則治無不痊。經云：咳而喘息有音甚則唾血者屬肺臟。此即風寒咳血也。止嗽散加荆芥紫蘇赤芍丹參。咳而兩脇痛不能轉側屬肝臟。前方柴胡枳殼加赤芍。咳而喉中如梗狀甚則咽腫喉瘻屬心臟。前方倍桔梗加茅子。咳而右脇痛陰引肩背甚則不可以動。動則咳嗽屬脾臟。前方加葛根秦艽鬱金。咳而腰背痛甚則咳涎者屬腎臟。前方加附子。咳而嘔苦水者屬膽臟。前方加黃芩半夏生薑。咳而失氣者屬小腸腑。前方加芍藥。咳而嘔甚則長蟲出屬胃腑。前方去甘草加烏梅川椒乾薑。有熱佐之以黃連。咳而遺尿屬大臟腑。前方加白术赤石脂。咳而遺溺屬膀胱腑。前方加茯苓半夏久咳不止三焦受之其症腹滿不食令人多涕唾面目浮腫氣逆。以止嗽散合五味異功散並用投之對症其效如神。又以內傷論前證若七情氣結鬱火上衝者用止咳散加香附貝母柴胡黑山梔。若腎經陰虛水衰不能制火內熱脈細數者宜朝用地黃丸滋腎水午用止嗽散去荆芥加知母貝母以開水鬱仍佐以葳蕤胡桃湯。若客邪混合肺經生虛熱者更佐以

團魚丸。若病勢深沉變為虛損。或尸蟲入肺。喉癢而咳者。更佐以月華丸。若內傷飲食。口乾痞悶。五更咳嗽甚者。乃食積之火。至此時流入肺經。用止嗽散。加連翹山楂麥芽葡萄子。若脾氣虛弱。飲食不思。此氣弱也。用五味異功散。加桔梗。此內傷之治法也。凡治咳嗽。貴在初起得法為善。經云。微寒微咳。咳嗽之因屬風寒者。十居其九。故初治必須發散。而又不可以過散。不散則邪不去。過散則肺氣必虛。皆令纏綿難愈。薛立齋云。肺有火則風邪易入。治宜解表兼清肺火。肺氣虛則腠理不固。治宜解表兼補肺氣。又云。肺屬辛金。生於己土。久咳不已。必須補脾土以生肺金。此誠格致之言也。然清火之藥不宜久服。無論脈之洪大滑數。數劑後即宜捨去。但用六味丸。頻頻服之。而兼以白蜜胡桃潤之。其效自止。若脾肺氣虛。則用五味異功散。六君子等藥。補土生肺。反掌收功。為至捷也。滑數者。宜細加詳審。患咳嗽者。宜戒口慎風。毋令久欬。不除。變為肺痿肺疽。虛損勞瘵之候。慎之戒之。

健人大抵由吸受强烈之氣。或感冒寒氣。或煙塵等刺戰。氣管咽頭而發。然如耳道舌根。若受刺戰。亦發咳嗽病之來也。大都基於喘息氣管枝炎。爛喉。馬脾風肺癆。肺氣腫。百日咳。咽頭炎。氣道潰瘍。喉頭小腫瘍諸症。此外則由於種種呼吸器病。當人咳嗽之時。全身靜脈之環流。立起障礙。故額面頸項靜脈怒張。縷縷青筋。分明發現。面青而紅。此種現象。可實徵之。又有因氣壓上肺而患肺氣腫者。尋常咳嗽。無不有痰塊咯出。其但咳無痰者。則謂之乾咳。如因耳道刺戰。喉頭炎。氣管枝炎。百日咳諸症。皆足致之。強健之人。必因煙塵等衝入氣道。始發咳嗽。若呼吸器有病。則雖吸入寒冷或溫暖之空氣。或稍含塵埃之空氣。亦遽發咳。但亦有不同者。倘該人已人事不省。或喉頭氣管枝早已麻痺。或氣管枝久炎。呼吸筋力。纖維結合核菌者。則惟在某種病證為然。要之咳嗽雖至輕微。然苟視若等閒。不難立致重症。即如肺病等。是謬云。傷風不醒變成癆。詎可輕忽之耶。職是之故。以速行治療為是。食物須擇鹽少而滋養多者。飲

料中酒類大忌。祇可飲橙汁、枸櫞汁、葛湯等。寒冽之日不宜外出。風塵撲面之時亦當蟄居室內。頸部纏毛絨或棉布勿令其冷。慎勿唱歌演說。痰既咯出務即吐去不可嚥下。

【中國醫方】黃芪散 治虛中有熱咳嗽、膿血口苦

咽乾

黃芪四兩

甘草二兩

右為細末。湯點一二錢服。日三服。一方。甘草一兩。黃芪六兩。名黃芪六一湯。只

㕮咀水煎服。

蛤蚧丸

治婦人咳嗽不止漸成勞氣

蛤蚧一對

紫菀

款冬花

鼈甲炙

貝母心去

皂角子仁炒各一兩

杏仁炒去皮尖一兩半

右為細末。

煉蜜丸如桐子大。每服二十丸。淡薑湯吞下。

含化丹 治婦人患肺熱久嗽。身如炎。肌瘦將成肺勞。服此安

枇杷葉去毛分等

桑白皮

款冬花

木通

紫菀

大食後夜卧。含化一丸。

杏仁去皮尖分等

太黃減半

右為細末。煉蜜丸如櫻桃

貝母湯 治諸嗽久不瘥

貝母浸半日

北五味子

黃芩

乾薑熱者減半

陳皮兩

半夏

桑白皮

桂心

北柴胡各半

加一半。右為粗末。每服五錢水一盞半。杏仁七枚去皮尖碎之。生薑二片煎

七分去滓。熱服。

定喘湯 治婦人遠年近日肺氣咳嗽上氣喘急喉

中涎聲。胸滿氣逆。坐卧不安。飲食不下。及治肺感

寒邪咳嗽聲重。語言不出。鼻塞頭昏並昏治之。

半夏麵炒

阿膠炒

甘草各半錢

薑粟殼製半兩

北五味子

桑白皮

麻黃去節

人參各半錢

右㕮咀。每服三大錢。薑三片。烏梅半個水一盞半。

煎至七分去滓。漸漸溫服。食後臨卧。日二服。

補肺湯 治證同前

又名清金湯

鷺粟殼製二兩

人參

粉草各半錢

陳皮

茯苓

杏仁製

白木

明阿膠炒

北五味子

桑白皮

薏苡仁

紫蘇莖各一兩

右㕮咀為末。

服三大錢水盞半。薑三片。棗二枚。烏梅半個煎至一盞。臨卧溫服。更加百合。貝母半錢。款冬花各一兩。服之良驗。

金不換散 治男子女人脾胃虛寒久嗽不已喘促

滿悶咳嗽。盛腹脹滿腰背倦痛或虛勞冷嗽。

唾紅痰及遠年近日一切喘嗽諸藥不效者並治之

鷺粟殼半兩

杏仁製

甘草各三錢

枳殼四錢

右咬咀每服三錢水一盞半薑三片烏梅半個煎至八分食後臨卧漸漸熱服

橘皮湯 療春夏傷寒秋夏冷溼咳嗽喉中作聲上氣不得下頭痛諸證

陳橘皮

紫菀

麻黃去根

杏仁製

當歸

桂心

甘草

黃芩各等分

右咬咀每服五錢水盞半煎至一盞去滓熱服

乾薑炮

桂心

躑躅花

葛根

芫花根皮

蜈蚣一條去頭足

細辛

甘草炙

四滿丸

治上氣嗽飲嗽燥嗽冷嗽邪嗽謂之五嗽

乾薑炮

桂心

躑躅花

葛根

芫花根皮

蜈蚣一條去頭足

細辛

甘草炙

鬼督郵

人參

半夏湯洗各

右為末煉蜜丸

大豆許

每服五九米飲下

日三服未應加至七八丸

丸如龍眼大噙化一丸

團魚丸

治骨蒸勞嗽累效

月母

前胡

知母

杏仁

柴胡各等分

生園

魚二個

右藥與魚同煮熟取肉連汁食之將藥焙乾為末用骨更煮汁一盞和藥丸如桐子大每服

二十九煎黃芪六一湯空心送下病既安仍服黃芪六一湯調理

參术調中湯

瀉熱補氣止嗽定喘和脾胃進飲食

黃芪四錢

桑白皮五錢

人參

炙甘草

青皮

白茯苓各三分

五味子半錢

白朮三分

地骨皮

白茯苓各三分

麥門冬

陳皮各五錢

右水煎服

噙化丸 清肺止嗽定喘化痰

薄荷葉四兩

桑白皮

天門冬去心

麥門冬去心

桔梗

知母去毛

百合

貝母去心

柿霜各二錢

桔梗

葉去毛

知母去蜜炙

百合

炒去皮尖

花各一兩半

冰片一錢非真

旋覆花

馬兜鈴

元明粉

鉛白霜

桔梗

冰片一分

右薑水煎服。

南星飲

治痰涎咽喉不利

半夏七枚每個

大皂角一寸去黑皮

南星半個

甘

草寸三作四片

生薑一塊搗指大

右水煎冷服。

人參歸芎湯

治虛勞少血咳嗽咯血

當歸川芎

芍藥人參半夏橘皮茯苓阿膠細辛五味子甘草各分等

棗水煎

右薑水煎服。

紫蘇散

治肺感風寒作嗽

紫蘇桑白青皮五味子杏仁麻黃

甘草各分等

右水煎服。

治十六種咳嗽

馬兜鈴兩

黃明膠二兩

甘草半夏杏仁

各一兩各半

人参兩

右水煎服。

貝母湯

治諸嗽久不瘥

貝母黃芩乾薑陳皮五味子各一兩

桑白皮甘草各分等

白半夏柴胡桂枝各半

木香甘草各分等

右生薑七片煎服。

杏仁桃分半夏

桔梗各四錢

桂枝三分

甘

細辛湯

治肺虛實不調鼻塞多涕咽中有涎而喘

細辛半夏

茯苓

桔梗各四錢

桂枝三分

甘

杏子湯

右薑四片蜜半匙水煎治一切咳嗽

人參半夏茯苓細辛乾薑

芍藥甘

草五味子各等杏仁五錢

右薑五片水煎服

一方去人參茯苓加陳皮名溫肺湯

滌痰湯治嘔吐痰涎喘急難卧者

陳皮半夏茯苓甘草麥冬膽南星

枳實黃連人參桔梗各五錢

竹茹一錢

水煎服。

紫菀草湯治咳嗽咽乾吐痰血喘急脇痛不得安卧

桑葉霜者用經

百合杏仁阿膠貝母蒲

黃各七錢右薑三片水煎入犀角末服之

麻黃蒼木湯治秋冬夜嗽不絕

麻黃八錢蒼木五錢黃芪一錢

草豆蔻分六分

柴胡羌活各五錢

防風當歸甘草各四錢

五味子十五粒右水煎服。

觀音救苦散

人參當歸滑石甘草粟殼蜜右各等

草錢二右薑四片蜜半匙水煎治一切咳嗽

人參半夏茯苓細辛乾薑

芍藥甘

人參當歸滑石甘草粟殼蜜右各等

芍藥甘

芍藥甘

分。哎哩用烏梅一枚白水二鐘臨卧煎服。
降氣化痰湯 治喘因於痰者喘則便有痰聲

紫蘇子一錢半

炒搗碎半錢前胡半夏

茯苓橘紅

桑白皮杏仁各一錢半

甘草分五錢炒

桔梗一錢

右薑三片水煎服

射干兜苓湯 治咳嗽

射干桑皮兜苓桔梗薄荷玄參花

粉貝母枳殼甘菊金銀花各等

右水煎服

六安煎 治風寒咳嗽

陳皮一錢半夏二三錢

茯苓二錢甘草一錢杏

仁一錢白芥子六七錢

右生薑水煎

竹茹湯 治咳逆

蘿蔔子蘇子白芥子桔梗竹茹枳實

青皮杏仁竹瀝桑白皮薑汁各等

右水煎服

人參湯 治肺虛咳嗽

生南星人參陳皮烏藥枳殼紫蘇子

右生薑五片水煎服

阿膠湯 治肺咳嗽

麥冬黃柏知母生地黃阿膠歸尾

桑白皮右水煎有痰加貝母

百部湯治久嗽不已咳吐痰涎

百部薏苡百合麥冬各三錢

止嗽散治諸般咳嗽

桔梗炒荆芥紫菀蒸百部茶

甘草炒二兩陳皮水洗去白一斤

右共為末每服三錢

人參胡桃湯止嗽定喘

人參五錢冰砂糖三分

胡桃肉三錢連衣研生薑三片右水煎服

薑橙膏治痰飲及久咳

冰砂糖兩乾薑五兩

橙皮兩右為末煉蜜調

九仙散治一切久嗽

人參款冬花桑白皮桔梗阿膠五味

子各一錢烏梅一分貝母五錢粟殼三錢

右生薑

人參款花湯治久嗽喘急或虛勞冷嗽多年不效

水煎溫服

者

中西合璧圖書館版權所有

款冬 五味子 紫菀 桑白皮 人參各一

生薑

大棗

右為煎藥

杏仁五味子湯

諸嗽通用

杏仁

淡芩各一錢

橘皮分

五味子 桔梗

甘草炙各五分

右水煎溫服。

人參清肺湯

治咳嗽久勞嗽唾血

桔梗

桑白皮 地骨皮 知母

人參 烏梅

阿膠

鷄粟殼 杏仁 甘草

右入棗蜜為

煎藥

清氣化痰湯 治痰火通用之方

陳皮 杏仁 枳殼 黃芩酒炒

瓜萎 茶芩

天南星

半夏 生薑

右薑汁或蜜為丸

潤肺除嗽湯 治遠年咳嗽

人參

甘草生杏仁薄荷各三分

五味子

麻黃

紫菀

陳皮 石膏 款冬

桔梗 半生

夏枳殼

烏梅 桑白皮 鴉粟殼五分

生

單方 白刀豆松脂二味為末。白湯送下。治瘧累效。

又方。白蜜二斤。胡桃肉二斤。隔湯燉熟。開水冲服。

不拘時。

【外國醫方】遠志末三瓦 半夏末 茴香末 生
薑末 硝砂各半瓦 右研和為散分作三包一日

日分三次至五次服完

硫酸規尼涅一瓦 硝砂末兩瓦 杏仁末半瓦

甘草末 甘草膏各適宜

右為丸五十粒一日

三次每服三粒

遠志末兩瓦 杏仁末 硝砂末各一瓦 半夏末

兩瓦 生薑末一瓦 薄荷葉末半瓦

龍膽末

一瓦 右細細研和。以蜜或水飴煉如膏子狀一日

三次每服一小匙。

龍腦 半夏各一瓦十分之八 杏仁末兩瓦 乾

薑末 遠志根末各八瓦 青豆粉十二瓦

右

以水飴及蜜調煉成膏。一日三次分二日服。

臭刺四瓦 杏仁末一瓦十分之八 薄荷油糖八

瓦 達刺侃篤樹膠一瓦十分之四 右為錠劑一日

服三次。

薄荷腦 苗香油各兩瓦 白糖四十瓦 右為錠

劑作三十個每服兩個。一日三次。

半夏 乾薑末各兩瓦 遠志根末四瓦 龍腦一

瓦十分之四 右研為散。勻分六包。一日三次每

服一包

半夏、白樹膠各四瓦
乾薑末兩瓦
右研為散

勻分八包，一日服三包。

四

口有。首月不而以三月之八日
十歲。每自服三粒。至一立夏。

十粒每日服三粒至十五粒

1

瓦五分之一。右研為散。分作三包。一日分三次。

眼。

嘴滿

中醫學說 素問云諸氣皆屬於肺諸喘者亦屬於肺。是以人之一呼一吸謂之息。呼吸之間。脾受其氣。通乎榮衛。合乎陰陽。周流一身。無過不及。然後權衡得其平矣。將理失宜。六淫所傷。七情所感。或因墮墮。驚恐度水跌仆。飽食過傷。動作用力。遂使臟氣不和。榮衛失其常度。不能隨陰陽出入以成息。促於肺。不得宣通而為喘也。診其脈滑。手足溫者。生脈濁。四肢寒者死。數者亦死。謂其形損故也。更有產後喘急。為病尤亟。因產所下過多。榮血暴竭。衛氣無所主。獨聚於肺。故令喘急。謂之孤陽絕陰。為難治。**喘者**。促氣急。喝喝痰聲。張口擡肩。搖身擷肚。短氣者。呼吸促。

雖急而不能接續。似喘而無痰聲。亦不擡肩。但肺壅而不下。哮者與喘相類。但不似喘。開口出氣之多。而有呻吟之音。呻者口閉。呀者口閉。閉口閉口。盡有奇聲。呻呀二音。合成哮字。以痰結喉間。與氣相擊。故呻呀作聲。氣喘之病。最為危候。治失其要。鮮不誤人。欲辯之者。亦惟二證而已。所謂二證者。一曰實喘。一曰虛喘。二證相反。不可混也。何以辨之。實喘者有邪。邪氣實也。虛喘者無邪。元氣虛也。實喘者。氣長而有餘。虛喘者。氣短而不續。實喘者。胸脹氣粗。聲高息湧。膨膨然若不能容。惟呼出為快也。虛喘者。慌張氣怯。聲低息短。皇皇然若氣欲斷。提之若不能升。吞之若不相及。勞動則甚。而惟急促似喘。但得引長一息為快也。此其一為真喘。一為似喘。真喘者。其責在肺。似喘者。其責在腎。何也。蓋肺為氣之主。腎為氣之根。肺主皮毛而居上焦。故邪氣犯之。則上焦氣壅而為喘。氣之壅滯者。宜清宜破也。腎主精髓而在下焦。若真陰虧損。精不化氣。則下不上交。而為促。促者。斷之基也。氣既短促。而再加消散。如壓卵矣。且氣盛有邪之脈。必滑數有力。氣虛無邪之脈。必微弱無神。此脈候之有不同也。其有外見浮洪。或芤大至極。而稍按即

無者。此正無根之脈也。或往來弦甚而極大極數全無和緩者。此正胃氣之敗也。俱為大虛之候。但脈之微弱者。其真虛易知。而脈之浮空弦搏者。其假實難辯。然而輕重之分。亦惟於此而可察矣。蓋其微弱者。猶順而易醫。浮空者。最險而多變。若弦強之甚。則為真臟已見。不可為也。凡虛喘之證。無非由氣虛耳。氣虛之喘。十居七八。但察其外無風邪。內無實熱。而喘者。即皆虛喘之證。若脾肺氣虛者。不過在中上二焦。化源未虧。其病猶淺。若肝腎氣虛。則病出下焦。而本末俱病。其病則深。此當速救其根。以接助真氣。庶可回生也。其有病久而加以喘者。或久服消痰散氣等劑。而反加喘者。或上為喘欬。而下為泄瀉者。或婦人產後亡血過多。營氣暴竭。孤陽無依。而為喘者。此名孤陽絕陰。剝極之候。已為難治。更毋蹈剥膚之戒。也。若虛喘證。其人別無風寒。欬嗽等疾。而忽見氣短似喘。或但經微勞。或饑時。即見喘促。或於精泄之後。或於大汗之後。或於大小便之後。或大病之後。或婦人月期之後。而喘促愈甚。或氣道噎塞。上下若不相續。勢劇垂危者。但察其表裏無邪。脈息微弱無力。而諸病若此。悉宜以貞元飲主之。加減如本方。其效如

神。此外如小營煎。大營煎。大補元煎之類。俱可擇用。經曰。肝苦急。急食甘以緩之。即此爻類。若大便溏泄。兼下寒者。宜右歸飲。右歸丸。聖木煎之類主之。肺氣虛。上焦微熱。微渴。而作喘者。宜生脈散主之。或但以氣虛而無熱者。惟獨參湯為宜。若大鍊肺金。上焦熱甚。煩渴多汗。氣虛作喘者。宜人參白虎湯主之。若大在陰分。宜玉女煎主之。然惟夏月。或有此證。若陰虛自小腹。大氣上衝而喘者。宜補陰降火。以六味地黃湯加黃藥知母之類主之。岐伯曰。夜行則喘。出於腎。淫氣病肺。有所墮恐。喘出於肝。淫氣害脾。有所驚恐。喘出於肺。淫氣傷心。度水跌仆。喘出於腎與骨。當是之時。勇者氣行則已。怯者則著而為病也。原疾之由。皆本於肺與氣。然感外邪。則有太陽症。脈浮無汗。血喘者。宜麻黃湯。陽明病。汗出不惡寒。腹滿而喘。有潮熱者。宜承氣湯。若表邪未解。誤服下利藥。利遂不止。脈促喘而汗出者。宜葛根黃芩黃連湯。若微喘者。桂枝厚朴杏子湯。汗出而喘。若無大熱者。宜麻黃杏子甘草石膏湯。若表邪未解。心下停水。發熱而喘。或嘔者。小青龍湯。去麻黃。加杏仁主之。若陰證喘促者。四肢逆冷。脈息沉細。或寸大尺小。或六脈促疾。或

心下脹滿結鞭。或冷汗自出。或大便頻數。上氣喘促。或咽喉不利者。此是本氣極虛。內外挾寒冷所致。使陰寒內消。陽氣得復而愈。宜反陰丹主之。大槩諸臟相乘而喘者。用杏子散。如感寒伏熱而喘者。用華蓋散。九寶湯。若暴寒合火。覆衣被過當。傷熱肺實而喘促者。其狀多有熱證。用洗心散。冷水調服。若因氣不調。痰盛喘促者。宜四七湯。兼官局桔梗湯。薑煎服。若涎多而喘者。宜千絛湯。橘皮半夏湯。若不得卧。卧即喘者。此由水氣逆行。上乘於肺。肺得水則浮而開。使氣不得通流其脈沉大。宜神秘湯。肺之積名曰息貴。在右脇下。大如杯。令人灑淅寒熱。喘咳發癰痘。宜棗膏丸。若上氣喘者。用神授湯。上盛下弱而喘促者。用蘇子降氣湯。吞黑錫丹。尊年之人。素來稟賦太厚。不任熱藥者。不可輕投丹劑。及諸熱藥。但以秘傳降氣湯分心氣飲。論之梗槩不出於此矣。惟素有脚氣而喘者。當作脚氣治之。薛立齋曰。東垣云。肺金受邪。由脾胃虛弱。不能生肺。故咳嗽氣短。氣上皮毛。不能禦寒。精神少而渴。情慘不樂。皆陽氣不足。陰氣有餘也。治法。若肺氣虛弱。用四君子。加枳殼半夏。脾虛不能生肺。補中益氣湯。七情氣結。四七湯。脾經鬱結歸

脾湯。脾氣虛弱。人參補肺散。肺經大盛。人參平肺散。腎水敗濁。六味地黃丸。真陽虛損。八味丸。或兼小便不利。為害尤速。非二丸不能救。經云。諸病喘滿。皆屬於熱。蓋寒則息微而氣緩。熱則息粗而氣急也。由是觀之。喘之屬火無疑矣。然而外感寒邪。以及脾腎虛寒。皆能令喘。未便槩以火斷也。假如風寒外感而喘者。散之。直中於寒而喘者。溫之。熱邪傳裏。便閉而喘者。攻之。暑熱傷氣而喘者。清而補之。濕痰壅遏而喘者。消之。燥火入肺而喘者。潤之。此外感之治法也。若七情氣結。鬱火上衝者。疎而達之。加味道還散。腎水虛而火上炎者。壯水制之。知柏八味丸。腎經真陽不足。而火上泛者。引火歸根。桂附八味丸。若因脾虛不能潤肺而喘者。五味異功散。加桔梗。補土生金。此內傷之治法也。夫外感之喘。多出於肺。內傷之喘。未有不由於腎者。經云。諸痿喘嘔。皆屬於下。定喘之法。當於腎經責其真水真火之不足而主之。如或脾氣大虛。則以人參白朮為主。參朮補脾生肺。生肺金。生腎水。乃隔二隔三之治也。更有哮症。與喘相似。呀呷不已。喘息有音。此表寒束其內熱。致成斯疾。加味甘桔湯主之。止嗽散亦佳。古今治喘哮症方論甚繁。

大意總不出此。

西醫學說 西醫名喘滿曰喘息為氣管枝之病。凡患此者其呼吸多不暢。息數減少增加者不多見也。病之來也每突發於夜間。惟時呼氣延長。面色蒼白。眼珠突出。且咳且喘。喉間常發出一種聲響。若吹笛然冷汗遍體。不能言語。苦悶甚者必至起坐牀上。如此約二三時後始得稍發聲響。繼則諸證消失。頓覺爽適。疲極之餘因而熟睡。後乃全然恢復。亦有絕不消失。必繼續數日或數星期之久者。又當病將發之際。往往全身違和。肢體倦怠。心悸亢進。豫為之兆。此病豫防之法。第一在慎防感冒。次則須呼吸新鮮之空氣。擇食滋養之食物。營為適宜之運動。毋居暗室及塵囂之處。毋飲酒吸煙。刺戟氣道。毋以香氣異常之花卉。供養卧室之中。毋紛擾精神。治法除利用空氣外。仍須內服沃剝。砒石。及亞鈞羅。必湧等。

中國醫方 杏子散

治諸臟相乘喘急

錢無時。
杏仁去皮尖雙黃研細如膏

右和勻煎橘皮湯調下二

橘皮半夏湯 治肺胃虛弱好食酸冷寒痰停積嘔逆惡心涎唾稠粘或積吐粥藥不下手足逆冷目

瞓身重又治傷寒時氣欲吐不吐欲嘔不瞓昏憒悶亂或飲酒過多中寒停飲喉中涎聲乾喊不此陳皮去白半夏七兩製各右剉為粗散。每服三錢生薑三片水二盞煎至一中盞去滓溫服。不計時留兩服。滓併一服再煎服。

棗膏丸 治息貴在右脇下大如杯令人灑漸寒熱

喘咳

甜葶苈炒研

陳皮

苦梗各等分

右為末。有棗肉

丸桐子大。每服數丸。白湯下。

神授湯 治上氣喘急不得卧

橘紅

苦梗

紫蘇

人參各一錢

五味子三粒炒

右薑水煎服

治婦人喘促虛腫 快利小便即瘥

用生薑二兩。取汁白麵三兩。以薑汁搜作小劑。大半夏十個。打研入麵中作餅。炙熟。作黃色為末。溫熱水調下一二錢。以小便通利為度。

天門冬丸 治婦人喘手足煩熱骨蒸寢汗口乾引

飲面浮腫

天門冬十兩去心秤

麥門冬八兩去心

生地黃三斤取汁熬膏

右二味為末。入地黃膏和丸如桐子大。每服五

人參補肺散 治肺癰腎水不足虛火上炎咳嗽膿

血發熱作渴小便不調

人參 黃芪炒 白朮 茯苓 陳皮 當歸各

錢 山茱萸去核

冬心去 甘草炙各七錢

右薑水煎服

山藥各二錢 五味子杵 麥門

熟地黃

牡丹皮

錢五分

人參平肺散 治心火犯肺金患肺痿咳嗽喘嘔痰

涎壅盛胸膈痞滿咽膈不利

人參 青皮 茯苓 天門冬 陳皮 地骨皮

錢各一 甘草炙五分

知母分 五味子十粒

桑

白皮炒一錢

右薑水煎服

加味甘桔湯 治喘定哮

甘草分 茯苓 旋覆花各一錢

桔梗 川貝母 百部 白前 桔紅

補肺百合湯 治喘促咳嗽逆久不效者

人參 百合 詞子 鳴栗殼 天門冬 生地

黃紫菀 知母 馬兜鈴 木香各一錢

甘草分 薑梅 右水煎服

青龍丹 治咳嗽痰喘不得卧者

薄荷兩 皂莢分

桔梗 細辛分

龍腦各五錢

甘草三錢

川芎三錢

參蘇溫肺湯

治肺寒喘息

半夏

人參

肉桂

甘草

陳皮

木香

白朮

錢五分

右水煎服

桂枝

香附子

甘草

乾薑

蜀羊泉

香薷

錢各一

丁香

葛粉

梗米

錢寒

南燭葉

乾

治喘息方

信良丸

理喘急喘息

茶實生熟者佳

百合根

礬石分

右三味

擣和

紫金丹

治喘息

砒霜

豆豉

枯礬

錢各三

右三味

為末糊丸

如桐子大

朱砂為衣

每服五丸

冷茶或冷水送下

白刀豆 糖霜分等 右二味調合生薑湯飲下
二錢日二

治喘滿方

鰣臘霜

辰砂

桔礬各等

右三味為末。白湯

送下。神效。

外國醫方】

沃剝兩瓦。嗎啡一瓦百分之三。水二百瓦。

右一日三次分二日服。

安知必林半瓦。鹽酸歇魯茵一瓦千分之五。乳

糖半瓦。右為一包發作時頓服。

吐根末。菲沃斯越幾斯各一瓦五分之一。硫酸

規尼涅一瓦。乳糖兩瓦。右分十包每三時服

一包。

鹽酸古加乙涅一瓦。蒸餾水二十瓦。右溶和塗

布鼻粘膜。

炭酸安母尼亞四瓦。蒸餾水四十瓦。右每次取

三四十滴。和水服用。一日數次。

沃剝一瓦。白糖四瓦。右製錠十個。每服四個。日

服二次。

臭剝。白糖各四瓦。右製錠兩個。每服二三個。一

日服三次。

硝石五瓦。安息香酸安母紐謨一瓦。蒸餾水二十瓦。右溶化以此水灑煙葉上。或浸漬之。風乾。

裝入煙斗中。作煙吸之。

硝石紙。右於發作時捲紙燃熏之。

硝石。曼陀羅華末各十五瓦。

右發作時。取一茶

量。置瓦盆上燒之。令吸其氣。

芒硝越幾斯半瓦。吐根末三瓦。

蒲公英膏適宜

硫酸亞鈦羅必涅一瓦千分之一。

龍膽膏適宜

右製九十粒。一日二次。每服一粒。

亞砒酸一瓦四分之一。護謨漿。蒸餾水各適宜

硫酸亞鈦羅必涅一瓦四分之一。護謨漿。

蒸餾水各適宜

右製九百粒。一日三次。每食後服一粒。連服二

十日。停止十日。接服如前。

嘔吐

【中醫學說】婦人嘔吐者。由脾胃有邪冷。穀氣不理所為也。胃為水穀之海。其氣不調。而有風冷乘之。冷搏於胃。胃氣逆則令嘔吐。夫嘔吐之疾。非特脾胃虛冷而嘔吐也。亦有胃熱而嘔者。亦有胃中冷。胃口熱而吐者。亦有痰盛而嘔者。亦有血弱而嘔者。經云。無陰則嘔是也。不可以一槩用藥。如胃冷而嘔吐。宜用人參丁香散。理中丸。及半夏丸。人參七味丸。胃熱而嘔吐者。宜用小柴胡湯。蘆根湯。竹茹湯。槐花散。胃中

冷。胃口熱而嘔吐者。宜用藿香正氣散。生薑棗子煎。
沈冷服。即止。瘧盛嘔吐者。宜半夏湯。茯苓湯。二陳湯。
惡阻。兼用茯苓丸。血不歸源而嘔吐者。用十全大補。
加陳皮半夏。藿香。薑棗煎服。薛立齋曰。東垣先生云。
前證內有故寒與新穀俱入於胃。新故真邪相攻。氣
併相迎。復出於胃。故為嘔。補手太陰。瀉足少陰。又云。
胃因氣逆為嘔。夫嘔吐噦者。俱屬於胃。以其氣血多
少為異耳。如嘔者。陽明也。陽明多血多氣。故有聲有
物。血氣俱病也。仲景云。嘔多雖有陽明證。慎不可下。
孫真人云。嘔家多服生薑。為嘔家之聖藥。氣逆者必
散之。故以生薑為主。吐者。太陽也。太陽多血少氣。故
有物無聲。為血病也。有食入則吐。以橘皮去白主之。
六君丁香藿香生薑之類。若胃中有熱。膈上有痰。用
二陳山梔黃連生薑。若久病脾胃虛。嘔而不納。穀者用
製半夏為主。若脾胃虛弱。寒邪所客。飲食所傷者。用
生薑參术黃芪香附之類。亦有痰膈中焦。食不得下。
者。有氣逆而嘔者。行氣鬱於胃口者。有食滯於心肺。
之分而復出者。有胃口有火與痰而嘔者。若注船大
嘔。渴飲水者。即死。童便飲之最妙。前論云。血不歸源。
前論云。血不歸源。

而嘔。用十全大補湯。誠發前人之未發。愚常用之屢
效。嘔者。聲與物俱出。吐者。有物無聲。噦者。有聲無
物。世俗謂之乾嘔。東垣以此三者。皆因脾胃虛弱。或
寒氣所客。或飲食所傷。以致氣逆而食不下也。香
砂二陳湯主之。然嘔吐多有屬火者。經云。食不得入。
是有火也。食入反出。是有寒也。若拒格飲食。點滴不
入者。必用薑水炒黃連以開之。累用累效。至於食入
反出。固為有寒。若大便閉結。須加血藥以潤之。潤之
不去。宜蜜煎導而通之。蓋下竅開。上竅即入也。其有
因脾胃虛弱而吐者。補中為主。理中湯。其有因痞積
凝滯而吐者。消積為主。和中丸。若命門火衰。不能生
土者。補火為主。八味丸。復有呃逆之症。氣自臍下直
衝上。多因痰飲所致。或氣鬱所發。扁鵲丁香散主之。
若火氣上衝。橘皮竹茹湯主之。

〔中國醫方〕益智子散 治婦人脾胃久虛氣弱多
欲嘔吐食全不下四肢無力

益智一兩 附子炮 縮砂仁 丁香 厚朴 黃
芪 白朮 白茯苓 陳皮 川芎 良薑 蕤
香葉 當歸各一錢半 人參 桂心各半
每服三錢。薑三片。棗一枚。水一盞。煎至七分。去滓。

無時溫服。

丁香散 治婦人臟腑虛冷脾胃氣弱食則嘔吐水穀不消。

丁香 白术 縮砂仁 草果仁 橘皮
當歸 草各半 雨各半
白豆蔻 薤香葉 神曲 詞子皮
人參 一兩 右為細末每服二三錢煎薑
棗湯調下。

竹茹湯 治胃熱嘔吐

乾葛 三
半夏 湯洗七次薑汁半盞漿水
一升煮耗一半取七錢半
右咬咀每服五分水二盞薑三片竹茹殼
子大棗子一枚煎至一盞去滓溫服。

槐花散

皂莢 白礬 槐花炒令黃
細末 各等 甘草 分
白礬 槐花炒令黃
細末 白湯調下二錢

半夏丸 療積冷在胃嘔逆不下食方

半夏 一升真熊州 小麥麵升
搜麵丸如彈子大以水煮令麵熟則是藥成初吞

四五丸日二服稍加至十四五丸旋煮旋服比覺
病減欲更合服亦佳忌羊肉鴨
人參七味丸

人參

白术各五

厚朴 炙

細辛各四

生薑

八兩

橘皮兩

桂心二

右為細末煉蜜丸如

桐子大

飲下十九漸加至二十九與半夏丸間服

亦可忌桃李雀肉生葱生菜

青金丹

治一切嘔吐不已

硫磺

水銀一錢

右入銚內慢火熬他以木篋

子撥炒成砂再至乳鉢研至不見星

以薑汁糊丸

如菉豆大每服二十九米飲下

人參安胃散

治脾胃虛熱嘔吐泄瀉或飲食不入

人參一

黃芪炒二

生甘草

炙甘草各五

白芍藥七

白茯苓四

陳皮三分

黃連炒二

右水煎服

橘皮竹茹湯

陳皮去白

右水煎服

大半夏湯

治反胃嘔吐

半夏洗二升

人參三

白蜜一

右三味以水一

斗二升和蜜揚之

二百四十遍煮藥取二升半溫

服一升餘分再服

小半夏湯

治嘔吐穀不得下者

十五滴一日三次食後服用。

橙皮末四瓦八 大黃末四瓦

重曹四瓦八 右

為散藥分作十包一日服三包。

當藥末四瓦 桂枝末一瓦十分之四 丁子末

茴香末各一瓦十分之四 薄荷油半滴 右為

散藥分作十包一日三次每食後服一包。

杏仁水十瓦 嘴啡一瓦十分之一 右每時取五
滴與碎冰塊同服。

龍膽酒三十二瓦 大黃酒十六瓦 右調和。每食
前服二十滴。

胃液素十瓦 白糖四十瓦 桂皮末四瓦 達拉
侃篤樹膠適宜 右為錠劑作五十個每食後服
一二個。

糖化素兩瓦 胃液素八瓦 達拉侃篤樹膠適宜

右為錠六十個每食後服兩個。