



續名醫類案卷十五

錢塘魏之琇編集

海昌王士雄孟英
定州楊照藜素園同校

汗

竇材治一人額上時時汗出乃腎氣虛也陽明熱則額上出

汗常人多有此症未可卽斷爲腎虛也凡病虛實無不對

待未可執一不治則成癆瘵先炙臍下百壯服金液丹而愈

一人夜多虛汗亦腎氣虛也服全真丹黃芪建中湯而愈

一人每日四五遍出汗灸關元穴亦不止乃房事後飲冷傷

脾氣復炙右命門百壯而愈。

常東軒挺晚苦陰汗有教之用牡蠣粉撲之者始雖少減久之至潰腐見其署丸焉豈非殺之以藥乎

志雅堂
襍抄

琇按陰汗必由下部濕熱而成以牡蠣收濬之故鬱瘀而潰爛也。

宋懷州知州李治與一武臣同官怪其年七十而輕健面如渥丹能飲食叩其術則服首烏丸也乃傳其方後治得病盛暑中半體無汗已二年竊自憂之造丸服至年餘汗遂浹體其治血治風之功大有補益方用赤白何首烏各半斤米泔浸三夜竹刀刮去皮切焙石臼搗爲末煉蜜丸梧

子大每空心溫酒下五十九亦可末服

本草綱目

滑伯仁治一人暑月病身冷自汗口乾煩躁坐臥欲干泥水中脈浮而數按之豁然空散曰脈至而從按之不鼓諸陽皆然此爲陰甚格陽得之飲食生冷坐臥當風所致以真

武湯

附尤芳
茯苓

冷飲一進汗止再進躁去三飲而安

琇按江案暑門滑治一人汗出如雨身熱煩躁醫悞用朮附乃以黃連人參白虎三進愈之宜參看

薛立齋治一婦盜汗不止遂致廢寢神思疲甚口乾引飲作血虛有熱用當歸補血湯代茶炙芪一兩當歸三錢又以六黃湯加人參五味子二劑而愈

陳三農治一人感寒用麻黃發汗。汗遂不止。用建中湯汗出愈多。痰喘有聲。此傷寒損血。兼用藥之過。陰虛而陽無所附。遂用川芎三分。白芍生地各二錢。當歸一錢。雄按芎歸尚有可議元胡索香附各三分。再服而愈。四物是矣。加香附元胡是所不解。

一少年人汗出三年不愈。用棉子炒黑入湯一滾。服四五日脚腿能立。後以歸脾補中等湯而安。

楊乘六治朱氏子年二十外。勞倦發熱。上半身自汗如雨。晝夜不止。一切斂汗方法無效。脈之浮細沉洪軟弱無力。面白無神。舌胖而軟且白滑。意此必肺氣大虛。而腠理不固。也以黃芪湯加五味附子各二錢。自子至卯連進三劑。

其汗如故。思之良久。乃用審炙黃芪二兩。人參五錢。白朮一兩。蜜炙升麻。柴胡。陳皮各一錢。上半身有汗。下半身無汗。明是陽氣不能內歛。秀按柴胡升麻究竟無謂歸身。炙草炒黑乾姜各二錢。白芍五味附子各三錢。大棗五枚。一劑而歛。此症本以勞力傷其肺。肺中藏之陽陷而不升。衛外之陽虛而不固。以致陰氣不肯下降。乘虛外溢。故特用升麻以升提下陷之氣。用黑姜以收固衛外之陽。使在外而爲陰之衛。在內而爲陽之守。後用清金滋水等劑而愈。

薛立齋治一婦人。盜汗自汗。遍身痠疼。五心發熱。夜間益甚。或咳嗽咽乾。月經兩三月一至。用加味逍遙散六味地黃。

丸兼服歸臥又服陳朮九陳皮白朮三月餘諸症悉愈其經乃

兩月一至又服兩月而痊

一婦人患前症食少倦怠肌肉消瘦日晡發熱至夜益甚月水過期漸至不通猶奪汗者時發渴燥汗多而無血也誤用通經

之劑熱倦愈重飲食愈少乃用八珍加升麻丹皮山梔柴胡治之熱漸退又用八珍丹皮軟柴胡調理而愈

羅謙父曰齊大兄因感寒邪頭項強身體痛自用酒服靈砂丹四五粒遂大汗出汗後身輕至夜前病復發以前藥復汗其病不愈復以通聖散發汗病添身體沉重足脰冷而惡寒是日方命醫醫者不究前治又以五積散汗之翌日

身重如石不能反側足脣如冰冷及腰背頭汗如貫珠出而不流心胸躁熱煩亂不安喜飲西瓜梨柿冰水之物常置左右病至於此命診之六脈如蛛絲微微欲絕乃以死決之主家曰得汗多矣焉能爲害曰夫寒邪中人者陽氣不足之所致也而感之有輕重治之豈可失其宜哉仲景云陰盛陽虛汗之則愈汗者助陽退陰之意也且寒邪不能自汗必待陽氣泄乃能出也今以時月論之大法夏月宜汗然亦以太過爲戒况冬三月閉藏之時無擾乎陽無泄皮膚使氣亟奪爲養藏之道也逆之則少陰不藏此冬氣之應也凡有觸冒宜微汗之以平爲期邪退乃已急當

衣煖衣居密室服實表補衛氣之劑雖有寒邪勿能爲害此從權之治也今非其時而發其汗乃謂之逆仲景有云一逆尚引日再逆促命期今本傷而并汗汗而復傷傷而復汗汗出數四使氣亟奪衛氣無守陽泄于外陰乘于內故經云獨陽不生獨陰不長不死何待雖盧扁不能治活也是日至夜將半頑強身體不仁手足搐急爪甲青而死矣金匱要畧云不當汗而妄汗之奪其津液枯槁而死今當汗之症一過中亦絕其命况不當汗而強汗者乎。

華陀傳縣吏尹世苦四肢煩口中乾不欲聞人聲小便不利陀曰試作熱食得汗則愈不汗後三日死卽作熱食而不

汗出陀曰藏氣已絕于內當啼泣而絕果如陀言

此亦藏氣傷燥

之病

三國志

馬元儀治沈康生夫人病經一月。兩脈浮虛。自汗惡風。此衛虛而陽弱也。與黃芪建中湯一劑。汗遂止。夫人身之表。衛氣主之。凡所以溫分肉實腠理。司開闔者。皆此衛氣之用。故內經曰。陽者衛外而爲固也。今衛氣一虛。則分肉不溫。腠理不密。周身毛竅有開無闔。由是風之外入。汗之內出。其孰從而拒之。故用黃芪建中湯。以建立中氣。而溫衛實表也。越一日病者。以手自冒心間。脈之虛濡特甚。此汗出過多。而心陽受傷也。仲景云。發汗過多。病人以手自冒心。

心下悸者。桂枝甘草湯主之。與一劑良已。

丁庠生頭汗火升食少心悸恍惚不甯或議用滋陰脈之兩寸獨鼓兩關尺虛微少神此脾腎交虧真陽欲脫之候也與人參桂附理中湯大培火土以復虛陽彼以生平不任熱劑爲辭曰若謂頭汗火升爲火邪上熾耶不知此乃真氣上越也且謂心悸恍惚爲陰氣內虧耶不知此乃真元無主也遂與人參四錢白朮五錢附子玉桂各三錢乾姜二錢炙草一錢連進四劑脈始和症始退再溫養元氣一月而安。

羅謙甫治刑部侍郎王立甫之婿年二十五仲冬因勞役憂

詒論遠源

思煩惱飲食失節而病時發躁熱肢體困倦盜汗濕透其
衾不思飲食氣不足以息面色青黃不澤診其脈浮數而
短濶兩寸極小曰此危症也治雖粗安春至必死當令親
家知之夫人不以爲然遂易醫至正月躁熱而卒他日王
謂羅曰吾壻果如君言願聞其理曰此非難知也內經曰
主勝逆客勝從天之道也蓋時令爲客人身爲主冬三月
人皆懼寒獨渠躁熱盜汗是令不固其陽時不勝其熱天
地時令尙不能制藥何能爲冬乃閉藏之月陽氣當伏于
九泉之下至春發爲雷動爲風鼓折萬物此奉生之道也
如冬藏不固春生不茂爲疫癘之災且人身陽氣亦當潛

伏于內不敢妄擾。無泄皮膚使氣亟奪。此冬藏之應也。令
壻汗出于閉藏之月。醫水已涸。至春何以生木。陽氣內絕。
無所滋榮。不死何待。乃嘆息而去。

施笠澤治一人。服參芪數日後。每將昏反發熱。至夜得盜汗。
而解曰。此陰虛不能勝其陽也。參芪雖能補陽助陰。而陰
血未易驟生。乃用六味丸料加參歸陳皮一劑。而熱退汗
止。後以六味丸參荅白朮散全愈。

庠友張君牙患寒熱。咸作瘧治。服解表之劑。乃盜汗潮熱。肢
節頸項強痛。夜臥則汗出如沐。濕透重衿。二旬餘日不交
睫。診得左寸微細欲絕。右尺浮大無力。此汗多亡陽症也。

與加味歸脾湯不效。自加麥冬。更服二劑。胸膈滿悶。飲食不進。遂疑參朮不可服。一僧欲進大劑苦參湯。施曰。診法陰盛陽衰者。不可以柔藥。柔藥助陰。陽氣衰弱。陰氣益著。實實虛虛之禍。其能免乎。今君相二火俱虧。非急進歸脾湯加桂心五味不可。豈前藥有陳腐或泡製失宜耶。今取藥一劑。是夜卽安。汗亦漸止。間進八味丸。一月而愈。

庠生施爾祁病脈之曰。陰虛火動也。病使人發熱盜汗。肢節作楚。正合丹溪滋陰降火之劑。服三日後。服虎潛丸。病全愈。所以知爾祁之病者。切其脈虛而數。經云。血虛脈虛。腎水之真陰不足。而虛火妄動也。先是一醫謂是歷節風飲。

以風劑卽肢節浮腫。痿弱不能行。汗出如淋。經云足受血而能步。又云奪血者無汗。奪汗者無血。蓋風能生火。又能耗血。血虛則內熱益甚。肢熱則腫。肺熱則痿矣。

錢國賓治荊州李山人年四十餘。凡飲食頭上汗多。氣如烟霧。必頻抹乃止。寸關浮洪兩尺。沉實。胃脈倍盛。而數此胃熱蒸籠頭也。飲食入胃。遇熱上薰心肺。心主汗液。火性上騰。肺主皮毛。腠理不密。故頭汗出。若蒸籠之氣。因煎迫而如烟霧也。以三黃石羔湯。數劑清胃熱愈。文田按此脈真合用白虎湯矣

魏玉橫曰。詹渭豐母年六旬。外素有肝病。因患瘧。自五月至九月。瘧愈。而他症蜂起。自汗如洗。徹夜不眠。食少便溏。脇

痛齒痛口淡惡心惡風畏寒頭頂皮帽身襲皮衣重幃夾
幔猶慄慄不勝診時以止汗爲囑脈之弦小急知爲陰虛
火盛瘧邪未清誤作陽虛多與補氣斂汗之劑而然叩之
果服歸脾五味子麻黃節浮麥龍骨甚夥乃與生地杞子
地骨釵斛首烏鱉甲黃連棗仁渭豐曰諸醫咸謂頭爲諸
陽之首惡寒若此又自汗而喜熱飲明屬陽虛今方中唯
與養陰又口淡便溏惡心皆屬脾胃虛寒黃連棗仁安可
用至瘧疾已愈何必用首烏鱉甲再所重在汗多而又全
不治汗其故何也曰此症乃火鬱之極內真熱而外假寒
也瘧本胆腑之邪因肝虛而腑傳臟故寒熱止而變爲諸

症。故以生地。杷子。地骨釵斛。養肝治其本。黃連清伏暑。蔓
仁散鬱熱。以治標。首烏。鱉甲入肝而去瘧邪。蓋肝火熾盛。
逆胃。胃絡上蒸則爲汗。下迫則爲瀉。若見汗則收斂。見瀉
則固滯。一藥肆人足矣。醫云乎哉如方服之。數劑而愈。
濟生歸脾湯。人參。龍眼。黃耆。甘草。白朮。茯苓。木香。當歸。棗
仁。遠志。

何某年七旬矣。偶于冬間苦盜汗。乃水衰肝火內熾。當閉藏
之候。反蒸鬱而爲汗也。或教以黃芪。煮黑棗。服之四五日。
汗果止。而咳嗽作。或以爲痰火。與二陳姜汁竹瀝。或以爲血虛。
羌防風之類。或以爲痰火與二陳姜汁竹瀝。或以爲血虛。

與四物知母黃柏咸不效。已半年。診其脈則弦數而促。其症則痰多食少。天柱已傾。雙足浮腫。投以生地麥冬杞子地骨沙參女貞四劑無進退。已召畫工傳眞矣。告曰某本籍越中。今病已膏肓。量不可起。治任欲歸。第乞疏一方。俾可服多劑者。以希萬一耳。仍前方加熟地。婁仁與之。後二年偶遇之客坐。彼前致謝甚殷。余茫然叩其故。曰某何姓。昔患咳嗽幾斃。蒙惠方渡江後服二十餘劑。竟獲全愈。此再造之德也。視其容貌充腴。迥非疇曩。其病之痊殊意外矣。書此以爲輕信單方。并見汗治汗之戒。以此條與羅謙甫治王立甫婿

之案參看可見閉藏之令過汗雖屬危症亦非斷無生機。羅公於此有遺憾矣。

楊元植年四旬外。早衰鬚髮盡白。素患肝腎病。客吳門。病瘧
瘧愈而汗出不止。凡生脈飲六黃湯牡蠣龍骨五味黑豆
一切斂汗之藥莫不嘗之矣。吳醫技窮。乃遄歸。就予診脈。
但虛數。與熟地一兩。杞子五錢。棗仁五錢。麥冬一錢。蘿蔔仁
一錢。胡黃連四分。地骨皮三錢。一服減二服瘥。

趙坤維令正病。自首至胸。汗出如淋。動則尤甚。頗能食。然食
入則滿。回淋漓。衣領盡透。醫與玉屏風散。當歸六黃湯。俱
不效。延診。右關寸數大。問。回浮及齒痛否。曰。然。此少厥二
陰之火。上逆胃絡也。與重劑玉女煎。入杞子五錢。川連少
許。二帖而瘳。

楊兆成病瘧瘧愈大汗如雨。一日夜約斗餘。醫盡力與固表收濤。反較麻黃姜活爲甚。近診脈洪數有力。日啖粥十數甌。猶覺饑。蓋瘧時多服半夏豆蔻蒼朮厚朴藿香橘皮。諸燥烈之劑擾動胃火而然。若與六黃湯。則汗止而瘧必更作。乃用生地一兩。石膏五錢。黃連八分。麥冬三錢。蔓仁一錢半。一服減二服。瘧瘧亦不作。

張玉書年近六旬。素患陰虛火甚。兩手脈上溢入掌。心夏月偶不快。就混堂澡浴。以圖汗解歸而寒熱大作。頭痛兩耳後焮腫。上連承靈下至天牖。急邀余視。余適他出。別延外科。謂當成耳枕瘤勢甚危。投以搜風敗毒之劑。腦後肩甲

筋絡益抽掣急絆燥渴躁悶小便淋瀝如火迨余至困憊不支矣脈之洪數異常知其中熱邪在陽明少陽以陰虛過汗火就升上又爲風藥所鼓而然不可與柴胡乃君以黃芩石膏臣以鮮乾兩地黃佐以滑石生甘草使以連翹木通大劑飲之次日腫痛減腫處尙赤色前方入荳豆一合腫痛全消再與導赤散合六一散而愈。

徐靈胎曰治病之法不外汗下二端下之害人其危立見故醫者病者皆不敢輕投至於汗多亡陽而死者十有二三雖死而人不覺也何則凡人患風寒之症必相戒以爲甯暖無涼病者亦重加覆護醫者亦云服藥必須汗出而解。

故病人之求得汗。人人以爲當然也。秋冬之時。過暖尚無大害。至於盛夏初秋。天時暑燥。衛氣開而易洩。更加閉戶重衿。復投發散之劑。必至大汗不止而亡陽矣。又外感之疾。汗未出之時。必煩悶惡熱。及汗大出之後。衛氣盡洩。必陽衰而畏寒。始之暖覆。猶屬勉強。至此時雖欲不覆。而不能愈。覆愈汗愈。愈汗愈寒。直至汗出如油。手足厥冷。而病不可爲矣。其死也。神氣甚清。亦無痛苦。病者醫者及旁觀之人。皆不解其何故。而忽死。惟有相顧詫然而已。總之有病之人。不可過涼。亦不宜太暖。無事不可令汗出。惟服藥之時。宜令小汗。仲景服桂枝湯法云。服湯已溫。覆令微汗。不

可如水淋漓此其法也。至於亡陽未劇猶可挽回。傷寒論中真武理中四逆等法可考。若以脫盡無可補救矣。又盛暑之時病者或居樓上或臥近竈之所。無病之人一立其處。汗出如雨。患病者必至時時出汗。卽不亡陽亦必陰竭而死。雖無移徙之所。必擇一席稍涼之地而處之。否則神丹不救也。

裴兆期曰。一土人大病久虛後已大受餐且日服大補氣血之藥。兼旬越月宜其起矣。不謂飲食頓減遍體畏寒。自汗盜汗晝夜不止。已延二三名家。進以桂附參耆。汗愈多而寒益甚。參耆加至兩許亦不驗。余以姜活防風爲君。蒼朮

半夏爲臣。黃連陳皮砂仁厚朴茯苓桂枝浮麥爲使。一劑而汗收。並不畏寒矣。隨製人參大補脾丸與之。調理不踰月而康。蓋大病久虛之後。胃雖強而脾尚弱。易於加餐。難於運化。且湯藥之補無虛日。濕熱鬱於中宮。故飲食頓減。而多汗多寒也。人身捍衛之氣出於胃。胃旣爲痰涎所閉。則捍衛之氣不能布皮毛。充腠理。先哲謂中腕有痰。令人多寒。脾濕不流。令人多汗。此之謂也。其多汗而反用姜防者。以其腠理開疏。風氣乘虛來客。必先去其風。而汗始易收也。其畏寒而反用黃連者。以寒非虛寒。乃濕熱生痰所致之寒濕清。而寒自止也。凡人當大病之後。切不可恣投。

以藥無論藥謬。卽對病者亦不可不慎。蓋人之元氣以胃氣爲本。胃氣又以穀氣爲本。大病之人。與穀氣久疏。則所喜者食物。所惡者藥物理之常也。此際正當以食投其所好。以養胃氣。胃氣旺則元氣亦旺。不補之中有至補者。在安用此拂意之物。妨礙胃氣耶。今之醫者不明此理。每遇病久亡痊。必謂氣血兩虛。尙須大補。其藥不外當歸地黃。枸杞。故紙。山藥。蕤茲。麥耆。斧尤等類。不煎則丸。恣投無忌。有服之而飲食反減者。有服之而作瀉。作嘔。與腫滿者。甚至有膈脹不能食。而反生他症者。名爲補人。而實害人矣。可不戒哉。

可不戒哉

裴兆期治一萃廉爲諸生時。以遷居榮擾。復不免有少年事。
於秋盡冬初日。晡發熱。亦恬不爲意。裴診之。則六脈已虛。
疾無倫。爲之駭然。以人參五錢。桂附歸朮各二錢。囑曰急。
急煎服。庶可無虞。猶泄泄未之遽信。不移時。輒汗流如洗。
手足冷而目眩神疲。就枕不能佈語。始急以前藥。連服五。
六劑。人參加至一兩餘。勢乃稍定。脈尚幾幾。欲絕。越日往。
視脈狀如前。汗復以時至。裴卽宿於其家。用人參一兩。附。
子半枚。另用黃芪二兩。煎湯煮藥。凡四進汗。猶不止。時漏。
已三下。無處市藥。不得已以前渣合煎。以濟權時之急。至。
子後陽生。胃氣方回。啖糜粥二甌。肉食數箸。汗始漸止。脈。

亦自此有斂。天明急市參以繼之。調理而愈。

藜按此自汗之極重者。不惟陽虛。陰亦大傷。純用參芪桂附。已不免偏勝之弊。參入當歸。尤不合法。得藥渣甘淡之力。胃氣始回。復得粥食。助其胃氣。而汗始斂。非得力于參耆桂附也。

徐靈胎曰。經云奪血者無汗。奪汗者無血。血屬陰。是汗多乃亡陰也。故治汗之法。必用涼心斂肺之藥。何也。心主血。汗爲心之液。故當清心火。汗必從皮毛出。肺主皮毛。故又當斂肺氣。此正治也。惟汗出太甚。則陰氣上竭。而腎中龍雷之火。隨水而上。若以寒涼折之。其火愈熾。惟用大劑參附。

佐以鹹降之品。如童便牡蠣之類。冷飲一碗。直達下焦。引其真陽下降。則龍雷之火。反乎其位。而汗隨止。此與亡陰之汗。真大相懸絕。故亡陰亡陽。其治法截然。而轉機在頃刻。當陽氣之未動也。以陰藥止汗。及陽氣之既動也。以陽藥止汗。而龍骨牡蠣黃芪五味收澁之藥。則兩方皆可隨宜用之。醫者能於亡陰亡陽之交。分其界限。則用藥無誤矣。其亡陰亡陽之辨法何也。亡陰之汗。身畏熱。手足溫。肌熱汗亦熱。而味鹹。口渴喜涼飲。氣粗脈洪實。此其驗也。亡陽之汗。身反惡寒。手足冷。肌涼。汗冷。而味淡微粘。口不渴。而喜熱飲。氣微脈浮數而空。此其驗也。至於尋常之正汗。

熱汗邪汗自汗。又不在二者之列。此理知者絕少。卽此汗之一端。而聚訟紛紛。毫無定見。誤治甚多也。

又曰。汗出總由於心火不窟。屬熱者多。屬寒者少。今人皆用補陽治法。乃一偏之見。皆由不知汗出之液在何經也。誤人多矣。亡陽之汗。乃陽氣飛越。下焦空虛。此乃危急之症。非參附不能回陽。與自汗盜汗大不相同。醫者全然不知。并爲一病。貽誤無窮。深爲可笑。

尤在經曰。一人食鹹頭汗如注。食淡則否。診之心脈獨大而持指。因問曰。燥欲飲乎。曰然。每晨起舌必有刺。因悟所以頭汗出者。心火太盛。而水不勝之也。味鹹屬水。而能降火。

火與水持。火盛水微。不能勝之。而反外越也。其出於頭者。
水本潤下。而火性上炎。水爲火激。反從其化也。食淡則否。
者。鹹味湧泄爲陰。淡味滲泄爲陽。陽與陽從。不相激射攻。
得遂其滲泄之性。而下行也。

咳嗽

徽宗寵妃苦痰嗽。終夕不寐。面浮如盤。詔內醫李防禦用藥。
令供狀。三日不效。當誅。李憂撓技窮。與妻對泣。忽聞外間
呴云。咳嗽藥一文一帖。喫了。今夜睡得。李使人市藥十帖。
其色淺碧。用淡鹽水滴麻油數點調服。李疑草藥性廣。或

使臟腑滑泄併三爲一自試之旣而無他於是取三帖令
爲一攜入禁庭授妃請分兩服是夕嗽止比曉面腫亦消
上喜賜金帛直萬緡李念病卽安倘索方無以爲對令僕
俟前賣藥人過邀飲以百金賂其方乃蚌粉一物新瓦炒
令通紅拌青黛少許耳叩其從來曰壯而從軍老而停汰
頃見主帥有此方故剽得之以其易辦姑藉以度餘生無
他長也李給之終身槎菴文田按咳嗽症辛升太過腎小乘氣逆上故蚌粉以養其腎陰

所以能愈

潘塙曰予夏秋之交火嗽月餘晝夜不輟聲不能伏枕幾殆
羣醫皆主故常曰西方金司令肺氣盛耳當瀉或曰久嗽

肺虛當補或曰歟之愈子曰金初司令驛金也火尙未伏壯火也壯火能爍舞金濁之金愈弱火愈熾此嗽所以不能止也經曰無違時無伐化又曰無伐生生之氣今氣初生而濁之伐化也殆於不可况五火相煽肺失清化之令補之恐反助火歟之恐不能散火請更思之醫不曉各主所見饋藥不敢嘗日飲解毒涼膈散去硝黃加白朮以助胃氣晨服童便不時服梨汁瓜漿各十數杯醫乃暗投人參五味煎以予飲而子不知也飲之則愈嗽加喘乃專主已見飲前藥數日火退嗽止而病瘳矣褚記

室

解毒涼膈

散大黃芒硝甘草連翹黃芩薄荷梔子爲末加竹葉生蜜

漢陽庫兵王六病痰嗽并喘百藥不效于岳陽遇一道人教
用五味子白礬等分爲末每服三錢以生豬肺炙熟蘸末
細嚼白湯下兩服病遂不發久病乃可服此

本草綱目

張子和治東門高三郎病嗽一年半耳鳴三月矣嗽吐膿血
面多黑點身表俱熱喉中不能發聲曰嗽之源心火之勝
也秋傷于濕冬生咳嗽冬水既旺水濕相接隔絕于心火
火不下降反而炎上肺金被爍發而爲嗽金火既久聲反
不發醫補肺腎皆非也令先備西瓜冰雪等涼物次用涌
泄之法又服去濕之藥病日已矣

劉氏一男子年二十餘病勞嗽咯血吐唾枯臭不可聞秋冬

少緩春夏則甚寒熱往來日晡發作狀如瘡瘍痕汗如水
累服麻黃根敗蒲扇止汗汗自若也又服甯神散甯肺散
止嗽嗽自若也張先以獨聖散吐其痰狀如雞黃汗隨湧
出昏憒三日不省時時飲以涼水精神稍開飲食加進又
與人參半夏丸桂苓甘露散服之不數日乃愈

趙君玉妻病嗽時以十月矣張處方用陳皮歸身甘草白朮
枳壳桔梗趙以其不類嗽藥張笑曰君怪無烏梅鶯粟囊
乎夫冬嗽乃秋之濕也濕上逆而爲嗽此方皆散氣除濕
解結和經三服而愈

竇材治一人病咳嗽盜汗發熱困倦減食四肢逆冷六脈弦

緊乃腎氣虛也先炙關元五百壯予保命延壽丹二十九
鐘乳粉二錢間日服金液丹百丸一月全安

一人病咳嗽脈症與上條同但病人怕炙止服延壽丹五十
粒金液丹百粒鍾乳粉二兩五日減可十日脈沉緩乃真
氣復也仍服前藥一月全安蓋此病早不炙亦可遲必加
炙否則難治

凌漢章治里人病嗽絕食五日衆投以補劑益盛凌曰此寒
濕積也穴在頸針之必量絕逾時始蘇命四人分牽其髮
使勿傾側乃針果量絕家人皆哭凌言笑自若頃之氣漸

蘇復加補始出針嘔積痰斗許病即除

明史

一中年婦人乾咳寸脈滑動似豆狀。餘皆散大不浮左大干右每五更心躁熱有汗但怒氣則甚與桔梗貝母諸藥不效遂以石膏香附爲君。芩連青黛門冬瓜蔞仁陳皮炒柏歸梗爲臣。五味砂仁川芎紫苑爲佐。凡二十餘帖而安

醫學

目綱

崔某療久嗽熏法。每旦取欬冬花如鷄子大少許密拌花使潤約一升鐵器鎗中又用一瓦碗鑽一孔內安小竹筒或筆管亦得其筒少長置碗鎗相合及插筒處皆麵糊塗之勿令泄氣鎗下著炭火少時欬冬烟自竹管出以口含筒吸取咽之如胸中稍悶須舉頭卽將指頭捻竹筒頭勿令

漏烟出氣及烟盡止凡如是五日一爲之至六日則飽食
羊肉餛飩一頓永瘥一法不用鐺梔用有嘴瓦瓶燒藥蓋住瓶口却以口干瓶嘴吸烟咽之尤捷也

銜譚希曾咳嗽吐痰手足時冷以爲脾肺虛寒用補中益氣加炮姜而愈竇林以肢冷爲腎氣虛

一婦人患咳嗽脇痛發熱日晡益甚用加味逍遙散熟地治之而愈年餘因怒氣勞役前症仍作又太陽痛或寒熱往來或咳嗽遺尿此肺氣虛肝火盛而尿脬失制也用前散及地黃丸月餘而瘥

表弟婦咳嗽發熱嘔吐痰涎日夜約五六碗喘咳不甯胸痞

燥渴飲食不進崩血如涌此命門火衰脾土虛寒用八味丸及附子理中湯加減治之而愈

一婦人久咳嗽面白色痿黃或時㿠白肢體倦怠飲食少思稍多則瀉此脾土虛而不能生肺金朝用補中益氣湯夕用六君子湯爲主間佐以八珍湯三月餘漸愈後感寒邪喘嗽胸腹作脹飲食不入四肢逆冷此中氣尚虛不能充皮毛實腠理司開闔之所致也遂用六君加生姜及桔梗而愈

一婦人患勞嗽晡熱內熱寒熱往來作渴盜汗小便頻數其經兩三月一行此肝脾氣血虛損用八珍湯六味丸六十

餘劑。諸症漸愈。其經兩月一行。仍用前二藥。間以加味逍遙散。名三十餘劑。後恚怒適經行去血過多。諸症悉至。飲食少。思腹脹氣促。用十全大補湯數劑漸愈。仍用前藥調補。復因喪子。胸腹不利。飲食少。內熱盜汗。便血無寐。用加味歸脾湯。仍兼前藥而愈。

錦衣李大用。素不慎。起居吐痰。自汗咳嗽。發熱。服二陳芩連枳壳山梔之類。前症不減。飲食少。思用四物。二陳芩連元參知柏之類。前症愈甚。更加胸腹不利。飲食亦少。內熱。肺熱。加桑皮紫蘇杏仁紫苑桔梗之類。胸腹膨脹小便短少。用猪苓澤瀉白朮茯苓枳壳青皮半夏黃連蘇子胸膈痞

滿脇筋膨脹小便不通加茵陳草、慈、喘促不臥飲食不進
診之六脈洪數肺腎二部尤甚曰脾土既不能生肺金而
心火又乘之此肺癰之候也當滋化源緩則不救不信後
唾膿痰復求治胸膈痞滿脾土敗也喘促不臥肺金敗也。
小便不通腎水敗也脇肋膨脹肝木敗也飲食不化心火
敗也此化源既絕五臟已敗藥豈能生已而果然

孫客姚荃者素鬱怒年近六十脾胃不健服香燥行氣飲食
少思兩脇脹悶服行氣破血飲食不入右脇脹痛喜用手
按彼疑爲膈氣痰飲內傷曰肝木剋脾土而脾土不能生
肺金也若內有瘀血雖單衣亦不敢著肉用滋化源之藥

四劑諸症頓退。彼以爲愈。曰火令在廻。當保脾土以補肺金。彼不信。後復作。另用痰火之劑。益甚。求治左關右寸滑數。此肺內潰矣。仍不信。服前藥。果吐穢膿而歿。

嘉興周上舍。每至夏患咳嗽。服降火化痰之劑。咳嗽益甚。肺腎脈皆浮而洪。按之微細。此脾土虛不能生肺金。肺金不能生腎水。而虛火上炎也。朝用補中益氣湯。夕用六味地黃丸。而痊。後至夏。遂不再發。

一婦人不得於姑。患咳嗽。胸膈不利。飲食無味。此脾肺俱傷。痰鬱于中。先用歸脾湯。加山梔川芎貝母桔梗。諸症漸愈。後以六君加川芎桔梗間服全愈。

一婦人咳嗽脇痛或用清氣化痰降火等劑久不愈。更加內熱。晡熱若兩脇或小腹內熱。其嗽益甚。小便自遺。此屬肝經血虛火動。用六味丸加五味子滋腎水以生肝血。用補中益氣生脾土以滋肺金而尋愈。

上舍陳道復長子。虧損腎經。久患咳嗽。午後益甚。薛曰。當補脾土滋化源。使金水自能相生。時孟春不信。乃服黃柏知母之類。至夏吐痰引飲。小便頻數。目如緋薛。以白朮當歸茯苓陳皮麥冬、五味丹皮澤瀉四劑。乃以參芪熟地山茱爲丸。俾服之。諸症頓退。復請視以爲信。遂以前藥如常與之。仍泥不服。卒致不起。

陸養愚治吳氏妾寡居夜熱以煩勞感冒乾咳無痰醫與疏
風藥反增嘔惡更以二陳症不減而夜不能寐若失神志
煩亂不安脈之沉弦而數曰乾咳乃火鬱之甚最爲難治
况寡居多年其鬱可知雖有風寒但於養氣養血舒鬱清
熱中微加疏散若竟發其表升動陰火則病反甚重以二
陳之燥宜其煩亂不寐神志如失也用清氣養榮湯加黃
芩前胡薄荷杏仁蘇葉二劑咳嗽煩悶俱減第睡未安脈
微浮而數去蘇葉前胡杏仁加貝母知母山梔棗仁竹茹
大棗二劑諸症俱愈但四肢倦怠氣乏不足以息脈浮數
而弱此虛火已平真氣衰乏之候仍用前湯加貝母棗仁

更入人參一錢五分數劑而愈

陳曙倉室咳嗽或時純血或時純痰或時痰血相半夜熱頭眩胸膈不舒脚膝無力服滋陰降火藥已半年矣飲食漸少精神漸羸脈之兩寸關沉數而有力兩尺濶弱而微浮此上盛下虛之症也上盛者心肺間有留飲瘀血下虛者肝腎之氣不足用人參固本丸合空腹服之日中用貝母蘇子山楂丹皮桃仁紅花小薑以茅根煎汁入藥同煎十劑痰清血止後以清氣養榮湯與固本丸間服三月後病痊而孕

陸肖愚治吳遜齋患咳嗽身熱脇痛日輕夜重寢食俱廢咸

以年高病重爲慮。脈之左手浮弦。右手弦滑。曰此病極輕。何必憂疑。乃內有食積痰飲。外感風邪所致也。少爲消導。疏散卽愈矣。用蘇葉柴胡以解其表。青皮白芥以治其脇。桑皮前胡杏仁以治其嗽。陳皮半夏以清其痰。山楂枳實以消其食。二劑而減四劑脫然。

陸祖愚治費表母。生平飲酒多而穀食少。釀成痰火。每至五更則疾作。喘嗽頻併。氣逆息粗。不能伏枕。由來久矣。年近七旬。其痰大發。日夜昏暈數次。四肢厥冷。自汗如洗。形容瘦削。六脈如絲。或與清火清痰毫不應。乃用附子理中料。干杵蜜丸。淡鹽湯服。以助下元。另以知母貝母桑皮輩煎。

湯徐徐含嚥清其上膈數劑嗽稀喘止肢溫汗歟再用十
全大補湯料九服數十年痼疾從此遂瘳

陳三農之室遇夜嗽甚多痰作陰虛火動以四物換生地貝
母知母蘿蔔仁杏仁麥冬五味二劑而愈

孫文垣姪婦喉中癢痒咳嗽紅痰兩寸關洪大內熱生瘡山
梔小薊生地丹皮滑石青皮麥冬甘草黃連蘿蔔仁水煎服。
血止嗽除後遇勞卽咳嗽喉中血腥總由上焦熱甚而
然以枇杷葉山梔生地白芍甘草丹皮地骨皮天花粉滑
石紫苑常服三五劑兩月而安。

溫天衢冬月病目醫與發散太過至春間吐血碗餘及夏下

午潮熱咳嗽胸膈脹疼。早晨冷汗淋漓大便溏一日兩行。飲食少。肌肉消十之七脈數孫曰據症。脈法在不治。衆懇不能辭。乃用瀉白散加五味白芍貝母馬兜鈴。服下其夜帖然而臥不嗽。惟大便溏。前藥加扁豆山藥茯苓。汗亦漸止。復與瀉白散加石斛馬兜鈴貝母陳皮苡仁白芍山藥。五味桔梗。調理三月而痊。

琇按此與孫治吳肖峰內人注夏誤服參蘇飲成咳嗽。同爲發散所傷。世俗謂傷風不醒變成勞者是也。過表之害。詢然然亦有風寒痼閉不出而成勞者。魏君猶知其一。未知其二也。不知此等皆爲市醫不分虛實恣用。

疏散散病變之重而重者至死猶曰傷風不醒哀哉見癆
吳案

門

李士材治一人咳而上氣凡清火潤肺化痰理氣之劑幾無遺用而病不少衰診其腎脈大而軟此氣虛火不歸元用人參三錢煎湯送八味丸五錢一服而減後用補中益氣湯加桂一錢附子八分凡五十劑及八味丸二斤而痊

一人經年咳嗽更醫數十人藥不絕口而病反增劇自謂必成勞嗽李曰不然脈不數不虛惟右寸浮大而滑是風未解必多服酸收故久而彌甚用麻黃杏仁半夏前胡桔梗甘草橘紅蘇子五劑減十劑已

馮楚瞻治李孝廉患咳嗽甚頻視其身長肥白頰色常紅知爲表有餘而裡不足上假熱而下真寒病必當劇勸以重服藥餌時有通譜新貴甚精醫藥乃託其治所用乃山梔黃岑花粉橘紅貝母蘇子杏仁之類止之勿聽數劑後嗽轉甚煩躁喜冷倍常益信寒涼爲對症倍用之轉劇再進煩躁更甚粒不下咽飲水無度更以爲實熱以三黃丸下之利行不多漸加喘促再劑夜半喘大作有出無入遍身麻木潰汗如雨神昏目直口噤不言委頓極矣亟招馮診兩寸左關僅存時當六月欲與四逆理中主人畏懼改以人參一兩麥冬二錢五味六分肉桂錢許始允急煎服之

喘減片刻。奈病大藥小頓復大作。乃不咎寒涼之誤。反以參桂爲罪矣。因思盡吾之力。尙可以活。若徇彼之見。必死而已。乃堅定一方。勒令服之。用炒白朮三兩。人參二兩。炮姜三錢。五味子一錢。五分製附子三錢。煎濃汁灌之下。後病人張口大聲云。心中如火烙欲死。此不與冷服故傍觀疑怨交起。不爲動。頃之又大聲曰。臍間更疼更熱欲死矣。乃竊喜其陽能下達。未之絕也。果少焉喘定。汙收手足溫而神思清。語言反甚無力。此方尤多參少者。因中宮久困寒。冷不先爲理中。則陽氣難下達也。

呂東莊治徐鸞和內病咳嗽。醫以傷風治之。益甚邀診。則中

虛脈也。曰：鼻塞垂涕，痰急皆傷風實症。何得云虛？曰：此虛實真假所辨在脈。庸醫昧此，誤人多矣。彼不知脈，請卽以症辨之。其人必晡熱潮熱，至夜半漸清，至晨稍安。然乎？然，則中虛何疑乎？所言喜者，正此鼻塞垂涕耳。乃投以人參白朮，當歸黃芪，白芍各三錢，軟柴胡升麻各一錢，陳一皮，甘草五味各六分。三劑而咳嗽立止，再診謂之曰：上症已去，唯帶下殊甚。近崩中耳。驚應曰：然卽前方重用人參，加補骨脂阿膠各二錢，數劑兼服六味丸而愈。

柴嶼青治陳氏甥女，咳嗽吐痰，夜間發熱，衆醫以爲必成勞症，診其脈雖稍洪，尙有根柢，並非細數，何至不治？純用滋

陰之藥調養半年而愈。

同學蔡爲章患痰嗽，夜難就寢，身不勝衣，夜臥床不能轉側。診其六脈微弱，氣血兩劇，擬用參芪補劑。蔡以痰嗽不宜用補爲疑，乃力任之。先用六君子湯加炮姜桂附，數帖而嗽減，繼用養榮湯十數劑，始能下牀行動，調理月餘而康。張惕中咳嗽吐痰，醫誤認風寒，服藥十數劑，病增劇，身熱喘嗽，夜不能臥，胸膈痞塞，困於床第，小便短縮，診得人迎脈緩絕，非外感氣口空大，左寸弱甚，兩沉微微。此心腎不足的係內傷之症，其小便不利者，三焦之氣化不能運于州都也。從東垣治內傷條，師其意而變通之，旬日而痊。

左中丞夫人年二十餘形體瘦弱痰嗽息粗夜不能寐醫頻與消痰理氣愈委頓。診其脈甚微細此氣虛也。仲景云氣虛有痰。腎氣丸補而逐之。遂用六味湯加麥冬、五味治之而愈。惟夜間尚未熟睡。再用養榮湯加茯神棗仁十數劑卽加餐安睡漸得復元。

丙寅新正回卿諱伊喇齊長郎賀節至寓云咳嗽求方。診其兩脈細數右寸鬱結斷其難以收功。勉用麻黃湯。伊斷斷不可。曰我子陰虧。他醫熟地人參服過數兩柴曰陰虧誠然但風邪閉塞肺氣。補劑又從而壅遏之。非此不能去邪。力爭不信。早決其不起。果然。

琇按凡損症脈見右寸厥厥然如豆按之梗指其病原屬不起以肺金敗也今以右寸鬱結斷爲風邪閉塞然必見鼻塞聲重或頭痛痰濃或咳嗽連續方是其候

王肯堂治一婦人咳嗽不已服諸藥不效漸成勞瘵診之六脈濡弱此血弱又因憂感太過而成斯疾合用當歸等藥

治之必愈遂先以古今錄驗橘皮湯空心服蘇子降氣湯徐用金鎖煎熟地黃丸當歸丸調理而安 橘皮湯文田

按今見千金方五十四卷橘皮麻黃各三兩柴胡乾紫蘇各三兩宿姜杏仁各四兩石羔八兩右七味㕮咀水九升煎麻黃兩沸去沫下諸藥煮取三升分三服

張路玉治吳江郭邑侯喘嗽氣逆。診之兩尺左關弦數，兩寸右關濶數，弦者腎之虛，濶者肺之燥。夏暑內伏肺絡，遇秋月燥收之令，發爲咳嗽也。自言每歲交秋則咳，連發四載，屢咳痰不出，則喘至夜不能臥，咳嗽劇則大便枯燥，有血。曾服越脾湯，嗽卽稍可。張曰：公腎氣素強固，水虧火旺，陰火上熾，肺金燥不能生水。咳甚則便燥，有血者，肺移熱于大腸也。此耳。含有千金麥門冬方，除去半夏、生姜之辛，燥易以葳蕤、白蜜之甘潤，藉麻黃以鼓舞麥冬、生地之力，與越脾湯中麻黃石膏分解互結之燥熱同一義也。郭曰：諸醫咸詆麻黃爲發汗重劑，不可輕試。僅用杏仁蘇子甘

梗前胡等藥服之其咳轉甚何也。曰麻黃雖云主表今在
麥門冬湯中不過借以開發肺氣原非發汗之謂。麻黃在
大青龍湯麻黃湯麻杏甘石湯方其力便峻。以其中皆有
杏仁也。杏仁雖舉世視爲治嗽通藥虛實混用然辛溫走
肺最不純良耗氣動血莫此爲甚熬黑入大陷胸丸。佐甘
遂等搜逐結垢性味可知。遂用前方連進二劑。是夜便得
安睡。脈弦雖未退按之稍喫氣口則虛濡之力與六味生
脈加葳蕤白蜜作湯四服嗽頓減。卽以此方製丸恒服至
秋無復嗽之虞。先是公子柔症用桂枝湯及六味作湯
加蝎尾服之而瘥。其後夫人素有敗瘀生道左右兩脇俱

有結塊大如覆盆發則咳嗽喘逆腹脇掣痛六脈止促按之少力用六君加胆星枳實香附沉香二劑大吐稠痰結垢一二升。嘔止嗽甯不必更進他藥矣。

何督學媳素常咳嗽不已痰中間有血點恆服童真丸不徹以父歿哀痛迫切咳逆倍常痰中雜見鮮血因與瑞金丹四服仍以童真丸烏骨雞丸調補而安

勞太夫人年五十餘素稟氣虛多痰數日來患風熱咳逆咳甚則兀兀欲吐且宿有崩淋近幸向安法當先治其咳以桔梗湯加葳蕤白薇丹皮橘紅蜜煎生姜四劑撤其標症次與六君子加葳蕤以安胃氣繼進烏骨雞丸方療其痼

疾以久不茹葷不忍傷殘物命改用大溫經湯加麋茸角
腮作丸藥雖異而功則一也

陳三農治一婦咳嗽痰喘飽脹水火不通眠食俱廢以人參
白芍爲君蘇子炒研細爲佐枇杷葉三大片白茯苓佐之
二服得眠大小便通

東坡蓋公堂記云始吾居鄉有病寒而咳者問諸醫醫以爲
蠱不治且殺人取其百金而治之飲以蠱藥攻伐其腎腸
燒灼其體膚禁切其飲食之美者期月而百病作內熱惡
寒而咳不已纍然真蠱者也又求于醫醫以爲熱投之以
寒藥旦夕吐之暮夜下之于是始不能食懼而反之則鍾

乳烏喙襍然並進。而漂疽癰疥眩瞀之狀無所不至。三易醫而病愈甚。里老父教之曰。是醫之罪藥之過也。子何疾之有人之生也。以氣爲主。食爲輔。今子終日藥不釋口。臭味亂于外。而百毒戰于內。勞其主。隔其輔。是以病也。子退而休之。謝醫却藥。而進所嗜。氣全而食美矣。可以一飲而效。從之期月而病良已。容齋五筆

後文節

薛立齋治甥范允廸。咳嗽痰盛。胸腹不利。飲食少思。肢體倦怠。脈浮大。按之微弱。服二陳枳壳等藥愈甚。肺脾腎虛也。用補中益氣湯六味丸而愈。

萬密齋治監生胡篤菴。咳久不止。汗之不可下之不可。因表

裏之邪俱甚也爲製方用蘇葉薄花葉桑白皮杏仁霜瓜
蔓霜桔梗甘草等分爲末虛者阿膠蜜丸白湯下或口中
噙化五日而安後以治人多效

立齋治一癲婦咳而無痰日晡發熱脈浮數先以甘桔湯少
愈後以地皮骨散而熱退更以腎氣丸及八珍湯加柴胡
地骨皮丹皮而愈丹溪云咳而無痰者此係火鬱之症及
痰鬱火邪在中用苦梗開之下用補陰降火之劑不已則
成勞嗽此症不得志者多有之又原病式曰人瘦者腠理
疏通而多汗血液衰少而爲燥故爲勞嗽之痰也 文田
按薛方誠未盡善然癰症少陽盛而少陰虛立齋之偶驗

亦倖中耳予亦嘗見癥症須用附子而後愈者至少陽之用柴胡則中廉定理王氏治病從溫病人故頗畏尤附而酷惡柴胡所謂過猶不及矣

癥癥爲勞怯之根加以乾咳

潮熱則勞症成矣此數方者烏足以愈之大約薛氏因丹溪有此論故附會

言之否則其病少衰便以爲愈耳不足信也

一男子咳嗽氣急胸膈脹滿睡臥不安以草薢散二服少愈

更以桔梗湯而瘥

一男子咳嗽項強氣促脈浮而緊以參蘇飲二劑少愈更以

桔梗湯四劑而痊

馬元儀治楊咸時咳嗽多痰氣逆作喘自汗不食已兩月脈之虛微無神此勞倦致傷肺脾也經云勞則氣耗氣與陰

火勢不兩立。氣衰則火自勝。土虛既不能生金陰火又從而尅之。故喘嗽而汗作矣。若行疏泄以定喘止嗽是耗散其氣也。用人參一錢黃芪五錢炙草五分貝母一錢杏仁蘇子各二錢紫苑桔梗防風以佐之。兼進七味丸以培土母歸脾大造膏以實肺脾而愈。

來天培治一婦年一旬餘季夏酷熱患咳嗽頭痛發熱胸膈不舒或以蘇杏前貝生地黃芩治之轉甚視其面色浮腫懶言氣怯咳嗽聲微胸膈脹滿飲食不下六脈微弱此風寒內伏裏虛致感也始宜以參蘇飲倍姜棗一二劑可已。今增虛矣非薑附不能瘳也以補中益氣湯去升麻柴胡

加川芎炮姜附子一劑汗出遍身。腫脹漸消。再劑熱退。改用八珍加姜附二劑而咳嗽除。終以歸脾加熟地炮姜四劑聲高食進矣。彼云舊有風症。兩手不能舉。今服藥乃能舉于頭矣。此治病必求其本之謂歟。

沈明生治金斐文夏患咳嗽清痰續續不已。時風熱嗽甚多。金謂所投之劑非疏風化痰卽清金滌熱及診曰是非溫補不痊。金駭愕問故。曰君以外感盛行之際。必無內因者耶。初得之症必無屬虛者耶。是則時有一定之方症。有一定之藥人皆可以爲醫矣。夫嗽屬外因必肺氣脹滿咳嗽相屬。或兼頭疼鼻塞涕唾稠濃聲壯氣壅脈浮數有力。或

人迎脈大。此爲外因。今脈不浮而沉。非風也。不數而緩。非熱也。按之不鼓。非有餘也。噦雖頻而氣短。不續。痰雖多而清薄不濃。若疏解則徒耗肺家之金。清涼則轉瘡中州之土。是欲去病而反重病也。宜用補中益氣與六君子參合。複方藉參芩朮以補肺之母。使痰無由生。藉橘半升柴以升清降濁。則噦可不作。一二劑噦微減。再服浹旬而愈。吳橋治鄱陽王令領邑甫及期。病咳嗽。唾痰稠黏而臭。且雜以血。久之潮熱失聲。食少肉消。閉戶踰月。將乞骸骨歸。幸橋至診之。橋獨任其無害。令愕然。且固問橋。橋曰。此肝氣凌脾。治者謬以爲陰虛火動。劑涼則脾益滯。津液不通。肝

愈熾而無所制矣。法當扶脾抑肝。三劑如脫七劑而出視

事集

太函

徐靈胎曰。咳嗽由於風寒入肺。肺爲嬌臟。一味誤投。卽能受害。若用熟地麥冬。萸肉五味等滋膩酸斂之品。補住外邪。必至咯血失音。喉癬。肛癰。喘急。寒熱。近者半年。遠者三年。無有不死。蓋其服此等藥之日。卽其絕命之日也。間有見機而停藥者。或能多延歲月。我見以千計。故今之吐血而成勞者。大半皆因咳嗽而誤服補藥所致也。或云五味子。乃仲景治嗽必用之藥。不知古方之用五味必合乾姜。一散一收。以治寒嗽之症。非治風火之嗽也。况加以熟地麥

冬則受禍尤烈。又嗽藥中多有桔梗。桔梗升提甘桔湯中用之。以載甘藥上行。治少陰之喉痛。與治嗽宜清降之法者非宜。苟誤服之。往往令人氣逆痰升。不能著枕。凡用藥當深知其性。而屢試屢驗。方可對病施治。無容冒昧也。

張叔吟曰。亦有咳嗽屬於陰虛肺燥者。誤投溫散。刲其津液。必成勞損。卽此論之對面也。醫者臨症。可不詳審其病情哉。

徐靈胎曰。今之醫者。謂吐血爲虛勞之病。此大謬也。夫吐血有數種。大概咳者成勞。不咳者不成勞。間有吐時偶咳者。當其吐血之時。狼狽頗甚。吐止卽痊。皆不成勞。何也。其吐

血一止。則週身無病。飲食如故。而精神生矣。即使亡血之後。或陰虛內熱。或筋骨疼痛。皆可服藥而痊。若咳嗽則血止。而病仍在。日嗽夜嗽。痰壅氣升。多則三年。少則一年而死矣。蓋咳嗽不止。則腎中之元氣震蕩不甯。肺爲腎之母。母病則子亦病。故也。又肺爲五臟之華蓋。經云。穀氣入胃。以傳於肺。五臟六腑。皆以受氣。其清者爲營。濁者爲衛。是則臟腑。皆取精于肺。肺病則不能輸精於臟腑。一年而臟腑皆枯。三年而臟腑竭矣。故咳嗽爲真勞不治之疾也。然亦有咳嗽而不死者。其嗽亦有時稍緩。其飲食起居不甚變。又其人善於調攝。延至三年之後。起居如舊。間或一發。

靜養卽愈。此乃百中難得一者也。更有不咳之人。血症屢
發。肝竭肺傷。亦變咳嗽。久而亦死。此則不善調攝以輕變
重也。執此以決血症之死生。百不失一矣。

久嗽不愈。由於肺虛有火。法當清肺潤肺。忌用澀燥閉氣之
藥。設若誤用粟壳訶子。俾火壅於肺。不得下降。若兼參朮
半夏。卽死不旋踵矣。世醫往往蹈此覆轍。相尋。卒無悟者。
聊爲論著。敢告方來。廣筆記

葉天士治陸某咳嗽。乃秋暑燥氣。上受先干於肺。令人咳熱。
此爲清邪中干。當以辛涼清潤。不可表汗。以傷津液。青竹
葉連翹花粉杏仁象貝。六一散。

又陸某濕必化熱。薰蒸爲嗽。氣隧未清。納穀不旺。必薄味靜養壯盛。不致延損。飛滑石花粉、象貝、苡仁、綠豆皮通草。

胡某年六十六。脈右勁。因疥瘡。頻以熱湯沐浴。衛疏易傷冷熱。皮毛內應乎肺。咳嗽氣塞痰多。久則食不甘便。燥結胃津日耗。不可供肺。况秋天降燥。氣上加漸。至老年痰火之象。此清氣熱以潤燥。理勢宜然。倘畏虛日投滯補益。就枯燥矣。霜桑葉、甜杏仁、麥冬、玉竹、白沙參、天花粉、甘蔗漿。

甜梨汁熬膏。徐靈胎曰老年而無外感之嗽。麥冬、玉竹亦可用。

一人年四十。脈弦胸膈痺痛。亥嗽頭脹。此燥氣上侵。肺氣不宣使然。當用輕藥以清上。焦桃杷葉桑葉川貝母杏仁冬。

瓜子

一人年二十七脈細促久嗽寒熱身痛汗出由精傷及胃用黃芪建中湯去薑

又一人年二十四脈弦右大久嗽背寒盜汗用小建中去薑加茯神

徐靈胎曰咳嗽服姜必吐血并能令人失音去之爲宜此亦人所不知也風嗽挾火者服桂枝必吐血百試百驗又曰葉氏用建中諸法治久嗽而中宮虛乃補母之義真古聖相傳之正法也若陰火虛勞之嗽與建中正相反也葉氏用此得手而誤施於虛勞亦辨之不審耳

馮長年孝廉。素患陰虛咳嗽而犯時氣。遂用葱白香豉湯。加人中黃童便三日而安。又一地師宿有血症。亦感時氣。卽用前湯。更加犀角丹皮。服後大便下血而愈。王公峻治一孕婦風熱咳嗽。已經發散後。胎上逼心。上氣倚息。咳則遺漏。用紫蘇飲去川芎。腹皮加葳蕤。白薇一劑而胎安。張誕先治一少年陰虛而傷秋燥。當時火炎乾咳。五心煩熱。妄夢失精。小水時白。時黃杪秋。忽大咳嗽。坐間遍地清痰。周身凜凜畏寒。肌表微微發熱。咳甚則嘔。嘔則鼻衄如注。小便結燥。小水如淋。先用異功散去丸。加山藥次與六味丸。加麥冬五味。半月而嗽方止。歷推治驗。凡陰虛而更感風。

案未有不重在本病者。大抵火炎乾咳。悉是陰虛。古人雖有腎肝同治之論。然細格病情。多屬腎水枯竭。肝臟多火之證。所以只宜壯水制陽。而導火之法。斷斷不可輕試也。薛一瓢曰。久咳移邪犯胃。因咳而肺肅無權。故氣升逆。勿用瀉損肺氣之藥。水梨去心帶皮搗爛。絲棉濾清。慢火煎膏。收入磁瓶內。每日開水送下五錢。

古人造字。兩火着力爲勞。故爲君相二火而說。溫補中州以靜痰之源。補下焦以益水之源。但病勢已深。恐非一繫可破也。熟地枸杞子。元參牛膝茯苓紫石英。橫則爲坎。豎則爲水。中間一點真陽。水虧則露爲龍火。震下。

之陽與之同源。升爲雷火。所以雷爲木屬。皆陰中之火也。純陰之藥愈澀愈熾。一切草木無能制之。當用一元丹。久服愈矣。滌秋石五六斤。紅棗漿爲丸。早服五六錢。晚服二三錢。以陽秋石點湯送下。

脈弦數尺獨大。咳而喉痛失音。在數載失血之後。其陰虧火炎。不言可喻矣。惟有至靜之品引陽潛入陰中。庶近內經之旨。然須作靜攝工夫。使陰密陽密。得坎離相交之力。爲妙。熟地用海石粉搗爛。金石斛北沙參茯苓麥冬。生白芍。龜腹板山藥。

此病起於費心勞碌。風寒不節。遂致咳嗽吐痰。久則內傷。

內傷者內中之臟氣傷也卽古人所謂虛勞總不得愈必
須絕去費心勞碌之事一毫凡念不起助之以藥或可延
年麥冬阿膠桔梗炙草沙參苡仁茯苓

此真陰虧證俗名百日勞也稍有伏暑所以寒熱愈甚惜
乎治之不早爾熟地茜草青蒿元參滑石丹皮

脈得數而且弦此陰虧證也並非外感今以虛火升而頭痛。
漸有金水兩傷之勢靜攝乃得藥餌其次也熟地女貞子
麥冬龜板元參澹秋石棗漿爲丸開水送下

心陰虛則多汗肺陰虛則多嗽肝陰虛則火升腎陰虛則發
熱脾陰虛則便溏非一真陰乎。性症之漸也但知頭痛醫

頭之爲良醫不知履霜堅冰至君子其爲憂危之心也炒

白芍小生地麥冬棗肉桂枝尖甘草青蒿梗雲苓

此由金水不相承拒故咳久不愈切勿理肺肺爲嬌臟愈
理愈虛亦不可泛然滋陰北沙參玉竹雲茯神川石斛甜

杏仁生扁豆

治咳嗽神方甜杏仁一兩去皮尖搗如泥分爲三服每服加
冰糖三錢開水沖連末服下早晚各一次三服愈煎服則

不驗

續名醫類案十六卷

錢塘魏之琇編集

海昌王士雄孟英
定州楊照藜素園 同校

痰

洞虛子曰：痰之爲病，成偏頭風，成雷頭風，成太陽頭痛，眩暉，如坐舟車。精神恍惚，或口眼瞓動，或眉稜耳輪俱痒，或頷腮四肢遊風，腫硬似疼非疼，或渾身燥痒，搔之則陰疹隨生，皮烘熱，色如錦斑。或齒頰似痒似痛，而無定所，滿口牙浮，痛痒不一。或噯氣吞酸，鼻聞焦臭，喉間豆腥氣，心煩鼻

塞。咽嗌不利。咯之不出。嚙之不下。或噴嚏而出。或因舉動而吐其痰如墨。又如破絮。或如桃膠。或如蜋肉。或心下停水。鐵閉滯室。妨悶。嘔嘔連聲。狀如膠氣。或寢夢如刑戮刀兵劍戟。或夢入人家四壁圍繞。暫得一竇。百計得出。則不知何所。或夢在燒人地上。四面烟火枯骨焦氣。撲鼻無路可出。或因觸發忿怒。悲啼雨淚而寤。或時郊行。忽見天邊兩月交輝。或見金光數道。回頭無有。或足膝痠軟。或骨節腳腰腎疼痛。呼吸難任。或四肢肌骨間痛如擊戩。乍起乍止。並無常所。或不時手臂麻疼。狀如風濕。或如芒刺在背。着膚。或如毛蟲所螫。或四肢不舉。或手足重滯。或眼如薑。

蟄。膠黏痒澑。開闔甚難。或陰晴交變之時。胸痞氣結。閉而不發。則齒痒咽痛。口糜舌爛。及其奮然而發。則噴嚏連聲。初則唾稠黏。次則清水如注。或眼前黑暗。腦後風聲。耳內蟬鳴。筋瞞肉惕。治之者。或曰腠理不密。風府受邪。或曰上盛下虛。或曰虛。或曰寒。或曰發邪。惟洞虛子備此苦疾。乃能治療病勢之來。則胸腹間如有二氣交紐。噎塞煩鬱。有如烟火上冲。頭面烘熱。眼花耳鳴。痰涎涕淚。並從肺胃間涌起。凜然毛竅噴嚏千百。然後遍身煩燥。則去衣凍體。稍止片時。或春秋乍涼之時。多加衣衾。亦得暫緩。或頓飲冷水而定。或痛飲一醉而甯。終不能逐去病根。乃得神祕沉

香丸屢獲大效愈人萬數。但不欲輕傳匪人。故以詩隱括之。詩曰：甌裏看翻甲帶金。於今頭戴草堂深。相逢二八求斤正。硝煨青礞倍若沉。十七兩中沉半兩。水丸梧子意須斟。驅除怪病安心志。水瀉雙身却任。大黃蒸八兩。黃芩八兩。青礞石一兩。硝煨如金色。沉香半兩。

孫兆治綵白舖劉員外。患傷寒六七日。晝夜不得眠。方眠卽起。方起卽倒。未嘗少息。時復身上冷出汗。孫診之。尺寸脈皆沉。關中亦沉重。胗之鼓擊於指上。此寒痰積聚於胸中也。遂用陳皮半夏乾薑三物各一兩爲飲。生薑半兩搗碎。以水兩碗煎七分去渣。分二服。服藥經時遂睡。經一晝夜。

不甦。既覺下痰一塊如雞子大。其病遂愈。凡痰皆有冷汗。其症明矣。

張子和治一婦人。心臍上結硬如斗。按之若石。人皆作痞治。鍼灸。毒藥。禱祈無數。如捕風然。一日張見之曰。此寒痰也。胗其兩手寸關皆沉。非寒痰而何。以瓜蒂散吐之。連吐六七升。其塊立消過半。俟數日後再吐之。其涎沫類雞黃腥臭。特殊。約二三升。凡如此者。三以人參調中湯五苓散。調服以平矣。

朱丹溪治白雲許先生。始因飲食作痰成脾疼。後累因觸冒風雪。腿骨作疼。衆皆以脾痰骨疼爲寒。雜進黃牙等藥。雜

治十餘年間艾炙數萬計或似有效及至病再作反覺加重至五十一歲時又冒雪乘船而病愈加至坐則不能起扶起亦不能行兩胯骨不能開合若脾疼作時則兩胯骨痛處似覺稍輕若飲食甘美脾疼不作則胯骨痛增重諸老袖手計無所出朱謂此初因中腕有宿食積痰雜以冲冒寒濕抑遏經絡血氣津液不行痰飲注入骨節往來如潮其涌而上則爲脾疼降而下則爲胯痛非涌泄之法不足以治之時七月二十四日遂以甘遂末一錢入豬腰子內煨以食之連瀉七行至次日兩足便能行步至八月初三日嘔吐大作不能起床顆粒不食但時煩躁氣弱不能

言語諸老皆歸罪於七月之瀉而又知累年之熱補俱悞
皆不敢用藥。朱嘗記金匱云：病人無寒熱而短氣不足以
息者，此實也。其病多年鬱結，一旦以刀圭之劑泄之，走動
猖狂之熱未有制御之藥。所以如此，仍以吐劑達其上焦。
以次第治及其中下二焦。於初三日用瓜蒂吐不透。初六
日用梔子又吐不透。初九日用附子三枚，和漿與之。始得
大吐，嘔噦終日。前後所吐共得膏痰沫液一大水桶。初十
日遂以朴硝滑石黃芩石膏連翹等涼藥咬咀一斤，蒸濃
汁放井水中極冷飲之。十一十二十三十四日每日食上
件藥一盞。十五日腹微滿，大小便皆祕悶。朱欲用大承氣

下之諸老皆以爲不可。十六日六脈皆歇止。朱胗其脈獨歇止於酉二時。其餘時刻平和如舊。朱曰。卯酉爲手足陰陽之應。卯時屬大腸。酉時屬胃。此大腸與胃有積滯不行。當速瀉之。爭論不已。至十八日遂作紫雪半斤。十九日紫雪成。成每用一匙頭。以新汲井水化下。至二十日天未明已服紫雪五兩。神思少安。腹滿亦減。秀按觀于此案丹溪之大智神勇卓識定力。色色可臻絕頂。若少一游移大事去矣。景岳輩每疵議丹溪之學。不知遇此大症能措手否。遂收起。紫雪不與二十一日大爲小便閉作痛所苦。遂飲以蘿蔔汁半茶盃。隨手痛止。小便立通。二十二日小腹滿痛不可。挾摸。神思不佳。遂以大黃牽牛作丸服。至三百丸。至二十

三日已時大小便併通。如爛魚腸三碗許。臭惡可畏。是日
神思少安。胗其脈不歇止矣。二十四日腹大絞痛。殆不能
勝者。約一時許。腰胯沉重且墜。兩時不出聲。不能言。瀉下
穢物如榆油條者一尺許。肚中如燒。片時方定。至二十五
日神思漸安。夜間得睡。二十六日漸出聲言語。自初二日
至此。並顆粒不曾入口。語言並不出聲。至二十七日方啜
半盞稀粥者四次。似有生意。至次月初四日方平安。其脈
自嘔吐至病安日。皆平常弦大之脈。唯有中間數日歇止
少異耳。至次年四月復行倒倉法。方步履如初。

徐東皋治匡掌科夫人年三十餘病。胃腕連胸脇痛。日輕夜

重兩寸關脈弦滑有力諸醫以爲積滯凝寒用發散及攻
下藥繼用鐵刷散四磨飲等方俱不效後至湯水皆吐而
不納經月不食痛且益甚徐謂其爲痰鬱明矣但痛久弱
甚不敢行吐法奈何偶一醫謂五靈脂沒藥素用有效歟
皆哂之曰此藥用之久矣多矣徐謂再用亦無妨何哂之
有彼用酒調服病者到口便吐隨吐綠痰兩碗許痛卽止
遂納飲食此蓋痰在上下之亦不去必得吐法而後愈經
曰有故無隕此之謂也歟全書

孟望湖淮安人耳中聞人聲悉是祖考談其家擾撓不休邀
劉春齋醫治胗之曰暴病謂之胃火怪病謂之痰用滾痰

丸下之而痊

續金陵瑣事

一男子吐痰。胸膈不利。飲食少思。服海石瓜蒌之類。不應。曰此脾氣虛弱。不能消導而爲痰。當健脾爲主。彼不信。又服驅逐之劑。其痰如漏。四肢浮腫。小腹腫脹。小便滯滯。曰此復損脾腎所致也。先用金匱加減腎氣丸。補中益氣湯。治之。諸症漸減。又用八味九兼前湯。而愈。

一男子素吐痰。遇怒其痰益甚。胸膈痞滿。此肝木制脾土也。用六君子湯加木香。治而愈。

一婦人吐痰。頭暈。帶下青黃。用四七湯送白丸子。小柴胡加白朮。茯苓。治之而安。

舊僚錢可久素善飲而赤痰盛大便不實薛以爲胃炎壅帶
用二陳芩苓連山梔枳實乾薑澤瀉升麻一劑吐痰甚多。
大便始實此後日以黃連三錢泡湯飲之而安。

一婦咳嗽其痰上壅日去五六碗作氣虛水泛爲痰用六味
丸料及四君子各一劑而愈。

陳三農治一人痰出盈盆不止脈豁大無力此內傷不足之
症用人參附子各五錢乾薑草撥梔榔枳壳一劑而愈。

一人滿口痰珠至舌尖則成大泡綿綿不絕此火熱在胃大
寒在肺也。肺與胃息息相通斷無胃熱而肺反寒之理矣且試觀其用藥殆胃熱輕而肺寒重耳用

參附湯保定肺氣後砂仁益元散散瀉胃火而安

一人痰涎壅盛。汗出不止。此脾虛不能攝痰。而肺失所養。切不可作痰治。只補脾胃爲主。用參朮煨薑各二錢。半夏一錢。煎服愈。

陸養愚治董濤陽夫人。稟氣怯弱。性情沉鬱。年三十得一病。晚間發熱。天明始止。飲食漸減。煩躁不安。初服補血養陰。年餘轉羸瘦。又服參耆補氣不效。醫謂脈已歇止。恐不能久。診之右手果然。左手但微弱而數。詢其月事。則先期而少。曰。先期是血熱。應左手之數少。是血虛。應左脈之微。脈症相應。右手歇止。此必鬱痰伏在氣分。故脈結不至。非死脈也。第發熱必有所起之處。令詢之。則曰右脇一團熱起。

漸延遍身。再問熱起處必有結而成形者。按之果有柔塊如碗狀。曰不足憂也。攻去其塊。諸症自愈矣。爲製一方。香附一斤醋製。與巴豆二兩同炒至巴豆黑色去之。醋打麪糊爲丸。梧子大米飲下五十九日三服。又用四物湯加山梔貝母白蔻仁木香薑棗煎。日一劑。半月塊消。肌肉漸長。一月精神爽健矣。

陸肖愚治李安吾正室不育及納妾則俱孕生子出痘正者死而妾者生悲愁彌月。遂胸脇脹痛。每臥必令人於背上搘之。良久方得就枕。片時臥不能仰。仰則氣漏而喘。食減肌消。月事數月不行。脈之寸沉而數。闊沉而滑。尺沉而弱。

脈與病應。此鬱火成痰之症也。用調氣養榮湯加白芥子。
信霞天麴數劑。胸脇少舒。可仰臥矣。第大便五日不行。
腹脹急。與滾痰丸二錢。又慮元氣不足。改用補氣養榮湯。
二劑。大便去燥矢數枚。後出皆痰積。脹痛減後。與補藥間。
服月餘而安。

吳遜齋體肥。素有酒積。胃腕作疼。近又肢節疼。而下體更甚。
或以爲風。用史國公酒酒療之時。作時止。改用虎潛河車
等九。則疼處且腫。脈之六部皆緩滑。而關稍帶弦。此濕痰
流注關節。而痛非風。亦非虛也。治法宜先用丸劑。清中宮
之積痰。繼用煎劑。疏筋絡之壅滯。則肢節之痛除。而胃腕

之疚亦愈矣依法服之果然。丸方霞天麵山查橘紅白朮
茯苓枳實神麵竹瀝打糊爲丸。食遠白湯送下。前方芩光
苡仁半夏南星白芥子威靈仙秦艽炙甘草青木香煎成
入酒一小杯半飽時服

潘元石怒後縱飲遂患吐逆。飲食半留半出。甚則嘔物如褐
色。胸脇脹痛徹背。或以翻胃治之。反潮熱煩燥。又以肺瘡
治之。飲食減而嘔脹益甚。或見吐出之物。謂肺爛矣。胗之
見其肌肉未消。聲音不改。兩寸滑數。左關弦。右關滑。兩尺
寸平。曰此非肺壞也。第爲鬱怒所致耳。怒則血菀於上。與
痰膠結。濁陰不降。而脢脹生焉。法當涌之。用常山五錢。紅

花五錢。酒二碗煎一碗。令通口服之一涌而出。初見褐色痰塊。後多紫黑。約有盆餘。胸膈頓寬。背亦不痛。不作嘔矣。再以清氣養榮湯調。

陸祖愚治沈振宇。妄患鬱痰鬱火症。醫咸謂不起矣。診之形容枯槁。咳咯涎沫。六脈沉滯。隱隱似有似無。重按至骨。或有力。或無根。或遲或數。已飲食不進。似胃氣將絕者。但自能起坐。聲音嚮亮。知爲痰涎壅隔。血氣凝塞。故脈亦不流通耳。用二陳加蔻仁。蘇子黃連白芥子貝母石菖蒲等味一劑未效。再胗聞病人喜聞爆竹硝黃之氣。遂於前方加薑汁竹瀝。每劑入牛黃半分。調服。症脈漸起。再與加減。五

六日後進蘇合丸一丸能飲粥再與六君子加減調理月餘而安。

李江州因下第歸飲食不思精神倦困醫謂遠歸久曠投以補劑胸膈痞塞大便艱難不寐又與養血安神煩躁而小腹脹滿診之見其面容昏滯六脈沉滑乃以枳實黃連瓜蔞陳皮貝母檳榔元明粉兼服潤字丸三錢半日未應又以前丸二錢催之良久腹中鳴轉下矢氣去稠黏臭穢五色錯雜約半桶頓快繼以前湯丸少少與之兩三日間糞微黃改用參朮歸芍健脾養血調理而安。

費表嫂患胸之下臍之上溫溫作痛可揉可按凡溫中消導

清火厯試不效。胗之六脈沉弦而滑。以痰治之。數劑而痛止。精神未復而勞於女工。且患血崩。食入不化。遷移數日。胸腹腫脹。其熱如火。湯藥難投。致呻吟不絕。人事不省。脈之寸關沉伏不見。而尺尙沉滑有神。曰。以沉痰之爲祟也。元氣雖弱。痰結不得不通。徐靈胎謂人虛症實。不必顧忌。但急去其實。則精神自復。此類是也。用滾痰丸。徐徐投之。至半夜胸前隱隱有聲。五更下稠痰益許。神氣頓蘇。胸膈少利。再以養榮合二陳調理半月而愈。

張宇清。少時體羸多病。專主溫補。病愈而火症時發。乃滋水制火。其疾如失六味之力也。迨壯年肥盛。濕痰醞釀於中。

仍滋陰不徹。六旬外痰症陡發。復以六味加二母歸芍麥冬。服後痰涎壅塞。四肢厥冷。口開眼合。人事昏沉。脈之六脈洪滑而數。遂用加味導痰湯繼之蘇合丸。兩劑纔覺精神清。問用何藥。以前方告。乃怒曰。我生平最忌燥劑。豈可服此。今後斷不可用。乃即心知父之非。非每日以地黃湯一劑與驗過。暗以導痰之藥以進。病愈後。洞悉前情。不勝歎仄。

孫文垣治李古愚。每食後卽大便腹皮稍脹急。胸膈飽悶。服參朮則痞悶愈甚。小水清長。脈之左寸濶。右寸滑。按之如黃豆大。且鼓指。關尺皆弦小。左寸迢迢有神。據脈乃積痰。

鬱於肺而莫能出。以致大便之氣不固也。當效丹溪治。乃叔用吐法。吐去上焦痰積。大便自實矣。先用苦梗蘿蔔子各三錢。白豆仁橘紅山梔各一錢。以川芎五分生薑三片。葱三根。水煎服之。取吐服半時許。吐出清痰。惡心未已。乃痰積膠固。未易出也。又用蘿蔔一合。擂漿水加蜂蜜。與半碗飲之。始吐膠痰二碗許。平日每小水則大便並行。吐後小水始能單去。連三四次。胸腹寬舒。初亦以吐爲懼。至是豁然稱快。大便五日一行。再以二陳加白朮旋覆花麥芽。調理全愈。

李士材治章給諫暑月心中大痛。醫與香薷飲。痛轉增而寸

口弦急此痰食交結也。服砂仁二陳二劑。痛雖畧減而困苦煩悶更以冒苓湯加半夏二錢。大黃三錢下黑矢數枚。痛減三四仍以前湯用大黃四錢下膠瘀十餘碗始安。

徐主政勞且怒後神氣昏倦汗出如浴語言錯亂危困之極脈大而滑且軟此氣虛有痰也用補中益氣湯料併四劑爲一劑用參至一兩加熟附子一錢熟半夏三錢四日稍甦更以六君加薑汁一鐘服數日兼進八味丸兩月而安。王郡侯患痰嗽輒服清氣化痰丸漸至氣促不能食李曰高年脾土不足故有是症若服前丸則脾土益弱矣投以六君子湯加煨薑三錢益智仁一錢五分十劑而痰清更以

前方煉蜜爲丸約服一斤飲食乃進

朱文學遍體如蟲蟄口舌糜爛朝起必見二鬼執盤食以獻
向李泣曰某年未三十高堂有垂白之親二鬼旦暮相侵
必無生理。形容其寸脈乍大乍小意其爲鬼祟細察兩關弦
滑且大遂斷以痰投滾痰三錢雖微有所下而病患如
舊更以小胃丹二錢與之復下痰積及水十餘碗遍體之
痛減半至未明早鬼亦不見矣更以人參三錢丸二錢煎
湯服小胃丹三錢大瀉十餘行約二十碗許病若失矣乃
以六君子爲丸服四斤而愈

張路玉治一燕人體肥痰盛善內善飲患痰鳴喘嗽數年食

傷恒發。發則六脈遲滑。時見歇止聲如拽鋸遍地皆痰。每歲或一二發。或二五發深初初冬尤甚。遂用倒倉法。此亦可用滾痰丸治之。倒倉自言肢體皆輕。症遂愈。二年後因不禁牛肉復發。然其勢較前不過十一是亦不慎口腹所致耳。

郭邑侯夫人素有敗痰失道。左右兩脇俱有結塊大如覆杯。發則咳嗽喘逆。腹脇掣痛。六脈至促。按之少力。用六君子湯加膽星枳實香附沉香二劑。服之大吐稠痰結垢一二升。因嘔勢太甚。促往診之。至則嘔吐已甯。脈息調匀。不必更藥矣。

黃履素曰。立齋治痰每言腎虛水泛爲痰。法當補腎。予壬申

秋咳嗽多痰、自知因於色、遵先生法、恪服六味丸、更不治、痰嗽月餘竟愈、時師治痰最忌用熟地、以爲膩膈、是烏知箇中妙理哉。

龔子才治周藩海生陽生、患痰嗽喘熱、左足腫痛、日輕夜重、每年發二三次、已三十年、遍治勿效、診之、左微數、右弦數、此血虛有濕痰也、以四物湯加蒼朮黃柏木瓜檳榔木通、澤瀉空心服、以治下元、茯苓補心湯臥時服、以治上焦、各三服而愈、後以神仙飛步丸空心服、清氣化痰丸臨臥服各一料全愈。

張三錫治一中年婦、每夜發熱、天明方止、症兼惡心不食、肢

倦且云體素肥今漸消瘦因憶古人有言昔肥而今瘦者
痰也痰滯中宮咀礙升降宜乎不食且作惡心痞悶血無
所滋因而不足故夜熱乃以二陳治痰參補其中氣枳實
麥芽寬中香附炒梔子清火柴胡退熱凡二十劑間服橘
半枳朮丸一月愈後進人參湯體漸復舊

一人素肥盛半年漸瘦兩膝與背互痛兩尺沉滑古人有言
昔肥而今瘦者痰也遂以加減豁痰湯連進數服一日食
後偶作惡心乃以瓜蒂散一錢投之吐稠痰半升而愈
朱丹溪治一人項強痛不可忍不可以回顧作痰客太陽經
之症治之用二陳湯加酒芩姜活紅花服後二日而愈

張路玉治吳別駕夫人患痞眩嘔逆向因下體畏寒肢體麻木久服八味參附不徹六脈弦滑按之則濡此中焦素蘊痰濕陽氣不能周於四末之象得桂附辛熱之力有時雖可暫開究非真陽之虛且有地黃之滯所以痞暈漫無止期遂與局方七氣加沉香一服豁然再劑神爽食進而安薛立齋治一儒者脾腎素虛而有痰或用導之之法痰甚作渴頭暈煩熱謂中氣虛弱而變症用補中益氣湯而愈後勞役發熱此氣虛不能上升也用前湯加蔓荆子而愈後又勞神畏見風四肢逆冷口淡痰多此脾氣虛寒真病以六君子加炮姜肉桂而愈

一男子素腎氣虛而咳痰亦用導痰之法虛症悉具痰涎土涌小便頻數謂足三陰虛而復損也朝用補養脾氣湯培養肺脾之虛氣夕用六味丸加五味子收斂耗散之精而愈

大尹陳克明導痰後痰益多大便不實喜極熱飲食手足逆冷謂命門火衰而肺脾虛寒不能攝涎歸源用六味丸而愈

進士張禹功飲食停滯胸滿吐痰或用藥導之痰上涌眩暈熱渴大便秘結喜冷飲食手足發熱謂腎水虛弱津液難降敗液爲痰用六味丸而愈

儒者楊文魁素唾痰諸藥不應服牛黃清心丸吐痰甚多或頭或熱從脇起左脈洪大有力右脈浮大而無力薛曰此三陰虧損火不能歸源用補中益氣加麥冬五味及加減八味丸補其化源而愈。

秋官張碧崖面赤作渴痰甚頭暈此腎虛水泛爲痰用地黃丸而愈。雄按三陰虧損補中益氣湯何得浪施

儀制賀朝卿吞酸胸滿痰盛作渴飲食少思用清氣化痰等藥前症益甚兩膝漸腫寒熱往來謂脾胃虛濕熱下注用補中益氣倍參朮加茯苓半夏炮姜而愈

考功楊林菴嘔吐痰涎胸腹脹痛飲食少思左關脈弦長按

之微弱。此木尅土。用六君子加柴胡山梔木香而愈。

二守陳子忠飲食少思。吐痰口乾。常服二陳枳實黃連之類。脾胃受傷。乃間於薛。薛述東垣先生云。脾胃之症。實則枳實黃連瀉之虛則白朮。陳皮補之。彼遂以二味等分爲丸。常服。由是多食而不傷。過時而不饑。

趙以德云。予近治一男子。肩井後腫痛。身熱且嗽。其腫按之不堅。此乃酒痰流結者。遂用南星半夏瓜蔞根芩連竹懸作煎飲。燒葱根敷腫處。另用芥子白礬作小丸。就煎藥吞。二十九服後。痰隨嗽出。半日約去三四碗。病卽愈。全上

羅成之既得丹溪之學。歸隱崇明三沙。張太尉士誠患痰疾。

氣怔忡諸名醫治療不效。迎成之膠之主以倒倉法張卒

用其方諸病悉除。賜勞甚厚。

醫史全上

陸愚愚治孫景陽室年近五旬向患痰火發則頭空眩暈飲食減少旋發旋愈蓋有年矣近發轉甚將及月餘診之六脈洪滑而數按之無力肢冷面赤肌肉黃瘦不時眩暈甚則昏不知人水穀不進其似不可攻然其脈來有神當棄症憑脈乃用枳實瓜萎胆星貝母芩連橘紅牙皂入姜汁竹瀝服之吐痰數碗四肢漸溫再用川牛黃五分配以蠟丸頓服三丸徐徐頻飲竹瀝催之腹響後服潤字丸三錢便垢穢若干病頓減後以清火消痰健脾養血調理而安。

吳淑止室軀體壯盛自來有痰初出口時稀白澄清唾地良久反極稠膩過勞卽眩暈昏冒近則兩三日一發始則叫號旣而昏憒角弓反張食頃乃甦四肢厥冷胸腹滿硬六脈如細而且濇以爲寒痰凝滯中焦用二陳導痰湯半夏與四五錢服後一夜不安痰壅愈甚口舌燥渴因想脈症不同此當棄脈從症改用貝母芩連桔梗花粉前胡胆星瓜蔞竹癰姜汁煎湯吞潤字丸五分數服後胸膈柔軟昏暈已除大便數日不行用滾痰丸三錢不應又以潤字丸三四錢催之始得更衣症減半兩日後遂晡熱唇紅面赤乾唾無痰胸膈不暢竟似弱症乃清晨服丸藥生地麥

銀柴胡黃連知母鼈甲秋石歸芍杜仲。食後服煎藥半貝母黃連查橘枳朮前胡花粉白蔻仁。如是出入增損養血順氣清火消痰。兩月全愈。

薛立齋治一男子素耽厚味胸滿痰盛此膏梁之人內多積熱與法製清氣化痰丸而愈彼以爲有驗修合餽送脾胃虛者無不受害

一婦人元氣素弱痰氣時作或咽間不利或胸痞等症以爲鬱結傷脾以加味歸脾湯治之而愈後遇大怒前症仍作惑於衆言以爲痰飲妄用祛痰之劑吐瀉數次變諸異症口噤不省薛以爲脾胃復傷日用六君子一劑米飲濃煎

常服匙許。至四日漸進粥食。乃服前藥。間以歸脾和其胃。調養兩月餘。諸症悉愈。

傅青主治一老人患痰漏喉間。氣不得出入其間。具棺待殮。先生胗之曰。不死令搗蒜灌之。吐痰數升而甦。劉紹攽九疇古文

王肯堂曰。予初喜唾痰愈。唾愈多已而戒之。喉間梗梗不可耐。輒呷白礬湯數口。咯入口中。用舌攪研令碎。因之而嗽之百餘津液滿口。卽從鼻中吸氣嚥下。以意送至丹田。默存少頃。咽間清泰。如未清再嗽再嚥。以化盡爲度。方咯出時。其味甚鹹。漱久則甘。世人乃謂瘀濁之物無澄而復清之理。何其謬哉。吾嘗渡河見舟人掬濁水而入之。壅。繆入。

磬未數分卽時澄清此可悟治痰之法也。

丹月賀魯菴年七十餘、膈間有不快、飲食少思、初無大害就醫京口投以越鞠丸、清氣化痰丸、胸次少寬日日吞之、遂不輟口、年餘困頓不堪、僦舟來訪、問脈於王、則大肉已脫、兩手脈如遊絲、太谿絕不至矣、見王有難色、因曰吾亦自問必死、但膈滿太甚、大便秘結不通、殊以爲苦、但得少寬、卽瞑目無憾也、因求王疏方以至親難辭、教用人參白朮之類、大劑進之、少竟如廁下積痰升餘、胸膈少寬矣、更數日而歿、蓋時二方乃時師常用之物、本欲舒鬱、適增其痞、本欲清痰、適速其斃、豈可恃哉。

薛立齋治一人、胃弱痰盛、口舌生瘡、彼食滾痰丸愈盛、反瀉不止、惡食倦怠、此胃氣受傷也。以香砂六君子湯數劑少可再以補中益氣湯加茯苓半夏二十餘劑而愈。夫胃氣不足、飲食不化、亦能爲痰。補中益氣乃治痰之法也。苟虛症而用峻利之劑、鮮不危矣。

施沛然治莫進士公謨患痰嗽、日吐痰數盂、形體瘦削、僉曰火症純用柔劑、胗之曰、此肝木乘脾也、脈浮而關弦、面黃而鼻青、補之則瘳、瀉之則劇、用六君子加炒芍、姜汁製連二劑不信、仍用山梔黃柏之類、更教以豬首佐饔、殼施曰、三日大瀉絕粒、奈何、經曰陰劑柔勝、積凝爲洞泄、寒中之

屬則真火微而榮衛至。三日後大渴脈脫，鼻息如冰，口不能言。彼醫曰：脈脫矣，大勢其在今日乎？急投附子，或可救也。曰：無庸。昨梔柏而今附子，鳥附何冰炭反掌耶？寒涼過劑，脾氣大傷，食復滯之，按之則楚。先取山楂作液少服，旋進獨參湯。

沈明生治玉峯李嘏侯之恙也，病萌於己亥夏風鶴之驚，至九月間夜讀，忽覺神思昏沉，中心若墜。嗣後正仲不已，友見其素稟清弱，勤於鉛槧，虛症昭然，勸令服參，越兩月，困忘轉加，眩暈特甚，則以參少力薄，故益至五錢一劑，約三四兩，後見病日深，輒參勿服，歷扣醫家，或以爲陰火亢

盛當成勞瘵者或謂其冬得春脈當其時不能再見者或
斷之終至癲癇者醫更藥雜歲將暮矣延彤曰從前所議
皆不悞也所以不卽愈者未治痰也今當耑事豁痰徐議
其虛可耳遂用二陳湯加鉤藤菖蒲等味漸進煎劑書一
案云思慮傷神痰乘包絡以致虛靈之宰不獲自持時覺
心繞千絲時覺腹無一物獨處則萬緒紛紜臨事則五色
眩瞀痰上逆也痰爲火擾夜臥難甯痰助陽明多食不飽
流於精道則夢失見之脈候則滑弦治宜先標後本驅其
壅閉俾神明之官仍安厥位繼以補血養心庶滋潤之品
不致泥膈而餘疴不治自愈矣歸至甯神至寶丹一料送

服入春全愈

錢國賓治無錫劉元女咳嗽吐痰氣短經閉骨瘦如柴但不夜熱以新增不相顧病益劇劉延診以決死生六脈結滯或五七至中一止十餘至中一止兩更實實凡勞症脈當芤細弦牢短促今見痰脈非勞脈也以導痰湯枳實半夏胆星蒼朮茯苓陳皮白芥子各一錢甘草三分加熟大黃二錢二三劑下痰少許身體困極以參湯調理漸安令服八珍湯而愈

劉雲密曰愚於戊戌歲冬深終之氣主氣寒水既與司天相合而客濕土又與在泉相合更加於主氣寒水之上其病

於陽氣甚矣。氣乃肺主之，故肺易受寒邪。既病於主氣之肺，陽氣益不得施化，而水中之陽化更微，致濕淫滋患，故濕痰生聚於胃而不行，是濕痰愈覆其陽，則肺生鬱熱，遂口舌爲燥，而肺所治之上焦亦俱不爽，且移於所合之大腸而化風矣。治之者宜麻黃杏仁輩以散寒，炒乾姜製白朮以除濕，第所鬱之火驟以姜朮投之，適益其勢耳。乃散寒以麻杏，而除濕暫用二陳，加南星乃入蛤粉於中，以鎮陰僭而散陽鬱，其痰漸化而熱亦行，徐以乾姜白朮輩，理中乃得全愈。

飲

孫兆治俞伯道忽患微熱心中滿頭有汗不能解。衆醫以爲濕病用表藥有謂食在膈者治之皆不効。召孫至曰用半夏茯苓湯遂瘥。衆問故曰頭有汗心下滿非濕症乃水結胸膈也。水既去其病乃愈。且如濕氣心下滿自當遍身汗。若有食心滿頭豈得有汗。若言是表身又不疼不惡寒。表症何在。故凡水結胸膈脇頭必有汗耳。堆按此案已列卷一傷寒門

張子和曰有一婦人年三十餘病滑泄經年皆云虛中有積以無憂散五七日一服至二十服不效又服纏積丹軟金

丹丸諸藥皆不效其人服藥愈速病勢愈甚飲食日減人或謂曰此休息病也宜炙中腕及左右穴也下氣海及膀胱穴以三里引之每年當冬至日夏至日炙之前後計萬餘壯忽門外或者曰此病我屢識蓋傷飲之故卽日桃花正開俟其落時以長棘針刺之得數十尋勿犯人手以白麵和作餅子文武火燒令熟嚼爛以米飲湯下之病人如言服之一二時瀉如傾前後六七日計數十行昏困無所知覺惟索冷水徐徐而飲至六七日少省後食日進神日昌氣血日和不數年生二子

子和治郭敬之留飲面目浮腫不能食脚腫連腎囊痛先以

苦劑涌之後以舟車丸瀦川散瀉之病去如拾遺又一田
叟姓楊其病嘔酸臭水十餘年本留飲諸醫皆以燥劑燥
之中腕脣脰以火艾燔針刺之瘡未嘗合張以苦劑越之
其涎如膠乃出二三升談笑而愈

李七老病涌水症面黃而喘兩皆腫按之陷而復起行則濯
濯有聲常欲飲水不能睡臥張令上涌去痰而汗之次以
舟車丸瀦川散下之以益腎散復下之以分陰陽利水道
之劑調之水盡瘥

一婦從少年時因大哭罷飲冰因臥水停心下漸發痛悶咸
以爲冷積治以溫熱之劑及禁食冷物一聞茶氣病輒內

作如此數年燎炙燒艾瘡孔數千十餘年後小大便秘悶
兩目如昏積水轉甚流於兩脇世謂水癖或謂支飲硝漆
稜莪攻磨之藥竟施之矣食日衰積日茂上至鳩尾旁至
兩脇及臍下但發之時按之如水聲心腹結硬手不可近
者月發五次甚則欲死已二十餘年張診其脈寸口獨沉
而遲此胸中有痰先以瓜蒂散涌痰五七升不數日再越
痰水及斗又數日上漏數升凡三漏三下汗如水者亦三
其積皆去以流濕飲調之月餘大瘥

中丞常予正苦痰飲每食飽或陰晴節變幸十日一發頭痛
背寒嘔吐酸汁卽數日伏枕不食服藥罔效宣和初爲順

昌司錄於太守蔡達道席上得吳仙丹方服之遂不再作
每遇飲食過多腹覺滿脹服五七十九便已少頃小便作
茱萸氣酒飲皆隨小水而去前後痰藥甚衆無及此者用
茱萸湯泡七次茯苓等分爲末煉蜜丸梧子大每熱水下
五十九其效如神朱氏集驗方

本草綱目

陸養愚治施南石二十九歲患晡熱至天明方退夜熱尤甚
咳嗽無痰咳則痛引胸脇熱甚則咳亦甚咳甚則痛亦甚
初服菖蒲散喘急殊甚易以前胡杏仁桑皮蘇子輩亦不
效後以陰虛治之二冬二母服數月飲食漸減肌肉羸瘦
或謂勞瘵已成不可療矣最後一醫診得脈弦數左關尤

甚此肝火也。用柴胡青皮黃連赤芍山梔白芥子數劑亦無驗。於是苦於藥餌。不延醫。二月診之。大脈沉數而滑。右關尺更有力。其脇痛若從右而應乎左。因思仲景云飲在脇下。咳則引痛。謂之懸飲。今咳痛明是其症。第十棗湯非常用之方。且病人狼狽已極。亦必不肯服。乃以潤字丸料加入甘遂和丸。令一二分一服。日二服。每日加一分。加至五分一服。使便出稠痰碗許。中有一塊半碗半軟如雞子大。脇痛如失。熱嗽減之十之六七。又用人參白朮歸芍茯苓貝母甘草作煎劑。與丸藥間服。丸藥仍減一分。直待便中無痰始止。丸藥用煎藥日一帖。調月餘全安。

雄案
體虛

病實深得緩攻之法迨衰其半又合寓攻于道補之道

陳三農治一婦患眩暈腰痛過寅卯二時則日夜昏迷不省人事身如在浮雲中脈細數弦滑細爲濕數爲熱弦爲飲濕熱痰飲留滯胸膈隨氣升降上涌則爲眩暈下墜則爲腰痛痰飲沃心包致竅不通故昏不省人事至巳午時心火助其濕熱鼓擊痰涎故昏痴益甚也此必痛飲所至卯之果然遂以稀涎散涌酸臭痰數升仍以舟車丸泄如漏屋水者五六次諸症均愈

一貴婦患溢飲遍身虛腫用金沸草散一劑汗出腫減繼以澤瀉湯加枳實旋覆花前胡四劑而安

一婦患時疫飲水過多胸膈堅痞咳逆倚息短氣不臥湯飲入而吐出諸藥罔效作停飲治以五苓散一劑愈。

一婦患霍亂飲陰陽水左腹堅硬痛極作留飲治以半夏旋覆花各三錢澤瀉青皮枳實白朮乾姜各一錢吳茱萸二分一劑愈。

李士材治秦景明素有痰飲每歲必四五發發卽嘔吐不能食此病久結成窠囊非大涌之弗愈也須先進補中益氣十日後以瓜蒂頻投投涌如赤豆沙者數升已而復得水晶色者升許如是者七補之七涌之百日而窠囊始盡耑服六君子八味丸經年不輟。

吳爭先治西商王，氣體甚厚，病留飲，得利反快，心下積堅，滿鼻色鮮明，脈沉，此留飲欲去而不能盡去也。用甘遂、甘草半夏白芍加白蜜五匙頓服。前症悉瘳。或問甘遂與甘草其性相反，用之無害而反奏效何也？曰：正取其性之相反，使自相攻擊，以成疏瀹決排之功。西人賦性厚，尤當用之。

張景岳尊人早年善飲，後及四旬，遂得痰飲之疾，嘔酸脹滿，飲食日減，眩暈不支，驚惕恍惚，痰瘡等症，相繼迭出，百方治痰無效，因慕張子和吐法之妙，遵而用之，初用獨聖散，茶調散及蘢汁之類，一吐稍效，再吐再效，自此屢用不止，雖諸症漸退，而元氣勿復也。如此年餘，漸覺純熟，忽悟其

理。遂全不用藥。但於五鼓睡醒時。仰臥用唾提氣。氣有不充。則嘸氣爲喎。隨嘸隨提。痰涎必隨氣至。雖最深之痰。無不可取。其最後出者。形色臭味紫氣酸惡。不堪言狀。每吐後。或至唇咽腫痛。但以涼水一二口漱嘸解之。吐畢早膳。用屏五味。用薄粥一二碗。以養胃氣。自四旬後。絕不用酒。行吐法四十餘年。自六旬外。則一月或半月。必行一次。凡吐後。神氣必倍旺。陽道必勃然。一切內傷外感。無不盡却。蓋道用督。此則用任。所用不同。所歸一也。不惟却病。而且延年。後至八旬外。猶能登山。及燈下抄錄古書。無病而卒。

葉天士曰。按張子和儒門事親云。凡人之病。自外而入。由內而起。皆邪氣也。邪氣加諸身。速攻之可也。及其聞攻。則

不悅聞補則樂之至於無邪無積之人始可議補有邪有
積而議補者如鯀涇洪水之徒也故立汗吐下三法以去
病病在表者汗之在上者吐之在下者下之以病去爲先
病去之後以穀肉果菜補之非藥補也景岳言子和吐法
之妙不知汗下之法更妙然以法惟在上者吐之非一概
可吐也又有補論一篇甚言誤補之害惟庸醫治病純講
補其虛不敢治其實世人皆以爲平穩而自誤景岳但見
其吐法不見其補論一篇乎子和之學亦宗河間與東垣
丹溪並傳大用寒涼攻擊以治病毫不用補以補之適足
爲害也景岳重子和而毀河間丹溪豈子和另有溫補之
書抑不敢
議其非歟

張三錫治一人肩背與膝相引而痛寸脈弦知痰飲爲患也
投小胃丹一服吐痰半升間日再進一服瀉痰小有如膠
者一升許病良已

張子和治一人病留飲者數十年不愈診之左寸脈三部皆

微而小。右手脈三部皆滑而大。微小爲寒。滑大爲燥。以瓜蒂散涌其寒痰數升。汗出如沃。次以導水禹功去腸中燥垢。亦數升。其人半愈。然後以痰劑流其餘蘊。以降火之劑開其胃口。不踰月愈。

朱丹溪治一人。素耽於酒。患遍身關節腫痛。此愈彼劇。胸膈不寬。此酒濕症。痰飲在胃。流注經絡。卽流飲症也。用二陳湯加酒芩。蒼朮。姜活威靈仙澤瀉。倍葛根而愈。

許叔微自患飲滯三十年。始因少年夜坐寫文。左向伏几。是以飲食多墜左邊。中夜必飲酒數盃。又向左臥。壯時不覺。三五年後。覺酒從左下有聲。脇痛食減。嘈雜飲酒半盞。卽

止十數日必嘔酸水數升暑月止右邊有汗左邊絕無遍
訪名醫及海上方間或中病愈得月餘復作其補如天雄
附子礬石利如牽牛甘遂大戟備嘗之矣自揣必有滯囊
如水之有科曰不盈科不行但清者可行而濁者停滯無
路以決之故積至五七日必嘔而去脾土惡濕而水則不
流莫若燥脾以去濕崇土以填科臼乃製蒼朮丸服三月
而疾除蒼朮一斤去皮切片末之用白芝麻半兩水盞研
瀘取汁大棗十五枚爛煮去皮核以蘇汁勻研成稀膏搜
和入臼熟杵丸如桐子大乾之每日空腹溫湯吞下五十
丸加至百丸忌桃李雀鴿初服時必膈微燥且以茅朮製

之覺燥甚卽進山梔散一服久之則不燥也。山梔散用山梔一味乾之爲末沸湯點服。

馬元儀治沈表姪因悲哀勞役面色枯白形體憔悴右脇有塊凝結作痛痛則嘔手足厥逆飲食不思大便時溏時結吐出痰飲動輒盈盆或一日一發或間日一發苦楚萬狀診其脈左三部弦而勁急右三部虛微無力方用附子理中加桂湯稍安越三日又發與前方不應乃倍加附子甚安後復發前方又不應因思仲景傷寒治法有用真武湯一法原以真火飛越水氣上逆故用此以復陽收陰坐鎮少陰北方之位究其功用全在行水醒脾之妙今因勞鬱

所傷中氣損甚由是所勝之木乘脾所不勝之水侮之而逆。木橫則痞結作嘔。水逆則痰飲泛溢。若非真武。何以攝元陽而鎮陰邪耶。遂用此方倍加分兩多用人參。連進三十餘劑。嘔漸已。痰漸少。令早服八味丸。晚服附桂理中丸。調理諸症悉愈。惟結塊不除。則以久積陰寒難解。恐成痼疾也。用真武湯甚合法。而多加人參。未免又沿俗蓋參性膩滯。最不宜於飲症也。此症元氣復後。卽宜間用攻劑。以盡根株。徒事溫補。安能望結塊之去耶。

繆仲淳治丹陽葛文學。宇十內人。因作家勞鬱。患飲。每每發嘔吐不已。腸如欲出。所吐俱清水。動以盆桶計。日夜不止。不思飲食。就醫金壇。諸醫以健脾行氣。理鬱清痰藥投之。

愈劇困頓待斃計無復之矣。繆視脈審病知爲飲無疑。乃用姜製半夏四兩。廣皮四兩。茯苓四兩。豬苓二兩。澤瀉米泔浸炒二兩。旋覆花三兩。厚朴姜汁炒一兩五錢。白朮二兩。枳實麪炒一兩。川連一兩。木香五錢。加入參一兩三錢。一劑吐止。再劑霍然。隨啖粥糜。脾氣漸復。至今每病作檢方服之卽平。此丸方也。用稀米糊加姜汁和丸如綠豆大。每服五錢。淡姜湯下。如作煎劑。取二十倍中。一倍加白蔻仁。未木香。姜汁。和服。因寒濕者加蒼朮二兩。木香五錢。白豆蔻五錢。因鬱者加柴蘇四錢。去蒼朮。

雲間康孟修患寒熱不食久之勢甚危。以治寒熱劑投不應。徧檢方書與王宇泰議。投五飲丸立瘥。蓋飲症原有作寒熱之條。故治飲病自退矣。廣筆記

吳橋治汪錢始壯輒患嘔逆胸膈痛諸醫悉以膈治骨立而
羸久之隨絕而汗如流水漿不能入口診其脈卽浮濡不
任按無他端曰此停飲爾悞以膈治病者心悸則氣滯於
胸中血從氣行氣阻則血亦阻矣此二症撞鐘惑也第先
屏二症然後治之瘀血當下病者憮然爲間曰敬如公言
遂修行氣一劑飲之飲未畢而痛止徐下黑糞瘀血畢病

乃平

太函集

程氏有少婦病小腹痛吐痰多嘔清水發熱泄瀉肌削而屏
囊殼六脈沉細弦數曰此積飲也法當發其積而病可除。
第病久而孱，伐無太過劑以和中去濕小腹大痛而昏既

則嘔吐盈盆沈沈皆綠水狀異曰何爲有此橋曰吾固以爲濕也也地下濕則生苔其綠同尋無恙全

上

羅練年近壯病中腕疼痛連背脇及心間吐清水久之痛甚如割刃人事昏昏族醫技窮謂六脈絕矣橋後至則曰停飲也痛甚故脈伏非絕也遂以溫補之劑投之一服而脈見再服而愈

太禹集

徐靈胎曰凡病必有邪如人病湯水下咽少頃卽傾囊湧出者此乃胃中積水寒飲故食入卽拒法當扶陽滌飲驅開寒邪然後補其中氣亦必兼滌飲之藥不可竟用參芪補住寒飲若無邪而現症若此乃胃絕之徵亦不必治矣洞

廷一金姓者患嘔吐症其先人與葉氏甚相契葉氏竭力治之年餘而病者幾殆因求治於余余曰薺飲也世無知者爲製一方其病立已其人因受業於余

吞酸嘈雜

潘墳曰余昔年脾胃受病每日申未時飯至二鼓食消方寢夜半睡醒嘔氣吞酸糟粕乘氣浮上起坐摩娑久之復寢漫服枳朮平胃散或分消或疏導久不效自思年六旬外恐脾胃弱不能運化却去晚餐凡黏硬果物及濕熱酒麪一切不入口不知何以致此因讀東垣脾胃瀉論乃知陽

氣下陷陰火上衝脾胃不實故耳。得一方曰補脾胃瀉陰火升陽湯藥品主佐在本方。并服藥時日所宜所忌切中病情。又讀調理脾胃治驗。謂不可用淡滲之劑。抑遏陽氣反助陰邪。必加升陽風藥。以姜獨活升麻防風炙甘草根。截入煎藥水煎服。乃依方服之。片時後陽氣縷縷而上。不數日陰火漸伏。脾胃實而愈。

高鼓峯治杭人沈孟嘉妻。患吞酸膈痛。屢年矣。肌肉枯削。幾於絕粒。診之六脈細數。此木乘脾土也。先投六君子湯。加炮姜十餘劑。覺吞酸減半。繼用補中益氣湯加半夏。炮姜。十餘劑而吞酸盡去。膈痛亦除。次用歸脾湯倍木香加炮

姜吞八味而全愈。

薛立齋治一婦人飲食後或腹悶或吞酸自服枳朮丸飲食日少胸膈痞滿腿肉痠痛畏見風寒或用養胃湯腿痛浮腫益甚月經不行此鬱結所傷脾虛濕熱下注清晨四君子湯芎歸二陳午後以前湯送越鞠丸諸症漸見愈又用歸脾八珍二湯兼服兩月餘而經行。

一婦人胸滿少食或腹脹吞酸或經候不調此中氣虛不能施行化也用補中益氣加砂仁香附炮姜而進飲食更以六君芎歸貝母桔梗而經自調。

一婦人飲食少思胸中嘈雜頭暈吐痰此中氣虛而有熱用

六君子湯加黑山梔桔梗而愈。後因勞碌頭暈發熱吐痰。
不食用補中益氣加半夏茯苓天麻而痊。

一婦人中腕餽雜口中辛辣或咳嗽吐痰發喘面色或白或
赤此脾氣虛而肺中伏火也用六君子加山梔桔梗柴胡
及炒黑片芩苓治之尋愈。

一婦人嘈雜吞酸飲食少思大便不實此脾氣虛寒而下陷。
用補中益氣湯加茯苓半夏炮姜漸愈又常服人參理中
丸而安。

一婦人飲食後嘈雜吞酸此熱鬱爲痰用六君子湯送越鞠
丸漸愈又用加味歸脾湯而痊後因怒兩脇脹痛中腕作

酸用四君子湯送左金丸漸安仍用六君子湯送下越鞠丸而瘥

朱丹溪治一人因濕熱病嘔吐酸水如醋用二陳湯加姜炒芩連蒼朮白朮梔子霍香香附砂仁而愈

陳三農治一婦每食止碗許稍加非大便泄瀉卽噎癟吞酸腹脹痞悶此脾虛寒不能化也用六君子加茱連霍香香附砂仁神麴煨姜而愈

薛立齋治一婦人飲食少每碗許稍加非大便不實必吞酸嚙腐或以爲胃火用二陳黃連枳實加內熱作嘔曰未傳寒中故噯氣吞酸脹滿痞悶不信仍用火治虛症並至月

經不止。始信以六君子加炮姜木香數劑。元氣漸復。飲食漸進。又以補中益氣飲食漸進。加炮姜木香茯苓半夏數劑全愈。後因飲食勞倦。兼之怒氣。飲食頓少。元氣頓怯。用前藥便加發熱。誠似實火。服洪大搜之而虛。兩如如無。此命門火衰。用補中益氣姜姜桂及八味丸。兼服兩月餘。諸症悉愈。此症若因中氣虛弱者。用人參理中湯。或六君子加木香炮姜。不應用左金丸或越鞠丸。虛寒者加附子或附中理湯。無有不愈。

一男子虛弱惡食。雖熟食亦少。作脹吞酸。日削瘦。服參耆等藥。及炙脾俞等穴。不應用八味丸治之而愈。此真氣不足。

不能生土虛火上炎之症也

一婦人年二十餘飲食每每因怒氣吞酸噯腐或兼腿根焮
疼服越鞠丸等藥不應此脾氣虛濕氣下注而然以六君
子湯香附砂仁藿香炮姜數劑少愈更以六君湯數劑而
愈

一男子瘰癧已愈患吞酸服參朮藥不應彼謂餘毒薛治以
附子理中丸而愈

張景岳曰予向在都中治一壘紳病吞酸告以爲寒彼執爲
熱堅持造酒之說以相問難莫能與辨竟爲芩連之屬所
斃此見理不眞而固執以致釀成大害者選

頭

徐靈胎曰頭風一症往往本熱而標寒。清火之藥固能愈風火輕症或有寒邪犯腦及風寒外來則溫散之法固不可畧而外提之法尤當博考也。

凡屬形體之疾皆當兼外治不明外治之法服藥雖中病僅得醫術之半耳

又曰頭風之疾輕者易愈其重者風毒上攻絡血橫逆重則厥冒久則傷目必重劑並外法諸法方能有效

有人三代不壽問彭祖祖觀其寢處果有穴洞當其腦戶合

塞之遂得壽蓋隙風人耳吹腦則陽氣散頭者諸陽所最

以主生也

延壽書

竇材治一人起居如常但時發頭痛此宿食在胃腕也服丁

香九十粒而愈。

陽明食積頭痛

張子和治南卿陳君將赴秋試頭痛偏腫連一目狀若半壺具脈洪大張出視內經面腫者風此風乘陽明經也陽明氣血俱多風腫宜汗乃與通聖散入生姜芍根豆豉同煎一大盞服之微汗次日以草莖入鼻中大出血立消。

陽明風熱

頭痛

王定國病風頭痛至都梁求明醫楊介老治之連進三丸卽

時病失懇求其方，則用香白芷一味，洗晒爲末，煉蜜丸彈子大，每嚼一丸。二茶清或荆芥湯化下，遂名都梁丸。其藥治頭風眩暉，女人胎前產後頭痛，及血風頭痛皆效。百一選方

按此方惟陽明風熱宜之，餘不可服。

○
張大復曰：偏頭風之苦，病者不能自言，方亦多岐而罕效。戊申予忽病此，政悶鬱時，周叔明以餅法見寄，未服也。五月五日，顧民服貽二餅，貼太陽上一夕，良已。法用南星半夏、白芷、三味等末，爛搗生姜、葱頭爲餅，不服不攻不熏，視諸方更簡便也。筆談按此方風痰用之。

姚應鳳治嚴州施盛宇，三載患頭痛，不可忍。姚曰：法當取首

中骨今八月時收斂難猝治期以明歲春乃割額探去其

骨出瘀血數升頓愈

錢塘縣志

此症似與腦中石蟹畧同

雄按未免涉誕

龔子才治杜侍御患頭痛如刀劈不敢移動懼風怕語言耳

鳴目中溜火六脈緊數有力與酒浸九蒸九曬大黃爲末

三錢茶調服一劑而愈

此亦陽明血熱爲病病在至高之地故大黃必用如是製法

孫文垣治蔡樂川內人患頭痛如刀破髮根少動則痛連滿

頭痛倒不省人事踰半時乃甦遍身亦作疼胸膈飽悶飲

湯水停膈間不下先一日因怒吐水數次蛻蟲三條今或

惡風或惡熱口渴或不渴而大便秘脈則六部皆滑大有

力此痰厥頭痛也先以藿香正氣散止其吐繼以牛黃黑

虎丹清其人事。頭仍痛甚。又以天麻、藁本各三錢。半夏二
錢。陳皮白芷薄荷。麻黃。生姜葱白煎服。得少汗而頭痛少
止。至晚再服之。更痛止大半。人事未全清。此蓋中州痰盛。
非下不可。乃用半夏五錢。巴霜一分。麪糊爲丸。每服三十
丸。生姜湯下。下午大便行三次。皆稠粘痰積也。飲食少進。
餘症差可。惟遍身疼未盡去。改用二陳湯加前胡石膏藁
木薄荷枳殼黃芩石菖蒲。調理而安。木盛土衰

朱丹溪治一人。因浴冷水發熱。頭痛脈緊。此有寒濕也。宜溫
藥汗之。蒼朮麻黃乾葛甘草陳皮川芎。二劑得汗後知病
退。又與下補藥。陳皮川芎乾葛白朮蒼朮人參木通甘草。

四劑姜水煎服

濕熱

一婦人頭痛發熱而渴白朮陳皮川芎乾葛木通甘草水煎

溫服

陽明病

婁全善治一老婦人頭病歲久不已因視其手足有血絡皆紫黑遂用三稜針盡刺出其血如墨汁者數盞後視其受病之經刺炙之而得全愈卽經所謂大痺爲惡及頭痛久痺不去身視其血絡盡出其血是也

三陽風熱

○李時珍治一人病氣鬱偏頭痛用蓖麻子同乳香食鹽搗貼一夜痛止

妙法治標

○李士材治蔣少宰頭痛如破昏重不甯風藥血藥痰血久治

無功脈之尺微寸滑。腎虛水泛爲痰也。地黃四錢。山藥丹皮澤瀉各一錢。茯苓三錢。沉香八分。日服四劑。兩日輒減六七更。以七味丸。人參湯送。五日其痛若失。近日上盛之病最多。觀此

河悟一切
少陰病

○吳孕先治一人患頭病。痛不可禁。脈短而澁。吳曰。頭爲諸陽之首。若外邪所乘。脈當浮緊而弦。今反短澁。短則陽脫于上。澁則陰衰於下。更加手足厥冷。名爲眞頭痛。與真心痛無異。法在不治。爲猛進參附。或冀挽回萬一。如法治之果愈。

李成章官六安衛千戶。善針灸。或病頭痛不可忍。雖震雷不

本病

聞李診之曰此蟲啖腦也合殺蟲諸藥爲末吹鼻中二三日
蟲卽從眼耳口鼻出卽愈明雄按此症雖奇實有是病史娶人多患之彼處呼爲大白蟻亦因風熱所生也

一人素病黃忽苦頭痛不已發散降火厯試無效診得脈大
而緩且一身盡痛又兼鼻塞乃濕家頭痛也投瓜蒂散一
七內鼻中黃水去一大杯而愈

○張三錫屢見苦頭痛百法不效詢之曾生過楊梅瘡用土茯
苓四兩白蘚皮苦參金銀花各三錢黃柏一錢皂角子三
十粒苡仁木通防風各二錢氣虛加參耆血虛加四物大
梅毒孔風

獲其驗身痛亦效治法濕毒

此心梅毒
加
大黃
見效

一人頭痛脈滑而數。乃痰火上攻也。二陳荆芥羨活酒芩不應加石膏二劑稍可。終未盡除。前方加熟大黃三錢。食遠煎服。病去如脫。全上陽明痰火

一人苦頭痛。衆作外感治。診得右手寸口脈大四倍於左。兩尺洪盛。乃內傷氣血頭痛也。外兼自汗倦怠。以補中益氣湯加炒黃柏一劑知。二劑已。氣虛

一人頭痛而面色青黑。身體羸瘦。左寸關俱不應指。兩尺獨洪盛。因作陰虛治。用滋陰四物加黃柏知母元參。二服減半。十日痊。血虛

一婦苦頭痛。悞爲外感治。發散消導愈投愈甚。診之氣口急。

大而數按之卽濡。右脈而虛。大詢之先不熱。服藥後始熱。曰風寒必先發熱。在一二日間。豈有先不熱而後熱者。此氣虛頭痛也。觀其氣短不足以息。餘皆可知。今發散過度。復耗其氣。又復下之。復損其血。氣血兩傷。宜乎虛火獨熾。而身反熱也。非大補詎能挽回。遂以補中益氣湯大劑。加熟附子一片爲嚮導。雄按此藥未嘗無疵。服下卽熟睡。覺而痛止。第人事不清。復加筋惕肉瞞。振振不甯。彼歸咎於補劑。曰虛極所致。復更一醫用柴胡表藥。致一身之火遊行於外。變爲班爛。彼益信爲傷寒矣。化斑承氣日進。遂不救。同上

一人頭痛。身形拘急。惡寒便祕。惡心作食。鬱治不應。診得氣

口脈和平。獨尺數而細。且行步艱難。乃脚氣欲動也。從脚氣治而愈。同上

一人頭痛作外感。治不應。左脈平和。氣口獨盛。症兼飽悶惡心。乃食鬱也。消導而愈。全上陽明病

一人牙與頭角互痛。乃少陽陽明二經病。盛之故。清胃散對小柴胡去半夏。人參加薄荷石膏。二劑瘳。全上

一老嫗頭痛連額。發散降火備用不效。面上皆出小紅泡。有微水不甚潰。一月後痛悉移於右。左眼胞上紅腫。且嬾於言動。飲食不甜。用辛涼愈甚。六脈濡弱如蜘蛛。初按少弦。因作氣虛治。六君倍黃耆加蔓荆子。三服後漸安。心跳不

眠愈急乃以調中益氣湯加茯神元參棗仁柏子仁連進

數服頓愈。

全上

東垣常病頭痛發時兩頰青黃眩暈目不欲開嬾言身體沉重兀兀欲吐漱古曰此厥陰太陰合病名曰風痰以局方玉壺丸治之炙俠谿卽愈是知方者體也法者用也徒執體而不知用者弊體用不失可謂上工矣。

醫說續編

湖南押衙顏思退治頭風掣痛用蠟二斤鹽半斤相和於錫罐中熔令相入捏作一兜鍪勢可合腦大小搭頭量至額頭痛立止。

經驗方全上

王叔權云予年踰壯寒夜觀書每覺腦冷飲酒過量腦亦痛

甚後因灸顙會穴而愈。有兵士患鼻衄不已，予教令灸此穴卽愈。有人久患頭風亦令灸此穴卽愈。但銅人明堂經只云主鼻塞不聞香臭等疾而已，故予書此以補其治療之缺。然以腦戶不宜針，觀之顙會亦不宜針。鍼經只云八鍼云下不宜鍼，恐未盡也。

叔權母氏隨叔權赴任爲江風所吹，身體頭動搖，如在舟車上，如是半年，乃大吐痰，徧服痰藥並灸頭風諸穴方愈。有土人患腦熱疼甚，則自牀下頭以腦柱地，或得冷水粗得減而疼終不已，服諸藥不效，人教灸顙會而愈。熱疼且可炙，況冷疼乎？凡腦痛脾漏先宜灸顙會而強間等穴，蓋其

次也。以上並資生經

薛立齋治一儒者酒色過度頭腦兩脇作痛以爲胃虛而肝病用六味地黃料加柴胡當歸一劑頓安。

商儀部勞則頭痛作陽虛不能上升以補中益氣湯加蔓荆子而痊。

王肯堂治一人寒月往返燕京感受風寒遂得頭痛數月不愈一切頭風藥無所不服厥痛愈甚肢體瘦削因思此症明是外邪緣何不解語云治風先治血血行風自減本因血虛而風寒入之今又疎泄不已烏能愈哉又云痛則不通通則不痛乃用當歸生津活血木通通利關竅血脈其

人能酒。用酒一斗。入二藥其中。浸三晝夜。重湯煮熟。乘熱飲之。致醉則去枕而臥。然有火鬱於上。而痛者。宜酒合石膏之類治之。又方用芎歸熟地連翹各一錢。以薄荷二錢放碗內。將滾湯沖下。鼻吸其氣。候溫卽服。服之立愈。然亦爲血虛者設耳。

8
馬元儀治一人患頭痛。經年不愈。早則人事明了。自午至亥。神氣昏憒。不甯。作風治。治無效。診之。兩脈俱沉且滑。此太陰陽明痰厥頭痛也。用礞石滾痰丸。間服。導痰湯。以蕩滌之。次以六君子少加秦艽全蝎調理而安。

張樹滋妹患頭痛累月。診之。陽脈大。陰脈滯。曰此陰衰於下。

陽亢於上。上盛下虛之候也。法宜六味地黃丸加青鉛五錢。俾清濁定位。斯不治痛而痛自止矣。所以然者。以陽氣居上。體本虛也。而濁氣干之。則實。陰氣居下。體本實也。而氣反上逆。則虛。頭爲清陽之位。而受濁陰之邪。陰陽混亂。天地否塞而成病矣。治之不察其脈。概以頭痛爲風火。專行透解之劑。有不益虛其虛者乎。

朱某患頭痛累月苦不可忍。咸用散風清火之劑。診其脈浮虛。不鼓語言。嬾怯肢體惡寒。此勞倦傷中。清陽之氣不升。濁陰之氣不降也。故汗之反虛。其表清之益。傷其中其惡寒乃氣虛不能上榮而外固也。况脈象浮虛體倦語怯尤

爲中氣氣弱之驗與補中益氣湯

雄按此湯升清則有之如何能降濁升清降濁

加蔓荆爲使令至高巔一劑知二劑已

一人頭風畏冷首裹重綿三十年不愈以蕎麥粉二升水調作二餠更互合頭上微汗卽愈

李樓怪症奇方王帶存曰此方先裝溪伯曾治族祖

驗經

繆仲淳治梁溪一女子頭痛作嘔米飲不能下曰因於血熱血虛火上炎也麥冬五錢橘紅木瓜茯苓各二錢白芍三錢枇杷葉三大片蘇子錢半甘菊錢半烏梅二箇竹懸一杯蘆根汁半碗二劑嘔止頭尚痛加天麥冬二錢頭痛止加土茯苓二兩小黑豆一撮全愈

廣筆記

沈觀頤中丞傳自一道人頭風神方予僕婦患此痛甚欲自
縊服二劑數年不發土茯苓四兩忌鐵金銀花三錢蔓荆子

防風明天麻各一錢元參八分辛夷川芎各五分黑豆四
十九粒燈心二十莖芽茶五錢河水井水各盅半煎一盅

服廣筆

廣筆記治半邊頭風屬火症者用之大黃末三分黃芩末一
錢二味和生白酒一碗頓熱調勻服之卽愈

立齋治一婦人腦左腫痛左鼻出膿年餘不愈時或掉眩如
坐舟車正許叔微所謂肝虛風邪襲之而然也以川芎一
兩當歸三錢羵活旋覆花細辛蔓荆子防風石膏藁本荆

芥穗半夏麴乾地黃甘草各五錢乃製一料每服一兩姜水煎服而愈

劉雲密曰一婦季冬受寒至於中春，顱頂並左後腦痛，是原病手足太陽寒水寒少鬱化熱上行，以病於手太陽，因風升之化不達，而病亦在左厥陰也。經謂過在巨陽厥陰者誠然，診者云手太陽熱甚於風，足厥陰熱勝於濕，更謂肺亦有鬱熱，余止治手太陽而微兼肺，以手太陽之氣化在肺主氣者也。心有微熱，並治足厥陰，以風升之化達，而手太陽之氣化乃暢，更微利小腸，以通血脈而和其氣，並心經之熱亦去，故不必多治他經也。按此亦治顱頂之一。

因見寒者溫治之未盡耳

酒片芩二分半酒枯芩分半蔓荆子二分半防風分半萸連二

分半柴胡三分藁本三分升麻二分川芎二分酒黃柏三分當歸三分木通四分牛膝三分水煎一劑立愈

嘉祐初仁宗寢疾藥未驗間召草澤醫始用針自腦後刺入針方出開眼曰好惺惺翼曰聖體良已自爾以穴目爲惺惺

惺惺穴經初無此名或曰卽風府也

畫謾鍊宋張舜民

吳橋治方簡妻病五年食餧不盡一器至夜則頭岑岑遞絕數筭病爲。或婦當娠大損血於頭審是治二年可受胎復遞甦達旦乃定橋至曰食少久臥肌宜胺今且腴而脈不產男而起矣蓋婦嘗妊哭姑髮根有疣如豆大出血數升匿勿令人知尋免男弗育也治不補氣專補血累二年而

舉子命之曰去病遂如常

太白集

眉髮羹

李林甫婿鄭平爲省郎林甫見其鬚髮斑白因曰上明日當

賜甘露羹鄭郎食之能烏髮翼日食之一夕兩鬚如^皮髮^毛那

代醉

編

李卿換白髮方云刮生老姜皮一大升于鐺中以文武火煎之不得令過沸其鐺惟得多油膩者尤佳更不須洗刮便以羗皮置鐺中密封固濟勿令過氣令一精細人守之地色未分時_{黎明}便須煎之緩緩不得令火急如其人稍疲

卽換人看火。一伏時卽盛置於磁鉢中研極細。李方雖云
一伏時若火候勿至。日西卽成藥也。使時以簪脚蘸取如
麻子大。先于白髮下點藥訖。然後拔之。再點以手指熟撚
之。令人內第四日當有黑者生。神效。

梅師治年少白髮。拔去白者。以白蜜塗毛孔中。卽生黑髮。
生取桐子搗汁塗上。必生黑者。

千金療髮黃。熊指塗髮梳之。散頭入床底。伏地一食頃。卽出
便盡黑。不一升脂驗。

薛立齋治一男子。因大怒發熱。眉髮頓落。蓋髮屬腎而眉屬
肝。此肝腎素虛。爲怒所激。陰火愈盛。銷鑠精血而然也。用

六味丸料加柴胡山梔黃柏數劑漸生。又二十餘劑而完一男子染時瘡服換肌散之類。眉毛頓落遍身作痒或時赤暈乃燥藥損其陰血陽氣偏旺而然。朝用四物湯倍熟地加茯苓白朮丹皮山梔甘草夕用六味丸料加當歸黃耆治之瘡既愈眉毛亦生。

一男子素不慎房勞其髮忽落或發熱惡寒或吐痰頭暈或口乾作渴或小便如淋兩足發熱或冷至脛屬足三陰虧損而陰火內熾朝用十全大補夕用六味丸料加炒黑黃柏枸杞治之諸症悉退而髮漸生。

一男子遍身瘡痒服祛風辛燥之劑眉髮脫落此前藥復傷

肝腎精血虛而火內熾所致。朝用八珍湯加麥冬、五味子。
用六味丸料加當歸黃耆治之。風熱退而眉髮生矣。

一儒者遍身作痒。破膿血淋漓。眉毛脫落如癩風症。久服祛
風等藥致元氣虧損。用補中益氣湯加茯苓而愈。後失調
理。日晡熱甚。用八珍湯加五味麥冬。五十餘劑而痊。

繆仲淳烏鬚明目丸。女貞子酒拌炒九蒸九晒淨末一斤。甘
菊花十二兩。何首烏赤白各半。如法蒸。九晒淨末二斤。牛膝
酒蒸一斤。桑葉一斤。生地酒洗淨二斤。甘枸杞一斤。半乳
拌茯苓酥一斤。麥冬一斤。半槐角子十兩。蒼朮蜜酒拌蒸
晒十二兩。人參一斤。人乳拌烘乾。山萸肉酒蒸十二兩。烏

飯子之黑者取汁熬膏每斤加煉蜜半斤丸如梧子大每
服五錢日三服白湯送下忌白萊菔牛肉牛乳桃李蒜雀
蛤

繆仲淳定烏鬚方何首烏勿去皮黑豆同牛膝蒸製如常法
最後用人乳拌晒三四十次赤白各二斤女貞實酒拌九
蒸九晒二斤旱蓮草熬膏十二兩烏飯子卽南竹子也熬
膏十二兩蒼朮米泔浸蒸晒三次去皮切片十二兩真川
椒紅去白膜開口者十二兩沒石子十兩爲細末以旱蓮
草膏烏飯子膏同煉蜜爲丸如梧子大每五錢空心饑時
各一服白湯下

面

孫兆治樊樓店家劉三一日滿面皆黑色。有相者斷云不過月餘死。旣逾月且安適孫入店與客飲酒。遂拜孫述說其病狀。孫診之曰非病也。乃爲臭氣所熏。穢氣畜于面部不散。故有此色。問劉汝一月前聞甚一陣非常臭氣不能避耶。劉曰。一日登溷。其廁臭氣不可聞。隱忍良久下廁。明日遂有此疾。孫曰去至臭無過香。我家有南人將至售香。可用沈檀二香各一兩碎擘焚于爐中。安帳內以熏絹被蓋定。勿令香氣散。可端坐香邊。暝目靜坐。候香氣散方可出。

帳明日引鑑照之劉依其言面白色漸變旬日如故。

樓全善曰腎臭腐屬水脾臭香屬土廁臭者腐臭也故聞之則入腎而面白黑沈香者香臭也故熏之則脾土勝腎水而色還也。

蘇子由面有瘡高安丐者趙生謂子由曰君好道而不得要陽不降陰不升故肉多而浮面白而瘡吾將教君一碗水以灌溉子骸經旬諸疾可去子由用其說信然惟忘不能久故不能極其妙

龍川志畧

治面部生瘡或鼻臉赤風粉刺用盡藥不效者惟有此藥可治神妙不可言每以小許臨臥時洗百合淨如面油用之

近眼處勿塗數日間瘡處自平赤亦消如風刺粉刺一夕

見效敏捷點方用生硫黃

五分

香白芷

五分

羌青

七箇去翅足

全蝎

一個

洗炒

瓜婁

五分

膩粉

五分

蟬退

五個洗去

右爲細末麻油黃蠟

約度如合面油多少熬熔取下離火入諸藥在內每用少

許塗面上

醫說續編

趙君猷撫幹所傳云有貳卿趙再可知湖州時與一僧相厚而僧患酒齇鼻端生赤贅數枚大者如橘小者如梅李下垂過口言語飲食皆所妨廢良自厭苦之郡有一小兵事刀鑷人但聞其善取膿瘻不知其能治酒齇也一旦自言于僧請醫此疾卽以藥傅之凡半月餘每日取惡物如膿

血自皮膚出者甚多其贅後恐成痴落去皮面瑩然遂以

十千爲謝且語貳卿備直齋閣而求得其方以傳秀邦治

人良驗用黃丹

五餅藥五十文著文大罐子盛

矯砂三十文研個極細用

巴豆十個

去殼膜紙裏壓去其油

右件同入餅藥罐子中慢火熬三沸取下續

入研細生礦灰三錢酒龜鼻用鵝毛掃在紅處一日一次

上藥以追出毒物病退卽止雀子斑用小竹捧兒挑藥點

患處纔覺微腫卽便洗去恐力太猛

並集成同土

陳三農治隣婦面上一熱卽通身躁熱而汗隨之日夜六七

次百治不愈細思之經曰面熱者足陽明病此脾陰不足

而胃火有餘也以山藥爲君歸芍地黃爲臣以補脾陰之

不足。用石膏生甘草以瀉胃火。黃耆麥冬五味以固腠理。
加竹葉以去煩熱。二劑愈。

朱丹溪治一婦人面頰兩腮熱腫。此膈壅之病也。乾葛桔梗各錢半升。麻一錢。蘇葉錢半。薄荷一錢。炙甘草七分。羌一片。水煎食後服。

王莽遺孔休玉。休不受。莽曰：君固有疵。美玉可以滅瘢。休由不受。莽曰：君嫌其價重乎。遂槌碎進休。休方受之。

薛立齋治吳黃門之顙赤腫痛。此胃經風熱上攻所致。以犀角升麻湯二劑而平。又姜大正患此處前方。爲人所惑。謂湯內白附子性溫而不服。另用荆防敗毒散愈甚。後雖用

此湯尙去白附子亦不應後用前方三劑而愈本草云白附子味甘辛氣溫無毒主面上百病及一切風瘡乃風熱之主藥內經曰有是病有是藥苟不用主病之藥病焉得而愈哉

吳進士面患瘡已潰作渴自服托裡藥及降火藥不應診其脈浮而弱丹溪云潰瘍作渴屬氣血俱虛况脈浮弱投以參耆各三錢歸朮熟地各二錢數服渴止又以八珍湯加黃耆數劑脈斂而愈

韓氏子年十四早喪天眞面紅腫如風狀不時舉作或誤用癘風藥內虛發熱口燥煩渴此內傷不足陰火上炎之類

赤遊風症也藥宜滋其陰則火自退用地黃湯加參耆四十劑又用此作丸服斤許不兩月而痊癩瘍機要

許學士治王檢正患鼻額間痛或麻痺不仁如是數年忽一日連唇口頰車髮際皆痛不開口難言語飲食亦妨在額與頰上常如糊手觸之則痛作足陽明經絡受風毒傳入血凝滯而不行故有此症或者以排風小續命透髓丹之類與之皆不效乃製犀角升麻湯贈之數日而愈犀角升麻防風羌活川芎白附白芷黃芩甘草右粗末每服四錢水煎日三四服陽明經絡環唇挾舌起于鼻合額中循頰車上耳前遇客主人循髮際至額顱今所患皆一經絡也

王橫老母年七十餘累患頰車痛每多言傷氣不寢傷神則大發上連頭下至喉內及牙齦皆如針刺火炙手不可犯乃至口不得開言語飲食並廢自覺火光如閃電尋常涎唾稠黏如絲不斷每勞與饑則甚得臥與食則稍安知其虛也始以清胃散犀角地黃湯人參白虎湯羌活勝瀉湯加黃芩甘桔皆不效後改用參耆朮草葛歸升柴桔梗之類稍佐黃芩山梔牛蒡連翹空腹進之食遠遠則服加減甘露飲始漸安然老人性多躁而不耐閒勞與多言時有之不能除去病根然發亦稀少卽發亦不如往歲之劇矣又從子語因喪子鬱結復多餌鹿角膠諸種子藥或于食

後臨臥輒進之。以至成積于胃。遂患面痛如老母之症。服清胃散。甘露飲。重加石膏。太過而見虛症。又服參耆等補藥。而復見火症。門人施生以越鞠丸。加山梔連翹貝母橘紅之屬。開其鬱結。而始安然如舊日矣。

續名醫類案卷十六終

1655

續名醫類案卷十七

錢塘魏之琇編集

海昌王士雄孟英
定州楊照黎素園 同校

目

孫兆治國婆婆患眼冷淚、眼科官治二三年不效。上召孫孫至曰：臣非眼科，但有藥耳。容進方用石決明一兩、赤小豆兩半、半夏五錢、生斑猫二十一粒、炒去頭足、木賊五錢爲末、薑汁丸如桐子大。每服二十九薑湯下方進聖旨下。眼科詳定奏曰：此方與眼科甚不相涉。斑猫有毒，恐傷臟腑。

不敢用合再取聖旨。國婆婆聞之曰。眼科醫官不惟不能。
亦不愿使我治也。但合此藥。總傷無怨。上聞之。孫自進藥。
服經十餘日愈八分。二十日全愈。時眼科並降兩官。孫嘗
錢三十萬。雄按眼科雖降官其言未可爲非。婆婆眼
雖愈其方未可爲訓學者勿盡信書也。

竇材治家中女婢。忽二目失明。視之又無暉翳。細思此女年
少精氣未衰。何緣得此症。良由性急多怒。有傷肝臟。故經
脉不調所致。遂與蜜蒙花散一料。如舊光明矣。

張子和治女僮目忽暴盲。不見物。此相火也。太陽陽明血氣
俱盛。乃刺其鼻中攢竹穴。與頂前五穴。太出血。目立明。

李民範目常赤。至戊子年火運君火司天。其年病目者往往

暴盲火運炎烈故也。季是年目大發張以瓜蒂散涌之赤立消不數日又大發其病之來也。先以左目內皆赤發牽睛狀如鋪麻左之右次銳背發赤左之右赤貫瞳子再涌之又退凡五次亦五次皆涌之又刺其手中出血及頭上鼻中皆出血上下中外皆奪方能戰退然不敢觀書及見日張云當候秋涼再攻則愈火方旺而在皮膚雖攻其裡無益也秋涼則熱漸入裡方可擒也惟宜暗處閉目以養其神水暗與靜屬水明與動屬火所以不宜見日也。蓋季因初愈後曾冒暑出門故痛連發不愈如此涌洩之後不可常攻使服鼠麴子以退翳方在別集中。

趙君玉目暴赤腫點洗不退偶思張語曰凡病在上者皆宜吐乃以茶調散涌之一涌赤腫消散君玉歎曰法之妙其迅如此乃知法不遠人人自遠法耳。

王之一子十餘歲目赤多淚衆工無效張曰此兒病目還當得之母腹中被驚其父曰妊娠時在臨清被圍乃令服瓜蒂散加蠻金上涌而下泄各去涎沫數升人皆笑之其母亦曰兒腹中無病何吐瀉如此至明日其目耀然爽明其日又與頭上出血及眉上鼻中皆出血吐時次用通經散二錢舟車丸七十粒自吐却少半又以通經散一錢投之明日又以舟車丸三十粒投之下十八行病更不作

士人趙仲溫赴試，病兩目赤，腫睛翳，不能識路。大痛不任，欲自尋死。一日與全儕釋悶，坐於茗肆中。忽鉤窗脫鉤而下，正中溫額上，髮際裂三四寸，紫血流數升，血止目快，能通路而歸。來日能辦屋脊，次見瓦溝，不數日復故。此不藥不針，誤出血而愈。夫出血者，乃發汗之一端也。亦偶合出血法耳。

一小兒名德孫，眼發赤，其母買銅綠欲洗。兒目前熟，家人誤與兒飲之，須臾大吐，吐訖立開。

婁全善男，目珠至夜疼，連眉稜骨及頭半邊，腫痛用黃連膏點之，反甚。諸藥不效，灸厥陰少陽，隨止。半日又作，月餘

以夏枯草二兩，香附二兩，甘草四錢爲末，每服錢半，清茶調下。咽疼減半四五服，良愈。

一男子所患與前症皆同，但黑睛有白翳二點，諸藥不效。亦以此藥與東垣選奇湯加四物及黃連煎服，並灸厥陰少陽而安。

王海藏妻姪女形肥，笄年時得目疾，每月或二月一發，發則紅腫難開。如此者三年，服除風散熱等劑，左目反有頑翳，從銳眎遮瞳人，右目亦有翳，從下而上。經云：「從內走外者，少陽病；從外走內者，太陽病。」此少陽陽明二經有積滯也。脈短滑而實鼓，還則似短濇潔。古云：「短爲積滯，過抑臟腑宜。」

下之遂用溫白丸減川芎附子之二多加龍胆草黃連如東垣五積法從二丸加起每日加一服加至大利然後減丸又從二丸咸起忽一日干利中下黑血塊若干如黑豆大而堅硬從此漸痊而翳盡去以上三則皆

醫學綱目

○盧州知錄彭大辦在臨安暴得眼赤後生翳一僧用蘭香子

本名羅勒又名香

藥又名醫子草洗曬每納一粒入眥內閉目少頃連膜

而出一方爲末點之李時珍嘗取子試之水中亦脹大蓋

此子得濕即脹故能染惹眵淚浮膜耳然目中不可著一

塵此子可納三五顆亦不妨礙亦二異也本草綱目

○張大復云予曰初眇有敷服三花五子丸者或云緩甚益益

三花五子丸

于用乎。遂止。揚州張斗嶽謂予。淮僧某者。久眇。哲然問之。則服三花五子丸也。此古本所載耳。而修合之法稍異。則效不效應焉。比歸請以相與。予病且老。無事于方。然願得之。以濟同病者。張信士通劖術。其言多不妄。筆談

▲
張三丰真人治目疾碧雲膏。臘月取羯羊膽十餘枚。以蜜裝滿紙套籠。住懸簷下。待霜出。掃下點之。神效。即二百味草花膏。另製。

法

兗州朱秀才。忽不見物。朝夕拜天。因夢神傳方。用好硝。硝一兩。銅器鎔化入。飛過黃丹二分。片腦二分。銅匙急抄入。罐內收之。每點少許。卽愈。

張三丰仙方

宋丞相言黃典史病外障翳夢神傳一方用太陰玄精石陰
陽火煅石決明各一兩蕤仁黃連各二兩羊子肝七个竹
刀切晒爲末粟米飯丸梧子大每卧时茶服二十九服至
七日烙頂心以助藥力一月而愈朱氏集驗方

魏全家富母忽然失明王子貞卜之曰明年三月一日從東
來衣青者療之必愈至時候見一人著青綢襦遂邀爲重
設飲食其人曰僕不解醫但解作利耳爲主人作之乃持
斧就舍求犁轍見桑曲枝臨井上遂斫下其母兩眼煥然
見物此曲枝桑蓋井之所致朝野僉載

王靈集要詩云赤眼之餘翳忽生草中鵝不食爲名塞於鼻

鷄兒不食竹
客鼻後五事

中頻頻換。三日之間復舊明。又倪惟德原機啟微方用鷄

不食草

本名石胡荽

晒乾二錢。

青黛川芎各一錢爲細末。

噙水

本草綱目

一日每以米許噙入鼻內。泪出爲度。一方去青黛。

本草綱目

經驗方治目障翳。以熊膽少許。淨水畧調開。盡去筋膜塵土。

入冰片一二片。或瘡痒則加生薑汁些少時。以銅筋點之。

絕奇。赤眼可用。余家二老婢俱以此效。熊膽善辟塵。試之

之法。淨一器。塵其上。投膽一粒許。則凝塵豁然而開。

同上

朱丹溪治飛絲入目。紅腫如眠。痛澀不開。鼻流清涕。用京墨

膾磨以新筆塗人目中。閉目少時。以手張開。其絲自成一

塊。看在眼白上。却用錦輕輕拭出。即愈。如未盡再治。又飛

絲入目用頭垢點入目中卽出神效又昧目鹽與豉置水
中浸之視水其渣立出同

龔子才治一人兩眼角出烟霧此肝火也以柴胡黃連等分
大劑水煎臨卧頻服之數劑乃瘥仍宜入血藥爲要

華州陳明遠瞽十年漢卿視之曰可針也爲翻睛刮翳歛然

辨五色同

上

福建按察使沈文敏其母隨養時雙目失明延一醫療之云
障翳已重藥不能效乃先藥之使不知痛尋以物撥轉眼
睛向內一面向外封閉三日而開視物無一不見云眼睛
惟兩角有筋係之故可撥轉然非削鼻垂手不能也菽園
雜記

京師法雲寺僧律師失明數年夢中有人授一方治內外障
但神水在者皆可療焉二兩二兩上脫一味疑爲首烏抄
本但字下空一字又焉字似
鳥字之訛蔓青子枸杞蒺藜甘菊荆芥穗各一兩當歸地黃川

芎赤芍防風各一兩半十一味末之水麵糊丸桐子大空
腹食前溫水下三二十丸僧服之目復明因目曰夢靈丸

元遺山續

黃堅志

曰彥良壯歲常患赤目一道人曰但能不赤頭則不病此彥
良記之七十餘更無眼疾延壽書

有八年八十餘眸子瞭然夜讀蠅頭字云別無服藥但自小
不食畜獸肝人以木草羊肝明目疑之余曰羊肝明目性

也。以食百草故。他肝不然。畜獸臨宰之時。忿氣聚於肝。肝主血。

不宜于目明矣。

延壽書

陳坡次女痘後餘毒上攻。遂成內障。遍試諸藥。半月不驗。後得老醫一方。用蛇蛻一具。淨洗焙燥。又天花粉等分。細末之。以羊子肝破開。入藥在內。麻皮縛定。用泔水煮熟切食之。凡旬餘而愈。其後程甥亦用此效。

桂菴小乘

萬密齋治孫撫軍淮海患目疾。因宦學政時多閱卷而得今。每閱文案則眼珠脹痛。用八珍湯爲主人參茯苓炙甘草酒洗。當歸酒炒白芍酒炒生地黃去白术以其川芎以其燥也。鼠也。

加麥冬五味子柏子仁棗仁黃連減半。共十一味。孫曰。何

不用菊花蔓荆子曰凡目疾有外因內因由風熱得之爲外因宜發散所謂火鬱則發之也由久視傷血得之爲內因宜以養血爲主所謂目得血而能視也服十數劑全愈。孫文垣治吳小峰與弟小川俱病目專科治之益甚其目始紅腫次加太陽痛繼以白星翳疊出脉之小峯濡緩而大。兩目血縷入貢瞳人薄暮則痛虛小川則洪大鼓指黑珠有浮翳膜隱澁難開大小便皆不利實故于小峯用補。先以清肝散與之夏枯草五錢香附四錢甘草錢半細茶五分以撤其痛治標藥兩進而痛止方法與前婁全善案同繼用人參茯苓熟地杞子桂心牛膝破故紙白蒺藜丹皮治本則桂紙蒺藜當酌用

于小川用瀉內用瀉肝湯及當歸龍鬚丸外用象牙冰片
未點之凡點眼藥研須極細七日全愈經云實者正治虛者從治

川之症唯厥陰肝火熾盛肝常有餘有餘者瀉之正治也
小峯則下虛又爲怒所激怒則火起于肝肝爲藏血之地
故血絲貫瞳人而薄暮作痛故先用清肝散以去其痛再
用甘溫補下元之虛俾火得歸原此從治也若用苦寒降
火之劑恐血凝而痛加且火激而愈熾矣

姪孫眼紅腫脹或以苦寒治時疾之劑與之眼愈腫且增兩
太陽痛再加石膏病不減且遍身脹悶寢食俱廢脉之弦
大無力乃用蔓荆子桑白皮柴胡香附夏枯草甘草芽茶

一帖痛定。兩帖腫消。四帖全愈。

一女孩右目紅腫。腹中飽。乃能開飢。則不能開此。疳積寒症也。以夏枯草二錢。甘草穀精各一錢。香附一錢。五分煎服。

四帖而安。

孫氏婦年過四旬。眼赤腫。太陽痛。大便三日不行。經水四日未止。諸治不效。右目內眥突生。一白泡垂與鼻齊。大二寸餘。耑科見而却走。以爲奇疾。時眩暉不能少動。動則嘔吐。益劇。孫脈之兩寸關俱滑大有力。兩尺沈微。此中焦有痰。肝胆有火。爲怒所觸而然。經云諸風掉眩。皆屬於肝。諸逆衝上。皆屬於火。蓋無痰不作暉也。却未然其白泡乃火性急。

于小川用瀉。內用瀉肝湯及當歸龍鬚丸。外用象牙冰片。
未點之。凡點眼藥研須極細。七日全愈。經云實者正治。虛者從治。小

川之症唯厥陰肝火熾盛。肝常有餘。有餘者瀉之。正治也。
小峯則下虛。又爲怒所激。怒則火起于肝。肝爲藏血之地。
故血絲貫瞳人。而薄暮作痛。故先用清肝散。以去其痛。再
用甘溫補下元之虛。俾火得歸原。此從治也。若用苦寒降
火之劑。恐血凝而痛加且火激而愈熾矣。

姪孫眼紅腫脹。或以苦寒治時疾之劑與之。眼愈腫且增兩
太陽痛。再加石膏。病不減。且遍身脹悶。寢食俱廢。脉之弦。
大無力。乃用蔓荆子桑白皮。柴胡。香附。夏枯草。甘草芽。茶

一帖痛定。兩帖腫消。四帖全愈。

一女孩右目紅腫。腹中飽。乃能開飢。則不能開。此疳積寒症也。以夏枯草二錢。甘草穀精各一錢。香附一錢。五分煎服。

四帖而安

孫氏婦年過四旬。眼赤腫。太陽痛。大便三日不行。經水四日未止。諸治不效。右目內眞突生。一白泡垂與鼻齊。大二寸餘。耑科見而却走。以爲奇疾。時眩暉不能少動。動則嘔吐。益劇。孫脈之兩寸關俱滑大有力。兩尺沈微。此中焦有痰。肝胆有火。爲怒所觸而然。經云。諸風掉眩。皆屬於肝。諸逆衝上。皆屬於火。蓋無痰不作暉也。却未然其白泡乃火性急。

速怒氣加之氣乘于絡上而不下故暴脹垂下也古壯士一怒目皆裂與此理同治當抑肝木鎮痰火先用薑汁益元丸以壓火止吐再以二陳湯加酒連酒芩天麻滑石吳萸竹茹枳實一帖吐止稍能運動仍以二陳湯加芩連菊精草夏枯草香附苡仁吳茱萸四劑赤腫消白泡斂經止而愈俞東扶曰此案見證甚怪治法甚穩因知醫病祇要明理毋庸立異也

呂東莊治吳綺厓弟患左目痛連腦醫以頭風治之不解初時發寒熱後遂壯熱不止呂診之曰火伏于內風燥泉涸木乃折矣非得汗不解也或曰汗須用發表藥獨非風燥

乎。且發汗藥須擁被悶卧乃得。身熱甚苦此奈何。難得妙呂

曰。庸醫發汗皆屬強逼。故須擁被悶卧。然而汗不可得也。

說破此輩伎倆。正是教人苦心。今藥非此類。雖薄衾舒體。時雨自至。豈能

阻遏哉。

語欠圓活

乃用龍腦白朮飲子。

必逍遙無疑

夜分大汗淋漓。

次日頭目爽然矣。

龍腦白朮飲子無從考核

有謂即趙氏加減逍遙散未知是否原注

按雄

議論超妙而所用之方仍是風。

似與泉涸二字失照應矣

劑

吳孚先治一人目痛。乞葉一片刺鼻之迎香穴。出血而痊。

鼻內迎香穴乃手足陽明交經也。

治法本張子和

王宗蒼目珠紅赤驚悸。腸鳴色天不澤。左手浮空。右關尺重。

按無力。吳曰。此肝腎交虛。不能制遊行之火。非肺家實火。

也。朝服加味歸脾湯。夕服八味丸。不一月白珠紅退。脈漸冲和矣。

法妙

楊竇亨治一貴人患內障性暴躁。時時持鏡自照。計日責效。數醫不愈。召楊診曰。公目疾可自愈。第服藥過多。毒已流入左股。旦夕間當發毒。竊爲公憂之。旣去。貴人日夕視左股。撫摩惟恐其發也。久之目漸愈。而毒不作。貴人以楊言不驗。召詰之。對曰。醫者意也。公性躁欲速。每持鏡自照。心之所屬。無時不在于目。則火上炎。目何由愈。故詭言令公凝神于足。則火自降。目自愈矣。雄按此移情妙法。醫能隅反勝用。逍遙越鞠諸方矣。

兵行詭道。惟醫亦然。貴人曰。良醫也。厚禮而遣之。筠齋漫錄江西

通志載

此大畧

范武子嘗患目痛就張處度求方處度因嘲之曰古方宋陽里子少得其術以授魯東門伯魯東門伯以授左邱明及漢杜子夏鄭康成魏高堂隆晉左太冲凡此諸賢並有目疾相傳此方云一減思慮二專內視三簡外觀四旦晚起五夜早眠熬以神火下於氣海蘊于胸中然後納諸方小修之一時近能數其目睫遠視尺箋之餘長服不已洞見牆壁之外非但明目乃亦延年全

黃履素曰子少時神氣不足患目每用目少過輒酸澁無光者累日博考方書多云六味地黃丸可治目子連服二三

料目疾轉甚改用別方補腎氣血之藥始得少愈後讀醫
學鉤元有目病不宜服六味丸辨謂澤瀉茯苓滻水山茱
萸不宜于目山萸味酸肝開竅于目經云肝病者毋多言
食酸凡肝腎病皆不宜此三味不惟目也

之甚詳以予驗之此論良是然從今思之目病有屬血虛
亦有屬氣虛者予血固不足氣則尤虛薛立齋治兩目翳
澁不能瞻視以爲元氣下陷用補中益氣湯倍加參耆而
愈予悔往時不多服前湯而專事于補腎養血致久不痊
迨四十後以指麻多服前湯原無意于治目而目光漸充
始信往時之誤予幼時患風弦爛眼甚受其累百藥罔效
遇一陳姓醫士于長安邸授予白未藥令敷于眼眥患處

隨敷隨愈。取效如神。不肯傳方。予略訪之云。有吐蛔在內。
吐蛔者。小兒口中吐出蛔虫。收乾候用。其中想更有製就。
蘆甘石配之者。真奇方也。

張三錫治一人病目久不能治。涼藥盡試不應。診之。兩手微
弱。命服八珍加麥冬。一月如舊。乃知飲食不運。腸胃枯澁。
髮落皮皺。噎膈淋閉等症。目昏耳聾。悉由氣液血脉榮衛
衰少。不能升降出入。虛火阻滯而然。故元府閉則小便淋
濁。火炎上則目視昏花。有如隔簾視物之象也。丹溪東垣
治目昏。用參芪補養氣血。久靡不獲效。以氣血旺。則元府
得利。升降清明也。

一人目赤黑珠傍暗赤成瘡耳中痒作腎臟風治用四生散
每作三二服卽愈時稱爲聖散聖惠方白附子黃芪獨活
沙苑蒺藜也

一人拳毛倒睫用木鱉子一个去殼爲末綿裹塞鼻中左塞
右右塞左一二夜其睫自分治法

陸肖愚治孫憲副夫人固怒氣患兩目赤痛兩太陽亦痛治
及半月赤痛益劇且腫大如桃經行數日不止大便數日
不行飲食不進頭眩吐逆脈之左弦右滑上下俱陽分有
餘曰相火寄位于肝胆怒氣觸之其發如龍雷不可逆折
病雖上劇而下緩然實因下而逆于上也用醋炒柴胡青

皮吳茱萸炒黃連鹽水炒黃柏酒炒黃芩白芍丹皮青黛
竹茹爲煎劑。以抑青丸合龍鬚丸。一日夜煎丸各二服。遂
減大半。第大便未行。經血未止。煎劑仍前。以抑青丸合潤
字丸投之。便行極瀉。進粥安睡。明日諸症俱愈。後以清氣
養榮湯調理之。

○老人年八十四夜能細書。詢之云。得一奇方。每年九月二
十三日桑葉洗目一次。永絕昏暗。宜五月五日六月六
日立冬日採者佳

○倪新溪母陶氏。哭子喪失明已十一年。忽一人踵門曰。吾能
療瞽。時其孫上成均。宗黨會餞。具在其人。曰。諸君但少留
此視之。發囊出針。針其目兩眥。目頓能見物。撫其孫頑曰。

吾久不覩汝今成人矣新溪德之手百金謝其人不受而

去衆以爲神

雲間雜誌

九江有夫毆其婦致雙睛突出適有兵過其門令勿動取手巾水濕盛睛旋轉使其系不亂然後納入卽以濕巾裹住令三日勿開其婦性急閉二日遂解巾眼好如故但遇風寒常發痛云解早之故也

奇疾方王
帶存抄輯

晉顧含養嫂失明嘗藥視膳不冠不食嫂目疾須用蚺蛇膽含計盡不得有一童子以一合授含開乃蚺蛇膽也童子出門化爲青鳥而去嫂目遂瘥

晉書

王叔權云卽執子遊學會稽早觀晉辰牌方食久之患目澁

倦遊而歸同舍遺以鹽精數次揩目而疾除鹽精且爾則
青鹽之治目固也古方用青鹽揩牙因掬在手洗目而目
明鹽精乃鹽倉地下之精英資生經

○唐丞相李恭公扈從在蜀中日患眼或澁或生翳膜或卽疼
痛或見黑花如豆大累累數日不斷或見如飛蟲翅羽百
方治之不效僧智深云相公此病緣受風毒夫五臟實則
瀉其子虛則補其母母能令子實子能令母虛腎是肝之
母今腎受風毒故令肝虛肝虛則目中恍惚五臟亦然脚
氣消中消渴諸風等皆由腎虛也此僧深得經旨雖未能
暢發所以終是唐人高

手諸說紛紛徒亂人意耳地黃丸悉王之用生地黃熟地黃各一斤石

八

烟眼皮方

解防風皆去蘆枳殼。炒去穰。牛膝酒浸。杏仁去皮尖各四兩。右爲細末。不犯鍊器。煉蜜丸如桐子大。空心以豆淋酒下五十丸。豆淋酒法。黑豆半升淨揀簸炒令烟出。以酒三升浸之。不用黑豆用此酒煮獨活卽是紫湯。百乙方

陸景淵之子患爛弦風眼。兩目皆痛。淚漬兩頰皆卽成瘡。百藥不效。因理故書得此方。試點之。須臾藥淚俱下。循瘡中流出。其間有小丘。自此遂愈。甚妙。黃連一兩。淡竹葉一兩。柏樹皮乾用一兩。而半濕用二兩。右三味咬咀以水二升煎至五合。稍冷用滴目。皆及洗爛處。日三四用全。

咒偷針眼已結赤腫。未成膿者。神驗。取患人衣衫角。以手緊

捻定于所患眼大背上搵之每一搵卽念一聲移甚底移
擦眼如此一氣念七過搵七遍訖隨身就手擦令緊打一
結結定自然便退直候眼安方解切在志誠不須令病人
知咒語或欲自移亦甚可全

上

朱丹溪治一人病眼至春夏便發當作鬱治用黃芩

酒浸

南星

薑香附蒼术

俱童便浸

連翹

各二兩

山梔

炒一兩

川芎

童便浸一兩半

陳皮

兩半

製酒

草龍胆

酒蒸

羅荀子青黛

各半兩

柴胡

三錢爲末

神麴糊丸服

之旬月而愈

治法

華川陳明遠患瞽十齡百藥屢嘗而不見効自分爲殘人松
陽周漢卿視之曰是醫翳雖在內尚可治用針從眥入睛

背捲其翳下之目。欵然辦五色，陳以爲神。

續粹

趙良仁云、丹溪先生嘗用參膏治一老人目暴不明昏暗。如夜正靈樞謂氣脫者目不明是也。余亦曾治一士人患頭

風連左目壅痛。從戴人法于百會上星出血皆不效。遂在頭偏左之足太陽所過第二行與上星對平。按之痛甚處出血立愈。由是而言針之與藥必切中病所。藥與邪對然後可愈。前人之方不過立規矩耳。藥要或問

繆仲淳從父病後眼花。服此立愈。蓋肝腎二經虛也。真甘枸杞一斤去蒂。真懷生地黃。一斤極肥大者酒洗淨河水砂鍋內熬膏。以無味爲度。去渣重湯煮滴水成珠便成膏也。每膏一斤。

入煉蜜六兩。空心白湯化下。廣筆記

○黃學諭潛白患風淚眼、每出則流淚盈頰、繆仲淳疏一方寄之、穀精草爲君、蒺藜和枸杞之屬佐之、羊肝爲丸、不終劑愈。

薛立齋治一男子眼赤痒痛、時或羞明下淚、耳內作痒、服諸藥不効、氣血日虛、飲食日減、而痒亦盛、此脾胃風熱土攻也、以四生散白附子黃芪獨活砂苑蒺藜酒調四服而愈、又一人頭目暈眩、風膚瘙痒、搔破成瘡、以八風散治之亦愈。

○張石頑治澄和尚患眼疾二年、服祛風清熱藥過多、致耳鳴嘈嘈不止、大便艱苦燥結、近左眼上有微翳、見燈火則大

如斗見月光則小如螢張曰此水虧而陰火用事也月乃
陰精腎水內涸不能泛濫其光故視之甚小燈本燃膏之
焰專擾乎陰不能勝其灼爍故見之甚大合脈參證知爲
平日勞傷心肺火土二臟過燥並傷腎水真陰也遂疏天
王補心丹與之他如徐中翰燕及見日光則昏瞓如蒙見
燈火則精彩倍常此平昔恒勞心腎上盛下虛所致上盛
則五志聚於心胞暗侮其君下虛則相火失職不能司明
察之令得燈燭相助故精彩勝常此與嬰兒胎寒夜啼見
火則止之義不殊專事眼科者能悉此義否

士齋曰世傳眴皆初生小泡視其背上卽有細紅點如瘡以

針刺破眼時卽瘥故名偷針實解太陽經結熱也人每試之有驗

△
張子顏少卿晚年常目光閃閃然中有白衣人如佛相者子
顏信之彌謹乃不食肉不飲酒然體瘠而多病矣一日求
汪壽卿診卿一見大驚不復言但投以大丸數十小丸千
餘粒囑曰此十日內服之當盡却以示報旣如約視所見
白衣人變黃而光無所見矣乃欲得肉食欲思飲酒又明
日黃亦不見竟氣象異他日矣乃詣壽卿以告卿曰吾固
知之矣公脾初受病爲肺所乘心脾之母也公旣多疑心
氣不固自然有覩吾以大丸實其脾小丸補其心肺爲脾

之子既不能勝其母而病自愈矣。

道山清話
未選入

沈存中云子爲河北察訪使時病目赤四十餘日黑暗傍黯赤成瘡晝夜作楚百治不效郎官邱革相見問子病目如此曾耳中痒否若耳中痒即是腎家風有四生散療腎風

每作二三服即瘥間里號爲聖散子予傳其方合服之午

後一服臨卧一服目反大痛至二更乃能眠及覺目赤稍

散不復痛矣更進三四服遂平安如舊是時孫和甫學士

帥鎮陽聞子說大喜曰吾固知所以治目矣向久病目膏

見呂吉甫參政曰頃目病久不差服透冰丹乃瘥如其言

修合一劑試服了二三十服目遂愈乃知透冰丹亦療腎

風耳。未選

入

龔子才治一人。兩目作痛。服降火祛風之藥。兩目如綈。倦殊甚。用十全大補湯數劑。諸症悉退。後服補中益氣湯。兼六味丸而愈。復因勞後。目澁體倦。仍取十全大補而痊。一人目赤不明。服祛風散熱藥。反畏明重聽。脈大而虛。此因勞心過度。飲食失節。以補中益氣湯。加茯神棗仁山藥五味。頓愈。又勞役復甚。用十全大補兼前藥而痊。

前日與歐陽叔弼。晁無咎。張文潛同在戒壇。子病目昏。將以

熱水洗之。文潛曰。目忌點洗。目有病當存之。齒有病當勞

力。雄按此治目疾之妙法。蓮華經也。

庸人自擾。宜乎肓矣。不可固也。又記魯直語云。治目

當如治民。治齒當如治軍。治民當如曹叅之治齊。治軍當如商鞅之治秦。頗有理。故追錄之。

東坡志林

相公崔公慎由廉察浙西。左目皆生贅。如息肉。欲蔽瞳人。問極諸醫方。無驗。譚簡見曰。此立可去。但能安神。不撓獨斷。于中。則必效矣。崔公曰。如約。雖妻子必不使知。譚又曰。須用九日晴明。亭午。于靜處療之。若其日果能遂。心無憂矣。是時月初也。至六七日間。忽陰雨甚。譚生極有憂色。至八大開霽。問崔公飲酒多少。崔曰。量雖至小。亦可引滿。譚大喜。是日于使宅北樓請飲酒數杯。端坐無思。俄而譚以手微捫所患。曰。殊小事耳。初覺似拔之。雖痛亦可忍。又聞

動剪刀聲乃白崔曰此地稍暗請移往中庭坐既定聞櫛
然有聲先是譚請好綿數兩染縫至是以絳綿拭病處兼
傳以藥遂不甚痛請開眼看所贅肉大如小子指堅如乾
筋遂命投之江中後數日詔徵入秉鈞因語錄

唐趙璘

魏玉橫曰金封翁年近七旬病暉厥卽類中風也小愈後眼
花不良干步或教以一味白蒺藜水泛爲丸每早晚服四
錢既可祛風又能明目且價廉而工省纔服數日覺口咽
苦燥再服遂陡然失明重以鬱怒暉厥復作目閉不語汗
出如珠延診脈已散亂姑以熟地二兩杞子二兩煎服一
時醫至不敢主方欲就中加附子一錢謂重劑純陰宜少

入陽藥，余曰此症外間多用參附湯。有致筋枯皮黑人，未死而半身先死者，以衰微之陰被刲也。雄按此眞閼厯之言余亦目擊多人

矣。今症屬三陰虧竭，五志之火上炎，故卒然暈厥，且病人

以誤服白蒺藜之燥，失明而病作，寧可再服附子，醫乃默

然去一味服下，神氣漸甦，乃減半入沙參麥冬沙苑蒺藜

而愈。今常服之，兩年許能辦磁器花色矣。後復更醫，不知

何病而卒。

盧玉川年六旬外，久病脇痛，凡一切香竄古方，莫不遍嘗。後一醫與丸方，以胡蘆巴爲君，餘多伐肝之品，服之，脇痛果暫愈。既而一目失明，猶不謂藥之誤也。再服則兩目俱損。

續醫案卷十七
○
腸痛轉甚。延診以大劑生熟地。杞子女貞沙參麥冬。蔓仁與之一服卽愈。始悟向藥之非。然目中黑水神光枯竭已久。不能復矣。

一人年二十左右求診無他病。唯日入則兩目無所見。此卽諺語所謂雀盲是也。其脈唯左關大。左尺極微。語之曰。君得毋新婚乎。曰。然。與生地。杞子。牛膝。甘菊。沙參。麥冬。女貞。四劑而愈。因戒其房幃撙節。否則再發成廢人矣。

方懋春內人患瘡荆防二味爲時師治瘡所不可缺者。服四劑不慮其芳香燥烈竟致兩目赤腫眵淚成障也。已逾月漸次失明。診之兩寸上溢且弦數。令以前方加當歸白芍。

數服而愈。其姪亦同此患。時已瞳人迸出。不及藥矣。

消障救睛散。石蟹錢半生研。羚羊角一錢草決明一錢。蓮翹
錢半。白蒺藜一錢。龍胆草五分。酒炒灰甘菊八分。木賊草
五分。漢防己一錢。茺蔚子一錢。水二盃煎八分。食遠服。王
晉三曰。白睛胬肉狀若魚胞。世人咸用外點鈎割。殊非正
治。余因製此方。以石蟹爲君。性大寒而燥。去溼忍消。胬肉
如鼓應桴。堪稱仙品。佐以羚羊角之精靈。熄肝風。散惡血。
草決明療青盲。去白膜。連翹瀉客熱。散結氣。專泄大小眥
之熱。酒炒龍胆草退溼熱。之鬱翳。白蒺藜散風破血。木賊
防已療風勝溼。甘菊化風。茺蔚行血。諸藥皆入肝經。仍能

上行於肺用之屢驗。

尤在涇曰目赤腫痛人知降火而不知活血所以多不得力。只用四物湯內地黃用生芍藥用赤加蒸大黃赤茯苓薄荷葉治之甚妙此戴復菴法也余謂目赤腫痛人知活血而不知治痰脾胃壅滯積熱生痰積痰生熱輾轉相因氣沖頭目昏痛不已者須用半夏石菖蒲黃芩枳實茯苓陳皮微兼菊花白蒺藜之屬治之。

耳

許叔微治一男子年二十歲因瘡毒後腎經熱右耳聽事不

明每心中拂意則轉覺重虛鳴疼痛地黃湯生地枳殼羌活桑白皮磁石甘草防風黃芩木通右爲粗末每服四錢水煎日二三服不拘時候綱目

朱丹溪治馮官人左耳鳴此因勞得之法當補陰而鎮墜之。

黃耆人參當歸陳皮茯苓升麻酒柏防風甘草白芍食前熱飲飲了去眠一覺綱目其方則似補氣而升舉之非補陰鎮墜也

薛立齋治一人耳內不時作痛痛時欲死痛止如故六脉皆安非瘡也。話間忽作度其有蟲令急取猫尿滴耳果出一臭蟲遂不復痛或用麻油滴之則蟲死難出或用炒脂麻枕之蟲亦出但不及猫尿之速也。取猫尿法用生姜擦猫鼻其尿自出

趙養葵治一小兒患耳膿醫以藥治之經年累月不效殊不知此腎病也用六味丸加桑螵蛸服之愈。

吳孚先治張司馬素有火症兩耳腫痛係少陽風熱勸延針灸科刺聽會合六臨泣尋愈。

柴嶼青治汪謹堂夫人兩耳蟬鳴昕夕不歇服過人參熟地四兩無少效柴曰腎開竅于耳心亦寄竅于耳治耳必責之腎固矣但診得兩尺尙屬有神決非腎虛左寸亦平緩無疴惟右寸關洪大此肺胃兩部風熱所壅而致遂不治病而治脉雄按鼻塞治心耳聾治肺非僅治脈也用清解之劑不數服而右耳已愈再服數劑兩耳全愈因思耳目口鼻雖于五臟各

有分屬而內竇相通。治病惟以切脉爲憑。夫固有治在此而效在彼者。全在一心之圓機活法也。

李元淳尚書在河陽日。蚰蜒入耳無計可爲。時悶有聲。至以頭擊門柱。奏狀危困。御醫療之不驗。忽有人獻方。用胡麻油作餅枕卧。須臾自出。乃愈。圖經本草綱目

江湖記聞云。有人壁風入耳。頭痛不可忍。百藥不效。用稻稈灰煎水灌入。卽死而出也。又蒿草搗汁滴入。亦能出百蟲入耳。本草綱目

薛立齋治一婦人。耳內或耳後項側作痛。寒熱口苦。月經不調。此肝膽經火兼傷脾胃。用四君加柴胡升麻葛根白芍。

而愈。後因勞役怒氣嘔吐脇脹。用六君子湯加山梔柴胡而安。

一婦人耳內外腫痛。胸脇不利。寒熱往來。小便不調。此肝火傷血。先用龍胆瀉肝湯四劑。諸症頓退。又用加味逍遙散而愈。又因怒復作。用小柴胡湯而痊。

一婦人經行後。因勞怒發寒熱。耳作痛。以經行為血虛。用八珍湯加柴胡。怒氣爲肝火。用加味逍遙散。勞役爲氣傷。用補中益氣湯加山梔而愈。

一婦人素鬱怒。耳內作痛。腫瘍寒熱。面色青黃。經行則變赤。用加味歸脾湯加味逍遙散而愈。

一婦人懷抱素鬱。因怒耳作腫痛。經行不止。發寒發熱。面色青赤。肝脉弦數。此久鬱傷脾。暴怒傷肝。先用加味小柴胡湯。隨用加味道遙散而痊。

一婦人因怒發熱。每經行兩耳出膿。兩太陽作痛。胸脇乳房脹痛。或寒熱往來。或小便頻數。或小腹脹悶。皆屬肝火血虛。先用梔子清肝散二劑。又用加味道遙散數劑。諸症悉退。乃以補中益氣而痊。

喻嘉言議王大司馬耳鳴症曰。人之陽氣走上竅。而下入於陰位。則有溺泄腹鳴之患。陰氣走下竅。而上入於陽位。則有窒塞耳鳴之患。故人當五十以外。腎氣漸衰於下。每每

從陽上逆。腎開竅於耳。而以肝木爲之子。是以謀慮鬱怒之火一動。卽疏洩母氣。而陰氣從之上逆。與聾病相去天涯。聾病者。竅中另有一膜遮閉。外氣不得內入。故以開竅爲主方書所用菖蒲麝香。及外填內攻等法。皆爲此而設。耳鳴乃陰氣冲至上竅。亦隔一膜。不能越出竅外。止於竅中。薄薄有聲。如蛙鼓蟬鳴。外入之聲。爲內聲所混。聽之不清。若氣稍不逆上。則聽稍清。氣全不逆上。則聽全清矣。治此之法。以重用磁石爲主。以其重能達下。性主下吸。又能制肝木之上吸也。用地黃龜膠羣陰之藥輔之。更用五味山萸之酸。以攻之令陰氣自旺於木宮。不上觸於陽竅。然

後清清朗朗。聲入卽通。無壅碍也。方書指爲少陽胆厥陰。肝。一經熱多所致。然少陽之氣能步走上竅。皆絡於嶺頂。無觸筋沖耳之理。不當與厥陰混同立說。通聖散一方。汗下兼用。乃治壯火之法。惟滾痰丸。少壯用之。多有效者。以黃芩大黃沉香之苦。最能下氣。而礞石之重墜。與磁石之用相仿也。高年之人。腎水已竭。真火易露。故腎中之氣。易出難收。况有厥陰之子。爲之挹取乎。然則壯水之主。以制陽光。如蓋中添油。燈焰自小。豈非良治哉。

一婦人耳內腫痛。出水寒熱。口苦。腫連頸項。飲食少思。此肝火甚也。用小柴胡湯加山梔丹皮稍愈。又加味逍遙散漸

愈用八珍湯加柴胡丹皮山梔調補肝脾全愈。

一婦人耳內腫痛胸脇不利寒熱往來小便不調此肝經發熱也用龍胆瀉肝湯四劑諸症頓退用加味逍遙散而愈又因怒復作用柴胡清肝散而痊

一婦人耳內不時脹痛內熱口乾勞則頭暈吐痰下帶此肝脾氣虛也朝用補中益氣夕用加味逍遙散而痊

一寡婦耳內外作痛不時寒熱脈上魚際此血虛之症用小柴胡加生地以抑其血而愈又頂間結核如貫珠寒熱肺熱用加味歸脾湯加味逍遙散調補肝脾而愈

一婦人耳內外或作痛或赤腫或寒熱月經旬日而止潮熱

內熱自汗盜汗此肝脾氣血俱虛而有熱用歸脾湯六味丸而愈

一婦人性急或耳內作痛或耳外赤腫發熱脇脹日晡益甚此怒氣傷肝氣血俱虛朝用加味逍遙散加黃柏桔梗夕用歸脾湯送地黃丸而愈

一婦婦耳內外作痛或頂側結核內熱晡熱月經不調吐痰少食胸膈不利此鬱怒傷肝朝用歸脾湯以解脾鬱生脾氣夕用加味逍遙散以清肝火生肝血而愈

一女子耳下腫赤寒熱口苦月經不調小腹內結一塊此肝火氣滯而血凝也先用小柴胡加山梔川芎丹皮又用柴

胡清肝散而痊。

一婦人耳腫痛發寒熱與荆防敗毒散四劑表症悉退以散腫漬堅湯數劑腫消大半再以神效瓜蔓散四劑而平

一男子肝經風熱耳下腫痛發熱脈浮數以薄荷丹治之愈

薄荷皂角連翹三稜首烏蔓荆豆豉荆芥

一男子每怒耳下腫或脇作痛以小柴胡湯加青皮木香紅花桃仁四劑而愈

一婦人耳鳴內熱經行不調肢體倦怠飲食無味以肝脾虛熱用四君加柴胡山梔丹皮甘草而愈

一男子耳內出膿或痛或痒服聰耳益氣湯不應服防風通

聖散愈甚以補腎丸治之而愈

魏玉橫曰朱余二女中表姊妹也年十六七朱則耳痛常發癰癧因感冒痛暴甚耳門連頂皆腫以養青湯加黃芩羚羊蔓仁二劑而愈余則耳痛常流膿水因患瘻醫與荆防發之遂出血不止膈間曹竦前方去羚羊加知母赤芍二劑血止數劑膿水乾二人脉皆關弦寸鼓乃腎與肝胆之火也

余某早失怙恃困苦顛連年十四就西溪吳氏質庫食力值冬月查盤提唱勞劇忽右耳暴痛不可忍如刺如錐約一日夜內起一疱迸出黃水涓滴不絕數日乃乾第水出則

痛減水乾則痛除自後過勞卽發其痛至欲求死如是者年必數次偶問一醫彼見少年得此謂由暴怒傷肝瘀血爲患教服抵當丸不知此屬勞傷肝腎龍雷之火上攻而然幸合藥時肆中無蟲蟲水蛭竟因循不服後年二十餘右耳漸聾病遂不作蓋此中經絡枯絕火亦不能透達也

雄按余亦十四歲失怙而廢書服賈雖困苦備嘗而尙不致有疾者以母氏主持家事也讀此旣感少境之與先生相類又憾學術空疏不能起老母之危病涕淚交流爲之掩卷

葉天士治丁某腎開竅於耳心亦寄竅於耳心腎兩虧肝陽亢逆故陰精走泄陽不行依是以耳鳴時閉但病在心腎其原實由於鬱鬱則肝陽亢胆火上炎清晨服丸藥以

補心腎。午服湯藥。以清少陽。以胆經亦終於耳也。水煮熟地四兩。麥冬一兩半。龜板二兩。牡礪兩半。白芍兩半。北五味一兩。建蓮兩半。磁石一兩。茯神兩半。沉香五錢。辰砂五錢爲衣。煎方。夏枯草二錢。丹皮一錢。生地三錢。山梔一錢。女貞子三錢。赤茯錢半。生甘草四分。

徐靈胎曰。方極清和可喜。耳聾之法多端。大端不過清上鎮下二條。此案方極穩當。至於外治之法及虛寒等症。亦不可不知也。

鼻

張子和治常仲明嘗于炎暑時風快處披露肌膚爲風所賊
三日鼻窒雖坐於暖處少通終不大解使服通聖散入生
薑葱根豆豉同煎三兩服大發汗鼻立通矣。此由傷風而得

有人患鼻中有瘻肉垂出鼻外不聞香臭用瓜蒂細辛等分
爲細末以綿包如豆許塞鼻中須臾鼻即通瘻肉化爲黃
水點滴至盡三四日愈又望惠方用陳瓜蒂以羊脂和傅

上日三次效

醫學綱目

薛立齋治一男子面白鼻流青涕不聞香臭三年矣此肺氣虛也
用補中益氣湯加山梔麥冬而愈。

陳都憲夫人患鼻疳爛通鼻孔用鹿角一兩白矾一兩瓦上

煅過人頭髮五錢。燈火上燒過爲末。用花椒湯洗淨。繆藥
疳上三四次卽愈。如不收口。瓦松燒灰存性。研末乾糲之。
卽收。

一人酒皰鼻紅赤。用金花丸晚服。芥連梔柏大黃桔梗白葛粉井水爲丸用六味地黃丸全料。加當歸二兩。苦參四兩。空心服。不兩月而愈。

孫文垣治吳儀制尙卿弱冠時病鼻塞不能飲者四年。且卽寒月更甚。口渴咽喉邊有痰核。脉之右寸關洪滑。此肺經痰火症也。與前胡秦艽葛根薄荷石膏天花粉元參貝母山梔甘草白藥子桔梗丹皮四帖而卽止。夜與牛黃三清

丸數粒噙之。鼻氣卽通利能嗅噙未旬日全愈。

一婦人方妙齡表虛易感風寒致成鼻淵流清涕不止便覺頭暈。兩太陽常痛且多噴嚏脈之兩寸洪大用秦艽酒芩桑白皮馬兜鈴各八分白芍一錢滑石石膏各二錢枳殼蔓荆子各五分甘草三分四帖而愈。

病鼻赤者乃陽明胃經火上炎一方只食鹽一味研細每晨起撮少許擦齒噙水蕩漱旋吐掌中掬以洗面行之月餘而鼻色復舊且有益于齒。蘇談

吳學先治一人患鼻淵十載乃肺脾氣虛下陷須用補中益氣湯百劑方愈不信用白芷防風辛夷川芎等味病轉甚。

復求治。與前方百帖而痊。

丹溪治一中年人右鼻管流濁且臭脈弦小右寸滑左寸濶
炙上星三里合谷次以酒芩二兩蒼朮半夏各一兩辛夷
川芎白芷石膏人參葛根各五錢分七帖服之全愈乃痰
鬱火熱之症也。大還

一人鼻中流臭黃水脳亦痛名控腦沙有蟲食腦中用絲瓜
簾近根三五尺許燒存性爲細末酒調服卽愈又炙法顙
會在鼻中直上入髮際通天在顙會上一寸兩旁各一寸灸七壯隨鼻
左右炙常見炙後去臭肉一塊從鼻中出臭不可言而愈
有人卒食物從鼻中縮入腦中介介痛不得出以牛脂或羊

脂。如指頭大內鼻中。以鼻吸入。須臾脂消。物逐脂出也。治法

彙

孫文垣治從姪中叔。以暑月赴南雍。一日假出。索茶飲之。趣從左鼻逆流而出。入腹者十之三。治幾一月。卽粥飯亦多鼻出矣。服藥漸加。惡心頭暈。肌削四肢無力。診畢。詢醫作何症。投何劑。曰。僉謂此疾。書所不載。治法無稽。或云胃火。或云諸逆上衝。皆屬肝火。所用非黃連解毒。卽三黃石膏。及諸苦寒之劑。自以多飲火。因酒動理。或爲然。然竟無效。曰。治病貴辨經絡之貫通。與臟腑之出入。豈拘拘徒守方書而已哉。經云咽喉者水穀之道路氣之所以上下者也。

頑頽者分氣之所洩也。人之涕出不收者。頑頽不開也。此症亦類是耳。頑頽不開故氣上而不下。會厭弱而不能揜其氣喉。夫鼻干氣喉相通惟不揜故飲食逆從鼻竅而出。不見常人偶氣逆則飲食從噴嚏出乎。今右脉緩弱無力。氣虛明矣。經云形寒飲冷則傷肺脾胃喜溫而惡寒。因多服寒涼所以惡心頭暈肌削也。蓋肺屬金而主氣。金氣旺則收歛下降。氣下降則飲食自不逆矣。六君子湯加辛夷桑白皮苡仁沈香一進而勢緩三進而止大半。七劑全安王執中母氏久病鼻乾有冷氣問諸醫者醫者亦不曉但云疾病去自愈既而病去亦不愈也後因寒絕骨而漸愈執

中亦常患此偶絕骨微疼而著艾鼻乾亦失去初不知是
炙絕骨之力後閱千金方有此症始知鼻乾之去因炙絕
骨也若鼻涕多宜炙顙會前項大人小兒之病初無異焉
許知可自停飲食已必嚏服棗膏丸而愈本事
方

孫氏姑鼻不聞香臭有年矣後因他病友人繆仲淳爲處方
每服用桑皮至七八錢服久而鼻塞忽然通矣

魏玉橫曰沈晉培年三十許患鼻淵黃濁如膿時醫以爲風
熱上淫于腦與薄荷辛夷川芎蒼耳白芷蔓荆古方治之
不效反增左邊頭痛所下涕亦唯左鼻孔多就診曰此肝
火上炎爲疾耳與生熟地杞子沙參麥冬十餘劑而愈是

症由傷風用力去涕而得者易愈。若因火盛而成，必由水
虧而致。蓋肝脉上絡顱頂，督脈會腦爲髓海，爲龍火鬱蒸。
故膿濁腥穢源源而下，有若淵然久之督脈之髓，亦隨輸
泄，致成勞損者有之。醫學自立齋以前，宋元明初諸公，未
詳肝腎之治。至國朝諸老，亦漸講明。然多襍著术桂附。
惟集靈膏一方，最善治法，彙載之。但云吳中一醫用之所
向，神效是亦知其然而未知其所以然也。故守兔園一冊，
其覆餗多矣。

一瞽者徐姓，年三十來，鼻淵年餘，醫亦與辛散服之，覺反甚。
遂堅守不藥之戒。此古人心靜，自能消息病情，故不爲庸

手所誤後遇予教服集靈膏十餘帖而愈。

一費氏子年二十餘亦患此症時師與辛夷蒼耳芎芷荆薄之屬至百二十劑後就診于予兩手脈神氣索然告以不可治矣果月餘而歿。

廣筆記曰經云膽移熱於腦則爲鼻淵夫髓者至精之物爲水之屬腦者至陽之物清氣所居今爲濁氣邪熱所干遂下臭濁之汁是大能消物腦有所傷也治法先宜清肅上焦氣道繼以鋪墜心火補養水源此其大略耳藥多取夫辛涼者辛爲金而入肺有清肅之義故每用以引散上焦之邪如薄荷荆芥甘菊連翹升麻鼠粘子天麻之屬鎮墜

心火補養。水源如犀角人參天冬麥冬五味硃砂甘草。山藥生地茯苓丹皮之屬。然須兼理肺肝。蓋鼻乃肺竅。而爲腦氣宣通之路。又治乎上焦。而行清肅之令。胆爲脊升少陽之氣。與厥陰爲表裏。而上屬於腦。戴人有云。膽與三焦尋火治。內經謂膽憇由肝。義亦明矣。理肺用桑皮鼠粘桔梗二冬。花粉竹瀝。清肝胆以柴胡白芍。羚羊角竹茹。棗仁川芎。或者謂世人多用辛溫。辛憇之藥取效。此義何居。蓋辛憇甘溫。多能宣通發散。故病之微者。亦能奏效。此從治刧法。非不易常經。明者察之。

口瘡、俗呼爲心勞口瘡、三年不愈。令以長流水同薑棗煎五
苓散五七錢空心使服之以治其下。以宣黃連與白茯苓
去皮。一味各等分爲末。以白麵糊爲丸。食後溫水下三五
十丸以治其上百日而愈。作溼火治

一男子病口瘡數年。上至口中至咽喉。下至胃脘皆痛不敢
食。熱物一涌一泄。一汗病去。其九次服黃連解毒湯。不旬

日旨釋作實火治

一男子年二十餘。病口中氣出。臭如發廁。雖親戚莫肯與對。語張曰。肺金本主腥。乃金爲火所煉。火主焦臭。故如是也。久則成腐。腐者腎也。此熱極則反兼水化也。病在上。宜涌之。先以茶調散涌之。去其七分。夜用舟車丸瀆川散下五行。比旦而斷。嗚呼人有病口臭。而終其身者。世說以爲肺系偏。而與胃相通。故臭妄論也。

立齋治廷評曲汝爲。口內如無皮狀。或咽喉作痛。喜熱飲食。此中氣真寒。而外虛熱也。用加減八味丸而愈。虛寒

一人胃弱痰盛。口舌生瘡。服滾痰丸愈甚。反瀉不止。惡食倦怠。此胃氣被傷也。與香砂六君子湯數劑少可。再以補中。

益氣湯加半夏茯苓而愈。

立齋治一男子口臭、牙齦赤爛、腮膝痠軟。或用黃柏等藥益甚，時或口鹹。此腎經虛熱。以六味丸悉愈。虛熱

孫文垣治汪東之，手談過勞，口中生瘡，凡進大苦大寒之劑，十餘日瘡益甚延及於喉，藥食難進。脈之，六部俱豁，大無力。有耑科欲敷口疳藥。令以荆芥湯洗而引之。攬出稠涎二三碗，傾於地。偶一雞爭啄之，立斃。其毒如此。亦症之奇者。乃囑其用藥，只可吹入喉中。必俟喉全好，然後敷舌舌。好再敷口唇，毋得概敷。令毒無出路，反攻入喉，則誤事矣。謂其父曰：此虛陽口瘡也，非附子理中湯不可救。曰：瘡乃

熱症。况上身已熱。又天時酷暑。大熱之劑。其敢進乎。曰此陰盛格陽之症。悞服寒涼。激之。試探兩足必冷。按之果然。遂與人參白朮各三錢。大附子炮薑炙甘草各一錢。水煎冷服。服後卽酣睡達旦。次早能食粥半盞。足膝漸暖。藥仍如舊。適散步午歸。見舉家號慟。曰本熱病誤服熱藥。今舌腫大。塞滿口中。不能言語。不可爲矣。駭其驟變。再服之。則六脈微而有神。面色亦和。獨舌脹大。心知爲寒涼敷藥所致也。乃詰之。曰。今日可用敷藥否。曰。已二次矣。令急取官桂研末五錢。以生薑自然汁調塗舌上。塗訖。則涕淚流出。口內涎垂。舌頓消去。卽令取粥與食。使壓之。庶虛火不再。

升蓋舌滿脹者。乃敷藥寒涼。閉其毒氣。毒無從出故耳。以桂調薑汁塗之。辛散之義也。

黃師文父病口瘡。師文治之不愈。心訝之。乃密訪諸婢。果其父嘗晝同一婢子寢。明日瘡作。師文卽詳其時節。明日卽用其父所寢時。令其父淨濯足。以其藥貼腳心瘡。不外吳茱萸生

附子等藥

北窗炙輶

盧不遠治李某。口舌生瘡。幾三年矣。脈浮細急數。按之空虛。而尺尤甚。用立齋盧火不歸經法。以加減八味九料。二劑卽愈。

柴嶼青治吳頴菴少庭尉甥。閏年三十。口舌生瘡。下部泄瀉。

脈尺弱而無力。寸關豁大。此陰盛於下。逼陽於上。若用涼藥清火。則有礙於脾。用燥藥治脾。則有礙於舌。惟有引火歸源之法。竟用附子理中湯。冷飲送八味丸三錢。兩服頓愈。

光祿卿李瀛少夫人患口瘡。醫屢投清火寒涼之劑無效。更兼泄瀉。飲食少思。始求治。按其右關微弱。知係胃虛。穀少。復爲寒涼損傷。致脾胃虛衰之火。被逼上炎。則爲口瘡。元藏虛寒。則爲泄瀉也。惟補其火。散其寒。則火得所助。接引而退舍矣。方用人參白朮附子炮薑炙甘草。李君畏不敢與服。逡巡數日。勢益困勉。用前方連進數劑。卽安。蓋口瘡

非止一端。有上焦實熱。中焦虛寒。下焦陰火。各經傳變所致。必須分別治之。不可執也。

陸養愚治姚明水。天稟素弱。脾腎兩虛。幸能節養。兼服溫補之劑。中年頗健啖。因無子。置妾。遂患口瘡齒痛。初以涼膈散數錢服之。卽愈。自後常發。常服至半年許。滿口腐爛。飲食不進。脈之兩寸浮數而微。關尺浮弱而澁。謂形雖有餘精。仍不足。當嚴守禁忌。服滋補藥。涼劑不可再投矣。用八物湯倍地黃。以峻補腎水。加桂附各一分。引火歸原。經謂折之不去。求其屬以衰之是也。煎就涼服十劑。其患如失。

薛立齋治儒者劉允功。形體魁偉。冬日飲水。自喜壯實。薛曰。

此陰虛也。不信一日口舌生瘡或用寒涼之劑肢體倦怠。
發熱惡寒乃與六味地黃補中益氣而愈。

王肯堂治常熟嚴養翁相公春秋高而求助於厚味補藥。以致胃火久而益熾。服清胃散不效。加山梔芩連而益甚。以爲涼之非也。疑其當補。聞王善用人參。因延診而決之。纔及門。則口中穢氣達於四室。向之欲噦。此正清胃散症也。獨其熱甚。當用從治。而既失之。今且欲從而不可矣。當求其屬而衰之。用天冬麥冬生地熟地石斛升麻犀角蘭香之類。大劑投之。數日而臭已止矣。經云諸病寒之而熱者。取之陰。所謂求其屬也。火衰於戌。故峻補其陰。而熱自己。

後因不屏肉食。胃火復作。大便不利。目翳耳鳴。不能自忍。
雜進寒涼。時或利之。遂致不起。嗟乎。苟知其熱涼之而已。
則塗之人。皆可以爲盧扁。何事醫乎。

懋山齋筆塵

邑侯許少微患口糜。王謂非乾薑不能愈。許猶疑之後竟從
王言而愈。從子懋鋗亦患此甚危急。熱甚。惟欲飲冷水。王
用人參白朮乾薑各二錢。茯苓甘草一錢。煎成冷服數服
乃已。噫。此豈可與拘方者道耶。

口瘡無論新舊。遇夜卧時。將自己兩署丸。以手握緊。左右以
手揉之。三五十遍。每夜睡覺。輒行之。愈於服藥。

蘇談

一齋治一男子。口舌生瘡。服涼藥愈甚。治以理中湯而愈。

又一男子口舌生瘡飲食不甘勞而愈甚亦與前湯頓愈
一男子口糜爛服涼藥愈甚脈數而無力以四物加酒炒梔
柏元參一劑頓退四劑而痊

一男子口舌生瘡脈浮而緩飲補中益氣湯加炮薑更以桂
未含之卽愈又一男子患之勞而愈盛以前藥加附子三
片二劑卽愈丹溪云口瘡服涼藥不愈者此中焦氣不足
虛火泛上無制用理中湯甚則加附子

一婦人常口舌糜爛頰赤唇乾眼濱作渴脈數按之則濱此
心肺壅熱傷於氣血爲患名熱勞症也當多服滋陰養血
藥彼欲速效用敗毒寒劑攻之後變瘵症而歿婦人良方

云婦人熱勞者。由肺壅熱。傷於氣血。氣血不調。臟腑壅滯。熱毒內積。不得宣通之所致也。其候心神煩躁。頰赤頭痛。眼濱脣乾。四肢壯熱。煩渴不止。口舌生瘡。神思昏沈。嗜卧少寐。飲食無味。舉體痠疼。或時心怔。或時盜汗。肌膚日漸消瘦。故名熱勞也。

焦秀才病口苦。羅謙父製龍膽瀉肝湯治之。得效。內經云。有病口苦。名曰膽癥。乃肝主謀慮。膽主決斷。爲清淨之府。肝取決於膽。膽或不決。爲之恚怒。怒則氣逆。膽汁上溢。故口苦。或熱盛使然也。寶鑑

羅謙甫治梁齊民。膏粱多飲。因勞心過度。肺金有傷。以致氣

出腥臭涕唾稠黏。咽嗌不利。口舌乾燥。以加減瀉白散。主之。難經云。心主五臭。入肺爲腥臭。此其一也。因大飲大熱之氣所傷。從心火刑於肺金。以桑皮地骨皮苦微寒。降肺中伏火。而補氣爲君。以黃芩知母苦寒。治氣腥臭。清利肺氣爲臣。肺欲收急。食酸以收之。五味子酸溫。以收肺氣。麥冬甘寒。治涕唾稠黏。口苦乾燥。爲佐。桔梗辛溫。體輕浮治痰。逍利咽喉。爲使。服數劑而愈。

尤在涇曰。王肯堂治許少薇口糜。謂非乾薑不愈。卒如其言。又從予懋語亦畷。此勢甚危急。欲飲冷水與人參白朮乾薑各二錢。茯苓其車各一錢。煎成冷飲。日數服乃已。蓋士

經醫業卷十一
溼則火敏人多不能知此所以然者胃虛食少腎水之氣逆而乘之則爲寒中脾胃虛衰之火被迫上炎作爲口瘡其症飲食少思大便不實或手足逆冷肚腹作痛是也

脣

李大富而極鄙吝脣生肉鬚一尺長痛不可忍或云用刀或云用藥鄰有金先生者曰我能力治須講定謝金方醫衆親友講以十兩爲謝金用末藥一匕爐中燒烟熏之卽落去一寸袖手索謝李先生付一兩五日已好及講完前約乃堅不與矣金笑曰逆知其然也明年必發卽百金不用藥後

果發遂死焉扁鵲謂重財者爲六不治之一見續金陵瑣事

晉魏詠之生而免缺有善相者謂之曰卿當富貴年十八聞
荊州刺史殷仲堪帳下有名醫能療之貧無行裝謂家人
曰殘醜如此用活何爲遂齋數斛米西上以投仲堪旣至
造門自通仲堪與語嘉其盛意召醫視之醫曰可割而補
之但須百日進粥不得笑語詠之曰半生不語而有半生
亦當療之況百日耶仲堪於是處之別室令醫善療之遂
閉口不語惟食薄粥百日而瘥槎菴小乘

薛立齋治一婦人懷抱久鬱患繭脣襍治消痰降火虛症悉
具盜汗如雨此氣血虛而有熱也用當歸六黃湯內黃芩

連柏俱炒黑。二劑而盜汗頓止。仍用歸脾湯。八珍散兼服。
元氣漸復。更以逍遙散加歸脾湯間服。百餘劑。唇亦瘥。

一婦人唇裂內熱二年矣。每作服寒涼之劑時出血水益增。
他症此胃火傷血。而藥傷元氣也。用加味清胃散而愈。後
因怒唇口腫脹寒熱作嘔。此屬肝木乘脾土。用小柴胡加
山梔芩苓桔梗。諸症頓愈。復以加味逍遙散調補元氣而
愈。

一婦人生育多胎。月經不調。兩足發熱。至年餘而身亦熱。勞
則足腿痠疼。又年餘唇腫裂痛。又半年唇裂出血。形體瘦
倦。飲食無味。月水不通。唇下腫如黑棗。此肝脾血虛火盛。

也彼不信用通經藥而歿。

一婦人忿怒而脣腫或用消毒之藥，脣腫出血年餘矣。此肝木克脾土而血傷也。須養脾胃滋化源爲主。彼執用前藥，反進蝕狀如翻花瘤而歿。

一婦人懷抱久鬱，或時胃口嘈辣，胸膈不利，月水不調，晡熱食少，體倦，脣腫已年餘矣。此脾經鬱火傷血。用歸脾湯加薑汁炒黃連、山梔少佐吳茱萸，嘈辣頓去。飲食稍進，乃去黃連加貝母、遠志，胸膈通利。飲食如常。又用加味逍遙散歸脾湯間服。百餘劑月水調而脣腫愈。

州守劉克新患繭脣，時出血水，內熱口乾，吐痰體瘦，腎虛之

症悉具。用濟陰地黃丸。年許而愈。

一儒者因勞役感暑。脣生瘡。或用四物湯加知柏之類而愈。後復作。彼仍用前藥益甚。腹中陰冷。乃用補中益氣湯。加茯苓半夏治之而愈。

一男子素善怒。脣腫脹。服清胃等藥。時出血水。形體骨立。用補中益氣湯加半夏。茯苓。桔梗。月餘。脣腫漸消。元氣漸復。又以四物加柴胡。炒梔丹皮。升麻。甘草數劑。乃去梔加參。术而痊。

一男子內熱作渴。咳唾痰涎。大便乾滯。自喜壯實。此脾腎陰虧陽旺之症。當壯水之主。不信。自服二陳芩連之類。次年

下脣漸腫。小便赤濁。執守前藥。脣出血水。大便黑塊。小便淋瀝。再求治曰。大便結黑。小便淋瀝。肝腎敗也。脣口腫白。脾氣敗也。辭不赴竟歿。

上齒

元亨在大聖中結道友登嶽頂。至明皇館故址。得斷碑數行。彷彿有古文。洗滌之。得歌一首。曰。豬牙皂角及生薑。犀角升麻蜀地黃。木律旱蓮槐角子。細辛荷葉要相當。青鹽等分同燒煅。研細將來使最良。揩齒固牙。鬚髮黑。誰知世上。有仙方。荷葉下注云。翦荷葉心子也。因錄以歸。朝之名鄉。

巨公皆依之修用其效響應。

皇朝類苑

朱端章云余被檄任淮西幕府時牙疼大作一刀鑄入以草藥一捻湯泡少時以手蘸湯挹痛處卽定因求其方用之治人多效乃皺面地菘草也俗人訛爲地葱沈存中筆談專辨地菘其子名鶴虱正此物也錢季誠方用鶴虱一枚擢置齒中高監方以鶴虱煎米醋漱口或用防風鶴虱煎水噙漱及研草塞痛處皆有效

本草綱目

周密志雅堂雜抄治齒痛腫云用黑豆以酒煮汁漱之立愈

王脩竹云其閼中嘗用驗

仙人鄭思遠常騎虎故人許隱齒痛求治鄭曰虎鬚及熱插

齒卽愈。拔數莖與之。醫說

澤州李繼之忽病牙痛，皺眉不語，變景先見之曰：何不樂也？曰：牙痛藥。曰：曾記戴人云：陽明經熱有餘也，宜大下之。乃付舟車丸七十粒。服畢遇數知交留飲，強飲熱酒數杯，藥爲熱酒所發，盡吐之。吐畢而痛止。李大笑曰：戴人神仙也。不三五日又痛，再服前藥百餘粒，大下數行，乃愈。

儒門
事親

姚應鳳視一人脣有紅痣，無他病苦，乃謂之曰：此齒盡三年必死。其人怒不應。三年齒潰，詣求救謝。曰：君天譴也，不能過期矣。果歿。

錢塘縣志

龔子才治一人，齒浮作痛，耳面黧色，口乾作渴，日晡則劇。此

脾虛弱也用補中益氣湯加減八味丸而痊一男子每足發熱牙卽浮腫此足三陰虛火用加減八味丸而不復作。

李小園患滿口牙齒疼痛潰爛動搖飲食不下乃牙疳也諸醫不效忽遇道人傳一方用川椒炒一錢五分銅青一錢硼砂一錢三味爲末每少許擦患處流涎立瘥。

易思蘭治一人患齒病每有房勞齒卽俱長痛不可忍熱湯涼水俱不得入凡有惱怒痛亦如之十年前尙輕十年後殊甚每發必三五日呻吟極楚竟絕慾服補腎丸清胃飲俱不效一日疾作七日不飲食診其脈上二部俱得本體。

惟二尺洪數有力。此腎經火邪太盛也。以滋腎飲餌之。且嗽且嚥下二盞。隨覺丹田熱氣升上。自咽而出。復進二盞。其痛頓止。齒即可叩。永不再作。其方黃柏三錢。青鹽一錢。升麻一錢。水五碗煎湯。頻漱之。嚥下。其人問曰。吾病齒二十年。試藥不下百餘。皆未效。君用三味而奏功何也。曰。齒屬腎。諸痛屬火。今貽得脈。洪數有力。愈按愈堅。蓋沈濡而滑者腎脈也。洪數有力者心脈也。腎脈不沈濡而洪數。是所不勝者。侮其所勝。乃妻入乘夫。腎經中已有火邪矣。如遇房勞。則相火一動。邪火上冲。故齒長而痛也。又腎者肝之母。肝者腎之子。肝主怒。怒氣一發。則子益母。氣木來生。

火而火愈熾矣。齒豈不長而痛乎。其用清胃飲者。以牙齦屬陽明胃也。此惟胃脈洪數者爲宜。今胃脈平和。是胃無恙。用清胃飲何益也。非惟無益。且寒涼傷胃。反飲食不進矣。又腎主骨。齒乃骨餘。腎經火盛。致令齒長。復用補陰丸治之。中有乾薑等熱藥。以火濟火。其痛愈甚。故用黃柏爲君。以滋腎水。泄腎火。青鹽爲之引。升麻升出腎經火邪。藥一入口便覺丹田火熱上升。自咽而出。腎藏一清。齒自安矣。何必清胃補腎哉。

俞東扶曰。此案醫理講得最精。由於脈象認得的眞。而更運以巧思。斯發無不中矣。清胃散之庸誠不足責。卽泛用

滋陰藥亦難應手。只此三味銓解甚明。信乎缺一味不可。
多一味不必也。余鄉有患齒痛數年。諸藥不效者。葉天士
用山萸肉五味子女貞子旱蓮草各三錢。牛膝青鹽各一
錢而全愈。此取酸鹹下降。引腎經之火歸宿腎經可與易
公方並垂不朽。雄按謝再華室患上齦右痛。匝月益劇。
四晝夜不能合目。渾身內顫。足冷面紅舌赤無津。余視之。
患處不腫。脈軟無神氣衝覺冷。乃肝火爲患也。以鹽湯送
下滋腎丸三錢。一睡而愈。

呂東莊治許開壅病。齒上齦從耳根痛起。便苦楚不可耐。醫
用平胃降火藥。日增劇。診之。關滯而尺衰。授方以熟地爲

君杜仲爲臣。女貞甘草黃柏山藥山萸爲佐。其尊人青臣舉以問醫曰。此方何如。醫曰大謬不可服。問其謬狀曰。齒病爲陽明之火。與腎何干。而俱用補腎藥耶。青臣曰。果爾則吾知此方之妙矣。乃更邀往視。呂曰。病見於上。而治當從下。起此有步驟。不可責速效也。仍用前藥數劑。繼用人參白朮茯神甘草白芍棗仁遠志。當歸黃耆丹皮。數劑痛已減而未去也。診其兩尺已應。右關以上皆平和。惟左關尚鬱塞。曰。今當爲君立除之。遂用補中益氣湯加龍膽草。卽愈。後小發復加減前方愈之。因囑之曰。此雖小疾。而其根在下。當謹調攝。毋使頻發也。

孫文垣治昆池內人患牙痛一晚暈厥三次次日兩頤紅腫
痛不可支且酒漸惡寒寢食以廢與清胃湯加石膏爲君。
白芷爲臣。連翹爲佐。北細辛爲使。服之痛如失外以明礬
爲末大五倍子一枚入礬滿之炭火炙以礬紅炙爲末。不
時擦牙痛處立止此方多效。

孫襄齋因食雞嚼骨迸碎其齒出血至暈自後遇雞鳴時輒
痛不可忍餘時則否。凡燕會遇雞湯羹則痛發即不染指。
痛亦然如是數年其家禁不畜雞親舊欲招之者必先戒
厨人弗用也。後有人教食黃鼠狼家人乃設法捕得一頭。
烹而進之。孫以其物異心惡之強飲湯數呷爾後遇雞輒

啖如常了無所苦矣。

新案

文潞公方治牙齒風熱上攻腫痛獨活地黃各三錢爲末每服
三錢水一盞煎和滓溫服卧時再用木

草

薛立齋治毛宗伯齒痛胃脈無力用補中益氣加生地丹皮
治之而愈

楊考功齒動作渴屬脾胃虛弱陰火熾甚用補中益氣加炒
黑黃柏四劑又服加減八味丸諸症頓愈

王侍御齒搖齦露喜冷飲食此胃經溼熱先用承氣湯以退
其火又用清胃散以調理而齒固繼用六味丸以補腎而
痊

一男子晡熱內熱。牙痛齦潰常取小蟲此足三陰虛火足陽明經溼熱先用桃仁承氣湯二劑又用六味丸而愈。

茯苓石膏龍骨各一兩。寒水石二兩半白芷半兩。石燕子大者一枚。小者一雙。末之早晚揩牙。蘇時王文漢鄉得此方於鱗撫折守。折守得於國初洛陽帥李成。折年逾九十。牙齒都不疏豁亦無風蟲。王公今九十食肉尙能齒決之。信此方之神也。續衷堅志

薛立齋治一婦人因怒齒痛寒熱作嘔用清胃等藥益甚。此肝火傷胃寒藥復傷故也。用六君子加白芍柴胡山梔而愈。

一婦人發熱齒痛。日晡益甚。月水不調。此脾經血虛。用逍遙散加升麻。尋愈。後因怒復痛。仍以前藥加川芎而痊。

一婦人胃中嘈辣。甚則熱痛。後患齒動。此胃中痰火也。用二陳加芩連下越鞠丸而瘳。

一婦人因怒牙痛寒熱。此肝火侮脾土。用小柴胡加芎歸芩木山梔而疼痛止。用加味逍遙散而寒熱退。

一婦人每產後齒齦動搖皆痛。踰月乃止。此氣血虛動也。後復懷妊臨月。與十全大補湯二劑。令產後煎服。其齒不動如故。

廷尉張中梁齒動搖。用安腎丸考功楊仲玉齒動。用補中益

氣湯侍御王濟川齒搖齦露用承氣湯文選鄭伯興齒脳痛用羌活附子湯顏金憲齒痛用涼膈散郭職方過飲用清胃散黨吏部風熱用犀角升麻湯朱工部血氣虛用全大補湯沈大尹頭腦齒痛頭重手足厥冷此風寒入腦用麻黃附子細辛湯並愈。

一男子齒痛脈數實而便秘用防風通聖散卽愈。

一男子齒痛胃脈數而有力以清胃散加石膏荆防二劑而痊

一男子齒痛甚胃脈數實以承氣湯一劑卽止。

一男子齒痛脈浮無力以補中益氣湯加黃連生地石膏治

之不復作。

一老人齒痛，午後卽發，至晚尤甚。胃脈數而實，以涼膈散加荆防石膏。

王教授云：有老婦人舊患牙疼，人教將兩手大指交叉以大指頭盡處爲穴，灸七壯，永不疼，恐是外關穴也。穴本手少陽，去腕後二寸陷中。泉州一稍子妻，舊亦苦牙疼，人爲灸手外踝穴，近前些子，遂永不疼。但不知于金所謂足外踝耶？手外踝耶？識者當辨之。百乙方

辛帥舊患傷寒，方愈食青梅，已而牙疼甚，有道人爲之灸屈手大指本節後陷中，灸三壯。初灸覺病牙痒，再灸覺牙有

聲三壯疼止今二十年矣。恐傷豁穴也。銅人云此穴治齒痛。手陽明脈入齒縫中。左疼灸右。右疼灸左。效上

昔率爲樂清主簿者。蛀牙疼不可忍。號呼之聲徹於四鄰。用藥不效。有丐者獻一方。用之卽安。以漢椒爲末及巴豆一粒。同研成膏。飯爲丸如菉豆大。以綿裹安在蛀牙孔處立效。同上

馬敏叔說。一村嫗苦牙痛。百藥不效。用絲瓜兒。俗呼爲磨蘿燒灰存性。爲細末。擦痛處立止。同上

香白芷太平州道地一分。白芷者不拘多少。硃砂一分。白芷右爲細末。入硃砂拌勻。煉密如櫻桃大。每用一丸。擦痛立止。廬州郭醫傳云。渠親

曾累取效盡勝他藥。此藥乃濠梁一村婦人以醫治帥母夫人者。倉卒不用硃砂及蜜亦可。其功只在香白芷耳。趙從簡府判所用只白芷細辛二味等分。亦每作效。同上

李莫安撫女子退齒踰年不生甚以爲撓。因遇平江會李亮卿語之。李云子有一方已經試驗用之一月齒遂生。用雌鳥雞雄烏雞糞以二雞各畜之舊鞋底。麻底尤佳右三物等分燒灰存性研細入麝香少許同研傅於齒齦。同上

立齋治黨吏部頰頸腫歎至牙齦右關脈數此胃經風熱上攻也。以犀角升麻湯治之而消。

郭職方齒腫歎至頰頸素善飲治以清胃散數劑而愈。一男

子患齒痛服清胃散不應服涼膈散而愈盛子用補胃丸治之而愈

固齒方取老鼠頭骨牙同鹽煅存性研細以擦動牙卽堅固
不搖

來天培治一婦人五旬患齒痛連脳兩頰赤腫惡寒發熱脈
細而滯此肝脾鬱結爲患治以逍遙散加熟地石膏荆穗
杞子一劑而腫痛減再劑而諸症釋然

脫齡

羅太無治一人伸頸而頰車蹉但閉不能合以酒飲之令大
醉睡中吹皂角末搐其鼻嚏透卽自正矣

醫學綱目

龔孚才治一人因怒氣大叫下頸脫落任掇不上衆莫措手令以烏梅搘餅塞於兩頸至牙盡頭控處張口流涎須臾隨手掇上。

張三錫治一婦人錯下頸古謂脫金鉤兩手脈弱用八珍湯加升柴遂全愈先用手法擎上正骨科當知。

雄按余治一人以大劑熟地柏杞龍眼肉而愈。