


聖濟總錄

百全

內閣文庫			
函	106	漢	
冊數	200	(179)	
函號	300	212	



大德寺藏書卷之八十一

小兒疳

小兒諸症

小兒驚風

小兒疳積

小兒驚風

小兒疳積

小兒驚風

小兒疳積


小兒驚風

小兒疳積

小兒驚風

小兒疳積

大學東
校典籍
局之印



大德重校聖濟總錄卷第一百八十一

小兒門

小兒語遲

小兒齒不生

小兒咽喉諸病

小兒誤吞物

小兒緊脣

小兒涎液不收

小兒胎赤眼

小兒斑瘡入眼

小兒眼生翳膜

小兒目赤痛

小兒聾耳

治小兒諸病後六七歲不能語雞頭丸方

雄雞頭燒灰壹枚 鳴蟬去翅足炒參枚 甘草炙半兩

大黃炒 麥門冬去心焙各壹兩半

常歸焙切 黃耆剉 芎藭各參分

遠志去心 木通剉各半兩 人參壹兩

右一十一味壽羅為末鍊蜜丸如菉豆大每服以粥

不飲下五丸至七丸量兒大小加減不計時候

治小兒五六歲不語菖蒲丸方

菖蒲 人參 黃連去須各半兩

丹參 赤石脂各參分 天門冬去心焙

麥門冬去心焙各壹兩

右七味搗羅為末鍊蜜丸如菉豆大每服五七丸溫

水下不拘時候日三量兒大小以意加減

小兒齒不生

論曰牙齒者是骨之所終髓之所養手陽明足太陽之脈並入於齒若血氣充實則骨髓強盛雖其齒損落猶能更生也若虛弱者血氣衰耗風冷乘之致令齒久不生假令生者或齲或蟲落不能復生也

治小兒齒不生或因落不生方

牛糞中黑豆

右一味取二七枚小開去頭上皮此豆頭開處注齒根上時時用之當効

治小兒牙齒不生方

雄鼠糞貳柒

右一味每日用糞一枚齒根上拭至二十一日其齒

當生

又方

道傍遺稻粒

右一味於齒落處點三七下其齒自生

治小兒齒不生無問遠近皆得便生神効方

雄雞糞

貳柒枚頭尖者雌雞糞貳柒枚頭圓者

右二味燒灰存性先用鍼挑開齒斷上以雞糞灰點

之

小兒咽喉諸病

論曰咽喉者肺脾經所主也小兒肺脾有熱蘊積上焦

熏發喉間故令咽喉赤腫吞吐不利或塞或壅憎寒壯

熱欬嗽痰涎是其候也昔人謂藏熱則咽門腫而閉塞

豈虛言哉

治小兒咽喉中鳴欬嗽喘急款冬花丸方

款冬花

甘草炙

紫苑去苗

麻黃

去根節煎去沫
焙乾各半兩

貝母燻

麥門冬

去心焙
各參分

右六味搗羅為細末鍊蜜丸如菽豆大每服三九至

五丸食後米飲下五歲已上以意加之日三

治小兒咽喉舌腫脹咽氣不利朴消散方

朴消壹

衣中白魚炒參

鹽少許

右三味搗研為細散每服以指搵少許在舌下

治小兒咽喉項腫啼聲不出牛黃散方

牛黃研半

代赭兩

麝香研半

玄參分

厚朴去麤皮生薑

汁炙參分

升麻壹兩

射干兩半

大黃剉炒壹兩

木香參分

白朮兩半

犀角鎊屑參分

甘草炙半兩

右一十二味搗羅十味為細散入研藥和勻每服半

錢匕以人乳汁一蛤蜊殼許調下空腹日一服三歲

至五歲已上每服一錢匕棗湯調下米飲亦得日再

治小兒咽喉中鳴欬嗽痰壅牽牛散方

牽牛子炒半生半

杏仁去皮尖

甘草炙

吳茱萸湯洗焙

陳橘皮去白焙

各壹分

右五味搗羅為細散每服半錢匕空腹以沸湯調下

微利出惡物即差量兒大小加減服

治小兒咽喉腫熱肺脹氣急喉中似有物塞麻黃湯方

麻黃去根節煎桑根白皮剉桂去麤皮

大黃生射干湯浸去皮尖杏仁雙人各壹分

右六味麤搗篩每服一錢匕以水半盞煎至三分去

滓溫服

治小兒咽喉腫脹咽氣不利黃蘗湯方

黃蘗去麤皮甘草炙各壹分

右二味麤搗篩每一錢匕以水半盞煎至三四分去

滓溫服不計時候

治小兒熱病口爛咽喉生瘡水漿不下當歸膏方

當歸去麤頭射干剉升麻剉各兩

附子半兩炮去白蜜合

右五味切以豬脂四兩先煎成油後內諸藥入於油

中用文火熬令附子黃色濾去滓投蜜更熬一兩沸

成膏以瓷器收每取杏人大含化嚥津無妨日三四

用之

治小兒咽喉腫痛毒氣熱極咽塞不利生薑湯方

生薑貳兩升麻貳兩射干貳兩

陳橘皮壹兩湯浸去白

右四味剉如麻豆每服三錢匕水一盞煎至七分去

滓溫服

治小兒咽喉腫痛壯熱躁渴不止升麻湯方

升麻

射干

大黃剉炒各半兩

右三味麤搗篩每一錢匕水半盞煎至四分去滓分

溫二服早晨日午各一

治小兒膈熱唇口生瘡咽喉腫痛玉芝散方

甘草

剉作半寸許劈破湯浸壹日微炒

石膏

研細粉各壹兩

山梔子

去皮微炒兩藿香葉兩

右四味搗研為細散每服半錢匕以新汲水調下量

兒大小加減服

治小兒風熱咽喉腫塞生瘡搖頭煩悶及蟲咬心痛龍

腦丸方

龍腦研半錢

白礬

銚子內鍊沸泣盡汁為度研

玄明粉

壹錢

蟬殼

參拾枚去牛黃研半

蛇蛻皮

壹條長貳尺鐵器上燂焦研為末

右六味再一處細研入沙糖少許和丸如梧桐子大

冷水化破一丸服之

治小兒咽喉腫痛苦藥子散方

苦藥子

白殭蠶等分

右二味搗為細散每服半錢匕白礬水調下量兒大

小加減

治小兒忽腫毒著咽喉露蜂房散方

露蜂房燒灰白殭蠶各壹分

右二味細研每服半錢匕用乳香湯調下看兒大小

以意加減

治小兒喉痺血氣結塞慎勿刺破但與藥通利升麻湯

方

升麻生木通剉大黃生

麻黃去根節犀角鎊石膏碎

甘草生剉各半兩朴消研壹兩

右八味麤搗篩每二錢匕水一盞煎至七分去滓量

大小分減服

小兒誤吞物

論曰小兒多以珠璣錢鏰之類為玩弄之具或藏於口

中因驚或啼遂誤吞嚥倉卒不得出為害亦大當隨物

所宜以方術治之

治小兒誤吞錢在喉中不下方

麩炭研為細末

右一味以指彈少許入喉中少頃自吐出一方用羊

歷炭研細為末

治小兒誤吞鍼方

磁石

壹塊小彈子
大吸鐵緊者

右一味入口內吸令鍼出或絲繫定送咽喉引出亦得

治小兒誤吞鈎繩方

右凡吞鈎繩猶在手者莫伸引俱以珠璫若穿了惹
苡子之類就其繩穿稍稍推至鈎畔即急推前入纜
鈎離刺處復緩緩引出

治小兒誤吞珠璫方

右燒銅弩牙令赤淬水一碗旋飲其物即出

治小兒誤吞銀鑲及釵方

右以飴糖隨兒大小多少食之若能多食釵鑲即隨

出

治小兒誤吞髮方

右用木梳燒灰細研粥飲調下半錢匕不下再服

治小兒誤吞梅李核方

右以溫水旋從小兒頭淋下却接其水與兒飲之

治小兒誤吞鑲方

右以鵝毛半兩燒灰細研米飲調下半錢未効再服

小兒緊脣

論曰脾主肉其華在脣脾胃有熱熏發於口則令脣際生瘡又為風邪寒濕之氣搏於腫處故焮結不消濕爛汗出時發時差積久不愈謂之緊脣瘡又名藩脣也

治小兒脣瘡未已復被風冷所搏瘡口濕腫此名緊脣順脾散方

山芋兩壹

人參叁分

桂去麤皮壹分

木香兩半

甘草炙到

白朮各壹分

訶梨勒炮去核半兩

肉豆蔻炮去殼貳枚

白茯苓去黑皮

黃耆到各半兩

白芷壹分

右一十一味搗羅為散每服半錢匕沸湯點服量兒大小加減

治小兒緊脣瘡二鉛散傳方

鉛丹壹分

鉛霜研半分

蛤粉研

晚蠶蛾微炒各半錢

麝香研壹錢

右五味各為散用蜜合調傅瘡上

治小兒緊脣瘡腫皮急黃連散傳方

黃連去須

黃蘗去麤皮到

甘草生到

凝水石碎各半兩

檳榔生到壹分

右五味搗羅為散用蜜調傅脣上頻換為効

治小兒緊脣及脾熱攻脣瘡腫烏蛇散傳方

烏蛇燒灰

右一味細研以酥和傅脣上頻換為効

治小兒脣瘡白及膏傳方

白及

白欵

白蠟各壹兩

黃耆剉

乳香研

牡丹皮

芍藥

丁香各壹分

麻油貳兩

右九味除油蠟外並細剉先煎麻油令沸次入前項藥以柳木枝不住手攪綿瀘過去滓再煎入蠟膏成入銀石器中盛候冷不拘多少取傅瘡上

治小兒脣瘡不合龍膽丸方

龍膽

大黃剉微炒各壹分

人參

梔子人

朴消

郁李人去皮別研入各半兩

茵陳蒿壹分

右七味擣羅為末鍊蜜和丸如麻子太每服五丸至七丸溫水下量兒大小加減

治小兒脣瘡方

黃蘗去麤皮為細末

右一味濃煎蕃薇根汁調塗瘡上立効

治小兒脣生瘡方

桑根白皮細切

右一味搗取汁塗瘡上大効

治小兒屑瘡方

藍葉細切

右一味研取汁洗之日三上差

小兒涎液不收

論曰小兒因氣不升降膈腕否滯致令乳飲不化流入胃中隨氣上溢故令多涎其候胸滿短氣飲食遲化內經謂脾為涎當調脾胃升降其氣則病可愈

治小兒脾風多涎心胸壅悶不下乳食昏昏多睡鉛霜

散方

霜鉛研

龍腦研各半分

防風去

犀角屑

甘草炙剉各壹分

牛黃研

白附子炮

丹砂研

細辛去苗

黃芩去黑

半夏生薑汁製焙乾

馬牙消研

天竺黃研

黃芩去黑

右一十三味搗研為散再同研勻每服一字用生薑蜜溫水調下更量兒大小以意加減不計時候

治小兒脾肺風熱膈上多涎心神昏悶少欲乳食防風湯方

防風去

羚羊角屑

黃芩去黑心

人參

枳殼去瓢炒

甘草炙剉各壹分

半夏半分生薑汁製焙乾

右七味麤搗篩每一錢匕水八分入生薑少許煎至五分去滓不計時候量兒大小分減溫服

治小兒脾熱乳食不下胸膈多涎半夏丸方

半夏半分生薑湯洗柒遍去滑

皂莢子人兩

右二味搗羅爲末用生薑汁和丸如麻子大不計時候以溫水下三丸隨兒大小以意加減

治小兒脾胃氣不升降氣溢於上涎液不收半夏丸方

半夏微炒壹兩

白礬生研半兩

右二味先以半夏爲細末再入白礬和勻麤糊和凡如粟米大每服五七丸量輕重加減食後臨臥生薑湯下

治小兒胃氣上溢氣不升降涎液不收清膈降氣丸方

牛房子內通

梔子人

甘草炙微赤剉

川消

鬱金已上各半兩

枳殼壹分麤炒微黃去瓢

龍腦半兩研

右七味搗羅爲末麤糊和爲丸如麻子大用薄荷水化下二丸至三丸不計時候量兒大小加減服之

治小兒脾熱乳食不下胸膈痞悶涎溢不收桑白汁方

新桑根白皮不以多細切

右一味取自然汁塗於兒口內立効如無新桑根白

皮取乾桑根白皮一兩細剉用水一盞煎至半盞放

溫塗兒口內極妙

小兒胎赤眼

論曰小兒眼胎赤者是初生洗目不淨令穢汁浸漬於

眚中使驗赤爛至大不差故云胎赤眼也

治小兒胎赤皆爛黃連丸方

黃連去須壹兩

防風去義

龍膽去土

大黃剉炒

細辛去苗葉各半兩

右五味搗羅為末鍊蜜丸如菉豆大每服五丸至七

丸溫熱水下日三更量兒大小加減

治小兒眼胎赤風毒所攻腫痛升麻湯方

升麻

黃耆剉

玄參

甘草炙各半兩

犀角屑

防風去義

麤人湯浸去皮研各壹分

右七味麤搗篩每一錢匕以水七分煎至四分去滓

分溫二服更量兒大小加減

治小兒眼胎赤腫痛上焦壅熱麥門冬湯方

麥門冬焙去心 犀角屑 芒消

防風去 甘草炙各半兩 旋復花壹分

右六味麤擣篩每一錢七水七分煎至四分去滓量兒大小分減溫服日四五

治小兒眼胎赤久不差牛黃丸方

牛黃壹分細研 黃連半兩去須 決明子壹分

麤人壹分湯浸去皮 犀角屑半兩 龍腦壹錢細研

右六味擣羅為末鍊蜜和丸如麻子大每服以溫水下五九日三四服更量兒大小以意加減

治小兒眼胎赤及生瘡怕見風日方

龍腦半錢細研 麤人壹分湯浸去皮研 杏仁壹兩湯浸去皮尖雙入研

右三味滴少水都細研如乳汁每日三四度點之

治小兒眼胎赤痒痛方

龍腦半錢細研 桑葉伍兩燒作灰

右二味水一升半先煎桑葉灰取半升綿濾去滓後入龍腦攪令勻日三四上少點

治小兒眼胎赤龍腦煎方

龍腦壹錢 鹽綠半兩 麤人湯浸去皮壹分

右三味都研令極細以蜜調似面脂用點眼日三兩上

治小兒眼胎風赤爛不以年月發歇視物淚出澁痛不可忍黃連膏方

黃連壹兩 去須搗

盧會研壹分

龍腦壹錢 別研

右三味先將黃連盧會搗研羅為末以新綿裹用水一盞於銀器中以重湯煮候藥汁三分減二即去藥綿入龍腦攪勻以瓷瓶收每日三兩上點之

治小兒眼胎赤兼有翳膜杏人膏方

杏人去皮尖雙人 研如膏壹兩

膩粉壹錢

鹽綠

黃連末各壹分

右四味同研極細以真酥調如膏攤於銅碗內以熟

艾如雞子大掘小坑子燒艾烟出便覆銅碗熏之勿令氣洩候烟盡更研令勻每取少許以綿裹用人乳汁浸一宿日三四度點之內亦日午暮不日點之

治小兒眼胎赤經年月深遠者銅青散方

銅青

膩粉各壹錢

龍腦半錢

乾地龍壹條 去土為末

右四味同研極細每用半小豆許點目皆日一兩度

治小兒斑瘡入眼

論曰小兒脾肺壅熱或緣時氣溫病表裏俱虛邪毒發於肌表致生斑豆甚者徧體斑如瑇瑁頭作燥漿毒氣

炎盛上攻眼目發於睛輪先須於驗膚上用藥貼熯次
可調利脾肺切不得用藥點眼點藥則令斑瘡潰爛穿
壞睛輪不可不慎也

治小兒斑瘡入眼連翹散方

連翹去土 芎藭 黃蘗去麤皮

胡麻參錢 甘草參

右五味搗羅為散用白湯調放冷食後服五歲以下
半錢五歲以上一錢如眼內有白丁子者不日退去

治小兒熱盛攻眼及斑瘡入眼井泉石散方

井泉石為末再研飛過 蟬殼去土 蛇蛻皮多

治小兒甘草各壹兩

右四味搗研羅為散每服半錢至一錢匕蜜水調下

治小兒斑瘡入眼柳絮散方

柳絮 穀精草 石決明

夜明沙各等分

右四味搗羅為散每服一錢匕豬肝一片批開摻
藥在內以線子扎定米泔一大盞煮至五分取出乘

熱以湯熏眼良久服之日一服

治小兒斑瘡入眼生翳膜遮睛烏龍散方

烏魚骨 貝齒 豬指甲各壹兩

右三味同入沙合子內用鹽泥固濟令乾燒通赤爲度取出細研每服半錢匕用羊子肝一具批開糝藥在內麻縷扎定粟米泔一盞煮熟爲度細嚼米飲下

治小兒斑瘡入眼成胞瘡如聖散方

蛇蛻皮尺壹 皂子拾肆

馬勃壹

右三味以蛇皮裏皂子更用馬勃裏蛇皮入罐子中瓦蓋黃泥裹合暴乾炭火煨候烟欲斷即止取出油單貼入地中出火毒一宿研細入麝香少許再研每服半錢匕葱湯調下日三服忌一切發眼物

治小兒斑瘡入眼及生翳通聖散方

白菊花

如無用甘菊花代

菘豆皮

穀精草各壹兩

右三味擣羅爲散每服一錢匕用乾柿一枚生粟米泔一盞與藥同煎水盡爲度只喫乾柿一日可二服不計時候若患十日已裏三五服即差一月已裏十數服差

治豆瘡子入眼妙應散方

蛇蛻皮兩壹

蟬殼伍枚

右二味用罐子泥固濟暴乾火斷過地上出火毒一宿研爲末蜜水調下一字匕食後日三

治小兒出瘡子後眼內生青膜翳暈蛤粉散方

蛤粉壹

甘草

炙壹

右二味將甘草搗羅為末與蛤粉同研令勻每服一錢匕新汲水調下不拘時候

治小兒斑瘡入眼成白膜但不作丁子者服之必効

蛸散方

桑螵蛸兩

麝香

少許

右二味搗研為細散每服一錢半匕生米泔調下臨臥服

治小兒瘡疹入眼成翳膜蟬殼湯方

蟬殼

羊子肝

右二味搗羅為末每服二錢匕用水煎羊子肝湯調

下日三

治小兒斑疹入眼生翳膜方

穀精草

細蛤粉

已止各壹兩

右二味搗研為細末每用一錢匕豬肝二兩批開摻藥在內捲了用青竹葉裏麻縷扎定水一碗煮令熟入收口瓷瓶內薰眼後取肝食之服不過十日必差

日二

治小兒斑瘡入眼輕粉散方

小兒眼生翳膜

右一味如患左眼用紙撚纏左耳右耳亦如之以填滿為度如耳根痛其膜自落

小兒眼生翳膜

論曰眼者肝之候也五藏六府精氣皆上注於目小兒體本挾熱將養過溫致府藏積蓄邪熱熏漬肝經上衝於目始則赤痛若不即治蘊結變生障翳熱氣輕者生白翳如黍米大者如麻豆重者乃生兩三翳又甚則翳生白障侵遮瞳人滿目悉白遂致失明然障亦有輕者黑睛邊微有白膜來侵黑睛漸染散漫當急治之即免

侵遮黑睛有瞽矇之患

治小兒熱毒氣盛翳膜侵睛兼赤眼疼痛蕪人丸方

蕪人 湯浸去皮別搗壹兩半

兔肝 炙壹具

蕪子人 黃芩 去黑心

黃連 去須各半兩

升麻

決明子 各參分

細辛 去苗葉壹分

右八味搗羅為末鍊蜜丸如菉豆大每服三丸至五丸溫水下早晨日晚各一服更隨兒大小加減

治小兒風翳散漫侵瞳人及風疳眼惡實散方

惡實 炒

木通 剉

蒺藜子 炒去角各壹兩

右三味搗羅為散每服半錢匕以水搗羊子肝汁調

下早晨日晚各一服更量兒大小加減羊干松石

治小兒眼赤或生翳膜或眼常合不開决明子散方

决明子去車前子去梔子人衣

防風去黃連去須各黃連壹兩半黃連壹兩半黃連壹兩半

右五味搗羅為散每服一字至半錢匕搗生豬肝投

熱湯取汁調下早晨日晚各一服更量兒大小加減

治小兒肝受病目昏漸生翳膜散漫侵睛因此失明須

內外治之龍膽飲方

龍膽去釣藤去土瓜根去

茯神去木各甘草炙桑根白皮炙

防風去又各壹分

右七味麤搗篩每一錢匕水一盞入棗半枚去核同

煎至六分去滓分作二服量兒大小加減早晚服

治小兒肝熱眼生翳膜或生血輪腫脹切宜急治車前

子湯方以米泔水煎取汁一盞入車前子一匙

車前子去防風去甘菊花去

甘草炙人參去荊蕈子去

青箱子各參梔子人黃連去須各

右九味麤搗篩每服一錢匕水一盞入淡竹葉七片

煎至五分去滓溫服日三量兒大小加減

治小兒疳眼翳膜沙澀煮肝散方大小

黃連須去沙參玄精石

決明子

右四味等分搗羅為散每半錢用羊子肝一片竹

篋子切作縫子摻末在內線繫入沙罐子內垂掛勿

干令到底以米泔煮熟淡食羊肝每一片分作兩服或

三服量兒大小與食

治小兒五歲已下肝藏熱毒目生丁翳黃芩湯方

黃芩去黑心升麻 甘草炙剉各半兩

萎蕤 玄參 犀角鎊各壹分

右六味麤搗篩每一錢匕水七分煎至四分去滓分

溫二服量兒大小加減日三四服

治小兒肝藏壅熱眼生瘡翳車前子丸方

車前子 甘菊花 芎藭

黃連須去 當歸切焙各壹分 大黃濕紙裹煨

黃芩去黑心各半分

右七味搗羅為末鍊蜜丸如菉豆大每服五七丸量

兒大小加減煎桑枝湯下

治小兒風熱疳氣攻眼赤痛障翳撥雲膏方

桃人 杏人各驛枚并去皮尖雙入

蕤人

郁李人

各伍枚
非去皮

右四味同生研細濾入蜜龍腦麝香膩粉各少許再研極勻點之

治小兒因瀉痢日久眼生翳膜并疳眼退翳如聖散方

蛇蛻

兩條用紙燭燒灰研

穀精草

壹兩

蟬蛻

去土壹分

附子

生去皮臍貳錢

石決明

刷淨壹分

胡粉

研肆錢

右六味搗研為散每服一字半羊子肝一片批破摻末用麻皮線纏米泔煮熟先熏眼後與食量大小加減如未能食研汁灌之

治小兒眼有障翳七八歲瞳子未堅不宜點藥用蝕翳

珊瑚散方

珊瑚兩

右一味細研如粉每點時取如黍米大內翳上日再

點

治小兒目睹有膜白礬膏方

白礬

熟令汁盡壹分

右一味以清水四合置熟銅器中煎取半合去滓入少許白蜜以綿濾過每日三度點如黍米大

小兒目赤痛

論曰目者府藏之精華肝之外候也小兒藏府有熱與

膈間痰飲相搏氣不宜通熏漬於肝肝經受熱則血脉
壅滯循經上衝於目故令目赤痛不即治熱甚則生障翳
治小兒眼赤隱澁不開膈中有熱決明湯方

決明子炒

黃芩去黑心

壹兩壹分

茈胡去苗

大黃研炒各

壹兩半

升麻

石膏碎

小梔子人

各壹兩

甘草炙

到

枳殼去瓢

各半兩炒

右九味麤擣篩每一錢匕水七分入竹葉五片同煎
至四分去滓分溫二服隨兒大小加減食後服

治小兒赤眼黃芩飲方

黃芩去黑心

半兩

寒水石壹兩

壹分

升麻

甘草

炙到各壹分

右四味麤擣篩每一錢匕水七分入竹葉五片同煎
至四分去滓分溫二服食後臨臥隨兒大小加減

治小兒赤眼決明丸方

決明子

牛黃別研

麩人等分

右三味搗研為末鍊蜜丸如麻子大臨臥時乳汁下
二丸隨兒大小加減如熱痛不可忍者用豬膽汁丸

立差

治小兒肝熱眼赤疼痛涼膈退熱白華散方

蛤粉水飛研

連翹

甘草到

白藥子

白附子

炮等分

右五味搗研為散每服半錢匕用麥門冬蜜熟水調下量兒大小加減

治小兒目赤腫痛清肝散方

芍藥

防風

去叉各壹分

大黃

羌活

甘草

剉各半兩

右五味搗羅為散每服一錢匕水半盞入燈心黑豆各少許煎五七沸去滓食後溫服量兒大小加減

治小兒風熱眼赤痛敗毒湯方

大黃

甜消

甘草

炙剉各貳兩

陳橘皮

去白焙參兩

右四味麤搗篩每服一錢匕水七分入薄荷三葉煎至四分去滓食後量兒大小加減服無薄荷入乳香亦得

治小兒赤眼朴消膏點方

朴消

黃連

右二味擣為麤末綿裹以乳汁浸之點眼良

治小兒眼爛皆痒痛淚出不能視物風傷則痛黃連膏

方六

黃連

大銅錢

白礬

燒灰壹分

右三味以水并白蜜各三合用銅器盛於飯上炊一
次綿濾去滓貯瓷合內點眼

治小兒眼赤痛不開洗眼生地黃湯方

生乾地黃貳兩

決明子

黃芩去黑心

竹葉各壹兩

芍藥半兩

右五味細剉以水二升煮五六沸去滓澄清洗眼一

日三次大人通用

治小兒赤眼黃藥湯洗方

黃藥去麤皮剉

秦皮各壹兩剉

蕤人去皮半兩

右三味麤擣篩每用兩匙頭以水一碗入乾棗三枚

同煎三五沸去滓適寒溫洗眼

治小兒目暴赤痛鉛丹丸洗眼方

鉛丹壹兩再研

右一味用白沙蜜調如稀糊同入銀器內攪勻炒候

鉛丹紫色可丸卽丸如皂子大每用一丸沸湯化乘

熱淋洗

治小兒目赤澀痛漸生翳膜昏暗大黃丸方

大黃剉

鬱金

人參

黃連去須各貳錢

右四味擣羅爲末研鼠肝和丸如菉豆大每服三丸

米泔下妳食後服量兒大小加減

小兒聾耳百蟲入耳附

論曰腎氣通於耳心寄竅於耳疏通不窒則其聽為聰

小兒心藏熱實貫衝耳脉開竅者塞結而為腫或生膿

汁故謂之聾耳或因沐浴水入耳內停積不化亦為聾

耳久不治則致聾聵

治小兒聾耳汁出不止礬石散方

白礬熬令汁枯

龍骨

鉛丹炒各半兩

麝香

竹艸末各壹分

右五味同搗研細先用綿杖子拭乾耳內以藥少許

糝之

治小兒聾耳出膿汁疼痛不可忍者竹艸散方

竹艸糞壹兩

白礬熬令汁枯半兩

雄黃貳錢

麝香壹字

右四味同研勻細先用綿裹杖子拭乾耳中次以藥

少許糝之

治小兒聾耳膿血塞耳赤石脂散方

赤石脂

白礬熬令汁枯

黃連去須

烏賊魚骨去甲各壹分

右四味搗研為散每取少許綿裹塞耳中大人可用

一錢匕一方無赤石脂有龍骨藥在耳中大人下爪
治小兒聾耳夜明沙散方

夜明沙錢貳 麝香字壹

右二味同研極細先以綿杖子拭去膿用藥半錢匕
糝入耳中

治小兒聾耳出膿螻蛄散方

桑螵蛄須桑上者
微炙末之

右一味入麝香少許同研先用物拭膿淨然後糝藥
治小兒耳聾膿出久不差者紅白散方

白礬熬令
汁枯 漆烟脂

右二味等分研為細末先以綿杖子纏去膿極乾用
藥半錢匕糝之不過三兩次

治小兒水入耳內膿出疼痛日夜不止如聖散方中

箭筈內如蟲子同研
令細用參錢 膩粉

麝香各壹
錢研

右三味同研細先以綿杖子拭乾耳取藥三刺耳子
深糝入耳以綿塞定如覺刺割即是惡物要出去綿

側耳令出甚者三度差大人亦可用

治聾耳有膿水狼牙散方

狼牙 白斂 竹蛙屑各壹
分

右三味搗研細每用少許糝耳內治聾耳

治聾耳膿水不絕礬脂散方
白礬汁熬令枯 三松脂 八木香

花烟脂各壹分

右四味搗羅為散每用綿拭膿後滿耳填藥限耳干

治小兒聾耳汁方

黃連去須分 龍骨燒研半兩 烏賊魚骨去甲壹枚炙

右三味搗研為末麻油調少許日三四度點耳中

治小兒聾耳汁出漬外生瘡雄黃散方

雄黃研壹兩 黃芩去黑心 曾青研各半兩

右三味搗研為散以少許糝外瘡更用綿裹一大豆

塞耳中日再換之

治小兒蚰蜒入耳胡麻枕耳方

胡麻不拘多少

右一味先熬後搗貯以葛囊枕之即出

治小兒飛蟲入耳雄黃油方

雄黃壹分

右一味研細以麻油調抹耳中

治小兒蟲入耳桃心塞耳方

桃心葉貳柒葉焙 胡麻子壹升炒

右二味先以桃葉塞耳中其蟲必出如不出以胡麻

子炒令香以葛袋盛枕頭耳中蟲自出

治蟻子入耳方

灸肉

右一味安在耳邊蟻子自出

又方

韭

右一味搗絞取汁滴耳中

又方

藍青

大右一味搗絞取汁滴耳中百八十一

又方

葱

右一味取涎滴耳中

右二...

...

...

...

...

...

...

...

...

大德重校聖濟總錄卷第一百八十一



