婦人大全良方

十二十四

新編婦人大全良方卷之十二

妊娠疾病門 胎教 已明須知 娠病故以次之

凡妊娠諸病但已忌毒藥餘當對證依法治之

妊娠隨月數服藥及將息法第一 凡二十

十金妊娠一月名始胚大麥丹食醒辛是謂總正

又妊娠一月足厥陰脉養不可針灸其經足厥陰

內屬於肝肝主筋及血一月之內血行否滞不為

力事寢心安靜毋令恐畏

又妊娠二月陰陽新合為胎寒多為痛熱多卒驚

舉重腰痛腹滿胞急乖有所下當預安之宜服

烏雌雞湯方

烏雌雞一隻治如食法　吳茱萸一升　茯苓
阿膠各一兩　生姜四兩　甘草各二
人參　麥門冬去心各五　為葉　白朮各一兩
右㕮咀細切以水二斗煮雞取汁六升去
滓下藥膠烊盡取參升去滓溫服
鷄下藥煮取三升
內
又若產日參服　一日胎者當預服補胎方
北細辛一兩　防風二兩　烏梅一升
吳茱萸五合　乾地黃　白朮各一兩
生姜四兩
大麥五合
右㕮咀以水漿升煮取二升半去滓分溫三服

若寒多者倍細辛茱萸熱多渴者去細辛茱萸
加栝樓根二兩若有所思去大麥加栢子仁三
合一方有人參一兩忌生菜蕪荑桃李雀肉等
物

妊娠二月名始胎母食辛臊居必靜處男子勿勞
百節皆痛是謂胎始結
又妊娠二月足少陽脉養不可鍼灸其經足少陽
內屬於膽膽主精二月之時兒精成於胞裏當謹
護驚動
人妊娠二月始陰陽踈經有寒多壞不成有熱即
萎卒中風寒有所動搖心滿臍下懸急腰背強痛
卒有所下乍寒乍熱艾湯主之方

艸參三兩　當歸　人參
麻黃去節　艾葉　阿膠炙各二兩
甘草炙一兩　大棗十二枚擘　生薑六兩
右九味切以酒三升水一斗內藥煮減半去滓
內膠煎取參升分溫三服忌海藻菘菜
又若曾傷二月胎者當預服黃連湯方
黃連　人參各一兩　吳茱萸五合
生地黃五合　生姜三兩
右五味切以醋將水七升煮取三升分四服日三
夜一每十日一作若頗覺不安加烏梅一升加
烏梅者不用將水直用水耳忌豬肉冷水菰黃三
方當歸羊兩

姙娠三月名始胎當此之時未有定儀見物而化
欲生男者操弓矢欲生女者弄珠璣欲子美好數
視璧玉欲子賢良端坐清虛是謂外象而內感者
也

又姙娠三月手心主脈養不可鹹炙甚經手心主
內屬於心無悲哀無憂驚動
亦即黃芩驚恐憂愁瞋恚喜頓仆動於經脈腹滿
又姙娠三月為定形有寒大便青有熱小便難不
續腑苦痛腰脊痛卒有所下雄雞湯方

雄雞一隻治如食法　甘草炙　茯苓
人參　膠阿各二兩　黃芩
芍藥四兩　麥門冬去心
白朮各一兩

大棗 十二枚擘　生薑 一兩切

右㕮咀以水一斗五升煮雞減半內藥煮取一半入清酒三升并膠再煎取三升分三服一日盡之當溫卧忌海藻菘菜酢物桃李雀肉等一方

又若曾傷巳一月胎者當預服茯神湯方

茯神　丹參　龍骨　各一兩

阿膠　甘草　各二兩

當歸　十兩

人參　各二兩

右㕮咀酢漿一斗煮取三升分四服七日後服一劑腰痛者加桑寄生二兩深師方有薤白三兩麻子一升忌同前

赤小豆 二十粒

大棗 十二枚擘

妊娠四月始受水精以成血脉其食稻粳其羹魚鴈是謂成血以通耳目而行經絡

又妊娠四月午少陽脉養不可鍼灸其經手少陽內輸三焦四月之時兒六腑順成當靜形體和心志節飲食

又妊娠四月為離經有寒心下愠愠欲嘔胃膈滿不欲食有熱小便難數數如淋狀腑下苦急卒中風寒頸項強痛寒熱或驚動身軀腰背腹痛往來有時胎上迫胸煩不得安卒有所下菊花湯方

菊花　大一枚　如雞子

阿膠　三兩　炙各

麥門冬　去心一升

生薑　五兩

甘草　炙

半夏　洗各二兩

人參　一兩半

當歸

大棗十枚擘　右細剉以水捌升煮減一半內清酒叁升并阿
膠煎取三升分三服溫卧當汗以粉撲之護風
寒四五日忌羊肉海藻菘菜餳等
又若曾傷四月胎者當預服調中湯方
芍藥　四兩　甘草　炙　芎藭
續斷　各一兩　柴胡　各一兩　白朮　各三兩
烏梅　二十枚　生李根白皮　三兩
當歸　一兩半　厚朴　炙　味心
枳實　炙　各二兩　生薑四兩
右細切以水一斗煮取三升分四服日三夜一
八日再服一劑一方有半夏貳兩忌海藻菘菜
桃李雀肉
妊娠五月始受火精以成其氣晏起沐浴浣衣居
處必厚其衣裳朝吸天光以避寒殃其食□麥其
羹牛羊和菜莫調以五味是謂養氣以定五藏
又妊娠五月足太陰脉養不可鍼灸其經足大陰
內輸於脾五月之時兒四肢成無大飢無甚飽無
食乾燥無自灸熱無大勞倦
又妊娠五月毛髮初生有熱苦頭眩心亂嘔吐有
寒苦腹滿痛小便數卒有恐怖四肢疼痛寒熱胎
動無常處腹痛悶頓欲仆卒有所下阿膠湯方名又
施覆花湯
阿膠四兩　人參一兩

麥門冬 去心 一升 生薑 六 兩 吳茱萸 七 合

旋覆花 當歸 芍藥

甘草 炙 當歸 芎 各 二 兩

右細切以水玖升煮取一半內清酒三升并勝微火煎取三升半分為四服日三夜一究食再服便愈不差更服忌海藻菘菜

又若曾傷五月胎者當預服安中湯方

甘草 炙 芍藥 各 三 兩 當歸

人參

乾地黃 芎藭 各 二 兩

五味子 五 合 生姜 六 兩 麥門冬 去心 一 升

大麻仁 五 合 大棗 三十 五 枚 擘 黃芩 一 兩

右細切水柒升清酒五升煮取三升半分四服日三夜一七日再服一劑忌如前

安胎當歸湯 小兒療姙娠五月舉動驚愕胎動不安下在小腹痛引腰胳小便疼下血

當歸

人參 各 一 兩

阿膠 棗 十 二 枚 艾 一 虎 口

右細切以酒水各三升合煮至三升去滓內膠令烊分三服腹中當安小便緩也古今錄驗救急同一方有甘草無參棗

姙娠六月始受金精以成筋身欲微勞無得靜處出遊於野數觀走犬馬食宜鸇鳥猛獸之肉是謂褰腠理紐筋以養其力以堅背膂

又姙娠六月足陽明脈養不可鍼灸其經足陽明

內屬於胃主其口目六月之時鼠口目皆成調五味食甘美無大飽又姙娠六月孕有所動不安寒熱往來腹內脹滿身體瞤驚怖忽忽有所下腹痛如欲產手足煩疼方

麥門冬湯方

麥門冬一法心升　甘草炙人參各一兩　乾地黃三兩　阿膠四兩　黃芩二兩　大棗十擘枚　生姜六兩

右八味切以水七升煮減半內清酒貳升令膠煎取三升分三服每如人行三四里中間進藥粥忌海藻菘菜蕪荑又若曾傷六月胎者當預服柴胡湯方

柴胡四兩　甘草炙二兩　芍藥二兩　大棗擘十枚

右十味切以水一斗煮取三升分四服日三夜一中間進藥粥勿食生冷及堅強之物七日更服一劑忌海藻菘菜蕪荑桃李雀肉等一方有黃芩二兩

集驗療姙娠六七月胎不安常處旋覆花湯亦名阻病

旋覆花一兩　厚朴　白朮　芍藥一紫藏方作三兩　麥門冬去心三兩　薤白二兩　乾地黃五兩　生姜六兩

枳殼炒一方無　黃芩各三兩　茯苓各三兩　芍藥　生姜各二兩

右細切以水一斗煮取貳升羊先食分五服日
參夜貳忌羊肉餛飩醋桃李雀肉并金同
姙娠七月始受水精以成骨勞身搖肢無使定止
動作屈伸以運血氣自此後居處必燥飲食避寒
常食粳稻以密腠理是謂養骨而堅齒
言無號哭無薄衣無洗浴無寒飲
又姙娠七月并太陰脈養不可針灸其經手太陰
內屬於肺肺主皮毛七月之時兒皮毛已成無大
冷脉若傷寒煩熱腹滿短氣常苦頸項腰背強
葱白湯方
葱白 長三四寸十四枚 羊夏 洗切炒 麥門冬 去心各一升

生姜 八兩
黃耆 各三兩
黃芩 一兩
甘草 炙
當歸
阿膠
人參 一兩半
旋覆花

右十一味切以水八升煮減半內清酒參升并
膠煎取肆升溫服一升日三夜一溫卧當汗出
若不出者加麻黃貳兩煮服如前法若秋後勿
強責汗忌羊肉餛飩海藻菘菜等
杏仁湯 若曾傷七月胎者當預服

甘草 炙
杏仁 去皮尖雙仁碎 各二兩
乾薑 各二兩
麥門冬 去心
五味子
粳米 各五合
鐘乳 研
吳茱萸 各二升
紫菀 二兩

右九味切以水八升煮取三升半分四服日三

夜一中間進食七日服一劑忌海藻菘菜
又姙娠八月始受土精以成胎草和心靜息無使
氣極是謂密勝理光澤顏色
又姙娠八月手陽明脉養不可鍼灸其經手陽明
內屬於大腸大腸主九竅八月之時兒九竅皆成
無食燥物無輒失食無忍大飢
芍藥湯又姙娠八月中風寒有所犯觸身體盡痛
乍寒乍熱胎動不安常苦頭眩痛繞臍下寒時時
小便白如米汁或青或黃或赤或寒慄腰背苦冷痛
而目視茫茫

芍藥四兩　人參　當歸
甘草炙三兩　各一兩　厚朴二兩炙
白朮一兩

薤白一升切　生姜四兩切
右八味切以水五升酒四升合煮取三升分三
服日再夜一忌海藻菘菜桃李雀肉等

葵子湯若曾傷八月胎者當預服

甘草炙　柴胡　白朮各三兩
厚朴　芍藥各二兩　葵子二升
大棗二十枚擘
生姜六兩

右八味切以水玖升煮取三升分三服日三一
日服一劑忌海藻菘菜桃李雀肉等
姙娠九月始受石精以成皮毛六腑百節莫不畢
備飲醴食甘緩帶自持而待之是謂養毛髮多才
力

又妊娠九月足少陰脉養不可鍼灸其經足少陰
內屬於腎腎主續縷九月之時兒脉續縷皆成無
處濕冷無著灸衣
羊夏湯又妊娠九月若卒下痢腹滿懸急胎上衝
腰背痛不可轉側短氣

羊夏洗　麥門冬去心各五合　吳茱萸　當歸　阿膠炙各三兩　大棗十二枚擘

右七味切以水五升煮取三升去滓內白蜜八
合微火上溫分四服痢即止忌生血物餳
猪腎湯若曾傷九月胎者當預服

猪腎一兩　茯苓　桑寄生　乾姜　白朮四兩　大豆三合　乾地黃　麥門冬一升去心　芍藥各三兩　附子中者一枚炮

右十味切以水一斗煮腎令熟去腎內諸藥煎
取三升半分四服日三夜一十日更一劑忌猪
肉冷水蕪荑桃李雀肉酢物等
妊娠惡阻方論第二凡十二方

妊娠十月五臟俱備六腑存通納天地氣於丹田
故使關節人神皆備但候時而生集驗延年同
夫妊娠阻病者按針灸殿産寶方謂之子病棠氏病
源謂之惡阻若婦人稟受怯弱或有風氣或有痰
飲既妊娠便有是病其狀顏色如故脉息和順但

覺肢體沉重頭目眩擇食惡聞食氣好食酸醎
甚者或作寒熱心中懊憹不能支持不拘初娠但疾苦有輕重耳輕者不
服藥亦不妨重者須以藥療之千金方有半夏茯苓湯茯苓圓貳方專治阻病然此二藥比來少有
服者以半夏有動胎之性蓋胎初結慮其易散此
不可不謹也張仲景傷寒論云婦人傷風續得寒
熱發作有時此為熱入血室有用黃龍湯者小柴
胡湯去半夏也此蓋為姙婦而設焉王子亨則有
白朮散局方則有人參丁香散用之良驗然三方
皆大同而小異楊振則有人參橘皮湯齊士明則
有醒脾飲子試之亦效皆不用半夏動胎等藥服
者知之

白朮散治惡阻吐清水甚害十餘日粥漿不入者

白朮 一兩　人參 半兩　甘草一錢　丁香 貳錢半

右為細末每服貳錢水一錢姜五片煎至七分
溫服

人參橘皮湯治阻病嘔吐痰水

人參 去芦　陳橘紅　白朮
麥門冬 去心各一兩　甘草 三錢　厚朴 製

白茯苓 去皮半兩　各

右為粗末每服四錢水一錢半淡竹茹一塊如
彈子大生姜三片煎至七分去滓澄清溫服空

心食前集驗無茯苓麥門冬甘草
人參丁香散治姙娠惡阻胃寒嘔逆翻胃吐食及
心腹刺痛
人參半兩　丁香　藿香葉各一分
右為散每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服無
時
又方
人參　丁香　柿蒂各一兩
甘草　良薑各半兩
右為細末每服貳錢熱湯點下無時
醞脾飲子治姙婦阻病嘔逆不食甚者中滿口中
無味或作寒熱此出海藏王氏方
草豆蔻以濕紙裹煨令紙乾取出去皮用厚朴制衣各半兩
乾姜三分　甘草一兩
右為細末每服貳大錢水一大盞棗貳箇生姜
三片煎至八分去滓呷服病輕者只一貳服便
能食舊有橘紅貳兩治寒熱瘧痢不食後人去
橘皮以乾生姜代乾姜治老人氣虛大便秘少
津液引飲有奇効產科醫官齊士明依舊用乾
姜去橘皮亦名醒脾飲子治阻病極為神驗宣
和初在京師校勘
保生湯治婦人經候不行身無病而似病脉滑大
而陸部俱勻乃是孕婦之脉也精神如故惡聞食
臭或但欲一物或大吐或時吐清水此名惡阻切

勿作寒病治之宜服此藥如覺惡心嘔吐加丁香
主姜煎服（温隱居方）
人參一分　甘草一分　白朮
香附子　烏藥　橘紅各半兩
右㕮咀每服三大錢水一盞半姜五片煎至七
分去滓温服無時或作末水調
古今録驗療惡食
人參　厚朴　生姜各二兩
枳殼　甘草各一兩
右切以水陸升煮取三升分三服
治妊娠胆病心中憒閙見食嘔吐惡聞食氣眩
煩疼身體沉重多思睡嗜卧面黄肌瘦

人參　陳皮各八分
麥門冬　甘草
太棗二十箇
右㕮咀以水五升煎取貳升温分三服忌菘菜
醋等○凡妊娠惡食者以所思食任意食之必
愈○一方無棗子有半夏竹茹如陳皮分兩
二香散療妊娠胎氣不安氣不升降飲食不美嘔
吐酸水起坐覺重宜服之
香附子二兩　藿香葉　甘草各二錢
右為細末每服貳錢入塩少許百沸湯點服
近効方療妊娠惡食心中煩憒熱悶嘔吐
麥門冬　甘草各三兩　前胡二兩

橘皮 一枚 西 蘆根 一握
右細切以水一大升煮取半升去滓分兩服食
前一服一方無麥門冬用小麥三合㊀體熱四
肢煩熱者加地骨皮（醫人夏侯伍錄方）
李茂翁先生云若左脈弱而嘔服諸藥不止者當
服理血歸原藥則愈經云無陰則嘔是也
人參
當歸
白芍藥
苦梗 炒
甘草 炙 川芎
京芍藥
丁香 各半 西
白朮
陳皮 各一 西
枳穀 去穰 炒 各一分
半夏 泡洗七次 切炒 黃一

右咬咀每服三錢重生姜五片棗一枚煎
安胎飲治懷胎三月至九箇月日惡阻病者
心中憒悶頭重目眩四肢沉重懈怠不欲執作惡
聞食氣欲啖鹹酸多睡少起嘔逆不食或胎動不
安非時轉動腰腹疼痛或時下血及姙娠一切疾
病並皆治之
甘草 炙 當歸
茯苓 白朮
熟地黃 芎 川芎
黃耆 白芍藥 半夏 泡洗七次 切炒
阿膠 切炒 杉 地榆 各等 炒
右咬咀每服三錢水盞半生姜肆片煎至八分

去淳温服無時候一方無半夏地榆有人參桑寄生一方無白术黄耆半夏地榆有艾葉只是膠艾湯加白茯苓

婦姙娠痰逆不思食方論第三 凡八方

夫水飲停積結聚為痰人皆有之少者不能為害多則成病妨害飲食乃至嘔逆婦姙娠之病若嘔逆甚者傷胎也原疾之由皆胃氣不調或風冷乘之冷搏於胃故成斯病也亦惡阻之一端半夏茯苓湯治婦姙娠惡阻心中憒悶虛煩吐逆頭目昏眩四肢怠惰百節煩疼痰逆嘔吐嫌聞食氣好嗜鹹酸惡寒汗出嘔極黄瘦多卧少起不進飲食婦姙有疾必生阻病千金以半夏茯苓湯對之此思邈處方之妙也若孕婦嘔瞓弱胎孕不安則動必成咎全在醫者相人強弱以授之又何慮焉

半夏一兩別剉炒令黄次 茯苓 北細辛 紫蘇 甘草各半兩 生姜五兩

熟地黄 橘紅各三兩 芍藥 苦梗 川芎各一兩

右㕮咀每服四大錢水二盞姜七片煎至七分去滓空心温服兼服茯苓圓

局方與崔氏無紫蘇細辛有旋覆花一兩有客熱煩渴口瘡去橘皮細辛加前胡知母各三兩腹冷下痢者去地黄加炒柱心二兩胃中虛熱

大便秘小便赤澁加大黃三兩去地黃加黃芩
一兩忽半夏雖能動胎若炒過則無妨
半夏茯苓湯張氏方
半夏泡洗七次炒黃七錢　陳皮各二兩半　白茯苓二兩
縮砂仁一兩　甘草炙四錢
右㕮咀每服四錢水二盞姜十片棗一个烏梅
半个煎至七分食前溫服
茯苓圓治姙娠阻病心中煩悶頭目暈重憎聞食
氣吐逆吐痰煩悶顛倒四肢重弱不自勝持服之
即効要先服半夏茯苓湯兩劑後服此藥
乾姜　赤茯苓　人參　半夏泡洗七次炒黃　桂心　橘紅各一兩
白朮　枳殼各二兩　葛根　甘草
右為細末煉蜜為圓如梧桐子大米飲吞下五
十圓日參服一方有麥門冬忌海藻菘菜羊
肉餳糖桃李雀肉酢等○肘後只伍味云姙娠
忌桂千金同
療姙娠心胸支滿痰逆不思飲食
赤茯苓　前胡　白朮
紫蘇葉各一兩　半夏　麥門冬
人參　大腹皮各半兩
右為粗末每服四錢水一盞姜伍片煎至七分
去滓溫服一方無大腹皮人參有大腹子檳榔

療妊娠嘔吐不食煩渴疾水
生薑根 十分 橘紅 四分 生薑 六分
檳榔二分
右切以水二盞煮取七合空心熱服
療妊娠心膈氣滯嘔吐不下飲食心神虛煩四肢
少力
枇杷葉 半夏 麥門冬
人參 甘草 各半兩 呵子 肉
藿香 各一兩 赤茯苓 枳殼
陳皮 各三分
右㕮咀每服三錢水一盞半薑三片棗一箇煎至
七分去滓溫服一 棗方大 呵子
集驗療婦人妊娠惡阻嘔吐不下食
青竹茹 茯苓 各四兩 橘皮 各三兩 生姜 半夏 五兩
右細切以水六升煮取貳升半去滓分三服不
差頻服忌羊肉餛飩酢等物
柴胡湯 古今錄驗 療妊娠不欲食或吐春月所宜服
甘草 柴胡 各二兩 麻黃 一兩
食茱萸 半兩 大棗 十二枚
右細切以水六升煮取三升適寒溫服一升日
三療食噫醋除熱下氣所宜多與止洞但秋夏
去茱萸加枸杞一兩秋去石膏加甘草一兩九月去麻黃加乾姜

一兩十月加川芎參分忌海藻菘菜

胎動不安方論第四

凡婦人妊娠胎動不以日月多少而常墮胎者有雖有胎而月信雖不多常來而胎不損者產實方云婦人妊娠常胎動不安者由衝任經虛胞門子戶受胎不實故也斧有飲酒房室過度有所損動不安者巢氏云婦人衝任貫經狭風寒而有胎故不以日月多寡因悞有擊觸而胎動者有喜怒不常氣宇不舒傷於心肝觸動血脉衝任經虛乃致胞門不固或因登高上厠風攻陰戶入於子宮如此皆令胎動不安也曾有以娠婦月信不絶而胎不損問產科能宗古者荅曰婦人血盛氣衰其人必肥既娠之後月信常来而胎不動若據晚進觀之便以為漏胎若作漏胎治之則胎必墮若不作漏胎治則其胎未必墮今推宗古之言誠有旨也巢氏云婦人經閉不利別有所苦者是謂有子以其經血畜之以養胎之為乳汁也有子之後畜以養胎豈豈可復能散動邪所以然者有娠而月信每至是亦未必因血盛也若謂婦人榮經有風則經血喜動以其風勝則可也既榮經為風所勝則所来者非養胎之血以此辨之若作漏胎治之必服保養補胎之藥旦胎不損強以藥濕之乃所謂實實虛虛也其胎終墮但矣若醫者知榮經有風之理專以一藥治風經信可止或不服藥胎亦

無恙然而有胎奉不固而困房室不節先漏而後
墮者須作漏胎治之此又不可審也亦有婦人年
方壯歲聽醫官言某藥可服致補煖而使胞門子
戶反為藥所操搏（胞藥胞門子戶張仲景謂之血室）使
新血不滋舊血不下設或有子不以遲晚則必墮
中年之後氣宇漸衰必有崩中帶下之疾或月信
愆期漸覺黃瘦腰背不伸主心煩熱五勞七傷之
疾從此而生不獨胞門子戶風寒而生也故千金
翼方有朴消湯泡正為此疾今之醫者未見有用
亦未見有知之者又論姙娠胎動其由有二一因
母病而胎動但療母疾其胎自安若胎不堅固自
動其母疾唯當安胎其母自愈一因勞役氣力或
觸冒冷熱或飲食不適或居處失宜輕者轉動不
安重者便致傷墮當以母形色察之母面赤舌青
者兒死母洁唇口青面瘡沫出者子母俱死面青
古赤口中沫出者母死子洁也

集驗方療姙娠二三月上至八九月胎動不安腹
痛已有所下方

艾葉　阿膠　當歸

川芎各三兩　甘草一兩

右細切以水八升煮取三升去滓內膠令烊分
三服日三千金文仲備急同

刪繁療婦人懷娠胎動不安惡阻方

香豉一升　蔥白一升　阿膠二兩炙

先以水三升煮葱豉取一升去滓入膠再煎令烊服一日一夜可服三四劑經心錄同

釣藤湯治妊娠搦臂月胎動不安心腹疠痛面目青冷汗出氣欲絶此由勞動用力傷胎宮冒急治之

釣藤　當歸　茯神
人參　各一兩　苦梗一兩半　桑寄生半兩

右為粗末每服五大錢水二盞煎至一盞去滓温服無時候忌豬肉菘菜若煩熱加石膏二兩半臨産月加桂心一兩始妊娠胎動不安護胎法鯉魚二斤　粳米一升　葱一握

豉　薑

右作臛食之每月一度

治妊娠無故胎動不安腹内絞痛煩悶産宝同

當歸　桑寄生各四分　川芎三分

豉八合　阿膠二分　葱十四莖

右以水二升煮取八合下膠空腹温分貳服一方無豉用銀器煎集驗無寄生豉有續斷三分

銀多少先煎後入藥

糯米一合

黄耆湯治胎動不安腹痛下黄汁

黄耆　川芎各一兩

右細剉水一大盞煎至一盞三分温服

産寶方治胎動

熟艾　阿膠各二兩　葱白一升

右以水肆升煮取一升半分為三服

安胎鐵罩散

白薬子一兩

右為細末每服貳錢煎紫蘇湯調下或胎熱心煩悶入砂糖少許煎

銀苹酒治妊娠胎動欲墮腹痛不可忍方

苧根二兩　銀五兩　清酒一盞

右以水一大盞煎至半去滓分温貳服

治胎動方　養生必用方救急療胎動去血腰腹痛

阿膠　川芎　當帰

右以水十盞煎取一斗煮至五盞去銀入上件薬三味煮至二盞半去滓入膠再煎膠烊分温三服空心自早至暮盡未効再作

治妊娠冷熱腹内不調致胎不安　産寶方

艾葉三兩　當帰　川芎四兩

右以水四升煮取二升分温肆服不過兩剤胎氣常不安治五箇月已後胎不安

寄生湯

桑寄生洗剉　秦艽　阿膠各半兩　糯米作粉半兩

右以新汲水三升先下寄生秦艽貳味煮至二升去滓次入阿膠糯米再煮約有一升止分作

三服空心食前日午服之忌酒醋三五日娠婦
胎気至五月已後常不安者服之必効頃見娠
婦好飲酒食醎酸五辛胎必動可不知之
治胎動不安
好銀煮取
水
又方
川芎 二両
葱白一升
右以水七升煮取二升半分温三服
右著葱白作羹食之佳
順気飲子産前服之安胎
紫蘇葉
草豆蔻
大腹子 二両 弱者如気不用
木香 炮
人参
茯苓 各一両
甘草 半両
右�once 毎服三銭水一盞半根三寸糯米少許
煎至七分去滓温服
療妊娠後不轉動方
阿膠 炙一両
右為末以酒一升煮五沸下生鶏卵一枚投酒
中分温二服空心食前一服小品方無㝵生右
艾葉只用水煎
文仲安胎㝵生湯療血流下方
桑㝵生 半両
甘草 十分
白朮 各五分
茯苓 肆分
右切以水五升煮取二升半分三服若人壮者
可加芍薬八分足水二升若胎不安腹痛端然

有所見加乾姜肆分即安忌海藻菘菜酢物桃
李雀肉等崔氏小品經心同
秦艽湯 治胎動不安出王氏指迷方
秦艽 阿膠 炒 艾葉
右等分為粗末每服五錢水二盞糯米百粒煎
至一盞去滓温服
小兒療妊娠童下痛引腰背安胎止痛湯方
當歸 阿膠 炙 乾地黄
黄連 芍藥 各一兩 雞子一枚
林米一升
右柒味以水柒升攪雞子令相得煮糯米令如
蟹目沸去滓内諸藥煮取三升分肆服忌蕪荑
經心錄同
又膠艾湯療損動毋去血腹痛方
膠一斤 艾葉一莒
右貳味以水五升煮取二升半分三服經心錄
同

妊娠漏胎下血方論第五

夫妊娠漏胎者謂妊娠數月而經水時下也此由
衝任脉虚不能約制午太陽少陰之經血故也衝
任之脉為經絡之海起於胞内午大陽小腸脉也
手少陰心脉也是二經為表裏上為乳汁下為月
水有娠之人經水所以斷者壅之養胎榦之以為
乳汁也衝任氣虚則胞内泄不能制其經血故月

水時下亦名胞漏血虛則人斃矣又有因勞役喜怒哀樂不節飲食生冷觸冒風寒遂致胎動若母有宿疾子藏為風冷所乘氣血失度使胎不安故令下血也

妊娠卒然下血方論第六十二方

夫妊娠卒然有損動或冷熱不調和致傷於胎故卒痛而下血不止之則墮胎也

療妊娠三肆箇月腹痛時時下血

續斷 八分　艾葉 當歸
乾地黃 各六兩　竹茹 阿膠
雞蘇 各四錢

右以水一升煎取陸合去滓空心再服隔日更服

療妊娠陸柒箇月忽胎動下血腹痛不可忍

川芎 八分　桑寄生 肆分 當歸 十二分

右以水一升煎取捌合下清酒半升再煎取捌合分三服如人行五陸里再服

廣濟主安胎病漏血腹痛當歸 川芎 阿膠 炙

右切以水三升酒肆升煮取二升半分三服五日一劑頻服三四劑無所忌

又療妊娠胎動腰痛及下血安胎當歸 人參 各一兩 大棗 二十介

右切以水三升酒肆升煮取二升半分三服五日一劑無所忌 川芎 苧根 各三兩

鹿角膠
右細切以水一斗煮取五升空心熱服正方用艾葉各二兩葱白一升
銀煮水煎藥又見腰痛門
療妊娠忽下血胎上衝心手足逆冷用生艾汁二
錢入阿膠生蜜各二錢煎至一錢半稍熱服如無
生艾濃煎熟艾汁
治妊娠忽然下血腰痛不可忍男六德續添
鹿角刮細當歸刮各半兩
阿膠一兩炒
艾葉灰半兩
又方
只作一服以水三鍱煎至一半空心食前頓服
不過二服即安
又方
右為細末空心糯米飲調下二錢
漏胎下血不止胞乾即死宜急治之
生地黃汁一升酒五合
過三服良
右同煎三五沸分温三服以止為度
又療娠娠漏胞方一云及腹内冷者
崔氏療妊娠下血不止血盡子死
生乾地黃為末酒服方寸匕日三夜一即愈不
乾地黃五兩乾薑半兩
右為末酒服方寸匕日再集驗文仲經心同
療妊娠無故卒然下血不絶方
阿膠三兩用清酒一升半煎取一升半頓服

又方治妊娠卒然下血兼治胎衣不下方

右以鐵鍾燒令通赤內酒中如此者三次候溫飲一盞

妊娠驚胎及僵仆方 論第七凡七方

夫妊娠驚胎者是懷妊月將滿其胎神識已具或將産之時從高墜下傷損胞絡致血下胎動遂上搶心胃氣絶不醒其母面赤舌青口噤出者子母俱死面青舌青沫出者子母俱死若下血不止胞燥胎枯令子死矣

催生神妙佛手散 窮一名芎治婦人妊娠伍柒月因事築磕著胎或子死腹中惡露下疼痛不已口噤欲絶用此藥探之若不損則痛止子母俱安若治損立便遂下本出文仲徐王効神驗胎動方云治血上衝心腹滿悶者如湯沃雪救急經心同出外臺

又治産前産後體熱敗血腹痛

當歸六兩 川芎肆兩

右為粗末每服三錢水一大盞煎令沸去滓溫服口噤灌之如人行五里再服不過三服便生一方云此藥治傷胎去血多崩中去血多金瘡去血多拔牙去血多及產後血暈欲倒者以水煎服或先以漏血腹內疼痛加芍藥官桂減半隨手效詳見通用方治妊娠因墜倒損胎不轉動腹內疼痛腰重及子死腹中不出須臾三服立下

川芎一兩為細末以熱酒調服方寸匕日三肆
服

治妊娠困失所動困絶子金方亦治子煩

右取竹瀝飲一升立愈

治妊娠從高墜下腹痛下血煩悶

生地黃 益母草 各一兩 當歸
黃耆 各兩半

右㕮咀每服肆錢水二盞姜肆片煎至陸分去
滓無時候

集驗療妊娠二三月上至七八月頓仆失踞胎動
不安傷損腰腹痛欲死若有所見及胎奔上搶心
短氣下血不止方

乾地黃 當歸
阿膠 川芎 各三兩
艾葉 二兩

右以水柒升煮取二升半分作三服腹痛甚加
杜仲五加皮各三兩一方無地黃有甘草一方
無地黃却用生姜自然汁一起地黃汁半合馬
通半合煎成藥去滓入此再煎三沸溫服一方
有人參白茯苓水煎

竹茹酒治妊娠誤有失墜損墮胎損疼痛

青竹茹二合 好酒一升 棗三伍沸分作三
服即安

秦艽湯療妊娠或因僵仆胎動不安腑腹疠痛出產
枰方
前見

療妊娠偶有所傷胎動不安疼痛不可忍無甚效無治子晉子
癎名 治 縮砂不以多少和皮炒令黑色一方用仁熨斗
內略炒為細末熱酒調下二錢不能酒者以米
飲調下皆可覺腹中熱則胎已安矣此方極效
溫隱居云神効不可盡述僕用有效

妊娠胎上逼心方論第八 凡七方

夫妊娠將養得所則血氣調和故兒在胎則安當
產亦易若節適失宜則血氣乖理兒在胎則亟動
至產盲亦難而子上逼於心者由產難用力胎
動氣逆胎上衝逼於心者凡胎上逼於心則悶絶
胎下乃甦甚者至死也

紫蘇飲治妊娠胎氣不和懷胎近上脹滿疼痛謂
之子懸兼治臨產驚恐氣結連日不下名七寶散
無芍

當歸　大腹皮　甘草一分　人參　白芍藥各半兩　川芎　陳橘皮　紫蘇一兩

右㕮咀每服半兩水一錢半姜肆片葱白柒寸
煎至柒分去滓空心溫服

爛而證治之法知之者寡矣此胎死腹中以下之例也胎死而脈猶未絕者亦可下之例也胎死而脈已絕者不可下之例也

當歸飲治妊娠胎動漏下心悶絶煩燥口乾橫生倒産上衝下築迷悶唇口青黒牛足厥冷産科名保安散一方無甘草有川芎厚朴産寶方有川芎

當歸 甘草 二兩 人參 各一兩半 阿膠 一兩炒 連根葱白 一握

右細剉水二升煎肆味至升半去滓下葱再煎三合溫服一劑分為二三服

治胎上逼心熱痛下血

麩半斤擣碎和熟水絞取汁三中盞無時分溫五服〇一方治胎動腹痛連腰用麥麩新汲水調下一方用神麯大同小異

治胎上逼心煩悶方又治妊娠六七月已後胎動困篤

葱白二七莖濃煮汁飲之即安若胎已死服之即出未死即安未効再服

治胎不順胎上逼心方〇以烏犬血少少飲之當下

治妊娠遍身痛或衝心欲死不能飲食

白木 五兩 黄芩 二兩 芍藥 肆兩 白朮

右水六升煮取貳升半分為三服緣胎有水致
痛煎易産
文仲葛氏療妊娠卒胎上迫心痛方○取弩弦急
帶之立愈
妊娠忽然下黄汁如膠或如豆汁如膠或如豆汁胎動腹
痛方第九 見十一
療妊娠忽然下黄汁如膠或如豆汁胎動腹痛
粳米五升 黄耆陸兩
右以水七升煎取二升分為肆服
妊娠誤服毒藥傷動胎氣方第十 凡三方
奪命圓專治婦人小産下血至多子死腹中其人
增寒手指唇口仏甲青白面色黄黒或胎上搶心
則悶絶欲死冷汗自出喘満不食或食毒物或誤
服草藥傷動胎気下血不止胎尚未擾服之可安
己死服之可下此方的係異人傳授至妙
牡丹皮 白茯苓 桂心
桃仁製 赤芍藥
右等分為細末以蜜圓如弾子大每服一圓細
嚼淡醋湯送下速進兩圓至胎腐爛腹中危甚
者立可取出
治婦人服草藥墮孕腹痛方 男六德補遺
白扁豆生去皮為細末米飲調服方寸匕若修
製不及濃煎服亦可
解男子女人誤中砒毒
亦治婦人赤白帶下要炒黄為末米飲調下

阿膠散治妊娠不問月數深淺或困頻作或困毒藥胎動不安腰痛腹滿或有所下或胎上搶心短氣力方

熟地黃二兩　白芍藥　艾葉

當歸　甘草　阿膠

黃耆各一兩　一方有川芎

右㕮咀每服半兩水一大錢姜三片棗一箇煎至七分去滓溫服無時

妊娠心痛方論第十一凡七方

夫妊娠心痛者多是風邪疹飲聚於心之經絡邪氣搏於正氣交結而痛也若傷心正經而痛者為真心痛心為帝主之官統領諸藏不可受邪邪若傷之朝發夕死朝死若傷心支別絡而痛者則乍安乍甚休作有時也妊娠之人或有病而痛不已者氣染胞絡傷損子藏也則令胎動不安不安而動於血者則血下也凡胎轉移則多不安

治妊娠卒心痛氣欲絕方出產寶

川芎　茯苓

厚朴製各等分　當歸

右水六升煎取二升分為二服忌如前

雷公炮炙論云心痛欲死急覓延胡

白朮湯治妊娠卒心痛欲死不可忍者出古今錄驗

白朮三兩　赤芍藥二兩　黃芩半兩

右切以水六升煮取二升半分三服半日令盡
微下水令易生忌桃李雀肉
千金療牡娠心痛
青竹茹一升 羊脂八兩 白蜜三兩
右三味合煎每服棗核大三枚食前頓服日三
服
又方
青竹茹一升酒貳升煮取一升半去滓分温頓
服
又方
破雞子一枚調酒服之
又方

大麻子三升研水八升煮取伍升分為伍服
又方
橘皮三兩 豆豉二兩
右為細末煉蜜圓如梧桐子大温水下貳七圓
無時候出外臺秘要方
牡娠心腹痛方論第十二 凡十一方
夫牡娠心腹痛者或由宿有冷疹或新觸風寒皆由藏虛而致發動也邪下衝於心則心痛下攻於腹則腹痛故令心腹痛也牡娠而痛者邪正相擊而并於氣隨氣上下攻於腹則腹痛故令心腹痛其痛衝擊胞絡必致動胎甚則傷墮也又云牡娠心腹疼痛多是風寒濕冷痰飲與藏氣相擊故令

腹痛攻傷不已則致胎動也
當歸芍藥散治姙娠腹中絞痛心下急痛及療産
後血暈內虛氣之崩中久痢常服通暢血脉不生
癰癤消瘀養胃明目益津
白芍藥半斤　當歸　茯苓
白朮各二兩　澤瀉　川芎各四兩一方川芎只兩半
右為細末每服二錢食前溫酒調服　元和紀
用經云芎六氣經緯無能怯風補勞養真陽退
邪熱緩中安和神志潤澤容色散郁寒瘟瘴時
氣安期先生賜季少居久餌之藥後仲景增減
為婦人懷姙腹痛方　本方用芍藥肆兩澤瀉茯
苓川芎各一兩當歸白朮各二兩亦可以蜜圓

服出三方
治姙娠心腹痛不可忍方
塩一斤燒令赤右以兩指取一撮酒調服
療姙娠先患冷氣忽中心腹痛如刀刺
川芎　人參　茯苓
吳茱萸　苦梗　當歸各三兩
厚朴製　芍藥各二兩
右㕮咀以水九升煎取三升分三服氣下即安
療姙娠患腹痛并胎動不安
葱白切一升　人參　厚朴
阿膠　川芎各二兩　當歸三兩
右㕮咀以水七升煎取三升分作三服○一方

有甘草無厚朴川芎
香术散治妊娠五箇月已後常胞腹間氣刺滿痛
或腸鳴以至嘔逆減食此由喜怒憂慮過度飲食
失節之所致
蔡元度寵人有子夫人怒欲遂之遂病醫官王師
復處此方三服而愈後用果驗
廣中蕷茂一兩煨丁香半兩粉草一兩炙和紀
右為細末空心鹽湯點服一大錢覺胷中如物
按下之狀
草豆蔻散治妊娠心腹常痛嘔食減少四肢不和
全不入食
草果仁想是草豆蔻陳橘皮乾地黃
白术各一兩 川芎三分 當歸炒
桂心 乾姜 木香各半兩
右為細末每服肆錢水一盞半棗二枚煎至六分
熱服
阿膠散治妊娠胎動腹中疠痛不思飲食
白芍藥 白术 川芎
阿膠各三分炒 當歸炒 陳皮各一兩
甘草一分
右㕮咀每服三錢水一盞姜三片棗一箇煎至
七分去滓溫服
治妊娠四五月忽心腹絞痛
大紅棗十四枚燒存性為末以童子小便調下

治妊娠胎動欲落腹痛不可忍

土等銀一升　苧根二升去黒皮

右以水九升煮銀取二升入清酒一升同煎苧根取二升分為三服立安

古今録驗療妊娠腹内冷痛忽胎動

薤白一升　當歸四両切

右以水五升煮取二升作三服亦将小便服将

千金療妊娠腹中痛方

生地黄三斤擣取汁酒一升合煎減半頓服愈

妊娠中悪方論第十三凡三方

夫妊娠人忽然心腹刺痛悶絶欲死者謂之中悪言邪悪之気中胎傷於人也所以然者血気自養而為精神之主若気血不和則精神衰弱故邪毒之気得以中之妊娠之病亦致損胎也

當歸散治妊娠中悪心腹疗痛

當歸　丁香　川芎　各三両

青橘皮二両　吳茱萸　半両去梗湯泡三次炒黒

右為細末無時温酒調一錢

又方

右為細末無時温酒調下

又方

苦梗　丁両細略炒　薑辛両　煎服

妊娠腰腹及胅痛方論第十四　凡十方

論曰腎主腰足肉勞傷損動其經虛則風冷乘之則腰痛冷氣亲虛入腹則腹痛故令腰腹相引而痛甚其痛不止多動胎氣婦人腎以繫胞妊娠而腰痛甚者則胎墮也

療妊娠氣壅攻腰痛不可忍兼治腹痛

當歸三兩　阿膠二兩　甘草二兩

葱白一升

右細剉以水柒升煮取三升去滓分溫五服

紫酒治妊娠腰痛如折

大黑豆二合炒令香熟以酒一大瓦煮取柒分去豆空心頓服

通氣散治妊娠腰痛狀不可忍此藥神妙

破故紙不以多少炒令香熟為末嚼核桃肉羊脂空心溫酒調下二錢

療妊娠腰背痛反覆不得

鹿角長六寸燒令赤淬酒中淬再燒令赤淬酒中淬再淬以角碎為度取酒飲之鹿角為末服亦可

療妊娠腰疼痛不可忍或連胯痛

杜仲四兩　五加皮　阿膠炙　防風　金毛狗脊　川芎　地細辛　草薢各三兩　芍藥

右㕮咀以水九升煮取二升去滓下膠作三服

療妊娠三二月腰痛不可忍者 次服此圓

續斷 杜仲 各十兩 芎藭 獨活 各三兩 狗脊 五加皮 菟絲 芍藥 薯蕷 各八兩 呵子肉 各三兩

右為末煉蜜圓如梧桐子大空心酒下四十圓 日三服

療胞動胎以致腰痛皆痛

杜仲 芍藥 人參 各三兩 當歸 五加皮

右細剉以水七升煮取二升半分溫三服

療妊娠三二月及七八月胎動不安或腰肚痛及血下

川芎 當歸 各四兩 阿膠 二兩 艾葉 甘草 一兩

右細剉以水五升煮取二升去滓分溫三服

大地黃圓治產前後腰腹疼一切血疼信效方治血氣虛四肢不舉骨髓熱疼

熟地黃 二兩 烏梅肉 當歸 各一兩

右為細末煉蜜圓如彈子大每服一圓白湯嚼下空心

廣濟療妊娠胎動腰痛及下血安胎方見前妊娠下血方中論

小品芎根湯療損動胎腰腹痛去血胎動向下方

生乾地黃　芎根各二兩　當歸

下芍藥

右細切以水六升煮取二升去滓內膠煎烊分

温三服忌海藻蕪荑

阿膠　甘草各一兩

救急療胎動去血腰腹痛方見前第

姙娠小腹痛方論中見一方

姙娠小腹痛者由胞絡宿有風冷而姙娠血

論曰姙娠小腹痛甚亦令胎動也

不通冷血相搏故痛下不安小腹痛連腰下血

療姙娠被驚惱胎向

當歸　各六兩　川芎　各八分　阿膠　炙二十

人參　艾葉　四分　大棗　十介

夫姙娠心腹脹滿者由腹內風有寒氣致令停飲

姙娠心腹脹滿方論第十六　凡三方

茯苓十分

右細切以水四升煮取二升温分三服

姙娠腹內動與氣相干故令心腹脹滿

姙娠重閉溺冷飲發動也

倉公下氣湯治姙娠心腹脹滿而胷妨悶不下飲

食四肢無力

羌活　赤芍藥　甘草

檳榔　青皮　大腹皮

陳皮

桑白皮

赤茯苓　半夏

桂心　各半兩　紫蘇莖二兩

右咬咀每服三錢童水一𦫳姜五片棗一箇煎至柒分去滓温服無時候○與局方分心氣飲大同小異加燈心煎

阿梨勒散療姙娠心腹脹滿氣衝胸膈煩悶四肢少力不思飲食

阿梨勒　赤茯苓　前胡各一兩　陳皮　枳殼　大腹皮　桑白皮各三分　川芎　白朮各半兩

右為麤末每服肆錢水一𦫳半姜三片棗子一箇煎至柒分去滓温服無時

治姙娠心下急氣滿切痛

赤茯苓六分　桑白皮五分　前胡四分

郁李仁　檳榔各三分

右為細末以水一升煮取一半去滓夜卧服

局方枳殼散　及保氣散亦妙　紫蘇飲亦妙　方見

新編婦人大全良方卷之十二

新編婦人大全良方卷之十三　凡五方

妊娠數墮胎方論第一

夫陽旋陰化故得有胎榮衛調和則經養周足故胎得安則能成長若血氣虛損者子臟為風寒所苦則血氣不足故不能養胎所以數墮胎也其妊娠腰疼者喜墮胎也

千金療妊娠三箇月數墮胎法灸膝下一寸柒壯

又方

亦小豆為末酒調方寸匕日貳服亦治妊娠數月水尚來

刪繁方療妊娠懷胎數落而不結實或冷或熱百病之源

甘草　黄耆　人參
川芎　白朮　地黄
吳茱萸　各等分　有當歸
右為末空心溫酒調二錢忌菘菜桃李雀肉醋
物經心同錄

廣濟療婦人懷胎數傷胎方
鯉魚三斤　粳米一升
右二味如法作曬少著塩勿著葱豉醋食之甚良一月中須三遍作效安穩無忌集驗文仲備急崔氏延年方同

經心錄紫石英圓主風冷在子宮有子常落或始為婦便患心痛乃成心疾月水都來曾來服之肥悦令人有子方
紫石英　天門冬　去心　五味子　各三兩
烏頭　炮　蓇葖　當歸　烏賊魚骨
雲母　燒研　禹餘粮　當歸
川椒　如常製　桑寄生　石楠葉　各一兩
沢瀉　杜仲　遠志　去心
蒐蕘　桂心　甘草
石斛　人參　辛夷
栢子仁　各二兩
右為末煉蜜為圓如梧桐子大溫酒下二十圓至三四十圓　子金方同
卷栢圓療胞脈數墮胎皆因氣血虛損子臟風冷

致胎不堅固頻有所傷宜服

卷柏　紫石英飛　鍾乳粉　鹿角膠炒
禹餘粮煅研飛　陽起石　桑螵蛸炒
熟地黃各一兩　桂心
川牛膝　蛇床子　桑寄生　北五味
川芎　牡丹皮　杜沖
右為末煉蜜圓如梧桐子大每服三四十圓空心溫酒吞下　當歸各三分

妊娠胎不長養方論第二凡五方

夫妊娠之人有宿痾挾疾而後有娠或有娠時節適乖理致生疾病並令臟腑衰損氣力虛羸令胎不長故須服藥去其疾病益其氣血以扶養胎也

集驗治婦人懷胎不長方

鯉魚長一尺者去腸肚鱗以水漬沒內塩及棗煮令熟取汁稍稍飲之當胎所腹上當汗出如牛鼻狀雖有所見胎雖不安者十餘日輒一作此令胎長大甚平安

白朮散古今錄驗療妊娠養胎

白朮　川芎各四分　川椒炒出汗三分

黃牡蠣煅二分　

若四味為細末酒調一錢匕日三夜一但苦痛加芍藥心下毒痛倍加川芎吐噦不能飲食加細辛一兩半夏大者二十枚服之復更以漿水

服之若嘔亦以醋漿水服之復不解者小麥汁
服之已後其人若渴者大麥粥服之病雖愈盡
服之勿置裴枕（仲景方忌肉桃李）
黃芩散療妊娠胎不長宜服安胎和氣思食利四
肢

黃芩　白朮　陳皮
麥門冬　白芍藥　前胡
人參　各三分　甘草　各半兩

右㕮咀每服三錢水一盞薑三片棗一枚煎至
七分去滓溫服

人參圓療妊娠胎不長宜服養胎

人參　白朮　當歸
柴胡　桑寄生　各一兩　剌薊蘇　厚朴
枳殼　三分　甘草　半兩

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服二十圓
食前溫水吞下

白朮圓調補衝任扶養胎氣治妊娠宿有風冷胎
瘦不長或失於將理傷動胎氣多致損墮娠孕常
服益血保護胎臟

白朮　地黃　炒令六分焦　阿膠　炒
當歸　去尾炒　各一兩　牡蠣　煅為粉　一分
川椒　三分　炒去汗　川芎

右為末煉蜜為圓如梧桐子大空心米飲吞三
四十圓酒醋湯亦可

妊娠胎動不得安却須下方論第三方九七

妊娠得病欲去子方附

夫妊娠羸瘦或挾疾病臟腑虛損氣血枯竭既不能養胎致胎動而不堅固終不能安者則可下之免害妊婦也

療胎動不得安尚在腹母欲死須以牛膝湯下之

牛膝半兩去苗對半兩 水銀二兩 朱砂半兩研

右以水五大盞煮牛膝可得一盞去滓即以蜜和朱砂及水銀研如膏每服以牛膝汁一小錢調下半錢頓服

桂心散治妊娠母因疾病胎不能安可下之

桂心 瓜樓 牛膝

當歸二兩 曬麥各二兩 桂心各一兩 牛膝二兩

右㕮咀每服肆錢水一盞煎至七分空心去滓服

又方

曬麥

蟹爪二合

右為細末空心溫酒調一錢服

又方

牛膝十握右細擣以無灰酒一大盞煎取七分溫二服

又方

取七月七日法麴四兩水二大錢煎取一錢三

分綿濾去滓分温三服立下
小品療妊娠得病須去胎方
麥蘗二升為末和煮二升服之即下神効
文仲療妊娠得病欲去胎方
取雞子一枚以三指撮塩置雞子中服之立出
與阮河南療産難間千金経心緑同

妊娠墮胎後復損於経脉経脉既虚故下血不止也
夫墮胎後復損於経脉経脉既虚故下血不止方論第四凡九方
下血多者便效煩悶乃至死矣
治妊娠損動下血不止腹痛宜服此方

阿膠一両炒　艾葉半両
右以水二大盞煎至六分去滓温服空心

治妊娠損動下血不止
甘草炙一両　阿膠二両炒　雞子一枚
右細剉以水二大盞煮甘草一盞三分去滓下
雞子及阿膠候膠消攪令停無時分温三服
龍骨散廣濟療困損娠下悪血不止
龍骨　當歸　艾葉四分炒　地楡
芍藥　乾姜各六分　阿膠　蒲黄五分
牛角鰓炙焦十分
右為細末食前粥飲調下二錢
治妊娠墮胎下血不盡苦煩滿欲極時発寒熱狂悶方

鹿角屑 一兩 熬

右以水一大盞煎、數一合取汁六分為三服
調鹿角屑二錢服日三服須臾下血古今錄驗
同

千金療落胎下血不止方

右以生地黃汁一小盞調代赭末一錢日三服
治姙娠下血疼痛不止方 亦治小便不禁

右以家雞翎燒灰細研以溫酒調下二錢如人
行五里再服以効為度

千金療姙娠胎墮下血不止方

丹參一味 十二兩

右細切以酒五升煮取三升分三服

救急療損娠方

右取朱砂末一錢七生雞子二顆取白和朱砂
頓服胎若死即出如未死即安

姙娠日月未足之欲產方第五 凡四方

集驗知母圓治日月未足而痛如欲產者無治產
難及子煩知母一味為細末煉蜜圓如雞頭大溫
酒嚼下日三服十金崔氏小異同 一方圓如
梧桐子大粥飲下二十圓

棬子圓治姙娠月數未足而似欲產腹痛者

棬子 蒲黃等分

右為末蜜圓如梧桐子大溫酒下二十圓以痛
止為度

又方

取蒲黃如棗核大篩過以井花水調服

又方

梁上塵 竈突煤

右二味為細末空心酒服方寸匕

斷產方論第六 凡七方

論曰欲斷產者不易之事雖曰天地大德曰生然亦有臨產艱難或生育不已或不正之屬為尼為娼不欲受孕而欲斷之者故錄驗方以備所用然其方頗衆悉有用水銀蚤虫水蛭之類孕不復懷難免受病此方平和而有異驗列具于后小兒方療婦人斷產驗方 千金翼 外臺秘要同

故(先)蛛紙方圓一尺燒為末酒飲調服終身不復懷孕也

療姙娠欲去之令斷產方

梔樓 桂心 各二兩

右三味切以水四升煮取一升半分服之

又方

附子二枚為末以漿若酒和塗右足去之大良

十金斷產方

油煎水銀一日方息空心服如棗大一圓長斷不損人

廣濟落胎方

梔樓根 四兩

肉桂 五兩

牛膝 三兩

右切以水七升煎二升三合去滓温分三服服後如人行五里又進一服無忌

小品療羸人欲去胎方

粉草　乾姜　人參
川芎　黄芩　生姜　肉桂

蟹爪

右八味等分細切以水七升煮取二升分三服忌海藻菘菜生葱千金欲去胎

大麴五升清酒一斗煮二沸去滓分五服隔宿勿食旦再服其子如糜令母肥盛無疾苦　千金不傳

妊娠咳嗽方論第七　凡八方

夫肺感於寒寒傷於肺則成咳嗽也所以然者肺主氣而外合皮毛皮毛竅不密則寒邪亲虚而入故肺受之也五臟六腑俱受氣於肺以其時感於寒而為嗽也秋則肺受之冬則腎受之春則肝受之夏則心受之其諸藏嗽不已則傳於腑妊娠病久不已者則傷胎也

款冬花　麻黄　貝母　熯
前胡　桑白皮　紫苑　各半
旋覆花　白木　甘草　各一分

石膏一兩

右㕮咀每服四錢水一盞姜三片煎至七分去
滓溫服食後

桔梗散治姓娠肺癰咳嗽喘急不食

天門冬去心一兩　桑白皮　苦梗
紫蘇各半兩　人參
貝母　赤茯苓一兩　麻黃去節三分
甘草　馬兜鈴　苦梗　人參
貝母各半兩　陳皮去白

右㕮咀每服四錢水一盞姜三片煎至七分去
滓不拘時候服

馬兜鈴散治姓娠胎氣壅滯咳嗽喘急

大腹皮　五味子七重　紫蘇　桑白皮各一
麻黃散治姓娠外傷風冷疼逆咳嗽不食

右㕮咀每服四錢水一盞姜三片煎至七分去
滓無時溫服

麻黃　陳皮　前胡各半兩　人參　白朮
半夏　枳殼　甘草各半兩　貝母

右㕮咀每服四錢葱白五寸姜半分棗二箇水
一盞煎至六分去滓溫服

百合散治姓娠咳嗽心胷不利煩悶不食

川百合　紫菀　麥門冬

苦梗　桑白皮　各一兩　甘草　半兩

右㕮咀每服四錢水一盞竹茹一分煎至六分去滓入蜜半匙更煎三兩沸不拘時温服

紫菀湯治姙娠咳嗽不止胎不安大方出產科

甘草　桑白皮一分　杏仁　各一分　紫菀一兩

右㕮咀每服三錢水一盞竹茹一枳殼煎至七分去滓入蜜半匙更煎一沸温服

苦梗　三分　天門冬一兩

療姙娠咳嗽方

以車軸燒赤投酒中候冷飲之良

療姙娠傷寒涎多咳嗽

知母　杏仁　天門冬

桑白皮等分

右㕮咀每服三錢水一盞煎至七分去滓服

姙娠喘嗽不止宜服局方華蓋散穩重而有効

方論第八凡二方

姙娠吐血衄血方論第八凡二方

論曰夫姙娠吐血者皆由臟腑所傷為憂思驚悠皆傷臟腑氣逆吐血而心悶胸滿未欲止心悶甚者死姙娠病此多墮胎也○局方必勝散有効

治吐血不止

馬勃用生布擦為末濃煎汁服亦可就第七卷吐血方中選用

數之皮俱收並藏侍用無遺者醫師之良也

昌黎先生云牛溲馬勃敗

婦人煩冷論第九 凡五

論曰婦人煩悶者以四月受少陰君火之氣以養精六月受少陽相火之氣以養氣若母心驚膽寒多右煩悶名曰子煩也產寶云夫妊娠而子煩者是肺臟虛而熱氣於心則令心煩也停痰積飲在心胸之間或衝於心亦令煩也若熱而煩者但熱而已若有痰飲而煩者嘔吐涎沫惡聞食氣煩躁不安也大抵妊娠之人既停痰積飲又虛熱相搏氣尉不舒或煩躁或嘔吐涎沫劇則胎動不安均謂之子煩也

竹葉湯治子煩

竹葉 黃芩 麥門冬 各三兩

防風

右以水一斗煮取四合徐徐服盡為度

麥門冬散治妊娠心煩憒悶虛躁吐逆惡聞食氣頭眩四肢沉重節疼痛多臥少起

麥門冬 赤茯苓 各一兩

紫胡 赤芍藥 陳皮

白茯苓四兩

右吹咀每服肆錢水一盞竹葉數片煎至七分去滓溫服忌酢物

竹葉名竹瀝湯 指迷同一方無黃芩有知母

又方 時時飲竹瀝隨多少

竹茹湯療妊娠煩燥或胎不安

淡青竹刮茹一兩

右以水一大升煮取四合徐徐服盡為度

人參　苦梗　桑寄生
甘草　旋覆花　各半兩　生地黃三兩
右為粗末每服四錢水一盞薑半分煎至陸分去滓無時溫服

又方
麥門冬　茯神　各一兩　甘草一分　犀角屑半兩
右㕮咀每服四錢水一盞生地黃一分淡竹葉二七片煎至六分去滓溫服

柴胡散　治姙娠心煩頭目昏重心胸煩悶不思飲食或嘔吐
柴胡一兩半　赤茯苓　麥門冬各一兩
枇杷葉去毛　甘草各半兩
右㕮咀每服四錢水一琖薑三片煎至七分去滓溫服

人參散　治姙娠熱氣衆於心脾津液枯少煩躁壅熱口舌乾渴
人參　地骨皮　犀角屑各三分　甘草半兩　赤茯苓　麥門冬　黃芩　乾葛
右㕮咀每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服
治姙娠子煩口乾不得卧
黃連去鬚　人參　擣紅

右為細末每服一錢粥飲調下酒蒸黃連圓亦妙

治妊娠心煩熱不止

梔子二合 擘 豉二合 白一握

右以水二大盞煎取一盞半去滓溫分三服

壹母圓治妊娠因服藥致胎氣不安有似虛煩不得卧者巢氏謂之子煩也

知母一兩 洗焙

右為細末以棗肉為圓如彈子大每服一圓細嚼煎人參湯送下○次見醫者不識此證作虛煩治之損動胎氣宜矣有識者亦見有藥也産科鄭宗文得於陳藏器本草拾遺中也用之良

驗方出産乳

妊娠煩躁口乾方論第十凡四方

夫足太陰脾之経也其氣通於口手少陰心之経也其氣通於舌若妊娠之人臟腑氣虛榮衛不理陰陽隔絶熱氣乘於心脾津液枯少故令心煩而口乾也愚考此證與子煩大同小異其方亦可就子煩中通用一母圓亦妙

升麻散治妊娠壅熱心神煩躁口乾渴逆

川升麻 黃芩 人參

梔子仁 柴胡

瓜蔞根 犀角屑 各一兩

甘草 各半兩

茯神

知母

麥門冬

右㕮咀每服四錢水一盞煎至六分去滓温服

知母散治妊娠煩躁悶亂口乾及胎臟熱

知母　麥門冬　甘草各半兩
黄耆　赤茯苓各三分

右㕮咀每服四錢水一盞煎至七分去滓温服

葛根散治婦人妊娠數月胸高煩躁唇口乾渴四肢壯熱少食

葛根不用野葛　黄芩　人參
甘草等分　黄耆　麥門冬

右㕮咀每服四錢水一盞竹茹一堆如錢大煎至七分去滓温服無時

人參黄耆散治妊娠身熱煩躁口乾食少

人參　黄耆　家葛根
秦艽　麥門冬各一兩　知母三分
甘草半兩　赤茯苓一兩

右㕮咀每服四錢水一盞姜三片烝竹葉二七片煎至六分去滓温服

新編婦人大全良方卷之十四

婦人中風方論第一

論曰夫四時八方之氣為風也常以冬至之日候之若從其鄉來者長養萬物若不從其鄉來者名為虛邪賊害萬物人體虛則中之若風邪客於皮膚入於經絡即頑痺不仁若入於筋脉挾寒則攣急喎僻挾濕則弛縱若入臟腑則恍惚驚悸凡五臟俞皆在背臟腑虛風邪皆從俞而入隨所傷臟腑經絡而為諸病也婦人中風若不早治則令墮胎也

防風散治婦人中風卒倒心神悶亂口禁不能言四肢強急

防風　桑寄生　葛根各一兩
菊花　防己　北細辛
秦艽　當歸　桂心
茯神　甘草　羚羊角各半兩

右為粗末每服四錢水一盞姜三片煎至六分去滓入竹瀝半合溫服

白朮酒治姙娠中風口噤語言不得

白朮一兩半　獨活一兩　黑豆一合炒

右細剉以酒三升煎取一升半去滓溫分四服口噤者物灌之得汗即愈

治姙娠中風口眼不正手足頑痺

防風　羌活　防己各一兩

麻黃去節半兩　黃松木節一兩　桂心
荊芥穗　羚羊角屑　桑寄生
甘草　薏苡仁各半兩

右㕮咀每服三錢水一盞生姜半分煎至六分去滓溫服

治姙娠因感外風如中風狀不省人

熟艾三兩

右以米醋炒令極熱乘熱以絹帛裹熨臍下良久即省

陳總領嬖云余女夫趙汝磐居天台親見王清叔舍人療其娉氏姙娠風痙方論第二　凡三方

論曰夫姙娠體虛受風而傷大陽之経絡後復遇風寒相搏発則口噤背強名之曰痙又云産其候冒悶不識人須臾自醒良久復作謂之風痙亦名子癎亦名子冒甚則反張

治姙娠中風角弓反張口噤語澁

麻黄去節　羚羊角屑　桂心　防風　獨活各一両　酸棗仁炒　甘草　當帰　杏仁製各三分　川芎

右㕮咀每服四銭水一盞半合温服

淳入竹瀝半合温服

治姙娠中風腰背強直時復反張

防風　生乾地黄各二両　葛根　杏仁製　川芎　麻黄去節各半両　獨活　甘草

右㕮咀每服四銭水一盞煎至七分去滓温服

小品療姙娠忽悶眼不識人須臾醒醒復発亦有不醒者名為痙病亦名子癎亦曰葛根湯若有竹近可速辦者當先作瀝汁次辦湯也其竹遠不可即辦者當先辦湯此二療會得其一種其竹瀝偏療諸痙絶起死也非但偏療姙娠産婦絶死者有効小兒或癎痙金瘡発痙療之亦驗○作竹瀝法見第三巻第一論

葛根湯療妊娠臨月困瘁風痙忽悶憒不識人吐迷眩倒小醒復發名為子癎

葛根　貝母去心　牡丹皮去心
木防己　防風　當歸
川芎　桂心熬
沢瀉　白茯苓　甘草各二兩
石膏碎　人參各三兩　獨活

右細切以水九升煮取三升分二服貝母令人易產若未臨月者升麻代之忌海藻菘菜酢物

其詳見第三卷第一論之亦可選方而用

夫人臟腑調和則血氣充實風邪鬼魅不能干之妊娠腹內有鬼胎方論第三　凡三方

若榮衛虛損則精神衰弱妖魅鬼精得入於臟狀如懷娠故曰鬼胎也

雄黃圓療妊娠是鬼胎致腹中黑血散下腹痛

雄黃細研　鬼臼去毛　蓉草
丹砂細研　巴豆去皮心油　獺肝炙令黃各半兩
蜥蜴一枚炙令黃　蜈蚣一條炙黃

右為細末蜜圓如梧桐子大空心溫酒下貳圓日西服後當利如不利加至三圓初下清水次下虫如馬尾狀無數病極者下蛇蟲或如蝦卵雞子或如白蠶或如豆汁其病即除療婦人鬼胎及血氣不可忍方

班猫去頭翼足製　延胡索炒各三枚

右為細末再研如麪以溫酒調下半錢以胎下為度

治婦人虛羸有患胎癥堛經候不通

芫花根三兩

右剉炒令黃色為細末每服二錢桃仁煎湯調下當下惡物

妊娠傷寒方論第四十二凡方

論曰夫冬時嚴寒人體虛為寒所傷即成病為傷寒輕者淅淅惡寒翕翕發熱微咳鼻塞數日乃止婦人一緊治之也

妊娠傷寒六七日後熱久而不愈則傷胎凡妊婦傷寒仲景無治法用藥宜右避忌不可與尋常加減四物湯治妊娠產前腹痛及治月事或多或少或前或後胎氣不安產後血堛不散或亡血過多或惡露不下

當歸 川芎 白芍藥 熟乾地黃 各一兩

右㕮咀每服四錢水一盞半煎至八分取六分去滓分四服食前投

清汁熱服日四服以知為度○妊孕下血即入艾六七葉阿膠末一錢同煎疾勢甚大散藥不及以四味各半兩細剉以水四盞煎至二盞半右㕮咀每服一錢水一盞半煎至一盞去滓分四服食前投

度平常產乳服至三日止如虛弱血臟不調至堂月止○因虛致熱熱與血搏口古乾渴欲飲

水者加枯樓根一兩麥門冬三分○腹中刺痛
惡物不下加當歸芍藥各一分○血崩加地黃
蒲黃各一兩○因热生風加川芎一分柴胡半
兩○身热脉躁頭昏頃強加柴胡黃芩各半兩
○大便秘結加大黃半兩桃仁一分炒○如大
便滑洩加桂心熟附子各一分發寒热加乾姜
牡丹皮芍藥各一分○嘔者加白朮人參各半
兩○腹脹加厚朴實各一分○虛煩不得眠
加竹葉人參各一分○煩躁大渴加知母石膏
各半兩○水停心下微吐逆加猪苓茯苓防已
各一分○虛寒狀類傷寒加人參柴胡防風各
三分

阿膠湯治姙娠傷寒瘟疫時氣先服此以安胎宜
却以治病藥相間服

阿膠 灸 白朮 桑寄生
人參 白茯苓
右等分為細末煮糯米飲調服方寸匕日三服

葱白湯治姙婦傷寒憎寒發熱當發其汗

葱白 十莖 生姜 二兩
右細切以水二盞煮取一盞連服取汗愈

前胡湯治姙婦傷寒頭痛壯熱肢節煩疼出廣濟方
石膏十二分 甜竹茹 三分 外臺無
黃芩 前胡 六分
枳子仁 各四分 大青 五分
知母

右�once咀每服五錢水一盞半葱白三寸煎至八分去滓温服集驗文仲備急救急同
蘇木湯治婦人傷寒或中時行洒淅作寒振慄而悸或加嘔者
赤芍藥　橘紅　猪苓
黄連　甘草　蘇木等分
右�once咀每服五錢水一盞煎至六分去滓温服
汗出瘥若胎不安無服阿膠湯方見前
黄龍湯治婦人寒熱頭疼嘿嘿不欲食脇下痛嘔逆疾氣及産後傷風熱入胞宮寒熱如瘧并經水適来適斷病後勞腹餘熱不解宜服
柴胡去苗一兩　黄芩　人參
甘草各半兩
右�once咀每服五錢水一盞半煎至一中盞去滓温服
柴胡石膏湯治婦人傷暑頭痛惡寒身熱躁悶四肢疼痛項背拘急口乾躁
柴胡四兩　甘草二兩　石膏八兩
右�once咀每服二錢水一盞生姜五片煎至六分去滓温服若氣虚體冷加人參四兩
枳實散治婦人傷寒四日至六日以来加心腹脹上氣渴不止飲食不多腰疼體重
枳實一兩炙　陳皮　麥門冬半兩
右為細末每服三錢水一中盞生姜半分葱白

七寸煎至六分去滓温服

旋覆花湯治姓婦傷寒頭目旋疼壯熱心躁

旋覆花 赤芍藥 甘草各半兩 前胡 人參 麻黄去根節 黄芩各三分 石膏各一兩 白朮

右㕮咀每服四錢水一盞半姜半分煎至六分去滓温服

麥門冬湯治姓婦傷寒壯熱嘔逆頭疼不思飲食胎氣不安

人參 黄芩各三分 石膏各一兩 前胡 麥門冬各半兩 桔梗

右㕮咀每服五錢水一盞半生姜四片棗二箇淡竹茹一分煎至八分去滓温服

梔子大青湯治姓婦發斑甚為黑色尿血

梔子仁各二兩 大青 升麻 杏仁

右㕮咀每服五錢水一盞半葱白三寸煎至一盞去滓温服

為藥湯治姓娠傷寒五箇月已前當用此方

黄芩各一兩半 芍藥各四錢 當歸

右為細末温酒調服方寸匕日二服產後百病

悉皆主之常服則易產無疾苦（王子亨為產後常服之藥）

當歸茯苓散治婦人傷寒腹中隱痛

當歸　白芍藥　半斤　茯苓　白朮　各二兩　澤瀉　川芎　各四兩

右為細末酒服方寸匕日三

白朮散治妊婦傷寒煩熱頭痛胎氣不安或時吐逆不下食

白朮　橘紅　麥門冬　前胡　赤茯苓　人參　川芎　各一兩　甘草　半夏　各半兩

右㕮咀每服四錢水一中盞姜四片淡竹茹一分煎至六分去滓無時溫服

柴胡散治妊娠熱病骨節煩痛頭疼壯熱若不治熱不止則損胎

柴胡　家葛根　知母　梔子仁　甘草　各半兩　大青　石膏　一兩　黃芩　升麻　各三分

右㕮咀每服四錢水一盞葱白三寸煎至六分去滓無時熱服

麻黃散治妊娠五六箇月傷寒頭疼壯熱四肢煩疼

麻黃　赤芍藥　各一兩　桂心　柴胡　甘草　半兩

右㕮咀每服三錢水一盞姜三片煎至六分去

淳無時溫服

升麻散治姙娠傷寒頭痛身體壯熱

川升麻　蒼朮炒　麥門冬
麻黃各一兩　黃芩　大青各半兩
石膏二兩

右㕮咀每服四錢水一盞姜半分淡竹葉二七片煎至六分去淳無時溫服白三七煎至

治孕婦傷寒

柴胡　前胡　川芎
當歸　人參　芍藥
豉　生地黃等分
甘草

右為細末每服二錢姜三片棗四箇煎至七分去淳溫服要出汗加葱白一莖

良方白朮散治姙婦傷寒

白朮　黃芩各等分新瓦上炒令香

右為散每服三錢水一中盞姜三片棗一枚煎至七分溫服但覺頭痛發熱便可與二三服即癒唯四肢厥冷陰證者未可服此方本當別一論仍售去行醫用之如神無比

士人賣此藥醫皆詫人得此方予自得此治疾無有不効者仍安胎益母子

治姙婦傷寒頭疼腹痛

升麻　黃芩各六分　家乾葛
大青　石膏　甘草各三分

苦竹葉 一握 並細剉

右用水一升半先煮苦竹葉乾葛減一半入諸藥再煮至六合去滓溫服

婦娠時氣方論第五凡三方

論曰夫四時之間忽有非節之氣如春應暖而反寒夏應熱而反冷秋應涼而反熱冬應寒而反暖非其節而有其氣而一氣之至無人不傷寒少雖殊病皆相似者多扶於表毒也言其時普行此氣故云此時氣也婦娠遇之重者致傷胎也

柴胡湯

柴胡 各一兩 石膏二兩

秦艽散治婦婦時氣五六日不得汗口乾多喫冷水狂語嘔逆

秦艽 赤茯苓 各半兩 前胡 甘草 各一兩 犀角屑 家葛根 川升麻

右㕮咀每服四錢水一盞姜半分淡竹茹一分煎至六分去滓無時溫服

葛根飲子治婦婦時氣頭熱口乾頭痛

家乾葛 麻黃去節根 各半兩 石膏一兩 白米半合 梔子仁二七枚 豉一合

右細切以水二大盞煎至一盞三分去滓無時分溫三服汗出為效

消熱飲子治婦婦時氣六七日熱甚大小便不利

最宜服此

川芒消一兩細研　葵子三兩

右如前煎服以利為効

敗毒散升麻葛根湯皆可用（凡用葛根宜用家葛氣養生必用曬乾風野葛能動胎方言之甚詳）

妊婦熱病方論第六凡五方

論曰夫冬時當蓄寒觸胃傷之藏於肌膚夏至乃發壯熱又為暑病即熱病也此寒氣蘊積發即為痛若妊娠遇之多致墮胎也

經云熱病與中暑相似但熱病者脉盛中暑者脉虛

治妊娠熱病壯熱頭痛嘔吐不止不食心胸煩悶

人參一兩　竹茹一方無二兩　麥門冬去心一兩　蘆根二兩　家葛根各一兩　知母三分

右�once咀每服四錢水一盞連根葱白三寸煎至七分去滓溫服

梔子仁飲子治妊娠熱病斑出黑色小便如血氣急欲絶胎欲落

梔子仁　升麻　石膏　生乾地黄各二兩　黄芩各一兩　大青各一分

右�once咀每服半兩葱白七寸豉四十九粒水一盞煎至五分去滓無時溫服救急有杏仁無地黄石膏

大黃飲子治妊娠病六七日熱入腹中大小便
秘澁煩熱
川大黃（微炒） 石膏各七銖 知母 水一
前胡 赤茯苓各三分 梔子仁
甘草 黃芩各半兩
右㕮咀每服半兩水一大盞生地黃一分煎至
六分去滓無時溫服
又方
以伏龍肝細研無時水調下一錢匕（亦可調為涎塗臍下）
又方
以家葛根煮汁無時服一小盞
妊娠傷寒煩悶防損胎方論第七凡七方
論曰非節之氣傷於妊婦熱毒之氣侵損胞胎遂有墮胎漏血俱害子母之命也
治妊娠傷寒骨節疼痛壯熱不急治則胎落
葱白（切）一升 前胡 家葛根
石膏各十分 青竹葉六分 升麻八分
梔子仁十一分
右㕮咀以水七升煮取二升半去滓分溫三服
治妊娠時氣頭痛腰背強壯熱
升麻 青竹葉
梔子仁 黃芩各二兩 前胡
家葛根三兩 石膏八分
右㕮咀以水五升煎取二升半去滓分為三服

治妊婦六七箇月傷寒熱入腹大小便秘結不通
蒸熱

前胡十分　大黄八兩　石膏各二十分
梔子仁十枚　知母　黄芩
茯苓　生姜各八分

右水八升煎取二升半後下大黄更煎三五沸
分作三服

治妊娠傷寒苦熱不止身上班出忽赤忽黑小便
如血氣欲絶胎欲落

梔子仁　升麻各四兩　青黛二兩
石膏八兩　知母一升　黄芩三兩
生地黄二十分　葱白切一升

右㕮咀以水九升煎取三升去滓作三服忌熱
物

治妊娠時氣身大熱令子不落護胎方

伏龍肝研令極細　川朴消　蛤粉

右水調塗臍下二寸乾則易差即止消清亦可

又方

淳萍　大黄微炒
藍根各八分

右為末水調付臍上安胎解煩熱極妙

又方

井中泥塗心下乾則易二方出本事再録有効

妊娠熱病胎死腹中方論第八　郭楠中凡四方

論曰熱病胎死腹中者何咎曰因母患熱病至六七日以後臟腑極熱熏煮其胎是以致死緣兒死身冷不能自出但服黑神散暖其胎須臾胎即自出何以知其胎之已死但看產母舌青者是其候

黑神散 又名烏金散 靈苑方 治肉桂散

桂心 當歸 芍藥 甘草炙 乾姜炮 生乾地黃 各一兩 黑豆炒去皮二兩

右為細末每服二錢空心溫酒調下一方無附子有浦黃陳無擇評曰夫妊娠謂之重身二命係焉將理失宜皆能損胎不持病熏煮所致或困頓作驚恐出入觸冒及素有癥瘕積聚壞胎最多其候古書即知子死養胎論曰面青古赤母死子生唇青吐沫子母俱斃又有雙懷二胎或一死一活其候尤難知自非臨蓐觀察未易預述不可不備學也然以黑神散溫胎未若補助產母使其氣正免致虛乏困頓胎自下矣催生湯殊勝黑神散

催生湯 治胎死腹中或產母氣乏委頓產道乾澁

蒼朮泔浸洗炒二兩 桔梗一兩 陳皮六錢 白芷 桂心 甘草各二錢 川芎錢半 川烏 當歸 乾姜炮 厚朴製 芍藥 茯苓 半夏湯泡 附子炮去皮

南星炮各二錢　枳穀四製錢　木香一錢
杏仁去皮尖炒　阿膠炒各一分
右為細末每服一大錢溫酒調下覓熱悶加白蜜新汲水調服只是五積散無麻黃有川烏附子南星阿膠木香杏仁六味

鹿角散治妊娠熱病胎死腹中下之
鹿角屑一兩
右以水一錢匕白五莖豉半合煎至六分去滓溫服良效

又方取死胎
烏雞一去毛隻
右細剉以水三升煮取二升去雞通手用衣帛

蘸摩臍下胎自出

妊娠癰疾方論第九凡四方

論曰夫妊娠病癰者由夏傷於暑客於皮膚至秋因勞動血氣腠理虛而風邪乘之動前暑熱陰陽交爭陽盛則熱陰盛則寒陰陽相離寒熱俱歇若邪動氣至交爭則發故癰休作有時其發寒時節漸晏者此由風邪客於風府風府故發日晏其發日早者衛日一夜常大會於風府一節二十一日下至尾骶二十氣之行風府日下一節二十一日下至尾骶二十二日入脊內上注於伏衛之脈其行九日出缺盆之內其氣既止故發更早其間日發者由風邪內搏五臟橫連募原其道遠其氣深其行遲不能日

作故間日擂積乃發也姙娠而發則寒熱之氣相迫傷於胎故多損動也

治妊婦瘧疾不差出集驗方今録驗同

常山　石膏各一兩　黄芩　烏梅十四箇炒　甘草炙各三兩

右細切以酒水各一大升相和浸酒一宿平旦煎至一升半去滓分三服第一服未發前一食久服之第二服取臨欲發時服

糯米百粒　恒山　竹葉各三兩　石膏八兩碎

右切以水六升煮取二升半去滓分三服第一服未發一食久服之第二服取臨欲發時服

餘一服用塗頭額及鼻前立心藥滓置頭邊當發一日勿進水及飲食發過後乃進粥飲忌生葱菜集驗大仲備急同

治妊婦患瘧寒熱頭痛心煩

黄芩　參門冬去心各一兩　石膏　甘草半兩　烏梅十四箇

右㕮咀每服四錢水一盞煎至六分去滓温服七寶散治男子婦人一切瘧疾或先寒後熱或先熱後寒或寒多熱少或熱多寒少或一日一發或一日兩三發或連日或間日發或三四日一發不問鬼瘧食瘧不伏水土山嵐瘴氣似瘧者並皆治之

常山　厚朴　姜製　春皮
陳皮　益智去白　甘草　檳榔
草菓去皮
右等分咬咀每服半兩於未發隔夜用水一碗
酒一盞煎至一大錢漉出露一宿却將滓再用
酒水更依前煎一次去滓別以椀盛貯亦露一
宿來日當發之早溫面東先服頭藥少歇再
服藥滓大有神効出楊氏家藏○僕嘗治一妊婦六
七箇月而沿瘴疾先寒後熱六脉浮緊衆醫用
柴胡桂枝無効僕言此疾非常山不愈衆醫不
肯因循數日病甚無計罷勉聽僕治之遂用七
寶散一服愈黃帝問曰婦人重身毒之如何岐
伯曰有故無殞帝曰願聞其故何謂也岐伯曰
大積大聚其可犯也衰其太半而止豈不以審
藥之性味明治療之方處以中庸與疾適好於
半而止之勿過而餘則何疑於攻治哉
妊娠霍乱方論第十凡四方
論曰夫陰陽清濁相干謂之霍乱霍乱冷風
乱也但飲食過度觸冒風冷使陰陽不和致清濁
相干腸胃虛者受之故霍乱也熱乱者先吐或心
腹痛則吐痢並發有頭痛體疼發熱而吐痢者亦
為霍乱所以然者挾風而有實故也風折於氣皮
膚緻密故血氣不得宣通故令壯熱風邪乘其經

脉気上衝頭則頭痛風気入於腸胃則洩痢胃逆則嘔逆故為吐痢也吐痢甚者則多煩臓腑虚故也又手逆冷陽気暴竭謂之四逆也姙娠之病吐痢甚者則傷胎也

人参散 治姙婦霍乱吐瀉心煩腹痛

人参 去芦 厚朴 姜製 橘紅 各一両
当帰 炒 乾姜 炮 甘草 炙 各半両

右為散 毎服四銭 水一銭半 棗三箇 煎至六分 去滓 温服 無時

白木散 治姙娠霍乱腹痛吐逆不止

白木 炒 益智仁 枳殻 製 各三両
橘紅 分 草豆蔻 煨去皮 良姜 炒 各半両

右為散 毎服三銭 水一銭半 姜半分 煎至六分 去滓 温服 無時

木瓜煎 治姙娠霍乱吐瀉転筋入腹則悶絶

吳茱萸 一方有茴香一銭 湯泡七次 生姜 切一両 木瓜 切一両半

右細剉 水一盞半 煎一銭半 分去滓 分三服 無時熱服

一方止渇飲 治姙婦霍乱吐瀉心煩悶乱作渇

右用糯米一合 泡令浄 細研 以水一大盞研濾 取汁入銚一合 生姜汁半合 相和渇即頓服立止 ○縮脾飲亦妙

五苓散 局方 訶子散

胡椒湯　香薷散

夏月頓宣合此以防霍乱若有是訂以此茶療之其效神速但要極令服一方有黄連無扁豆已上五方並見第七卷第三論

縮脾飲方解伏熱陳煩湯消暑毒止吐痢霍乱之後脹熱藥太多致煩躁者宜沉冷水令頓腹

草菓仁四両　烏梅肉三両　甘草一両半

右㕮咀每服半両水一椀生姜十片煎至八分浸以熟水温冷任意

新編婦人大全良方卷之十四