

徐氏醫學十六種

福建中医学院图书馆

地址：福州市模兜

脉訣啓悟註釋目錄

診法

浮脉

沉脉

遲脉

數脉

滑脉

濡脉

虛脉

實脉

長脉

短脉

洪脉

微脉

緊脉

緩脉

芤脉

弦脉

革脉

牢脉

濡脉

弱脉

散脉

細脉

伏脉

動脈

促脈

結脈

代脈

疾脈

英江徐靈胎著

診法

脉為血脈，血行脈中，氣血之先。

言脉非氣非血，乃氣血之元神也。

脉為血府，氣血之隧道。

言隧道乃氣息應馬脈溫氣動息之所由，脈之所由，人脈之至數

應資始於腎。腎主先天，一氣之始。

資生於胃。胃主後天水穀之本。

血脈氣息，皆資生於此。

血脈之行，而脈即資生於此。氣息上下循環，行諸經。

不息，晝行陽二十五度；夜行陰二十一度。

一晝夜運行五十度，周於身。

十二經中，十二經皆有動脈，獨寸闊尺寸位惟手太陰。

口取決。

寸口該寸闊尺寸，兩手六部屬肺，肺為藏府，華蓋藏府，有脉之大會。

肺為百脉之朝宗，而為脉之大會。

脉之大會。

肺為百脉之朝宗，而為脉之大會。

息之出入，生息之出入，氣

出陽入陰，合乎十二經中。

手足陰陽，經動脈，寸

呼出心肺吸入腎肝，之為一息。

一呼一吸，脾主中州，氣息應也。

脉來四至，吸之間，脉來四至，是為平脉，閏以太息，低氣息有高

長短呼吸間，有一息長者，謂之太息。

太息太息之間，如歲月之間。

脈來五至，五至亦為平脉，呼出吸入，往來既定，合為一息。

來為一息，日夜一萬。

日夜一萬，一日一夜，一萬呼吸。

一日一夜，一千五百息，呼吸之間，一呼脉再至，氣行三寸，脉行六寸。

合呼吸之計，脉行六寸，八百十丈。

合日夜一萬三千五百息計之。

脉來五至，當五十周于身，日行無不準此。

一日一夜，脉治病平旦為準。

行八百一十丈，當五十周于身。

日行無不準此。

氣血未亂，脈絡調匀。

虛靜凝神，虛心靜意，調息細審。

調息細審，病人之氣息，診人之脉，診病人令仰其掌，令其手，掌上掌後，高骨，掌後高骨之端。

布指疎密，長短勿失，脉之長短，布指輕重，布指診脈，各自不同，輕重之間，意各不同。

意各不同，曰舉按尋，輕取曰舉重，取消消息從容。

從容病脈前為陽，關脈後為陰，關脈後為陰，關脈後為陽，半為陽，半為陽。

半為陰，關脈木之上為陽，足居關脈之上為陽，足居關脈之先，後推尋，先關後寸及尺推

是名關上。

即是關脉之端，審位既確，審的關，可以布指。

即可分疎密得宜，布指疎密，長短勿失，勿失其部，布指輕

重，布指診脈，當分輕重，各自不同。

輕取曰舉，重取曰按，尋消息從容，從容不迫，關前為陽，半為陽，關後為陰，關脈後為陰，關脈後為陽，半為陽，半為陽。

半為陰，關脈木之上為陽，足居關脈之上為陽，足居關脈之先，後推尋，先關後寸及尺推

大為順，陽道女人之脉，屬陰，右大為順，陰道男尺恒虛。

男以陽為主，女人恒盛為主。

女以陰陽弱陰強，男子尺脉盛，女子尺脉虛。

反此則病。反此經常。闕前一分。為陽人命之主。

陽為生氣。係人性命之主。

左偏緊盛。左脉偏見緊盛。

傷寒在表。右偏緊盛。

寒邪傳表。

右偏緊盛。

右脉偏食傷裏。傷胃神門屬腎。乃診腎兩在闕後。眞後有

人無二脉。兩尺無脉。必死不救。

無藥可救。脉絕必死。

即浮中沉。浮中沉。浮候中。上下左右。自足至寸。自寸至尺。

為下陰根子。左陽根於右。七法推尋。以明診法。

又有九候。脈有

三候。候尺三部合而為名。合三部各有三候。每候五十動而不

止者是藏氣完固。乃

為九候之名。

有七診。七種

診法曰浮中沉。候沉候。上

下左右。自足至寸。自寸至尺。

為下陰根子。左陽根於右。七法推尋。以明診法。

又有九候。脈有

三候。候尺三部合而為名。合三部各有三候。每候五十動而不

止者是藏氣完固。乃

為九候之名。

為九候之名。

即浮中沉。浮中沉。浮候中。上下左右。自足至寸。自寸至尺。

為下陰根子。左陽根於右。七法推尋。以明診法。

又有九候。脈有

三候。候尺三部合而為名。合三部各有三候。每候五十動而不

止者是藏氣完固。乃

為九候之名。

為九候之名。

而內之以向內而不內。脉身有動也。脉為推而上之。推脈氣上而不下。脉氣竟腰足清也。虛清冷足推而下之。以向下而不上下。脉氣上而項痛也。蹠項作痛。按之至背筋者少者分減少。用者

痛而身有痺也。病痛綿綿也。五藏不同。醫不同。各藏皆心肝脾肺各有本脉。左寸之心。心脉應洪大而散。心火炎

右寸之肺。肺脉應浮濶而短。肺金清而短。肺應左關。肝脉應沉而弦長。肝木生榮之象。腎應左尺。左尺沉石而滑水。

螯藏右關應脾。脾關應脉象和緩。脾土中和之象。右尺命門。命門應沉滑而洪。真陽所基封藏之象。春弦。弦主春令。應夏洪。

洪主夏令。應秋毛。毛主秋令。應火之象。秋脉金之象。肺水之象。冬石。石主冬令。應火之象。腎水之象。四季之末。牌脉主四季之末。和緩不急。和緩為脾胃太

過實強。肺氣盛則脉之過。病生於外。而病生于外。而病生于外。而病生于外。不及虛微。不及為虛微。不及為虛微。正氣奪則脉氣病生於內。內傷正氣則為

內脉見側傍。側傍見脉。不循正位。脉名曰側關。側關從尺斜至側傍。覆手見脉。從尺直至後腕。名曰反關。反關脉見手背三部九候尺寸。三候是為九候。肺經動脈。肺兩手動脈皆屬肺經。以陰藏府又五藏天府十二經所居之地。五藏六府。三焦。大腸。小腸。胱為六府。各以其

時令之時循序漸進。猶四時次序運合自然。還氣主令應時。即至。時應氣躁促為征。躁促為病愆。四時百

病。百病生於四時。胃氣為本。有胃氣則生。脉貴有神。按之有力不失。和緩無病。不可不審。脉動之象。即是有神。從客之象。即是有神。不可不審。脉動之象。三至為遲。呼吸之間脉來六至為數。數則熱症。虛火熱之病。遲數既明。既明遲數為

為遲。遲則為冷。虛陰令之病。六至為數。六至為數。則熱症。虛火熱之病。遲數既明。既明遲數為

浮沉湏別。湏別表裏。在浮沉遲數。滑表沉裏。辨内外因。內因七情外因於天。外感天內因於人。內傷人天

有陰陽。陰主冷。風雨晦冥。風淫末疾。雨淫濕疾。晦冥謂陰。人為陰冷之病。喜怒憂喜。傷心。傷陽。思悲恐驚。傷脾。悲亦

驚。傷老弱不同。老少並氣不同。氣不同。風土各別。宜有別之至理。既明脈還貫圓通。還貫圓通。動圓通。脉察真藏。胃氣不至乎手

脉。陽主熱。風主熱。時陰晦冥人為陰冷之病。人喜怒憂喜。傷心。傷陽。思悲恐驚。傷脾。傷腎。急益勁如新張弓。心脉來躁疾。形如

至數急疾。乃脾脉來催咏。如雀喙食歟。不經絕脉。肺脉來吹毛。如風吹毛。肺經絕脉。命門脉來。如魚之翔。脉不值

手起伏皆為死脉。診得絕脈，不拘十指，吉凶順逆皆主死。細載於經，詳著脈經，奇經八脉，二經中衡任督帶。任主胞胎，為諸脈之承任。督行於背，為諸脈之總督。陰維為諸陰脈之維繫，陰蹻主諸陰脈之蹻捷。高章綱為帶脈，環脈為諸脈之約束。陰維為諸陽脈之維繫，陰蹻為諸陽脈之蹻捷。高章綱為陽蹻之網，牒單損為不足。牒單為諸陰脈之損，二十八脉，診病條分於後，分晰條陰蹻之損，二十八脉，診病條分於後，分晰條。

脉之體象

浮脉

浮在皮毛。浮在皮毛之內，輕取脈即應，指如水漂木。喻水中漂木言。言脈在浮分也。舉之有餘，輕取曰舉。按之不足，重取曰按。勢即減，非虛脈也。

主病

浮為風為表，浮為風為虛。

浮脉為陽。浮為陽脉，風邪在表。表受風邪，表無見證。無頭痛發熱，乃為陽盛。症必口燥舌乾，脈必浮盛，有力浮虛血虛。脉若虛浮帶數，陰虛浮豁散亂，是無根。脉既無根，症必難治。

寸關尺

兩手六部

右寸脈浮。右寸應肺，主分佈衛氣。肺受風邪則浮，傷風鼻塞。風傷衛氣則肺失分佈而肺氣逆，故鼻塞。左寸脈見于右寸者邪遍周分則六脈者浮傷。傷風鼻塞。右寸主統營血寒，邪傷之則浮脉見於左。傷寒頭痛，寒邪傷表則清。左寸若邪過營分則脉必浮而兼緊。右寸應脾，胃血胆屬少陽而司腠理，二經受邪，右關脉浮。右關應脾胃，受風則脈浮，傷脾胃。胃主納穀，脾主運化，胃經受風則善善，脾經受風則不能食而泄。右尺應命門，腎命受風則真氣下泄。左尺脉浮。左尺應腎膀胱，小便不利為熱結膀胱，小腹急結，小便不利為熱結膀胱，小腹結硬，小便不利為血淋，濁膀胱受風。右尺脉浮。右尺應命門，腎命受風則脈浮，太陽犯本之裏膀胱為太陽之府，小腸應太陽之經，腎藏受風則腰痛，小腸受風則溺血淋，濁膀胱受風。隨經瘀熱入裏，則小腹急結，小便不利為熱結膀胱，小腹結硬，小便不利為血淋，濁膀胱受風。

無力表虛。浮為風寒
為表陽虛。脉浮有力為表
實欲詳裡証裏脉浮虛象最切。脈虛主裏

辨兼脈

浮緊風寒。

浮為風家
緊為寒家
裏虛則浮

浮緩風濕。

浮因風鼓
緩由濕着浮數風熱
數乃熱極

浮洪風火。

浮為風傷營
洪為大熱浮濤傷營

浮浮短氣虧。

短主氣虧
濁主氣衰

浮浮濡氣衰。

濁甚則浮
衰甚則濁

辨兼象

按浮之為義。

浮脉之義

如木之浮水面也。

喻其脉在浮分舉之有餘

按之不足。

言脉在浮分按之脉之象

按之不足。

言脉在浮分按之脉勢即減非虛象也

最合浮脈之

最合浮脈之義

形容浮脈之義為最合

浮而盛大為洪。

洪如洪水滿指浮而軟大為虛

虛脉浮軟

浮而柔細為濡。

濡而浮且浮而無根為散

散大而遲浮而柔細為濡

且浮而無根為散

乃為散脈急為革脈

浮而弦大為革。

浮而弦大且浮而中空為革

急為革脈

浮而中空為芤。

芤脈中空浮沉俱有

芤中候獨空乃為芤脉

診宗脈學

浮脉者。下指即顯浮象。按之稍減而不空。舉之泛泛而流利。不似虛脉之按之不振。芤脉之尋之中空。濡脉之綿軟無力也。浮為經絡肌表之應。良由邪襲三陽經中。鼓搏脈氣於外。所以應指浮滿。在暴病得之。皆為合脈。然必入迎浮盛。乃為確候。若氣口反盛。又為痰氣逆滿之徵。否則其人平素。右手偏旺之故。有始病不浮。病久而脉反浮者。此中氣虧乏。不能內守。反見虛痞之兆。若浮而按之漸衰。不能無假象發見之虞。傷寒以尺寸俱浮。為太陽受病。故凡浮脈主病。皆屬於表。但須指下有力。即屬有餘客邪。其太陽本經。風寒營衛之辨。全以浮緩浮緊分別。而為處治。其有寸闊俱浮。尺中遲濇者。南陽謂之陽浮陰弱。營氣浮脉啟悟註釋

不足。血少之故。見太陽一經。咸以浮為本脈一部不速。虛實懸殊。亦有六脈浮遲而表熱裏寒。下利清穀者。雖始病有熱。可驗太陽。其治與少陰之虛陽發露不異。又有下後仍浮。或兼促兼弦。兼緊。兼數之類。總由表邪未盡。乃有結胸咽痛脇急頭痛之變。端詳結胸藏結及痞之證。皆為下早。表邪內陷所致。究其脉雖變異。必有一部見浮。死生虛實之機。在關上沉細緊小之甚。與不甚耳。惟陽明府熱攻脾脈。雖浮大心下反硬者。急當下之。所謂從證不從脉也。其在三陰。都無浮脈。惟陰盡復陽。微愈足溫而脉浮者。皆為愈證。故太陰例。有手足溫。身體重。而脉浮者。少陰例。有陽微陰浮者。厥陰例。有脉浮為欲愈。不浮為未愈者。須知陽病浮遲。兼見裏證。合從陰治。陰病脉浮。證顯陽回。合從陽治。幾微消息。當不越於聖度也。近世為尚文浮中沉三法。舉世共推。雖卓章已見。究其所云。不論脉之浮沉遲數。但以按之無力。重按全無者。便是陰證。曷知按之無力者。乃虛散之脈。與浮何損者哉。逮夫雜證之脉浮者。皆為風象。如類中風痱之脉浮。喘效痞滿之脉浮。煩躁衄血之脉浮。風水皮水之脉浮。消渴便血之脉浮。泄瀉膿血之脉浮。如上種種。或與證相符。或與證乖互。咸可治癒。惟內經有腸澼下白沫。脉沉則生。脉浮則死之例。然風水乘脾之證。初起多有浮脈。可用升散而愈者。當知陰病見陽脈者生。非若沉細虛微之反見狂妄躁渴。難於圖治也。

沉脉

沉行筋骨。沉脉在筋骨之間。如水投石。言石投水中。喻其脉重取脈乃應手。在沉分而不浮也。

按之有餘。按之脉氣有餘。沉脉之象。舉之不足。輕取無有。

不分而
不浮

主病沉為陰為裏

沉脈為陰脉，伏在裡，無伏，亦無之。但只為氣滯鬱結之脉，若屬虛寒，裏實之疾，兼服辨治。以沉脈兼象辨別其虛實為治。

寸闕尺

右寸脈沉

沉為逆肺病喘歎。肺苦氣上逆氣逆氣逆則痰升而喘歎。

左寸脈沉

沉為暴怒傷營。暴恚氣鬪營陰暗傷。

左闕脈沉

氣鬪肝膽氣

結

傷肝鬪右闕脈沉。沉為傷肝鬪。

中滿食滯

中滿傷脾食滯在裏。

右尺脈沉

沉為氣結。

伏溺閉

氣不化濕小便癃閉。

辨虛實

無力裏虛

脉沉無力裏氣虛衰。

有力裡裏

脉沉有力裏邪實滯。

外證未平

惡寒發熱之表未平。

治裏勿及

從證治表不可遽專治裏。

辨兼脈

沉遲痼冷

沉為裏遲為寒遲從沉見則為在藏之陰寒。

沉數內熱

沉為裏數為熱數從沉見則為在府之火熱。

沉滑痰飲

沉為裏滑為痰滑從沉見則為痰飲內滯。

血結

沉為裏滯傷血滯從沉見有力則為血結。

沉澀虛衰

沉為裏滯主虛衰。

沉牢堅竇

沉為裏牢主堅竇。

沉緊冷疼

沉為裏緊為寒緊從沉見則為冷疼。

寒濕

沉為陰緩為寒濕從沉見則為寒濕。

沉弦伏飲

沉為裏弦主飲弦從沉見則為伏飲。

沉細陽衰

沉為裏細主陽衰從沉見則為真陽衰弱。

辨兼象

按沉之為義

沉脉之義。

如石之存水底也

喻其脉在沉分而不浮。

沉而細軟為弱脈

沉而細為弱脉。

沉而細且

且為弱脉。

沉而弦勁為牢脉

既弦而

且勁為牢脉

為牢脉。

沉而着骨為伏脉

沉而推筋着。

診宗脈學

沉脈者輕取不應重按乃得。學指滅小更按益力縱之不即應指不似實脉之舉指逼逼伏脉之滯於筋下也。沉為藏府筋骨之應。蓋緣陽氣式微不能浮運營氣於表。脉顯陰象而沉者則按久愈微。若陽氣鬱伏不能浮應衛氣於外。脉反伏匿而沉者則按久不衰。陰陽寒熱之機在子細微之辨。傷寒以尺寸俱沉為少陰受病。故於沉脈之中辨別陰陽為第一義。若始病不發熱無頭痛而手足厥冷脉沉者此直中陰經之寒症也。若先曾發熱頭痛煩躁不寐至五七日後而變手足厥冷躁不得寐而脉沉者此厥深熱深陽邪陷陰之熱證也亦因始本陽邪因汗下太過而脉變脉遲此熱去寒起之虛證也有太陽證下早胸膈痞硬而關上脉小細沉緊者此未邪內陷陽分之結胸也若能食自利乃陽邪下陷陰分之藏結矣。有少陰病自利清水口乾腹脹不大便而脉沉者此熱邪陷於少陰也。有少陰病始得之反發熱脈沉者麻黃附子細辛湯溫之是少陰而兼太陽即所謂之兩感也此與病發熱頭痛脉反沉身體痛當溫之宜四逆湯之法似是而實不同也。有寸關俱浮而尺中沉遲者此陽證夾陰之脉也若沉而實大數盛動滑有力皆為陽邪內伏沉而遲細弱弦濇少力皆屬陰寒無疑。有久時伏邪發於春夏煩熱躁渴而反脈沉濇者此少陰無氣毒邪不能發出陽分乃下虛死證也。凡傷寒溫熱時疫感冒得汗後脉沉者為愈證非陽病陰脉之比。有內外有熱而脈沉伏不數不洪指下濇小急疾無論傷寒雜病發於何時皆為伏熱。不可以其脉之沉小而誤認陰寒也。至如腸澼自利而脉沉寒疝積瘕而脉沉暋節痛痺而脈沉伏疾留飲而脈沉石水正水而脉沉胸腹結痛而脉沉霍亂嘔吐而脉沉鬱結氣滯而脉沉咸為應病之脉若反浮大虛濇或雖沉而弦細堅疾為胃氣告焉未可輕許以治也。

遲脈

遲脈屬陰。是為陰象為不及。

遲本陽虛中之陰象不及之象

往來遲慢。陽氣虛衰不能健運營。

一息三至。吸之間脉來三至為遲。

主病

遲主藏寒。

遲為陽虛故主藏寒

其病為陰。陰寒之邪

令人為病浮屬陽虛

遲從浮見則陽虛於外脉必浮遲無力

沉為火衰。遲從沉見則火衰於裏脉必沉遲細微

寸闊尺

右寸脉遲。

遲見肺痿數沫

肺虛成痿

厥吐涎沫

左寸脉遲。

遲見心痛停凝

心陽氣虛

陰寒凝結

左關脉遲。

遲見癥瘕筋筋

癥瘕

藏寒右闊脈遲。

遲見右闊脈

胃火虛衰

冷物內滯

左尺脉遲。

遲見溲便不禁

小便不禁

右尺脉遲。

遲見火衰飧泄

真火衰微

大便飧泄

辨虛晉

有力積冷。

脈遲有力冷積於中

無力虛寒。

脈遲無力虛寒傷寒

傷寒傳變。

寒化為熱傳布經絡

兼滑非寒。

熱初傳裏脈必遲滑

辨兼脉

浮遲表冷。

陰寒表盛浮進有力

沉遲裏寒。

陰寒裏盛脉必沉遲

遲滑脹滿。

脈滿遲滑有力

遲滑血寒。

血結于寒遲滑血寒飲食令積

遲結物凝。

冷物凝滯脈必遲結

遲細寒濕。

寒濕陽藏脈必遲細

遲微陽脫。

真陽虛脫脈必遲微

辨兼象

按遲之為義。

遲之義遲慢而不能中和也

脈來遲慢以一息四至為平。

一息四至失於中和

脉以一息三至為平。

一息四至是為平脉

遲則一息三至。

一息三至間脉來

三至遲而不流利則為濇脉

遲帶而不能流利乃為濇脉

遲而有歇止。

則為結脉

脉來緩時一止是為結脉

遲而浮大且軟。

則為虛脉

脉訣啟悟註釋

遲脈

五續

脈脉來浮大遲
軟為虛脈

診宗脈學

數脈

遲脈者呼吸定息不及四至而舉按皆遲。不似濶脈之參伍不調。緩脈之脉勢遲緩也。遲為陽氣不能鼓運管氣之象。故昔人咸以隸之虛寒。而人迎主寒。濕外襲氣口主積冷內滯。又以浮遲為表寒。沉遲為裡寒。遲濶為血病。遲滑為氣病。此論固是。然多有熱邪內結。寒氣外鬱。而見氣口遲滑作脹者。詎可以脉遲概為之寒。而不究其滑濶之象。虛實之異哉。詳仲景有陽明病脉遲微惡寒而汗出多者。為表未解。脉遲頭眩腹滿者不可下。有陽明病。脉遲有力。汗出不惡寒。身重喘滿。潮熱便難。手足濶然汗出者。為外欲解。可攻其裡。又太陽病。脉浮因誤下而變進。膈內扼痛者為結胸。若此皆熱邪內結之徵驗也。當知脉遲雖見表證。亦屬藏氣不充。不能統攝百骸。所以邪氣留連不解。即有腹滿。而頭眩。脉遲。陽分之患未除。禁不可下。直待裏證悉具。然後下之。聖法昭然。豈不詳審慎重乎。遲為陽氣失職。胸中大氣不能敷布之候。詳遲為在城一語。可不顧慮藏氣之病乎。

數脈

主病

數脈為陽。數為陽熱之象其病為陽。陽熱有盛之脉。為太過。數為陽熱其病為陽。陽熱有浮數陰虛。浮數陰虛。火熱內盛。脉必少力。沉熱火熱必沉數有力。氣急脉數。氣急故脉

亦急數。數氣虛。氣虛不能統攝營血。故脉為虛。其病為陽。陽熱有浮數陰虛。浮數陰虛。火熱內盛。脉必少力。沉熱火熱必沉數有力。氣急脉數。氣急故脉

一息六至。陽氣運行過度則往來越度。一息六至者其常度而為數脉脉來急數而不徐。往來越度。

數主病。

數主府熱。數為陽熱之象其病為陽。陽熱有浮數陰虛。浮數陰虛。火熱內盛。脉必少力。沉熱火熱必沉數有力。氣急脉數。氣急故脉

亦急數。數氣虛。氣虛不能統攝營血。故脉為虛。其病為陽。陽熱有浮數陰虛。浮數陰虛。火熱內盛。脉必少力。沉熱火熱必沉數有力。氣急脉數。氣急故脉

右寸脈數數見肺肺瘧喘咳肺熱或寒左寸脉數數見火火炎口瘡心火炎上左寸火炎口瘡心火炎上左寸火炎口瘡心火炎上左寸火炎口瘡心火炎上雷電右闊脉數數見脾脾胃實脾火為紅炉之火左闊脉數數見肝肝胆火肝火之火為實火為寒熱之火為寒熱之火右闊脉數數見腎腎火為寒熱之火左闊脉數數見腎腎火為寒熱之火右闊脉數數見腎腎火為寒熱之火右尺火結便火結由陰虛火旺右尺火結便火結由陰虛火旺是大腸濕火

辨虛實

有力實火火邪內實脉必數而有力無力虛火陰虛有火脉必數而虛衰表證悉罷頭癢發熱惡寒之證悉罷火越宜涼火象發越清涼折之

辨兼脈

浮數表熱浮數主火邪發熱沉數裏熱沉數主火邪發熱弦數肝火弦數主少陽若無半緩數溫火緩數溫火緩數主太陰若無腹滿吐利則為溫火之脉陽數君火陽數在寸脉陰數相火陰數在尺脉左數陰陽左寸脉數為君火盛陰數相火左數陰陽左寸脉數為君火盛陰數相火右數火亢右寸脉數為火邪亢

辨兼象

按數之為義數脉之義躁急而不能中和也躁急而不能中和也一呼脈再至一呼來急數一呼脈再至一呼來二至一吸脈再至一吸來二至呼吸定息合呼一吸呼吸定息合呼一吸脉來四至四至為平脈閏以太息閏息之長脉脉來五至太息之間五至亦為平脈數則一息六至一息六至為數脈數而弦急則為緊脈弦急有力轉動大橘為緊脉數而流利則為滑脈流利如珠為滑脉數而有止則為促脈數而有歇止為促脉數而過極則為疾脈數而過急為疾脉數如豆粒則為動脈動搖為動脉

診宗脈學

數脈者呼吸定息六至以上而應指急數不似滑脈之往來流利動脈之駁駁動搖疾脈之過於急疾也。

數為陽盛陰虧。熱邪流傳於經絡之象。所以脈道數盛。大性善動而躁急也。故傷寒以煩躁。脉數者為傳。脈靜者為不傳。有火無火之分也。即經盡欲辭。而脉浮數。脈之不絕。其人不虛不戰。汗出而解。則知數而按之脉者皆為虛矣。又陽明例云。病人脉數為熱。當消穀引食而反吐者。以發汗令陽氣微。膈內虛。脈乃數也。數為客熱不能消穀。胃中虛寒故吐也。又胃反而寸口脉微數者為胸中冷。又脈陽緊。陰數為欲。吐陽浮。陰數亦嘔。胃反脉數中氣大虛。而見假數之象也。人見脉數。悉以為熱。不知亦有胃虛及陰盛。格陽者。若數而浮大。按之無力。寸口脉細者虛也。經曰。脈細而從按之不鼓。諸陽皆然。病熱脉數。按之不鼓。甚者乃陰盛拒陽於外。而致病。非熱也。形證似寒。按之鼓擊於指下者。乃陽盛拒陰而生病。非寒也。丹溪曰。脈數盛大。按之而澹。外有熱證者。名曰中寒。蓋寒留血脉外。證熱而脈亦數也。凡乍病脉數。而按之緩者。為邪退久病脉數為陰虛之象。瘦人多火。其陰本虛。若形充色澤之人。脉數者。濕熱鬱滯經絡。不暢而蘊熱。其可責之於陰乎。若無故脉數。必生癰疽。如數實而吐臭疾者。為肺癰。數虛而欬吐延沫者。為肺痿。又歷攷數脉諸例。有云數則煩心者。有云滑數心下結熱者。皆包絡火旺而乘君主之位也。有云細數陰虛者。水不制火。真陰虧損也。有云數為在府者。陽邪干陽。藏氣無預也。有云數則為寒者。少大氣。衰壯大食氣也。大抵虛勞失血欬嗽上氣多。有數脉。但以數大軟弱者為陽虛。細小弦數者為陰虛。非若傷寒衄血之脉。浮大為邪伏於經。合用發散之比。諸凡失血。脉見細小微數無力者為順。脈數有熱及實大弦勁急疾者為逆。若乍疎乍數。無問何病。皆不治也。

滑脈者。滑而利也。往來流利。圓滑盤珠之形。走珠尚露之象。滑利之象。殆無專義。

主病

滑為血盛。

血盛則脉滑。此言平人無病之脉。

主痰主孕。

滑主有餘。言非痰即孕滑為邪盛。病人有病之脉。

百病皆順。

百病脉滑無逆。病之輕重皆為。

順利之脉。

寸闊尺

右寸脈滑。

滑見哮喘痰嗽。則于疫疾伏抑鬱則喘。

左寸脉滑。

滑見心包則忧惚怔忡。疫因火動則怔忡。左闊脉滑。見疫心包則憂惚。

左膽府邪侵。

疫延沃胆。搏膈驚惕。右闊脉滑。見疫溫內滯。

左尺脉滑。

滑見遺精白濁。脾腎失職。右尺脉。

右尺上利客迫。

疫帶腸胃。

辨虛實

無力虛痰。

疫因虛動。脉滑無力。有虛滯。

六氣之痰。

疫生於六氣。變於七情。

辨兼脉

浮滑風痰。

浮為風。滑為痰。沉滑痰食。

沉滑數瘦大。

滑為痰。數為火。滑為氣。瘦為虛。大為火。主氣虛。

滑而浮大。

浮大為陽脉。滑為火。內熱則陰痛。

尿則陰痛。

火熾則腎水傷。浮散為中氣虛。而主尿則陰痛。

衛不密。風邪易入。疫狀則經絡凝。

滑而冲和。

滑為血。有餘。冲和為氣。獨治。

懷孕可決。

血盈氣調。

辨兼象

按滑之為義。

滑為氣。氣往來流利。而不滯也。往來之脉勢流利與陰陽中之陰。此陽中兼浮者毗於陽。

浮見滑從。

則為陽脈。兼沉者毗於陰。滑從沉見。是以或寒或熱。則為陰脉。是從無一定。或表或裡。浮沉從裏。無定稱。或寒從數。則為陽。則為陰。陽主病。從表。或權衡之以浮沉。浮沉以辨之以尺寸。尺寸始可為陰陽。表裏。

惟衡之以浮沉。浮沉以辨之以尺寸。尺寸始可為陰陽。陽主病。從表。或寒從數。則為陽。則為陰。陽主病。從表。或權衡之以浮沉。浮沉以辨之以尺寸。尺寸始可為陰陽。表裏。

診宗脉學

滑脈者。舉之而浮。按之滑利。不似實脉之逼。逼應指堅脉之往來勁急。動脈之見於一部。疾脉之過於急。疾也。仲景曰。翕翕沉名曰滑。滑者緊之浮名也。言忽浮忽沉。形容流利之狀。無以過之。滑為多血少氣之脈。而昔人又以滑大無力。為內傷元氣。曷知滑脈雖浮沉之分。却少無力之象。蓋血由氣生。若果氣虛。則鼓動之力先微。脈何由而滑耶。惟是氣虛不能統攝餘火。而血熱脉滑者有之。嘗攷諸內經。有脉滑。曰病風緩而滑。曰熱中脉浮而滑。曰新病脉盛滑堅者。曰病在外脉弱以滑。是為胃氣滑者陰氣有餘也。則知滑脉之病。無虛寒之理。他如傷寒溫熱時行等病。總以浮滑而濡者為可治。故先師論脉首言大浮數動。滑為陽。而雜病以人迎浮滑為風疾。緩滑為中風。氣口緩滑為熱中。滑數為宿食。尺中弦滑為下焦畜血。又嘔吐而寸口遲滑。為胸中實。下利而關上遲滑。為下未盡。厥逆而脉滑而裏有實。詳此則滑脈之疾。可不言而喻。即經有滑者陰氣有餘一語。是指陰根搏陽而言。豈以陰氣有餘。多汗身寒之病。便可目為血多。又以滑大之脈。牽合無力。而為內傷元氣乎。平人肢體豐盛。而按之綿軟。六脉軟滑。此瘦濕漸清於中外。終日勞役。不知倦怠。若省息則重着痰疾矣。夫脉之滑。而不甚有力者。皆浮滑緩滑濡滑微滑之類。終非無力之比。滑為血實氣盛之脉。悉屬有餘。婦人身有病。而脈滑和者。為孕。臨產脉滑疾者。曰難經。若滑而急強。堅厚如彈石。謂之腎絕。滑不值手。按之不可得。為太陽氣不足。以其絕無和緩。胃氣故經與之。

濇脉

濇脉艱滯。脉氣應指艱滯。與滑脉正相反。如刀刮竹。刀刮竹喻其脉勢遲細而短。與遲脉遲慢不同。三象俱足。三者之象俱不足之謂。

主病

濇為血少。血營脈中故少則脈濇。氣滯傷精。濇主精傷。脈必濇弱無力。男子難嗣。女子難孕。能懷孕者。男子難嗣于嗣育。女子難孕于能懷孕者。

寸關尺

右寸脉濇。濇見傷燥欬沫。肺虛傷燥。右寸傷燥。故吐白沫。左寸脉濇。濇見驚悸傷營。營傷則心血虧少。心神失養而為驚悸。左關脉濇。濇見遺濁。難嗣。男子難嗣于嗣育。女子難孕于能懷孕者。

邪遏。血少則邪不能外。遇于肝膽。則右關脉濇。

邪遏。血少則邪不能外。遇于肝膽。則右關脉濇。若氣滯脈必沉濇。有力量。男子難嗣于嗣育。女子難孕于能懷孕者。

尺脉濇。右尺液涸結腸。津液內涸。

辨虛實

有力濇滯。濇屬邪滯。是實熱。因虛酒滯。脉必有力。隨部斷經。各隨部位以病久延。百病診得濇滯。

辨兼脈

有力濇滯。濇屬邪滯。是實熱。因虛酒滯。脉必有力。隨部斷經。各隨部位以病久延。百病診得濇滯。

辨兼象

按濇之為義。之義。脉來不流利。脈勢來不能流利。快。脈氣應指不暢達。而濇滯而不能中和。脉氣濇滯失於中和。如輕刀刮

你不能喻其遲慢而艱難也。遜慢艱難乃喻其脉氣如雨沾沙。不能喻其濡滯而不流也。蓋雨沾玉石則滑利而流利雨沾沙土則濡而不流也。非若極細極軟。言極其似有若無為微脈。似有若無欲絕為濡脈。浮而細且柔為弱脈。沉而細且柔為弱脈。三者雖皆有似濡脈。微濡弱三脉雖似濡脈而確乎指下。指下確切辨認大有分別也。

微濡各

有一定之象與濡脈
大有分別不可混也

診宗脉學

濡脈者指下濡濶不前。內經謂之參伍不調。叔和喻以輕刀刮竹。通真子譬之如雨沾沙。長沙又以渴漆之絕比擬。雖然其義則一。不似遲脈之指下遲慢。緩脈之脉象緩徐。濡脈之來去綿軟也。良由津血虧少。不能濡潤經絡。所以濡濶不調。故經有脉濶曰脾。寸口諸瀉亡血濶則心痛。尺熱脉濶為憐。種種皆陰血消亡。陽氣有餘。而為身熱無汗之病。亦有痰食。勝固中外。脈道阻滯。而見濡數模糊者。陰受水穀之害也。金匱云。守口脉浮大。按之反濶。尺中亦微而濶。知有宿食。有發熱頭痛。而見浮濶數盛者。陽中霧露之氣也。霧傷皮腠。濕流關節。總皆脉濶。但兼浮數沉細之不同也。有傷寒陽明府寢。不大便而脉濶。但病大熱而脉濶。吐下微喘而脉濶。水腫腹大而脉濶。消痔大渴而脉濶。痰症喘滿而脉濶。病在外而脉濶。婦人懷孕而脉濶。皆證脉相反之候。間有因胎病而脉濶者。然在二三月時有之。若四月胎息成形之後。必無虛濶之理。平人無故脉濶。為貧窘之兆。尺中塞濶。則艱於嗣。金匱云。男子脈浮弱而濶。則無子。精氣清冷。其有脉塞而鼓。如省客左右傍至。如交漆。按之不得。如頹土。皆手足不和殊異尋常之脉。故素問列之大奇。

虛合四升乃有二義虛軟空虛

一浮大遲軟合為虛脉是及乎尋按中候幾不可見

尋按難見况候之虛乃

主病

虛主血虛

脈為血府血虛脉虛軟甚氣虛帶數陰虛虛細陽虛

又主傷暑暑傷元氣氣

病暑脉虛泄則脉虛暑屬暴病確為傷暑辨認無疑病久脉虛則

虛衰之候且暑病虛病脉空虛則一而應指強弱有別

寸關尺

右寸脉虛

虛見右寸自汗氣怯肺虛則腠理不密而自汗

左寸脉虛

虛見左寸驚悸怔忡心虛少則心神失養而

正音而左關脉虛

虛見左關脉虛治節無權而氣怯

血不榮筋

肝主筋而藏血虛則筋失所養而不榮

右關脉虛

虛見右關脉虛飲食難化脾胃虛衰則

虛見左尺腰膝痿痺

腎脾作痛為脾病而無力為痿

不右尺脈虛

虛見右尺真火衰弱命門火衰

辨兼象

按虛之為義虛空不足之象

虛見空虛專以軟而無力得名者也虛脉

虛之異於濡者虛脉虛則遲大

而無力虛脉濡則細小而無力也

濡脉異於芤脉虛則愈按愈軟虛脉虛軟按芤則重按而

仍見也

芤象中空浮沉俱有中候獨空

診宗脈學

虛脉者指下虛大而軟如循雞羽之狀中取重按皆弱而少力久按仍不乏根不似芤脉之豁然中空按久漸出濶脉之軟弱無力舉指即來散脉之散漫無根重按久按絕不可得也虛為營血不調之候叔和

以遲大而軟為虛。每見氣虛喘乏。往往有虛大而數者。且言血虛脉虛。獨不詳仲景脉虛身熱得之傷暑東垣云。氣口脈大而虛者。為內傷於氣。若虛大而時縮一濶。為內傷於血。凡血虛之病。非顯濶弱。則弦細芤遲。如傷暑脉虛。為氣虛。弦細芤遲。為血虛。虛勞脉杜虛。芤遲或尺中微細小者。為亡血失精。男子平人脉虛弱微細者。善盜汗出。則氣血之分了然矣。慎齋有云。脈洪大而虛者。防作瀉。可知虛脉多脾家氣分之病。大則氣虛不斂之故。經云。脉氣上虛。脉虛是謂重虛。病在中脉虛難治。仲景有脈虛者不可吐。腹滿脈虛復歟者。不可下。脈陰陽俱虛熱不止者。死。可見病實脈虛。皆不易治。蓋虛即是毛。毛為肺之平脈。若極虛而微。如風吹毛之狀。極虛而數。譬譬如羹上肥者。皆為肺絕之兆也。惟癰癧之脉虛為可治者。以其神出舍空。而行峻補。若實大為頑痰固結。搜滌不應。所以為難耳。

實脉

實脉有力。實為充實。應指有力。長大而堅。長大堅滿與物虛脈正相反。應指幅幅。堅滿與象三候皆然。浮中沉三候。

主病

邪實脉實。實為邪盛之候。火實壅結。乃火結於裏。暴病非熱。暴病為邪盛。久病非寒。久病為熱結。

寸闊尺

右寸脉實。實見右寸數逆咽痛。肺熱上壅。則左寸脉實。實見左寸舌強氣湧。心火不降。則左關脉實。實見左關火壅腸痛。

肝熱內壅。則肝膽氣結而脇痛。右關脈實。實見右關脈滿。氣壅結為痛。中左尺脈實。實見左尺溺閉腹滿。小便閉滯。則右尺脈實。實見右尺相火亢逆。相火內元。

寶真右尺朴火元通水大更勝

辨兼象

實而且堅

實為朴結。緊則寒侵。

指留於中實而且滑。

滑為痰聚。痰凝見祟。

神昧見祟。則實而清長。

實而數大。

實主熱。急搏為洪。

重按稍減也。

脉來洪盛。指下屈曲旁出。按之

則脈勢稍減。均與實脉有別也。

為洪

重按稍減也。

為急搏。指下屈曲旁出。按之

則脉勢稍減。均與實脉有別也。

為急搏。指下屈曲旁出。按之

則脉勢稍減。均與實脉有別也。

為急搏。指下屈曲旁出。按之

則脉勢稍減。均與實脉有別也。

為急搏。指下屈曲旁出。按之

則脉勢稍減。均與實脉有別也。

按實之為義。

實脉為邪氣壅盛。

邪熱內盛。脉來結滿。

而為有餘之象也。

堅滿實大。故三候皆有力而且大且

長。

實大有力三候無不皆然。非如緊脈之弦急。

急搏為緊取。如切繩而左右彈人手。

如切緊繩而彈人手指。則洪脈之盛大滿指。

洪脈之盛大滿指。

洪盛指滿。

彈人手指。

彈人手指。

洪脈之盛大滿指。

洪盛指滿。

彈人手指。

彈人手指。

洪脈之盛大滿指。

洪盛指滿。

診宗脉學

實脉者。重濁滑盛相應。如參。春而按之石堅。不似緊脈之逆急不和。滑脈之往來流利。洪脈之來盛去衰也。實為中氣壅滿之象。經云。邪氣盛則實。非正氣本充之謂。即此一語。可為實脉之總歸。夫脈既實矣。諒虛證之必無也。證既實矣。諒假象之必無也。但以熱邪亢極而暴絕者。有之。其為病也。實在表。則頭痛身熱。實在裏。則頭脹腹滿。大而實者。熱由中發。細而實者。積自內生。在傷寒。陽明病。不大便而脉實。則宜下。後脉實大。或暴微欲絕。熱不去者。死。厥陰病下利脉實者。下之。必病脉逆從。可見矣。蓋實即是石。石為腎之平脉。若石堅太過。譬譬如彈石狀。為腎絕之兆。其消牌鼓脹堅積等病。皆以脉實為可治。若泄而脫血。及新產婦虛久病虛羸。而得實大之脉。良不易治也。

長脉

長脈迢迢。長脈應首尾俱端。脉之首尾直上直下。均條長。如循長等。長脉之家與短脉正相反。

主病

長主有餘。

長脉為陽有餘之病

氣逆火盛。

長主氣逆火盛於中

長而清圓。

脉長圓澤火盛於外

壽徵之診。

長則氣治故主壽徵

寸闊尺

右寸脈長。

長見逆滿之脉

肺熱內盛

左寸脈長。

長見君火為病

相火失解壯火食氣

左寸脈長。

長見木實之硬

木鬱子內

火為右關脈長。

長見土鬱脹悶

脾土內鬱

左尺脈長。

長見大腹脹悶

大腹脹悶

右尺脈長。

長見奔豚氣逆

腎相火上攻

右尺脈長。

長見氣逆奔豚

右尺相火專令

相火亢逆燥熱便難

辨脉象

診宗脈學

長脈者。

指下迢迢而過於本位

三部舉按皆然。

不似大脈之舉之間大脈之少力也。

傷寒以尺寸俱長為

陽明受病。

內經又以長則氣治。

為胃家之平脈。

胃為水穀之海。

其經多氣多血。

故顯有餘之象。

然必長而

和緩方為無病之脈。

若長而浮盛。

又為經邪方盛之兆。

亦有病邪向愈而脈長者。

仲景云太陰中風四肢

頭項身熱脉微急躁

而長者為次愈。

蓋風本陽邪。

因土虛木乘陷於太陰之經。

而長脈見於微濶之中。

浮

謂在筋骨之淺

而病進之謂

且有陰氣不充而脈反上盛者。

經言口渴中半長者

謂在筋骨之深

而病進之謂

相火亢逆

燥熱便難

也

曰足胫痛是也。此與秦越人逐上魚為益。遂入尺為覆。及上部有脉。下部無脉。閼格吐逆。不得小便。同脈異證。不可與尺寸俱長之脈比例而推也。

短脈

短脈濶小。短脈之象首尾俱短。脈之首尾俱短。則脉之應指不能滿部。短脈之象與長脉正相反。中間突起。中間獨突。然浮起。不能滿部。脉之應指不能滿部。條長此。

主病

短主不及。短脉主不及之證。不為氣虛病。皆主元氣虛衰之病。

寸闊尺

右寸脉短。短見短脉頭。頭痛肺虛。清陽不足。則心神不足。心氣內虛。則心失所養。而心神不足。左寸脉短。短見心神不足。心氣內虛。則心失所養。而心神不足。所養而心神不足。右闊脈短。短見肝氣有傷。憤怒過度。則肝氣有傷。氣有傷。則右闊脈短。短見膈氣為殃。胃氣虛衰。左尺脉短。短見少腹必疼。少腹疼痛。右尺脉短。短見右真火不降。命門火衰。大便溏泄。

辨兼脉

按短之為義。短脉兩節俱下。而中間浮起也。短脉兩頭俱下。中間獨浮。肺為主氣之藏。肺主氣。偏與短脉相應。經云。肺脉則短中自有和緩之象。短而和緩。為氣仍治也。氣仍治。則氣無病。若短而沉且濶。沉濶謂氣不病可乎。短而沉濶。是氣之為病。之蓋長脉屬肝。宜於春。肝主春。而脉應長。短脈屬肺。宜於秋。肺主秋。而脉應短。故知非其時。非其部。非其肺。即為病脉也。非部。非時。條見短脉。即肺即為有病之脉。

診宗脉學

洪脈

短脈者。尺寸俱細而不及本位。不似小脈之三部皆小弱。不振伏脉之一部獨伏匿不前也。經云。短則氣病。良由胃氣阨塞。不能條暢百脉。或因痰氣食積。阻礙氣道。所以脉見短濶之狀。亦有陽氣不充。而脉短者。經謂寸口脉中手短者。曰頭痛是也。仲景云。汗多重發。亡陽識語。脉短者死。脉自和者不死。又少陰脉不至。腎氣絕。為尺厥傷寒。六七日大下後。寸脉沉而遲。手足厥冷。尺脉短或下部脉不至。咽喉不利。吐膿血難治。戴同父云。短脉只當責之於尺寸。若關中見短。是上不通寸為陽絕。下不通尺為陰絕矣。曷知關部從無見短之理。昔人有以六部分隸而言者。殊失短脈之義。

洪脈

洪脈極大。洪脈極其狀如洪水。如洪水之勢。於中之病。主火氣亢盛。如見虛洪。洪從火浮水涸。水原枯涸。則
主火。洪脈極大。滿指盛火元。來盛土衰。洪脈之氣來盛而去不盛。滔滔滿指。脈勢則減。此洪脈之象。

主病

洪為盛滿。洪見胸滿氣逆。氣逆胸滿。左寸脉洪。洪見心煩舌破。心火炎灼。左寸脉洪。洪見脾熱脹悶。胃火消渴。右關脉洪。右關胃熱脹悶。脾熱脹悶。左尺脉洪。洪見水枯溺濇。火旺水枯。右尺脉洪。洪見龍火燔灼。

寸闊尺

右寸脈洪。右寸見胸滿氣逆。氣逆胸滿。左寸脉洪。洪見心煩舌破。心火炎灼。左寸脉洪。洪見脾熱脹悶。胃火消渴。右關脉洪。右關胃熱脹悶。脾熱脹悶。左尺脉洪。洪見水枯溺濇。火旺水枯。右尺脉洪。洪見龍火燔灼。

火亢甚
大便閉結

辨證

利潤脉即大脉也。脉盛滿相近。猶如刀之溝應指來。動應指去。一喻其盛滿之象。滿是對其洪脈者。

洪脈只是根脚澗大。洪脈之來應指盛滿而且澗大更有湧湧之勢却非堅硬。按之脈勢減少若使大而堅硬使澗大而按之且又堅硬則為實脉而非洪脉矣。實脉既實洪脉盛滿不可混也。

診宗脈學

洪脉者既大且數。指下聚疊如連珠如循琅玕而按之稍減不似實脉之舉按逼逼滑脈之軟滑流利。大脉之大而甯靜也。昔人以洪為夏脉內經以鈎為夏脉遂有鈎即是洪之說以其數大而濡按之指下屈曲傍出固可謂之曰鈎火性虛炎所以來盛去衰按之不實然痰食瘀積阻礙脈道關部嘗屈曲而出此與夏脉微鈎似同而實不類也。洪為火氣燔灼之候仲景有服桂枝湯大汗出大煩渴不解脉洪為溫病溫病乃久時伏氣所發發於春者為溫病發於夏者為熱病其本伏藏於內而發出於表脈多浮洪而混濁不清每多盛於右手亦有動滑不常者越人所謂行在諸經不知何經之動也當此不行內奪反與解表不至熱交營度不已也若溫熱時行證顯煩渴昏熱脉反沉細小弱者陽病陰脉也有陽熱亢極而足令尺弱者為下虛之症皆不可治又屢下而勢勢不解脈洪不減謂之壞病多不可救洪為陽氣滿溢陰氣垂絕之脈故謁謁如車蓋者為陽結脈浮而洪身汗如油為肺絕即雜病脉洪皆火氣尤甚之兆若病後久虛虛勞失血泄瀉脫元而見洪盛之脉尤非所宜惟惜濁下賤脉多洪實又不當以實熱論也。

微脉

微脉模糊微脉應指模極細極軟細軟之極似有若無微脉之極欲絕非絕隱難顯似若無欲絕非微脉之體微脉之象微脉之勢微脉之精神始盡

主病

微為亡陽。陽亡則陰獨氣血大衰。氣血大衰真象參附急救救其元陽庶可挽回庶可挽回於萬一

寸闊尺

右寸脉微微見虛汗喘促。肺氣虛衰右寸虛汗喘促。肺氣虛衰。左寸脈微微見神虛驚悸。神氣大虛左寸神虛驚悸。神氣大虛。驚悸少寐。左關脉微微見肝虛寒鬱。肝陽虛寒鬱左關肝虛寒鬱。肝陽虛寒鬱。右關脉微微見胃虛冷逆。胃陽虛衰右關胃虛冷逆。胃陽虛衰。陰冷呃逆。左尺脈微微見腎竭精傷。腎藏虛寒左尺腎竭精傷。腎藏虛寒。右尺脈微微見陽亡命絕右尺陽亡命絕。元陽內亡元陽垂絕。命氣垂絕。

辨兼象

按微之為義。微之義極細極軟而微渺。微渺微隱微渺極隱幾不可見之候也。微脉難尋幾微似有若無。似有之間。欲不可尋見之脉。似有若無。猶或可挽絕非絕。極微為微絕渺八字真為微脉傳神。形容微脉之精微極薄其精神猝病以元氣暴虛暴虛則形神猶或可挽。久病以日漸消磨。日漸消磨則神存則元氣可挽救元氣將絕。元氣已脫。則神亦垂亡。形神已脫多難挽効多難挽効。

診宗脈學

微脈者似有若無。故絕非絕。而按之稍有模糊之象。不似弱脈之小弱分明。細脈之纖細有力也。微為陽氣衰微之脉。經言寸口諸微。古陽言諸微者。則輕取之。微重按之。微。寸口之微。尺中之微。皆屬陽氣虛衰。故所見諸症。在上則為惡寒多汗少氣之患。在下則有失精脫瀉少食之虛。總之與血無損。所以榮華如蜘蛛絲者。仲景謂陽氣之衰。嘗見中風卒倒而脈微。暑風卒倒而脈微。皆為氣虛之象。其脉多見沉緩。若中寒卒倒而脈微。為陰邪暴逆。所以細微欲絕也。而傷寒尺十俱緩。為厥陰受病。丙午庚至凡空。不待人。正氣不充之餘。又以目此不以少陰之脉散細。但故脉耳。詳二經之脉同。一微也。而有陰盡復

正氣之虛邪亦向衰之際是以俱虛不似少陰之脉微細但微弱耳詳二經之脉同一端也而有陰盡陽去入陰之義即太陽經病之脉微而有發熱惡寒熱多寒少脈微為無陽者有面有熱色邪未欲解安而脈微方可為欲愈之機若太陽證具而見足冷尺微又為下焦虛寒之驗可不建其中氣而行正發汗之例子

緊脈

緊脈有力

緊脉應指有力

左右彈人手指如絞轉索

轉索之喻如切轉索之疾急是緊脉之勢

如切緊繩

切繩之喻如切緊繩之急乃緊脈之形

右寸脉緊

寒傷於表則氣鬱於左寸脉緊

左寸心痛滿急

寒犯心包則心系急而心痛滿急

左關脈緊

見

主病

緊主寒邪

寒令脉緊故緊則為寒

亦主諸痛

寒性陰凝故主諸痛

諸寒收引

寒邪欬束故主收引皆屬於腎

腎屬太陽

寸關尺

右寸脉緊

寒傷於表則氣鬱於右寸傷寒喘嗽

裏急而咳嗽

寒傷於表則氣鬱於左寸

左寸心痛滿急

寒犯心包則心系急而心痛滿急

左關脈緊

見

心痛滿急

寒犯心包則心系急而心痛滿急

左尺脉緊

見

奔豚疝疾

左外傷寒邪

寒傷於表則氣鬱於左外傷寒邪人迎浮緊右關脉緊

緊見寒傷於表則氣鬱於左外傷寒邪人迎浮緊右關脉緊

內傷冷食

寒食內傷

左尺脉緊

見

左尺脉緊

寒傷於少陰

左尺脉緊

寒傷於少陰

右尺脉緊

見

右尺脉緊

辨兼脉

浮緊傷寒

浮主表緊為寒緊從浮見則為寒傷于表肺必浮緊有力

沉緊傷寒

沉為裏緊為寒沉緊則為急而緊者

脉急是為道戶

且急是為道戶

鬼疰數而緊者

鬼疰數而緊者

當主鬼擊

鬼擊神傷也

辨兼家

按緊之為義。

脉來

絃急而兼緩轉之形也。

絃轉是緊脈之勢。古稱熱則筋急。寒則筋急。急是緊脈之形。

主收斂寒。

寒主收斂寒。蓋熱傷於內。

熱邪內寒束於外。寒邪外鬱於表。故緊急絃轉之形著於脉也。

寒熱相緩脈必緊。

有力。

往來之勢有力。

左右彈人手。

左右彈人手指。

則女嬌剛勁之概可掬。

女嬌是絃轉之聲。剛勁是絃轉之勢。

急之緊則客緊脉之象殆盡。

診宗脈學

緊脉者。狀如轉索。按之雖實而不堅。不似弦脈之端直如弦牢脈之強直搏指也。緊為諸寒收引之象。亦有熱因寒束而煩熱疫痛拘急者。如太陽寒傷營證是也。然必人迎浮緊。乃為表證之時候。若氣口盛堅。又為內傷飲食之兆。金匱所謂脉緊頭痛。風寒腹中有宿食也。仲景又云。曾為人所難。緊脈從何而來。假令亡汗者。吐以肺裡寒。故令脉緊也。假令欬者。生飲冷水。故令脉緊也。假令下利。以胃中寒冷。故令脉緊也。詳此三下轉語。可謂曲盡緊脈為病之變端。而少陰經中又有病人脉陰陽俱緊。反汗出者亡陽也。此屬少陰。法當咽痛而復吐利。是謂緊反入裏之徵驗。又少陰病脉緊。至七八日下利。脉暴微。手足反溫。脈緊反去為欲解也。雖煩下利。必自愈。此即緊去人安之互解。辨不可下脈證中。則有脉來陰陽俱緊。惡寒發熱。則脉欲厥厥者。脈初來大。漸漸小。更來漸漸大。是其候也。此亦緊反入裏之互解。因誤下而陽邪內陷。欲出不出。有似厥逆進退之象。故言欲厥脈雖變。而緊狀依然。非營衛離散。乍大乍小之比。而脉法中復有寸口脉微。尺脈緊。其人虛損多汗。知陰常在。絕不見陽之例。可見緊之所以在皆陽氣不到之處。故有急不休。是傳醫家無能者也。耳堵此者。匪古大圣。尚有七心。古水王。口傳。不可得也。

是故大脉安之。察加弦直。上下于者。應若伏堅者。為陰經。總皆經脉尚急。故有比脉。若脉至如重索而強

緩脉

緩脉四至。

緩脉應寬緩和。脈氣寬緩。微風經脉。如微風初春楊柳。如初春之楊柳。意思即欣欣然揚揚手四至。寬緩和。至數和。微風經脉之輕颺。初春楊柳可見。緩脉之義在脉氣和緩。非至數之比。

主病

緩為胃氣。

和緩之脉

亦主溫脉。

氣却少。柔和。緩亦主溫脉。緩有力。溫在脾。緩有力。

胃氣非病。

脉所以和緩從容。以證驗。方可斷其為病。

更取兼脉。

緩脉中兼見他脉之象。

斷病無疑。

詳別兼脉斷病始無遺漏之義。

寸關尺

右寸浮緩。

浮緩見右寸。風邪所傷。風從肺受。必傷衛氣。

左寸潛緩。

潛緩見左寸。少陰血虛。

潛見主陽血而經虛。

左關浮緩。

浮緩見左關。左關浮緩。見左

精室空虛。

關肝風內鼓。

肝虛生風。風從內召。右關沉緩。

沉緩見右關。土弱濕侵。土虛不能制濕。

左尺緩潛。

潛見左尺。左尺緩潛。則濕從內侵。

左尺緩潛。見左尺。精室空虛。

腎氣虛。

足右尺緩細。

緩細見右尺。真陽衰弱。命門火衰。

辨兼脈

浮緩傷風。

浮為風。風令脉緩。緩從外受。沉緩寒濕。

沉為陰。為裏緩。為溫為寒。為濕為寒。從沉見故。主寒濕內傷。緩大風虛。

緩為風大為虛。緩從大現故主虛。而中風緩。

細濕薄。

細為濕。細亦為濕。緩從細見故。主濕着為痺。

從緩。潛脾薄。

潛傷脾緩。為脾家本脉。緩為陽陷。緩主氣虛。薄為陽陷。薄主氣虛。薄見則陽氣乘虛而下陷。

從緩。弱氣虛。

辨兼象

按緩脉以寬舒和緩為義。脈體寬舒脈氣和緩為緩脉之體象。與緊脉正相反也。

緊脉相反與緩緩而和脉之象。不浮不沉。脉兩相對照。

之象。

中候不大不小。信其不疾不徐。言其意思欣欣。微風輕颸之象。悠悠揚揚初春柳樹之象。難以名狀者。難以色名。真胃氣脉也。真氣之象。有胃氣則生。有胃氣則死。無胃氣則死。無胃氣則死。陰陽之於脈大矣哉。
生大有關係也。

診宗脈學

緩脉者。從容和緩。不疾不徐。似遲而實未為遲。不似濡脈之指下綿軟。虛脈之晬晬虛大。微脉之微細模糊。弱脉之細軟無力也。仲景云。陽脈浮大而濡。陰脈浮大而濡。陰脈與陽脈同等者。名曰緩也。傷寒以尺十俱緩者。為厥陰受病。厥陰為陰盡復陽之界。故凡病後得之。咸為相宜。其太陽病發熱。頭痛目濁。脈浮緩。為風傷衛證。以其自汗體疎。脈自不能擊盛也。緩為脾家之本脉。然必和緩有神。為脾氣之充者緩弱。振為脾氣不足。緩而滑利。則胃氣冲和。昔人以浮緩為傷風。沉緩為寒濕。緩大為風虛。緩細為濕脾。又以緩為風中於陽。沉緩為濕中於陰。蓋濕脉自緩。得風以搖之。則兼沉緩。若中於陰。則沉細微緩。以厥陰藏風木之氣。故脉雖沉而有微緩之象也。

芤脉

芤乃草石。乳脉之象。絕類慈葱。又類慈葱。浮見沉中候見沉。浮沉俱有。浮見沉中候見沉。中候獨空。浮沉皆有中候空虛。故有芤草慈葱之喻。

主病

芤脉中空。血營脉中亡。如吐衄崩漏一。主失血症。如吐衄崩漏一。

寸關尺

芤脉中空。血營脉中亡。如吐衄崩漏一。

四脉

左關右尺

右寸脉芤。見目專全。亡相傳肺金也。於血加。左寸芤。見心主喪。心包也喪失也。左尺
脉芤。見氣虛。便紅為咎。大便下紅。陰為告。

辨兼象

按芤之為義。芤脉之義浮俱有中。浮候沉候俱見脈中候獨空之象也。中候獨空見空虛假令以指候葱皮。如候葱皮之兩邊有中央空浮候之

看上面之葱皮。即見脈象中候之正當葱中空處。鼻之中候正當芤脉之中空沉候之又着下面之葱皮。重按芤脉沉分仍不乏根

診宗脈學

芤脉者浮大弦軟。按之中空。中按雖不應指。細推仍有胃氣。縱指却顯弦大。按之減小中空。不似虛脉。皆

虛虛大。按之豁然無力也。芤為血氣不能濡潤經脈。故虛大而芤。然其中必顯弦象。劉三點以為絕類葱

葱。殊失弦大而按之減小中空之義。蓋虛則陽氣失職。芤則經絡中空。所以有虛濡無力。弦大中空之異。

仲景云。脉弦而大。弦則為芤。芤則為寒。芤則為虛。虛寒相搏。此名為革。革則胃氣告匱。而弦強

搏指。按之無根。非芤脉中空之比。按太陽病有浮脉。而緊按之反芤。本虛戰汗而解者。暑病有弦細芤脈。

血分受傷者。芤為失血之本脉。經云。脉至如搏。血溫身熱者死。詳如搏二字。即是弦大而按之則減也。又

云。脉來懸鈎浮。為常脉。言浮而中空。按之旁至。似乎微曲之狀。雖有瘀積阻滯。而指下柔和。是知尚有胃

氣。故為失血之常脉。若弦強搏指。而血溫身熱。為真陽竭。必死何疑。凡血脫脉芤。而有一部獨弦或帶

結促滯者。此為陽氣不到。中扶陰邪之兆。是即瘀血所結處也。所以芤脉須辨一部兩部。或一手兩手。而與攻補方為合法。

弦脈

弦脈

弦如琴弦。弦脈如輕虛而滑。應指輕微滑端直以長。端然條直。然如琴弦之挺直。指下利輕虛形。形容弦脈之象。畢肖。

主病

弦為肝風。弦為肝木。生風之脉。亦主氣鬱。篤結陽氣脉。必弦而兼滑。主痛主飲。飲勝多弦。主諸痛。主癥主痢。弦亦主利。

寸闊尺

右寸脈弦。弦見胸及頭痛。飲停胸膈。疼痛及頭。左寸脈弦。弦見心包。心屬火。火熱則弦。見於四肢。心中必痛。飲犯心包。心膈作痛。

左關脉弦。弦見左關。左關主濕伏經。從數見。故主肝風細急。見故主傷筋而拘急。從火。陽弦在上。陰弦在下。陰弦腹痛。故主腹痛。陽弦頭疼。故主頭疼。陰弦腹痛。故主腰痛。單弦飲癖。見單弦。

腹痛停下痢

辨兼脉

浮弦支飲。

支飲溢於四肢

沉弦懸飲。

懸飲清於胸膈

弦數多熱。

扶熱則弦。從數見。

弦遲多寒。

秋寒則弦。見遲中。

弦大勞傷。

弦則為勞大。則為勞弦。從大見。

二脉。

謂弦長而略帶長也。

春令之脉。弦長並主之。

但弦

成雙弦寒痼。

脉若雙弦又主土敗。

而寒飲酒結於中。

辨兼象

按弦之為義。

弦脈之義。

如琴弦之挺直而略帶長也。

此弦脈與長脉謂之象。

弦脈與長脉皆主春令。

春令之脉。弦長並主之。

但弦

為初春之象。

弦主初陽之陰。

為陽中之陰。

為陽中之陰脈。天氣猶寒未盡化。

故如琴弦之端直而挺然。

如琴弦之挺直。然然挺直稍帶一分。

端然挺直。

如琴弦之挺直。然然挺直。

稍帶一分緊急。

是長脉之謂。然然挺直。如琴弦之挺直。然然挺直。

是長脉之謂。

是長脉之謂。然然挺直。如琴弦之挺直。然然挺直。

是長脉之謂。

是長脉之謂。然然挺直。如琴弦之挺直。然然挺直。

之際急也。指帶一分緊急是弦長為暮春之象。長主暮春之令。純屬於陽。是純陽絕無寒意。與令已故如木幹之

診宗脈學

弦脈者。端直以長。舉之應指。按之不移。不似緊脉之狀如轉索。革脈之勁如弓弦也。弦為風木主令之脉。故凡病脉弦。皆陽中伏陰之象。虛證誤用寒涼。兩尺脈必變弦。胃虛冷食停滯。氣口多見弦脉。傷寒以尺寸俱弦。為少陽受病。少陽為樞為陰陽之交界。如弦而兼浮。兼細為少陽之本。脉弦而兼數。兼緩。即有入府轉陰之兩途。若弦而兼之以沉濇微弱。得不謂之陰乎。經言寸口脉弦者。腋下拘急而痛。令人嘔嘔惡寒。又傷寒脉弦。頭痛發熱者。屬少陽。此陽弦頭痛也。痛必見於太陽。陽脉濇。陰脈弦。法當腹中急痛。此陰弦腹痛也。痛必見於少腹。皆少陽部分耳。少陰病。欲吐不吐。始得之。手足寒脈弦遲者。此胸中實。當吐之。若膈上有寒飲乾呕者。不可吐。急溫之。詳此。又不當以兼沉兼濇。概謂之陰。弦遲為胸中實也。審症合脉活法在人。貴在心手之靈耳。歷診諸病之脈。屬邪感而見弦者。十常二三。屬正虛而見弦者。十常六七。其於他脉之中。兼見弦象者。尤復不少。在傷寒表邪全盛之時。中有一部見弦。或兼遲兼濇。便是夾陰之候。客邪雖盛。急需溫散。汗下猛烈。咸非所宜。即非時感冒。亦宜體此。至於表有動氣怔忡。寒疝脚氣。種種宿病。而挾外感之邪。於浮緊數大之中。委曲搜求弦象。必隱於內。多有表邪脈緊。於緊脈之中。按之漸漸減少。縱之不甚鼓指。便當脉弦例治。於浮脉之中。按之缺直滑脉之中。按之搏指。並當弦脉類看。於沉脈之中。按之引引。濇脈之中。按之切切。皆陰邪內伏。陽氣消沉。不能調和百脈。而顯弦直之狀。良非客邪緊盛之比。迨夫傷寒壞病。弦脈居多。虛勞內傷。弦常過半。所以南陽為六殘賦之首推也。他如病瘧寒飲。一

切雜病皆有弦脈。按金匱云。脈自弦。弦數多熱。遲弦多寒。弦小堅者下之。差弦遲者可溫之。弦緊者可發汗。針火也。浮大者可吐之。弦數者風發也。以飲食消息主之。飲脉皆弦。雙弦者寒也。偏弦者飲也。弦數滿等病。種種皆有弦脈。總由中氣少權。土敗木賊所致。但以弦少弦多。以證胃氣之強弱。弦實弦虛。以證邪氣之虛實。浮弦沉弦。以證表裏之陰陽。寸弦尺弦。以證病氣之升沉。無論所患何證。兼見何脉。但以和緩有神。不乏胃氣。咸為可治。若弦而勁細。如循刀刃。弦而強直。如新張弓。弦如循長筭。如按橫格。皆但弦無胃氣也。所以虛勞之脉。多寸口數大。尺中弦細搏指者。是皆為損脈。虛扁復生。奚益哉。

革脈

革大弦急。革脈大而浮取即得。舉之浮候。按之則空。按空中則空。又屬內之血

主病

革主表寒。

革脈主表。又有寒邪。亦極盛。

亦屬中虛。又屬內之血。氣亦大虛。

寸闕尺

右寸脉革。

革脈古寸金衰氣壅。肺金虛衰逆氣上壅。

左寸脉革。革見心血虛痛。心血大虛心膈疼痛。

左寸見心癆為祟。痰結

左寸見心癆為祟。痰結

左寸見心癆為祟。痰結

左寸見心癆為祟。痰結

左寸見心癆為祟。痰結

左寸見心癆為祟。痰結

左寸見心癆為祟。痰結

右寸脉革。

革脈右寸見心癆為祟。痰結

右寸見心癆為祟。痰結

右寸見心癆為祟。痰結

右寸見心癆為祟。痰結

右寸見心癆為祟。痰結

右寸見心癆為祟。痰結

右寸見心癆為祟。痰結

右寸見心癆為祟。痰結

右寸見心癆為祟。痰結

男傷精極。

女半產漏。

辨兼家

按革之為義。革脈如鼓革之象。宛如滿鼓。浮舉之而弦大。舉之浮候。細急之象也。指下細急。按之而豁然。

按革之為義。革脈如鼓革之象。元如滿鼓。浮舉之而弦大。即見弦大細急之象也。急于外沉。按之而豁然。

重按則豁然無脉

中空之象也。中空之象。以表有寒邪。寒邪表

故弦急之象外見。弦急之象。中虧氣血。氣血內虛。故中

空之象。內見中空之象。男子亡血失精。男子主精。女人半產漏下。女子主小

漏於內。血內亡。產崩漏。

診宗脉學

革脈者。弦大而數。浮取強盛。重按即空如鼓皮之狀。不似緊脈之按之劈劈。弦脈之按之不移。牢脉之按之益堅也。賈雷生曰。革乃變革之象。雖失常度。而按之中空。未為真藏。故仲景厥陰例中。有下利陽明脉浮革者。主以當歸四逆湯。得非風行本末。擾動根株之候乎。又云。婦人則半產漏下。男子則亡血失精。金匱半產漏下。主以旋覆花湯。得非血室傷憊。中有瘀結未盡之治乎。其男子亡血失精。獨無主治。雲岐補以十全大補。得非極勞傷精。填補其空之謂乎。是以長沙直以寒虛相搏。例之惟其寒。故柔和之象失焉。惟其虛。故中空之象見焉。豈以革浮屬表。可不顧腎氣之內憊乎。

牢脉

牢在沉分。牢脉之體其應大者弦實。牢脉之象既沉指直在沉分浮中二候。浮候了不可得。牢脉沉分浮中二候未可即得有牢固實之象

主病

牢主堅積。牢乃牢固主積。堅氣實之病病在於陰。堅精之感。蓋由於陰寒而血氣凝結

寸闕尺

右寸脉牢。右寸息責為疾。息者逆滿。肺之精聚左寸脉牢。左寸伏梁為病。伏梁內結左關脉牢。左關肝結血積。肥氣結核

肝之右闊脈牢。牢見右闊陰賓瘡疎。居病於中。

脾之積聚左尺脈牢。牢見左尺奔豚氣逆。

右尺脈牢。右見奔豚氣逆。

右尺脈牢。右見陰凝積結。

令積堅凝。

華下痞也。

辨兼象

按牢之為義。牢，堅牢固實之象。堅牢固實之象似沉似伏。堅牢固實之象，以沉似伏，伏似沉。牢之位也。是牢，牢，堅牢固實之義。是牢體也。是牢，牢，牢，牢脉所主之體。牢脉所以其在沉分也。牢脉所以其在沉分也。為陰為寒，故悉屬陰寒。沉分主病，為陰為寒，故悉屬陰寒。凝結為病，以其形堅實也。凝結為病，以其形堅實也。既該且實，故咸為堅積。既該且實，故咸為堅積而為病也。

診宗脉學

牢脈者，弦大而長，舉之減小。按之實強，縱之不移。不似實脈之滑實流利。伏脉之匿伏濇難，草脉之按之中空也。叔微云：牢則病氣，牢固在虛症，絕無此脉。惟濕痺拘急，寒疝暴逆，堅積內伏，乃有是脉。歷攷諸家，不出辛熱開結，甘溫助陽之治，庶有克敵之功。雖然，固壘在前，攻守非細。設更加之以食墊中土，大氣不得流轉，變故在於湏衷，可不為之密察乎？若以牢為內實，不問所以而妄行迅掃，能無實實虛虛之咎哉？大抵牢為堅積內着，因氣竭絕，故諸家以為危殆之象云。

濡脉

濡脈細軟。濡脈應指細軟。

見於浮分。浮分即見脉象。舉之乃得，輕手取之，即得。按之即無，重按即無，濡浮細。

主病

司藏病。常虛弱，無津液，少血氣，則脉必濡。凡病，虛者必濡，實者必澀。

勢半虛，覺沾濡浮，無濡浮之象。

右寸脉濡濡見右寸腰虛自汗腰理不密左寸健忘驚悸心血虧少左關脉濡濡見血虛筋掣肝血虛少

筋脉急急見右關脉濡濡見脾虛濕侵脾氣虛衰左尺脉濡濡見精血枯損腎精枯血損右尺脉濡濡見火敗命乖

命門火衰
真氣垂敗

辨華象

按濡之為義濡脉之義即軟之象也。濡脉乃濡必在浮分。見其細軟。浮而細軟。是為濡脉。

若中候沉候。二候不可得而見。

中候沉候漸減。濡脉之浮軟。言濡脉與虛脉相類。其浮軟者。於虛脉。但虛脉形大。而濡脉形小也。虛脉較大而少。而至於不見。

濡脉之浮軟。言濡脉與弱脉相類。其細小者。於弱脉。但弱在沉分。而濡在浮分也。濡脉浮軟。

濡脉之無根脉。言濡脉浮軟。濡脉之無根脉。則無根。而浮軟者。於散脉。但散脉從散大。而按之絕無散脉。散大。按濡脉從細小。而漸至不見也。濡脉浮軟。濡脉之無根脉。則無根。而浮軟者。於散脉。但散脉從散大。而按之絕無散脉。散大。按濡脉從細小。而漸至不見也。

按細小而按則漸。不見。

診宗脉學

濡脉者。浮軟少力。應指虛細。如絮浮水面。輕手乍來。重手乍去。不似虛脉之虛大無力。微脉之微細如絲。弱脉之沉細軟弱也。濡為胃氣不充之脉。故內傷虛勞。泄瀉少食。自汗喘乏。精傷痿弱之人。脉雖濡軟之力。猶堪峻補峻溫。不似陰虛脫血。純顯細數弦強。欲求濡弱。絕不可得也。蓋濡脉之浮軟。與虛脉相類。但虛則浮大。而濡則浮細也。濡脉之軟弱。與弱脉相類。但弱在沉分。而濡在浮分也。濡脉之濡微。與微脉相類。但微則欲絕。而濡則力微也。濡脉之無根。與散脉相類。但散則從大。而按之絕無濡脉。則從小而漸至無。

力也。夫從小而漸至無力。氣雖未充。血猶未散。從大而按之。絕無。則氣無所統。血已傷殘。陰陽離散。將何恃而可望其生乎。以此言之。則濡之與散。不啻霄壤矣。

弱脉

弱脉細小。弱脉應指細小。見於沉分。沉分始見。細舉之則無輕取浮分。

主病

弱主陽衰。陽氣衰真氣衰弱。真陽衰弱不能鼓運肺氣於外。弱為陽陷。陽氣下陷肺不能外久。病非劇久。弱於裏。故浮分無脉而沉候始見也。弱為陽陷。陽氣下陷而沉弱見於寸口久病非劇久。元衰脉應委弱故。非危劇之候也。

寸閥尺

右寸脉弱。弱見自汗短氣。肺虛陽弱。

自汗氣短。

左寸脉弱。弱見驚悸健忘。

心氣虛。

左寸驚悸健忘。

心氣虛。

左寸驚悸健忘。

失榮。

左閥脉弱。弱見木枯筋掣。

肝木失榮。

左閥脉弱。弱見木枯筋掣。

肝木失榮。

左閥脉弱。弱見木枯筋掣。

筋脉急。右閥脉弱。弱見右閥水穀成洞。

脾胃氣衰。

右閥水穀成洞。

水穀為病。

左尺脈弱。弱見涸流可徵。

腎虛水涸。

右尺脈弱。弱見古尺陽衰可驗。

古尺陽衰可驗。

命門氣虧。

真火弱衰。

辨兼象

按弱之為義。弱脉沉而細小之候也。沉而細小。是為弱脉。按之乃得。

其之弱脉。全然無脉。何其彰明詳盡。

按之乃得。始能應指。

舉之無有。

舉之無有。

舉之無有。

舉之無有。

形谷弱脉之象為詳盡彰明之至。

夫浮以候陽。

浮分主候陽弱在。

陽主氣。

陽氣化則陽。

浮取之而全無。

弱脉浮全無則陽。

氣衰微。元氣微弱確然可徵。

弱為陽虛之象確然無疑。

沉以候陰。

沉分主候陰濡在。

陰主血。

陰資血則陰。

沉取之而。

無脉濡脉沉則陰虛水涸。

腎陰虛則。

與弱脉正相反也。

弱主陽虛氣陽濡主陰虛。

一脉相反而義背兩相對照。

弱脉者沉細軟而按之乃得舉之如無不似微脉之按之欲絕濡脉之按之若無細脉之浮沉皆細也弱為陽氣衰微之候。夫浮以候陽今浮取如無陽衰之明驗也。故傷寒首言弱為陰脉即陽經見之亦屬陽氣之衰。經言寸口脉弱而遲虛滿不能食。寸口脉弱而緩食卒不下。氣墮膈上上二條一屬胃虛一屬脾虛故皆主乎飲食又形作傷寒其脉不弦緊而弱太陽中暍身熱疼痛而脉微弱可見脉弱無陽必無實熱之理。祇宜辨析真陽之虛。胃氣之虛及夏月傷冷水水行皮中所致耳。在陰經見之雖為合脉然陽氣衰微已極非峻溫峻補良難。春回寒谷也。惟血虛虛勞久嗽失血新產及老人久虛脉宜微弱然必弱而和滑可卜胃氣之未艾。若少壯暴病而得弱脉咸非所宜即血證虛證脉弱而兼之以滑為血氣交敗其能榮養下之斯乎。

散脉

散脉浮散脉指下龍亂有表無裏浮散之象中候漸空中候漸空詒按則絕矣按之則絕

主病

散王腎敗散見肺氣一敗則見則危殆脉既散亂則病必危亡

寸闊尺

右寸脉散散見右寸自汗淋漓肺氣耗散自汗淋漓左寸脉散散見左寸怔忡不寐心虛怔忡神耗不寐

奇疾起右闊脈散散見右闊脈逆滿張滿盛疾深則為盛左尺脉散散見左尺北方水竭腎氣垂散右尺脉散散見右尺陽消命

絕命真陽消散

辨兼象

按散之為義。散脉自有漸無之象。自有漸無為亦散亂不整之象。根無之脉亦散亂不整為當浮候之輕手脉。子散之象當浮候之其浮分儼然大
而成其為脈也。成其為散脉。而為散亂不整為當浮候之輕手脉。其浮分儼然大
謂減至沉候之脉沉候杳然不可得而見也。散脉沉候杳然不可得而見也。散脉沉候杳然不可得而見也。散脉沉候杳然不可得而見也。散脉沉候杳然不可得而見也。
七八 脉散則脈氣及中候之其中候頓覺無力。頓然覺其脉勢消散而減其十分之七八矣。散脉至中
之徵。散亂為散脈代為脾絕之徵。脾絕則脈之來去。古人以代脈為必死者。代脈散脈蓋散為腎敗
然無 是先天資始之本絕也。脈氣資始於腎。腎絕則脈亦絕。散脈乃垂絕之象。脾脈主信。脾信而代脈歟止。脉氣資生於脾。脾絕則後天資生之本絕也。資生本絕則後天之氣垂亡。故二脉獨見。獨見散脈按之則絕。見則必死。蓋散為腎敗。而一脉文見。
垂亡 不愆其期。正之期。不愆期。是後天資生之本絕也。資生本絕則後天之氣垂亡。故二脉獨見。獨見散脈按之則絕。見則必死。蓋散為腎敗。而一脉文見。
既見代二脈尤為必死之符。尤為必死。

診宗脉學

散脈者。舉之浮散。按之則無。去來不明。漫無根蒂。不似虛脉之重按雖虛而不至於散漫也。散為元氣將散之象。故陽寒欬逆上氣。其脉散者死。謂其形損故也。可知散脈為必死之候。然形象不一。或如吹毛。或如散葉。或如懸壅。或如羹上肥。或如火薪。然皆真散脈。見之必死。非虛大之比。經曰。代散則死。若病後大邪去。而熱退身安。泄利止而漿粥入胃。或有可生者。又不當以槩論也。古人以代散為必死者。蓋散為腎敗之應。代為脾絕之兆。腎脉本沉。而散脉按之則不得見。是先天資始之根本絕也。脾脉本緩。而代脉歟止不愆其期。是後天資生之根本敗也。故獨見代脉散脉。均為危亡之候。而一脉文見。尤無疑矣。

細直而軟。

細脉應指。細脉降直。繫繫繁縝。繁縝形其直。狀如絲綿。如絲綿之細軟。較顯於微。細脉如線應指顯然。非細軟無力。亦主濕侵。湯鬱脉細。必細而有神。諸虛勞損。虛損勞細則為甚。脈細則氣血衰竭。肝枯木痿。陰竭血傷。右關脉細。右關胃虛脹滿。脾胃陽虛。藏寒脹滿。左尺脉細。左尺遺滑堪憂。腎氣不攝。遺精滑精。右尺脉細。右尺下元冷憊。真火衰微。精至冷憊。

寸闕尺

右寸脉細。

細見右寸效嘔氣怯。濕鬱效嘔氣怯。肺虛氣怯。

左寸脉細。

細見左寸怔忡不寐。心虛有火則怔忡。心虛血少則不寐。

左關脈細。

左關

肝陰枯竭。

右關脉細。

細見右關胃虛脹滿。脾胃陽虛。

左尺脉細。

細見左尺遺滑堪憂。腎氣不攝。

右尺脉細。

右尺

下元

元冷憊。

真火衰微。精至冷憊。

辨兼象

按細之為義。

細脈之義。細也。是細脉之形。狀如絲也。是細脉之象。

細脉與微脉不同。俱為陽氣衰殘之候。陽氣衰來。

微夫氣主煦之。是陽氣為煦育之主。非行溫補。氣不足者溫之以氣。謂非峻溫峻補。元氣散失。非大溫。

仲景有少陰病。

脉沉細數。不可發汗之禁。此皆外陰內陽。非若嚴冬卒中暴寒。

感夏暑氣卒倒。內外皆陰之比。內經細脉諸條。如細則少氣。脉來細而附骨者積也。尺寒脉細。謂之後泄。

診宗脈學

細脉者。

往來如髮。而指下顯然。不似微脉之模糊微渺也。細為陽氣衰弱之候。傷寒以尺寸俱沉細。為太陰受病。太陰職司敷化之權。今為熱邪所傳。營行之氣不能條暢。百脉所以尺寸皆沉細。不獨太陰為然。即少陰之脉亦多沉細。故仲景有少陰病。脉沉細數。不可發汗之禁。此皆外陰內陽。非若嚴冬卒中暴寒。

感夏暑氣卒倒。內外皆陰之比。內經細脉諸條。如細則少氣。脉來細而附骨者積也。尺寒脉細。謂之後泄。

頭痛脈細而緩為中濕。總皆陰邪之徵驗。所以胃虛少食。冷涎泛逆。便泄腹痛。濕脾脚軟。自汗失精。皆有細脉。但以兼浮。兼沉在尺。在寸。分明而為裁決。如平人脉來細弱。皆憂思過度。內狀真元所致。若形盛脈細。少氣不足。以息及病。熱脉細。神昏不能自持。皆脉不應病之候。不可以尋常虛細論也。

伏脉

伏為隱伏。伏為隱伏之脉更下於沉較沉脉更深沉。推筋着骨。推至筋骨之間始得其形。始得伏脉之形。在深沉。

主病

伏脉為陰脉。伏見之脉故為陰脉。受病入深。深沉之分。遇陽伏陽氣內伏。獲汗為珍。獲汗則陽舒陰。

寸闊尺

右寸脉伏。伏見邪傷衛微。肺邪深入左寸脉伏。伏見邪傷營微。邪遏心包。左寸脉伏。心營滯伏。左寸脉伏。肝血在腸。邪遏

肝血。右關脈伏。右關寒凝水畜。脾胃陽衰。寒凝水畜。脾腫滿。左尺脉伏。伏見心癥結核。寒氣入深。右尺脉伏。伏見火衰陽伏。

少火氣衰。真陽鬱伏。

辨兼象

按伏之為義。伏脉之義。深伏隱伏而不見之象也。伏脉深沉有深浮中二候。浮候絕無影響。尋舉並深伏隱之勢。浮候雖至沉候。按至

亦難即見。雖沉候本未見脉。必推筋至骨。必推至筋骨之間方始得見。直至筋骨間。其主病多在沉陰之分。局在沉陰則

隱深之處。邪伏幽隱。則傷寒。以一手脉伏為單伏。陰陽偏兩手脉伏為雙伏。邪深固不可以陽症見陰脉。例如也。伏為邪氣伏匿。非火郁內熱。火郁不得發。或不得發。乃陽極似陰。陽郁尤烈。反故脉伏者。論得

必有大汗而角解。而則陰寒內伏。證。脉微火郁。火郁不得發。或不得發。乃陽極似陰。陽郁尤烈。反故脉伏者。論得而外復感寒邪。外內皆寒。陰氣壯盛。陽氣衰微。陽氣衰微。於內外。陽氣衰微。於下中。

必有大汗而解。洽取之七日，而外微周寒，脉外內皆寒。陰氣壯盛於內外，陽氣衰微於下中。四肢厥逆。陽不外敷，則陰寒內伏。而外微周寒，脉外內皆寒。陽氣壯盛於內外，陽氣衰微於下中。四肢厥逆。手足逆冷。六脉沉伏。陽衰陰盛，則脈不能鼓。須投姜附。壯陽及炙闕元。救陽陽乃復回。陽回則脉自愈。脉乃復出也。

診宗脈學

伏脉者，隱於筋下，輕取不得，重按濶難，委曲求之，附着於骨，而有三部皆伏，一部獨伏之異。不似短脉之尺寸短縮，而中部顯然。況脉之三部皆沉，而按之即得也。伏脉之病，最為叵測。長沙有陽脉不出，脾不上身，冷膚硬少，陰脈不至，令身不仁。此為尸厥等例。詳伏為陰陽潛伏之候，有伏而伏坐，而脈伏不出者，雖與短脉之象有別，而氣血滯滯之義則一。故閼格吐逆，不得小便之脉，非偏大倍常，即偏小隱伏。越人所謂上部有脉，下部無脉是也。至血鬱氣結，久痛及癰痕，留飲水氣宿食，霍亂吐利等脉，每多沉伏，皆經脉阻滯，營衛不通之故。所以妊娠惡阻，常有伏醫之脉。此又脉證之變耳。在傷寒失於表散，邪氣不得發越，而六脈俱伏者，急宜發汗，而脉自復。劉元賓曰：伏脉不可發汗，謂其非表脉也。而潔古人言，當以麻黃附子細辛湯發之。臨病適宜，各有權度，不可執一。若六七日煩躁不甯，邪正交併，而脉伏者，又為戰汗之兆。如久旱將雨，六合陰晦，雨後庶物咸蘇也。不可以伏為陰，誤辛熱，頃刻崑崙飛燭矣。

動脈

動無頭尾。

動脉應指，無頭無尾，厥厥動搖，吸吸然有其形如豆。脉形圓活，必兼滑數。脉動之中，且滑且舉，有動而搏，自

主病

動脈主痛。動為陰陽相搏故主疼痛。亦主於驚。動則氣亂。故陽動則汗出。陽動則心液不收。而自汗當出。陰動則發熱。中而發熱不休。

寸闕尺

右寸脉動。動見右寸。自汗喘促。肺氣不收。勢可拘。左寸脉動。動見左寸。驚悸煩渴。心虛火動。煩亂驚悸。體可見。左寸脉動。動見左寸。拘掣驚痛。血燥生風。

右闕脉動。動見右闕。脾虛火動。火甚於中。左尺脉動。動見左尺。失精亡髓。精髓消亡。右尺脉動。動見右尺。火迅龍飛。

拘掣痛。右闕脉動。右闕。脾虛火動。火甚於中。左尺脉動。左尺。失精亡髓。精髓消亡。右尺脉動。右尺。火迅龍飛。

辨兼象

按動之為義。動脈以欣欣動搖。動脈之形急數有力得名。動脈之至兩頭俯下。動脈之中間突起。動脈

之義。動脈以欣欣動搖。動脈之形急數有力得名。動脈之至兩頭俯下。動脈之中間突起。動脈

極與短脈相類。短脈與動脈雖相似。但短脈為陰。短為不數不硬不滑也。短脈為陰脉。動脈於陽。動為且數且硬。

且滑也。動脈滑數。故為陽脉。婦人手少陰脉動其子也。動為陰中育陽之象。故主妊子。

診宗脈學

動脈者。欣欣動搖。指下滑數如珠。見於關上。不似滑脈之諸部。皆滑數流利也。動為陰陽相搏之候。陽動則汗出。陰動則發熱。是指人迎氣口而言。然多有陰虛發熱之脉動於尺內。陽虛自汗之脉動於寸口者。所謂虛者則動。邪之所湊。其氣必虛也。金匱有云。脉動而弱動。則為驚。弱則為悸。因其虛而旺氣來之。惟傷寒以大浮數動滑為陽。是專主邪熱相搏而言。非虛勞體痛。便溺崩淋。脉動之比。而婦人尺脉動其子。有子之象。經云。陰搏陽。則謂之有子。又云。婦人手少陰脉動甚者。妊子也。以腎藏精心主血。故二處脉動皆為有子。辨之之法。告人皆以左大順男。右大順女為言。然妊娠之脉。往往有素體一手偏大偏小者莫若以。重在男尺重在女尺。有子據

皆為有子辨之之法。昔人皆以左大順男右大順女言。故姓之脉往往有素稟。手傳大師小者皆可以與在男尺重為女最在有據。

促脈

促為急促。

促脉應指急促數時一止。

脉來急數中如趨而蹶如走之失足暫躊躇進則必死其病至於必死

主病

促因火亢。

促見主火亢則氣運乖違

亦主物停。物停於中則阻碍氣道

寸闕尺

右寸脉促。

促見右寸肺鳴咯咯。肺虛火熾咯痰鳴心盛火灼

左寸脉促。促見心火炎炎心盛火灼驚悸神消

左寸血燥生殃。肝鬱

左寸血燥生殃。肝鬱

左寸血燥生殃。肝鬱

左寸血燥生殃。肝鬱

左寸血燥生殃。肝鬱

左寸血燥生殃。肝鬱

左寸血燥生殃。肝鬱

左寸血燥生殃。肝鬱

生熱

右關脉促。

促見脾官食傷食結傷脾

生風

右關脉促。

促見胃氣熱迫胃氣

左尺脉促。

促見遺精滑脫腎虛熱迫

左尺脉促。

促見遺精滑脫腎虛熱迫

右尺脉促。

促見古尺灼熱亡陽

相火炎灼

相火炎灼

相火炎灼

相火炎灼

相火炎灼

腎燥亡陽

辨兼象

按促之為義。

促脉急數之中。至急數見一止。

急數中時見一止。

為陽盛之象。

陽盛則促陽

左寸脉亦促

如蹶之走

如失足之超步

如失足之超步

如失足之超步

如失足之超步

如失足之超步

如失足之超步

如失足之超步

暫徐疾不常歇止中徐

徐不常非代脉可比

深得其旨

夫人身之氣血

血氣在人身

貫注於經脈之間者

經絡刻刻流

行。刻刻營運

淮陰百骸綿不息

周流不息

凡一晝夜當五十營。

營衛通行

凡一晝夜當五十營

周于身

或藏氣乖違

藏氣有乖違

違於常度則稽

留凝滯

經氣稽留則

氣凝滯

阻其運行之機

之機閼

因而歇止者

為輕

此歇止因於阻

若真元衰憊

命門氣衰

陽弛

失其揆度之常。失其運行之常。因而歇止者為重。此歇止因真元

衰憊者為病重

診宗脉學

促脈者。往來數疾中。忽一止復來。不似結脈之遲緩中有歇止也。促為陽邪內陷之象。經云。寸口脈中。手上擊者。曰肩背痛。觀上擊二字。則脈來搏指。熱感於經之義。朗然心目矣。而仲景太陽例。有下之後。脈促胸滿者。有下之利遂不止。而脈促者。有下之脈促不結胸者。有脈促手足厥冷者。上四條。一為表邪未盡。一為併入陽明。一為邪去欲解。一為博次厥陰。總以促為陽。感裡不服邪之明驗。雖症見厥逆。亦宜用火以通陽。不宜四逆以回陽。明非虛寒之理。真見言外。所以溫熱發班。於血發狂。及痰凝滯。暴怒氣逆。皆令脈促設中虛無碍。必無歇止之脈也。

結脉

結為凝結。結見肺經。指遲滯緩時一止。脈來遲緩中時見一歇止。徐行而急。如徐行之足。頗得其旨。遲滯中一止復來。

主病

結屬陰寒。結主陰寒。指遲滯緩時一止。亦因凝積。亦因積帶內凝。

寸闊尺

右寸脈結。結見肺經。指遲滯緩時一止。左寸脈結。結見心經。指心寒疼甚。左關脈結。結見肝經。指心脹疼甚。左尺脈結。結見腎經。指心色變黑。邪凝。右關脈結。結見脾經。指積食停滯。左尺脈結。結見腎經。指腎難舉。左尺脈結。結見腎經。指腎難舉。右尺脈結。結見腎經。指陰寒為甚。

真火食微。陰寒內甚。

辨兼象

安結之為義。又曰。結脉結而不散。陰寒凝滯帶中。時見一止也。遲滯中見歇止。古人譬之徐行而急。如徐行之足。偶一步可為結脈。傳說亦稱之象。凡熱自流行。主流注。寒則停滯。陰寒之性。愈少水氣。則命

審結之氣義之良藥。不謂此中時見止此相報。正相
之火。則中氣虛寒。中州失其乾健之運。失其健運之權。則氣血痰食互相阻滯。其中氣
虛也。運行之機關不結。甚則積甚。甚則積亦甚。結微則氣微。結微則氣亦微。浮結者外有痛積。痛積於外。積伏結者內有積
聚。乃知結而有力者。脉結有力方為精聚。精聚見有結而無力者。無力是真氣衰弱。乃真元之違其運
化之常。運化失常。惟一味溫補為正治。溫補真元以助氣。乃正治也。

診宗脈學

結脈者。指下遲緩。中頻見歇止。而少頃復來。不似代脈之動止。不能自還也。結為陰邪固結之象。越人云。
結甚則積甚。結微則氣微。言結而少力。為正氣本衰。雖有積聚脉結。亦不甚也。而仲景有陽寒汗下。不詳。
脉結。代心動悸者。有太陽病。身黃脉沉結。小腹硬滿。小便不利。為無血者。一為津衰邪積。一為熱結膀胱。
皆虛中伏邪之候。凡寒飲死血。吐利腹痛。癰癧蟲積等。氣鬱不調之病。多有結脈暴見。即宜辛溫扶正。略
兼散結。開發脉結自退。常見二三十至。內有一至接續不上。每次皆然。而指下虛微。不似急促之狀。此元
氣驟脫之故。峻用溫補。自復。如補益不應。終見危殆。若久病見此。尤非合脉。夫脈之歇止不常。雖詳指下
有力無力。結之頻與不頻。若十餘至。或二三十至。一歇而縱。指續續重接。頻見前後至數不齊者。皆經脉
窒礙。陰陽偏阻所致。蓋陽盛則促。陰盛則結。所以仲景皆為病脉。

代脉

代為禪。代脈有禪。代之義。止有常數。歇止之間。不能自還。歇止之間。良久復動。服代良久。不能即來。良久復動。方始復至。

主病

代主藏衰。

代脉主藏氣衰微

危惡之候。

病勢危惡則脈代

脾土敗壞。

代為脾土敗絕之証

吐利為咎。

上吐下利為咎

中寒不食。

中敗寒腹痛

疑不食

難救。

土敗木賊則甚難救

二動一止。

脈來二至一歇止

三四日死。

死期四動一止

脈來四至六七日死。

死期預次第推求

以

第其止數推求之

不失經旨。

不失內經診切之旨

辨兼象

按代為禪代之義。

代脈為禪代是即交替之義

如四時之禪代。

四時二十四節交替如禪代

不愆其期也。

不愆令節結促之止

交替之期結促之止

二脉

歇止無常數。

歇止之數無常期

代脈之止。

代之止數有一定期

止數有一定期

止數有一定期

結促之止。

結促之止

暫時一止

脉即後來代脈

之止。

代脈良久方至

代止良久內經亦始復動

內經以代脈一見。

代脈為藏氣衰微

藏之真脾氣脫絕

之証

脾之元氣衰微故督

氣不能至。

腎藏氣衰微則不能至

則四十動一止。

脈來四十至見一止

肝氣不能至。

肝藏氣衰微則不能至

則三十動一止。

脈來三十至見一止

脾氣不能至。

心藏氣衰微則不能至

則二十動一止。

脈來二十至見一止

心氣不能至。

心藏氣衰微則不能至

則十動一止。

脈來十至見一止

肺氣不能至。

肺藏氣衰微則不能至

則死期愈近矣。

死期愈近可次

不能至。

氣衰脉來四五至

數愈促。

脈來數止漸增者

死期愈近矣。

死期愈近可次

診宗脈學

代脈者。動而中止。不能自還。良久復動。名曰代陰。不似促脈之雖見歇止。而復來有力也。代為元氣不續之象。經云。代則氣衰。在病後見之。未為死候。若血氣驟損。元神不續。或七情大過。或頭仆重傷。或風寒客家。見止代。只為病脈。傷寒家有心悸。脈代者。腹痛心痰。有結滯。止代不匀者。凡有痛之脈止歇。乃氣血阻滯而然。不可以為準則也。若不因痛。而脈見止代。是一藏無氣。他藏代之。真危亡之兆也。即因痛。脈代為常也。以四五歲之期。其少益間。三陳三火。

可謂之半生半死。不可謂之半死半生。清舉至一代。每為吉。如要而止。此必難治。經謂五十動不一代者。以

而無脉。然不可以為津則也。若不候病而脈見，止但是陽氣無氣化。脈之亡於外者，其氣亦日日而耗亡。上至五臟六腑，下至四肢百骸，無一毫氣存焉。此以真氣之終盡，一動不一停也。脉為常也。以知五藏之期。與之短期者，乍疎乍數也。又云：數動一代者，病在陽之脈也。此則陽氣竭盡無餘之脉耳。所以或如雀啄，或如屋漏，或如弦絕，皆其代脉見之。生理絕矣。惟妊娠惡阻，嘔逆最劇者，恒見代脉。穀入既少，血氣盡併於胎息，是以脉氣不能接續。然在一、二、三月時有之。若至四月胎已成形，當無歇止之脉矣。

疾脉

疾為疾急。疾脉指下疾急數之至極數之至極

七至八至

脈來七八至上下

脈流薄疾

脉氣薄疾裏之至極急之則顯然可見

主病

疾為陽極。

疾脉主陽氣亢極

陰氣欲竭

氣欲絕

脉號離經

離於經常之脈

虛魂將絕

神消魂絕

漸進漸疾

數轉甚一日夕

辨兼象

按六至以上。

六至以上為脈有兩稱

兩種名或名曰疾

急疾之疾

或名曰極

急極之極

是急速之脉之至

數之甚者也。

極急極必至喘促聲嘶

肺絕喘促則

僅呼吸於胸中數寸之間

僅能呼出

而不能達於根蒂

心與肺

不能吸入

真陰極於下

真陰之氣

涸竭于下

孤陽浮於上

孤陽之氣而氣之短已極矣

有升無降氣短已極

夫人之生死由於

腎與肝

人之生死

氣之聚散由於血

元氣之聚散

元氣之聚散

元氣之聚散

未絕故猶微

暫可苟延

若一息八至之候

一息八至以

脉名曰極

則氣已欲脫

元氣將

欲脫而猶冀天草木生之

元氣欲脫草木

木莫可維

何怪

乎不相及也。草木之味不能相及以殺之

診宗脉學

疾脉者呼吸之間脉七八至雖急疾而不實大。不似洪脉之既大且數。却無躁疾之形也。疾脉有陰陽寒熱真假之異。如疾而按之益堅。乃亢陽無製。真陰垂絕之候。若疾而按之不堅。又為陰邪暴虐。虛陽發露之機。嘗效先輩治療。有傷寒而赤目赤煩渴引飲。而不能嚥。東垣以姜附人參汗之而愈。又傷寒畜熱內盛。陽厥極深。脈疾至七八至以上。人皆誤認陰毒守真。以黃連解毒治之而安。斯皆證治之明驗也。凡溫病大熱躁渴。初時脈小。至五六日後。脉來躁疾。大額發赤者死。謂其陰絕也。躁及皆為火象。內經有云。其有躁者在手。言手少陰厥陰二經俱屬於火也。陰毒身如被杖。六脉沉細。而妄炎之不溫者死。謂其陽絕也。然亦有熱毒入於陰分。而為陰毒者。脉必疾盛有力。不似陰寒之毒雖疾。而弦細之力也。虛勢喘促聲嘶。脉來數疾。無論名曰行尸。金匱謂之厥陽獨行。此真陰竭於下。孤陽尤於上也。惟疾而不躁。按之稍緩。方為熱證之正脉。脉法所謂疾而洪大者不治。疾而沉細。腹中痛。疾而不大不小。雖因可治。其有大小者。難治也。至若脉至如喘。脉至如數。得暴厥暴驚者。待其氣復自平。迨夫脉至浮合。浮合如數。一息十至以上。較之六數七疾八極更甚。得非虛陽外驚之兆乎。