

扁鵲心書

宋太醫寶材重集

扁鵲心書

千頃堂書局發行

大英書堂局商標



扁鵲心書序

靈素為醫家正傳。後世張仲景。王叔和。孫思邈。孫兆初。虞世。朱肱。皆不師內經。惟採本草諸書。各以己見。自成一家之技。治小疾則可。治大病不效矣。王叔和朱肱烏可與仲景同列。若云仲景不師內經。試觀傷寒金匱一書。不本是精深之論乎。至皇甫士安巢元方王冰等。雖學素問。而不得方學之傳。亦依前六子方法。醫盡博六子之書。以為醫之理盡矣。然調治小疾。百發百中。臨大病。百無二三。每悵已術之不精也。後遇關中老醫。叩余所學。笑曰。汝學非是岐黃正派。特小技爾。祇能調小疴。俟其自愈。豈能起大病哉。余即從而師之。三年。師以法授我。反覆參詳。遂與內經合旨。由茲問世。百發百中。再觀六子書。真兒戲耳。但師授固簡而當意。欲梓行。恐有未盡。遂將追隨先師所歷之法。與已四十餘稔之所治驗。集成醫流正道。以救萬世夭枉。後人得此。苟能日夜勤求。自能洞貫其理。以見余言非謬。至若賢良忠正。孝子仁人。再為廣布。俾天下後世。上可以救君親。下可以濟斯民。余因恐遭天譴。不敢自私。刊刻流傳。願仁者勿拘成見。而屑視之。斯幸矣。宋紹興十六年。武翼郎前開州巡檢竇材謹序。

奏玉帝青詞

維大宋紹興十六年丙寅月。武翼郎臣竇材奏啟。

玉皇上帝玉陛下。臣聞上天好生而惡死。下民畏死而貪生。上天雖云惡殺。但示勸懲於下民。

非其人而殺之者有之。下民雖曰貪生。但歸生死於天命。而致枉死者有之。皇天憫下民之疾苦。故假神農黃帝岐伯雷公扁鵲俞跗等以立醫教。救人災病。歷世綿遠。屢遭兵火。其神書散亡。僅存者靈樞素問而已。雖不盡傳宗派。是亦能救人疾苦。保人性命。但少洞徹藏府。剗腸條體之神耳。果能參悟靈素自然洞見藏府。至於剗腸涤髓。乃後世法之巧而用之神惜乎。此書世理道之神書。亦無傳諒。亦不過一技術之妙。豈如靈素之貴。夫人嘶隱顯大無不包。細無不入。為萬救人之秘典哉。後世仲景採內經外感風寒之旨。附以已見定立方法。及採雜證七十餘條。集為傷寒。金匱後之學者。咸遵守莫敢移易。殊不知傷寒既有多證。內經自然該載。何必牽扯種種雜病。以為傷寒。誤人不少。果能遵循仲景之法。豈有誤人。惟後學不明其旨。妄為注解。各執之罪人。千百年來。明傷寒法者。有幾人哉。嗣後叔和思邈。又附益之。障蔽聖經。遺訛後世。且經云。傷寒為病。身熱。熱雖甚不死。論中風曰。中五藏俞穴。則為偏風。論水脹曰。因氣為腫。論厲風曰。地之濕氣。感則害人皮肉筋脉。如此言之。其旨深。其意廣。後之人欲移難就易。妄為穿鑿。且舉傷寒之症。真邪相傳。真氣盛則病愈。邪氣盛則病死。陽證無死人之理。陰證害人甚速。須加灸艾。方保無虞。仲景立許多承氣湯。使後人錯用。致寒涼殺人于頃刻也。三承氣湯惡能害人。後學不明陰陽承制之道。而妄用承氣者。害之耳。于仲景何尤。臣因母病。用仲景之法不效。遂成不救。痛心疾首。精究內經。又得皇天默授。經歷十年。方得靈驗。凡一切大病小疾。祇以此法觸類引伸。效如影響。臣苦志五十餘年。悟得救人秘法。已十餘年矣。向因薄宦奔走四方。今年過不踰常慮。身填溝壑。其書失傳。遂欲考訂發梓。伏望皇天后土。特加慈憫。保生民于仁壽之域。俾其書萬世通流。臣雖死無憾。設有一言不實。甘受天殃。若

此書果益于後世。伏望神天護佑以廣其傳。

設此重誓以質上帝則其立心切于天下後世可
知學者不可謂偏于從熱而忽視之以負先生一

片救世
婆心

臣誠惶誠恐冒罪以聞。

進醫書表

臣聞醫家正道。內經為真。內經言病最詳。而無治病之法。故皇帝又與岐伯撰出靈樞。實為醫門所最急者也。嗣後秦越人。依內經旨趣。而演八十一難九鍼之說。晉皇甫士安。採靈樞之旨。撰甲乙經十卷。隋巢元方。摘靈素緒餘。註內經。又撰病原三十卷。唐王冰。抉靈素之旨。註內經。撰天元玉歷。已上諸子皆有著作。悉師靈素。去古法不遠。而漢張仲景。不師內經。惟採本草湯液。著金匱玉函十卷。撰傷寒論十卷。晉王叔和。又贊其說。唐孫思邈。採本草藥性。集成千金方三十卷。玉函經五十卷。和附仲景。重著述。皆宗此意。廢去鍼灸。及丹附大藥。盡用草木小藥。盛行湯劑。以知理小疾。則生。治大病。則百無一活。至千百世。誤死天下蒼生。傷寒金匱之書辨
六氣之環轉折神
機之出入陰陽消長之妙虛實遞更之變首尾貫通絲絲入扣至于在經俞而用針起陷下而
用灸并觀其自叙可謂神于師內經者矣謂仲景不師內經廢棄鍼灸不亦寃乎至若叔和思
邈俱一代之名醫亦未宜伏念臣河朔真定之寒士焉。敢善善謁前輩之過。但臣世祖隸傳于醫學。內舍相傳。亦以十金仲景等方。小試果効。用臨大證。心竊有疑。後得上天裨我此書。更參內經。百發百中。始信醫有回天之功也。所謂大病者。一傷寒。二陰疽。內蝕。三虛勞瘍。火。四中風。五水腫。六臌脹。七脾泄暴注。八尸厥。久痢。十脾瘧。十一喉痺。十二男女骨蒸勞熱。十三小兒急慢驚風。十四痘疹黑斑縮陷。至于胎前產後百十種。必死大證。世人莫能救療。末手待斃。良

可哀哉。臣於此處消息五十餘年。乃見正道。自古扁鵲俞跗倉公華陀。皆此書也。惜不廣傳於後世。臣今盡傳此法於人。以救蒼生。天橫伏乞陛下大展聖裁。憫諸末世。將此書頒行天下。試之有驗。臣死無憾。若試之不效。即置臣於法。以彰誑君之罪。臣誠惶誠恐。稽手頓首。冒死以聞。

張師固不可毀而王孫亦不可闢。夫先生之書固創出前賢。然先煩根底于素問靈樞。致力于仲景思貌。更充之以先生之法。真于大疾。況病自然。遊刃有餘矣。無如叔世良滿。祗知耳食性喜寒涼。畏惡針灸。稍一談及。俱搖頭咋舌。甘死不受。是以先生之道難明。而先生之法不能行。予應斯世斯民也。予欲以之方思。惟數載終無妙法。先生倘以宿肯濟世仁心。神感于予。便

予應心。得手再為廣布。以傳不朽。諒先生在天之靈。亦應許可。古月老人胡珏謹識。

扁鵲心書目錄

卷首

序

青辭

進表

卷上

當明經絡

時醫三錯

黃帝灸法

須識扶陽
忌用轉下

扁鵲灸法

住世之法
禁戒寒涼

附寶材灸法

大病宜灸
要知緩急

三世扁鵲
五等虛實

卷中

傷寒

太陰見證

傷寒四經見證
少陰見證

傷風傷寒

陰毒

老人傷寒

陰陽換氣

勞復

汗後大便下赤水或膿血

疽瘡

喉痺

虛勞

中風

風狂

口眼喎斜

破傷風

水腫

膨脹

暴注

霍亂

暑月傷食泄瀉

痢疾

休息痢

洗頭風

牙槽風

內傷

傷脾發潮熱

嘔吐反胃

消渴

死脈見

疝氣

怔忡

脚氣

溺血

卷下

陰莖出膿

咳嗽

腎勞

肺膈痛

耳聾

瘰癧

婦人卒厥

痞悶

着腦病

腰痛

吞酸

心痛

足痿

淋證

腸癰

咳嗽

頭痛

骨縮

氣纓

婦人

胎逆

產後虛勞

中暑

頭暉

中風人氣虛中滿

脾瘡

瘡病

黃疸

腸癖下血

腸痔

失血

眼病

手顫

三蟲

子嗣

午後潮熱

小兒

暑月脾燥疾

厥證

氣脫

老人兩脇痛

胃瘡

神癥病

黑疽

膏肓病

腎厥

夢泄

老人便滑

蠱毒

血崩

臍中及下部出膿水

驚風

兩脇連心痛

邪祟

老人兩脇痛

下注病

便閉

噎病

脾勞

奔豚

老人口乾氣喘

癟證

帶下

班疹即痘

子癧

小兒午後潮熱

塘瀉

腹脹

病疾

水瀉

面目浮腫

胎寒腹痛

咳嗽

下血

牙疳

蠟蛇節

水沫瘡

水沫瘡

神方

金液丹

保命延壽丹

大丹

中丹

三黃丹

四神丹

五福丹

紫金丹

全真丹

來復丹

草神丹

薑附丹

麝靈湯

救生湯

鐘乳粉

草澄茄散

半硫丸

鹿茸丸

生薑半夏湯

附子半夏湯

平胃散

太白丹

滲濕湯

八風湯

入風丹

換骨丹

三五七散

黃藥子散

華蓋散

祛風散

當歸柴胡湯

大通散

知母黃芩湯

當歸芍藥湯

四順散

二聖散

蜜犀丸

白龍丸

良薑理中湯

建中湯

如聖餅

大通散

知母黃芩湯

阿膠丸

桃花丸

八仙丸

珍珠散

厚膚丹

中和湯

還晴丹

蜜蒙花散

發雲散

洗肝散

週身穴道

牙疳

蠟蛇節

禿瘍

禿瘍

咳

水沫瘡

水沫瘡

水沫瘡

補肝丸

碧雲湯

宣風丸

分氣丸

定風散

消癰散

碧霞散

醒脾丸

附金線重樓治證

服金液丹各種引藥

神治諸般風氣靈膏

文蛤散

丁香丸

五膈散

鎮心湯

安蟲散

補宮丸

萬靈膏

奪命丹

遠志丸

檳榔丸

育嬰丹

膠艾湯

脫衣散

百花散

一醉膏

潤腸散

撮氣散

遠志丸

檳榔丸

換骨散

地血散

柳青餅

大青膏

阿膠散

胡麻散

煎紅丸

麥煎散

定痛丸

睡聖散

兔絲子丸

麥煎散

換骨散

地血散

柳青餅

大青膏

阿膠散

胡麻散

煎紅丸

麥煎散

薄荷散

石膏丸

阿膠散

胡麻散

大青膏

阿膠散

胡麻散

大青膏

阿膠散

胡麻散

阿膠散

胡麻散

阿膠散

阿膠散

扁鵲心書卷上

古神醫盧人扁 鵲 傳

宋太醫真定寶 材重集
清 錢塘胡 环參論

當明經絡

諺云。學醫不知經絡。開口動手便錯。蓋經絡不明。無以識病證之根源。究陰陽之傳變。如傷寒三陰三陽皆有部署。百病十二經脈可定死生。既講明其經絡。然後用藥。徑達其處。方能奏效。昔人望而知病者。不過熟其經絡故也。俗傳遇長桑君。授以懷中藥。飲以上池之水。能動見藏府。此虛言耳。今人不明經絡。止讀藥性病機。故無能別病所在。漫將藥試。偶對稍愈。便爾居功。况亦未必全愈。若一不對。反生他病。此皆不知經絡故也。過世時醫失口言經絡部位乃外科
不明何以知陰陽之交接藏府之遞更疾病因從何審察夫經絡為識病之要道尚不肯講求焉望其宗主內經研究傷寒識血氣之生始知榮衛之循行陰陽根中根外之理不明神機或出或入之道不識師徒授受唯一大明醫指掌藥性歌括以為熟此儘可通行用藥誤人全然不辨或遇明醫枝梧扯拽更將時事俗情亂其理談常恐露出馬脚唯一周旋承奉彼明理人全然焉肯作惡只得挽回數言以蓋其誤如此時醫誠為可恥

須識扶陽

道家以消盡陰翳。煉就純陽。方得轉凡成聖。霞舉飛昇。故云。陽精若壯。千年壽。陰氣如強。必斃。傷。入云。陰氣未消。終是死。陽精若在。必長生。故為醫者。要知保扶陽氣為本。人至晚年。陽氣衰。

故手足不煖。下元虛憊。動作艱難。蓋人有一息氣在。則不死。氣者陽所生也。故陽氣盡必死人於無病時。常灸關元氣海命關中脘。更服保元丹。保命延壽丹。雖未得長生。亦可保百餘年壽矣。今人只是愛趨死路。動云我有大病難服熱藥所延之醫患。皆趨承附和。不言上焦有火。即盼不待書方而已。有不服之意矣。生今之世。思欲展抱負。施薦尚且難入。而丹藥灼艾之說。斷乎其不可行也。

住世之法

紹興間。劉武軍中步卒王超者。本太原人。後入重湖為盜。曾遇異人。授以黃白住世之法。年至九十。精彩腴潤。辛卯年間。岳陽民家多受其害。能日淫十女。不衰。後被擒。臨刑。監官問曰。汝有異術。信乎。曰無也。惟大力耳。每夏秋之交。卽灼關元千炷。久久不畏寒暑。累日不饑。至今臍下一塊。如大之緩。豈不聞土成磚木成炭。千年不朽。皆火之力也。死後。刑官令剖其腹之煖處。得一塊非肉。非骨。凝然如石。卽艾火之効耳。故素問云。年四十。陽氣衰而起居乏。五十體重。耳自不聰明矣。六十陽氣大衰。陰痿九竅不利。上實下虛。涕泣皆出矣。夫人之真元。乃一身之主宰。真氣壯則人強。真氣虛則人病。真氣脫則人死。保命之法。灼艾第一。丹藥第二。附子第三。人至三十。可三年一灸。臍下三百壯。五十可二年一灸。臍下三百壯。六十可一年一灸。臍下三百壯。令人長生不老。余五十時。常灸關元五百壯。卽服保命丹。延壽丹。漸至身體輕健。羨進飲食。六十三時。因憂忽見死脈于左手寸部。十九動而一止。乃灸關元命門各五百壯。五十日後。死脈不復見矣。每年常如此灸。遂得老年康健。乃為歌曰。一年辛苦惟三百。灸取關元功力多。健

體輕身無病。患彭箋壽算更如何。先生三法實為保命之要訣。然上策人多畏懼而不肯行中策。古今痛掃視為險途。若下策用之早而得其當亦可十救其五子。遵行歷年不無有效。有否効則人云偶中。否則謠謗蜂起。此非薦附之過乃予熱勝之所招也。吾徒不可以此而退縮不前。視人之將死可救而莫之救也。

大病宜灸

醫之治病用灸。如做飯需薪。今人不能治大病。良由不知鍼艾故也。世有百餘種大病。不用灸艾丹藥。如何救得性命。却得病回。如傷寒。疽瘡。勞瘵。中風。腫脹。泄瀉。久痢。喉痺。小兒急慢驚風。痘疹。黑陷等證。若灸遲。真氣已脫。雖灸亦無用矣。若能早灸。自然陽氣不絕。性命堅牢。又世俗用灸。不過三五十壯。殊不知去小疾則愈。駐命根則難。故銅人鍼灸圖經云。凡大病宜灸。臍下五百壯。補接真氣。即此法也。若去風邪四肢小疾。不過三五七壯而已。仲景毀灸法云。大氣雖微。內攻有力。焦骨傷筋。血難復也。余觀亘古迄今。何嘗有灸傷筋骨而死者。彼蓋不知灸法之妙。故爾。靈樞論虛而至陷下溫補無功。借冰臺以起陷下之陽耳。若仲景所言。微數之脈。慎無益。但有炎焰而無溫存。寧不焦骨傷筋而血難復。非毀灸也。孫思邈早年亦毀灸法。逮晚年方信。乃曰。火灸大有奇功。昔曹操患頭風。華陀鍼之。應手而愈。後陀死。復發。若干針處灸五十壯。永不再發。或曰。人之皮肉最嫩。五百之壯。豈不焦枯皮肉乎。曰。否。已死之人。灸二三十壯。其肉便焦。無血榮養故也。若真氣未脫之人。自然氣血流行。榮衛環繞。雖灸千壯。何焦爛之有哉。故治病必先別其死生。若真氣已脫。雖灸亦無用矣。惟是膏梁之人。不能忍耐痛楚。當服睡聖散。即昏不知痛。其睡聖散。余自用灸膝神効。放心服之。斷不誤人。以救己之心推以救人。所謂見身說法。其言誠真。其心誠切。其論誠千古不磨。之論無如下之不信。

三世扁鵲

醫門得岐黃血脉者。扁鵲一人而已。扁鵲黃帝時人。授黃帝太乙神明論。著五色脈診。三世病源。後淳于意華陀所受者是也。第二扁鵲戰國時人。姓秦名越人。齊內都人。採內經之書。撰八十一難。慨正法得傳者少。每以扁鵲自比。謂醫之正派。我獨得傳。乃扁鵲再出也。故自號扁鵲。第三扁鵲。大宋寶材是也。余學素問靈樞。得黃帝心法。革古今醫人大弊。保天下蒼生性命。常以扁鵲自任。非敢妄擬古人。蓋亦有所徵焉。嘗因路過衢州野店。見一婦人。偏身浮腫。露地而坐。余曰。何不在門內坐。婦曰。昨日蒙土地告我。明日有扁鵲過此。可求治病。我故于此候之。余曰。汝若聽我。我當救汝。婦曰。汝非醫人。安能治病。余曰。我雖非醫。然得扁鵲真傳。有奇方。故神預告汝。遂與保命延壽丹十粒服之。夜間小便約去二升。五更覺飢。二次又服十五粒。點左命關穴。灸二百壯。五日後。大便下白膿五七塊。半月全安。婦曰。真扁鵲再生也。予治數人。患此症者。浮腫喘急。卧難。既無丹藥。亦不肯灸。只用重劑。薑附十餘貼。想扁鵲獨倚其才。旁遊列國。而形體復舊。飲食如常。可知人能信用溫化。即不灸亦有生機。華陀亦不傳其法。為人譖死。皆因秘而不發。招人之忌耳。余將心法盡傳于世。凡我同心。肯學正傳。不妨亦以扁鵲自命可也。舜何人哉。予何人哉。亦若是。

時醫三錯

凡陰疽及鬼邪着人。或兩眼內障。此三法皆出內經。其瘡疽本於腎虛。為陰所着。寒邪滯經。依附于骨。故爛人筋。害人性命。其法必大補腎氣。壯陽消陰。土得陽氣。自生肌肉。則元氣周流。不

侵骨髓矣。今則附入外科。庸醫不知反用敗毒涼藥。致元氣虛憊而死者多矣。

親見一婦人患伏免陰疽形扁

色白大如覆盂。延一良山門。瘡醫連用清火敗毒藥四劑。不肯服。潰一瀉而死。

鬼邪着人者。皆由陰盛陽虛。鬼能依附陰氣。故易而成病。若陽光盛者。馬敢近之。治法大補元氣。加以育神。則鬼邪自然離體。病家不知。專求符籤。此等外道。決無靈驗。或假手庸醫。認為燥火。投以涼藥。或清熱化痰。致人枉死。良可悲哉。

世俗于輕淺小疾。皆事巫祝。况鬼崇為殃。肯捨巫籤乎。加之醫用寒涼。故爾愈者不易。

眼生內瘴。由于脾腎兩虛。陽光不振耳。故光之短。主于脾。視物不明。主乎腎。法當溫補脾胃。壯陽光以消陰腎。則目明矣。今則另立眼科。以成一家之技。只用涼劑。冰損元陽。致脾腎虛衰而死。殊不知一切病證。皆有內經正法。後人分立十三科妄名。是以識見小者。專習一科。成一偏之見。譬之大海中認一浮漚。綜理未貫。動卽傷生。悲哉。予目覩京中來一大醫院。官陳某。自衒其人本領實而火重者見效亦捷。若本弱元虧者。無不陰受其害。斜橋一號。販之妻服膏半蓋腹。即疼痛甚。其夫強之服盡。大吐而薨。其夫一時惶急。從樓窓躍出街心。哭咷。陳太醫藥殺我婦。百種辱罵累及祖先。聞者無不寒心。筆此以見寒涼誤人。并信耳不信目之戒。

忌用轉下

內經並無轉下之說。止言發散。又止言辛甘發散為陽。辛溫之藥。達表則自然汗散。攻裏則自然開通。據先生之論。謂辛甘發散為陽。故表邪解而裏自和。非辛甘能攻裏也。後人當活看。非若寒苦之藥。動人藏府。泄人元氣也。夫巴豆硝黃之類。能直穿藏府。非大積大聚。元氣壯實者。不敢輕用。今之庸醫。不問虛實。動輒便行轉下。以泄六府各氣。轉生他證。重則脾胃漸衰。不進飲食。肌肉消瘦而死。又俗云。春行夏補。至

秋時須服通行藥數劑。以泄夏月積熱。此語甚訛。俗醫慣將此數語印人耳目。夫內經四時調養長生收藏之道與春夏養陽秋冬養陰之說。不肯精求靈素良可慨也。夫熱在內。自然從五藏六府及大小便中泄出。若以涼藥泄熱。吾恐熱氣未去一分。而元氣已衰九分。嘗觀服轉藥一劑。則有五七日飲食脾胃不能復舊。况乎三焦煖熱方能腐熟水穀。若一刻無火。則肌膚冰冷。陽氣脫盡而死矣。故內經止有沉寒痼冷之論。未有積熱純陽之說。縱然積熱為病。一服轉下。便可解救。若陰寒為病。則四肢逆冷。死在須臾。古人立法。若狂言妄語。踰垣上屋。諸大熱證亦要論其大便如何。數日不出者。有燥屎也。方下之。若大便如常。即不可下。狂言妄語踰垣上屋。自是熱證。然有一種面青脈急或面黑脈微手足厥冷者。又熱陰證。此係無附之陽必死之證。若治之早。或有今人于並無以上熱證。而亦概用寒涼轉下。必欲盡去其熱。吾不知將以何為生氣。夫人身無熱。則陽氣盡矣。此河間丹溪遺訛後世業醫者不可以不察此弊也。

禁戒寒涼

夫四百八病。大約熱者居多。寒者最少。無怪乎河間論火。丹溪之補陰也。但泥二子之書。而不攷究內經。墮于偏頗。害人特甚。蓋熱病屬陽。陽邪易散易治。不死。冷病屬陰。陰邪易伏。故今人不覺。久則變為虛寒。侵蝕藏府而死。初起不覺之證。最能害人。往往輕忽之而一發致死者不少。况人身之大多。亦是當然。天之六氣。大居其二。今之庸醫。執壯火食氣之說。內經壯火食氣之說。猶炎暑盛而人氣乏相大熾而真元傷。非涼藥之治。亦非熱藥之謂。馬元臺不察此理。妄為註釋。遺訛後學。不淺。溺于滋陰苦寒之劑。殊不知邪之中人。元氣盛。則能當之。乃以涼藥冰脫。反泄元氣。是助賊害主也。夫涼藥不知害了多少人。若元氣稍虛者。與不被涼藥冰敗而死。

脾胃有傷焉。望其生。如人飲熱湯及炙燭之物。從齶至鬢斷無損人之理。內經言。膏梁之變。止發癰疽。况膏梁發疽者。百無一二。故知熱之養人。時刻不可缺也。若以冷水飲人。不須三日。即為腹疼泄瀉。脾虛胃敗矣。故達人立法。食必用火。萬代蒼生。得以活命。俗醫大用涼劑。譬于飲人冷水。陰害黎民。良可慨也。不見當今醫家。禍及子孫。甚至滅門絕後。皆學術不精之報也。醫觀此切項猛省誤用涼藥之害。真實不爽。子見近代時醫。苟用溫平者。或延一息終見陵。皆以寒涼攻伐。天札人命者。誠未見其有後也。

要知緩急

夫病有淺深。治有緩急。體認病情而用藥緩急。合當乃醫家第一要着。若急病而用緩藥。是養殺人也。緩病而用急藥。是逼殺人也。庸醫遇病。不能必其何症。亦不能必其當用何藥。概以溫平試之。若緩病尚可。設遇大病。則為誤不小。故名養殺人。若緩病投以急藥。是欲速其效。殊不知攻急則變。生所謂逼殺人也。二者之誤。令世醫家。比比瞻怯者。蹈養殺之弊。心粗者。逞逼殺之害。醫本生人。乃為殺孽。悲哉。余觀京師名醫呂實者。亦熟此法。但不早用。惟先用溫平藥調治。及至危篤。方議灼艾丹附等事。多不效。乃曰。此天命也。殊不知救挽已遲。藏氣敗絕。雖靈丹妙藥。無能為矣。余親見彼治一傷寒。第五日。昏睡瞎語。六脈洪大。以為胃中有熱。以承氣下之。四更即死矣。六脈之大。非洪也。乃陽氣將脫。故見此耳。治以下藥。更虛其陰。則陽無所附。而死速矣。若先于臍下灸三百壯。固往脾腎之氣。內服保元丹。斂陽丹。飲薑附湯。過三日。自然汗出而愈。余治一傷寒。亦昏睡妄語。六脈弦大。余曰。脈大而昏睡。定非實熱。乃脈隨氣奔也。強為之治。先生真仁人也。強治之心。余頗有之。第以人不我信。且又碍于言訥。而不肯為究。非真行仁術之人。常以此自愧。用烈大灸。

關元穴。初爻病人覺痛。至七十壯。遂昏睡不疼。爻至三鼓。病人閉眼。思飲食令服薑附湯。至三日後方得元氣來復。大汗而解。今時姑息成風。免法難行。余嘗歎曰。人參雖救命之品。薑附尤有回陽之功。無如世人不識。俗醫痛掃良可慨也。余思前證少陰病也。發昏譫語。全似陽證。若時投以承氣。豈得不死。故耳聾不呻吟。身生赤黑屬太陽。用柴胡承氣輩。誤人不少。夫但知少陽脈循脇絡耳。却不思耳竅屬腎。以耳聾歸少陽。此仲景所未到之處也。耳聾仲景作宗氣虛論未嘗歸之陽。至于譫語論中言神氣虛者。多若陽明證中不過數條而已。先生故加貶駁。未免有意索瘢。

五等虛實

凡看病要審元氣虛實。實者不藥自愈。虛者即當服藥。爻關元穴。以固性命。若以溫平藥亦難取效。淹延時日。漸成大病。溫平之藥近世所尚。旁人稱其穩當。醫士習千兩岐及至變大病惶急錯投誤而又誤。總由識見不真。遂爾因循贻害。病多般大累分為五種。有平氣微虛甚虛將脫已脫之別。平氣者。邪氣與元氣相等。正可敵邪。止以溫平藥調理。緩緩而愈。如補中益氣小柴胡八物湯是也。微虛者。邪氣旺。正氣不能敵之。須服辛溫散邪之藥。當補助元氣。使邪氣易伏。宜草澄茄散。全真丹。來復丹。理中丸。薑附湯之類是也。甚虛者。元氣大衰。則成大病。須用辛熱之藥。厚味之劑。大助元陽。不暇攻病也。經云。形不足者。溫之以氣。精不足者。補之以味。卽官桂附子。鹿茸河車之類是也。將脫者。元氣將脫也。尚有絲毫元氣未盡。惟六脈尚有些小胃氣。命若懸絲。生死立待。此際非尋常藥餌所能救。須爻氣海丹田關元各三百壯。因其脾胃。夫脾為五藏之母。腎為一身之根。故傷寒必診太谿冲陽二

脈者卽脾胃根本之脈也。此脈若存則人不死。故尚可灸。內服保元丹。獨散大丹。保命延壽丹。或可保其性命。單顧脾腎乃先生學力大有根基之論。蓋腎為先天之原。脾為後天之本。若已平氣變虛。虛證變脫。及至三焦失運。神氣改常。出入道乖升降機息。而猶執邪氣未盡。火熱未除之說。朝涼暮熱。多尚寒涼。喘行丸伐致使。

黃帝灸法

男婦虛勞。灸臍下三百壯。

陰疽骨蝕。灸臍下三百壯。

肺傷寒。灸臍下三百壯。

癰喉風。灸臍下三百壯。

急慢驚風。灸中脘四百壯。

老人氣喘。灸臍下三百壯。

產後血暈。灸中腕五十壯。

鬼邪着人。灸巨闕五十壯。臍下三百壯。

婦人無故風擣發。灸中腕五十壯。

鬼魘着人昏悶。灸前頂穴五十壯。

死脉及惡脈見。急灸臍下五百壯。

男婦水腫。灸臍下五百壯。
久患脾瘡。灸命關五百壯。

氣厥。灸戶厥中腕五百壯。

黃黑疸。灸命關二百壯。

老人二便不禁。灸臍下三百壯。

久患脚氣。灸湧泉穴五十壯。

暑月腹痛。灸臍下三十壯。

婦人臍下。或下部出膿水。灸臍下三百壯。

久患偃伏不伸。灸臍俞一百壯。

婦人半產。久則成虛癆水腫。急灸臍下三百壯。

婦人產後。腹脹水腫。灸命關百壯。臍下三百壯。

腎虛面黑色。灸臍下五百壯。

嘔吐不食。灸中脘五十壯。

婦人產後熱不退。恐漸成癆瘍。急灸臍下三百壯。

扁鵲灸法

命關二穴。在脇下腕中。舉臂取之。對中腕。向乳三角取之。

此穴屬脾。又名食竇穴。能接脾藏真氣。治三十六種脾病。凡諸病困重。尚有一毫真氣。灸此穴二三百壯。能保固不死。一切大病屬脾者。並皆治之。蓋脾為五藏之母。後天之本。屬土。生長萬物者也。若脾氣在。雖病甚不至死。此法試之極驗。

腎俞二穴。在十四椎兩旁。各開一寸五分。

凡一切大病。于此灸二三百壯。蓋腎為一身之根蒂。先天之真源。本牢則不死。又治中風失音。手足不遂。大風癲疾。

三里二穴。在膝眼下三寸。骱骨外筋內宛中。舉足取之。

治兩目矇矇。不能視遠。及腰膝沉重。行步之力。此證須灸中腕臍下。待灸瘡發過。方灸此穴。以出熱氣自愈。

承山二穴。在腿肚下。挺脚指取之。

治腳氣重。行步少力。

湧泉二穴。在足心宛宛中。

治遠年脚氣腫痛。或脚心連脛骨痛。或下粗腿腫沉重少力。可灸此穴五十壯。
腦空二穴。在耳尖角上。排三指盡處。

治偏頭痛。眼欲失明。灸此穴七壯自愈。

目明二穴。在口面骨二瞳子上。入髮際。

治太陽連腦痛。灸三十壯。

腰俞二穴。在脊骨二十一椎下。

治久患風腰痛。灸五十壯。

前項二穴。在鼻上入髮際三寸五分。

治顛頂痛。兩眼失明。

附寶材灸法計五十條

一中風半身不遂。語言蹇澁。乃腎氣虛損也。灸關元五百壯。

一傷寒少陰證。六脈緩大。昏睡自語。身重如山。或生黑靨。噫氣吐痰。腹脹。足指冷過節。急灸關元三百壯。可保。

一傷寒太陰證。身涼足冷過節。六脈弦緊。發黃紫斑。多吐涎沫。發燥熱。噫氣急。灸關元命關各三百壯。傷寒惟此二證。害人甚速。仲景只以舌乾口燥為少陰。腹滿自利為太陰。餘皆歸入陽證條中。故致害人。然此二證若不早灸。關元以救腎氣。灸命關以固脾氣。則難保性命。蓋

脾腎為人一身之根蒂。不可不蚤圖也。

舌乾口燥乃少陰本熱之證。仲景以大承氣急下。但者不能用。蓋火亢盛不用承制。則燎原之害熾而生化之機息可畏哉。設本熱假而標行之也。○仲景蓋以氣化而用承。氣若涉形藏。別有治法。不可混用。

一、腦疽發背。諸般疔瘡惡毒。須灸關元三百壯。以保腎氣。

一、急喉痺。顧麤頸腫。水穀不下。此乃胃氣虛。風寒客肺也。灸天突穴五十壯。穴在結喉下四寸。

一、虛勞。咳嗽潮熱。咯血吐血。六脈弦緊。此乃腎氣損而欲脫也。急灸關元三百壯。內服保元丹。

可保性命。若服知柏歸地者立死。蓋苦寒重損其陽也。

虛勞而致六脈弦緊。即是腎氣已脫。乃今之醫治虛勞者。脈至微細。急疾

尚用寒涼真視人如草芥。也。此種人不知作何結果。

一、水腫膨脹。小便不通。氣喘不卧。此乃脾氣大損也。急灸命關二百壯。以救脾氣。再灸關元三百壯。以扶腎水。自運消矣。

一、脾泄注下。乃脾腎氣損。二三日能損人性命。亦灸命關關元各三百壯。

一、休息痢。下五色膿者。乃脾氣損也。半月間則損人性命。亦灸命關關元各三百壯。

一、霍亂吐瀉。乃冷物傷胃。灸中脘五十壯。若四肢厥冷。六脈微細者。其陽欲脫也。急灸關三元百壯。

一、瘧疾。乃冷物積滯而成。不過十日半月自愈。若延綿不絕。乃成脾瘧氣虛也。久則元氣脫盡而死。則中脘及左命關各百壯。

一黃疽眼目及遍身皆黃。小便赤色。乃冷物傷脾所致。灸左命關一百壯。忌服涼藥。若兼黑疽。
乃房勞傷腎。再灸命關三百壯。命關當作命門

一番胃食已即吐。乃飲食失節。脾氣損也。

灸命關三百壯。

一尸厥不省人事。又名氣厥。灸中脘五十壯。

一風狂妄語。乃心氣不足。為風邪客于包絡也。先服睡聖散。灸巨闕穴七十壯。灸瘡發過。再灸

三里五十壯。

一腸痛不止。乃飲食傷脾。灸左命關一百壯。

一兩腸連心痛。乃恚怒傷肝。脾腎三經。灸左命關二百壯。關元三百壯。

一肺寒。胸膈脹。時吐酸逆氣上攻。食已作飽。困倦無力。口中如含冰雪。此名冷勞。又名膏肓病。
乃冷物傷肺。反服涼藥。損其肺氣。灸中府二穴。各二百壯。

一咳嗽病。因形寒飲冷。冰消肺氣。灸天空穴五十壯。

一久嗽不止。灸口俞二穴。各五十壯即止。若傷寒後。或中年久嗽不止。恐成虛勞。當灸關元三百壯。

一癟風。因卧風濕地處。受其毒氣。中於五藏。令人面目龐起如黑雲。或偏身如錐刺。或兩手頑
麻。灸五藏俞穴。先灸肺俞。次心俞。肺俞。再次肝俞。腎俞。各五十壯。周而復始。病愈為度。
一暑月發燥熱。乃冷物傷脾胃。腎氣所致。灸命關二百壯。或心膈脹悶作疼。灸左命關五十壯。

若作中暑。服涼藥。即死矣。

一中風病。方書灸百會肩井曲池三里等穴多不効。此非黃帝正法。灸關元五百壯。百發百中。

一中風失音。乃肺腎氣損。金水不生。灸關元五百壯。

一腸痺下血。久不止。此飲食冷物。損大腸氣也。灸神闕穴三百壯。

一虛勞人。及老人。與病後。大便不通。難服利藥。灸神闕一百壯。自通。

一小便下血。乃房事勞。損腎氣。灸關元二百壯。

一砂石淋。諸藥不効。乃腎家虛火所凝也。灸關元三百壯。

一上消病。日飲水三五升。乃心肺壅熱。又吃冷物。傷肺腎之氣。灸關元一百壯。可以免死。或春灸氣海。秋灸關元三百壯。口生津液。

一中消病。多食而四肢羸瘦。困倦無力。乃脾胃腎虛也。當灸關元五百壯。

一腰足不仁。行步少力。乃房勞。損腎。以致骨痿。急灸關元五百壯。

一昏默不省人事。飲食欲進不進。或卧或不卧。或行或不行。莫知病之所在。乃思慮太過。耗傷心血故也。灸巨闕五十壯。

一脾病。致黑色痿黃。飲食少進。灸左命關五十壯。或兼黧色。乃損腎也。再灸關元二百壯。一賊風入耳。口眼歪斜。隨左右灸地倉穴五十壯。或二七壯。一耳輪焦枯。面色漸黑。乃腎勞也。灸關元五百壯。

一中年以上之人口乾枯燥。乃腎水不生津液也。灸關元三百壯。若誤服涼藥必傷脾胃而死。一中年以上之人腰腿骨節作疼。乃腎氣虛憊也。風邪所乘之證。灸關元三百壯。若服辛溫除風之藥。則腎水愈涸難救。

一腿骯澀間發赤腫。乃腎氣風邪着骨。恐生附骨疽。灸關元二百壯。

一老人滑腸困重。乃陽氣虛脫。小便不禁。灸神闕三百壯。

一老人氣喘。乃腎虛氣不歸海。灸關元二百壯。

一老人大便不禁。乃脾腎氣衰。灸左命關元各二百壯。

一兩眼昏黑。欲成內障。乃脾腎氣虛所致。灸關元三百壯。

一瘰癧。因憂鬱傷肝。或食鼠涎之毒而成。于瘡頭上灸三七壯。以麻酒潤百花膏塗之。灸瘡發過愈。

一破傷風。牙關緊急。項背強直。灸關元穴百壯。

一寒濕腰痛。灸腰愈穴五十壯。

一行路忽上膝及腿如錐。乃風濕所襲。于痛處灸三十壯。

一脚氣少力。或頑麻疼痛。灸湧泉穴五十壯。

一頑癬浸淫。或小兒禿瘡。皆汗出入水濕淫皮毛而致也。于生瘡處隔三寸。灸三壯。出黃水愈。凡灸大人艾炷須如蓮子底濶三分。灸二十壯後却減一分。務要緊實。若灸四肢及小兒艾炷

如蒼耳子大。灸頭面。艾炷如麥粒子大。其灰以鵝毛掃去。不可口吹。
如顛狂人不可灸。及膏梁人怕痛者。先服睡聖散。然後灸之一。服止可灸五十壯。醒後再服再灸。

扁鵲心書卷中

古神醫盧人扁 鶴 傳

宋太醫真定寶 材重集
清 錢塘胡 玉參論

傷寒、

傷寒。六脈浮緊。呻吟不絕。足指溫者。陽也。忌服涼藥。恐變為陰。害人性命。至六日。發煩躁。乃陰陽換氣。欲作汗也。服當歸茯苓散。汗出而愈。

六脈緊大。或弦細。不呻吟。多睡耳聾。足指冷。肢節痛。發黃。身生赤黑瘡。時發噫氣。皆陰也。灸關元三百壯。服金液丹。薑附湯。過十日半月。出汗而愈。若不早灸。反與涼藥者死。辨別陰陽不比二條則治傷寒證誤謬亦少其灸法雖不能偏行若貧家無力而遇難起之病不能備參藥炮告以灸能治命倘肯依從未必非仁術之一端予每見時疫盛行之際鄉廩死者比戶心切憐之倘盡心力并合丹藥以濟之不特已身蒙福予孫亦必昌大若吐逆而心下痞。灸中脘五十壯。若微微發顫者。欲作汗。服薑附湯而愈。若少年壯實之人。傷寒至五六日。發狂踰垣上屋。胃中有積熱也。服大通散。輕者知母散亦愈。

傷寒四經見證

傷寒祇有四經。無少陽厥陰二經。夫寒之中人。如太陽主皮毛。故寒邪先客此經。陽明主胃。凡形寒飲冷則傷之。太陰主脾。凡飲食失節。過食寒物。則傷之。少陰主腎。寒水喜歸本經也。故傷

寒止有四經。若少陽厥陰主肝膽。如憂思喜怒方得傷之。寒病最少。如耳聾囊縮者不陰也。寒熱口苦乃陽病也。此四證俱不宜用寒涼藥也。言無少陽厥陰二經非通論也。時醫見寒熱口苦耳聾脇痛乾嘔吐逆不辨陰陽不審虛實動靜妄脈體法急更云內熱以深輕則瀉心白虎重則陷胸承氣不至水脫不已至若厥陰標陰本風中見大化證來錯雜人多不識誤死者多矣

太陽見證

太陽寒水內屬膀胱。故脈來浮緊。外證頭疼。發熱。腰脊強。惟服平胃散。至六七日出汗而愈。蓋胃氣不虛。傳偏經絡自愈也。仲景以為陽證。乃與涼藥隨經而解。反攻出他病。甚者變為陰證。六脈沉細。發厥而死。急灸關元。乃可復生。如本經至六七日發戰者。欲作解而陽氣少也。服薑附湯出汗而愈。仲景圓機活法論中救誤者甚多。何嘗能誤人哉。其誤人者乃後人誤用仲景法而誤之耳。子仲景何尤。

陽明見證

陽明燥金。內屬於胃。六脈浮緊而長。外證目痛。發熱。手足溫。呻吟不絕。服當歸柴胡湯。平胃散。仲景反言熱深厥亦深。此誤也。若果發昏厥。兩目枯陷不能昇者。急灸中脘五十壯。漸漸省人事。手足溫者生。否則死。仲景厥陰證中有厥熱多寡之論。不過驗邪正之進退。察陰陽之消長。示人為治之活法。無偏無倚。何誤之有。

太陰見證

太陰濕土。內屬於脾。其脈弦緊。外證不呻吟。四肢不痛。身不甚熱。時自汗。自利。手足冷。多痰唾。服保元丹。薑附湯。十日後。汗出而愈。此證溫治若早愈。亦甚迷。稍不審察。害人亦易。又一證。發黃生紫斑。咽乾燥。噫氣。

者此名陰燥陰黃服鍾乳粉十日後汗出而愈庸醫或誤認陽證涼之即死

少陰見證

少陰君火內屬於腎其脈弦大外證肢節不痛不呻吟但好睡足指冷耳聾口乾多痰唾身生赤黑屬時發噫氣身重如山煩躁不止急灸闢元三百壯內服保元丹薑附湯過十日汗出而愈若作陽證誤服涼藥以致發昏譫語循依摸牀吐血脉細乃真氣虛腎水欲涸也仲景反曰急下之以救腎水此誤也真氣既虛反用涼藥以攻其裏是促其死也急灸闢元三百壯可保無虞少陰本熱標寒而又中見太陽本熱之證固不易治況標陰為病千頭萬緒變態百出令人接應不暇然只在初時體察真切用灸用溫亦非難事良由初着一錯胎誤到底害人不少至若無本熱而又無中見之太陽一派陰寒必死無疑或連灸闢元重投丹附亦在于覺之早庶望其生少陰誤治而變諸敗逆證誠為費手先生之論尚屬形藏故尚溫補仲景之論惟言氧化故主承制然論中用溫者多下者不過數條而已况標本氣化今古難明非神于仲景之法者不能倘于急下證而誤溫殺人反掌急溫證而誤下究沉海底嗟嗟醫之為道誠難矣

傷風傷寒

脈浮為風脈緊為寒仲景分為兩塗故有麻黃桂枝之說此誤也然傷寒乃太陽本氣受傷不可大汗但服薑附湯自愈不必穿鑿他求以為精也浮風緊寒古人通論解肌發表定法難唐神志稍失其常形氣不能振作則先生之法斷不可緩○傷風輕淺之證初起咽喉喉痛鼻中大出此風邪外傷毛腠抑遏陽氣故現此耳醫者不明誤用寒涼馴至重大

挾食冷物

脈沉為胃氣寒緊為冷氣盛滑則食不消其證頭痛發熱嘔吐心下痞時或腹痛服丁香丸來復丹若冷物不消草澄茄散胃虛者平胃散理中丸

中濕

三四月間人感潮濕之氣名曰濕病。或六七月大雨時行恣飲冰水冷物亦名中濕。則令人寒熱自汗。陽則脈緊。肢節痛。足指溫。服大附湯。陰則脈沉而緊。肢節不痛。身涼自利。足指冷。服薑附湯不可發汗。汗則必發煩躁。虛汗不止。或發黃腫。若脈涼藥則泄瀉而死。

一今人于六七月之交不變是寒是濕或陰或陽動輒云著耑用寒涼及至發脾瀉泄而猶云暑毒未清又行攻下不至醫殺不止實可痛心

先生于此證雖分陰陽而用附子則

陰毒

或腎虛人或房事後或胃發冷氣即腹痛煩躁甚者囊縮昏悶而死急灸關元一百壯內服薑附湯保元丹可救一二若遲則氣脫雖灸亦無益矣。

不可因循致歸絕路

老人傷寒

切忌發汗及吐下。蓋元氣盛則邪不能為害。傳偏經絡自愈。仲景不敢補反攻邪氣致正氣受傷誤人多矣。凡遇此證只用薑附湯多服自然解散。

元虛而受攻傷正何必老人仲景醫之聖者寧不知此

陰陽換氣

凡傷寒陽證欲作汗陰證已加矣真元欲復與邪氣分爭必發寒戰鼻頭昏迷牙關微緊四肢微厥乃陰陽換氣也一二時辰自然腋下汗出而愈陰陽換氣即今之所謂戰汗須預告病家

彼時一劑誤投遂有生死之別

傷寒譜語

凡傷寒譖語。屬少陰。仲景屬陽明誤也。陽明內熱必發狂。今止譖語。故為少陰。仲景皆指神虛未嘗不屬少陰也。急灸關元三百壯。若灸後仍不止者死。

傷寒衄血

凡鼻衄不過一二盞者。氣欲和也。不汗而愈。若衄至升斗者。乃真氣脫也。針關元入三寸。留二十呼。血立止。再灸關元二百壯。服金液丹。不然恐成虛勞中滿。當解當清當溫當補。當審證須治庶幾無誤

勞復

傷寒瘥後飲食起居勞動。則復發熱。其候頭痛。身熱。煩躁。或腹疼。脈浮而緊。此勞復也。服平胃散。分氣丸。汗出而愈。若連服三四次不除者。此元氣大虛故也。灸中脘五十壯。勞復證仲景數一。須審邪氣之有無。解寒熱。之多寡以施治。則無誤矣。

汗後大便下赤水或膿血

此乃胃中積熱未除。或服丹附而致。宜服黃連當歸芍藥湯。下膿者如聖餅化積而愈。經云。熱雖甚不死。若陰氣盛。則殺人于頃刻。戒之。熱藥之過一涼可解。涼藥之誤十熟難瘳。又積熱易解而易治。沉陰難愈而難明。臨證之工大宜體認。

汗後發噫

由於脾腎虛弱。冷氣上奔也。服薑附湯來復丹。此症多是發呃苦噫證。無死人之理。觀後二案可見。

治驗

一人傷寒至八日。脈大而緊。發黃。生紫斑。噫氣足指冷至腳面。此太陰證也。最重難治。為灸

命關五十壯。闢元二百壯。服金液丹。鍾乳粉。四日汗出而愈。

一人患傷寒。至六日。脈弦緊。身發黃。自汗。亦太陰證也。先服金液丹。點命關穴。病人不肯灸。傷寒惟太陰少陰二證。死人最速。若不早灸。雖服藥無効。不信。至九日瀉血而死。不聽良言往往至此

及至證變而下血。俗醫猶謂硫黃熱迫痛為排擠反用寒涼以下石至死。衆口呶呶。總咎熱藥之害。婆心遭謗。不一而足。然有天道何恤人言。

一人病傷寒。至六日。微發黃。一醫與茵陳湯。次日更深。黃色偏身如棍子。此太陰證。誤服涼藥。而致肝木侮脾。余為灸命關五十壯。服金液丹而愈。傷寒發黃雖有陰陽之異。然牌家陰濕而為陰黃者多。不可不知。

肺傷寒

肺傷寒一證。方書多不載。誤人甚多。與少陰證同。但不出汗而愈。每發于正二臘月間。亦頭疼。肢節痛。發熱。惡寒。咳嗽。脈緊。與傷寒畧同。但多咳嗽耳。不宜汗。服薑附湯。三日而愈。若素虛之人。邪氣深入。則昏睡譫語。足指冷。脈浮緊。乃死證也。急灸闢元三百壯可生。不灸必死。服涼藥亦死。蓋非藥可療也。肺傷寒之證。今人多認為重傷風。非溫平誤事。即寒涼殺人手于此證。畧而已。設槩用薑附。有分曉。然不免因人檢點。苟遇知己用之。無疑應酬通治。不過薑甘桂辛。往往遭人謗毀。

治驗

一人患肺傷寒。頭痛。發熱。惡寒。咳嗽。肢節疼。脈沉緊。服華蓋散。黃芪建中湯。畧解。至五日。昏

睡證語。四肢微厥。乃腎氣虛也。灸關元百壯。服蓋附湯。始汗出愈。此證與雍正六年印春祖藥誤有誤。不知非藥誤人。乃庸人不明此理。妄投涼藥之誤耳。苟具隻眼焉得有誤。

疽瘡

有腰疽。背疽。腦疽。腿疽。雖因處以立名。而其根則同。方書多用苦寒敗毒之藥。多致剝削元氣。變為陰疽。侵肌蝕骨。潰爛而亡。不知內經云。脾腎氣虛。寒氣客手經絡。血氣不通。着而成疾。若真氣不甚虛。邪氣不得內陷。則成癰。蓋癰者。壅也。血氣壅滯。故大而高起。屬陽易治。若真氣虛甚。則毒邪內攻。附貼筋骨。則成疽。蓋疽者。阻也。邪氣深而內爛。阻人筋骨。屬陰難治。其始發也。必憎寒壯熱。急服救生湯五錢。再服全好。甚者。卽于痛處灸三五壯。陰疽即三五十壯亦不為過如痛者。屬陽易治。若不痛。乃疽瘡也。急服保元丹。以固腎氣。若用涼轉藥。則陽變為陰。或不進飲食而死。急灸關元可生。近世瘡醫祇記一十三味方。不問邪之深淺。感之重輕。頂之起不起。色之紅不紅。辨五色。不審七惡。藥用此方。更加涼解。即見純陰冷毒。而猶云半陰半陽。總以法散解毒為良法。及至寒涼水伏。尚云毒盛內攻。或見神情躁擾。終認大熱未清。小證變其餘實。由學問未精。識證不確。陰陽錯亂。虛實混淆。夫淺證變深。若遇大證。未有不受其害者。世謂外科拉折腿醫。亦不盡然。人之無良。亦或有之。變證之來。全然不曉。有似故意害人。其實非本心也。

治療

一人病腦疽。六日危篤。不進飲食。余曰。年高腎虛。邪氣滯經也。令服救生湯。卽刻減。半夜間再進一服。全安。

一人忽患偏身拘急。來日陰囊連並。腫大如斗。六脈沉緊。余曰。此陰疽也。幸未服解毒涼藥。

若服之。則並與翠丸。必皆爛去而死。急令服救生湯五錢。又一服全安。

一老婦。腦後作痛。憎寒拘急。余曰。此欲發腦疽也。急令服救生湯三服全愈。

余治一婦。新產深居密室。頭面偏體生扎馬疔。外科與清火敗毒藥二劑立時消去其家甚喜。次日胸中氣悶渴躁不已。神氣異常至晚腹痛泄瀉。身熱體倦。嘔惡不食。瘍醫云暑毒內攻。更與連括涼劑煎訖將進。適余至診。其脈空散無根。一息七八至。乃裏虛毒陷也。即以異功加薑附飲之。次日瀉止。神清食粥不嘔。又一劑而扎馬疔仍復發出。亦不如前之痛苦矣。此以為瘍醫寒涼之成精方脈者亦不可不明此理。

凡一切癰疽。發背。疔瘡。乳癰。癌毒。無非寒邪滯經。只以救生湯服之。重者減半。輕者全安。百發百中。

喉痺

此病由肺腎氣虛。風寒客之。令人頤領粗腫。咽喉閉塞。湯藥不下。死在須臾者。急灌黃藥子散。吐出惡涎而愈。此病輕者治肺。服薑附湯。灸天突穴五十壯亦好。重者服鍾乳粉。灸關元穴。亦服薑附湯。

治驗

一人患喉痺。痰氣上攻。咽喉閉塞。灸天突穴五十壯。即可進粥。服薑附湯一劑即愈。此治一人患喉痺。頤領粗腫。粥藥不下。四肢逆冷。六脈沉細。急灸關元穴二百壯。四肢方暖。六脈漸生。但咽喉尚腫。仍令服黃藥子散。吐出稠痰一合。乃愈。此治腎也。

一人患喉痺。六脈細。余為灸關元二百壯。六脈漸生。一醫曰。此乃熱證。復以火攻。是抱薪救

火也。遂進涼藥一劑。六脈復沉。咽中更腫。醫計窮。用尖刀于腫處刺之。出血一升而愈。蓋此證忌用涼藥。痰見寒則凝。故用刀出其肺血。而腫亦隨消也。先生治肺治腎之法千古早見三肺腎虛寒十有八九。喉科不明此理。一味寒涼。即有外邪。亦致冰伏。若元本虧損。未有不閉悶致死者。所以咽喉妙法第一。開豁痰涎。既湧自然通快。然後審輕重以施治。蓋予生也。至于刺法。亦須知人多畏之。而不肯用耳。然當為急時。亦不可避。忌強為救治。亦可得御。家強其延喉科。視之彼醫笑予動輒用熱藥。不知此乃陽明熱甚。證火性急速。故一日而燒渴其喉。即腐潰。豈可用溫補劑耶。乃投白虎二劑。服未半。而神氣改常。語言錯亂。甚至顛倒。而妄用白虎。使胃絡陷下。而不能上通。故心神失守。以歸脾湯加桂枝。飲之甫一劑。而神恬脈靜矣。噫。彼喉科一無學之人。妄為評品。大方亂投。湯藥幾至殺人。亦愚矣。

虛勞

此病由七情六慾。損傷脾胃。早尚易治。遲則難愈。必用火灸。方可回生。若用溫平藥。及黃芪建中。鱉甲飲之類。皆無益于病。反傷元氣。其證始則困倦少食。額上時時汗出。或自盜汗。口乾咳嗽。四肢常冷。漸至咳吐鮮血。或咯血多痰。蓋腎脈上貫肝膈。入肺中。腎既虛損。不能上榮于肺。故有是病。治法當同陰證治之。先于關元灸二百壯。以固腎氣。後服保命延壽丹。或鍾乳粉。服三五兩。其病減半。一月全安。若服知柏地黃。當歸之屬。重傷脾胃。是促其死也。切忌房事。然此病須早灸。遲則無益。丹藥亦不受矣。服之反發熱煩。乃真脫故也。若童男女得此病。乃胎秉法弱。宜終身在家。若出嫁犯房事。再發必死。

治驗

一人病咳嗽。盜汗發熱。困倦減食。四肢逆冷。六脈弦緊。乃腎氣虛也。先灸關元五百壯。服保命延壽丹二十九鍾。乳粉二錢。間日服金液丹百丸。一月全安。

一人病咳嗽。證脈與上條同。但病人怕灸。止服延壽丹五十粒。金液丹百粒。鍾乳粉二兩。五日減可。十日脈沉緩。乃真氣復也。仍服前藥。一月全安。蓋此病早治不灸亦可。遲必加灸。否則難治。

一幼女病咳嗽。發熱。咯血。減食。先灸脅下百壯。服延壽丹。黃芪建中湯。而愈。戒其不可出嫁。犯房事必死。過四年而適人。前病復作。余曰。此女胎稟素弱。只宜固守終老。不信余言。破損天真。元氣將脫。不可救矣。強余丹藥服之。竟死。

天真元氣將脫不可救矣。強余丹藥服之竟死。
一人額上時時汗出。乃腎氣虛也。不治則成癆瘍。先灸臍下百壯。服金液丹而愈。
一人夜多虛汗。亦腎氣虛也。服全真丹。黃芪建中湯而痊。

一婦人產後虛汗不止。乃脾腎虛也。服金液丹全真丹。當歸建中湯而愈。凡童男女秉氣虛多汗者。亦同此治。

一人每日四五遍出汗。灸關元穴亦不止。乃房事後飲冷傷脾氣復灸左命關百壯而愈。一婦人傷寒瘥後轉成虛勞。乃前醫下冷藥損其元氣故也。病人發熱咳嗽吐血少食為。

闢元二百壯服金液保命四神鍾乳粉一月全愈

脾腎者先後天之本與元也虛勞之病雖有五藏之殊其原皆由於脾腎受病而脾腎之治殊難見效不知腎之元于生陽脾之本于焦火溫溫不息元本日充自然真水流行津液四

中風

此病皆因房事六慾七情所傷。真氣虛為風邪所乘。客于五藏之俞。則為中風偏枯等證。若中脾胃之俞。則右手足不用。中心肝之俞。則左手足不用。大抵能任用。但少力。麻痺者為輕。能舉而不能用者稍輕。全不能舉動者最重。邪氣入藏。則廢九竅。甚者卒中而死。入府則壞四支。或有可愈者。治法先灸關元五百壯。五日便安。次服保元丹一二斤。以壯元氣。再服八仙丹。八風湯。則終身不發。若不灸臍下。不服丹藥。雖愈不過三五年。再作必死。然此證最忌汗吐下。損其元氣必死。大凡風脈浮而遲緩者生。急疾者重。一息八九至者死。中風之證古方書雖有中藏中府中經脈之別。然其要不

過閉證與脫證而已。閉證雖屬實而虛者不少。或可用開闢通竅行痰除氣之劑。闢竅一開。痰氣稍順急當審其形藏察其氣血而調治之。更觀其兼證之有無虛實之孰勝。或補或瀉。再佐以先生之法。庶幾為效速而無妄廢難起之患矣。至若脫證惟一于虛重劑參附或可保全。誠不若先生之丹艾為萬全也。予見近時醫家脫證已具三四而猶云有風有痰。雖用參附而必佐以秦艽天麻膽星竹瀝水滷疏散是不知緩急者也。烏足與論醫道者是。

治驗

一人病半身不遂。先灸關元五百壯。一日二服八仙丹。五日一服換骨丹。其夜覺患處汗出。來日病減四分。一月全愈。再服延壽丹半斤。保元丹一斤。五十年病不作。千金等方。不灸關元。不服丹藥。惟以尋常藥治之。雖愈難久。

一人患左半身不遂。六脈沉細無力。余曰。此必服峻利之藥。損其真氣。故脈沉細。病者云。前月服促虎丹。吐涎二升。此後稍輕。但未全愈耳。余嘆曰。中風本因元氣虛。損今服吐劑。反傷元氣。目下雖減。不數日再作。不復救矣。不十日。果大反復。求治于余。雖復丹藥。竟不能起。

癘風

此證皆因暑月抑卧濕地。或房勞後。入水冒風。而中其氣。令人兩目壅腫。雲頭班起。或肉中如針刺。或麻痺不仁。腫則如癰疽。潰爛筋骨如死。若中肺俞。心俞。名曰肺癰。易治。若中脾肝腎俞。名曰脾肝腎癰。難治。世傳醫法。皆無効驗。黃帝正法。先灸肺俞二穴。各五十壯。次則心俞。次脾俞。次肝俞。次腎俞。如此周而復始。全愈為度。內服胡麻散。換骨丹。各一料。然平人止灸亦愈。若爛見筋骨者難治。經云。脈風成為癰。蓋風之中人。善行而數變。今風邪留于脈中。淹漫不去。而癰成矣。其間有傷營傷衛之別。傷營者。營氣熱附。其氣不清。故使裏柱壞而。

色敗使肌肉膚瘡潰傷衛者風氣與太陽俱入行于脈俞散于分肉之間與衛氣相犯其道不利故則上體先見毒在血分則下體先見氣血俱受則上下齊見更須分五藏之毒肺則皮生白屑眉毛先落肝則面發紫泡腎則脚底先痛或穿脾則偏身如麻心則雙目受損此五藏之毒病之重者也又當知五死之證皮死麻木不能肉死割刺不痛血死消烟目癱筋死指甲脫落骨死鼻柱崩壞此五藏之傷病之至重者難治若至音啞目盲更無及矣

治驗

一人面上黑腫。左耳下起雲。紫如盤蛇。肌肉中如刀刺。手足不知痛。詢之所以。因同僚邀遊醉卧三日。覺左臂黑腫如蛇形。服風藥漸減。今又發。余曰。非風也。乃濕氣客五藏之俞穴。前服風藥。乃風勝濕。故當暫好。然毒根未去。令灸肺俞二穴。各百壯。服換骨丹一料全愈。面色光潤如故。

一人偏身赤腫如錐刺。余曰。汝病易治。令灸心俞肺俞四穴各一百壯。服胡麻散二料而愈。但手足微不隨。復灸前穴五十壯。又服胡麻散二料全愈。一人病癘證。鬚眉盡落。面目赤腫。手足悉成瘡痍。令灸肺俞心俞四穴各十壯。服換骨丹一料。二月全愈。鬚眉更生。

風狂

此病由于心血不足。又七情六慾。損傷包絡。或風邪客之。故發風狂。言語無倫。持刀上屋。治法先灌聖散。父巨闕二三十壯。又灸心俞二穴各五壯。內服鎮心丹。定志丸。此證有陽明脈盛可愈也有暴折而難決為怒狂者奪其食則已治之以生鉄落飲二證皆狂之實者也然虛證常多不可誤治設一差訛害人反掌有心血不足而病者有腎水虧損而病者有神志俱不足而病者有因驚恐而病者有因妄想而病者是皆虛證體察而治斯無悖矣

治驗

一人得風狂已五年。時發時止。百發不效。余為灌聖散三錢。先灸巨闕五十壯。醒時再服。又灸心愈五十壯。服鎮心丹一料。余曰。病患已久。須大發一回方愈。後果大發。一日全好。一婦人產後得此證。亦如前灸。服薑附湯而愈。

口眼喎斜

此因賊風入舍于陽明之經。其脈挾口環唇。遇風氣則經脈牽急。又風入手太陽經。亦有此證。治法當灸地倉穴二十壯。艾炷如小麥粒大。左喎灸。右喎灸。後服八風散。三五七散。一月全安。此證非中風兼證之口眼喎斜乃身無他苦而單現此者是賊風之客也然有筋脈之異傷筋則痛傷脈則無痛稍有差別治法相同

破傷風

凡瘡口或金刃破處。宜先貼膏藥以禦風。不然致風氣入內。則成破傷風。此證最急。須早治。遲則不救。若初得此時。風客太陽經。令人牙關緊急。四肢反張。項背強直。急服金華散。連進二三服。汗出即愈。若救遲則危篤。額上自汗。速灸關元三百壯可保。若真氣脫雖灸無用矣。此證所為害甚大。雖一毛孔之傷。有關性命之急。一人因拔鬚二莖。忽然腫起。不食。有友人詢余。余曰。此破傷風也。速灸為妙。瘡醫認作懿疔治。以寒涼不數日發癆而死。

洗頭風

凡人沐頭後。或犯房事。或當風取涼。致賊風客入太陽經。或風府穴。令人卒仆。口牙皆緊。四肢反張。急服薑附湯。甚者灸石門穴三十壯。此證若無房事之傷焉。至于此慎之慎之。

牙槽風

凡牙齒以刀針挑之。致牙根空露。為風邪所乘。令人齒齦急者。潰爛於頸刻。急服附薑湯。甚者灸石門穴。督主骨齒乃骨之餘破傷宣露風邪直襲督經致潰爛于俄頃含薑附而用寒涼為變可勝道哉。

水腫

此證由脾胃素弱。為飲食冷物所傷。或因病服攻尅涼藥。損傷脾氣。致不能通行水道。故流入四肢百骸。令人偏身浮腫。小便反澀。大便反泄。此病最重。世醫皆用利水消腫之藥。乃速其斃也。治法先灸命關二百壯。服延壽丹。金液丹。或草神丹。甚者薑附湯。五七日病減。小便長。大便實。或潤能飲食為効。惟喫白粥一月後。喫餅麵無妨。須常服金液丹來復丹。永瘥。若曾服芫花。大戟。通利之藥。損其元氣。或元氣已脫。則不可治。雖灸亦無用矣。若灸後瘡中出水。或雖服丹藥。而小便不通。皆真元已脫。不可治也。脈弦大者易治。沉細者難痊。

治驗

一人病。四肢皆腫。氣促。食則脹悶。止喫稀粥。余令日服金液丹百粒。至四日。覺大便滑。再二日。乃今喫麵食亦不妨。蓋治之早也。

一婦人病。面脚皆腫。飲食減少。世醫皆作血虛。治之不効。余曰。非血病。乃脾胃虛也。今日服

延壽丹十粒。全真丹五十粒。至十日。覺大便滑病愈。

俞翰林母七旬餘平日患咳喘疾紅常服滋陰涼潤之劑。秋月忽患水腫。喘急難忍。日漸脹。飲食少進。則氣急欲死。諸醫用藥無効。乃延予治。六脈弦大而急。按之益動而空。予曰。此三焦大氣虛憊。不能歸根而浮于外。水隨氣奔。致充郛郭而溢皮腠。必須重

溫以化否則不救。彼云吾素內熱不服溫補片薑入口疾即帶紅先生所論故是第恐熱藥不相宜也。予曰有是病服是藥成見難孰且六脈緊大陽已無根無根卽脫矣。此皆平日久寒涼所致。若再捨溫補不用恐無生理。請辭彼云但不迫動血證敢不從命。予以附桂薑萸十味入參三錢不三劑而腹有緩文八劑全消飲食如故。又二劑而全愈。痰喘吐紅舊證竟不發矣。○一婦因子遠出饗食不給憂愁成病變為水腫喘急粥飲不入者月餘矣。友人見余談及此婦乃謂予曰肯做一好事否。予曰既云好事焉敢違命。遂偕往診見其六脈欲絕。解突腰圓喘難着席。脾腎之敗不可為矣。因處十味方。命服四劑喘微定而腫漸消覺思人亦大快。

膨脹

此病之源與水腫同。皆因脾氣虛衰而致。或因他病攻損胃氣致難運化而腫大如鼓也。病本易治。皆由方書多用利藥。病人又喜于速效。以致輕者變重。重者變危。甚致害人。黃帝正法先灸命關百壯。固住脾氣。爻至五十壯。便覺小便長。氣下降。再灸關元三百壯。以保腎氣。五日內便安。服金液丹。草神丹減後。止許喫白粥。或羊肉汁。泡蒸餅食之。瘥後常服全真丹。來復丹。凡臌脹脈弦緊易治。沉細難痊。此病若帶四肢腫者。溫之于早尚可奏功。若單腹脹而更青筋浮露者難治。苟能看破一切視世事如浮雲。置此身于度外。方保無虞。次則慎起居。節飲食。遠房帷。戒情性。重溫急補。一中可救。二三先生之丹。义用之得宜。其庶幾乎。

治驗

一人因飲冷酒。喫生菜。成泄瀉。服寒涼藥。反傷脾氣。致腹脹。命灸關元三百壯。當日小便長有下氣。又服保元丹半斤。十日即愈。再服全真丹。永不發矣。

暴注

凡人腹下有水聲。當即服丹藥不然變脾泄害人最速。暴注之病由暑月食生冷太過損其脾氣故暴注下泄不早治三五日瀉脫元氣方書多作尋常治之河間又以為火用涼藥每害人性命治法當服金液丹草神丹霧靈湯薑附湯皆可若危篤者灸命關二百壯可保若灸遲則腸開洞泄而死。脾泄之病世人輕忽時醫亦邀視之而不知傷人最速鹽商薛汝良午間注泄速矣能救先生之論誠非謬也

治驗

一人患暴注因憂思傷脾也。腹金液丹霧靈湯不効蓋傷之深耳。灸命關二百壯小便始長。

休息痢

痢因暑月食冷及濕熱太過損傷脾胃而致。若傷氣則成白痢服如聖餅全真丹金液丹亦可。若傷血則成赤痢服阿膠丸黃芩芍藥湯初起腹痛者亦服如聖餅下積血而愈此其輕者也。若下五色魚腦延綿日久飲食不進者此休息痢也最重不早治十日半月害人性命治法先灸命關二百壯服草神丹霧靈湯三日便愈過服寒涼下藥必死。痢至休息無已者非處治之差即調理之誤或飲食之過

所以止作頻仍延綿不已然欲使其竟止亦頗費手有肺氣虛陷者有腎陰不足者有脾腎兩腑者有經脉內陷者有肝木乘脾者有腐穢不清者有固澀太早者有三焦失運者有濕熱傷脾者有生陽不足者有孤陰注下者有暑毒未清者有陰損陽盛者有風邪陷入者一一體察得其病情審治的當自能應手取效

治驗

一人病休息痢已半年。元氣將脫。六脈將絕。十分危篤。余為灸命關三百壯。關元三百壯。六脈已平。痢已止。兩脇刺痛。再服草神丹。霧靈湯。方愈。一月後大便二日一次矣。

一人病休息痢。余令灸命關二百壯。病愈二日。變注下。一時五七次。令服霧靈湯。二服立止。後四肢浮腫。乃脾虛欲成水腫也。又灸關元二百壯。服金液丹十兩。一月而愈。

內傷

由飲食失節。損其脾氣。輕則頭暈發熱。四肢無力。不思飲食。脈沉而緊。服來復全真。及平胃散。重者六脈浮緊。頭痛發熱。吐逆心下痞。服草澄茄散。來復全真而愈。若被庸醫轉下涼藥。重損脾氣。變生他病。成虛勞。臌脹泄瀉等症。急灸中脘五十壯。關元百壯。可保全生。若服涼藥速死。
內傷之證。飲食其一端也。又有勞倦鬱怒憂悲思慮喜樂驚恐惡怒奇慾皆由七情不以次入直傷。五藏更有由房室跌撲而成內傷者。臨證之工不可不察。

霍亂

霍亂由於外感風寒。內傷生冷。致陰陽交錯。變成吐瀉。初起服珍珠散二錢即愈。或金液丹百粒亦愈。如寒氣入腹。搏于筋脈。致筋抽轉。卽以瓦片燒熱。紙裹絡筋轉處。立愈。若吐瀉後。胃氣大損。六脈沉細。四肢厥冷。乃真陽欲脫。灸中脘五十壯。關元三百壯。六脈復生。不灸則死也。
霍亂之證。三焦失運。中土受傷。一時心疼腹痛。吐利頻作。揮霍撩亂。煩劇不寧。大法溫其三焦。調其亂中土。一劑可愈。至若厥冷無脈。非重用溫補。不可否。則轉筋入腹而死。近世時醫不云中暑。即言痧發。禁用官料競事涼水。利其廉。共針其曲澤。以大泄其血。不知脾胃受傷。中焦之榮血已竭。而復大泄之。譬下井而投以石也。此種醫人不顧人命。真狠心虎腹人邪。存救人之心者。當須體察。

暑月傷食泄瀉

凡暑月飲食生冷太過傷人六府傷胃則注下暴泄傷脾則滑泄米穀不化傷大腸則瀉白腸中痛皆宜服金液丹。霹靂湯三日而愈不愈則成脾泄急灸神闕百壯。神闕恐是命關之誤難經雖言五泄不傳治法凡一應泄瀉皆依此法治之。

治驗

一女人因泄瀉發狂言六脈緊數乃胃中積熱也詢其丈夫因喫胡椒生薑太多以致泄瀉五日後發狂言令服黃芩知母湯而愈平日恣啖炙燉喜食椒姜胃中積熱者有此一證臨證自明然亦希遇更有瀉脫津液致舌胎乾燥發熱神昏譙妄不寧者此脾腎大虛法當溫補若用寒涼虛脫立見

痢疾

凡人勿食生冷濕熱傷其脾胃致成痢疾初起服如聖餅子下積而愈若無大便止下赤膿者乃胃有大熱傷血者宜當歸芍藥湯阿膠湯若下白膿者乃飲食冷物傷大腸也服桃花湯全真丹而愈若腹痛發熱昏睡六脈洪數純泄赤濃乃熱氣滯于腸胃也名痞蠱痢亦有錯服熱藥而得者服黃連丸甚者大通散痢疾固當化積清熱香連承氣等方用果得宜何嘗不應乎以溫補為要也蓋熱藥之誤易于轉手涼藥之誤救治殊難虛表以應臨證誤人自少

傷脾發潮熱

此因飲食失節損及脾胃致元氣虛脫令頭昏腳弱四肢倦怠心下痞悶午後發熱乃元氣入陰分也服全真丹草澄茄散三月而愈若服滋陰降火涼藥其病轉甚若俗醫用下藥致病

危篤。六脈沉細。爻中脘五十壯。關元一百壯。可保。遲則脾氣衰脫而死。庸醫于此證不知誤殺人變為虛脫小兒轉為脾風而猶曰風暑難清痰熱為害及至垂斃醫者云人力已竭病家云天數難挽至死不悟良可悲哉

嘔吐反胃

凡飲食失節。冷物傷脾胃。雖納受而脾不能運。故作吐。宜二聖散。草神丹。或金液丹。若傷之最重。再兼六慾七情有損者。則飲蓄于中焦。令人朝食暮吐。名曰番胃。乃脾氣太虛。不能健運也。治遲則傷人。若用攻尅。重傷元氣。立死。須灸左命關二百壯。服草神丹而愈。若服他藥。則不救。

嘔吐一證先當審其所因。輕者二陳平胃。藿香正氣一劑可定虛者六君子理中亦易為力。唯重者一時暴吐。厥逆汗出。稍失提防。躁脫而死。不可不知。至于番胃。雖屬緩證。治頗棘手。惟在醫者細心。病人謹攝治以丹艾。庶可獲全。不然生者少矣。

痞悶

凡飲食冷物太過。脾胃被傷。則心下作痞。此為易治。宜全真丹。一服全好。大抵傷胃則胸滿。傷脾則腹脹。腹脹者易治。宜草神丹。金液全真來復等。皆可服。寒甚者薑附湯。此證庸醫多誤下藥。致一時變生腹大水腫。急灸命關二百壯。以保性命。遲則難救。此證乃內經所謂陽畜積病死之證。不可以誤治也。若腹脹所謂藏寒生滿病。是也。苟不重溫。危亡立至。

治驗

一人因暑月食冷物。以致胸腹脹悶欲死。服金液丹百丸。少頃加全真丹百丸。即有氣下降。

而愈。

夏月伏陰在內一切冷物在所禁食若不慎而致傷者不重則溫化惡得不變

一小兒食生杏致傷脾悶欲死灸左命關二十壯即愈。又服全真丹五十九。

生杏在大人尚不可食况

小兒乎溫中藥內入些少麝香為妙

一人每飯後飲酒傷其肺氣致胸膈作脹氣促欲死服鍾乳粉五膈散而愈。若重者爻中府

穴亦好服涼藥則成中滿難治矣。

酒後吃飯中氣不傷若飯後飲酒清氣濁亂所以致脹

一人慵懶飲食即卧致宿食結于中焦不能飲食四肢倦怠令灸中脘五十壯服分氣九丁

香丸即愈。

修養書云飯後徐徐行百步自然食毒自消磨食後即卧食真中宮升降有幸焉得不病

中暑

凡此病脈大而緩其候飲食不減起居如常但時發煩熱渴飲無度此暑證也易治知母散一服便愈若煩熱困倦不食者暑氣傷胃也服溫中湯藥即愈若服香薷六一寒涼等劑冰損胃氣多致變瘧痢泄瀉諸證慎之若暑氣客于心包絡之經令人譫言煩渴欲飲冷水小便秘澀大便下赤水當服阿膠丸當歸芍藥湯而愈若暑月飲食冷物寒邪入客胃中致腹中作痛宜金液草神全真來復等丹連二服便愈若以涼藥下之變為中滿脾泄若元氣虛早間行路冷氣入腹令人心肚作痛宜服金液丹或來復丹凡暑月人多食冷物若常服金液全真來復保元等丹自然脾胃調和飲食不傷但少壯人須五日一次恐熱上攻眼目也

中暑之證原只尋常苟渴飲無度知母散可服若因倦不食便當溫中設暑客于心包絡譫煩飲冷消滯便赤清心涼血膏一劑可愈者若今之醫家將一切內傷虛寒之證亦認為暑恣用寒涼朝夕靡已及變陰深冷脫猶

云暑邪內攻。病勢深重難挽回矣。間遇明眼高手。投以參附。猶且從中阻。燒泊。投之有効。輒覲顏支節。我原欲轉手不謂渠意亦同。投之不効。讒言蜂起。一肩卸却罪歸參附。病家本不識病。情未免隨之怨恨嗟嗟。此種醫人。天良盡喪。予具熱陽。常遭此輩謗累。因書此以志慨。

暑月脾燥病

凡夏月冷物傷脾。又兼暑氣客之。則成燥病。令人發熱作渴不止。六脈弦大。乃火熱傷肺。而津液不能上輸也。有脾胃之分。若發燥熱而能食者。熱在胃也。易治。服全真丹。革澄茄散。而愈。若發燥熱。不進飲食。四肢倦怠。熱在脾也。為重服金液草神。或來復等丹。五日而愈。如作暑治。下以涼藥。熱雖暫退。必變為中滿洞泄諸證。暑月發熱。務分虛實。六脈沉數。飲食如常者。為實熱。服薄荷煎而愈。若六脉弦緊。減食倦忘者。為虛熱。大忌寒涼。宜全真來復等丹而愈。夏月發熱而大誰肯不作暑治。而不用寒涼者。不知暑熱薰蒸耗人元氣。元氣既傷。未有不渴。冷物傷脾。有辛輸灌三焦。失運腠理不和。發熱作渴。自所不免。且六脈弦大。弦則為減。大則為虛。體驗果真一溫可解。今之醫家專尚香薷青蒿黃連滑石等劑。變為澀泄。猶云協熱及至虛脱。全然不覺。此由脈理清明誤主。作賊之誤也。

兩腸連心痛

此證由憂思腦怒。飲食生冷。醉飽入房。損其脾胃。又傷肝氣。故兩腸作痛。庸醫再用寒涼藥。重傷其脾。致變大病。成中滿番胃而死。或因腦怒傷肝。又加青陳皮。枳壳實等。重削其肝。致令四

肢羸瘦。不進飲食而死。治之正法。若重者。六脈微弱。羸瘦。少飲食。此脾氣將脫。急灸左命關二百壯。固住脾氣。則不死。後服金液全真來復等丹。及華澄茹散。隨證用之。自愈。此證古法在左血不消。憤怒所傷。在右則為疾。為飲為食。積氣帶此皆標病。易于治療。若宗氣有乖虛里作楚榮氣失調。脾絡作痛。此非積漸溫養不愈。至若兩腸連心。痛如刀刺。此三陰受損。迷于膈盲之藥。原若泥古方。耑干剝削。未有不死者也。

消渴

此病由心肺氣虛。多食生冷。冰脫肺氣。或色慾過度。重傷于腎。致津不得上榮。而成消渴。蓋腎脈貫咽喉。係舌本。若腎水枯涸。不能上榮于口。今人多飲。而小便反少。方書作熱治之。損其腎元。誤人甚多。正書春爻氣海三百壯。秋爻關元二百壯。日服延壽丹十九。二月之後。腎氣復生。若服降火藥。暫時有効。日久肺氣漸損。腎氣漸衰。變成虛勞而死矣。此證大忌酒色。生冷硬物。若脾氣有餘。腎氣不足。則成消中病。脾實有火。故善食而消。腎氣不足。故下部少力。或小便如疳。孫思邈作三焦積熱。而用涼藥。損人不少。益脾雖有熱。而涼藥瀉之。熱未去而脾先傷敗。正法先灸關元二百壯。服金液丹一斤而愈。消渴雖有上中下之分。總由于損耗津液所致。蓋腎為津液之原。脾為津液之本。本原虧而消渴之證。從瘦下消者。素問謂之鬲消渴。而多飲小便頻數中消者。素問謂之消中。消殺善飢。身體消不治之證也。大法以救津液壯水火為生。

治驗

一人頻飲水。而渴不止。余曰。君病是消渴也。乃脾肺氣虛。非內熱也。其人曰。前服涼藥六劑。

熱雖退。而渴不止。覺胸腸氣痞而喘。余曰。前證止傷肺脾。因涼藥復損元氣。故不能健運。而水停心下也。急灸關元氣海。各三百壯。服四神丹。六十日津液復生。方書皆作三焦猛熱。下以涼藥。殺人甚于刀劍。慎之。涼者受傷不惟消渴亦兼雜病而誤用寒涼者不少時醫以此殺人而人不悟奈何

着惱病

此證。方書多不載。人莫能辨。或先富後貧。先貴後賤。後暴憂暴怒。皆傷人五藏。多思則傷脾。多憂則傷肺。多怒則傷肝。多欲則傷心。至于憂時加食。則傷胃。方書雖載內因。不立方法。後人遇此。皆如虛證治之。損人性命。其證若傷肝脾。則泄瀉不止。傷胃則晝不省人事。傷腎則成瘍瘍。傷肝則失血筋攣。傷肺則咯血吐痰。傷心則顛胃。當先服薑附湯。以散邪。後服金液丹。以保脾胃。再詳其證而灸之。若脾虛。灸中府穴。各二百壯。腎虛灸關元穴。三百壯。二經若實。自然不死。後服延壽丹。或多服金液丹而愈。涼藥服多。重損元氣則死。此證皆因七情所傷五志之過審其所因而調治之庶無失誤

治驗

一人年十五。因大憂大惱。却轉脾虛。庸醫用五苓散。及青皮枳壳等藥。遂致飲食不進。胸中作悶。余令灸關元二百壯。飲食漸進。灸關元五百壯。服薑附湯一二劑。金液丹二斤。方愈。方書混作勞損。用溫平小藥。誤人不少。悲夫。大憂惱而得脾泄。醫用五苓青皮枳壳變尚如此近有六脈虛脫脾腎敗壞。猶云不妨而用此藥者。又庸醫中之廝穢也。

此證因冷痰聚于腦。又感風寒。故積而不散。令人頭旋眼暉。嘔吐痰涎。老年人宜服附子半夏湯。少壯人宜服半夏生姜湯。若用涼劑。則暫時有效。痰愈凝而愈固。難以速效矣。此即所謂頭瘡聚腦。又感風寒之說。若頭暉則純屬於虛。蓋肝虛則血不上榮。肺虛則清陽不運。腎虛則厥成。頰疾心虛則火炎浮越。夫風虛痰火間或有之。至于頭風虛證。不少不可不知。

治驗

一人頭風發。則旋暉嘔吐。數日不食。余為針風府穴。向左耳入三寸。去來留十三呼。病人頭內覺麻熱。方令吸氣出針。服附子半夏湯。永不發。華陀針曹操頭風。亦鍼此穴。立愈。但此穴入針。人即昏倒。其法向左耳橫下針。則不傷大筋而無暉。乃十金妙法也。此針法奇妙。須與誤得無

一人起居如常。但時發頭痛。此宿食在胃脘也。服丁香九十粒而愈。

厥證

素問云。五絡俱絕。形無所知。其狀若尸。名為尸厥。由憂思驚恐。致胃氣虛閉于中焦。不得上升下降。故昏冒強直。當灸中脘五十壯。即愈。此證婦人多有之。小兒急慢驚風。亦是此證。用藥無効。若用吐痰下痰藥。即死。惟灸此穴。可保無虞。令服來復丹。草證茄散而愈。厥證經言詳矣。尸端外有血厥。痰厥。厥煎。厥薄。厥總皆根氣下虛之證。所謂少陰不至者厥也。又云內脊而厥。則為瘡瘕。此腎虛也。

治驗

一婦人產後發昏。二目滯澁。面上發麻。牙關緊急。二手拘攣。余曰。此胃氣閉也。胃脈挾口環

唇出于齒縫。故見此證。令灸中脘穴五十壯。即日而愈。

產後血厥倉公白微散

一婦人。時時死去。已二日矣。凡醫作風治之不効。灸中脘五十壯即愈。

氣脫

少年酒色太過。脾腎氣虛。忽然脫氣而死。急灸關元五百壯。服霹靂湯。姜附湯。金液丹。久久而愈。此證須早治。遲則元氣亦脫。灸亦無及矣。

更有血脫神脫精脫津脫液脫。若汗脫即津液脫也。

死脈見

此由少年七情六慾所損。致晚年真氣虛衰。死脈見于兩手。或十動一止。或二十動一止。皆不出三年而死。又若屋漏雀啄之類。皆是死脈。灸關元五百壯。服延壽丹。保元丹。六十日後。死脈方隱。此仙師不傳之妙法也。

雍正三年初冬。一董姓者。來求診脈。其脈或二動一止。或七動一止。或十二動一止。或十七動一止。此心絕脈也。仲冬水旺。其何能生。始定參芪草附河車臍帶桂心棗仁等方與之服。十劑脈之歇止。參差不似前之有定數矣。

可生全者

腰痛

老年腎氣衰。又兼風寒客之。腰髋髀作痛。醫作風痺走痛治。用宣風散。趁痛丸。重竭真氣。誤人甚多。正法服姜附湯散寒邪。或全真丹。灸關元百壯。則腎自堅牢。永不作痛。須服金液丹。以壯元陽。至老年不發。

老年腰痛而作風氣痺證治者多致大害。即使風痺重用溫補亦能散去。

中風人氣虛中滿

此由脾腎虛憊。不能運化。故心腹腹滿。又氣不足。故行動則胸高而喘。切不可服利氣及通快藥。令人氣愈虛。傳為脾病。不可救矣。宜金液丹。全真丹。一月方愈。重者。灸命關元二百壯。腎經則生氣之原。乏脾虛則健運之力。微氣虛中滿之證作矣。又內經謂藏寒生滿病。醫人知此。不行割削重劑。溫補為變者少矣。

老人兩脇痛

此由胃氣虛。積而不通。故腸下脹悶。切不可認為肝氣。服削肝寒涼之藥。以速其斃。服草神金液。十日重者。灸左食竇穴。一灸便有下氣而愈。再灸關元百壯。更佳。老人與病後及體虛人兩更須察其兼證。有無虛實。治頗不易。

治驗

一人脾氣虛。好食冷物。不消。常覺口中出敗卵臭。服草神丹即愈。若服全真金液亦効。脾胃食所傷。不可再施消滯。惟治以溫化。則自健運矣。

一人脾氣虛。致積氣留于腸下。兩肋常如流水。多服草神丹而愈。脾虛致積。當用溫行水流。腸下更仗溫化。

疝氣

由于腎氣虛寒。凝積下焦。服草神丹。灸氣海穴自愈。此證內經論五臟皆有而後人以病由于肝先生言。因腎氣虛寒總不若丹艾之妙。吞酸

凡人至中年。脾氣虛弱。又傷生冷硬物。不能運行。蘊積中焦。久之變為鬱火停痰。故令噫氣。久則成中滿腹脹之證。須服草神丹。全真丹。金液丹。皆可。吞酸為病。雖微致害。非淺。尚不慎節。飲食戒謹。房幃久久。無不變成臌脹。

脾瘡

凡瘡病。由于暑月。多吃冰水冷物。傷其脾胃。久而生瘡。古今議論。皆差。或指暑邪。或分六經。或云邪祟。皆謬說也。但只有脾胃之分。胃瘡易治。脾瘡難調。或初起一日一發。或間日一發。乃陽明證也。清脾飲。截瘡丹。皆可。若二三日一發。或午後發。綿延不止者。乃脾瘡也。此證若作尋常治之。誤人不少。正法當服全真草神四神等丹。若因重日久。肌膚漸瘦。飲食減少。此為最重。可灸左命關百壯。自愈。窮人艱于服藥。只灸命關亦可愈。凡久瘡。止灸命關下火便愈。實秘法也。

脾瘡原屬正虛治得其法應手即愈而世人競尚柴胡攻多補少不知元氣既虛又拔其本以致耽延時日變端百出先生灸法實可宗主

治驗

一人病瘡月餘。發熱未退。一醫與白虎湯。熱愈甚。余曰。公病脾氣大虛。而服寒涼。恐傷脾胃。病人云。不服涼藥。熱何時得退。余曰。內經云。瘡之始發。其寒也。列火不能止。其熱也。冰水不能遏。當是時。良工不能措其手。且扶元氣。待其自衰。公元氣大虛。服涼劑退火。吾恐熱未去。而元氣脫矣。因為之灸命關。纔五七壯。腸中有氣下降。三十壯全愈。久瘡而用白虎真所謂盲人說瞎話也。繆仲醇

一代名醫論多出此。竊所未解。予觀廣筆記。疑其所學全無已。莫至子本草經疏設立許多禁忌。令後人疑惑。信相半。不敢輕用。為患匪細。

胃瘡

素問。論瘡而無治法。十金雖傳治法。試之無効。凡人暑月。過啖冷物。輕則傷胃。重則傷脾。若初起。先寒後熱。一日一發。乃胃瘡也。易治。或吐或下。不過十日而愈。扁鵲正法。服四神丹。甚者灸

中脘穴三十壯愈。此證感淺病輕人多忽畧雍正三年秋冬之交人皆病此重劑溫補或可幸其溺用寒涼雖一誤免投藥少差立見冰脫用清解小柴胡者皆不能起寧紹之人死者比比以再誤而終不悟也。

邪祟

比證皆由元氣虛弱或下元虛憊憂恐太過損傷心氣致鬼邪乘虛而入令人昏迷與鬼交通當服睡聖散灸巨闕穴二百壯鬼氣自滅服姜附湯而愈。邪祟烏能着人人自着之耳果立身鬼神欽敬不遑何邪祟之敢來哉惟其陰幽偏頗卑悰晉蒸之輩多能惑此有似邪祟之附着究非邪祟也蓋由人之藏氣受傷而神魂失守故肝藏傷則意不寧而白衣人來搏擊心藏傷則神不安而黑衣人來毆辱肺藏傷則魄不守而紅衣人來斥辱此皆神氣受傷以至妄有聞見不覺其見乎定其志魄審其何藏之虛而補之何藏之乘而制之可也。

治驗

一婦人因心氣不足夜夜有少年人附着其體診六脈皆無病余令灸上脘穴五十壯至夜鬼來離牀五尺不能近服姜附湯鎮心丹五日而愈。

一貴人妻為鬼所着百法不效有一法師書天醫符奏玉帝亦不效余令服睡聖散三錢灸巨闕穴五十壯又灸石門穴三百壯至二百壯病人開眼如故服姜附湯鎮心丹五日而愈一婦人病虛勞真氣將脫為鬼所着余用大艾大灸關元彼難忍痛乃令服睡聖散三錢復灸至一百五十壯而醒又服又灸至三百壯鬼邪去勞病亦瘥。

怔忡

凡憂思太過。心血耗散。生冷硬物。損傷脾胃。致陰陽不得升降。結于中焦。令人心下恍惚。當以來復丹。金液丹。草澄茄散治之。若心血少者。須用獨骸大丹。次則延壽丹亦可。憂思之傷。怔忡之殊。審證施治。自然無誤。

心痛

皆由鬱火停痰而作。飲食生冷。填于陽明。太陰分野。亦能作病。宜全真丹。若胃口寒甚。全真丹或薑附湯不愈。灸中脘七十壯。若脾心痛發而欲死。六脈尚有者。急灸左命關五十壯。而甦內服來復丹。草澄茄散。若時痛時止。吐清水者。乃蛔攻心包絡也。服安蟲散。若卒心痛。六脈沉微。汗出不止。爪甲青。足冷過膝。乃真心痛也。不治。心為一身之主宰。一毫不可犯處。正無偏豈宜受病。凡痛非心痛。乃心之包絡痛與脾痛。胃痛異。大柴胡者為多屬實者。間亦有之。審察而治。庶無差錯。

痺病

風寒濕三氣合而為痺。走注疼痛。或臂腰足膝拘攣。兩肘牽急。乃寒邪湊于分肉之間也。方書又邪入于陰。則為痺。故凡治痺。非溫不可。方書些作實治。然屬虛者。亦頗不少。

神疑病

凡人至中年。天數自然虛衰。或加妄想憂思。或為功名失志。以致心血大耗。癡醉不治。漸至精

氣耗盡而死。當灸關元穴三百壯。服延壽丹一斤。此證尋常藥餌皆不能治。惟灸火及丹藥可保無虞。此乃失志之證。有似癡呆或如神崇自言自笑神情若失。行步若聽非大。遂其志不能愈。故愈者甚少。

治驗

一小兒因觀神戲受驚。時時悲啼。如醉不食。已九十日危甚。令灸巨闕五十壯。卽知人事。曰
適間心上有如大滾下。卽好。服鎮心丸而愈。驚則神無所倚。痰涎入客包絡。宮城受傷。心不
緩。驚鍛抱龍丸多矣。

一人功名不遂。神思不樂。飲食漸少。日夜昏默。已半年矣。諸醫不効。此病藥不能治。令灸巨闕百壯。關元二百壯。病減半。今服醇酒一日三度。一月全安。蓋醺酣忘其所慕也。失志不遂
遣性情不可以灸法保其要。醉酒陶其情。此法妙極。

下注病

貧賤人久卧濕地。寒邪客于腎經。又兼下元虛損。寒濕下注。血脈凝滯。兩腿粗腫。行步無力。漸至大如瓜。○方書皆以消濕利水治之。損人甚多。今灸湧泉三○水山各五十壯。卽愈。
俗名蘇狀怪異可畏。終身之疾。鮮有愈者。先生灸法未知驗否。

脚氣

卜元虛損。又久立濕地。致寒濕之氣客于經脈。則雙足腫痛。行步少力。又暑月冷水濯足。亦成乾脚氣。發則連足心腿脣。腫痛如火燎。或發熱惡寒。治法。灸湧泉穴。則永去病根。若不灸。多服

金液丹亦好。平常藥暫時有效。不能全除。其不能行步者。灸關元五十壯。大忌涼藥泄傷腎氣。變為中滿腹脹而死。久患脚氣。人濕氣上攻。連兩脇腰腹肩臂拘攣疼痛。乃腎經濕盛也。服宣風丸五十粒。微下而愈。然審果有是證者可服。若虛人斷不可輕用。但此證發則上衝心胸。嘔吐煩悶甚為危險。即內經所謂厥逆是也。輕者疏通經通解散寒濕于壯熱氣逆嘔吐筋急入腹。閼亂欲絕。此邪衝入腹危險更甚。非重用溫化不可。如茱萸姜附等藥皆用之。至如剝削過度。脈微欲絕。變成虛寒。往往不起。不可謂疎疾而不利于補補也。

治驗

一人患脚氣。兩骭骨連腰。日夜痛不忍。為灸湧泉穴五十壯。服金液丹。五日全愈。似痛脾此證須細審的確方可通用。

足痿病

凡腰以下。督氣主之。督虛則下部無力。筋骨不用。可服金液丹。再灸關元穴。則督氣復長。自然能行動矣。若腎氣虛脫。雖灸無益。此證內經皆言五臟虛熱。故後人有補陰虎潛金剛地黃等。此證亦頗不少。臨審詳自有分曉。

治驗

一老人腰脚痛不能行步。令灸關元三百壯。更服金液丹。強健如前。

黃疸

暑月飲食冷物。損傷脾腎。脾主土。故見黃色。又脾氣虛。脫濁氣停于中焦。不得升降。故眼目偏
身皆黃。六脈沉緊。宜服草神丹。及金液全真來復之類。重者。灸食竇穴百壯。大忌涼藥。此證第
一要審陰陽黃必身色光明脈來洪滑善食發渴此皆實證清濕熱利小便可愈若身熱脈浮亦可
發表陰黃則身色晦暗神思困倦食少便溏脈來無力重用溫補則小便長而黃自退若誤作
陽黃治之為變非細又一種膚黃證因大驚卒恐膽傷而
泄于外為病嚴重惟覺之早而重用溫補者尚可挽回

治驗

一人偏身皆黃。小便赤色而澀。灸食竇穴五十壯。服姜附湯全真丹而愈。

黑疽

由于脾腎二經。縱酒貪色。則傷腎。寒飲則傷脾。故兩目偏身皆黃黑色。小便赤少。時時腸鳴。四肢困倦。飲食減少。六脈弦緊。乃成腎癆。急灸命關三百壯。服草神丹。延壽丹而愈。若服涼藥必死。

便閉

老人氣虛。及婦人產後。少血致津液不行。不得通流。故大便常結。切忌行藥。是重損其陰也。止服金液丹。久久自潤。或潤腸丸亦可。又大小便主腎。腎開竅于二陰。能運行津液。若腎氣虛。則二便皆不通。亦服金液丹。腎氣壯。則大小便自利矣。有陳姓鹽商年七十六矣。春時患中風脫
閉。結不行。日登廁數十次。冷汗大出。面青肢厥。一馬姓醫用滋補劑。入生大黃三錢。予深以為
不可。戒之曰。老年脫後。幸參附救全。不能安養過于思慮以致津液枯竭。傳送失宜。惟可助氣
滋津。佐以溫化自然。流通何事性急。以速其變。若一投大黃。往而不返。恐難于收功矣。姑忍二
三日。勢當自解。病者怪予遲緩。口出怨咎。之辭。至次日不得已。用人參二兩。從容一兩。常歸五

錢松柏仁各五錢附子三錢升麻四錢煎服外用絲
碧一斤入圓桶以滾水冲入扶其坐上一刻而通

溺血

凡膏梁人火熱內積。又多房勞。真水既涸。致陰血不靜。流入膀胱。從小便而出。可服延壽丹。甚者灸關元。若少壯人。只作火熱治之。然在因病制宜。大熱內積實證也。一劑終涼可解。房勞博腎虛證也。非溫補不可。審證而治。大有分

別

淋澄

此由房事太過。腎氣不足。致包絡凝滯。不能通行水道。則成淋也。服梔榔湯。鹿茸丸而愈。若包絡閑澀。則精結成砂子。從莖中出。痛不可忍。可服保命丹。甚者灸關元。淋濁之證。古人多用寒涼。分清通利之品。然初起則可久而虛寒。又當從溫補。一法亦

腸痺下血

此由飲食失節。或大醉大飽。致腸胃橫解。久之冷積。結于大腸之間。致血不流通。隨大便而出。病雖尋常。然有終身不愈者。庸醫皆用涼藥止血。故連綿不已。蓋血愈止。愈凝。非草木所能治也。正法先灸神闢穴百壯。服金液丹十兩。日久下白膿。乃病根除也。經云陰陽傷則血。內溢血不難。若不慎飲食。恣縱酒色。斷不能愈矣。亦在別其脈之強弱。色之鮮潤。該清該溫。愈亦

扁鵲心書卷下

古神醫盧人扁鵲傳

宋太醫真定竇材重集
清 錢塘胡廷參論

陰莖出濃

此由酒色過度。真氣虛耗。故血化為膿。令人漸漸贏瘦。六脈沉細。當每日服金液丹。霹靂湯。外敷百花散。五六日服中微痛。大便滑。小便長。忌房事。犯之復作。若灸關元二百壯。則病根去矣。遺滑淋濁無不由酒色之過。至于血出可謂劇矣。又至化血為膿。則腎虛寒而精腐敗。非溫補不可。更須謹戒。若仍不慎。必致泄氣而死。

腸癰

此由膏梁飲酒太過。熱積腸中。久則成癰。服當歸建中湯自愈。若近肛門者。用鍼刺之。出膿血而愈。此證身皮甲錯。腹皮急。眼如腫。甚者腹脹大轉。有水聲或繞脅生瘡。若臍間出膿者。不治大法以口口為主。若膿成口口而殞。

腸痔

此由酒色飲食太過。致經脈解而不收。故腸裂而為痔。服金液丹可愈。外取蠶腐婦字蟲十枚。當研爛攤紙上貼之。少刻痛止。若老人患此。須灸關元二百壯。不然。腎氣虛毒氣下注。則難用藥也。凡係咳嗽吐血。後大腸並肺虛極而熱。陷于大腸。多難收功。若專于治痔而不顧本原。未有不致斃也。

膏盲病

人因七情六慾。形寒飲冷。損傷肺氣。令人咳嗽。胸膈不利。惡寒作熱。可服全真丹。若服冷藥。則重傷肺氣。令人胸膈痞悶。昏迷上奔。口中吐冷水。如含冰雪。四肢困倦。飲食漸減。此乃冷氣入於肺中。侵于膏肓。亦名冷勞。先服金液丹。除其寒氣。再用薑附湯。十日可愈。或服五膈散。振氣散去肺中冷氣。重者。灸中府三百壯可愈。形寒飲冷之傷初起原不甚深重。醫人不明此證誤與涼藥積漸水溼致成膏肓之疾。及至氣奔吐冷寒熱無已。思轉手溫補仍與以滋陰退熱等劑以致不起。非是病殺乃醫殺也。

治驗

一人暑月飲食冷物。傷肺氣。致咳嗽。胸膈不利。先服全液丹百粒。泄去一行。痛減三分。又服五膈散。而安。但覺常發。後五年。復大發。灸中府穴五百壯。方有極臭。下氣難聞。自後永不再發。世醫不審。病因動云。暑月熱氣傷肺。一派寒涼致水氣不消。變成大病。

噎病

肺喜緩而惡寒。若寒氣入肺。或生冷所傷。又為庸醫下涼藥。冰脫肺氣。成膈噎病。覺喉中如物塞。湯水不能下。急灸命關二百壯。自然肺氣下降而愈。噎病之多死者。皆由咽中堵塞。飲食不能補。焉能得生。用先生灸法。甚妙。奈人不能信用何哉。

又有肺寒一證。令人頭微痛。多清涕。聲啞惡寒。肩背拘攣。脈微浮緊。當服華蓋散。重則姜附湯。忌冷物。此證不可誤認作癆證治。故表而出之。肺寒之證。世醫不識。不能用溫散。但用桑皮貝母。麥冬。玉竹等味。壅住寒邪。做成弱證者多矣。

咳嗽

咳嗽多清涕者，肺感風寒也。華蓋散主之。若外感風寒，內傷生冷，令人胸膈作痞，咳而嘔吐，五膈散主之。咳嗽煩躁者，屬腎。石膏丸主之。大凡咳嗽者，忌服涼藥。犯之必變他證。忌房事，恐變虛癆。久咳而額上汗出，或四肢有時微冷，間發熱困倦者，乃勞咳也。急煎闢元三百壯服金液丹保命丹。姜附湯須早治之。遲則難救。治咳嗽之法，若如先生因證制宜，馬有瘡疥不治之患敗及至用補，又不過以四君六味和平。如醫者輒以芩知桑杏為要藥，致肺氣冰伏脾腎虛之劑，和平之藥與之所謂養殺而已。

咳嗽病

此證方書名為哮喘。因天寒飲冷，或過食鹽物，傷其肺氣，故喉常如風吼聲。若作勞，則氣喘而滿。須灸天突穴五十壯。重者灸中脫穴五十壯。服五膈散或研蚯蚓一條，醋調服立愈。哮喘證遇逢勞則甚，審治得當，愈亦不難。然少有除根者。先生此法甚妙，請嘗試之。

失血

凡色慾過度，或食冷物太過，損傷肺脾之氣，故令人咯血。食前服鍾乳粉、金液丹。食後服阿膠散而愈。若老年多子酒色，損傷脾氣，則令人吐血。損傷腎氣，則令人瀉血。不早治，多死。當灸闢元三百壯。服姜附湯、金液丹自愈。傷肺氣，則血從鼻出。名曰肺衄。乃上焦熱氣上攻也。服全液丹，或口含冷水，以鬱金末調金項後，及鼻柱上。凡肺衄不過數杯，如出至升斗者，乃腫漏也。當作腦効。由真氣虛而血妄行，急灸闢元三十寸。留二十呼立止。再灸闢元二百壯。服金液丹草神丹。可保。失血之證，世人所畏，而醫人亦多縮手。其畏者為殞命之速，而成瘻瘍之易。縮手者恐不能識其原，而脫體之難，不知能究其原，察其因，更觀其色，辨其脈，或起于形體之勞，或成于

情忘之過由于外感者易治出于內傷者難痊絡脈與經隧有異輕淺而絡脈輕肝脾與肺腎不同肺腎難而肝脾易苟不訖其治法雖重難亦可挽回唯在辨別其陰陽權衡其虛實溫清補瀉各得其宜不可畏其失誤專尚寒涼逐漸消伏其生氣而致不可解者叱叱矣

治驗

一人患腦効日夜有數升諸藥不效余為針關元穴入二寸留二十呼問病人曰針不覺熱否曰熱矣乃令吸氣出針其血立止

一法治鼻効與腦効神方用赤金打一戒指帶左手無名指上如發作時用右手將戒指捏緊箍住則効止矣

腎厥

凡人患頭痛百藥不効者乃腎厥服石膏丸黑錫丹則愈此病多酒多色人則有之經云厥成云少陰不至者厥也頭痛之證腎虛者多若用他藥斷難奏效惟大溫補為是溫補不效其毋艾乎

治驗

一人因大腦悲傷得病晝則安靜夜則煩悅不進飲食左手無脈右手沉細世醫以死證論之余曰此腎厥病也因寒氣客肺腎二經灸中脘五十壯關元五百壯每日服金液丹四神丹至七日左手脈生少頃大便下青白膿數升許全安此由真氣大衰非藥能治惟艾火灸之此證非灸法不愈非丹藥不效二者人多之不能行醫人僅用泛常藥以治其何能生

脾勞

人因飲食失節。或吐瀉服涼藥。致脾氣受傷。令人面黃肌瘦。四肢困倦。不思飲食。久則肌肉瘦盡。骨立而死。急灸命關二百壯。服草神全液。甚者必灸關元。先天之原腎是也。後天之本脾是有_未自然藏腑。和平經脈。運行榮衛。貫通氣血。流暢又何勞病之有。病至于勞。則已極矣。非重溫補。何由得生。虞范溪強立五勞之證。所用皆係溫平涼劑。以此哭梨褐棗實。是賊害後人。

腎勞

夫人以脾為母。以腎為根。若房事酒色太過。則成腎勞。令人面黑而焦。筋骨無力。灸關元三百壯。服金液丹可生。遲則不治。

頭痛

風寒頭痛。則發熱惡寒。鼻塞肢節痛。華蓋五膈消風散。皆可主。若患頭風兼頭暈者。刺風府穴。不得直下針。恐傷大筋。則昏悶向左耳橫紋針下。入三四分。留去來二十呼。覺頭中熱麻是効。若風入太陽。則偏頭風。或左或右。痛連兩目。及齒。灸腦空穴二十一壯。其穴在腦後。入髮際三寸五分。再灸目窓二穴。在兩耳直上一寸五分。二十一壯。左痛灸左右痛灸右。頭風之病證候多端治得其法

眼病

肝經壅熱。上攻。致目生昏翳。先服洗肝散數劑。後服撥雲散。其翳自去。若老年人。腎水枯涸。不能上榮于目。致雙目昏花。漸至昏暗。變為黃色。名曰內障。服還晴丹。半月目熱。上攻。勿懼。此乃腎氣復生。上朝于目也。如覺熱。以手掌抹一番。光明一番。一月間。先生復舊矣。眼科用藥不循紀律。祇用一派。

發散寒涼所謂眼拉板是也。倘能盡如先生之法而行之。天下喪明皆少矣。

治驗

余家女婢忽二目失明。視之又無昏翳。細思此女年少精氣未衰。何緣得此證。良由性急多怒。有傷肝藏。故經脈不調而致。遂與密蒙花散一料。如舊光明矣。病有萬變醫止一心線索在手頭緒逼清河懼病休

之多端不愁治療之無術

夢泄

凡人夢交而不泄者。心腎氣實也。夢而即泄者。心腎氣虛也。此病生于心腎。非藥可治。當用紙撲長八寸。每夜緊繫陰囊。天明解之。自然不泄。若腎氣虛脫。寒精自出者。灸關元六百壯而愈。若人一見女子。精即泄者。乃心腎大虛也。服大丹五兩。甚者灸巨門五十壯。仲景云陰寒精自知精之不固。由于陽之不密。先生云腎氣虛脫。精自出。則溫補下元。為得法矣。世醫苟明此理。以治遺精。必不專事寒涼而致人夭枉矣。

奔豚

此由腎氣不足。又兼濕氣入客小腸。連脾發痛。或上或下。若豚之奔。或痛連外腎成疝氣者。服塌氣散。茱萸丸。金鈴子丸。或蟠葱散。奔豚與疝不同。混淆不得。從小腹而上抵心者。奔豚也。從痛欲死者。衝病也。從少腹而下達腎區者。小腸與狐疝也是有差別。不可不審。

肺膈痛

此證因肺虛。氣不下降。寒氣凝結。令人胸膈連背作痛。或嘔吐冷酸水。當服五膈散自愈。治此證若

失宜久久
必成膈證

骨縮病

此由腎氣虛。腎主骨。腎水既涸。則諸骨皆枯。漸至短縮。治遲則死。須加灸火。內服丹附之藥。非尋常草木藥所能治也。凡人年老逐漸尪矮。其猶骨縮之病乎。

治驗

一人身長五尺。因傷酒色。漸覺飢肉消瘦。予令灸關元三百壯。服保元丹一斤。自後大便滑小便長。飲食漸加。肌肉漸生。半年如故。此自消瘦與骨縮有間。不知何緣附此中間。疑有缺文。

手顫病

四肢為諸陽之本。陽氣盛則四肢實。實則四體輕便。若手足顫搖。不能持物者。乃真元虛損也。常服全液丹五兩。姜附湯自愈。若灸關元三百壯。則病根永去矣。手足顫搖終身痼疾。若傷寒。傷營而致者。宜以重劑扶陽。加以神氣昏亂者。亦不治。

老人便滑

凡人年少過食生冷硬物。致冷氣積而不流。至晚年脾氣一虛。則脇下如水聲。有水氣。則大便隨下而不禁。可服四神丹。姜附湯。甚者灸命門穴。此病須早治。遲則多有損人者。又脾腎兩虛。則小便亦不禁。服草神丹。五日即可見效。老人大便不禁。溫固法為妥。若連及小便。而用草神丹。中有硃砂琥珀。恐非其宜。

老人口乾氣喘

老人脾虛則氣逆冲上逼肺。令人動作氣喘。切不可用削氣苦寒之藥。重傷其脾。致成單腹脹之證。可服草神丹。金液丹。薑附湯而愈。甚者灸闢元穴。腎脈貫肺。繫舌本主。運行津液。上輸于肺。若腎氣一虛。則不上榮。故口常乾燥。若不早治。死無日矣。當灸闢元五百壯。服延壽丹半斤而愈。口乾氣喘。係根元虛。而津液竭。庸醫不思補救。猶用降削。若寒之品。不漸自己識力。不真聞者。尚不知其謬妄。仍奉之如神明。重踐覆轍者。不一而足。宣不妄哉。

耳聲

有為風寒所襲而聾者。有心氣不足而聾者。當服一醉膏。滾酒下。汗出而愈。若多酒色人。腎虛而致聾蔽者。宜先服延壽丹半斤。後服一醉膏。若實聾則難治。

腎開竅于耳。又胃之宗氣別走于耳。故耳聾一證屬虛者多今

言心氣不足而用一醉膏此理未解。又云實聾者難治。尚俟細參。

琦按人于六十外精神強健。不減少壯。而惟耳重聽。乃腎氣固藏之微。多主老壽。不須醫治。此書所謂若實聾則難治者。當是指此一種。

氣壅

若山居人。溪澗中有薑理石。飲其水。令人生瘻瘤。服消風散。當是消瘻散。初者服薑附湯。若血癰血癟。則不可治。妄治害人。

三蟲

三蟲者。蛔蟲。蟻蟲。寸白蟲也。幼時多食生冷硬物。及腥厭之物。久之生蟲。若多食牛肉。則生寸白。其蛔蟲長五六寸。發則令人心痛。吐清水。貫心則死。寸白蟲如葫蘆子。子母相生。長二三寸。

發則令人腹痛。蟻蟲細如髮。隨氣血周遊。遍身出皮膚化為瘋癩。住腹中為蟻瘕。穿大腸為痔漏。俱宜服安蟲散。若人穀道痒痛。當用輕粉少許服之。來日蟲盡下。寸白蟲亦能下。

治驗

一婦人病腹脹。諸藥不効。余令解腹視之。其皮黃色。光如鏡面。乃蟻瘕也。先灸牛肉一斤。令食後用生麻油調輕粉五分服之。取下蟻蟲一合。如線如鬚狀。後服安蟲散而愈。

蟲毒

閩廣之人。以諸蟲置一器內。令其互相啖食。候食盡而獨存者。即蠱也。中其毒。則面目黃腫。心腹脹滿。疼痛或吐涎血。久則死矣。初得時。用皂角一挺。柏根二兩。水煎濃汁二盞。臨卧服之。次早取下毒物。後用以萬歲藤根。濕紙裹煨熟。每日空心嚼五枚。生麻油送下。三日毒從大便出。凡人至川廣。每日飲食。宜用銀筋筋白。即無妨。筋黑即有毒也。

瘤證

有胎瘤者。在母腹中。母受驚。驚氣冲胎。故生子成疾。發則仆倒。口吐涎沫。可服延壽丹。久而自愈。有氣瘤者。因憤怒思想而成。須灸中脘穴而愈。胎瘤出于母腹。俗所謂三搘成瘤者也。氣瘤由于七情故大病後及瘦苦人并縱性貪口腹人率多患此。醫書雖有陰陽五藏之分。然皆未得其要。而愈者蓋寡。先生此法直中肯綮。予用之而獲效者多矣。

治驗

一人病瘤三年餘。灸中脘五十壯。即愈。

一婦人病癰已十年。亦灸中脘五十壯愈。○凡人有此疾。惟灸法取効最速。藥不及也。
瘻癰

此證由憂思惱怒而成。蓋少陽之脉循脣繞頸環耳。此即少陽肝膽之氣鬱結而成。亦有鼠涎墮食中。食之而生。是名鼠癰治法。俱當于瘻頭上灸十五壯。以生麻油調百花膏傅之。內服平肝順氣之劑。日久自消。切不可用斑貓石灰硫霜之類。內經所謂陷脈為瘻。留連肉腠。此風邪乃外感之輕者也。靈樞經所謂腎藏受傷水毒之氣。外傷經脈留滯于肉腠之間。而為瘰癧。出于上而為鼠癰。失治多至殞命。乃內瘍之重者也。

婦人

婦人除妊娠外。有病多與男子相同。但男子以元陽為主。女子以陰血為主。男子多腎虛為病。女子多衝任虛為病。蓋衝為血海。任主胞胎。血信之行。皆由衝任而來。若一月一次為無病愆期者為虛。不及期者為實。脈沉細而濇。月信不來者。虛寒也。血崩者。衝任虛脫也。崩者倒也。白帶者。任脉冷也。任為胞門子戶。故有此也。發熱減食。皆為氣血脾胃之虛。不減食止發熱者。心藏虛也。此外疾病治法。皆與男子同。婦人另立一科。原屬無謂業方脈者。不知男女之分。陰陽亦方小技之傳烏得稱大方哉。

子嗣

婦人血旺氣衰則多子。氣旺血衰則無子。若髮黑。面色光潤。肌膚滑澤。脈隱毛稀。乃氣衰血旺也。主多子。若髮黃。面無光彩。肌肉粗澀。脈隱毛多。乃氣旺血衰也。主無子。若交合時。女精先至。

男精後衝者。乃血開裏精也。主成男。若男精先至。女精後來者。乃精開裏血也。主成女。若男女精血前後不齊至者。則不成胎。為子嗣計者重在擇婦。婦人端莊則生子。凝重交合有節則生之。先天性情雖稟于父母而後天體局往往多肖乳母。

血崩

經云。女子二七而天癸至。任脈通。太衝脈盛。月事以時下。若因房事太過。或生育太多。或暴怒。內損真氣。致任脈崩損。故血大下。卒不可止。如山崩之驟也。治宜阿膠湯。補宮丸半斤而愈。切不可用止血藥。恐變生他病。久之一崩。不可為矣。若勢來太多。其人作暈。急灸石門穴。其血立止。血崩之證。乃先後天衝任經隧周身之血。悉皆不能收持。一時暴下。有如山崩水溢。不可止遏。非重劑參附補救。不能生也。間有屬實者。當以形證求之。

帶下

子宮虛寒。濁氣凝結。下焦衝任脈。即子不得相榮。故腥物時下。以補宮丸。膠艾湯治之。甚者。失胞門子戶穴。各三十壯。不獨病愈。而且多子。帶下之證。十有九患。皆由根氣虛而帶脈不收引者。有脾虛陷下者。有濕濁不清者。有氣虛不攝者。有陽虛不固者。先生單作子宮虛寒。誠為卓見。

乳癰

良由藏氣虛衰。血脉凝滯。或為風寒所客。着而成癰矣。若陽明蘊熱。亦能成此。先覺增寒壯熱。服救生湯一劑。若遲三五日。宜多服取效。

胎逆病

妊娠後多于房事。或食冷物不消。令人吐逆不止。下部出惡物。可服金液丹。霹靂散即好。胎逆阻俗所謂病兜是也。苟能慎起居戒房事節飲食。不但無病。兜之患而生子亦多易育。若謹攝已當。而仍病者。是係孕婦體弱氣血多虛故耳。

午後潮熱

若飲食減少。四肢倦怠。午後熱者。胃氣虛也。若起居如常。但發煩熱。乃胃實心氣盛也。服益草湯。五日愈。

脣中及下部出膿水

此由真氣虛脫。衝任之血不行。化為膿水。或從脣中。或從陰中。淋瀝而下。不治即死。灸石門穴二百壯。服全液丹。姜附湯愈。脾為神闕穴上脾下腎不可有傷。若出膿水。先後天之氣泄矣。馬得不死。

婦人卒厥

凡無故昏倒。乃胃氣閉也。灸中脘即愈。婦多有此證。

產後虛勞

生產出血過多。或早于房事。或早作勞動。致損真氣。乃成虛勞。脈弦而緊。咳嗽發熱。四肢常冷。或咯血吐血。灸石門穴三百壯。服延壽丹。全液丹。或鍾乳粉。十日減一月安。凡虛勞而其脈弦在生產而出血過多者乎。急投溫補。唯恐已遲。苟或昧此。尚欲滋陰愈無日矣。

小兒

小兒純陽。其脉行疾。一息六七至為率。遲冷數熱。與大人脉同。但小兒之病。為乳食所傷者十

居其半。發熱用平胃散。吐瀉用珍珠散。頭痛發熱。恐是外感。用華澄茄散。穀食不化。用丁香丸。泄瀉用金液丹。小兒之脉較之大人固是行疾第畧差半至一至為率若六七至非平脈也平脈而六七至則數脈將八至矣。脈至八至非脫而何。

驚風

風木太過。令人發搐。又積熱蓄于胃脘。胃氣鬱閉。亦令卒仆。不知人事。先服碧霞散。吐痰次進知母黃芩湯。或青餅子硃砂丸皆可。若脾虛發搐。或吐瀉後發搐。乃慢驚風也。灸中脘三十壯。服姜附湯而愈。小兒之急驚慢驚猶大人中風之閉證脫證溫清補瀉審病當而用藥確自無差訛

斑疹即痘子

小兒斑疹。世皆依錢氏法治之。此不必贅。但黑泡斑及縮陷等證。古今治之未得其法。以為火而用涼藥治者。十無一生。蓋此乃汚血逆于皮膚。凝滯不行。久則攻心而死。黃帝正法。用霹靂湯。姜附湯。凡多死之證。但用此法。常有得生者。蓋毒血死于各經。渙無復還之理。惟附子健壯峻走十二經絡。故用此攻之。十中常生八九于臍下一寸。灸五十壯。則十分無事。若以涼藥凝水。其血致偏身青黑而死。此其過也。世俗凡遇熱證。輒以涼藥投之。熱氣未去。元氣又瀉。此法最不良。余每遇熱證。以知母五錢。煎服。熱即退。元氣無損。此乃秘法。錢氏之法。後世兜醫咸遵藏之證。以順逆險而為難易。不治之條。所用之藥。不過溫平無奇。陽熱之逆誠可救。全陰寒之逆。百無一愈。其後陳氏雖云得法。十中或救一二。不若先生之論。闢千古之秘奧。為救逆之神樞。兜醫苟能奉行自然天枉者少矣。每見世俗一遇逆證。勿論陰陽。輒云大閑石膏黃連大黃。功用之不厭人。皆信之至死不悔。近時費氏教偏瑣言。一出庸子輒又奉為典型。在証藥相合者。雖偶活其一二。而陰寒之證。亦以其法。治之寃遭毒害者。不知凡幾矣。

午後潮熱

小兒午後潮熱。不屬虛證。乃食傷陽明。心腹痛吐逆。宜用來復丹。草澄加散。

吐瀉

小兒吐瀉。因傷食者。用珍珠散。因胃寒者。用姜附湯。吐瀉脈沉細。手足冷者。灸臍下一百五十壯。慢驚吐瀉。灸中脘五十壯。人家_{肯用姜附小兒亦已幸矣。若灼艾至一百五}以此法勸之。斷手不允。只索托之空言耳。

面目浮腫

此證由于冷物傷脾。脾虛不能化水谷。致寒飲停于中焦。輕者面目浮腫。重者連陰囊皆腫。服金液丹。輕者五日可愈。重者半月全愈。當飲軟粥半月。硬物忌之。_{金液丹洵是活命之神藥。但世人不識。在大人尚有許多。}

疑慮小兒
馬肯用哉

咳嗽

小兒肺寒咳嗽。用華蓋散。若服涼藥。並止咳藥更咳者。當服五膈散。若咳嗽面目浮腫者。服平胃散。咳而面赤者。上焦有熱也。知母黃芩湯。_{咳而面赤屬土焦。寔熱者宜用知母黃芩。若該甚而面赤兼嘔涎沫者。則當以溫補氣血為宜。}

瘡瀉

冷氣犯胃。故水谷不化。大便溏滑。甚則脫肛者。厚腸散。半硫丸主之。

腹脹

冷物傷脾。則作脹。來復丹。全真丹。皆可用。

痢疾

痢因積滯而成者。如聖餅化積而愈。暑熱所傷。下赤而腫者。黃連丸。腹痛者。當歸芍藥湯。寒邪客于腸胃。下白者。姜附湯。桃花丸。

水瀉

火熱作瀉。珍珠散。食積作瀉。如聖餅。感應丸。

胎寒腹痛

藏氣虛則生寒。寒甚則腹痛。亦有胎中變寒而痛者。調硫黃粉五分。置乳頭。令兎吮之。即愈。三四歲者。服來服丹。

下血

暑中于心。傳于小腸。故大便下血。宜當歸建中湯。

牙疳

胃脈絡齒。榮牙床。胃熱則牙縫出血。犀角化毒丸主之。出局腎虛則牙齒動搖。胃虛則牙牀潰爛。急服救生丹。若齒齦黑。急灸闢元五十壯。牙齒動搖或有知其胃虛者。至牙牀潰爛誰不日胃火上攻。敢服救生丸。并灸闢元者鮮矣。

蠻蛇節

風寒凝于髮際。或冷水沫頭。小兒頭上生癤。麻油調百花散塗之。如腦癰初起。亦服救生湯。

禿瘡

寒熱客于髮。湊浸淫成瘡。久之生蟲。即于頭上灸五十壯自愈。看其初起者。即是頭也。

水沫瘡

小兒腿脣間有瘡。若以冷水洗之。寒氣浸淫。遂成大片。甚至不能步履。先以葱椒姜洗搗乾。又以百花散敷之外。以膏藥貼之。出盡毒水。十日全愈。

周身各穴

巨闕 在脾上五寸五分

陰交 在脾下一寸

關元 在脾下三寸

心俞 在五椎下夾脊各三寸

腎俞 在十四椎下兩旁扶脊各五分

承山 在崑崙上一尺肉間陷中

中府 在乳上三寸

地倉 口吻旁四方
一名胃維挾

目窓 當目上入髮際一寸五分

腰俞 在二十一椎下間

三里 四穴二在曲池下一寸即手腕下

食竇 即命關在中府下六寸

上星 在鼻上入髮際一寸

腦空 在腦後入髮際三寸五分

風府 入髮際一寸

前項 入髮際四寸五分

中腕 在脾上四寸

氣海 在脾下一寸五分

天柱 在一椎下兩旁齊肩

肝俞 在九椎旁扶脊各三寸五分

脾俞 在十一椎旁扶脊各三寸五分

肺俞 在三椎旁扶脊各三寸五分

石門 在脾下二寸三分

神闕 中人忌灸即胞門子戶

涌泉 在足心陷中

天突 在結喉下

脾俞 各相去一寸五分

石門 在脾下二寸三分

人忌灸即胞門子戶

扁鵲心書神方

宋太醫真定竇材重集

清錢塘胡珏參訂

古神醫盧人扁鵲傳

金液丹 一名保元丹 一名壯陽丹

余幼得王氏博濟方云。此丹治百種欲死大病。竊嘗笑之。恐無是理。此得扁鵲方。以此冠首。乃敢遵用。試之于人。屢有奇效。始信聖人立法。非不神也。乃不信者。自誤耳。此方古今盛行。莫有疑議。及孫真人著千金方。乃言硫黃許多利害。後人畏之。遂不敢用。亦是後人該墮天折故。棄大藥而求諸草木。何能起大病哉。余觀今人之病。皆以溫平藥養死。而不知悔。余以此丹。起數十年大病于頃刻。何有發疽之說。孫真人之過也。凡我同志。請試驗之。自見奇效。

此丹治二十種陰疽。三十種風疾。一切虛勞。水腫。脾泄。注下。休息痢。消渴。肺脹。大小便閉。吐衄。尿血。霍亂。吐瀉。目中內障。尸厥。氣厥。骨蒸潮熱。陰證。陰毒。心腹疼痛。心下作痞。小腸兩脇急痛。胃寒水谷不化。日久膀胱疝氣。膨脹。女人子宮虛寒。久無子息。赤白帶下。臍腹作痛。小兒急慢驚風。一切疑難大病。治之無不效驗。

船上硫磺十斤。用銅鍋熬化。麻布濾淨。傾入水中。再熬再傾。如此七次研細。入陽城罐內。蓋頂。

鐵絲扎定。外以鹽泥封固。八分厚陰乾。先慢火煅紅。次加烈火煅一炷香。寒爐取出。埋地中三日。去火毒。再研如粉。煮蒸餅為丸。梧子大。每服五十九。或二十九。小兒十五丸。元氣虛人。宜常服之。益壽延年。功力最大。一切牛馬六畜。吐食者。灌硫末立愈。一切鷄鵝鴨瘦而欲死者。飼以硫末。可以立愈。且易肥。

作蒸餅法。○清明前一日。將乾麪打成薄餅。內放乾麵包裹陰乾。

保命延壽丹

此丹治癰疽。虛勞。中風。水腫。臌脹。脾泄。久痢。久瘧。戶厥。兩脇連心痛。夢泄遺精。女人血崩。白帶。童子骨蒸勞熱。一切虛羸。黃黑疽。急慢驚風。百餘種欲死大病。皆能治之。一枚勝金液丹十粒。久服延年益壽。

硫黃

明雄黃

辰砂

赤石脂

紫石英

陽起石

大蝦醋淬三次

每味各二兩。研作細末。同入陽城罐。蓋頂鐵絲紮定。鹽泥封固。厚一寸。陰乾。掘地作坑。下埋一半。上露一半。烈火煅一夜。寒爐取出。研細。醋丸梧子大。每服十粒。空心送下。童男女五粒。小兒二三粒。俱見成效。

大丹

此丹補腎氣。駐顏色。活血脉。壯筋骨。輕步履。明耳目。延年益壽。治虛勞。發熱咳嗽。咯血。骨蒸盜汗。怔忡驚悸。一切陰疽冷漏。小兒斑痘縮陷。水腫臌脹。黃黑疽。一切虛羸大病。

功同延壽丹。常服可壽百餘歲。但富貴人方得合此。貧者難合。只服金液丹亦妙也。
大硃砂一斤。要有墻壁者。

為粗末。入陽城罐。先用蜜拌。安砂在底。次以瞿麥末。草烏末。菝葜末。各五錢。以鷄子清五錢拌勻。蓋在砂上。以罐蓋蓋住。鐵絲繫好。鹽泥封固。陰乾掘地作坑。下埋五分。上露五分。烈火煅一日夜。寒爐取出。研細。醋打半夏糊丸。芡實大滑石為衣。以發光彩。銀器收貯。每服五粒。或三粒。空心面東熟酒下。

凡用入藥中。並為衣者。俱如此。製則無毒。可放心服。

中丹

此丹補腎氣。壯筋骨。延年不老。治脾瘡。黃黑疽。脾泄久痢虛腫。水腫。女人血崩。白帶。骨蒸勞熱。小兒急慢驚風。及暴注腸滑洞泄。中風諸般瘡毒皆効。

雄黃十兩

赤石脂一兩

共為粗末。亦用前五味拌製。

如大丹法。取研極細。醋糊丸。芡實大滑石為衣。發光彩。銀器收貯。每服五粒。或三粒。空心熟酒或米飲下。

三黃丹

此丹治中滿胸膈痞悶。中風疾喘氣急。大便虛秘。功與中丹同。但畧峻耳。

雄黃

雌黃

硫黃

各五兩。為粗末。製法如大丹。研極細。醋糊丸。芡實大滑石為衣。發光彩。銀器收貯。每服五粒。或三粒。空心熟酒或米飲下。

四神丹

此丹治病。功力與延壽同。治虛證更多。能止怔忡驚悸。諸般大病。

同前三黃丹。外加辰砂五錢。

製法合法丸法俱如前。每服四十九空心白湯下。

五服丹

此丹功力與延壽丹中丹同。又能壯陽。治陽痿。于腎虛之人。功效更多。

雄黃

雌黃

硫黃

辰砂

陽起石

各五兩。製法合法丸法皆

如前。每服三四十丸空心米飲下。

紫金丹

此丹補脾胃虛。損活血。壯筋骨。治下元虛憊。子宮寒冷。月信不調。臍腹連腰疼痛。面黃肌瘦。泄瀉精滑。一切虛損之證。

代赭石

燒紅醋淬七次

赤石脂

製法同

禹餘糧

製法同

各五兩。共研細末。入陽城罐

鹽泥封固。

一寸厚。陰乾。

大火煅三炷香。冷定。再研極細。醋糊丸。芡實大。每服十九。熱酒送下。

全真丹

此丹補脾腎虛。損和胃。健下元。進飲食。行濕氣。治心腹刺痛。胸滿氣逆。臍下痛。心腹脹痛。小便頻數。四肢厥冷。時發潮熱。吐逆。泄瀉。暑月食冷物。不消。氣逆痞悶。男女小兒。面

目深腫小便赤澁淋瀝一切虛寒之症

高良姜

炒四兩

乾姜

炒四兩

吳茱萸

炒三兩

大附子

製

陳皮

青皮各二兩

右為末。醋糊丸。梧子大。每服五十九。小兒三十九。米飲下。

無病及壯實人。不宜多服。

來復丹

此丹治飲食傷脾。心腹作痛。胸膈飽悶。四肢厥冷。又治傷寒陰證。女人血氣刺痛。或攻心腹。或兜枕作痛。及諸鬱結之氣。真良方也。

陳皮去白

青皮

大川附子

製

五靈脂

各六兩

消石

硫黃各三兩

右為末。蒸餅丸。梧子大。每服五十九。白湯下。

草神丹

此丹大補脾胃。治陰毒傷寒。陰疽漏。水腫。膿脹。中風半身不遂。脾泄暴注。久痢。黃黑。疽。虛勞發熱。咳嗽咯血。兩脇連心痛。胸膈痞悶。腸中如流水聲。童子骨蒸。小兒急慢驚風。痘疹變黑。縮陷。氣厥卒仆。雙目內障。吞酸逆氣。痞積血塊。大小便不禁。奔豚疝氣。附骨疽。兩足少力。虛汗不止。男子遺精夢泄。沙石淋溺。血婦人血崩。血淋。暑月傷食腹痛。嘔吐痰涎。一切疑難大病。此丹乃藥中韓信也。取効最速。好生君子。廣試驗之。知不謬也。

川附子

製五兩

吳茱萸

泡二兩

肉桂

二兩

琥珀

五錢用柏子

辰砂五錢

另研麝香

先將前三味為細末。後入琥珀辰砂麝香三味。共研極勻。蒸餅丸。梧子大。每服五十九。米飲

下。小兒十九。

姜附丹

此丹補虛助陽。消陰治傷寒。陰證癰疽發背。心胸作痛。心腹痞悶。喉頸項腫。湯水不下。及虛勞發熱。咳嗽吐血。男婦骨蒸勞熱。小兒急慢驚風。痘疹縮陷。黑泡水泡。斑脾勞。面黃肌瘦。腎勞。面白骨弱。兩目昏翳。內障。脾瘡。久痢。水瀉。米谷不化。又能解利雨感傷寒。天行瘟疫。山嵐瘴氣。及不時感冒等症。

生姜

切片五兩

川附子

炮切片童便浸再加姜汁炒乾五兩

共為末。

每服四錢。水一盞。煎七分。和渣服。

若治中風不語。半身不遂。去附子用川烏。

去黑皮製法與附子同

霹靂湯

治脾胃虛弱。因傷生冷。成泄瀉。米谷不化。或脹或痛或痞。胸脇連心痛。兩脇作脹。單腹脹。腹霍亂吐瀉。中風半身不遂。脾瘡。黃疽。陰疽。入蝕骨髓。痘疹黑陷。急慢驚風。氣厥發昏。又能解利陰陽。傷寒諸般冷病寒氣。

川附

泡去皮五兩

桂心

去皮盡一兩

當歸

兩

甘草

一兩

共為細末。每服五錢。水一大

盞。生姜七片。煎至六分。和渣通口服。小兒止一錢。

救生湯

治一切癰疽發背。二十六種疔。二十種腫毒。若初起憎寒壯熱。一服即熱退身涼。重者

減半。輕者全愈。女人乳癰。乳巖。初起。姜葱發汗。立愈。又治手足瘻塊。紅腫疼痛。一服即消。久年陰寒。寒冷漏病。一切瘡毒。服之神効。

芍藥炒

當歸洗

木香大

丁香錢各五

川附炮二兩

共為細末

每服五錢。加生姜十片。水二盞。煎半和渣服。隨病上下食前後服。

鍾乳粉

治勞咳咯血。老人上氣不得。卧或膈氣腹脹。久咳不止。及喉風。喉腫。兩目昏障。童男女骨蒸勞熱。小兒驚風。胎前產後。發昏不省人事。一切虛病能先于臍下灸三百壯。後服此藥。見效如神。蓋虛勞乃腎氣欲脫。不能上榮于肺。此藥是潤肺生水之劑。後因邪說盛行。以致此藥隱聞。丹溪云。多服發渴淋。此言甚謬。余家大人服三十年。未嘗有此疾。故敢附此。○服此藥須忌人參。白朮。二味。

石鍾乳一斤。煅成粉。製法見李時珍本草內再入石鼎。煮三炷香。研極細。每服三錢。煎粟米湯下。但此藥難得真者。多以滴乳石亂之。真者浮水性鬆。煅易成粉。

華澄茄散

治脾胃虛滿。寒氣上攻于心。心腹刺痛。兩脇作脹。頭昏。四肢困倦。吐逆。發熱。泄瀉。飽悶等證。

華澄茄

高良姜

肉桂

丁香

原朴姜汁炒

桔梗去蘆

陳皮

三陵泡醋

甘草各一兩
五錢
香附製
三兩

為細末。每服四錢。姜三片。水一盞。煎七分。和渣服。

半硫丸

治胃虛心腹脹滿。嘔吐痰涎。頭目旋暉。困倦不食。或大便滑泄。水谷不化。小兒面目浮腫。小便赤淋。

半夏
煎水炒
姜芽

倭硫
生姜

各五兩。同搗碎。水浸蒸餅糊丸。梧子大。每服五十丸。小兒二三十丸。白湯下。

滲濕湯

治脾胃虛寒。四肢困倦。骨節痠疼。頭暉鼻塞。惡風。多虛汗。痰飲不清。胸滿氣促。心腹脹悶。兩脇刺痛。霍亂吐瀉。此藥能緩脾胃。辟風寒。祛瘴疫。除風濕。

厚朴
二兩

丁香

甘草

附子
各一兩

砂仁

乾姜

肉果
麵裹
煙透

高良姜
錢各八兩

剉碎。每用五錢。加姜三片。棗三枚。水一盞。煎七分。去渣空心服。

生姜半夏湯

治風痰上攻頭旋眼花。痰壅作噦。面目浮腫。

生姜

半夏
各三兩

共搗餅。陰乾為末。每服四錢。加姜五片。水煎溫服。

附子半夏湯

治胃虛冷痰上攻。頭目旋暉。眼昏嘔吐等證。

川附

生姜各一

半夏

陳皮去白各二兩

共為末每服七錢加姜七片水煎服

平胃湯

治老人氣喘咳嗽

葶藶炒一兩

官桂去粗皮一兩另研

馬兜鈴去絲蒂三兩

共為末每用三錢水一盞煎七分於食後細

細呷之

大白丹

療咳嗽化痰涎

枯礬煅

寒水石煅

元精石燬

各四兩半夏製

天蟲炒去絲

天南星製

白附子各二兩

右為末麵糊丸

麵糊即梧子大蒸餅也梧子大每服三十丸食後姜湯下

鹿草丸

溫補下元疏通血脉明目輕身

鹿草一具去毛酸矣

鹿角霜二兩

川棟子炒取淨肉

青皮

木香各一兩

右為末蒸餅丸

梧子大每服三十丸空心鹽湯下

黃藥子散

治癢喉風頤領腫及胸膈有痰水不下者用此吐之

黃藥子即班根爲細末每服一錢白湯下吐出頑痰即愈

八風湯

治中風半身不遂。言語塞塞。口眼喎斜。先灸臍下三百壯。後服此藥。永不再發。若不加灸。三年後仍發也。

當歸

防已

人參

秦艽

官桂

防風

釵斛

芍藥

黃芪

甘草

川芎

紫苑

石膏

白蘚皮

川烏

川羌活

川獨活

黃芩

麻黃去節

乾姜

遠志

各等分

剉為末

每服五錢

水酒各半

煎八分

食前服

八風丹

治中風。

半身不遂。

手足癱麻。

言語塞塞。

口眼喎斜。

服八風湯。

再服此丹。

永不再發。

大川烏炮

荆芥穗各四兩

當歸二兩

麝香另研五錢

共為末。

酒糊丸。

梧子大空心酒

下五十九○中風者不可缺此。

換骨丹

治中風。

半身不遂。

言語蹇澀。

失音。

中風者。

先灸臍下三百壯。

服金液丹一斤。

再服此藥。

當歸

芍藥

人參

鐵脚威靈仙各二兩

南星三兩

乳香去油二兩

麻黃去節三斤另

沒藥去油二兩

各為末。

先將前五味和勻。

後入乳香沒藥。

以麻黃膏和勻為丸。

如彈子大。

每以

無灰酒下一丸。出汗。五日一服。仍常延壽丹。金液丹。

三五七散

治賊風入耳。口眼喎斜之證。

人參

麻黃去節

川芎

官桂

當歸以上各一兩

甘草各五錢

右為末。每服二錢。茶下。日三次。

蜜犀丸

治半身不遂。口眼喎斜。語言不利。小兒驚風發搐。

槐角炒四兩

當歸

川烏

元參炒各二兩

麻黃

茯苓乳

防風

薄荷

甘草各一兩

猪牙皂角

去皮。五錢。

冰片五分

另研。

先以前十味為末。後入冰

片和勻。蜜丸。櫻桃大。每服一丸。小兒半丸。細嚼茶清下。

白龍丸

治風邪言語不遂等證。面如蟲行。手足麻木。頭旋眼昏。及傷風傷寒。頭痛拘急。小兒急慢驚風。大人風癟失音。并皆治之。

天南星

四兩。以生姜四兩同搗成餅。

川烏

甘草

藁本

甘松

白芷

桂心

各二兩

海桐皮一兩

石膏二兩。煅研極細。

以前八味共為末。糯米糊丸。彈子大。石膏為衣。

茶清下。大人一丸。小兒半丸。若治傷寒。姜葱湯下出汗。

華蓋散

治傷寒頭痛。發熱。拘急。感胃。鼻多清涕。聲音不清。大能解利。四時傷寒。瘟疫瘴氣等症。

麻黃四兩
浸去沫

蒼朮八兩
米泔浸

陳皮

杏仁去皮
尖

甘草各二
兩

共為末。每服四錢。水盞半。煎八分。食前熱服取汗。

祛風散

治風寒頭痛。遍身拘急。破傷風。洗頭風。牙槽風。肩背痙直。口噤。

天南星

泡二兩

生姜一兩同
南星製

防風二兩

甘草一兩

共為末。每服四錢。姜七片。水煎

服。取汗。無汗再服。

當歸柴胡湯

治傷寒頭痛。發熱惡寒。支節痛。吐逆。

柴胡

錢五

半夏二錢以生姜
一錢同搗

當歸一錢

甘草五分

加姜棗。以水二盞。煎

至八分。熟服。取汗。微微即止。

大通散

治傷寒。胃中有熱。或服熱藥太多。發狂言。棄衣而走。登高而歌。或腹痛下血。但實熱者。用之虛人。大忌。

大黃二錢

枳實炒

甘草一錢

水煎空心熱服。不利再服。得利即止。

知母黃芩湯

二錢

治傷寒。胃中有熱。心覺懊憹。六脈洪數。或大便下血。

知母錢二

黃芩錢二

甘草錢一

水煎熱服

當歸芍藥湯

當歸

芍藥錢各二

水煎熱服

四順散

治中暑。

冷熱不調。大便下赤白膿。

川黃連

炒酒

當歸

芍藥錢各二

御米殼去隔膜
炒二錢
加生姜七片。水煎食前熱服。

知母散

解一切煩熱。

口乾作渴。飲水若係實熱。皆以此解之。不損元氣。若困倦減食者。乃胃虛

發熱也。不可服涼藥。當以溫中為主。

知母五錢

鹽水研末
炒姜三片。水一盞。煎六分溫服。

术附湯

治六七月中濕頭疼發熱。惡寒自汗。偏身疼痛。

附子一兩

白术土炒二兩

甘草五錢

共為末。

每服五錢。姜七片。水煎熱服。

截瘧丹

治一切瘧疾。但瘧不宜截宜補。

硫黃一兩

雌黃色紅出陰一兩

砒霜錢

為末入罐內。鹽泥封固。陰乾。打火三香。

冷定取出。醋糊丸。梧子大。每服五丸。空心米飲下。○凡用砒。要將蘿蔔切去。蓋下段挖空。入砒以蓋。好紙包火煨透。存性取出。今此丹係打火煉過。不必蘿蔔製。

為丸時須研和極勻。若次匀恐破。有多有少。多處或致損傷人命。

良姜理中湯

治虛瘧。久瘧脾胃虛弱。若初起為冷物所傷。亦用此方。

高良姜

乾姜炒

草菓去殼

各二兩為末。每服四錢。水煎空心服。

建中湯

附子燒

治久發瘧疾。脾胃虛弱。胸膈腹中飽悶。痞塊。兩腸連心痛。四肢沉重。發熱泄瀉。鴻臚瘦症等。白朮土炒各二兩。芍藥酒炒四兩。甘草炒乾姜炒各一兩。為末。每服五錢。水煎熟服。

二聖散

治脾胃虛寒。嘔吐不食。

硫黃五兩

水銀五兩

共研末。同炒再研細。每服三錢。米湯下。小兒一錢。姜湯亦可。

炒成青砂頭。亦治翻胃膈食吐痰神效。

八仙丸

治脾胃久冷。大便泄瀉。腸中冷痛。米谷不化。飲食不進等證。

附子炮

高良姜

華撥

砂仁

肉豆蔻各一兩

生姜三兩

厚朴四兩
姜汁製

為末。醋糊丸。梧子大。米飲下五十九。

厚腸丸

治脾虛傷食。大使下赤白膿。腸鳴腹痛。泄下。米谷不化。小兒脾虛。滑泄。脫肛。疳瘦等證。

川烏炮

肉桂

硫黃另研

赤石脂煅

各一兩。乾姜炒二兩

為末。糯米糊丸。梧子大。每服五十九。白湯下。

阿膠丸

治冷熱不調。下痢赤白。

黃連

黃柏鹽水炒

當歸各一兩

烏梅肉炒一兩

芍藥二兩

阿膠蛤粉炒一兩

為末。蒸餅丸。梧子大。白湯下。五十九。

桃花丸

治腸胃虛。下赤白膿。小兒脫肛極効。

乾姜炒二兩

赤石脂煅二兩

為末。米糊丸。梧子大。米飲下五十九。

如聖餅

治大腸冷熱不調。下赤白痢。及大人小兒一切積滯。

蜜陀僧五錢

訶子大者八個

硫黃三錢

輕粉二錢

石燕燒紅酒淬一對洗淨

右為末。麵糊丸。龍眼大。捏作餅。每用一餅。入灰中畧煨。熱茶清下。

珍珠散

治大人小兒霍亂吐瀉。

硫黃

滑石各二兩

共為細末。每服二錢。白湯下。不愈再服。小兒一錢。

少陽丹

能解利雨感傷寒。瘟疫瘴氣。

硝石

硫黃

五靈脂

炒醋

青皮

陳皮

麻黃各二兩

為末。先以硝石炒成珠。和諸末。米糊丸。茱豆大。白湯下。五十九。再以熱湯催汗。

中和湯

治傷寒溫疫。頭目昏痛。發熱。鼻流清涕。服此不致傳染。

蒼朮

一斤米泔浸

川烏炮

厚朴

姜製

陳皮

甘草各四兩

草果各二兩

共為末。每用四錢。生姜七片。水煎和渣服。

還睛丹

治脾腎虛衰。精血不生。致雙目成內障。

磁石

活者火煅醋淬七次

硫黃

雄黃

雌黃各二兩。共為粗末。入罐打三附子。台椒炒出汗。

鍾乳粉

附子

台椒各二兩

共為末。醋糊丸。梧子大。每服二十九。空心米飲下。日二服。半月覺。熟攻眼勿懼。乃腎氣潮眼。陽光復生也。熟時用兩手搓熱。揉之。揉一番。光明一番。六十日後。眼明藥盡再服一料。

蜜蒙化散

治風熱攻眼。昏睛多眵。隱濛羞明。或癢或痛。漸生翳膜。或患頭風在先。牽引兩眼。漸覺細小。及暴赤腫痛。

蜜蒙花

木賊去節

川羌活

甘菊花

白蒺藜炒去刺

石決明煅水煎。再用

各等分。為末。食後茶清下三錢。

撥雲散

治上焦壅熱。眼目赤腫疼痛。或生翳障。先服洗肝散。後服此藥。

荆芥穗

川芎

防風各二兩

枳殼麸炒

蟬退去翅足

薄荷

龍膽草

甘草各五錢

共為末。每服二錢。食後服。

洗肝散

治藏火太過。壅熱攻目。或翳障疼痛。

大黃錢

黃芩三錢

水煎食前服。

補肝丸

能補肝腎之氣。服還睛丸後。多服此藥。

台椒炒

各等分爲末。酒糊丸。梧子大。空心米湯下。三十九。

文蛤散

治目弦腫。大小皆成赤瘡。

五倍子一兩研末。每服三錢。水一盞。煎八分。先洗後以筋頭點之。

一醉膏

治耳聾

麻黃一斤。以水五升。熬一升。去渣熬膏。每服一錢七分。臨卧熱酒下。有汗即効。

睡聖散

人難忍火灸痛。服此即昏睡不知痛。亦不傷人。

山茄花

八月收

火麻花

八月收

按八月中火麻花已過時恐作七月乃是此

收此二花時。必須端莊閉口齊手足探之。若二人去。或笑或言語。服後亦即笑即言語矣。採

後共爲末。每服三錢。小兜只一錢。茶酒任下。一服後即昏睡可灸五十壯。醒後再服再灸。

按山茄子今謂之風茄見其花亦謂之曼陀羅花生北土南人亦有栽者春生夏長莖直上高四五尺生不旁引葉莖碧葉如茄葉八月開白花凡六瓣狀如牽牛花而大攢花中黃麻折駢葉外包朝開夜合結實圓而有丁拐中有小子八月採花九月採實花實氣味俱辛溫有毒主治諸風及寒漏脚氣驚癇脫肛等證相傳此花笑采浸酒飲令人醉采浸酒飲令人舞余嘗試之飲須半酣更令一人或笑或舞引之乃驗又云未火麻子花八月采山茄子花陰乾等分爲末熱酒調服三錢少頃昏昏如醉割瘡矣火不覺苦痛蓋古方也今外科所用麻藥即是此散服之並無傷害

薄荷散

治心肺壅熱。頭目不清。咽喉不利。精神昏濁。小兒高熱。

真薄荷

二兩

桔梗

三兩

防風

二兩

甘草

一兩

荆芥穗

二兩

牛蒡子

炒一兩

真薄荷

一兩

為末。食後茶下三錢。

碧雲湯

治風痰上攻。頭目昏眩。咽喉疼痛。涎涕稠粘。

丁香丸

治宿食不消。時發頭疼。腹痛。

丁香

烏梅肉

青皮

肉桂

三稜

炮各二兩

巴豆

去油一兩

治老人虛氣中風。產後大便不通。

枳實

炒數粒

青皮

陳皮

各一兩

共為末。每服四錢。水一盞。煎七分。空心服。

兎絲子丸

補腎氣壯陽道。助精神。輕腰腳。

兎絲子

一斤淘淨酒煮。搗成餅焙乾。

附子

製四兩

共為末。酒糊丸。梧子大。酒下五十九十日後強壯。

石膏丸

治肺厥頭痛。及腎虛咳嗽煩悶遺尿。

石膏

兩一

硫黃

兩一

消石

一兩合研

硫

天南星

一兩用生姜

同搗

為末。麵糊丸。梧子大。食前米飲下。五十九日二次。

宣風丸

治風濕脚氣。走注上攻。兩足拘急疼痛。或偏身作痛。

黑丑

取頭二兩未

青皮

兩一

胡椒

二十粒

全蝎

二十四枚去頭足

共為末。蜜丸梧子大。食前白湯下。五十九或三十九。

五膈散

治肺傷寒。誤服涼藥。冰消肺氣。胸膈膨脹。嘔吐酸水。口中如含冰雪。體倦減食。或成冷勞。胸中冷痰。服此皆効。

人參

黃芪

白朮

麥冬

官桂

附子

炮

杏仁

各分等

乾姜炒

遠志去心

台椒

北細辛

百部

去蘆

共為末。水煎服四錢。

撮氣散

治涼藥傷肺。飲食不下。胸膈飽悶。吞酸氣逆。久嗽不止。

白木

乾姜各二

黃芪蜜水拌炒

附子

川椒

杏仁各一

甘草
錢五

麥煎散

共為粗末。水煎服四錢。初服冷熱相搏。覺煩悶欲吐。少頃撮定。肺氣自然下降。

治幼年心絰。為暑所傷。每至暑時。即畏熱。困倦減食。

知母

烏梅肉

地骨皮

柴胡
錢各二

大麥一撮

右剉片成一劑。水煎溫服緩下。

剪紅丸

治遠年近月腸澼下血。

吳茱萸

去梗
二兩

荆芥穗
二兩

川烏
一兩

右炒黃色。共為末。醋糊丸。梧子大。每服五十九。空心白湯下。

分氣丸

治心腹痞悶。疼痛。兩脇氣脹。痰涎上攻。咽嗌不利。能行氣化酒食。

黑刃

半生半熟
頭未四兩取

青皮
炒

陳皮
炒

乾姜炮

肉桂
各一兩

共為末。水法梧子大。每服三十九。空心姜湯下。

鎮心湯

治心氣不足。為風邪鬼氣所乘。狂言多悲。夢中驚跳。

人參

茯苓

石菖蒲
桑葉水
拌炒

遠志

木香

丁香
錢各一

甘草

乾姜各五

大棗三枚

水煎空心服。

遠志丸

治心氣不足。多悲健忘。精神昏默。手顫脚搐。多睡。

遠志

人參

石菖蒲

茯苓

為末。蜜丸梧子大。每服三十丸。酒棗湯任下。

定痛丸

治奔豚上攻。心腹腰背皆痛。或疝氣連睾丸痛。

木香

馬蘭草醋炒

茴香

川棟子炒各一兩

共為末。每服四錢。滾酒下。連進二服。其痛即止。

阿膠散

治肺虛咳嗽咯血。

牙香三兩
炒

阿膠蛤粉炒成珠

為末。每服三錢。姜湯下。日三次。

定風散

治破傷風。及洗頭牙槽等風。牙關緊急。項背強直。角弓反張。若一二日者。服此可治。五

七日者難治。須急煎臍下三百壯。

川烏二兩

防風二兩

雄黃一兩

共為末。每服四錢。水煎和渣服。日三次出汗愈。

安蟲散

治蟲攻心痛。吐清水。如蟻蟲發則腹脹。寸白蟲則心痛並治之。

乾漆炒至烟盡五錢

鶴虱炒淨

雷丸切炒各一兩

共為末。每服二錢。小兒一錢。米湯下。

檳榔丸

治小便淋溢不通。及血淋石淋。

芍藥

苦棟子炒

馬蘭花各一兩

共為末。每服四錢。酒煎熱服。

換骨散

治癩風。面上黑腫。肌肉頑麻。手足疼痛。偏身生瘡。先灸五藏俞穴。後服此藥。

烏蛇去頭尾酒煮取肉

白花蛇全上製法

石菖蒲

荆芥穗

蔓荆子

天麻酒炒

胡首烏小黑豆拌蒸酒

白楊樹皮炒各二兩

甘草炒

地骨皮酒炒枳壳炒

杜仲

鹽水炒

當歸酒炒

川芎酒炒

牛膝鹽水炒各一兩

共為末。每服二錢。酒下。

胡麻散

治癩風。渾身頑麻。或如針刺。偏身疼痛。手足癱瘓。

紫背浮萍七月半采一斤

黑芝麻炒四兩

薄荷蘇州者佳二兩

牛蒡子炒

甘草各一兩

共為末。每服三錢。茶酒任下。日三服。

消癰散

治氣瘦。多服取効。血瘦不治。

全蝎

三十枚去頭足

猪羊麝

即膝眼骨各三十枚炙枯

枯礬

五錢

共為末。蜜丸梧子大。每服五十丸。飴米糖拌吞。或茶任之。

補宮丸

治女人子宮久冷。經事不調。致小腹連腰痛。面黃肌瘦。四肢無力。減食發熱。夜多盜汗。下赤白帶。久服且能多子。

當歸酒

熟地

姜汁炒

肉蓯蓉

酒洗去膜

菟絲子

製法見前

牛膝

酒洗各二兩

肉桂

沉香

草薢

去蒂炒

吳茱萸

去梗

肉果

各一兩

真血竭

艾葉

錢五錢

共為末。醋糊丸梧子大。每服五十丸。或酒或白湯任下。

膠艾湯

治婦人衝任虛損。月水不調。子宮久冷。腰腹疼痛。赤白帶下。或惡露不止。此藥能通經絡。活死血。生新血。

阿膠

蛤粉炒珠各五錢

艾葉

當歸

白芍

川芎

熟地

各二兩

甘草

乾姜

各五錢

共為末。每服四錢。水煎和渣熱服。戒怒氣。一月。

地血散

治婦人心血間有熱。飲食不減。起居如常。但發煩熱。

茜草 當歸 白芍

烏梅 柴胡

知母各一

每劑加姜三片。水煎溫服。

大清膏

治小兒吐瀉後成慢驚。脾虛發搐。或班疹後發搐。

烏蛇酒浸去頭尾

全蝎十枚去頭足

蜈蚣五條去頭足

鍾乳粉要真者大煅研極細末水飛淨五錢

川附子各五錢。白附子一兩。麵包煨熟

青黛

丁香

木香

川附子各五錢。白附子一兩。麵包煨熟

金線重樓即金線釣蝦蟆製法見後各五錢

共為末。蜜丸龍眼大。每服一丸。滾水下。連進二服。立差。甚者參中脫五十壯。

碧霞散

治痰涎壅盛。卒仆或發驚搐。一切急症。服此吐痰。

豬牙皂角皮弦去

銅青另研

大黃生用

金線重樓即金線釣蝦蟆製法見後各五錢

右為末。每服一錢。小兒三分。白湯灌下。牙關緊者。鼻中灌下。吐痰立愈。

萬靈丹 治小兒疳瘦腹脹。水瀉多消。

香附一兩

青皮

川黃連

肉桂

巴豆去

砂仁

肉果錢五

右為末。醋糊丸。黍米大。每用三五七丸。溫水下。

育嬰丹

治小兒面黃肚大。青筋作瀉。及五疳諸積。健脾進食。

上好白蠟

一兩二錢人鍊煩化傾入碗內七次

硃砂飛淨一錢心疳用之

赤石脂一錢火煅脾疳用之

青黛一錢
疳用之 肝

先將白蠟研碎。後加各經引藥共研細末。分作十貼。每用雞蛋一枚。開一小孔去黃留青。入藥一貼。攪勻。紙封口。或蒸。或用大煨。任意食之。酒飯無忌。

抑青餅 治小兒驚風。清膈化痰。降熱火。

防風

薄荷

桔梗炒

甘草炙

青黛淨

冰片分

寒水石一錢
用泥罐上下蓋定 大煅
火煅肺脾用之

牡蠣一錢大煅
腎肝用之

共為末。蜜丸。芡實大。或捏作餅。姜湯下。

硃砂丸 治小兒膈熱消痰

半夏製

辰砂各五錢

杏仁三十粒去皮

青黛各五錢

冰片分

共為末。蒸餅丸。梧子大。每服十九。或五七丸。食後薄荷湯下。

醒脾丸

治久瘧不瘥。

川烏

五兩姜汁浸去黑皮切片

大蒜三兩煨去皮

共為末。醋糊丸。梧子大。每服二十丸。米飲下。小兒量減。

奪命丹

治中風。左癱右瘓。半身不遂。口眼喎斜。言語蹇澁。

川烏酒煮

蒼朮米泔浸

各四兩。共為末。酒糊丸。梧子大。空心服十五丸。忌見風暖。益出汗。

脫衣散

治汗斑即紫白癩風

各五錢共為末。姜汁調以茄蒂蘸擦三四次全愈。

附子

硫黃

百花散

治腿肚血風腫瘡。小兒蛇蟲瘡。或耳底出膿。瘰癧瘻漏。

川烏五兩搗為末。凡一切瘡毒。以麻油調塗。濕者乾粉。○耳中出水吹入。○牛馬六畜瘡皆可治。○人家合醬入此末五錢。不生蟲痘。

附金線重樓治證

金線重樓俗名金線釣蠍。葛采得去外黑粗皮用石頭打碎勿見鐵器。晒乾為末。小罐收貯。凡一切要吐痰涎之證。用代瓜蒂最妙。

一治風痰結胸。用一錢陰陽水和服。吐去痰即愈。

一治傷食成瘧疾者。用一錢臨發空心水和服。一吐即愈。

一治噤口痢疾。涼水和服一錢。吐痰即愈。

服金液丹各證引藥。

虛勞。白湯下。或姜湯下。

骨蒸潮熱。地骨皮湯。或炒胡黃連五分煎湯。或丹皮湯下。

吐血茅根湯。或藕節湯下。

消渴。烏梅湯。或石膏湯下。

肺脹。真蘇子湯下。

水腫。車前子湯或木通湯下。

休息痢。白者用臭椿根皮湯下。紅者用雞冠花湯下。

脾泄。車前子炒焦煎湯下。

大便閉芒硝煎湯下。

尿血。山梔木通湯下。或燈心竹葉湯下。

吐瀉。生姜燈心湯下。

氣厥。真蘇子湯下。

陰毒。黃芪湯或附子湯下。

心下作痞。枳實桔梗湯下。

胃寒。米谷不化。乾姜麥牙湯下。

肚腹痛。甘草白芍湯下。

小腹痛。小茴香湯下。

女人子宮虛冷。姜湯下。

慢驚風。人參湯下。

中滿。陳皮湯或木香湯或薄菜湯下。

注下。木退湯下。

小便閉。木退湯下。

霍亂。霍香湯下。

尸厥。姜湯下。

陰證附子湯下。

目中內障。木賊菊花湯下。

心胃痛。延胡索湯或酒下。

兩脇急痛。青皮湯下。

脣腹痛。麥牙湯下。

膀胱疝氣。小茴橘核湯下。

赤帶。地榆湯下。

小兒急驚風。金銀花湯下。

一切疑難之證。俱用姜湯下。

神治諸般風氣靈膏

紅砒一斤。入灌化汁。用金頭蜈蚣全蝎末投砒內。以砒不起烟為度。又以砒用槐角子一斗。煮三晝夜。水乾為度。上以上土築寢封固。火燬鍋通。紅死砒脆白化成汁。○用砒一兩。配前金液硫一兩。共研為末。攤于膏藥貼患處。

汗斑神效方

黑芝麻

碱汁

半盃。○按字書無碱字。繫俗人所造。正寫當作鹹字。

將芝麻研細。入碱汁煎。數沸。搽之即愈。

扁鵲心書三卷。及神方一卷。宋紹興中開州巡檢竇材所集錄。已嘗鋟板行世。而歲久湮沒。人間少有見者。古月老人得之。詫為奇書秘冊。寶藏不啻在琅函玉笈中。老人精醫理。千古今方論。剖析疑似。指斥謬誤。皆合軒岐正義。遇危急之疾。他人縮手告難。老人治之。往往奏效。年五十外。又得此書。嗣後治人痼疾。蓋多奇驗。沒後。其子道周繼其業。嘗手其書。示余曰。思欲重刊。以傳于世。而家貧乏力。遲之十餘年。竟不克刊。道周亦沒。歷今又十餘年。見其孫紀雲語。及是書。因出其祖手錄副本見示。上有參論百餘條。拾遺補闕。可謂竇氏功臣。第字句不無訛錯。遺方亦有蠹蝕。問前者所見原本。則歸橫塘一藏書家。余深以不得再見為歎。又恐此本久亦湮没不存。爰加較勘。即以參論諸條。附註其下。以付剞劂。一以恩故人。昔日見示斯編之意。一以使奇方要訣。流傳世上。後人用之。得以起沉疴。而保天年。為益甚無窮也。回思數十年前。與古月老人父子相晤語。宛然疇昔事。歲月如

馳兩人墓木已拱。不獲親見。是書重刊為可歎也。老人名珏。字念庵。因姓胡氏。故自號古月老人。清乾隆乙酉二月丁丑朔。紫陽山民王琦書。

竇氏材。生于宋之中葉。而書中有河間丹溪遺訛後世之語。又鍾乳粉方下。訾丹溪多服發渴淋子之說為謬。又言製法見時珍本草。何緣舉元明人之書而反之。其為後人增益疑。兼之是編非竇氏原本矣。仲景傷寒論。古今奉為不刊之典。竇氏顧有指摘。其未當者數條。蓋由膠執其詞。未嘗融貫以參領其活潑之用。致意見有差池。再後人自當分別觀之。能鑒其是。更能正其非。判然不惑。斯為善讀古書者。

人稟陰陽之氣。以成此身。身之內。皆二氣所充周也。互以相生。因以相濟。而無過與不及之相陵。是以內外和平。而無疾病。有疾病者。反是治之者。扶陽保陰。各視其攸宜。損之益之。以期于至當而無偏焉。是書重在扶陽。或者疑其不免偏見。然余嘗觀天地間。日月盈虧。寒暄遞運。雨暘時若。草木盛衰。而信陽常有餘。陰常不足。乃造化自然之樞機。若夫陽常有餘。而芸生不厭其有餘。陰常不足。而芸生不苦其不足。以此悟扶陽之理。視保陰為尤要者。亦本造化當然之軌。則竇氏之書。以灼艾為第一。餌丹藥為第二。用附子為第三。傳此三法以為保命真訣。洵千古不磨之法。何庸排訾其非哉。其議論張王。以下六子也。非務為好辨以矯異也。序中以明言學六子之書。以調治小疾。百發而百中。特以數十種大病。垂危之證。非其書中所載諸方。可能救療。而別有救療之方而言也。惟是藥與人。有

宜不宜之殊。方與證有對不對之異。千古書能善讀之。又貴能善用。苟僅能見其外之形似。而未能察其內之神機。惘惘然執紙上陳言。而嘗試之一。有不當人。且乘其間而議。是書扶陽之法為誤。而不可遵循矣。嗟嗟扶陽正理。何誤之有。因用者之不當。而并咎昔人立言之誤。吾恐斯人之學。亦誤于保陰之說。天枉天下蒼生更多。而冒不自覺也。可勝嘆哉。二月十三日己丑琢崖又書。

雕板未竣。或有阻余者曰。陶節菴錄成家秘的本。戒其子勿以示人。恐淺陋者妄肆詆謔。子珍是編什襲而藏之。擇其人示焉可矣。胡事鑄梨刻來。以昭示于世。不類淺學之徒。是非鋒起。或加塗抹。而為是書瘡痏與余曰。人心各異。所見不同。于是書而非之。或塗抹之。如吾子所言固有矣。然豈無重之珍之。更欲重刊之。如古月老人父子者乎。昔華陀能剖割積聚。湔洗腸胃。其方書焚毀。不傳後人以為恨。然使其書尚存。恐謂其誕妄不經者。必多。孰敢有信而用者。今寶氏之書。甯獨異于華氏之書耶。余幸其得存于今也。亟重刊之。化一帙為千百帙。冀其長留天地間。而不至澌滅無傳。後人得之。或有信而用者。以之起死扶衰。通閉解結。而反之于平。則是書寔博施濟衆之良書。其為有功于蒼赤。豈少哉。彼執偏滯之見。平居則噴有煩言于扶陽之理。肆為排擊。臨險證則袖手傍徨。莫之能救。其學之優劣。可一覽而知其言之是非。曾何足為重輕乎。二月二十六日壬寅琢崖又書。