

醫學秘真
二

喉腫

喉腫者二

毒

毒

毒

毒

毒

毒

毒



知

知

PDG

此毒起於脾經因食煎燂油膩等物及飲酒太過而行房事以致毒氣不能流行聚結於喉根若不速治潰毒閉急卽死治法先用醋水蘸汁攪去痰涎卽用吹喉藥吹數次後服八正順氣散

厚朴

砂仁

半夏

陳皮

茯苓

青皮

桔梗

芍藥

枳殼

木香

玄參

鼠粘子

山梔仁

右剉水二鍾姜三片煎服

喉節

古知胆水之一餘其二氣實類

刺去

刺去

刺去

刺去

犀角干

山蛇干

山蛇干

山蛇干

甘草

四山犀角

乳香火炙

真天香不以火炙用酒洗去其苦味

寒熱用神效藥用此藥七次人病中再用此藥黃升

不出藥不可至三日漸去其藥之間各處新藥其

此藥去其藥真之申醫以成藥其去其藥之間各



此症生於鳩尾之中初起如梅核在喉膈之間吐
不出嚥不下至三日漸上喉節之間名爲喉節其
疾須用刺破後用胆硝丹吹入喉中再用雄黃化
毒丸吞下七丸仍用四七氣湯連進五服再用冰
片散吹之

四七氣湯

甘草

桔梗

枳殼

玄參

鼠粘子

山梔仁

生地黃

天花粉

陳皮

連翹

茯苓

紫蘇

右咬咀水二鍾姜三片煎服

纏喉風

出風寒

瓜用如

前附

白芷

羌活

蘇北

此藥



犀角

甘草

胡蘆

蘇北

此藥

犀角

東山

蘇北

蘇北

此藥

蘇北

蘇北

黃芩

蘇北

此藥

蘇北

蘇北

黃芩

蘇北

此藥

此病因腎經有熱內枯不能上潤致令心火盛故
發此症服散毒散其探吐法在前

羌活

防風

桔梗

黃芪

黃芩

白芷

甘草

陳皮

柴胡

芍藥

前胡

鼠粘子

玄參

仍用吹喉藥吹三五次又用白地松根醋搗汁漱
出風痰如喉間雷響者不可治切宜仔細

氣癱喉閉

玄參

白朮

人參

參事顯原增

神藥如毒火

女工中不三

北益為因



此症爲因聚毒塞於喉間痰涎稠實發寒熱者仍
分上中下三關毒在下關者難治上中二關用吹
喉藥吹數次茶湯送下雄黃化毒丸七丸然後服
參苓順氣散

人參

茯苓

烏藥

蒼朮

紫蘇

白朮

粉草

陳皮

鼠粘子

枳壳

玄參

山梔

桔梗

天花粉

噎食喉風

天不中受氣無絲毫毒滯入命

心腹間陣痛吞吐俱閉或吞或吐以火黃降下味

製歸蘇一匙煎心火下所至大便食虧服散

高藥

白芷

川芎

不阿散用川蘇

此症因熱毒吞食心火燄毒聚而無藥者服會香



此症因熱毒在於心經咽喉燥而無痰若噎食者不可治用川桔散

川芎

防風

桔梗

鼠粘子

山梔仁

白芷

玄參

天花粉

枳壳

黃芩

烏藥

甘草

陳皮

連鬚葱一根燈心七寸同煎至七分食後服如落心肺間刺痛者仍用當歸連翹散加大黃利下如久不治變為飛絲勞毒能傷人命

喉癰

俱之如葉同前

尚非前所及有數月者無用內無毒長用金銀膏

十活者

效好

內出膿膿不盡者

生肌間後不敷前恐毒入內也即膏出必疑口

此毒因毒發憂思悲恐驚火動肝火計醫誤也



此毒因喜怒憂思悲恐驚以傷七情鬱結成癰毒
生喉間若不速治恐毒氣內攻喉骨若出必致口
內出膿雖不傷命卽成冷瘻終身之痼疾也治方
於後

十竒散

治喉節初起有膿卽散破用內補散外用金絲膏
貼之吹藥同前

脚根喉風



此處顯赫餘味至竹連間與一羊絲一大半羊發

至大日

鼎

其葉山

PD

此症脚根發起至於喉間或一年發一次半年發一次切忌熱物不得傷於怒氣其病一日行一穴至七日行七穴雖然不妨只是要發用吹喉藥仍服敗毒散如腥惡發泡者死

喉閉

鯨魚人衣針眼王鼎長

單餅干

玄冬

白芷

甘草

當歸

川芎

人參

麝香

麻人玉

附子

鹿角

蘇合

冰片

麝香



此藥因性寒涼，服內虛弱，起大寒，野人熱毒

此症因外感寒邪內傷熱物或大寒後便入熱湯
洗故將寒氣逼入脾經冷氣阻於中腕邪氣熱客
於心經故生此疾急用三稜針刺手腕中紫筋上
或少商穴出血却將雄黃化毒丸冷茶磨化灌之
仍將冰片散吹入喉中待漱出風涎稠痰爲愈更
服八正順氣散

陳皮

砂仁

枳殼

桔梗

甘草

當歸

川芎

人參

鼠粘子

玄參

白芍

水二鍾煎八分後服玉樞丹

喉痛

凡人之

前所... 青... 片... 黃... 黃... 冬... 冬...

白... 末... 計... 黃... 冬... 冬...

長... 甘... 草... 冬... 冬...

益... 救... 喉... 冬... 冬...

何... 北... 冬... 冬...

喉... 外... 冬... 冬...

中... 高... 冬... 冬...

喉... 喉... 冬... 冬...

喉... 喉... 冬... 冬...



喉瘤生於喉間兩傍或單或雙形如圓眼大血絲相裹如瘤故名之此症肺經受熱多語損氣或怒中高喊或誦讀太急或多飲燒醞酒或多噉炙煨物犯之卽痛不犯不痛須要斂神晏息以藥攻之則此症脫落矣不可用刀点破

益氣疎風湯

升麻

甘草

當歸

川芎

生地黄

白芍

桔梗

花粉

黃芩

麥門冬

前胡

青皮

乾葛

紫蘇

連翹

白蒺藜

防風

麝香散 日夜吹之

真麝香 二多
冰片 三分

黃連末 一多

右研末和勻蘆管吹入患處一日夜五六次

又一人口內生肉毬有根線長五寸餘吐毬出方可
飲食以手輕捻痛徹至心煎劑同前再用真射香
二錢分二次水調服之或用射香散三日根化而
愈

又一人咽喉間生肉層，相疊漸，腫起有孔出臭
氣用臭狗橘葉煎頻服之而愈
一人舌上忽出血如簪孔赤小豆一升杵碎水三碗

和搗取汁每服一盞不拘時服槐花末摻上尤良
一人齒齦邊津液血不止苦竹茹四兩醋煮含嗽吐

之

又一人齒齦出血肉色赤腫痛者用此汁漱之

款

二款合之六米隨用之

身以手彈之能至心直除回前再

又一人口內肉肉將食難辨身正作

古瓶末味

真熱香

熱香指 日齊火文

懸癰



名媛

重臣米... 人... 田... 苦不... 官... 此... 四

此毒生於上腭形如紫李墜下抵舌其人口不能
言舌不能伸頭不能低仰面而立鼻中時出紅涕
若不速治毒入於腦卽死治方於後

用銅匙挑開口竹批針破癰頭用葢湯攪淨血出
盡用冰片散吹入患處閉口以待藥化自然嚙下
連吹三五次仍服荆防敗毒散再服雄黃化毒丸
三丸冷茶消下此症形雖註外其實生口中上腭

鎖喉瘡



此乃
君

鎖喉瘡者心經毒氣小腸邪風發於聽會之端注
於懸膺之側初生如癩瘰不能飲食閉塞難通漸
次腫破化膿早治得生宜服當歸連喬散之類內
用冰片散牛黃清心丸之類治之
蜈蚣不拘以射香火片和搗搽之

傷寒喉閉

時氣重者喉閉五熱而食

一人湯寒者山十湯安日十

諸君

重者

人卷

白芷

增益眼微其流其力

人付心跡難對悉罪四小為漸

北慈濟寒飯真不期延我大日



此症傷寒道毒不散致八九日後喉閉皆因熱毒入於心經脾經急服四七氣湯二三貼次用冰片散後服蠲毒流氣飲

白芷

防風

陳皮

連翹

人參

香附

川芎

當歸

玄參

花粉

枳殼

甘草

桔梗

柴胡

粘子

山梔

一人傷寒舌出寸餘連日不收用梅花冰片摻舌上即收重者用五錢而愈

双蛾風

双蛾風

採子

甘草

當歸

好單當歸製香散

香散小女茶前發子大限米中婦如火入煮大立散

少得宜即伴燈出風卷新研白椒製香散散黃外

此藥皆關其五身開用此散吐豆八法律傳香散



此症有兩枚在喉間兩邊如豆大急將黃蘗汁蜜
少許玄明粉漱出風痰仍服當歸連喬散雄黃化
毒丸七九茶清送下次用米片散吹入數次立効
後服當歸連喬散

當歸

地黃

連喬

前胡

甘草

枳殼

桔梗

黃芩

粘子

玄參

花粉

白芍

加燈心

口緊



一名月闕瘡

一名鴈來風

一名蟲蝕瘡

此症急用馬齒莧汁洗緊唇仍用黃蘗汁灌去風
痰再用冰片散吹之然後服防風通聖散

防風

大黃

朴硝

川芎

甘草

當歸

黃芩

滑石

石膏

薄荷

山梔

麻黃

荆芥

桔梗

白朮

連翹

白芍

如毒氣歸心胸前脹滿上氣頰促下部洞泄不止
必死難治

木舌乳蛾



木舌乳蛾
此症多因心火上升
或受風寒而起
初起喉痛
繼則舌腫
甚至不能
飲食
此症多因心火上升
或受風寒而起
初起喉痛
繼則舌腫
甚至不能
飲食

五十六

PDG

此症為因心經熱毒或因酒後濕牀厚被以致熱氣攻於心經故生單蛾及舌脹而紫吐出風痰急用三稜針刺舌下金津玉液二穴及刺乳蛾俱破出血痰却用膽硝丹吹入喉中仍用荆防敗毒散雄黃化毒丸用茶湯清送下吹藥同前

一婦人木舌脹滿口諸藥罔効以銚針砭之五七次腫減三日方平血出盈斗服藥同前

炮製法

人參

去蘆飯上蒸

陳皮

去白即橘紅

半夏

滾湯泡浸去皮再用生薑汁浸或菜油拌炒大能豁痰

黃芪

去根或盪水拌或蜜炙

白朮

米泔浸炒瀉用陳壁土炒

茯苓

去粗皮赤白二種隨症用

甘草

或生或炒細小者能治小便痛

當歸

酒洗

川芎

大者撫芎小者又有種西芎傷寒科可用餘不可用

白芍藥

或生用或白炒或酒炒

白朮

去梗微炒

淮熟地

酒洗同上

乾葛

剉片取末白者佳

白山藥

微炒

荆芥

去梗取穗

獨活

去蘆

黃芩

去蘆水煎二沸上部用酒拌炒

桔梗

去蘆頭炒

玄參

去老根

赤芍藥

同上

淮生地

酒洗不犯鐵器

升麻

去須

藿香

水洗去泥土味香者真

防風

去蘆

羌活

去泥土并蘆

薄荷

去梗

條芩

酒煮堅實者是胎前用

天花粉

白色者佳去油色

白芷

水洗不宜見火

蒼朮

拌炒 淋浸後用鹽

紫蘇

葉梗紅 色者佳

硬柴胡

去蘆

麥門冬

水洗去心

杏仁

湯泡去皮尖 并雙仁不用

黃連

去苗或用酒或 用姜汁拌炒

知母

去毛鹽 酒拌炒

猪苓

去砂石 醋拌炒

五味子

去梗槌碎

山茱萸

去核

厚朴

紫實者佳 姜汁拌炒

前胡

去蘆

軟柴胡

去蘆水洗

天門冬

水洗去心

桃仁

去皮尖 并雙仁

黃栢

去粗皮鹽酒 拌炒禱色

山梔

去殼姜汁拌炒 大者名伏尸不用

澤瀉

炒

吳茱萸

鹽水煮三四滾取 出晒乾再炒去梗

枳實

同麩皮炒

枳殼

去穰同
麩皮炒

青皮

同麩皮炒

官桂

味濃厚者名肉桂形薄
味淡者名薄桂能行經絡

續斷

去蘆

鼠粘子

即牛旁子
炒研用

紫蘇子

去泥土微
炒研末

麻黃

滾湯內
去沫

貝母

去心

金銀花

白蒺藜

去刺炒

烏藥

不見火

秦艽

洗去泥土
酒拌晒

桑寄生

忌火

龍膽草

酒拌炒須
洗去泥土

蔓荊子

炒

南星

白礬皂
莢同煮

連翹

去梗研

瞿麥

紅花

牡丹皮 水洗去

阿膠 蛤粉炒 或生用

茵陳 去梗不 宜見火

牛膝 去老梗 酒洗

檳榔 微炒

玄胡索 微炒

辛夷 去蒂

藟子 炒研

江子 去殼去油 即巴豆

木鱉子 去殼

地骨皮 去梗水洗

百合 水洗

紫菀 去根

杜仲 去粗皮 鹽酒 拌炒斷絲

大腹皮 曬乾再炒 黑豈汁煮

香附 炒黃或童便醋 鹽水浸任

蒲黃 炒或生用

莞鈴 去筋膜

乾姜 或煨或 煨灰用

皂角刺 酒拌炒

皂莢 去絲筋

豬牙皂角 炙

砂仁 微炒研

木香 不見火

肉果 糯米粉捏細包火內煨熟麵亦可剉片紙包打去油用

天麻子 去殼

苦參 酒炒

冷飯糰 米泔洗水搥碎之忌鉄白者佳紅色者能殺人

葶藶

山查 研碎炒磨末去子

神麩 炒黃色

麥芽 炒

白匾荳

香薷

滑石 研末水飛

大黃 或生或酒煨或蜜水浸煎

寒水石 或生用或煨

車前子 炒

遠志

甘草水浸
去骨

藁本

去芦
不見火

赤根

卽麻黃根
止汗

三稜

醋拌炒

附子

炮

白薇

威靈仙

酒洗忌茶

僵蠶

炒

槐花

炒

五加皮

酒炒

細辛

不見火

石斛

去頭土酒浸
一宿曬乾

天麻

明亮者佳

蓬朮

醋拌晒炒

白芨

川廣者佳

何首烏

牽牛子

去皮取末

姜黃

牛膠

或生用或
麩皮炒

丁香

大者爲母
丁香去蒂

淡竹茹 淡竹先刮去青用第二層

益智

射干

木瓜 紅色者佳

地榆 水布揩淨

川烏 炮

蟬脫 水洗去土

茴香 忌火

酸棗仁 去壳取仁微炒

白蘚皮 去梗

海桐皮 不見火

甘菊 眼科用酒拌晒

薏苡仁 炒

灰菱仁 去殼

牡蠣 火煨童便浸再煨

菖蒲 九節者佳

款冬花 去梗

麻子 研

茯神 去皮木

川槿皮 去粗皮

桑白皮

去黃皮炒
或蜜炙

甜瓜子

微炒腹中
癭不可缺

枇杷葉

布揩去毛
姜汁炒

艾葉

去梗

玄明粉

卽皮硝冬天用白葡萄煮三四沸取出傾入
缸內夜露早晨取明亮者另入一器風化

用其汁再
如前取之

芥菜子

晒乾研

鳳仙子

微火炒

黃蜀葵子

微炒

馬鞭草

去老根

稀莨草

去梗

射香

不宜見火藥店上多將泥土
及荔枝核炙焦研末和之

鹿角

火煨

犀角

鎊或用
水磨

羚羊角

鎊

冰片

客商多有番硝和之火上
燒火起是硝香者片也

雄黃

夾石者不宜用

牛黃

口中苦後香甜者真

輕粉

明亮輕浮者真

絨灰

有羊絨大紅絨煨灰摻藥內用

雞內金

即雞肫內黃皮焙乾研末或煨灰存性用

白礬

或生或火煨

樟冰

風子 去殼取肉

乳香

蕭葉上慢火炙黃同石研方細今有假者似之

沒藥

血竭 香赤色者真腥氣者假

孩兒茶

蟾酥

硫黃

青色者不宜用

珍珠

入豈腐煮一伏時

五倍

去內虫窠

人中白 煨

韶粉 即面粉

菘荳粉 微火焙乾水

青靛 散者佳成糲者

穿山甲 灰火內炮

海藻 水洗去泥土用烏

琥珀 拾得芥者真

金箔 多有假者

蛤粉 紫口蛤蜊 煨灰研末

龍骨 火煨

鱉甲 或煨或醋炙

花藥石 火煨醋淬

辰砂 水飛

膽礬

昆布 水洗去沙土園藥 中用醋煮加姜汁

續隨子 去壳去油

銅青 火上微煨

赤石脂 粘唇者佳

礪砂 去石即 撓砂

海螵蛸 去塵土

龜甲 童便浸七日長流水 洗淨醋煨酥潤之

象皮 剉片火炙

丁皮 不見火

橘葉 洗淨剪碎

橘核

皂莢子

澤蘭

旋覆花 去蒂

谷精草

細茶 去梗

天竺黃

今有假者以化
過人骨代之

蘆薈

水中兩塊粗
移近者真

草決明

石決明

冬青子 飯上蒸

白沙參

紫花地下

附子不可輕用

附子味辛甘氣溫大熱有大毒製法以童便煮而浸

之再用文武火以烈其毒且可助下行之力入鹽
尤捷此佐使之藥通行諸經其性善走而不守浮
中沉無所不至陽中之陽故行而不止用之得宜
有奪旗斬將之功用之不宜有殺身殞命之禍每
人參一錢爲君止可下附子一二分爲使再加甘
草以解其毒內外之症遇嚴寒時候瘡口沉塌四
肢厥冷寒濕疼痛躄攣拘攣膝痛不能行步腰脊
風寒伏陰傷寒方可下附子不審陰陽虛實一槩
用之使人服後火鬱中焦氣鬱下焦咆哮喘急頃
刻而斃凡用附子者豈可不細審乎

解附子毒令多汲新水連飲數碗遂大嘔洩方解其毒也又不可不知也

但醫術淵奧皆臻要妙之門方法宏深盡藏幽微之理噫余非敢誇言立論但志在養生心存濟物况子幼家貧若此書秘於一家則公人之念泯矣遂校正之增衍以待來學

總論病家大畧

夫人之身配天地陰陽善攝生者須飲食有節起居有常不妄作勞形與神俱則榮衛周流六淫無自而入何痛之有不善攝生者以酒爲漿以妄爲常

起居不謹飲食失節形氣損傷六淫之邪相侵則
醫藥之道作矣故莊子有養生主篇蓋心爲吾身
君主之官神明出焉養生者所以養此心也修心
養性之術旣不能習於未病之先調攝保養之功
又不能察於已病之際夫旣病矣要須安常處順
視富貴如浮雲恬淡心志怡養精神不妄想不遷
怒不作勞卽有勿藥之喜若心猿意馬戚於功
名孜孜於貨利瑣煩惱汲榮辱病已在身心
不在病或勞心或勞力而君主之官昧焉五神失
位六賊內戕欲疾之愈也得乎清真子曰大凡人

卧病卽於胸前寫一死字則百般思慮俱息此心
便得安靜勝如服藥此真無上妙方也是故醫書
云惟富貴之人從生至長無敢逆其意及其病也
將平時所畜醫書看得一二便要誇言立論考訂
醫人以是爲非以非爲是倔強爭論不知病之淺
深脉之虛實藥之寒溫若遇諂諛貪利之輩心先
自歎拱手聽命惟言是從不敢折論妄投藥劑輕
用針刀廿久傳變遂致病者勢益危篤雖扁鵲復
生不能治矣乃若直道醫人精思病源酌古准今
冀一藥而愈以奏回生之功苟不見聽則飄然而

去肯徇情哉又有病者不肯服藥煎成傾於地徒
爲虛語應答反言醫之無功及至斃也真情發露
與醫何干故東坡先生有曰吾平生求醫已於平
時默驗其工拙至於有疾必先盡告以所患而後
使之診視使醫者了然知厥病之所從來庶病証
先定於心而脉之疑似不能惑也故雖遇中醫療
疾亦能常愈吾求疾愈而已豈以困醫爲事哉斯
言真警迷濟世之箴規也近世以來多隱所患而
試驗醫之能否醫亦不屑下問挾己之長而治其
病從前至後其誤益多矣與醫何尤實病家自誤

之也故龍虎經云鍊得陰陽元氣足始知成立自
虛無黃庭經云修真之士窮造化之原知升降之
路安神定息一念不生湛然無欲其氣週流自然
造化老子曰綿、若存用之不勤太素曰出入廢
則神機化滅升降息則氣立孤危因世人不知返
本窮原之道故聖人指性命之根令人蕪神聚氣
還返往來歸根復命也故人之生也賦性於天養
性於地百年之身從此可保內外之証何由而生
岐伯曰恬憺虛無病安從來一有拂鬱諸病生焉
正謂此也養生之士宜詳察之并附六不治於後

驕恣不論乎理一不治
輕命重財二不治
衣食不週三不治
陰陽并藏氣不足四不治
形瘦不能服藥五不治
信巫不信醫六不治

醫家切戒

聖人繼天立極憫黎元之疾辨察百藥以治百病由
是有方書之學而醫道興焉上醫治國中醫治人
下醫治病經曰不治已病治未病不治已亂治未
亂此治國治人之道盡之矣其下醫治病殆猶良
將之用兵也量敵而後進慮勝而後會察色觀形
便知臟腑之疾臨機應變務度緩急之宜今古不

同世俗亦異若執古方以治今病猶拆舊屋以接
新屋不經匠手不可適於用矣况醫司人命任大
責重不可輕易臨病之際兢兢業業心到眼到手
到因病立方因方用藥視人之疾猶己之疾不別
其貴賤親疎推廣天地好生之德貧則施惠富無
苟取推誠拯救務俾此業爲仁術勿爲盜蹠劫人
於道路夫盜亦人也爲貪心所使遂致污名喪命
醫乃九流中之高術人稱曰醫師豈可使下同於
盜哉近世有初學之輩不讀內經百家羣書輒就
行醫開肆不讀本草焉知藥性專泥藥性決不識

病假饒識病未必得法識病用藥工中之甲能窮
素問病受何氣便知用藥當服何劑苟圖富貴一
遇病家卽出大言警嚇生死噫渠旣病矣死生未
可卜也所仰望者在醫人耳若果可治務要盡心
日夜思所以愈之苟不可治亦更精思之不可
遂以不可治告之使彼早備送終之具免其倉卒
失禮以致終天之恨若懷利心進退惑亂謂之行
醫可乎近觀博奕好飲者流連勝負不知病家之
急婪財肥家者較計豐嗇遂忘濟世之心莊子曰
盜賊亦有仁義禮智信今醫人乘急取財尤甚於

盜賊矣是可忍也孰不可忍也國語云無德而福
隆猶無基而厚墉也壞無日矣魏子云薄米當白
日聚毛遇烈火所以喻今之祖父聚斂而子孫輕
廢之謂也理窟言採金於千仞之山而人不顧其
覆壓之禍者利於金也求珠於不測之淵而人不
顧其沉溺之患者利於珠也此乃貪夫所徇醫以
活人爲業豈可徇利乎人而無恒不可以作巫醫
巫所以禱鬼神干係雖輕然不誠則鬼神難格巫
固非可倫於醫巫尚不可不盡誠况醫司人命其
可視之如戲而不恒其德乎有陰德者天必報之

苟望報而爲筭亦非仁人君子之用心矣余賴祖
父之業勉承斯業然濟人利物之心竊有志焉每
以不學爲恥恐蹈夫孤陋寡聞之域斯則余之日
兢、焉者也予性甚粗予言甚倨素多取戾於人
荷高明君子同道之士俯念蠢直不我咎也

醫家七診

- 一 靜其心 存其神也
- 二 忘外意 無思慮也
- 三 均呼吸 定其氣也
- 四 輕指於皮膚之間探其膈脈 浮也

五 微重指於肌肉之間取其胃氣 中也

六 沉指於骨上以取其臟脉 沉也

七 察病人脉息數來也

二 初長

一 錯在

胃寒少

脈高則發之曰發之曰

熱，無火也。子時有時不

以不熱也。少時天寒

及之業。其氣也。以

傳望。雖而為。其氣也。以

立相六千七百五十息是陰六千七百五

十

十息是陽呼為陽吸為陰也榮衛相隨各

行

二十五度六千七百五十周於身漏水

下

百刻凡人一晝一夜一萬三千五百息

扁鵲云人受天地之中以生所謂冲氣也

其天五之氣如自中焦播於諸脉

三焦

經手以陽起於小指次指之端循手

腕

至目兌管子時注膽

膽

經足少陽起於目兌管入大指岐骨肉

而

出於城丑時注肝

脾

經足厥陰起於大指聚毛之際上循足

大

附上廉上入肺中寅時注肺

肺經手太陰起於中焦下膈大腸其支者

從腕後直出次指內廉出其端卯時注大

陽

大腸經手陽明起於大指次指之端內側

循

指上連其支者從缺盆上頸貫頰入下

齒

中上掖鼻孔辰時注胃

胃

經足陽明起於鼻交頰中下循鼻外入

上齒中其支者入大指間出其端巳時注脾

肝

此脾經足太陰起於大指之端循行內側白

與

肉際其支者入胃別上膈午時注心

腎

心經手太陰起於心中入掌內循小指出

入

其端未時注小腸

吸

小腸經手太陽起於小指之端循手外側

地

其支者從臍內左右別下循京骨至小指

而

外側酉時注腎

陰

腎經足少陰起於小指之下斜趨足心其

為

支者從腎上貫肝膈入肺注胸中戌時注

吸

心包

誌

於手太陰肺經上合雞鳴下應潮水其氣

直

與天地同流加一至則熱減一至則寒古

絡


人處百病決死生候此而已

之玩細心究學者死生決以十二時配合十二經

直誌絡人處百病決死生候此而已

右手

左手



寸關尺
寸關尺
寸關尺

寸關尺
寸關尺
寸關尺

寸關尺

寸關尺

寸關尺
寸關尺
寸關尺

脉胃膀胱並屬陽道非
但三焦及大腸小腸五
藏之源氣
治行於陽凡焦者有名
無形尺主下焦小腸至
足陽明
關主中焦及腰背脊一
寸上寸主上焦頭皮及
毛盡手陽明

臟喻山腑喻道收陰陽之道合於道五臟之氣候是
以黃帝論氣之行營必分勇怯故扁鵲治病忌神
明之失守叔和論脈辨性氣之緩急欲療病人先
察其源五臟未虛六腑未竭血脈未亂精神未散
服藥必活然用芳草石藥必察緩和看外證得神
者昌失神者亡外證面塵色脫也脈診得沉細而
微難治也

黃帝曰醫家之用功者以專持毒藥不察病之淺深
而不問其情則精神不進志意不治故病不可愈
內經所以閉戶塞牖數問其情夫用火毒之藥若

善藥不能取効不得已而用之可也

脉息節要

七表八裏

浮芤滑實弦緊洪乃七表也
微沉緩澁遲伏濡弱八裏也

七表爲陽

象易少陽之數也

浮脉者輕手廼得重手不見脉見諸陽爲表熱諸陰

爲表寒

浮動在肌肉之上
浮屬陽病在表也

芤脉者浮大軟而按之中央空兩邊實也
脉中間空
虛芤主熱

甚

滑脉者不澁也
多與實數相兼爲病熱
或滑兼遲者病寒也

實脉者大而長沉浮皆得而數陽熱甚也

弦脉者奐虛而滑端直以長也
弦如張弓如琴
弦也弦主風

緊脈者不緩也或如轉索或如切繩者緊脈主痛

洪脈者極大而數舉按滿指實熱之極甚也

八裏爲陰象易少陰之數也

微脈者若有若無極細而軟也多兼於遲主於陰寒

微沉緩濇遲伏濡弱見諸陰脈也不可便言爲寒當以標本明之

沉脈者輕手不見重手迺得動在肌肉之下也沉屬陰病

裏在

緩脈者縱緩而不緊似遲而小疾也緩而遲爲寒緩大而長熱

濇脈者澁而不滑也或如刀刮竹或澁而止住者澁主

心病

遲脈者一息四至已下也氣液虛損故脈遲病

伏脈者脈附於骨附親近也沉之甚也伏主水畜於內積飲不散也

濡脈者按之似無而舉指無力也有似微弱主極冷多兼於遲

弱脈者軟虛而無力也弱主虛冷必兼微而遲也

四時平脈

春弦 夏洪 一日數 秋毛 一日浮 冬石 一云沉

○第二明當藏之病

其液汗 心風嗜忘 心風寸浮數 心風成癩癩

○從肝腎起

其聲言 心氣痛甚 心氣寸緊 心氣成伏梁

○從脾起

其味苦

心熱狂走

心熱寸焦數

心熱風狂走

○從肝虛飢

其臭焦

心冷死矣

心冷寸沉瀦

心冷成癢

真心痛手足冷

其色赤

心虛嗜驚

心虛寸濡弱

心虛成恐懼

右上五般之病除虛不灸餘四種並灸心俞第七
椎相去二寸二分量病輕重上至一百下至三壯
一七若從起處灸之亦差餘並倣此也不須更敘

椎與椎同音捷七
椎第七脊之骨也

○從肝起

其液泣

肝風筋脉痠痛

肝風關浮數

肝風癩癰頸筋急

其聲叫

肝氣左脇痛

肝氣關緊強

肝氣風癰氣左脇妨

其味酸

肝熱骨節疼

肝熱關洪盛

肝熱成精目赤骨節煩

其臭死

肝冷不食暴吐水

肝冷關沉細

肝冷有痰飲清風

其色青

肝虛多恐懼

肝虛關孔濡

肝虛恐思無力

右上五般病當灸肝俞從大椎下行至第九椎七
椎，相去二寸三分候本藏脉或從餘藏來當灸
餘藏還量老少病若重或輕量事而制之除虛
灸也

○從肺起

其液涕

肺風皮膚生瘡

肺風寸浮數

肺風鼻塞流涕

其聲哭

肺氣成上氣噎

肺氣寸緊數

肺氣上喘氣膈

其味辛

肺氣成癥嗽病

肺熱寸洪濇

肺熱頭面生疱瘡

其臭腥

肺冷成面墨悲

肺冷寸沉細

肺冷右脇生癢氣

其色白

肺虛饒涕皮痒

肺虛寸孔濡

肺虛鼻中肉結生

右件五般病除虛不灸餘並灸之從大雁下行至

第五雁夾相去二寸三分若從餘藏未候當藏脉

量老少輕重制之

○從脾起

其液涎

脾風旋重

脾風闕浮數

脾風癱緩右邊多重

其聲歌

脾氣皆妨

脾氣闕緩實

脾氣皆痛久成瘦病

其味甜

脾熱饒睡

脾熱關洪數

脾熱成黃亦爲三消

其臭香

脾冷吐水

脾冷關細瀉

脾冷風入尺胃痰飲脹滿

其色黃

脾虛來欠

脾虛關浮朮

脾虛心熱嗜饑嘔

右件諸病除虛不灸餘並須灸第十一椎兩邊相
四寸半季肋盡處卽是隨病輕重而灸之若從餘
藏來當候脉而灸之量不妨藥治

○從腎起

其液唾

腎風旋吐痰

腎風尺浮數

腎風痿攣急

其聲呻

腎氣脇脊疼

腎氣尺浮緊

腎氣背脇疼煩

其味鹹

腎熱骨煩疼

腎熱尺洪數

腎熱陰毒時行

其臭腐

腎冷腰脚疼

腎冷尺沉細

其色墨

腎虛頭足痠

腎虛尺浮弱

腎虛多風耳聾

右上諸病除虛不灸餘病並灸腎俞大椎下行至第十四椎兩邊相去四寸是內腎又夾此椎相去七寸八分斜下是外腎俞亦主膀胱俞也不妨藥治之恐不審細仍爲圖記之後人背面

第三五藏相入

肝病入心

肝風入心 爲癇亦成癩癰項筋急頭痛舌縮壯熱

肝氣入心 爲瘰癧氣痛甚難忍左脇下痛

肝熱入心 項筋急目赤舌乾少睡嗜驚恐

肝冷入心 爲吐醋水飲食不下手足冷，如鐵名

心痛

肝虛入心 嗜驚惡罵躁暴不欲聞人語聲則叫呼

右此五般之病除虛不灸餘並灸之當候之脉從何生灸之卽不錯也兼須服藥大段灸之當候之脉穴同上心病入亦准上子不合傳母之逆也病

卽難差

肺病入心

肺風入心

咳嗽唾血身體戰掉拉，不安皮膚搔

痒瘡疥

肺氣入心

胃中病痛取氣短卧不安胃背痛悶不

已

肺熱入心

嗽逆吐血皮膏生瘡喘息麤短面赤

肺冷入心

目中多淚悲思不已面目青墨色不常

肺虛入心

悲啼思慕嗜驚怕怖皮膚白色

右此五般病狀除虛不灸量病輕重觀其老少斟

酌之不妨服餌

心病入肺

心風入肺

皮膚生瘡白屑白癩翻疥癩肉中生結

子

心氣入肺

曾背熱悶曾前及背上熱結子

心熱入肺

皮膚熱蒸手足煩悶曾中及口生瘡

心冷入肺

雞皮白膚面無血色尪弱怯懼無色

心虛入肺

啼泣悲哀目中冷淚鼻塞口乾悲思

右五般病除虛不灸其餘並灸當候其脈輕重老

少藥性臨時制之

腎病入心

腎風入心

爲癩拂然而死輕則眼旋目前生花

腎氣入心

爲痲痺氣動而改變爲氣病面黃

腎熱入心

爲狂顛之病輕則骨煩名陰毒時行

腎冷入心

手足冷如鐵是名真心痛甚則死

腎虛入心

四體昏，喜汗出足無力困悶昏

右此五般病亦候其脈除證不多視老少患狀斟

酌不得可依

心病入腎

心風入腎

脚心熱吸，無力手足骨節痠疼頭痛

心氣入腎

連臍痠痛兼膀胱及腰脚痛不可忍