

景岳全書外科鈴古方卷之六十四 春集

會稽 張介賓 會卿著

會稽 魯超 謙菴訂

外科

仙方活命飲 治一切瘡瘍未成膿者內消已成膿者即潰

此止痛消毒之聖藥也

川山甲 蛤粉炒 白芷 防風 天花粉

赤芍藥 歸尾 乳香 沒藥

外科

貝母

皂刺

甘草

各一錢

金銀花

陳皮

各三錢

酒一碗煎數沸溫服

托裏消毒散

治瘡疽元氣虛弱或行攻伐不能潰散服之

未成即消已成即潰腐肉即去新肉即生若腐肉既潰而新

肉不能收欵屬氣虛者四君子湯為主屬血虛者四物湯為

主氣血俱虛者十全大補湯為主並忌寒涼消毒之劑

人參

隨證增減

黃芪

鹽水拌炒

當歸

川芎

芍藥

炒

白朮

炒

茯苓

各一錢

金銀花

白芷 各七
分

甘草

連翹 各五
分

右水煎服○陳氏托裏消毒散內多陳皮方在痘瘡○

秘方托裏散 三

治一切瘡毒始終常服不致內陷

瓜蒌 大者一
個并

當歸 酒并

黃芪 鹽水
炒

白芍藥

甘草 各一
兩半

熟地

天花粉

金銀花

皂刺 炒各
一兩

右每用藥五兩以無灰酒五茶鍾入磁器內厚紙封口再用

油紙重封置湯鍋內蓋煮至藥香取出分服直至瘡愈○立

齋曰此方藥品平易消毒之功甚大且不動臟腑不傷血氣

不問陰陽腫潰屢用屢效真仙方也常治發背腦疽勢盛者
更用隔蒜灸之若脉沉實大小便秘者先用疎通而後用此
其功甚捷若火毒已退不作膿或不潰者更宜托裏潰而不
斂及膿清者用峻補

神功托裏散

四

一名金銀花散○治癰疽發背腸癰乳癰及

一切腫毒或痲痛憎寒壯熱

金銀花

黃芪

當歸

甘草

等分

右用酒水各一鍾煎至一鍾分病上下食前食後服之少頃
再服一劑粗敷患處不問老少虛實皆可服若為未酒調服

尤妙

參芪托裏散 五

治瘡湯氣血俱虛不能起發或腐潰不能收

欬及惡寒發熱者

木人參

氣虛多用之

黃芪炒

白木炒

當歸

熟地

芍藥

酒炒

茯苓

陳皮

各一錢

石水煎服

參芪內托散 六

方在痘疹七

治癰疽膿毒不化及潰後作痛

托裏養營湯 七

治癰癤流注及一切癰疽不足之證不作膿

或不潰或潰後發熱或惡寒肌肉消瘦飲食不思睡臥不寧
盜汗不止

人參

黃芪 炙

當歸 酒洗

川芎

芍藥 炒

白木 炒各一錢

熟地 二錢

五味子 炒研

麥冬

甘草 各五分

水二鍾薑三片棗一枚煎七分食遠服

托裏黃芪湯入

治癰疽氣虛作渴甚效

黃芪 蜜炒六錢

甘草

天花粉 各一錢

水二鍾煎八分頻服之○加人參一錢亦可○若氣血俱虛

虛血大泄而作渴或兼發熱者宜用托裏養營湯

補黃芪湯九 治癰毒內虛毒不起化及潰後諸虛迭現

黃芪炙

麥冬各一兩

人參五錢

熟地三錢

茯苓

甘草炙各七分

白芍藥二錢

當歸

川芎

遠志

官桂各五分

右每服一兩薑棗水煎服

托裏當歸湯十

治潰瘍氣血俱虛或疔熱內熱寒熱往來或

婦人諸瘡經候不調小便頻數大便不實等證但瘡瘍氣血

虛而發熱者皆宜服之久服亦收斂瘡口

入參

黃芪

當歸

熟地

川芎

芍藥

柴胡

甘草

各一錢

各五分

右水煎服

托裏健中湯

十一

治瘡瘍元氣素虛或因涼藥傷胃飲食少

思或作嘔瀉等證

人參

白朮

茯苓

半夏

各二錢

炮薑

各錢

黃芪

牛一錢

炙甘草

五分

肉桂

三分

右薑棗水煎服

托裏溫中湯

治瘡瘍膿潰元氣虛寒或因剋伐胃氣脫

陷腸鳴腹痛大便溏泄神思昏憒此寒變內陷緩則不治

附子炮去皮 乾薑炒三

臍二錢 錢

益志 丁香

羌活

沉香

木香

茴香

陳皮各一錢

炙甘草二錢

右薑水煎服

托裏益中湯 治中氣虛弱飲食少思或瘡不消散或潰

而不斂

人參

白朮

茯苓

炮薑

陳皮

半夏各一錢

木香

炙甘草

各五分

右薑棗水煎服

托裏溫經湯 十四

治瘡瘍寒覆皮毛鬱遏經絡不得伸越熱

伏營中聚結赤腫作痛惡寒發熱或痛引肢體若頭面腫痛

厥甚仍宜破之

麻黃

升麻

防風

乾葛

白芷

人參

當歸

芍藥

甘草

蒼朮

各一錢

右水二鍾煎一鍾服臥煖處得汗乃散○或加柴胡

托裏益黃湯 十五

治脾土虛寒水反侮土以致飲食少思或

嘔吐泄瀉等證

人參

白朮

茯苓

陳皮

半夏

錢各一

炮薑

丁香

炙甘草

分各五

右薑棗水煎服

托裏清中湯

十六

治脾胃虛弱痰氣不清飲食少思等證

人參

白朮

茯苓

陳皮

錢各一

半夏

八分

桔梗

七分

甘草

五分

右薑棗水煎服

托裏抑青湯

十七

治肝木侮脾脾土虛弱以致飲食少思或

一胸膈不利等證

人參

白朮

茯苓

半夏

陳皮 各一錢

芍藥

柴胡

甘草 各五分

石薑棗水煎服

托裏營衛湯 十八

治瘡瘍外無焮腫內便調和乃邪在經絡

也宜用此藥

人參

黃芪

當歸

甘草 炙

紅花

柴胡

連翹

蒼朮 米泔浸炒

羌活

防風

黃芩 各一錢

桂枝 七分

右酒水煎服

托裏越鞠湯 十九

治六鬱所傷脾胃虛弱飲食少思等證

人參

白朮

各二錢

陳皮

半夏

各一錢

山梔

川芎

香附

蒼朮

各七分

炙甘草 五分

右薑棗水煎服

定痛托裏散 二十

治瘡瘍血虛疼痛之聖藥也

粟殼

去蒂炒 二錢

當歸

酒拌

白芍藥

炒

川芎

各一錢半

乳香

沒藥

肉桂

各一錢

右薑棗水煎服

內托復煎散

治瘡瘍焮腫在外其脉多浮邪勝必侵於

內宜用此托之

人參

白朮

炒

當歸

黃芪

鹽水炒

芍藥

炒

茯苓

甘草

炙

地骨皮

肉桂

防己

酒炒

黃芩

各一錢

防風

二錢

右先以蒼朮一升水五升煎去朮入藥再煎至二升終日飲

之

內托羌活湯

二二

治腎癰堅硬腫痛兩尺脉緊無力

羌活

黃柏各一錢

防風

當歸尾

藁本

肉桂各一錢

連翹

蒼朮米泔浸炒

陳皮各五分

黃芪鹽水炒一錢半

右水酒各一鍾煎八分食前服

內塞散二三

治陰虛陽邪湊襲患腫或潰而不斂或風寒襲

於患處血氣不能運行久不能愈遂成漏證

附子童便浸炮

肉桂去皮

赤小豆

炙甘草

黃芪鹽水炒

當歸酒拌

茯苓

白芷

桔梗炒

川芎

人參

遠志去骨

厚樸 制各一兩

防風 四錢

右為末每服二錢空心溫酒下或酒糊丸鹽湯下或煉蜜為

九亦可

沖和湯 二四

治瘡屬半陰半陽似潰非潰似腫非腫此因元

氣虛弱失於補托所致

人參

陳皮 各二錢

黃芪

白朮

當歸

白芷 各一錢半

茯苓

川芎

皂角刺 炒

乳香

沒藥

金銀花

甘草節 各一錢

石水酒各半煎服

神效酒煎散 二五 治一切瘡瘍能托毒散毒其效如神

人參

沒藥 另研一 當歸尾 各一 甘草 三錢

括箕 二個半 生牛炒

右以酒三碗煎二碗分四服○或以為末酒糊丸桐子大每

服五十九丸用酒下善消毒活血

人參黃芪湯 二六 治潰瘍飲食少思無睡發熱

人參

白朮

蒼朮

麥冬

陳皮

當歸

升麻 各五分

黃芪 一錢

外科

黃栢炒四分

右水煎服

黃芪人參湯二七

治潰瘍虛熱無睡少食或穢氣所觸作痛

黃芪鹽水炒二錢

人參

白朮

蒼朮米泔浸炒

當歸酒拌

麥門冬

五味子炒敲各一錢

甘草炙

升麻

神麴炒

陳皮各五分

黃栢酒炒三分

水二鍾薑三片棗一枚煎服

黃芪建中湯二八

內托癰疽諸毒

黃芪蜜炙

肉桂各三兩

甘草炙二兩

白芍藥六兩

右每服一兩薑棗水煎服

參朮補脾湯 二九 治肺疽脾氣虧損久欬吐膿或中滿不食

必服此藥補脾土以生肺金否則不治

人參

白朮

各二錢

黃芪

二錢半

茯苓

當歸

陳皮

各一錢

麥冬

七分

北五味

四分

桔梗 六分

炙甘草 五分

右薑棗水煎服

參芪補肺湯 三十

治肺證欬喘短氣或腎水不足虛火上炎

痰涎壅盛或吐膿血發熱作渴小便短澀

人參

黃芪

白朮

當歸

陳皮

茯苓

山藥

山茱萸

各一錢

各二錢

五味子

炙甘草

熟地黃

麥門冬

各五分

一錢半

牡丹皮

各八分

右薑棗水煎服

益氣養營湯

三一

治懷抱抑鬱或氣血損傷四肢頸項等處

患腫不問軟硬赤白腫痛或日晡發熱或潰而不斂

人參

黃芪

當歸

川芎

鹽水炒

熟地

芍藥

貝母

香附

炒

茯苓

陳皮 各一錢

白朮 二錢

柴胡 六分

甘草

桔梗 各五分

右薑水煎服○口乾加五味子麥門冬往來寒熱加軟柴胡

地骨皮膿清加入參黃芪膿多加川芎當歸膿不止加入參

黃芪當歸肌肉遲生加白薇官桂

補陰八珍湯 三二

治瘰癧等瘡足三陰虛者

人參

白朮

茯苓

甘草

當歸

川芎

熟地

芍藥

黃柏

酒炒

知母

酒炒各七分

右水煎服

參朮薑附湯 三三

治瘡瘍真陽虧損或誤行汗下或膿血出

多失於補托以致上氣喘急自汗盜汗氣短頭暈泄瀉

人參

附子

炮去皮臍
各一兩

乾薑

炮

白朮

各五錢

右作二劑水煎服

附子埋中湯

三四

治瘡瘍脾胃虛寒或誤行攻伐手足厥冷

飲食不入或腸鳴腹痛嘔逆吐瀉

附子

人參

白茯苓

白芍藥

各三錢

白朮

四錢

右水煎服

六物附子湯

三五

治四氣流注於足太陰經骨節煩疼四肢

拘急自汗短氣小便不利或手足浮腫

附子

制

防已

桂枝

各四錢

炙甘草

一錢

白朮

茯苓

各三錢

右作二劑水一鍾半薑三片煎一鍾食遠服

附子八物湯

三八

治瘡瘍陽氣脫陷嘔吐畏寒泄瀉厥逆

附子

炮

乾薑

炮

芍藥

炒

人參

炙甘草

茯苓

各一錢

肉桂

一錢

白朮

二錢

右水煎食遠服

四物湯 三七

治脾腎虛寒瘡屬純陰或藥損元氣不腫痛不

腐潰或腹痛泄瀉嘔吐厥逆及陽氣脫陷等證

人參

白朮

黃芪

各三錢

乾薑

炮

附子

炮

甘草

炙

陳皮

當歸

各二錢

柴胡

升麻

各五分

右酒水煎服如不應倍加薑附

薛氏

加減八味丸 三八

治瘡瘍痊後及將痊口乾渴甚或舌上

生黃或末患先渴此皆腎水枯竭不能上潤以致心火上炎

水火不能相濟故煩躁作渴小便頻數或白濁陰痿飲食不
多肌膚漸消或腿腫脚先瘦服此以降心火滋腎水則諸證
頓止及治口舌生瘡不絕

熟地 八兩酒蒸搗膏

山茱萸 酒浸 各四兩

澤瀉 蒸焙

白茯苓

牡丹皮

各三兩 桂心 一兩

北五味

四兩半炒

右爲細末入二膏加煉蜜少許丸桐子大每服六七十丸五
更初言語前或空心用鹽湯送下 此卽陳氏加減八味丸

也 方在補陣一二三

加味地黃丸 三九

治肝腎陰虛瘡毒或耳內痒痛出水或眼

昏痰氣喘嗽或作渴發熱小便赤澀等證

熟地

山藥

山茱萸

白茯苓

澤瀉

牡丹皮

柴胡

北五味

各為末
等分

右將地黃指碎酒拌濕蒸爛杵膏入諸藥和勻加煉蜜為丸
桐子大每服百丸空心白湯送下如不應用加減八味丸

當歸川芎散

四十

治手足少陽經血虛瘡證或風熱耳內痒

痛生瘡出水或頭目不清寒熱少食或婦女經水不調胸膈

不利脇腹痛

當歸

川芎

柴胡

白朮

芍藥 各一錢

山梔 炒一分

牡丹皮

茯苓 各八分

蔓荆子

甘草 各五分

右水煎服

加味敗毒散

四

治足二陽經熱毒流於脚根焮赤腫痛寒

熱如瘧自汗短氣大小便不利或無汗惡寒表裏邪實者宜

之

羌活

獨活

前胡

柴胡

桔梗

人參

茯苓

枳殼

甘草

川芎

大黃

蒼朮

各一錢

水二鍾薑三片煎服

九味羌活湯 四二 方在散陣四四

治瘡瘍風熱鬱遏焮腫作痛或遍身作痛或拘急不利及頭

痛惡寒脊強脉浮緊

加味羌活湯 四三

卽前湯加金銀花連翹用解瘡毒

白芷胃風湯 四四 治手足陽明經氣虛風熱面目麻木或牙

關緊急眼目翳動

白芷

升麻

各二錢半

葛根

蒼朮

米泔炒各八分

炙甘草

當歸 各一錢半

草豆蔻

黃栢 炒

柴胡

藁本

羌活

麻黃

去節各四分

蔓荊子

僵蚕 各三分

右水煎服

葛根牛旁湯

四五

治時毒腫痛而便利調和者

葛根

管仲

甘草

豆豉

牛旁子

半生半炒各二錢

右水煎服

犀角地黃湯

四六

治胃火血熱妄行吐衄或大便下血

犀角鎊為末

生地

牡丹皮

芍藥

各一錢半

黃芩炒

升麻各一錢

右水煎熟入犀角末服

犀角升麻湯四七

治時毒或風熱頭面瘡痛或咽喉不利或

鬢疽疔腮等證

犀角鎊

升麻

防風

羌活各錢半

白芷

白附子

黃芩各一錢

甘草六分

右水煎服入犀角末服

玄參升麻湯四八

治心脾壅熱舌上生瘡或木舌重舌或連

頰兩邊腫痛或咽痛發斑並治之

元參

升麻

赤芍藥

犀角

鎊末

桔梗炒

管仲

黃芩

各一錢

甘草

五分

水二鍾煎八分入犀角末食後服

升麻黃連湯

四九

治胃經熱毒腮腫作痛或發寒熱

升麻

川芎

當歸

各一錢半

連翹

黃連

牛蒡子

白芷

各一錢

右水煎服○若腫連太陽加羌活連耳後加山梔柴胡

秘傳連翹湯五十

治癰疽時毒腫痛焮腫

連翹

升麻

樸硝

各一兩

玄參

芍藥

白蘇

防風

射干

各三錢

大黃

一兩二錢

甘草

炙五錢

杏仁

八十個去皮尖同麩炒黃另研

右每服五七錢水煎服下惡物後服內托之類

五香連翹湯

五一

治腦疽癰疽時毒邪氣鬱滯不行者

乳香

木香

沉香

丁香

香附

黃芪

射干

連翹

升麻

木通

獨活

桑寄生

甘草

各一錢

右水煎服

復元通氣散 五二

治乳癰便毒腫痛及一切氣滯腫毒或打

撲損傷閃跌作痛及痞氣尤效

木香

舶上茴香 炒

陳皮

白芷

甘草

貝母 去心

川山甲 炙

漏蘆 等分

一方有玄胡索白牽牛

炒用無白芷漏蘆

右為末每服二三錢溫酒調下

當歸散 五三

通經絡行血滯

當歸

川山甲 灰炒

蒲黃 炒各半兩

辰砂 一錢

麝香 少許

右為末每服三錢熱酒調下如不飲酒薄荷醋湯亦可

方脉流氣飲 五四

治漂癰流注鬱結腫塊或走注疼痛或心

胸痞悶咽塞不利脇腹膨脹嘔吐不食上氣喘急欬痰盛
面目四肢浮腫大小便秘

當歸

川芎

芍藥 炒

茯苓

黃芪 炙

炙甘草

紫蘇

青皮

烏藥

半夏 制

桔梗 炒

枳實 炒

防風

陳皮 各一

木香

大腹皮

枳殼 麩炒 檳榔 各五分

水二鍾薑三片棗一枚煎八分食遠服

瘡科流氣飲 五五 治流注及一切恚怒氣結腫痛或胸膈痞

悶或風寒濕毒搏於經絡致成腫塊肉色不變或漫腫木悶

無頭

人參 當歸 酒拌 黃芪 鹽水炒 芍藥

官桂 厚朴 制 甘草 防風

紫蘇 枳殼 烏藥 桔梗 炒各七分

檳榔 木香 川芎 白芷 各五分

右水煎服

陳氏獨聖散 五六

凡患瘡瘍皆因氣血凝滯宜服香劑蓋香能

行氣通血也如瘡初作便宜以此入茶飲之

香附子 薑汁浸一宿焙乾研末

石無時以白湯調服三錢○潰後以局方小烏沉湯為尤妙

乳香定痛散 五七

治瘡毒損傷血凝氣滯壅腫拘攣筋骨疼

瘡

乳香

沒藥

各另研

羌活

五靈脂

獨活 各三錢

川芎

當歸

真綠荳粉

肉桂

白芷

白膠香

各半

右為末煉蜜丸如彈子大每服一九細嚼薄荷湯或酒送下

手足損痛不能舉動加草烏五錢鹽湯送下

消毒散

五入

治乳癰吹乳並便毒如憎寒壯熱或頭痛者宜

先服人參敗毒一二劑方可服此藥如無前證即服此藥三

二劑或腫不消宜服托裏散

金銀花

青皮

天花粉

柴胡

僵蚕

炒

貝母

當歸

酒拌

白芷

各二錢

水二鍾煎一鍾食遠服如治便毒加大黃一二錢煨用空心

服

清熱消毒散 五九

治一切癰疽陽證腫痛發熱作渴

黃連 炒

山梔 炒

連翹

當歸

甘草

各一錢

川芎

芍藥

生地

各一錢半

金銀花

二錢

右水煎服

東垣黃連消毒散 六十

治腦疽背疽焮腫疼痛或麻木

黃連

炒

羌活

各一分

黃芩

黃柏

桔梗

藁本

防已

各五分

歸尾

連翹

防風

獨活

知母炒

生地各四分

人參

甘草各三分

黃芪

蘇木

陳皮

澤瀉各二分

右水煎服

連翹消毒散六一

治癰疽貫熱諸證○亦名清涼飲亦即局

方涼膈散

連翹一兩

梔子

大黃

薄荷葉

黃芩各五錢

甘草一兩半

朴硝二錢半

右每服一兩水煎溫服

加味解毒湯 六一

治癰疽實熱大痛不止

黃芪 鹽水炒

黃連 炒

黃芩 炒

黃柏 炒

蓮翹

當歸 酒拌各七分 甘草 炙

白芍藥

梔子 炒各一錢

水二鍾煎服痛即止

普濟防風湯 六三

治斑疹或痒或痛

防風 一錢

黃芪

芍藥

地骨皮

枳殼 炒

荆芥 各二錢

水煎徐徐服

解毒防風湯 六四

方在痘疹五六

痘疹毒氣熾盛

潰堅湯 六五

治療癰堅硬氣血無虧宜用之

柴胡

黃芩

各四分

白芍藥

炒 一升麻

連翹

黃柏

酒炒

蓬朮

三稜

酒拌 微炒

乾葛

歸尾

各三分

知母

酒炒

龍膽草

酒炒

天花粉

桔梗

昆布

各五分

炙甘草

二分

右水煎服

瓜蒌托裏散

六六

治瘡瘍毒盛者未成則易消已成則易潰

外科

既潰則生肌

黃瓜葉

二個 杵碎

忍冬藤

乳香

各一兩

蘇木

五錢

沒藥

三錢

甘草

二錢

右用酒三碗煎二碗空心日午臨睡分三服○或以此為末

酒糊丸彈子大硃砂為衣細嚼用當歸酒送下治打撲損傷

尤妙

萬金散 六七

一名內托散○治癰疽已潰未潰者有消毒破

血之功

括蕒

一個 杵碎

沒藥

一錢 研

大甘草節

一錢

右用酒二碗煎一碗去粗後入沒藥服

製甘草湯 六八

治懸癰不拘腫潰亦治癰疽

用大甘草一兩切三寸長用潤水一碗浸透以慢火炙乾仍
投前水浸透再炙至水乾爲度却控細用無灰酒二鍾煎七
分空心服嘗有人患此已破服兩劑瘡即合○一國老膏方
用大甘草二斤以河水浸取漿汁去粗用銀石器熬成膏磁
罐收貯每服一二匙酒調服或水亦可尤解丹藥之毒○一
方治癰疽用生甘草爲末酒調服二錢連進數服自消

礞花飲子 六九

癰疽初起服之可防毒氣內攻

川芎

乾葛

天花粉

黃芪

烏梅

甘草

蘇木

各一兩

忍冬藤

四兩

石作四劑水煎服

膠散 七十

治癰疽使毒不內攻不傳惡證有益無損

牛皮膠

廣中明者四兩

右用酒一碗重湯煮化加酒服至醉不能飲者加白湯

膠飲子 七一

治一切癰疽癩毒

明廣膠

蛤粉炒

粉甘草

各一兩

橘紅

五錢

作三劑水煎服

護心散 七二
解金石砒硫發疽之毒

綠豆末 一兩
明乳香 半兩
研細

右以生甘草煎湯調時時與呷務使藥氣常在膈間

清心內固金粉散 七三
一名金花散○解毒清心流行氣血

散滯清火九熈腫熱痛飲食如常者大宜用之

綠豆 四兩
研末
硃砂 另研
人參
甘草

白茯苓 各三錢
朴硝 另研
白豆蔻 各五分
麝香 另研

雄黃 各一錢
水片 五分

右為末每服一二錢蜜湯調下

蠟礬丸 七四

一名黃礬丸○治金石發疽一切癰疽托裏止
疼痛護臟腑神效不問老少皆可服之

黃礬

一兩黃色佳者溶開離火入礬末○一方止用七

錢

白礬

一兩明亮淨者研末

右二味和勻衆手急丸桐子大每服二三十丸漸加至四五
十丸熟水或鹽湯送下日進二三服服至三四兩之上愈見

其功矣○如服金石發疽別用白礬末一兩作三五服溫酒

調下尤效○有人遍身生瘡狀如蛇頭各曰蛇頭瘡尤宜服

一之○治蛇蝎毒虫咬傷熔化熱塗傷處痛止毒出仍服兩許
○此方不惟止痛生肌而已其護膜止瀉消毒化膿及內癰
一掛膿托裏之功甚大

千金化毒丸 七五

治諸惡毒

用白礬三錢糊丸以葱頭七莖煎湯送下則腫痛俱退再用
仙方活命飲二劑以去其餘毒此本方原用礬末以葱湯調
服因湯難服故易爲丸○一方士治瘡疽不問腫潰先用此
藥二三服後用消毒藥甚效常治芻蕘之人用此卽退不用
一托裏藥亦愈若金石毒藥發疽者尤效蓋礬能解金石之毒

也○一方用礬末五錢硃砂五分熱酒下亦效此藥托裏固
一內止瀉解毒排膿不動臟腑不傷氣血有益無損其藥易得
一其功甚大偏僻之處不可不知此方或虫蛇所傷溶化熱塗
一患處更以熱酒調末服皆效

五福化毒丹 七六

治咽喉牙口瘡毒腫痛並小兒一切熱毒

瘡癩驚惕煩躁口舌生瘡夜臥不寧等證

玄參

桔梗

各二兩半

茯苓

三兩半

人參

牙硝

青黛

各一兩

甘草

七錢半

麝香

少許

金箔

二十片

右爲末煉蜜丸芡實大每服一丸薄荷湯化下○若痘毒上

攻口齒生瘡以生地黃汁化服及用鷄翎掃敷患處

命丹 七七

一治疔瘡發背等證或麻木或嘔吐重者昏慣此

藥服之不起者即起不痛者即痛痛甚者即止昏慣者即甦

嘔吐者即解未成者即消已成者即潰有奪命之功乃惡證

中之至寶也

彈酥 消化

輕粉

麝香 各五分

枯礬

寒水石 煨

銅綠

乳香

沒藥 各一錢

硃砂 三錢

珊瑚 二十個另研無亦可

外科

右為末用蝸牛或酒糊搗北綠豆大每服二三丸溫酒葱湯
下或用葱白三四寸病者自嚼爛吐於手心包藥在內用熱
酒和葱送下如人行五七里汗出為效重者再服一二丸或
外用一丸入瘡孔內以膏藥貼之

飛龍奪命丹 七八 治一切疔瘡毒瘡出汗則愈神效

乾蟾酥 二錢
乳化 沒藥

硼砂 寒水石 煨

雄黃 各三錢
乳香

珠砂 血竭 嚼成餅
者真

枯礬 各一錢
輕粉

水片 各五分
蜈蚣 一條去頭
酒浸焙乾

蝸牛 四十九個研為
膏或無亦可

右各研爲細末取蝸牛膽酥研勻入諸末熟杵芫綠豆大硃砂爲衣每服四五丸嚼葱白一口吐在手心將藥包葱內用溫酒吞下須臾汗出或少吐瀉毒即解

立齋曰前回生丹乃慄悍攻毒之劑也蓋無經不至無氣不動者後奪命丹尚緩若食一切禽畜毒物及瘡脈浮緊細數毒畜在內並惡毒證凡宜汗吐者當用前丹有神效若老弱之人或瘡毒稍輕者宜用後丹或更以隔蒜灸之爲良

回生丹 七九

李願顏先生口授非泛常之藥萬寶之秘專治

一切疔毒並有神效

金脚信

明礞砂

明孔香

半夏

上紅丹

各五分

巴豆肉

不去油

明雄黃

大南星

南礞砂

各一錢

大斑貓

十五個去頭足翅

右為細末旋取蟾酥和丸麻子大硃砂為衣每服十五丸好

酒下看瘡生上下食前後服能飲者至醉為佳凡腫毒失治

毒氣入腹用此藥能起死回生服藥後吐瀉俱作乃甦

通氣散

八十一

治時毒腫甚咽喉不利取嚏以泄其毒

玄參

一錢半

牙皂

川芎

各一錢

藜蘆

五分一方無此

羊躑躅花

二錢半

右為末用紙撚蘸少許入鼻內取嚏為度○按此方止用
角川芎北細辛三味即可亦不必藜蘆躑躅之毒昂也總不
若通關散為妙方在因陣九十八

梔子仁湯 八一

方在寒陣十九

治發熱狂躁咽喉腫痛

六味梔子仁湯 八一

治時毒腫痛大便秘結脈沉數

山梔 炒

枳殼

大黃 煨

升麻

牛旁子 炒

鬱金 等分

右水煎服或為細末每服三錢蜜水調下

清肝益營湯 八三

治肝膽小腸經風熱血燥筋攣結核或耳

項胸乳脇肋作痛並一切肝火之證

山梔

當歸

木瓜

不犯鐵

茯苓

各一錢

柴胡

芍藥

炒

川芎

各七分

龍膽草

八分

白朮

二錢

熟地

一錢半

炙甘草

五分

右薑水煎服

清心湯

八四

治瘡瘍腫痛發熱飲冷脉沉實睡語不寧右方

即防風通聖散每料加黃連五錢每劑用一兩水煎服方在

攻隴十六

濟陰湯 八五

治瘍毒純陽腫痛發熱

連翹 二錢

山梔 炒

黃芩 炒

黃連 炒

甘草 各一錢

芍藥 一錢半

牡丹皮 一錢二分

金銀花 三錢

水煎服○大便若秘量加大黃

地骨皮散 八六

治瘡瘍氣虛內熱煩渴不寧

人參

黃芪

生地黄

地骨皮

柴胡 各一錢半

白茯苓

石膏 煨

知母 各一錢

水薑煎服

一味苦參丸 八七

治一切癰疽毒瘡癩腫作痛或煩躁

苦參 不拘多少為末

右用水糊丸桐子大每服二三錢溫酒下

陳氏苦參丸 八分

治遍身搔痒癬疥瘡瘍

苦參 四兩

玄參

黃連

大黃

獨活

枳殼

防風 各二兩

黃芩

梔子

菊花 各一兩

右為末煉蜜丸桐子大食後茶酒任下三四十九日三服

五利大黃湯 八九

治時毒嗽腫赤痛煩渴便秘脈實而數

大黃 煨

黃芩

升麻 各二錢

芒硝

梔子 各一錢半

水一鍾半煎六分空心熱服

清涼飲 九十

治難瘍熱毒熾盛大便秘結○此即前連翹消

毒散

連翹 一兩

大黃

山梔子

薄荷

黃芩 各五錢

甘草 一兩

朴硝 二錢

右每服一兩水煎服

宣毒散 九一

治一切癰毒其功不可盡述

大黃 煨

白芷 各五錢

水二鍾煎一鍾食前服

立齋曰此方乃宜通攻毒之劑若脉沉實便秘者毒在臟也
宜服之其功甚大若臟腑調和脉不實者不可用醫林集要
方用大黃一斤白芷六兩爲末每服三錢熱酒調下更用茶
清調搽患處名曰萬金散蓋因其功而珍之也或用水跌爲
丸以便於服亦可吳江申僉憲兄患背疽堅硬脉沉實乃毒
在內用一服大小便下汚物再服而消恐患者忽此二藥故
以此嘗驗者告之

拔毒散 九二

治一切癰疽腫毒其功不可盡述

乳香

沒藥

當歸

川山甲

炮

木鱉子

連翹

各一錢

甘草

炙五分

瓜蒌仁

八分

牙皂

炒

貝母

各七分

忍冬藤

二錢

大黃

生熟各一錢半

一右水酒各一鍾煎一鍾食前服○此方攻毒止痛化膿之良

劑也屢用屢驗若膿成或已潰者大黃可不用恐泄其真氣

則膿者難潰潰者難斂也亦有膿雖潰脉仍洪數或沉實喜

冷者火邪尚在又所宜用

內疎黃連湯

九三

治瘡瘍發熱而嘔大便秘結脉洪而實

黃連

芍藥

當歸

檳榔

木香

黃芩

梔子

薄荷

桔梗

甘草

連翹

大黃

薑水煎仍量虛實治之

桃仁湯 九四

逐瘀血

桃仁

蘇木

生地黄

蜜虫

水蛭

炒各三
十個

各一
兩

五錢

去足
翅炒

右每服三錢水一盞煎六分空心服

漏蘆湯 九五

治腦疽癰疽毒盛實者

漏蘆

黃芪

甘草

連翹

沉香 各五錢

大黃 一兩 微炒

右每服四五錢薑棗水煎服

千金漏蘆湯

九六

治癰疽發背丹疹時行熱毒赤腫焮痛

漏蘆

黃芩

白蘇

連翹

枳殼

麩炒

升麻

粉草

麻黃

去節

大黃

濕紙裹

朴硝

各一兩

右每服五六錢薑水煎去粗空心服下惡物為妙

漏蘆升麻湯

九七

治時毒頭面紅腫咽隘堵塞水藥不下若

臟腑素有積熱發為腫毒疔瘡一切紅腫惡毒

漏蘆 二錢

升麻 一錢

黃芩 酒洗

生甘草

玄參

牛蒡子 炒

苦梗

連翹 各一錢

藍葉

如無用青黛

大黃

酒浸量輕重用之

水煎服大利之結者加芒硝

潤腸丸 九八

治脾胃伏火大腸乾燥或風熱血結宜用此丸

通之若結在直腸宜用猪膽汁導之蓋腎主五液開竅於二

陰若津液滋潤則大便通調若津液不足脾氣虧損必當培

補乃忌此藥

桃仁

去皮

麻子仁

各一兩

羌活

歸尾

大黃 張

皂刺

秦艽 各五錢

右各另研為末煉蜜或猪膽汁丸桐子大每服三四十九白

湯下若用猪膽汁導而糞不結燥者須急補元氣

沒藥丸 九九

善逐滯血

當歸 一兩

桂心

芍藥 各半兩

桃仁 去皮尖研

沒藥 各三錢

蚘虫 去足翅

水蛭 炒各二十個

右為末醋糊丸桐子大每服三五丸空心醋湯下

當歸丸 百 一行血利水通大便

當歸 半兩

大黃

桂心 各三錢

赤芍藥

外科

葶藶 各二錢

人參

甘遂 麩裹煨 半錢

煉蜜丸如彈子大空心米飲化下一丸

破棺丹 百一

治瘡瘍熱極汗多大渴便秘譫語發狂

大黃 二兩半半 生半熟

芒硝

甘草 各二兩

右為末煉蜜丸彈子大每服一丸童便酒化下白湯亦可

忍冬酒 百二

解諸癰毒

忍冬藤

鮮者四五兩若乾者止用一兩搗

大甘草節 一兩生用

二味入砂鍋內以水二鍾煎至一鍾再入無灰酒一鍾又煎

數沸去粗分三服病重者晝夜兩劑至大小便通利為度另
用忍冬藤研爛入酒少許罨患處

金銀花酒 百三

治一切癰疽發背疔瘡喉痺等證

用金銀花藤葉搗爛取汁半鍾和熱酒半鍾溫服甚者不過
三五服可保無虞

槐花酒 百四

治癰瘍熱毒最妙

用槐花四五兩炒微黃葉熟入酒二鍾煎十餘滾去粗執服
未成者二三服已成者一二服但察其有熱毒未清者皆可
用槐花治濕熱之功最為神速惟胃寒者不宜服大抵腫毒

非用蒜灸及槐花酒先去其勢雖用托裏諸藥其效未必甚

速

蒲公英酒 百五

治乳癰吹乳不問已成未成皆可用

用蒲公英一握搗爛入酒半鍾取酒溫服粗貼患處甚者不

過三五服即愈

遠志酒 百六

能托散諸毒治女人乳癰尤效

遠志 不拘多少用米泔浸洗槌去心

右爲末每服三錢用好酒一鍾調遲少頃澄清飲之以滓敷

患處

牛膝酒 百七

治楊梅風毒腰痛

牛膝

川芎

羌活

五加皮

杜仲

甘草

地骨皮

薏仁

各一兩

生地黄

十兩

海桐皮

二兩

右咬咀用帛裹入無灰酒浸二七日夏月三五日每服一盃

日三五次

消癭酒

百八

昆布

三錢

海藻

五錢

沉香

雄黃

各一錢
研末

海螵蛸

二錢

外科

右為阻用好酒一升湯煮任意每服一二鍾或浸十餘日亦

可飲

桑枝煎 百九

大治口渴

取嫩桑枝細切一升炒以水三升煎一升日服三五劑更多

尤妙抱樸子云療風痺乾燥臂痛脚氣四肢拘攣上氣眩暈

久服補肺消食利小便輕身耳目聰明令人光澤其功不能

盡述

神仙截法 百十

治癰疽發背一切惡瘡預服則毒氣不入內

真麻油 一斤銀器內熬十數沸候冷

右用酒兩碗入油五盞通口熱服一日用盡緩則數日服之
○吳安世云吾家三世用之無有不效又聞獵者云丸中藥
箭急飲麻油藥毒卽消屢用其驗○按右方丸大便秘結而
毒蓄於內者最宜用之以疏通其毒若陰毒及大便不實者
乃非所宜

砭法 百十一

一治丹毒疥瘡紅絲走散或時毒瘀血壅盛用細磁器擊碎取
一有鋒鏃者一塊以筋一根劈開頭尖夾之用線縛定兩手指
輕撮筋尾令磁鏃正對患處約懸寸許再另用筋一根頻擊

筋頭令毒血遇刺皆出毒自減退若毒氣入腹膨脹者難治

刺少商穴 百十二 治咽喉急痛

穴在手大指內側去爪甲角如韭葉刺入二分許以手自臂

勒至刺處出血卽消若重而膿成者必須針患處否則難治

洪丞相麒麟鍼法 百十三 九癰瘍勢熾毒盛血凝不散者宜用

此法以殺其勢

治癰初作先以筆管一箇入大螞蟥一條以管口對瘡頭使

螞吮惡血得去其毒卽散如瘡大須換三四條若吮正穴螞

必死矣屢試屢效若血不止以藕節上泥塗之卽止若瘡頭

未明以井邊泥塗上先乾處卽是

騎竹馬灸法

百十四

治一切瘡瘍無有不愈

其法令病人以手肘凭几而坐男左女右將手臂豎起要直
乃用竹篾一條自臂腕中曲處橫紋間量起貼肉直上至中
指尖盡處截斷爲則不量指甲另用竹扛一條令病人脫衣
正身騎定前後用兩人扛起令病者脚不着地仍使人扶定
勿令偻倮却將前量臂篾從竹扛上尾骶骨坐處直貼脊背
量至篾盡處記之此取中之處非灸穴也又用薄篾量男左
女右手中指節兩橫紋處截爲同身寸法將此寸篾卽安前

一脊中點記處兩邊各開一寸盡處卽是灸穴各灸五七壯疽
發於左則灸右疽發於右則灸左兩邊俱甚則左右皆灸蓋
此穴乃心脈所過之處凡癰疽皆心火之留滯灸此則心火
流通而毒自散矣有起死回生之功屢試屢驗

神仙隔蒜灸法

百十五

治一切癰疽瘡毒大痛或不痛或麻

木及治痘疔毒氣熾盛使諸痘不能起發已起發者不能貫
膿已貫膿者不能收靨等證如痛者灸至不痛不痛者灸至
痛其毒隨火而散此攻散鬱毒從治之法也大有回生之功
其法用大蒜頭去皮切三分厚安瘡頭上用艾壯於蒜上灸

之五壯換蒜復灸或三五十壯或一二百壯愈多愈妙未成者卽消已成者亦殺其大勢不能爲害如瘡大用蒜搗爛攤患處將艾鋪上燒之蒜敗再換或陰毒紫白色不起發不痛不作膿者尤宜多灸仍服托裏之劑如灸後仍不痛或不作膿不起發者不治此氣血虛極也

附子餅

百十六

治潰瘍氣血俱虛不能收斂或風寒襲之以

一 致血氣不能運行皆令不斂用炮附子去皮臍研末以唾津和爲餅置瘡口上將艾壯於餅上灸之每日灸數壯但令微熱勿令痛如餅乾再用唾津調和務以瘡口活潤爲度

豆豉餅 百十七

治瘡瘍腫毒硬而不潰及潰而不斂並一切

頑瘡惡瘡用江西豆豉餅為末唾津和作餅子如錢大厚如

三文錢置患處以艾壯於餅上灸之乾則再易如灸背瘡用

漱口水調餅覆患處以艾鋪餅上灸之如未成者即消已成

者亦殺其大毒如有不效必氣血虛敗也

木香餅 百十八

治一切氣滯結腫或痛或悶胸及風寒所傷

作痛並效

木香 五錢

生地黄 一兩

右以木香為末生地黄杵膏和勻量患處大小作餅置腫處

以熱熨斗熨之

香附餅 百十九

治癰癤流注腫塊或風寒襲於經絡結腫或

痛

用香附爲末酒和量瘡毒大小作餅覆患處以熱熨斗熨之
未成者內消已成者自潰若風寒濕毒宜用薑汁作餅

神效桑枝灸

百二十一

治發背不起或瘀肉不潰此陽氣虛弱用桑枝燃着吹熄其
焰用火灸患處片時日三五次以助腫潰若腐肉已去新肉
生遲宜灸四畔其陰瘡癰癤流注腫瘡惡瘡久不愈者亦宜

用之大抵此法未潰則解熱毒止痛消瘀腫已潰則補陽
氣散餘毒生肌肉若陽證腫痛甚或重如負石初起用此法
出毒水即內消其日久者用之雖潰亦淺且無苦楚惜患者
不知有此治者亦不肯用此也

神效葱熨法

一一一

治流注結核骨癱鶴膝肢體腫塊或痛

或不痛或風寒襲於經絡流注肢體筋攣骨痛或跌撲損傷
止痛散血消腫之良法或先用隔蒜灸法而餘腫未消最宜
用熨以助氣血而行壅滯其功甚大用葱頭細切杵爛炒熱
敷患處冷即易之再或熱熨數次腫痛即止其效如神○或

用葱煎湯薰洗傷處亦妙○或用葱一大把束其數節切為
薄餅置患處用熱物熨之或鋪艾灸之亦可必易餅多熨為
妙

神仙薰照方

雄黃

硃砂

血竭

真者

沒藥

各一錢

麝 二分

右五味研細末用綿紙捲為粗撚約長尺許每撚中入藥三
分裨定以真麻油潤透點灼瘡上須離瘡半寸許自紅暈外
圈周圍徐徐照之以漸將撚收入瘡口上所謂自外而內也

更須將熬猛向外提以引毒氣此是手法此藥氣從火頭上
出內透瘡中則毒隨氣散自不內侵臟腑初用二條漸加至
五七條瘡勢漸消可漸減之薑罷隨用後敷藥

廣陵李杜云背瘡所患惟內攻與外潰耳證屬火毒醞釀所
成不能外散勢必內攻不能中出勢必傷潰醫者往往以涼
藥圍解多惟此二患又陰瘡不起發者止有隔蒜灸一法然
亦未見鑿鑿取效此方初用藥熬薰照以火引火毒氣外散
後用藥敷圍追膿止痛毒從孔竅及瘡頂中出可免傍潰矣
陰瘡一照即起紅暈狀如蒸餅變為陽證可保無虞此其奇

中大畧也照法日每一次初次用搥三根或四根次日用四根或五根再次漸至六七根止大率看瘡輕重酌搥多寡重者不過六七日腐肉盡化爲膿從瘡口中陸續湧出新肉如石榴子纍纍而生此時不必再照圍藥終始如一隨瘡勢大小漸漸收入照圍後不可聽醫用膏藥貼蓋以致毒氣怫鬱一止刮葱葉量瘡口貼之丸照時先須用猪蹄煎湯澄清洗去圍藥如法薰照待瘡勢大愈肉生將滿始可用生肌散或護以太乙膏平復後膏藥猶不可離此其始末細微也內服者大要不出十宣散護心散等方最忌寒涼恐傷胃氣此瘡由

惱怒鬱結厚味所致受病以年計愈久則愈甚也調攝之法
非愆忿窒慾清散托裏治以前方卽盧扁復生有望而走耳
又前方初止治背疽其後一切腫毒無不收功蓋法無定則
醫貴變通神而明之存乎其人耳余不佞善病故留心方術
然未經累驗不輕授人此一方初驗於化南再驗於陳大叅
景山及范中翰舍初其他證亦會用以推廣皆應手取效輒
贅其詳於此其傳則道人孫氏今大播廣陵余先慈賴以保
安者廿年云

池陽來揚伯云王孝廉良甫爲余言廣陵人有善神燈照者

療渠發背神良已求得其禁方矣余識之已酉歲余客廣陵
偶析腫比于股招所謂善療者照之不膿得愈又館友胡舍
素患發背大如覆孟神憊憊憤矣延瘍醫至束手待肉腐糜
方可用膏徐長肌肉問其術曰止此問其候曰百日果如其
說則含素將成烏有矣遂急同弟輩求得前方刻本按法治
之一日痛止二三日神清如脫桎梏釋重負肉腫如孟者日
縮而小並未嘗腐糜也不月餘膿盡爽然起矣奇矣哉不表
而汗不針而潰不灸而陷舉不補而實不下而毒盡凡醫人
之針刺不必用也至理歸於易簡大道本在目前所謂不可

不思議者也古今道術入妙者皆如此類茲重刻之故爲此
敘

曲梁聶雲翰云戊戌春暮余病疽京邸疽據背中前與心對
初發微若黍粒搔之痛痒關心寒熱交作甫十日大若升再
十日大若斗食逆便結匝月日不一瞬醫方所載諸死候業
已十犯八九兩絕復甦自分無生手條後事偶從楊楚璞得
李肖鶴所傳異人指授仙方如法薰敷越二日毒漸解迺有
起色不易方而竟就痊距初發淡甘旬歸家出以誅人輕僅
踰月重亦不出百日靡不起者蓋余所感毒極重勢極大又

治極遲卽二三內外科名家皆束手失色以爲從所未聞未
見及試人則取驗更捷蓋感有輕重治有遲蚤也顧念非此
異方不能起余必死異證非余起死回生不能白此方之神
異余以此方活安忍天下人以此證危因慮此方莫獲廣沛
於天下又慮天下忽視此方而不加篤信或亂於耻功不已
山之醫口疑似轉盼間致悞大事而悔無及也因贅數語以
爲此方之引

咸林王維英云丙午端陽日余左臂患疽其大如拳用騎竹
馬法灸之百十壯疱起如銅錢四圍腫覺退笥中蓄此仙方

命製藥料欲俟破後薰之不識其初亦可薰也容有傳言可
薰者因於當日卽薰十條瘡頂高收四圍色白夜間毒肉從
邊化爲稠膿徐徐內潰粘同膠鰓每日如法薰照洗貼五六
日中尖毒肉脫落一條共有十三孔瘡外一指註傷串三孔
且痛且痒卽極力照之初出黃水次出稠膿後流清漿瞬息
口收並未再串其原載敷藥長安中若不產菴菴五龍二草
止用金銀花三色敷之乾則覺痛卽去之不敷並未用生肌
散惟護以太乙膏月餘盡痊當此瘡將愈左臂又患一疽正
對無二卽照搥十條敷以麩炒醋調文蛤膏一日敷更次日

五條三日頂破膿出不痛不痒其毒盡散同時有患別瘡者
余付此藥薰之隨薰卽散並未成形迺知是方也真仙方哉
真仙方哉持此療瘡天下無瘡矣余恐世人但知瘡破後可
照不識照初發者尤易散又恐因敷藥不全並棄前方不識
敷藥不用亦可也故備述終始以神此方之用

洗藥神效散

一二三

洗陰濕諸瘡

蛇床子

二兩

朴硝

一兩

右每用一兩水二碗煎數沸洗瘡拭乾搽生肌藥

雄黃解毒散

一二四

治一切癰腫潰爛毒勢甚者先用此藥

二三次以後用猪蹄湯

雄黃 一兩

白礬 四兩

寒水石 煨一兩半

右俱為末用滾湯二三碗乘熱入藥末一兩洗患處以太乙

膏或神異膏貼之

猪蹄湯 一二五

治一切癰疽杖瘡潰爛去惡肉潤瘡口止痛

白芷

黃芩

當歸

赤芍藥

獨活

生甘草

露蜂房

連子者佳各五錢

用猪蹄一隻水四五碗煮熟去油相取清湯入煎藥一兩許

煎十數沸去粗溫洗惡肉隨洗而下隨用膏藥貼之○按此

湯不必用黃芩或以白礬易之更佳

集香散 一二六
洗癰疽潰爛

白芷

藿香

茅香

香附

防風

各三錢

木香

甘草

各一錢

右用水三碗煎數沸去粗淋洗患處

立齋曰此乃馨香之劑也血氣間香則行得臭則逆也凡瘡

毒將盡未盡宜用之若有癩肉宜先用雄黃解毒散解之後

用此方洗後須即用膏藥貼護勿使風入肌肉易生直至收

口為度最忌用生肌之藥

敷藥方 一二七

車前草

葦簽草

金銀花

五爪龍草

右四味鮮草一處搗爛加多年陳米粉即常用糲衣者初起時仍加飛鹽少許共調爲稠糊敷瘡上中留一頂拔膿出若冬時無鮮者用乾葉爲末陳醋調敷亦可或五龍草一時難得即單用四味亦能奏功不必拘執也○陽伯曰瘡毒初起毒盛者須內服敗毒藥數劑其有氣血薄弱者亦須用托裏藥數劑則萬全之計耳

秘傳圍藥鐵井欄

一二八

敷一切惡毒即收斂消腫神效

牛糞灰 晒乾燒灰用新磁罐盛之乾處加倍用

鐵線草 草烏 文蛤 白芨

白欬 貝母心 陳小粉炒極黃色 各等分

右為末用高醋熬熱調藥如糊敷瘡四圍中留錢孔以出毒氣乾則易之瘡勢惡甚者用飛龍奪命丹等藥出汗無不效

大黃搗毒散 一二八 敷熱壅腫毒

大黃一兩 半 白芨一兩 朴硝二兩

右為末井水調搽乾則潤之

草烏搗毒散 百三十 治一切癰疽腫毒

草烏

貝母

天花粉

南星

芙蓉葉 等分

右為末用醋調搽四圍中留頭出毒如乾用醋潤之

抑陰散 一三一

治瘡瘍元氣虛寒焮腫不消或不潰斂或筋

攣骨痛一切冷證

草烏 二兩

南星 煨

赤芍藥 炒

白芷 各一兩

肉桂 五錢

右為末蒸湯調塗熱酒亦可

抑陽散 一三二

一名洪寶丹 ○治瘡屬純陽腫痛發熱

天花粉 三兩

薑黃

白芷

赤芍藥 各一兩

右為末茶湯調搽患處

陰陽散 一三三

治瘡屬半陰半陽

紫荆皮 炒五兩

獨活

去節炒

赤芍藥 炒

白芷

石菖蒲 各二兩

右為末葱酒調搽

神功散 一三四

諸發背癰疽及諸瘡不問腫潰皆效

黃柏 炒

草烏 炒各一兩

右為末用漱口水調入香油少許搽患處如乾仍用水潤之

清涼救苦散

一三五

治大頭瘟腫甚者以此藥敷之

芙蓉葉

霜桑葉

白欬

白芨

大黃

黃連

黃芩

黃栢

白芷

雄黃

芒硝

山茨菰

赤小豆

南星

金線重樓

右等分爲末蜜水調敷腫處以翎頓掃之

一黃膏 一三六

敷一切腫毒熱浮在外或時氣熱壅者

黃栢

大黃

各等分

右爲末用醋調傳如乾用水潤之

迴陽玉龍膏 一三七

治陰疽發背寒邪流注風濕冷痺諸脚

氣冷痛無紅赤者及跌撲所傷為敷涼藥或人元氣虛寒腫
不消散或不潰斂及癰腫堅硬肉色不變久而不潰潰而不
斂或鼓雄風筋攣骨痛一切陰寒冷證第一藥也

草烏

肉桂

各五錢

萸黃炒

南星

煨

白芷

赤芍藥

炒各一兩

右為末葱湯或熱酒調塗

沖和膏 一三八

治一切瘡腫不甚敷熱積日不消

紫荆皮

炒五兩

獨活

去節炒三兩

赤芍藥

炒二兩

白芷

菖蒲 各二兩

右為末葱頭煎湯調搽

麥飯石膏 一三九

治瘡疽初起先以麥飯石膏塗之俟瘡根

漸收即敷神異膏斂之但麥飯石膏難於脩合用神異膏亦

效

白麥飯石 炭火煨醋淬數次研極細二兩○據本草所

載凡石如飯團粒粒粘結成塊者即是皆可用也

鹿角 生取帶腦骨者斷之用炭火燒烟盡研極細四兩

右用米醋調和入砂器煎以竹片不住手攪熬成膏先用猪

蹄湯洗患處以鷲翎拂塗四周乾則以醋潤之若腐爛者用布帛攤貼之○李氏曰麥飯石膏治發背癰疽神妙惜世罕知有患癰不潰而危者全用此膏一夕頭潰凡疽得膿其毒始解或有不潰者須用此膏故錄之俾精擇修合以取十全之功也嘗見世間醫者每有妙方秘而不傳或更改以惑人誠可惡也余思西華麥飯石膏守死不傳其立心私刻君子鄙之矣

黑末子 百四寸

治癰毒

用羊角連肉骨燒存性爲末酒調三錢分上下服之瘡可散

○立齋曰此方未嘗用蓋秘方也嘗治面上或身卒得赤班
或痒或癩毒此而不治亦乃殺人以致羊角燒存性研為極
細末以雞子清調塗之甚效本草亦云然

乳香定痛散 一四一 治瘡瘍潰爛疼痛不可忍諸藥不效者

乳香

沒藥

各二錢

寒水石

煨

滑石

各四錢

冰片 一分

為細末搽敷患處痛即止此方乳沒性溫佐以寒劑制之故
寒熱之痛皆妙

烏金膏 一四二

治發背中央肉死塗之卽腐未死塗之卽生若初起腫痛用
點數處則解毒頓消若瘀肉腐黑塗之卽潰若惡瘡頑瘡元
氣無虧久不收斂者內有毒根以紙撚蘸紅其內有等發背
因元氣虛弱或因尅伐元氣虧損毒氣散漫中黯外赤不腐
不潰須服大補之劑中塗三四寸許至五六日間赤黯之界
自有裂紋如刀割之狀中央漸潰漸脫內用純陽之藥以接
其元氣庶能收斂若妄用刀鍼去肉出血則陽隨陰散元氣
愈傷或塗涼藥則毒氣不解氣血愈虛非徒無益適以害之
矣○其方用巴豆去殼炒黑研如膏點腫處或塗瘀肉上則

自消化或如乳香少許亦可如塗瘡內或加香油少許調稀

可用若餘毒不斂者以此紙之不致成痛

透骨丹 一四三 此潰膿藥外科不可缺

彈酥

硼砂

輕粉

巴豆

各五錢

蝸牛 二箇

麝香 一分

右先將巴豆研如泥次入蝸牛麝香再研後入各藥研極細
以小磁瓶收藏每用少許以乳汁化開先用鐵輕輕撥破毒
頭挑藥米粒許納於瘡口外用清涼膏貼之

鐵頭散 一四四

治一切頑瘡內有膿管瘀肉或癰癤結核不

化瘡口不合宜此藥追蝕腐之

赤石脂 五錢

輕粉

麝香 各五分

乳香

白丁香 各三錢

生砒

黃丹 各一錢

蜈蚣 一條 炙乾

右爲末搽瘰肉上其肉自化若瘡口小或痔瘡用糯米糊和作細條陰乾縫入外以膏藥貼之凡瘡口久不合者內有膿管必須用此腐之內服托裏之藥

代鐵膏 一四五

治瘡瘍膿熟不潰

乳香 二分

白丁香 真者 是 巴豆 炒焦

碱 各五分

石爲末熱水調點瘡頭上常以碱水潤之勿令其乾

替鍼丸 一四六

治膿成不潰者

白丁香

硃砂

另研

真沒藥

乳香

各一匙

糯米

四十粒先以礬灰拳大一塊置磁碗內量入井水

待熱氣將息以米排入灰中良久候米如水晶狀取出

用之如米未就再用灰製

右各另為末然後和勻收貯用時四飯丸麥粒大每用一粒

水濕粘瘡頭上其膿自出○凡瘡瘍血氣壯實膿成不潰者

宜用此藥以洩其毒則肌肉易生瘡口易斂若氣血虧損者

須用甘溫之劑以培根本否則不惟不潰且難收斂若附骨

疽及緊要之地當及時針砭出之爲善

三合散 一四七

治癰疽不肯作膿

新巴豆肉 明砒

班猫 一分

一爲細末緝瘡內惡肉自化

立齋曰此方藥性太毒果有惡毒之證宜用腐之取其以毒攻毒也若以陽氣虛不能腐化成膿者宜用大補之劑及桑木灸之丹溪云氣血壯實膿自湧出大抵瘡之潰斂遲速總由血氣之盛衰使然也

藜蘆膏 一四八

治一切瘡疽肉突出不問大小長短用藜蘆一味爲末以
生豬脂和研如膏塗患處周日易之

生肌散 一四九

治瘡口不合

木香

輕粉 各二錢

黃丹

枯礬 各五錢

右爲細末用豬膽汁拌勻晒乾再研細摻患處

立齋曰此方乃解毒去腐搜膿之劑非竟自生肌藥也蓋毒
盡則肉自生常見患者往往用龍骨血竭之類以求生肌殊
不知餘毒未盡肌肉何以得生反增腐爛耳若此方誠有見

也