

詳校官助教臣李巖

臣紀昀覆勘

欽定四庫全書

普濟方卷三十七

大腸腑門

總論

明周王朱楠撰



夫大腸腑者主肺也鼻主中央是其候也肺通氣於大腸大腸者為行道傳瀉之腑也號監倉椽重二斤十二兩長一丈二尺廣六寸當臍右回疊積還反十二曲貯

水穀一斗二升主十二時定血脈和利精神

千金明堂外臺同難

經云長二丈一尺大四寸徑一尺之少半十六曲盛穀一斗七升半鼻遂以長以後大腸

右手關前寸口陽絕者無大腸脈也若少氣心下有

水氣立秋節即咳刺手太陰治陰在魚際間 右手關

前寸口陽實者大腸實也若陽中切痛如刺刀所刺無

休息時刺手陽明治陽在手腕中瀉之 大腸並者腸

中切痛而鳴濯濯冬日重感於寒則洩當臍而痛不能

久立與胃同後取巨虛上廉 腸中雷鳴氣上衝胸喘

不能久立邪在大腸刺育之原巨虛上廉三里 大腸

脹者腸鳴而痛寒則洩食不化大腸有寒驚澹有熱便

腸垢大腸有宿食寒慄發熱有時如瘡狀 肺前受病

移於大腸肺咳不已咳則遺失便利厥氣客於大腸則

夢田野肺應皮皮厚者大腸厚皮薄者大腸薄皮緩腹

裏大者大腸緩而長皮急者大腸急而短皮滑者大腸

直皮肉不相離者大腸結 扁鵲云手太陰與陽明為

表裏大腸若病食實則傷熱熱則腸滿不通口為生瘡

食下入腸腸實而胃虛食下胃胃實而腸虛所以實而  
不滿乍實乍虛乍來乍去虛則傷寒寒則腸中雷鳴洩  
青白之痢而發於氣水根在大腸 大腸絕不治何以  
知之洩利無度利絕則死 病者乍寒乍熱損肺傷氣  
暴嗽嘔逆或體熱發斑喘咳引氣名曰氣狸以秋三月  
源從陽明係手太陰受疫淫邪之氣若腑虛為陰邪所  
傷則乍寒乍熱臟實為陽毒所傷則體熱發斑

大腸實論

夫右手寸口氣口以前脈陽實者手陽明經也病苦腸  
滿善喘咳面赤身熱喉咽中核狀名曰大腸實熱也大  
腸者傳瀉行導之腑也其氣盛實燥熱生馬傳瀉不利  
腸中痛如錐刀所刺或生鼠乳腫脹痛悶大便不通腹  
脇脹滿腰背腫痛上氣喘滿皆大腸氣實之證也 夫  
大腸實實則生熱熱則腸結脹滿喜氣喘欬身而熱喉  
中噎乍實乍虛乍來乍去大腸有宿滯則發寒慄如瘧  
之狀秘不通則是大腸實熱之候也



茯苓麻黃湯 出聖濟總錄

治大腸實熱令人氣脹滿

白茯苓 去黑皮 麻黃 去根節各一兩半 黃耆 剉 大青 剉 桂 去麤

皮各三分 細辛 去苗葉 杏仁 湯浸去皮尖炒各一兩一分 石膏 碎三兩 丹

參 兩半 五味子 陳橘皮 去白焙 甘草 炙剉 貝母 芎藭

各一兩 枳殼 麩炒三枚

右咬咀帛裹三錢井華水盞半煎八分去滓溫服

羚羊角散 出聖惠方 治大腸實熱心神煩躁口内生瘡

羚羊角屑 三分 甘竹茹 川朴硝 川大黃 剉炒各一兩

黃芩 梔子仁 紫蘇莖葉 杏仁 湯浸去皮尖雙仁麩炒

玄參 木通 赤茯苓 各三分 甘草 半兩炙剉

右咬咀每服三錢水一盞煎六分去滓入地黃汁一

合更煎一兩沸不計時溫服

生薑洩腸湯 出千金方 治大腸實熱腹脹不通口内生瘡

生薑 橘皮 青竹茹 黃芩 梔子仁 白朮

各三分 桂心 一兩 茯苓 芒硝 各三分 生地黄 十兩 大棗 四枚

右咬咀水七升煮取三升去滓下芒硝分二服 一方無桂



心名瀉  
白湯

檳榔丸 出聖  
惠方

治大腸實熱氣壅不通心腹脹滿大便

秘實

檳榔 大黃 蒸 麻子仁 炒去殼  
別研 枳殼 麩炒 羌活 去蘆 牽

牛 炒 杏仁 去皮  
尖炒 白芷 黃芩 各一兩 人參 兩半

右咬咀為末煉蜜丸梧桐子大每服四十九空心用

熱水送下以大腑流利為度

杏仁丸 出聖  
惠方

治大腸實熱大便不通上氣喘咳心神

煩悶

杏仁 湯浸去皮  
尖雙仁炒 甘草 炒 赤芍藥 黃芩 麥

門冬 去心  
焙 細辛 去苗  
葉 五味子 各三分 石膏 碎三兩 大黃

剉炒一兩半

右咬咀每服三錢水一盞煎六分去滓食前溫服

大黃丸 出楊子建  
護命方 治大腸秘熱心胸煩悶頭暈胸腹

脇脹滿口舌乾燥

大黃 炮剉 桔梗 炒 枳殼 麩炒 芎藭 羌活 去蘆 木香

柴胡去苗獨活去蘆頭牽牛子一兩半炒熟半生用

右為末熟煎萊菔入藥同於木臼內搗令丸得為度

丸梧桐子大每服三十九食後臨卧熱湯下加至四

十九

赤茯苓散出聖惠方治大腸實熱頭痛目眩驚狂喉痺腹

脹滿悶手卒煩疼

赤茯苓 麥門冬去心檳榔各一兩川大黃半犀角

屑 枳實麩炒各三分杏仁湯浸去皮尖雙仁炒丹參各半石膏

二兩

右咬咀每服三錢水一盞煎六分去滓食前溫服忌

熱麩炙燻

柴胡散出聖惠方治大便實熱氣壅不通心腹脹滿發渴

寒熱

柴胡去苗赤芍藥 檳榔各一兩枳實麩炒杏仁湯浸去皮尖雙

仁黃芩 漢防已各三分川大黃三兩甘草半兩

右咬咀每服三錢水一盞煎六分去滓食前溫服

大青湯出聖濟總錄

治大腸熱滿腸中切痛或生鼠乳大便不通

便不通

大青剉三分麻黃去根節石膏碎芒硝碎黃蘗去麤皮生

地黃焙各一兩半枳殼麩炒去穰赤茯苓去黑皮

右咬咀每服三錢水一盞半入竹葉十片煎八分去

滓溫服日三服

橘皮湯出聖濟總錄治大腸熱欬脇滿掌中熱

陳橘皮 芒硝 紫蘇葉各一兩半白朮一兩甘草炙對桂

去麤皮各半兩石膏瑩淨者三兩碎杏仁炒一分去皮

右咬咀每服三錢水一盞半淡竹葉十片蔥白四寸劈破煎八分去滓溫服三日

治白氣狸肺腑溫病陰陽臟毒實為陽毒所傷肌膚發

斑氣喘引色昏白者

紫苑茸一兩梔子仁 升麻 前胡各三分葶藶炒一分

杏仁去皮尖炒甘草炙各半兩

右咬咀每服五錢水二盞煎七分去滓食前服



大腹皮散 出聖惠方

治大腸實熱腸脹不通熱氣上衝口

内生瘡

大腹皮

三兩

柴胡 去苗 訶梨勒皮

枳殼

麩炒去穰各一兩

川大黃

剉炒

川朴硝

各二兩

羚羊角屑

三分

甘草

半兩

右咬咀每服三錢水一盞煎至六分去滓食前溫服

大腹湯

出聖濟總錄

治大腸實熱腹脹不通熱氣上衝口

内生瘡

大腹皮

大黃

生剉各二兩

木香

一兩

訶梨勒皮

三分

去穰炒

芎藭

三分

右咬咀每服三錢水一盞半煎至八分去滓溫服

神功丸

出聖濟總錄

治氣壅大腸風熱大便不通 方見本門大便

秘澁不通類四味神功丸

治腸痛如打

用豆半升炒令焦酒一斤煮令沸熟取醉

瀉白湯

出鮑氏方

治大腸實熱腹脹不通臑臍痛喘不能

久立口内生瘡

陳皮 淡竹葉 黃芩 梔子仁 黃柏皮一兩半

茯苓 芒硝兩一 生地黃兩五

右為散每服四錢薑棗煎空心服

大腸虛論

夫右手寸口氣口以前脈陽虛者手陽明經也病苦胸中喘腸鳴虛渴唇乾目急善驚洩白名曰大腸虛冷也其候胸中喘腸鳴虛渴唇乾皮膚乾燥目急善驚滑洩骨節疼痛不能久立蓋大腸者傳導之官變化出焉寒

邪客於其間則冷氣虛弱不能自固而成諸疾診其脈右手氣口以前陽虛者是也

款冬花丸出聖惠方 療大腸虛冷欠呿欬氣短小腹中痛

款冬花七分 桂心 五味子各六分 乾薑 芎藭 甘

草各五分 附子炮四分 桔梗四分 蘇子五分 蜀椒一分 百部汁

七合 白蜜一斤 乾棗五十枚 劈去皮研為脂 薑汁

右為末將蘇蜜汁和微火煎丸梧桐子大每服溫酒下三十九丸加至四十九日再忌海藻菘菜猪冷水生

蔥

草豆蔻散 出聖惠方

治大腸虛冷腸鳴腹痛下痢不思飲食

食

草豆蔻 皮去 陳橘皮 湯浸去白穰焙各一兩 高良薑 剉三分 桂心

丁香 木香 白朮 當歸 剉炒 白豆蔻 皮去 肉豆

蔻 去殼各半兩 甘草 一分剉

右為末每服半錢食前以薑棗湯調下

木香丸 出聖惠方 治大腸虛冷切痛腸鳴食不消化

木香 白朮 桂心 蕪荑 炒 高良薑 剉各一兩 訶梨

勒 煨去皮 肉豆蔻 去殼乾薑三分炮 附子 二兩炮裂去皮臍 厚朴

二兩去麤皮薑炙成灰 甘草 炙各半兩

右為末用神麴末煮作糊丸梧桐子大食前薑棗湯

下十九

治白氣狸肺腑臟温病陰陽毒大腸腑虛為陰邪所傷

寒熱時作上氣欬逆大腸殮洩色浩浩白者

白朮 人參 各一兩 乾薑 炮 麥蘖 炒各三分 白茯苓 五



味子 肉豆蔻 草菓 烏梅 甘草炙各半兩

右咬咀每服五錢水盞半煎七分去滓食前服

吳茱萸散出聖惠方 治大腸虛冷腸鳴腹痛食不消化

吳茱萸湯浸七次焙乾炒 肉豆蔻去殼 乾薑炮 甘草炙對各半兩

陳橘皮二兩浸去白焙 高良薑對 縮砂皮去 神麴搗碎炒 白朮

各一兩 厚朴二兩去麤皮薑汁炒

右為末每服一錢食前粥飲調下

訶梨勒散出聖惠方 治大腸虛冷腸鳴洩痢腹脇氣痛飲

食不化

訶梨勒一兩半煨用皮 附子炮去皮 陳橘皮湯浸去白 當歸

對 肉豆蔻去殼各三分 桔梗去蘆 木香各半兩 吳茱萸湯浸七次

焙 甘草炙對各一分

右咬咀每服三錢水一鍾入生薑半分棗三枚煎六

分去滓食前稍熱服

防風丸出聖濟總錄 治大腸氣虛又因傷風冒雨大腸中

下血

防風仁去芎藭各一分黃耆剉白朮各半五味子續

斷陳橘皮湯浸去白石硫黃研一兩

右研為末煉蜜丸梧桐子大空心鹽米湯下三十丸

訶梨勒丸出醫方集成治大腸虛冷腸鳴洩瀉腹脇氣痛

飲食不化

訶梨勒麩累附子炮去皮臍肉豆蔻麩累木香不見吳

茱萸去梗炒龍骨生用白茯苓去皮葶撥各半兩

右為末薑汁煮糊為丸梧桐子大每服七十九空心

米飲下

黃連補湯出千金方治大腸虛冷痢下青白腸中雷鳴相

逐

黃連四兩茯苓兩芎藭各三兩酸石榴皮兩地榆五兩茯苓

龍肝雞子大一枚

右咬咀水七斤煮取二斤半去滓下伏龍肝末分三

服

附子湯出聖惠方治大腸虛冷腰痛羸瘦

附子炮去皮臍 人參 乾薑炮 赤芍藥 桂去粗皮

甘草炙各一兩

右咬咀每服三錢水一盞棗三枚煎六分去滓食後

温服

茱萸丸出聖濟總錄

治大腸虛冷飲食減少非飧洩

吳茱萸湯浸焙乾 訶梨勒皮 丁香 草豆蔻去皮 芎

藟 防風去叉各一分 石硫黃研一兩

右為末煉蜜丸梧桐子大空心陳米飲下

黃連湯出聖濟總錄

治大腸虛冷痢下白膿腸內虛鳴相

逐

黃連去鬚 酸石榴皮焙 赤石脂各三兩 白茯苓去黑皮 乾

薑炮各二兩半 桔梗炒二兩

右咬咀每服五錢水一盞半煎八分去滓温服日三

服

茈葫丸出聖濟總錄

治大腸虛冷腸痛不能久立或腰中

虛鳴



此葫去苗土

枳殼麩炒去穰

各一兩半

白朮三錢

白茯苓去黑皮

一兩

丹參

去根

黃耆

剉各

二兩

右為末煉蜜丸梧桐子大空腹粥飲下三十九日三

服

朴附丸

出聖濟總錄

治大腸虛冷便痢滑洩不思飲食腸

鳴腹痛

厚朴

去粗皮生薑汁炙一兩

附子

炮去皮臍半兩

甘草

炙一兩

乾薑

炮一兩

兩

右為末酒煮麩糊丸梧桐子大每服五十九食前温

米飲下

大建中湯

出聖濟總錄

治大腸虛

乾薑

炮一兩半

芍藥

甘草

炙對桂

去粗皮

各一兩

右咬咀每服二錢棗三枚加白錫一塊水一盞煎七

分去滓空腹温服日三服

乳豆丸

濟生方

治大腸虛寒滑洩不止

鍾乳粉

一兩

肉豆蔻

半兩

麩裹煨香去麩不用

右為末煮棗肉杵為丸梧桐子大每服七十九空心食前米飲送下

治大腸虛冷

用鰻鯉魚煮酒服蓋其魚能補虛

固腸湯

鮑氏方

治大腸虛寒痢下青白腸中雷鳴大便

節小便赤上氣充胸不能久立身腫腹急當臍痛

酸石榴皮

兩半

黃連

炒

地榆皮

兩一

右為散每服四錢薑五片烏梅一箇煎空心服

腸風下血

附論

夫腸風臟毒下血者皆由飽食過度房室勞損坐卧當風恣餐生冷或啖炙煇或飲酒過度榮衛氣虛風邪冷氣進襲臟腑因熱乘之使血性流散積熱壅遏血滲腸間故大便下血血清而色鮮者腸風也濁而色黯者臟毒也肛門射如血線者虫蛀也又有陽氣不升血隨氣降而下血者下虛也下虛之脈脈多洪大而芤蓋弦者勞也芤者下血也治療之法風則散之熱則清之寒則

溫之虛則補之治法合無不効者矣夫大便下血或清或濁或鮮或黑或在便後或與洩物並下此由內外有所傷感凝停在腸胃隋氣不通亦妄行之類故曰便血方書以鮮血為腸風瘀血為熱毒濺注為腸痔受病之初或因大腸有熱毒血朝於下或因下虛而腸臟無脂膜血得以滲入及其久則成痼疾矣亦時有所感觸而發之如遇熱發則為瘀血遇寒發則為清鮮遇濕發則為豆汁色亦因而轉不可拘以一說蓋人之滋養一身

惟氣與血血為榮氣為衛榮行行脈中衛行行脈外故心主血肝藏之而脾為之統貴於氣順則血調若內因七情并酒食所傷外為四氣相干則血氣逆亂榮衛失度皆能令人下血若風入腸胃者其脈浮下血必在糞前是名近血停積於大腸者其脈沉滯血在糞後又名遠血臟寒者其脈沉微下血無痛積熱者其脈洪數純下鮮血甚則鮮血多而不止廉痛傷濕者脈沉而遲下血如豆汁令人面無顏色時寒時熱脈浮弱按之絕者



下血也凡治法大要先當解散腸胃風邪熱者與敗毒散冷者與不換金正氣散風邪既去然後隨其冷熱而對治之或曰血遇熱則行止血氣用涼藥如地榆散藥皮湯黃連阿膠丸酒蒸黃連丸輩施之熱証固當然爾其或陽虛陰走正氣不得歸元則用木香理中湯附子理中湯震靈丹黑錫丹輩治之如何而廢之要之芎藭湯一劑又調血之上品熱者加茯苓槐花冷者加茯苓木香此則自根自本之論也雖然精氣血氣生於穀氣

旺惟大腸下血大抵以胃藥收功真料四君子湯參苓白朮散以枳殼散小烏沉湯和之胃氣一回血自循於經絡矣然腸風之血自腸中來虫痔之血肛門邊傍別有小竅射如血線是也肛門既脫腐血浸淫於其間則俱化為虫蠹蝕腸口滴血淋漓自此又不能約而收之矣當以蕪荑艾葉苦楝根輩止血亦不用甘草但增棗

入藥用之

儒門事親書云崇谿藥彥剛病下醫者以藥下之默默而死其子企見戴人過而問之曰

吾父之死竟無人知是何証戴人過曰病挫其心也心主行血故被挫則血不禁若血温身熱者死淡數七死

必七日治不當抑下之不滿數企曰四日死何為病挫心戴人過曰智不足而強謀內不足而強舉心安得不挫也藥初與鄰爭屋不勝遂感又論曰凡人有臟毒下得此病企由是服拜而學醫

血何謂也生氣通天論曰邪熱傷肝因而大飽筋脈橫解腸癖為痔故膿血者血隨熱行參差入於腸胃之間乃成瀉血也若身體壯熱則為難治身涼者可治也可先調中消血蕩除積血瀉之二三行瀉後服芍藥蘼皮丸黃連解毒湯五苓散益元散各以新汲水調下五七錢甚者取地黃汁半盞服之則愈矣又積年腸風下血

不止者由人氣血衰弱臟腑困憊飲食勞損或毒氣風邪蘊蓄在臟腑流注於大腸既虛下血致面色萎黃四肢消瘦或累月連年諸醫不差故曰積年傷風下血也內經謂結陰者便血一升再結二升三結三升邪在五臟則陰脈不和陰脈不和則血流結陰之病以陰氣內結不得外行血無所稟滲入腸間故便血也

方

黃耆湯 治腸風下血



黃耆三兩 槐實 小蘇 桑耳 乾地黄焙 當歸對

黃連去鬚 白芷各一兩 草豆蔻二枚 芎藭 赤石脂

天雄炮去皮 龍骨各三兩 黃芩去黑心 紅藍花 訶梨

勒皮 延胡索 厚朴去粗皮 桂去粗皮

右咬咀每服五錢水盞半薑一錢煎八分去滓食前

溫服日二服

地黄湯 治大便下血并多年腸風飲食不得

熟乾地黄焙 赤石脂各二兩 延胡索 牡蒙 桔梗

黃芩去黑心 龍骨各一兩 當歸切 黃連去鬚 白芷

地榆 木香 紅藍花炒 桂去粗皮 乾薑炮 黃

耆對

右咬咀每服五錢水一盞半煎八分去滓溫服無時

五香聖散出聖惠方 治腸風氣流注下部致生腫結牽引

腑臟不和時發疼痛經久下血太多虛乏羸瘦

沉香 黃耆對 枳殼麩炒 熟乾地黄各一兩 麝香研

乳香分 木香 藿香對 檳榔 當歸對 白茯苓



白蒺藜炒去刺 川大黃炒對 白芍藥 卷柏炒 芎藭

各三兩

右為末每服二錢食前粥飲調下

內補散出聖惠方 治腸風痔疾失血過多虛乏羸困不欲

飲食

續斷 熟乾地黄各二兩 人參去蘆 附子炮去皮臍 當歸對炒

芎藭 黃耆對 白芍藥 桂心 麥門冬去心 白茯苓

苓 乾薑炮對 五味子各一兩 白芷 甘草炙對各三分

右咬咀每服四錢水一盞棗三枚煎六分去滓溫服

日三四服

白花蛇丸出聖惠方 治腸風下血日夜不絕疼痛至甚

白花蛇二兩酒浸去皮骨炙黃 杏仁半兩湯浸去皮尖雙仁炒 黃耆對 胡

荜子炒 蝟皮炙 人參去蘆 鯉魚皮燒 附子炮去皮臍 當歸

對炒 皂莢樹耳炙各一兩 枳殼麩炒去穰 男女髮燒 桂去皺皮

右為末煉蜜杵丸梧桐子大每服三十九食前人參

湯下

升陽去熱和血湯醫方大成 治腸癖下血作勞其血即出

有力而遠射四散如春節二月中二行腹大作痛乃

陽明氣衝熱毒所作也當去濕毒和血而愈是其治

也又名除濕和血湯

生地黄 牡丹皮 生甘草各五分 熟甘草 黃耆

各一錢 當歸身 熟乾地黄 蒼朮 秦艽 肉桂

各三分 橘皮二分 升麻七分 白芍藥一錢五分

右咬咀作一服水四盞煎一盞去滓稍熱空心服之

白朮散出聖惠方 治腸風痔疾失血虛損羸瘦飲食無味

面色萎黃四肢乏力

白朮 石斛去根 續斷 天門冬去心各三分 黃耆

熟地黄 人參去蘆 肉蓯蓉酒浸一宿去皺皮炙 牛膝 白茯苓

苓各一兩 桂心 甘草去蘆炙

右咬咀每服四錢水一盞生薑半分棗三枚煎至六

分去滓不計時溫服

內補黃耆丸出聖惠方 治腸風痔病下血太多虛羸無力

黃耆剉 槐子仁炒 枳殼麩炒去穰 白蒺藜炒去刺 烏

蛇肉酒浸炙 鹿茸去毛塗炙 附子炮去皮臍 蝟皮炙 當歸剉炙

沉香 檳榔 厚朴去蘆皮薑汁炙各一兩

右為末煉蜜杵丸梧桐子大每服三十九丸食前桑枝

湯下

黃耆丸出間易方 治久年腸風痔漏方見痔瘻門痔瘻類

熟乾地黃丸出聖惠方 治內腸風冷大便下血不止

熟乾地黃 龍骨燒赤 黃耆剉 紫蘇子 蒲黃 當

歸 附子炮去皮臍 艾葉炒 白礬燒冷汁盡 阿膠碎炒各一兩 枳

殼半兩麩炒去穰

右為末煉蜜丸梧桐子大每服三十九丸空心及晚食

前粥飲下

黃耆散出聖惠方 治腸風痔疾失血後虛損皮膚乾燥四

肢黃瘦心神虛煩少得眠卧不能飲食

黃耆剉 熟乾地黃 人參去蘆 柴胡去苗 白茯苓各一兩

酸棗仁炒 麥門冬去心 枸杞子各三分 防風去蘆 白朮



甘草 灸對各半兩

右咬咀每服四錢水一盞生薑半分棗三枚煎至六

分去滓不計時溫服

卷柏散 出聖惠方 治腸風腹痛下血不止

卷柏 熟乾地黄 黃耆 各一兩對 白朮 白芍藥

甘草 灸對 芎藭 各三分 枳殼 麩炒去穰 當歸 三分對炒 乾薑 半兩炮對

右咬咀每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服日三

四服

烏玉丹 治腸風痔漏著床頭痛不可忍 方見痔瘻門痔瘻類

神丹 治腸風痔漏 方見痔瘻門痔瘻類

蝟皮丸 出聖惠方 治大腸毒下血疼痛

蝟皮 灸 營實 枳實 麩炒 黃耆 對 桑木耳 灸 地榆

當歸 對炒 烏賊魚骨 各一兩 槐子 炒二兩

右為末煉蜜杵丸梧桐子大每服三十九食前粥飲

送下

黃耆丸 出聖惠方 治腸風積年久不瘥轉加羸困

黃耆

劉

白礬

燒灰各三兩

附子

炮去皮臍

硫黃

研細水飛

蝟皮

黃

虎眼皮

熟炙黃

栝樓

各一兩

槿藤子

去殼酥蜜塗

皂

英

去黑皮塗酥蒸一次二梗

右搗羅為末煉蜜和搗三二百杵丸梧桐子大每服

三十九食前粥飲送下

黃連貫仲散

神效方

治腸風下血

儒門事親

黃連

鷄冠花

貫仲

大黃

烏梅

各一兩

甘草

炙三錢

枳殼

炮

荆芥

各一兩

右為末每服二錢食前溫米飲調服

槐角散

醫方大成

治腸胃不調腹脹下血

蒼朮

厚朴

陳皮

當歸

枳殼

各一兩

烏梅

半兩

槐角

二兩

甘草

半兩

右咬咀每服五錢水一鍾煎服

當歸和血散

一名槐花散醫方大成

治腸澼下血濕毒下血

槐花

青皮

各六分

當歸身

升麻

各二錢

荆芥

六分

芎

四分

熟地黃

白朮

各六分

右為末每服二三錢食前清米飲調下忌酒濕麪生冷物

加減四物湯 危氏方 治腸風下血不止

側柏葉 生地黄 洗 當歸 去蘆酒浸 川芎 各一兩 枳殼 去穰

炒 荆芥穗 槐花 炒 甘草 炙各半兩

右咬咀每服四錢水一盞半生薑三片烏梅少許煎七分去滓食前溫服一方加防風烏梅各半兩

烏鷄丸 經方良方 治丈夫腸風婦人崩病

麈尾 火塘煤是也濃醋和 蒲黃 乾地黄 芍藥

當歸 各五錢 甘草 川烏 炮 肉桂 各三錢半

右為末蜜丸梧桐子大每服三十九丸炒黑豆淋酒服

腸風黑散 直指方 治腸風下血腹痛

枳殼 製各一分 甘草 炒 烏梅肉 炒各半兩 敗棕 頭髮 木

饅頭 木賊 各燒存性 槐角 炒

右為末每服二錢陳米飲湯調下

槐皮膏 止痛癢血出



槐皮三兩 薰陸 辛荑 甘草 白芷各半兩 巴豆七枚

漆十四枚 桃仁十枚

右以猪脂半斤煎之三上三下去滓以綿裹膏塞下部日四五止痛癢

內補散出聖惠方 治腸風下血不止黃瘦虛羸

蒲黃 白石脂 熟乾地黄各二兩 當歸 白芷

甘草炙剉 黃連去鬚 芎藭各一兩

右咬咀每服三錢水一鍾煎六分去滓溫服日三四

服

內補黃耆散出聖惠方 治腸風下血不止面色萎黃氣力

全少

黃耆 龍骨 槐子炮 白芍藥各二兩 當歸剉炒 芎藭

一兩 甘草剉 附子炮去皮臍

右咬咀每服四錢水一鍾煎六分去滓食前溫服

側柏葉散出聖惠方 治大腸風虛積冷下血不止

側柏葉炙 棕櫚皮燒灰 附子炮去皮臍 防風去蘆 槐花

炒 羌活

當歸

剉炒各半兩

白朮

三分

右為末每服二錢食前粥飲調下

鹿茸丸

一名斷紅丸 出聖惠方

治臟腑久虛腸風痔瘻下血多

面色萎黃日漸羸瘦

鹿茸

去毛塗醋炙

附子

炮去皮臍

續斷

側柏葉

黃耆

剉

厚朴

去粗皮塗薑汁炙

阿膠

碎炒

當歸

剉炒各一兩

右為末煉蜜杵丸梧桐子大每服三十九食前粥飲下一方用白礬無厚朴

腸風黑散

出危氏方

治榮衛氣虛風邪冷氣進襲臟腑之

內或食生冷或喫炙燻或飲酒過度積熱腸間致使腸胃虛弱糟粕不聚大便解血臍腹疼痛裏急後重或肛門脫出或久患酒痢大便頻數皆療之

荆芥

燒二兩

枳殼

去穰二兩 燒一兩

亂髮

燒

槐花

燒

槐角

燒

甘草

炙

蝟皮

各一兩半

右將合燒藥同入瓦瓶內黃泥固濟燒存三分性出火氣同甘草枳殼為末每服二錢水一盞煎七分空

心温服温酒調下亦得

結陰丹 出御藥院方

治腸風下血及臟腑毒下血諸大便

下血疾

枳殼 麩炒去穰

葳靈仙

黃耆

椿根白皮

陳皮

去白

何首烏

荆芥

各等分

右為末酒麩糊內少許蜜同丸梧桐子大每服五十丸至七十九食前米飲下一方不用蜜以醋少許陳米煎湯送下

治腸風臟毒解酒毒

黃連

一兩

防風

五錢

槐角

荆芥

烏梅

扁柏葉

炒

黑為度

枳殼

各五錢

右為末老米麩醋糊丸每服三五十九空心米湯下

玉屑丸 出本方

治腸風瀉血不止

槐根白皮

去粗皮

苦棟根

去皮

各三兩

椿根白皮

四兩

味於九

月後二月前取軟者日乾一方檇根皮

天南星

去膜生薑製

半夏

各半兩

生薑製

葳靈仙

寒食麩

三兩



右為末滴水丸梧桐子大乾之每服三十九水八分  
一盞煎沸下丸子煮令浮以匙抄取溫水送下不嚼  
空心服之 頃年有一人下血盈盆頓爾瘦服諸藥  
皆不效予因此証腸風令服玉屑丸三服止予苦病  
疾三十年蓄下血茶方近五十品其間或驗或否或  
始驗而久不應者或初不驗棄之再服有驗未易立  
談大抵此疾品類不同對病則易愈如下清血絕鮮  
者腸風也血濁而色黯者臟毒也肛門射如血線者

虫痔也亦有一種下部虛氣陽氣不升血隨氣而降  
者仲景云脈弦而大弦則為減大則為芤減則為寒  
芤則為虛寒虛相搏此名為革婦人則半產漏下男  
子則忘血精此下部虛而下血者也若傳革脈却止  
服溫補藥虫痔宜薰千金方用蝟皮艾者佳予嘗服  
頗得效

槐角散

指出直指方

治腸風瀉血脫肛

槐角

一兩

防風

地榆

當歸

枳殼

製

木賊

茯苓

神 各半

右為末酒麩糊丸梧桐子大每服三十九米飲下

七妙散 治腸風

枳殼去穰椿木丸 雷丸 天麻 白芨 猪牙皂

角 各半 赤石脂

右為末每服一錢温酒調下空心臨卧服

六君子湯 出德生堂方 治便血不止脾胃虛寒飲食不進

身體羸弱

人參 白朮 白茯苓 當歸 黃耆 白扁豆

甘草 各一兩半

右為末每服二三錢米飲調日進三服

蝟皮散 出聖惠方 治腸風下血久不瘥面色萎黃

蝟皮灰 蒜莖灰 乾薑炮剉各三兩 牡礪 黃牛角燒灰

枳殼麩炒去穰 酸石榴皮炙各一兩

右為末每服二錢食前粥飲調下

地榆散 出聖惠方 治大腸下血久不止

地榆 赤芍藥 生乾地黄 茜根劉 龍骨 黃

芩 鷄蘇苗各一兩

右咬咀每服三錢水一盞煎六分去滓食前溫服

治腸風臟毒下血出本

川當歸 枳殼 側柏葉 陳槐子 芍藥 百

草霜

右剉同一處炒令黑存性末之每服二錢空心溫酒調下日午米湯調下各飯前服甚妙

地榆散出直指方 治腸風熱證下血

地榆 黃連 茜根 黃芩 茯神各半兩 梔子仁

分一

右咬咀每服三錢薤白寸同煎服又方藜皮湯下

木賊散出直指方 治腸風下血

木賊去節炒 木饅頭炒 枳殼製 槐角炒 茯苓 荊芥

各半兩

右為末每服二錢濃煎棗湯調下



腸風方 出直指方

香附 製一兩 枳殼 分三 當歸 川芎 各半 槐花 甘草

灸各一兩

右咬咀每服五錢新汲水一盞半薑棗煎食前服

防風散 出危氏方 治因食熱過度風氣蕃盛銷大腸膏脂

以致榮衛之血滲流而下

羌活 荆芥 防風 枳殼 僵蠶 炒去絲 薄荷 各

分

右咬咀白水煎空心温服忌再喫熱物

涼血地黄湯 出濟生拔粹方 治如飲食不節起居不時陰受

之陰受之則入五臟入五臟則膜滿閉塞下為殮洩

久為腸癖大腸癖者水穀與血另作一派洩出也今

時值長夏濕熱大盛正當客氣勝而土弱也故腸癖

之病甚矣

熟地黄 青皮 不去穰 槐子 炒 當歸 各五分 知母 炒 黃

蘗 去皮剉烙各一錢

右吹咀作一服水一盞煎七分去滓溫服如小便澁  
臍下悶或大便則後重調木香檳榔細末各半錢稍  
熱服空心或食前如裏急後重又不去者當下之如  
有傳變隨証加減

槐荆丸 治腸風下血先糞後紅方見痔瘻門痔瘻類

黃連散 出醫方大成 治腸風下血疼痛不止

黃連 去鬚炒 鷄冠花 焙 貫仲 川大黃 烏梅 各一兩

甘草 三分炙

右為細末每服二錢溫米飲調下日三服不計時方一

無川大黃

玉壺丸 治腸風病年深不效

青嫩角鐵 採半斤劈破用河水五升浸二七日入砂器中煮去四升存一升入藕汁半升

蜜一兩用火熬成膏稀稠得所去火放冷 枳殼 一兩針剉放燈火上燒存性入酒中浸透 胡

桃 十個依前法 沒藥 二錢研 陰地椿白皮 二兩焙乾取乳

香 二錢研

右除前膏外後五味為末入前膏內為丸梧桐子大

每服二十九腸風煎木賊湯下痔疾荆芥湯下時瀉  
血米飲下空心日三服

琥珀散 治腸風一切血痢脾臟毒下血

琥珀屑研 鹿角霜 赤石豆 槐花 枳殼去穰炒

白芷各一兩

右除琥珀外並剉碎同炒令焦黑杵為散入琥珀研  
令勻每服二錢米飲調下空心食前各一服

防風餅 治腸風瀉血

防風去 雞冠花 續斷 甘草炮 天麻 人參各半

兩

右為末以油餅三箇入藥三錢分做三箇油餅早晨  
日午近晚以淡竹湯下

木香丸 治腸風不問年深日久

木香 白芷 乾蝎去土炒 阿魏各一兩 當歸炙半兩 漏

蘆去蘆二兩

右各別搗以小童便一升煎阿魏三十沸後下木香



剪三十沸後又下乾蝎當歸再剪如錫入白芷漏蘆末再和丸梧桐子大每服五丸至十九丸空心温酒下

釣湯丸 治腸風瀉血不止疼痛

附子一箇炮去皮臍 石硫黃研 鷄冠花 鮫鯉甲炒 皂莢

刺炒各一兩 蝟皮二箇燒灰

右為末麩糊為丸梧桐子大每服二十九丸槐花湯下

日二服

臭椿皮散出聖惠方 治積年腸風瀉血穀食不消肌體黃

瘦

臭椿樹白皮二兩炙對 乾薑炮對 甘草炙對各三分 鷄冠花

附子炮去皮臍 槐鷲炙各二兩

右為末每服二錢食前枳殼湯下

附子丸出聖惠方 治積年腸風瀉血面色萎黃

附子二箇炮去皮臍 食鹽 當歸對炒 乾薑炮對 杏仁湯浸去皮尖雙

仁麩炒 皂莢去黑皮塗醋炙各一兩

右為末煉蜜杵丸梧桐子大每服二十九丸食前陳米

飲下

生地黄散

出聖惠方

治大便下血皆胃肺積熱流注大腸

生乾地黄

黃芩

赤芍藥

黃連

去鬚

蒲黃 地

骨皮

各二兩

右以咀每服五錢水一大盞入竹茹一鷄子大煎五

分去滓頻溫服

黃芩散

出聖惠方

治大腸積熱下血不止日夜無度

黃芩

黃蘗

黃連

去鬚

生乾地黄

地榆

剉

犀角

屑 各一兩

右以咀每服三錢水一鍾入青茹半鷄子大煎至六

分去滓食前溫服

治大便下血

草錦

蓮蓬殼

敗棕

白茅苗

新錦

各等分

右為末溫米飲調下

五湯散 治瀉血不定

貫仲

去土毛

槐花

地榆

黃連

去鬚

甘草

各等分

右為末每服一錢米飲調下

黑虎丸 一名黑虎丹

治腸風屢經大效

白礬

研二兩

鷄冠花

乾者一兩

屋龍尾

屋下烟煤是

青橘皮

洗去

白焙五靈脂

炒各四兩

右為末分一半末用米醋二升漫火熬成膏候冷和

一半末為丸梧桐子大每服三十九空心陳米飲下

車螯散

一名如聖散

治腸風下血痔漏不止

車螯

合一

白莢刺

四十枚

硃砂

丹砂

乳香

各一分三味同

研

右四味為末同車螯合於內以地龍泥固臍用炭六斤煨火盡為度出研為末每服一錢空心温酒調下

側柏散 治腸風瀉血等疾

側柏葉

一斤九蒸九曝

黑豆

小者一升炒

甘草

炙剉二兩

白朮

桂

去粗皮各一兩

右為末每服二錢熱湯調下日三服不拘時

大安散

一名白礬散

治久患腸風瀉血



礬石灰研三兩 硫黃末 黃連去鬚炒末 乳香研各一兩 蠟一錢

桑耳散 治腸風下血風毒氣攻注大腸疼痛

桑耳炒 枳殼麩炒去穰 木賊 當歸剉炒 槐鶩炙各一兩

右為末每服二錢食前粥飲調下

治積年腸風瀉血百藥無效

敗皮巾子燒灰 白礬燒灰 人指甲燒 麝香各一兩 乾薑三兩

末 炮為

右為末每服一錢食前溫粥飲下

止血散 治腸風下血或在便前或在便後在便前者

其血近腎肝血也在便後者其血遠心肺血也

皂角刺燒灰二兩 胡桃仁去皮 破故紙炒 槐花各一兩半

右為末每服二錢米飲點下溫酒亦得

槐花散 治腸風臟毒下血 方見痔瘻門諸痔類治五痔

治腸寒下血

核桃殼 鹽退 皮鞋底 赤鷄冠花各等分

右燒灰為末每服一錢溫酒調空心下

厚朴煎 治積年下血

厚朴

五兩生薑五兩同搗爛於銀石器內炒令紫色

白朮

一兩

大艾葉

神

麴

各一兩同炒令紫色

右為末水麴糊丸梧桐子大疾作時空心米飲下一

百丸平時三五十丸

昔王嗣康為蔡照先處得此方韓縣尉名楚鄉父服之作效嗣

康云腸胃本無血緣氣虛腸薄自榮滲入令用厚樸厚腸胃神麴麥孽消酒食白朮導水血自不作也

治腸風有脫瘡瘡破者不治

馬藺子

一斤研破酒浸夏三日冬七日曬乾

何首烏

半斤

雄黃

四兩

雌黃

四兩

右為末用馬藺子酒打糊丸梧桐子大每服三十九

空心溫酒下三服效

治腸風臟毒

黃連

黃芩

各一兩

地榆

二兩

黃蘗

半斤

右為末煉蜜丸梧桐子大每服隨湯送下不計時忌

一切毒物

治腸風久血

茅花 敗荷葉

敗棕

各半兩 燒存性

香附

杆淨一兩少 鹽和半炒 焦

炒半畧

右為末食前米飲調下

藥皮丸 治臟毒便血疼痛嘔噦

黃連 黃蘗 芍藥 槐花

炒各二兩

右為末滴水丸梧桐子大每服三十九食前米飲下

日進二服

麝香散 治腸風大小便出血淋澁疼痛婦人血崩

蠶退紙

燒灰存性

晚蠶

沙

煉去土

重黃

燒灰存性

白殭蠶

炒去絲各

等分

右為末每服二錢入麝香少許用飯調下糞前紅者

食前服如糞後紅者食後服血崩淋澁等疾不拘時

日三服熱淋止用蠶退紙一味燒灰存性研末飯飲

下

治便紅

肥皂

獨子者七箇去核

陳鹽海

七箇入肥皂內水紙包裹文武火煨焦出火氣研為



細末香附炒黑 陳艾燒灰各等分

右用米飯為丸空心飲湯送下

治便血

檮皮即大眼椿根上 水紅花即龍眼花 瓦松 川百煎各等分

右為末空心新汲水調下

酒蒸黃連丸

出德生堂方

治酒食過度便血臟毒諸種痔

漏瀉痢赤白臟腑疼痛胃隔痞悶氣不舒暢男子婦

人皆可服之解酒毒

黃連

一斤用好酒浸二日入鍋內蒸透為度取出晒乾留酒和麩糊

乾薑半斤 枳殼

半斤 木香四兩

右為末酒糊為丸梧桐子大每服五七十九飯飲無

時下

犀灰散

出傳信適用方一名異功散

治五積腸風瀉血下痢糞前

有血號外痔糞後有血號內痔大腸不收號脫肛穀道四面有努肉如乳號鼠乳如頭上有孔號漏此藥

並皆治之

方見痔瘻門痔瘻類

抵聖散 治腸風下血

椿根白皮

焙

蒺藜子

炒

枳殼

麩炒去穰

防風

去心各一兩

右為末每服一錢白湯點服

四聖散 治腸風

貫仲 荆芥穗

白礬

飛過

猪牙皂角

酸炙各一兩

右同燒灰存性為末每服一錢温米飲調下空心食前日三服

槐實散 治腸風

枳實

剉炒

枳殼

去穰麩炒透

黃耆

剉炒各一兩

右為末每服一錢茶清調下

神應丸 治腸風經年不差瀉血疼痛

水牛角

燒灰

楷木茸頭

乾漆

酒浸一宿炒令斷煙取出各二兩

槐耳

一兩半

右為末煉蜜丸梧桐子大每服三十九空心熱酒下

枳實丸 治腸風

枳實麩炒槐莢麩炒皂莢猪牙者塗醋炙大黃炒各一兩

右為末麩糊丸梧桐子大每服二十九丸荆芥蠟茶下

空心食前服

礬石丸出十便良方治腸風下血久不止下部疼痛

白礬二兩飛過存一分性皂莢二挺去皮塗醋炙附子不去皮臍炮三度每度炮

入水煎殺乾薑炮各一兩

右為末用河水煮麩糊丸梧桐子大每服十九鹽湯

下空心食前服

木賊散 治腸風下血多年不差方見痔瘻門痔瘻類

烏魚骨丸 治腸風

烏鰂魚骨罐子內燒赤肉蓯蓉酒浸焙各半斤桑根白皮剉炒蕪

荑各半斤

右為末醋煮乾飯丸梧桐子大空心米飲下每服五

丸不嚼

防風散 治腸風

防風去叉炙黃耆剉炙各二兩甘草剉炙人參各半兩



右為末每服二錢食前粟米飲調下

黃芩飲 治大腸風熱下血不止

黃芩 去黑心

黃蘗 去粗皮

黃連

槲葉

炙各一兩半

右以咀每服三錢水一盞煎七分入地黃炙半合去

滓溫服不拘時

野狸骨散 出聖惠方

治大腸風毒下血不止心神虛煩

野狸骨

一兩酥炙

防風

半兩去蘆

益母草

半兩

膩粉

一錢

右為末每服半錢食前溫酒調下

治腸風下血不止腹痛日漸疔羸 出聖惠方

枯萋

一枚生者

槐花

白麩

各一兩

皂莢

一挺不

艸者

右都搗作一團捏作餅子燒令黑色為末每服一錢

食前溫粥調下

牛角腮散 出聖惠方

治積年腸風或發或歇不止

牛角腮

燒灰

槐耳

臭椿根

炙

屋松

各二兩

右為末每服一錢食前溫粥飲調下

治積年腸風下血 出聖惠方

蜜陀僧

白礬

搗碎

槐子仁

炒為末

皂角

燒灰為末 各一兩

右將蜜陀僧白礬入瓦罐子內燒令通赤候冷取出為末入槐子皂角灰相和研令勻粳米飯丸梧桐子大每服十五丸食前粥飲下

菰藚瓜丸

出聖惠方

治積年腸風下血不止面色萎黃肌

體枯悴

菰藚

三枚割去蓋子

硫黃

細研

附子

炮去皮臍

乾薑

炮剉

猪牙皂角

去皮生搗碎各一兩

右都搗為細末入菰藚內却以蓋子蓋之用竹簽子扎定以麩厚裏漫火燒麩黃焦為度候冷取出重研令極細以軟飯和丸梧桐子大每服十五丸食前黃耆湯下

五槐丸

出氏方

五倍子

槐花

陳者

百藥煎

好者各等分

右焙乾為末酒糊為丸梧桐子大每服二十九空心米湯下日三服一方無百藥煎

治丈夫瀉血婦人血崩瀆入大腸出血出氏方

豆蔻 檳榔各炒紫色 罌粟殼燒灰各等分

右為末每服二錢空心飯飲調服

聚金散出醫方大成 治大腸積熱或因毒大便下血腹中

多熱痛作渴脈來弦數之證

黃連四兩一兩水浸晒乾一兩炒一兩灰大炮一兩生用 黃芩 防風去蘆各一

右為末煮麩糊丸梧桐子大每服五十九丸米泔浸枳

殼水下不拘時冬月宜入大黃一兩

香梅丸出醫方大成 治腸風臟毒下血

烏梅同核燒灰存性 香白芷不見火 百藥煎燒灰存性各等分

右為末米糊丸梧桐子大每服七十九丸空心米飲下

三神金烏散出仁存方 治大便下血

卷柏 側柏 棕櫚各等分

右燒灰存性為末每服三錢用酒調下空心服一法

研飯丸梧桐子大服一百粒米飲下



治腸風久而下膿血日數十度者出百一選方一名枳實三百丸

枳實 槐花生用各半兩 皂角一兩半生用半燒存性

右為末煉蜜為丸如梧桐子大約可得三百丸每服三十九食前米飲下酒亦得甚者一料即安

治腸風出百一選方

生乾地黄酒浸熟乾 地黄酒浸 遼五味子各等分

右為末煉蜜丸梧桐子大每服五七十九酒或湯下因心氣下血人可用妙香散酒調服梁路分患此疾

更十七藥不效服此一服而愈又方濃煎黃連湯下

連翹丸或紅子

治酒毒便血不差經年者出百一選方一名槐花湯

椽斗子 槐花各一兩二味同炒黃色 白礬一分

右為末每服二錢温酒調下

治大便下血椿皮丸出經驗良方

椿樹根皮四面去粗皮焙乾 枳殼麩炒 蒼朮各一兩泔浸

右為末醋糊丸梧桐子大每服四十九空心米飲下

治腸風下血及肛出出經驗良方

虎爪芳根 金罌子芳根 椿根各等分

右同烏梅甘草半水半酒空心服

治臟毒下血出經驗良方

側柏葉一兩白礬少許湯煮過焙乾 槐花二兩炒為末 棕數片陳者佳燒

性存

右為末每服一匙頭溫酒隨意調下

三栝萋酒 治便紅

天栝萋即木饅頭叔二三年者佳 地栝萋即白爛田螺殼 水栝萋即蓮蓬殼

久者為佳

右燒灰存性窰小油調下

治腸風漏

荆芥二稜用烏頭炒過切片子 馬兜零藤 穀精草

右各等分用水煎沸熏洗大效

治初得腸風及血痔出本草

以槲若葉微炙炒槐花減槲葉之半同為末米飲

調服熱多者尤佳

治便血

蒲黃生用 好

荷葉頂

大蘿蔔皮各等分

右將荷葉大蘿蔔皮燒帶性碾末和勻空心米湯下

黃連飲 治腸風瀉血如痢腹中疼痛面色萎黃

黃連去鬚 一兩

乾薑炮 一分

甘草炙半 兩

右咬咀每服三錢水一盞生薑三片棗一枚劈煎六

分去滓溫服

黃耆丸 治腸風行走艱難

黃耆

炮

枳殼

去穰 炒 各一兩

葳靈仙

去鬚 二兩

右為末煉飯丸小豆大每服三十九至五十九用溫

水下並不損氣

烏梅丸 治瀉血

烏梅

二十枚 醋 煮去核

白礬

三兩 飛過

訶梨勒

三十枚 炮去核

右將白礬訶梨勒為末與梅肉丸梧桐子大每服七

丸米飲下



神驗膏 治腸風下血冷不入食

背陰臭椿皮 根不見日者極取嫩皮一斤 黑豆 半斤 槐花 二兩

右用水五升於銀石器內慢火熬令豆熟為度續入二兩再煎候蜜熟傾出淨瓷器內盛過夜露宿每日食後臨卧各一服每服約半盞許用重湯溫熱得所漸漸服食

大効丸 治腸風瀉血

大薊根 七截各長一寸又名荆芥 白礬 一兩研細 麝香當門子 七豆許

右用不霑土大菰菰一箇割下蓋子不去穰入大薊

根白礬麝香當門子在內用菝子左攪七遭安蓋子

在上以鹽一合和土為泥固臍陰乾用炭火煨候透

赤便住候冷打去泥細研為末取一半為散一半以

糯米粥為丸梧桐子大每日空心將大薊苗煎湯調

下半錢至日午臨卧又煎大薊苗酒下十九服三兩

日便住須是喫得三五箇栝萐永去病根

獨活丸 治腸風瀉血不止

獨活

半兩去蘆為末

黃蠟

五兩銀器中融成汁

生薑

半斤取自然汁

右薑汁入熬以汁盡為度次入獨活末令勻衆手急送下

榮順散 治腸風下血疼痛不可忍

枳殼

去穰麩炒

荆芥穗

各一兩

槐鶯

半兩炒黃

右為末每服二錢溫米飲調下不拘時未效再服

龍肝散 治腸風瀉血

伏龍肝

般丹

牡蠣

各半兩

右為末每服二錢陳米飲調下不拘時

治腸風痔漏大便常血

出時後方

苦桃皮

扁竹

苦參

右煮汁漬之大妙燒稻稾灰汁漬之亦良

治腸風下血疼痛不止

出聖惠方

道人頭

荆芥穗

各一兩

皂莢

三寸去黑皮塗醋炙去子

右為末每服一錢食前粥飲調下

內補散 出聖 惠方

治大腸風毒下血

黃耆 剉 枳殼 麩炒 去穰 側柏葉 炙各 一兩

右為末每服二錢食前粥飲調下

治大腸風毒下血不止 出聖 惠方

枸杞子 槐子 炒 桑木耳 炙各 二兩

右為末每服二錢食前黃耆粥飲調下

又方 出聖 惠方

枳殼 麩炒 去穰 何首烏 乾薑 炮剉 各 一兩

右為末每服一錢食前粥飲調下

又方 出聖 惠方

牛角鯁 棕櫚皮 乾薑 各 一兩

右都燒為末研勻每服二錢食前粥飲調下

又方 出聖 惠方

釜下墨 棕櫚皮 訶梨勒皮 煨 各 一兩

右為末每服一錢食前粥飲調下

又方 出聖 惠方



牛角鯢對一雄黃一塊如麝香一分

右每一隻牛角鯢安雄黃一塊在內以稠泥封閉下

面用桑柴火燒熟研為散入麝香和勻又用栝萋一

對亦用桑柴火燒令熟研為散每服栝萋末二錢牛

角鯢末一錢相和令勻食前粥飲調下

治腸風下血發歇不止出聖惠方

荆芥穗 薄荷 枳殼各一兩麩炒去穰

右為末每服一錢食前粥飲調下

又方出聖惠方

皂莢三兩不栝萋一枚白礬二兩

右件藥入瓶內以鹽泥固臍候乾以炭火燒令通赤

候冷細研令勻每服二錢食前粥飲調下

神效方出聖惠方 治腸風積年瀉血不止

黃丹 白礬各一兩栝樓一枚去頭入二味在內

右以物蓋栝萋頭鹽泥固濟安磚上以大火燒令通

赤放冷取出搗細為末每服一錢食前煖刺薊汁調

下

治腸風積年下血不止 出聖 惠方

野狸頭 一枚 桑根西枝 一握 附子 一枚

右等藥入瓶內鹽泥固濟候乾炭火燒令通赤候冷取出為末每服二錢食前粥飲調下

又方 出聖 惠方

皂莢 七挺不舂者去黑皮塗醋炙去子 寒食蒸餅子 烏龍尾 各二兩

右為末煉蜜丸梧桐子大每服二十九食前粥飲下

又方 出聖 惠方

槐耳 半斤切 皂角 十挺剥去皮子 礶砂 一兩細研

右用米醋三升煎取一升去滓後再入鐺中以大火養成膏入礶砂和勻丸梧桐子大每服十九空心及晚食前溫粥飲下

治積年腸風下血疼痛 出聖 惠方

竈突墨 二兩 荊芥 木香 各一兩

右為末水浸蒸餅為丸梧桐子大每服三十九丸食前  
槐子湯下

治積年腸風下血面色萎黃下部腫痛出聖惠方

綠礬二兩燒赤 釜底墨 烏賊魚骨炙焦各一兩

右為末粟米飯為丸如梧桐子大每服三十九丸食前  
煎赤糙米湯送下

又方出聖惠方

皂莢去黑皮塗酥炙去子 藟藟子炒各一兩 枳殼二兩麩炒去穰

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九丸食前枳

殼湯下

治大便下血不止出聖惠方

生乾地黄二兩 阿膠碎炒 白藪五兩

右以咀每服三錢水一中入竹葉二七片煎至六分

去滓食前溫服

治腸風出本惠方

五倍子 白礬各半兩



右為末順流水為丸梧桐子大每服七丸空心飯飲下

治腸風瀉血

出本  
事方

牽牛 五兩 牙皂 三兩 不

坤者

右水浸三日後除皂角將酒一升煮令乾焙為末煉蜜丸梧桐子大每服七丸空心温酒下空心日午夜卧各一服或轉下黃物不妨病後可常每日服五丸飯飲送下

治腸風及熱毒下血或因食熱物發動

出本  
事方

金星草 陳乾薑 各三兩

右為末每服一錢新汲水調下

當歸赤小豆散 出干 治先血而後便謂之近血及治

金方

大腸秘

赤小豆 五兩 浸出芽晒 當歸 一兩

乾一法熬令折

右為末漿水服方寸七日三四服

治臟毒下血名卷柏散 出危

氏方

地柏 生土右傍高四五寸根黃如絲莖上細 黃耆

各等分

右為末每服二錢用水調下

治便血及臟毒下血經年瘦者 出仁存方

槐花 五倍子 各炒焦等分

右為末糊為丸梧桐子大每服五十九食前米飲下

荆芥散 經驗良方 治腸風下血

荆芥穗 縮砂仁 各等分

右為末每服三錢用糯米飲調下不拘時日進三服

一方食前服

地榆湯 百一選方

地榆 洗焙 卷柏 不去根洗淨各等分

右吹咀水一碗砂瓶內煮數十沸通口服不拘時每

服用一兩

治腸風下血二三十年者

鷹爪黃連 吳茱萸 各等分

普濟方

五七

右新瓦上同炒候茱萸香熟黑色為度去茱萸不用  
 將黃連為末空心溫酒下二三錢米飲下亦得又方  
 黃連茱萸陳米糊丸梧桐子大每服五十丸米飲下  
 日二服更以胃風湯煎如法吞下一方名剪血丸用  
 木香一兩用濕紙裹煨為末以酒糊丸切忌鹽藏白  
 酒鷄肉鮓醬

普濟方卷三十七

總校官候補知府臣葉佩蓀  
 校對官編修臣張九鐔  
 騰錄監生臣劉瑄