

大德重校聖濟總錄卷第五十九

消渴門

虛熱渴

暴渴

胃熱渴

久渴

渴利

消渴後成水

消渴後成癰疽

消中

消腎



虛熱渴

木一蓋煎十分

論曰人因勞傷府藏或大病後未復榮血不足陰虛於內則生內熱熱則津液燥少故渴而引飲飲不能多多則腹滿不消氣虛不勝於水故也

治藏氣不足內燥發渴腎瀝湯方

甘早

生乾地黄洗到

澤瀉炒

遠志去心

桂皮去

當歸切

龍骨

甘草炙

五味子

赤茯苓去皮

芎藭去 人參一蓋去 黃芩去 三去

麥門冬去心 枳實去 羊骨一夏去 附子四

土瓜根

山茱萸

鹿茸

去毛酥炙

黃連

龍骨

牛膝

去苗酒浸壹宿焙

狗脊

茯神

人參

牡蠣

右一十二味搗羅為細末鍊蜜丸如梧桐子大每服

三十九丸溫水下不拘時服

治虛渴飲水不已心腹脹滿木香湯方

木香

枳殼

芍藥

檳榔

桑根白皮

黃耆

草豆蔻

枇杷葉

黃連

桂

人參

白芍

右一十一味攪搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去

治虛燥渴不已黃耆丸方

治虛燥渴不已黃耆丸方

黃耆

麥門冬

茯神

附子

醋石榴皮

生乾地黄

澤瀉

黃耆

右一十味搗羅為細末鍊蜜丸如梧桐子大每服三

治虛燥渴不已黃耆丸方

治虛渴飲水無節人參湯方

人參兩 五味子各 大腹皮各

赤茯苓去黑皮 桑根白皮剉 黃耆細剉各

芍藥 黃芩去黑心 葛根剉各

枳殼去瓢 枳實去瓢 茯苓剉各

右二十味廔搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去

滓溫服不拘時

治藏虛舌本燥渴飲不已地黃丸方

熟乾地黄剉 山茱萸 山芋

澤瀉 牡丹皮 白茯苓去黑皮

附子炮裂去皮 桂去盡皮 附子各 薑不 下不 察

右八味搗羅為細末鍊蜜丸梧桐子大每服三十丸

溫水下不拘時服

治虛渴不止意苳人湯方

十薏苳太 五味子各 覆盆子小麥

大聖乾地黃剉 枸杞子各 紫蘇葉每

黃耆細剉 木通各 白茯苓去黑皮

右九味廔搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫

服不拘時候 山茱萸 茯苓剉各

治虛渴煩躁不利鹿茸洗方

鹿茸去毛

黃耆細

人參

土瓜根

山茱萸

杜仲去蟲皮切炒

桑螵蛸炙各

栝樓根水

菟絲子酒浸

肉蓯蓉酒浸壹宿去

皮各壹兩壹分

雞腹膠蛤殼

右十一味搗羅爲細末鍊蜜丸如梧桐子大每服三

十九酒下不拘時服溫水亦得

暴渴

論曰暴渴緣熱甚腠理開汗大泄而津液暴燥故渴而引飲小便利者不能爲害若三焦不和心肺壅熱胃中乾燥渴而小便不利者須變飲證不可不察

治心脾壅滯暴渴引飲茯苓湯方

赤茯苓去黑皮

澤瀉

白朮

黃連去須

桂去皮

甘草炙劉各壹兩

大黃生用

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞半入小麥半匙

煎至一盞去滓溫服不拘時

治內熱暴渴不止枳實湯方

枳實去穢炒

扶神木

葛根剉

石膏各貳兩半

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞半煎至一盞去

滓溫服不拘時

治心脾壅盛暴渴飲水黃連散方

黃連去須

葛根剉各兩

大黃剉炒兩

枇杷葉拭去毛炙兩

麥門冬去心焙壹兩半

右五味搗羅為散每服二錢匕溫水調下不拘時

治心脾虛熱暴渴不已地骨皮湯方

地骨皮

栝樓根

黃連去須

麥門冬去心焙

黃芩去黑心各壹兩

茯神去木

遠志去心各分

甘草炙剉半兩

石膏碎貳兩

右九味搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服不拘時

治暴渴煩躁飲水麥門冬湯方

麥門冬去心焙肆兩

知母焙參兩

凝水石壹兩半

青竹筍揀如雞子大兩塊碎切

右四味搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服不拘時

治暴渴咽燥口乾引飲秦芫湯方

秦芫去苗上貳兩

甘草炙半兩

右二味搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服不拘時

治暴渴地骨皮湯方

地骨皮

栝樓根各壹兩半

黃連去須

土瓜根

麥門冬去心焙

車前子各壹兩

知母焙半兩

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞半入生地黃半

分切煎至八分去滓溫服不拘時

治虛躁暴渴烏梅散方

烏梅肉焙

麥門冬去心焙各壹兩半

生乾地黄兩焙參兩甘草炙壹兩

右四味搗羅為散每服二錢匕溫熟水調下不拘時

治暴渴黃耆湯方

黃耆剉

栝樓根各壹兩

赤茯苓去黑皮

甘草炙各半兩

麥門冬去心焙壹兩半

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞半煎至八分去

滓溫服不拘時

治暴渴飲水不止頭面虛浮桑根皮湯方

桑根白皮剉

麥門冬去心焙

石膏碎各兩

赤茯苓去黑皮

黃芩去黑心

栝樓根各壹兩半

梔子人兩碎土瓜根壹兩

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞半煎至八分去

滓溫服不拘時

治暴渴煩熱蘆根湯方

蘆根剉

麥門冬去心焙

栝樓根

地骨皮各壹兩

白茅根剉

石膏碎各壹兩

黃芩去黑心

人參各叁分

甘草炙半兩

右九味麤搗篩每服五錢匕水一盞半生薑一棗大

拍碎小麥牛合竹葉二七片煎至八分去滓食後溫

服

治暴渴心煩口舌乾燥芫胡湯方

芫胡去苗

烏梅肉炒各貳兩

甘草炙壹兩

麥門冬去心焙壹兩半

右四味麤搗篩每服四錢匕水一盞半煎至八分去

滓溫服不拘時

胃熱渴

論曰胃氣實則生熱熱則土氣內燥津液不通咽膈煩滿故渴而引飲內經謂脾氣熱則胃乾而渴蓋藏真濡於脾脾合為胃行其津液者也脾既受熱津液不濡於胃胃乾則渴不止也

治胃乾渴不止飲水枸杞根湯方

枸杞根

栝樓根

麥門冬去心

黃連去須各壹兩半

土瓜根乾者

知母

車前子去土各壹兩

右七味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半入生地黃半分切同煎至八分去滓溫服日三

治胃熱渴豬肚丸方

豬肚壹枚淨洗去脂膜滓穢

黃連去須伍兩

栝樓根肆兩

茯神去木

麥門冬去心焙各貳兩

知母剉參兩

白粱米淨洗伍兩

右七味先搗羅下六味為末內豬肚中線縫口安甑中蒸蓋甑無令泄氣候極爛乘熱細切用并藥木白

內搗勻可丸即丸若輒即入鍊蜜同搗丸梧桐子大每服三十九煎粟米飲下不拘時候日再服漸加至

四十九

治脾胃有熱煩渴不止黃連羊乳丸方

黃連去須別搗肆兩

生栝樓根去皮半斤研生布絞汁

生地黄半斤淨洗研生布絞汁

羯羊乳合兩

右四味取地黄栝樓汁羊乳和黃連末丸如菉豆大每服三十九煎小麥湯下

治胃熱乾渴甘草湯方水二盞減小麥半合煎至一盞

甘草剉

栝樓根各貳兩

麥門冬去心焙貳分

半夏湯洗去滑柴 偏暴

右四味麤搗篩先以水二盞洵小麥半合煎至一盞

半去麥下藥末五錢匕大棗二枚擘破生地黃半錢

生薑一棗大拍破再煎至八分去滓溫服日再

治胃中乾渴栝樓根湯方

栝樓根

參兩

知母

焙貳兩

甘草

銑

管輅入參各壹兩

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

下白蜜少許攪勻不拘時候服日可數服

治胃渴引飲泄熱茯神湯方

茯神去木

貳兩

栝樓根

麥門冬

去心焙各伍兩

知母

剉

萎蕤各肆兩

右五味麤搗篩先以水三盞洵小麥一匙淡竹葉五

十片洗切同煮至一盞半去滓下藥末四錢匕棗二

枚擘破生地黃半分同煎至一盞去滓溫服日三

治胃乾渴黃耆湯方

黃耆去苗

貳兩

茯神去木

栝樓根

甘草

炙

麥門冬

去心焙各壹兩半

生乾地黄

兩半

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服日三

久渴

論曰消渴之病本於腎氣不足下焦虛熱若病久不愈者邪熱蘊積榮衛澀滯精血衰微病多傳變宜知慎忌凡忌有三一飲酒二房室三鹹食及麪又消渴病經百日以上者當忌灸刺若灸刺則瘡上漏水變成癰疽矣治久消渴飲水不絕腎瀝湯方

遠志去心

人參

澤瀉

熟乾地黄焙

桂皮去麤

當歸切

赤茯苓去黑皮

龍骨

黃芩去黑心

芎藭各貳兩

五味子參

麥門冬去心焙

右一十二味麤搗篩每五錢匕水三盞先煮羊腎一

具取一盞去腎入藥并大棗三枚擘破生薑半分切

同煎取一盞半去滓分溫二服不拘時候

治久消渴麥門冬丸方

麥門冬去心焙

赤茯苓去黑皮

黃連去須

黃芩去黑心

石膏煨

萎蕤

人參

升麻

龍膽

栝樓根

枳殼去炒

生薑切

枸杞根皮洗切各壹兩

右一十三味搗羅爲末鍊蜜和九梧桐子大每服三

十九粟米飲下不拘時候

治久消渴不止升麻丸方

升麻

黃芩去黑心

麥門冬去心焙

生乾地黄焙

栝樓根兩

苦參兩

人參兩

黃連去須

黃蘗去鹽皮剉

右九味搗羅爲末以生牛乳汁和衆手速丸梧桐子

大暴乾每服三十九粟米飲下不拘時候服漸加至五

十九

治久消渴內燥引飲不已黃連散方

黃連須去

白石脂兩

鉛丹研

栝樓根兩

石脂兩

右四味搗研羅爲細散每服二錢匕漿水調下日三

服

治腎虛燥久消渴不止澤瀉丸方

澤瀉

肉蓯蓉酒焙

五味子

禹餘糧煨

巴戟天去心

當歸切

地骨皮洗焙

磁石煨

人參

三赤石脂

韭子洗

白龍骨

六甘草

和餘澤瀉牡丹皮洗鹽兩生乾地黄兩

右一十五味搗研羅爲末鍊蜜丸如梧桐子大每服
三十九以牛乳汁下不拘時候

治消渴程年飲水不止白石英丸方

白石英

別

芒消

別

凝水石

別研各

赤茯苓

去黑皮

人參

別

地骨皮

苦參

甘草

麥門冬

去心焙各參兩

右一十味除別研外搗羅爲末合研勻鍊蜜丸如梧

桐子大每服三十九溫水下不拘時候

治久消渴飲水不絕葵根湯方

經霜冬葵根皮

不拘多少細切焙

右一味羅搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服不拘時候

治久消渴經年飲水無度水銀丸方

水銀

鉛

柳絮

各研次入水

銀并鉛參味和研勻以瓷合盛外用紙筋泥固濟安灰火內養半日取出候冷再研細

鼓炒

鉛丹

白殭蠶

黃連

去須各半兩

右七味將四味爲末與前三味再研勻用糯米糊丸如梧桐子大每服二十九溫水下空心日午夜臥服

治久消渴飲水不絕苦參丸方

苦參兩

黃連去

栝樓根

知母焙

麥門冬去心

人參

牡蠣煨

黃耆剉

生乾地黃焙各兩

右九味搗羅爲末以牛乳汁和衆手速丸如梧桐子大每服三十丸漿水下不拘時候

渴利

論曰消渴小便利多隨飲而出故名渴利此蓋少服乳石房室過度致腎虛精耗熱氣獨留腎爲之燥故渴而引飲腎虛不能制冰則飲隨小便利也病久津液耗竭

經絡否滯榮衛不通熱氣留滯必變癰腫也

治消渴日夜飲水不止飲下小便卽利麥門冬湯方

麥門冬焙

黃連去

冬瓜乾者各兩

右三味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服

治渴利虛熱引飲不止消熱止渴石膏湯方

石膏半

地骨皮參

栝樓根貳兩

麥門冬去心

茯苓去

茯神去

知母焙

萎蕤兩

右七味麤搗篩每服四錢匕水二盞竹葉三十片生

地黄半分切生薑三片棗二枚擘破同煎至十盞去
滓食後溫服日三

治渴利日飲水數斗小便頻數栝樓散方

栝樓根

黃連去心

防已去心

試出鉛丹炒紫色研

右四味搗羅三味為散與鉛丹研勻每服二錢匕酒

調食後服日三服藥後即強飲水須臾自惡必不欲

飲麥門冬心

黃蘗去心

冬八各

治渴利患十年者服之即差千金散方麥門冬心

鹽澤瀉各蒲葶栝樓根各黃蘗去心甘草炙

白石脂研

赤石脂研

鉛丹炒研各

胡粉炒研

石膏碎研

右八味搗前三味為散更與研者和勻每服一錢匕

煎菝葜湯調下不拘時日三

治渴利有熱小便澀難欲下之前胡湯方

前胡去蘆

生乾地黄焙

大黃剉炒各

黃芩去黑

梔子人

升麻

芍藥

栝樓根

石膏碎各

麥門冬去心

兩壹分

桂去麋皮

壹分

枳實去瓢

甘草炙

右一十三味麤搗篩每服四錢匕水一盞半入生地黃一分切碎同煎至八分法淨食前溫服日三

治渴利麥門冬湯方

麥門冬焙心

白茯苓去黑皮各肆兩 栝樓根

地骨皮各伍兩

甘草炙參兩

右五味麤搗篩每服四錢匕先以水三盞入小麥一匙竹葉二七片生薑一棗大切棗二枚擘破同煎至一盞半去滓下藥末煎至八分法淨食前溫服日三

治渴利栝樓根煎方

生栝樓根去皮細切拾斤

黃牛脂碎切壹合半鍋內慢

水煎令消濾去滓

右二味先以水三斗煮生栝樓根至水一斗用生絹絞去滓取汁內午脂攪令勻再內鍋中慢火煎不住手攪令水盡候如膏狀卽止於堯合中密盛每日食後溫酒調如雞子黃大服之日三

治三消渴疾飲水無度小便隨之肌肉消瘦厚朴湯方

厚朴去蟲皮壹兩 牡蠣煨參兩

人參壹兩

右三味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓不計時候溫服

治三消渴疾肌膚瘦弱飲水不休小便不止黃耆散方

黃耆 剉

桑根白皮 剉細各壹兩

葛根 剉貳兩

右三味搗羅為散每服三錢匕煎鯨豬湯澄清調下

不拘時

治常食熱麪炙燂諸乾燥物及服補熱藥因熱酒衝肺日久即患消渴飲水無度小便旋利心中熱悶煩躁拘

杞根飲方

枸杞根皮

菰根

李根白皮

葛根

肆味並洗各貳兩炙壹兩

牡蠣 炒貳兩

石膏 碎伍兩

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓不拘時溫服

治渴飲水下咽即利為膀胱有熱名曰渴利雞臍脰丸

方

雞臍脰黃皮 炙 栝樓根 切

右二味等分同搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服

二十九溫熱水下食後服

治渴日夜飲水隨飲即利石菖蒲散方

石菖蒲 壹兩

栝樓根 貳兩

黃連 去須半兩

右三味搗羅為散每服二錢匕新汲水調下食後臨

臥服

治渴利麥門冬湯方

麥門冬去心焙烏梅去核炒

右二味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

放溫服

治渴利小豆汁方

小豆不限多少

右一味水煮熟搗爛細布絞取汁每服一盞不拘時

頻服即差

又方

薔薇根細剉半斤

右一味用水五升浸一日取水量力時時飲之

消渴後成水

論曰脾土也土氣弱則不能制水消渴飲水過度脾土受濕而不能有所制則泛溢妄行於皮膚肌肉之間聚為浮腫脹滿而成水也

治消渴後四肢浮腫小便不利漸成水病豬苓散方

豬苓去黑皮

人參各分

木通剉壹兩

黃連去須壹兩半

麥門冬去心焙

栝樓根各貳兩

右六味搗羅為細散每服一錢匕溫漿水調下日三

以差為度

治消渴欲成水氣面目并膝脛浮腫小便不利藷麥湯

方

藷麥穗

滑石

澤瀉

各半

防己

分

犬黃

炒

黃芩

去黑心 各四分

桑螵蛸

炒壹拾肆枚

右七味蠶搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

空心溫服良久再服

治消渴後數飲嘔逆虛羸欲成水病茯苓散方

赤茯苓

去黑皮

栝樓根

麥門冬

去心焙各壹兩半

升麻

壹兩

桑根白皮

剉貳兩

陳橘皮

湯浸去白焙參分

右六味搗羅為細散每服一錢匕清水調下日再

治消渴後偏身浮腫心膈不利紫蘇湯方

紫蘇莖葉

桑根白皮

剉

赤茯苓

去黑皮壹兩

羚羊角

檳榔

剉各參分

木香

桂皮

去麤皮

獨活

去蘆頭

枳殼

去瓢麩炒各半兩

郁李人

湯浸去皮尖炒貳兩

右一十味麤搗篩每服四錢匕水一盞半生薑半分

切煎至入分去滓溫服不拘時

治三焦氣不宜通膈壅停水不下至腎腎消肌肉化為

小便茯苓湯方

赤茯苓去黑皮

澤瀉

麥門冬去心

杜仲去麤皮炙桑白皮剉參

桂去麤皮 薑兩

磁石搗如麻粒大淘

右七味麤擣篩每六錢匕水二盞棗三枚擘破蒸白

五莖細切煎至一盞去滓分二服空腹溫服如人行

十里再服至晚亦然此藥內消不止利服一劑訖津

液未通血脉未行肌膚未潤更服一劑

治消渴差後津液枯竭身體虛浮欲成水病防已丸方

防已

豬苓去黑皮

郁李人湯浸去

杏人去皮尖雙入

栝樓根

赤茯苓去黑皮

葶藶子紙上

桑根白皮剉各

白木分參

右九味為細末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九空

腹漿水下日一服腫消小便快為度

治消渴後頭面脚膝浮腫胃虛不能下食心胸不利或

時吐逆赤茯苓湯方

赤茯苓去黑皮

紫蘇子

白朮

前胡去頭

人參各壹

陳橘皮湯浸去

桂去麤皮

木香

檳榔剉各

甘草炙剉
半兩

右一十味麤搗篩每服三錢匕水一盞半生薑半分
拍碎棗二枚擘破煎至一盞去滓溫服不拘時

消渴後成癰疽

論曰消渴則隨飲而出皆作小便由少服乳石所致久
則榮衛損傷精血不足肌膚減耗石氣增熾隨附經絡
津液內竭經絡凝澁榮衛不行熱氣留滯故變癰疽此
當精窮治法恐毒氣不出穿通府藏也

治消渴後虛熱留滯結成癰疽栝樓根丸方

栝樓根壹兩

鉛丹研壹兩

乾葛粉參分

附子炮裂去皮
兩半

右四味以二味搗羅爲細末與粉鉛丹和勻鍊蜜丸
栝樓子大每服二十九溫水下不拘時候

治消渴後煩熱結成癰疽八珍散方

水銀入鉛丹點少
水研今星盡

栝樓根各壹兩

苦參剉

知母焙各壹兩半

鉛丹半兩

蜜陀僧研

牡蠣熬

黃連去須各壹兩

右八味除水銀鉛丹外搗羅爲細散入水銀鉛丹末
和勻每服一錢匕溫水調下不拘時候

治渴利後經絡否澁榮衛留結成癰疽玄參散方

玄參洗切

犀角鎊屑

芒消研細

黃耆細切

沉香剉

木香

羚羊角鎊屑

各甘草生剉

右八味搗羅為細散每服二錢匕溫水調下不拘時

候

治消渴後成癰疽磁石飲方

磁石性緊者
肆兩

右一味杵碎以水五升瓷器中煮取四升候冷不拘

多少旋飲之

治消渴後成癰疽磁石散方

磁石引錄名火燒兩
淬訖拾偏壹兩

生乾地黄焙各五味子剉各

地骨皮洗

桂去麤皮

枳殼去雜
麩炒

檳榔剉各

右八味搗羅為細散每服三錢匕溫水調下日三服

治消渴後熱毒結成癰疽麥門冬湯方

麥門冬去心
焙

赤茯苓去黑皮

栝樓實焙

地骨皮洗切各
兩甘草炙剉

右五味搗搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫

服不拘時

治消渴後心肺氣壅盛結成癰疽桑根白皮湯方

桑根白皮剉炒

右一味爛搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服日再

治消渴後成癰疽石膏湯方

石膏碎壹兩半

知母兩半壹

犀角鈔屑壹兩

升麻分

栝樓根生者剉去皮細切可半斤燻研生布絞取汁兩合半

口如無以乾者

土瓜根殺取汁兩合半無生二則肆兩代之

右六味除汁外爛搗篩每服三錢匕二藥汁各半合

水一盞半小麥少許同煎至八分去滓溫服不拘時

治消渴後虛熱結成癰疽鉛丹散方

鉛丹別研半兩

栝樓根兩壹

澤瀉

石膏研

赤石脂

白石脂各壹兩

胡粉研半兩

甘草炙剉兩壹

右八味搗羅五味為細散入別研三味和勻每服二

錢匕溫水調下不拘時服

治消渴內虛熱結成癰疽礞石丸方

礞石火燒醋淬壹兩

大豆壹合

薺芫切

人參

赤茯苓去黑皮

葛根剉各壹分

石膏碎壹兩壹分

黃芩去黑心

栝樓根

甘草剉

知母各壹兩

右一十一味搗研為細末鍊蜜和丸梧桐子大每服

三十九溫水下日三服

消中

論曰病消中者不渴而多澁一名內消以邪熱薰燥五藏然後外及肌肉形體也得之年少餌石房室太甚真氣耗憊石氣孤立結於腎則實腎實則消水漿故不洩而小便利多不得潤養五藏使所食之物皆消為小便治宜滋腎水養津液則差

治初得消中食已如飢手足煩熱背膊疼悶小便白濁

天門冬丸方

天門冬

去心焙 貳兩半

雞內金 參具 桑螵蛸 拾枚 養肉

土瓜根

乾

肉苁蓉 酒浸壹切焙 熟乾地黃 焙

栝樓根

黑

知母 焙

澤瀉 剉

鹿茸

去皮毛 酒浸炙

五味子

赤石脂 各壹兩半

牡蠣

貳兩

苦參 壹兩

通共兩

右一十四味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

二十九煎粟米飲下

治內消所食物皆作小便兼治強中薺菀湯方

薺菀

壹兩

大豆

壹兩

人參

白茯苓

去黑皮

磁石 搗如米粒

葛根 剉

石膏

碎

黃芩

去黑

栝樓根

甘草

炙

知母

焙各兩

人參

右一十味廬烏篩每服五錢匕水二盞煎至一盞
上洋溫服日三夜一

治消中飲食無度小便日夜頻數轉加羸瘦水銀丸方

水銀

壹兩

銀薄

百片與鐵粉別

麥門冬焙壹

牡蠣

煨各兩

栝樓根

麥門冬焙壹

黃芩

去黑

苦參

黃連去

梔子

各兩

肉苁蓉

酒洗

黃

右二十味搗羅七味爲末與別研三味和勻用棗肉

研搗爲丸如梧桐子大每服四十九丸蘆根湯下日

二夜一

治消中脾胃熱極消穀引食化爲小便黃芩湯方

黃芩

去黑

麥門冬

去心

栝樓根

梔子

人

石膏

碎

淡竹葉

各壹兩

右六味廬烏篩每服四錢匕水一盞半煎至八分去

洋溫服不拘時

治消中大便數黃連丸方

黃連

去黑

栝樓根

酒洗

白龍骨

碎

苦參

炙

牡蠣

煨

山茱萸

土瓜根切

萎蕤各參

山茱萸

右八味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九至三十九大麥飲下日三夜一

治消中小便數鉛丹散方

鉛丹

研細 胡粉各 洋水一 栝樓根半 八合去

澤瀉

石膏碎

赤石脂合

白石脂

甘草各

右八味搗研為散每服二錢匕米飲調下日三夜一治內消肌膚羸瘦或轉筋小便利甚栝樓散方

栝樓根

黃連 防已到

鉛丹研各

黃連末

右四味搗羅三味為散與鉛丹和勻每服二錢匕用醋半合沸湯半盞調下日三夜一

治消中黃蘗丸方

黃蘗去

皮大 黃連去 須大 栝樓末 粉下 日三

右二味搗羅為末用酥拌和搗三百杵丸如梧桐子大每服三十九溫漿水下

治消中食已即飢手足煩熱背膊疼悶小便稠濁牡蠣丸方

牡蠣

赤石脂

栝樓根

黃連

肉蓯蓉

酒浸壹宿切
焙各青兩

黃連

去須

土瓜根

剉

黃芩

去黑心

知母

焙

澤瀉

天門冬

去心
焙

鹿茸

去皮毛
酒浸炙

五味子

桑螵蛸

焙炒各
參分

熟乾地黄

兩半
焙

右二十四味搗羅十二味為末與別研五味和勻鍊

蜜丸如梧桐子大每服三十九煎陳粟米飲下日三

夜一

治凡消渴變為消中者飲食到胃即時消化小便多而

色白所食多而不覺飽者豬肚黃連丸方

豬肚

壹枚洗去脂
膜不切破

黃連

去須搗羅
為末伍兩

右二味以大麻子入二合爛研以水四升調如杏酪

泔煮豬肚候爛取出入黃連末在內密縫肚口蒸令

極爛乘熱細切和黃連末以木臼搗之候可丸即丸

如梧桐子大暴乾每服三十九溫水下不拘時

治消中虛極小便無度肉蓯蓉丸方

肉蓯蓉

酒浸壹宿
切貳兩

澤瀉

熟乾地黄

焙

五味子

巴戟天

去心

地骨皮

人參

枳椇根

韭子

炒

甘草

剉

牡丹皮

各壹
兩

桑螵蛸

炙

赤石脂

研

磁石

煨醋泮貳
兩

龍骨

禹餘糧

煨醋淬各兩半

右一十六味搗研為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

三十九牛乳汁下

治消渴消中久不差知母丸方

知母

麥門冬

去心焙犀角 各壹兩 各半

鉛霜

雞膽

家式土瓜根 各半

白茯苓

去黑皮

黃連

去須參分

金薄片

右九味搗羅為末鍊蜜為丸如梧桐子大每服十九

煎人參湯下

消腎

人參八錢 二合 黃連末 內酒 出 口 蒸 合

論曰消腎者由少服石藥房室過度精血虛竭石勢孤立腎水燥涸渴引水漿下輸膀胱小便利多腿脛消瘦骨節痠疼故名消腎

治消腎脚脛瘦細小便數或赤似血色藏府虛冷者宜

服地黃湯方

熟乾地黃

剉

麥門冬

去心焙甘草 各貳兩

茯苓子

炒去角 各半兩

乾薑

炮壹兩

桂皮

去蘖

續斷

各半兩

右七味盛持篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服日三夜二

治消腎乾渴小便多羸瘦少力黃耆飲方

黃耆

剉

杜仲去蘊皮炙

山茱萸

人參

知母切焙各

龍骨碎參

右六味麤搗篩每服四錢匕水一盞半棗一枚擘煎

至一盞去滓溫服日三夜二

治消腎小便數阿膠湯方

阿膠

炙

乾薑炮各

遠志去心

附子炮裂去

皮臍

人參各

甘草炙

大麻人研

試

右七味咬咀如麻豆每服三錢匕水一盞煎至七分

去滓不拘時溫服

委實飲

桂心陸

治消腎多渴小便數宣補丸方

黃耆

剉

栝樓根

麥門冬去心

白茯苓

去黑皮

人參

甘草

黃連

去須

知母切焙各

熟乾地黄

石膏

碎各

肉苁蓉酒浸薄切

乾

菟絲子

酒浸壹宿別

搗為末

參

右一十二味除菟絲子外搗為末和勻用牛膽汁三

合并鍊蜜同和為劑丸如梧桐子大每服三十九煎

茅根湯下不拘時

治消腎自腰已下瘦弱無力小便數或不禁山茱萸九

方

山茱萸兩壹

黃耆細

杜仲去麤皮三

肉苁蓉酒浸一宿切

各壹兩半

桂皮去麤

牛膝去苗酒

韭子慢火炒兩

右七味搗羅爲細末鍊蜜和先如梧桐子大每服二

十九煎黃耆湯下日三服

治消腎身體羸瘦小便頻數人參九方去心

人參參

鹿茸去毛酒

黃耆剉參

栝樓根壹

桑螵蛸炙壹

杜仲去麤皮炙

三雞脆脂時教

山茱萸酒浸菟絲子酒浸別

右九味搗羅爲細末鍊蜜和九梧桐子大每服三十

丸煎棗湯下日三服

治消腎口乾眼澀陰萎手足煩疼小便多金銀薄丸方

金薄白銀薄各壹佰澤瀉壹兩

天門冬去心

肉苁蓉酒浸壹宿薄切

白茯苓去皮

生乾地黄焙葛根剉各

黃連去須麥門冬去心栝樓根兩

巴戟天去

五味子

乾薑兩半

丹砂細研

王漿

薄桂兩半

右一十五味除別研外搗羅為細末再研勻鍊蜜和九椀桐子大每服二十九三十九煎粟米飲下不拘

時天門冬

肉蓯蓉

許慎各兩半

治消腎小便白濁如凝脂形體羸瘦磁石湯方

磁石

陸兩別搗如米粒分爲貳黃者細

杜仲炙剉 龜皮三人參

五味子各壹兩半

白熟乾地黃兩 附末雞窠 味大 磁石大 參三

右六味除磁石外搗搗篩分爲二十貼每貼先用水三盞羊腎一隻切作四片去筋膜與磁石一貼同煎

至二盞去磁石羊腎下藥末更同煎至一盞半去滓

溫分兩服

治消腎小便白濁如凝脂弱無力腎瀝湯方

白羊腎

壹具去脂膜切肆片

黃耆剉

熟乾地黃

杜仲去蠹皮

五味子

人參各壹兩半

磁石搗碎如米粒陸兩

右七味除腎外搗搗篩每服五錢匕用水三盞先煮

腎至二盞去腎入藥再煎至三盞去滓溫服不拘時

治消腎渴燥磁石飲方

磁石兩

許慎各兩半

右一味麤搗篩如米粒大分作十貼每服一貼用水一椀煎至一盞去滓溫服日三夜一

治三消病小便頻數皮燥毛焦飲食雖多肌肉消瘦渴燥引飲丹砂散方

丹砂研水

黃連須去

鐵粉研

栝樓各壹兩

赤石脂

盧會研

龍齒

澤瀉各壹分

胡粉研

鉛丹研各半兩

牡蠣熱壹分

桑螵蛸拾箇炙

雞臍脰伍枚蜜炙黃 甘草炙壹兩半

右二十四味除別研外搗羅為散再和勻每服三錢

匕煎小麥湯調下日三服

治消腎飲水無度腿膝瘦細小便白濁參附湯方

人參

附子炮裂去皮臍

青黛各半兩

右三味咬咀如麻豆每服二錢匕水一盞楮葉一片切煎七分去滓溫服日二夜一

大德重校聖濟總錄卷第五十九

大德重校聖濟總錄卷第六十

黃病門

黃疸

急黃

陰黃

酒疸

穀疸

胃疸

黑疸

女勞疸

黃疸病正有五種一曰黃疸二曰黃汗三曰穀疸四
 曰酒疸五曰女勞疸一黃疸者徧身面目悉黃如橘二
 黃汗者身體洪腫汗出如黃藥汁不渴狀如風水三穀
 疸者食畢頭眩心中怫鬱不安而發黃四酒疸者心中
 懊痛足腫滿小便黃面發赤斑黃黑由大醉當風入水
 所致五女勞疸身目皆黃發熱惡寒小腹滿急小便難
 由大勞大熱房室過傷此五者證狀雖異大率多因酒
 食過度水穀相并積於脾胃復為風濕所搏熱氣鬱蒸
 所以發黃為疸其證食已如飢曰胃疸額上黑足下熱

黃疸統論

論曰疸病正有五種一曰黃疸二曰黃汗三曰穀疸四
 曰酒疸五曰女勞疸一黃疸者徧身面目悉黃如橘二
 黃汗者身體洪腫汗出如黃藥汁不渴狀如風水三穀
 疸者食畢頭眩心中怫鬱不安而發黃四酒疸者心中
 懊痛足腫滿小便黃面發赤斑黃黑由大醉當風入水
 所致五女勞疸身目皆黃發熱惡寒小腹滿急小便難
 由大勞大熱房室過傷此五者證狀雖異大率多因酒
 食過度水穀相并積於脾胃復為風濕所搏熱氣鬱蒸
 所以發黃為疸其證食已如飢曰胃疸額上黑足下熱

曰黑疸其因傷寒時氣後變成黃者緣陽明病無汗小便不利熱瘀在裏心中懊憹身必發黃若被火額上微汗出而但小便不利亦發黃其狀如橘色腹微滿此亦由寒濕不散瘀熱在於脾胃故也然又有九疸三十六黃其證其名悉各不同治皆有法具如後章凡黃病當利其小便疸而渴者其病難治疸而不渴者其病可治

黃疸

論曰內經謂目黃者曰黃疸又曰安臥脉盛謂之黃疸其外證身體面目及爪甲小便盡黃其內證食已如飢此由酒食過度脾胃有熱復為風濕所搏瘀結不散熱

氣鬱蒸故發是疾若面色微黃身體或青赤黑色皆見者與純熱之證不同當於濕家求之諸黃疸發於陰部其人必嘔發於陽部其人振寒而微熱疸而不渴者可治其渴而疸者難治

治黃疸目黃小便如血心煩躁悶口苦頭痛茵陳湯方

茵陳蒿

山梔子人各參

甘草炙半兩

木通剉

桔樓根

羌活去苗多

麥門冬

去心焙壹兩半

斯有七味麻搗篩每服五錢匕水二盞入竹葉三七片

同煎至一盞去滓食後溫服

治黃疸脾胃積熱皮肉皆黃煩躁口苦小便赤澀木通湯方

木通剉

藿麥穗各壹兩

赤茯苓去黑皮

白茅根

大青

秦艽去苗土各參分

生乾地黄焙壹兩半

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓食前溫服

治黃疸遍身面目皆黃黃連湯方

黃連去鬚 太膏煎取外 山梔子人 地骨皮黑 茵陳蒿是 芫花去 黃連湯 湯方

人參

黃芩去黑心

芒消各壹兩

大黃細剉醋炒貳兩

右一十味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服不拘時候

治黃疸通身並黃芫胡湯方

芫胡去苗

茵陳蒿各壹兩 升麻

龍膽各參分

右四味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓入地黃汁一合攪勻食後溫服

治黃疸面黃眼如金色四肢羸弱或時煩渴雞舌香湯

雞舌香

治黃疸面黃眼如金色四肢羸弱或時煩渴雞舌香湯

治黃疸面黃眼如金色四肢羸弱或時煩渴雞舌香湯

治黃疸面黃眼如金色四肢羸弱或時煩渴雞舌香湯

方

雞舌香

秦艽去苗土各參分

胡黃連

丁香

芎藭各半兩

芫胡去苗各兩

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓

食前溫服

治黃疸身眼皆如金色及諸黃桃根湯方

東引桃根壹握細切如釵股者佳取時勿見風及避婦人雞犬

右一味以水一盞半煎至七分去滓空心溫服如眼

中黃色未退可時飲酒一盞

治黃疸身體面目皆黃茵陳丸方

茵陳蒿參

大黃剉炒

黃連去須

黃芩去黑心各壹兩

右四味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服十五

丸食後臨臥溫水下

治黃疸心中懊懣煩熱梔子湯方

山梔子人兩半

枳殼去瓤炒壹分

大黃剉炒壹兩

右三味麤搗篩每服三錢匕水一盞入豉二十粒同

煎至七分去滓溫服不拘時候

治諸黃皮肉如金色小便赤黑口乾煩渴白鮮皮散方

白鮮皮貳兩

黃連去須

土瓜根

芍藥

大青

梔子人

茵陳蒿

栝樓根

此胡去苗半

芒消參兩半

黃芩去黑心

貝珠參拾枚燒赤研入

大黃兩

右一十三味搗羅為散每服三錢匕煎茅根汁調下
空腹頓服取利至晚不利再服服了以少葱豉粥投之

治黃疸面目身體皆黃口乾煩躁發熱狂悶茵陳丸方

茵陳蒿

常山各半

大黃剉炒

朴消研壹分

豉炒壹合

黃蘗

右五味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十丸
食後溫竹葉湯下

治中熱黃疸寒熱往來脉數煩困四肢勞倦知母散方

知母焙

赤茯苓去黑皮

常山

茵陳蒿

黃連須去

犀角剉

羚羊角剉

人參各壹分

苳胡去

黃蘗研末

甘草炙各半兩

龍膽半

右一十二味搗羅為散別入丹砂末半分合研勻瓷

合收每服二錢匕食前人參湯調下日再

治黃疸此胡湯方

甘草

此胡

此胡去苗

甘草炙

右二味細剉以水一椀白茅根一握同煎至七分去滓溫服

治黃疸面目黃瓜蒂散方

瓜蒂壹拾肆枚

丁香大者壹枚

黍米肆拾玖顆

右三味研為細散每服一字先含水一口以鼻搐藥

取下黃涎為効

治黃疸大小便難喘息促甜葶藶丸方

甜葶藶炒貳兩

大黃剉炒壹兩

右二味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十

丸溫米飲下食後臨臥服

治黃疸身體面目皆黃大小便秘澀臍府壅熱黃連散

方

黃連去須 大黃細剉 黃芩去黑心 芍藥去黑心

甘草壹兩 芍藥壹兩

右四味搗羅為散每服二錢匕食後溫水調下日三

治黃疸面黃肌瘦大黃丸方

大黃剉壹斤

芍藥半斤 黃芩半斤

右三味搗羅為末用蜜和成劑飯上炊七漏丸如梧

桐子大每服三十九丸熱水下空心食前臨臥日三服

治身面悉黃大便如濃梔子汁茵陳蒿丸方治用日三服

茵陳蒿各兩 芩蒿去苗 芩蒿去苗 梔子人各兩

龍膽各兩 枳殼去瓢 枳殼去瓢 枳殼去瓢 黃芩去黑心

升麻黃芩 大黃剉炒各

右八味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十丸

飲下以利為度日再

治黃疸身體面目爪甲小便俱黃病甚者秦艽煮散方

秦艽去苗土壹兩

右一味搗羅為末用牛乳二盞半煎至一盞半分溫

二服空心食前

治一切黃病茵陳蒿丸方

黃蘗壹兩

茵陳蒿肆兩 大黃剉人 黃芩去黑心

右四味生用為末鍊蜜和丸梧桐子大每服米飲下

黃蘗壹兩 茵陳壹兩 大黃壹兩 黃芩壹兩

治命赤更波姑各壹兩 茵陳壹兩 大黃壹兩 黃芩壹兩

治黃疸身腫發熱汗出而渴汗出著衣正黃吳藍飲方

吳藍壹兩 芍藥壹兩 麥門冬去心

桑根白皮剉防已 白鮮皮

梔子人各兩 枳殼去瓢 枳殼去瓢 枳殼去瓢 黃芩去黑心

白鮮皮壹兩 枳殼去瓢 枳殼去瓢 枳殼去瓢 黃芩去黑心

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服不拘時候

急黃

藥

白濁丸

論曰諸發熱心戰定必發爲急黃謂其卒然發黃心滿氣喘命在頃刻故名急黃也有初得病卽身體面目發黃者有初不知是黃死後變黃者但先見其證當急治之此由脾胃有蓄熱穀氣鬱蒸因熱毒所加故有斯病治急黃自如梔子色小便赤心煩悶茵陳湯方

茵陳蒿

大梔子人

黃黃萃

治

大黃

白鮮皮

黃連

去須各壹兩

朴消

研

貝齒

煨各壹兩

右八味除朴消外麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓人朴消末一錢匕再煎令沸食後溫服

治急黃熱毒攻發舌急眼黃犀角湯方

犀角

茵陳蒿

梔子人

升麻

黃芩

大黃

朴消

甘草

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入竹葉三七

片同煎至一盞去滓食後溫服

治天行急黃身如金色茵陳黃連湯方

茵陳蒿

黃連須去

黃芩去黑心

大黃剉炒各壹兩

甘草剉炙

人參各半兩

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去

滓食後溫服

治急黃煩熱口乾皮肉急黃赤小豆散方

赤小豆壹合

丁香諸

秫米人

瓜蒂

薰陸香別研各壹分

青布伍寸燒作灰研

麝香別研壹錢

右七味除研外搗羅爲散入研者和勻每服一錢匕

米飲調下食後服服後當吐下黃水即差

治急黃面目如金色渴欲飲水龍膽湯方

龍膽壹兩

木通剉

玉瓜根各壹兩半

石膏貳兩

犀角屑壹兩

梔子人兩

大黃剉炒壹兩半

白茅根剉

朴消各壹兩

右九味麤搗篩每服三錢七用水一盞煎至七分去

滓食後溫服

治急黃面目如金色煩渴飲水升麻湯方

升麻壹兩

秦艸去苗土壹兩

凝水石壹兩

栝樓根分

朴消壹兩

白

右五味麤搗篩每服三錢匕用水一盞煎至七分去

滓食後溫服日三

治急黃小便亦黑口乾煩躁白鮮皮散方

白鮮皮壹兩

黃連去須

芍藥

茵陳蒿

大青

土瓜根

各參分

梔子兩半

芫胡

去苗參分

黃芩

去黑心半兩

栝樓根

剉參分

大黃

剉炒壹兩半

朴消

壹兩

貝齒

燒壹兩半

右一十三味搗羅為散每服二錢七煎茅根湯調下

空心服取利為度未利以葱豉粥投之

治急黃煩熱口乾徧體悉黃黑豆煎方

黑豆壹升

右一味用水五盞煎至二盞去豆取汁再煎一盞然

後下蜜生地黃汁麥門冬汁生藕汁各二合酥半兩

相和慢火煎成膏瓷器盛候冷每服半匙或一匙食

後會化日三服

治急黃小便赤黑口乾煩躁方

蔓菁子取油

右一味不計時候頓服如無油即以蔓菁子搗冰和

絞取汁一盞服之亦得未効再作服

治急黃疽方

大黃貳兩

右一味剉碎水三盞生浸一夜平旦取汁入朴消二兩攪和分作四服每日一服取快利為度

陰黃

論曰陰黃者面色黃頭痛不發熱不欲聞人聲此由陽伏於陰邪熱沉潛散於肌肉身黃如橘故謂之陰黃昔人有說下之後身目發黃者當於寒濕中求之此其類也

治陰黃不欲聞人言小便不利秦苳湯方

秦苳去苗土壹兩

旋復花半兩

赤茯苓去黑皮半兩

甘草炙剉半兩

右四味麤搗篩每服四錢匕以牛乳一盞煎取六分去滓溫服不拘時候

治陰黃身如橘色小便不利茵陳散方

茵陳蒿貳兩

桂去麤皮半兩

澤瀉壹兩壹分

赤茯苓去黑皮

白朮

豬苓去黑皮各參分

右六味搗羅為散每服二錢匕溫水調下日三服

治陰黃龍膽湯方

龍膽

秦苳去苗土各壹兩半升麻壹兩

右三味麤搗篩每五錢匕水一盞半浸藥一宿平旦

煎至八分入黃牛乳五合再煎至一盞去滓空心分
溫二服日再取利為度

治陰黃赤小豆散方

赤小豆

丁香各參

麝香細研

瓜蒂貳

青布灰貳

右五味搗研為散每服一錢匕熟水調下日再服以
吐為度更取少許吹鼻中即有黃水出為效

治陰黃小便色不變欲自利腹滿而喘者必噦宜半夏
湯方

半夏

湯洗米瀝去
滑焙壹兩

人參貳

葛根貳 黃心申野麻艾葉各
右三味剉如麻豆每服四錢匕以水一盞入生薑半
分切煎取七分去滓不計時候溫服

治酒疸神效 風入水泄效 黃苔木蘭酒

論曰胃虛穀少醉以入房冒犯風邪胃中熱毒隨虛入
裏小便黃赤濕毒內聚心下懊痛熏發肌肉則身目發
黃或發赤斑足脛浮腫或下之早則變為黑疸令人心
如病飢大便黑瘀皮膚不仁治法槩宜先去濕毒後分
小水餘隨證治之

治酒疸心中懊痛小便黃赤茵陳湯方

茵陳

秦艽土

治酒疸心中懊痛小便黃赤茵陳湯方

秦艽土

茵陳蒿 去黑 葛根 剉各

小水 枳子八分 分 枳樓根 分 秦艽 去苗

誠升麻各壹

黃石七味 蠶搗節 每服三錢匕 水煑 煎至七分 去滓

食後溫服 日三 內藥心 可與黃蠶 蠶肉 腹良 日發

治酒疸 心懊痛 足脛滿 小便黃 面發赤斑 或黃黑色 此

由飲酒大醉 當風入水 所致 黃者 木蘭散方

黃耆 劉氣 木蘭皮 劉壹

右二味 搗羅為散 每服四錢匕 食前 熱酒調下 日三

治酒疸 身目俱黃 心中懊痛 艾葉湯方

生艾葉 一握 無生者 乾者亦得 麻黃 去根節

大黃 劉抄 壹斤 再煎

右三味 剉如麻豆 大每服四錢匕 以酒一盞 半入大

豆 半合同 煎至八分 去滓 食前 溫服

治酒疸 小便不利 或飲少 澁多 如白泔 色 凝水石散方

凝水石 燒令通赤 白石脂 栝樓根 各壹兩

菟絲子 酒浸別搗炒乾 知母 焙 桂 去蟲皮

右六味 搗羅為散 每服二錢匕 煮大麥粥 飲調下 日

三 一以水一盞 煎取半食 飲即服

治酒疸 小麥飲方

生小麥貳合

右一味以水一盞研絞取汁食後頓服

治酒疸腹滿如水狀心中懊懣不能下食時時欲吐桔

梗湯方

桔梗剉炒

百合

赤茯苓去黑皮

桑根白皮剉

枳殼去瓤

枳殼去瓤枳殼兩半檳榔伍枚

木通剉

右七味剉如麻豆大每服三錢匕水一盞煎至七分

去滓食前溫服良久再服

治酒疸身面黃心懊懣痛小便黃赤不利黃連丸方

黃連須去須

黃蘗去皮

黃芩去黑心

大黃剉炒

梔子人

黃藥子

鬱金

秦艽去苗土

貝母去心

甘草炙

欬冬花

黃明膠炙令燥

白芥子各半兩

右一十三味搗羅為末研粳米飯丸如梧桐子大每

服十九煎麥門冬湯下

治酒疸通身黃腫木通散方

木通剉

甘草炙

木香去心

檳榔剉

麻黃去根節

秦艽去苗土

瞿麥穗

乾薑炮

卷八

去

右八味等分搗羅為散每服一錢匕白湯點服空心食前日三病甚者用豬膽一枚去汁一半入巴豆一粒雜白二寸在膽內以線繫定同青橘皮少許水一盞半煎熟濾去膽取藥湯調下一錢匕蘇獻大治酒疸徧身發黃追毒飲方

狗脊

去毛

白芥子

壹兩

甘草

壹兩

右三味細剉用酒一升煎取半升去滓分溫三服利

下為度

卷八

黃藥

下

治酒疸心下懊痛身目發黃乳香礞砂丸方

乳香

研

礞砂

研

安息香

研

各壹

黃巴豆

拾粒去皮

心膜醋煮研

杏仁

去皮尖

雙入

炒研

藥粒

食後

右五味合研勻細蜜肉丸如棗豆大每服五丸食後

臨臥溫生薑米飲下

蘇獻大治酒疸心下懊痛脰腫洩黃面發赤斑大黃湯方

治酒疸心下懊痛脰腫洩黃面發赤斑大黃湯方

大黃

剉

兩

枳實

去

炒

梔子

各壹

兩

大鼓炒參半龍六對大熱味武破蘇麻干大蘇理正

右四味麤搗篩每服四錢匕水二盞半煎至八分去

滓溫服日三

卷八

黃藥

下

治酒疸徧身黃瓜蒂丸方

卷八

黃藥

下

瓜蒂 大黃炒

萹花 炒各

牛膽 二 芫花 半兩

右五味搗羅四味為末以清酒二升漬一宿煎至一

升去滓入牛膽汁微火熬稠丸如梧桐子大每服五

丸溫熱水下得吐利差 欬千人

穀疸 不與瀉藥並用

論曰失飢飽甚則胃中滿塞穀氣未化虛熱熏蒸遂為

穀疸其證心下懊悶頭眩心忪怩鬱發煩小便不利身

黃如橘是也 各人

治穀疸食則眩心忪怩鬱不安久久發黃茵陳湯方

茵陳蒿 去苗各 黃芩 去黑

龍膽 去心 枳實 去穢 梔子 去穢

升麻 大黃 山

右八味搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去

滓溫服若羸瘦去大黃加生地黃五兩梔子人四兩

治穀疸跌陽脉緊而數緊則為實數則為熱緊數相搏

胃中苦熱骨節煩疼小便不利石韋湯方

石韋 去毛 木通 去 芫花 去

茅根 各 梔子 人 芒消

右六味剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至一

蓋去滓溫服日三次
治穀疸食畢頭眩心中佛鬱發黃由失飢大食胃氣攻衝所致其腹必滿苦參丸方

苦參壹兩

龍膽半兩

右二味搗羅爲細末以牛膽汁和搗三百杵丸如梧

桐子大每服十五丸早晚食後煎大麥湯下入四兩

治穀疸頭眩心忪發黃腹滿滌熱湯方

茵陳蒿兩

大黃剉炒壹兩

山梔子人分

右三味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

食前溫服小便利色如皂莢汁一宿腹減

治穀疸苦參梔子丸方

苦參壹兩

梔子人分

龍膽半兩

黃芩壹兩

去黑心而無銀絲然胃氣多則即之粗

右四味搗羅爲細末以豬膽汁和搗五百杵丸如梧

桐子大每服二十九食後米飲下日三至八分去滓

治穀疸食畢頭眩腹滿及酒疸脉沉實礪砂乳香丸方

礪砂壹兩

乳香半兩

巴豆壹兩

去殼去膜用醋炒香入貳兩去皮

右五味再研勻爲細末煮肉丸如菉豆大每服五丸

食後溫生薑米飲下日再夜去吸兼豆大研細正火

治穀疸唇口先黃腹脹氣急鬱金散方

鬱金

壹兩 薑汁洗去

牛膽

壹枚 乾者 麝香

麝香

研與人糞飲 麝香 去心

右三味搗研為細散每服半錢匕新汲水調下不拘

時

胃疸 宜服二十日食穀米湯五日

論曰已食如飢者胃疸也夫胃熱則能消穀今已食如飢者以胃氣但熱而無陰也然胃為足陽明陽明之脉絡屬於心陽明得熱則心火上行陽炎過矣故單陽成瘧心槽煩而身面黃小便赤色也

治胃中有熱食已如飢不生肌肉面色萎黃瀉熱湯方

大黃

生剉

麻黃

去根

黃芩

去黑心 各肆兩

杏仁

去皮尖 雙入

赤茯苓

去黑皮

甘草

剉

陳橘皮

去白 焙

芒消

澤瀉

各參兩

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至八分去滓

食後溫服

治胃中熱食已即飢舌強腹脹身重節痛大黃瀉熱湯

方

大黃

細剉水壹升 半別漬壹宿

甘草

剉各參兩

澤瀉

赤茯苓

去黑皮

黃芩

去黑心

細辛

去苗葉

芒消

陳橘皮

去白焙各貳兩

右入味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至八分去滓食後溫服

治胃中積熱食已輒飢面黃肌瘦胸滿脇脹茯苓湯方

赤茯苓

去黑皮

陳橘皮

去白焙

澤瀉

桑根白皮

剉各兩

白朮

各兩

人參

桂

去麤皮各貳兩

石膏

兩

半夏

陸兩湯洗柒遍

右一十味麤搗篩每服四錢匕水一盞半入生薑少許同煎全一盞去滓不計時候溫服

許同煎全一盞去滓不計時候溫服

治胃中熱盛食已復飢面黃肌瘦唇燥口乾瀉熱梔子湯方

湯方

亦梔子人參黃芩赤芍藥

赤茯苓

去黑皮

黃芩

去黑皮

射干

大黃

剉微炒各壹兩

右七味麤搗篩每四錢匕水一盞半煎至八分去滓

入生地黃汁一合蜜一大匙攪勻再煎一兩沸食後

分溫二服

治胃中熱盛食已如飢唇燥口乾黃芩湯方

黃芩

石膏

各參分

赤茯苓

去黑皮

甘草

去根 葛根

剉 豕加皮

麻黃

去根節 各半兩

芫胡 去苗 壹兩

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑半分切

煎至八分去滓食後溫服

治胃中熱盛食已如飢常渴引飲滌熱蘆根湯方

蘆根

剉 栝樓根

麥門冬 去心 各壹兩

知母

甘草 剉 各半兩

赤茯苓 去黑皮 參分

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞入小麥五十粒

炙竹葉二七片生地黃一分生薑半分切煎至八分去

滓食後溫服

治胃中熱盛食已如飢多渴心煩肌肉羸瘦黃連丸方

黃連

去須 剉 下 栝樓根 剉 麥門冬 剉

各壹兩

知母

剉 黃連 壹兩 茯神 剉 大黃 剉 黃本 剉

各壹兩

右五味搗羅為末鍊蜜和搗百餘杵丸如梧子大

食後粥飲下三十九或牛乳汁下亦得

治胃實熱嘔逆不下食犀角湯方

犀角

剉 萬根 剉 各 梔子 剉 木 剉 枇杷葉 剉 麩 剉

各壹兩

麥門冬

去心 各壹兩

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑半分切

煎至八分去滓不計時候溫服

治諸黃病眼目已黃丁香散方黑

丁香香蘇餅餅赤小豆水一瓜帶核錄半公四

秫米壹分

右四味搗羅為散只作一服溫水調頓服令盡當吐

利黃水兩服永除食氣散也

食黑疸者下三十次散半匙下木野冬去心各壹兩

論曰諸黃疸酒疸女勞疸久不已皆變為黑疸其狀小腹滿身體盡黃額上反黑足下熱大便黑是也黃本脾病脾者土也脾病不已傳其所勝腎斯受之腎為水藏其經足少陰其色黑病在腎故小腹滿色黑大便黑足

下熱是皆足少陰經受病之證

治諸疸久不差變成黑疸當歸湯方

當歸參兩桂去麤皮陸兩麥門冬去心壹兩

大黃剉炒壹兩茵陳蒿黃芩去黑心

黃耆剉乾薑炮赤茯苓去黑皮

芍藥壹兩黃連去須石膏碎

人參壹兩甘草炙各兩去黃連人參

右一十四味剉如麻豆每服三錢匕水一盞入大棗兩枚擘破煎取七分去滓溫服日三一方無黃耆

治黃疸變成黑疸醫所不能療土瓜飲方

土瓜根

右一味每日空心服半盞其病隨小便出即愈然須量病人強壯者可半盞羸人一合如無生者即剉乾者一兩水一盞半煎取七分去滓頓服羸人量減

治黑疸身體及大便並黑及黃疸久不差瓜蒂散方

瓜蒂壹分

雄黃醋煮分壹錢

甘草炙兩壹兩

女萎兩貳

右四味搗羅為細散每服一字七用芥小豆二十粒茯苓一分水一盞煎至六分去滓調服須臾當吐吐止即愈

治黑疸身體黯黑小便澀茵陳蒿丸方煎至小豆半

茵陳蒿

赤茯苓去黑皮

葶藶子微炒各壹兩

枳殼去瓤炒

白朮各壹兩壹分

半夏湯洗去滑柒偏焙

大黃細切炒

杏仁湯浸去皮尖雙

甲 蜀椒去閉口及目炒令出汗

當歸切

乾薑炮過各半兩 甘遂地壹分 小蘗煎取汁

右一十二味搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸如棗

黑豆大每服空心米飲下一十九丸日三小野自採宜

中 女勞疸而發黃 煎之其色黃 煎之其色黃 煎之其色黃

日脾胃素有濕熱或緣大暑醉飽房勞過度引熱歸

腎濕氣交攻小水不利少腹墜脹濕毒流散於肌肉之中則四肢身面發黃故謂之女勞疸然其證又有額上黑微汗出手足心熱薄暮即發勝脫急小便利者宜各隨其證以治之

治女勞疸手足煩熱肢節疼痛小腹拘急時有虛汗鼈

甲湯方 去閉口又目

鼈甲 去裙兩塗酒人 芫胡 去塵

茵陳蒿 去塵 地骨皮 去塵 赤芍藥 去塵

梔子人 黃耆 剉去黑 麥門冬 去心焙

在八味處搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分法滓

不拘時候溫服

治女勞疸苦參丸方

苦參 兩 龍膽 半兩 梔子人 參兩

右三味搗羅為末以牛膽汁和為丸如梧桐子大每

服二十九溫水下二夜一稍加至四十九

治女勞疸身目皆黃發熱惡寒小腹滿急小便難由大

勞太熱房室傷損得之消石散方

消石 各壹兩 礬石 各壹兩

右二味合研為散每服一錢匕用大麥煮稀粥飲調

下蓋衣出汗其病隨小便出者色黃大便出者色黑

治女勞疸及勞氣熱渴額上汗出手足俱熱小便赤澁

犀角湯方

犀角鎊

龍膽各壹兩

升麻

甘草炙各半兩

麥門冬去心焙

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑一棗大

拍碎同煎至七分去滓入生地黃汁一合食後溫服

治黃疸病日晡即發惡寒小腹滿急體黃額黑大便黑

澹泄足下熱此爲女勞疸腹滿者難治一石散

滑石

石膏各壹兩碎

右三味同研令極細每服一錢匕用大麥煮稀粥調

下日三小便利卽差

散方

治女勞疸身目俱黃惡寒發熱少腹滿急小便難滑石

人滑石壹兩 半合礬石壹兩

右二味研羅爲散每服二錢匕以大麥粥飲調下不

拘時候小便出黃水爲度

又方

亂髮如雞子大

豬脂斤

右三味同於鐵內以微火煎令髮消盡不計時候以

溫水調下一匙匕以小便利爲度

治女勞疸額上黑汗出手足中熱四肢煩疼薄暮發熱
小便自利龍膽湯方

龍膽去蘆頭

黃草剉

麥門冬去心焙

芫胡去蘆頭

升麻

犀角鎔各分

牡蠣壹兩燒研如粉

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

入生地黃汁半合更煎一兩沸不拘時候溫服

治女勞疸額上汗出四肢虛煩日晡發熱小便自利牡

蠣湯方

牡蠣燒令通赤 龍膽

升麻

麥門冬去心

甘草鎔各分

犀角鎔半兩

藥本

桂各半兩

右八味搗篩為散每服四錢匕水一大盞煎至八分
去滓熱服溫覆卽避風寒