

醫
酒
林
一
致

二

醫林一致

暨陽駱登高茶飲甫一字恒園輯著

門人

丁有

曾象辛
光孔章

甫編定

胡世

安文思
昌予延

甫叅閱

男駱以文來菴甫校訂

痿

痿之大綱其病在肺其治在胃經曰肺熱葉焦則皮毛虛弱急

薄着則生痿躄也

肺痿者皮毛痿也肺屬金肺熱則火來乘金火盛金衰故葉焦肺主皮毛肺病則皮毛虛

弱虛弱者皮枯而毛落也故謂之皮毛痿急薄着熱氣留着而不去也肺主氣天之象也氣者萬物之父百骸資始者也肺着於熱則肺病而百骸無所資始矣故

令手足痿躄也躄者足不能行也

心氣熱則下脉厥而上上

則下脉虛。虛則生脉痿。樞折挈。脛縱而不任地也。心痿者脉痿也。心者君主

之象。火之位也。經曰。君火以名。相火以位。言君火正其名而無

爲相火守其位以聽其命。心氣熱則火炎上。故三陰在下之脉

亦皆厥逆而上。蓋相火不敢不聽命於君也。脉既逆而上。則下

脉空虛而痿弱。故曰脉痿。心傷於熱。則陽光用事。邪居百節而

肢廢。如樞紐之折而不能提挈。四肢關節之

處。既如樞紐之折。則足脛縱而不任地也。

肝氣熱則膽泄口

苦。筋膜乾則筋急而攣。發爲筋痿。

肝痿者筋痿也。膽爲肝之府。而附於肝。肝氣熱則逼其膽

汁。隨火上泄而口苦也。肝主筋膜。肝熱則筋膜乾。

乾則筋燥而攣急。攣急則手足不用。故曰筋痿。

脾氣熱則胃

乾而渴。肌肉不仁。發爲肉痿。

脾痿者肉痿也。胃者脾之府也。脾與胃以膜相連而開竅於口。脾熱

則熬煎其胃。胃液枯乾。必口乾而渴也。脾主肌肉。熱畜於

內。則鬱火內灼。精氣耗傷。而脾氣不能四達。故肌肉不仁。

腎氣

熱則腰脊不舉。骨枯而髓減。發爲骨痿。

腎痿者骨痿也。腎者水藏。無水而火獨治。則蒸

腰者居腎之府也。腎主督脉。貫於脊裡。故腎壞則腰脊

不舉。腎主骨髓。故腎壞則骨枯而髓減。發而爲骨痿。

肺者藏

之長也。爲心之蓋也。此言五藏之痿皆因肺熱也。最高故爲藏長。覆於心上。故爲心蓋。有所失

忘。所求不得。則發肺鳴。鳴則肺熱葉焦。失忘不得。則悲哀動中。而傷肺。肺鳴者。喘急也。

肺氣鬱而生火。故呼吸有聲。發爲肺鳴。金藏病。則失其清肅之化。故熱而葉焦。五藏因肺熱葉焦。發爲

痿躄。肺主氣。以行營衛。爲相傳以節制五藏。則一身皆治。若肺熱葉焦。則五藏之陰皆不足。此痿躄所以生於肺也。五痿

雖異。總論痿者。獨取陽明何也。陽明者。五藏六府之海。主潤宗

筋。宗筋主束骨而利機關也。陽明胃經。主納水穀。化精微以滋養表裡。故爲五藏六府之海。而下

潤宗筋。宗筋者。前陰所聚之筋也。爲諸筋之會。凡腰脊繇谷之筋。皆屬於此。故主束骨而利機關也。陽明虛則宗

筋縱。故足痿不用也。所以當治陽明。內經之於痿躄也。言之詳矣。後人

當有以辨其證而治之。蓋肺痿者。面必白。肺病而色自見也。脉多短數

短者。肺之真藏脉也。斯證也。持於冬。死於夏。十有九危。古人主

數者。火來乘金也。

以肺熱湯者。冀回生於千一耳。心痿者。面必赤。脉洪大。

火炎上也。治

宜瀉火。三補丸足以任之。火去則脉不厥逆。各循其經而手足

用矣。肝痿者。面必青。爪甲枯。

肝主筋。爪者筋之餘。

脉弦數。治宜瀉火而達

肝。養筋而潤燥。四者而已。龍膽瀉肝湯足以任之。脾痿者。面必

黃。痺而不仁。

脾爲濕土。與熱薄則營衛之氣不榮。痺而不仁。

脉緩數。治宜養營益衛。復

其濕傷之氣血。風能燥土而去濕。疏風之品。亦不可缺也。蠲痺

湯足以任之。腎痿者。面必黑。脉沉數。治宜補腎水之虛。去坎中

之熱。瀉命門之火。六味湯加黃柏知母。足以任之。王冰曰。壯水

之主。以制陽光。此之謂也。若夫陽明虛。宗筋失養。不能束骨而

利機關。令人手足痿弱者。勢必減食。四君子湯足。以任之。又有

陰事柔痿而不舉。名曰陰痿。八味湯足以任之。前哲之言曰。痿

躄大都屬熱。此亦不可拘也。內經曰。淫氣喘息。痺聚在肺。

痺冷濕也。

淫氣憂思。痺聚在心。淫氣遺溺。痺聚在腎。淫氣乏竭。痺聚在肝。

淫氣肌絕。痺聚在脾。此五證者。脈必沉遲。非大溫大熱不足以

濟之也。經之論肺痿者曰。急薄着。則生痿躄。觀薄着二字。則知

天氣六淫之邪。皆能爲病也。風着於肝。而與熱薄。則成筋痿。寒

著於腎。而與熱薄。則成骨痿。濕着於脾。而與熱薄。則成肉痿。燥

着於肺。而與熱薄。則成皮毛痿。火着於心。而與熱薄。則成脈痿。

暑雖傷胃。其氣歸心。故病於暑者。必虛其脈。是暑着於胃。而薄

於心。亦能致脈痿也。經又曰。有所失亡。所求不得。則發肺鳴。鳴

則肺熱葉焦。則知人身七情之傷。皆能爲病也。悲之過。則肺金傷。已所不勝者乘而襲之。乃成肺痿。恐之過。則腎水傷。已所勝者輕而侮之。乃成腎痿。怒之過。則肝木傷。無以約我之所生。反食我氣。乃成肝痿。驚喜過。則心火傷。傷則不受制而熾無已。乃成心痿。憂思過。則脾土傷。不能受生我者之所賦。有餘爲害。精氣耗傷。乃成脾痿。更有入房太甚。頑痰不化。死血無歸。五味偏勝。以致痿躄者。挾有多端。悉可類而推之也。經言病本。雖五藏各有。而獨重太陰肺經。經言治法。雖諸經各調。而獨重陽明胃經。此其說何居乎。李士材曰。肺金體燥。居上。而主氣化。以行於一身。畏火者也。五藏之熱。火薰蒸。則金被尅。而肺熱葉焦。故敢

疾有五藏之殊。而手太陰之地。未有不傷者也。胃土體濕。居中而受水穀。以灌溉於四肢。畏木者也。肺金之受邪失正。則木無制而侮其所勝。故治法有五藏之分。而足陽明之地。未有或遺者也。夫既曰肺傷。則治之亦宜在肺矣。而岐伯獨取陽明。又何也。靈樞所謂真氣所受於天。與穀氣并而充身。陽明虛則五藏無所稟。不能行氣血。濡筋骨。利關節。故百體中。隨其不得受水穀處。不用而爲痿。不獨取陽明而何取哉。丹溪所以云瀉南方。則肺金清。而東方不實。何胃傷之有。補北方。則心火降。而西方不虛。何肺熱之有。斯言當矣。若胃虛減食者。當以芳香辛溫之劑治之。若拘於瀉南之說。則胃愈傷矣。誠能本此施治。其於痿

也。思過半矣。人於大病之後，手足痿弱，率是陽明虛也。能於胃

而調養之，則得內經之旨矣。

此段為凡有病者言之，非專言痿證也。

痿門方

肺熱湯

治皮毛痿

羚羊角

玄參

射干

薄荷

芍藥

黃蘗皮

升麻

各三錢

生地

五錢

梔子仁

四錢

竹茹

二錢

人尿

治皮毛痿良于諸藥

肺痿者取人尿時時呷之最良蓋天一生水地二生火人

尿潤下鹹寒人身之天一也故可以交吾身之坎離濟吾

身之水火也

三補丸

治脉痿

黃連

黃芩

黃蘗

各等分

為丸每服三錢

龍膽瀉肝湯 治筋痿

柴胡 一錢

人參

知母

麥冬

天冬

黃連

草龍膽

山梔子

生甘草

各五分

五味子

七粒

黃芩 七分

蠲痺湯 治肉痿

羌活

赤芍藥

酒炒

薑黃

酒炒

甘草

各五分

黃芪

當歸

酒炒

防風

各二錢五分

坎離丸

治骨痿

熟地

八兩

山萸肉

四兩

山藥

四兩

丹皮

三兩

白茯苓

三兩

澤瀉

三兩

黃蘗

二兩

知母

二兩酒炒

四君子湯

治胃虛宗筋失養不能束骨而利機關令人手足痿弱

人參 茯苓 炙甘草 白朮

八味丸

治人房太甚宗筋縱弛發為陰痿

六味丸加 鹽煮附子 鹽炒肉桂

各一兩

藿香養胃湯

治胃虛不食筋無所養而成痿

藿香 白朮 炒透 人參 茯苓 薏苡仁 半夏 麩

烏藥 神麩 炒 砂仁 炒各一錢五分 萹澄茄 甘草 炒各一錢

薑 五片 棗 二枚

金剛丸

治腎虛精敗骨痿

革薺 杜仲 肉蓯蓉 酒浸 兔絲子 酒浸各等分

爲末酒煮猪腰子和丸梧子大每服五錢空心溫酒送下

神龜滋陰丸

治足廢各
日痿厥

敗龜版

酒炙
四兩

黃蘗

炒二
兩

知母

炒二
兩

枸杞子

一兩

五味子

一兩

鎖陽

一兩

乾姜

五錢

爲末猪脊髓爲丸梧子大每服五錢

補益丸

治腎
痿

白朮

二兩

生地

酒洗一
兩五錢

敗龜版

酒洗炙
一兩

鎖陽

酒浸
一兩

當歸身

酒洗浸
一兩

陳皮

一兩

牛膝

一兩

乾薑

七錢

黃蘗

炒五
錢

虎脛骨

酒炙
五錢

茯苓

五錢

五味子

二錢

兔絲子

一兩酒蒸研
如糊晒乾

甘草

炙一
錢

白芍藥

酒煨
一兩

爲末紫河車爲丸每服五錢

加減四筋丸

治腎肝虛
筋骨痠

肉蓯蓉

酒浸

牛膝

酒浸

天麻

木瓜

熟地

鹿茸

去毛切
酥炙

五味子

兔絲子

酒浸另研
各等分

蜜丸每服五錢空心酒下

痺

內經曰。風寒濕三氣雜至。合而為痺也。其風氣勝者為行痺。此走

注骨節疼痛之類。俗名流火是也。寒氣勝者為痛痺。痛而不移。俗名痛風是也。濕氣勝者為

着痺。肢體重着不移。或為疼痛。或為不仁。濕從土化。病多發于肌肉。俗名麻木是也。以冬遇此者為骨

痺。以春遇此者為筋痺。以夏遇此者為脉痺。以至陰遇此者為

肌痺。以秋遇此者為皮痺。此風寒濕三者各以其時受病之名。非三者之外。別有所謂骨痺筋痺脉

痺肌痺皮痺也。骨痺不已。復感於邪。內舍於腎。筋痺不已。復感於邪。內

舍於肝。脉痺不已。復感於邪。內舍於心。肌痺不已。復感於邪。內

舍於脾。皮痺不已。復感於邪。內舍於肺。各以其時重感於風寒

濕也。肺痺者。煩悶喘而嘔。心痺者。脉不通。煩則心下鼓。暴上氣

而喘。嗌乾善噫。厥氣上則恐。厥氣即陰氣。心火衰則陰邪乘之。故神怯而恐也。肝痺者。

夜臥則驚。多飲。數小便。上為引如懷。肝藏魂。肝病則魂不安。故夜臥則驚。腎痺者。

善脹。尻以代踵。脊以代頭。腎者胃之關。腎氣痺。則陰邪乘胃。故善脹。尻以代踵。足攣不能伸也。脊以

代頭。身僂不能直也。脾痺者。四肢懈惰。發欬嘔汁。上為大塞。脾主四肢。故為懈惰。大塞

者。上焦不隔不通也。腸痺者。數飲而出不得。風秘二便下焦之氣不化。故出不得。中氣喘爭。

小便不出。則本末俱病。故與中氣相爭。清不升。濁不降也。時發飧泄。清濁不分。故也。胞痺者。少腹勝

胱按之內痛。若沃以湯。澁於小便。上為清涕。胞者膀胱之腑也。膀胱氣閉。故按之

內痛。水閉則畜而為熱。故曰若沃以湯。澁于小便也。膀胱之脈從巔入絡腦。故上為清涕也。李士材曰。經以

風勝為行痺。寒勝為痛痺。濕勝為着痺。即其下一勝字。則知但

分邪有輕重。未嘗非三氣雜合為病也。在外者祛之。猶易。入藏

者攻之實難。治外者散邪爲亟。治藏者養正爲先。治行痺者散風爲主。禦寒利濕仍不可廢。大抵參以補血之劑。蓋治風先治血。血行風自滅也。治痛痺者以散寒爲主。疎風燥濕仍不可缺。大抵參以補火之劑。非大辛大溫不能釋其凝寒之害也。治着痺者利濕爲主。祛風解寒亦不可少。大抵參以補脾補氣之劑。蓋土強可以勝濕。而氣足自無頑麻也。此李士材之論痺也。如是然猶未盡焉。蓋痺之病于肌膚筋骨之間。令氣不能流通。氣滯則痰滯。氣鬱則壯火食氣。氣塞則血瘀。况痰生於濕。熱能生風。寒能凝血。經曰。痰着於經絡。四肢不仁。河間曰。壯火之火。無物不耗。又曰。風邪爲患。火卽隨之。丹溪曰。病於血者多痛。仲景

曰。瘀血漬之則疼。東垣曰。濕陰邪也。血得之則敗壞。又曰。寒邪據于關節者。久則化而爲熱。又曰。風湧則痰盛。由是則知痺之爲病也。雖曰風寒濕三者而成。久則鬱火流痰。死血靡不有之矣。蓋肢節之間。筋骨之會。空竅之所也。故邪易居之。經曰。逸者行之。留者攻之。熱者寒之。使不去其害。徒興其利。則亦何益之有哉。

痺門方

如意通聖散

治走注疼痛

當歸

陳皮

麻黃

去節

甘草

炙

川芎

御米殼

去頂蒂膈

丁香

各等分

用慢火炒令黃色每服五錢

水二鍾煎一鍾

如腰脚痛加

虎骨

乳香

沒藥

心痛加 乳香

良薑

此治痺痛之仙藥也

沒藥散

治遍身百節走注疼痛

沒藥

二兩另研

虎骨

醋炙四兩

為細末每服五錢酒下日二服

五痺湯

治五藏痺

痺門方

人參 一錢

茯苓 一錢

當歸 一錢

白芍藥 一錢

川芎

一錢肝腎心三痺當倍用之

五味子

十五粒

細辛

七分

白朮

一錢脾痺倍之

甘草

五分

生薑

一片

食遠服

肝痺加

棗仁

柴胡

心痺加

遠志仁

茯神

麥冬

犀角

脾痺加

厚朴

枳實

砂仁

神麩

肺痺加

半夏

紫苑

杏仁

麻黃

腎痺加

獨活

官桂

杜仲

牛膝

黃芪

草薺

一粒金丹

治筋痺游行不定聚于關節或赤或腫筋脉弛縱

草烏頭

剉炒一兩

五靈脂

一兩

地龍

五錢去土炒

木鱉子

五錢

白膠香

一兩 另研

當歸

一兩 去蘆

麝香

一錢 另研

為細末糯米糊

丸桐子大每服三丸酒下服藥後微汗為效

升麻湯

治脉痺肌肉熱極唇口反裂皮膚色變

升麻

三錢

茯神

人參

防風

犀角

鎊

羌活

麝羊角

鎊各一錢

官桂

三分

神效黃芪湯

治肌痺即濕痺留而不移汗多四肢緩弱皮膚不仁精神昏塞今名麻木

黃芪

二錢

人參

白芍藥

炙甘草

各一錢

陳皮

去白五分

蔓荊子

八分

臨臥服

小便澀加澤瀉

有熱加酒炒

黃蘗麻木雖有熱不用黃蘗再加黃芪

一錢

眼縮小去

白芍藥

忌酒醋濕麵葱蒜韭及生冷

疎養湯

治皮痺癰瘰風瘡搔之不痛

當歸

川芎

白芍藥

各一錢

熟地黃

三錢

防風

二錢

荆芥

一錢

麻黃

八分

去節

五積散

治骨痺卽寒痺痛苦切心四肢攣急關節浮腫兼治感冒寒邪頭痛身痛無論內傷生冷外感寒邪皆效

白芷

茯苓

半夏

湯洗七次

當歸

川芎

肉桂

甘草

炙

白芍藥

各三兩

枳殼

去穰

麻黃

去根節

陳皮

去白各六兩

桔梗

去蘆十兩

厚朴

去粗皮薑製

乾薑

炮各四兩

蒼朮

泔浸去皮二十四兩

每服四錢水一鍾

薑三片

葱白

三根

煎七分熱服

挾氣加莫茱萸

調經催生用艾醋

加減五苓散

治腸痺

猪苓 茯苓 澤瀉 白朮 肉桂 桑皮 麥冬

木通

腎着湯

治胞痺兼治腎着腎虛傷濕腰中如帶五貫錢腰冷如坐水中不渴小便自利

乾薑

炒

茯苓

甘草

炙

白朮

各二兩

每服四錢水煎

空心溫服

腎瀝湯

治胞痺

麥冬

五加皮

犀角

各一錢五分

杜仲

薑汁炒

桔梗

赤芍藥

木通

各一錢

桑螵蛸

一箇

水一鍾入羊腎

少

許

食前服

丹溪主上中下通用痛痺方

痺門方

南星 薑製

黃蘗 酒炒

蒼朮 各二兩

神麴

川芎 各一兩

桃仁

白芷

草龍膽 各五錢

防已

羌活 酒

肉桂 各三錢

紅花 酒洗一錢五分

作五劑加薑二片

二妙散 治濕熱作痺不拘上下

黃蘗 酒潤

蒼朮 米泔浸七日各等分

趕痛湯 治癩血濕痰畜于肢節而作痛

乳香 另研中

沒藥 另研中

地龍 酒炒

香附 童便製

桃仁

紅花

甘草節

牛膝 酒浸

當歸

羌活

五靈脂 酒淘去土

桑枝煎 治痛痺

桑枝一小升 細切炒香以水三大升煎取二升一日服盡

無時

圖經云桑枝性平不冷不熱可以常服療中風體癢乾澀脚氣及風氣四肢拘攣上氣眼昏肺氣喘嗽消食利小便久服輕身聰明耳目令人光澤兼療口乾 抱樸子仙經云一切仙藥不得桑枝煎不服 許學士云政和間予嘗

病兩臂痛服諸藥不效依此作數劑臂痛尋愈

稀莖丸

治一切痺疾并中風皆良久服輕身健骨

稀莖

不拘多少取枝葉洗淨

此草處處有之其葉似蒼耳對節而生

用五月五日七月七日九月九日採來晒乾鋪甑中用好

酒層層勻灑蒸之復晒如此九次爲末煉蜜爲丸如梧桐

子大每服五十九粒空心無灰酒下

... 氣血虧損... 宜服...

... 補氣養血... 宜服...

... 滋陰補腎... 宜服...

... 健脾開胃... 宜服...

... 化痰止咳... 宜服...

... 清熱解毒... 宜服...

... 活血通絡... 宜服...

... 養血安神... 宜服...

... 補腦益精... 宜服...

... 滋陰生津... 宜服...

... 健脾消食... 宜服...

中風

靈樞經曰。虛邪偏客于身半。其入深者內居營衛。營衛衰則真

氣去。邪氣獨留。發爲偏枯。此言邪氣深而中藏者也。其邪氣淺者脉偏痛。此

邪氣淺而中府者以痛爲辨也。又曰。非之爲病也。身無痛者。四肢不收。志亂不

甚。其言微知。可治。甚則不能言。不可治也。此亦言中藏之證。其各曰痺。身無痛者也。

偏枯。身偏不用而痛。言不變。志不亂。病在分腠之間。巨針取之。

益其不足。損其有餘。乃可復也。此亦言中府之證。而猶病之淺者。上兩節言受邪之淺深。下兩

節言可治不可治之證候。痺中風不語也。偏枯半身不遂之名。愚按中風之證。由于房事之餘。

五俞未閉。百竅未斂。或臥時貪涼。腠理不密。或新浴之後。玄府

不堅。因感乎風。入而爲邪。深者入于營衛。襲其五藏。淺者入于

皮毛襲其六府。又有不甚深。亦不甚淺。入于筋骨。襲其經絡。少年得之。則真氣方盛。氣足于中。而痰未盛。風邪伏之。不能爲害。至年老氣血漸衰。然後乘其衰而發之也。中年得之。瘦人氣歉于外。而足于中。風邪不能深入。但襲于六府經絡。發而爲痺。爲痿。爲口眼喎斜。肥者氣盛于外。而歉于中。歉于中。則風邪深入。挾痰而橫行。或閉其七衝。或迷其心竅。感于外者。發于表。感于內者。病其裏。不必伏于內。而卽發之矣。然其發之也。有中府中藏中血脉之分焉。中府者。其病在表。多着四肢。故肢節廢。脉浮惡風。拘急不仁。外有六經之證。太陽頭痛。身熱。腰脊強。陽明目痛。鼻乾。不得臥。少陽脇痛。耳聾。口苦。乾嘔。寒熱。太陰腹滿。自利。咽乾。少陰口燥。舌乾。厥陰煩悶。囊縮。以小續命湯及疎風湯汗之。

中藏者其病在裏。多滯九竅。故唇緩。二便閉。脾不能言。心耳聾。

腎鼻塞。肺目眇。肝以三化湯。及麻仁丸下之。中血脉者病在生

表半裏。外無六經之證。內無九竅之滯。但見口眼喎斜。半身作痛。不可過汗。恐虛其衛。不可太下。恐損其營。惟當養血順氣。以

大秦朮湯。羌活愈風湯和之。且有氣血之分焉。氣虛者。右手足

不仁。血虛者。左手足不仁。氣血俱虛者。左右手足皆不仁。若夫

表氣不順。則遍身麻痺。裏氣不順。病于舌本則語言蹇澁。面部之氣

不順。則口眼喎斜。邪并于虛。則半身不遂。風燥其筋。則手足拘

攣。風兼乎濕。則痿痺不仁。經曰。營氣虛則不仁。衛氣虛則不用。

不知痛癢。曰不仁。不能行動。曰不用。若中年壯盛之人。或屬于實。老年衰弱之人。

未有不虛者也。實者可汗可下。虛者惟有補而已矣。或于初中

之時。邪氣方盛。不能受補。用稀涎散蘇合香丸。先理其痰。通其

竅。以折其鋒。所謂急則治其標也。然惟牙關緊閉。兩手握固。各

曰閉症。方可用此。如口開心絕。牙關屬心。心絕故手撒脾絕。眼

合肝絕。遺尿腎絕。聲如鼾肺絕。更有吐沫。脾直視。心到則目到。

主故直視。肉脫。脾筋骨痛。肝髮直。心搖頭。心絕而神上撮。肝不能藏

升也。面赤如粧。顴屬腎。腎水絕汗出如珠。肺絕則腠理無皆脫絕

之證。宜大劑理中湯灌之。及灸臍下。關元雖曰不治。亦可救萬

中之一。若誤服蘇合香丸。牛黃至寶丹之類。卽不可救矣。蓋人

之一身。清陽在上。濁陰在下。則天冠地履。無暴仆之證也。若濁

邪風湧而上。則清陽失位而倒置矣。故令人暴仆。其痰涎壅塞者。風盛氣湧而然也。蓋痰乃至陰所化。脾濕則痰生。脾虛氣滯。則痰爲患。風入於肝。而干于脾。則風盛氣湧。而痰涎壅塞也。經曰。邪之所湊。其氣必虛。故治痰之法。必以利氣爲先。凡中風昏倒。先須順氣。然後治風可也。

豫防中風

凡大指次指麻木。或不用者。二年內必有中風之患。豫防者。當養氣血。節飲食。戒七情。遠幃幙。若依寶鑑錄。服愈風湯。天麻丸等藥。適所以招風取中也。

八中

八中者上古統名中風皆主外感。及河間主火。東垣主氣。丹溪主濕。而末世之論紛然。於是乎有八焉。蓋八中者。火中。虛中。濕中。寒中。暑中。氣中。食中。惡中也。左癱右瘓。熱氣拂鬱。心神昏胃。筋骨不用。卒倒無知者。火中也。用涼膈散。痰多者。用貝母瓜蒌散。東垣曰。卒倒昏憤。皆屬氣虛。故無癱瘓之證。而因于勞役過度。耗散真元。或因脾胃虛衰。痰生氣壅。此虛中也。宜用六君子

湯。因於房勞者。六味地黃湯。

虛中與火中氣中相似。但火中先有癱瘓之疾。虛中先無癱瘓之疾。

氣中有痰聲。虛中無痰聲也。

頭重體痛。身重浮腫。大便泄。小便赤者。濕中也。

清燥湯主之。身體強直。四肢戰掉。卒然眩暈。身無汗者。寒中也。宜用姜附湯。或附子麻黃湯。面垢悶倒昏不知人。手足微冷。或

吐或瀉或喘或滿或渴者暑中也暑中之人又分陰陽二證靜而得之大熱無汗謂之中暑陰也輕者香薷飲重者大順散動而得之多汗少氣謂之中熱陽也蒼朮白虎湯主之熱死之人切勿便與冷水及臥冷地宜置日中或令近火以熱湯灌之未有不活者七情內傷氣逆爲病因而痰潮身冷脉沉不浮者氣中也急以蘇合香丸灌之候醒以八味順氣散加香附若其人

本虛痰氣上逆宜養正丹氣中與真中相似但中風身溫中氣身冷中風脉浮應人迎中氣脉沉應

氣口以氣藥治風猶可醉飽過度或感風寒或着氣惱因而昏

迷者食中也不可與藥服藥必不救須煎姜鹽湯探吐之吐後

別無他證只以蒼朮白朮陳皮厚朴甘草之類調之食中與虛中氣中俱

醫林一覽 卷二
相似但虛中氣中不在醉飽之後而食中在醉飽之後也。登塚入廟。弔死問喪。飛尸鬼擊。卒厥客忤。手足逆冷。肌膚粟起。頭面青黑。精神不守。或錯語妄言。牙閉口噤。昏不知人者。惡中也。以生半夏加細辛皂角末吹其鼻孔。或蘇合香丸灌之。俟少醒服調氣平胃散。八種證候舉其大綱。觸類而通。任在司命。

中風門方

三生飲

治卒中昏冒口眼喎斜
半身不遂痰氣上壅

天南星

一兩
生用

川烏

一兩去
皮生用

生附子

五錢

木香

二錢
五分

每服二錢五分

薑

十片

水二盞煎六分服

小續命湯

通治中風五
痺痿厥等證

麻黃

去節

人參

黃芩

川芎

芍藥

炒

甘草

炙

杏仁

去皮
尖炒

防已

官枝

各一
兩

防風

一兩
五錢

附子

五錢炮
去皮臍

每服五錢

薑

五片

水一盞半煎一盞

服春夏加

石膏

知母

倍用黃芩

秋冬倍用桂

附芍藥

疎風湯

治表中風邪半身不遂語言微澁

麻黃

三兩
去節

杏仁

炒

益智仁

各一兩

升麻

五錢

每服五錢水煎熱服

三化湯

厚朴

薑炒

大黃

枳實

麩炒

羌活

各三錢

水二碗急火煎至一碗服

麻仁丸

厚朴

去皮薑汁炒

芍藥

炒

枳實

各四兩

大黃

八兩
蒸焙

麻仁

三兩
另研

杏仁

三兩
炒

共為末蜜丸如梧桐子大每服

三錢溫湯下

大秦芩湯

秦芩

石膏

各一錢

甘草

炙

川芎

芍藥

炒

當歸

羌活

獨活

防風

黃芩

炒

白芷

白朮

土炒

茯苓

生地黃

熟地黃

各五分

細辛

五分

春夏加知母

一錢

天寒加生薑

五片

羌活愈風湯

治肝腎虛筋骨弱語言難精神昏憤或肢體偏枯多思健忘

羌活

甘草

炙

防風

黃耆

蜜炙

蔓荊子

川芎

獨活

細辛

枳殼

炒

麻黃

去根

地骨皮

人參

知母

酒炒

甘菊花

去蒂

薄荷葉

白芷

枸杞子

當歸

杜仲

炒

秦芩

柴胡

半夏

製

厚朴

薑汁炒

普濟一收

中風門方

一

校

前胡 熟地黃 各二兩

白茯苓 黃芩 各三兩

生地黄

蒼木 製

石膏 芍藥 各四兩

官桂 一兩

每服一兩水煎服

大寒之後加 木通 倍用半夏 人參 柴胡 迎而

奪少陽之氣也

穀雨之後倍用石膏 黃芩 知母 迎而奪陽明之氣

也

季夏加 防已 白朮 倍用茯苓 勝脾土之濕也

大暑之後加 藿香 重用厚朴 官桂 迎而奪太陰

之氣也

霜降之後加 附子 重用當歸 官桂 勝少陰之氣

也

稀涎散

治中風口噤
單蛾雙蛾

江子

六粒每粒
分作兩半

牙皂

三錢
切片

明礬

一兩

先將明礬入鍋內用火化開却入二味攪勻待礬枯爲末
每用三分吹入諸病皆愈痰涎壅盛者燈心湯下五分在
喉者卽吐在膈者卽下

星香散

治中風痰盛服
熱藥不得者

天南星

四錢

木香

五分

薑

十片

滌痰湯

治痰迷心竅
舌強不能言

天南星

薑製

半夏

各二錢湯洗七次

枳實

炒

橘紅

各一錢二分

人參

石菖蒲

各八分

竹茹

六分

甘草

二分

茯苓

一錢

生薑

五片

食後煎服

鐵彈子丸

治中風昏憤口噤直視痙瘓口眼喎斜涎潮語澀筋攣骨痛癱瘓偏枯或麻木或瘙癢此藥極止疼痛通

經絡活血脈

乳香

另研

沒藥

另研各一兩

川烏頭

一兩五錢

五靈脂

淘淨四兩

麝香

一錢

先將乳香沒藥陰涼處細研次入麝香入藥

再研勻滴水和丸如彈子大每服一九食後臨臥薄荷酒

磨下

烏藥順氣散

治遍身麻痺語言蹇澀口眼喎斜喉中氣急有痰

麻黃 去節

陳皮 去白

烏藥 各一錢

炙甘草 白芷

桔梗 各一兩

枳殼 二兩去穰麩炒

川芎 洗去土

白殭蠶 炒

乾薑 炒黑各五錢

牽正散 治口眼喎斜無他證者方可用

白附子 白殭蠶 全蝎 並生用各等分

為末每服二錢酒調下

改容膏 治同前今日傳之明日改正故曰改容

蓖麻子 一兩 真冰片 三分 共搗為膏寒月加 附子

乾薑 各一錢 口眼喎僻在左以此膏傳其右在右者傳其

左

或以鱈血冰片傅之或以蜣螂冰片傅之皆良

史國公酒藥方

治一切中風

防風

去蘆

秦艽

去蘆

油松節

虎脛骨

酥炙

驚甲

醋炙

白朮

土炒各二兩

羌活

草薺

晚蠶砂

炒

當歸

川牛膝

去蘆

杜仲

去皮薑炒各三兩

蒼耳子

四兩

枸杞子

五兩

乾茄根

去土八兩

稀莨丸

用五月五日七月七日九月九日採取稀莨草陰乾鋪入

甌中用好酒層層勻灑蒸之而曬如此九次為末煉蜜為

丸如梧桐子大每服五十九空心無灰酒下

白芷

中風口噤不開宜用烏梅肉擦其牙關後以鐵物開之或以蘇

合香丸擦牙或以南星冰片擦之皆良如挾不開用牙皂

生半夏 細辛 為末吹入鼻內有嚏則生無嚏則死

不語 脾脉絡胃夾咽連舌本散舌下心之別脉繫舌本心脾

受風故舌強不語亦有因腎脉不上循喉嚨者用龜尿少

許點舌神效 取龜尿法置龜于新荷葉上以猪鬃于鼻內戳之其尿立出

獨參湯 治氣虛中

人參 三錢 水煎服

六君子湯 治虛中有痰

人參 白朮 炙甘草 橘紅 半夏 各三錢 各一錢 二錢 製

白茯苓 一錢五分

薑 三片

煎服

薑附湯

治寒中

乾薑

製附子

各等分

冷服

香薷飲

治中暑之陰症

香薷

去根二錢

厚朴

一錢五分

白扁豆

炒一錢

甘草

五分

本方加人參

白朮

陳皮

茯苓

木瓜

黃耆

名十味香薷飲虛者宜之

調氣平胃散

治惡中

木香

烏藥

白荳蔻

檀香

砂仁

陳皮

厚朴

薑汁炒各一錢

藿香

一錢二分

甘草

五分

蒼朮

一錢五分

薑 三片

灸法

惡中灌醒之後如狂言妄語不休者須以線帶繫定二大
拇指用艾炷灸兩介甲至七壯後服調氣平胃散

增補一
卷二
六
楊州府志

厥

厥也者。天地六淫之邪。人氣五賊之變所致也。而其要不外乎陰陽乖違。氣血拂逆兩端而已。分而言之。則有寒厥。熱厥。氣厥。煎厥。薄厥。尸厥之殊。寒厥者。從五指至膝上皆寒。此陽氣衰于下。而陰奏之也。六味附子湯主之。熱厥者。令人足下熱。熱氣循陰股而上。此陰氣衰于下。而陽奏之也。大補丸主之。氣厥者。由七情拂鬱。陽氣不能四達。而手足厥冷也。八味順氣散主之。煎厥者。發于夏月。火炎精絕。如煎如熬。而孤陽厥逆也。人參固本湯主之。經曰。陽氣者。煩勞則張。精絕。辟積于夏。使人煎厥。諸動屬陽。故煩勞則擾乎陽。而陽氣張大。則勞火亢矣。火炎則水乾。故精絕。是以遷延辟積。至于夏月。內外皆熱。水益虧而火益亢。孤陽厥逆。如煎如熬。故名之曰煎厥也。薄厥者。

大怒所致而血菀於上形氣脫絕也蒲黃湯主之

經曰大怒則形氣絕而血

菀于上使人薄厥肝者藏血而主怒怒則火起于肝載血上行故令血菀于上菀亂也薄雷風相薄之薄血氣亂于胸中相薄而厥尸厥者破陰絕陽形靜如死宜二十四味流氣飲及蘇合逆也

香九主之

五尸之氣暴注于人亂人陰陽氣血上有絕陽之絡下有破陰之紐形氣相離不相順接故令人暴厥如

死所謂一息不運則機緘窮一毫不續則霄壤判也於是證也審其寒者益火之源以消

陰翳熱者壯水之主以制陽光氣厥者開鬱順氣以宣發諸陽

補中益氣以調其不足煎厥者救腎水而益陰精扶肺金而清

夏氣薄厥者消其瘀而安其血暢其氣而和其營尸厥者俾血

氣流動使陽無絕絡陰無絕紐而已另有陰厥陽厥編入傷寒

方案故不復言矣

厥門方

六物附子湯

治寒厥

附子 肉桂

防已 各四錢

炙甘草 二錢

白朮

茯苓 各三錢

大補丸

治熱厥

黃柏一物炒褐色爲末作丸服或煎服亦可

八味順氣散

治氣厥

白朮

人參

白芷

白茯苓

台烏藥

陳皮

各一錢

甘草 五分

人參固本丸

治煎厥

人參 二兩

生地黃

熟地黃

天門冬

麥門冬

各四兩

為末作丸服若煎服更妙輕者減半

蒲黃湯

治薄厥

蒲黃 一兩

炒褐色清酒十爵沃之溫服

二十四味流氣飲

治尸厥

陳皮

青皮

炙甘草

厚朴

紫蘇

香附 各四錢

大腹皮

丁香皮

檳榔

木香

莪朮

炮

肉桂

草果

藿香

各一錢五分

人參

麥門冬

赤茯苓

白朮

枳殼

石菖蒲

木瓜

白芷

半夏

各一錢

木通

二錢

生薑

二片

水四碗煎二碗服

癩

癩疾之源得之於驚或在母腹之時或在有生之後必以驚恐

而致疾故曰驚癩蓋恐則氣下驚則氣亂恐氣歸腎驚氣歸心

并于心腎則肝脾獨虛肝虛則生風脾虛則生痰風痰積畜畜

極而通其發也暴發則仆地厥氣并于上上實下虛悶亂無知

濁邪干乎天君而神明壅閉也故令悶亂無知嚼舌舌者心之苗而脾之經絡連于舌

風邪入于心脾則舌自挺風邪入于吐沫吐沫者風熱盛于內

陽明則口自噤一挺一噤故令嚼舌也此風來潮海之象

背反張目上視背反張目上視者風在太陽經也足太陽之經起于睛明夾脊而下風邪干之則實而動急故

目上視而手足搐搦風屬肝木肝木主筋風熱盛于肝則一身

背反張也之名搦者十指或作六畜聲者是也或作六畜聲者風痰鼓其

開握之義也氣竅而聲自變也譬之弄

笛馬六孔閉塞不
同而宮商別異也。以續命湯加紫蘇陳皮主之。驚癇氣實者利。

驚丸主之。一月數發者易治。週年一發者難治。此虛實之判也。
實者攻之。虛者補之可也。

癰門方

續命湯加紫蘇陳皮方

治癰疾

竹瀝

一升二合

生薑汁

五合

生地黄汁

一升

龍齒

煨研末

防風

麻黃

各四兩

防已

附子

炮

石膏

桂枝

各二兩

陳皮

去白

紫蘇

各五錢

是方也有麻黃桂枝防風紫蘇可以泄在經之邪有竹瀝薑汁陳皮則可以行痰涎之滯有生地汁石膏則可以清心肺之熱有龍齒可以安魂有防已可以通塞若夫沉痾之痰非附子不足以行其滯而其大熱之性又足以益火之源而消陰翳譬之太陽中天幽谷之翳障無不消滅此古人用附子之意也

利驚丸

治驚癇氣實者

青黛

輕粉

各一錢

牽牛末

五錢

天竺黃

二錢

為末蜜丸如黍米大每服一錢得利即止利止後再服

茶子吐法

癘證宜下宜吐茶子苦而善湧能吐頑痰用者宜取一升
搗爛以水五升煎湯二升五合令患人先一夕勿食夜膳
次早以帛束其少腹於無風處飲而行之得大吐便止不

必盡劑

風

和黃

各四

胡

干

百

蘇

竹

二合

半

五合

主

一

蘇

命

夫

門

癩狂

黃帝問曰。有病怒狂者。此病安生。岐伯對曰。生於陽也。帝曰。何以使人狂。岐伯曰。陽氣者。暴折而難決。故善怒也。病名曰陽厥。帝曰。何以知之。岐伯曰。陽明者常動。巨陽少陽不動。不動而動。大疾。此其候也。帝曰。治之奈何。岐伯曰。奪其食。卽已。夫食入於陰。長氣於陽。故奪其食。卽已。使之服。生鐵洛爲飲。夫生鐵洛者。下氣疾也。鶴臯吳子曰。多喜爲癩。多怒爲狂。皆失心也。癩者精。神不守。語言錯亂。妄見。妄言。登高。詈罵。是也。狂者。少臥。少餓。自賢。自貴。妄笑。妄動。升高而歌。棄衣而走。是也。癩病者。責之。并於肝。狂病者。責之。并於心也。此皆實證。宜瀉不宜補。須以大黃之。

苦寒降瀉其實數日之後方可與食但得寧靜卽爲小康不可
以其瘦弱減食而卽以溫藥補之飲食飽之病一再發不可復
救矣故曰損其穀氣則病易愈所以然者食入於陰氣長於陽
故也若夫久病者無實可瀉惟安其神而已經曰主不明則十
二官危故視聽言動皆失其職以此養生則殆主明則下安故
視聽言動皆得其職以此養生則壽沒世不殆此之謂也

癲狂門方

大黃一物湯

治癲狂

大黃

四兩酒浸一宿

水三升煎分三分服不已再作

麻仁飲

治癲風

麻仁

四升

水六升煎七合空心服

麻仁潤藥也多與之令人通利故足以瀉癲風然可以濟火可以澤肝可以潤脾可以濡腎有攻邪去病之能無虛中環氣之患足稱良也

苦參丸

治發狂無時披頭大叫欲殺人不避水火

苦參一物為末蜜丸如梧桐子大每服五十九丸薄荷湯下

上件諸證皆神明內亂也故古人病狂謂之失心苦參主心腹結氣故足以治時熱狂言

靈苑三物散

治失心癩

辰砂

一兩要光明有墻壁者

酸棗仁

五錢微炒

乳香

五錢要光瑩者

爲末作一服溫酒調下善飲者以醉爲度勿令吐服藥訖

便令靜處熟臥病淺者半日至一日覺病深者三四日覺

令人潛伺之不可驚觸使覺待其自醒則神魂定矣萬一

驚寤不可復治

本事方以此方加人參一兩名寧志膏煉蜜作丸如彈子大每服一丸薄荷湯下此許學士治癩方

白金丸

治癩狂失心

白礬

三兩

鬱金

七兩須四川蟬腹者爲真

俱爲末糊丸如梧桐子

大每服五六十九溫湯下

本事方云昔有一婦人癲狂失心數年不愈後遇至人授此方初服覺心胸有物脫去神氣灑然再服頓愈至人云此病因憂鬱得之痰涎包絡心竅此藥能去鬱疾也

驚氣丸

治驚癲失心

附子 木香 白殭蠶 白花蛇 橘紅 天麻 各五錢

乾葛 二兩 麻黃 五錢 麝香 五分 腦子 二分

硃砂 一錢留半爲衣 天南星 薑汁浸一宿 紫蘇 各一兩

挾熱者去附子加鐵粉

俱爲細末煉蜜丸如龍眼大每服一九金銀薄荷湯下

雲母石 此物性寒質重而明寒可以勝熱重可以鎮心明可

以安神故紀明用之湯液以療開元宮人

以文轉為詩律賦之屬亦以體屬示官人

...

...

...

蘇楚 二兩 蘇黃 五錢 蘇香 五錢 蘇子 二兩

天南星 蘇子 蘇香 蘇黃 蘇子

木香 白朮 蘇子 蘇香 蘇黃 蘇子

...

...

...

...

頭痛

頭爲天象。六府清陽之氣。五藏精華之血。皆會于此。故天氣六淫之邪。人氣五賊之變。皆能相害。邪氣與真氣相薄。或蔽覆其清明。或瘀塞其經絡。經氣逆上。于于清道。不得運行。鬱而或疾。分而言之。頭痛循風府而上者。則爲腦風。風府督脉穴在項後髮際下一寸。頭

面多汗惡風。未痛之前一日。或身熱。或似寒非寒。或似熱不熱。

至于痛之日。前病稍減者。名曰首風。二條皆太陽頭頭痛二三

痛宜用桂枝湯

年不已。齒亦痛者。名曰厥逆寒也。頭痛在巔頂者。腎虛不足以

攝膀胱之火也。頭痛耳鳴。或九竅不利。胃氣虛也。卽中頭痛發

熱惡寒而渴者。胃經之風火也。白虎湯加白芷。頭痛胸滿咽酸

噫如敗卵臭。惡食發熱。而身不痛者。內傷飲食也。香附枳朮丸

魚尾

眉尖後近髮際名曰魚尾穴

上攻痛者。血虛也。頭痛目赤。下寒足斷為

甚。大便微秘者。府有實熱也。頭痛而偏者。左血虛而右氣熱也。

丹溪曰。濕土生痰。痰生熱。熱生風。是以頭風為病。多見于嗜酒

之人也。偏于一邊而痛者。其說有二焉。一則曰氣血有虛實實

屬熱虛屬寒。左屬血分。右屬氣分。偏于左者多為血虛。偏于右

者多為氣熱也。一則曰身半以上。天氣居之。天不足西北。故俱

感邪而右甚也。頭風致鼻塞者。鼻氣通

乎天。清陽往來之竅。風盛則氣壅矣。頭痛而起核塊。或頭中

如雷鳴者。名雷頭風。清震湯。頭痛甚則腦盡痛。手足青而寒至

節。名真頭痛。旦發夕死。夕發旦死。灸百會穴。猛進大劑參附亦

有生者。至若脫帽而痛減者。實痛也。得溫而痛止者。虛痛也。抽

掣惡風者。風痛也。頭重而天陰轉甚者。濕痛也。昏重而欲吐不

休者痰痛也。煩心惡熱者熱痛也。絀急而惡寒戰慄者寒痛也。頭痛聞艾氣而減者虫嚙也。氣虛痛者惡勞動其脉大。血虛痛者善驚惕其脉芤。頭痛目有多因而古方每用風藥何也。蓋高巔之上惟風可到。味之薄者陰中之陽。自地升天者也。在風寒濕者固爲正用。卽虛與熱者亦假之以引經。須知新而暴者但名頭痛深而久者則曰頭風。頭風必害眼者。經所謂東風生于春。病在肝。目者肝之竅。肝風動則邪害空竅也。誠哉是言。

頭痛門方

清空膏

丹溪曰東垣清空膏諸般頭痛皆治惟血虛頭痛從魚尾相連者勿用太陽厥陰巔頂痛宜來復丹等藥亦非

此膏所能治

羌活

防風

各一兩

柴胡

七錢

炙甘草

一兩五錢

川芎

五錢

黃連

炒一兩

黃芩

三兩一半酒炒一半生用

俱為細末每服三錢茶調如膏抹在口中少用白湯臨臥

送下

來復丹

一名養正丹一名黑錫丹一名三和丹○治巔頂痛兼治中風上盛下虛裡寒外熱及中暑泄瀉如水

硝石

一兩

舶上硫黃

要透明者一兩○二味共為末入磁碟內微火炒柳條攪火不可太

過恐傷藥力再研

太陰玄精石

水飛一兩

五靈脂

水澄去沙晒乾

極細末名二氣末

青皮 去白

陳皮 去白各二兩

將五靈脂青皮陳皮爲末次

入玄精石末及前二氣末拌勻好醋打糊爲丸如菟荳大

每服三十九丸空心米飲下

透頂散

治新久偏正頭風及夾腦風

細辛

表白者三莖

瓜蒂

七個

丁香

三粒

糯米

七粒

冰片

麝香

各一分五釐

將冰麝研極細將前味研勻另自

治爲末然後入乳鉢內與冰麝和勻磁瓶蜜固留孔一大

荳許隨患人左右鼻搐之良久出涎碗許則安

玉壺丸

治風痰吐逆頭痛目眩胸滿吐涎

天南星

生

半夏

生各一兩

天麻

五錢

白麵

三兩

爲末水丸如梧桐子大每服三十九丸用水一碗先煎沸下

藥煮候藥浮卽熟漉起生薑湯下

玉真丸

治腎虛逆上頭
痛謂之腎厥

硫黃

二兩

石膏

煨赤
研

半夏

湯洗

硝石

研各
一兩

俱爲末生薑汁丸如梧桐子大陰乾每服二十九薑湯下

灸關元穴百壯寒甚者去石膏用鍾乳石粉

沉香降氣散

治氣壅痞
塞頭痛

沉香

二錢
八分

砂仁

七錢
五分

香附

鹽水炒去毛六
兩二錢五分

炙甘草

五錢
五分

爲極細末每服二錢淡薑湯下

既濟解毒湯

治上熱頭目赤腫而痛煩悶不得
安臥下體寒足脗尤甚大便微秘

頭痛門方

大黃 便通者勿用

黃連 酒炒

黃芩 酒炒

甘草 炙

桔梗 各二錢

柴胡 升麻

連翹 當歸身 各一錢

食後服

芎犀丸 治偏正頭風鼻流臭涕服他藥不效者

川芎 硃砂 水飛

石膏 研

片腦 各四兩

人參 茯苓

炙甘草 細辛 各二兩

犀角 梔子 各一兩

阿膠 炒一兩五錢

麥門冬 三兩

為細末蜜丸如彈子大每服一丸食後茶

送下

清震湯 治頭面疔瘡或聞雷聲

升麻 蒼朮 製各四錢

青荷葉 一個

水煎食後服

普濟消毒飲子

治大頭瘟腫甚者宜受刺之

黃芩

黃連

各八分

人參

五分

橘紅

玄參

甘草

生各四分

連翹

牛蒡子

板藍根

馬尾勃

各三分

白殭蠶

炒

升麻

各二分

柴胡

桔梗

各五分

薄荷

六分

水煎服便秘加酒煨大黃

一錢

選奇湯

治眉稜骨痛

防風

羌活

各三錢

黃芩

一錢酒炒

甘草

三錢夏生冬炙

生熟地黃丸

治肝虛頭痛目暗

生地黃

熟地黃

各一斤半

甘菊花

去蒂一斤

石斛

枳殼

防風

牛膝

各六兩

羌活

杏仁

各四兩

俱為末蜜丸如

頭痛門方

梧桐子大每服三錢以黑豈三升炒令烟盡淬好酒六升

每用半鍾食前送下

導痰湯

治痰飲頭痛

半夏

製四兩

天南星

炮去皮

枳實

麩炒

橘紅

赤茯苓

各一兩

甘草

五錢炙

每服四錢生薑

十片

水煎食

後服

辛夷散

治頭風鼻塞

辛夷

天南星

蒼耳

黃芩

酒炒

川芎

三五七散

治大寒中于風府令人頭痛項筋緊急

細辛

一兩五錢

防風

四兩

乾薑

炮二兩

附子

三枚

山茱萸 去核

茯苓 各三兩

爲末每服二錢溫酒食前送

下

瓜蒂散搐鼻法

濕淫於巔頂之上頭目偏痛者

苦瓜蒂 赤小豆 等分

研細末令病人噉水一口以瓜

蒂散一字 二分半爲一字

穴入痛邊鼻中泄出黃水卽減

偏頭風

草麻子 五錢去殼

大棗 十五枚去核

共搗如泥塗綿紙上用筋

一隻捲之去筋納鼻中良久取下流涕卽止極效 或用

生蘿蔔汁仰臥注鼻中左痛注右右痛注左亦效

傷食頭痛

胸滿噯酸噫敗卵臭惡食雖發熱而身不痛

頭痛門方

香砂枳朮丸

頭痛九竅不利屬氣虛

補中益氣湯

眉尖後近髮際曰魚尾魚尾上攻頭痛屬血虛

四物湯加薄荷

動作頭痛胃熱也

酒炒大黃 五錢

濃茶煎服

熱頭痛目赤下寒足胗寒更甚大便秘

既濟解毒湯

出血法

此秦鳴鶴治
唐高宗法也

風眩頭重目視不明此風毒上攻宜砭刺百會穴及腦戶
出血候血變目卽能視矣

出血熱血變目鳴痛厥矣

風邪阻重目瞑不肥此風毒上攻宜少傳百會穴灸之可

心腹諸痛

心爲十二官之主。非可痛者。故心無真痛。真痛則死。內經所載無真心痛之文。但曰厥心痛。與背相控。善瘕。如從後觸其心。僂僂者。腎心痛也。腹脹胸滿。心痛尤甚。胃心痛也。如以錐針刺其心。心痛甚者。脾心痛也。色蒼蒼如死狀。終日不得太息。肝心痛也。臥若徒居。心痛間。動作痛益甚。色不變。肺心痛也。近世所言心痛。乃胸膈痛與胃脘痛。非心痛也。其胸膈胃脘之痛。與心痛別者。心在岐骨陷處。胸膈在陷處之上。胃脘在陷處之下也。胸膈與胃脘之痛。方論分爲九種。曰飲食熱冷。氣血倖蟲。疰是也。由于飲者。內有停水。惡心煩悶。時吐黃水。甚則搖作水聲。或飲

水輒痛。宜小胃散。或胃苓湯。由于食者。食積飽悶。噫氣如敗卵臭。拒按得食。輒甚。痛在胸膈。則用瓜蒂散。痛在胃脘。則用承氣湯。由于熱者。忽痛忽止。或往或來。口渴喜冷。便閉痛在胸膈。則用四消丸。痛在胃脘。則用平胃散。加黃連。由於冷者。其痛綿綿。無增無減。欲得熱。手按復喜熱飲食。宜朮附湯。或丁香止痛散。由于氣壅者。痛如攻刺。宜三因七氣湯。由于死血者。飲下作呃。宜韭汁酒。或手拈散。由于悸者。痛而心煩發熱動悸。此爲虛傷。宜妙香散。由于蟲者。面有白癍。唇黑。或不吐不瀉。饑則痛甚。而飽則否。或痛後能食。或口中沫出。宜剪紅丸。上半月虫頭向上。易治。下半月虫頭向下。難治。先以鷄肉汁。或蜜糖飲之。引虫頭向上。隨服剪紅丸。虻蟲。螞蟥。心痛有休止。或吐虻蟲。

虵動則惡心嘔吐宜服烏梅丸蕪荑散由于鬼疰者痛則昏憤
妄言或陰雨卽發用蘇合香丸

兩脇作痛責之少陽。膽左脇痛爲肝邪多由留血右脇痛爲肝

移邪于肺多由痰氣東垣曰左脇痛者肝氣實也肝實者不得
轉側喜太息肝虛則痛引胸背脇痛而日輕夜重或午後熱者
死血也脇痛而下有一條耕起積食也卽所謂脇下鞭滿者是
也

腹痛分爲三部臍以上痛者爲太陰脾當臍痛者爲少陰腎少
腹痛者爲厥陰肝其痛亦有九種與胸膈胃脘之痛約畧相同
腹痛而有時眩暈或吐冷涎或下白積或得辛辣熱湯而暫止

者痰也宜二陳湯

鶴臯曰凡腹痛連于脇膈多是飲食痰涎填塞至陰抑遏肝膽之氣宜吐之

腹痛

甚大便後稍減者食積也宜枳朮丸腹痛而身重囊濕小便不利大便溏泄者濕也宜四苓散時痛時止熱手按而不散者熱也宜平胃散加黃連綿綿而痛痛無增減欲得熱手按及喜熱飲食者寒也宜吳茱萸湯或丁香止痛散痛而腹脹者氣也宜

用砂仁木香之屬痛在少腹有定處而不移者死血也宜桃仁承氣湯心腹懊懣往來上下痛有休止或有塊耕起腹熱善渴

面有白癍或乍青乍白吐清水者蟲也宜剪紅丸烏梅丸之屬

劉守真曰腹中絞痛欲吐不吐欲瀉不瀉者名曰乾霍亂

俗名絞腸

沙不可服藥服藥即死以鹽湯和童便服而探吐之或以芒硝

三分調熱水。待溫與服而瀉之。

李士材曰。近世治痛。有以爲諸痛屬實。痛無補法者。有以爲痛則不通。通則不痛者。有以爲痛隨利減者。互相傳授。以爲不易之法。不知形實病實。便閉不通者。乃爲相宜。若形虛脈弱。食少便泄者。豈容混治。經曰。實實虛虛。損不足而益有餘。如此死者。醫殺之耳。須知痛而脹閉者多實。不脹不閉者多虛。拒按者爲實。不拒按者爲虛。喜寒者多實。愛熱者爲虛。飽則甚者爲實。饑則劇者多虛。脈實氣粗者爲實。脈弱氣少者多虛。新病年壯者多實。久病年衰者多虛。補而不效者爲實。攻而愈劇者爲虛。實者固可通利。虛者安可通利乎。故表虛而痛者。陽不足也。非溫

經不可。裏虛而痛者陰不足也。非養營不可。上虛而痛者以脾傷也。非補中不可。下虛而痛者脾腎敗也。非溫補命門不可。如泥痛無補法。則殺人慘于利刃矣。

心腹諸痛門方

丁香止痛散

治寒氣腹痛

丁香

小茴香

良薑

炒

甘草

鹽湯探吐法

治腹痛連脅膈手足冷脉伏匿

炒鹽

五錢

溫湯

一碗

和服探吐

三因七氣湯

治七氣相干陰陽不得升降攻衝作痛

半夏

五錢製

茯苓

四錢

厚朴

三錢製

紫蘇

二錢

玄胡酒

治婦人氣血攻刺疼痛連于脅膈

玄胡索

一兩為末炒香

清酒

一升

淬入玄胡溫服

韭汁酒

治死血作痛脅膈時常疼痛得熱則減得寒則增者便是

韭菜汁清酒 等分 和服

雄檳丸 治虫痛不吐不瀉淡食而
饑則痛厚味而飽則否

雄黃 白礬 檳榔 各等分

為末飯丸如黍米大每服五

分食遠服

抑青丸 治左脅
作痛

黃連 吳茱萸湯潤
一宿曝乾

為末作丸日服三錢

手拈散 治血滯心
腹作痛

玄胡索 醋炒 五靈脂 醋炒 草果 沒藥 各等分

為細末每服三錢熱酒調下

金鈴子散 治熱厥心痛
或作或止

金鈴子 各二
玄胡索 各二

為末每服三錢酒調下

木附湯 治寒厥心痛
脉微氣弱

附子 炮一兩
白朮 炒四兩

甘草 炙一兩

為末每服三錢

薑 五片
棗 一枚

水煎食前服

蕪荑散 治蟲咬心痛貫心
則殺人宜亟服之

蕪荑 各三錢
雷丸 各三錢

乾漆 炒至烟
盡一兩

為末每服三錢溫水

調服

秦川剪紅丸 治蟲血
成膈氣

雄黃 另研

木香 檳榔 三稜 煨

蓬朮 炒 貫仲

乾漆 炒烟
盡

陳皮 各一兩

大黃 一兩
五錢

為末麪糊為丸如

梧桐子大每服五十九米飲下

補肝湯

山萸肉

甘草

桂心

各三兩

桃仁

柏子仁

細辛

茯苓

防風

各一兩

大棗

二十四枚

水九碗煎四碗分三服

柴胡疎肝散

柴胡

陳皮

醋炒各二錢

川芎

芍藥

枳殼

炒各一錢五分

甘草

炙五分

香附

一錢五分

食前服

推氣散

治右脇痛脹滿不食

片薑黃

枳殼

炒

桂心

忌火各五錢

甘草

炙二錢

為細末每服三錢薑湯下

枳芎散 治左脇刺痛

枳實 川芎 各五錢

甘草 炙二錢

為細末每服三錢薑湯

送下

導痰湯 治痰飲痞塞為痛

半夏 製四兩

天南星 泡去皮

枳實 炒去瓢

赤茯苓

橘紅 各一兩

甘草 炙五錢

每服四錢薑

十片

水煎食後服

桂枝散 治驚氣傷肝脇中疼痛

枳殼 二兩

桂枝 一兩

為細末每服二錢薑棗湯調下

芍藥甘草湯 一名戊巳湯治腹痛如神

芍藥 四錢

甘草 二錢

大金花丸

黃連

黃蘗

黃芩

大黃

各等分

為末水丸每服二錢

白湯下

萬應丸

取虫積如神

黑丑

取頭末

大黃

檳榔

各八兩

雷丸

醋煮

木香

各一兩

沉香

五錢

將黑丑大黃檳榔一處為末以大皂角

苦練皮

各四兩

煎湯泛為丸如菘荳大以雷丸木香沉香為

衣每服三錢五更用沙糖水送下

芭蕉湯

治癰沙腹痛如神

陳芭蕉扇小半把洗淨剪碎水一碗煎八分溫服

砭刺法

治癰沙腹
痛如神

將針刺內臑穴出紫血痛立止

乾霍亂俗名癰沙痛欲吐不吐欲瀉不瀉者是也此證切不可

服藥服藥卽死以炒鹽三錢和溫湯探吐

又一法用芒硝二三分溫湯調下痛立止

...

...

...

...

...

腰痛

腰者腎之府也。腎乃作強伎巧之官。閉蟄封藏之本。腎水無虧。則六氣焉得而干之。惟勞于房事。精舍空虛。則寒濕風熱瘀血滯氣痰積皆得以襲之矣。是以水衰則陽光獨治而令腎熱熱而痛者。發渴便閉脉來洪數宜青娥丸。加知柏。火衰則陰翳襲之而令腎寒。寒而痛者得熱則減得寒則增。宜八味地黃湯。因

腎虛而肝脾之氣湊之。

肝氣風也。脾氣濕也。

則令腰膝實而作痛。屈伸不

便筋骨俱病。冷痺無力。

靈樞經曰。能屈而不能伸者病在筋。能伸而不能屈者病在骨。屈伸不便。筋骨

俱病。冷痺者陰邪實也。無力者氣血虛也。

是當以獨活寄生湯治之。蓋用辛溫以舉

肝脾之氣。肝脾之氣升。則腰膝勿痛矣。養陰以補肝腎之血。肝

腎之陰補則足得血而能步矣。益氣以長諸藏之陽。諸藏之陽生則冷痺去而有力矣。凡腰痛冷如坐井。重若有物。天陰必發者。腎著于濕也。名曰腎著。宜腎著湯。滲濕湯。復須燥以勝之。暘以曝之。痛無常處。牽引兩足者。風痛也。宜牛膝酒。勞役負重而痛者。跌撲損傷也。宜橘核酒。轉動若刀錐之刺。大便黑。小便或黃或赤。日輕夜重者。瘀血也。宜六味湯。或四物湯。加桃仁紅花。甚者加乳香沒藥。腰痛而虛氣上騰至膈而止。或痛引肩脇者。氣滯也。宜逍遙散。加香砂之屬。腰痛而有時眩暈。或多喘嗽。或唾痰不休者。痰積也。宜二陳湯。加竹瀝薑汁。腰痛由於痰積而挾寒者。宜桂附理中湯。加竹瀝薑汁。腰肢痿弱。脚膝酸軟。其痛

悠悠隱隱而不甚者。腎虛也。虛痛之中。當分寒熱二候。力怯氣短。小便清利者。虛而寒也。宜八味湯。小便黃赤。火常上炎者。虛而熱也。宜六味湯。加知柏腰痛久則熱化爲寒。必用官桂開之。方止要而言之。腎者坎象也。真陰寓焉。元陽寓焉。外邪一入。正氣必虛。此藏一病。百骸皆損。故于是證也。審是虛者。必當大補氣血。雖由外邪所感。驅逐之劑。中病卽已。外邪一除。速加補劑。令水火漸復。不致腎氣虧損。庶無後患也。

...

...

...

...

...

...

...

腰痛門方

青娥丸加黃蘗知母

治腎虛腰痛

破故紙

酒浸微炒

草薺

童便浸一宿

杜仲

薑汁炒

黃蘗

鹽水炒

知母

酒炒

牛膝

去蘆各四兩

胡桃

入兩去皮炮

蜜丸

獨活寄生湯

治腎虛受風受濕肝脾之氣襲之腰腿拘急筋骨攣痛屈伸不得步履艱難冷痺無力

獨活

桑寄生

如無用續斷

杜仲

炒

牛膝

細辛

秦芫

茯苓

桂心

防風

芎藭

人參

各一兩五錢

甘草

當歸

芍藥

熟地黃

各一兩

研末每服五錢湯藥分作

十劑每劑加生薑五片食前服

青娥丸

治腎虛腰痛

補骨脂

炒四兩

杜仲

薑汁炒四兩

為末

胡桃肉

三十個入研膏

熟蜜

少許

丸如梧桐子大每服四錢酒送下

無比山藥丸

治腎虛腰痛

赤石脂

煨

茯神

山萸肉

熟地黄

巴戟

去心

牛膝

酒浸

澤瀉

各一兩

杜仲

薑汁炒

兔絲子

酒浸

山藥

各三兩

北五味子

六兩

肉蓯蓉

酒浸四兩

俱為細末蜜丸如梧桐子大每服三錢酒送下

猪腰方

治腎虛腰痛

猪腰

一對

青鹽

三錢

杜仲

末五錢

人參

末一錢

將猪腰剖開入三味藥末于內濕紙裏煨熟空心食

牛膝酒

牛膝 川芎 羌活 地骨皮 五加皮 甘草

薏苡仁 各一兩 海桐皮 一兩 生地黃 十兩

俱為粗末絹袋盛入好酒二斗 浸七日每服一杯日服三

四杯令酒氣不絕為佳

腎着湯

治腎虛傷濕腰中如帶五貫錢腰冷如坐水中不渴小便清白此證名為腎着

乾薑 炒 茯苓 各四錢 甘草 炙 白朮 各二錢 空心溫服

滲濕湯

治寒濕所傷身體重着如坐水中小便赤澁大便澹泄

蒼朮 製炒 白朮 炒 甘草 炙 各一兩 茯苓 乾薑 炮 各二兩

橘紅 丁香 各二錢 每服四錢 薑 三片 棗 二枚

水煎服

摩腰膏

治老年腰痛
女人白帶

附子尖

烏頭尖

天南星

各二錢
五分

硃砂

雄黃

樟腦

丁香

各一錢
五分

乾薑

一錢

麝香

五分

俱爲細末蜜丸如龍眼大每用一丸生薑汁化開如厚粥

火上烘熱放掌上摩腰中候藥盡卽烘綿衣裹緊腰熱如

火間二日用一丸

甘荳湯

治風熱腰痛
二便不通

黑荳

二合

甘草

二錢

生薑

七片

煎服

間服敗毒散

敗毒散

風熱證
通用

羌活 獨活 前胡 柴胡 人參 茯苓 甘草炒

枳殼炒 桔梗 芎藭各等分 每服三錢生薑五片

橘核酒 治跌打損傷 瘀血作痛

橘核炒去皮 研細末每服二錢酒送下

疝氣

內經曰。任脉爲病。男子內結七疝。女子帶下瘕聚。諸種疝證。無不原于任脉。非肝木受邪。卽肝經自病也。任脉爲病者。從少腹上衝心而痛。不得大小便爲衝疝。宜木香散。肝經自病者。臥則入腹。立則入囊爲狐疝。宜蜘蛛散。狐疝者似狐之晝出穴而溺夜入穴而不溺故名之也。

小腸膀胱與膽。三陽爲病。發寒發熱。頑痺不仁。舉丸腫大。如升如斗。爲癰疝。宜三層茴香丸。或荔枝散。脾脉虛大。脾虛而肝木乘之。怒則隨氣厥逆上升。爲厥疝。宜當歸四逆湯。或木香練子散。脾受所不勝之邪。傳于所勝。則寸脉沉弱。少腹熱痛。白精自出。腹內有瘕。狀如王瓜。爲瘕疝。內經名爲疝瘕。宜烏頭梔子湯。或加橘

核桃仁吳茱萸肝木乘胃則肝脉滑甚腹中筋急囊內有膿血甚則出膿血爲癩疝宜補癩湯其脾受肝邪而傳腎者又或脾脉滑甚或腎脉滑甚內則裏膿血外則小便閉爲癩瘰疝宜加味通心散或五苓散加桃仁山查此衝狐癩厥癩癩瘰疝乃內經之七疝也後張子和亦有七疝曰寒水筋血氣狐癩是也腰痛引羣丸屈而不伸囊冷硬如石陰莖不舉者寒疝也宜吳茱萸加附子湯

寒疝之由必是寒客下體坐臥于卑冷涉于寒濕之所致也寒氣自外而入內束其少火鬱其肝氣

故令腰痛痛而引羣丸者肝之經絡環陰器故也寒主收引故令屈而不伸

腎囊腫大陰汗不絕或

按小腹作水聲者水疝也宜升陽除濕湯

水疝者得之飲水醉酒勞于使內蓋飲水

醉酒則濕勝矣勞于使內則腎氣虛腎氣虛則濕流于次者勢也故令腎囊腫大如水晶陰汗不絕如罇漏也

莖筋挈

痛挺脹不堪。或白物隨洩而下者，筋疝也。宜甘草梢烏荳湯。以此

邪術得之，邪術者，房術春方也。是宜解毒以緩急。外腎因撲損而傷，睪丸偏大，有特疼

痛者，血疝也。按摩則愈。夜分之時，自以一手托其下，一手按其

盡散，誠妙術也。雖年深日久，無不愈之。抑鬱則睪丸腫大，悲哀則不藥而消者，氣

疝也。宜虎潛丸。邪之所湊，常乘其虛。抑鬱而睪丸腫大者，肝氣乘腎之虛也。悲哀不藥而消者，氣有所泄也。

晝腫夜消者，狐疝也。宜補中益氣湯加黃柏知母。晝陽也，夜陰也。晝病而夜

否者，氣病而血不病也。父子相傳，睪丸雖大而無疾苦者，癩疝也，不必治

得于有生之初，非若有生之後，三因所致之疾，故不必治。或有先是癩疝，後來疼痛疾苦者，

此兼前件六證也。宜于前證之方消息之。書有言其要者曰：寒

則多痛，熱則多縱，濕則腫墜。濕者，囊濕。虛者亦腫墜。囊燥，在血分者

不移。在氣分者多動。羣丸有兩。左丸屬水。水生肝木。木生心火。三部皆司血。統納左之血者肝也。右丸屬火。火生脾土。土生肺金。三部皆司氣。統納右之氣者肺也。是故諸寒收引。則血注而歸肝。下注于左丸。諸氣憤鬱。則濕聚而歸肺。下注于右丸。故患左丸者痛多腫少。患右丸者痛少腫多。此確然者耳。凡病疝。諸藥罔效。久而不愈者。其氣必虛。不拘何疝。服補中益氣湯百劑。而自無不愈者。蓋清升濁降。則天冠地履。各得其所。無悖逆之患也。何疝之有。

小腸氣者。少腹引羣丸而痛。連腰脊。羣丸上而不下者是也。此因小腸虛弱。則風寒乘間而入。引羣丸而上。冲肝肺也。宜馬練。

丸。

膀胱氣者。小腹痛腫不得小便是也。宜用五苓散。續用礪砂丸。

此處為書文內容，因圖像模糊，文字難以辨認。可見有若干垂直欄位，可能為表格或分欄式書寫。

疝氣門方

木香散

治衝痛肝邪上厥痛悶欲絕

木香

陳皮

良薑

乾薑

訶子

枳實

各一錢五分

草薢

黑牽牛

川芎

各一錢

水煎空心服

蜘蛛散

仲景以之治狐疝

蜘蛛

十四枚去頭尾微炒雷公云蜘蛛勿用五色者身上有刺毛者薄小者須用屋西南有網身小尻大腹內

有蒼黃色者佳

肉桂

五分

為末每服二錢

三層茴香丸

治一切疝如神癰疝尤為要藥

第一科

大茴香

一兩拌鹽五錢炒和鹽秤

沙參

木香

各一兩

川練子

去核炒一兩

俱爲末水煮米糊爲丸如梧桐子大每服二錢空心鹽湯
下日三服纔完便接第二科

第二科

照前方加葶撥

一兩

檳榔

五錢

共前藥六味重五兩

五錢爲末糊丸服法如前若未愈服第三科

第三科

照前二方加白茯苓

四兩

附子

製一兩

共前八味重十

兩五錢糊丸服法同前但每服三錢雖三十年之久大如

栲栳者皆可除根

荔枝散

治陰丸腫大痛不可忍

荔枝核

十四枚用者燒存性

沉香

大茴香

炒

木香

青鹽

食鹽

各一錢

川練肉

小茴香

各二錢

俱為末每服三錢

空心熱酒調服

轉絕丸

治木腎不痛者即癩症

天南星

半夏

黃蘗

蒼朮

枳實

山查

白芷

神麴

滑石

吳茱萸

昆布

各等分

酒糊丸空心鹽湯

送下

雄楮丸

治同前

雄楮葉

不結子者

晒乾為末酒糊丸每服三錢鹽湯下

一法用馬鞭草搗塗患處神效

地黃膏子丸

治男婦痲氣奔豚氣塊小腹控睪而痛上冲心腹

血竭

沉香

木香

廣茂

炮

玄胡索

人參

蛤蚧

當歸

川芎

川練子

麩炒

白朮

炒

續斷

全蝎

茴香

柴胡

吳茱萸

沒藥

青皮

肉桂

已上分兩無有定數

隨證加減

俱為細末地黃膏子為丸如梧桐子大空心溫酒

下二十九日加一九至三十九

當歸四逆湯

治厥痛

當歸尾

七分

附子

炮

官桂

茴香

炒

柴胡

各五分

白芍藥

四分

玄胡索

川練子

茯苓

各三分

澤瀉

二分

水煎空心服

川苦練散

治同前

木香

川練子

巴豆拌炒去豆

茴香

鹽炒去鹽

各等分爲末每服二錢空心酒調下

木香練子散

疝氣久不愈者服此神效

石菖蒲

一兩炒

青木香

一兩炒

萆薢

五錢

荔枝核

二十枚燒存性

川練子

三十枚巴豆二十枚去殼同炒黃赤色去巴豆

俱爲細末每服二錢入麝香

少許

空心炒茴香鹽酒調下

烏頭梔子湯

治癰疽內有鬱熱外有寒束

川烏頭

炮

梔子仁

炒各三錢

空心服

解癰湯

治癰疽○丹溪云陽明受濕熱傳入太陰發熱惡寒小腹悶痛者癰疽也

梔子 炒

桃仁 炒

枳實

山查 各等分

加薑汁

補瘻湯

治瘻疝內有膿血

桃仁

炒十粒

玄胡索 一錢

甘草

八分

茯苓

一錢

白木

二錢

枳殼

一錢

山查

橘核

炒去皮尖各二錢

荔枝核

一錢五分 用新者炒

空心服

加味通心散

治瘻疝內有膿血小便不通

瞿麥穗

木通

去皮

梔子

去殼

黃芩

連翹

甘草

枳殼

川練子

去核

歸尾

桃仁

炒

山查

各等分

爲末每服三錢燈心

二十莖

車前草

五莖

煎湯空心調服

硝砂丸

木香 沉香 巴豆肉 各一兩 銅青 五錢 青皮 二兩

礪砂 一錢 將木香沉香青皮三味同巴豆慢火炒紫色

去巴豆為末入銅青研勻蒸餅和丸如梧桐子大每服七丸至十九丸鹽湯空心送下日二服

羊肉湯 治寒痲腹痛裡急

當歸 三兩 生薑 五兩寒者加用 羊肉 一斤 水八碗煎取汁

三碗溫服一日飲盡

吳茱萸加附子湯 治寒痲腰痛牽引

吳茱萸 生薑 各三錢 人參 一錢 大棗 二枚

附子 二錢 空心涼服

升陽除濕湯

治水疝陰囊腫
大陰汗不絕

柴胡 羌活

蒼朮

黃芪

各一錢五分

防風

升麻

藁本 炙甘草

各一錢

蔓荊子

七分

當歸

獨活

各五分

外以伏龍肝

即窰心土

研末摻腎囊

甘草梢 黑荳湯

治筋疝莖筋繫
痛挺張不堪

生甘草梢

二兩

黑荳 半升

水五倍煎去半空心服

虎潛丸

治氣疝拂鬱則羸丸腫
大悲哀則不藥而消

黃蘗

鹽酒炒

知母

鹽酒炒

熟地黃

各三兩

牛膝

白芍藥

酒炒

陳皮

各二兩鹽水潤晒乾

龜板

四兩酥炙

鎮陽

酒潤晒乾

當歸

酒洗各一兩五錢

虎脛骨

酥炙一兩

羊肉為丸

補中益氣湯加黃柏知母

治晝則腎囊腫大
夜則痛脹皆消

香白散

治疝氣
如神

香料丁香

三錢

白芷梢

五錢

小茴香

一兩

枳實

一兩

俱為細末分作四分好酒調空心服

馬練丸

治小腸氣小腹引翠丸
連腰脊而痛者是也

茴香

練實

吳茱萸

陳皮

馬蘭花

醋炒各
一兩

芫花

醋炒
五錢

俱為末醋糊為丸每服一錢加至二錢酒送

下

三牛散

治同
前

益智仁

蓬朮

各五
錢

大茴香

吳茱萸

牛膝

續斷

川芎 葫蘆巴 防風 牽牛炒

甘草各二錢五分

為細末每服三錢水煎空心連渣服 白湯調送亦可

黃芩 芍藥 枳實 木香 香薷 白芷 羌活 獨活 防風 牽牛 甘草

五苓散 香薷散 藿香散 小蘇合散 小續命散 小續命散

蘇合香丸 蘇合香丸 蘇合香丸 蘇合香丸 蘇合香丸 蘇合香丸

蘇合香丸 蘇合香丸 蘇合香丸 蘇合香丸 蘇合香丸 蘇合香丸

蘇合香丸 蘇合香丸 蘇合香丸 蘇合香丸 蘇合香丸 蘇合香丸

蘇合香丸 蘇合香丸 蘇合香丸 蘇合香丸 蘇合香丸 蘇合香丸

蘇合香丸 蘇合香丸 蘇合香丸 蘇合香丸 蘇合香丸 蘇合香丸

霍亂

內經曰。太陰所至。爲中滿。霍亂吐下。又曰。土鬱之發。民病嘔吐。

霍亂注下。

此二條言受濕霍亂也。

歲土不及。風乃大行。民病霍亂。餐泄。

此言

風木勝土而爲霍亂也。

熱至。則身熱。霍亂吐下。

此言火熱霍亂也。

○足太陰

脾之

別名曰公孫。去本節後一寸。別走陽明。

胃

其別者入絡胃腸。厥

氣上逆則霍亂。實則腸中切痛。虛則蟲脹。取之所別。○清氣在

陰。濁氣在陽。營氣順脈。衛氣逆行。清濁相干。亂於腸胃。則爲霍

亂。此言厥氣上逆。清濁不分。飲食不節。乃爲霍亂。○霍亂者如

有兩人。一從此往。一從彼來。相值不讓。遂致爭競。此與上段皆同此理。但上段單從脾與腸胃言。此從周身言也。按經之言霍亂也。分濕熱風暑虛實

六端。而於六者之中。又必以暑爲主。至其受病之區。不外脾胃。

二經。蓋霍亂多起於夏秋之間。皆外受暑熱。內傷飲食所致。卽發自冬者。亦由夏月之伏暑也。邪氣塞於中。使上下二焦之陽。不得升降。則乖隔而腹痛。而吐瀉。而霍亂也。霍亂與吐瀉有別。乃吐瀉之久。亡其津液。手足抽掣。而揮霍。眼目旋視。而瞭亂也。先心痛則先吐。邪盛上焦也。先腹痛則先瀉。邪盛下焦也。心腹俱痛。吐瀉並作。邪在中焦也。甚則轉筋者。二焦之邪俱盛。而風木賊之也。厥冷唇青者。寒氣也。身熱煩渴。氣粗脉數者。畜熱也。體重骨節煩疼。濕化也。至於暑邪。必兼而有之者也。主治之法。惟感寒者。用理中四逆等湯。其餘則香薷飲。霍香正氣散等方。其要藥也。若夫吐瀉不止。元氣耗散。病勢危篤。或口渴喜冷。或

惡寒逆冷。或發熱煩躁。欲去衣被。脉來沉遲者。此陰盛格陽。雖喜冷而必不能飲冷。急以理中四逆等藥。冰冷與服。不可以其喜冷欲去衣被而以為熱也。其有心腹脹滿攪痛不住。欲吐不吐。欲瀉不瀉。名曰乾霍亂。俗名絞腸沙不可服藥。服藥即死以鹽湯和童便服而探吐之。或以芒硝三分調熱水待溫與服而瀉之。

仲景曰。霍亂遍身轉筋。肢冷腹痛欲絕。脉洪易治。脉微舌卷囊縮者死。霍亂後陽氣已脫。或遺尿不知。或少氣不語。或膏汗如珠。或大躁欲入水。或四肢不收。皆不治。

不近大者人本也四時不非若不知
 三言其亦無過也身則更數氣不吸
 則身曰壽則益後則短今則惟知辨
 則更而對也必以子而三不既無本
 台則與則而高之。

不可與藥有取以置焉也

古今論去疾者而以欲然也其存心
 則無漸則無本若為土不
 為今而必不強則今意以堅中四
 疾等要本令與則今可以其
 惡寒並本為發熱散濕治去本
 新和來而雲者我留益替則理

霍亂門方

理中湯

治外感寒邪內傷冷物
腹痛寒多不欲飲水

人參 乾薑

白朮 各三錢

炙甘草 一錢

香薷飲

霍亂諸證
皆宜服之

厚朴

去皮薑
汁炒

黃連

薑汁炒
各二兩

香薷

四兩

甘草

五錢

為末每服四錢水煎不犯鐵器井中沉冷服

桂苓白朮散

治暑食兩傷濕
熱霍亂轉筋

桂枝

人參

白朮

白茯苓

各五錢

寒水石

澤瀉

甘草

石膏

各一兩

滑石

二兩

為末每服三錢薑湯下

一方用木香

霍香

葛根

各三錢

吳茱萸湯

治胃暑或傷冷物或忍饑或大怒或乘舟車傷動胃氣轉筋逆冷

吳茱萸

木瓜

食鹽

各五錢

同炒焦水三升煮令百沸

入藥煎至二升服

如無藥之處用

鹽

一撮

醋

一鍾

煎八分服

此出自華陀危病方中

四逆湯

附子

一枚
生用

乾薑

三兩甚
者四兩

炙甘草

二兩

水三升煮取

一升一合分溫再服

建中湯加木瓜柴胡湯

治霍亂
轉筋

桂枝

二兩
五錢

芍藥

二兩

甘草

一兩

膠飴

半斤

生薑

一兩
五錢

木瓜

柴胡

各五錢

每服一兩棗

六枚

水三

鍾煎鍾半去渣下餵兩匙服

六和湯

治飲食後六府不和霍亂轉筋

香薷 二錢

砂仁

半夏

湯洗七次

杏仁

炒

人參

炙甘草

各五分

赤茯苓

藿香

去土

白扁豆

薑汁各炒

厚朴

薑汁炒

木瓜

各一錢

薑 五片

煎服

厚朴湯

治乾霍亂

厚朴

枳殼

去穰麩炒

高良薑

檳榔

朴硝

各七錢五分

大黃

炒二兩

爲末每服三錢水鍾半煎一鍾服

冬葵子湯

治乾霍亂二便不通煩熱悶亂

冬葵子

滑石

研

香薷

各二兩

木瓜

一枚去穰

爲末每服五錢水二鍾煎一鍾服

地漿法

於墻陰掘地約二尺許入新汲水攪之澄清服一鍾既取土氣又取墻陰及新汲水蓋陰中之陰能治陽中之陽也

五苓散

治陽邪熱多欲飲水

茯苓

猪苓

白朮

各一錢三分

澤瀉

一錢

肉桂

五分

霍香正氣散

治內傷外感而成霍亂

霍香

三錢

白朮

厚朴

茯苓

紫蘇

半夏

大腹皮

淨洗

桔梗

橘紅

炙甘草

白芷

各一錢

生薑

三片

三因吐法

治乾霍亂令人暴死急以此方探吐能回生起死

燒鹽

十兩

熱水十五升三飲而三吐之

又方

炒鹽

卽熬鹽
五錢

和童便一碗服

此藥性味甘平，入脾、胃、肺、經。能補氣、養血、生津、止渴。凡氣血兩虧、脾胃虛弱、肺燥咳嗽、口渴咽乾、遺精、白濁、婦女經閉、產後虛弱、一切虛損之症，服之無不立效。此藥乃補劑中之極品也。

一、此藥性味甘平，入脾、胃、肺、經。能補氣、養血、生津、止渴。凡氣血兩虧、脾胃虛弱、肺燥咳嗽、口渴咽乾、遺精、白濁、婦女經閉、產後虛弱、一切虛損之症，服之無不立效。此藥乃補劑中之極品也。

二、此藥性味甘平，入脾、胃、肺、經。能補氣、養血、生津、止渴。凡氣血兩虧、脾胃虛弱、肺燥咳嗽、口渴咽乾、遺精、白濁、婦女經閉、產後虛弱、一切虛損之症，服之無不立效。此藥乃補劑中之極品也。

三、此藥性味甘平，入脾、胃、肺、經。能補氣、養血、生津、止渴。凡氣血兩虧、脾胃虛弱、肺燥咳嗽、口渴咽乾、遺精、白濁、婦女經閉、產後虛弱、一切虛損之症，服之無不立效。此藥乃補劑中之極品也。

癘風

癘風者。天地殺物之風。燥金之氣也。故瘡而不膿。燥而不濕。燥金之體澀。故一客於人。則營衛之行滯。令人不行而麻木也。至有毛落眉脫者。燥風伐其營衛而表氣難固也。遍體癩疹者。上氣下血俱病也。久則鼻梁崩壞。額顛腫破者。高巔之上。惟風可到。身半以上。天之陽也。病則氣受之。氣受之則上病也。諸痛屬實。諸癢屬虛。癘風之癢。固有多蟲。而胃氣之虛。不可誣也。是證也。自古難之。是以斯世之妄治者多也。深達癘風之奧者。潔古東垣二人而已。餘皆未之言也。東垣曰。主燥劑以疏風。則反以助邪。往往血枯而死。當求潤劑以主之。潔古曰。癘風攻鑿氣血。

木石不能獲效者非其類也。宜以血氣之屬能主風者以治之。總之衛氣虛而邪襲營，血壞而癘成，補氣瀉營，治癘風之妙旨也。

癩風門方

愈風丹

治癩風手足麻木毛落眉脫遍身癩疹搔癢成瘡

苦參

四兩為末

土蝮蛇

白花蛇

烏梢蛇

各一條俱要頭尾全者酒浸三

日去骨陰

乾為末

皂角

五斤去皮弦以無灰酒浸一宿取出用水熬膏

以苦參三蛇四味為末皂角膏和丸如梧桐子大每服七

十九丸以玉屏風散煎湯送下輕者三蛇得一即效不必全

也

玉屏風散

黃芪 白朮 防風

換肌散

治癩風年深不愈眉毛墮落鼻梁崩壞額顙腫破

白花蛇

烏梢蛇

俱酒浸一宿
去骨陰乾

地龍

去土各
三兩

當歸

酒洗

蒼朮

米泔浸
七日

木鼈子

去殼

細辛

蔓荊子

白芷

赤芍藥

威靈仙

甘菊花

天麻

天冬

川芎

何首烏

紫參 性能
解毒

荊芥穗

沙參

石菖蒲

苦參

胡麻

炒

不灰木

草烏

炙甘草

白蒺藜

木賊草

定風草

即天
麻苗

共為細末每服五錢食後無灰酒調下多飲為妙

凌霄散

治癘風常
獲奇效

蟬褪

地龍

炒

白殭蠶

炒

全蝎

炒各
七箇

凌霄花

五錢

熱風為末每服二錢熱酒調下無時常坐于浴室湯中一時許

服藥神效

是方也。蟬褪主風熱，地龍能引諸藥以就濕，蠶全蝎主風毒，凌霄花主風壞之血，斯五者皆有微毒，用之以治癘風，經所謂衰之以屬是也。然必坐于浴室湯中服藥者，所以開奏理使邪氣有所出耳。

補氣瀉營湯

此東垣治癘之妙方也。

升麻

連翹

各六分

生地黃

黃芩

各四分

當歸

蘇木

全蝎

地龍

黃芪

黃連

各三分

桔梗

五分

人參

二分

甘草

一錢五分

梧桐淚

一分

桃仁

三粒

蘇蟲

一枚去翅足微炒

水蛭

二枚炒烟盡

麝香

少許

衛氣虛而邪襲，故用參芪甘草以補氣，營血壞而為癘，故用蠶蟲桃仁蘇木以消瘀。全蝎地龍引諸藥至風濕結聚之處，麝香利關節而無所不至。升麻連翹桔梗入氣而解其熱，芩連入藏而清其氣，當歸生地入血而調其新。若梧

桐淚者用之以除大毒之熱又足以殺癘風之蟲而除頑種也

蝮蛇

泉州有客盧元欽患癘風惟鼻根未倒屬五月五日官取蝮蛇膽欲進或言肉可以治風遂取一截蛇肉食之三五日漸可百日平復蓋蛇之奔騰疾走皆風象也故爲逐風之鱗或嫌其毒而唾之不知醫之所取者妙在其毒也易曰同氣相求有此蛇毒方能就彼癘毒如水就濕火就燥各從其類耳內經曰衰之以屬正是此意

皂角刺

癘風眉髮墮落者取皂角刺九蒸九晒爲末每服酒下二

錢入服眉髮再生肌膚悅潤眼目倍明