


A4-114

069223

南陽活人書



069223
00011

活人書卷第十六

此一卷載雜方大率仲景證多而藥少使皆如仲景調理既正變異不生則麻黃桂枝青龍用之而有餘以後世望聖人難矣仲景藥方缺者甚多至如陰毒傷寒時行溫疫溫毒發斑之類全無方書今採外臺千金聖惠金匱玉涵補而完之凡百有餘道以證合方以方合病雖非仲景筆削然皆古名方也譬猶周易參同華嚴合論步驟馳騁不外乎聖人之意又況俗學久矣一旦革之悉用古法

卽陽春白雪復生謗毀適足以杜絕治法今撥歸
經絡裁減湯濟參以雜方庶免庸人易曉日就月
將辛甘發散酸苦湧泄之術行卽俗方不革而自
寢矣此余所以載雜方之意也又況五積散敗毒
散升麻湯萎蕤湯之類縱治不對病用之或差亦
無所害載之卷末以俟後之用方者采擇

升麻湯 一 治傷寒中風頭痛憎寒壯熱肢體痛發熱
畏寒鼻乾不得睡兼治小兒大人瘡疹已發未發皆
可服兼治寒暄不時人多疾疫乍暖脫着衣巾及暴

熱之次忽變陰寒身體疼痛頭重如石者

升麻

白芍藥

甘草炙

乾葛

各等分

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮至八

分去滓溫服若大段寒即熱服若熱即溫服瘡疹

亦准此服藥已身涼止藥小兒量度多少服如老

兒喫去芍藥加柴胡一兩人參半兩雪白芍藥一

分

防風白朮牡蠣湯 治發汗多頭眩汗出筋惕肉瞤

白朮

牡蠣粉

炒黃

防風

獨莖者去蘆頭各等分

湯當作散

右搗羅為細末每服抄二錢七以酒調下米飲亦

得日二三服汗止便服小建中湯

李根湯 治氣上衝正在心端

半夏 湯洗 桂枝 一兩 當歸 一分 芍藥 一分

茯苓 一分 黃芩 一分 甘草 炙一分 生薑 半兩

甘李根白皮 二合

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮至八

分去滓温服

大橘皮湯 動氣在下不可發汗發汗則無汗心中

甘麗安常 作乾

即金匱橘

皮竹葉湯

大煩骨節疼痛目運惡寒食則反吐穀不得入先服
大橘皮湯吐止後服小建中湯

甘草 炙半兩

人參 一分

竹茹 半升

橘皮 一兩半 去白

生薑 一兩

棗子 八箇 去核

右剉如麻豆大每服抄五錢七水三大盞煮取一

盞去滓分二服 八十問末 云治嗽佳

橘皮竹茹湯 五 治噦逆

橘皮 二兩

竹茹 一升

甘草 二兩 炙

人參 半兩

半夏 一兩 湯洗

生薑 半兩

棗子 三十箇

橘皮一本 作一升

即金匱橘
皮湯

右剉如麻豆大每服抄五錢七水二大盞煮至一

盞去滓温服日三服

生薑橘皮湯

治乾嘔噦若手足厥冷者

橘皮 四兩

生薑 半斤

右剉碎作一服水七盞煮至三盞去滓温服一盞

下咽即愈

陰旦湯 治傷寒肢節疼痛内寒外熱虚煩

芍藥 二兩

甘草 二兩 炙

乾薑 三兩 炮

黃芩 三兩此一味 酌量加減

桂枝 四兩

大棗 十五箇

右判如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮至八分去滓溫服日三夜二覆令小汗

陰毒甘草湯 〔七〕 治傷寒初得病一二日便結成陰毒

或服藥六七日已上至十日變成陰毒其病身重背強腹中絞痛咽喉不利毒氣攻心心下堅強短氣不得息嘔逆唇青面黑四肢厥冷其脈沉細而疾伸景云此陰毒之候身如被杖喉咽痛五六日可治七日不可治

甘草 炙

升麻

當歸

桂枝

去皮各二分

雄黃

一分

驚甲

一兩半 酸炙

蜀椒

一分出汗閉日者及子去之

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮至八

分去滓溫服人行五里頃更進一服溫覆取汗毒

當從汗出汗出即愈若未汗再作服

白朮散

八

治陰毒傷寒心間煩躁四肢逆冷

白朮

一兩

附子

一兩炮裂去皮臍

川烏頭

一兩炮裂去皮臍

桔梗

去蘆頭 一兩

細辛

一兩

乾薑

半兩炮裂剉

右件藥搗篩為細末每服二錢七水一中盞煮至

六分不許時候稍熱和滓頓服

附子散凡治陰毒傷寒唇青面黑身背強四肢冷

桂枝 半兩

當歸 半兩 微炒

白朮 半兩

附子 三分炮裂去皮

乾薑 一分炮裂剉

半夏 一分湯洗七遍去滑

右件搗篩為細散每服抄三錢七水一中盞入生薑半分煮至六分去滓不計時候熱服衣覆取汗如人行十里未汗再服

別不熱作 虛熱

正陽散干治陰毒傷寒面青張口出氣心下硬身不熱只額上有汗煩渴不止舌黑多睡四肢俱冷陽伯按成

聊攝明理論中言 舌黑俱熱證不備

分
鑿別本作

甘草

一分
炙剉

麝香

一錢細
研入

附子

一兩炮裂
去皮臍

乾薑

一分炮
裂剉

皂莢

一挺去黑皮塗酥
炙令黃色去子

右件搗羅為細末每服抄二錢七水一中盞煮至

五分不計時候和滓熱服

陽伯按此二段陰證亦有舌黑渴及昏憤者學

者非工力深到差謬多矣

肉桂散

十乙

治傷寒服冷藥過度心腹脹滿四肢逆

冷昏沉不識人變為陰毒

別本無厚朴木香二味茱萸湯浸七遍焙乾微炒

肉桂

三分
去皴皮

高良薑

二分
剉二

厚朴

三分去麁皮
薑炙香熟

白朮

三分

木香

三分

人參

一兩
去蘆頭

榮莖湯煮
七遍焙乾
微炒

赤芍藥 一兩

陳橘皮 一兩

附子 一兩炮裂
去皮臍

前胡 一兩
去蘆頭

當歸 一兩剉
微炒

吳茱萸 半兩
湯浸

右件搗為麤末每服抄四錢七水一中盞棗子三

枚煮至六分去滓不計時候稍熱頻服

回陽丹 干 二 治陽毒傷寒面青手足逆冷心腹氣脹

脉候沉細

華澄茄 半兩

木香 半兩

乾蠨 半兩

吳茱萸 半兩湯浸七
遍焙乾微炒

附子 炮裂去皮
臍半兩

硫黃 半兩
細研入

乾薑 一分炮
裂剉

右件藥搗羅爲細末酒煮麩糊爲圓如梧桐子大
每服三十圓不計時候生薑湯下頻服三服復以
熱酒一盞投之以厚衣蓋定取汗爲度

返陰丹 十三

治陰毒傷寒心神煩躁頭痛四肢逆冷

附子

炮裂去皮臍

乾薑

炮裂剉

桂心

各半兩

硫黃

五兩

太陰玄精石

消石

各二兩別研

右件藥用生鐵銚先鋪玄精末一半次鋪消石一
一半中間下硫黃末又着消石末蓋硫黃都以玄
精蓋上訖用小蓋合着以三斤灰火燒令得所勿

別下作放

別本合至
和六字作
極細米粉
煮爛為七
學

令煙出多急取瓦盆合著地面四向著灰蓋勿令
煙出直候冷取出細研如麩後三味搗羅為末與
前藥同研令細用軟飯為圓如梧桐子大每服十
五圓至二十圓煎艾湯下頻服汗出為度病重則
三十圓此方甚驗喘促與吐逆者入口便住若服
此藥三五服不退便於臍下一寸灸之須是大段
日夜不住手灸不限多少壯數灸之仍艾炷勿令
小小則不得力若其人手足冷小腹硬卽須更於
臍下兩邊各一寸各安一道三處灸之仍與當歸

一本逐作

透

別本作小

腸

四逆湯并返陰丹亦須頻服內外通逐方得解退
若遲慢卽便死矣若是陰證加以小便不通及陰
囊縮入小腹絞痛欲死者更於臍下二寸石門穴
大段急灸之仍須與返陰丹當歸四逆加吳茱萸
生薑湯慎勿與尋常利小便藥也尋常利小便藥
多是冷滑藥此是陰毒氣結在小腹所致也世有
鑿者見小便不通便用炒鹽及裏熱藥於臍下便
熨欲望小便通緣陰氣在小腹之間致被熱物熨
着無處所出得卽便奔上衝心往往有死者

天雄散

十四正元散
退陰散附

治陰毒傷寒身重背強腹中疔

痛咽喉不利毒氣攻心心下堅強短氣嘔逆唇青面

黑四肢厥冷其脈沉細而疾

麻黃

去根節
半兩

石膏

剉微炒
半兩

半夏

湯洗七遍
去滑

白朮

半兩

乾薑

三分
炮

陳橘皮

三分湯浸
去白穢炒

天雄

炮去皮
一兩

肉桂

一兩去
麤皮

川椒

一分去目及閉
口者微炒去汗

厚朴

一兩去麤皮塗生
姜汁炒令香

右件藥搗為麤末每服抄五錢七水一大盞入生

薑半錢棗子三枚煮至五分去滓不拘時稍熱服

如人行十里未汗再服

正元散出本治傷寒如覺風寒吹著四肢煩疼頭目

百骨節疼痛急煎此藥服如人行五里再服或連進

三服取汗立差若患陰毒傷寒入退陰散半錢同煎

或傷冷或傷食頭昏氣滿及心腹諸疾服之無不有

効

麻黃去節 陳皮 大黃生

乾薑炮 肉桂去皮 芍藥 附子炮去

吳茱萸湯洗 半夏泡各等分內麻黃加

焙炒 一倍茱萸減半用之

右搗爲末每服一大錢水一盞生薑三片棗子一枚煮至七分熱服如出汗以衣被蓋覆切須候汗乾去衣被如是陰毒不可用麻黃免發出汗

退陰散

出本
事方

治陰毒傷寒手足逆冷脉沉細頭痛腰

重連進三服小小傷冷每服一字入正元散內同煎入鹽一捻陰毒傷寒欬逆煎一服細細呷便止

川烏

乾薑

各等
分

右搗爲麤末炒令轉色放冷再搗爲細末每服一錢水一盞鹽一捻煮半盞去滓溫服

別本繩作

葱熨法 十五 治氣虛陽脫體冷無脉氣息欲絕不省

人事及傷寒陰厥百藥不効者

葱

以細索纏如繩許大切去根及葉惟存白長三二寸許

右如大餅餤先以火熨一面令通熱又勿令灼人
卽以熱處搭病人臍連臍上下四圍以舊布擁隔
火氣上用熨斗滿貯火放葱餅上熨之令葱餅中
熱氣鬱鬱入肌肉中須預作三四餅一餅壞不可
熨又易一餅良久病人當漸醒手足溫有汗卽差
更服四逆湯輩溫其內昔曾有患傷寒冥冥不知

人四體堅冷如石藥不可用入此遂差

葶藶苦酒湯 十六 治傷寒七八日內熱不解

葶藶 熬杵膏 苦酒 米醋是也

生艾汁 半升無生艾煮熟艾汁 或用艾根搗取汁亦可

右汁煎取七合分作三服

陽毒升麻湯 十七 治傷寒一二日便成陽毒或服藥

吐下之後變成陽毒腰背痛煩悶不安面赤狂言或

走或見鬼或下利脉浮大數面赤斑斑如錦紋喉咽

痛下膿血五日可治七日不可治

升麻 二分

犀角屑

射干

黃芩

人參

甘草 各一分

右剉如麻豆大以水三升煮取一升半去滓飲一

湯蓋食頃再服溫覆手足出汗則解不解重作

大黃散 十八 治陽毒傷寒未解熱結在內恍惚如狂

者

甘草 一兩

木通 一兩

大腹皮 一兩

桂心 三分

川芒消 二兩

川大黃 一兩

桃人 二十一枚湯洗去皮尖

雙仁麩炒令微黃

右件搗爲麤末每服抄四錢七次一中盞煮至六

分不計時候溫服以通利爲度

梔子人湯 治陽毒傷寒壯熱百節疼痛

梔子人 一兩

大青 一兩

赤芍藥 一兩

知母 一兩

柴胡 一兩半 去苗

川升麻 二兩

黃芩 二兩

石膏 二兩

甘草 半兩 炙

杏人 湯洗去皮尖雙仁一者麩炒微黃二兩

右件搗爲麤末每服抄四錢七水一中盞入生薑

半分鼓一百粒煮至六分去滓不計時候溫服

黑奴圓二十治時行熱病六七日未得汗脈洪大或

數面赤目瞪身體大熱煩躁狂言欲走大渴甚又五

六日已上不解熱在胃中口噤不能言為壞病傷寒

醫所不治棄為死人或人精魂已竭心下纔暖撥開

其口灌藥下咽即活兼治陽毒及發斑證

黃芩 一兩

釜底煤 即百草霜 研入一兩

大黃 一兩一分 或作二兩

芒消 一兩

竈突墨 一兩 研入

梁上塵 一兩

小麥奴 小麥未成熟時叢中不成麥捻之成黑勃是也無此亦得各一兩

麻黃 去節泡一二沸 焙乾秤三兩

龐安常作 胃中

別大黃麻 黃作一兩

別本也字 下作無此 必須取用 又本作無

見亦得但
此無解云
去十七字

右件搗羅為極細末煉蜜為圓如彈子大以新汲
水三合研下一圓渴者但與冷水盡足飲之須與
當寒寒竟汗出便差若日移五尺不汗依前法再
服一圓差即止須微利也此藥須是病人大渴倍
常躁盛渴者乃可與之若小渴者強與之翻為禍
耳

五積散

三十一

治陰經傷冷脾胃不和及感寒邪并食

積所傷

官桂

去皮
二兩

人參

二兩

川芎

一兩

厚朴 去皮淨

白茯苓

半夏 湯洗五七遍

芍藥 洗淨

當歸 洗

麻黃 去節

乾薑 各三兩

甘草 二兩半

枳殼 五兩麩炒令黃色

桔梗 十二兩緊實白者洗淨焙乾

陳橘皮 入兩洗淨不去穢

蒼朮 二十四兩新米泔水浸去皮

吳白芷 四兩洗淨焙乾

右件除枳殼肉桂橘皮外其餘並一處生搗為籠

末分作六分於大鑊內用文武火炒令黃熟不得

焦用紙攤於板上候冷入前件枳殼官桂橘皮末

一處和勻入瓷合盛每服二錢水一盞生薑三片

一作蒼朮
新者淨洗
焙乾無新
米七字

物 別本食作

別裏作中

同煎至七分 去滓温服 ○傷寒入葱白一莖豆豉

七粒同煎連 服出汗或脾胃不和內傷冷食渾身

疼痛頭昏無 力胃膈不快喫食不下氣脉不和四

肢覺冷至晚 心躁困倦卽入鹽少許同煎或是陰

經傷寒手足 逆冷或睡裏虛驚及虛汗不止脉細

疾面青嘔逆 更宜入附子同煎加減多少並在臨

時觀看虛實 輕重候之

霹靂散 三十三 治 陰盛隔陽煩躁不飲水

附子 一枚 及半兩者炮熟取出用
冷灰 培之去皮臍細研入

活人書 卷六 七

眞臘茶

錢一大

右同和分作二服每服用水一盞煎六分臨熟入蜜半匙放温冷服之須臾躁止得睡汗出卽差

火焰散

三十三

治傷寒惡候

舶上硫黃

黑附子

去皮生用

新臘茶

各一兩爲細末

右先用好酒一升調藥分大新椀五口放於火上

攤蕩令乾合於瓦上每一椀下燒熟艾一拳大以

瓦楮起無令火著直至烟盡冷卽刮取却細研入

盞合盛每服二錢酒一盞共煎七分有火焰起勿

訝取起待溫服下凡傷寒陰毒者四肢冷脈沉細
或吐或瀉五心躁煩胃中結硬或轉早伏陽在肉
湯水不得下或無脈先喫一服如吐却更進一服
服後心中熱其病已差下至臟腑中表未解者渾
身壯熱脈氣洪大便宜用發表藥或表解者更不
發熱便得睡眠渾身有汗方可用下胸膈行臟腑
藥漸用調和脾胃補養元氣湯散如服此藥二服
不應不可治也

丹砂圓

三十四

治傷寒陰陽二毒相伏危惡形證

硝石 半兩

太陽石

舶上硫黃

水銀

太陰石

玄精石 各一兩研

一作新鉄
銚字

右件藥爲末先用無油銚字以文武火炒下諸藥

末令勻如灰色研如粉麩生薑自然汁浸蒸餅爲

圓如棗豆大每服五圓龍腦牛黃生薑蜜水下壓

躁也若陽毒棗子煎湯下若陰毒任湯下不得於

屋底炒

活人書卷第十六終

活人書卷第十七

五味子湯 二十五 治傷寒喘促脉伏而厥

人參 二錢 麥門冬 去心二錢半 杏仁 去皮尖二錢半

橘皮 去白二錢半 五味子 半兩 生薑 二錢半 棗子 三枚破

右剉如麻豆大水二大盞煮至一盞去滓分作

二服

獬鼠糞湯 二十五 療傷寒病後男子陰易及諸般勞復

韭根 一大把 獬鼠糞 十四枚兩頭尖者是也

右二味水二升煮取半升去滓再煎三服温温盡

服必有粘汗出爲効未汗再作服亦治諸般勞復

竹皮湯

三十七

療傷寒後交接勞復卵腫腹中絞痛欲

絕

刮竹青皮一升

右一味以水三升煮取一升半絞去滓分服立愈

知母麻黃湯

三十八

傷寒差後或十數日或半月二十

日終不惺惺常昏沉似失精神言語錯謬又無寒熱

鑿或作鬼崇或作風疾多般治不差或朝夕潮熱頰

赤或有寒熱似瘧都是發汗不盡餘毒在心胞絡間

千古高覽

與九十七
知母桂心
湯方同銖
異

所致也

知母

一兩半

麻黃

去節

甘草

炙

芍藥

黃芩

各半兩

桂枝

去皮半兩盛暑中可減桂枝作一分

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煎至八

分去滓溫服半日可相次二三服溫覆令微汗若

心煩不眠欲飲水當稍稍與之令胃中和即愈未

汗須再服以汗為度

鼈甲散

二十九

傷寒八九日不差名曰壞傷寒諸藥不

能治者

升麻

前胡

去蘆

烏梅

去核

枳實

麩炒去穰

犀角

鎊

黃芩

各半兩

生地黄

切兩合

甘草

一分炙

鱉甲

去裙米醋炙赤黃研碎半兩

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煎至八

分去滓温服

人參順氣散

三十

治傷寒頭疼憎寒壯熱四肢疼痛

乾葛

甘草

炙

白朮

桔梗

去蘆

香白芷

人參

各一兩

乾薑

半兩炮

麻黃

去節一兩半

右搗羅爲麤末每服三錢水一盞半生薑三片葱

白二寸煎至八分通口服如要出汗連進二服

蒼朮散

〔三十一〕

治傷寒一二日頭疼發熱憎寒身體疼

痛

石膏

一兩

桔梗

半兩

麻黃

一兩

去節湯

山茵陳

去梗半兩

甘草

炙

蒼朮

各半兩米泔浸去皮

右爲麤末每服二錢水一盞煎至八分連服數服

出汗

麻黃葛根湯

〔三十二〕

治傷寒一日至二日頭項及腰脊

拘急疼痛渾身煩熱惡寒

芍藥

三兩

豆豉

一合

乾葛

四分

麻黃

二兩

去節
湯泡一二

沸焙
乾秤

右剉如麻豆大每服四錢葱白七根水一盞半煮

至八分去滓溫服以厚衣蓋覆如人行四五里間

再服良久如未得汗更煮葱粥少少與之熱投以

助藥力取汗卽愈

敗毒散

三十三

治四時傷風溫疫風濕頭目昏眩四肢

痛憎寒壯熱項強目睛疼尋常風眩拘倦風痰皆可

服之神効

羌活

去苗

獨活

去苗

前胡

去苗

柴胡

去苗

芎藭

枳殼

麩炒去穰

白茯苓

去皮

桔梗

人參

各二兩去蘆

甘草

半兩炙

右件搗爲末每服三錢生薑三片水一盞煎至七

分或沸湯點末服亦可老人小兒亦宜日三二服

以知爲度又烟瘴之地山嵐瘴氣或温疫時行或

人多風痰或處卑濕脚弱此藥不可闕也

獨活散

三十四

治傷風

温濕

熱等疾

羌活

獨活

並去蘆頭

枳殼

去穰麩炒通黃

防風

弱別本作氣

黃芩

者細堅

麻黃

沸湯泡一二沸焙乾秤

人參

細辛

者華陰

甘草

炒赤色

茯苓

蔓荊子

甘菊花

各一兩

石膏

水飛過二兩

右搗爲麤末每服三錢水一盞生薑三片薄荷四

五葉同煎至七分去滓微熱呷服之年高者以川

芎代黃芩

桂枝石膏湯

三十五

治傷寒三日外與諸湯不差發熱

脉勢仍數邪氣猶在經絡未入臟腑者

石膏

碎二兩

黃芩

半兩

梔子

四枚小者可用八枚

桂枝

去皮

甘草

各半兩

升麻

乾葛

白藥子

各三分

生薑

三分

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煎取八

分去滓溫服食頃再服若得汗即停後服此方可

夏至後代桂枝證用若加麻黃去節半兩以代麻

黃青龍湯用之也有汗脈緩為桂枝湯證無汗脈

緊為麻黃煩躁為青龍證

梔子升麻湯

三十六

治晚發傷寒三日至夏為晚發

梔子

十枚擘碎

升麻

半兩

生地黃

半斤切碎

柴胡

二兩半

石膏

二兩半

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煎至八

分去滓頻服病不解更作若頭面赤去石膏用乾

葛二兩無地黃用豆豉代之

橘皮湯

三十七

治傷暑痰逆惡寒

甘草

一兩

人參

一分

陳橘皮

去白一兩

右為麤末每服五錢用新青竹輕輕刮皮一團薑

四片棗子一枚水一盞半煎至八分去滓熱服如

不惡寒即宜竹葉湯

作治夏
前春温
及天行
云

解肌湯三十八

治傷寒温病天行頭痛壯熱

葛根 一兩
黃芩 半兩
芍藥 半兩
甘草 炙一分

桂心 一分
麻黃 三分
去節湯泡
一二沸焙乾秤

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半棗子一枚煮至八分去滓日三服三四日不解脉浮者宜再服發汗脉沉實者宜下之差

小柴胡加桂湯三十九
治瘧疾先寒後熱兼治支結

柴胡 八兩
人參
甘草 炙
半夏 浸七次切

黃芩
桂 去皮各三兩

右剉如麻豆大每服抄五錢七水二盞生薑七片

棗子二枚煮至八分去滓復煎取六分清汁溫服

日三夜二若渴者去半夏加人參括樓根同煎服

白虎加桂湯 四十一 治瘧疾但熱不寒者及自汗作渴

知母 六兩 甘草 炙二兩 石膏 一斤 粳米 二合

桂 去皮三兩

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮八分

去滓溫服

柴胡桂薑湯 四十一 治寒多微有熱或但寒不熱亦治

勞瘧

柴胡

四兩

黃芩

桂枝

去皮各一兩半

牡蠣

熬研碎一兩

甘草

炙

乾薑

各一兩

括樓根

二兩

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮至八

分去滓温服初服微煩復服汗出即愈

瘧母煎

四十二

治久瘧不愈結為癥瘕寒熱

鱉甲

十二分炙

黃芩

三分

烏扇

燒存性三分

鼠婦

熬三分

乾薑

炮三分

大黃

三分

桂枝

去皮三分

紫葳

三分

厚朴

薑炙三分

柴胡

去蘆六分

芍藥

五分

石葦

去毛三分

蝨蟲

五分熬去足翅一作麤虫

牡丹皮

五分去心

桃人

二分炒去皮尖双仁

葶藶

一分熬

瞿麥

二分

半夏

湯洗一分

人參

一分

阿膠

炒三分

蜂窠

熬四分

朴硝

十二分

蜣螂

炙六分

右搗羅爲末鍛竈下灰一斗清酒一斗五升浸灰

候酒盡一半著蠶甲於中煮令泛爛如膠漆絞取

汁內諸藥煎爲圓如梧桐子大空心服七圓日三

服○一方無鼠婦朴硝加海藻三分大戟一分

祛邪圓

四十三

治瘧疾脉浮大寒熱往來用此吐之衛

州書云瘧寒多熱少者痰多也然寒多熱少而脉浮

則痰無疑矣可吐之若脉遲微者惡寒瘧耳宜服柴胡桂薑也

恒山

甘草炙

大黃

知母

各二兩

麻黃

四兩去節湯泡一二沸焙乾秤

右搗羅爲末煉蜜爲圓如梧桐子大每服十五圓

面向東無根水吞下

猪膽雞子湯

四十四

治傷寒五六日斑出

猪膽

汁三合

雞子

一枚

苦酒

三合卽米醋

右三味和合煎三沸強人盡服羸人煎六七沸服

汗出差

萎蕤湯

四十五

治風温兼療冬温及春月中風傷寒發

熱頭眩痛喉咽乾舌強腎内疼痞滿腰背強

萎蕤

三分

石膏

一兩研末

白薇

麻黃

去根節湯泡焙乾秤

大羌活

去蘆

甘草

炙

芎

各半兩

杏仁

去皮尖雙仁者搗碎

葛根

半兩生者可用二兩尤佳

青木香

一分冬一兩春用半兩炒

右剉如麻豆大每抄五鈔七水一盞半煎一中盞

日三四服

知母葛根湯

四十六

治風温身體灼熱甚者

知母 三錢

乾葛 八錢

石膏 六錢

姜藜 五錢

甘草 炙二錢

黃芩 二錢

木香 二錢

升麻 二錢

人參 二錢

防風 二錢

杏仁 炒二錢

天南星 生二錢

羌活 二錢

芎 二錢

麻黃 去節四錢

湯泡焙乾

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮至一

盞去滓温服未知再服

括樓根湯 四十七

治風温加渴甚者

石膏 一两

括樓根 三分

人參 半两

防風 半两

甘草 炙半两

葛根 一两半生用

乾者只三錢

右剉如麻豆大每服抄五錢七用永一盞半煮至

一中盞去滓温服

漢防已湯 四十八 治風温脉浮身重汗出

甘草 炙 黄耆 蜜炙各一两 漢防已 四两 白朮 三两

生薑 三两 大棗 十二箇

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煎取一

中盞去滓飲訖仍坐被中汗出如虫行或卧被中

取汗

老君神明散 四十九 辟疫癘

別作治 瘟疫

白朮

二兩

桔梗

一兩

附子

二兩泡去黑皮

烏頭

四兩炮去皮麋

真華陰細辛

一兩

右搗龜篩縫絹囊盛帶之居閭里皆無病若有疫

癘者温酒服方寸七覆取汗得吐卽差若經三四

日抄三寸七以水二碗煮令大沸分三服

務成子螢火圓

五十一

主辟疾疫惡氣百鬼虎狼蛇虺

蜂蠱諸毒五兵白刃盜賊凶害皆辟之昔劉子南佩

之爲虜所圍矢下如雨未至數尺矢輒墮地虜以爲

神故五兵不能加害矣出神仙感應篇 聖散子附

加本作

螢火

鬼箭

羽 削去皮

疾藜

各一兩

雄黃

雌黃

礬石

各二兩 炒汁盡

羚羊角

鍛竈灰

鐵錘柄

人鐵處燒焦 各一兩半

右鴉篩為散以雞子黃并丹雄雞冠一具和之如

杏人大作三角縫囊盛五圓帶左臂仍更掛戶上

續添聖散子方蘇內翰云昔嘗覽千金三建散方於

病無所不治而孫思邈特為著論以謂此方用藥節

度不近人情至於救急其驗特異乃知神物效靈不

拘常制至理開感智不能知今予所謂聖散子者

此類也自古論病惟傷寒爲至危急表裏虛實日數
證候應汗下之類差之毫釐輒至不救若時毒流行
用聖散子者一切不問陰陽二感連服取差不可與
傷寒比也若疫疾之行平日輒煮一金不問老幼良
賤各服一盞卽時氣不入其門平居無病能空腹一
服則飲食快美百病不生真濟世衛家之寶也其方
不知其所從出而故人巢君世寶之以治溫疫百不
失一予旣得之謫居黃州連年大疫所全活者不可
勝數巢君初甚惜此方指江水爲盟約不傳人余切

士序
書故以授之且使巢君之名與此方同不朽東坡居
隘之以傳蘄水道人龐安常龐以醫聞於世又善著

木猪苓

去皮

石菖蒲

高良薑

茯苓

獨活

去蘆頭

附子

炮裂去皮臍

麻黃

去根節

藁本

去沙土

厚朴

去皮薑汁炙

芍藥

柴胡

去蘆頭

枳殼

麩炒去穢

澤瀉

細辛

華陰者

防風

去蘆頭

藿香

去土

半夏

湯洗姜汁浸吞半兩

肉豆蔻

十枚去皮麩裏煨

甘草

炙一兩

吳茱萸

半兩

吳朮

龐安常云蜀人謂蒼朮之白者為白朮蓋茅朮也而謂今

之白朮為
吳朮半兩

右判為麓末每服五錢水一盞半煮取八分去滓
熱服餘滓兩服合為一服重煎空心服之則効

調中湯 五十二 治夏末秋初忽有暴寒折於盛熱熱結

於四肢則壯熱頭痛寒傷於胃則下利或血或水或
赤帶下壯熱暈悶脉沉數宜下之

大黃 去皮 葛根 黃芩 芍藥

桔梗 去蘆 藁本 擇真者無此 茯苓 去皮

白朮 甘草 炙各半兩

右判如麻豆大每服五錢七水一盞半煮取一中

盞去滓温服移時再服之得快利壯熱便歇小兒

減與服

凡秋夏暑熱積日或有暴寒折之熱無可散喜博著肌中作壯熱氣也胃為六腑之

表最易為暴寒傷之而不利也虛弱人亦不壯熱

但下利或霍亂也不宜服此少實人可服又有服

五石人喜壯熱適與別藥斷下則加熱喜悶而死

矣亦不止便作熱毒若壯熱不歇則劇是以宜

調中湯下和其胃氣也調中湯去大黃即治風温

證兼治陽病因下遂協熱利不止及傷寒不因下

而自利表不解而脉浮數者

皆可去大黃煎服之殊驗也

射干湯

五十二

治初秋夏月暴雨冷及天行暴寒其熱

喜伏於內欬嗽曲折不可得氣息喉啞失聲乾嗽無

五石人別

本作五柔

圓

不止至圓

十四字安

常摠論無

妄常大黃

下有加葛

根成一兩

六字

唾喉中如硬

射干

當歸

肉桂

麻黃

去節湯泡焙秤

枳實炙

紫苑

獨活

橘皮

甘草

炙多

生薑

四兩泡

半夏

五兩洗

杏仁

三兩去皮尖兩入煮

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮至八

分去滓溫服

半夏桂枝甘草湯

五十三

治伏氣之病謂非時有暴寒

中人伏氣於少陰經始不覺病旬月乃發脈便微弱
法先咽痛似傷寒非喉痺之病次必下利始用半夏

桂枝甘草湯次用四逆散主之此病只二日便差白
方謂之腎傷寒也

半夏

湯洗七次

甘草

炙

桂心

各等分

右等分剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮

至七分放冷少少含細嚥之入生薑四片煎服

麻黃杏仁薏苡甘草湯

五十四

病人一身盡疼發熱日

晡所劇者名曰風濕此病因傷於汗出當風或久傷

取冷所致也

甘草

一分炙也

薏苡仁

半兩

杏仁

去炒

皮尖十粒

麻黃

去節湯泡秤二分

右劉如麻豆大水三盞煮取一盞半去滓分温二

服有微汗避風

防已黃耆湯

五十五

治風濕脉浮身重汗出惡風

防已

一兩

甘草

炙半兩

白朮

三分

黃耆

一兩一分
去蘆頭

右劉如麻豆大每服抄五錢七生薑四片大棗一

枚水一盞半煮取八分去滓温服良久再服喘者

加麻黃半兩胃中不和者加芍藥三分氣上衝者

加桂枝三分下有陳寒者加細辛三分服後當如

垂行皮中從腰如水後坐被上又以一被繞腰以

下温令微汗差

杏人湯 五十六 療風濕身體疼痛惡風微腫

桂心 二兩 天門冬 去心 麻黃 去節湯洗焙 芍藥 各一兩

杏人 二十五箇去皮尖兩人者炒 生薑 一兩半

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮取八

分去滓温服

小續命湯 五十七 治中風及脚氣痺弱不能轉側兼治

小兒慢驚風

一本防風 二兩半附

防風 一分 芍藥 白朮 人參

各一兩

川芎

附子 生

防己

黃芩 各一分

桂枝 半兩

甘草 半兩 炙

麻黃 半兩 去節 湯泡三次 焙乾

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮至一

盞去滓取八分清汁入生薑汁再煎一二沸溫服

日三夜二若寒中三陽所患必冷煎成清汁旋入

生薑自然汁一匙再煎一二沸溫服暑中三陰所

患必熱本方去附子減桂枝一半

若柔痙自汗者去麻黃夏間及

病有熱者減桂附一
半冬及始春去黃芩

附朮散 五十八 傷寒手足逆冷筋脉拘急汗出不止項

強直搖頭口噤

附子 炮

白朮 各一兩

川芎 三錢

獨活 半兩

桂心 二錢

右搗羅為末每服三錢水一中盞棗子二枚同煮

至五分去滓溫服

桂心白朮湯 五十九

治傷寒陰瘕手足厥冷筋脉拘急

汗出不止

白朮

桂心

防風

去蘆頭

附子

炮去皮臍裂

芎藭

甘草

炙微赤剉各一兩半

右剉如麻豆大每服抄五錢七水二盞生薑四片

棗子三枚同煮至八分去滓温服

附子防風散六十一治傷寒陰瘕閉目合面手足厥冷

筋脉拘急汗出不止

白朮 一两 茯苓 七錢半 乾薑 炮七錢半 甘草 炙七錢半

桂心 半两 五味子 一两 附子 炮裂去皮臍七錢半

防風 七錢半去蘆頭 柴胡 一两半去苗

右搗篩爲粗散每服三錢水一盞生薑四片煎至

六分去滓温服不計時候

一本作汗
出不出

八物白朮散 天十一 治傷寒陰瘕三日不差手足厥冷

筋脉拘急汗不出恐陰氣内傷

白朮 五錢

茯苓 五錢

五味子

五錢 麻黃

去根節湯泡
三沸焙五錢

羌活 半兩

桂心 七錢

高良薑

二錢 附子

七錢半炮
裂去皮臍

右搗篩爲麤散每服四錢水一大盞生薑四片煎

至五分去滓温服不計時候

柴胡半夏湯 天十三

治痰熱頭疼利膈除煩悶手足煩

熱榮衛不調肢節拘倦身體疼痛嗜卧少力飲食無

味兼治五飲消痰癖

別作五噉
胞前痰癖

柴胡六兩 半夏二兩 白朮三兩 甘草炙

人參 黃芩 麥門冬去心各三兩

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半生薑五

片棗子一枚煮至八分去滓温服

金沸草散六十三 治傷寒中脘有痰令人壯熱頭痛項

筋緊急時發寒熱皆類傷風但頭不痛為異耳

前胡三兩 甘草一兩 細辛一兩 旋復花即金沸草三兩

荆芥穗四兩 赤茯苓二兩 半夏淨洗姜汁浸一兩

右搗羅為麤末每服三錢水一盞生薑五片棗子

一本作赤芍末

一枚同煎至七分去滓熱服未知再服

活人書卷第十七卷

活人書卷第十八

大半夏湯

六十四

治膈間有寒痰

半夏

湯洗如法薄切焙乾

茯苓

生薑

各分

右為麤末每遇膈間有寒痰只作一服水兩盞半

煎至一盞濾去滓臨睡溫呷如有熱痰加炙甘草

一分如脾胃不和去甘草入陳橘皮一分同煎

越婢湯

六十五

治風濕痺脚弱

石膏

四兩

白朮

二兩

附子

一兩炮去皮臍

甘草

一兩炙微赤剉

麻黃

三兩去節湯泡焙乾

右剉如麻豆大每服抄四錢七水一盞半生薑三

片棗子一枚煮至八分去滓溫服

脾約圓 六十六 治老人津液少大便澁及脚氣有風大

便結燥

大黃 二兩酒浸焙乾 枳實 麩炒去穰 厚朴 刮去皮薑汁炙 芍藥 以上各半兩

麻子人 一兩半微炒別研 杏仁 去皮尖麩炒黃三分別研

右為細末煉蜜和杵干下圓如梧桐子大每服二

十圓溫水下不拘時候未知加五圓十圓至五十

圓止下利服糜粥將理 與正方九十二同分兩各別

一本麻子作一兩

黑神圓

六十七

治温疫時氣有食積者

別作新白
仁者

巴豆

新好者一兩輕搥去殼以急流水兩碗浸
一宿然後更煮三五十沸候冷漉出去心

膜以帛子拭去水然後研如膏用
厚紙十數層裹以重物壓去油用

五靈脂

二分黑色
者為上

大戟

半兩生用去皮裏
如粉白者為妙

荆三稜

半兩
生用

杏仁

半兩妙過後
研入藥再研

豆豉

二兩須是新軟者為妙不得
令曬乾與巴豆膏同研細

右三味為極細末方入巴豆豆豉研細後入杏仁

更研令細別入飛羅麩半匙以井花水調如糊漸

次拌藥搜和得所入臼中搗三二千下圓如菘豆

大燉乾入蓋合內頻燉或微火焙亦得如遇傷寒
 有食積者脉沉結身體不熱即下之量患人藏府
 虛實加減圓數服用煎薑棗湯吞下取微利為度
 不可太過溘泄身熱下之則為痞氣結胃若病在
 上可吐者同生薑乾嚼三五圓

神功圓

六十八

治三焦氣壅心腹痞悶六腑風熱大便

不通津液內枯大腸乾澀裏急後重或下鮮血痰唾
 稠粘風氣下流腰疼脚重臍下脹痛溺赤如金色

大黃 三兩

人參 半兩

麻子仁

五兩

呵子皮

淨取

右爲細末煉蜜爲圓如梧桐子大每服二十圓溫
水下日三服以通利爲度產後大便秘米飲下十圓
五柔圓 六十九 治老人虛人脚氣亡津液虛秘大便結
調補三焦

大黃

四兩

前胡

一兩

半夏

洗七遍

茯苓

酒浸

芍藥

茯苓

去皮

細辛

當歸

葶藶

炒各半兩

右爲細末煉蜜爲圓如梧桐子大溫水下二十圓
以通利爲度

別作治中
焦虛痞兩

脇氣痛面
目手足浮

腫大便云

大三腕散

七十

治三焦氣逆胃膈虛痞兩脇氣痛手

面浮腫大便秘澁兼治脚氣

獨活

一兩

白朮

三分

甘草

三分

乾木瓜

一兩切

微炙

焙乾秤

紫蘇

一兩

沉香

一兩

木香

三分

大腹皮

一兩

炙黃

陳橘皮

三分

川芎

三分

檳榔

三分麩

畏煨熟

右十一味同一處杵為粗散每劑秤一分水二盞

同煎至一盞去滓分二服帶溫服取便利為効如

能臨晚常進半劑依法煎服即府藏調和風氣人

多秘滯數宜服之未通利者依法煎服此藥極不

虛人氣血不損元神經驗多矣脚氣心腹氣悶大便秘滯者最良

檳榔散 七十二 治脚腫

橘葉 一大握 沙木 一握 小便 半盞 酒 半盞同已
上藥煎

右煎數沸調檳榔末二錢食前服

薏苡人酒法 七十二 治脚痺

薏苡人 牛膝 各二兩 海桐皮 一兩 五加皮 一兩

獨活 一兩 防風 一兩 杜仲 薑汁炙 一兩 白朮 半兩

枳殼 少 一兩 生乾地黄 二兩 半

右剉爲麤末以生絹袋盛之內無灰酒五升春秋
冬浸二七日夏月盛熱分作數劑逐旋浸酒每日
空心溫服一盞或半盞日三四次常令酒氣醺醺
不絕久服覺皮膚下如數百條虫行卽風濕氣也

木瓜散

七十三

治脚氣

大腹皮

一枚紫蘇

一分

乾木瓜

一分

甘草

一分
炙

木香

一分

羌活

一分

右剉爲麤散分作三服每服水一盞半煎至八分

去滓通口服之

葱豉湯

七十四

治傷寒一二日頭項腰背痛惡寒脉浮

而緊無汗

葱白

十五莖

豉

二大合

乾葛

八分

麻黃

四分去節

右剉如麻豆大以水二升先煮麻黃六七沸掠去

白沫內乾葛煎數十餘沸下豉次下葱煎取八合

去滓分溫兩服如人行五六里路久再服服訖良

久煮葱豉粥熱喫卽以衣覆出汗爲度

連鬚葱白湯

七十五

治傷寒已發汗或未發汗頭疼如

破

生薑

二兩

連鬚葱白

寸切半升

右以水二升煮取一升去滓分作二三服服此湯

不差者與葛根葱白湯

葛根葱白湯

七十六

治頭疼不止

葛根

芍藥

知母

各生兩

葱白

一把

川芎

一兩

生薑

一兩

右剉如麻豆大以水三升煎取一升半去滓熱分

二服

雄鼠屎湯

七十七

治勞復

梔子 十四枚 擘

枳殼 二枚 炙

雄鼠屎 十四枚 兩 頭尖者

右為麤末每服四錢水一盞半入葱白二寸香豉三十粒同煎至一盞去滓分二服勿令病人知鼠

屎

黃芩芍藥湯 七十八

治鼻衄

黃芩 三分

芍藥

甘草 炙各 兩半

右剉碎每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服

酒蒸黃連圓 七十九

治暑毒伏深累取不差無藥可治

伏暑發渴者

黃連

四兩以無灰好酒浸面上約一寸以重湯熬乾

右搗羅為細末麩糊為圓如梧桐子大熟水下三

五十圓宵膈涼不渴為驗

茅花湯

八十

治鼻衄不止

茅花

一大把無花以根代之

右以水三盞煎濃汁一盞徐徐服之即差

枳實理中圓

八十二

治傷寒結宵欲絕心膈高起手不

得近

茯苓

人參

白朮

乾薑

炮

甘草

炙各二兩

枳實

十六片 麩炒

右搗羅爲細末煉蜜爲圓如雞子黃大每服一圓

熱湯化下連進二三服胃中豁然渴者加括樓根

二兩下利者加牡礪二兩煨之

小半夏加茯苓湯

八十二

治諸嘔噦心下堅痞膈間有

水痰眩悸

半夏

五兩湯浸洗七遍

赤茯苓

三兩去皮

右剉如麻豆大每服半兩水三盞煎至一盞去滓

秤生薑四錢取自然汁投藥中更煎一二沸熱服

不拘時候

桔梗枳殼湯八十三

治傷寒痞氣胃滿欲絕

桔梗

枳殼麩炒去穰
各一两

右剉如麻豆大以水二盞煎至一盞去滓分二服

赤茯苓湯八十四 治傷寒嘔噦心下滿胃膈間宿有停

水頭眩心悸

芎藭半兩或作二錢半

人參一两去蘆頭

赤茯苓一两或作五錢

半夏半兩湯浸洗七遍去滑

白朮半兩

陳橘皮一两湯浸去白穰焙

右剉如麻豆大每服四錢水二盞生薑五片煎至
一盞去滓溫服不拘時候

香薷散 八十四 治陰陽不順清濁相干氣射中焦名為

霍亂此皆由飽食豚膾復啖乳酪海陸百品無所不
餐多飲寒漿或眠卧冷蓆風冷之氣傷於脾胃諸食
結而不消陰陽二氣壅而不反陽氣欲降陰氣欲升
陰陽交錯變成吐利不已百脉昏亂榮衛俱虛冷搏
於筋則轉筋痛宜服此藥

香薷穗 一两
厚朴 去皮 二两
黃連 二两已上二味以生薑
四两同炒令紫色用

活人書
右搗爲麤末每服三錢水一盞酒半盞同煎至七分去滓用新汲水頻頻浸換令極冷頓服之藥冷則効速也仍煎時不得犯鐵器慢火煎之兼治非時吐利霍亂腹中撮痛大渴躁煩四肢逆冷冷汗自出兩脚轉筋疼痛不可忍者須入餅封口下井中沉令極冷頓服之乃有神効

犀角地黄湯

八十六

治傷寒及溫病應發汗而不發汗

內有瘀血鼻衄吐血面黃大便黑色此方主消化瘀血兼治瘡疹出得太勝以此解之

芍藥 三分

生地黄 半斤

牡丹 去心 一两

犀角 一兩為屑如無以升麻代之

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煎取七

分有熱者加黃芩二兩如狂者亦加之其人脈大

來遲腹不滿自言滿者為無熱更不用黃芩

黃連解毒湯 八十七 治時疾三日已汗解或因飲酒復

劇苦煩悶乾嘔口躁呻吟錯語不得卧

黃連 三分 黃蘗 半兩 梔子 四枚 黃芩 一两

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煎取一

蓋去滓温服未知再服進粥以此漸差外臺云凡

大熱盛煩嘔呻吟錯語不得眠者傳此方諸人用

之有效此直解毒熱除酷熱不必飲酒劇者

酸棗人湯八十八治傷寒吐下後心煩乏氣晝夜不眠

金匱酸棗

酸棗

四升取人炒

甘草

一升炙

知母

二兩

茯苓

三兩

川芎作二

川芎

三兩

乾薑

三兩

麥門冬

一升去心

兩無乾姜

麥門冬餘

並同

別本一升

作六兩

右為麤末每服四錢水一盞煎至六分去滓温服

梔子烏梅湯八十九治傷寒後虛煩不得眠心中懊懣

梔子

半兩

黃芩

半兩

柴胡

一兩

甘草

半兩炙令微赤

烏梅肉

十四枚
微炒用

右剉如麻豆大每四錢水一盞半生薑三片竹葉
十四片豉五十粒煎至七分去滓溫服

橘皮乾薑湯

九十一

治噦

橘皮

通草

乾薑 炮

桂心 各二兩

人參

一兩

甘草

炙二兩

右剉如麻豆大每服四錢水一盞煎至六分去滓

溫日三服

羌活附子散

九十二

治欬逆

羌活

附子 炮

茴香 微炒 各半兩
木香

乾薑

炮各一
棗許大

右剉爲細末每服二錢水一盞鹽一捻同煎一二

十沸帶熱服一服卽止

半夏生薑湯

九十二

治噦欲死

卽金匱小
半夏湯

生薑

二兩
切

半夏

洗七次一
兩一分

右剉如麻豆大水二盞煎取八分去滓分溫二服

黑膏

九十三

治溫毒發斑

好豆豉

一升

生地黄

半斤
切

右二味以猪膏二斤合露之煎令三分減一絞去滓用雄黄麝香如大豆内中攪和分三服盡服之毒便從皮中出則愈忌蕪荑

葛根橘皮湯

九十四

治冬温未即病至春被積寒所折

不得發至夏得熱其寒解冬温始發肌中斑爛癰癤如錦紋而欬心悶但嘔吐清汁服此湯即靜

葛根

橘皮

杏仁

去步尖

知母

黄芩

麻黄

去節湯泡

甘草

炙冬干房

右剉如麻豆大每服抄五錢七以水一盞半煎至

八分去滓溫服

玄參升麻湯

九十五

治傷寒發汗吐下後毒氣不散表

虛裏實熱發於外故身斑斑如錦紋甚則煩躁譫語
兼治喉閉腫痛

玄參

升麻

甘草

炙各半兩

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煎至七分去滓溫服

大青四物湯

九十六

治傷寒熱病十日已上發汗及吐

利後熱不除身上斑出

一名阿膠大青湯

大青

四兩

豉

八合

阿膠

一兩

甘草

一兩
炙

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煎至一

盞去滓旋入膠再煎令烱温服

知母桂心湯

九十七

治傷寒後不差朝夕有熱如瘧狀

麻黃

一兩
去節

甘草

一兩
炙

知母

二兩炒或
作一兩

芍藥

一兩

黃芩

一兩

桂心

右剉如麻豆大每服抄四錢七水一盞半生薑四

片煎取七分去滓温服日三服温覆令微汗愈若

心煩不眠其水欲飲水當稍稍與之令胃中和則

二十八
知母麻黃
湯方同錄

愈

三黃圓

九十八

治吐血黃疸

黃連

三兩

大黃

一兩

黃芩

二兩

右搗羅爲細末煉蜜爲圓如梧桐子大每服十五

圓白湯吞下

桔梗半夏湯

九十九

治傷寒冷熱不和心腹痞滿時發

疼痛順陰湯消痞滿

桔梗

微炒

半夏

生薑

陳橘皮

各一兩

枳實

半兩麩炒赤色

不通作

右剉如麻豆大每服抄五錢半水一盞半生薑三

片同煎七分去滓溫服

三黃熟艾湯

一百

治傷寒四五日而大下熱利時作

白通湯諸藥多不得止宜服此湯除熱下利

黃芩

黃連

黃蘗

各三分

熟艾

半雞子大

右剉如麻豆大每服五錢七水一盞半煎取七分

去滓溫服

薤白湯

一百

傷寒下

利如爛肉汁或滯下伏氣腹痛

諸熱毒皆主之

別本作熱
利

豆豉

半升
綿裹

薤白

一把

梔子

七枚大
者擘破

右剉以水二升半

先煎梔子十沸下薤白煎至二

升下豉煎取一升二合去滓每服一盞

赤石脂圓

一百二

傷寒
下利

黃連

當歸

各二兩

赤石脂

乾薑

炮各一兩

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服三十圓米

飲吞下日進三服

地榆散

一百三

治傷寒

熱毒不解日晚即壯熱腹痛便

痢濃血

地榆

一兩

犀角屑

一兩

黃連

一兩去鬚微炒

茜根

一兩

梔子人

半兩

黃芩

右搗為麤末每服抄四錢七水一盞入薤白五寸

煎至六分去滓不計時候溫服

黃連阿膠湯

一百四

治傷寒熱毒入胃下利膿血

梔子人

半兩

黃蘗

一兩微炒

黃連

二兩去鬚微炒

阿膠

右搗碎每服抄五錢七水二盞煎至一盞去滓人

阿膠再煎膠烱不計時溫服

桃人湯

一百五

治蠹

安力切 蟲食病

槐子

碎一兩

艾

一兩

大棗

十五枚

桃人

一兩去皮
尖雙仁炒

右以水二大盞半煎一盞半去滓分三服

黃連犀角湯

一百六

治傷寒及諸病之後內有瘡出下

部

黃連

半兩

烏梅

七箇

木香

一分

犀角

一兩如無以
升麻代之

右剉碎以水二大盞半煎至一盞半去滓分三服

雄黃銳散

一百七

治下部膿瘡

雄黃

研

苦參

青箱子

黃連

各二分

桃人

去皮尖
研一分

右爲散以生艾搗汁和如棗子核大綿裏內下部
扁竹汁更佳冬間無艾只用散綿裏內下部亦得
百合知母湯 〔百八〕 治百合病發汗後者

百合 七枚

知母 三兩

右先以水洗百合漬一宿當白沫出去其水更以

泉水二升煎取一升去滓別以泉水二升煎知母

取一升去滓後合和煎取一升五合分溫再服

滑石代赭湯 〔百九〕 治百合病下病之後者

百合 七枚

滑石 三兩碎

代赭 如彈丸大一枚研碎綿裏

右先以水洗百合漬一宿當白沫出去其水更以
泉水二升煎取一升去滓別以泉水二升煎滑石
代赭取一升去滓後合和重煎取一升五合分溫
再服

雞子湯

二百一十

治百合病吐之後者

百合

七枚

雞子黃

一枚

右先以水洗百合漬一宿當白沫出去其水更以
泉水二升煎取一升去滓內雞子黃攪令勻煎五

分溫服

百合洗方

百十二

治百合病一月不解變成渴者

百合

一升

右以水一斗漬一宿溫暖以洗身洗已食煮餅勿

以鹽豉也

百合地黄湯

百十二

治百合病不經吐下發汗病形如

初者

百合

七枚 擘

生地黄

汁一升

右以水洗百合漬一宿當白沫出去其水更以泉水二升煎取一升去滓內地黃汁煎取一升五合

分温再服大便當如漆中病勿更服

括樓牡蠣散

百十三

治百合病渴不差者

括樓根

牡礪

分 熬等

右搗羅為細末飲服方寸七日三服

滑石散

百十四

治百合病變成寒熱者

一作發 寒熱

百合

炙 一两

滑石

三兩

右件羅為散飲服方寸七日三服當微利者止服

之熱即除

治中湯

百十五

治脾胃傷冷物胃膈不快腹痛氣不和

人參

乾薑

炮

陳橘皮

湯洗去穢

白朮

甘草

炙

青橘皮

去穢

右各等分爲細末每服三錢水一盞煎數沸熱

服尋常入鹽點服

陽旦湯

百十六

治中風傷寒脉浮發熱往來汗出惡風

項強鼻鳴乾嘔

桂枝

芍藥

已上各三兩

甘草

炙

黃芩

各二兩

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半棗子一

枚生薑三片煎至一盞去滓取八分清汁溫服○

自汗者去桂枝加附子一枚炮○渴者去桂枝加
括樓根三兩○利者去芍藥桂枝加乾薑三兩○
心下悸者去芍藥加茯苓四兩○虛勞裏急者正
陽旦湯主之煎時入膠飴爲佳○若脉浮緊發熱
無汗者不可與也

百虎加蒼朮湯

百十七

治濕温多汗

知母

六兩

甘草

炙二兩

石膏

一斤

蒼朮

三兩

粳米

三兩按白皆用粳米

虎湯竹葉石膏湯此方亦合用粳米

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煎八分

去滓取六分清汁温服

七味葱白湯 百十八 許仁則治傷寒或因起動勞復或

因喫食稍多皆成此候若復甚者一如傷寒若初有

乾葛 切三兩 麥門冬 去心三兩 葱白連鬚 切半升

新豉 半合綿裹 生薑 切一合 乾地黄 三兩

澆水 四升以杓揚之干遍名曰澆水

此證宜服此湯

右七味用澆水煎之三分減二去滓分二服漸漸

覆蓋取汗

增損四順湯 百十九 治少陰下利手足冷無熱候者

甘草 二兩 炙
人參 二兩
龍骨 二兩
黃連 二兩

乾薑 各一兩
附子 一枚炮 去皮臍

右剉如麻豆大每服三錢水一盞煎七分日三服

不差復作。下利腹痛加當歸二兩。嘔者加橘

皮二兩

化斑湯 百二十 治斑毒

人參 半兩
石膏 半兩
萎蕤
知母

甘草 各一分

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半入糯米

一合煎八分取米熟為度去滓溫服

官局桔梗湯 百二十二 治乾嘔

桔梗

半夏

陳橘皮

已上各一兩

枳實

炒半兩

右剉如麻豆大每服抄三錢七水一盞半生薑五

片煎至七分去滓溫服

麻黃加朮湯

百二十三

治中濕

甘草

半兩炙

桂枝

一兩去皮

蒼朮

半兩

麻黃

一兩半去節湯泡

杏人

三十五箇去皮尖

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煎取八

分去滓温服

竹皮大圓

百二十三

治虚煩

石膏

三分研

桂一分

生竹茹

二分

甘草

三分炙

白薇

一分

右爲細末棗肉圓彈子大米飲服一圓日三夜一

○有熱者倍白薇○煩喘者加枳實一分

古今錄驗橘皮湯

百二十四

療春秋傷寒秋夏冷濕欬嗽

喉中鳴聲上氣不得下頭痛方

陳橘皮

紫苑

麻黃去節湯泡

當歸

桂枝

杏人去皮尖

甘草炙

黃芩各半兩

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煎至一

盞去滓溫服

黃連橘皮湯

百二十五

溫毒發斑

黃連

四兩去毛

陳橘皮

去白

杏人

去皮尖

枳實

炙

麻黃

去節湯泡

葛根

各二分

厚朴

姜汁炙

甘草

各一兩炙

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煎至八

分去滓溫服下利當先止

麥門冬湯

百二十六

治勞復能起死人或勞氣欲絕者

麥門冬

一兩 去心

甘草

二兩 炙

右剉如麻豆大先用水二盞入粳米二合煎令米熟去米留水約得水一盞半入煎藥五錢七棗子二枚去核新竹葉十五片同煎取一盞去滓大温服不能服者綿滴口中

活人書卷第十八終

此一卷論婦人傷寒古人治病先論其所主男子調其氣婦人調其血血室不畜則二氣和諧血室凝結水火相刑傷寒氣口緊盛卽宜下人迎緊盛卽宜汗婦人左關浮緊不可下當發其汗以救其血室榮衛得和津液自通浹然汗出而解仲景云婦人傷寒經水適斷晝日明了暮則讖語如見鬼狀此爲熱入血室無犯胃氣及上二焦無犯胃氣者主不可下也小柴胡湯主

別本津下
有液字

之若行湯遲則熱入胃令津燥中焦上焦不榮

成血結胃狀須當針期門也五行相剋以生相

扶以出平居之日水常養於木水木相生則榮

養血室血室不畜脾無蘊積脾無蘊積則剛燥

不生剛燥既生若犯胃氣則晝夜讖語喜忘小

腹滿小便利屬抵當湯證也

傷寒胃實讖語宜下之婦人熱入血

室讖語不可下耳

雖然婦人傷寒與男子治法不同男

子先調氣婦人先調血此大略之詞耳要之脈

緊無汗名傷寒脈緩有汗為中風熱病脈洪大

川溪正宗
本議公補
血之語

中暑脈細弱其證一也假如中暍用白虎胃實
用承氣豈必調血而後行湯液耶仲景傷寒論
所以不分男女良亦以此學者皆可隨病於男
子藥證中以意選用也

若姪婦傷寒藥性須涼慎不可行桂枝半夏桃
人等藥小柴胡去半夏名黃龍湯蓋爲姪婦而
去也大括產前先安胎產後先補血次服傷寒
藥若病稍退則止藥不可盡劑此爲大法黃帝
問婦人重身毒之何如岐伯曰有故無殞亦無

涪人書
十九卷
殞也大積大聚其可犯也衰其大半而止過者
死

婦人傷寒藥方

男子婦人傷寒仲景治法別無異議比見民間
有婦人傷寒方書稱仲景所撰而王叔和爲之
序以法考之間有可取疑非古方也特假聖人
之名以信其說於天下耳今取金匱玉函治婦
人傷寒與俗方中可採者列爲一卷雖不足以
盡婦人傷寒之詳並可於百問中參用也

小柴胡湯 治婦人傷寒發熱經水適來晝日明了暮則譏語如見鬼狀者此爲熱入血室無犯胃氣及上二焦

又治婦人中風七八日續得寒熱發作有時經水適斷此爲熱入血室其血必結致使如瘧狀者 方在十

方二
十九

刺期門穴 治婦人傷寒發熱惡寒經水適來得之

七八日熱除脉遲身涼和胃脇下滿如結胸狀譏語者此爲熱入血室也當刺期門隨其實而取之 鍼法
在第十

瀉心三黃湯

三

婦人傷寒六七日胃中有燥屎大便

難煩躁讖語目赤毒氣閉塞不得流通

蜀大黃

鼠尾黃芩

雞爪黃連

各等分

右剉如麻豆大每服四錢水一盞半煎至八分去

滓溫服取微利如目赤睛疼宜加白茯苓嫩竹葉

寫肝氣之餘

桂枝紅花湯

四

婦人傷寒發熱惡寒四肢拘急口燥

舌乾經脈凝滯不時往來

一本作不
得

麻木桂枝
芍藥甘草
作一兩

桂心

芍藥

甘草

炙各
三兩

紅花

二兩

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半生薑四
片棗子二枚煎至七分去滓溫服良久再服汗出
而解

黃芩芍藥湯

五

婦人傷寒口燥咽乾腹滿不思飲食

黃芩

白芍藥

白朮

乾地黄

各一
兩

右剉如麻豆大每服抄五錢七以水一盞半煎至
七分去滓溫服寒加生薑同煎

柴胡當歸湯

六

婦人傷寒喘急煩躁或戰而作寒陰

陽俱虛不可下

柴胡 三兩

白朮 二兩

人參

甘草 炙

當歸

赤芍藥 各一兩

五味子

木通 各半兩

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半生薑四

片棗子二枚煎至七分去滓溫服

乾地黄湯 比 婦人傷寒差後猶有餘熱不去謂之遺

熱

大黃

黃連

黃芩 各一兩

柴胡 去蘆

甘草 炙

白芍藥 各一兩半

乾地黄 一兩

右判如麻豆大每服抄五錢七以水一盞半煮至

七分去滓温服取微澹利汗出解

燒視散 〔入〕 婦人傷寒未平復因交合裏急腰胯連腹

內痛名曰陰陽易證也

男子視襠燒灰

右一味以水和服方寸七男子病用婦人視襠燒

灰小便利陰頭腫即愈

青竹茹湯 〔九〕 婦人病未平復因有所動致熱氣上衝

胷手足拘急搐搦如中風狀

乾薑湯一
療婦人得
温病雖差
平復未滿

百日不與人交

合為陰易

之病病必

拵急手足

拳攣皆死

丈夫病差

傷婦人名

陽易急癆

之可差滿

一百日不

可療也宜

服此藥

乾薑炮壹分

右剉如麻

豆大每服

抄五錢七

水二盞煎

括樓根

無黃者二兩

青竹茹

刮半斤淡竹者佳

右以水二升半煎取一升二合去滓温分作二三

服

當歸白朮湯〔十〕婦人病未平復因有所動小腹急痛

腰胯疼四肢不任舉動無力熱發者

白朮

一分

當歸

一兩

桂枝

去皮

甘草

炙

芍藥

附子

生去皮破半斤

人參

黃耆

各一分

生薑

半兩

右剉如麻豆大以水三升煮取一升半去滓通口

至六分去
津温服汗
出得解手
足伸遂愈

服一盞食頃再服一盞温覆微汗便差

○姪婦傷寒藥方

姪婦傷寒伸身無治法用藥宜有避忌不可與尋常人一槩治之也

加減四物湯

十一

姪婦產前腹痛及治月事或多或

少或前或後胎氣不安產後血塊不散或去血過多或惡露不下

當歸

切焙

川芎

熟乾地黄

白芍藥

各一兩

右搗爲麤末每服四錢水一盞半煎至八分取六

分清汁帶熱服日二三服以知爲度若姪婦下血
卽入艾五七葉阿膠末一錢七同煎服如前法○

疾勢甚大散藥不知以四味各半兩細剉以水四
盞煎至二盞半去滓分四服熱喫食前服一日之
中令盡以知爲度平常產乳服至三蠟止如虛弱
血臟不調至一月止○因虛致熱熱與血搏口乾
渴欲飲水加括樓一兩麥門冬三分○腹中刺痛
惡物不下加當歸赤芍藥各一分○血崩加地黃

蒲黃各一兩○因熱生風加川芎一分柴胡半兩

身熱脈躁頭昏項強加黃芩柴胡各半兩秘澁者
加大黃半兩桃人一分炒○滑瀉加官桂附子各
一分○發寒熱加乾薑牡丹皮芍藥各一分○嘔
者加白朮人參各半兩○腹脹加厚朴枳實各一
分○虛煩不得眠加竹葉人參各一分○躁大渴
者加知母石膏各半兩○水停心下微吐逆者加
猪苓茯苓防已各一分○虛煩狀類傷寒加人參
柴胡防風各三分

阿膠散

干
仁

姪婦傷寒安胎次治其病

阿膠

炒

桑寄生

白朮

吳者佳

人參

白茯苓

各等分
瓦上炒

右為粗末每服抄五錢七水一盞半煮八分去滓
溫服或為細末糯米飲調服二錢七日二服

白朮散

十三

妊婦傷寒安胎

白朮

黃芩

各等分新瓦上
并同炒令香

右搗為粗末每服抄三錢七水一盞生薑三片棗
子一枚擘破同煎至七分去滓溫服但覺頭痛發
熱便可服三兩服即差若四肢厥冷陰證見者未

可服也

葱白湯 十四 妊婦傷寒憎寒發熱當發其汗無妊亦

可用

葱白 十莖

生薑 三兩切

右以水三升煮取一分分作二服取汗為度

蘇木芍藥湯 十五 妊婦傷寒或中時行洒淅作寒振

慄而悸或噦者

赤芍藥 廣陳皮 黃芩 黃連

甘草 炙 蘇木 各一兩

別葱一把
薑二兩

右剉如麻豆大每服抄五錢七以水一盞半煎至
八分去滓温服衣蓋有汗出差若胎不安兼服阿

膠散

黃龍湯〔十六〕 妊婦寒熱頭疼嘿嘿不欲飲食脇下痛

嘔逆痰氣及差後傷風熱入胞宮寒熱如瘧并經水
適來適斷病後勞復餘熱不解

柴胡 一两

黃芩

人參

甘草

炙各一分半

右剉如麻豆大每服抄五錢七水二盞煮取一盞

去滓温服

柴胡石膏湯十七 姪婦寒暑頭痛惡寒身熱不合四

肢疼痛背項拘急唇口乾燥

柴胡

四兩

甘草

二兩炙

石膏

八分

右剉如麻豆大每服抄三錢七以水一盞生薑五

片煎至六分去滓溫服不計時候若氣虛體冷加

人參四兩

枳實散十八 姪婦傷寒四日至六日已來加心疼腹

脹上氣渴不止食飲不多腰疼體重

枳實

一兩炒微黃

麥門冬

半兩去心

陳橘皮

三分湯浸去白穰炒

別心疼腹

脹作心腹

脹悶

別麥冬作

一兩

右剉如麻豆大每服抄三錢七水一盞入生薑半

分葱白七寸煎至六分去滓温服

旋覆花湯 十九 姪婦傷寒頭目旋痛壯熱心躁

旋覆花 半兩 白朮 三分 前胡 一兩去蘆頭 赤芍藥 半兩

黃芩 三分 麻黃 三分去節根 人參 三分 石膏 一兩

右剉如麻豆大每服四錢水一盞半生薑半分煎

甘草 半兩 炙

取六分去滓温服

麥門冬湯 三十 姪婦傷寒壯熱嘔逆頭痛不思飲食

胎氣不安並宜服

人參

一兩

石膏

一兩

前胡

三分

黃芩

三分

別前胡作半兩

葛根

半兩

麥門冬

半兩 去心

右剉如麻豆大每服

抄五錢七水一盞半生薑四

別本作竹葉

片棗子二枚淡竹葉

茹一分取八分去滓溫服

梔子大青湯

三十一

妊婦發斑變為黑色及尿血

大青

杏人

去尖

黃芩

各一兩半

升麻

別本青杏 各半兩

梔子人

各二兩

右剉如麻豆大每服抄五錢七以水一盞半細切

根 別葱白三

葱白三寸煎取一盞去滓温服

蘆根湯

三十二

千金治妊娠熱病頭痛壯熱心煩嘔吐

不下食

知母

四兩

青竹茹

三兩

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半入生蘆

根一握粳米一撮煎至一盞去滓温服盡更作差

止

塗臍法

二十三

治妊娠遭

時疾身大熱塗之令子不落

名伏龍

肝散

竈心中黃土

右用水調塗臍下乾復易塗差乃止一方酒和塗方五寸又泔清和塗之並佳

葱白豉湯

二十四

治妊娠熱病

葱白

二兩半

豉

半斤

右以水三升煮取一分作二服取汗為度

葱白一物湯

二十五

治妊娠熱病主安胎若胎已死者

服之須臾胎出

葱白

二把

右以水一升煮令熟服之取汗食令盡

葛根壹物湯

三十六

治妊婦熱病煩悶

葛根汁

每服一小盞如人行五里再一服如無生者用乾葛

右咬咀煎濃汁服

梔子五物散

二十七

廣濟療妊娠傷寒頭痛壯熱

梔子

前胡

知母

各二兩

黃芩

一兩

白石膏

四兩

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煎至一

盞去滓溫服

別本前胡
六分石膏
十二分知
母四分梔
子四分大
青四分黃
芩五分竹
茹三分葱
白三寸

前胡七物湯 二十六

治妊娠傷寒頭痛肢節煩疼壯熱

前胡

知母

梔子人

各二兩

石膏

四兩

大青

黃芩

各一兩半

甜竹茹

三分

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半葱白三

莖煎至一盞去滓溫服

升麻六物湯

二十九

救急療妊娠七月傷寒壯熱赤斑

變黑溺血

升麻

梔子人

各二兩

大青

杏人

去皮尖

黃芩

各一兩半

右劉如麻豆大每服抄五錢七水一小盞半入葱

白三莖煎至一盞去滓溫服

○產後藥方

陽旦湯

三十

治婦人產後傷風十數日不解頭微痛

惡寒時時有熱心下堅乾嘔汗出

方在十八卷一百一十六

治瘧法

三十一

婦人產後血虛多汗喜中風身體強直

口噤背反張作瘧治之

法在第六卷問中

一方用荆芥穗

不以多少微炒為細末好酒調五錢七服之不過再

服

神功圓

三十二

治婦人產後亡津液大便多秘或譫語

煩躁不可用湯液宜神功圓用青木香湯吞下方在十八

卷六

十八

桂心牡蠣湯

三十三

婦人產後頭疼身體發熱兼治腹

內拘急疼痛

桂心 三兩

黃芩 二兩

白芍藥

乾地黄

牡蠣 煅各五兩

右剉如麻豆大每服抄五錢七以水一盞半煎至

一盞去滓溫服

蜀漆湯

三十四

婦人產後寒熱往來心胃煩滿骨節疼

痛及頭疼壯熱日晡加甚又如瘧狀

黃耆

五兩

生地黄

一斤

蜀漆葉

一兩

桂心

甘草

炙

黃芩

各一兩

知母

芍藥

各二兩

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煎取一

盞去滓溫服

增損柴胡湯

三十五

婦人產後虛羸發熱飲食少腹脹

或往來寒熱等疾

柴胡

三錢

人參

白芍藥

半夏

湯泡

甘草 炙

陳橘皮

川芎

各三分

右剉如麻豆大每服抄四錢七水一大盞生薑三

片棗子一枚煎至七分去滓食後溫服日三

竹葉防風湯

三十六

婦人產後傷風發熱面赤喘而頭

痛

竹葉

半把

防風

半兩

人參

半兩

桂枝

去皮

桔梗

半兩

甘草

炙各半兩

葛根

一兩半

右剉如麻豆大每服四錢水一盞半生薑三片棗

子一枚煎至八分去滓溫服衣蓋汗出差○頸項

金匱方

強加附子炮去皮臍一錢同煎○嘔者加半夏一

錢

三物黃芩湯

三十七

婦人草蓐中傷風四肢苦煩熱頭

疼與小柴胡湯頭不疼但煩與此藥

黃芩

半兩

苦參

一兩

乾生地黃

二兩

右剉如麻豆大每服四錢水一盞半煎至八分去

滓溫服

小柴胡湯

三十八

婦人產後亡血汗多故令鬱冒其脉

微弱不能食大便反堅但頭汗出所以然者血虛而

厥厥而必冒冒家欲解必大汗出以血虛下厥孤陽

上出故但頭汗出所以產婦喜汗出者亡陰血虛陽

氣獨盛故當汗出陰陽乃復所以便堅者嘔不能食

也方在第十二卷二十九

乾薑柴胡湯三十九婦人傷寒經脈方來初斷寒熱如

瘧狂言見鬼

柴胡四兩桂枝一兩括樓根二兩牡蠣一兩
去蘆 半 熬

乾薑一兩甘草炙一兩

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至七公去

別本此方並海蛤散俱在前胡胡當歸湯後一本薑根作二兩

滓温服初服微煩再服汗出而愈

海蛤散

四十一

婦人傷寒血結胃膈揉而痛不可撫近

法當刺期門仲景無藥方此方疑非仲景然其言頗有理姑存焉

海蛤

滑石

甘草

炙各一兩

芒硝

半兩

右搗羅為散每服二錢雞子清調下小腸通利則胃膈血散臆中血聚則小腸壅小腸既壅臆中血不流行宜用此方若小便利血數行更宜桂枝加

紅花二兩發其汗則愈終

成都李煊校字

活人書卷第二十

此一卷論小兒傷寒小兒大人治法一般但小
分劑藥性差涼耳尋常風壅發熱鼻涕痰嗽煩
渴惺惺散主之咽喉不利痰實咳嗽鼠粘子湯
主之頭額身體溫熱大便黃赤腹中有熱四順
散連翹飲三黃圓主之頭額身體溫熱大便白
而酸臭者胃中有食積雙圓主之小兒無異疾
惟飲食過度不能自節心腹脹滿身熱頭痛此
雙圓悉治之小兒身體潮熱頭目碎痛心神煩

濕溫作發

躁小便赤大便秘此劇熱也洗心散調胃承氣湯主之頭疼發熱而畏人惡寒者此傷寒證也升麻湯主之無汗者麻黃黃芩湯有汗者升麻黃芩湯皆要藥也小兒尋常不可過服涼藥胃冷虫動其證與驚相類醫人不能辨往往服進驚藥如腦麝之類逐痰發吐胃虛而成慢驚者多矣小兒須有熱證方可疎轉仍慎用圓子藥利之當以大黃川芎等段咀作湯液以蕩滌蘊熱葢圓子巴豆乃攻食積耳

洗心散 治遍身壯熱頭目碎痛背膊拘急大熱衝
上口苦唇焦夜卧舌乾咽喉腫痛涕唾稠粘痰壅喫
食不進心神躁熱眼澁睛疼傷寒鼻塞四肢沉重語
聲不出百節疼痛大小便不利麩豆瘡時行瘟疫
狂語多渴及小兒天吊風夜驚啼並宜服之

當歸 四兩
炒

芍藥 四兩
生用

甘草 四兩
炙

荆芥 四兩

白朮 一兩
炙

麻黃 四兩
去節炙

大黃 四兩
以米泔水浸一炊
間漉出令乾慢炒取熟

右爲末每服二錢水一盞半生薑一片薄荷二葉

煎至八分放溫
和滓服了仰臥
仍去枕少時如
五臟壅實煎四
五錢七若要澹
轉則熱服

惺惺散 治小兒風熱及傷寒時氣或瘡疹發熱

桔梗

細辛

人參

白朮

甘草

炙

瓜樓根

茯苓

川芎

各等分

右搗羅爲末每服二錢用水一盞生薑二片薄荷

二葉同煎七分服三歲已下作四五服五歲已上

分二服凡小兒發熱不問傷風傷寒風熱先與此

散數服往往輒愈

四順散 三 解大人小兒膈熱退壅盛涼心經

大黃 炙

甘草 炙

當歸 酒洗

芍藥 各等分

右為細末每服二錢水一盞薄荷三葉煎七分温

服小兒量歲數與之

麻黃黃芩湯 四 治小兒傷寒無汗頭痛發熱惡寒

麻黃

去節

黃芩 半兩

赤芍藥

各半兩 甘草 炙

桂枝

去皮各半兩
或作一分

右搗羅為細末每服一錢或二錢暖水調下日進

三服兼治天行熱氣生豌豆瘡不快煩躁昏憤或

出時身尚疼熱

升麻黃芩湯五治小兒傷風有汗頭疼發熱惡寒

升麻

葛根

黃芩

芍藥

各三錢

甘草

一錢
半炙

右剉如麻豆大每服三錢水一盞煎至六分去滓

溫服瀉者不可服若時行瘡豆出不快煩躁不眠者加木香一錢半

甘露飲子六治傷寒壯熱口渴及胃中客熱口臭不

思飲食或饑煩不欲食齒齦腫疼膿血不住口舌咽

中有瘡赤眼目臉重不欲開瘡疹已發未發並宜服之

天門冬 麥門冬 並去心焙 甘草 炙 熟乾地黄

枳殼 麩炒 枇杷葉 去毛 黃芩 生乾地黄

石斛 去苗 山茵陳

右各等分咬咀每服三錢水一盞煎至六分去滓

溫服食後臨卧去滓溫服

雙圓 七 治小兒身熱頭痛飲食不消胃腹脹滿或心

腹疼痛大小便不利或下重數起未差可再服小兒

蒸候哺食減少氣息不快夜啼不眠是腹內不調並宜服此圓下之

甘遂 半兩

硃砂 二錢 別研

蕤核 取人四兩 半別研

牡蠣 二兩 熬

甘草 一兩一分 半炙

麥門冬 去心二兩半

巴豆 六十枚 去皮心膜 研新布 絞去油 日中熬之 白如霜

右麥門冬甘草甘遂牡蠣四味為極細末入巴豆

硃砂蕤人合和一處搗二千杵更入少蜜搗和極

熟旋圓半歲小兒服如荏子大一雙一歲小兒服

如半麻子大分為一雙二歲小兒服麻子大一枚

分一雙三四歲者服麻子大二圓五六歲者服麻子微大二圓七八歲者如小豆大二圓十歲者微大於小豆二圓常以雞鳴時候服如至日出不下者投熱粥飲數合即下藥圓皆雙出也下利甚者濃煎冷粥飲之便止

石膏麻桂湯八治小兒傷寒未發熱欬嗽頭面熱

甘草半兩炙石膏半兩麻黃一兩去節湯泡芍藥半兩

桂心一分黃芩一兩杏仁十枚去皮尖

右咬咀每服二錢水一中盞生薑二片煎半盞去

滓服兒若甚小以意增減之

連翹飲九治小兒一切熱

連翹

防風

甘草炙

山梔子

各等分

右爲末每服二錢水一盞半煎七分去滓溫服

麥門冬湯十治嬰兒未滿百日傷寒鼻衄身熱嘔逆

麥門冬

三分去心

石膏

寒水石

甘草

各半兩炙

桂

三錢半

右剉如麻豆大每服三錢水一盞煎至七分去滓

溫服

十物升麻湯^{十一} 治小兒傷寒變熱毒病身熱面赤口燥心腹堅急大小便不利或口瘡或因壯熱四肢攣掣驚仍作痢疾時發時醒醒後身熱如火者

升麻

白薇

麻黃去根節

萎蕤

柴胡

甘草各半兩炙 黃芩一兩

朴消

大黃

鈎藤各一分

右剉如麻豆大每服三錢水盞半煎至七分去滓下消再煎化溫服

六物黃芩湯^{十二} 治嬰兒腹大短氣熱有進退食不安

安穀爲之不化

黃芩

大青

甘草炙

麥門冬去心

石膏

各半桂三錢

右剉如麻豆大每服三錢水一盞煎七分去滓温

服

五物人參飲

十三

廣濟療小兒天行壯熱咳嗽心腹

脹滿

人參

甘草

各生

麥門冬

去心

生地黄

一兩半如無只用
生乾地黄半兩

右剉如麻豆大每服三錢水一盞入茅根半握煎
至七分去滓溫服

入物麥門冬飲

十四

治小兒天行壯熱欬嗽心煩

麥門冬

三兩
去心

甘草

炙

人參

各一兩

紫苑

升麻

各二兩

貝母

一分半

右剉如麻豆大每服三錢水一盞入茅根半握煎
至七分去滓再入竹瀝少許重煎合和服

棗葉飲

十五

療小兒天行壯熱五日以後熱不歇者

棗葉

半握

豉

一合

麻黃

半兩去根節

葱白

切一合

右件四味用童子小便二盞煎至一盞去滓分作
二服

○小兒瘡疹藥方

此一卷論小兒瘡疹與傷寒相類頭痛身熱足
冷脉數疑似之間只與升麻湯緣升麻湯解肌
兼治瘡子已發未發皆可服但不可疎轉此爲
大戒傷寒身熱固不可下瘡疹發熱在表尤不
可轉世人不學乃云初覺以藥利之宜其毒也
誤矣又云瘡痘已出不可疎轉出得已定或膿

血大盛却用疎利亦非也大抵瘡疹首尾皆不
可下小兒身熱耳冷尻冷咳嗽輒用利藥卽毒
氣入裏殺人也但與化毒湯紫草木通湯解之
子湯出得大盛卽用犀角地黄湯解之若瘡痘
出不快煩躁不得眠者冰解散麻黃黃芩湯升
麻黃芩湯活血散主之瘡黑倒靨猪尾膏無比
散龍腦膏子無不驗也若熱毒攻咽喉痛者如
聖湯瘡痘入眼決明散撥雲散蜜蒙花散通聖
散與蛤粉散主之治瘡疹之法無出此矣

升麻湯 十六 治傷寒中風頭痛增寒壯熱肢體疼痛

發熱畏寒鼻乾不得卧并治大人小兒瘡疹已發未

發皆可服兼治寒暄不時人多疾疹乍暖脫著衣巾

及暴熱之次忽變陰寒身體疼痛頭重如石者 方在第十

六卷

第一

犀角地黄湯 十七 治傷寒及溫病應發汗而不發汗

內有瘀血者及鼻衄吐血不盡內有餘瘀血面黃大

便黑者此方主消化瘀血兼治瘡疹出得太盛以此

方解之 方在第十八

卷八十六

麻黃黃芩湯

〔十八〕

治小兒夫特熱氣生豌豆瘡出不

快益煩躁身重昏憤或瘡出身尚疼熱者

方在本卷第四

升麻黃芩湯

十九

治小兒時行瘡痘出不快煩躁不

眠加木香一錢半

方在本卷第五

化毒湯

二十

治小兒痘瘡已出未出並可服之

紫草

嫩而肥大者佳

升麻

甘草

炙各半兩

右剉如麻豆大作一服以水二盞糯米一撮煎至

一盞去滓量大小溫服

柴草木通湯

〔二十一〕

治小兒痘瘡

紫草

去蘆

木通

人參

茯苓

去皮

糯米

各等分

甘草

半之

右剉如麻豆大每服抄四錢七水一盞半煎至一

盞去滓澄清温温分服

鼠粘子湯

二十二

治痘癍欲出未得透皮膚熱氣攻咽

喉眼赤心煩躁者

鼠粘子

四兩炒香

甘草

一兩炙炒

防風

半兩去節

荆芥穗

二兩

右爲細末每服二錢沸湯點服食後臨卧日進三

服大利咽膈化痰涎止咳嗽若春冬間常服免生

別防風
翠

瘡癩老幼皆宜服

水解散

二十三

治天行頭痛壯熱一二日兼治疱瘡未

出煩躁或出尙身體發熱

大黃

一兩

黃芩

桂心

各一兩

甘草

炙

芍藥

各一兩

麻黃

四兩去節湯泡焙秤

右搗羅爲末患者以生熟湯浴訖以暖水調下二

錢相次二服得汗利便差強實人服二方寸七此

調風實之人三伏中亦宜用之若去大黃卽春夏

通用

活血散 三十四 治瘡子或出不快

白芍藥末 一錢

右用酒調如欲止痛只用溫熟水調下

猪尾膏 三十五 治瘡子倒靨

小猪兒尾尖刺血一兩點入生腦子少許

右同研用新水調下立効

無比散 三十六 治瘡癰惡候不快及黑瘡子應一切惡

候

牛黃 一分
麝香 一分
龍腦 一分
膩粉 一分
研細

硃砂

一兩先
研如粉

右同研細小兒一字大人半錢水銀少許同小獐
猪尾上血三兩滴新汲水少許同調服先甯穩得
睡然後取轉下如爛魚腸蒲桃穗之類涎臭惡物
便安小兒用妳汁滴尤妙

龍腦膏子

三十七

治時疾發疏豆瘡及赤瘡子未透心

煩狂躁氣喘妄語或見鬼神或已發而陷伏皆宜早
治不爾毒入藏必死

梅花龍腦

一錢
生者

右細研旋滴猪心血和圓如雞頭子大每服一圓
心煩狂躁者用紫草湯化下若瘡子陷伏者用溫
酒化下少時心神便定得卧瘡疹發透依常將息
取安也

如聖湯

二十八

小兒瘡疹毒攻咽喉腫痛

桔梗

一兩

甘草

生一兩

牛旁子

炒一兩

麥門冬

去心半兩

右爲細末每服二錢沸湯點細細呷服入竹葉煎

調尤妙

决明散

二十九

治癩豆瘡入眼

半決明子一分 括樓根半 赤芍藥一分 甘草一分

右搗羅為末每服半錢蜜水調下日進三服

撥雲散三十一 治癰疽瘡入眼及生翳膜

桑螵蛸真者一兩炙

右為極細末入麝香少許令勻每服二錢生米泔

水調下臨服卧之

蜜蒙花散三十二 治癰疽瘡並諸毒氣入眼

青箱子 決明子 車前子各半錢 蜜蒙花一錢半淨

右為細末用荜苳一片破開作三片摻藥今勻却

合定作一片以濕紙七重裏煨灰火中煨熟空心

食之

通聖散 三十三 治癩痘瘡入眼及生翳

菜豆皮

穀睛草

去根各一兩

白菊花

二兩如無黃甘菊花代之然不如白菊花

右搗羅為末每服一大錢乾柿一箇生粟米泔水

一盞共一處煎候米泔盡只將乾柿去核喫之不

拘時候一日可喫三箇日淺者五七日可効遠者

半月即愈

