





41540/B

F. XI

18/
P.

Pathumus, Gen. frag
750
22 August





48412

JOSEPHI JACOBI PLENCK,

Chirurgiæ Doctoris, nec non Chirurgiæ, Anatomes atque Artis obstetriciæ Professoris Cæsareo-regii, publici ac ordinarii in Cæsareo-regia Universitate
Tirnaviensi.

D O C T R I N A
D E
M O R B I S
O C U L O R U M.



V I E N N Æ,
A PUD RUDOLPHUM GRÆFFER.

1 7 7 7.

La partie de l'oeil, quoique bornée,
présente une riche moisson, pour occuper long-temps nombre d'observateurs.

Janin.



ILLUSTRISSIMO
AC
MAGNIFICO VIRO
ANTONIO
LIB. BARONI
DE STÖRCK
AUGUSTISS. IMPERATORIS ET IMPERATRICIS A CONSILIIS,
ARCHIATRORUM COMITI,
STUDII MEDICI PRÆSIDI AC DIRECTORI PERPETUO,
PER UNIVERS. ASTR. PROVINCIAS
PROTO - MEDICO,

NOSOCOMII CIVICI PAZMANIANI
PHYSICO.
SOCIET. BOTAN. FLORENT. ACAD. SCIENT. SIEN. ACAD.
PRINCIP. HASS. INSTIT. BONON. ET ACAD. NATUR.
CURIOS. DEGLI AGIATI DI ROVOREDO
MEMBRO &c. &c.

I N.
GRATITUDINIS MONUMENTUM
OB
CHIRURGIAM OCULARIAM
peculiaris sparta ornatam.

*Hacce qualescumque lineas
sacræ vult
AUCTOR.*

Digitized by the Internet Archive
in 2019 with funding from
Wellcome Library

<https://archive.org/details/b30525901>

P R A E F A T I O.

Quamvis inter sensuum organa oculo præstantius, magisque necessarium sit nullum, nescio tamen quo tristissimo fato hæc chirurgiæ pars, quæ divini hu-jus membra ægritudines complectitur, diu adeo manibus empyricorum tradita, relicta que fuerit. Inde promanat ratio cur etiam morborum ocularium doctrina progressum habuerit adeo tardum ac exiguum, ut vix non omnem nostri sæculi Scriptoribus debeamus. Priori enim ævo, quamprimum quis cataractæ depositio-nem, occœcando quamvis ægrotos, per-ficere novit, semet jam medicum ocula-rium evasisse, sibi aliisque vana ostentatio-ne suadebat, ac nullis non oculorum morbis mederi posse, gloriabatur.

Sicque cum corporis nostri nobilissimo instrumento ludebatur, donec summi in arte viri & huic doctrinæ suam operam consecrarent, græcorum, arabumque de hac scientia notitiam perscrutarent, soli-

dissima optices theoremata adhiberent, ipsique salutiferas huic organo manus applicarent. Inter hos clarissimos viros primi existere *Bartisch*, *Saint-Yves*, *Mauchart*, *Boerhaave*, *Petit*, *Davel*, *Sauvages*, *Gerin*, *Gendron*, *Hellman*, *Odheilius* &c. plurimum tamen chirurgia ocularia industriæ Celeber. *Janini*, *Richteri*, & *Potii* debet.

Nec erubesco quin gratus fatear me horum maximorum virorum vestigia presisse, illorumque medellas proposuisse, omissis curationibus invalidis, obsoletis, dubiis, periculosis; hæc enim commentariis transscribo.

Sufficit interim mihi si insignem hujus doctrinæ ambitum, ingentemque morborum oculos infestantium numerum, quorum hicce libellus 118 expedit, in naturalem redegerim ordinem, quo authorum, in diversa abeuntium, opiniones, curationesque proponi, rimarique commode possint.

IN.



INDEX

MORBORUM OCULARIUM.

MORBI SUPERCILIORUM.

13.

- M**adarosis, der Augenbraumausfall.
Phthyriasis, die Augenbraumlausfucht.
Vulnera superciliorum, die Wunden der Augenbraume.

MORBI CILIORUM.

15.

- Trichiasis, die Einwärtskehrung der Augenliederhaare.
Distichiasis, die doppelte Reihe der Augenliederhaare.

MORBI PALPEBRARUM.

17.

- Anchyloblepharon, die Zusammnwachung der Augenlieder.
Symblepharon, die Anwachung der Augenlieder.
Blepharophthalmia, die Augenliedenzündung.
Oedema palpebrarum, die Wassergeschwulst der Augenlieder.
Emphysema palpebrarum, die Luftgeschwulst der Augenlieder.
Ecchymoma, die Blutunterlaufung der Augenlieder.
Atheroma, die Breygeschwulst der Augenlieder.
Sarcoma palpebrarum, das Fleischgewächs der Augenlieder.



- Schirrhūs palpebrarūm**, die Verhärtungsgeschwulst der Augenlieder.
- Carcinoma palpebrarūm**, der Krebs der Augenlieder.
- Carbunculus palpebrarūm**, der Karbunkel der Augenlieder.
- Hordeolum**, das Gerstenkorn.
- Chalazion**, das Hagelkorn.
- Hydatis**, die Wasserblase der Augenlieder.
- Milium**, das Hiersenkorn.
- Morum palpebrarūm**, die Maulbeer.
- Verrucæ palpebrarūm**, die Warzen der Augenlieder.
- Trachoma**, die Augenlidrauhigkeit.
- Blepharoptosis**, der Augenliedvorfall.
- Lagophthalmus**, das Haasenauge.
- Ectropium**, die Auswärtskehrung des Augenlieds.
- Entropium**, die Einwärtskehrung des Augenlieds.
- Psorophthalmia**, die Augenliederflechte.
- Rubor marginum palpebralium**, die Röthe der Augenliederrünfe.
- Tylosis**, die Augenliederkalosität.
- Vulnera palpebrarūm**, die Wunden der Augenlieder.
- Fistulæ palpebrarūm**, die Fisseln der Augenlieder.
- Coloboma**, der Augenliedspalt.
- Nictitatio**, das Blinzen der Augenlieder.
- Spasmus palpebrarūm**, der Krampf der Augenlieder.
- Pruritus palpebrarūm**, das Jucken der Augenlieder.

MORBI VIARUM LACRUMALIUM. 47.

Scheroma, die Trockenheit der Augen.

Epiphora, der Thränenflus.

Lippitudo, das Eitertriefen der Augenlieder.

Hydrops sacci lacrimalis, die Wassersucht des Thränenfacks.

Anchylops, die Augenwinkelgeschwulst.

Aegylops, das Augenwinkelgeschwür.

Fistula lacrimalis, die Thränenfistel.

Encaanthis, die Thränenkarunkelauswachung.

Rhyas, das Schwinden der Thränenkarunkel.

Peribrosis, die Augenwinkelzerfressung.

Lemositas, die Augenwinkelunreinigkeit.

Lacrumatio sanguinea, das Blutweinen.

MORBI MEMBRANÆ CONJUNCTIVÆ. 70.

Ophthalmia, die Augenentzündung.

Ophthalmodinia, der Augenschmerz.

Varicositas conjunctivæ, die Kropfadern der Augen.

Ecchymosis, die Blutunterlauffung.

Pustula, die Eiterblättern.

Phlyctæna, die Wassерblättern.

Papula, die Knoten.

Carunculæ, die Fleischwarzen.

Carbunculus, der Karbunkel.



Ulcus, das Geschwür der weissen Augenhaut.
Aliena oculis illapsa, fremde Körper im Auge.

MORBI CORNEÆ. 90.

- Obscuratio corneæ**, die Verdunklung der Hornhaut.
- Maculæ**, die Flecke.
- Pterygium**, das Augenfell.
- Staphyloma**, das Staphylom.
- Onyx**, das Hornhautappostem.
- Ulceræ corneæ**, die Geschwiire der Hornhaut.
- Fistulæ corneæ**, die Fisteln der Hornhaut.
- Vulnus corneæ**, die Wunde der Hornhaut.
- Rhytidosis**, das Zusammenfallen der Hornhaut.
- Pustulæ**, die Eiterblattern.
- Phlyctenæ**, die Wasserblattern.
- Carunculæ**, die Fleischwarzen der Hornhaut.

MORBI BULBI.

108.

- Atrophia bulbi**, der Schwund des Augapfels.
- Exophthalmia**, das Ochsenauge.
- Ophthalmoptosis**, der Vorfall des Augapfels.
- Carcinoma bulbi**, der Krebs des Augapfels.
- Tetanus bulbi**, der Augapfelkrampf.
- Nystagmus bulbi**, die Augapfelzukung.
- Vulnus bulbi**, die Wunde des Augapfels.
- Defectus oculi**, der Abgang des Auges.
- Oculus supernumerarius**, das überzählige Aug.

MOR-

MORBI IRIDIS.

118.

Mydriasis, die Augensternweiterung.

Myosis, die Augensternverengerung.

Synizesis, die Augensternverwachung.

Synechia, die Regenbogenanwachung.

Ptosis iridis, der Regenbogenvorfall.

Vulnus iridis, der Spalt des Regenbogens.

Deformitas pupillæ, die Ungestattheit des Augensterns.

Pupilla præternaturalis, der widernatürliche Augenstern.

Hippus, die Zuckung des Augensterns.

Immobilitas pupillæ, die Unbeweglichkeit des Augensterns.

MORBI HUMORIS AQUEI. 130.

Hydrophthalmia, die Augenwassersucht.

Hypopyum, das Eiteraug.

Hypoæma, das Blutaug.

Hypogala, das Milchaug.

Turbiditas humoris aquei, die Verdunklung der wässerichen Feuchtigkeit.

Effluvium humoris aquei, der Ausflus der wässerichen Feuchtigkeit.

MORBI LENTIS CRYSTALLINÆ. 139

Cataracta, der graue Staar.

Prolapsus lentis crystallinæ, der Vorfall der Kryallinse.

MOR-



MORBI HUMORIS VITREI. 170

Glaucoma, die Verdunklung der gläsernen Feuchtigkeit.

Synchysis, die Auflösung der gläsernen Feuchtigkeit.

Prolapsus humoris vitrei, der Vorfall der gläsernen Feuchtigkeit.

MORBI RETINÆ seu VISVS. 173.

Photophobia, die Lichtscheue.

Amaurosis, der schwarze Staar.

Amblyopia, das schwache Gesicht.

Nyctalopia, die Tagblindheit.

Hemeralopia, die Nachtblindheit.

Myopia, die Kurzsichtigkeit.

Presbyopia, die Weitsichtigkeit.

Hemiopia, das Halbsehen.

Myodesopsia, das Mückensehen.

Visus reticularis, das Netzsehen.

Visus nebulosus, das Nebelsehen.

Metamorphopsia, das Ungeformtsehen.

Crupsia, das Farbensehen.


Photopsia, das Lichtsehen.

Strabismus, das Schielen.

Luscitas, das schiefe Sehen.

Diplopia, das Doppeltsehen.





DE MORBIS OCULORUM GENERATIM.

Morbi, qui oculos infestant, in *communes* atque in *proprios* dividi solent.

COMMUNES dicuntur, qui in pluribus nostri corporis partibus eodem modo ut in oculis observantur.

PROPRII sunt, qui solis in oculis inveniuntur, & a morbis communibus sua indole differunt.

Consultissimum esse duco, si singulæ partis morbos, tum *communes* tum *proprios*, ordine anatomico, quo partes oculi locantur, consideremus.

MORBI SUPERCILIORUM

MADAROSIS.

Est superciliorum & ciliorum desfluvium vel defecatus. A)

E.F.

A) Vox est græca α μαδαρὸς glaber. dicitur etiam *Ptilosis* α πτιλός calvus. Aliis hic morbus vocatur *Milphosis*.

EFFECTUS morbi sunt ingrata deformitas & fortioris lucis intolerantia.

SPECIES madaroseos sunt

1. MADAROSIS SPONTANEA, quæ lepræ, elephantiasis, atque luis venereæ inveteratæ symptoma est. Hæc madarosis censetur incurabilis ob bulbos pilorum acrimonia destructos.
2. MADAROSIS A RASURA SUPERCILIORUM. In hac specie supercilia iterum intra duos annos renascuntur. A)
3. MADAROSIS AB EVULSIONE CILIORUM, ut in trichiasi contingit. Etiam cilia evulsa at rigidiora recrescunt.

PHTHIRIASIS SUPERCILIORUM.

Est pediculorum latorum in superciliis & tarsis ciliorum nidulatio. B)

Hoc vitium est infantibus familiare, atque plerunque immundicie debet.

CURATUR unguento mercuriali, quod locis obsessis aliquoties illiniri debet. Laudatur etiam oleum spicæ.

VUL.

A) Illustr. HALLERI *Physiolog.* T. V. p. 38.

B) Illustr. SAUVAGES *Nosologia methodica edit.* in 4. T. II. p. 603. in phthyriasi interna totius corporis, pediculi ipsis ex oculis proveniebant.

VULNERA SUPERCILIORUM.

Vulnera supercilio illata, quandoque gravia indu-
cunt symptomata. A)

SPECIES sunt

1. VULNUS SIMPLEX, ubi sola integumenta læsi
sunt. Hæc vulnera blepharoptosim causant,
si palpebra superior a curatione longior ma-
net, & lagophthalmum, si a cicatrice nimis
arcta brevior evadit. Hinc ne hæc mala orian-
tur vulnus tale est legitime uniendum & con-
solidandum.

2. VULNUS COMPLICATUM CUM LÆSIONE NER-
VI FRONTALIS, qui a foramine superciliari
egreditur. Hæc læsio amaurosim infert, quæ
utplurimum sub vulneris sanatione primum
oritur. V. *Amaurosis a vulnere superciliii.*

MORBI CILIORUM.

TRICHIASIS.

Est directio ciliorum versus oculi bulbum. b)

Ra-

a) PLATNER *Prolusio de vulneribus superciliis illatis.*
Opusc. T. 2. & GENGA anatomia chirurgica p. 239.

b) Dicitur etiam trichosis a grise pilus. V. CORTUM
Diss. de trichosi, & HEISTERI Diss. de trichiasi oculorum.



Rarissime in superiori, ut plurimum in inferiori tarso
palpebrarum hoc vitium deprehenditur.

CAUSA hujus mali est quandoque nativa, quandoque
callositas aut cicatrix ciliis directionem dat
iniquam.

EFFECTUS hujus morbi sunt conunctivæ atque cor-
neæ perpetua sub omni nictitatione irritatio,
inde immanis dolor, inflammatio oculi, ulce-
ra, maculæ, opacitas corneæ, quandoque cæ-
citas.

SPECIES trichias eos sunt

1. **TRICHIASIS TOTALIS**, quando cilia omnia in-
trorsum vergunt.

2. **TRICHIASIS PARTIALIS**, si solummodo quæ-
dam cilia fasciculi ad instar versus oculi bul-
bum dirigantur.

Curatio radicalis exigit destructionem bulborum.

Hinc 1. ope peculiaris volfelliæ evellantur ci-
lia, sensim ac interpolitis diebus, dein 2. po-
rus evulsi cilii vel seta porcina vel mediante te-
nui penicillo impletatur solutione lapidis in-
fernalis, vel spiritu salis ammoniaci vel solu-
tione pastæ depilatoriæ A) vel acu candente
tangatur.

Frustra resecantur cilia, nam rigidiora recrescunt.

Frustra mediante emplastro cilia palpebræ ag-
glu-

A) PIENCK *Pharmacæ chirurgica* p. 248.

glutinantur, nam ablato emplastro brevi iterum in vitiosum situm redeunt.

3. TRICHIASIS A DISTICHIASI, est rarissima trichiaeos species. V. *Distichiasm.*

4. TRICHIASIS AB ENTROPIO, hæc species symptomæ est entropii, frequentissime observatur, & exigit curationem introversi tarsi palpebralis. V. *Entropium.*

DISTICHIASIS.

Est duplicita series ciliorum, quarum una extrotsum, altera introrsum versus oculi bulbum crescit.

CAUSA proxima est vitium primæ conformatio-
nis, qua vitiosus numerus & situs bulborum ori-
tur. Effectus sunt ut in trichiasi.

CURATIO rariissimi hujus morbi exigit ut interna
series ciliorum extirpetur evulsione & erosio-
ne ut in trichiasi suasimus.

MORBI PALPEBRARUM.

ANCHYLOBLEPHARUM.

Est palpebrarum in suis tarsis concretio. A)

B

Hæc

A) Ab ἀγκύλῃ concretio & φλεψι, palpebra.



Hæc concretio vel *totalis*, si integra palpebrarum commissura, vel *partialis* vocatur, quando solum pars quedam hujus commissuræ concreta est.

SPECIES hujus mali sunt

1. **ANCHYLOBLEPHARUM CONGENITUM**, quod in infantibus recens natis observatur. Tarsi palpebrarum in hac specie ut plurimum in solo angulo externo ad dimidium commissuræ cohaerent.

CURATIO anchyloblephari exigit dissectionem marginum palpebralium, hæc facillime, palpebris diductis, ope cultelli cum cuspide capitato peragitur.

2. **ANCHYLOBLEPHARUM ADVENTITIUM**, quod a prægressa inflammatione, ambustione, vel erosione marginum palpebralium oritur.

Dissectio in anchyloblepharo totali cum cultello acuto incipitur, & dein cum cultello capitato juxta commissuram palpebralem continuatur. Vulnus vino tepido exsiccatur.

3. **ANCHYLOBLEPHARUM SPURIUM**. Est apparens palpebrarum concretio, in qua margines & cilia palpebrarum spisso glutine puriformi, e glandulis Meibomianis exsudante, tempore somni vel oculis diu clausis firmiter agglutinantur. Est symptoma lippitudinis & variolarum.

CURATIO exigit humectationem concretionis cum laete tepido & dein curationem lippitudinis.

V. *Lippitudo.*

SYMBLEPHARUM.

Est palpebræ concretio cum oculi bulbo.

Hoc malum potissimum in superiori, rarissime in inferiori palpebra observatur.

CAUSÆ hujus concretionis sunt vitium *malæ conformatio-*
nis vel *ulceratio corneæ*, *conjunctivæ*
vel *internæ palpebrarum superficiei*, aut *scuri-*
ficatio, vel *ambustio oculi*, præsertim si oculi
diu clausi manent.

1. **SYMBLEPHARUM TOTALE**, quando tota palpebra bulbo, id est *conjunctivæ* & *corneæ* adhæret. Hoc malum nisi recens sit, incurabilem inducit, etiam discisis partibus, cæcitatem. Concretus enim *corneæ* locus, opacus manet.

2. **SYMBLEPHARUM PARTIALE**, quando solum particula quædam palpebræ cum *conjunctiva* vel quod pejus est, cum *cornea* cohæret.

CURATIO, exigit ut bene protracta palpebra operculelli a parte concreta separetur.

Post dissectionem serventur oculi aperti, moveantur saepius & illiniantur cremore lactis vel linimento ex butyro, & tutia, ne iterum accretio fiat.



BLEPHAROPHTHALMIA.

Est inflammatio palpebrarum.

SPECIES hujus morbi sunt

1. BLEPHAROPHTHALMIA VIOLENTA, quæ contusionem vel vulnus palpebrarum, aut extractionem cataractæ sequitur. Curatur fomento ex herbis cephalicis vino infusis.

2. BLEPHAROPHTHALMIA AB ICTU INSECTI, ut vespæ vel apis. Curatur aqua frigida, forma fomenti oculo applicata.

3. BLEPHAROPHTHALMIA SPONTANEA, quæ a depositione alicujus acrimoniæ oritur. Committatur erysipellas faciei, hordeolum, lippitudinem & stadium variolarum suppuratorium.

CURATIO exigit purgantia, & alia derivantia ab oculis.

OEDEMA PALPEBRARUM.

Est intumescentia palpebrarum cuti concolor, indolens, mollis, digitii impressi foveam retinens.

CAUSA PROXIMA est roris aquosi congestio in tunica cellulosa palpebrarum.

Hoc malum est utplurimum symptoma alijs morbi.

SPECIES sunt

1. OEDEMA SYMPTOMATICUM, quod anasarcæ & clorozeos est symptoma. Curatur roborantibus.

2. ODE-

2. OEDEMA IDIOPATHICUM, quod a causa ipsis
in palpebris hærente, ortum est. Cataplasmata
emollientia palpebras sæpe oedemato-
sas reddunt. *Curatio* exigit roborantia ex-
terna.

EMPHYSEMA PALPEBRARUM.

Est palpebrarum intumescentia ab aere in tellam cel-
lulosam insinuato.

Hoc malum horrendum in modum palpebras inflat
ac semper emphysematis universalis, aut phyo-
cephali est symptomata.

CURATUR ablata emphysematosi. V. in chirurgia
tumores aëreos.

ECCHYMMOMA PALPEBRARUM.

Est palpebrarum intumescentia livida, a sanguine in
membranam cellulosam effuso.

SPECIES ecchymomatum palpebralium sunt

1. ECCHYMMOMA VIOLENTUM, quod a contusio-
ne oculi & palpebrarum nascitur. *Curatur*
venæflectione & fomento ex herbis cephalicis
vino infusis.

2. ECCHYMMOMA CONSECUTIVUM, quod contu-
sionem frontis vel syncipitis non primo sed
tertio vel quarto die, a defluente in tella cel-
lulosa cruento, sequitur. *Curatur* ut prior spe-
cies.



3. ECCHYMOMA SPONTANEUM, est livor palpebrarum, qui scorbuticos, puellas menstruantes aut opilatas, gravidas, atque alios morbos internos committatur. Curatio exigit ablationem morbi primarii.

ATHEROMA PALPEBRARUM.

Est tumor cysticus, materiem pultaceam continens, qui in palpebra superiori versus canthum oculi temporalem ut plurimum nasci solet.

Hic tumor est mobilis, indolens, cuti concolor. Quandoque magnitudinem nucis avellanæ, quandoque nucis juglandis habet. Subinde autem palpebram integrum in magni farciminis formam distendit.

CURATIO. Incipientis atheromatis resolutio spiritu saponaceo tentari potest, adulto tumori solus culter opitulatur.

Cutis saccum tegens, in plicam elevata transversim discindatur, dein saccus a tella cellulosa totus separetur, & extrahatur, vel faltem magna portio ex eo exscindatur, & vulnus suppuratione aliquantum protracta sanetur. A)

SAR.

A) Non semper necessarium est, ut infima cystidis pars exscindatur, hæc enim suppuratione consumpta saepe vel sua sponte exit, vel per ipsam suppurationem con-

SARCOMA PALPEBRARUM.

Est tumor carneus e palpebra excrescens.

SPECIES sunt

1. SARCOMA PENSILE, quod mediante pedunculo e palpebra pendet. *Curatur ligatura pedunculi.*
2. SARCOMA SESSILE, quod palpebræ lata basi adhæret, *curatur sola excisione totius tumoris.*

SCIRRUS PALPEBRARUM.

Est tuberculum durum in superiori utplurimum palpebra.

SPECIES sunt

1. SCIRRUS BENIGNUS, qui mobilis, cuti concolor & indolens est. *Curatur interno usu extracti cicutæ, externe emplastrum de cicu-*

B 4

ta

consumitur. Puer 6. annorum, atheromate magno palpebrali laboranti, facta incisione cutis ob pueri nimiam agitationem, solummodo superiorem portionem sacci auferre potui, tumor tamen jam a biennio integre curatus manet. Idein mihi sucessit in atheromate buccæ sinistriæ, quod ductui salivali insidebat, qui prohibuit ne inferiorem sacci partem exscinderem. Tumor tamen jam a decenio perfecte curatus manet, licet nec integrum saccum exciderim, nec vulneri causticum impo-
suerim.

ta cum pulvere belladonæ mixtum applicetur.

2. **SCIRRHUS MALIGNUS**, qui lacinans, & live-scens est. Si cicuta nil juvat, sola excisio tumoris prodest, ne tumor in cancrum abeat.

CANCER PALPEBRARUM.

Est tuberculum vel uicus malignum in palpebra ut plurimum superiori, quod acrimoniam cancro-fam continet.

SPECIES teterrimi/ hujus morbi ut plurimis lathalis sunt

1. **CANCER SCIRRHOSUS**, est tuberculum in palpebra durum, tuberosum, lacinans, frequenter varicibus lividis circumbatum.
2. **CANCER VERRUCOSUS** est verruca lacinans, lida, varicosa,
3. **CANCER NERVEUS**, oritur ex papula livido-rubente & lacinante, quæ lente, ut verruca cancrofa in ulcus late serpens, dolens, diversicolor cum margine calloso, lacero & retorto abit.

CURATIO exigit medicamenta specifica, ut cicutam, belladonam, flamulam jovis, succum sedi acris, gentianam.

Si hisce remediis malum non cedat, excindatur tumor, si nulla contraindicatio operationem inutilem declareret.

CAR-

CARBUNCULUS PALPEBRARUM.

Est tuberculum inflammatorium in palpebra, quod intra paucos dies in gangrenam abit.

Hoc malum a peculiari miasmate oritur.

CURATIO exigit internum usum corticis peruviani cum aceto camphorato. Externe scarificato tumor unguentum de styrace & camphora applicetur, ac desuper fomentum ex aqua vegetominerali & cort. peruv. ponatur.

HORDEOLUM.

Est tuberculum inflammatorium, parvo furunculo simile, in margine palpebrarum. A)

CAUSA PROXIMA est inflammatio glandulæ Meibomianæ.

CAUSÆ REMOTÆ sunt ingestæ acria, spirituosa b) transpiratio suppressa, depositio acrimoniae venereæ, scrophulosæ.

PROGNOSIS. Est vitium infantibus familiare, raro resolvitur, ut plurimum abit in suppurationem, quandoque saepius in anno recurrit, & chalazion induratum relinquit.

CURATIO. Incipiens hordeolum quandoque aqua vegetominerali & dato purgante resolvi potest. Si

B 5

vero

A) Græcis vocatur crithe.

b) Novi hominem, qui quotiescumque spiritum vini bibit, hordeolo afficitur.



vero resolutio intra 24 horas non efficiatur; suppuratio est promovenda, hinc applicetur hordeolo frustillum emplastri diachilon simplicis & cataplasma emolliens.

Hordeolum bene maturum intra digitos leniter comprimatur, ut pus exeat, remanens duries, eodem emplastro penitus auffertur.

HORDEOLUM s^epius *recurrens* a saburra primarum viarum, ab acrimonia venerea vel scrophulosa est. Hinc interne his causis contraria remedia præscribantur.

CHALAZION.

Est tuberculum indolens, cuti concolor, mobile, in margine palpebrarum. A)

SPECIES chalazii sunt

1. **CHALAZION SCIRRHOSUM**, quod tuberculum inæquale & durum est, ut plurimum a male curato hordeolo oritur. *Curatio.* Resolutio tentetur emplastro saponato, vel emplastro ciutæ composito, vel aqua vegeto minerali. Si resolutio non obtineatur, tentetur *suppuratio* tumoris emplastro semivesicatorio.

2. **CHALAZION CANCROSUM**, est tuberculum tuberosum, lacinans, live-scens, oritur ab acrimonia cancrosa, tractetur ut *cancer* palpebrarum.

3.

A) Latinis vocatur *grando*.

3. CHALAZION CYSTICUM, est tuberculum æquale, molle, indolens, cuti concolor. Curatio triplici modo fit.

I. Resolutione, hæc spiritu saponato, vel emplastro saponato, aut cicutæ composito, aut unguento basiliconis cum camphora, tentari potest.

2. Erosione tumoris mediante particula minima lapidis caustici & dein continuato digestivo acri.

3. Incisione tumoris horizontali. Aliquot dies promoveatur suppuratio incisi facci, sic foccus facillime eximi potest. A)

4. CHALAZION TERREUM, est tuberculum durissimum, terram continens, sola incisione tumoris noscendum & curandum. b)

HYDATIS PALPEBRARUM.

Est vesicula aliquantum pellucida, aquam continens, margini palpebrarum, ut plurimum solitaria, insidens.

CAUSA PROXIMA est elevatio epidermidis ab humore aquoso.

CURATIO exigit incisionem vesiculæ & exsiccationem, quæ guttula aquæ vitriolatæ, vel extracti saturni fieri potest.

MI-

a) Cel. SCHMUCKER chirurgische Wahrnehmungen I. Tb.
S. 568.

b) Dicitur etiam litbiasis seu lapis palpebralis.



MILIUM PALPEBRARUM.

Est minimum tuberculum albicans & durum, semini milii magnitudine æquale.

CAUSA PROXIMA est materia atheromatosa sub epidermide collecta.

CURATIO. Cuspide lanceolæ incidatur epidermis, sic mollecula dura albicans exprimi potest.

MORUM PALPEBRARUM.

Est tuberculum rubrolividum, molle, ac indolens, quod morum refert, atque palpebræ, ut plurimum superiori, insidet.

Hoc vitium semper a nativitate est. De curatione V. nævios in doctrina de morbis cutaneis.

VERRUCÆ PALPEBRARUM.

Sunt verrucæ palpebris vel earum marginibus insidentes.

Huic malo præsertim vetulæ sunt obnoxiæ. A) Quandoque admodum magnæ evadunt & blepharoptosim, atque in prædispositis cancrum palpebrarum faciunt.

Frequentissimæ SPECIES sunt

I. VERRUCÆ PENSILES, quæ pedunculum habent; afferuntur ligatura vel abscissione.

2. VER-

A) HEISTER Institut. Chirurgic. P. 1. p. 537.

2. VERRUCÆ SESSILES, quæ lata basi cuti insident. Curantur excisione. V. doctrina de morbis cutaneis.
3. VERRUCÆ CANCROSÆ, quæ dolentia, livida, varicosa sunt; de curatione V. cancer palpebrarum.

TRACHOMA.

Est asperitas in interna palpebrarum superficie. A)
EFFECTUS sunt ingens ophthalmia & dolor immannis, quotiescumque palpebræ nictitant, ut de trichiasi diximus.

SPECIES sunt

1. TRACHOMA SABULOSUM, ut ab illapso sabulo, tempore ventoso itinerantibus, in via sabulosa contingit. Praecavetur larva cum oculis vitreis, curatur elutione oculorum cum aqua vegetominerali.
2. TRACHOMA CARUNCULOSUM, quod a carunculis, seu minimis verrucis carneis in interna palpebræ superficie enatis, oritur. Curatur carunculis forfice abscissis. B)

3. TRA-

A) *Trachoma* derivatur a *τραχόν* *aspero*.

B) Hæc species trachomatis vocatur etiam *morum palpebræ internæ*, quia interna palpebræ superficies mori ad instar tuberculosa, & lividorubra evadit, Aliis hæ carunculæ *pladaretes* dicuntur.



3. TRACHOMA HERPETICUM , quod a pustulis duris in interna palpebrarum superficie enatis, excitatur. a) Curatur unguento cum mercutio præcipitato rubro. Interne sublimatus corrosivus vel sulphur auratum antimonii cum mercurio dulci b) detur.

BLEPHAROPTOSIS.

Est prolapsus palpebræ superioris , adeo ut corneam tegat , & æger oculum penitus aperire dormientis adinstar nequeat.

EFFECTUS est vitium deforme , intuitui nocens & luscitatem etiam sanato morbo relinquens.

SPECIES hujus morbi sunt

I. BLEPHAROPTOSIS AB ATONIA seu RELAXATIONE MUSCULI LEVATORIS PALPEBRAE SUPERIORIS , c) causæ sunt chlorosis , omnis debilitas totius corporis , longa quies palpebrarum ab oculo diu deligato , cataplasma emollientia. Curatur fomento ex aqua frigida. Interne detur cortex cum valeriana & marte.

2. BLE-

a) Hic affectus etiam *sycosis* seu *palpebra ficosa* dicitur, quia interna palpebræ superficies ficus discissi adinstar granulosa evadit.

b) PLENCK, *Lebre von den Hautkrankheiten* p. 106.

c) Vocatur etiam *prosis* seu *prolapsus palpebrae superioris* , & græcis quibusdam *Atoniatonblepharon*.

2. BLEPHAROPTOSIS PARALITICA seu A PARALYSI

MUSCULI LEVATORIS. Ut plurimum simul amaurosis adest, atque paralysis genæ ejusdem lateris, linquæ & maxillæ vel symptoma est apoplexiæ, paraplegiæ. Oritur quandoque a suppressione menstruorum, hæmorrhoidum aut contusione superciliæ. Curatio exigit antiparalytica & curationem morbi primarii, tentetur ergo *interne* arnica, *externe* aqua frigida, embroche, vinum roborans JANNINI, electricitas applicetur. Fricetur supercilium cum liquore anodyno minerali & tintura succini aut oleo fœniculi.

3. BLEPHAROPTOSIS SPASMODICA seu A CONTRACTIONE SPASMODICA MUSCULI ORBICULARIS PALPEBRARUM.

Hæc species subito aggreditur & remittit, est hypochondriacis, hysterics & verminosis familiaris; etiam a sola saburra ventriculi quandoque oritur.

Curatur purgante, & dein datis nervinis aut antispasmodicis. V. *Spasmus palpebrarum*.

4. BLEPHAROPTOSIS A TUMORE PALPEBRAM SUO

PONDERE DETRAHENTE, atheroma, lipoma, Scirrus palpebræ superioris huc refertur.

Curatio exigit excisionem tumoris.

5. BLEPHAROPTOSIS AB INTUMESCENTIA TOTIUS PALPEBRAE SUPERIORIS.

Inflammatio, oedema, emphysema, ecchymoma palpebræ huc



huc pertinet. *Curatio* exigit purgantia & externe fomenta discutientia.

6. BLEPHAROPTOSIS A PROLONGATIONE CUTIS PALPEBRALIS. Hæc prolongatio quandoque vitium connatum est; quandoque vulnus transversale palpebræ, male sanatum, sequitur. Sæpe autem causa ejus latet.

Distinguitur ab atonia musculi levatoris, quod hic cute palpebræ in plicam digitis elevata, illico se contrahat, in atonia autem musculus etiam elevata cute relaxatus manet.

Curatio palliativa. Cutis palpebræ per emplastrum tenax ad frontem elevata firmetur.

Curatio radicalis exigit, ut cutis palpebræ in transversalem elevetur plicam, hæc plica cultro transversim abscindatur, demum vulnus cutis emplastro adhæsivo bene uniatur, & sic sanetur. a)

7. BLEPHAROPTOSIS A VULNERE MUSCULI LEVATORES PALPEBRÆ, vel FRONTALIS transversim dissecto, curatur sutura vulneris.

8. BLEPHAROPTOSIS PERIODICA, quæ certo tempore reddit. *Curatur* purgantibus, roborantibus, & cortice peruviano. b)

LA-

a) *Instrumentum BARTISCHIANUM* pro hac operatione inventum a CEL, RUY SCHIO & HEISTERO emendatum non est necessarium, est incommodum & palpebras nimium contundit.

b) CEL. CAUTVEL blepharoptosim qualibet nocte cum epi-

❧ ❧ ❧

LAGOPHTHALMUS.

Est impotentia palpebras penitus claudendi. A)

EFFECTUS. Cornea ab illabente pulvere exsiccatur & paullatim obscura evadit.

SPECIES hujus morbi sunt

1. LAGOPHTHALMUS SPASMODICUS seu a spasmo musculi levatoris palpebræ superioris. Hæc species in hystericis, hypochondriacis, verminosis, morbis convulsivis, & quandoque in febribus acutis observatur. Curatio exigit antispasmodica & curationem morbi primarii, externe cataplasma emolliens ac anodynū convenit.

2. LAGOPHTHALMUS PARALYTICUS seu a paralysi musculi orbicularis palpebrarum, qui antagonista musculi levatoris est, hinc levator perpetuo se contrahit. Curatur antiparalyticis, arnica.

3. LAGOPHTHALMUS AB ATONIA MUSCULI ORBICULARIS PALPEBRARUM. Hæc species in senibus & hominibus jejunio, vigiliis, morbo, inanitione valde debilitatis, observatur.

C

Cu-

epiphora mucosa recurrentem refert, quam aquæ bellucanæ, nuchiæ affusæ, sanarunt. *Philos. Transact.* 1738. n. 449.

A) Α λαγώς lepus & ὁ φράλυος oculus, hinc latinis *oculus leporinus* vocatur, quia lepores apertis oculis dormire creduntur.



Curatio interna exigit roborantia & nutrientia.

Externe ut in lagophthalmo paralytico oleum fœniculi, balneum oculi frigidum, vinum roborans convenit.

4. LAGOPHTHALMUS A FISSURA PALPEBRÆ LONGITUDINALI, qua musculus orbicularis divisus est. Hæc divisio vel a vulnero, vel a colobomate originem habet, exigit curationem fissuræ. *V. vulnera palpebrarum & coloboma.*

5. LAGOPHTHALMUS AB EXOPHTHALMIA, qua palpebras diducit. Huc etiam referri potest *magna encanthis*. *Curatio* exigit ablationem morbi primarii.

6. LAGOPHTHALMUS A TUMORE INTER ORBITAM & MUSCULUM LEVATOREM PALPEBRÆ. Talis tumor sua pressione musculum irritat, & abbreviat. Noscitur tactu, & *curatio* exigit excisionem.

7. LAGOPHTHALMUS A CONTRACTILITATE MUSCULI LEVATORIS PALPEBRÆ. Sic infantes, in cunis cum vertice versus fenestras locati, ex mala consuetudine sursum, ut lucem videant, intuendi, adeo musculum levatorem contractilitate afficiunt, ut lagophthalmi evadant.

Curatio exigit ut versus lucem locentur, & ut emplastris tenacibus palpebra superior versus genam

genam agglutinata, per aliquot septimanas deorsum trahatur.

8. **LAGOPHTHALMUS A CICATRICE**, quam vulnus, ulcus vel ambustio in palpebris, gena vel fronte relinquit, & quæ cutem palpebræ valde contrahit. Si emollientia & emplastra detrahentia ad curationem non sufficient, instituatur mox dicenda operatio.

9. **LAGOPHTHALMUS A NATIVA BREVITATE CUTIS PALPEBRARUM.** Sedes brevitatis semper in sola cute, nunquam in musculo levatore esse solet. Curatio exigit ut cutis elongetur; si hæc elongatio per cataplasma & unguenta emollientia, atque simul applicatis emplastris tenacibus, ut mox diximus genæ & papebræ superiori abbreviatæ affixis, non possibilis est, tunc operatio institui debet.

Fiat nempe incisio transversalis per totam palpebram superiorem, & quidem in loco ubi palpebra plicam transversalem format.

2. Dein labium vulneris superius per emplastrum tenax ad frontem, labium autem vulneris inferius per aliud emplastrum ad genas, quantum fieri potest, detrahatur & agglutinetur.

3. Si prolongatio cutis nondum sufficiat statim secundum infligatur vulnus transversale in palpebra, & etiam emplastro deorsum glutinetur ad genam.



4. Sic vulnus cum lata cicatrice consolidetur.

IO. LAGOPHTHALMUS PARTIALIS. Quandoque cutis palpebræ non in tota palpebra, sed solummodo in externa vel interna palpebræ commissura nimis brevis est. Id etiam vel a vitio connato, vel a cicatrice oritur. In hac specie *incisio transversalis* non in tota palpebra, sed in solo loco abbreviato instituitur.

ECTROPIUM.

Est palpebræ utplurimum inferioris extraversione, qua interna harum superficies adeo extorsum agitur, ut hæc sub forma carnis rubræ in conspectum prodeat. A)

Vitium hoc utplurimum in inferiori palpebra, rarissime in superiori deprehenditur, & rarissime utrumque oculum afficit.

EFFECTUS ectropii sunt fæda deformitas, ac si caro rubra ex oculo prominaret, perpetua lacrimatione, bulbi sordities & non raro inflammatio, demum callosa degeneratio carnis rubræ.

CAUSA PROXIMA est nimia cutis, palpebram formantis, brevitas.

SPE-

A) Derivatur ab ἐκτρέπω evertō. Gallis dicitur *Renversement*. V. KECK diss. de ectropio in *Collect. Halleiana* T. I.



SPECIES ectropii sunt

I. ECTROPIUM AB INTUMESCENTIA MEMBRANA
NÆ INTERNÆ PALPEBRALIS, quæ in scro-
phulosis, venereis, catarrhosis, & ophthal-
mia humida diu laborantibus observatur.

*Curatur medicamentis internis specificis, prout
varia est acrimonia.*

*Externe I. applicentur adstringentias ut aqua
frigida, vel vitriolata, vel aluminosa.*

2. Caustica ut solutio lapidis infernalis vel bu-
tyrum antimonii, quo ope penicilli tu-
mor illiniri debet.

3. Scarificetur intumescentia & altero die ap-
plicetur unguentum ophthalmicum cum
præcipitato rubro, ut intumescentia per sup-
purationem consumatur.

4. Si hæc medicamenta nil juvent, tunc opti-
mum est, ut membrana tumida volsella
in plicam transversalem elevetur, & cul-
tello transversim exscindatur.

Facta operatione linteolum liquore vegetomi-
nerali madidum intra palpebram & bulbum
oculi ponatur, ne hæ partes concrecant.
Palpebræ autem linteolum & fascia per
aliquot dies applicetur.

2. ECTROPIUM A CICATRICE vel in PALPEBRA
INFERIORI vel in GENA. Hinc vulnera, ul-
cera, & ambustionem harum partium sequi-
tur.



tar. Si malum leve est, emolliatur unguento de althea cutis palpebræ & ope emplastri diachilon ad oculum apprimatur, si vero hæc methodus non succedit, fiat excisio membranæ internæ.

3. ECTROPIUM A NATIVA BREVITATE CUTIS EXTERNAM SUPERFICIEM PALPEBRÆ FORMANTIS. In hac specie membrana interna palpebræ nimis longa est & tumida. Hinc si per adstringentia contrahi nequeat, optimum est, ut pars hujus membranæ transversim excindatur.

Incisio cutis externæ & vulneris diductio ope emplastrorum adhæsivorum fere semper incassum tentatur. A)

4. ECTROPIUM A VULNERE vel ULCERE COMMISSURÆ INTERNÆ PALPEBRARUM. Sub actione musculi orbicularis dilatatur vulnus & interna membrana evertitur, hæc species ectropium partiūle dici potest. Idem etiam observatur si coloboma vel fissura in medietate palpebræ inferioris est.

Curatio hujus speciei exigit curationem vulneris, ulceris vel colobomatis, quos morbos vide in suis locis.

§. Ec-

a) *Memoires de l' Acad. de Chirurgie de Paris T. V.*

5. ECTROPIUM AB ATONIA MUSCULI ORBICULARIS PALPEBRARUM. Quod vitium s^ape in senibus, vetulis & ophthalmia humida diu laborantibus observatur. Curatur roborantibus internis ut cortice & valeriana, externe aqua frigida & alia roborantia adhibeantur. At in senibus curatio vix possibilis est.
6. ECTROPIUM A SARCOMATE IN INTERNA SUPERFICIE PALPEBRÆ, quod s^ape ex ulceribus huus internæ membranæ excrescit. Curatio exigit excisionem sarcomatis & excisionem ulceris.
7. ECTROPIUM AB AATHEROMATE IN PALPEBRÆ SUPERFICIE INTERNA, quod tactu noscitur. Curatio exigit excisionem tumoris.
8. ECTROPIUM AB EXOPHTHALMIA, vel ENCANTHIDE, quæ palpebram inferiorem extorsum & deorsum premit. Curatur ablatione morbi primarii.
9. ECTROPIUM SIMULATUM, vidi puerum, qui digitis omnes quartuor palpebras sibi invertebat.

ENTROPIUM.

Est palpebræ intraversio, qua tarsi palpebrarum cum ciliis versus oculi bulbum introvertuntur.

EFFECTUS huus mali sunt deformitas, trichiasis atque pessima ophthalmia. V. Trichiasis.



SPECIES sunt

**I. ENTROPIUM A CONTRACTIONE MÈMBRANÆ
INTERNAE PALPEBRARUM**, qua hæc nimis
brevis evadit & tarsum invertit.

Curatio exigit ut cilia evellantur & ophthalmia sopiaatur, dein externa cutis palpebræ transversim dissecetur, vel portio quædam cutis transversim excindatur; ac vulnus per emplastrum illico uniatur & sanetur. A)

**2. ENTROPIUM A CICATRICE membranæ inter-
næ palpebrarum**, quæ ulcera curata sequitur.
Curatur priori methodo.

3. ENTROPIUM A TUMORE PALPEBRALI, qui
tarsum cum ciliis introrsum premit. *Curatio*
exigit extirpationem tumoris.

PSOROPHTHALMIA.

Est scabies palpebras, earumque margines absidens.

CAUSA PROXIMA est depositio acrimoniæ variæ ad glandulas palpebrarum.

SPECIES psorophthalmiæ sunt.

I. PSOROPHTHALMIA CRUSTOSA, quæ crustas siccas vel humidas in marginibus palpebrarum format. *Curatur* lacte camphorato forma fermenti oculo applicato. *Interne* dentur purgantia & purificantia.

2. Pso-

A) Cel. ACREL plura entropia sic sanavit. V. ejus *Bemerkungen*.

2. PSOROPHTHALMIA HERPETICA , quæ papulas parvas admodum prurientes & in squammas abeuntes exhibit. Curatur aquæ vegetominali camphorata , sulphurea, mercuriali. A)

RUBOR MARGINUM PALPEBRA- LIUM.

Est rubor & intumescentia marginum palpebralium.

CAUSA PROXIMA est inflammatio chronica perichondrii , quod tarbos palpebrarum investit.

SPECIES sunt

1. RUBOR ACRIMONIOSUS. Omnes fere acrimoniæ , præsertim cancroſa b) ruborem marginum palpebralium inducunt. Curatio exigit interna remedia specifica. Externe , aqua vegetomineralis , vel aqua frigida applicetur.

2. RUBOR A LIPPITUDINE. In hac specie limbus

C 5

pal-

a) JANIN *Abhandl. und Beobachtungen über das Auge.*
S. 393.

b) Cel. SCHMIDT amputationem mammæ vel alias partis cancroſæ , si margines palpebrarum jam constanter tubeant , merito disuadet , rubor enim marginum palpebralium indicat virus cancroſum per universum corpus jam dispersum , adeoque amputatione incurabilem esse morbum. V. SCHMIDT *chirurgische Wahrnehmungen.*

T. 2.



palpebrarum valde tumidus est, ac muco puriformi oblinitus. V. *Lippitudo*.

3. RUBOR SYMPTOMATICUS, qui hordeolum, blepharophthalmiam & alios morbos palpebrarum committatur. Curatio exigit ablacionem morbi primarii.

4. RUBOR SENILIS, qui ab atonia palpebrarum oritur. Est incurabilis si aqua frigida non curetur.

TYLOSIS.

Est marginum palpebralium callosa vel indurata crassities.

CAUSA PROXIMA est infarctus ab humore spisso & glutinoso in glandulis & cellulis marginum palpebralium stagnante.

SPECIES sunt

1. TYLOSIS CALLOSA, quæ a sicco, inspissato margine palpebrali provenit. Curatur cataplasmate ex lacte, foliis cicutæ, camphora & semine lini. Interne detur extractum cicutæ, & camphora cum mercurio dulci.

2. TYLOSIS INDURATA, quæ a glandulis meibomianis in toto fere limbo induratis, oritur. Hoc vitium quandoque in scrophulosis & venereis deprehenditur. Curatur balsamo ophthalmico mercuriali.

VUL-

VULNERA PALPEBRARUM.

Sunt solutiones cruentæ palpebrarum.

SPECIES esse possunt

1. VULNUS NON PENETRANS, quo solummodo cutis palpebræ transversim, vel longitudinaliter dividitur. Curatio exigit ut tale vulnus sine suppuratione excitata emplastro anglicano uniatur. Ne palpebra per suppurationem longior vel brevior fiat, & plepharoptosim aut lagophthalmum relinquat.
2. VULNUS PENETRANS LONGITUDINALE, quo tota palpebræ crassities dividitur. Emplastro anglicano unitum vulnus, subinde ad sarcum usque solummodo concrescit. A) V. Coloboma.
3. VULNUS ABSCINDENS PALPEBRAM. Tale vulnus corneam & totum bulbum obscurationi exponit & visum tollit.
4. VULNUS COMMISSURÆ INTERNÆ PALPEBRARUM, ectropium palpebræ facit, curatur emplastro uniente.

FISTULA PALPEBRARUM.

Est ulcus angustum & sinuosum in palpebra.

SPECIES sunt

1. FISTULA PALPEBRARUM SIMPLEX, quæ in pal-

A) Cartilago dissecta neque augetur, neque coalescit, dicit HIPPOCRATES.



palpebræ substantiam penetrat. *Curatur* ut fistula in alio loco.

2. FISTULA PALPEBRARUM IN SACCUM LACRUMALEM PENETRANS, quæ a sacci lacrimalis intumescentia purulenta & ruptura in palpebræ inferioris quodam loco oritur. *Curatio radicalis* exigit ut sacci lacrimalis intumescentia aperiatur, & ejus morbus curetur. Sic fistula palpebræ sua sponte sanatur.

COLOBOMA.

Est hiatus siccus in margine palpebrali, qui labium leporinum refert.

Hoc vitium deformitatem inducit, ac speciem ectropii partialis. Oritur vel a *mala formatione* vel a *vulnera marginis palpebralis*.

CURATIO. Suadent authores abscissionem marginis callosi, qui hiatum format, & unionem vulneris per acum & filum.

NICTITATIO.

Est invita palpebrarum sese jam cludentium, jam aperientium motitatio.

CAUSA PROXIMA est vera covulsio palpebrarum.

SPECIES sunt

I. NICTITATIO CONNATA, & quæ a **MALA CON-**
SUE-

SUETUDINE est, curatur meliore consuetudine inducta, & oculis alternatim deligatis.

2. NICTITATIO AB HETEROGENEO IN OCULUM ILLAPSO. Curatur exemplo corpore alieno.
3. NICTITATIO A SABURRA, vel VERMIBUS PRIMARUM VIARUM, purgantibus & anthelminticis curatur.
4. NICTITATIO SYMPTOMATICA, quæ alius morbi convulsivi symptoma est, exigit curationem morbi primarii.
5. NICTITATIO A TIMORE, hæc species sub operatione cataractæ maxime animadvertisit, & operatori valde incommoda est. Curatur persuasione & mora.

SPASMUS PALPEBRARUM.

Est palpebrarum invita & permanens contractio.

NOSCITUR oculi rigida clausura, quæ digitis vix aperiri potest.

SPECIES sunt

1. SPASMUS A SABURRA PRIMARUM VIARUM.
Quæ purgantibus vel anthelminticis curatur.
2. SPASMUS AB ILLAPSO HETEROGENEO IN OCULUM, curatur exemptione corporis illapsi.
3. SPASMUS SYMPTOMATICUS, qui ab alio morbo provenit. Curatur antispasmodicis & curato morbo primario.

4. SPAS-



4. SPASMUS AB OPHTHALMIA; quibus oculi sunt inflammati ob lucis metum adeo arcte palpebras contrahunt, ut vix digitis deduci possint. Curatio exigit ablationem ophthalmiæ.

5. SPASMUS SUB OPERATIONE CATARACTÆ, turbat sœpe operationem præsertim extractiōnem. Observatur in timidis & subiectis iritabilibus. Exigit ut ante operationem oleum cum opio detur.

PRURITUS PALPEBRARUM.

Est sensatio, quæ hominem ad fricandas palpebras cogit.

SEDES utplurimum versus internam palpebrarum commissuram est.

SPECIES sunt

1. PRURITUS A TRANSPiratione SUPPRESSA, qui matutino tempore in catarrhosis & rheumaticis observatur.

2. PRURITUS AB INCIPIENTE HORDEOLO. Curatur aqua vegetominerali.

3. PRURITUS AB INGESTIS ACRIBUS, qui altero primum die præsertim in ebriosis observari solet. Curatur purgantibus.

4. PRURITUS AB HERPete PALPEBRARUM, exigit curationem herpetis. V. Psorophthalmia.

MOR-



MORBI VIARUM LACRUMALIUM.

SCHEROMA.

Est oculi siccitas ob humoris lacrimalis penuriam.

EFFECTUS. Deficientibus lacrumis oculi sunt aridi, pulverulenti, obscurati, sordidi, quod sinistrum in morbis acutis omen est.

SPECIES sunt

1. **SCHEROMA FEBRILE**, seu siccitas oculorum, quæ in febribus, cum phlogistica humorum densitate complicatis, observatur. *Curatur humectantibus externis & internis diluentibus antiphlogisticis.*
2. **SCHEROMA EXHAUSTORUM**, quod post magnas evacuationes & in morikundis contingit. *Curatio in exhaustis exigit nutrientia.*
3. **SCHEROMA INFLAMMATORIUM**, quod ophthalmiæ siccæ symptoma est. Exigit curationem ophthalmiæ.
4. **SCHEROMA ITINERANTIUM**, seu oculorum siccitas, quæ in itineribus per loca sabulosa, ardente syrio aut vento calido, qui omne humidum absorbet, institutis, consueta est. *Curatur elutione & humectatione. Collyrium ex semenibus cydoniorum, decoctum malvæ, lac tepidum hic convenit.*

EPI-



EPIPHORA.

Est humoris serosi vel aquosi profluvium ex oculis.
ORIGO hujus humoris non solum glandula lacrimalis est, sed etiam pori corneæ & conjunctivæ, nec non interna palpebræ utriusque superficies, glandulæ Meibomianæ, atque carunculæ lacrimalis ad hanc secretionem contribuunt. A)

CAUSA PROXIMA epiphoræ est, vel *aucta secretio humorum lacrimalium*, vel *impedita absorptio horum humorum*.

SPECIES ab *aucta secrezione* sunt

1. **EPIPHORA A STIMULO IN OCULO HÆRENTE**, ut ab illapsa arenula, fumo acri, vapore vel odore acri, a trichiasi. *Curatio* exigit ut corpus heterogeneum afferatur.

2. **EPIPHORA INFLAMMATORIA**, quæ symptomata ophthalmiæ humidæ est. *Curatur* ablata inflammatione.

3. **EPIPHORA ACRIMONIOSA**, quæ a depositione acrimoniæ rheumaticæ, arthriticæ, podagricæ, variolosæ, morbillosæ, venereæ, vel a transpiratione suppressa oritur. Videntur hæ acrimoniæ organa secretoria lacrimalium ad majorem secretionem irritare. Tarsi & genæ a lacrumis excoriantur.

Cura-

a) JANIN l. c. pag. 49.

Curatio exigit I. derivationem acrimoniae ad alia loca, quod purgantibus, diureticis, diaphoreticis, ac præcipue fonticulis, vesicatoriis, fetaceo peragitur. 2. *Interne* dentur antacrimoniosa, & *externe* aqua vegetomineralis, lac crocatum, vel mucilago cydoniorum aut amyli.

4. **EPIPHORA A LAXITATE PORORUM CORNEÆ**, conjunctivæ & glandulæ lacrimalis. Hæc species noscitur ex humiditate corneæ atque omnis doloris & ruboris absentia. Curatur interno usu corticis peruviani cum valeriana. Externe aqua frigidissima, collyrium vitriolatum & camphoratum, nec non spirituum conductit.

SPECIES epiphoræ ab *impedita* lacrumarum *absorptione* seu a viis lacrimalibus *imperviis*, sunt

I. **EPIPHORA A PUNCTIS vel CANALIBUS LACRIMALIBUS CONCRETIS.** Id a combustione, vel exulceratione prægressa oritur & inspectione vel exploratione punctorum lacrimalium noscitur.

Curatio exigit, ut orificia concreta ope acuti stili oocularis, in orificium externum immitti, perforentur. Vel ut saccus lacrimalis incisione aperiatur, & canalis atque punctum lacrumale e cavo sacci aperti extrorsum ope styli aperiantur.



2. EPIPHORA A DUCTU NASALI OBSTRUCTO. Hæc species hydropem lacrumalem habet comitem & exigit reserationem ductus nasalis obstru-
cti. V. *Hydrops lacrimalis.*
3. EPIPHORA A POLYPO NASALI, orificium inter-
num ductus nasalis comprimente. Curatur
polypi nasalis extractione. A)
4. EPIPHORA A SACCO LACRUMALI PER ANCHY-
LOPEM vel PER TOPHUM FOSSÆ LACRUMA-
LIS COMPRESSO. Curatur ablato tumore
comprimente. V. *Anchylops.*
5. EPIPHORA EX RHYADE seu defectu carunculæ
lacrimalis est incurabilis.
6. EPIPHORA A VITIO PALPEBRARUM, quod
puncta lacrimalia a lacu lacrimali removet,
ut encanthis, ectropium, entropium, lago-
phthalmus, intumescensia marginis palpe-
bralis. Hæc species curatur ablatis his
morbis.
7. EPIPHORA A PARALYSI PUNCTORUM LACRU-
MALIUM. Nam hæc puncta vi musculari
lacrumas e lacu lacrimali sugere videntur.
Curatio exigit roborantia antiparalytica.
8. EPIPHORA A PUNCTIS LACRUMALIBUS ERO-
SIS. Si fibræ musculares horum orificiorum
erosæ sunt, vis fugens illorum perit. Cu-
ratio

A) Vedit Cel. JANIN radicem polypi nasalis e sacco la-
crimali ortam. l. c.

ratio exigit sanationem erosorum punctorum.

LIPPITUDO.

Est exsudatio humoris puriformis e marginibus palpebrarum.

CAUSA PROXIMA est depositio acrimoniæ ad glandulas Meibomianas tarforum palpebralium.

EFFECTUS. Hoc humore noctu tarsi palpebrarum invicem conglutinantur, margines palpebrarum rubent & intumescent. Persæpe ophthalmia, fistula lacrimalis & non raro ectropium exinde oriuntur.

SPECIES lippitudinum sunt

1. **LIPPITUDO INFANTUM**, quæ infantibus valde est familiaris, præsertim ab achoribus aut a scabie capitis suppressa.

2. **LIPPITUDO ADULTORUM & SENILIS.** Lippitudo infantum successu temporis sponte evanescit, ac pertinacissima est, quæ adultos afficit, & plane immedicabilis fere observatur in senectute & in potatoribus.

Curatio exigit repetita purgantia, vesicatoria, setacea aut fonticulos. Externe solutio lapidis divini, aut unguentum ophthalmicum cum mercurio precipitato rubro mirum præstat effectum. A)

D. 2

3. LIP-

a) THEDEN neue Bemerkungen p. 192.



3. **LIPPITUDO VENEREA**, quæ ex suppressa gonorrhœa vel fluore albo, atque in infantibus, a venereis parentibus genitis, observatur.

Curatio exigit præter externum usum unguenti ophthalmici mox laudati, internum usum mercurii gummosi.

4. **LIPPITUDO SCROPHULOSA**, quæ scrophulosos aggreditur. *Curatur* interno usu corticis peruviani cum cicuta, æthiope minerali, antimonio. Valida evacuantia scrophulosis nocent.

5. **LIPPITUDO SCORBUTICA**, quæ scorbuticos afficit. *Curatio* exigit interna antiscorbutica; externe solutio lapidis divini, vel sacchari saturni prodest.

HYDROPS LACRUMALIS.

Est intumescentia sacci lacrimalis, qui pressus dito lacrumas puras, vel quandoque striis albis mixtas per puncta lacrimalia vel per ductum nasalem, vel per vias utrasque eructat.

CAUSA PROXIMA est vel laxitas sacci lacrimalis, vel obstruētio ductus nasalis.

SPECIES ergo sunt

I. **HYDROPS LACRUMALIS A LAXITATE SACCI LACRUMALIS.** Noscitur hæc species quod collectæ lacrumæ per ductum nasalem facile exprimi possint. *Curatur* injectione collyrii

roborantis ex vitriolo & spiritu vini camphorato, applicata aqua frigidissima, atque applicatis spleniolis graduatis, quæ saccum lacrimalem comprimunt.

2. HYDROPS LACRUMALIS AB OBSTRUCTIONE DUCTUS NASALIS. Hæc obstructio est multiplex, variamque exigit amotionem.

1. *Obstructio mucosa* exigit collyrium detergens, quod interno oculi cantho aliquoties de die instillari, vel ope syphonis A-nelliani in punctum lacrumale inferius injici debet. Infusum veronicæ, solutio boracis, aqua felterana, solutio salis ammoniaci, vel vitrioli pro hoc scopo laudantur.

2. *Obstructio a contractione sphincteris ductus nasalis.* Noscitur quod lacrumæ adhibitavi in nares exprimi possint. Curatio quandoque succedit injectione emolliente, & applicato cataplasmate emolliente.

3. *Obstructio a corrugatione ductus nasalis.* Non potest sine facci lacrumalis incisione cognosci. Curatio exigit, ut injectiones emollientes ab initio tententur, si vero hæ obstructionem non tollant, fiat incisio facci lacrumalis, atque immittantur ductui nasali per aliquot septimanas choræ præparatæ, vel tenuissimæ candelulæ Gouardianæ, vel stili plumbei. Aperto ductu nasalí consolidetur vulnus externum.



4. *Obstructio a polypo nasal i curatur ablato polypo.*

ANCHYLOPS.

Est tumor in interno oculi cantho, qui sedem extra saccum lacrimalēm habet.

SPECIES anchylopum sunt

1. **ANCHYLOPS INFLAMMATORIA**, quæ rubore & calore canthi interni noscitur, exigit curatio fomentum ex aqua vegetominerali, & purgantia.

2. **ANCHYLOPS SUPPURATORIA**, quæ abscessum in cantho interno format. Oritur ex prægressa inflammatione, vel metastasi purulenta. Curatio exigit ut tumor emplastro diachylon & cataplasmate emolliente emolliatur, atque dein aperiatur.

3. **ANCHYLOPS SCIRRHOSA**, est tuberculum durum in interno oculi cantho, quod non raro in carcinoma abit. Curatio exigit cicatram.

4. **ANCHYLOPS CYSTICA**, est atheroma in interno oculi cantho, seu tumor indolens, cuti concolor, glaber, mobilis. Curatio exigit ut spiritu saponato resolvatur, vel si resolutio impossibilis, ut cultro afferatur.

5. **ANCHYLOPS SEROSA**, est tumor serum continens in interno oculi cantho. Si resolvinequeat, incidatur.

6. An-

6. ANCHYLOPS TOPHOSA, seu EXOSTOTICA, est tophus in interno oculi cantho, cuius causa fere semper venerea est. Curatio. Interne detur mercurius cum decocto radicis mezerei, externe emplastrum vel unguentum mercuriale, vel solutio mercurialis applicetur.

7. ANCHYLOPS LACRUMALIS est intumescentia sacci lacrimalis a lacrumis in eo retentis.
V. *Hydrops lacrimalis*.

8. ANCHYLOPS A FISTULA LACRUMALI, est intumescentia sacci lacrimalis a muco puriformi in eodem congesto. V. *Fistula lacrimalis*.

ÆGYLOPS.

Est ulcus in cantho interno oculi, qui sedem extra saccum lacremale habet.

Causæ ægylopis sunt canthi interni contusio, vulnus, inflammatio, depositio acrimoniae, præsertim variolosæ, fistula lacrimalis.

SPECIES ægylopum sunt

1. ÆGYLOPS SIMPLEX, est ulcus purum in oculi cantho interno, saccum lacremale non affectans. Curatur aqua vulneraria.
2. ÆGYLOPS CANCROSA, a prægressa anchylope scirrhosa oritur. Trastari debet ut cancer.



3. **ÆGYLOPS VENEREA**, est ulcus venereum in interno oculi cantho. *Curatur* externo usu balsami mercurialis, & interne datis mercurialibus.

4. **ÆGYLOPS CARIOSA**, est ulcus cariosum in interno oculi cantho. Quandoque cum, quandoque sine fistula lacrumali est. *Curatio* exigit externa & interna anticariosa.

5. **ÆGYLOPS A FISTULA LACRUMALI**, est ulcus in interno oculi cantho a ruptura vel incisione facci lacrumalis ortum. V. *Fistula lacrumalis*.

FISTULA LACRUMALIS.

Est effluxus humoris puriformis ex punctis lacrimalibus.

NOSCITUR ex levi tumore canthi interni, qui pressus mucum puriformem, vel per puncta lacrimalia, vel per ductum nasalem, vel per vias utrasque evomit.

CAUSA PROXIMA est muci puriformis excretio ex glandulis facci lacrumalis sine ulceris in sacco præsentia. Adebat rarissime ulcus, & si adest, tunc effectus & non causa hujus effluxus puriformis est. A)

CAU-

a) Multoties observatur muci puriformis effluxus e variis partibus sine ulceris præsentia. In gonorrhœa & fluore



CAUSÆ REMOTÆ sunt depositio acrimoniæ qualis-
cunque in glandulas facci lacrimalis, ut in va-
riolosis, morbilliosis, scrophulosis & venereis
observatur, inflammatio sœpius rediens hujus
facci, stagnatio lacrumarum in sacco ob ductum
nasalem obstructum, contusio facci lacrimalis.

Dividitur fistula lacrimalis in simplicem & compli-
catam.

SPECIES fistularum lacrimalium sunt

I. **FISTULA LACRIMALIS SIMPLEX**, in qua ob-
structio ductus nasalis non adest, quod no-
scitur si mucus puriformis tum per puncta
lacrimalia, tum per ductum nasalem exprimi
potest.

D 5

Cat-

fluore albo, quandoque altero statim ab infectione die,
mucus effluit puri similis, antequam inflammatio præ-
sens ulcus facere potuisset. In corryza e naribus sine
ulcere profluit sœpe mucus puriformis. In hæmorrhoi-
dum fluxu albo idem contingit. In calculosis ingens sœpe
puriformis muci copia cum urina egeritur. In phthysi
spuria ingens muci puriformis copia quotidie ejiceba-
tur, cum tamen post mortem, nec in vesica calculoso-
rum, nec in pulmonibus phthysi spuria mortuorum, ul-
cus fuerit inventum. V. POTT *Observations on the fi-
stula lachrymalis. Lond. 1763. & POTTS Abhandlungen
über verschiedene Gegenstände der Wundarzneykunst. Dres-
den 1771.*



Curatio exigit collyrium detergens, cantho oculi interno aliquoties de die instillandum. Infusum veronicæ, solutio lapidis divini, boracis cum saccharo, lapidis infernalis solutio diluta, aqua vitriolata, camphorata, solutio salis sedlizensis in hunc scopum laudantur. Hi liquores per puncta lacrimalia absorben-

tur. A)

2. *Vel hi liquores ope syphonis ANELLIANI per punctum lacrumale inferius in saccum lacrimalem injici possunt.*

Injectio sequenti modo pergatur. B)

1. *Digitu manus sinistræ palpebra inferior extorsum, & versus canthum externum trahitur.*

2. Sy-

A) Instillatio sequenti methodo peragi debet. 1. Eger locetur supinus, dein calami superius & inferius transversim abscissi apertura superior digito tegatur, inferior apertura immergatur in collyrium, sic quædam guttulae cavum calami intrant. Jam hæc apertura oculi cantho applicetur, sic liquidum, digito a superiori apertura ablatu, per aerem in tubum irruentem exstilla in oculum. Clausis palpebris liquidum in oculo digitis aliquantum agitetur, ut e lacu lacrimali in orificio punctorum lacrimalium absorbeatur.

B) D. ANEL nouvelle méthode de guérir les fistules lacrimales. Tarin. 1713.

2. *Syphonis* apex manu dextra in linea vix obliqua, seu fere perpendiculari orificio lacrimali inferiori immittatur, dein sine vi adhibita in linea obliqua sponte quasi sua imergatur ulterius canula syphonis in sacum lacrumalem,

3. Tandem sypho comprimatur. Quantitas liquidi injecti non sit nimis magna, ne saccus lacrimalis nimium extendatur.

4. Injectio post aliquot horas iterum exprimatur & sic aliquoties de die repetatur.

At injectio via plus quam instillatio, ut plures observavi, praestat, imo in fistula lacrimali inflammata irritando injectio nocet.

2. **FISTULA LACRUMALIS COMPLICATA CUM INFLAMMATIONE SACCI LACRUMALIS.** Noscitur ex effluxu muci puriformis & praesentia ruboris, caloris, atque doloris in cantho oculi interno & sacco lacrimali. Hæc inflammatio quandoque ter vel quarter in anno afficit, & facile antiphlogisticis remediis intra aliquot dies curatur. At quandoque malum hoc omni mense, imo qualibet septimanâ vias lacremales aggreditur & pertinacius remediis antiphlogisticis resistit.

Curatio ergo exigit

I. ut fomenta & collyria ex aqua vegetominerali applicentur. *Injectio in puncta lacru-*



lacrimalia durante stadio inflammatorio nimis irritat.

2. Fiat *venceſtio*, dentur *purgantia*, & de-
in antiphlogistica.

3. Adhibeantur *revellentia*, ut setaceum, vel
vesicatoria ad nucham, hyrudines ad tem-
pora,

4. *Purificantia sanguinem.*

3. FISTULA LACRUMALIS COMPLICATA CUM OB-
STRUCTIONE DUCTUS NASALIS. Hæc no-
ſcitur, quando mucus puriformis ex sacco
non in nares exprimi potest.

Curatio exigit amotionem obſtructionis. Si hæc
ſolum *glutinosa* eſt, amogetur injectione de-
tergente, ſi vero obſtructio *ſolida* eſt, ut
contraetio chronica sphincteris vel ductus naſa-
lis corrugatio tunc operatione ſequenti opus eſt.

Operatio fistulæ lacrimalis.

INDICATIO. Fistulæ lacrimalis cum obſtructione du-
ctus naſalis complicata curatio exigit.

1. *Incisionem facci lacrimalis.*

2. *Dilatationem ductus naſalis.*

3. *Exſiccationem ductus naſalis a dilatatione
ſuppurantis.*

4. *Sanationem ulceris externi ab incisione re-
manentis.*

TEM-

TEMPUS URGENS. Quando saccus lacrimalis pure multum turget, & illo per expressionem liberati nequeat, operatio est facienda, 1. ne saccus in alieno loco crepet, 2. ne pus saccum torum exulceret, destruat & cariem fossæ lacrimalis inducat.

PRÆPARATIO AEGRI. Purgans detur & in plethoricis venæsecchio aliquot ante operationem dies fiat, vietus sit antiphlogisticus. Saccus lacrimalis per noctem valde intumescens mane non exprimatur, ut saccus tumidus locum pro incisione bene monstret.

INSTRUMENTA. Cultellus pro incisione facci. Potest culter cataractarius adhiberi.

Specillum MEJANI.

Stilus triquierter pro ductu nasalium.

Acus triquetra curvata pro perforando osse lacrimali.

Chordæ fidium præparatæ, sed crassitie diversæ. A)

Cereoli vel stili ex plumbō.

PRO DELIGATIONE. Torunda parva.

Emplastrum anglicanum semi-lunatæ figuræ.

Si-

A) Chordæ fidium diversæ crassitie humectentur, dein appensis ponderibus elongentur & exsiccentur, tandem in frusta, digitum longitudine æquantia, scindantur, ac in apicibus cultello aliquantum accuminentur.



SITUS PRO OPERATIONE, æger sedeat in sella versus lucem, caput ejus a ministro retro ægri sellam stante retineatur. Chirurgus ante ægrotum stet.

OPERATIO IPSA.

1. Chirurgus cultro *vulnus longitudinale seu perpendicularē* facit in facci lacrimalis prominentis cavitatem usque, ad 3 vel 4 lineas.
2. *Vulnus parva turunda* ex linteo carpto modice impleatur, & emplastro semilunato tegatur. Hæc prima diligatio triduo sic relinquatur.
3. Quarto die *vulnus aperiatur* & *specillum* in apice triquetrum, vel *specillum MEJANI* per *ductum nasalem* obstructum sensim in cavum narium trudatur. Ex ægri sensatione specilli in cavo narium & ex exitu aliquot guttularum sanguinis e cavo narium, scimus *obstructionem canalis nasalis* superatam esse.
4. Exempto specillo statim in canalem nasalem apertum intrudatur *chordæ fidium tenuissima*, altero die *crassior*, tertio *crassissima*. Hæ chordæ in canali intumescunt, & illum dilatant. Sic per chordam crassissimam sed quotidie cum recenti mutata, dilatatio canalis nasalis per 3 vel 4 septimanas continuatur. *Extremitates chordarum*

darum e naribus & vulnere facci prominentes inflectantur & emplastro conglutinentur, ne chorda excidat e ductu.

5. Demum loco chordarum cereoli parvi cum extracto saturni parati per 15. dies ductui nasalii imitantur, tandem per 10 vel 15 dies stili plumbei loco cereolorum ductui nasalii imponantur; sed antea aliquoties guttulae quedam extracti saturni vel aquae Thedianae injiciantur. Sic canalis dilatatus sensim exsiccatur.
6. Tandem omittantur hi stili plumbei, & vulnus externum solo emplasto anglicano vel diapalmæ tegatur. Sic vulnus intra aliquot dies sua sponte sanatur. A)

SYM-

A) ANELLI methodus, qui sine facci lacrumalis incisione specillo tenui per punctum lacrimalis immisso, & MEJANI methodus, qui simul introdueto per vias lacrimales filo, obstructionem ductus nasalii expedire conatur, ut & methodus DE LA FORESTI, & CABANISII, qui specilla & setaceum per orificium nasale ductus nasalii in saccum lacrimalem introducere suadent, rarissime peragi potest, & ut plurimum sine medella malum exasperat. V. MEZGER curationum chirurgicarum, quæ ad fistulam lacrimalem hucusque fuerunt adhibitæ, historia critica 1772.

SYMPTOMATA, quæ operationi quandoque superveniunt.

1. HÆMORRHAGIA sub incisione sacci lacrimalis.

Hæc a læsione arteriæ angularis provenit. Sistitur facile linteo carpto, vel fungo agarico.

2. EPIPHORA, quæ quandoque post operationem remanet. Hæc vel a laxitate sacci lacrimalis vel a punctis aut canalibus lacrimalibus concretis oritur. Ideo ante sanationem vulneris sacci lacrimalis semper exploret chirurgus, vel per stilum vel per injectionem, an canales lacrimales sint aperti, nam si essent concreti stilo prius illos aperire deberet. Si ergo jam sanato vulnere sacci lacrimalis ductus concreti inveniantur, nova incisio sacci & perforatio ductuum lacrimalium fieri deberet. Epiphora autem a laxitate sacci lacrimalis curatur ut *hydrops sacci lacrimalis*, quem vide.

3. CALLOSITAS VULNERIS, quæ sub dilatatione a torundis & a stilis plumbeis quandoque oritur. Hæc exigit ut orificium callosum vel guttula butyri antimonii, aut soluti lapidis infernalis, aliquoties tangatur, vel cuspide cultelli, in vulnere circumvoluto, margo callosus reddatur recens, vel apex parvæ torundæ unguento cantharidum imbuta per horam ulceri imponatur. Sic ablato callo vultur ut recens sanetur.

4. Fi-

4. FISTULA LACRUMALIS COMPLICATA CUM.

RUPTURA SACCI LACRUMALIS. Si mucus puriformis sua glutinositate puncta lacrimalia & simul ductum nasalem obstruit, ac tamen a glandulis incavo facci lacrimalis continuo secerni pergit, tunc deim saccus lacrimalis cum superjacente cute rumpitur extorsum.

Hæc *ruptura* vel in *medietate* facci lacrimalis, vel in *loco alieno*, ut sub *inferiori* palpebra, contingit.

Ruptura in *loco legitimo*, seu medietate facci lacrimalis orta, ut plurimum nimis exigua est, hinc sufficienter dilatari debet, ut chordæ in ductum nasalem applicari possint.

Ruptura in *loco illegitimo* orta exigit ut operatio in sacco lacrimali instituatur, alias nec illegitima *ruptura*, nec *fistula lacrimalis* curari potest.

**5. FISTULA LACRUMALIS CUM CARIE FOSSÆ
LACRUMALIS COMPLICATA.** Hæc species raro observatur, & ex neglecta incisione facci lacrimalis oritur. *Caries ossis lacrimalis* fætorem fistulæ & narium, carnem fungosam in sacco & canali nasalí producit. Hæc caries exigit ut

I. *Interne anticariosa* adhibeantur nempe cortex peruvianus cum asa fœtida.

E.

2. Ex-



2. Externe, vel cultro vel causticis ut solutione saturata lapidis infernalis afferatur caro fungosa, dein essentia euphorbii, mastichina, vel myrrhae ad inhibendum cariei progressum applicetur.
3. Tandem si ductus nasalis adeo obliteratus est, ut stilo triquetro non aperiri & chordis pervius reddi possit, tunc nova apertura ope acus triquetrae crassioris per os lacrumale, & internam narium membranam in cavum narium fieri debet. Sanguis e nare profluens, & aer e vulnere fistulæ compressis naribus prorumpens sunt signa perforati oculis lacrimalis.
4. Hæc apertura statim torunda ex linteo carpto expleatur, & sic per triduum relinquatur.
5. Dein exempta torunda 3. chordæ fidium præparatae, & crassissimæ in factam aperturam per 3 vel 4 septimanas immittantur, ut hæc dilatata maneatur.
6. Tandem loco chordarum vel cereoli saturini, vel stili plumbei, quæ crassitatem trium chordarum habent, per 25 dies in aperturam ponantur. Simul aqua frigida & liquore adstringente apertura exsiccatur, ac callösa reddatur.

7. Tan-



7. Tandem omissis cereolis & stilis vulnus externum sacci consolidetur.

6. FISTULA LACRUMALIS COMPLICATA CUM ACRIMONIA, quæ nempe ex acrimonia venerea, scrophulosa, variolosa cancrosa, aut alia oritur, præter curationem generalem simul specifica medicamenta exigit.

ENCANTHIS.

Est excrescentia vel intumescentia carunculæ lacrimalis.

EFFECTUS encanthidis sunt deformitas, lacrumatio, quandoque ectropium.

SPECIES hujus mali sunt

1. ENCANTHIS BENIGNA, seu excrescentia indolens, mollis, rubra, granulosa fructus mori ad instar.

Curatur 1. exsiccatione cum extracto saturni,
2. Ligatura radicis. 3. Excisione portio-
nis superfluæ. 4. caustico.

2. ENCANTHIS MALIGNA, est excrescentia lancinans, plumbæ coloris, dura, inæqualis. Hæc species in cancrum abit, hinc ut talis trætetur.

3. ENCANTHIS INFLAMMATORIA, seu INFLAMMATIO carunculæ lacrimalis. Noscitur ex intumescentia rubra, calente, dolente & subito nata, increvit hæc species quandoque



in ingentem magnitudinem, & incisa, vel sponte erupta pus fundit ac subito consistet.

Curatio exigit ab initio resolutionem cum aqua vegetominerali, si resolutio non succedit, applicetur per aliquot dies cataplasma emolliens, & dein incidatur tumor.

RHYAS.

Est cacrunculae lacrimalis decrementum vel defectus.

CAUSA PROXIMA est defectus nativus, vel excisio, vel erosio a quacunque acrimonia.

Hoc malum est *incurabile*, ac epiphoram inducit insanabilem, cum lacus lacrimalis perpetuo hiet.

PERIBROSIS

Est erosio seu ulceratio commissurarum palpebrarum. Frequentissime commissura palpebrarum interna haec erosione afficitur.

SPECIES sunt

1. PERIBROSIS AB ACRIMONIA LACRUMARUM, ut in epiphora acrimoniosa observatur. Exigit ablationem epiphoræ & dein solutionem lapidis divini.

2. PERIBROSIS AB AEGYLOPE, quæ se quandoque in commissuram usque extendit. Curatur evanescente sen sanato morbo primario. V. aegylops.

LEMOSETAS.

Est sordities puriformis interno oculi cantho inhærens. A)

CAUSA PROXIMA est sebi ocularis collectio in interno oculi cantho.

SPECIES sunt

1. LEMOSITAS VULGARIS, quæ evigilantibus a somno, itinerantibus a pulverulentia aëris, & ægrotis quibusdam a morbo contingit.
Curatur elutione oculorum.

2. LEMOSITAS CONSTANS, quæ diu permanet, & a lippitudine carunculæ lacrimalis originem habet. *Curatur ut lippitudo palpebrarum.*

LACRUMATIO SANGUINEA.

Est sudatio sanguinis spontanea ex oculis.

CAUSA PROXIMA est extremitatum arteriosarum anastomosis seu dilatatio. Visæ fuerunt feminæ, quibus sanguis omni mense non ex utero, sed ex oculis profluebat. b)

Curatio exigit venæsectionem & restitutionem menstruorum.

a) Hæ sordes græcis dicuntur *lemia* vel *gramia*.

b) DODON. *observat cap. 15.*

MORBI MEMBRANÆ
CONJUNCTIVÆ.

OPHTHALMIA.

Est membranæ conjunctivæ vel totius bulbi ocularis inflammatio; quæ ex oculi rubore, calore, dolore & tensione nescitur.

C A U S A P R O X I M A est vasorum ocularium in parte inflammatæ dilatatio & oscillatio a stimulo inflammatoryo, qui oculum immediate vel consensualiter afficit.

C A U S A D I S P O N E N S est oculi debilitas vel nimia sensitivitas.

Multiplex habetur ophthalmiarum divisio & denominatio, quæ ab inflammationis sede, gradu, duratione, complicatione & causa peti solent.

A sede dividitur ophthalmia.

1. In *externam*, quæ in conjunctiva & quandoque in ipsa cornea
2. — *internam*, quæ in iride, uvea, vel choroida sedem habet.
3. — *angularem*, quæ solum oculi canthum externum vel internum occupat.

A gradu vehementiæ dividitur

1. In *leven*, quæ taraxis

2. In

2. In gravissimam, quæ chemosis dicitur.

A duratione discernitur ophthalmia

1. In acutam, quæ febrem habet comitem & non diu durat.

2. — chronicam, quæ sine febre est, atque plures menses, imo annos durare solet.

3. — periodicam, quæ determinato die aut tempore redit.

A complicatione dividi potest

1. In complicatam, quæ cum alio morbo oculari jungitur,

2. — symptomaticam, quæ alii morbo oculari supervenit.

3. — humidam, quæ vehementem humoris feroci vel purulenti effluxum habet.

4. — siccam, quæ sine omni humoris effluxu est.

A causa tandem dividitur ophthalmia

1. In violentam, quæ a causa externa.

2. — consensualem, cuius causa in abdomine vel alio loco est.

3. — idiopathicam, cuius causa in ipso oculo est.

4. — acrimoniosam, quæ a metastasi acrimoniæ originatur, ut catarrhalis, venerea, gonorrhœica, cancerosa, scrophulosa, variolosa, morbillosa, exanthematica, rheumatica, arthritica, febrilis.

Ex his ergo sequentes ophthalmiarum SPECIES constitui possunt.



I. TARAXIS. Est levissima oculi inflammatio, in qua rubedo albicans est, & dolor modicus. Oritur a levi causa ut vapore acri, dentitione, lectione immodica, solis ardore, il lapso corpore heterogeneo, tempestate humida, vento sicco, vel frigido.

Curatio exigit collyrium repellens ex aqua vegetominali, vel aquam frigidam. Venæfetione & purgatione opus est, si inflammatio increscit.

2. CHEMOSIS. Est vehementissima oculi inflammatio, in qua conjunctiva oculi tunica ut pannus scarlatinus rubet & ita intumescit ac super corneam adeo elevatur, ut hæc in fossa quasi locari videatur. Ut plurimum palpebræ simul inflammantur, cornea fit turbida & rubicunda, dolor adest atrocissimus præsertim in superciliis, qui nocte cum febre & vigiliis, ac sensatione pulsationis in capite & oculo, primis præsertim diebus, exacerbatur, visus penitus obfuscatur.

Exitus chemoseos rarius est in *resolutionem*, frequentissime autem in *suppurationem*, qua vel bulbus oculi rumpitur, vel alias atrox morbus in oculo relinquitur, ut opacitas corneæ, staphyloma, varices conjunctivæ, ulcera corneæ, fistula lacrimalis, pterygium.

Cura-

Curatio exigit ut illico validissima revellentia & antiphlogistica adhibeantur. Hinc.

1. Fiant *venæsectiones repetitæ* in brachio, pede, jugulo,
2. Hirudines 6. vel 8. ad canthos oculorum.
3. *Sectio arteriæ temporalis.*
4. Detur *validum purgans*, reliquis diebus *eccoproticum.*
5. *Vesicatoria* ad nucham.
6. *Emulsio refrigerans* cum nitro & diacodii syrupo.
7. His remediis nil juvantibus fiat ope lanceolæ scarificatio tumidæ conjunctivæ. *Ophthalmomyxsis Woolhousiana* evitetur. A)
8. Externe applicetur fomentum ex aqua vegetominali, aut cataplasma pomaceum; remittente inflammatione fiat fomentum ex solutione aluminis, aut sacchari saturati, aut vitrioli albi. B)

3. PLEGMONE OCULI, seu OPHTHALMIA INTERNA,

E 5

NA,

A) LANGE *Commentatio de ophthalmia. Tiranav.* 1777. p. 47. & SCHMUCKER *Chirurg. Wahrnehmungen. I. T. 382. S.*

B) Illustr. L. B. DE STÖRCK, *præcepta medico-præctica in usum chirurgorum castrorum & ruralium. Viena 1777. T. 2. p. 81. & Cel. BRAMBILLA, Abhandlung von der Phlegmone. S. 312. I. Th.*



NA, est inflammatio iridis, uveæ & choroidæ. Noscitur ex albugineæ modico rubore, at iris est rubra & pupilla adeo constricta ut æger prorsus videre nequeat. Summa adest lucis intollerantia, dolor & pulsatio intollerabilis in oculi fundo & capite, bulbus nonnunquam e sua sede propellitur. Jungitur simul febris vehemens, adsunt vigiliae nocturnæ & delirium, præsertim in junioribus & sensilioribus.

Non raro chemosis in phlegmonem oculi & phlegmone in chemosim abit. Tunc omnium ophthalmiarum acutissima & periculosissima adest, quæ frequentissime hypopio finitur, quo oculus rumpitur & immedicabilis sequitur cæcitas.

Quandoque tamen interna oculi inflammatio synizesim, synechiam, catarractam, amaurosim, amblyopiam, iridis fissuram relinquit, licet discutiatur.

Curatio eadem adhibetur ac in chemosi.

4. **OPHTHALMIA ACUTA** est ophthalmia vulgaris cum febre stipata at intra aliquot dies vel septimanas terminanda; taraxi aliquantum est vehementior, & præter phlogisticam, nullam peculiarem sibi junctam habet acrimoniæ.

Cura-

Curatio generalis exigit venæflectiones, purgantia, antiphlogistica, & externe aquam vegetomineralem.

5. **OPHTHALMIA CHRONICA** seu **HABITUALIS**, est ophthalmia diu jam durans, valde rubens at utplurimum indolens, nascitur ex laxitate vasorum. A)

Curatio exigit roborantia interne & externe adhibenda.

Externe, aqua frigida, solutio saturnina, vitriolata, aluminosa, b) spirituosa, aut unguentum ophthalmicum roborans applicetur.

Interne detur cort. peruvianus, Valeriana.

6. **OPHTHALMIA SICCA**, c) est ophthalmia habitualis, in qua vix lacrumæ, nec tumor in palpebris observantur; rubedo & pruritus in tarsis palpebrarum, quæ noctu cohærent, adest.

Cau-

a) Huc etiam referto *ophthalmiam indolentem*, in qua oculus sine omni dolore valde rubet, ut aliquoties vidi. Idem confirmat Cel. RICHTER, JANIN & GENDRON V. Cl. Prof. RICHTER *Chirurgische Bibliothek*, I. B. 4. Stück. p. 124.

b) Albumen ovi cum alumine tritum, bonum quidem remedium est, at palpebras & cilia conglutinando, incomoda parit.

c) Græcis dicitur *Sclerophthalmia* & aliis *Xerophthalmia*.



Causa est acrimonia humorum, hinc malum pertinax. Superveniens dysuria quandoque critice solvit hanc ophthalmiam.

Curatio exigit *vencectionem*, & *purgantia* sæpius repetita.

Fuscula diuretica, sanguinem purificantia.
Serum lactis & *aquas acidulas*.

Balnea tepida.

Collyrium ex lacte crocato, cataplasmate pomaceo, lacteo.

Collyrium obvolvens, ex amylo vel semine cydoniorum.

7. **OPHTHALMIA HUMIDA** est ophthalmia habitualis cum palpebrarum intumescientia circa tarsos, ac cœpiosa lacrimatione aut lippitudine complicata.

Causa est acrimonia humorum, unde malum adeo est pertinax, oculos, palpebras & genas excorians.

Curatio exigit

Vencectionem & *hyrudines* ad oculorum canthos.

Purgantia repetita.

Vesicatorium ad nucham vel inter scapulas.

Fonticulos aut *setaceum* in malo graviori.

Fuscula sanguinem edulcorantia vel antacrimoniosa specifica.

Collyrium ab initio *obvolvens* ex amylo, vel semi-

semine cydoniorum, & ad finem collyrium vitriolatum, vel ex saccharo saturni aut alumine.

8. **OPHTHALMIA VIOLENTA**, quæ ab oculi percussione, arenula illapsa, involatu insecti vel vulneratione oritur, ut post cataractæ operationem observatur. Curatur fomento ex vino herbis cephalicis infuso, vel cataplasmate pomaceo, & venæsectione.

9. **OPHTHALMIA CONSENSUALIS**, quæ a faburra primarum viarum oritur, ex signis faburræ acidæ, putridæ, biliosæ vel verminosæ, quæ infantibus est familiaris, noscitur. Hæc species est sæpe indolens, ac febrem remittentem gastricam habet quandoque comitem. A) Curatur salibus digestivis, purgantibus & anthelminticis, si a vermibus est.

Ad ophthalmiam consensualem pertinet etiam illa, quæ a dentitione, dolore capitis, obstruktione visceris, & aliis causis, ab oculo diskitis, oritur. Curatur ablato morbo primo.

10. **OPHTHALMIA ENCEPHALICA**, quæ a cerebro affecto oritur. Noscitur ex signis cerebri inflammati. Mali est ominis ophthalmia, quæ phre-

A) SELLE Rudimenta Pyretologica methodica 1773. Berlini p. 108.



phrenitidi, febri acutæ, aut capiti contuso circa septimum diem supervenit, designat enim cerebrum inflammatum, suppurratum, vel gangrænosum esse, & mortem instare. *Curatio adhibetur phrenitidis.*

I2. OPHTHALMIA PLETHORICA, quæ a sanguinis congestione ad oculos oritur. *Signa habet sanguinis ad caput congesti.*

Oritur a plethora, menstruis, hæmorrhoidibus suppressis, abusu spirituorum, connatu vomendi, tussiendi, alvum duram vel partum deponendi.

Curatur. Venæsectionibus, purgantibus, restitutis excretionibus suppressis. Externe aqua frigida conducit.

I2. OPHTHALMIA CATARRHALIS, quæ a transpiratione præsertim matutina suppressa originem dicit, A) ut catarrhus per aliquot dies durat, & facta coctione materiæ catarralis humor puriformis ex oculo profluit, atque ophthalmia evanescit.

Curatio ergo exigit curationem catarrhi. Externe lac crocatum prodest.

I3. OPH-

A) HOFFMANN Diss. de præcipuis oculorum morbis. & BLOCH medicinische Bemerkungen. Mulier quotiescumque parieti humido accubuit, ophthalmia affiebatur.

13. OPHTHALMIA GONORRHÖICA, quæ a suppressa gonorrhœa venerea oritur, tum matières virulenta ad textum cellulosum membranæ conjunctivæ seu albugineæ per metastasim deponitur.

Diagnosis. Biduo vel triduo post suppressam gonorrhœam oritur uberrima lippitudo, seu fluxus ex oculo rubente humoris alboflavescens, puriformis, & materiæ gonorrhœicæ, antea ex pene stillanti, simillimi. Rubor oculorum circa auroram ut in ophthalmia venerea non remittit, & fere semper in pessimam *chemosim* abit, qua cornea obscuratur, & membrana conjunctiva adeo intumescit, ut corneam in foveam quasi depresso exhibeat.

Prognosis. Hæc ophthalmia difficulter resolvitur, ut plurimum terminatur in suppurationem oculi interni, opacitatem corneæ, & immedicabilem cæcitatem.

Curatio, huc usque consueta, nempe venæfctiones, hirudines ad canthos oculorum, vesicatoria, fonticuli, purgantia per ostium data ex nitro & rheo, cataplasma discutientia ad oculum & emollientia balnea ad membrum virile, vix quidquam juverunt, ego plurimos cum hac methodo obcæcatos vidi, hinc consuetis remedii hisce addidi.

I. Usum



I. Usum internum mercurii gummosi ad 30 grana pro die.

2. Balneum oculi mercuriale , quod ex uncia una mercurii gummosi, in libra lactis coquenda, componitur , & quo oculi , mediante parvo vasculo vitreo , omni media hora tepide balneari debent.

3. Si nec mercurii usus malum fugaret , posset inoculatio gonorrhœæ ope cereoli , pure gonorrhœico maligno obliniti & urethræ immissi , fieri. A) at .

Ophthalmoxysis aut conjunctivæ excisio nil profundit , imo nocent. b)

14. OPHTHALMIA VENEREA , quæ ab acrimonia venerea per totum corpus diffusa originem dicit. Hæc a gonorrhœica ophthalmia differt , quod circa auroram remittat & *nunquam in chemosim abeat.*

Curatur usu interno mercurii gummosi , externe balneum oculi mercuriale , vel balsamum ophthalmicum mercuriale applicetur.

15. OPHTHALMIA CANCROSA , est rubor levis oculorum & marginum palpebralium , qui carcinomata exulcerata , quo cunque in loco corporis sita , comitatur. Curatio a cancri

A) Cel. LANGE Commentatio de ophthalmia. p. 78.

B) SCHMUCKER chirurg. Wahrnehmungen I. T. 482. S.

eri curatione pendet. V. *Rubor marginum palpebralium.*

16. OPHTHALMIA SCROPHULOSA, quæ infantibus scrophulosis familiaris est. A)

Noscitur ex signis acrimoniæ scrophulosa. Curatur usu interno corticis peruviani, antimonii, conservæ cicutæ, æthiopis mineralis, saponis Veneti, aquilæ albæ, gentianæ. Externe decoctum corticis peruviani cum alumine pro collyrio adhibetur, demum vesicatorio vel setaceo excitetur ulcus artificiale. Venæsectio & valida purgantia scrophulosis nocent.

17. OPHTHALMIA EXANTHEMATICA, quæ a metastasi materiæ alicujus morbi exanthematici, ad oculum depositi, provenit. Noscitur ex præsenti vel prægresso morbo exanthematico, morbilis, scabie, herpete, tinea capitis.

Curatio exigit revocationem exanthematis, & derivationem humoris acris ab oculis. Hinc præter medicamenta specifica salus est in repellentibus, ut setaceis, fonticulis, vesicatoriis & externis repellentibus.

18. OPHTHALMIA VARIOLOSA oritur ut plurimum aliquot septimanas post exsiccatas variolas,

F

præ-

A) BISSET. *Medical essays and observations.* p. 119.



præsertim si æger non bene purgatus fuerit, aut auræ frigidæ se nimis cito exponat, pertinax, humida & acris est, quandoque per annos affligit. Sæpe in maculas & staphylomata corneæ abit.

Curatio exigit purgantia crebriora, antimonialia, mercurialia, ulcera artificialia & balnea.

19. **OPHTHALMIA RHEUMATICA & ARTHRITICA**, vix ruborem facit, at dolorem intensum, & lacrimationem acrem. V. *Ophthalmodinia rheumatica*.

20. **OPHTHALMIA ONANISTICA**, quæ pollutionibus frequentioribus inducitur. Curatur aqua frigida vel vegetominerali, ad oculos applicato, & balneo frigido totius corporis. Internie dentur roborantia, cortex peruvianus valeriana, mars. A)

21. **OPHTHALMIA COMPLICATA**, est oculi inflammatio, quæ ab alio morbo oculari excitatur, ut a trichiasi, trachiomate, ulcere, vel fistula corneæ, synechia, lagophthalmio, ectropio, carbunculo albugineæ, pustula corneæ, hordeolo palpebrarum, corpore alieno in oculum illapso, vel vulnere oculi.

Cura-

A) BÖRNERS praktisches Werk von der Onanie. Leipzig 1776. p. 223.

Curatio hujus ophthalmiae exigit ablationem morbi primarii, qui ophthalmiam excitat. Hinc vide *morbos citatos*.

22. OPHTHALMIA EPIDEMICA. Ophthalmia catarrhalis a transpiratione suppressa & ophthalmiae autunnales a bile corrupta non raro epidemice observantur. *Curatio* ergo vel ut in catarriali, vel ut in gastrica instituantur. A)

23. OPHTHALMIA PERIODICA, quæ certo tempore aggreditur ut febris intermittens, quandoque cum, quandoque sine rubore oculi est. *Curatur* digestivis, purgantibus, & dein dato cortice peruviano. b)

OPHTHALMODINIA.

Est oculi vehemens dolor sine magno oculi rubore. Hicce dolor varius est, pruriens, ardens, pressorius arenosus.

F 2

SPE-

a) Ophthalmiam epidemicam adnotavit *Cel. HUXHAM.* *Opera medico-physica*, & *HOFFMAN.* l.c. Ophthalmias autumno epidemico-bilioſas v. in *Historia morborum Vratislaviensium.* p. 237. & *HIPPOCRATES Aphoris.* Sect. 3. aphor. 2.

b) Ophthalmiam quotidianam observavit *BUTER.* V. *opus treatise on the Kincough.* 1707. *Lond.* p. 27. & *SAGAR Systema morborum* p. 236. ophthalmiam tertianam vidit *Illastr. ROSENSTEIN.* V. *Kinder Krankheiten* p. 415.



SPECIES sunt

1. **OPHTHALMODINIA RHEUMATICA**, est oculi dolor cum levissimo, vel nullo penitus oculi rubore. *Inflammatio enim rheumatica est serosa & ruborem non producit. Curatio exigit purgantia antiphlogistica, lenia dia-phoretica atque vesicatoria. Collyria humida in rheumaticis & arthriticis oculus non fert.*
2. **OPHTHALMODINIA PERIODICA** est oculi dolor sine rubidine, qui certis & statis temporibus redit. Habet simul comitem pulsum celeriorem, sitim, lacrimationem, urinam intense rubram, quandoque lateritiam.
Curatur ut febris intermittens nempe ab initio purgantibus, & dein dato cortice peruviano, aut infuso florum arnicæ.
3. **OPHTHALMODINIA SPASMODICA** est dolor pressorius in oculi bulbo, qui a spasmo muscularum bulbi in hysterics & hypochondriacis, atque etiam finito fletu observatur.
Curatur mora, nervinis, & antispasmodicis.
4. **OPHTHALMODINIA AB INTERNA OCULI INFLAMMATIONE.** Dolor & sensatio adest, ac si bulbus ex orbita exprimeretur. *V. Plegmonem oculi.*
5. **OPHTHALMODINIA HYDROPHTHALMICA**, post frontis dolorem visus obscuratur, pupilla dilata-

latatur, & oculi bulbus eminentior est. Videlur ergo hæc species ab incipiente hydrophthalmya humoris vitrei pendere.

Curatur venæsectione, purgantibus, vesicatio-
rio. V. Hydrophthalmya.

6. **OPHTHALMODINIA ARENOSA**, est dolor pruriens & simul sensatio ac si arenula oculo inspersa esset, qui incipientes ophthalmias, arenulas oculo illapsas, & nascentia hordeola comitatur.

Curatio exigit eluitionem oculi cum aqua frigida vel aqua vegetominerali.

7. **OPHTHALMODINIA SYMPTOMATICA**, quæ alius morbi ocularis symptoma est, ut ophthalmia hordeoli &c. *Curatio exigit ablationem morbi primarii.*

8. **OPHTHALMODINIA CANCROSA**, quæ ab acri-

monia cancrosa in oculum deposita oritur.

V. Carcinoma oculi.

VARICOSITAS CONJUNCTIVÆ.

Est venarum in membrana conjunctiva dilatatio in varices. a)

CAUSA PROXIMA est laxitas harum venarum.

SPECIES sunt

I. **VARICOSITAS SIMPLEX**, quæ post ophthalmias sœpe remanet. *Curatur aqua vitriolata.*

F 3

2. VA-

a) Cirsophthalmia dicitur græcis.



2. VARICOSITAS COMPLICATA CUM PTERYGIO.

Curatio exigit ut varices, quæ ab oculi cantho ad radicem pterygii pergunt, lanceola vel acu oculari transversim discindantur, & solutione saturata vitrioli exsiccentur. De varicositate cancrosa. V. Carcinoma bulbi.

ECCHYMOYSIS CONJUNCTIVÆ.

Est sanguinis effusio in cellulas membranæ conjunctivæ.

Quandoque solammodo macula livida vel rubra in albo oculi observatur, quandoque tota vel dimida conjunctiva a sanguine effuso livet.

SPECIES sunt

1. *ECCHYMOYSIS VIOLENTA*, quæ a percussione oculi oritur. *Hæc species plerumque cum inflammatione complicatur.*

2. *ECCHYMOYSIS SPONTANEA*, quæ sine prægressa oculi contusione a vomitu, tussi, vel risu oritur. *Hæc species ut plurimum periculo & inflammatione vacat.*

Curatur utraque species fomento ex speciebus cephalicis vino infusis.

PUSTULÆ CONJUNCTIVÆ.

Est vesicula pure turgida, quæ in conjunctiva ad limbum corneæ ut plurimum invenitur, & ad quam fasciculus vasorum rubrorum excurrit.

SPE-

SPECIES sunt

1. PUSTULA VULGARIS, quæ ab ophthalmia angulari, oritur.

Curatur sedata inflammatione, aqua camphorata & dein solutione lapidis divini.

2. PUSTULA ACRIMONIOSA, quæ in venereis, variolosis, & ab aliis acrimoniis excitatur.

Præter mox dicta remedia externa exigit medicamenta interna specifica.

PHLYCTENA.

Est vesicula aqua plena.

SPECIES sunt

1. PHLYCTENA INDOLENS, quæ hydatidi est similis. *Curatio exigit incisionem, & excisionem cum aqua vitriolata.*

2. PHLYCTENA ARDENSI, quæ in limbo rubet, & dolet, oritur a varia sanguinis acrimonia, & non raro in ulcera pessima conjunctivæ degenerat. *Curatio exigit ablationem inflammationis, collyria exsiccantia, & interna specifica.*

PAPULA.

Est tuberculum durum, in conjunctiva oculi.

Quandoque albuginea permultas tales papulas habet.



CAUSA videtur esse induratio alicuius glandulae subcutaneæ in conjunctiva, A)

CURATIO exigit medicamenta resolventia *interne* & *externe* applicanda.

CARUNCULA.

Est papula mollis & rubicunda ex conjunctiva ex crescens carunculae carneæ similis. B)

CAUSA videtur esse transudatio humoris lymphatici in tuberculum concrecentis.

SPECIES sunt

1. **CARUNCULA SIMPLEX**, quæ sine alio morbo albuginea est. *Curatur* solutione vitriolata.

2. **CARUNCULÆ COMPLICATÆ**, quæ ulcera, & alios morbos conjunctivæ comitantur. *Curat*ur etiam solutione vitriolata, vel butyro antimonii.

CARBUNCULUS OCULI.

Est tuberculum in albuginea, vel in ipsa cornea, ab initio saturate rubens, & ardens, dein in cruentam gangrenosam abiens.

CAUSA PROXIMA est miasma carbunculosum. Hic morbus ut plurimum oculi sphacelum, cæcitatem & non raro mortem infert.

Cu-

a) JANIN l. c. p. 58.

b) Græcis vocatur *epanastema*, & colore rubente differt a *pinguecula*, quæ flavescit. V. *Pterygium*.

Curatio. Externe applicetur oculo mucilago cyclo-
niorum camphorata, & aqua vegetomineralis.
Interne detur acetum cum camphora & cor-
tice peruviano.

ULCUS CONJUNCTIVÆ.

Est solutio purulenta in conjunctiva.

SPECIES sunt

1. **ULCUS SIMPLEX**, quod a causa externa vel præ-
gressa inflammatione pura ortum est; cura-
tur balsamo vulnerario ophthalmico, vel so-
lutione lapidis divini.
2. **ULCUS VENEREUM**, quod a chemosi gonorr-
hoica, vel venereis pustulis conjunctivæ sæ-
pe remanet. Curatur solutione diluta sub-
limati corrosivi cum melle rosaceo.
3. **ULCUS SCROPHULOSUM.** Quod ex prægressa
chemosi scrophulosa quandoque remanet, cu-
ratur interno usu cort. peruv. cum conserva
cicutæ, & aliis antiscrophulosis. Externe
decoctum corticis cum alumine quandoque
prodest.

ALIENA OCULIS ILLAPSA.

Sunt corpora peregrina oculis illapsa, ut arenula, fe-
stuca, infectum, ramentum ferri.

Excitant hæc corpora assiduam nictitationem, lacru-
mationem, oculi inflammationem.



SPECIES sunt

1. CORPORA ALIENA INTER BULBUM ET PALPEBRAS LOCATA. Hæc elui, aut ex oculi cantho interno digitis exprimi possunt. Aut lingua ab alio homine elambantur, vel penicillo abstergantur, aut volfella, vel stilo eximantur. Ramentum ferreum magnete applicato quandoque extrahi potest.
 2. CORPORA ALIENA CORNEÆ VEL CONJUNCTIVÆ INFIXA. Hæc volfella eximi debent, vel si hoc fieri nequeat, acu dilatetur locus, cui corpus heterogeneum adhæret.
-

MORBI CORNEÆ.



OBSCURATIO CORNEÆ.

Est corneæ totius perfecta vel imperfecta impelludicidas.

Noscitur ex corneæ colore naturali depravato, visu obscuro vel nullo.

CAUSA PROXIMA est, vel effusio humoris inter lamellas corneæ, vel stagnatio humorum seroforum in vasis pellucidis corneæ, vel concretio vasorum aut fibrarum, quæ corneam constituunt.

CAU-

CAUSÆ REMOTÆ sunt *inflammatio corneæ*, *calor ignis*, *depositio humoris variolosi*, *venerei*, *scrophulosis*, *subsidentia corneæ*, *inflata coagulantia ut vitriolum*.

EFFECTUS sunt *amblyopia si obscura*, *cæcitas si penitus opaca*, *visus dimidiatus*, *si solummodo medietas corneæ opaca est*.

Obscuratio corneæ dividitur generatim

1. In *imperfectam* seu *nubosam*, quando tota cornea subpellucida, nubis vel fumi adinstar obscurata est, & ægrotus debilem adhuc habet visum. Hæc species curabilis est.
2. In *perfectam* seu *opacam*, quando tota cornea flava vel cretacea est, & ægrotus penitus nil videat. Hæc species est *incurabilis* præsertim si malum jam antiquum est. Si vero opacitas hinc inde locum cærulescentem seu nubosum exhibeat, applicentur remedia huic loco, ut saltem ille redatur pellucidus.

SPECIES obscurationum corneæ sunt

1. **OBSCURATIO AB INFLAMMATIONE CORNEÆ.**
Curatur ut ophthalmia chronica venæfetione, purgantibus, vesicatorio nuchæ applicato. *Externe* collyrium vitriolatum, vel aqua vegetomineralis convenit.
2. **OBSCURATIO VULGARIS**, quæ sine causa specifica oritur. *Curatio* exigit interna resolventia, extractum cicutæ, pulsatillæ nigricantis,



tis, A) sal mirabile, sublimatus corrosivus, aquila alba, præprimis laudantur cum interpolatis purgantibus.

Externe collyria abstergentia, aut caustica dilutissima convenient.

1. *Pulvis boracis, mercurii dulcis, aluminis usti, vitrioli albi, opii; ex his grana quædam cum saccharo canarino in pulverem rediguntur.*

2. *Solutio boracis, mercurii dulcis, aluminis usti, vitrioli albi, lapidis divini, salis tartari fixi, salis volatilis cornu cervi, fellis lacii piscis, lapidis infernalis, butyri antimonii, tartari emetici, auripigmenti, aloës. Parantur hæ solutiones ex aliquot granis horum medicamentorum, in uncia una aquæ vel melis, solutis.*

3. *Linimentum ex mercurio præcipitato rubro, camphora & tutia præparata, quæ cum axungia viperina, medulla ossium, butyro recenti, oleo mustellæ fluviatilis, aut alio oleo in formam linimenti reducuntur.*

4. *Præparata sunt aqua cærulea, balsamum ophthalmicum rubrum, balsamum ophthalmicum Saint Yves.*

Omnia

A) *Illust. Baron. de Störck libellus de pulsatilla nigricante.*

Omnia hæc medicamenta ope tenuis penicilli
bene diductis palpebris corneæ opacæ ali-
quoties de die & per aliquot menses illini-
ri debent, atque dolore nimis excitato
oculus lacte tepido illico eluatur. Solutio-
nibus autem oculus aliquoties de die bal-
neari potest.

3. OBSCURATIO VENEREA, quæ a chemosi vene-
rea quandoque supereſt, quandoque ſine hac
prægressa, a miasmate venereo in corneam
depoſita, ut in infantibus a parentibus vene-
reis progenitis aliquoties vidi, originem ha-
bet. A)

*Curatur uſu interno mercurii gummosi, Ex-
terne unguentum ophthalmicum cum præci-
pitato rubro convenit, vel aqua vitriolata
cum grano ſublimati corrōſivi, vel balneo
mercuriali.*

4. OBSCURATIO SCROPHULOSA, quæ infantes scro-
phulosos aggreditur.

*Curatur uſu interno corticis peruviani, cicu-
tæ, æthiopis mineralis. Externe decoctum
corticis peruviani cum aqua ophthalmica cum
ſapone veneto applicetur.*

5. O-

A) Ill. SAUVAGES l. c. p. I. p. 729. has obſcurations in-
fantum venereas dicit incurabiles. Ego plures tales infan-
tes balneo oculari ex lacte mercuriali curavi.

5. OBSCURATIO VARIOLOSA , quæ aliquot post finitas variolas septimanas cum ophthalmia , vel sine hac , corneam afficere solet , & non raro in staphyloma corneæ degenerat.

Curatio exigit repetita purgantia , & corticem peruvianum.

Eexterne ut in obscuratione vulgari tentetur butyrum antimonii.

6. OBSCURATIO A CORNEÆ RHYTIDOSI evanescit curata subsidentia corneæ. V. *Rhytidosis*.

7. OBSCURATIO A STAPHYLOMATE curatur butyro antimonii. V. *Staphyloma*.

8. OBSCURATIO CORNEÆ COMPLICATA , seu quæ chemosim , staphyloma , ulcera & alios morbos comitatur. *Curatio* exigit ablationem morbi primarii , & dein specialem curationem obscurationis ; ut hucusque diximus.

MACULÆ CORNEÆ.

Sunt obscurationes vel opacitates in quodam corneæ loco. A).

CAUSÆ sunt eadem ac in obscuratione corneæ.

SPECIES macularum in cornea sunt 6.

I. MACULA SEMIPELLUCIDA seu NEPHELIUM , est macula subpellucida , nubem , nebulam vel fumum in cornea referens. Oritur ab humore

A) MAUCHART, *dissert. de maculis corneæ in Collect. Halleriana.*



more crasso in vasis pellucidis corneæ stagnantibus. A)

Curatur ut obscuratio vulgaris.

2. MACULA OPACA seu LEUCOMA est macula penitus opaca, albi vel flavi coloris, dicitur etiam *albugo*. Oritur ab humore opaco inter lamellas corneæ effuso.

Curatur causticis dilutis, quæ in obscuratione perfecta laudavimus.

3. MACULA MARGARITACEA seu PARALAMPSIS, est macula opacissima, cretacei vel albo-cærulei coloris, in figuram margaritæ, tuberculi albi ad instar elevata, & indurata.

Vix unquam sanari potest. Interim pro tentamine laudantur sequentia remedia.

1. *Extima* tuberculi *superficies* tangatur lapide infernali, vel guttula butyri antimonii, aut solutione cantharidum vel auripigmenti.

2. *Extima* tuberculi *superficies*.

1. *Abradatur* xystro chalybeo, vel lima tenuissima vel vitro contuso.

2. *Abscindatur* cultello.

3. *Perforetur* acu plurimis puncturis, vel

4. *Scarificetur* parvis incisionibus & illico solutione acri in suppurationem redigatur.

4. MA-

a) Græcis dicitur etiam *achlys* vel *ægis*.

4. **MACULA ARCUATA** seu **GERONTOXON**, est macula, quæ marginem corneæ totum vel pro parte arcus adinstar ambit. Medietas corneæ pellucida manet, hinc discus corneæ adeo exiguis apparet. Est vitium senibus familiare, hinc *arcus senilis* vocatur; videtur a vasis pellucidis in senio concrecentibus oriri. Est vitium *incurabile*.

5. **CICATRIX** seu **OULE**, est macula oblonga, quæ vulneri aut ulceri corneæ ob vasa pellucida **concreta**, succedit. Vulnera acuto instrumento corneæ inflicta cicatricem visibilem non relinquunt, ut post extractionem cataractæ videre est. Sola instrumenta obtusa & vulnera corneæ multum suppurantia cicatricem relinquunt visibilem, quæ raro iterum evanescit.

PTERYGIUM.

Est excrescentia membranacea, quæ ut plurimum ab interno oculi cantho alæ expansæ adinstar per membranam albugineam & corneam versus pupillam sensim increscit.

CAUSA PROXIMA videtur extensio seu prolongatio fibrarum & vasorum carunculæ lacrimalis vel membranæ semilunaris esse.

CAUSÆ REMOTÆ sunt inflammations habituales harum partium, relaxations, depositiones acrimoniæ.

SPE-

SPECIES pterygiorum sunt quartuor.

1. PTERYGIUM TENUЕ seu UNGULA, est pellicula pellucida, tenuis, cineritii coloris, indolens, ex caruncula lacrimali vel membranula semi-lunari excrescens.

Curatur vel medicamentis vel abscissione.

Medicamenta sunt solutio saturata vitrioli, lapidis divini, lapidis infernalis, butyrum antimonii, alumem ustum cum saccharo.

Abscisso exigit ut pterygium tenui vosella in plicam elevetur, ac cultro oculari sensim abscindatur. Pterygia, quæ filamentis solummodo adhærent, facile abscinduntur, difficilime autem, quæ ubique accreta sunt corneæ ac in plicam elevari non possunt.

2. PTERYGIUM CRASSUM seu PANNUS. Differt ab ungula crassitie, colore rubro & congerie vasorum rubrorum supra album oculi, ipsamque corneam fasciculi ad instar expansorum.

Curatur

1. *Abscissione vasorum nutrientium*, quæ a cantho interno ad pterygium pergunt, sic hoc quandoque contabescit.

2. *Medicamentis causticis mox laudatis.*

3. *Abscissione panni ad carunculam usque.*

3. PTERYGIUM MALIGNUM, est pannus diversicolor, dolens, varicosus, ab acrimonia cancerosa ortus.

G

Cura-

❧ ❧ ❧

Curatio exigit curam cancri, quæ raro succedit.

4. PTERYGIUM PINGUE seu PINGUECULA est molecula lardo vel pinguedini similis, mollis, indolens, flavescentis coloris, quæ ut plurimum in angulo oculi externo ex albuginea nascitur, & raro in corneam usque ascendit, sed per vitam sèpe sic manet.

Curatio, si in corneam ascenderet, exigit excisionem.

STAPHYLOMA.

Est corneæ morbus, quo hæc membrana præternaturalē suæ substantiæ crassitiem & opacitatem subit. A)

CAUSA PROXIMA est humoris crassioris decubitus inter lamellas corneæ, adeo ut interna & externa corneæ superficies mirum in modum protuberet.

CAUSÆ REMOTÆ sunt habitualis corneæ inflammatio, valida contusio, at frequentissime a depositione humoris variolosi post variolas oritur.

SPECIES sunt

I. STAPHYLOMA TOTALE, quod totam corneam occu-

A) Veram hujus morbi notionem primus nobis dedit doctissimus Professor RICHTER. V. Cl. viri fascicul. II. observationum chirurgicarum. p. 104.

occupat; hæc species frequentissima est. Pro-tuberat cornea opacata, ac si conus ex bulbo oculi prouineret, increscendo inferiorem palpebram propellit & adeo invertit, ut cornea elongata genæ incumbat, eam fricet & excoriet. Unde bulbus oculi aëris attractus expositus, sordibus inquinatus, & ciliis palpebræ inferioris irritatus sæpe acriter dolet, rubet & minimis papillis obsidetur.

Curatio. Incipiens staphyloma quandoque aqua frigida aut vitriolata resolvitur, ut nuper vidi; antiquum autem staphyloma solo butyro antimonii resolvi potest.

Palpebris bene diductis, ope penicilli parvi, cuius cuspis butyri antimonii guttula madeat, illiniatur cornea opaca, omni altero vel tertio die; quamprimum æger a defluente medicamento dolorem in oculo sentit, eluatur oculus lacte tepido. A)

2. **STAPHYLOMA RACEMOSUM**, est staphyloma, quod tuberculis carneis, caput aciculæ plerumque æquantibus vel majoribus, obsitum est.

G 2

Cura-

A) Hoc egregium remedium primus tentavit celeberrimus ophthalmiater gallicus JANIN. V. librum citatum; hanc methodum esse efficacissimam & tutissimam observationibus illustravit Cl. Prof. RICHTER vid. l. c. p. 123.



Curatur ut staphyloma simplex.

3. **STAPHYLOMA PARTIALE**, quod aliquam modo partem in cornea occupat. Exhibit ergo tumorem opacum e cornea prominentem, uvæ parvæ albicanti quodammodo similem.
Curatur ut staphyloma totale.

4. **STAPHYLOMA SCLEROTICÆ** est tumor cærulefascens, uvæ parvæ cærulefcenti similis, e quodam scleroticæ loco per albugineam eminens. *Curatur etiam butyro antimonii.*

5. **STAPHYLOMA PELLUCIDUM**, in quo cornea non incrassata, admodum autem extensa at pellucida est. A) Hicce morbus est incipiens hydrophthalmia, hinc ejus curationem exigit.
 V. *Hydrophthalmia.*

6. **STAPHYLOMA COMPLICATUM**, quod cum ophthalmia, vel exulceratione oculi, cum synchia, ectropio, curunculis aut alio morbo oculari complicatum est. Hi morbi evanescent curato staphylomate.

7. **STAPHYLOMA IRIDIS.** De hac spece V. *Ptoſis iridis.*

ONYX.

Est abscessus seu puris collectio inter corneæ lamellas.

SI-

A) Dicitur a quibusdam *ceratocele*, seu *hernia cornea*.

V. BURGMANNI *epistola de singulari tunicarum utriusque oculi expansione.*

B) Onyx a figura & colore, quem quandoque exhibet, lati-



SIGNA sunt macula alba, eminens, fluctuans, mollis.

Hoc caractere a leucomate, quod durum est, differt.

SPECIES sunt

I. ABSCESSUS SUPERFICIALIS, ab inflammatione natus, non est periculosus, & cum inflammatione evanescit applicatis collyriis anti-phlogisticis.

2. ABSCESSUS PROFUNDUS, qui profunde inter lamellas corneæ hæret, quandoque introrsum rumpitur, & hypopyum facit, quandoque extrorsum aperitur & fistulam corneæ relinquit, quandoque pus exsiccatur & in leucoma abit.

Curatio exigit resolutionem abscessus, quod solutione boracis cum saccharo tentatur, si resolutione non succedit, abscessus cuspidi cunctelli vel acus pro cataracta aperiri, & aperitus ut ulcus corneæ sanari debet.

HELCOMA.

Est ulcus in externa vel interna corneæ superficie.

CAUSÆ horum ulcerum sunt prægressa inflammatio, vulnus, contusio, depositio variolosa, venerea, scrophulosa, acrimonia lacrumarum, trichiasis,



pterygium detractum , pustula vel phlyctæna corneæ.

NOSCITUR visu superficie excavatæ & purulentæ in cornea. A)

VARIETATES sunt.

1. ULCUS SUPERFICIALE seu levis excoriatio, quæ totam corneam occupat , quandoque in margine corneæ sedet , & albedinem in cornea, rubedinem in conjunctiva causat. Curatur solutione lapidis divini , vel vitrioli albi, b) cum albumine ovi soluti , & ope penicilli corneæ illiniti.

2. ULCUS SORDIDUM , quod crustosum vel lardaceum est. Si solutio boracis vel lapidis divini non juvat , purificetur diluta solutione lapidis infernalis vel butyri antimonii , vel sublimati corrosivi.

3. ULCUS FUNGOSUM , ex quo papilla carneæ , capitulo aciculæ æqualis , excrescit. Papilla fun-

A) Ophthalmiatri veteres ulceræ corneæ variis inducebant nominibus , quæ memoriam onerant , & omni utilitate destituantur. *Helcydron* est ulcus superficiale , *Coiloma* est ulcus excavatum , *Encauma* vel *epicanma* est ulcus sordidum & ardens. *Eotryon* est ulcus cum caruncula , *argema* est ulcus marginale. V. MAUCHART *Diff. de ulceribus cornea.*

B) V. TRECOURT in *Journal de medecine.* T. xxxii.

fungosa abscindatur, vel lapide infernali tangatur. Demum *Revelentia*, ut vesicatoria, setacea, fonticuli, purgantia omni altero die repetita, simili adhibeantur.

4. **ULCUS VENEREUM**, exigit mercurialia interna & externe solutionem dilutam sublimatum cum melle rosaceo.
5. **ULCUS SCROPHULOSUM**, quod scrophulosos afficit, exigit antiscrophulosa interna, & externe decoctum corticis.

FISTULA CORNEÆ.

Est ulcus sinuosum seu canalis purulentus in cornea. Hæ fistulæ vel *sursum* vel *deorsum*, vel *transversum* vel *recta introrsum* vel *tortuose* inter laminas corneæ pergunt. A)

SPECIES sunt

I. **FISTULA PENETRANS**, quæ utramque corneæ superficiem penetrat, noscitur visu foraminis corneam penetrantis, stylo, effluxu humoris aquei, obscuratione, corrugatione & subsidentia corneæ, atque oculi rubore perpetuo.

Diu durantes fistulæ penetrantes ob corneæ subsidentiam & irritationem iridis, myosim, inflammationem & concretionem iridis cum cornea faciunt,

G 4

Cu-

A) MAUCHART. *Diss. de fistulis corneæ.*



Curatio. Primum tentetur purificatio & sanatio fistulæ cum solutione vitrioli, vel aloes, vel boracis cum saccharo.

2. Tangatur orificium cum solutione cantharidum, lapidis infernalis, vel butyro antimonii.

3. Cultello pro cataracta dilatetur vel discindatur fistula.

2. **FISTULA NON PENETRANS**, quæ corneæ internam superficiem non transit, noscitur vi-
su albidi canaliculi; cornea obscurata ac non
collapsa,

Curatur mox laudatis medicamentis & fistulæ dilatatione cum cultello.

Interne dentur specifica antacrimoniosa.

VULNUS CORNEÆ.

Est corneæ dissectio vel punctura.

In utraque specie humor aqueus effluit, & cornea collabitur.

VARIETATES constitui possunt

1. **VULNUS SCISSUM**, seu instrumento acuto inflatum facile & intra 48. horas consanatur sine remanente cicatrice visibili, si clausis palpebris oculus deligetur.

2. **VULNUS PUNCTUM.** Collabitur oculus at vulnus intra 24. horas ut plurimum sanatur, hinc hæ curationes sæpe habentur miraculosæ.

3. **VUL-**



3. VULNUS CONTUSUM , in suppurationem abit, tardius sanatur , & cicatricem relinquit visibilem.
4. VULNUS RUPTUM seu RHEXIS OCULI , hæc ruptura a contusione externa , vel ab hypopyo aut hydrophthalmia oriri potest. Utplurimum omnes efflunt humores & sequitur immedicabilis cæcitas. V. Hypopium.
5. VULNUS COMPLICATUM CUM PROLAPSU IRIDIS vel HUMORIS VITREI . Hæ res vulneris consolidationem impediunt. V. Ptosis iridis & prolapsus humoris vitrei.

RUTIDOSIS.

Est corrugatio & subsidentia corneæ.

CAUSA PROXIMA est defectus humoris aquei.

SPECIES sunt

1. RUTIDOSIS A VULNERE vel PUNCTURA CORNEAM PENETRANTE. Curatur sanato vulnera intra 24. horas.
2. RUTIDOSIS A FISTULA CORNEAM PENETRANTE. Curatio palliativa exigit applicationem pelliculæ ad fistulam, ne humor aqueus perpetuo exeat. At curatio radicalis exigit ut fistula curetur.
3. RUTIDOSIS A DEFICIENTE HUMORE AQUEO, ut a senio, febre, magna evacuatione prægressa, & magna siccitate aëris observatur.



Curatur cardiacis nutrientibus, & externis humectantibus.

4. **RUTIDOSIS CADAVERUM**, cum humor aqueus exhallet per corneam & novus non seceratur, ideo cornea in cadaveribus obscura & collapsa invenitur. Hoc unum ex certissimis signis est mortis.

PUSTULÆ CORNEÆ.

Sunt vesiculæ pure plenæ in externa corneæ superficie.

SPECIES sunt

1. **PUSTULÆ AB INFLAMMATIONE CORNEÆ**, quæ quandoque in suppurationem abit, & pustulas in cornea relinquit. *Curantur aqua vegetominerali vel vitriolata.*

2. **PUSTULÆ A DEPOSITIONE ACRIMONIÆ IN CORNEAM**, ut in variolosis quandoque observatur. *Curantur purgantibus repetitis & collyriis exsiccantibus. V. Ophthalmia variolosa.*

PHLYCTÆNÆ CORNEÆ.

Sunt vesiculæ aqua plenæ in externa corneæ superficie.

SPECIES sunt

1. **PHLYCTÆNÆ SIMPLICES**, quæ nec dolent nec in margine rubent, ac facile sine reicto ulcere

cere evanescunt. Curatio exigit incisionem vesiculae, atque collyria exsiccantia.

2. PHLYCTÆNÆ ACRIMONIOSÆ, quæ dolent, ardent, & marginem inflammatum habent. Curatio exigit purgantia, & collyria exsiccantia. A)

CARUNCULÆ CORNEÆ.

Sunt parvæ papillæ molles & rubentes, in externa corneæ superficie. B)

CAUSA PROXIMA est humoris lymphatici transfundantis concretio in papillas.

SPECIES sunt

1. CARUNCULÆ SIMPLICES, quæ sine alio morbo oculari nascuntur. Curantur solutione lapidis infernalis vel butyro antimonii.
2. CARUNCULÆ COMPLICATÆ, quæ staphylo-matis, & ulcerum superficiem quandoque ob-sident. Curantur ut prior species.

MOR-

A) Phlyctæna simplices possunt etiam hydatides corneæ, atque phlyctæna acrimoniosæ solent psydracia corneæ dici. V. MAUCLERE nomenclatura critica morborum ocularium. Lond. 1768. p. 19.

B) Cel. RICHTER tales carunculas dissecuit & illas solidas, verasque esse excrescentias vidit. Imo tale tuberculum ter resectum ter renascebatur. V. Observ. chirurg. Fasc. 2. p. 109, & 115. Veteres dixerunt has carunculas epanastemata seu rebelliones.



MORBI BULBI OCULARIS.

ATROPHIA BULBI.

Est bulbi ocularis contabescentia seu diminutio voluminis.

CAUSA PROXIMA est humorum bulbum distendentium copia requisita deficiens.

SPECIES sunt

1. **ATROPHIA AB HUMORIS VITREI PARTE QUADAM EFFLUENTE**, ut in oculi vulneribus, & extractione cataractæ contingit. Hæc species tempore iterum emendatur.

2. **ATROPHIA PURULENTA** seu **PHTHYSIS BULBI**, qua humor vitreus synchysi purulenta consummitur & absorbetur. Hæc species est incurabilis.

3. **ATROPHIA ACRIMONIOSA**; a capitis scabie exsiccata eriebatur oculi contabescentia, quæ fonticulo retro auriculas excitato curabatur.

4. **ATROPHIA PINGUEDINIS ORBITALIS**, in hac specie oculi in orbitam retrahuntur adeo ut orbitæ concavæ apparent. Curatur quandoque irritatione & frictionibus bulbi.

5. **ATRO-**

5. **ATROPHIA AB EVACUATIONE HUMORUM OCULI**, si per oculum incisum aut sponte hypopyo ruptum, omnes ex bulbi cavo effluunt humores, tunc bulbus integer in parvam mollem carneam contrahitur. Hoc vitium exigit *oculum artificiale*.

EXOPHTHALMIA.

Est bulbi ocularis tanta intumescensia ut palpebris tegi nequeat.

SPECIES sunt

1. **EXOPHTHALMIA INFLAMMATORIA**, quæ a validissima oculi inflammatione oritur. V. *Che-
mosis*.

2. **EXOPHTHALMIA PURURENTA**, quæ a collectione puris intra oculi bulbum nascitur. V. *Hypopium*.

3. **EXOPHTHALMIA SANGUINEA**, quæ a congestione sanguinis ad oculum oritur, sic in strangulatis, parturientibus, a cutu sanguinis, & quandoque a nisu nimio rubent atque extra orbitam prominent oculi.

Curatio exigit venæsectionem, purgantia, & externe aquam frigidam, vel vegetominealem.

4. **EXOPHTHALMIA METASTATICA**, quæ ex decubitu materiæ morbosæ, ut febrilis, lactex,

vene-



venereæ, scrophulosæ a) generatur. Curatur ut *chemosis*, at simul dentur antacriminoſa.

5. **EXOPHTHALMIA CANCROSA**, est oculi degeneratio in fungum cancerosum, qui ſæpe ad pugni magnitudinem ex orbita prominet. V. *Carcinoma oculi*.

Curatur sola extirpatione bulbi.

6. **EXOPHTHALMIA HYDROPICA**, quæ a nimia humoris aquei collectione nascitur. V. *Hydrophthalmia*.

7. **EXOPHTHALMIA STAPHYLOMATICA**, staphyloma ſubinde adeo prominet, ut palpebris tegi nequeat. V. *Staphyloma*.

OPHTHALMOPTOSIS.

Est bulbi ocularis prolapsus in genas, canthos, vel ſurſum, vix mutata bulbi magnitudine. b)

SPECIES sunt.

I. **OPHTHALMOPTOSIS VIOLENTA**, qui a contuſione

a) Hujusmodi observationem habet GENDRON, qui in puerο bulbum oculi per oedema tunice conjunctivæ, ex cacochyria scrophulosa ortum, ad ovi gallinacei magnitudinem extensum vidit. V. GENDRON *traitè des maladies des yeux*. a Paris. 1770. T. 2. p. 38.

b) Græcis vocatur hicce morbus *Ecpiesmus* aut *proſis bulbi*.

sione vel iectu valido oculi generatur. Subito prolabitur oculi bulbus in genam vel in canthum, & ob elongatum, extensumque nervum opticum subito adest cæcitas.

Curatio exigit ut prolapsus oculi bulbus illico reponatur, & fomentis antiphlogisticis, simulque roborantibus aut aqua frigida foveatur. Sic ut plurimum quod mirum est, non solum oculi integritas, sed etiam visus restituitur. A)

2. **OPHTHALMOPTOSIS A TUMORE INTRAORBITALI.** Sic exostosis, tophus, abscessus, lipoma, atheroma, hygroma, scirrus intra orbitam natus vel induratio pinguedinis orbitalis sursum, deorsum vel ad canthos bulbum oculi exprimit.

Si medicamenta mercurialia vel alia resolventia hos tumores non auferant, tunc *curatio* exigit ut tumor incidatur aut ex orbita excidatur. B)

3. **OPHTHALMOPTOSIS PARALYTICA**, quæ a paralysi muscularum rectorum & hinc majori nato robure muscularum obliquorum bulbi ori-

A) Observationes plures recenset Cl. ACREL V. ejus *Bemerkungen*, & R. BROKELSEY in *medical. observat.*

T. II.

B) *Memoires de l' Accademie de chirurgie.* T. 5.



oritur. Curatur antiparaliticis ut infuso flos-
rum arnicæ & aliis.

4. OPHTHALMOPTOSIS STAPHYLOMATICA, sta-
phyloma quandoque deprimit palpebram in-
feriorem & genæ incubit. Curatio exigit
butyrum antimonii. V. *Staphyloma*.

CARCINOMA BULBI.

Est bulbi oocularis degeneratio in cancrum.

CAUSA PROXIMA est depositio virus cancerosi ad ocu-
li tunicas.

SPECIES sunt

1. CARCINOMA VULGARE. Oritur dolor in sanis-
simo oculo, dein vasa albugineæ varicosa,
sanguine atro infarcta, carnea quasi reddun-
tur ac visus perit. Tandem dolor vehemen-
tissimus nascitur, totus bulbus scirrhosus, ac
carni rubræ induratæ similis evadit.

2. CARCINOMA FUNGOSUM, incipit hæc species
cum tuberculo fungoso corneæ vel albugineæ,
quod sensim totam oculi superficiem occupat,
& bulbus in ingentem fungum dolentem de-
generat.

Curatio. In incipiente oculi carcinomate tenta-
ri debent: 1. omnia remedia anticancroſa, quæ
in cancro palpebrarum indicavimus: 2. car-
cinoma parvum quandoque ligatura afferi po-
test, his vero nil juvantibus fiat *extirpatio
bulbi*.

Extir-

Exstirpatione oculi cancroſi.

INDICATIO. Carcinoma, quod magnam bulbi partem occupat, hanc operationem exigit. A)

CONTRAINDICATIO. At si carcinoma jam inveteratum, aut a causa interna ortum est; aut si jam orbitæ ossa carie afficiuntur, tunc hæc operatio sine fructu instituitur.

INSTRUMENTA. Culter rectus.

Culter juxta superficiem parum curvatus.

Forfex cum apicibus obtusis, & juxta superficiem aliquantum curvatus, DAVIELLIANO similis.

Acus curva cum filis ceratis.

PRO DELIGATIONE. Plumaceola multa & variæ magnitudinis.

Splenia.

Fascia.

Fungus agaricus & Alcohol vini.

SITUS PRO OPERATIONE. Æger sedeat in sella altiori versus lucem, caput ejus ab adjutore retineatur, chirurgus stet ante ægrum.

OPERATIO ipsa.

I. Chirurgus cultro recto ad $\frac{1}{4}$ pollicis findat com-

H

miſ-

a) Mémoires de l' Academie de chirurgie. T. V . HESTERI, atque BILGUERI Bemerkungen.



missuram externam palpebrarum. Adjutor bene elevet dein palpebram superiorem.

2. Cultro juxta marginem superiorem orbitæ discindatur membrana conjunctiva, quæ bulbum ad palpebram superiorem necit.
3. Demum bene depressa palpebra inferiori etiam juxta inferiorem marginem orbitalem discindatur membrana conjunctiva, & separetur bulbus a palpebra inferiori.
4. Tandem ope acus curvæ filum ceratum per anteriorem bulbi partem traducatur, ut ansa fili bulbus ex orbita protrahi possit.
5. Jam ansa fili bulbo protracto pinguedo & musculi bulbi tum supra tum infra bulbum ab orbita vel cultro vel forfice curvato separantur.
6. Ubique demum separato bulbo nervus opticus vel cultro curvo vel forfice curvato absindatur, & bulbus eximatur.
7. Digitò exploret chirurgus an non amplius moleculas induratas in orbita inveniat, has si adsint, excindat.
8. Dein plumaceolis bene expleat cavum orbitæ, atque applicet splenia & fasciam, quam triduo relinquat.
9. Tandem balsamo arcæi suppuration & incrementum substantiæ carneæ, ex relicta pinguedine orbitali propullulantis, ad tantam mo-

molem promoveatur, ut oculus artificialis com-
móde applicari possit. V. Hypopium & ap-
plicatio oculi artificialis.

TETANUS OCULI.

Est spasmatica & constans contractio muscularum,
qui bulbum movent.

NOSCITUR ex bulbi immobilitate.

SPECIES sunt

1. TETANUS A VULNERE OCULI. Quamprimum
sub operatione cataractæ acus vel culter oca-
lo immersus est, immobilis stat bulbus ocu-
li. Id a muscularum bulbi spasmo fieri vi-
detur. Hic spasmus intra aliquot minuta
sponte remittit.

2. TETANUS SYMPTOMATICUS, seu OCULI FIXI,
qui in quibusdam febribus & morbis spas-
modicis observantur. A) Curatur antispasmo-
dicis & ablato morbo primario.

NYSTAGMUS.

Est convulsio seu invita agitatio bulbi ocularis.

NOSCITUR ex instabilitate seu involuntario ac con-
stanti motu bulbi ocularis, ab uno in alterum
canthum, aut in aliam directionem. Quan-
doque simul hippus adest.

SPECIES sunt

I. NYSTAGMUS A TIMORE, hæc agitatio sub
H 2 ca-

A) Cel. Prof. TRNKA comment. de ZERNO. p. 9.



cataractæ operatione observatur, soplur persuasione & mora.

2. **NYSTAGMUS AB ARENULA IN OCULUM IL-LAPSA**, hæc species curatur exempta arenula.
3. **NYSTAGMUS CATARRHOSUS**, qui gravedinem comitatur. Curatur ablata gravedine.
4. **NYSTAGMUS A SABURRA PRIMARUM VIA-RUM**, ut in infantibus verminosis observatur, & ex signis saburræ cognoscitur. Curatur purgantibus & anthelminticis.
5. **NYSTAGMUS SYMPTOMATICUS**, qui in morbis convulsivis, hysterics, epilepticis & in gravidis quandoque observatur. Curatur antispasmodicis & ablato morbo primario.

VULNUS SCLEROTICÆ.

Est incisio, vel punctura in albugineam & scleroticiam oculi.

SPECIES sunt

1. **VULNUS SCISSUM**, illico humor vitreus exit, sed clausis palpebris & utroque oculo spleniis atque fascia ligatis intra paucos dies consolatur vulnus.
2. **VULNUS PUNCTUM**, ut in depressione cataractæ fit. Raro exit humor vitreus, & facilius adhuc sanatur.

3. VUL-

3. VULNUS COMPLICATUM CUM PROLAPSU HUMORIS VITREI, vulneris consolidatio tali prolapsu retardatur. V. *Prolapsus humoris vitrei.*

DEFECTUS OCULI.

Est oculi unius vel utriusque absentia in orbita.

SPECIES sunt

1. DEFECTUS NATIVUS. In hoc casu, quantum ex relatione observatorum patet, plerumque ambo deficiunt oculi. A)
2. DEFECTUS ADVENTITIUS, qui post partum ab oculo exciso, sclopeto vel hypopyo destructo, oritur. In hoc casu homo quandoque uno, interdum autem utroque oculo spoliatus est. Hoc vitium oculo artificiali aliquantum celari potest. V. *Applicatio oculi artificialis.*

OCULUS SUPERNUMERARIUS.

Est numeri consueti excessus in oculis.

Nati fuere homines tribus quippe vel etiam quatuor oculis instructi.

Prodigiosa quoque oculi constitutio est, quan-

H 3

do

A) Act. Er. Lips. anni 1726. Mens. Marr. & SCHENK Lib. I. observat. 278.

do pectori infixus, vel in ipsis humeris situs
est oculus. A)

MORBI IRIDIS.

MYDRIASIS.

Est nimia pupillæ dilatatio cum vel sine visus læ-
sione. B)

Noscitur hic morbus, si pupilla etiam ad lucem,
eandem semper latitudinem habere observatur.

SPECIES mydriaseos sunt

1. MYDRIASIS AMAUROTICA, quæ ut plurimum
at non semper amaurosim comitare solet.
Rarissime sine amauroseos curatione curatur.
2. MYDRIASIS HYDROCEPHALICA, quæ ab hydro-
pe cerebri originem habet, est ut morbus a
quo oritur, ut plurimum incurabilis.
3. MYDRIASIS VERMINOSA, quæ a faburra ver-
minosa primarum viarum nascitur. Curatur
anthelminticis & purgantibus.
4. MYDRIASIS A SYNECHIA, seu a concretione
uveæ cum capsula lentis. V. Synechia.
5. My-

a) De utroque vitio SCHENCK l. c. observationes ha-
bet.

b) MAUCHART *Diff. de mydriasi.*

5. MYDRIASIS PARALYTICA, seu a paralyysi fibra-
rum orbicularium iridis, observatur in mor-
bis paralyticis, & ab applicatis ad oculum
narcoticis. Curatur arnica, electricitate &
aliis antiparalyticis.

6. MYDRIASIS SPASMODICA, seu a spasmo fi-
brarum rectarum iridis, ut in morbis spas-
modicis, & hysterics quandoque observatur.
Curatio exigit nervinā & antispasmodica.

7. MYDRIASIS AB ATONIA IRIDIS, frequentissima
causa est cataracta magna, pupillam sub tran-
situ in cataractæ extractione valde exten-
dens. Evanescit aliquot post operationem
dies. Pupilla demum diu dilatata ex con-
fuetudine dilatata manet.

Curatur angustatione pupillæ, tractando corpora
minuta & lucida, atque contemplatione atten-
ta corporum dissitorum. Curatio palliativa
mydriaseos exigit, ut æger de die aut in lo-
co lucido ope nigrae chartulæ, foramine satis
magnō instructo, videat.

8. MYDRIASIS NATURALIS, hæc in somno, in
loco obscuro & in contemplatione objecti
oculo vicini observatur.

MYOSIS.

Est nimia pupillæ contractio seu angustia. A)

H 4

No-

A) MAUCHART *Diss. de pupillæ phthisi & sinuzesi.*



Noscitur pupillæ diametro, quæ naturali minor,
etiam in loco obscuro manet.

Facit visum debilem, hemeralopiam & alios morbos.

SPECIES sunt

1. MYOSIS SPASMODICA, quæ a spasmis fibrarum
orbicularium iridis in hysteris, hypochondriacis &
spasmodicis morbis quandoque ob-
servatur. Curatio exigit antispasmodica.

2. MYOSIS PARALYTICA, quæ a paralysi fibra-
rum rectarum iridis in morbis paralyticis
quandoque contingere potest. Curatur anti-
paralyticis.

3. MYOSIS INFLAMMATORIA, quæ ab inflammatio-
ne iridis vel uveæ oritur, ut in ophthalmia
interna, hypopio, oculi vulnere videre est.
Curatur antiphlogisticis, & venæflectione. V.
Ophthalmia interna.

4. MYOSIS A CONSUETUDINALI CONTRACTIO-
NE PUPILLÆ. Huc ergo pertinet MYOSIS A
LUCIS aut OBJECTORUM MINUTISSIMORUM
aut VALDE DISSITORUM DIUTURNA CON-
TEMPLATIONE ; hæc species scribis, le-
ctoribus, artificibus minuta tractantibus, mi-
croscopiis laborantibus, & aliis eis familia-
ris. A) Curatur abstinentia longa a contem-
pla-

A) Hinc patet cur lectura ad lampadem cum umbra-
culo, lucem colligente, & ad chartam repercutiente myo-
sim

platione objectorum, seu evitacione causæ, mora in loco obscuro, & intuitu parietis viridis.

5. **Myosis a defectu humoris aquæ**, ut in rhytidosi observatur. Curatur restituto humore aquæ. V. Rhytidosis.

6. **Myosis nativa**, quæ cum homine nascitur. Exigit incisionem transversalem iridis. V. Syniresis.

7. **Myosis naturalis**, est pupillæ coarctatio a lumine, ab intuitu objectorum diffitorum. Hæ pupillæ arctationes sunt temporariæ & brevi iterum sponte evanescunt.

SYNIZESIS.

Est plenaria pupillæ coarctatio vel concretio. A)

Noscitur pupillæ absentia. Ejusmodi miseri nil nisi lumen a tenebris, ut sani palpebris clausis discernere possunt.

SPECIES sunt

I. **SYNIZESIS NATIVA**, seu quæ connata est. In hoc casu per errorem primæ conformatiois pupilla non perforata est. Rarissime membrana.

sim cum tempore inducat. Umbraculum viride simplex, hinc lampadibus cum umbraculo clauso, ut in SEGNERIANO lampade est, præferri debet.

A) WEISSENBORN *Disserr. de pupilla nimis coarctata vel clausa.* Erfordia 1773. & JANIN l. c. p. 169.



brana pupillaris non evanida hujus morbi causa invenitur. A)

Curatio exigit ut artificialis fiat pupilla. Hinc faciat chirurgus incisionem transversalem cornæ; demum pupillæ locus naturalis transversim, aliquanto plus versus nafum cultro **LAFAYANO** incidatur. B)

2. **SYNESIS ACCIDENTALIS**, seu pupillæ concretio quæ a prægressa inflammatione, vel exulceratione uæ aut iridis, vel humoris aquei aut vitrei defectu oritur. Hæc species frequenter post cataractæ depressionem continet, atque incisionem novæ pupillæ exigit, ut mox diximus.

3. **SYNESIS A SECESSU IRIDIS A CORNEA.** A quacunque causa secessus fiat, certus semper est effectus, ut pupillæ diameter se contrahat, fibræ enim longitudinales a cornæ circulo separatæ fibris orbicularibus resistere nequeunt, hinc hæ pupillam vel ex parte vel penitus contahunt. C)

Cu-

A) *Clar. WRISBERG Dissert. de membrana pupillari foetus. in nov. Comment. Goetting. T. II. p. 169.*

B) *Abhandlungen der schwedischen Akademie. 34. Band, & RICHTERS Chirurg. Bibliotek. 4. Band 1. St. S. 192.*

C) *Cel. RICHTER Chirurg. Bibliotek. 2. B. 1. St. 132 S. & JANIN 1. e. p. 249.*

Curatio. Si æger per pupillam præternaturalem videre potest, non est necessarium, ut nova incidatur pupilla.

4. **SYNIZESIS COMPLICATA**, seu quæ cum amaurosi, cataracta, synechia vel alio morbo oculari complicatur. Amaurosis noscitur, quando æger lucem a tenebris distinguere nequit, hanc enim non solum clausa pupilla, sed etiam clavis palpebris distinguere possumus. Cæteras complicationes noscimus visu.

Curatio synizeseos complicatae exigit, ut prius morbus complicans curetur.

5. **SYNIZESIS SPURIA**, est pupillæ obturatio a gleba mucosa, purulenta, vel grumo sanguinis. Si hæc corpora, pupillam obturantia, medicamentis resolvi non possint, exigit curatio, ut cornea indidatur, & ut cochleari DAVIELLIANO corpora hæc eximantur.

SYNECHIA.

Est iridis concretio cum cornea vel cum capsula lentis crystallinæ. A)

CAUSA PROXIMA est contactus & inflammatio harum partium.

CAUSÆ REMOTÆ sunt collapsus corneæ, prolapsus iridis, intumescientia cataractæ, hypopygium, formatio nativa.

SPE-

A) MAUCHART *Diss. de Synechia.*



SPECIES sunt.

I. SYNECHIA ANTERIOR TOTALIS seu concretio iridis cum cornea. Hæc species visu noscitur. Pupilla in hac specie vel dilatata, vel coarctata, vel concreta invenitur. Inde variæ visus læsiones.

Curatio radicalis synechiæ totalis exigit, ut cultro & stylo separetur iris a corea, at hæc separatio in concretione antiqua, ubi cornea cum iride jam unum constituit continuum seu individuum temeraria & periculo plenissima esset. In malo vero recenti separatio sequenti modo tentari saltem posset.
 I. Cauta fiat incisio in corneam, dein stilo cum latiusculo fine intra corneam & itidem presso tentetur separatio. 2. Si hæc non facile fieri possit, illico ab operatione desinendum est.

2. SYNECHIA ANTERIOR PARTIALIS, quando solummodo pars quædam iridis corneæ accreta est. Hæc concretio in uno vel pluribus locis observatur. Hinc pupilla varie defigurata, & ejus motus inordinatus invenitur. A)

Curatio exigit ut Chirurgus immierat in corneam, loco pro extractione consueto, parvum cul-

A) JANIN l. c. p.

cultellum cataractarium, a) juxta punctum adhesionis iridis in cameram anteriorem oculi, dein obtuso cultelli dorso ab inferiori cohaesionis parte iridem adhaerentem sursum premat. Sic saepe pars adhaerens separata resilit sua sponte versus pupillam.

3. SYNECHIA ANTERIOR COMPOSITA, quando non solum iris tota, sed simul prolapsa capsula lentis cornea accrescit, adeo ut tota camera anterior & posterior desit. Temerarium esset hanc concretionem solvere velle.
4. SYNECHIA POSTERIOR TOTALIS, seu concretio totius uvae cum processibus ciliaribus, & capsula lentis crystallinæ.

5. SYNECHIA POSTERIOR PARTIALIS, quando solum pars quædam uveæ capsulae lentis accreta est. Quæ accretio simplex, duplex vel triplex, seu in pluribus locis esse potest.

Curatio exigit ut incisa cornea ope stili in apice aliquantum inflexi detrudatur uvea a capsula lentis.

6. SYNECHIA COMPLICATA cum AMAUROSI, CATARACTA, MYDRIASI, MYOSI, SYNIESI. Hæ complicationes exigunt præter separationem iridis suas proprias medellas.

Pro-

a) Hujus maxima latitudo lineam unam & medium habeat, & dorsum sit obtusum, atque totus cultellus cataractario cultro Cl. RICHTER sit simillimus.



PTOSIS IRIDIS.

Est iridis prolapsus per vulnus vel ulcus corneæ. A)
Noscitur ex tuberculo nigricante, quod ex cornea
aliquantum collapsa sub varia figura promi-
net. b)

SPECIES ptosis iridis sunt

I. PTOSIS RECENS A VULNERE LATO CORNEÆ,
ut sub vel post extractionem cataractæ con-
tingit.

Curatio exigit, ut iris cochleari parvo per vulnus,
aut palpebris clausis digito confricata repona-
tur,

A) Authores omnes Cel. RICHTERO antiquiores solent
iridis ptoses staphyloma vocare, hinc de his staphylo-
matibus V. GUNZ *Diss. de staphylomate*, & MAUCHART
Diss. de staphylomate.

B) Ipse iridis prolapsus pro diversa magnitudine sua
varia quoque nomina ab ophthalmiatis græcis accepit.

Myocephalum, si prolapsa particula magnitudinem,
colorem & figuram capitis muscæ refert.

Staphyloma iridis, si prominentia paullulum major
& uva acino quasi similis videatur.

Melon, si ad tantam denique magnitudinem incre-
vit, ut extra palpebras promineat.

Hilon seu *clavus* si prominentia callosa & indurata
est, atque caput clavi refert.

eur, aut solutione aluminis tangatur. Vulneris dilatatio sine iridis læsione fieri nequit.

2. PTOSIS INVETERATA, in qua iris prolapsa incarcerata & vulneri vel ulceri jam accreta & per attractum aeris callosa induratave est. Hæc species nulla arte digitis reponi potest.

Curatio exigit ut tuberculum prominens butyro antimonii semel omni altero vel tertio die tangatur.

Abscissio & ligatura prolapsæ iridis ut plurimum successu carent.

VULNUS IRIDIS.

Est iridis solutio ope instrumenti.

SPECIES.

1. VULNUS TRANSVERSALE, ut sub cataractæ operatione quandoque contingit, non consolidatur amplius, sed relinquit pupillam præternaturalem.

2. VULNUS LONGITUDINALE. Hoc arte, ut in operatione synizesios, vel casu factum, intra 14 dies iterum concrescit.

PUPILLÆ DEFORMITAS.

Est pupillæ diametri rotundæ mutatio in figuram aliam.

Huc ergo pertinet

1. PUPILLA OVALIS. Hoc vitium semper nativum & incurabile est. Nil visui obest.

2. Pu-



2. **PUPILLA INFERIUS AMPLIATA**, est frequens symptomata, quod extractionem cataractæ ob pupillæ violentiorem extensionem sequi solet. evanescit intra aliquot dies.

3. **PUPILLA RUPTA vel FISSA**, etiam hoc vitium cataractæ extractionem, iridis vulnera & inflammationes quandoque sequitur. Est vitium incurabile.

PUPILLA PRÆTERNATURALIS.

Est foramen vel fissura præternaturalis in iride.

SPECIES sunt

1. **PUPILLA PRÆTERNATURALIS A VULNERE TRANSVERSALI IRIDIS**, ut mox de iridis vulneribus diximus.

2. **PUPILLA PRÆTERNATURALIS A SECESSU IRIDIS CORNEÆ**, quandoque in uno, quandoque in pluribus locis margo iridis a circulo corneæ secedit. Hæ pupillæ marginales a lapsu in caput, ab oculi contusione, ab hypopyo & ab inflammatione iridis observatæ fuerunt.

Quandoque sine omni causa antecedente, nulloque symptomate subsequenti præter pupillæ synizesim vel saltem myosim iris corneam in uno vel pluribus locis, tægro inscio, relinquit. Hæ pupillæ secessus sunt incurabiles.





HIPPUS.

Est pupillæ alterna & continuo repetita dilatatio & constrictio. A)

CAUSA PROXIMA est alterna convulsio fibrarum orbicularium & radiatarum iridis.

Oritur ab iisdem causis, & curatur iisdem medicamentis ac bulbi convulsio, hinc vide Nyctagmus.

IMMOBILITAS PUPILLÆ.

Est pupillæ morbus, quo hæc nec ad lucem contrahitur, nec ad tenebras dilatatur, sed semper eandem diametrum servat.

CAUSA PROXIMA paralysis fibrarum orbicularium & radiatarum esse videtur.

SPECIES sunt

1. **IMMOBILITAS AMAUROTICA**, quæ amaurosim comitatur. Quandoque sine amauroseos curatione usu arnicæ & aliorum remediorum antiparalyticorum curatur.
2. **IMMOBILITAS A PUPILLÆ MORBO**, ut synchia, myosi, synizesi; curatur ablato morbo, qui immobilitatis causa est.
3. **IMMOBILITAS IDIOPATHICA**, hujus causæ plurimum latent.

I

Cu-

a) MAUCHART *Diss. de ulceribus cornea.*



Curatio tentetur infuso arnicæ, electricitate, purgantibus, extracto pulsatillæ nigricantis, liquore anodyno minerali, supercilio infricato.

MORBI HUMORIS AQUEI.

HYDROPHTHALMIA.

Et bulbi ocularis intumescentia ob nimiam humoris aquei vel vitrei collectionem. A)

CAUSA PROXIMA est humoris aquei nimium incrementum vel in cameris oculi, vel in cellulis humoris vitrei.

CAUSÆ REMOTÆ ut plurimum latent. Exitus morbi ut plurimum funestus est, cœcitatem relinquentis.

SPECIES sunt

I. **H**YDROPHTHALMIA AB INCREMENTO HUMORIS AQUEI. Signa sunt successivum bulbi exorbitantis augmentum, cornea plus solito prominens, iris profundior, pupilla immobilis, visus ab initio debilior, sensim nullus, oph-

A) MAUCHART *Diss. de hydrophthalmia, & Diss. de paracentesis oculi.*



ophthalmodinia sensim auctior, hemicrania & insomnium.

Curatio. Incipiens morbus exigit venæsectio-
nem, purgantia, vesicatoria, mercurialia, ex-
tractum pulsatillæ nigricantis, setaceum, fon-
ticulos. Externe fomentum discutiens appli-
cetur, ut in hypopyo.

Si medicamenta nil juvent, fiat *incisio cornea*,
ut in extractione cataractæ.

**2. HYDROPHTHALMIA AB INCREMENTO HUMO-
RIS VITREI.** Noscitur ex notabili bulbi ex-
orbitantis augmento, & duritie, cornea vix
magis prominente, iride convexa, ad corne-
am magis approximata, pupilla dilatata, oph-
thalmodinia obtusa, sensim vehementi, stra-
bismo, visu abolito, & hemicrania.

Curatio eadem ac in priori specie adhibetur;
si malum medicamentis non obtemperat,
incidatur cornea, eximatur lens crystallina
& portio humoris vitrei.

3. HYDROPHTHALMIA COMPOSITA, ubi humor
aqueus, & vitreus simul increscunt. **Cura-**
tio est ut in specie secunda. Si malum huic
methodo non cedit, fiat oculi extirpatio, ne
malum ex morboso in sanum transeat ocu-
lum. A)

a) *Journal de medecine.* T. 45. & *CHESTON patholo-
gical inquiris and observations.*



HYPOPYUM.

Est puris collectio in humore aqueo oculi.

SEDES puris vel in anteriori vel in posteriori vel in utraque oculi camera est.

CAUSA PROXIMA est prægressa inflammatio iridis , vel uveæ. Abscessus vel ulcus corneæ , depositio materiæ purulentæ , vel puriformis in oculi cameras.

NO SCITUR hypopyum inspectione oculi. Apparet liquidum album & mobile , medium vel integrum oculi cameram implens , iridem totam vel medium abscondens , & visum pro parte vel integre obscurans.

EXITUS. Pus effusum quandoque integre iterum absorbetur & per corneæ poros transfudat. Quandoque adeo in oculi cameris coacervatur ut corneam rumpat & exedat cum humorum prolapso.

Quandoque pars tenacissima puris membranæ crassæ adinstar capsulæ crystallinæ accrescit & sic dictam cataractam purulentam format. Quandoque conus purulentus pupillæ adhaeret , & visum tolit. V. *Synizesis spuriam.*

SPE-

A) MAUCHART *Diss. de hypopyo & Diss. de empyesi oculi.* JANIN l. c. p. 355. & RICHTERS *Abhandl. von der Ausziehung des grauen Staars.* 1773. in Capite de *hypopyo.* S. 172.

SPECIES hypopyi sunt

I. HYPOPYUM INFLAMMATORIUM, quod a prægressa inflammatione interna oculi oritur. Est pessima species, quæ raro sine relecto alio oculi morbo abit.

Curatio exigit, vel *dissipationem* puris vel si hæc non succedit *incisionem* corneæ, ut pus exire possit.

Dissipatio tentatur venæfectione, purgantibus & fomentis discutientibus, ut decocto malvæ cum aliquot guttulis spiritus vini camphorati, vel infuso herbarum cephalicarum, aut cataplasmate pomaceo.

Incisio corneæ fiat ut in extractione cataraæ. Vulnus per aliquot dies apertum servetur, pus enim non simul sed ob crassitatem sensim & guttatim ex corneæ vulnere exit.

2. HYPOPYUM METASTATICUM, quod subito & sine prægressa inflammatione oculi oritur, at ruborem oculi & febrem inducit. Hæc species multo facilius quam prior dictis medicamentis dissipatur & per corneam transfudat.

3. HYPOPYUM PERIODICUM, quod certo tempore aliquoties recurrit. *Curatio* exigit purgantia, revellentia & corticem peruvianum. A)

I 3

4. Hy-

a) JANIN l. c. p. 360.



4. HYPOPYUM VENEREUM , quod a gonorrhæa suppressa oritur. Curatur ut chemosis gonorrhœica. V. Ophthalmia gonorrhœica.

5. HYPOPYUM COMPLICATUM CUM DESTRUCTIONE omnium humorum & membranarum internarum , qua omnis partes in pus convertuntur. Hoc malum exigit ut cornea incidatur , humores evacuentur , & ut oculus artificialis applicetur.

Applicatio oculi artificialis.

Est laminæ vitreæ vel aureæ , quæ picturam oculi gerit, applicatio intra palpebras , ut deformitas oculi destructi occultetur. A)

INDICATIO.

1. Si oculi bulbus ob carcinoma excisus , vel globo sclopetario destruetus est.
2. Si humores fere omnes per vulnus corneæ vel scleroticæ effusi sunt,
3. Si cornea penitus opaca , & deformis est , ut in inveterato staphylomate.
4. Si bulbus ob hypopium vel ob hydrophthalamiam , aut synchysim evacuari debuit.

CON-

A) Cel. MAUCHART *Diss. de oculo artificiali.* Præter hanc omnes reliquæ Cel. MAUCHARTI dissertationes ophthalmicæ , in hoc opere citatæ , in collectione diss. chirurgicar. *Illust. HALLERI* continentur.

CONTRAINDICATIO. Præsente adhuc *inflammatio-*
ne vel exulceratione oculi corrupti non tente-
tur impositio, sed sopiaatur inflammatio & cu-
retur prius exulceratio.

CONDITIO OCULI ARTIFICIALIS. *Materia horum*
oculorum est vel ex vitro vel ex auro, uterque
debet esse encausto (emaille) obductus & pi-
ctus.

Figura oculi artificialis respondeat magnitudini,
convexitati, & iridis colori naturali ocu-
li alterius adhuc sani.

Oculi vitrei pro levi prætio sunt, at facile
franguntur, non adeo nitide pingi, nec
lima, si non quadrant, facile orbitæ adaptari
possunt.

Oculi aurei pro magno habentur prætio, at non
franguntur, sunt nitidius picti, possunt
lima ad oculum facillime adaptari.

APPLICATIO.

1. Elevetur palpebra superior, & sub hanc oculi artificialis, saliva humectatus, quantum fieri potest, introponatur.
2. Dein palpebra inferior aliquantum extrorsum trahatur, & oculus artificialis deorsum moveatur sub palpebram inferiorem, & in bono situ firmetur.

Si vero remanens bulbi portio nimis est exigua,
cunc cavum oculi artificialis cera liquefa-



Et adeo impleri debet, ut cum remanente bulbi portione firmum habeat situm; in hoc autem casu oculus artificialis immobilis est.

HYPÆMA.

Est eruoris effusio in cameras oculi.

Noscitur inspectione oculi, in cuius cameris humor rubicundus appareat; si sanguis effusus valde opacus est, simul cæcitatem infert.

Species sunt

1. HYPÆMA VIOLENCEUM, quod ab oculi contusione, aut punctura iridis, ut in depreßione cataractæ quandoque contingit, observatur. Curatio exigit venæficationem, reuelentia, fomenta discutientia. Si vero thrombus sanguineus pupillam obstruat qui nullo modo resolvi possit, tuuc fiat incisio corneæ & eximatur thrombus. V. Synizesis spuria.

2. HYPÆMA SPONTANEUM, quod a tussi vehementi, vomitu, aut nisu parturiendi oritur. Curatur ut species prior.

HYPOGALA.

Est lactis vel alijs humoris albi collectio in cameris oculi.

Noscitur inspectione oculi, in cuius cameris liquidum album, mobile appareat.

SPE-



SPECIES sunt

1. HYPOGALA A DEPOSITIONE LACTIS, ut in puerperis quandoque observatur. Curatio exigit revellentia & fomentum discutiens.
2. HYPOGALA A DEPRESSIONE CATARACTÆ LACTÆ. Incisa per acum cataractæ capsula, ab effluente humore albo illico albescit humor aqueus. Curatio est eadem ut in priori specie, quandoque sua sponte evanescit.

TURBIDITAS HUMORIS AQUEI.

Est impelluciditas humoris aquei in oculo, qui turbidus apparat.

SPECIES sunt

1. TURBIDITAS MUCOSA, quæ a mucositate humoris aquei nascitur. Curatur fomentis di- discutientibus.
2. TURBIDITAS A FISTULA CORNEÆ, seu ulcere in interna corneæ superficie; ex quo una alterave guttula puris in humorem aqueum effluit.

Curatur ablata fistula. V. *Fistula corneæ*.

3. TURBIDITAS A LENTE CRYSTALLINA IN HUMORE AQUEO DELIQUESCENTE, ut sæpe aliquo post cataractæ depressionem tempore aut quando cataractæ caseofæ particula post extractionem remanet, observatur.

Cura-



Curatur mora, revellentibus & fomentis difcutientibus.

Si turbiditas medicamentis non cedit, emittatur turbidus humor aqueus per incisionem corneæ.

EFFLUVIA HUMORIS AQUEI.

Est humoris aquei profluviū e vulnere vel fistula corneæ.

SPECIES sunt

I. EFFLUVIA EX VULNERE CORNEÆ. *Hoc effluvium post cataractæ extractionem 2 vel 3 dies durat, post hos enim dies, ob vulnus corneæ consolidatum, cessat; si vero ultra tertium diem aquei humoris profluviū durat, signum est, ob iridis vel humoris vitrei prolapsum vulnus in cornea non esse consolidatum.*

Curatio exigit sanationem vulneris, sic humor aqueus iterum restituitur. Si vero prolapsus sanationem vulneris impedit, tunc V. Prolapsus iridis & prolapsus humoris vitrei.

2. EFFLUVIA EX FISTULA CORNEÆ. *Impeditur effluxus palliative si pellicula ad fistulam agglutinetur, at cura radicalis exigit curationem fistulæ. V. Fistula corneæ.*

MOR-

MORBI LENTIS CRYSTAL. LINÆ.

CATARACTA.

Est cœcitas, quæ ab opacitate lentis crystallinæ vel
vel ejus capsulæ provenit.▲)

Multiplex habetur cataractæ divisio respectu sedis,
consistentie, coloris, magnitudinis, maturita-
tis, temporis, quo aggreditur, complicationis &
ortus.

Respectu sedis, quam opacitas tenet, dividitur ca-
taracta

1. In *crystallinam*, si ipsa lens crystallina est
opaca. Est frequentissima cataractæ spe-
cies.

2. In *capsularem*, quam alii *membranaceam*
vocant, si capsulæ crystallinæ lamina an-
terior vel posterior vel utraque opaca red-
ditur.

3. In

A) Veteribus latinis cataracta dicebatur *suffusio*, græ-
cis autem *hypochyma*, & *hypochysis*. V. Cel. HENKEL Diss.
de cataracta crystallina vera. GUNZII Diss. de suffusio-
nis natura & sede. & ALBINI Diss. de cataracta.



3. In *crystallino-capsularem*, si lens crystallina & ejus capsula simul opacantur.

Non datur ante operationem certum signum cataractæ crystallinæ, capsularis, & crystallino-capsularis.

4. In *partialem*, si capsulæ vel lentis non ambitus integer sed medietas, vel dimidium vel solus margo, vel punctum solummodo opacitate laborat, hinc non plenariam cœcitatem, sed varia alia visus vitia producit. V. *Hemeralopia* & *nyctalopia*.

5. In *spuriam*, quæ pus est, quod membranæ adinstar, anteriori superficie lentis crystallinæ adhæret & ex prægresso hypopyo nascitur. V. *Hypopium*.

Respectu consistentie dividimus cataractam

1. In *duram*, quando lens crystallina soliditatem habet, hæc naturali ut plurimum minor est, raro major, rarissime *cornea* vel *lapidea* est.

Signa cataractæ duræ sunt pupilla coarctata vix mobilis, & cataracta multum ab uvea distans.

2. In *molliem*, quam alii *caseosam* dicunt, quando lens crystallina casei mollitiem habet & friabilis est.

3. In *fluidam*, seu *læteam*, si lens crystallina in

in humorem album, tremori lactis vel puri similem, mutata invenitur.

Signa cataractæ mollis & fluidæ sunt 1. pupillæ amplitudo & tarda ad lucem admotam contractio, sed signa amauroseos abesse debent. 2. Cataractæ tanta magnitudo ut margo lentis vix etiam dilatata pupilla videri possit. 3. Cataractæ uveæ vicina apparet, at signa cataractæ cum uvea concretæ abesse debent.

4. In *Fluido durani* quando ambitus lentis crystallinæ lacteus vel caseofus & medietas lentis dura est. Huc referri potest *cataracta* ex *humore MARGAGNIANO* opaco cum vel sine lente opaca.
5. In *cysticam*, quando tota capsula lentis sub extractione cataractæ fluido vacua, opaca vel pellucida, hydatidis ad instar sponte ex oculo elabitur.

Respectu coloris cataractæ divisionem habemus

1. In *gryseam*, quæ margaritæ colorem refert.
2. — *albam*, quæ lacteum habet colorem, saepè at non semper hæc cataracta mollis est. Quando albedo splendet, tunc *cataracta argyras* seu *argentea* dicitur.
3. — *glaucam*, glaucus color cataractæ est rassisimus.

4. In



4. In *flavam*, flavus cataractæ color non est frequens.

5. — *nigram*, quæ ferri nigri colorem refert. Distinguitur ab amaurosi 1. quod in cataracta nigra pupillæ nigredo sit turbida, albicans, non pura ut in amaurosi. 2. Pupula seu imago intuentis in cataracta nigra non ut in amaurosi videri potest. 3. Amauroticus lucem a tenebris distinguere non potest, quod vero in cataracta nigra, nisi cum amaurosi sit complicata possibile est. A)

6. — *variegatam*, quæ plures colores, &

7. — *striatam*, quæ stellæ ad instar strias exhibet, hinc etiam quibusdam *stellata* audit. Color nil certi de duritie aut mollitie cataractæ docet. Imo cataracta extracta quandoque alium colorem habet, quam qualem in oculo ante operationem exhibuit.

Respectu *magnitudinis*, quam cataracta habet, dividitur

1. In *magnam*, quæ naturalem lentis magnitudinem excedit, ut in cataractis mollibus.

2. — *parvam*, quæ naturali lentis magnitudine

Signa

A) JANIN l. c. p. 243. duas de cataracta nigra observationes recenset.

ne minor est, ut in cataractis duris ut plurimum at non semper observari solet.

Signa magnæ ac parvæ cataractæ sunt ut mollis & duræ. A)

Respectu maturitatis habetur cataractæ divisio

1. In *maturam*, seu *perfectam*, in qua lens perfecte opaca est.

Noscitur si æger adeo visu privatus est, ut nil præter lucem & tenebras distinguere possit.

2. — *immaturam* seu *imperfectam*, in qua lens nondum perfecte est opacata. Noscitur quod cataracta laborans aliquantum adhac colores & objecta percipere possit. Dantur cataractæ, quæ nunquam maturæ fiunt, dantur, quæ intra aliquot septimanas jam maturescunt.

Respectu temporis, quo aggreditur cataracta dividi solet

1. In *recentem*, quæ nondum diu duravit.

2. — *inveteratam*, quæ jam multos per annos durat.

3. — *secundariam*, quæ post cataractæ depressionem vel extractionem iterum in eodem oculo nascitur. Cataracta secundaria post de-

a) Journal de medecine. T. 45. & RICHTERS Chir.

Bibliothek 4. B. 2. St. 253. S.



depressionem a reascensu lentis crystallinæ, cataracta secundaria post extractionem nata, ab obscuratione laminæ posterioris capsulæ crystallinæ remanentis oritur. A) Respectu complicationis necessaria est cataractæ divisio.

1. In *simplicem*, quæ sine alio corporis aut oculi vitio adest.

2. — *complicatam* cum *amaurosi*. Signa sunt si cataracta laborans pupillam habeat dilatatam & immobilem atque lucem a tenebris distinguere nequeat. Si prægressus est visus frequens radiorum lucidorum, si signa cataractæ adhærentis vel nimis magnæ absint.

3. — *complicatam* cum *dissolutione* humoris vitrei, aut cum *opacitate* hujus humoris. Nec synchysis nec glaucoma ante operationem nosci possunt.

4. — *complicatam* cum *pupilla coarctata*. Hoc vitium oculi intuitu noscitur.

5. — *complicatam* cum *adhæsione*; cataracta dicitur *adhærens*, si lens crystallina vel cum uvea vel cum *humore vitreo*, vel cum *propria capsula*, concreta est.

Signa cataractæ adhærentis cum uvea sunt
I. si

A) Cel. RICHTER Fasc. II. obs. chirurg. p. 88.

1. si opacitas proxime pupillam est, 2. si æger nullum lucis sensum superstitem habet, 3. si pupilla obliqua vel tota immobilis vel inæquali modo parum mobilis est.

Signa cataractæ cum propria capsula cohærentis sunt, si discissa capsula & dilatata etiam pupilla, non tamen nec sponte, nec ad fortiorum oculi pressionem lens opaca exeat.

Signa lentis cum *humore vitreo concretæ*, sunt, si lens acu depressa perpetuo, acu elevata, iterum reascendat, hinc quibusdam cataracta *elastica* dicitur.

6. In complicatam cum mobilitate seu tremore lentis crystallinæ. Talis cataracta dicitur *tremula*, quia digitis fricato oculo titubare solet.

Respectu ortus habetur cataractæ divisio

1. In *localem*, quæ a vitio solius lentis
2. — *universalem*, quæ a vitio totius corporis oritur, nempe ab acrimonia scrophulosa, venerea, ulcerosa, arthritica, podagrifica, scorbutica &c.
3. — *connatam*, quæ cum homine nascitur.
4. — *hereditariam*, quæ a dispositione hereditaria ortum habet.

CAUSA DISPONENS ad cataractam est vel hereditaria vel peculiaris debilitas in vasculis lentis crystallinæ.



CAUSA PROXIMA est obstructio seu infarctus vasculorum, & cellularum, quæ lentem crystallinam ejusve capsulam formant, ab humore opaco, qui lentem raro indurat, frequentius autem in humorē caseosum emollit.

CAUSÆ REMOTÆ sunt

1. *Inflammatio capsulæ lentis vel ipsius lentis non resoluta.*
2. *Depositio materiæ arthriticæ, catarrhalis, podagricæ, venereæ, scrophulosæ, tineosæ, scabiosæ, herpeticæ, febrilis, ulceris anti-qui exsiccati.*
3. *Abusus spiritus vini.* Potatores non raro cataractosi fiunt.
4. *Vapor aquæ fortis, qui lympham lentis crystallinæ coagulat.* A)
5. *Commotio capitis aut*
6. *Vulnus oculi.*
7. *Oculi percussio, qua vascula lentis crystallinæ distorqueri & debilitari videntur.*
8. *Intuitus diutinus corporum minutorum, præcipue splendidorum, hinc scribis, calcographis cataracta familiaris.*
9. *Splendor solis vel ignis diu in oculum agens.*
10. *Vitium hereditarium vel congenitum.*

II. Ætas

A) SZEN *Diss. de cataracta ab effluviis aquæ fortis orta.* Jenæ 1774.

II. *Ætas senilis.*

12. *Consensus unius oculi cum altero.* Oculus cataracta laborans ut plurimum post aliquot annos etiam alterum oculum cataracta afficit; hinc tot homines in utroque oculo cataracta laborant.

13. *Ambusatio oculi.* Calor oculi lentem opacat, ut in coctis piscium oculis videre est.

DIAGNOSIS. Cataracta *incipiens* noscitur, si ægroti visus nebulosus aut fumosus evadat, atque naturalis pupillæ nigredo splendens aliquantum albescat; perfecta demum ingruens cæcitas cum pupillæ colore opaco & albo vel gryseo *confirmatam* docet adesse cataractam.

PROGNOSIS. Cataracta est malum chronicum, ægrotum deformem & præstantissimo sensu orbum reddens, atque per vitam durans, ni operatione auferatur. Cataracta unius oculi facilime intra aliquot annos alterum oculum afficit, ni tempestiva cataractæ primæ extractio fiat; hac autem non raro alterius oculi cataracta *præcaveri* potest.

Curatio cataractæ triplici modo tentatur.

1. Per medicamenta.
2. — depressionem.
3. — extractionem.

MEDICAMENTA rarissime opacitatem resolvere valent. *Interne* in cataracta incipiente laudantur



extractum aconiti , pulsatillæ nigricantis , hyosciami albi , cum mercurio dulci combinatum & millepedum succus.

Externe. Fonticuli , setacea , vesicatoria nuchæ imponenda sunt. Demum vapor spiritus salis ammoniaci per breve tem pus oculo adhibetur.

Plus præstare videntur medicamenta in cataractis ab acrimonia specifica ortis , sic in cataracta venerea tentetur mercurius , in scrophulosa cortex peruvianus cum cicuta , in arthritica aconiti extractum cum antimonio Rara sunt exempla cataractarum sponte evanescentium , sæpius tamen adhuc id in cataractis secundariis observatur.

DEPRESSIO cataractæ tutius & facilius quam extractio ejus instituitur , at non raro reascensum lentis opacæ admittit.

EXTRACTIO certius a cataracta liberat , at operacioni supervenientia mala non raro visum iterum tollunt.

Depressio cataractæ.

Est cataractæ ope acus depressio cum vel sine sua capsula , e suo situ ad bulbi partem inferiorem . A)

Hl-

A) V. Cel. SAINT-YVES nouveau traité des maladies
des

HISTORIA OPERATIONIS. Est antiquissima operatio,
GALENO jam nota & ad annum 1745. con-
sueta, ab hoc autem tempore, quo Cel. DA-
VIEL chirurgus gallus extractionem cataractæ
invenit, neglecta fuit. Hodie dum autem a Cel.
POTT iterum in usum revocatur. A)

INDICATIO & CONTRAINDICATIO. Omnis cataracta
deprimi potest, ac si *amaurosis* vel *glaucoma*,
vel *synchisis* adest, tunc depressio ac extractio
frustra instituuntur. b)

TEMPUS PRO OPERATIONE. Omni anni tempore
depressio fieri potest.

CUBICULUM PRO OPERATIONE sit sat lucidum,
præter unam, omnes fenestræ cubiculi obvel-
lentur.

K 3

PRAE-

des yeux. 1736. Cel. ACREL *chirurgische Krankengeschichte*. & Cl. HENCKEL *Abhandl. der chirurg. Operationen I. St.*

A) Cel. POTT *chirurgische Beobachtungen. & Cl. RICHTERS chirurgische Bibliothek. 3. St. 4. Band 564. S.*

b) Generalis quorundam ophthalmiæ regula, quæ operationem declarat inutilem, si ægrotus lucem a tenebris distinguere non valeat, exceptionem patitur. Non enim solummodo ob *amaurosim*, sed etiam si cataracta admödum magna est, atque si cataracta cum uvea concreta est, ægrotus lucem a tenebris distingue-re nequit. In his duobus ultimis casibus operatio tamen non raro cum successu instituitur. Hinc signa ha-
rum trium conditionum bene distinguantur.



PREAPRATIO ÆGROTI. Die ante operationem fiat venæsectio, aliquot ante operationem dies primæ viæ sale amaro purgentur, ab hoc tempore victus ægri sit antiphlogisticus.

PREAPRATIO INSTRUMENTORUM. Acus cataractaria Cel. BRISSEAU est omnium acuum optima. **PRO DELIGATONE** parentur *spenia* quædam & *fascia ocularis*.

SITUS ÆGROTI. Æger in sede humiliori ita versus fenestram sedeat, ut lumen a latere incidat in oculum.

SITUS CHIRURGI. Chirurgus in sede altiori quam æger sedeat, adeo ut hujus caput pectori chirurgi obversum sit, & ad illud quantum fieri potest, appropinguet.

SITUS ADJUTORIS. Hicce retro ægroti sedem stet, atque una manu fronti, altera mento ægroti supposita, caput illius reclinet, ac pectori suo firmiter apprimat.

OPERATIO IPSA. Si oculus, exempli gratia, sinister cataractam habet

1. Oculus sanus seu dexter *spenio* & *fascia* firmiter obtegatur.

2. Chirurgus sinistræ manus pollice atque inde bene palpebras diducat, atque ita simul oculi bulbum immobilem teneat.

3. Imperandum jam ægroti est, ut oculum versus nasum vertat, sic externus oculi angulus

am-

amplam albugineæ partem operatori exhibet.

4. Tum chirurgus dextra manu acum, ab adstante ministro exhibitam, calami scriptorii ad instar, pollice, indice & digito medioprehendat, & binos reliquos digitos super genas adeo imponat, ne manus facile contremiscat.
5. Denique acum cataractariam albo oculi ad duarum linearum a cornea distantiam rectâ per oculi tunicas e regione medietatis pupillæ imittat.
6. Quamprimum chirurgus ex cessante partium renitentia animadvertisit, acum tunicas bulbi penetrasse, inclinanda statim est acus cava superficies supra cataractam, eaque mox cum sua capsula a parte superiori infra pupillæ regionem inferiorem, & paululum retrorsum ad fundum humoris vitrei premenda & aliquamdiu ibi retinenda est, ut cataracta inferiori parti insideat.
7. Si acum in pupillam elevatam cataracta de pressa non sequatur, bene est facta operatio, adeoque tum acus iterum ex oculo recta educi debet. Si vero cataracta elevationem acus sequeretur, tunc depressio aliquoties & fortius repeti deberet.



8. Noxium est, statim post operationem ægroti visum variis objectis demonstratis exercere. Sic enim facile reascendit cataracta, & inflammationi occasio datur.

DELIGATIO PRIMA. Statim a peracta operatione splenium collyrio ex aqua vegetominerali, vel vino repido imbutum aut cataplasmum pomaceum super oculum, sed sine oculi pressione, applicari & fascia firmari debet.

Oportet vero utrumque oculum per injectam fasciam devincire, nam aperto oculo agitato, movetur & alter sub fascia.

REGIMENTUM ÆGROTI.

1. Facta prima deligatione æger super lectum adeo locetur, ut caput ejus aliquibus pulvinaribus suffultum, erectum aliquantum per primum octiduum servetur.

2. Caveat ægrotus a tulsi, vomitu, risu, sternutatione, sermone intensiori, nisu ad alvum; ac præsertim ab inclinatione capitis ad anteriores vel quod adhuc deterius ad inferiores, sic enim facile reascendit cataracta.

3. Elapsis aliquot ab operatione horis instituatur *venæfæctio*

4. Sub vesperam primæ diei exhibeatur *emulsio* cum nitro & syrupo diacodii, & injiciatur *enema emolliens*.

5. Oculus bis de die per 8 vel 10. dies fomento vino-

vinoſo vel aqua vegetominerali. deligetur.
Sub omni deligatione obscurentur fenestræ,
ne lux vividior oculum feriat.

6. *Victus per ocliduum sit antiphlogisticus.*

7. Post decimum diem, si singula bene se habent,
oculus non amplius deligetur, at maneat æ-
ger in cubiculo obscurato; demum post ali-
quot dies lumen admittatur, at oculi peplo
sericeo viridi, e fronte propendente, sint mu-
niti, oportet.

Paullatim demum ægrotus in cubiculo luci-
do obambulare & ad viētum consuetum
redire potest.

OPERATIONES CATARACTARUM SPECIALIUM.

1. **CATARACTA LACTEA.** Quamprimum sub de-
pressione, ope acus capsula lentis inciditur,
illico humor lacteus cataractæ effluit in hu-
morem aqueum, qui subito adeo turbidus
& albicans evadit, ut chirurgus nec pupil-
lam nec cuspidem acus amplius videre queat.
Hæc turbiditas post aliquot septimanas spon-
te evanescit. Si id non contingat, vulne-
re aperiatur cornea & emittatur humor
turbidus.

2. **CATARACTA CASEOSA.** Quandoque sub de-
pressione fragmenta quædam remanent vel in
canieram anteriorem elabuntur. Particulæ
elevata acu remanentes etiam deprimantur ;



elapsæ autem cum tempore in humore aqueo resolvuntur.

3. CATARACTA CUM UVEA CONCRETA. Noscitur quod sub cataractæ depressione simul iris inferius rugetur, superius deprimi videatur. Chirurgus in tali casu dorso acus uveam a cataracta antrorum premere & separare debet. Si hoc non possibile est, desinat ab operatione, alias iridem a limbo cornæ penitus separat.

4. CATARACTA CUM PROPRIA CAPSULA CONCRETA. Talis cataracta cum ipsa capsula deprimitur.

5. CATARACTA ELASTICA seu quando postica capsulæ lentis superficies cum membrana hyaloidea concreta est. Si cataracta depressa, illico iterum elevata acu reascendat, tentetur ter, vel sexies depresso fortior. Si nondum deprimi potest, introducat chirurgus acum acutam intra cataractam & humorēm vitreum, separet lentem & dein deprimat illam.

6. CATACTA CAPSULARIS ANTERIOR. Licet ut plurimum capsula in anteriori vel posteriore membrana obscurata, simul cum lente deprimatur, fieri tamen potest, ut incisa vel erupta capsula deprimatur lens sola sine capsula. Noscitur, depressa cataracta, laminam capsulæ anteriorem obscuratam remansisse, tactu,

taetu, visu mutati coloris opaci in pupilla
& inconspicuitate acus retro pupillam.

Curatio exigit ut membrana opaca acu perfo-
diatur, hinc inde dilaceretur ac deprimatur.

7. **CATARACTA CAPSULARIS POSTERIOR.** Acu
depressa cataracta, acum in pupilla videmus,
at retro acum & pupillam lamina opaca ap-
paret.

Curatio exigit, ut acu laminam opacam ab
humore vitreo separemus & separatam de-
primamus.

8. **CATARACTA NATIVA.** Qui a nativitate cata-
ractosi sunt, hi etiam depressa cataracta non
apte vident, donec videre discant.

9. **CATARACTA COMPLICATA CUM CORPORIS VI-
TIO UNIVERSALI,** ut acrimonia scrophulosa
vel alia. His ægris deposita cataracta fonticuli
vel alia ulcera artificialia fieri debent, & re-
media antacrimoniosa diu adhuc præberi, alias
brevi iterum cataracta afficiuntur.

10. **CATARACTA SECUNDARIA.** Hæc quandoque
post unam alteramve horam, vel diem, vel
mensem vel unum pluresve annos iterum a
reascensu lentis opacæ contingere, ac novam
cœcitatem inferre solet, at non semper, nam
quandoque iterum sponte descendit. Interim
reascendens cataracta si non sponte iterum
de-



descendat novam exigit depressionem, aut quod tunc tutius est extractionem cataractæ.

SYMPTOMATA depressioni quandoque *supervenientia* sunt.

1. **ECCHYMOSIS ALBUGINEÆ**, quæ in loco, cui acus immissa fuit, quandoque observatur. Hoc malum est nullius momenti, ac collyrio facile discutitur.

2. **HYPOMA** seu crux effusio in oculi cameras, qua humor aqueus totus rubicundus appareat. Hoc malum jam gravius est, at non raro venæsectioni, ac fomento ex vino & speciebus cephalicis cedit.

3. **INFLAMMATIO OCULI**. Hæc minus quam in extractione timenda est, & raro adeo valida fit. Curatur venæsectionibus, sale amaro, spec. cephalicis vino infusis, aqua vegetominerali aut cataplasmate pomaceo & vesicatorio.

4. **EFFLUXUS HUMORIS AQUEI**, a quo tunica cornea concidit. Hoc symptoma non multum timendum est. Paucos enim intra dies humor aqueus & oculi pristina forma redit.

5. **VOMITUS**, haud raro post unam alteramve horam vel etiam prima nocte sequitur, qui vero sponte brevi plerumque iterum cessat. Malum vero indicii symptoma est, nam vomendi impetu cataracta depressa utplurimum reascendit. Hinc statim post operationem antemeti-
cum

cum seu laudanum liquidum cum oleo amygdalarum dari debet.

6. PROLAPSUS CATARACTÆ per iridem in anticam oculi cameram ; hæc postulat incisionem corneæ atque extractionem lentis opacæ.
7. MYOSIS & SYNIZESIS. Hæc vitia uveæ inflamatæ vel iridis læsæ sunt sequellæ. V. Myosis & synizesis.
8. IRIDIS LÆSIO. Iridis vulnera longitudinalia, non adeo sunt periculosa, si inflammatio arceaatur.
9. HYPOXYUM. Hoc plerumque inflamatæ uveæ, vel iridis sequella est, hinc mali ominis ; nam plerumque sequitur pupillæ angustio, & cœcitas.
10. MYOPIA & AMPLYOPIA , quibus cataracta, vel deprimitur, vel extrahitur , his utplurimum visus debilior ob lentis defectum. Hinc Perspicilla biconvexa, quorum focus 5 vel 6 pollicum est, adhibeantur.

Extractio cataractæ.

Est cataractæ exemptio ex oculo ope incisionis in corneam. A)

IN-

A) Cel. P. RICHRER von der Ausziehung des grauen Staars. & Cel. HELLMANN vom grauen Staar und dessen Herausnehmung.



INDICATIO. Omnis cataracta extrahi potest.

CONTRAINDICATIO. Si *amaurosis*, vel *glaucoma* vel *synchisis* simul cum contracta adest, tunc operatio frustra instituitur.

Ut plurimum *infelix* est operationis exitus, si ægrotus ophthalmia & hemicrania sæpius laborebat, si temperies humorum acris & habitus corporis nimis irritabilis est; si cataracta cum uvea vel cum humore vitreo concreta est.

DEPRESSIO est extractioni *præferenda*.

1. Si ægrotus nictatione palpebrarum vel bulbi convulsione laborat.
2. Si oculus nimis profunde in orbita locatur.
3. Si cornea nimis plana ut in brespitis est.
4. In infantibus, qui nec oculum nec caput in requisita pro operatione quiete & situ servare possunt.

TEMPUS PRO OPERATIONE. Omni anni tempore extractione fieri potest. *Hyeme* cubiculum ægroti modice sit calefactum, *œstate* modice refrigeretur. *Ver* & *autumnus* ob consuetam morborum epidemicorum frequentiam pro hominibus ad epidemiam dispositis, æquivoçum exhibent tempus.

LOCUS PRO OPERATIONE & PRÆPARATIO ÆGROTI eadem requiritur ac pro depressione.



PRÆPARATIO INSTRUMENTORUM.

1. *Digitale cum hasta Cet.* RUMPELT.
2. *Cultellus cataractarius Cl.* Prof. RICHTER.
3. *Cyfitomus aliquantum curvatus Cel.* LA FAYE.
4. *Acus oculta pro extorsione capsule crystal-*
line cum lente ad mentem Cl. RICHTER.
4. *Cochleare ophthalmicum Cel.* LA FAYE.
6. *Forfices ophthalmicæ Cel.* DAVIEL , pro di-
latando cornea vulnere si necessarium fo-
ret.
7. *Instrumentum pro separatione cataractæ cum*
iride concretæ.

PRÆPARATIO PRO DELIGATIONE. *Splenia quædam*
& fascia ocularis.

SITUS ÆGROTI. Æger in sede humiliori ita sedeat
versus fenestram, ut lumen a latere nasi in ocu-
lum incidat.

SITUS CHIRURGI. Chirurgus in sede altiori quam
æger sedeat, adeo ut huius caput pectori chi-
rurgi obversum & approximatum sit. Nam
neque elevatis, neque extensis brachiis tuto
fecat chirurgus.

SITUS ADJUTORUM. Unus operatori præbet instru-
menta. Altet retro ægroti sedem stet, atque
una manu ægri superiorem palpebram elevet,
altera manu ægroti mento supposita, caput illius
reclinet ac pectori suo firmiter apprimat.

OPE-



OPERATIO IPSA. Si in sinistro ægri oculo operatio peragenda esset, tunc

1. Dexter ægri oculus *fascia* & *splenio* fortiter obtegatur.
2. Chirurgus digito indice sinistræ manus deprimat palpebram inferiorem & oculi bulbum inferius in interno angulo simul paululum, caute tamen, comprimat.
3. Jam dextra manu cultellum instar calami scriptorii prehendat, armatamque manum ad externum oculi angulum applicet, & ut firma sit, genæ temporique ægroti adprimat.
4. Oportet jam, ut chirurgus in hoc situ paululum exspectet, donec oculus, qui tunc temporis valde plerumque agitatur, in opportuno ad operationem situ, nempe elevatus, & ad externum orbitæ angulum versus, per momentum quiescat.
5. Hoc ipso momento cultelli cuspidem, subito, caute tamen, tunicæ corneæ in angulo externo, ad lineæ dimidiæ a sclerotica distantiā, loco, qui pupillæ centro altitudine respondet, perpendiculari ad corneam directione impingat, ut cameram oculi anteriorem intret.
6. Dein cultellus, aversa ab iride illius cuspide & retrorsum moto illius manubrio, ut lamina illius parallelam cum iride directionem servet,

servet, anteriorem transeat oculi cameram, atque in opposito latere e cornea, loco, quo ingressus est, simili exeat.

7. Jam ulterius propellat cultellum ad angulum oculi internum, donec cuspis illius ad sex circiter linearum longitudinem e cornea exierit, & dimidium inferius corneæ solutum sit. Hoc tempore demum prorumpit humor aqueus.
8. Jam cystitomus per vulnus corneæ & per pupillam ad capsulam lentis crystallinæ admovatur, ac expressa cuspide iteratis ictibus pertundatur, & dein hoc instrumentum remissa cuspide ex oculo afferatur.
9. Nunc lens crystallina sponte plerumque vel ad levem oculi compressionem exit.
10. Vel incisa cornea, capsula lentis non aperiatur sed immittatur *acus occulta* Cel. RICHTERI, & infigatur mediæ lenti. Ope hujus acus lens cum capsula elevetur, deprimatur dextrorsum & sinistrorsum iterum iterumque, caute tamen agitetur; acum dein inter digitos rotando, a lente, in quam defixa est, expediās. Quo facto ad levem bulbi compressionem lens cum capsula vel sponte prodit, vel parvo DAVIBLIS cochleari curvato expediri penitus potest. A) L II.

a) Hæc methodus a Cl. Prof. RICHTER nuper proposita



II. Elapsa lente demum purificetur oculus cochleari DAVIELIS a fragmentis.

DELIGATIO PRIMA & RELIQUUM REGIMEN AEGROTI
post extractionem, ut post depressionem eadem
sunt observanda.

OPERATIONES CATARACTARUM SPECIALIUM.

I. CATARACTA LACTEA. Hæc cataracta cum integra capsula eximi non potest, hinc post humoris lactei effluxum, cava lentis capsula cuspidi acus vel cystitomi discindatur.

2. CATARACTA CASEOSA. Fragmentis cataractæ exemptis idem cum capsula ac in priori specie tentetur.

3. CATARACTA CUM UVEA CONCRETA. Stilus cum apice inflexo introducatur inter uveam & lentem atque tentetur separatio.

4. CATARACTA CUM PROPRIA CAPSULA CONCRETA. Talis cataracta cum ipsa capsula acu Richteriana solvitur & exprimitur.

5. CATARACTA ELASTICA seu cum HUMORE VITREO CONCRETA. Tentetur separatio capsulae ab humore acu Richteriana. Si vero separatio non succedit, incidatur capsula, & exprimatur lens sola.

6. CA-

posita ægrotum a cataracta secundaria, a capsula obscuratione oriunda, tutum reddit. V. *Observ. chirurgicarum Fasc. II. p. 88.*

6. **CATARACTA CAPSULARIS ANTERIOR** vel POSTERIOR. Hæc species cataractæ præsertim capsulæ separationem ab humore vitreo exigit, si hæc impossibilis esset, discindatur remanens capsula opaca reiteratis dissectionibus.
7. **CATARACTA SECUNDARIA** extractioni jam die altero post operationem superveniens ab inflammatione remanentis capsulæ est. Hæc quandoque applicatis antiphlogisticis fomentis intra aliquot dies cessat, at si hæc inflammatio his remediis primis diebus non cedit, violentiora adhibenda sunt; ut venæflectio aqua vegetomineralis, vesicatorium ad nucham & ad tempora, purgantia ex sale amaro.
Si vero inflammatio in obscurationem chronicam remanentis capsulæ abeat, tunc adhibeantur resolventia fortiora, quæ in curatione cataractæ laudavimus, his nil proficienibus, fiat nova operatio & destructio lamellæ opacæ.
8. **CATARACTA CUM PUPILLA COARCTATA.** Si pupilla jam ante operationem perpetuo coarctata & immobilis est, atque incisa cornea & bene obscurato cubiculo se non dilatat, tunc operator aliquot tempus exspectet, si nondum se dilatat, audacter est pupilla incisa.



Infortunia sub extractione cataractæ.

1. INCISIO INTER LAMELLAS CORNEÆ. Si culter oblique imergatur corneæ, tunc intra lamellas decurrit. Hinc retrahatur culter & applicetur magis perpendiculariter.

2. VULNUS CORNEÆ NIMIS ANGUSTUM. Si non dimidium corneæ aperiatur, lens crystallina in vulnere manet incarcerata. In tali casu mediante forfice recta, dilatentur anguli vulneris. Forfice recta facilius quam curva hæc dilatatio fieri potest; præjudicium est forficem acutam consumum facere vulnus & malam relinquere cicatricem.

3. CORNEÆ COLLAPSUS SUB INCISIONE. Hoc contingit si humor aqueus jam sub incisione corneæ præmature effluat, vel ob malam cultri figuram, quo omnes, præter Richterianum, vittio laborant cultri; vel ob retractionem cultri ex vulnere, si ægrotus oculum movet, aut ministro delabatur palpebra superior, vel denique si oculi bulbus sub incisione corneæ multum premitur.

In tali casu facillime læditur iris, hinc ab operatione penitus abstineat chirurgus & consolido vulnere post aliquot dies iterum operationem repetat. Vel forfice recta & obtuso apice vulnus corneæ sufficienter dilatet.



4. IRIDIS LÆSIO. Hæc visu & sanguinis effluvio noscitur.
5. IRIDIS PROLAPSUS, qui sub operatione contin-
git a pressione externa vel tetano bulbi oritur.
Reponi debet Iris. V. *Ptosis iridis.*
6. PROLAPSUS HUMORIS VITREI. Hic vel a pressione
externa oculi, vel ex tetano muscularum bulbi
originem habet. Mediocris portio elabens nil
visui obest, imo clarus vident, quibus humor
vitreus prolabitur. V. *Prolapsus humoris vi-
trei. A)*
7. PRÆMATURUS LENTIS CRYSTALLINÆ ELAPSUS.
Quandoque vix aperta cornea & nondum inci-
sa capsula crystallina jam cum violentia proslit
lens crystallina vel ob oculi pressionem vel ob
spasmodum muscularum bulbi. Hinc timendum
est, ne simul fiat iridis atque vitrei humoris
prolapsus.
8. STERNUTATIO ÆGROTI. Hæc pessime jam inci-
sa cornea operationi supervenit, nam inde san-
guis, iris & totus humor vitreus ex oculi bul-
bo excuti solet. Hinc illico oculus linteo &
manu continendus.
9. COMPLICATIO CUM AMAUROSI. Si chirurgus ex-

a) Obtegatur oculus & committatur prolapsus naturæ.

Cl. RICHTER Abhandl. von der Auszieb. des grauen Staars.

S. 113.



tracta lente pupillam nigram & puram obser-
vet, æger autem nil tamen videre possit, amau-
rosis adest. Hinc operatio est sine fructu.

IO. COMPLICATIO CUM SYNCHYSI seu dissolutione
humoris vitrei. Exempta lente crystallina il-
lico effluit tenuis humor vitreus, & æger ma-
net cæcus.

II. COMPLICATIO CUM GLAUCOMATE seu opacita-
te humoris vitrei. Exempta lente crystallina
prominet humor vitreus opacus, hinc æger
manet cæcus.

12. COMPLICATIO CUM PUPILLA COARCTATA. Si
facta incisione corneæ pupilla ante operationem
dilatata se valide contrahit, impossibilis est ca-
psulæ incisio & lentis expressio. Hinc cubi-
culum est obscurandum & expectandum donec
pupilla se dilatet.

*Symptoma post operationem quandoque
sequentia.*

1. VULNUS CORNEÆ NON CONCRESSENS. Commu-
niter tertio post operationem die vulnus cor-
neæ esse solet concretum. Si ergo quarto aut
quinto adhuc die vulnus nondum concretum in-
venitur, id vel ob malos ægri humores vel
iridis aut humoris vitrei prolapsum contingit.

2. CICATRIX VISIBILIS. Vulnus corneæ, quod mi-
rum est, cultello acuto inflictum nullam relin-
quit

quit cicatricem, nisi vulnus in suppurationem magnam abeat.

3. **OPHTHALMIA.** Quandoque septimo primum die post cataractæ operationem succedit inflammatio oculi & febris. A) Hæc non raro venæctione, sale amaro, vesicatoriis nuchæ & temporibus applicatis iterum discutitur. Quandoque vero acuta ophthalmia in *chronicam* degenerat, quæ menses & annum durare solet. V. *Ophthalmia chronicæ.*

4. **EFFLUVİUM HUMORIS AQUEI POST TERTIUM DIEM**, quo cessare deberet, est signum iridem vel humorem vitreum in vulnere esse incarcерatum.

5. **PROLAPSUS HUMORIS VITREI**, qui aliquot horas post operationem a spasmo muscularum bulbi oritur, exigit opiata. V. *Prolapsus humoris vitrei.*

6. **PROLAPSUS IRIDIS**, aliquot post operationem horas vel altero die etiam a tetano bulbi oritur. Reponatur iris & applicetur solutio aluminis. V. *Ptosis iridis.*

7. **PUPILLA DEFORMIS.** Est frequens cataractæ extractionem sequens symptomata.

8. **PUPILLA FISSA**, a læsione transversali iridis sub operatione oritur. Non amplius curatur.

A) LANGE l. c. p. 5.



9. **MYOSIS, SINIZESIS & SYNECHIA**, ab inflammatio-
ne iridis & uveæ oriuntur. V. *Hos morbos
sub suis titulis.*
10. **OBSCURATIO CORNEÆ** a corneæ inflammatione
oritur & hac sanata evanescit.
11. **TURBIDITAS HUMORIS VITREI**, quandoque a
remanente particula cataractæ caseosæ, in humo-
re aquo soluta, originem habet & evanescit
post aliquot septimanas.
12. **HYPOPYXUM** est inflammationis internæ effectus.
V. *Hypopyxum.*
13. **BLEPHAROPHTHALMIA**; hæc effectus est palpe-
bræ a ministro contusæ vel cataplasmate relaxa-
tæ. Facile curatur.
14. **MUSCULORUM BULBI CONVULSIO**. Hæc ab ani-
mi pathemate, aut nimis cito admissa luce ex-
citari potest, exprimit sæpe iridem aut humo-
rem vitreum per vulnus corneæ. Exigit fo-
mentum pomaceum cum croco & camphora.
Interne detur opium.
15. **AMBLYOPIA**, hæc a lentis defectu originem ha-
bet, exigit perspicilla utrinque convexa.
16. **TABES OCULI**. Hæc quandoque ab humorum
effluxu oritur. V. *Tabes bulbi.*
17. **TRICHIASIS**, quandoque sub curatione cilia quæ-
dam introvertuntur & bulbum inflammant. Ci-
lia introverfa evellantur, si everti nequeunt.

PROLAPSUS LENTIS CRYSTAL-
LINÆ.

Es̄ lentis prolapsus ex sua capsula in anteriorem oculi cameram.

SPECIES sunt

I. PROLAPSUS LENTIS SINE VULNERE CORNEÆ.

CAUSA PROXIMA est capsulæ crystallinæ ruptura. Hæc s̄æpe contingit sub depressione cataractæ, a lapsu in caput, a saltu e loco alto, a percussione oculi, a pressione bulbi.

DIAGNOSIS. Lens prolapsa noscitur inspectione oculi, & visu lentis crystallinæ pellucidæ vel opacæ.

EFECTUS. Lens crystallina in anteriori oculi camera quandoque dolorem, oculi inflammationem, pupillæ contractionem procreat, atque visum perturbat, quandoque præter visus perturbationem nullum excitat symptomata.

CURATIO exigit incisionem corneæ adeo magnam ut in extractione cataracta requiritur.

2. PROLAPSUS LENTIS CUM VULNERE CORNEÆ, qui facta corneæ incisione voluntaria ut in extractione cataractæ, aut in involuntaria corneæ vulneratione contingit, præsertim si oculus digitis vel instrumentis vel spasmo muscularum bulbi multum premitur.

MOR-



MORBI HUMORIS VITREI.

GLAUCOMA.

Est opacitas humoris vitrei. A)

NO SCITUR ex cæcitate ægroti & visu circuli opaci,
vel saltem obscurioris, qui retro lentem cry-
stallinam obſervatur.

CAUSA PROXIMA est depositio humoris opaci in cel-
lulas humoris vitrei.

Est morbus rarissimus, cognitu difficultimus ac semper
incurabilis.

SPECIES sunt

I. GLAUCOMA OPACUM, in quo humor vitreus,
ut in cataracta molli, impellucidus est. In
morbo incipiente posset externe vapor spiri-
tus salis ammoniaci tentari. Interne extra-
ctum pulsatille nigricantis, cicutæ, hyo-
sciami albi, aconiti cum millepedibus, cum
mercurio dulci, & infuso arnicæ exhiberi
posset. Morbus adultus est *incurabilis*.

2. GLAUCOMA TERREUM, in quo humor vitreus
in concrementum terreum, ut authores re-
ferunt, degenerat.

3. GLAU-

A) HEISTERI *Tractatio de cataracta. glaucomate & a-
mauroſi*, Altorfii. 1720.

3. **GLAUCOMA PURULENTUM**, est humoris vitrei mutatio in humorem purulentum vel puri analogum. Est *incurabilis* & ni oculus extirpetur, in alterum transit.

SYNCHYSIS.

Est humoris vitrei solutio in tenuitatem aquam.

CAUSA ut plurimum latet. A) Hic morbus est fere semper cum amaurosi b) quandoque simul cum cataracta complicatus.

NOSCITUR ex perfecta cæcitate, in qua pupillæ nigredo adeo est pallida, ut per illam tota interna retinae superficies, & ejus vascula rubra videri possint.

CURATIO est impossibilis. Quæ enim medicamenta humoris vitreo dissoluto naturalem restituant densitatem?

PROLAPSUS HOMORIS VITREI.

Est humoris vitrei prolapsus e vulnere corneæ vel scleroticæ.

E.F.-

a) Ab applicatione spiritus volatilis cornu cervi hanc dissolutionem inductam fuisse videtur. V. CL. RICHTER *omn. granen Staar.* S. 102.

b) Cel. RICHTER *Fascicul. observ. chir.* II. p. 67.



EFFECTUS, modicus prolapsus nil obest, & intra aliquot septimanas iterum restituitur, si vero magna hujus humoris pars effluat, tunc bulbus collabitur, pupilla se claudit, & immedicabilem cæcitatem infert.

SPECIES sunt

1. PROLAPSUS A PRESSIONE OCULI. Est symptoma in cataractæ extractione frequens, quando adjutor vel operator sub incisione corneæ bulbum digitis ruditer premit.

2. PROLAPSUS A SPASMO MUSCULORUM BULBI. Hicce spasmus quandoque statim a facta incisione corneæ aut sub extractione lentis oritur, quandoque vero altero vel aliquot post operationem dies primum contingit. De causis hujus spasmi. V. *Tetanus bulbi*. Nec situs ægroti supinus hunc prolapsum præcavet.

Curatio exigit ut illico opium cum oleo interne detur. Externe oculus deligetur per 9. dies, & prolapsus relinquatur in vulnere, nec reprimatur, nec abscindatur. Nam vulnus sensim consolidans partem prolapsam sua sponte separat. A)

MOR-

A) V. CL. RICHTER von der Ausziehung des grauen Stœrs in capitulo de prolapsu humoris vitrei. p. 99.

MORBI RETINÆ seu
VISUS.

PHOTOPHOBIA.

Est tanta lucis intolerantia, ut oculus vel modicam ejus quantitatem ægre ferat.

Tales ægroti connivendo solent se a nimia luce tueri.

CAUSA PROXIMA est nimia retinæ sensilitas.

SPECIES sunt

1. PHOTOPHOBIA INFLAMMATORIA, quæ ophthalmiæ præsertim internæ est symptomæ, curatur ablata inflammatione.
2. PHOTOPHOBIA A MYDRIASI, pupilla enim dilatata nimiam radiorum copiam admittit, hinc lucis intolerantia. Curatio palliativa exigit obvelationem oculorum tela sericea viridi. Curatio radicalis exigit ablationem mydriaseos. V. Mydriasis.
3. PHOTOPHOBIA A DESUETUDINE LUCIS. Qui diu carceribus inclusi, ex illis educeti lucem diu non ferre possunt etsi pupilla contrahatur. Quibus cataracta deprimitur aut extrahitur, his primus lucis introitus igneus ut fulgur, oculo non ferendus videtur. Utantur peplo viridi & sensim assuescant oculos luci.

4. PHO-



4. PHOTOPHOBIA NERVIA, quæ ab aucta nervorum sensitivitate nascitur. Est symptomum hydrophobiæ & multorum morborum tum acutorum tum systematis nervæ. Curatur roborantibus & nervinis.

5. PHOTOPHOBIA A NIMIA LUCE ut ab inspectione solis, qui oculo intolerabilis est.

AMAUROSIS.

Est cæcitas cum pupilla utplurimum nigra, dilatata, & immobili. A)

Dantur vero etiam amauroses cum pupilla coarctata, mobili, pallida vel usque ad retinam pellucida. B)

Raro unus utplurimum uterque oculus hoc morbo afficitur.

CAUSA PROXIMA est deficiens influxus liquidi nervi in nervum opticum & in retinam.

Rarissime nascitur hic morbus sine omni *prædispositione*:

DIAGNOSIS. Amaurosis utplurimum sensim, rarius subito ingruit. Signa amaurosis incipientis sunt visus paullatim debilitatus, nebulosus, araneofus,

A) Dicitur etiam *gutta serena*. V. OEHMEN *Diss. de amaurosi*. & NOOTNAGELL *Diss. de amaurosi*. Erlangæ, 1776.

B) *Cel. RICHTER Fasç. II. observ. chirurg. p. 62.*



sus, reticulosus, coloratus, lucidus. Tandem imperfecta, ac ultimo perfecta supervenit cæcitas, licet pupilla appareat nigra.

SPECIES amaurosis, respectu causarum, sequentes constitui possunt.

I. AMAUROSIS A CONGESTIONE SANGUINEA, seu quæ a sanguinis copia in vasis, quæ cerebrum, nervum opticum, ac retinam perpetrant, congesta oritur.

Causæ congestionis sunt *nixus* a ponderis gestatione, præsertim corpore valde antrosum curvato, nifus a partu. *Plethora* ab æstu aëris, vel insolatione capitis commota. *Supressa menstrua* vel *lochia* vel *haemorrhoidum* fluxio, aut consueta *vencectio* omissa, abusus *spirituorum*. *Vomitus*, *tussis*, *rifus*, *clamor*, *inflatus tubarum*, quo sanguis in capite retinetur, abusus mercurialium A) aut martialium. Demum *ophthalmia membranæ choroidæ*, *apoplexia sanguinea*, *febris calida*, & *gravitas* huc referuntur.

Noscitur amaurosis sanguinea ex signis sanguinis ad encephalon & oculos congesti. Homines juvenes & sanguineos aggreditur.

Cu-

A) Cel. THEDEN *Unterricht für die Wundärzte bey Armeen.* 1774. S. 199.



Curatio amauroseos sanguineæ exigit repellentia & evacuantia. Hinc fiat

1. Larga *vencectio* in pede & brachio aliquoties instituenda.
2. *Scarificatio.*
3. *Hirudinum applicatio* ad tempora & oculorum canthos.
4. *Sectio arteriae temporalis.* Simul adhibentur.
5. *Purgantia fortia & enemata acria*, saepius repetenda.
6. *Semicupia vel balnea tepida.*
7. Externe *aqua frigidissima* ad oculum, & *fomentatio frigida* fronti & temporibus, omni horæ quadrante renovanda, applicetur.

His remediis incassum adhibitis signum est vasa sanguine turgida jam atonia laborare; haec remediis externis & internis, speciatim in amurosi laudatis curari debet.

REMEDIA INTERNA, quæ in amurosi laudantur, sunt

1. *Cicutæ extractum. A)*
2. *Aconiti extractum. B)*

3.

A) Cicutæ usu plures homines visum recuperarunt.
Illustr. Bar. de SSÖRCK. Tr. de cicuta p. 168. & 169.

B) V. Lib. cit. Illustr. de STÖRCK p. 120. & p. 268.
Extra-

3. Infusum florū arnicæ. A)
 4. Balsamus vitæ.
 5. Sulphur auratum antimonii tertiae præcipi-
 tationis. B)
 6. Oleum animale DIPPELI.
 7. Moschus. C)
 8. Decoctum ligni quajaci. D)
 9. Mercurius dulcis seu Calomel. E)
 10. Belladonna. F)

M

II.

Extracto aconiti cum mercurio dulci simulque adhibito
 vesicatorio ad caput, puerum e retrogressa capitis scabie
 intra 14. dies sanavi.

- A) Cel. COLIN passim in ann. med. & observat.
 B) Balsami vitæ guttulas aliquot, saccharo exceptas,
 nec non sulphur auratum antimonii tertiae præcipitatio-
 nis laudat Fr. HOFFMANN. Syst. med. rat. T. IV. p. 4.
 §. 6. p. 119. & 120. §. 5.
 C) Oleum animale DIPPELI ac moschum laudat Cel.
 WARNER on the humane eye. & Cl. LIEVTAUD Synops.
 univers. praxeos med. 1765. Amst. P. I. I. 2. S. 2. p. 351.
 D) Tentari saltem debet ob eximios in paralyssi tol-
 lenda effectus. V. Illust. WINTRINGHAM Annotationes in
 MEADII monita & præcepta.
 E) Mercurio dulci felicissime guttam serenam cura-
 runt. ROWLEY A treatise on the diseases of eyes p. 150. &
 Abhandl. der Schwedischen Akademie. 30. B. 703. S.
 F) V. Hannöverisches Magazin. 1774. St. 27.



- II. Decoctum saturatum corticis paruviani ac radicis Valerianæ cum sale volatili cornu cervi nuptum. A)
12. Vomitoria. B)
13. Radix hermodactyli. C)
14. Tinctura cantharidum. D)

Medicamenta martialia interne adhibita amuroticis nocent, cum congestionem sanguinis versus caput & oculos augeant.

REMEDIA EXTERNE adhibenda, sunt

1. Balnea frigida. E)
2. Capitis, capillis abrasio, frictio, cum pannis laneis, succini fumo imbutis, nec non cum spiritu vini camphorato, colli vertebris simul infricando. F)
3. Oleum animale Dippelii oculo instillatum. G)
4. Bal-

A) NOOTNAGELL l. c. p. 14. & DRESKY *Diss. de Valeriana officinali Linnei.* Erlangæ. 1776.

B) Cel. SCHMUCKER l. c. Th. I. p. 481. & Cel. THEDEN *Bemerkungen.* & Cl. RICHTER l. c. p. 80.

C) Ill. a LINNE *materia medica.* p. 45e

D) Cel. BRISBANE *Select. cas. in the practice of medicine.*

E) WARNER l. c. p. 32.

F) GENDRON *traitè des maladies des yeux.* T. II. p. 235.

G) *Acta Acad. Elect. Moguntinæ.* T. I. p. 536.

4. *Balsamus vitæ HOFFMANNI fronti ac temporibus applicatus.* A)
5. *Sternutatoria.* B)
6. *Aquæ calidæ cum fabis coffeeæ tostæ aut cum speciebus cephalicis infusæ vapor.* C)
7. *Halitus volatilis spiritus salis ammoniaci.* D)
8. *Frigio bulbi ocularis & regionis supraorbitalis.*
9. *Vis electrica.* E)
10. *Vis magnetica.* F)

2. *AMAUROSIS A CONGESTIONE SEROSA,* quæ ab humore seroso vel pituitoso in cerebri cortice, ventriculis, in basi cranii aut circa nervos opticos effuso vel congesto originem habet. Hinc catarrhum male curatum, transpirationem suppressam, depositionem pituitosam,

M 2

a) *Syst. M. Rat.* T. IV. p. 120.

b) *Cel. RICHTER* l. c. p. 57.

c) *Conf. HEISTERI, HOFFMAN, Lievtaud* libros citatos.

d) *Cel. SCHMUCKER* l. c. B. 2. S. 473.

e) *Medical. observations and inquiris.* Vol. V. 1776.

& *Cel. RICHTER chirurg. Bibliothek.* 4. B. 1. St. 54.

f) *Cel. NÖOTNAGEL* in *Diss.* citata. p. 23. & *Cel. WEBER von der Wirkung des künstlichen Magners in einem seltenen Augenfehler an die königl. Societät der Wissenschaften nach Göttingen gesendet.* 1767. Hanover.



tosam, apoplexiam serosam, hydrocephalum pro causa habet.

Agreditur pituitosos, senes & infantes.

Curatio exigit diaphoretica ut decoctum lignorum, antimonium cum roob sambuci. Vinum antimmonii HUXHAMI, purgantia, diuretica, vomitoria, vesicatoria, fonticulos, setacea. His nil proficientibus adhibeantur mox dicta *antamaurotica* interna & externa.

3. AMAUROSIS AB IMBECILLITATE RETINÆ. Retinæ imbecillitas seu atonia inducitur cerebri commotione, nimiis studiis ac lucubrationibus, nimio coitu aut manustupratione, diuturno microscopiorum usu, subito magnoque splendore in oculum illapso, ac diuturno rei admodum splendidæ aut albæ ut nivis intuitu. Demum oritur a narcoticis aut vapore latrinarum oculis diu applicato.

Curatio exigit roborantia. Externe balneum oculi frigidum, & vinum ophthalmicum IANNINI aut aqua liliorum cum spiritu lavendulæ conducit. Interne cortex peruv. cum valeriana detur.

4. AMAUROSIS EXHAUSTORUM. Sequitur omnem evacuationem, & debilitatem totius corporis, præsertim diarrhæam nimiam, vomitum cruentum, salivationem nimianam, venæfæctiōnem nimis largam præcipue in gravidis.

Cura-

Curatio exigit cardiaca roborantia, diætam lacteam cum cortice peruviano & cascarillæ extracto.

5. AMAUROSIS AB ENCEPHALO. Sic hydrops cerebri, sanguis in cranio effusus, cerebri induratio, aut aliud vitium circa thalamos nervorum opticorum, amaurosim *incurabilem* facit.

6. AMAUROSIS A NERVI OPTICI MORBO PECULIARI. Serum circa thalamos nervorum, aut ipsos opticos nervos aut retiam congestum, mora temporis degenerat in crûstas mucosas, terreas, hydatides, steatomata, hygromata. Quandoque nervi optici marcescunt. Omnes hæ causæ ante cadaveris sectionem ignorantur & amauroses *incurabiles* constituunt.

7. AMAUROSIS PERIODICA, quæ omni altero vel tertio die ingruit. Hujus causa ut plurimum in primis viis est, hinc ut febris intermitens purgantibus, salibus digestivis, cortice peruviano & arnica curatur. A)

8. AMAUROSIS FEBRISEQUA, est illa, quæ febres tum

A) *Illustr. de Störck ann. med. prim. p. 76. Cl. PEYE. medical. observ. and. inquiris at Lond. V. I. p. 3. & Cl. MEDICUS Geschichts Periodisch. Krankheiten 1. B. p. 75. -- 82.*



tum intermittentes tum acutas sequi solet.

Curatur setaceo nuchæ inciso. A)

9. AMAUROSIS A VULNERE SUPERCILII. Sub curatione vulneris primum oritur. Videtur a crispatura nervi superciliaris oriri.

Curatio exigit frictionem loci læsi frequentiorēm cum vel sine liquore anodyno minerali, aut spiritu formicarum. B)

10. AMAUROSIS A MORBO SINUS FRONTALIS.

Noscitur dolore in sinu frontali hærente, aut alio sinus vitio.

Curatio exigit amotionem causæ a sinu frontali. C)

11. AMAUROSIS A CONSENSU OCULORUM. Quæ ex unius oculi vitio in altero oritur. Sic ab unius oculi amaurosi sensim etiam alter oculus occæcatur. Fonticulus id quandoque præcavet.

12. AMAUROSIS CONGENITA. Nascuntur quandoque infantes amaurotici, cum autem in his pupilla licet immobilis at non dilatata apprehendatur, hinc cæcitas ut plurimum ætate procedente primum animadvertisit.

Cura-

a) *Abhandlung. der k. Schwed. Akademie. Elfter Band.*

b) *Cel. PLATNER progr. de vulneribus superciliis illatis & Illustr. MORGAGNI epistol. anat. 1764. Epist. 18. p. 356.*

c) *Cel. RICHTER l. c. 54.*

Curatur aqua ophthalmica ex vitriolo & sapone veneto cum spiritu vini, quo retinæ torpor aufertur.

I3. AMAUROSIS HÆREDITARIA. seu quæ plures ex eadem familia aggreditur. Hæc species fere semper est *incurabilis*.

I4. AMAUROSIS VENEREA, quam depositio acri moniæ venereæ aut tophus orbitæ craniive, nervum opticum premendo, producit. *Curatio* exigit antivenerea cum antamauroticis combinata.

I5. AMAUROSIS SCROPHULOSA, quæ in infantibus scrophulosis a depositione succi scrophulosi ad nervi optici decursum provenit. *Curatio* exigit antiscrophulosa & antamaurotica.

I6. AMAUROSIS EXANTHEMATICA, quæ a morbis cutaneis suppressis oritur. A scabie capitatis, achoribus, herpete, varis faciei, & miliaribus retropulsis, amaurosis observata fuit. Huc etiam ulcus subito exsiccatum pertinet.

Curatio exigit expulsionem exanthematis retrogressi, quod vesicatoriis, setaceis, fonticulis, scarificatione, sudoriferis, diureticis, purgantibus, vomitoriis aut insitione vel infectione obtinetur. Dein antamaurotica adhibeantur. Amaurosis ab ulcere exsiccato exigit ut ulcus renovetur.



17. AMAUROSIS ABDOMINALIS, quam causa in
abdomine latens producit, ut saburra acida,
bilioſa, pituitosa, verminosa, plumbata. Hæc
species familiaris est feminis acido laboranti-
bus, hypochondriacis, colica saturnina affe-
ctis, iracundia subito commotis, & infantibus
verminosis.

Curatio exigit eliminationem saburræ. Hinc ex
signis saburræ mobilis vel immobilis, sursum
vel deorsum turgentis varia medella indica-
tur.

Saburra immobilis pituitosa tartaro tartarisato
& radice ari vel exigua tartari emeticæ
portione mobilis reddatur.

Saburra sursum turgens vomitorio
— deorsum turgens purgante eliminari
debet.

— acida absorbentibus & alcalinis, bilioſa
cremore tartari & pulpa tamarindorum,
verminosa anthelminthicis præsertim va-
leriana curatur, amaurosis saturnina eme-
ticis & purgantibus excutitur.

18. AMAUROSIS SPASMODICA, ea est, quam spasmus vel dolor oculum idiopathice vel con-
sensualiter afficiens, procreat. Hæc amau-
rosis oritur a magno terrore, a dolore vehe-
menti capitis, renum, vel alias partis, a
vulnere supercilii aut musculi temporalis, de-
mum

mum a morbo *convulsivo*, ut *epilepsia*, *te-*
tano, *passione hysterica*.

Noscitur ex causis prægressis. Amaurosis *hyste-*
rica ut plurimum temporaria solummodo est.
Curatio exigit opiata, nervina, roborantia,
præsertim moschum & valerianam.

19. AMAUROSIS PARTIALIS, quando solummodo
dimidia retina est amaurotia, facit visum di-
midiatum. *Curatur* ut amaurosis integra.

20. AMAUROSIS COMPLICATA, est ea, quæ ca-
taractæ, *myosi*, *sinizesi*, *synchyxi* vel aliis
morbis ocularibus jungitur. *Noscitur* im-
possibilitate lucem a tenebris distinguendi.
Hi morbi sunt incurabiles, si amaurosis non
antea curetur.

OXYOPIA.

Est visus consueta videndi facultate acrior.

Visi fuere homines qui de die stellas in cœlo vide-
re poterant.

CAUSA PROMIMA est præternaturalis retinæ sensi-
tivitas.

SPECIES sunt

1. **OXYOPIA INCARCERATORUM**, qui diu in car-
ceribus obscuris detinentur, scribere & le-
gere in tenebris discunt.

2. **OXYOPIA AB INCIPIENTE AMAUROSI.** Hæc
spe-



species quandoque amauroseos prodromus est. A)

Curatio exigit antamaurotica. V. *Amaurosis.*

3. OXYOPIA PLURIUM OBJECTORUM. Est visus vi-
tium , quo ægrotus simul duo vel tria ob-
jecta diversa clarissime videt. Ratio phæno-
meni vel in abolitione poli visorii retinæ
est, vel plura loca retinæ adeo sensilia ut
polus visorius retinæ evadunt.

Hinc differt hæc oxyopiæ species a diplopia in
hac enim æger unum objectum bis vel ter
videt. V. *Diplopia.*

Curatio radicalis non patet , *palliativæ* autem
exigit tubum , qui objecta lateralia arcet, vi-
sio enim plurium objectorum visum reddit
confusum.

AMBLYOPIA.

Est visus debilitas sine admodum visibili oculi vitio. A)
MYOPES & PRESBYTÆ in certa objecti distantia so-
lummodo confuse vident: Nyctalopes & heme-
ralopes certo diei tempore tantum male vi-
dent, at amblyopes in quavis distantia & qua-
vis diei tempore objecti debiliter discernunt.

CAU-

A) Cel. NOOTNAGELL l. c. p. 3.

B) Dicitur etiam *visus hebetudo.*

CAUSA PROXIMA amblyopiæ *idiopathicæ* est retinæ minor sensitivitas, amblyopiæ autem *symptomaticæ* sedes est, vel in *cornea*, vel in *humore aquo*, vel in *pupilla*, vel in *lente crystallina*, vel in *humore vitreo*.

Hinc sequentes SPECIES amblyopiæ constitui possunt.

1. AMBLYOPIA A CORNEÆ NUBE, quo tota cornea vel solummodo pars quædam obscuratur.

Puncta opaca plurimis radiis transitum dengant, hinc radii nimis pauci ad retinam perveniunt. Curatio exigit ablationem nubis.

V. *Maculæ corneæ & obscuratio corneæ*.

2. AMBLYOPIA A CORNEÆ HUMIDITATE, ut in epiphora contingit. Aqua corneæ adhærens radios confuse refringit. Curatur ablata, humiditate. V. *Epiphora*.

3. AMBLYOPIA A CORNEÆ SICCITATE. Sicca enim cornea pulverulenta & turbida evadit. Curatur hæc species humectatione corneæ. V. *Scheroma*.

4. AMBLYOPIA A TURBIDITATE HUMORIS AQUEI. Hic enim ut turbida cornea nimis paucos radios transmittit. Curatur restituta humoris aquei pelluciditate. V. *Turbiditas humoris aquei*.

5. AMBLYOPIA AB HUMORIS AQUEI IMMINUTA QUANTITATE. Sic enim cornea aliquantum contrahitur & pelluciditatem amittit.

Cura-



Curatur restituto humore aqueo. V. *Atrophia oculi & rhytidosis cornice.*

6. **AMBLYOPIA AB ABUNDANTIA HUMORIS AQUEI,** ut in incipiente hydrophthalmia observatur. Sic enim focus radiorum jam ante retinam formatur. De curatione hujus vitii V. *Hydrophthalmiam.*
7. **AMBLYOPIA A MYOSI PUPILLÆ,** hæc enim nimis coarctata nimis paucos transmittit radios. De curatione v. *myosim.*
8. **AMBLYOPIA AB INCIPIENTE CATARACTA,** opacari incipiens lens vel ejus capsula non sufficientes radios transmittit. V. *Cataracta.*
9. **AMBLYOPIA AB INCIPIENTE GLAUCOMATE.** Idem hinc fit ac in cataracta. V. *Glaucoma.*
10. **AMBLYOPIA AB INCIPIENTE AMAUROSI,** in hoc enim morbo retina insensibilis fieri incipit. De curatione V. *amaurosim.*
- II. **AMBLYOPIA A TOPICA RETINÆ ATONIA.** Causæ quæ hanc retinæ debilitatem generant, sunt, malum *hæreditarium.* Solis, luna, ut astronomi solent, vel ignis longus *intuitus.* visus nimium *intensus* ut accidit, qui objecta minuta diu tractant, noctu multum scribunt, aut ad lumen perpetuo legunt, & veneris abusus, qui oculos & ventriculum præprimis debilitat.

Hæc

Hæc amblyopiæ species non raro transit in amaurosim.

Curatio exigit 1. ut causæ morbi evitentur. 2. ut lumen validum arceatur, ut oculus externis & internis medicamentis roboretur.

Retina roboratur

1. *Abstinētia a luce*, hinc illi qui diu carceribus obscuris includuntur, legere & scribere in tenebris discunt.
2. *Tubis nigris*, qui lucem superfluam arcent. A)
3. *perspicillis planis viridibus*, hæc lumen moderantur.
4. *Mora in cubili*, quod ab una solum finestra lumen habet, & viridibus ornatum est parietibus. Color enim viridis oculum roborat.
5. *Flamma lampadis vel luminis umbraculo viridi tegatur*. Umbracula, quæ nimiam lucem reflectunt, ut Segnerianum, evitentur.
6. Pro labore & lectione *vitrum viride magnum* adhibetur, sæpius æger a lectione abstineat & parietem viridem inspiciat. B)

7. Ex-

a) BOERHAAVE tract. de morbis oculorum. Goet. 1750.
p. 175.

b) Experientia docet colorem viridem oculo magis pro-



7. Externe applicetur *vinum ophthalmicum*
JANINI A) vel aqua stillatitia salviæ, men-
thæ aut fœniculi uncias aliquot cum toti-
dem drachmis spiritus anthos, vel spiri-
tus vini camphorati, & aliquoties balne-
um frigidum oculi adhibeatur.
8. Interne detur cortex peruvianus cum ra-
dice valerianæ sylvestris.
- Curatio palliativa* obtinetur usu *perspicillo-*
rum utrinque convexorum, seu *biconve-*
xorum: horum enim ope radii collecti
fortius retinam afficiunt.
12. AMBYOPIA A DEBILITATE TOTIUS SYSTE-
MATICIS NERVI, ut post magnas evacuatio-
nes & in convalescentibus a morbis acutis,
observatur. *Curatio* exigit cardiaca nutrien-
tia & roborantia.
13. AMBYOPIA SENILIS. Multiplex est hujus am-
blyopiæ causa. Retina insensilior, lens flave-
scens, cornea turbidior.
- Pro curatione palliativa, aqua liliorum cum spi-
ritu anthos commendatur. *Curatio radicalis*
est impossibilis.

NY-

prodeesse quam nigrum, color enim viridis sensim vi-
detur tensionem retinae minuere, niger autem color il-
lam subito & penitus relaxat.

A) Cel. JANIN I. c. p. 395.

NYCTALOPIA seu CÆCITAS
DIURNA.

Est visus vitium, quo ægroti de die parum vel nihil, vesperi autem ac nocte sat bene vident. A)

CAUSA PROXIMA est varia

SPECIES sunt

1. **NYCTALOPIA AB AMAUROSI PERIODICA**, si paroxysmus mane incipit & circa vesperas definit. Curatio exigit vomitoria, purgantia, vesicatoria & ultimo corticem peruvianum cum valeriana.

2. **NYCTALOPIA A NIMIA RETINÆ SENSITIVITATE**, quæ lucem meridianum non fert. V.
Photophobia. B)

3. **NYCTALOPIA A MACULA OPACA IN MEDIE-TATE LENTIS CRYSTALLINÆ.** Cum lux meridianus pupillam coarctat, adest cœcitas, cum autem circa vesperas aut in loco obscurato pupilla dilatetur, hinc radii per limbum ad-

(A *Illustr. HALLERI Flem. physiol.* T. V. p. 490. & *Cel. ROHDE Diss. de nyctalopia ac hemeralopia, visu simplici & duplici.* Jenæ 1774.

B) Non repugnat, quod hi homines ad lumen candelaæ aut lunæ videant. Solis enim vis ad lumen candelaæ est ut 11664. ad 1. & ad lumen lunæ in plenilunio ut 374000. ad 1.



adhuc pellucidum lenti crystallinæ transuent.

Curatio exigit depressionem vel extractio-
nem lenti crystallinæ.

4. Nyctalopia a desuetudine lucis. Sic qui
ex obscuris carceribus educuntur statim in
luce meridiano nil vident, at sensim iterum
luci assuefcunt.

5. Nyctalopia a mydriasi immobili. Hic
enim pupilla nimiam lucis quantitatem ad-
mittit, quam immobilis moderari nequit,
hinc ægri a nimia luce nil vident. *Curatio*
palliativa exigit perspicilla viridia. De cura-
tione radicali v. Mydriasis.

**6. Nyctalopia a nimia pupillæ coarcta-
tione.** Hæc non sufficientem radiorum co-
piam admittit, cum circa vesperas autem hæc
coarctatio remittat, hinc eo tempore melius
vident. Hæc coarctatio quandoque inflam-
matoria, quandoque spastica est.

Curatio exigit vel antiphlogistica, vel antispa-
modica. V. Myosis. Fomentum ex radice al-
theæ, aut floribus malvæ & hyosciami lau-
datur.

7. Nyctalopia endemicæ, integræ gentes ny-
ctalopes sunt, ut leucæthiopes, Africani,
Americanæ & Asiaticæ, toto enim die oculi eo-
rum lacrumentur, noctu primum recte vi-
dent. A)

8.

a) *Illustr. HALLER I. c. T. V. p. 490. & RÖHDE Diss.*



8. **NYCTALOPIA AB OCULI COMMOTIONE.** Inde homo de nocte omnia objecta distincte vide-re potuit. A)

HEMERALOPIA seu CÆCITAS CREPUSCULARIS.

Est visus vitium, quo ægroti de die bene, ad lucem autem crepuscularem ut mane & ad vesperam, jam parum vel nil vident.

SPECIES sunt

1. **HEMERALOPIA AB AMAUROSI INCIPIENTE**, in quo æger luceni meridianum adhuc, crepuscularem autem vel lumen candelæ non amplius sentit. Imo omnis amblyopia si vehe-mens est hemeralopiam simul causat. Curatur ut amaurosis.

2. **HEMERALOPIA AB AMAUROSI PERIODICA**, cuius paroxysmus circa vesperas incipit & adulta jam die definit. Curatur purgantibus & dein dato cortice peruv. cum valeriana.

3. **HEMERALOPIA A TRANSPIRATIONE SUPPRES-**

N

SA

A) *Miscellanea A. N. C. Dec. i. Ann. i.* Homo chor-dam fidium tensuris, rupta chorda sibi oculum vehe-menter contundebat, oculus inflammabatur, æger de no-cte minimas lineas imaginum & litteras libror. distingue-bat, clauso oculo ægroti autem nil videbat, nec diei, nec candelæ lucem de nocte ferre potuit, hicce morbus post aliquot dies evanuit.



SA OCULI. Forsan retina humore transpirabili inundatur magis circa vesperas, quia aer frigidior quam de die. Curatio exigit evacuantia ac præsertim diaphoretica antimonialia. A)

4. HEMERALOPIA ENDEMICÀ. In China & Barbados, tum in Maldiviensibus, & Moluccis insulis, in Mosambica, Brasilia, ac in Polonia frequens est malum.

MYOPIA.

Est difficultas objecta paullulum dissita distinete videndi. B)

Myops nempe censetur qui ultra 20. pollices non distinete videt. Datur myopia 3 — 6 — 9 — pollicum.

CAUSA PROXIMA est adunatio radiorum in focum jam ante retinam.

SPECIES sunt

I. MYOPIA A CONEX NIMIA CONVEXITATE.

Causa hujus convexitatis est vel a nativitate, vel a majori aquei humoris secretione, hinc uno die major quam altero myopia esse po-

a) RICHARD DE HAUTESIERCK *Recueil d' observations de medecine des hopitaux I. 2. & Cel. WEIZ neue Auszüge aus Dissertationen für Wundärzte. 6. E. 50. S.*

b) Illustr. HALLERI *Element. physiol. T. V. p. 496. & Hamburg Magazin T. 23. p. 279.*

poteſt, hinc incipiens hydrophthalmia origo myopie. Curatio ab ætate & evacuantibus ſperatur.

2. MYOPIA A NIMIA LONGITUDINE BULBI. Hæc longitudo vel *nativa* est vel *aquisita* ob humorum congeſtioneſ in oculos, inde artifices in minutis operibus occupati, ut ſigillorum ſculptores, & homines multum legentes, frequenter poſt adolescentiam iterum myopes fiunt. Hi curantur abſtinentia ab artificiis cominus laborioſis.

3. MYOPIA A NIMIA CONVEXITATE ANTERIORIS SUPERFICIEI IN LENTE CRYSTALLINA,
Etiam hoc vitium a nativitate eſt.

Radii paralleli qui incident in corneam, eo obliquius incident, quo cornea vel lens, vel humor vitreus in anteriori superficie eſt convexior. Sed angulus refractionis eſt angulo incidentiaꝝ aequalis, ergo angulus refractionis eo citius in focum formabitur, quo convexior eſt cornea, vel lens.

4. MYOPIA A DENSITATE MAJORI CORNEÆ ET OCULI HUMORUM. Experimenta optica docent, eo citius radios in focum cogi, quo corpus diaphanum eſt densius.

5. MYOPIA A MYDRIASI. Nam quo latior aperitura diaphragmatis in optico instrumento eſt, eo proprior eſt focus.



6. **MYOPIA INFANTILIS.** Infantes ob corneam convexiorem sunt myopes, sed paulatim dum adolescunt remotiora etiam vident.

Curatio myopiæ radicalis ab ætate ut in infantibus speratur.

Curatio myopiæ palliativa obtinetur inspiciendo per tubos denigratos absque vitris ullis, aut per exiguum foramen carthæ & per perspicilla concava.

PRESBYOPIA.

Est visus vitium, quo objecta proxima confuse, remota vero distinctius videntur.^{A)}

Uti *myopia* infantibus sic *presbyopia* senibus commune est vitium.

Causa proxima est senior radiorum adunatio in focum, ut hic ultra retinam cadat.

SPECIES sunt

1. **PRESBYOPIA A CORNEÆ PLANITIE.** Quo planior est cornea eo minus & tardius refringit radios in focum. Hoc vitium oritur 1. a penuria humoris aquei & vitrei, quæ senio vel alio morbo inducitur. 2. a cicatrice, quæ cornea convexitatem minuit. 3. a nativa conformatione corneæ.

2. **PRESBYOPIA A LENTE CRYSTALLINA NIMIS**

PLA-

^{A)} *Illustr. HALLERI Elem. physiol.* T. V. p. 501.

PLANA. Etiam hoc vitium a senio, mala conformatio-
ne, vel tate lentis crystallinæ oritur.

3. PRESBYOPIA A NIMIA BULBI BREVITATE. Sic enim distantia inter corneam & retinam reditum brevior quam focus est.

**4. PRESBYOPIA A MINORI DENSITATE CORNEÆ
vel HUMORUM OCULI;** quo enim hæ partes sunt rariores eo miuus refringunt radios. Qui ex hac causa sunt presbyopes hi senili ætate curantur, senium enim majorem inducit densitatem corneæ, & ipsius lentis. Ex ejusmodi emendatione factum esse videtur, ut subinde presbyopes sponte convaluerit, & vitra convexa abjecerint, quibus juniores egebant.

5. PRESBYOPIA A CONSUETUDINE OBJECTA REMOTA CONTINUO INSPICIENDI. Inde artifices, qui in remotis objectis occupantur, id vitium sibi contrahere dicuntur; ratio phænomeni latet.

6. PRESBYOPIA SENILIS. Ex multiplici causa senes fiunt presbyopes, ob humorum in senio penuriam cornea atque lens crystallina fit planior & bulbus brevior. Cum autem in senio ex ipsa senili siccitate bulbus oculi brevior & cornea planior fiat, hinc qui ante此 myopes fuerunt, nunc in senio recte vident & vitris concavis non amplius indigent.

7. **PRESBYOPIA A NIMIA OBJECTORUM PROXIMITATE**, objectorum dissitorum focus est brevior, propinguorum autem est longior.

8. **PRESBYOPIA A PUPILLA COARCTATA**, quo angustior est apertura diaphragmatis in tubo optico, eo remotior est focus.

Curatio radicalis est impossibilis, nisi ætate curetur. *Curatio autem palliativa perspicillis convexis*, obtinetur. Hæc enim radios ita refringunt, ac si ex puncto longinquῳ venirent.

9. **PRESBYOPIA MERCURIALIS**, quæ ab usu mercurialium præparatorum oritur, ægrōtus sentit dolorem pressorium in oculo, qui ab tactu augetur, bulbus oculi rigidus quasi est, & difficulter ad latus moveri potest. Objecta vicina æger penitus non videt, dissita autem confuse.

Multi hunc morbum pro amaurosi imperfecta habent.

Curatio exigit fomenta ex foliis malvæ & vaporem aquæ, venæfectionem in pede, & pulpam cassiæ cum sero lactis. Quando dolor in oculo cessat, temporibus emplastrum de tacamahaka applicetur, & per aliquot septimanas mane & vesperi aliquoties scintillæ ele-

Etri-

Etricæ ex oculo extrahantur. Visu penitus
redeuante aqua frigida oculi robarentur. A)

HEMIOPSIA seu VISUS DIMI- DIATUS.

Est oculi vitium quo ægrotus objecti partem medium
seu non integrum videt.

SPECIES hujus mali sunt.

1. HEMIOPSIA A MACULA DIMIDIÆ CORNEÆ ,
vel DIMIDIÆ LENTIS. Radiorum enim pars
media in loco opaco suffocatur. Curatio exi-
git ut corneæ opacitas afferatur, vel ut lens
opaca extrahatur. V. *Maculas cornæ.*

2. HEMIOPSIA AB AMAUROSI DIMIDIÆ RETINÆ.
Si nempe focus partim retinæ paralyticæ
partim sanæ illabitur. Curatio exigit amo-
tionem causæ, quæ amaurosim facit. V. *Amau-
rosis.*

3. HEMIOPSIA NERVEA, quæ in nervo optico
sedem habere videtur. Caratur medicamen-
tis nervinis, & purgantibus interpolatis. B)

N 4

ME-

A) MARAT. on a singular. disease of the eyes. Lond:
1776. & RICHTERS chirurg. Bibliothek 4. Band. 1. St.

B) Cel. ABRAH. VATER in Diff. de duobus visus vitiis,
altero duplicato, altero dimidiato. 1713. Wittembergæ. tres
casus hujus morbi memorat. Religiosus cum tenuissimo



MYODESOPSIA seu VISUS MUSCARUM.

Est oculi vitium quo ægrotus punctum nigrum, quod muscæ, araneæ vel flocis nigris simile censet, ante oculum videt. A)

Hoc punctum nigrum volitare videtur, quando ægrotus oculum movet, & fixum manet, si oculus fugitur. Homines, qui visum acriorem habent, & in luce serena constituuntur, præser-tim his myodibus seu flocis nigris affici solent.

CAUSA PROXIMA est punctum opacum in quodam retinæ loco; seu ab humore opaco in vase quodam retinæ hærente, aut in retinæ ipsius super-ficie effuso vel a vase varicoso retinam pre-mente.

SPE-

victu tempus quadragesimale celebraret, subito vehe-
menter capitis dolore obrutus. brevi post oculorum acie
hebetata, tandem visu a latere ita amissò, ut nomen,
ex pluribus syllabis combinatum, non nisi capite & ocu-
lis, quamlibet syllabam seorsim sequentibus, legere po-
tuerit. Pariter inter duos vel plures ambulantes, jun-
ctim sociatos, unum solum e directo sibi obvium vidit.
Speculum inspiciens dimidium saltem oculi & pupillæ
repræsentari semper observavit. V. *Miscellaneæ N. C.*
annii V. VI. obs. 107.

A) Derivatur a μοῦ & οἷα visio.

SPECIES sunt

I. MYODESOPSIA A PUNCTO OPACO RETINÆ.

Quæ species amaurosis partialis est, ac non raro in amaurosim totalem transit. Curatur ut amaurosis.

2. MYODESOPSIA SANGUINEA, quæ a congestione

sanguinis in vascula quædam retinæ oritur.

Hæc species in phrenitide, in plethoricis, a solis æstu, a menstruis vel hæmorrhoidibus suppressis, & a capite diu antrorsum inclinato, observatur.

Curatio exigit venæsectionem, revellentia & externe repellentia, ut aquam frigidam oculo applicatam. *Myodes* phreniticorum larganarium hæmorrhagia optime solvuntur.

3. MYODESOPSIA AB ATONIA RETINÆ, quæ a lectione nimia, a lucubratione, telescopiorum, vel microscopiorum frequentiori usu, aut a vehementi foco radiorum in retinam illapso, oritur.

Curatio exigit remotionem causæ, applicacionem fomenti ex aqua frigidi, & interna roborantia ut corticem peruvian. cum valeriana. Supercilio infricitur liquor anod. m.

4. MYODESOPSIA AB OCULI CONTUSIONE, qua forsan guttula alicujus humoris in retina effunditur. Curatur venæsectione & fomentis discutientibus. A)

VI-

▲) Sunt authores qui putant, myodes in oculo exercita-



VISUS RETICULARIS.

Est oculi vitium, quo ægrotus umbras ramosas reticulo tenui, aut telæ aranearum similes, videt.

CAUSA PROXIMA est turgescensia vasculorum retinam perreptantium, & illam prementium.

SPECIES sunt

1. **VISUS RETICULARIS A CONGESTIONE SANGUINIS IN RETINAM.** Sic cohita inspiratio, aut capite diu antorsum inclinato, pro libitu possumus nobis procurare visum reticularum. Hæc species fugax est & evanescit remota causa.

2. VI-

citari a puncto opaco crystallinæ lentis, vel a macula in cornea, vel a corpusculo in humore aqueo volitante; at optices regulas, qui attentius considerat, facile comprijet, imagines rerum, in oculo ante retinam sitarum, prorsus extra oculum projici, nunquam in oculo depingi. Corporis enim radiantis & a crystallino humore, tres semidiametros hujus lentis cum semisse distantis, nulla pingitur in retina imago, cum igitur cornea in nullo oculo distet a lente crystallina tribus ejusdem semidiametris cum semisse, hinc nulla supra corneam cicatrix, aut corpus in humore aqueo volitans, neque macula in lente crystallina percipitur a retina. Hæ causæ visum debiliorem seu amblyopiam, non autem myodesopsiam causare valent.

2. VISUS RETICULARIS PERMANENS, qui constanter adest. In hac specie videntur vasa retinæ ob retinae atoniam constanter turgere.

Curatio exigit fomenta roborantia vel aquam frigidam externe oculo applicatam : *interne* cortex peruv. cum valeriana detur.

VISUS NEBULOSUS.

Est oculi vitium, quo ægrotus per nebulam vel linteum vel tenebras quasi, objecta videre opinatur.

CAUSA PROXIMA est vel denegatus transitus sufficientis quantitatis radiorum, vel insufficiens sensilitas retinæ.

SPECIES sunt

1. **VISUS NEBULOSUS AB INCIPIENTE CATARACTA**, quæ jam paucissimos radios ad retinam transmittit. Exigit curationem cataractæ.

2. **VISUS NEBULOSUS AB INCIPIENTE AMAUROSI**, quando retina jam fere insensibilis, vix radiis lucis amplius afficitur. *Curatio* exigit curam amauroseos.

3. **VISUS NEBULOSUS A LEUCOMATE CORNEÆ**; per loca opaca non requisita radiorum copia, quæ visui claro sufficeret, transit. De curatione v. *maculas & obscurationem cornæ*.

4. **VISUS NEBULOSUS A TURBIDO HUMORE AQUEO**. Sic pauci radii hunc liquorem transfire pos-



- possunt. Curatio exigit ut humor hicce clarius reddatur vel emittatur. V. Turbiditas
5. VISUS NEBULOSUS AB INCIPIENTE GLAUCOMATE. Idem contingit si humor vitreus opacus fieri incipit. Curatio est raro possibilis. V. Glaucoma.
6. VISUS NEBULOSUS AB INCIPIENTE ANIMI DELQUIO. Quibus animi deliquium imminent his visus non solum nebulosus, sed tandem tenebricus evadit, ob cessantem liquidum nervi motum in retina. Curatur evanido animi deliquio.
7. VISUS NEBULOSUS AB ATONIA RETINÆ, quæ insensibilis aliquantum evadit, de causis & curatione hujus speciei, V. Amblyopia a debilitate retinæ.
8. VISUS TENEBRICOSUS AB INGESTIS VENENIS, quæ per consensum e ventriculo in retinam agunt. Curatio exigit emetica..

METAMORPHOPSIA seu VISUS DEFIGURATUS.

Est vitium oculi, quo ægrotus figuræ objectorum mutatas videt. A)

SPE-

A) *Metamorphosis* est figuræ mutatio, *figura* est limes extensi. Hinc species hujus morbi a figuræ magnitudine & circumscriptione mutata constituo.



SPECIES sunt

1. METAMORPHOPSIA AUCTA, quando ægrotæ objecta majora, quam revera sunt, apparent. Id a myopia, a saburra primarum viarum, a morbo nervorum originem habere potest.
2. METAMORPHOPSIA DIMINUTA, quando objecta minora quam revera sunt, videntur. Etiam hæc species a saburra primarum viarum oriui visa est. A) Curabatur vomitorio & purgante.
3. METAMORPHOPSIA NUTANS. Vertiginosis, ebriis, & morbo nerveo affectis objecta titubare videntur. Quandoque saburra primarum viarum aut transpiratio suppressa origo mali est. Hinc curatio juxta causas instituatur.
4. METAMORPHOPSIA TORTUOSA seu FLEXUOSA, quandoque omnes res apparent flexuofæ seu tortuofæ. Causa hujus mali vel in nervis vel in primis viis est. Hinc pro curatione vel evacuantia vel antispasmodica adhibe. B)

5.

A) LENTIN *Observat fascicul. II.*

B) Illustr. Medico Narbonensi octogenario per aliquot dies omnia objecta inflexa seu flexuosa vel in alterutrum latus nutantia apparebant, ita ut homines obvii viderentur ipsi trunco, cruribusque tortuosi, simulque in alterutrum latus declinantes & ad lapsum proni, quos



5. METAMORPHOPSIA INVERSA , quando ægroto omnia objecta ; inversa apparent. A)

6. METAMORPHOPSIA IMAGINARIA , est rei non præsentis visio , ut in delirantibus , maniacis , & visionariis quandoque observatur. Curatio exigit ablationem morbi , a quo visio imaginaria oritur. B)

7. METAMORPHOPSIA AB IMPRESSIONE REMANENTE. Sic qui attente præterim in magna luce objectum intuetur , diu adhuc objectum sibi præfens videt.

CHRU-

quos ideo prima vice monebat , aut sustentare conabantur ; evanuit hic affectus , remansit vero visus solito obscurior. V. Illust. SAUVAGES Nosol. method. T. II. p. 190.

A) Exemplum , ubi omnia morbose inversa apparuerant , habet Illust. SENNERTUS Prax. med. L. I. c. 3. S. II. Archijater Dresdensis cum in bibliotheca scalam ascenden- do , oculos nimis sursum converteret , subito animadver- tit , omnia se se plane inversa videre. Duravit hæcce miranda oculorum affectio per anni quadrantem , donec eodem casu , quo venerat , rursus evanesceret , cum ite- rum nimirum casu aliquando oculos valde attolleret.

B) Cel. DELII Diss. phantasmatæ ante oculos volitan- zia. Observavit VALSALVA hominem , qui continuo præ oculis palatia pulchre decorata & colorata sibi adversari videbat.



CHRUPSIÀ seu VISUS COLO- RATUS.

Est oculi vitium, quo ægrotus objecta alieno colore
tincta, vel colores varios itidi vel pavonis cau-
dæ similes videt. A)

CAUSA PROXIMA est color alienus in retina, vel
pressio retinæ, quæ irritationi similis est, quam
focus coloris in retina excitat.

SPECIES sunt

1. **CHRUPSIÀ ICTERICORUM**, quibusdam ictericis
omnia objecta apparent flava. B) Curatio
exigit sanationem iæteri.
2. **CHRUPSIÀ A SANGUINE EFFUSO**. Sic crux in
oculi cameris & circa retinam effusus obje-
cta rubro colore tingit. Curatio exigit ve-
næsectionem purgantia & fomentum discu-
tiens.
3. **CHRUPSIÀ A FRICTIONE VEREMENTI OCULI,**
PRÆSERTIM IN TENEBRIS. Notum est inde
pavonios excitari colores, qui sensim eva-
nescunt.

4.

A) χρυψία derivatur a χρυσῷ & φία visio.

B) Dico ictericis quibusdam, non enim omnes obje-
cta vident flava. *Celeb. Durazzini* oculos icterici, cui
obje-



4. **CHRUPSLA FEBRILIS.** Ægroti qui febre pestilentiali decumbebant irides videbant. A)
5. **CHRUPSLA AB INSPECTIONE SOLIS.** Imago prima est lucidissima, sed hæc inde in rubram, flavam, cæruleam & nigrā degenerat ac evanescit.
6. **CHRUPSLA AB IMPRESSIONE PERMANENTE.** Sic qui diu pannum ruberrimum intuetur, & oculum subito avertit, diu adhuc rubedinem percipit.
7. **CHRUPSLA NERVIA.** Ex terrore quandoque omnia viridescunt, vel cærulescunt. Quandoque delirium, quandoque faburra ventriculi causa hujus mali est. Curatio exigit amotionem harum causarum.
8. **CHRUPSLA A MISCELLA RADIORUM COLORATORUM EXTRA OCULUM.** Si quis perspicillum, cuius unum vitrum cæruleum, alterum rubrum est, naſo apponit, & lumen aspicit, tunc

objecta videbantur flava, dissecuit, huic retina, omnes oculi membranæ, atque lens crystallina humore havo erant tinctu. In aliis icterici cadavere, cui objecta non flava apparebant, præter capsulam lentis nil flavescebat in oculo. V. TORGIONI *raccolta di opusculi medico-prædicti. T. I.*

A) Cel. BOYLE *de coloribus* p. 18. & Illustr. HALLE-RI *Element. physiolog.* T. V. p. 528.

tunc videt flamمام violaceam. A) Sic ab incenso in tenebris sulphure omnes adstantes viride pallescunt.

PHOTOPSIS seu VISUS LUCIDUS.

Est oculi vitium, quo ægrotus radios, vel lineolas igneas, vel scintillas, aut corruscationes videt. B)

CAUSA PROXIMA harum visionum lucidarum esse videtur pressio retinæ, adeo valida, ut similis sit pressioni, quam focus lucis naturalis in retina excitat, id docent causæ lucem imaginariam excitantes.

SPECIES sunt

1. PHOTOPSIS A PERCUSSIONE OCULI. Id vulgarissimo experimento notum est, dicunt percussi ignem ex oculo exsilire.

2. PHOTOPSIS AB AFFECTIONE NERVÆ. Fulgures ante tetanum, ante epilepsiam, aut alios morbos spasmaticos, huc referto. Curatio exigit ablationem morbi spasmatici.

3. PHOTOPSIS A CONGESTIONE SANGUINIS IN RETINAM vel NERVUM OPTICUM. Hinc a tussi, vomitu, sternutatione, vertigine, ante

O

te

A) JANIN *Beobachtungen über das Auge.* S. 88.

B) HIPPOCRATI dicitur *marmaryge*.



te amaurosim & apoplexiā observata fuit; hinc a menstruis vel hæmorrhoidibus suppressis oritur. *Curatio* exigit venæsectionem, purgantia, revellentia. *Esterne* aquam frigidam.

4. PHOTOPSIS A LABORE IN CORPORIBUS MINUTIS. Id de sutricibus phrygiis atque de lucubratione nimia affirmatur. Et hæc species a sanguinis congestionē oriri videtur. Labor enim talis oculum irritat, & irritatio attrahit. *Curatio* hinc eadem ut in specie priori.

3. PHOTOPSIS AB EVIGILATIONE NOCTURNA. Quibusdam has scintillas imaginarias adeo fuisse vividas referunt scriptores, ut etiam noctu aliquot secunda durarent, & ad videntia objecta sufficerent. A)

6. PHOTOPSIS A LACRUMATIONE. Quorum oculi lacrumis madent, hi lucidos vident radios, quia radii lucis in lacrumis prius fluorescunt antequam corneam transeunt. Hæc species abstensis lacrumis evanescit.

STRABISMUS.

Est oculi vitium, quo ægrotus objecta, oculum unum

A). Si hæc pars historiæ vera est, dicit *Illustr. HALLERUS Elem. physiol.* T.V. p. 527.

unum vel utrumque ab axi visus distorguendo, intuetur. A)

Hæc oculi distorsio vel *sursum* vel *deorsum* vel *extorsum* vel *introrsum*, in uno vel utroq; oculo observatur, vel distorsio oculorum est *inequalis*, adeo ut oculorum unus terram, alter cœlum aspiciat.

EFFECTUS strabismi sunt non solum deformitas oculorum sed etiam visus debilior in dijudicandis corporibus dissitis & diplopia, præsertim morbo incipiente.

SPECIES strabismi sunt

I. STRABISMUS NEUNATORUM. Omnes infantes neunati oculos distorquent, ast successu temporis observant, objecta distinctius videri ambobus oculis, ad ea directis, quæ directio illis sensim naturalis evadit. B)

2. STRABISMUS A PRAVA CONSUETUDINE INFANTUM DUO OBJECTA SIMUL INTUENDI. Sic infans in cunis inter duo objecta, quæ valde amat, locatus, si ex uno latere speculum v. g. vel fenestram & ex altero latere nutricem perpetuo aspicit, facile strabismo afficitur.

Curatio exigit ut oculus sanus per aliquot mens

O 2

ses

A) Cel. RUFFON *sur la cause du strabisme ou des yeux louches.* in *Mem. de l' Acad. des sciences.* 1743.

B) Cel. PETIT *Diss. sur la vue des enfans.* in *Mem. de l' Acad. de Paris.* 1727.



ses linteo deligetur, si unus solummodo oculus strabismo est affectus. Si vero uterque oculus strabismo laborat, tunc per aliquot dies solus dexter & per aliquot solus sinister oculus eligari debet. Sic oculus nudus simplicissimo hoc remedio sensim intuitui recto objectorum assuefecit.

3. STRABISMUS EX DISTORSIONE UNIUS MUSCULI BULBI. Infantes, qui in naso verrucam, vel aliud vitium habent, vi oculum perpetuo distorquent, ut hoc vitium aspicere possint, unde sensim strabones evadunt.

Curatio exigit roborantia externa ut fomentum ex viao & spiritus camphorati aliquot guttulis.

4. STRABISMUS AB AMBLYOPIA vel MYOPIA UNIUS OCULI. Sic si sinister oculus non videt ultra semipedem & dexter ultra pedem, tunc objecta unico dextro oculo aspicere asuescimus & debilem oculum negligimus, Idem observatur in hominibus, qui unius oculi cæcitatem laborant; Cæcus enim oculus a fano divergit. In ambabus oculis cæci in utroque oculo strabones sunt.

5. STRABISMUS A SPASMO UNIUS MUSCULI BULBI. Tunc bulbus versus musculum spasmus affectum trahitur, & immobilis manet. Causa hujus spasmi esse potest a salubra primarum



marum viarum, a malo hysterico vel hypo-chondriaco, a terrore, ab oculi punctura.

Curatio hinc exigit ablationem causæ.

6. STRABISMUS RHEUMATICUS, qui a rheumatismo musculi unius bulbi oritur; noscitur dolore rheumatico sub bulbi motu. *Curatur purgantibus & antirheumaticis.*

7. STRABISMUS A PARALYSI UNIUS MUSCULI BULBI. Sic musculus antagonista fortior factus se ex opposito latere contrahit. Si vero omnes bulbi musculi paralysi afficiuntur, tunc bulbus immobilis manet & cum motu oculi sani non correspondet.

Causæ hujus paralysis sunt capitis vel oculi contusio, incipiens apoplexia, prægressa epilepsia, quæ quandoque paralysim relinquit, vulnus nervi ocularis.

Curatio exigit antiparalitica, ut arnicam, electricum ignem, nervina externe & interne applicata.

8. STRABISMUS A BULBI UNIUS IMMOBILITATE. Sic enim bulbus immobilis motui bulbi mobilis respondere nequit. *Causæ*, quæ bulbum reddunt immobilem, sunt bulbi concretio cum orbita ob pinguedinem orbitalem suppuratione consumptam, vel tumor osseus, aut cysticus, qui bulbum ad latus premit. Longa muscularum quies, quæ contractili-



tatem muscularum causat, ut si oculus longo tempore firmiter deligatur.

*Curatio exigit amotionem causæ, si hæc amo-
veri nequit strabismus est incurabilis.*

9. STRABISMUS ENDEMIUS. Omnes fere incolæ Asiae æquinoctialis strabones & nyctalopes sunt, hi interdiu album oculi tantum ostendunt, pupillam autem sub palpebris reconidunt, ne a radïis solis, quos arenosum solum reflectit, lædentur.

10. STRABISMUS SYMPTOMATICUS, ut qui symptoma est hydrocephali interni, epilepsia, tetani, & morientium. Omnes hi strabismi sunt lethales.

LUSCITAS seu VISUS OBLI- QUUS.

Est oculi vitium quo ægrotus objecta non directe sed oblique solummodo videre potest.

Diffrerit luscus a strabone, luscus enim oculum non distorquet.

SPECIES luscitatis sunt

I. LUSCITAS A LEUCOMATE IN MEDIE TATE CORNEÆ. Cum ægrotus radios objecti, qui ad medietatem corneæ pergunt, videre non possit, hinc cogitur ut objectum oblique aspiciat.

*Curatio exigit curationem leucomatis. V. Ma-
culas cornea.*

2. Lu-



2. LUSCITAS A LENTIS CRYSTALLINÆ SITU OB-
LIQUO. In hoc casu radii a lente crystallina
oblique franguntur, hinc non in medietate
tem retinæ, sed ad latus incident, ideo æ-
grotus luscitare cogitur.

Cause, quæ lentis situm mutant, sunt mala
conformatio, vulnus capsulæ crystallinæ, vel
processuum ciliarium, commotio capitis vel
oculi.

Signum diagnosticum hujus vitii est, quod pu-
pula seu imago insipientis in oculum, non
in medietate sed lateraliter seu oblique appa-
reat in oculo ægroti.

Curatio est impossibilis, incertum enim est an
lente extracta visus non maneat incommo-
dus.

3. LUSCITAS A LATERALI PUPILLÆ SITU. Tunc
faciem & oculum vertimus adeo oblique ut
radii per obliquam vel lateralem pupillam
incidere possint. Curatio est impossibilis.

4. LUSCITAS AB INSENSILITATE PUNCTI VISO-
RUM IN RETINA. Quando retinæ medietas
non bene sentit, tunc recte conspecta obje-
cta obscure vel penitus non videntur, obli-
que vero posita objecta distincte cernuntur.

Curatio vel est impossibilis, vel exigit curam
amauroseos partialis.

§. LUSCITAS AB OBLIQUITATE CORNEÆ. Hæc enim focum oblique ad lenten dirigit. Sed an non lens focum iterum in rectitudinem reducit? Hinc hæc causa luscitatis dubia est. A)

DIPLOPIA seu VISUS DUPLICATUS.

Est oculi vitium, quo ægrotus idem objectum bis aut pluries videt. b)

CAUSA PROXIMA est *dislocatio axium visus vel geminata aut multiplicata imago in retina unius oculi.*

SPECIES hujus morbi sunt

I. **DIPLOPIA A STRABISMO.** Si imago unus objecti in eundem utriusque retinæ locum incidit, tunc hoc objectum semel videmus, quia in oculo utroque eandem ideam excitat, si vero ob strabismum unus oculus ab axi visus distorquetur, tunc objecti imago in oculo sano in medietatem retinæ, in oculo distorto autem ad latus medietatis retinæ incidit, hinc ab inæquali sensatione duæ ideæ

a) Vedit Celeb. Professor RICHTER corneam in quodam loco tuberosam & ægrotus tamen non luscitabat.

V. von der Ausziehung der grauen Staars. S. 180.

b) Cel. KLINCKE Diff. de diplopia. Gött. 1774.

ideæ imaginis excitantur, unde objectum bis videmus.

Cum autem strabones ut plurimum oculum unum altero debiliorem habent, hinc solo oculo sano videre solent, distortum seu debilem negligunt, ideo sensatio imaginis distinctoris in oculo sano imaginem debiliorem in oculo debili adeo obscurat, ut strabones sensim diplopia non amplius afficiantur.

Curatio hujus diplopiæ exigit curationem strabismi. V. *Strabismus.*

2. **DIPLOPIA A PRESSIONE OCULI.** Notissimum est experimentum, quod geminum videamus objectum, si digito oculum e latere premissus. Idem observatur si oculus exostosi vel alio tumore intraorbitali ad latus premitur. Ratio est quod pressus oculus in alio loco, quam sanus objecti imaginem percipiat.

Curatio exigit ablationem tumoris prementis.

V. *Exophthalmia.*

3. **DIPLOPIA AB ANCHYLOBLEPHARO.** Si chartam lusoriam acicula bis perforemus, ita ut foraminula non magis distent a se quam pupillæ diametro, atque si charta oculo uni admota, altero clauso flammarum candellæ in certa distantia intueamur, illico flammæ gemina, imo si tria sunt foraminula, triplicata apparebit. Si itaque palpebris conniven-

tibus



tibus ciliorum interstitia, totidem foramina, luci pervia, relinquant, nil mirum est, si tales ægroti objectum ter, quater vel pluries repetitum videant.

Curatio exigit divisionem palpebrarum. V. An-
chyloblepharon.

3. DIPLOPIA A LACRUMIS. Si cilia lacrumis mandent, in illis efformantur totidem lentes aquæ, hinc per totidem lentes objecta multiplicantur.

Curatio exigit abstersionem lacrumarum.

4. DIPLOPIA A LENTE CRYSTALLINA POLIEDRICA.
Sic duo formantur foci, qui duplarem in retina imaginem faciunt, ut in vitro polygono videre solemus.

Curatio exigit ut lens crystallina extrahatur. An cornea polyedrica diplopiam pariat, dubium est. Hoc corneæ vitium est incurabile.

5. DIPLOPIA A PUPILLA DUPLICI IN UNO OCULO. Sic enim duplex per pupillas transit focus ad retinam. Est malum incurabile. A)

6. Di-

a) Cl. REGHELLINI *lettera chirurgica sopra l' offesa della vista in una donna, consistente nec radoppiamento degli oggetti, sequira dopo la depressione della cataratta.* VENEZ. 1749. Dantur tamen casus; in quibus a pluribus pupilis diplopia non observabatur. V. Cl. JANIN, & Cel. KLINCKE opus citatum.

6. DIPLOPIA A PUPILLÆ SISU PRÆTERNATURA-

LI. In hoc casu radiorum imago in diversis utriusque retinæ locis pingitur, unde diplopia. Est etiam malum incurabile.

7. DIPLOPIA A LENTE E SITU MOTA. Etiam in hoc casu alias est focus in oculo ægroto. Curatio exigit extractionem lentis, hæc enim luxata alioquin brevi in cataractam abit.
8. DIPLOPIA A CATARACTA PARTIALI. Ubi lens in uno solum loco opacatur. Videtur focus in lente ab opacitate dividi. Curatio exigit extractionem lentis.
9. DIPLOPIA MYOPUM. Ratio haud in promtu est, nisi assumamus myopiæ simul junctam esse quandoque lentem polyedricam.
10. DIPLOPIA NERVEA, quæ a peculiari affectione nervi optici, idiophatice, vel consensualiter affecti, oritur. Ut a terrore, faburra ventriculi, assumpto veneno, ebrietate, confusione capitis, superciliarum vel oculi, ab apoplexia vel morte instanti, a malo hysterico vel hypochondriaco.

Curatio exigit ut causæ amoveantur. Externe liquor anodynus mineralis vel alia nervina nervo frontali e supercilio exeundi, inficari possunt.





INDEX.

A.

	PAG.
Achlys.....	95
Ægylops.....	55
Ægis.....	95
Albugo.....	95
Aliena oculis illapsa....	89
Amblyopia.....	186
Amaurosis.....	174
Anchyloblepharum....	17
Anchylops.....	54
Argema.....	102
Argyriæ.....	141
Atheroma palpebrarum..	22
Antoniatonblepharon....	30
Atrophia oculi.....,	108

B.

Blepharophthalmia.....	20
Blepharoptosis.....	30
Bothrion.....	102
Buphtalmia.....	130

C.

Carbunculus oculi.....	88
— palpebrarum	25
Carcinoma bulbi....	112
— palpebrarum	24
Carunculæ coniunctivæ..	88
cornea —	107
Cataracta.....	139
Ceratocele.....	100

Chalazium.....	26
Chemosis.....	72
Cirsophthalmia.....	35
Clavus iridis.....	126
Coiloma.....	102
Coloboma.....	44
Crithe.....	25
Crupsia.....	207

D.

Defectus oculi.....	117
Diplopia.....	216
Distichiasis.....	17

E.

Ecpiesmus.....	110
Ecchymoma palpebrarum	21
Entropium,.....	36
Ecchymosis conjunctivæ	86
Effluvium humoris aquei	138
vitrei	171

Emphysema palpebr.....	21
Empyesis.....	132
Encauthis.....	67
Encauma.....	102
Entropium.....	39
Epanastema.....	88
Epicauma.....	102
Epiphora.....	48
Exophthalmia.....	109

F. Fi-



F.

Ficosa palpebra.....	32
Fistula cornea.....	103
— lacrimalis.....	56
— palpebrarum....	43

G.

Gerontoxon.....	96
Glaucoma.....	170
Gramia.....	69
Grando.....	26
Gutta serena.....	174

H.

Hebetudo visus.....	86
Helcomma.....	101
Heleydrion.....	102
Hernia cornea.....	202
Heimeralopia.....	193
Heiniopsis.....	199
Hilon.....	126
Hippus.....	129
Hordeolum.....	15
Hydatis palpebrarum....	27
— cornea.....	107
Hydrops facci lacruina- lis.....	52
Hypogala.....	136
Hypoæma.....	136
Hypochyma.....	139
Hypochybris.....	139

I.

Immobilitas pupillæ....	129
-------------------------	-----

L.

Lacrumatio sanguinea..	69
------------------------	----

Lagophthalmus.....	33
Lapis palpebralis.....	27
Leinia.....	69
Lemositas.....	69
Leucoina.....	95
Lithiasis palpebræ.....	27
Lippitudo.....	51
Luseitas.....	214

M.

Maculæ cornea.....	94
Madarosis.....	13
Melon.....	156
Metamorphopsia.....	204
Milium palpebrarum....	28
Milphosis.....	13
Morum palpebrarum..	28
Morum palpebræ inter- na.....	29
Mydriasis.....	118
Myocephalum.....	126
Myodesopsia.....	200
Myopia.....	194
Myosis.....	119

N.

Nebula.....	203
Nephelium.....	94
Nictitatio.....	44
Nictalopia.....	191
Nystagmus.....	115

O.

Oculus artificialis....	134
— leporinus.....	33
— supernumerarius	17
Obscuratio cornea....	90
Oedema	

Oedema palpebrarum.	20	Ptosis palpebræ superio-
Onyx.	100	ris.
Ophthalmia.	70	— bulbi.
Ophthalmodinia.	83	Pustula.
Ophthalmoptosis.	110	Pupillæ deformitas.
Oule.	96	Pupilla præternaturalis.
Oxyopia.	185	— marginalis.

P.

Pannus.	97
Papulæ.	87
Paralampsis.	95
Peribrosis.	668
Phlyctena.	87 — 107
Phthyriasis superciliorum	14
Phthisis oculi.	108
— pupillæ.	119
Photophobia.	173
Photopsia.	209
Phleginone oculi.	73
Pinguecula.	88
Pladarotes.	29
Presbyopia.	196
Proptosis.	110
Prolapsus oculi.	110
— iridis.	127
— lentis crystalli-	
næ.	169
— humoris vitrei	71
— palpebræ supe-	
rioris.	30
Pruritus palpebrarum.	46
Psorophthalmia.	40
Psydracia.	107
Pterygium.	96
Ptilosis.	13
Ptosis iridis.	127

R.

Rebelliones.	107
Rhexis oculi.	105
Rhyas.	68
Rhytidosis.	105
Rubor marginum palpeb-	
ralium.	41
Rutidosis corneæ.	105

S.

Sarcoma palpebrarum.	23
Scheroma.	47
Scirrus palpebrarum.	23
Sclerophthalmia.	75
Spasmus palpebrarum.	45
Staphyloma corneæ.	98
— iridis.	126
Strabismus.	210
Sycosis.	30
Symblepharum.	19
Synchysis.	171
Synechia.	123
Synizesis.	121
Suffusio.	139

T.

Taraxis.	72
Tetanus oculi.	115
Trachoma.	29

Tri-



Trichiasis.....	15	Verrucæ palpebrarum..	28
Trichosis.....	15	Visus reticularis.....	202
Turbiditas humoris a. quei.....	137	— nebulosus.....	203
Tylosis.....	42	Vulnera bulbi.....	116
U.		— cornea.....	104
Ulcus conjunctivæ.....	89	— iridis.....	127
— cornea.....	101	— palpebrarum..	43
Ungula.....	97	— superciliorum..	15
Unguis.....	101	— sclerotica.....	116
V.		X.	
Varicositas conjunctivæ..	85	Xerophthalmia.....	78

