特1
2509

陰病

漏下

胎前

難産

後

国立国会図書館　タイトル『本草類方10巻』　請求記号 特1-2509　ガラス使用

本草類方卷之九

崩中漏下第二十三

婦人血漏 伏龍肝[illegible]兩阿膠蠶沙炒各一兩爲末每空肚酒服二三錢以知爲度○寇氏衍義

婦人崩中 百草霜二錢狗膽汁拌勻分作二服當歸酒下○經驗方

婦人血崩 赭石火煆醋淬七次爲末白湯服二錢○普濟方

女人血崩 貫衆半兩煎酒服之立止○集簡方

崩中漏下 青黃赤白使人無子禹餘粮煆研赤石脂煆研牡蠣煆研烏賊骨伏龍肝炒桂心等分爲末温酒服方寸匕日服忌葱蒜○張文仲備急方

婦人血崩 金絲草海栢枝砂仁花椒蠶退紙舊錦灰等分爲末煮酒空心服陳光述傳○談埜

国立国会図書館 タイトル『本草類方10巻』 請求記号 特1-2509 ガラス使用

特1
2509

翁方

婦人崩中 益智子炒碾細米飲入鹽服一錢○産寶

婦人崩中 獨聖散用防風去蘆頭炙赤爲末每服一錢以麵糊酒調下更以麵糊酒投之此藥累經効驗一方加炒黑蒲黃等分○經驗方

崩中下血 黃芩爲細末每服一錢霹靂酒下以秤錘燒赤淬酒中也許學士云崩中多用止血及補血藥此方乃治陽乘陰所謂天暑地熱經水沸溢者也○本事方

漏血欲死 鷄蘇煮汁一升服之○梅師方

婦人血崩 三七研末同淡白酒調一二錢服三服可愈加五分入鬥物湯亦可○瀕湖集簡方

下血血崩 如山崩或五色漏帶並宜常服滋血調氣乃婦人之仙藥也香附子去毛炒焦爲末每服二錢立愈昏迷甚者三錢米飲下亦可加麝灰○許學士本事

崩中不止 荆芥穗炭麻油燈上燒焦爲末每服二錢童子小便服此夏太君娘娘方也○婦人良方

婦人血崩 新縮砂仁新瓦焙研末米飲服三錢○婦人良方

崩中漏下 石韋爲末每服三錢溫酒服甚效

崩中下血 晝夜不止千金方用苧鷰一兩清酒一大盞煎取五分徐徐進之○聖惠加生地黃汁二合同煎

崩中下血 小腹痛甚者苧藥一兩炒黃色栢葉六兩微炒每服二兩水一升煎六合入酒五合再煎七合空心分爲兩服亦可爲末酒服二錢○聖惠方

国立国会図書館　タイトル『本草類方10巻』　請求記号 特1-2509　ガラス使用

婦人血崩 青鞏二兩輕粉一錢爲末水丸梧子大每服二三十丸新汲水下○摘玄方

崩中漏下 青黃赤白使人無子好墨一錢水服日三服○肘後方

血崩帶下 赤芍藥香附子等分爲末每服二錢鹽一捻水一盞煎七分温服日二服十服見効名如神散○良方

血崩不止 夏枯草爲末每服方寸匕米飲調下○聖惠方

婦人血崩 血氣痛不可忍遠年近日不瘥者雷氏木賊散主之木賊兩爲末每服三錢色黑者酒一盞煎紅赤者水一盞煎和滓服日二服臍下痛者加乳香沒藥當歸各一錢同煎忌生冷硬物豬魚油膩酒麵○醫壘元戎

崩中下血 大小薊根一升酒一斗漬五宿任飲亦可酒煎服或生搗汁温服○又方小薊莖葉洗切研汁一盞入生地黃汁一盞白米半兩煎減半温服○千金方

傷中崩赤 醍醐杵汁拌酒煎沸空心服一盞○千金方

婦人崩中 連日不止熟艾鷄子大阿膠炒爲末半兩乾姜一錢水五盞先煮艾薑至二盞半傾出入膠烊化分三服一日服盡○初虞世古今録驗

血崩不止 木苺根四兩酒一盆煎七分空心温服○膳仙乾坤生意

婦人血崩 凌霄花爲末每酒服二錢後服四物湯○丹溪纂要

崩中漏下 桑耳炒黑爲末酒服方寸匕日三服取效○千金方

崩中痢下 治婦人崩中及下痢日夜數十起欲死者以此入腹即活懸鈎根薔薇根柿根根拔葜各一斛剉入釜中水淹上四五寸煮減三之一去滓取汁煎至可丸丸梧子大每温

酒服十九日三
服○千金翼

崩中下血不問年月遠近用槐耳燒存性爲末每服方寸匕溫酒下○産寶方

崩中漏下木耳半斤炒見烟爲末髮灰三分共二錢四分以應二十四氣好酒調服出汗○孫氏集效方

崩中下血用湖鷄腿根一兩擣碎酒二錢煎一錢服○瀕湖集簡方

崩中下血陳年蒸餅燒存性米飲服二錢

婦人血崩草血竭嫩者蒸熟以油鹽姜淹食之飲酒一二盃送下或陰乾爲末姜酒調服一二錢一服卽止生于磚縫井砌間少在地上也○危亦林得效方

崩中漏下不止者桃核燒存性研細酒服方寸匕日三○千金

産後崩中下血不止菖蒲一兩半酒二盞煎取一盞去滓分三服食前温服○千金方

血崩不止白扁豆花焙乾爲末每服二錢空心炒米煮飲入鹽少許調下卽効○奇効良方

阿伽陀丸治婦人血崩用胡椒紫檀香鬱金茜根小蘗皮等分爲末水丸梧子大每服二十九阿膠湯下○時珍曰按西陽雜俎胡椒出摩伽陀國此方之名因此而訛者也

漏胎下血蓮房燒研麵糊丸梧子大每服百丸湯酒任下日二○朱氏集驗方

血崩不止諸藥不效服此立止用甜杏仁上黃皮燒存性爲末每服三錢空心熟酒服○保壽堂方

舊葫蘆瓢炒存性蓮房煅存性等分研末每服二錢熟水調服三服有汗爲度卽止甚者五服止最妙忌房事發物生冷○海上方

赤白崩中

血崩不止老絲瓜燒灰棕櫚燒灰等分鹽酒或鹽湯服○奇效良方

婦人白崩秩楊皮半斤牡丹皮四兩升麻牡蠣煅各一兩每用一兩酒二鍾煎一鍾食前服○集簡方

崩中下血荷葉燒研半兩蒲黃荼各一兩爲末每空心酒服三錢

血崩不止不拘冷熱用蓮蓬殼荊芥穗各燒存性等分爲末每服二錢米飲下○聖惠方

血崩不止烏梅肉七枚燒存性研末米飲服之日二

血崩不止桂心不拘多少砂鍋內煅存性爲末每飲空腹服一二錢名神應散○婦人良方

婦人崩中晝夜不止丁香二兩酒一升煎一升分服○梅師方

婦人血崩鳥蒜一箇燒存性研末酒服之○李氏方

血崩不止胡桃肉五十枚燈上燒存性研作一服空心温酒調下神效

血痢血崩楮樹皮荊芥等分爲末冷醋調服一錢血崩以煎七服神效不可具述○危氏得效方

婦人血崩黃絹灰五分棕櫚灰一錢貫衆灰京墨灰荷葉灰各五分水酒調服卽止○集簡方

血崩不止好綿及婦人頭髮共燒存性百草霜等分爲末每服三錢温酒下或加棕灰○東垣方用白綿子蓮花心當歸茅花紅花各一兩以白紙裹定黃泥固濟燒存性爲末每服一錢入麝香少許食前好酒服○乾坤祕韞用舊綿絮去灰土一月新蚕絲一斤陳蓮房十箇舊炊箪一枚各燒存性各取一錢空心熟酒下日二服不過五日愈

崩中赤白不問遠近取槐枝燒灰食前酒下方寸匕日二服○深師方

国立国会図書館　タイトル『本草類方10巻』　請求記号 特1-2509　ガラス使用

血崩不止　槐花三兩黃芩二兩爲末每服半兩酒一盞銅秤錘一枚桑柴火燒紅浸入酒內調服忌口○乾坤秘韞

血崩不止　櫻樹皮燒存性空心淡酒服三錢一方加蝦白礬等分○婦人良方

婦人尿血　絞茄一斤洗淨河水四升半煮二升半分二服○千金方

崩中帶下　椒目炒碾細每温酒服一錢○金匱鈎玄

崩中漏下　赤白用桑蝎燒灰温酒服方寸匕日二○千金方

血露不絕　鋸截桑根取屑五指撮以醇酒服之日三服○肘后方

婦人漏血　不止槐花燒存性研每服二三錢食前温酒下○聖惠方

下血血崩　槐花一兩櫻灰五錢鹽一錢水三鍾煎減半服○摘玄方

血崩不止　漆器灰櫻灰各一錢栢葉煎湯下○集簡方

崩中漏下　五色使人無子蜂房末三指撮温酒服之大神效○張文仲方

崩中腹痛　毛蟹殼燒存性米飲服一錢○證治要訣

崩中下血　不止用白僵蠶衣中白魚等分爲末井華水服之日二○千金

婦人血崩　鼈沙爲末酒服三五錢○儒門事親

婦人血崩　鯽魚一個長五寸者去腸入血竭乳香在內綿包燒存性研末每服三錢熱酒調下○葉氏

摘玄方

婦人漏下　甕權曰鼈甲酷炙研末清酒服方寸匕日二○又用乾姜鼈甲訶黎勒皮等分爲末糊丸空心下三十丸日再

崩中不止　蠶故紙一張剪碎炒焦槐子炒黃各等分爲末酒服立愈○衛生易簡方

赤白崩中　魚縱膠三尺焙黃研末同雞子煎餅好酒食之

血崩不止　頃曰用五靈脂十兩研末水五盆煎三盆去滓澄清再煎爲膏入神麴末二兩和丸梧子大每服二十丸空心溫酒下便止極效○集要用五靈脂燒研以鐵秤錘燒紅淬酒調服以效爲度

婦人血崩　蠶黃散治下血淋瀝疼痛用蠶黃臙脫紙並燒存性晚蠶沙白僵蠶並炒等分爲末入麝香少許每服二錢用米飲送下日三服甚效○聖惠方

崩中垂死　肥羊肉三斤水二斗煮一斗三升入生地黃一升乾薑當歸各三兩煮三升分四服

○千金

婦人血崩　老母豬屎燒灰酒服三錢○李樓方

赤白崩中　豬毛燒灰三錢以黑豆一椀好酒一碗煎一碗調服

女人漏血　亂髮洗淨燒研空心溫酒服一錢○婦人良方

赤白崩漏　氈燒灰酒服二錢白崩用白氈紅崩用紅氈○海上

婦人血氣　卒下血不止清酒和豬血炒食之○思邈主治

崩中漏下　常炙猪腎食之○張文仲方

本草類方卷之九

胎前第一百四

胎前産後　逆生横生瘦胎産前産後虚損月候不調崩中百草霜白芷等分爲末每服二錢童子小便醋各少許調勻熱湯化服不過二服。杜壬方

胎動下血　或胎已死百草霜二錢櫻灰一錢伏龍肝五錢爲末每服一二錢白湯入酒及童尿調下。筆峯雜興方

婦人胎動　十月未足欲産梁上塵竈突墨等分酒服方寸匕。千金方

妊娠腰痛　如折者銀一兩水三升煎二升服之。子母秘錄

胎動欲墮　痛不可忍銀五兩芎根二兩清酒一盞水一大盞煎一盞温服。婦人良方

胎熱橫悶 生銀五兩葱白三寸阿膠炒半兩水一盞煎服亦可入糯米作粥食○聖惠方

妊娠欬嗽 車缸一枚燒赤投酒中冷飲○聖惠方

妊娠心痛 不可忍鹽燒赤酒服一撮○產寶

妊婦胎動 朱砂末一錢鷄子白三枚攪勻頓服胎死卽出未出卽安○普濟方

妊娠下痢 疼痛用烏鷄卵一箇開孔去白留黃入鉛丹五錢攪勻泥裹煨乾研末每服二錢米飲下一服愈是男二服愈是女○三因方

妊婦胎動 母欲死子尚在以此下之水銀朱砂各半兩研膏以牛膝半兩水五大盞煎汁入蜜調服半匙

○聖惠方

轉女爲男 婦人覺有妊以雄黃一兩絳囊盛之養胎轉女成男取陽精之全于地産也○千金

方

妊娠子淋 不得小便滑石末水和泥臍下二寸○外臺秘要

妊娠患淋 冬葵子一升水三升煮二升分服○千金方

妊娠尿難 飲食如故用貝母苦參當歸四兩爲末蜜丸小豆大每飲服三丸至十丸○金匱要略

胎動不安 泰艽甘草炙鹿角膠炒半兩爲末每服三錢水一大盞糯米五十粒煎服○又方泰艽阿膠炒艾葉等分如上煎服○聖惠方

因驚胎動 出血取黃連末酒服方寸七日三服○子母秘錄

安胎清熱 條芩白朮等分炒爲末米飲和丸梧子大每服五十丸白湯下或加神麴丸妊娠調

理以四物去地黃加白朮黃芩爲末常服甚良○丹溪纂要

妊娠浮腫羌活蘿蔔子同炒香只取羌活爲末每服二錢温酒調下一日一服二日二服三日三服乃嘉興主簿張昌明所傳○許學士本事方

妊娠子煩因服藥致胎氣不安頻不得卧者知母一兩洗焙爲末棗肉丸彈子大每服一丸人參湯下醫者不識此病作虛煩治反損胎氣産科鄭宗文得此方於陳藏器本草拾遺中用之良驗○楊歸厚産乳集驗方

妊娠腰痛大豆一升酒三升煮七合空心飲之○心鏡

妊娠腹痛月未足如欲産之狀用知母二兩爲末蜜丸梧子大每粥飲下二十丸○陳延之小品方

妊娠子煩口乾不得卧不得黃連末每服一錢粥飲下或酒蒸黃連丸亦妙○婦人良方

胎動不安腹痛下黃汁黃耆川芎蒲各一兩糯米一合水一升煎半升分服○婦人良方

安胎順氣鐵罐散香附子炒爲末濃煎紫蘇湯服一二錢一加砂仁○中藏經

臨産順胎九月十月服此永無驚恐福胎飲用香附子四兩縮砂仁炒三兩甘草炙一兩爲末每服二錢米飲下

○朱氏集驗方

妊娠惡阻胎氣不安氣不升降嘔吐酸水起坐不便飲食不進二香散用香附子二兩藿香葉甘草各二錢爲末每服二錢沸湯入鹽調下○聖惠方

妊娠中惡心腹痰痛桔梗一兩剉薑三片煎六分温服○聖惠方

子痛昏冒縮砂和皮炒黑熟酒調下二錢不飲者米飲下此方安胎止痛皆效不可盡述○温

妊娠胎動　偶因所觸或跌墜傷損致胎不安痛不可忍者縮砂熨斗內炒熟去皮用仁擣碎每服二錢熱酒調下須臾覺腹中胎動極熱即胎已安矣神效。孫尚藥方

妊娠熱病　葛根汁二升分三服。傷寒類要

孕婦熱淋　車前子五兩葵根切一升以水五升煎取一升半分三服以利爲度。梅師方

妊娠水腫　小便不利惡寒赤茯苓去皮葵子各半兩爲末每服二錢新汲水下。禹講師方

妊娠腰痛　通氣散用破故紙二兩炒香爲末先嚼胡桃肉半箇空心温酒調下二錢此藥神妙。婦人良方

妊娠吐水　酸心腹痛不能飲食人參乾姜炮等分爲末用生地黃汁和丸梧子大每服五十丸

米湯下。和劑局方

損動胎氣　因跌撲舉重損胎不安或子死腹中者芎藭爲末酒服方寸匕須臾一二服立出。千金方

胎前産後　烏金散治胎前産後虛損月經不調崩漏及橫生逆産用白芷百草霜等分爲末以沸湯入童子小便同醋調服二錢丹溪加滑石以苧歸湯調之。普濟方

半産漏下　虛寒相搏其脉弦芤旋覆花湯用旋覆花三兩葱十四莖新絳少許水三升煮一升頓服。金匱要畧

妊娠患淋　熱痛酸楚手足煩疼地膚子十二兩水四升煎二升半分服。子母秘錄

妊娠下血　冬葵子一升水三升煮二升分服。千金方

妊娠尿血豆醬一大盞熬乾生地黃二兩爲末每服一錢米飲下○普濟方

妊娠水腫身重小便不利洒淅惡寒起卽頭眩用葵子茯苓各三兩爲糝飲服方寸匕日三服

小便利則愈若轉胞者加髮灰神效○金匱要畧

胎動不安木賊去節川芎等分爲末每服三錢水一盞入金銀一錢煎服○聖濟總錄

熱病胎死紅花酒煮汁飲二三盞○熊氏補遺

妊娠胎動兩三月墮預宜服此以續斷酒浸杜仲薑汁炒去絲各二兩爲末棗肉煮爛杵和丸梧子大每服三十丸米飲下

妊娠胎痛妊婦衝任脈虛惟宜抑陽助陰內補丸用熟地黃二兩當歸一兩微炒爲末梧子大温酒下三十丸○許學士本事方

妊娠風寒卒中不省人事狀如中風用熟艾三兩米醋炒極熱以絹包熨臍下良久卽甦○婦人良方

妊娠漏胎下血不止百一方用生地黃汁一升漬酒四合煮三五沸服之不止又服○崔氏方

用生地黃爲末酒服方寸匕日一夜一○經心錄加乾薑爲末○保命集二黃丸用生地黃熟地黃等分爲末每服半兩白朮枳殼煎湯空心調下日二服

胎動迫心作痛艾葉雞子大以頭醋四升煎二升分温服○子母秘錄

妊娠胎動或腰痛或搶心或下血不止或倒産子死腹中艾葉一雞子大酒四升煮二升分二服○肘後方

妊娠胎動忽下黃汁如膠或如小豆汁腹痛不可忍者芎根去黑皮切二升銀一斤水九升煮

国立国会図書館　タイトル『本草類方10巻』　請求記号 特1-2509　ガラス使用

四升每服以水一升入酒半升煎一升分作二服一方不用銀○梅師方

妊娠吐衄　不止馬勃末濃米飲服半錢○聖惠方

妊娠下血　張仲景曰婦人有漏下者有半産後下血不絕者有妊娠下血者並宜膠艾湯主之阿膠二兩艾葉三兩芎藭甘草各二兩當歸地黃各三兩芍藥四兩水五升清酒五升煮取三升乃納膠令消盡每温酒一升日三服○金匱要畧

鬼胎癥瘕　經候不通芫花根三兩剉炒黃爲末每服一錢桃仁煎湯調下當利惡物而愈○聖惠方

妊娠胎動　生地黃搗汁煎沸入鷄子白一枚攪服○聖惠方

孕中有癰　薏苡仁煮汁吞頻頻飲之○婦人良方補遺

妊娠尿難　飲食如故用貝母苦參當歸四兩爲末蜜丸小豆大每飲服三丸至十丸○金匱要畧

妊娠腫滿　氣急少腹滿大小便不利已服猪苓散不瘥者用太山赤皮甘遂二兩搗篩白蜜和丸梧子大每服五十丸得微下仍服猪苓散不下再服之猪苓散即五苓散○小品方

妊娠動胎　豉汁服妙華佗方也○子母秘錄方

病欲去胎　苦實把豆兒即番木鱉也研膏納入牝戶三四寸○集簡方

妊娠下血　豆醬二升去汁取豆炒研酒服方寸匕日三○古今錄驗

妊娠水腫　始自兩足漸至喘悶似水足趾出水謂之子氣乃婦人素有風氣或衝任有血風不

可作水妄投湯藥宜天仙藤洗微炒香附子炒陳皮甘草烏藥等分爲末每服三錢水一大盞姜三片木瓜三片紫蘇三葉煎至七分空心服一日三服小便利氣胍通腫漸消不須多服此乃淮南名醫陳景初祕方也得于李伯時家。

陳自明婦人良方

妊娠下血不止用桃枭燒存性研水服取瘥。葛洪方

妊娠遺尿不禁桑螵蛸十二枚爲末分二服米飲下。産乳書

胎動下血病痛搶心用葱白煮濃汁飲之未死即安已死即出未效再服一方加川芎一方用銀器同米煮粥及羹食。深師方

妊娠去胎外臺治妊娠欲去胎麥蘗一升窑一升服之即下。小品用大麥芽一升水三升煮二升分三服神效

胎熱不安鐵罩散用白藥子一兩白芷半兩爲末每服二錢紫蘇湯下心煩熱入砂糖少許。聖惠方

頻致墮胎赤小豆末酒服方寸匕日三服。千金

六月孕動困篤難救者葱白一大握水三升。煎一升去滓頓服。楊氏産乳

妊婦腹痛燒車缸脂末納酒中隨意飲。千金方

胎動不安下黃水用糯米一合黃芪苓蒴各五錢水一升煎八合分服。産寶

妊娠胎動腹內冷痛薤白一升當歸四兩水五升煮二升分三服。古今錄驗

胎上衝心葡萄煎湯飲之即下。聖惠方

胎動牢産卒動不安或腰痛胎轉搶心下血不止或胎動牢産日月未足而欲産並以菖蒲根搗汁一二升服之○千金

妊娠下水黃色如膠或如小豆汁秫米黃芪各一兩水七升煎三升分三服○梅師

胎損腹痛冬葵子一升杵碎熬香水二升煮汁分服○心鏡

去生胎蜥蜴肝蛇蛻皮等分以苦酒和勻摩妊婦臍上及左右令温胎即下也○聖惠

胎動腹痛急下黃汁用粳米五升黃芪六兩水七升煎二升分四服○聖惠方

妊娠心痛煩悶麻子仁一合研水二盞煎六分去滓服○聖惠

胎動欲産日月未足者蒲黃二錢井華水服○集一方

妊娠溺澁蕪菁子末水服方寸七日二服○子母秘錄

頻慣墮胎或三四月即墮者於兩月前以杜仲八兩糯米煎湯浸透炒去絲續斷二兩酒浸焙乾爲末以山藥五兩爲末作糊丸梧子大每服五十丸空心米飲下肘後方用杜仲焙研棗肉爲丸糯米飲下○楊起簡便方

胎動不安或上搶心下血者生麴餅研末水和絞汁服三升○肘后

妊娠下痢白色晝夜三五十行黃蘗厚者蜜炒令焦爲末大蒜煨熟去皮搗爛和丸梧子大每空心米飲下三五十丸日三服神妙不可述○婦人良方

妊娠腹痛大紅棗十四枚燒焦爲末以小便服之○梅師

孕中有癰膿洪州烏藥軟白香辣者五錢水一盞牛皮膠一片同煎至七分温服乃驗彦德方也○婦人良方

国立国会図書館　タイトル『本草類方10巻』　請求記号 特1-2509　ガラス使用

妊娠胎動已見黃水者乾荷蒂一枚炙研爲末米淘汁一鍾調服卽安○唐氏經驗方

妊娠腫渴從脚至腹小便不利微渴用豬苓五兩爲末熟水服方寸七日三服○子母秘錄

妊婦熱病車轄脂隨意酒服大良○千金方

胎動腹痛桑寄生一兩半阿膠炒半兩艾葉半兩水一盞半煎一盞去滓温服或去艾葉○聖惠方

懷胎腹痛枳殼三兩麩炒黃芩一兩每服五錢水一盞半煎一盞服若脹滿身重加白朮一兩○活法機要

妊娠子淋豬苓五兩爲末熟水服方寸匕日三夜二以通爲度○小品方

病篤去胎蚤蟲十枚炙搗爲末酒服胎卽下○産乳

孕婦子煩竹瀝頻頻飲之○梅師方茯苓二兩竹瀝一升水四升煎二升分三服不瘥更作之

婦人胎腫屬濕熱山卮子一合炒研每服二三錢米飲下丸服亦可○丹溪方

孕婦漏胎五倍子末酒服二錢神效○朱氏集驗方

婦人損胎孕八九月或墜傷牛馬驚傷心痛用青竹茹五兩酒一升煎五合服○子母秘錄

胎氣不長用鯉魚肉同鹽棗煮汁飲之○集驗

婦人胎動妊娠因夫所動困絕以竹瀝飲一升立愈○産寶

妊娠胎漏黃蠟一兩老酒一椀溶化熱服頃刻卽止

妊娠感寒時行者用大鯽一頭燒灰酒服方寸匕無汗腹中緩痛者以醋服取汗○産乳

下胎蟹爪散治妊婦有病欲去胎用蟹爪二合桂心瞿麥各一兩牛膝二兩爲末空心温酒服一

錢。千金

妊娠感寒腹痛 乾魚一枚燒灰酒服方寸七取汗瘥。子母秘錄

胎動不安 及婦人數傷胎下血不止鯉魚一箇治淨阿膠炒一兩糯米二合水二升入葱姜橘皮塩各少許煮臞食五七日效。聖惠方

胎痛欲産 日月未足者以全蛇蛻一條絹袋盛遶腰繫之。千金方

胎産下痢 用龜甲一枚醋炙爲末水飲服一錢日一。經驗方

妊娠感寒 用鯉魚一頭燒末酒服方寸七令汗出。秘錄

妊娠下血 黄明膠二兩酒煮化頓服之。肘後方

胎動上逼 弩弦繫帶之立下。醫林集要

妊娠胎死 不出及胎衣不下産後諸疾狼狽者刺羊血熱飲一小盞極效。聖惠方

妊娠下痢 絞痛用烏鷄子一枚開孔去白留黄入黄丹一錢在內厚紙裹定泥固煨乾爲末每服三錢米飲下一服愈者是男兩服愈者是女。三因方

妊娠下血 不止阿膠三兩炙爲末酒一升半煎化服即愈。又方用阿膠末二兩生地黄半斤搗汁入清酒二升分三服。梅師方

妊娠胎動 刪繁用阿膠炙研二兩香豉一升葱一升水三升煮取一升入膠化服。産寶經艾葉二兩葱白一升水四升煮取一升分服

湯用阿膠炒熟艾葉二兩葱

妊娠腰痛 牛屎燒末水服方寸七日三。外臺

妊娠腰痛 鹿角尖五寸長燒赤投二寸酒中又燒又浸如此數次細研空心酒服方寸七。産

妊娠毒痛 犛牛屎燒灰水服方寸匕日三并以酢和封○千金方

胎動下血 藏器白鷄子二枚打破以白粉和稀食之

妊娠下血 不止鹿角屑當歸各半兩水三盞煎減半頓服不過二服○普濟方

病欲去胎 鷄子一枚入鹽三指撮服○張文仲方

妊娠尿血 阿膠炒黃爲末食前粥飲下二錢○聖惠

胎前瘧疾 夜明砂末三錢空心温酒服○經驗方

妊娠熱病 青羊屎研爛塗臍以安胎氣○外臺秘要

妊娠血痢 阿膠二兩酒一升半煮一升頓服

傷胎血結 心腹痛取童子小便日服二升良○楊氏産乳

妊婦尿血 取夫指甲燒灰酒服○千金方

胎産便血 髮灰每飲服二錢○咎殷産寶

妊娠胎滿 血下不止血盡則子死用鷄子黃十四枚以好酒二升煮如飴服之未瘥再作以瘥爲度○普濟方

妊娠下痢 中衣帶三寸燒研水服○千金

温養胎氣 胎至九月消息用豬肚一枚如常着五味煮食至盡○千金髓

轉女爲男 婦人始覺有胎用原蠶屎一枚井水服之日三○千金方

妊娠行經 赤小豆末酒服方寸匕日三服○千金方

妊娠傷寒 赤斑變爲黑斑尿血者以葱白一把水三升煮熟服汁食葱令盡取汗○傷寒類要

妊娠熱病 伏龍肝末一雞子許水調之仍以水和塗臍方寸乾又上○傷寒類要

孕婦傷寒 大熱煩渴恐傷胎氣用嫩卷荷葉焙半兩蚌粉二錢半爲末每服三錢新汲水入蜜調服并塗腹上名罩胎散○鄭氏方

妊娠傷寒 壯熱赤斑變爲黑斑溺血用艾葉如鷄子大酒三升煮二升半分爲二服○傷寒類要

妊娠時疾 冷胎不動以鷄子七枚納井中令冷取出打破吞之○子母秘錄

妊娠下痢 羊脂如棊子大十枚温酒一升服日三○千金

妊婦瘧疾 先因傷寒變成者用高良姜三錢剉以豬胆汁浸一夜東壁土炒黑去土以肥棗十五枚同焙爲末每用三錢水一盞煎熱將發時服神妙○永類鈐方

妊娠水腫 范汪用大鯉魚一頭醋三升煮乾食一日一作○外臺用大鯉一尾赤小豆一升水二斗煮食飲汁一頓服盡當下利盡瘥

胎氣不安 氣不升降嘔吐酸水者香附霍香甘草二錢爲末每服二錢入塩少許沸湯調服之○聖惠

妊娠胎動 神效佛手散治婦人妊娠傷動或子死腹中血下疼痛口噤欲死服此探之不損則痛止已損便立下此乃徐玉神驗方也當歸二兩芎藭一兩爲粗末每服三錢水一盞煎令泣泣欲乾投酒一盞再煎一沸温服或灌之如人行五里再服不過三五服便效○張文仲備急方

胎動欲産　日月未足者取槐樹東引枝令孕婦手把之即易生○子母秘錄

孕婦欬嗽　貝母去心麪炒黃爲末沙糖拌丸芡子大含嚥一丸神效○救急易方

臨月易産　榆皮焙爲末臨月日三服方寸七令産極易○陳承本草別說

臨産下痢　梔子燒研空心熱酒服一匙甚者不過五服○勝金方

生胎欲去　牛膝一握搗以無灰酒一盞煎七分空心服仍以獨根土牛膝塗竈香插入牝戶中○婦人良方

妊娠瘧疾　酒蒸常山石膏煅各一錢烏梅炒五分甘草四分水一盞酒一盞浸一夜平旦温服○姚僧坦集驗方

婦人將産　井華水服半升不作運○千金方

滑胎易産　酸漿水和水少許頓服○産寶

盤腸生産　腸乾不上者以磨刀水少潤腸煎好磁石一盃温服自然收上乃扁鵲方也

女人難産　土蜂兒窠水泡湯飲之取時逢單是男雙是女最驗○婦人良方

胎衣不下　井底泥一雞子大井華水服即下○集玄方

子死腹中　母氣欲絕伏龍肝末三錢水調下○十全博救方

胞衣不下　竈下土一寸醋調納臍中續服甘草湯三四合○産寶

橫生逆産竈中心對鍋底土細研每服一錢酒調仍搽母臍中○救急方

婦人逆産眞丹塗兒足下○集驗方

胞衣不下竈突後黑土三指撮五更酒下○陳藏器

胞衣不出痛引腰脊好墨温酒服二錢○肘後方

胎死腹中新汲水磨金墨服之○普濟方

婦人難産墨一寸末之水服立瘥○肘後方

産血不下鍋底墨煙熱酒服二錢○生生編

婦人逆産以手中指取釜下墨交畫兒足下即順○千金方

橫生逆産梁上塵酒服方寸七○子母秘錄

倒産子死不出當歸末酒服方寸匕○子母秘錄

婦人難産經曰不生雲母粉半兩温酒調服入口即産不順者即順萬不失一陸氏云此是何德楊方也已救三五十人○積德堂方

子死腹中不出硃砂一兩水煮熟末酒服立出○十全博救方

婦人難産水銀二兩先煮後服立出○梅師方

胎死腹中其母欲死水銀二兩吞之立出○梅師方

婦人難産芒硝末二錢童子小便温服無不效者○信效方

死胎不下硇砂當歸各半兩爲末分作二服温酒調下如人行五里再一服○瑞竹堂方

妊婦逆生鹽摩産婦腹并塗兒足底仍急爪搔之○千金方

国立国会図書館　タイトル『本草類方10巻』　請求記号　特1-2509　ガラス使用

子死腹中 或産經數日不下以瞿麥煮濃汁服之。千金方

橫生倒産 人參末乳香末各一錢丹砂末五分研勻雞子白一枚入生姜自然汁三匙攪勻冷服即母子俱安神效此施漢卿方也。婦人良方

産難胎死 橫生倒生用當歸三兩芎藭一兩爲末先以大黑豆炒焦入流水一盞童便一盞煎至一盞分爲二服末效再服。婦人良方

婦人難産 白芷五錢水酒服之。唐瑤經驗方

橫生倒産 葵花爲末酒服方寸匕。千金方

胎死不下 黃葵花焙研末熟湯調服二錢無花用子半合研末酒淘去滓用紅花酒下。産寶

橫産不出 車前子末酒服二錢。子母秘錄

難産催生 邵聖散治胎臟乾澁難産劇者併進三服良久腹中氣寬胎滑即下也用黃葵花焙研末熱湯調服二錢無花用子半合研末酒淘去滓服之。産寶

生産困悶 冬葵子一合搗破水二升煎汁半升頓服少時便産昔有人如此服之登厠立撲兒于厠中也

胞衣不下 冬葵子一合牛膝一兩水二升煎一升服。千金方

胞衣不下 冬葵子炒黃爲末酒服二錢七效。普濟産寶

胎死腹中 葵子爲末酒服方寸匕若口噤不開者灌之藥下即甦。千金方

胞衣不下 眞珠一兩研末苦酒服。千金

女人難産 益母草搗汁七大合煎減半頓服立止無新者以乾者一大握水七合煎服。韋宙

獨行方

胎死腹中 益母草搗熟以暖水少許和絞取汁頓服之○韋宙獨行方

婦人逆産 車缸膏畫兒脚底即止○開寶本草

不下再服

催生下衣 難産胎在腹中并胞衣不下及胎死者蒺藜子貝母各四兩爲末米湯服三錢少頃

○梅師方

胞衣不下 牛膝八兩葵子一合水九升煎三升分三服○延年方

子死腹中 眞珠末二兩酒服立出○外臺

胞衣不出 生地黃汁一升苦酒三合相和暖服○必效方

胎死腹中 及衣不下者取炊甑戶前燒末水服即下○千金方咳即故髑髏也

産難催生 鳳仙子二錢研末水服勿近牙外以蓖麻子隨年數搗塗足心○集簡便

胎滑易産 弓弩弦燒末酒服二錢○續十全方

子死腹中 胞破不生此方累效救人歲萬數也鬼臼只撚之如粉爲度每服一錢無灰酒一盞不拘多少黃色者去毛爲細末不用篩羅同煎八分通口服立生如神名一字神散○婦人良方

催生去胎 芫花根剝皮以綿裹點麝香少許套入陰穴三寸即下○攝生妙用方

産難 魚膠五寸燒存性爲末溫酒服○皆效方

催生下胎 不拘生胎死胎蓖麻二個巴豆二個麝香一分研貼臍中并足心○又下生胎蓖麻一月一粒溫酒吞下○集簡良方

婦人難產 蛇蛻泡水浴產門自易○寶鑑

催生下胞 崔元亮海上集驗方取蓖麻子七粒去殼研膏塗脚心若胎及衣下便速洗去不爾則子腸出即以此膏塗頂則腸自入也○肘後方云產難取蓖麻子十四枚每手各把七枚須臾立下也

盤腸生產 產時子腸先出產後不收者名盤腸產以半夏末頻嗑鼻中則上○婦人良方

胎孕不下 白斂生半夏等分爲末滴水丸如梧子大每揄皮湯下五十丸○保命集

婦人橫生 兎絲子末酒服二錢一加車前子等分○聖惠方

胞衣不下 腹滿則殺人以水入醋少許嗅面神效○聖惠方

胞衣不下 栝樓實一箇取子細研以酒與童子小便各半盞煎七分温服無實用根亦可○陳良甫婦人良方

死胎不下 苦壺盧燒存性研末每服一錢空心熱酒下○海上名方

胎死腹中 清油和蜜等分入湯頓服○普濟方

婦人難產 數日不出桃仁一箇劈開一片書可字一片書出字吞之即生○刪繁方

胞衣不下 蒲黃二錢井水服之○集驗方

胎死腹中 上搶心用雀麥一把水五升煮二升温服○子母秘錄方

胞衣不下 上搶心用雀麥一把水五升煮二升温服○子母秘錄方

婦人難產 皂莢子二枚去皮之○千金方

胞衣不下 用赤小豆男七枚女二七枚東流水吞服之○救急方

婦人難產　乃兒枕破與敗血裹其子也以勝金散逐了燒赤乳細入麝香一錢爲末取秤錘燒紅淬酒調服一大盞○郭稽中方

婦人難產　產寶用赤小豆生吞七枚佳○集驗治難產日久氣乏用赤小豆一升以水九升煮取汁入炙過黃明膠一兩同煎少時一服五合不過三四服卽產

死胎不下　紫金藤葵根各七錢土牛膝三兩生當歸四錢肉桂二錢麝香三分爲末米糊丸梧子大硃砂爲衣每服五十丸乳香湯下極驗○葛靜觀方

子死腹中　月數未足母欲悶絕者用大豆三升以醋煮濃汁頓服立出○產乳

難產　山樝核七七粒百草霜爲衣酒吞下○海上方

橫生難產　重陽日取高粱根名瓜龍陰乾燒存性研末酒服二錢卽下

難產　柑橘瓤陰乾燒存性研末溫酒服二錢○集效

胎衣不下　荷葉炒香爲末每服方寸匕沸湯或童子小便調下或燒灰或煎汁皆可○救急方

難產催生　簡要濟衆方用黃明乳香五錢爲末母豬血和丸梧子大每酒服五丸○經驗方用乳香以五月五日午時令一人在壁內捧乳鉢一童子在壁外以筆管自壁縫中逐粒遞過用鉢內研細水丸芡子大每服一丸無灰酒下○聖惠方用明乳香一豆大爲末新汲水一盞入醋少許令產婦兩手捉石燕念慮藥三遍乃飲之畧行數步卽下○海上方用乳香硃砂等分爲末麝香酒服一錢良久自下

婦人產難　母丁香三十六粒滴乳香三錢六分爲末同活兔腦和杵千下丸作三十六丸每服一丸好酒化下立驗名如意丹○顧眞堂經驗方

国立国会図書館　タイトル『本草類方10巻』　請求記号 特1-2509　ガラス使用

死胎不下 桂末二錢待痛緊時童子小便温熱調下名觀音救生散亦治産難横生加麝香少許酒下比之水銀等藥不損人○何氏方

婦人難産 眞珠末一兩酒服立出○千金

難産催生 蓮花一葉書人字吞之即易産○肘後方

胎死不下 月未足者大豆煮醋服三升立便分解未下再服○子母秘錄

妊娠胎死 斑蝥一枚燒研水服

婦人難産 催生柞木飲不拘横生倒産胎死腹中用此屢效乃上蔡張不愚方也用大柞木枝一尺洗淨大木草五寸並寸折以新汲水三升半同入新砂缾内以紙三重緊封文武火煎至一升半待腰腹重痛欲坐草時温飲一小盞便覺下開豁如渴又飲一盞至三四盞下重便生更無諸苦切不可坐草太早及坐婆亂爲也○昝殷産寶

婦人難産 路傍破草鞋鼻子燒灰酒服○集玄方

婦人難産 外臺秘要用箭簳三寸弓弦三寸燒末酒服方出崔氏○小品方治難産飛生丸用飛生一枚槐子故弩箭羽各十四枚合搗丸梧子大以酒服二丸攷飛生即鼯鼠也

婦人難産 鍾馗左脚燒灰水服○楊起簡便方

胎衣不下 取本婦鞋底炙熱熨腹上下二七次即下○集玄方

胎衣不下 皂莢刺燒爲末每服一錢温酒調下○熊氏補遺

胞衣不下 以本婦裩覆非上或以所着衣籠炷上○千金方

胎死腹中 或母病欲下胎榆白皮煮汁服二升○子母秘錄

国立国会図書館　タイトル『本草類方10巻』　請求記号 特1-2509　ガラス使用

產婦催生 路旁破草鞋一隻洗淨燒灰酒服二錢如得左足生男右足生女覆者兒死側者有驚自然之理也○胎產方

子死腹中 取本婦鞋底炙熱熨腹上下二七次即下○集玄方

胞衣不下 水煮弓弩弦飲汁五合或燒灰酒服○千金方

橐籮襲不 千金用蛇蛻炒焦爲末向東酒服一刀圭即順○十全博救方用塩泥固煆研二錢榆白湯服○濟生秘覽治逆生須臾不救用蛇蛻一具蟬蛻十四箇頭髮一握並燒存性分二服酒下仍以小針刺兒足心三七下擦鹽少許即生

千金神造湯 治子死腹中并雙胎一死一生服之令死者出生者安神驗方也用蟹爪一升甘草二尺東流水一斗以葦薪煮至二升濾去滓入眞阿膠三兩令烊頓服或分二服若人困不能服者灌入即活

婦人難產 蠶布袋一張蛇蛻一條入新瓦中以鹽泥固煆爲末以榆白皮湯調服○集成

難產催生 秘錄用龜甲燒末酒服方寸匕○摘玄治產三五日不下垂死及矮小女子交骨不開者用乾龜殼一箇酥炙婦人頭髮一握燒灰川芎當歸各一兩每服秤七錢水煎服如人行五里許再一服生胞死胎俱下

婦人難產 二日不出車軸脂吞大豆許二丸○千金方

難產橫生 蜂蜜眞麻油各半碗煎減半服立下○海上方

婦人難產 鱉甲燒存性研末酒服方寸匕立出○梅師

催生丹 臘月取兔腦髓一箇塗紙上吹乾入通明乳香末二兩同研令勻於臘日前夜安桌

子上露星月下設茶果齋戒焚香望北拜告曰大道弟子某修合救世上難生婦人藥願降威靈佑助此藥速令生產禱畢以紙包藥露一夜天未明時以猪肉搗和丸芡子大紙袋盛懸透風處每服一丸温醋湯下良久未下更用冷酒下一丸即産乃

催生丹 治産難臍月兎血以蒸餅染之紙裹陰乾爲末每服二錢乳香湯下○指迷方

催生易産 續千金方麝香一錢水研服立下○濟生勝金散治人弱難産麝香一錢塩豉一兩以舊青布裹之燒紅爲末以秤錘淬酒服二錢即下郭稽中云婦人産難及横逆生者乃兒枕破而敗血勝金散逐其敗血自生也裹子服

子死腹中 濕牛糞塗腹上良○産寶

催生散 用臍月兎腦髓一箇攤紙上夾勻陰乾剪作符子于面上書生字一箇倏母痛極時用釵股夾定燈上燒灰煎丁香酒調下○博濟方

胎死腹中 鹿角屑三寸匕煮葱豉湯和服立出○百一方

難産催生 勝金方聖妙寸金散用敗筆頭一枚燒灰研生藕汁一盞調下立産若母虚弱及素有冷疾者温汁服之○陸氏治難産第一方用兎毫筆頭三個燒灰金箔三片以蠟和丸酒服

墮胎腹痛 血出不止羚羊角燒灰三錢豆淋酒下○普濟

臨産催生 羚羊角一枚刮尖末酒服方寸匕○産寶

胞衣不下 豬脂一兩水一盞煎五七沸服之當下○聖惠方

子死腹中　雌雞糞二十一枚水二升五合煑之下米作粥食○產寶

胞衣不下　鹿角屑三分爲末姜湯調下○產乳

子死腹中　用三家雞卵各一枚三家鹽各一撮三家水各一升同煮令婦東向飲之○千金方

婦人催生　開骨膏用豬心血和乳香末丸梧子大硃砂爲衣面東酒吞一丸未下再服○婦人良方

子死腹中　雄鼠屎二七枚水三升煮一升取汁作粥食胎即下

死胎不下　烏雞一隻去毛以水三升煮二升去雞用帛蘸汁摩臍上自出○婦人良方

胎衣不下　亂頭髮撩結口中○孫眞人方

胎衣不下　惡血冲心用五靈脂半生半炒研末每服二錢温酒下○產寶

子死腹中　以夫尿二升煮沸飲之○千金方

婦人難產　牛屎中大豆一枚擘作兩片一書父一書子仍合住水吞之立產○皆殷產寶

死胎不下　麝香當門子一枚桂心末二錢温酒服即下○本事方

子死腹中　鷄子黃一枚姜汁一合和服當下

胞衣不下　取本婦手足爪甲燒灰酒服即令有力婦人抱起將竹筒子胸前趕下○聖惠

催生下胞　人溺一升入葱姜各一分煎二三沸熱飲便下○日華子本草

令子易產　取鼠燒末井花水服方寸匕日三○子母秘錄

胎衣不下　紅花酒煮汁飲二三盃○楊氏產乳

婦人產難　襍草燒鑊鏽白芷等分爲末每服一錢童便米醋各半和服見效○救急方

国立国会図書館　タイトル『本草類方10巻』　請求記号 特1-2509　ガラス使用

滑胎易産 車前子爲末酒服方寸匕不飲酒者水調服詩云采采芣苢能令婦人樂有子也陸機注云治婦人産難故也○婦人良方

孕婦束胎 白朮枳殻麩炒等分爲末燒飯丸梧子大一月一日每食前温水下二十丸胎瘦則易産也○保命方

催生 簸箕淋水一盞飲數口○集玄方

産婦催生 蒲黄地龍洗焙陳橘皮等分爲末另收臨時各炒一錢新汲水調服立産此常親用甚妙○唐愼微方

臨月滑胎 牽牛子一兩赤土少許研末覺胎轉痛時白榆皮煎湯下一錢○王袞博濟方

胞衣不下 困極腹脹則殺人螻蛄一枚水煮二十沸灌入下喉即出也○延年方

漏胎難産 因血乾澁也用清油半兩好蜜一兩同煎數十沸温服胎滿即下他藥無益以此助血爲效○胎産須知

本草類方卷之九

産後第一百六

産後血暈心悶氣絕以丈夫小便研濃墨一升服○子母秘錄

産後吹奶陳皮一兩甘草一錢水煎服即散

産後陰脫鐵爐中紫塵羊脂二味和勻布裹炙熱熨推納上○徐氏胎産方

産後陰腫桃仁燒研傳之

産後癲狂敗血及邪氣入心如見祟物癲狂大辰砂一二錢研細飛過用飲兒乳汁三四茶匙調濕以紫項地龍一條入藥滾三滾刮淨去地龍不用入無灰酒一盞分作三四次服○何氏方

産後下血 紫菀末水服五撮。聖惠方

産後吞出 不收丹砂傳之暗擲地聲驚之卽自收。集簡方

乳汁不通 氣少血衰脉濇不行故孔少也鍊成鍾乳粉二錢濃煎瀉蘆湯調下或與通草等分爲末米飲服方寸匕日三次。外臺秘要

乳汁不下 石膏三兩水二升煮三沸三日飲盡妙。子母秘錄

産後血痛 白鷄冠花酒煎服之。李樓奇方

産後兒枕 刺痛黑白散用烏金石燒酒淬七次寒水石煆爲末等分每用粥飲服一錢半卽止

産後血渴 不煩者新石灰一兩黃丹半錢渴時漿水調服一錢名桃花散。張潔古活法機要

産後煩躁 禹餘粮一枚狀如酸饅者入地埋一半紮築炭灰一斤煆之濕土裹一宿打破去外面石取裏面細者研萬遍用甘草湯服二錢一服立效。經驗方

子宮不收 名瘕疾痛不可忍慈石丸用慈石研末米糊丸梧子大每卧時滑石湯下四十丸次早用慈石散米湯服二錢散用慈石酒浸半兩鐵粉二錢半當歸五錢爲末

産婦尿秘 鼠婦七枚熬研末酒服。千金

産後脹衝 氣噎磋礪石代赭石等分爲末醋糊丸梧子大每服三五十丸醋湯下。潔古保命集

産後不語 明氏孤鳳散用生白礬末一錢熟水調下日一。婦人良方

産後血運 心氣欲絶益母草研汁服一盞絶妙。子母秘錄

産後惡血 不盡或經月半年以升麻三兩清酒五升煮取二升半分再服當吐下惡物極良。千金翼方

産後中風 人虛不可服他藥者一物白鮮皮湯用新汲水三升煮取一升温服。陳延之小品方

乳汁不下 二母散貝母知母牡蠣粉等分爲細末每猪蹄湯調服二錢此祖傳方也。王海藏湯液本草

産後諸病 凡産後穢汚不盡腹滿及産後血運心頭硬或寒熱不禁或心悶手足煩熱氣力欲絶諸病並用延胡索炒研酒服二錢甚効。聖惠方

産腸脫下 老鴉蒜即飯頭草一把以水三碗煎一盌半去滓熏洗神効。危氏得效方

産後血渴 飲水不止黃芩麥門冬等分水煎温服無時。楊氏家藏方

産後發狂 四物湯加青黛水煎服。摘玄

産後腹痛 羌活二兩煎酒服。必效方

産腸脫出 羌活二兩煎酒服。必效方

産後中風 語濇四肢拘急羌活三兩爲末每服五錢酒水各一盞煎減半服。小品方

産後露風 四肢苦煩熱頭痛者與小柴胡頭不痛者用苦參二兩黃芩一兩生地黃四兩水八升煎二升分數服

産後風虛 獨活白鮮皮各三兩水三升煮二升分三服耐酒者入酒同煮。小品方

国立国会図書館　タイトル『本草類方10巻』　請求記号 特1-2509　ガラス使用

產後嘔逆別無他疾者白朮一兩二錢生薑一兩五錢酒水各二升煎一升分三服○婦人良方

產後中寒遍身冷直口噤不識人白朮一兩澤瀉一兩生姜五錢水一升煎服○至寶

產後亡血過多心腹徹痛者用貫衆狀如刺蝟者一個全用不剉只採去毛及花蓼以好醋蘸濕慢火炙令香熟候冷爲末米飲空心每服二錢甚効○婦人良方

產後狂言血運煩渴不止生姜附子去毛爲末每服二錢姜棗水煎服○朱氏集驗方

產後陰翻產後陰戶燥熟遂成翻花澤蘭四兩煎湯熏洗二三次再入枯礬煎洗之即安○集簡方

產後血眩風虛精神昏眉荊芥穗一兩三錢梔仁五錢去皮尖炒爲末服三錢若喘加杏仁去皮尖炒甘草炒各三錢○保命集

產後水腫血虛浮腫澤蘭防已等分爲末每服二錢醋酒下○張文仲備急方

產後下痢大荊芥四五穗於盞內燒存性不得犯油火入麝香少許以沸湯些須調下此藥雖微能愈大病不可忽之○深師方

產後惡露不除續骨木二十兩剉水一斗煮三升分三服即下○千金方

產後血運築心眼倒風縮欲死者取乾荊芥穗搗篩末每用二錢七童子小便一酒盞調勻熱服立效口噤者挑齒口開者灌鼻中皆效○圖經本草

產後迷悶因怒氣發熱迷悶者獨行散用荊芥穗以新瓦半炒半生爲末童子小便服一二錢近世名醫用之無不如神也若角弓反張以豆淋酒下或剉散童尿煎服極妙蓋荊芥乃產後要藥而角弓反張

乃婦人急候得此證者十存一二而已。戴原禮要訣

產後血痛 有塊用姜黃桂心等分爲末酒服方寸匕血下盡卽愈。胥殷產寶

產後中風 華陀愈風散治婦人產後中風口噤手足攣癖如角弓或產後血運不省人事四肢強直或心眼倒斜吐瀉欲死用荊芥穗子微焙爲末每服三錢豆淋酒調服或童子小便服之口噤則挑齒灌之齗噤則灌入鼻中其效如神大抵產後太眩則汗出而腠理疎則易於中風也時珍曰此方諸書盛稱其妙姚僧坦集驗方以酒服名如聖散云藥下可立待應效陳氏方名舉卿古拜散蕭存敬方用古老錢煎湯服名一捻金王貺指迷方加當歸等分水煎服許叔微本事方云此藥委有奇效神聖之功一婦人產後睡久及醒則昏昏如醉不省人事醫用此藥及交加散云服後當睡必以左手搔頭用之果然瞥殷產寶方云此病多因怒氣傷肝或憂氣內鬱或坐草受風而成急宜服此藥也戴原禮證治要訣名獨行散賈似道悅生隨抄呼爲再生丹

產後心痛 血氣上衝欲死鬱金燒存性爲末二錢米醋一呷調灌卽甦。袖珍方

乳汁不下 京三稜三箇水二鍾煎汁一盌洗妳取汁出爲度極妙。外臺秘要

產後發喘 乃血入肺竅危症也人參末一兩蕪木二兩水二盌煎汁一盌調參末服神效。聖惠方

產後血運 人參一兩紫蘇半兩以童尿酒水三合煎服。醫方摘要

產後欬逆 氣亂心煩用乾柿切碎水煮汁呷。產寶

產後血脹 腹痛引脇當歸二錢乾姜炮五分爲末每服三錢水一盞煎八分入塩酢少許熱服

○婦人良方

産後腹痛 如絞當歸末五錢白蜜一合水二盞煎一盞分爲二服未效再服○婦人良方

産後自汗 壯熟氣短腰脚痛不可轉當歸三錢黃芪白芍藥酒炒各二錢生姜五片水一盞半煎七分温服○和濟局方

産後血多 山漆研末米湯服一錢○瀕湖集簡方

産後心痛 鷄子煮酒食即安○備急方

産後煩熱 內虛短氣甘竹茹湯用甘竹茹一升人參茯苓甘草各二兩黃芩二兩水六升煎二升分服日三服○婦人良方

産後中風 不省人事口吐涎沫手足瘛瘲當歸荆芥穗等分爲末每服二錢水一盞酒少許童尿少許煎七分灌之下咽即有生意神效○聖惠方

産後瘕痛 桂末酒服方寸匕取效○肘后

産後諸虛 發熱自汗人參當歸等分爲末用猪腰子一箇去膜切小片以水三升糯米半合葱白二莖煮米熟取汁一盞入藥煎至八分食前温服○永類方

産後秘塞 出血多以人參麻子仁枳殼麩炒爲末煉蜜丸梧子大每服五十丸米飲下○濟生方

産後不語 人參石菖蒲石蓮肉等分每服五錢水煎服○婦人良方

産後虛汗 黃芪當歸各一兩麻黃根二兩每服一兩煎湯下

産後腰痛 乃血氣流入腰腿痛不可轉者敗醬當歸各八分芎藭芍藥桂心各六分水二升煮

八合分二服忌葱○廣濟方

産後腸出 不收老鴉酸漿草一把水煎先熏後洗收乃止○救急方

産後血運 心氣欲絕者夏枯草搗絞汁服一錢大妙○徐氏家傳方

産後血閉 不下者益母草汁一小盞入酒一合温服○聖惠方

産後惡露 七八日不止敗醬當歸各六分續斷芍藥各八分芎藭竹茹各四分生地黃炒十二分水二升煮取八合空心服○外臺秘要

産後腹痛 如錐刺者敗醬草五兩水四升煮二升每服二合日三服良○衛生易簡方

産後血滲 入大小腸車前草汁一升入蜜一合和煎一沸分二服○崔氏方

産後血運 心悶煩熱用接骨草即蒴藋破如算子一握水一升煎半升分二服或小便出血者服之亦瘥○衛生易簡方

産後淋瀝 不通用葵子一合杵消八分水二升煎八合下消服之○集驗方

産後血脹 擣芭蕉根絞汁温服二三合

乳汁不下 麥門冬去心焙爲末每用三錢酒磨犀角約一錢許温熱調下不過二服便下○熊氏補遺

婦人乳少 因氣鬱者通泉散王不留行穿山甲炮龍骨瞿麥穗麥門冬等分爲末每服一錢熱酒調下後食猪蹄羹仍以木梳梳乳一日三次○衛生寶鑑方

乳汁不下 乃氣脉壅塞也又治經絡凝滯乳內脹痛邪畜成癰服之自然內消漏蘆二兩半蛇退十條炙焦瓜蔞十個燒存性爲末每服二錢温酒調下良久以熟羹湯投之以通

爲度。
和劑方

產後血運 心悶氣絕紅花一兩爲末分作二服酒二盞煎一盞連服如口噤幹開灌之或入小便尤妙。
子母秘錄

產後瀉痢 小龍牙根一握濃煎服之甚效卽蛇含是也。斗門方

產後尿血 川牛膝水煎頻服。熊氏補遺

產後諸疾 血運心悶煩熱厥厥氣欲絕心頭硬乍寒乍熱續斷皮一握水三升煎二升分三服如人行一里再服無所忌此藥救產後垂死。子母秘錄

產後血痛 有塊并經脉行後腹痛不調黑神散用熟地黃一斤陳生姜半斤同炒乾爲末每服二錢温酒調下。婦人良方

產後中風 脇不得轉交加散用生地黃五兩研汁生姜五兩取汁交互相浸一夕次日各炒黃浸汁乾乃焙爲末每酒服一方寸匕。濟生方

產後煩悶 乃血氣上冲生地黃汁清酒各一升相和煎沸分二服。集驗方

產後淋瀝 紫草一兩爲散每食前用井華水服二錢。產寶

產後惡血 不止乾地黃搗末每食前熟酒服一錢連進三服。瑞竹堂方

產婦有塊 作痛繁縷草兩大握水煮常常飲之。范汪東陽方

產後腹痛 欲死因感寒起者陳薤艾二斤焙乾搗鋪臍上以絹覆住熨斗熨之待口中艾氣出則痛自止矣。
楊誠經驗方

產後百病 地黃酒用地黃汁漬麴二升淨秫米二斗令發如常釀之至熟封七日取清常服令

相接忌生冷鮓蒜雞猪肉一切毒物未産先一月釀成夏月不可造。千金翼方

産後瀉血不止乾艾葉半兩炙熟老生姜半兩濃煎湯一服立妙。孟詵食療本草

乳汁不通萵苣菜煎酒服。海上方

産後血通菴蔺子一兩水一升童子小便二盃煎飲。頻潮集簡方

産後腹大堅滿喘不能卧白聖散用樠柳根三兩大戟一兩半甘遂炒一兩爲末每服二三錢熱湯調下大便宜利爲度此乃主水聖藥也。潔古保命集

産後腹痛及血下不盡麻黃去節爲末酒服方寸匕一日二三服血下盡卽止。子母秘錄

産後運絕半夏末冷水和丸大豆大納鼻中卽愈此扁鵲法也。肘後方

産後無乳乾胡荽煎湯飲之效。經驗方

斷産下胎生附子爲末醇酒和塗右足心胎下去之。小品方

産後下血羸瘦逆死蒲黃二兩水二升煎八合頓服。産寶方

産後中風身如角弓反張口噤不語川烏頭五兩剉炒半黑以酒三升傾鍋內急攪以絹濾取酒微温服一小盞取汗若口不開拘開灌之未効加烏雞糞一合炒納酒中服以瘥爲度。小品方

乳汁不下括蔞根燒存性研末飲方寸匕或以五錢酒水煎服。楊氏産乳

産後煩悶蒲黃方寸匕東流水服極良。産寶方

産後吹乳腫硬疼痛輕則爲妬乳重則爲乳癰用栝樓根末一兩乳香一錢爲末温酒每服二錢。李仲南永類方

乳汁不下　瓜蔞子淘洗控乾炒香拜上翕令白色酒服一錢七合面卧一夜流出。姚僧坦集驗方

乳汁不通　赤小豆煮汁飲之。産書

乳汁不下　土瓜根爲末酒服日二服。楊氏産乳方

産後煩渴　血氣上冲也紫葛二兩水二升煎一升去滓呷之

産後瘀血　不盡麻子仁五升酒一升漬一夜明旦去滓温服一升不瘥再服一升不吐不下不得與男子通一月將養如初。千金方

産後血運　韭菜切安瓶中沃以熟醋令氣入鼻中卽省。丹溪心法

産後血滯　冲心不下生姜五兩水八升煮服

産後虛汗　小麥麩牡蠣等分爲末以猪肉汁調服二錢日二服。胡氏婦人方

産後運絕　神麴炒爲末水服方寸匕。千金方

産後秘塞　大小便不通用桃花葵子滑石栀椰等分爲末每空心葱白湯服二錢卽利。集驗方

産後痢渴　久病津液枯竭四肢浮腫口舌乾燥用冬瓜一枚黄土泥厚五寸煨熟絞汁飲亦治傷寒痢渴。古今錄驗

乳汁不通　絲瓜連子燒存性研酒服一二錢被覆取汗卽通。簡便單方

産後血悶　清酒一升和生地黄汁煎服。梅師

乳汁不通 木蓮二個猪前蹄一個爛煮食之并飲汁盡一日即通無子婦人食之亦有乳也。

集簡方

豆淋酒法 宗奭曰治産後百病或血熱覺有餘血水氣或中風困篤或背强口噤或但煩熱瘈瘲手足頑痺頭旋眼眩此皆虛熱中風也用大豆三升熬熟至微烟出入瓶中以酒五升沃之經一日以上服酒一升温服令少汗出身潤即愈口噤者加獨活半斤微微搥破同沃之産後宜常服以防風氣又消結血

産後秘塞 許學士云産後汗多則大便秘難於用藥惟麻子粥最穩不惟産後可服凡老人諸虛風秘皆得力也用大麻子仁紫蘇子各二合洗淨研細再以水研濾取汁一盞分二次煮粥熟之。○本事方

薑薹散 治産後惡露不下血結衝心刺痛將來纔遇冒寒踏冷其血必往來心腹間刺痛不可忍謂之血母并治産後心腹諸疾産後三日不可無此用薑薹子炒當歸桂心赤芍藥等分每酒服二錢

産後回乳 産婦無子食乳乳不消令人發熱惡寒用大麥蘗二兩炒爲末每服五錢白湯下甚良。○丹溪纂要方

産後秘塞 五七日不通不宜妄服藥丸宜用大麥芽炒黄爲末每服三錢沸湯調下與粥間服。○婦人良方

産後青腫 乃血水積也乾漆大麥蘗等分爲末新瓦中鋪漆一層蘗一層重重令滿鹽泥固濟

服赤研末熱酒調服二錢産後諸疾並宜。婦人經驗方

乳汁不行 萵苣子三十枚研細酒服。又方萵苣子一合生甘草三錢糯米粳米各半合煮粥頻食之

産後下痢 赤白者用紫莧菜一握切煮汁入粳米三合煮粥食之立瘥也。壽親養老書

産後虛汗 馬齒莧研汁三合服如無以乾者煮汁。婦人良方

子腸脫出 五靈脂燒烟薰之先以塩湯洗淨。危氏

産後下痢 赤白裹急後重腹痛用桃膠焙乾沉香蒲黃炒各等分爲末每服二錢食前米飲下。婦人良方

産後陰脫 愼火草一斤陰乾酒五升煮汁一升分四服。子母秘錄

産後血瘀 蒲黃三兩水三升煎一升頓服。梅師方

産後中風 角弓反張不語用大蒜三十瓣以水三升煮一升灌之即甦。張傑子母秘錄

産後血運 蕓薹子生地黃等分爲末每服三錢薑七片酒水各半盞煮童便半盞煎七分溫服即甦。温隱居海上方

産後腹脹 不通轉氣急坐卧不安以麥蘗一合爲末和酒服良久通轉神驗此乃供奉太初傳與崔郎中方也。李兵部手集方

産後血運 惡物冲心四肢氷冷唇青腹脹昏迷紅藥子一兩頭紅花一錢水二盞婦人油欵二隻同煎一盞服之小便俱利血自下也。禹講師經驗方

炒豆紫湯 古方有紫湯破血去風除氣防熱産後兩用烏豆五升淸酒一斗炒令

煙絕投酒中待酒紫赤色去豆量性服之可日夜三盞神驗中風口噤加雞屎白二升和炒投之

產後血疼 欲死者槐雞半兩爲末酒濃煎飲服立愈○婦人良方

產後腹痛 兒枕痛天仙藤五兩炒焦爲末每服炒生薑汁童子小便和細酒調服○經驗婦人方

產後嘔水 產後因怒哭傷肝嘔青綠水用韭葉一斤取汁入姜汁少許和飲遂愈○摘玄方

產後目閉 心悶赤小豆生研東流水服方寸七不瘥更服○肘后方

產後氣喘 胡桃肉人參各一錢水一盞煎七分頓服

產後心痛 惡血不盡也荷葉炒香爲末每服方寸七沸湯或童子小便調下或燒灰或煎汁皆可○救急方

產後血運 不知人及狂語用麒麟竭一兩研末每服二錢溫酒調下○太平聖惠方

產後敗血 兒枕塊硬疼痛發歇及新產乘虛風寒內搏惡露不快臍腹堅脹當歸散用當歸炒鬼箭去中心木紅藍花各一兩每服三錢酒一大盞煎七分食前溫服○和濟局方

產後諸疾 及胎藏不安杜仲去皮炙雙仁熬搗極細以末煮棗肉和丸彈子大每服一丸糯米飲下日二服○勝金方

產後百病 千金桃仁煎治婦人產後百病諸氣取桃仁一千二百枚去皮尖雙仁熬搗極細以清酒一斗半研如麥粥納小瓶中麪封入湯中煮一伏時每服一匙溫酒和服日再

產後心痛 惡血冲心氣悶欲絕桂心爲末狗膽汁丸芡子大每熱酒服一丸○聖惠

產後悶亂 血氣上衝口乾腹痛梅師方用生藕汁三升飲之○廳妊時用藕汁生地黃汁童子小便等分煎服

產後惡血 沒藥血竭末各一錢童子小便温酒各半盞煎沸服良久再服惡血自下更不生痛○婦人良方

產後尿閉 不通者陳皮一兩去白爲末每空心温酒服二錢一服即通此張不愚方也○婦人良方

產後身熱 如火皮如粟粒者桃仁研泥同臘猪脂傅之日易之○千金方

兒枕作痛 五靈脂慢炒研末酒服二錢○產寶

產後痢渴 烏梅肉二十箇麥門冬十二分每以一升煮七合細呷之○必效方

產後秘塞 以葱涎調蠟茶末丸百丸茶服白通不可用大黃利藥利者百無一生○郭稽中婦人方

產後虛羸 腹痛冷氣不調及腦中風汗自出白羊肉一斤切治如常調和食之○心鏡

產後欬逆 嘔吐心忡目運用石蓮子兩半白茯苓一兩丁香五錢爲末每米飲服二錢○良方補遺

產後血閉 桃仁二十枚去皮尖藕一塊水煎服之良○唐瑤經驗方

產後血崩 蓮蓬殼五箇香附二兩各燒存性爲末每服二錢米飲下日二○婦人方

產後陽脫 不能收拾者楸枝取皮焙乾一握水五升連根葱五莖漢椒一撮同煎至三升去滓

傾盆內乘熱熏洗冷則再熱一服可作五次用洗後睡少時忌塩鮓醬麵發風毒物及用心勞力等事年深者亦治之○婦人良方

產後血運 五心煩熱氣力欲絕及寒熱不禁以接骨木破如算子一握用水一升煎取半升分服或小便頻數惡血不止服之即瘥此木煮之三次其力一般乃起死妙方○產書

婦人無乳 外臺用母豬蹄一具水二斗煮五六升飲之或加通草六分○廣濟用母豬蹄四枚水二斗煮一斗入土瓜根通草漏蘆各三兩再煮六升去滓納葱豉作粥或羹食之或身體微熱有少汗出佳未通再作

產後血多 不止烏鷄子三枚醋半升酒二升和攪煮取一升分四服○拾遺

產婦脬損 小便淋瀝不斷黃絲絹三尺以炭灰淋汁煮至極爛淸水洗淨入黃蠟半兩蜜一兩芽根二錢水一升煎一錢空心頓服服時勿作聲作聲卽不效名曰脬散○又方產時傷脬終日不小便只淋濕不斷用生絲黃絹一尺白牡丹根皮末白及末各一錢水二盞煮至絹爛如餳服之不宜作聲○婦人良方

產後腹痛 枳實麩炒芍藥酒炒各二錢水一盞煎服亦可爲末服○聖惠方

產後腸脫 不收用皂莢樹皮半斤皂莢核一合川楝樹皮半斤石蓮子炒去心一合爲粗末以水煎湯乘熱以物圍定坐熏洗之挹乾便喫補氣丸藥一服仰睡○婦人良方

產後遺溺 不禁鷄矢燒灰酒服方寸匕○產寶

產後靑腫 疼痛及血氣水疾乾漆大麥芽等分爲末新瓦罐相間鋪滿塩泥固濟煅赤放冷研散每服一二錢熱酒下但是產後諸疾皆可服○婦人經驗方

產後壯熱　頭痛頰赤口乾唇焦煩渴昏悶用松花蒲黃川芎當歸石膏等分爲末每服二錢水二合紅花二捻同煎七分細呷。本草衍義

產後下痢　沒石子一箇燒存性研末酒服熱即用飲下日二。子母秘錄

產後呃逆　白豆蔻丁香各半兩研細桃仁湯服一錢少頃再服。乾坤生意

產後煩熱　內虛短氣甘竹茹湯用甘竹茹一升人參茯苓甘草各二兩黃芩二兩水六升煎二升分服日三服。婦人良方

產婦汗血　汚衣赤色葎草擣生汁三升酢二合和合頓服當尿下白汁。韋宙獨行方

產後血運　蘊方木三兩水五升煎取二升分服

產後中風　口噤身直面青手足反張竹瀝飲一二升即甦。梅師方

產後虛汗　淡竹瀝二合煖服須臾再服。皆殷產寶

產後諸淋　紫荊皮五錢半酒半水煎溫服。熊氏補遺

產後腸出　不收枳殼煎湯浸之良久即入也。袖珍方

產後下血　炙桑白皮煮水飲之。肘後方

產後搐搦　強直者不可便作風中乃風入子臟與破傷風同用鰾膠一兩以螺粉炒焦去粉爲末分三服煎蟬蛻湯下。產寶

產後下痢　日五十行用桑木裏蠹虫糞炒黃急以水沃之稀稠得所服之以瘥爲度此獨孤納祭酒方也。必效方

乳汁不通　白僵蠶末二錢酒服少頃以脂麻茶一盞投之梳頭數十遍妳汁如泉也。經驗方

産後血暈 血結聚於胸中或偏於少腹或連於脇肋用水蛭炒虻虫去翅足炒沒藥麝香各一錢爲末以四物湯調下血下痛止仍服四物湯○保命集

産後盜汗 牡蠣粉麥麩炒黃等分每服一錢用猪肉汁調下○經驗

乳汁不通 用鯉魚一頭燒末每服一錢酒調下○産寶

産後口渴 用煉過蜜不計多少熟水調服即止○産書

産後腸脫 五倍子末摻之或以五倍子白礬煎湯熏洗○婦人良方

産後遺尿 或尿數桑螵蛸炙半兩龍骨一兩爲末每米飲服二錢○徐氏胎産方

産後腹痛 兎頭炙熱摩之即定○必效

乳汁不通 涌泉散用穿山甲炮研末酒服方寸匕日二服外以油梳梳乳即通○單驤方

乳汁不行 內服通乳藥外用木梳梳乳周回百餘遍即通○儒門事親方

産後遺尿 鷄窠草燒末酒服一錢匕○聖惠方

産後盜汗 嗇嗇惡寒茱萸一雞子大酒三升漬半日煮服○千金翼

産後煩懣 不食者白犬骨燒研水服方寸匕○千金翼

産後血運 狂言失志用紫菀一兩爲末酒服二錢匕○徐氏家傳方

産後血運 鰾膠燒存性酒和童子小便調服三五錢良○事林廣記

産後下痢 用野鷄一隻作餛飩食之○食醫心鏡

産後虛悶 阿膠炒枳殼炒各一兩滑石二錢半爲末蜜丸梧子大每服五十丸温水下未通再服○和劑局方

產後煩悶 汗出不識人千金用羚羊角燒末東流水服方寸匕未愈再服○又方加芍藥枳實等分炒研末湯服

產後血運 治產婦血運不知人事用五靈脂二兩半生半炒爲末每服一錢白水調下如口噤者斡開灌之入喉即愈○圖經

產後尿床 猪胞猪肚各一箇糯米半升入胞內同以胞入肚內同五味煮食○醫林集要

產後遺尿 猪胞猪肚各一箇糯米半升入脬內更以脬入肚內同五味煮食○醫林集要

通乳 麝肉煮食勿令婦知○子母秘錄

紫金丸 治產後惡露不快腰痛小腹如刺時作寒熱頭痛不思飲食又治久有瘀血月水不調黃瘦不食亦療心痛功與失笑散同以五靈脂水淘淨炒末一兩以好米醋調稀慢火熬膏入眞蒲黃末和丸龍眼大每服一丸以水與童子小便各半盞煎至七分温服少頃再服惡露即下血塊經閉者酒磨服之○楊氏產乳

產後血運 鹿角一㕮燒存性出火毒爲末酒調灌下即醒○楊拱醫方摘要

產後口乾 舌縮用鷄子一枚打破水一盞攪服○經驗方

產後血亂 奔入四肢并違墮以狗頭骨灰酒服二錢甚效○經驗方

產後中風 口噤瘈瘲角弓反張黑豆二升半同鷄矢白一升炒熟入清酒一升半浸取一升入竹瀝服取汗○産寶

產後虛羸 黃雌雞一隻去毛背上開破入生百合三枚白粳米半升縫合入五味汁中煮熟開腹取百合并飯和汁作羹食之并食肉○聖惠

產婦風瘡因出風早用豬膽一枚百子油一兩和傳○杏林摘要

產乳血運取釀醋和產婦血如棗大服之○聖惠方

產後血攻或下血不止心悶面青身冷欲絕者新羊血一盞飲之三兩服妙○梅師

乳汁不通鼠肉作羹食勿令知之○產書

墮胎血瘀不下狂悶寒熱用鹿角屑一兩爲末豉湯服一錢日三須臾血下○聖惠方

產後虛羸令人肥白健壯羊脂二斤生地黃汁一斗姜汁五升白蜜三升煎如飴溫酒服一盃日三○

小品

產後厥痛胡洽大羊肉湯治婦人產後大虛心腹絞痛厥逆用羊肉一斤當歸芍藥甘草各七錢半用水一斗煮取七升入諸藥煮二升服

產後腹痛鹿屑盡者鹿角燒研豉汁服方寸匕日二○子母秘錄

婦人無乳用羊肉六兩麝肉入兩鼠肉五兩作臛啖之○崔氏

產後風邪心虛驚悸用豬心一枚五味豉汁煮食之○心鏡

乳汁清少死鼠一頭燒末酒服方寸匕勿令婦知○子母秘錄

產後虛汗發熱肢體疼痛亦名蓐勞永類鈐方用豬腎一對切水三升煮取半合椒鹽葱白煮粥食○梅師用豬腎同葱豉和成作臛食之○崔氏

產後血運案紙二十張燒灰清酒半升和服頓定冬月用煖酒服之立驗已斃經一日者去板齒灌之亦活

產後虛勞寒熱用豬腎一對切細片以鹽酒拌之先用粳米一合葱椒煮粥鹽醋調和將腰子

鋪於盆底以熱粥傾于上蓋之如作酓生粥食之。濟生

琥珀散 止血生肌鎮心明目破癥瘕氣塊產後血運悶絕兒枕痛並宜餌此方琥珀一兩鱉甲一兩京三稜一兩延胡索半兩沒藥半兩大黃六銖熬搗爲散空心酒服三錢七日再服神驗莫及產後即減大黃。海藥本草

婦人血運 腹中疞痛沒藥末一錢酒服便止。圖經本草

產後血衝 心胸滿喘命在須臾用血竭沒藥各一錢研細童便和酒調服。醫林集要

產後諸痢 蒼耳葉搗絞汁溫服半中盞日三四服。聖惠方

產後諸痢 多煮薤白食仍以羊腎脂同炒食之。范汪方

產後血痢 小便不通臍腹痛生馬齒莧菜杵汁三合煎沸入蜜一合和服。產寶

產後氣喘 面黑欲死乃血入肺也用蘇木二兩水兩碗煮一碗入人參末一兩服隨時加減神效不可言。胡氏方

產後中風 茵芋五兩木防已半斤苦酒九升漬一宿猪脂四升同煎三上三下膏成每服熱摩千遍。千金方

產後悶滿 不能食用小豆二七枚燒研冷水頓佳。千金方

產後虛汗 豬膏薑汁白蜜各一升酒五合煎五上五下每服方寸匕。千金翼

產後腹痛 五靈脂香附桃仁等分研末醋糊丸服一百丸或用五靈脂末神麯糊丸白朮陳皮湯下。丹溪方

產後鼻衄 荊芥焙研末童子小便服二錢海上方。婦人良方

国立国会図書館　タイトル『本草類方10巻』　請求記号 特1-2509　ガラス使用

産後帶下 産後中風絕孕帶下赤白用羊肉二斤香豉大蒜三兩水一斗煮五升納酥一升更煮二升服○千金方

大蠭虫丸 治産婦腹痛有乾血用蠭虫二十枚去足桃仁二十枚大黃二兩爲末煉蜜杵和分爲四丸每以一丸酒一升煮取二合温服當下血也○張仲景方

産後帶下 漏盧一兩艾葉炒四兩爲末米醋三升入藥末一半同熬成膏入後末和丸梧子大每温水下三十丸○聖惠方

墮胎下血 不止當歸焙一兩葱白一握每服五錢酒一盞半煎八分温服○聖濟總錄

墮胎血下 煩悶用豉一升水三升煮三沸調鹿角末方寸匕○子母秘錄方

墮胎下血 小薊根葉益母草五兩水二大盌煮汁一盌再煎至一盞分二服一日服盡○聖濟

總錄

毒藥墮胎 女人服草藥墮胎白扁豆去皮爲末米飲服方寸匕濃煎汁飲亦可丸服若胎氣已傷未墮者或口噤手强自汗頭低似乎中風九死一生醫多不識作風治必死無疑

墮胎下血 不止榆白皮當歸焙各半兩入生姜水煎服之○普濟方

産後血氣 攻心痛惡物不下用灶中心土研末酒服二錢瀉出惡物立效○救急方

墮胎下血 不止桑木中蝎虫燒末酒服方寸匕日二虫屎亦可○普濟方

墜胎血溢 不止墨三兩火燒醋淬三次出火毒没藥一兩爲末每服二錢醋湯下○普濟方

産後惡物 不下芫花當歸等分炒爲末酒調一錢服○保命集

子腸脫出 茱萸三升酒五升煎二升分三服○兵部手集

子宮脫下 莖麻子仁枯礬等分爲末安紙上托入仍以莖麻子仁十四枚研膏塗頂心卽入○

摘玄

產門不閉 產後陰道不閉或陰脫出石灰一斗熬黃以水二斗投之澄清熏○肘后方

產後陰脫 絹盛蛇床子蒸熱熨之又法蛇床子五兩烏梅十四枚煎水日洗五六次○千金方

產腸不收 用油五升煉熟盆盛令婦坐盆中飯久先用皂莢炙去皮研末吹少許入鼻作嚏立上○斗門

產後陰脫 燒車缸頭脂納酒中服○子母秘錄

產後陰脫 千金用鱉頭五枚燒研井華水服方寸匕日三○錄驗加葛根二兩酒服

產後陰脫 以温酒洗軟用雄鼠屎燒烟熏之卽入○熊氏

產後陰脫 人屎燒赤爲末酒服方寸匕日二服○千金方

子腸不收 全蝎炒研末口噙水鼻中嚏之立效○衛生寶鑑

產後寒熱 心悶極脹百病殺羊角燒末酒服方寸匕○子母秘錄

婦人斷產 水銀以麻油煎一日空心服棗大一丸永斷不損人○婦人良方

婦人斷產 白鶴仙根白鳳仙子各一錢半紫葳二錢半辰砂二錢搗末蜜和九梧子大產內三十日以酒半盞服之不可着牙齒能損牙齒也○摘玄

婦人斷產 白麵一升酒一升煮沸去渣分三服經水至時前日夜次日早及天明服之

婦人斷產 蝙蝠一個燒研以五朝酒醋調下○摘玄方

婦人斷產 蠶子故紙一尺燒爲末酒服二錢每服至一兩卽終身不產○千金

婦人斷產 零陵香爲末酒服二錢每服至一兩卽終身不產○醫林集要

墮胎下血 不止代赭石末一錢生地黃汁半盞年絕孕益血聞香卽散也○醫林集要

落胎下血 丹參十二兩酒五升煮取三升温服調日三五次以瘥爲度○聖濟錄

一升一日三服亦可水煮○千金方

本草類方卷之九

陰病第一百七

陰冷發悶 冷氣入腹腫滿殺人釜月下土和雞子白傅之○千金方

女人陰脫 鐵精羊脂布裹炙熱熨推之○聖惠方

陰汗濕痒 爐甘石一分眞蚌粉半分研粉撲之○直指方

婦人轉脬 因過忍小便而致滑石末葱湯服二錢○聖惠方

男陰卒腫 釜月下土和鷄子白傅之○千金方

玉門寬冷 硫黃煎水頻洗○心傳方

男女陰毒 寒水石不拘多少爲末用兩餾飯搗丸栗子大日乾每用一丸炭火煆紅燒研以滾

酒調服飲葱醋湯投之得汗愈○蔡氏經驗必用方

陰下濕汗滑石一兩石膏煆半兩枯礬少許研摻之○集簡方

産門生合不開用銅錢磨利割開以陳石灰傅之即愈○通變方

婦人陰瘡桃仁杵爛綿裹塞之○肘後方

婦人陰脫作痒礬石燒研空心酒服方寸匕日三○千金翼

陰瘡作白取高昌白礬麻仁等分研末猪脂和膏先以槐白皮煎湯洗過塗之外以楸葉貼上不過三度愈○葛洪肘后方

婦人陰痛礬石三分炒甘草末半分綿裹導之取瘥○肘后方

婦人陰痛青布裹鹽熨之○藥性論

婦人陰痒墻頭爛茅荊芥牙皂等分煎水頓熏洗之○摘玄方

女子陰瘡硫黄末傅之瘥乃止○肘後方

陰下濕瘡甘草煎湯日洗三五度○古今錄驗

陰下濕痒綿黄耆酒炒爲末以熟猪心蘸喫妙○趙真人濟急方

婦人陰瘡蛇床子一兩白礬二錢煎湯頻洗○集簡方

婦人陰脫白及川烏頭等分爲末綿裹一錢納陰中入三寸腹内熱即止日用一次○廣濟方

子宫寒冷温中坐藥蛇床子散取蛇床子仁爲末入白粉少許和勻如棗大綿裹納之自然温也○金匱玉函方

婦人陰痛絹盛蛇床子蒸熱熨之又法蛇床子五兩烏梅十四箇煎水日洗五六次○千金方

陰痒生瘡胡麻嚼爛傅之良○肘后

陰下痒痛車前子煮汁頻洗○外臺秘要

婦人陰痛牛膝五兩酒三升煮取一升半去滓分三服○千金方

婦人陰痒小薊煮湯日洗二次○廣濟方

女人陰腫甘菊苗搗爛煎湯先熏後洗○危氏得効方

婦人陰癢狼牙二兩蛇床子二兩水四升煮取煎水熟洗○外臺秘要

婦人陰蝕瘡爛者狠牙湯用狠牙三兩水四升煮取半升以筋纏綿浸湯瀝洗日四五遍○張仲景金匱玉函

婦人陰瘡紫葳爲末用鯉魚腦或膽調搽○摘玄方

女人陰瘡如虫咬痒痛者生搗桃葉綿裹納之日三四易○食療本草

陰瘡爛痛杏仁燒黑研成膏時時傅之○鈐方

婦人陰腫作痒蒜湯洗之効乃止○永類鈐方

產門蟲疽痛痒不可忍用杏仁去皮燒存性杵爛綿裹納入陰中取効○孟詵食療本草

陰下濕癢蒲黃末傅三四度瘥○千金方

女陰挺出茄根燒存性爲末油調在紙上捲筒安入內一日一上○乾坤生意

陰汗濕痒石菖蒲蛇牀子等分爲末日搽二三次○濟急仙方

婦人陰腫或生瘡枸杞根煎水頻洗○永類方

女人陰冷五味子四兩爲末以口中玉泉和丸兎矢大頻納陰中取効○近効方

下部蟲瘡　蒸大棗取膏以水銀和捻長三寸以綿裹夜納下部中明日蟲皆出也○肘後

陰虱作痒　陰毛際肉中生虱如虱或紅或白痒不可忍者白果仁嚼細頻擦之取効○劉長春方

婦人陰寒　十年無子者用吳茱萸川椒各一升爲末煉蜜丸彈子大綿裹納陰中日再易之但子宮開即有子也○經心方

婦人陰冷　丹丁香末紗囊盛如指大納入陰中病即已○本草衍義

腎風陰痒　以稻草燒皂莢烟熏十餘次即止○濟急仙方

婦人陰腫　堅痛根實半斤碎炒綿裹熨之冷即易○子母秘錄

陰蝕欲盡　蝦蟇灰兎屎等分爲末傅之○肘後

交接違禮　女人血出不止青布同髮燒灰納之○僧坦集驗方

女人陰血　因交接傷動者五倍子末摻之良○熊氏

女人陰血　女人交接違理血出用雄雞冠血塗之○集驗

女人陰痒　炙豬肝納入當有蟲出○肘后

婦人陰吹　胃氣下泄陰吹而正喧此穀氣之實也宜豬膏髮煎導之用豬膏半斤亂髮雞子大三枚和煎髮消藥成矣分再服病從小便中出也○張仲景方

婦人陰蝨　作痒羊肝納入引蟲○集簡方

婦人陰脫　煎羊脂頻塗之○廣利方

陰腫痛極　馬齒莧搗傅之良○永類鈐方

特1
2509

婦人陰瘡 用鯽魚炙油塗之○時珍主治

婦人嫁痛 小戸腫痛也大黄一兩酒一升煮一沸頓服○千金方

婦人陰癩 硬如卵狀隨病之左右取穿山甲之左右邊五錢以沙炒焦黄爲末每服二錢酒下○摘玄方

子宮虛寒 杏林摘要云婦人無子由子宮虛寒下元虛月水不調或閉或漏或崩中帶下或産後敗血未盡內結不散用紅娘子六十枚大黄皂莢葶藶各一兩巴豆一百二十枚爲末棗肉爲丸如彈子大以綿裹留繫川竹筒送入陰戸一時許發熱湯用熟湯一二盞解之後發寒靜睡要安三日方取出每日空心以雞子三枚胡椒末二分炒食酒下以補之久則子宮暖矣

陰冷悶痛 漸入腹腫滿酷和麵熨之○千金方

婦人陰挺 鉄孕粉一錢龍腦半錢研水調刷産門○危氏得效方

国立国会図書館　タイトル『本草類方10巻』　請求記号 特1-2509　ガラス使用



国立国会図書館　　タイトル『本草類方10巻』　請求記号　特1-2509　　ガラス使用