

欽定四庫全書

普濟方卷一百九十一

水病門

總論

黃帝問岐伯曰水與膚脹鼓脹腸覃石瘕何以別之岐伯曰水之始起也目窠上微腫如新睡起之狀頭脈動時欬陰股間寒足脛腫腹乃大其水之盛也以手按其

明周王孫補



身重足腫腹大其水之盛也

欽定四庫全書

普濟方

一

腹隨手而起如裏水之狀轉動有聲此其候也膚脹如何
候之膚脹者寒氣客於皮膚之間澁然而堅腹大身盡
腫皮厚按之其腹陷而不起腹色不變此其候也鼓脹
如何鼓脹者腹脹身腫大大與膚脹等其色蒼黃腹脈
起此其候也大覃如何大覃者寒氣客於腸外與胃氣
相傳正氣不得榮因有所繫痼而內著惡氣乃起息肉
乃生始也如雞卵稍以益大及其成也若懷子之狀久
者離歲月按之即堅推之則移月事時下此其候也石

癡如何石癡者生於胞中寒氣客於子門子宮閉塞氣
不得通惡血當瀉不瀉血以留止日益大狀如懷子月
事不以時下皆生於女子可導而下之曰膚脹鼓脹可
刺耶曰先瀉其脹之血絡後調其經刺去其血脈師曰
病有風水有皮水有石水有黃汗風水其脈自浮外證
骨節疼痛其人惡風皮水其脈亦浮外證浮腫按之沒
指不惡風其腹如鼓不滿不渴當發其汗正水其脈沈
遲外證自喘石水其脈自沈草證腹滿不喘黃汗其脈

沈遲身體發熱胸滿四肢頭面普腫久不愈必致癰膿
心水者其人身體重而少氣不得卧煩而燥其人陰大
腫肝水者其人腹大不能自轉側而脇下腹中痛時時
津液微生小便續通脾水者其人腹大四肢若重津液
不生體若少氣小便難也肺水者其人身體腫而小便
難時時鴨溲腎水者其人腹大臍腫腰痛不得溺陰下
溫如牛鼻上汗足為逆冷其面反瘦師曰治水者腰以
下腫當利小便腰以上腫當發汗即愈問曰有病不利

利後渴飲水小便不利腹滿因腫何故師曰此法當病
水若小便自利及汗出者自當愈內外傷寒云金匱要
畧腰以上腫者發汗腰已下腫者當利小便又云治濕
不利小便非其治也大病后腰下有水氣牡蠣澤瀉散
主之治濕則五苓散主之孫真人治皮膚腫以五皮散
主之又述類象形之故也若窠有水則水青龍加羌活
湯主之病人乾嘔微利發熱而咳此為表有水表證罷
咳而脇下痛為裏有水十棗湯主之於病又當詳審此

病皆從虛損所致大病或下利後婦人產後飲水不即消三焦決滿小便不利仍相結漸漸生聚遂流諸經絡故也水有十腫不可治者有五第一層黑傷肝第二缺盆平傷心第三臍出傷脾第四背平傷肺第五足下平滿傷腎此五傷必不可治凡水病忌腹上出水出水者一月死大忌之夫腎主元氣天一之水生焉肺主沖化地四之金屬焉元氣乃水中之火所以太陽合少陰主精髓以滋血沖化乃土中之金所以太陽合陽明主肌

肉以養氣今腎虛則大虧致傷陽水凝滯肺滿則土隘使陰金沈潛衛氣凝滯而不理血淖經絡而不通上為喘急下為腫滿故經云腎為少陰肺為太陰其本在腎其末在肺皆至陰以精水也所以能聚水而生病者蓋腎為關鍵關鍵不利樞機不轉水不運行滲透經絡皮膚浮腫諸證不同以短氣不得卧為心水兩脇疼痛為肝水大便鴨澹為肺水四肢若重為脾水腰痛足冷為腎水口苦咽乾為膽水乍虛乍實為大腸水腹急肢瘦

為膀胱水大小便閉澀為胃水小腹急滿為小腸水惟
萃水謂之正水又有風水皮水石水黃汗以義考之風
合歸肝皮合歸肺黃汗歸脾石水歸腎雖名理不踰證
候少異如風水脈必浮惡風皮水脈浮按不沒指石水
脈沈腹滿不喘黃汗脈沈遲致發熱多涎療治之法當
辨其陰陽脈證若陰水為病者脈來沈遲色多青白不
煩不渴小便澀少而清大腑多泄陽水為病者脈來沈
數色黃赤或煩或渴小便赤澀大腑多秘腰以上腫者

宜發汗腰已下腫者宜利小便然後實其脾土土盛自
能攝養腎水其腫自消虛弱者又當溫補下元又有內
挾七情之氣停滯涎飲腹滿脇脹名為氣分及少血血
熱生瘡變為腫痛名為內熱又當隨證施治不可一塗
而取要知此證臍大者生沈細者死臨證施治宜詳審
焉治法大要身有熱者水氣在表可汗身無熱者水氣
在裏可下其間通利小便順氣和脾胃俱不可緩耳然
而證雖可下又當推其重輕不可過用芫花大戟甘遂

猛烈之劑一發不收吾恐峻決者易固閉者難水氣復來而無以治之也然水之為腫特一目曰風曰氣曰血合而有三馬風腫者皮羸麻木不可走注疼痛氣腫者皮厚四肢瘦前腹脇脹膨或煩燥漱水迷忘驚狂嘔逆煩悶皮間有紅縷赤痕者是血腫者婦人經脈壅閉敗血停腐尤多見之然婦人懷胎亦有氣遏水道而虛腫此但順氣安脾飲食無阻既產而腫自消若產後發虛則虛退而告殂矣大凡虛腫先起於腹而後散於四肢

者可活先起於四肢而後歸於腹者不治至若蟲脹而肚上有筋腹滿而大便滑泄久瘡而轉作虛浮男從脚下腫而上女從身上腫而下或肉硬或手掌平並不治當審而察之也大凡水病難治產後特須於口味又復病水人多嗜食不廉所以此病難愈也伐有醫者隨逐特情意存財物不理本性病人欲食兩於貴勝之處勸食羊頭蹄肉如此者未見有一愈者又此病百脈之中氣水俱實治者皆欲令瀉之使虛羊頭蹄極補那得瘳

愈所以治水藥多用葶藶子等諸藥本草云葶藶久服令人大虛故水病非久虛不得絕其根本有蠱脹但腹滿不腫有水脹而四肢面目俱腫大醫者久不善診候治蠱以水藥治水以蠱藥或但見脹滿皆以水藥如此者仲景所云愚醫殺之此疾所忌者喪孝產乳音樂一切生冷一切魚蒜房室誼戲酢滑一切肉粘食米豆油膩並禁不得食及不得用心其房室等猶三年慎之永不復發不爾者雖瘥復發發後更不可治也古方有十

水丸歷驗多利小便所以不能述錄也

水腫 附論

夫水腫之病以脾腎氣虛不能制水水氣妄行溢於皮膚其證股冷膚腫時作欬嗽不得安卧小便黃澀以手按腫處隨手而起是也

又方

徐王煮散 出千金方 治水腫利小便

牛角鯁 防己 羌活 人參 丹參 牛膝

升麻 防風 秦艽 生薑屑 殼皮 紫苑

杏仁 附子 石斛各三兩 桑白皮六兩 橘皮二兩 白朮

澤瀉 茯苓 郁李仁 猪苓 黃連各一兩

右為末篩為麤散以水五升煮三升取一升頓服日

再不能者但一服二三月以前可服主利多而小便

澀者用之大驗

檳榔丸出聖劑 總錄 治水腫及療老小虛腫大病後浮腫作

喘

檳榔微煨 附子炮去皮剉 吳茱萸水浸暴乾炒 乾薑炮 防己

厚朴去麤皮塗薑汁炙 甘草炙各一兩 葶藶紙上炒紫色 杏仁浸去皮尖

雙仁炒 椒肉微炒 赤茯苓去黑皮 黃芪剉炒 麻黃去根節炒 桂去麤

皮 栝婁去皮 白朮剉微炒 海藻洗去鹽炒各一兩半

右為細末鍊蜜丸如梧桐子大每服米飲下十九丸日

三稍加至十五丸未知加至二十五丸得小便利為

度

丁香散治腹脹硬滿水腫遍身小便澀少

丁香錢一胡椒 益智錢各一青皮去白陳皮去白甘草炒各

茯苓錢三白朮 連翹 桑白皮炒木香 枳殼

去瓢 麩炒木通 車前子炒各二錢

右為細末每服三錢水一盞半生薑五片煎至七分

和滓溫服食前日進三服

復元丹出醫方大成 治水腫夫心腎真火能生脾肺真土今

真火氣虧不能滋養真土故土不能制水水液妄行三

焦與氣脈閉塞樞機不通喘息奔急水氣盈溢滲漏

經皮俱溢滿足頸尤甚兩目下腫腿股間冷口苦舌

熱乾心腹堅脹不得正偃則咳嗽小便不通夢中虛

驚不能安卧

附子炮二兩南木香煨茴香炒川椒炒去汗獨活一方用羌

活厚朴去皮剉 薑製炒白朮煨炒陳橘皮 吳茱萸炒桂各一

兩澤瀉一兩半肉豆蔻煨半兩檳榔兩

右為末麩糊丸如梧桐子大每服五十九紫蘇湯下

不以時空心食前服此藥世傳屢驗其君臣佐使與

造物同妙一日三次先次施利頃次乃腫消喘止蓋藥能助真火以養真土運動樞機安平必矣法當禁絕鹽半年乃不再作

當歸散

出醫方集成

治如前

當歸

洗

木香

煨

赤茯苓

桂心

檳榔

赤芍藥

牡丹皮

陳皮

木通

白朮

各剉炒乾等分

右為末脚膝頭面腫大小便不快每服二錢水一盞紫蘇淡竹葉宣木瓜一片如指大同煎八分溫服日

三如已愈常服早晚二覺氣下或小便快是效臟寒

去檳榔臍已凸添天腹皮木通猪苓各一兩忌烏雞

肉鹽酸海味物

一方無白朮

茯苓丸

出千金方

治水腫

茯苓

白朮

椒目

各四分

木防己

葶藶

各二分

澤瀉

各五分

甘遂

各二分

赤小豆

前胡

芫花

白朮

七分

水

煎

下

服

丸

散

丸

右為末煉蜜和丸如梧桐子大蜜湯下五九日一稍

加以知為度

消腫丸 出醫方大成

治水腫喘滿小便不利

滑石 木通 白朮 黑牽牛炒 通脫木 赤茯苓

苓 茯神 半夏洗各一分 陳皮一分 木香牛分 瞿麥 穗

丁香 各一錢

右為末以酒糊為丸如梧桐子大每服四五十丸燈

心麥門冬湯下

導水茯苓湯 出聖主堂

治水腫頭面手足偏身腫如爛瓜之

狀手按而塌陷手起隨手而高突喘滿倚不息不能轉側不能著牀而睡飲食不下小便塞澀溺出如割便絕少雖有而如黑豆汁煮服喘嗽氣逆諸藥不效本堂用此即愈亦嘗驗其病重之人服此藥時要如熬阿刺吉酒相似藥水一斗止取藥一錢服後小便行時即漸添多直至小便變清白色方為全愈重水

澤瀉 赤茯苓 白朮 麥門冬去心各三兩 紫蘇

木瓜 檳榔 各一兩 陳皮 砂仁 木香 大腹皮

各七錢半

如病重者前藥計一十九兩重可均作三大服每服再加去心麥門冬二兩重燈草一大把均半兩重水一斗於砂鍋內下藥五兩重熬一大碗再下小鉚內煎至一大盞五更空心服滓再煎服連進三服自然利小便

右咬咀五錢重水二盞燈心二十五根煎八分去滓空心服後一方沈香琥珀丸與導水茯苓湯是一對

藥服之自見其效

沈香琥珀丸 出德生堂 治水腫一切急難證小便不通者

琥珀 去皮 杏仁 去皮 赤茯苓 各半兩 澤瀉 半兩 紫蘇 真者 沈

香 葶藶 炒 郁李仁 去皮殼各一兩半 橘皮 去白 防己 各七錢半

右為末煉蜜為丸如梧桐子大以麝香半錢為衣每服二十五丸加三十至五十丸煎人參湯送下空心

量稟氣虛實加減用

藁本丸 出聖濟總錄 治水腫久不瘥

藁本去苗 葶藶炒紫色各十分 大戟微炒 蜀椒去目及開口者炒出汗 澤

漆微炒 巴豆去皮心麩炒出油者 赤小豆微炒 澤瀉各半兩 甘遂微炒

一牽牛子炒熟十分 連翹微炒半兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每日空心溫酒下一丸加至二丸服後小便多白水即住

鬼箭羽散出千金方 有人患水腫腹大其堅如石四肢細小

勞苦足脛腫飲食便氣急此終身疾服利下藥不瘥者宜服此藥將以微除風濕利小便消殼歲久服之

乃可得力瘥後可常服

鬼箭羽 丹參 白朮 獨活各五兩 秦艽 猪苓

各三兩 知母 海藻 茯苓 桂心各二兩

右咬咀以酒三斗浸五日服五日服五合日三任性量加漸加之

大腹皮湯出醫方大成 治濕熱氣內攻心腹脹滿并水腫小

便不利大便滑泄並宜服之

橘皮去白一兩半 木香二錢半 滑石六兩 檳榔三錢 白朮一兩 茯苓

苓去皮木猪苓去皮澤瀉肉桂甘草二錢

右咬咀每服四錢水一盞薑五片煎六分溫服大小便秘澁先服十棗湯後服此

葶藶丸出醫方治腹中有濕熱氣自下作腫如新卧起

之狀兩足脛腫病在腎少陰故也標在肺太陽也故滿氣急欬嗽喘息有音每就卧則右脇有氣上衝左腋與血益相牽引不快少思飲食

甜葶藶兩郁李仁湯去皮熬紫色秤三分將白朮

牽牛子牛兩一分半桑白皮熟赤茯苓漢防已

羌活陳橘皮澤瀉

右為細末與上二味同研煉蜜和入臼內杵之丸如梧桐子大初服十丸空心晚食前日二服生薑皮湯下不知加至二三十丸以知為度

葶藶木香湯出醫方治水腫腹脹小便滑泄

葶藶炒白朮去皮各猪苓一分茯苓三分桂枝二錢滑石

澤瀉三兩木通甘草木香半錢一方

右為細末白湯調二三錢食前日夜四服若小便不得通而返滑者此濕熱痞悶極深而攻之不開是能反為注泄此正氣已衰而多難救也不可強攻之而無益勉以救之則少少與服之使稍稍導散微以得所漸以加之以意消息

木通散

出儒門事親

治水腫

海金沙 舶上茴香 巴戟 大戟 甘遂 芫花 木通 滑石 通草

右各等分為細末每服三錢大麥麩和作餅子如常二錢大爛嚼生薑湯送下

郁李仁丸 治水腫利小便

郁李仁

湯浸去皮尖微炒三分

海藻

洗去鹽味炒

桂

去麤皮各半兩

大黃

剉碎

葶藶

紙上炒紫色各一兩一分

川黃連

半兩去須

木通

剉

石韋

各一分去毛微炒

松羅

三分

右為末煉蜜丸梧桐子大每服米飲下十五丸日三稍增以知為度

白粉霜丸 出宣明論 治病水鼓滿不食四肢浮腫大便不進食

粉霜 硃砂 海蛤 玄精石 寒水石 燒研粉 白

丁香 頭白麩 各二錢 輕粉 三錢 海金沙 一錢

右研勻著紙裹數重便麩裹又紙裹又冷酒蘸了桑柴又燒麩熟為度宿証餅和丸如梧桐子大每服三丸生薑湯下一日三服二日加一丸至六日不加即止以粥補之

行水圓 出真指方 治水腫氣腫

葫蘆巴 炒 破故紙 炒 宿砂仁 革澄茄 各二錢半 木香

牛 真川椒 去目紙炒出汗 烏梅肉 焙乾各二錢半 牽牛 炒半 巴豆

畧去油一錢半

右為末麩糊丸棗豆大每服五丸食薑湯下

水銀葶圓 出聖惠方 治水腫利小便

水銀 三兩煮三日三夜 葶藶子 椒目 各一升 衣魚 二枚 水萍

瓜蒂 滑石 各二兩 芒硝 五兩

右搗葶藶令細下水銀更搗令不見水銀止別搗椒目令細搗瓜蒂水萍下篩合和餘藥以蜜和更搗三萬杵成丸初服一九如梧桐子次服二九次服三九次服四九次服五九次服六九至七九還從一九始起次服二九如是每至六九還從一九起如服藥當咽喉上有瘰子腫起頰車腫滿齒斷皆浮唾碎血出勿怪也不經三五日即消病皆瘥以上服藥若下多停藥以止利藥五下止病未瘥更服病瘥止此治諸

體肉肥按之不塌陷者臂羸著之油不受及千里大水悉生之漆師集驗陶氏古今錄驗無衣魚水萍瓜蒂滑石

泄水丸 出儒門事親 治水腫

大戟 芫花 甘遂 海帶 海藻 郁李仁

續附子 各半兩 章柳根 一兩

右為細末水煮棗二兩為丸如小豆大每服五七十丸水下

商陸圓 出聖惠方 治水腫

商陸 微炙一兩半 芒硝 研一兩 甘遂 微炒 大黃 剉破醋炒 芫花 微炒

芫花 微炒各三分 麝香 研四錢 猪苓 去黑皮一兩

右為末煉蜜丸梧桐子大每服米飲下五丸日三服

以微利為度華陀方酒客虛熱當風飲冷腹冷脹加

麝香猪苓各一兩一方無大黃

牡蠣澤瀉散 出衛生寶監 治脾胃氣虛不能制約腎水水溢

下焦腰以下有腫也金匱要畧曰腰以下有腫當利

小便

牡蠣 澤瀉 枯薑根 蜀漆 洗去腥 葶藶子 商

陸 已上各等分

右為末白飲和服方寸匕小便利止後服鹽味漏泄

牡蠣澤瀉海藻之鹽以瀉水氣內經曰濕淫於內平

以苦佐以鹽辛以苦泄之蜀漆葶藶根商陸之

酸辛與苦以導腫泄小便以散水

實脾散 出醫方集成 治陰水先實脾土為病腫脈沈遲緩煩

渴小便澁清大便多洩

厚朴皮去白朮

木瓜去木香不見

草果仁

大腹

子 附子

炮去皮劑

白茯苓

去皮乾薑

炮各二兩

甘草

炙半兩

右以咀每服四錢水一盞半薑五片棗二枚煎至七分去滓溫服不拘時候

一方 治脾元虛浮腫用

附子

一箇

草果

一箇

乾薑

各一兩

甘草

一兩

大腹皮

連皮

木

六兩

瓜

一箇去穢切片入水於砂器內同煮乾薑劈開薑心內不白為度不得全乾恐近焦焙乾

右為末空心日午用沸湯點服

治大腸水乍虛乍實上下來去

出千金方

赤小豆

五升

桑白皮

切二斤

鯉魚

四斤

白朮

八兩

右為末空心日午用沸湯點服以水三斗煮魚取爛勿鹽去魚盡食并取汁四升許細飲下

葶藶丸 治內虛外實久有積聚榮衛不通甚者變水

此為病從心起入於皮膚腫滿皮厚體重上氣不卧煩布而燥

葶藶炒令紫 防己 椒目 大黃到破醋炒 蓖麻

子去皮 郁李仁湯浸去殼

右為末鍊蜜同棗肉和丸如小豆大每服十九空心
溫酒下如不動加至十五二十九

牽牛子丸 治水腫上氣大便澀

牽牛炒一兩 葶藶炒熟二兩 杏仁去皮尖雙仁麩炒一百枚別研 芒硝半兩

牛酥研半合 大棗煮去皮核十枚研

右為末先搵前二味次入杏仁等研勻次入牛酥搗

萬杆丸如菜豆大每服至十九空心粥飲下

澤漆根湯 治水在肺令人咳喘上氣腹大脚腫目下

如卧蠶衛渴不得卧有頃入復小便難少而數胃滿

隱痛此水氣迫肺氣也宜利小便

澤漆根洗四兩 麥門冬去心焙 甘草炙 人參 赤茯苓

去黑皮 鯉魚一斤者各一兩 各一兩

右將五味麤搗篩先用水三升煮取汁一升去魚每
服三錢汁一盞煎至七分去滓溫服日三以小便利

為度不利增服如大便利小便未利者增至四合初服一日氣即下得安卧有寒可加生薑三兩切焙

芫花圓出危氏方消水腫

大巴豆二十五枚去殼葶藶 大黃 桂皮 芫花 杏

仁各等分

右為末米糊丸每服五十九空心温酒吞五更早喫下水效

牽牛湯出危氏方催發

巴豆 甘遂各二錢 檳榔 大戟 當歸各二錢 青皮

黑牽牛取頭末各一兩

右為末用大戟葶藶子煎湯調下五更初喫下水效

菴蓉散出危氏方用補

木香五錢 肉豆寇煨 肉菴蓉酒洗炙各二兩

右為末每服一大匕米飲調下忌生冷油麵

第一退水圓出三因方化氣退水腫去呃逆利濕通小便

蓬朮炮 三稜煨 桂心 青皮 益智各半兩 巴豆二兩

去皮出油別研

右為末麪糊丸如梧桐子大用黃梔子十箇劈破荆芥黑牽牛酸漿草各少許煎湯空心下二三十丸

第二退水餅出三方如服前藥未效即服此方

甘遂 大戟 各等分

右為末入麪打水調為餅如碁子大火煨熟五更淡茶湯下一錢餅可用大麥麪不用白麪五更後服至曉下極多如病未退隔日再服

第三大腹子散出三方專取轉後調正胃氣進食

大腹子炒 桂心 茴香炒 陳皮 各半兩

右為末每服二錢米飲調下

三花神佐圓出衛生寶鑑 治中滿腹脹喘嗽淋悶水濕腫滿

變生疾久病不已黃瘦困倦氣血壅住不得宣通或風熱燥鬱肢體麻痺走注疼痛瘡疾不已癥瘕積聚堅滿痞悶酒積食積一切痰飲嘔逆及婦女經病不快帶下淋瀝無問赤白并男子婦人濕熱腹滿實痛

魚瀉久新腰痛一切痢疾及小兒驚疳積熱乳癖並宜服之

甘遂 大戟 芫花 醋伴濕炒 各半兩 大黃 一兩 輕粉 一錢 黑

牽牛 二兩 頭

右為細末滴水為丸如小豆大初服五丸後服五丸溫水下每日三服加至快利後却當服病去為度設病安後老弱虛人平人常服保養宣通氣血消進飯食病痞滿極甚者更多服則頓攻不開轉如痛悶

初服二丸每服加二丸至快利為度以意消息小兒丸如麻子大隨弱壯增減二錢四歲者三五丸依法

大黃湯 出聖濟 總錄 治水腫

大黃 剉碎醋炒二兩 桂 去麤皮 甘草 炙剉 人參 細辛 去苗葉 各一兩

桑根白皮 炒黃色 剉二兩

右麤搗篩每服用水三盞藥五錢七大棗二枚擘破同煎至九分去滓入葱白湯一匙頭更煎一沸溫服

日三利小便瘥

桑白皮圓 治水腫

桑根白皮 取上有根者北陰下根白皮剉炙黃二兩 郁李仁 湯浸去皮炒 商

陸 微炙 葶藶 紙工炒 牽牛子 炒 巴豆 清水煮一日去皮尖心膜出油

各盡一兩

右為末鍊蜜丸梧桐子大每服茶湯下十五丸利三

五行見效即止

烏鯉魚湯 出危氏方 治水腫消腫又治四肢腫

烏鯉魚 一箇 赤豆 桑白皮 白朮 陳皮 各一兩 葱

白 五根

右用水三碗同煮不可入鹽先喫魚後服藥

正陽丹 出三方 治水腫

宣木瓜乾 四兩濕者一箇剉童子小便法酒各一升煮爛絞汁 大豆 煮去皮乾十兩

人參 一兩 附子 炮半兩 銀珠 二錢

右為末入銀珠研勻以木瓜膏丸如梧桐子大每服

五十丸米湯下

金匱要略

卷一百九十一

牽牛子湯

出聖濟總錄

治水腫

牽牛子

檳榔

煨木香

赤茯苓

去黑皮

陳皮

去白炒各

一兩

右麤搗篩每服二錢匕水一盞煎三兩沸去滓溫服

此藥不獨療水病凡肺氣脚氣賁豚氣上築心胃不

可忍皆治之

芫花湯

出聖濟總錄

治水腫及肢滿痰飲

芫花

炒黃色

大黃

剉碎醋炒

甘遂

微炒

甘草

微炙剉

大戟

去皮微炒

各一兩

右麤搗篩每服三錢匕水二盞棗二枚擘破同煎至

九分下芒硝半錢匕更煎一沸去滓溫服以利為度

防己丸

出聖濟總錄

治水腫眠卧不得

防己

海蛤

研各一兩

葶藶

一升蒸熟

甘遂

微炒一分

杏仁

十枚浸去

皮尖雙仁炒碎研

右先將葶藶杏仁一處伴和後以三味為末再研勻

入棗肉和丸梧桐子大每服米飲下漸加至二十五

大定回生金膏

普濟方

三五

丸以微利為度

青木香丸 出直指方 通水寬中利膈行滯氣消飲食治胃噎

食塞腹脇脹痛心下不開腸中水聲嘔噦痰逆不思

飲食

青木香 五兩 葶澄茄 補骨脂 炒 檳榔 炒 各十兩 牽牛子

六十兩炒香搗取末三十兩

右為末入牽牛末令勻漸入清水和令得所丸如菜豆大每服二十九茶湯熟水任下食後服每酒食後

可服五丸或七丸小兒一歲一丸妊婦不可服

木防己丸 療水病

木防己 八分 蜀大黃 八分如之 人參 八分 葶蘆 十分 杏

仁 八分去皮尖雙仁蒸紫色別搗

右搗篩蜜和丸先食後初服七丸如梧桐子大日再日加一丸至十二丸還日減一丸至七丸復漸加至十二丸循還服之以白飲服若病人熱多加黃芩各八分如病人冷多加厚朴八分如病人久心驚加鈎

藤八分忌酒麪羊肉其牛肉一色永斷不得食多外
禁酢物不得食鵝鴨獐兔鯉魚等肉

牛黃桂枝湯 療水腫

牛黃 六錢 研 桂枝 十二錢 又桂六錢 方云桂六錢 牡蠣 十二錢 熬研 椒目 二十

錢一 方海 葶藶 半升 熬一方 云用一升

右搗篩蜜和丸如梧桐子大米飲服七九日再小便

利為度忌生葱

越婢如木湯 出指 南方 治水腫從腰以上俱腫惡風小便不

利腎水上溢其狀大腹喘滿不得卧宜此湯發汗

麻黃 去節一兩半 石膏 三兩 甘草 半兩 白朮 一兩

右以咀為末四錢用水一盞半煎至七分去滓服不以時候

導水圓 出瑞竹堂 治水腫

黃芩 二兩 去蘼皮 大黃 二兩 去蘼皮 酒浸 滑石 四兩 細研 飛去

石牽牛 四兩 其治法正用一 灰 斤 炒香取頭末四兩

右為細末滴水為丸如梧桐子大每服五七十九臨

卧温水送下如加黄連薄荷葉川芎各二錢半即神
芎丸也詳證加後藥

甘遂 一兩久雨則加除濕 白芥子 一兩除通身 朴

硝 退熱散腫止痛久旱則加 郁李仁 散滯結通關節 樟柳根 去腰

疼沈重以上各一兩

妙香湯 治一切水氣四肢腫滿

藁香子 炒 烏藥 生用 高良薑 湯浸焙乾 青橘皮 去白各一兩

右麤搗篩每服二錢匕酒半盞煎數沸去滓稍熱服

逐氣散 治水氣兼治水腫

白商陸 去麤皮薄切暴乾 黃顛魚 三枚 大蒜 三 菜豆 一合

右搗羅為散用水一升同煮以豆爛為度先食豆汁送下又以汁調下藥散二錢匕水氣內消一方以商陸根煮菜豆令熟去商陸取菜豆任意食之不用大蒜

大麝香圓 療三焦決漏水在脇外名曰水病腹獨腫

大在腹表用

麝香

三分研

雄黃

六分研

甘遂

十二分熬

芫花

十二分熬

右搗合下篩和以白蜜丸如大豆二丸酒下日三服可至四丸節飲食禁肥肉生菜之類

大黃圓 治水腫利小便

大黃

白朮

一作葶藶

木防己

各等分

右為末蜜丸如梧桐子大米飲下十九丸利小便為度不知增之

三仁圓 治水腫喘急大小便不利

郁李仁

杏仁

炮去皮尖

薏苡仁

已工各一兩

右為細末用米糊為丸如梧桐子大每服四十九不拘時候米飲下

人參丸 治水腫

人參

木防己

各八分

杏仁

八分去尖皮雙仁熬紫色搗細

葶藶

十分

煎蜀大黃

八分搗

右搗篩蜜和丸如梧桐子大日服十二丸

吳茱萸圓 治水腫腹脹

吳茱萸

四兩

甜葶藶

二兩

甘遂

一兩

水煮

右焙乾為末蜜丸桐子大晨午卧米飲服七丸

歸表湯 治水氣四肢俱腫

羌活

二錢

青皮

半兩

黑牽牛

頭末 一兩

右為末每服一錢以樟柳根菜豆桑白皮煎湯調下

通經散 治水腫

陳皮

去白

當歸

各一兩

甘遂

右為細末每服三錢温淡酒調下臨卧服

益腎散

甘遂

依前合度

右為細末每服三錢以犢猪腰子細批破以椒鹽等物淹透爛切摻參藥在內以荷葉裹燒鹽温酒調下

服

玉并散

瓜蒞根

二兩

甘遂

一兩 治用

右為細末以麝香湯調下三錢臨卧服

白茯苓湯 治水腫

白茯苓 澤瀉 各二兩 郁李仁 五錢

右咬咀作一服水一碗煎至一半常服無時從少至多服或煎得澄入生薑自然汁在內和麪或飯粥飲作常食五七日後覺脹下再益以白朮散

大戟散 治水腫腹大如鼓或遍身皆腫

大戟 木香 白牽牛 頭末各等分

右為細末每服用三錢以猪腰子一對批開摻在內

燒熟空心食之如食左腰子搨右臂右腰子搨左臂如腫不能全去於腹遠臍遠身甘遂末甘草水少許其腫盡去

如腫因氣水氣為腫者加橘皮前白茯苓湯內加之

如因水為濕腫者煎防己黃耆湯調五苓散

如因熱為腫者八正散

如以熱燥於肺為腫者乃絕水之源也當清肺除濕水

自生矣於枳子頭湯中加黃芩

如熱在下焦陰消使氣不得化者當抑陰而陽氣自化
黃藥加黃連是也

如蠱脹之病治之以雞屎醴調酒

如水脹之病當開鬼門決潔淨府也前白茯苓湯主之

大戟丸 治水腫之病差

大戟炒 陳橘皮去白焙 巴豆一粒去皮大麥內
各一分

右為末用大麥麩糊丸如桐子大每服三丸生薑湯
下空心早晚服

麝香丸 治水腫

麝香研半 芫花炒黃 甘遂微炒去
三分

右為末鍊蜜丸桐子大強壯人酒下一十五丸老弱
人十九丸

桃皮酒 療水腫

桃皮三斤削去上 麥麩一升 秫米一升
黑取裏黃皮

右以水三斗煮桃皮令得一斗以五升汁漬麥麩五
升汁漬飯釀如酒法熱漉去滓可服一合日三耐酒

者增之以體中有熱為候小便多者即是病去便愈
忌生冷一切有毒物

大戟湯 療水病無問年月深淺雖腹脹惡亦主之

大戟 當歸 橘皮 各一兩

右切以水一大升煮取七合頓服利水二三斗而瘥
至重不過再服便瘥禁毒食一年水下後更服永不
作此方出張尚谷

治水腫利小便

葶藶 四兩 生用 桂心 一兩

右為末蜜丸桐子大米飲下丸日三

又方 亦療身體腫滿水氣急卧不得

郁李仁 末 各一兩 麩 并

右和作餅子七枚燒熟空心服熟食四枚不知加一
枚以至七枚大便通利便瘥

麻黃甘草湯 治水腫從上下俱腫以此湯發汗

麻黃 四兩 去根節 甘草 二兩

右吹咀每服三錢水一盞半煮麻黃再沸內甘草煎至八分取汁慎風冷有患氣促積久不得瘥遂成水腫之病服之有效但此藥發表老人虛人不可輕用宜詳審

桃紅散 治正水脹急大小便不利逆欲死方

甘遂

半兩半生半炒 研十元

右為末研勻用一錢以白麩四兩水調入藥搗和切作碁子白水煮浮更不得使鹽料物只淡飲候大小

便利五六分却用後藥調補

平胃散

一兩 附子

炮 白朮

各一兩

丁香

半兩

右為末和勻每服二錢水一盞薑七片棗三枚煎七分不拘時候日三五服若腫未退可灸三陰穴及命門穴腫退必矣

治大小便門水腫

大黃

防己

各二錢半

右為末蜜丸梧桐子大米飲下十九丸利小便為度

白朮 澤瀉 各等分

右為細末煎服或為丸煎茯苓湯下之末治之法黃耆芍藥建中之類以調養之忌房事魚酒等物

二氣湯 治水腫腹滿

牽牛子 甘遂 一分 微炒

右麤搗篩分作二服每服水二盞煎至五分放溫細細啣不拘時候

又方 治水腫及暴腫河東裴氏傳經效

葶藶 三兩 漢防己 末四兩

右葶藶杵六千下令如泥即下防己取棗豆鴨就藥臼中截頭瀝血臼中血盡和鴨頭更搗五千下丸如桐子大患甚者空腹白湯下十九稍可者五丸頻服五日止此藥利小便有效

又各別搗篩合以蜜丸更搗二萬杵藥成飲服二丸如梧實不知增之當以小便利及下為候若下者但可清旦一服若不下但小便利者日再三服常將服

腫消耳

療水腫方

皂莢 一挺去皮子焙 烏錫 五兩

右以酒二升煮六沸絞去滓頓服之須臾即小便二三升腫消忌一切肉麪生冷鹽酢食一年

療水病方

烏頭 一大升粒小者 桑根白皮 五天升細切

右為末以水五升和煮可有一大斗汁濾去滓於銅

器中重湯煎如錫可作丸即成所患人每服取利小便為度其小便復舊色身上腫除體中熱煩即服之禁房室及生死馬肉油膩麪酒等經數日得食羊頭肉兔肉永忌食羊頭蹄此云得食恐悞也

治水腫 出千金方

商陸 一升白者炒 羊肉 六兩

右以水一斗煮取六升去滓和肉葱頭作腫如常法食之加鹽亦可一方雜生鯉魚作湯煮服

治水腫利小便 出千金方

用牽牛子末水服方寸七日一以小便利為度

治水腫 出保命集方

用螻蛄去頭尾與蒲萄心同研露七日曝乾為末淡

酒調下暑月用佳

治水腫 出保命集方

用棗一斗鍋內入水止有四指用大戟并根苗蓋之
遍身盆合之煮熟為度去皮尖大戟大用施喫無時

盡棗決愈

治水腫 出經驗良方

用椒目茯苓皮二味不拘多少煎湯水飲

治水氣虛浮脹

昔滁州公候使酒庫攢司陳通此一病垂死醫者已
不下藥偶一婦人云是何人所授服之病自小便而
下幾數桶遂愈用大蒜一箇爛研以蛤粉和無分兩
可丸即止如梧桐子大每服十九白湯下若氣不升

降即以大蒜一頭每瓣切開逐瓣內入茴香七粒濕紙裹煨香熟爛嚼湯送下不以多少若臟腑不止即以丁香加茴香法煨服每瓣用三粒出百選方

治水腫 有小孩子發腫臍凸服之效 出百選方

用黑豆者皮乾為末米飲調下三錢建炎初江吳內翰女孫發腫臍凸無醫者吳檢外臺得此方服之立效

下水腫方 亦治小便澀 用何方

用黃犍牛溺一飲三升不覺更加服老小減半亦可

日至夜小便利差勿食鹽

治濕毒水腫方

用生大豆煮食之腫腹有白大豆不入藥用也

治水腫坐卧不得頭面腫及身體 出肘後方

取芫花桑枝燒灰淋汁煮赤小豆空心食餐飽饑即食盡不得飲葛氏方取棗引者

黃雌雞方 治腹腫水瘕水腫

用雌雞一隻加赤小豆一升同煮候豆爛即出食之

其汁日二夜一每服四合補腎扶陽氣治冷氣若瘦者漸食之良先患骨熱者不可食也

鯉魚方 出肘後方

用鯉魚一頭極大者去頭尾及骨唯取肉以水二斗赤小豆一大升和肉煮可二者以上汁生布絞汁去滓頓服盡如不能盡分為二服後溫煖服訖當下利利盡即瘥一方療腫脚滿下氣用鯉魚白煮食之後有宿石瘕可食

治卒刺手水腫

用搗韭及藍置上以火灸熱即瘥

香薷方 出十便良方 治水病腫脹不消食

用香薷乾者五十斤剉內釜中以水淹之水出香薷上寸煮使氣力都盡清澄之微火煎令可丸一服五丸如梧桐子大日漸增之以小便利一方用香薷剉煮令濃及熟以漬並服之

治頭上皮膚腫薄如蒸餅狀如裹水

用口嚼小麥麩敷之瘥

大豆酒 療水腫兼治風虛水氣

用大豆三升以水六升煮令熟出豆澄汁更內美酒五升微火煎如飴服一升漸增之合小便則腫歇也

療水腫

用黃連末以蜜和搗萬杵丸如梧桐子大米飲服二丸可至三四丸禁飲水并冷物

又方 出鮑氏方

用苦酒一升飲之一方取鹽豆各一撮以飲之一方

取用木蒂滿虎口搗取汁飲之

散腫丸 治水腫小便澀

用葶藶二兩微炒為末棗肉丸如梧桐子大桑白皮湯下每服三十丸日進二服一方用甜葶藶

甘遂散 治水腫

甘遂 炒 蓬莪朮 炮 青橘皮 湯浸去白 大戟 微煨 桂 去

皮各二分 石菖蒲 米泔浸炒乾 木香 各一兩

右為散每服用葱湯下一錢空腹服漸加至二錢微吐瀉為度亦治脚氣

治水瘡

海蛤

二兩 先研

漢防己

二兩

棗肉

二兩

杏仁

二兩

葶藶子

六兩

加料五加皮散

出朱氏 集驗方

治水腫

先用五加皮飲加澤瀉薑棗煎可先服三服次用大戟甘遂等為末麩糊為丸如彈子大用樟柳根桑白皮菜豆濃煎湯細嚼空心下

赤小豆粥

出朱氏 集驗方

治水腫屢效

赤小豆

炒焙 加

樟柳根頭

細切 片

黃魚

生細切

猪腰

一對 生細切

切 燒鹽 許少

右先將赤小豆煮濾去滓不用將豆樟柳根頭大白陳米飲若得大樟蓼同煮尤妙無亦可候粥七分熟却入黃魚與猪腰同煮覺魚與猪腰皆熟方入燒鹽喫之不過月立愈病輕者其效尤速
治腫疾 安後多不絕痕跡或以病未除方已復作又

難以更用去水藥宜此方以防之出澹療方

右以子烏為末先用酒調一服仍用醋調遍塗腫處

二三次自不作矣子烏恐麻人服時只一錢

分水散出楊氏家藏方治面浮腫

土狗一輕粉一字

右作細末每服少許搐鼻中其黃水盡從鼻出

一方出鮑氏方

商陸煮菜豆任意食之

一方出鮑氏方

白茯苓棗核仁等分米飲下二錢末

治水病初得急危出本草

即用冬瓜不限多少喫神效無比

治水腫浮氣結聚宿滯消腹中虛鳴出本草

以越王餘等煮服之

治水腫出本草

以椰子漿飲之

治水腫下水氣出本

以楓香煮汁服

治水病初得危急出本

以烏牛尿每服一合瘥

治水腫浮氣及風瘡出本

以瓶香土薑芥子等煎浴湯洗之

治水腫出本

以綠鴨頭煮服之

治水腫出本

以水松蒂食之生海底

治水腫利小便出本

以水萍搗汁服之

壓用石消水腫出本

以榆嫩葉作羹食之

凡水治病也若脈先當觀其病證診其脈氣察其大便小便赤色小便黃赤即是肝熱相刑於脾遂生水病也

若脈氣滯弦脣皮焦赤小豆小便赤色小便黃色是肝
刑於脾宜喫此方若無此病證不是肝熱只因餉食忽
生頑硬所傷即便不須喫此藥只喫治脾氣虛弱不能
製方也

楊子建獲命方 治肝臟實熱相刑於脾遂生浮腫漸
欲成水病並宜喫此方

川芎 羌活 獨活 細辛 荆芥穗 防己

連翹 各一分 木香 三錢 半夏 三錢

右為細末每服二錢食後熟湯下空心喫下
藿香散方

草豆蔻 黃橘皮 藿香 川芎 甘草 乾薑

赤小豆 煮熟焙乾 各半 牽牛 各半

右為細末每服三錢空心熟調下和滓喫但初患水
病有肝熱證候常將此病兩方藥對當服餌以取
平安若無肝熱證候只喫此方也

但一切水病之人不可暴取使服藥過度即傷損正氣

在徐徐取之一度盡取未盡停待一兩月更取一度莫令傷正氣治初受水之人腹脇脹滿頭面兩足皆腫宜喫此方浮氣亦可喫出獲命方

乾薑

三分

半夏

羌活

牽牛

各二兩

右為細末每服四錢用白麩一兩與藥末相衮和作麩羹入水一碗葱五根煮麩熟和汁盡喫取足一行又腫藥

用針砂鉄蛾即鉄匠家打下氣飛落者以入元子一

生須斷鹽性濡潤腫再發不可為灸製法用上等醋煮半日去鉄蛾取醋和蒸餅為丸薑湯服三十四丸以效為度亦得借鉄蛾氣耳出類鈴方日華子云煎汁服之不留滯於臟腑借鉄蛾之氣以制肝木弱不能尅脾土伐其土之尅而水腫自消矣
治水腫坐卧不得頭面身體悉腫

用葫藿根刮去皮搗汁一合煨空心服當微吐利治水腫水氣用樟木煎汁服之

導引法

養生方法十一月勿食經夏自死兩脯內動於喜成
水病其湯熨鍼石正方補食養宣導今附于後

又法

蝦蟇行氣正坐動搖兩臂不息十二通以治五勞水
腫之病也又云人卧勿以脚懸踞高處不久必成腎
水

十水 附論

夫十水之病腫從脚起上氣而欬名為白水其根在肺
腫從面目起名為青水其根在肝腫從胞起名為黃水
其根在脾腫從股起名為黑水其根在腎腫從心起名
為赤水其根在心腫從腹起名為氣水乍實乍虛乍去
乍來其根在腸腫從頭面起至足名為懸水其根在膽
腫從內起堅塊四肢小腫名為石水其根在膀胱腫從
四肢起腹大名為風水其根在胃腫從腹起名為裏水
其根在小腸凡此十水生於臟腑各從其根究其所本

肺與腎而已故內經曰其本在腎其末在肺皆積水也
 又曰津液充廓其魄獨居精孤於內氣耗於外形不可
 與衣相保蓋腎氣虛弱水氣脹滿上攻於肺肺氣孤危
 腎為水害子不救母故陰精損於內陽氣減於外三焦閉
 溢水道不通水滿皮膚身體否腫治之之法備見於內
 經云故曰平治權衡去菀陳剋微動四極溫衣繆刺其
 處以腹其刑開鬼門澉淨府精以時服五陽以布疏滌
 五臟故精自生形自成骨兩相保巨氣乃平也

紫金膏

出傳信通用方

治十腫水氣

蛇含石

二兩用灰一秤蛇含石用辛鉄定盛內入炭通紅用米醋二升損蛇含石入醋中

赤石脂

一兩研細末針砂五兩水淘洗焙乾用米醋二升同余根於糧於砂鍋內煮

乾為度再入鉄銚內於炭中煨紅取出冷吹灰研細金炒聲

木香

一兩切作片子焙乾

豆寇

二兩洗紙裏炮焙熟

禹餘糧

三兩

羌活

一兩去蘆頭

川芎

一兩 白茯苓

一兩去蘆頭切片子酒浸一宿

杜茴香

一兩 白蒺藜

一兩 川附子

一隻重七錢者炮去皮尖

三稜

一兩 青

皮

一兩 陳皮

二兩 牛膝

一兩切酒浸一宿

官桂

一兩 蓬朮

一兩
炮

右為細末用無鹽蒸餅湯泡為糊丸如梧桐子大每服三十九至五十九溫酒吞下空心食前如不食酒白鹽亦得忌鹽三月房室一年患人若介甲眼黑臍凸肚皮光有青筋起或灸並可下藥患人所食之物精作猪肉肚尖肚子白魚蘆魚白松菜只用葱椒醋食切不宜用鹽除此外食

大海藻湯

出聖濟總錄

治十種水病

海藻

洗去鹽焙

莞花

炒焦

猪苓

去黑皮

連翹

澤漆

炒 郁李

仁

去皮尖雙仁炒

陳橘皮

湯浸去白穰

桑根白皮

剉炒

白蒺藜

炒各

藁本

去苗土

昆布

洗去鹽

大戟

炒

防己

炒

葶藶

炒

朴

硝 甘遂

炒

杏仁

去皮尖雙仁炒各半兩

檳榔

煨剉七枚

右麤搗篩每服四錢匕水一盞半生薑大棗拍碎同煎至八分去滓空腹溫服日一以利為度

神仙萬金丸

出醫方大成

專治十種水氣逐陰固陽扶危正

命足膝微腫上氣喘滿小便不利便是水氣證速服

此藥取全効耳此藥效神功取水藥不同用蛇黃大而圓者三兩以新甘鍋子盛用炭火一秤煨過赤鉗鍋子出火急傾入釀米醋二升內候冷取出研至無聲上用針砂真者五兩賣者多雜鐵屑宜精揀擇入淘極淨磚上候冷一處研至無聲如粉即止以上三物為主其次量人虛實入後藥治水氣多是冷藥惟有此方上三物既非甘遂藁本芫花比之有下項藥輔佐故老人虛人皆可服次入後藥

羌活 川芎 牛膝酒浸一宿 木香炒黃 白茯苓 肉豆

寇炮 桂心去麤皮 杜茴香炒 蓬莪朮炮 乾薑炮 白蒺

藜已工各半兩更量虛實老人斟酌入三服內虛人老人全用實人減半用 青橘皮去白

炒 附子炮去皮 京三稜煨 當歸酒浸一宿炒 陳皮

右為細末拌極勻湯浸蒸餅握去水和藥再搗極勻丸如梧梧子大空心酒或白湯下三五丸忌鹽三箇月一撮不可入口淡且以醋少許調和飲食病者不能忌服藥徒勞無功果欲救病即須忌鹽至誠服藥

只於小便內旋去並不動臟腑病已此服此藥每服
一二服兼以溫和調補元血氣藥將理此神方也

萬餘
糧丸

溫白圓指出直治十種水病積聚脹滿癥癖塊痛久瘧諸

風

吳茱萸湯浸七次炒 柴胡 桔梗 石菖蒲 乾薑

肉桂 黃連 茯苓 人參 川椒去日隔紙炒出汗 厚

朴製 皂莢去皮 巴豆去皮膜 紫苑茸各半 川烏頭炮

皮臍一
兩半

右為細末和勻鍊蜜丸如桐子大每服三丸食後薑
湯下加至五七丸止治水腫溫白丸五苓散加炒牽
牛入匕薑汁畧煎送下

集香湯

沈香 丁香各二錢 木香 青木香 藿香葉 川

芎 赤茯苓 檳榔 枳殼 甘草 乳香一錢半

麝香一字
別研

右為細麤末每服二錢半薑三片紫蘇三葉空心煎服凡虛腫先用諸香以透其關絡然後審察證療

補藥方

肉桂去麤皮 青皮去白 乾薑炮 蓬朮醋煮 肉豆寇 雞

心檳榔 桔梗各等分 依法治

右為末每服三錢百沸湯點服空心日午晚食前項二方治水腫病余見鄉人有患水疾半年後得名醫獲瘥余遂百計求此醫人多酬黃白之物遂得此二

方余試用之百發百中獲濟者可無數世間所有水病方藥無出此二方之上者余初出本事方前集尚有此集後二快初深秘之今所有前集已盛行於世此後集今亦畧傳其一二人者使天下皆得躋盡天年毋致枉斃云一方無川芎

檳榔圓 治十種水氣腹腹喘嗽大小便澀

檳榔一兩 甜葶藶一兩 隔紙微炒 甘遂半兩 煨微黃 漢防己半兩 川

椒目一兩 當歸一兩 微炒 木通一兩 川大黃一兩 微炒 滑石一兩 澤

瀉半兩商陸一兩牽牛子一兩陳橘皮一兩猪牙皂

角半兩皮微炒

右為末醋飯和搗三五百杵為丸桐子大每服空心
粥飲下二十九以利為度未得快利再服之

芫花散 治十種水氣証候極惡諸醫不療

芫花醋拌澤瀉微炒郁李仁湯浸去牽牛子微炒甜葶

薤炒紫漢防己各一分滑石三分海蛤半兩蘧麥半兩檳

榔半兩大戟一分

右為細末每服一錢空心煎橘皮湯調下當先瀉下

碧綠水後下如爛羊脂即差如未羊脂日再服之

牽牛子圓出聖治水腫水氣遍身浮腫小便澁喘促不

止

牽牛子三分甘遂一分漢防己一分滑石半兩蘧麥

半兩椒目一分檳榔半兩澤漆一分桑白皮半兩甜葶

紫郁李仁一兩湯浸微炒

右為末鍊蜜和丸桐子大每服空心煎木瓜木通燈

心湯下二十九以利為度未得快利即再服之

十水圓出聖濟總錄療十種水腫

腫從頭諸書云脚起名為白水其根在肺椒目主之

腫從面起名為青水其根在肝甘遂大戟主之

腫從胞起名為黃水其根在脾甘遂主之

腫從腹起名為氣水乍實乍虛其根在大腸芫花主之

腫從股起名為黑水其根在腎玄參主之

腫從頭面起至足名為懸水其根在膽赤小豆主之

腫從內起堅塊四肢腫名為石水其根在膀胱桑根白

皮主之

腫從四肢起腹大名為風水其根在小腸巴豆主之

腫從胞中起名為赤水其根在心葶藶主之

椒目炒 大戟炒 甘遂炒 玄參 葶藶炒 芫花炒 赤

小豆 桑根白皮炙 澤瀉 巴豆去心皮膜

研出油

右等分隨其病始所在增其所主藥皆自一分巴豆

四分去心皮搗末下篩蜜和丸服桐子大三丸得下

為度不下日三亦可散末食服半錢七便利明朝復服如法再服病愈即禁飲但得乾物耳

又十水圓出本草方治水腫

大戟炒治青水 葶藶炒治赤水 甘遂炒治黃水 藁本去苗土治白水 連翹

去根治 芫花炒令焦治氣水 桑根白皮炙剉治石水 赤小豆治懸

水 巴豆去皮心炒出油治風水

右等分隨証所主倍之搗羅為末鍊蜜丸如菜豆大每服三丸至五丸米飲日三人弱者以意節之

萬勝散 治十腫水氣

海帶 海藻 海蛤炒醋 芫花浸 甘遂 大戟

甜葶藶 樟柳根 續隨子 巴戟去心各等分

右為末每服三錢至五錢溫調下卧間日再服

大戟圓出聖惠方 治十腫水氣遍身腫滿喘急煩悶心腹壅

滯大小便不利又用赤茯苓湯下忌鹽一百二十日

綠鹽能化水故也外忌魚鮓麪食一切毒物及生冷

等物此方千金難用此藥獲瘥之後更用後藥補之

大戟炒 甜葶藶色炒紫

色炒紫

芫花炒醋拌

今乾

甘遂煨令微黃

澤瀉

微黃

澤瀉

桑根白皮

赤小豆炒熟

巴豆去皮心出油

澤漆

右為末入巴豆研勻鍊蜜和丸桐子大每服三丸空

心粥飲下

檳榔圓出聖濟

總錄

治十種水氣

檳榔三筒炮

大戟炒半兩

牽牛子炒

滑石碎

海蛤

碎

瞿

麥穗

旋覆花

甘遂炒各一兩

右為末用軟飯和丸菜豆大每服七丸至十九煎商

陸湯下若作散每服一錢七亦煎商陸湯調下如躁

米飲調下如取利動維服葶藶丸

葶藶圓出聖濟

總錄

葶藶炒

杏仁不去皮各一分

右為末糊和丸如小豆大每服十五丸煎杏仁湯下

三消圓出聖濟

總錄

治十種水病

朴硝色青白者鍊熟二兩

芒硝色青白者

硝石色青白燒之有金

葶藶色青白者各一兩同工

葶藶色青白者各一兩同工

葶藶色青白者各一兩同工

二味研細

椒目微炒各一兩搗羅為均

葶藶色青白者各一兩同工

葶藶色青白者各一兩同工

葶藶色青白者各一兩同工

子炒各一兩杏仁二兩去皮尖雙仁以上味別為末與誘藥合搗一千杵

右用大棗一十一枚煮熟去皮核炒食令水氣滌盡和為劑或鞭即添少許熟蜜杵干下為丸如小豆大每服十五丸空心煎生薑湯下加至二十九丸以利為度不宜食飽衝冒霜寒并單衣受風冷雖夏中亦宜就溫禁食鹽味難消之物不宜悲喜憂勞兼不得近生產房室等事惟許喫粳米葱薤生薑橘皮禁鹽一年永不發動

檳榔湯出聖濟總錄治十種水氣遍身洪腫氣喘小便澀

檳榔三枚牽牛子炒葶藶炒桑根白皮一兩赤小豆炒半

郁李仁一兩炒防己各三錢猪苓去黑皮

右麤搗篩每服五錢匕水二盞生薑一棗大拍碎同煎至一盞去滓溫服空心日三服以利為度

大戟圓出宣明倫治十種水氣腫脹滿熱寒咳嗽心胞痞悶

背項拘急膀胱緊腫於小腹小便不通反轉大便澇泄不能坐卧并急喘

大戟 出聖方 芫花 醋炒 甘遂 海帶 海藻 郁李仁

續萆子 各半 樟柳根 一兩

右以上八味為末每料抄藥末十五錢匕便入後藥

硃砂 輕粉 粉霜 各一錢 龍腦 半錢 水銀 朱砂 一

子巴豆 二十粒生用去皮

右八味以下同研勻用棗肉為丸如菘豆大每服五

丸至七丸龍腦臘茶送下食後卧虛實加減

陳橘皮散 出聖方 治十種水腫氣皮膚脹滿三焦壅閉上

喘大便不通

陳橘皮 一兩 木香 半兩 牽牛子 一兩 川大黃 一兩 枳實 半兩 羌

活 半兩 烏白皮 半兩 漢防己 一兩

右為末每日空心濃煎桑根白皮湯調下三錢以利

為度

大戟圓 出聖方 治十種水氣遍身腫滿上氣喘促小便澀

大戟 一兩 牽牛子 一兩 白茨 一兩 去皮塗醋 海蛤

細研 甜葶藶 一兩 炒 川大黃 一兩 剉 桑根白皮 一兩

郁李仁 一兩湯浸 去皮微炒

右為末煉蜜和丸搗百杵如桐子大每日空心溫酒下十丸以利為度

續隨子圓 出聖 惠方 治十種風氣喘促腹脇鼓脹小便不通

續隨子 海蛤 細研 甜葶藶 漢防己 甘遂 煨微黃

郁李仁 湯浸一兩 去皮微炒 滑石 以上各半兩 膩粉 一分

右為末煉蜜和丸如桐子大每日空心粥飲下七丸當得快利如未利晚食前再服

川朴硝圓 出聖 惠方 治十種風氣此方出神仙密藏經人間

無本因鄭鍊師向天台金壇上石壁所記有數本緣

得傳療諸疾自行此方二十餘年得效者甚多凡水

氣有十種此方俱療一瘥以後永不再發但能斷得

鹽物無不效者此是仙方得之石壁金壇所記有靈驗

有人先患脚氣十餘年發盛便成水病四時之中遍

身腫滿腹硬如石水飲難下靡覺飢渴但喘羸不得

睡卧頭不著枕二百餘日無問晝夜即呷粥飲常須

倚物而坐羸弱異常因服此藥當胃氣散十日後肚
硬盡二十餘日後氣力如舊即神效

川朴硝 二兩 微研 川芒硝 一兩 細研 馬牙硝 半兩 細研 川烏頭 去皮

劑為末 椒目 微炒 為末 甜葶藶 炒紫 色 葶藶子 各一兩 去浮音水者牙出

黃色炒 杏仁 二兩 湯浸去皮尖雙仁 麩炒黃

右件葶藶杏仁葶藶等相和先搗一千杵取大棗十
枚與上件藥細研勻煉蜜和丸如桐子大每服二十
七丸煎桑根白皮湯下空心服

大黃圓 出聖惠方 治十種水氣面目四肢滿腫心腹虛脹三

焦壅滯坐卧喘急

大黃 剉炒 焦 滑石 去皮 炒 天戟 去皮 炒 甘遂 炒 芫花 醋炒 焦 椒

目 炒出 牙 葶藶 炒若 一分

右為末煉蜜為丸如小豆大每服一丸空心桑白皮
湯下日再漸增以止為度一方粥飲下

四石圓 出聖濟總錄 治十種風氣

滑石 甘泉石 白石英 續子仁 寒水石 研

硃砂 研細和作餅子用濕麩四兩 白丁香 半兩

右為末麩糊丸如桐子大每服五丸生薑湯下第一日三服第二日四服第三日五服以利為度利已用次藥補之

木香圓 出聖濟總錄 取下水氣補藥

木香 青橘皮 湯浸去白 蓬朮 二錢

右為末麩糊為丸如菜豆大每服十九白湯下

大蘇圓 出聖濟總錄 治十種風氣大通三焦

大戟 炒 甘遂 炒 春麥麩 炒 巴豆 去心膜麩 乾薑 炮

桂心 去皮 大黃 剉炒各半兩

右為末煉蜜丸如小豆大每服十九空心茶清下以利為度

巴戟圓 出聖惠方 治十種水氣通身不消化心腹脹滿

巴豆 十枚去心皮 大戟 半兩微炒 甜葶藶 半兩生用 川天黃

半兩 桂心 半兩 芫花 半兩醋拌炒乾 杏仁 半兩去皮尖

右為末入巴豆杏仁研勻煉蜜和丸如桐子大每服

空心温下下七九如人行五里熱茶投利下粘滑物者效

神助散

一名葶藶散出醫方集成方

治十種水氣面目四肢遍身俱

腫以手按之隨手而起欬嗽喘急不得安卧腹脹口

苦舌乾小便赤澁大便不利

澤瀉

二兩

猪苓

二兩去黑皮

黑牽牛

二兩半微炒去末

葶藶

二兩炒香

研別椒目 二兩炒香 木香

右為末每服以葱白三莖漿水一盞煎至半盞入酒

半盞調藥三錢絕早面向東服本事方人行十里久漿水葱白煮稀粥至葱爛入酒五合熱啜須一升許不得喫鹽并麪自早至午當利小便三四升或大便利喘定腫減七分隔日再服既平之後必須火將息及斷鹽房室等二年一方無木香

木香湯

出聖濟總錄

治十種水腫氣

木香

陳橘皮

焙湯浸去白

白朮

桑根白皮

炙剉去皮 桂皮

各半 木通

炒三分

右麤搗篩別用牽牛子二兩於鐵鉢內以紙襯手攪
 乘熱搗羅為末每服以前藥末三錢七同牽牛末一
 錢半七水一盞半煎至八分去滓五更溫服平明時
 喫冷生薑茶粥次用蕪荑桑根白皮各一分煮白羯
 羊肉半斤爛熟與喫

檳榔丸

出聖濟總錄

治十種水氣

防已

檳榔

郁李仁

去皮尖各研炒三分

葶藶

右為末煉蜜為丸如小豆大每服十九至二十九空

心服用後方葶藶湯下

葶藶湯

出聖濟總錄

葶藶

炒

桑根白皮

剉

百合

各一兩

右麤搗篩每服三錢七水一盞煎至六分下前藥日

三以便利為度若鼓氣微結加甘遂一兩

防已丸

出聖濟總錄

治十水定喘急

防已

陳橘皮

湯浸去白焙

大戟

炒

苦葶藶

紙上炒各半兩

右為末棗肉為丸如桐子大每服二十九溫水下不

拘時

大戟芫花散

出聖惠方

治十種水病腫滿喘急不得卧

大戟

一兩炒微

芫花

一兩炒醋拌

苦葫蘆

二兩炒子

甜葶藶

一兩炒

右為細末每服一錢陳大麥麩二錢水一盞煎至四

分每日空心和滓溫服良久腹內作雷聲更喫熱茶

投之使大小腸通利不過三服效

胡椒丸

出海上名方

治十種水氣脚腫脹上氣喘滿

巴豆

十粒去皮膜心用竹紙數重出油盡為度頻換紙

胡椒

二百粒生用

右為末醋糊為丸如菘豆大每日一丸淡薑湯下食

後實者日二服虛者一服如小便頻數為效服一兩

月必效忌麩食鹽物腌臢大忌濕麩

虛實丸

出聖濟總錄

治十種水氣

滑石

好白者二兩

膩粉

一兩

右先搗研滑石令極細次入膩粉和勻熬木瓜濃汁

成膏丸如菘豆大每服七丸五更空心溫米飲下日

只一服至五七丸覺腹攪痛小便多為效忌鹽一百

日覺效便服補脾胃藥

治水病瘥後常服此藥永不發方

出聖惠方

大麻仁

二兩微炒研如膏

黑豆

三兩炒熟去皮

右為末煉蜜和丸如桐子大每日三十丸空腹粥飲

下

治十種水病腫滿喘促不得卧

出聖惠方

生戟一錢蕎麥二錢

右件藥水和作餅子慢火燒令黃熟碾為末空心茶

清調下相次以大小便利為度

治十種水氣不瘥垂死

出鮑氏方

用青頭鴨一隻治如食法細切米并五味煮令極熟

作粥空腹食之

治十種水病腫滿喘促不得卧

出肘後方

用螻蛄五枚乾為末食前湯調半錢匕至一錢小便

通效

又方

用鯉魚一頭重一斤煮熟取汁和冬瓜蔥白作羹食之效

澤漆方

出聖惠方

治十種水氣

用澤漆十斤于夏間採取嫩葉入酒一斗研令汁二斗於銀鍋內慢火熬如錫即止磁器內收每日空心溫酒調下一茶匙以愈為度

治十種水氣不瘥垂死

出肘後方

用羊肉半斤切粳米三合水三升葱椒頭作粥食亦

可

十水圓

出楊氏家藏方

治十種水氣四肢腫滿面目虛以手按

之少時方起喘急不得安卧小便赤澀

遠志

去心

石菖蒲

寸九節者

椒目

炒

羌活

去蘆頭

巴戟

肉

豆寇

麩累煨六味各一兩

澤瀉

甜葶藶

研炒黃

木猪苓

去皮白

牽牛

炒黃各半兩

右件為末麩糊為丸如桐子大每服二十九加至三十丸溫米飲送下空心食前

冬瓜圓 出楊氏家藏方 治十種水氣浮腫喘滿

大冬瓜 一箇先于頭邊切一孔取中間穰不用以赤小豆水淘淨增淨填滿冬瓜中再用蓋

字合定用竹簽定以麻線繫紙筋黃泥通身固濟陰乾用糯米取糠片兩大蘿鉗冬瓜在內以及灸著糠內煨之俟火氣盡取出泥刮冬瓜令盡薄切片子并豆焙乾

右為末煮麩糊為丸如桐子大每服五十九煎冬瓜

子湯送下不拘時候小便利為度

商陸散 出楊氏家藏方 治十種水氣取水

商陸根 取自然汁一盞 甘遂末 一錢

右用土狗一枚自死者細研同調上藥只作一服空心日午水下忌鹽一百日忌食草甘三百

製菜豆 出朱氏集成

菜豆 二合半水三碗半入磁器瓶內煮候乾熟 大附子 一雙去皮臍作切兩片用

右取出乘熟空心只喫菜豆其附子次日將兩片四

片一并周菜豆二合半水三碗半同煮乾熟乘熟空

心喫菜豆第三日再別用附子菜豆二合半如前法

度服之又第四日亦如前第二日法度服之每一日

臨卧時喫豆但依此資次丸服四日其水從小便下
腫自消退如未退以前藥服之忌生冷毒物鹽酒六
十日無不效者

治十種水氣方

天戟 芫花 甘遂 續隨子 大黃 牽牛末

各一兩 肉果 硃砂 錢一

右為散子作三服水調下或作丸子未消再服忌房
事

又方 治十種水氣并根源證狀方法 出存仁方

一蒸水先從左右肋腫起根在肺 天戟 炒黃

二赤水從舌根腫起根在心 葶藶 隔紙炒

三黃水從腹腫起根在脾 甘遂 炒黃

四白水從脚腫起根在肺 藁本

五黑水從陰腫起根在腎 連翹

六玄水從面腫起根在外腎 芫花 醋煮炒

七風水從四肢腫起根在胃 澤瀉

八石水從腎腫起根在膀胱

桑白皮

九蒿水從腹滿腫起根在小腸

巴豆去油

十氣水或盛或衰根在胞

赤小豆

右十種水病各有根苗種種不同看十種病根除一味將九味等分透製者依法脩合為末煉蜜為丸如桐子大每服二十九赤茯苓湯下不拘時候日三服忌鹽一百二十日及魚鮓麪食一切毒物忌房事此病去甚遠遠取死將近甚勿忽

涌水 附論

夫內經言肺移寒於腎為涌水者按腹不堅水氣客於大腸疾行則鳴濯濯如囊裹漿水然也夫腎為肺之子而住水大腸為肺之附而為傳道之官肺受寒邪宜傳入腎背受寒邪則水閉鬱而不流且無所歸故容手大陽而不下夫水種流下今及瘡于大腸不得宣通宜其證滿溢如囊裹漿也

旋復花丸

出聖濟總錄

治涌水腹中動鳴作水聲兼痰飲助

脹滿

旋復花

桂心

去麤皮

枳實

去穢麤炒

人參

各一兩一錢

乾薑

炮芍藥

白朮

各一兩半炒

赤茯苓

去黑皮三兩

烏頭

炮去皮刺

鄉毒

礬石

各三兩

細辛

去蘆頭土焙

大黃

炒

黃芩

去黑心

葶藶

隔紙炒

厚朴

去麤皮

吳茱萸

湯浸炒

芫花

炒焦醋浸半日

橘

皮

焙各一兩去白

甘遂

炒三分

右為末鍊蜜丸桐子大每服五丸酒下二日不知稍

加丸數以知為度

大黃附子丸

出聖濟總錄

治涌水腹滿

大黃

剉炒

旋復花

附子

炮去皮刺

赤茯苓

去黑皮

椒目

桂心

去皮

芫花

炒焦醋浸

鄉毒

乾薑

炮

芍藥

枳實

炒

細辛

去苗葉各二兩

右為末鍊蜜丸如桐子大每服三丸熱水下漸增之

早晚食前臨卧各一服

猪苓丸

出聖濟總錄

治涌水

猪苓

去皮三分

牽牛

炒一兩

葶藶

炒半兩

桑根白皮

一兩

赤小

豆炒半 郁李仁去皮炒 防己各二 大腹皮三箇 生

薑焙一

右為末煉蜜丸如小豆大每服十五丸米湯下未效

加至二十九日三

葶藶丸 治涌水腹滿不堅疾行則濯濯有聲

葶藶炒 澤瀉各一 猪苓去 椒目 桑根白皮 杏

仁去皮 大戟炒 甘遂炒 天黃炒 黃芩各一 芫

花炒焦一 薤花兩半

右吹咀如麻豆大每服五分七水一盞煎七分早晚

食前溫服以利為度

檳榔丸 治涌水

檳榔煨 牽牛子炒 赤小豆炒 郁李仁炒湯浸 桑根

白皮剉 肉豆寇去殼 杏仁去皮尖雙仁

右為末煉蜜丸如小豆大每服十丸以溫水下日再

猪苓飲 治涌水小便澁卧即喘急

猪苓去皮 桑根白皮炒 防己 百合 郁李仁各一

瞿麥一兩 木通二兩

右麤搗篩每服三錢匕水一盞半煎至一盞去滓食前溫服如人行五里再服

通草飲 治涌水腸鳴腹大

木通二兩 桑根白皮炒 石韋去毛 赤茯苓去皮 防己

澤瀉各一兩半 大腹子炮四枚

右麤搗篩每服三錢匕水一盞半煎至一盞去滓食前溫服如人行五里再服

海蛤湯 治涌水

海蛤 紫苑去苗土 遠志去心各一兩 天戟 木香 防己

已各半兩

右麤搗篩每服二錢匕水一盞半煎至八分熱服若取下惡水即以白粥補之禁鹽一百二十日再不得

服芫花甘遂藥

商陸丸 治涌水諸般水腫

商陸一斤 陳橘皮二兩湯浸焙 木香一兩 赤小豆 麩四兩

右為末汲水和丸如菜豆大每服二十九橘皮湯下

椒目丸一名防己丸

治涌水腹滿腸間有水聲

方見本天腹水水腫類

葶藶丸出聖濟總錄

治涌水腹滿小便難

葶藶子

炒一兩半

杏仁

湯浸去皮尖雙仁炒二兩半研

右為末棗肉和丸如桐子大食前木通湯下十九日

二服

蓖麻單方


出聖濟錄

治涌水心下如數升油囊漿漿作聲日

不用食但欲飲水則成瘕

用蓖麻子去皮二十枚服如上法以病盡為度五日

內只喫白糜粥



普濟方卷一百九十一

總校官候補知府臣葉佩蓀

校對官檢討臣李鼎元

謄錄監生臣張鵬程