

醫方類聚卷之二十

諸風門 八

三因方

中風治法

生姜生附湯治卒中風涎潮昏塞不知人并

主瘀冷癖氣胃滿嘔沫頭痛飲食不消

大附子

一枚生去皮臍切作八片

右以水二椀生姜一兩切同煎至一大盞  
去滓溫冷服一法加沉香一錢一法加辰



砂末少匕凡中風無問冷熱虛實皆可服  
蓋此藥能正氣消痰散風神效

白散子治肝腎虛為風所襲卒中涎潮昏塞  
不語嘔吐痰沫頭目眩暈上實下虛真陽耗  
竭兼治陰證傷寒六脉沉伏昏不知人又治  
霍亂吐瀉飲食不進及小便淋瀝不通眼赤  
口瘡咽喉冷痛

大附子生去皮臍桂府滑石各半兩圓白半夏湯洗

二十一分  
次三分

右為末每服二錢水二盞姜七片蜜半匙  
煎七分空腹冷服霍亂加藿香小便不利  
加木通燈心茅根煎醫方大成集成此藥  
就有差互亦無所苦

紅龍散治中風開關竅

朱砂研別五靈脂各兩半茯神去心中木草薺各一兩

全蝎半兩腦麝各一錢

右為末每服二錢酒調服先服此次服神  
異溫風丹○袖珍方治一切中風先開關

竅不致枯廢服此藥後治風藥朱砂五靈

脂一錢半○經驗全蝎五錢茯神草薛兩腦

子良方射香半錢○良右為末每服二錢

酒調或煎荆芥湯薄荷湯下

神異溫風丹治中風一切諸疾

麻黃五兩不去節人參白朮乾姜炮

二兩茯神附子炮去白膠香別甘草多各

乳香別全蝎炒各

右將麻黃細剉用水五升熬去半入窰六

兩又熬成膏入前件藥末和負如彈子大  
每服一負溫酒下日三服

獨活丹治風懿不能言四肢不收手足躄曳

白芍藥 括蕒根 獨活 桂心各二甘

草三

右為剉散每服四錢匕姜五片水二盞醫

大成集成袖珍方 煎六分去滓入生葛汁

一合和勻服

小竹瀝湯治中風涎潮譫語醫方大成永昏

塞四肢緩縱不收

秦艸去苗土剉防風去蘆剉附子炮去皮臍獨活剉各一分

大成玉機微義各一錢

右水四盞煎二盞入生地黄汁竹瀝各半

盞煎三五沸去滓分四服醫方集成南北經驗方油珍方

與大不拘時熱服病去以它藥扶持未知

再作

燒竹瀝法新竹簡易方用青竹數竿管見大

篁竹截尺許長簡易方取新篁竹醫方大成數竿去兩頭節承類鈞方截篁

竹長一尺用兩磚對立相去八寸置竹在

上每截破作二片仰安磚上急著火良方下急

著烈磚外兩頭各置碗簡易方大以盛瀝

瀝盡以絹濾澄清良方澄夏秋須沉冷水

中良方鈞防瀝酸大熱有風人亦可單服

冷暖隨人勿過度荆瀝亦然得效方同醫

經驗方袖珍丸與大成同

獨活散治男子婦人氣虛感風或驚恐相乘

肝膽受邪使上氣不守正位致頭招搖手足

顛掉漸成目昏

獨活 地骨皮 細辛 芎藭 菊花

防風 去甘草炙

右等分爲末每服三錢水饑半煎一盞去滓取六分清汁入少竹瀝再煎食後溫日兩服又法不用獨活有旋覆花

仁壽圓治肝腎氣虛風冷所中筋脉瞶動口

眼喎邪常服補肝元行榮衛養氣血

附子 炮熟去皮臍一兩 桂心 白茯苓 山茱萸

五味子 杜仲 去皮姜制炒絲斷 續斷 枸杞子

熟地黃 洗巴戟去心 兔絲子 酒浸濕研 防風 各兩

牛膝 酒浸二兩

右爲末蜜丸梧子大每三五十九溫酒送

湯食前任下

鐵彈圓治男子婦人一切風疾無問遠近癱瘓中風口眼喎斜言語蹇澁手足躄拽難以稱舉或發搐瘈或如虫行或失音不語牙關緊急脚不能行身體頑麻百節疼痛精神不

寒頭虛煩悶夜卧不安多涎胃痛不利口乾  
眼澁多困少力如破傷風身如角弓口噤不  
開作汗如油及洗頭風腦重眉梁骨痛卒中  
不語迷悶兼白癩風遍身癰瘡鼻多清涕耳  
作蟬鳴小兒驚風天弔搖搦婦人血風手足  
煩熱夜多虛汗頭旋倒地並皆治之

白附子 沒藥 研別 虎脰骨 酒浸一宿 全蝎

烏頭 炮去皮尖 麻黃 不去節 自然銅 一宿各一兩

白花虬 半兩 辰砂 一分 五靈脂 一分 鱉子

二十介去皮 腦麝 一分 乳香 柳木

右為末蜜圓彈子大用无灰酒一升浸一  
員分二十服傷風鼻塞分三十服空心臨  
臥各一服大風五員可安

活絡通經圓治半身不遂口眼喎斜癱瘓諸  
風通活經絡宣導凝滯常服壯筋骨助血脉  
起偏廢之疾其效如神

川烏頭 二兩一兩生不去皮 草烏 二兩制

木鱉子 三兩 斑猫 百介去頭足并翅 烏

蛇酒浸去皮骨焙白花蛇酒煮去皮骨焙好墨火白膠香

各兩當歸兩五靈脂三兩

右為末將木鱉子末醋研為膏和黑豆末一斤好醋拌一兩作十九以墨為衣空心食前溫酒鹽湯嚼下一丸

舒筋保安散治左癱右瘓筋脈拘攣身體不遂脚腿少力乾濕脚氣及濕滯經絡久不能去宣導諸氣

乾木瓜五兩草薺 五靈脂 牛膝酒浸續斷

白疆蠶炒去絲松節 白芍藥 烏藥去木天

麻 歲靈仙 黃芪 川當歸 防風去

虎骨各一兩

右用無灰酒一斗浸上件藥二七日緊封扎日數足取藥焙乾搗為細末每服三錢用浸藥酒半盞調下喫酒盡用米湯調下又方添金毛狗脊一兩却將乳香白膠香各一兩同研入乾藥末內

松節散治風寒冷濕搏於筋骨使筋攣掣痛

行步艱難但是諸筋攣縮疼痛悉主之

茯神中心木制如米一兩 乳香一錢研

右入銀石器內炒留兩分性為末每服二

錢木瓜酒下

芎桂散治中風四肢疼痛及兩足俱軟行履不便

川烏頭二兩切作片水浸一宿切作筭子條更以米泔浸一宿不洗日乾

炒微赤為川芎兩 桂心一兩 甘草炙 乾姜炮

分一

右為末每服二錢溫塩酒調下日三服

趁風膏治中風手足偏廢不舉

川山甲左癱用左足右癱用右足 紅海蛤如碁子者○

一本海川烏頭大者生用各二兩

右為末每用半兩擣烈葱白汁和成厚餅約徑一寸半貼在所患一邊脚中心用舊

帛得效方 裏緊縛定於無風密室中椅子

上坐椅前用湯一盆將貼藥脚於湯內浸

仍用人扶病人恐汗出不能支持候汗出



即急去了藥汗欲出身麻木得汗周遍為妙切宜避風自然手足可舉如病未盡除候半月二十日以後再依此法用一次自除根本仍服治風補理藥忌口遠慾以自

養經驗良方同

小黃芪酒大治風虛痰癖四肢偏枯兩脚弱手不能上頭或小腹縮痛脇下攣急心下有伏水脇下有積飲夜夢悲愁不樂恍惚善忘此內屬虛五藏受邪所致或久坐腰痛耳聾

卒起眼眩頭重或舉體流腫疼痛飲食惡冷瀉瀉惡寒胃中痰滿心下寒疝及婦人產後餘疾風虛積冷不除

黃芪去皮附子去皮川椒去目并桂心秦

尤牛膝防風去烏頭集驗方白朮

川芎獨活細辛去甘草兩三大黃

葛根山茱萸乾姜各二當歸

右為剉散少壯人無熬煉虛老人微熬之以絹袋盛用清酒二斗漬之春夏五日秋

冬七日可先服食一合不知至四十合日  
 三服此藥攻痺尤佳亦不令人吐悶小熱  
 宜冷飲食也大虛加菴蓉二兩下利加女  
 萎三兩多忘加石斛菖蒲紫石英各二兩  
 心下多水加伏苓人參各二兩山藥三兩  
 酒盡可更以酒二斗重漬滓服之不尔可  
 曝滓擣下篩酒服方寸匕不知稍增之服  
 一劑得力令人耐寒冷補虛治諸風冷神  
 妙

竇朝議經進仙酒方治大風及偏風一切風  
 疾延年益壽

牛蒡根 牛膝 各一斤 秦艽 鼠粘子 各二兩

枸杞子 炒一斗 蒼朮 蒸爛二斤 防風 蠶沙 各二兩

大麻子 炒別研去殼一升 桔梗 羌活 各二兩

右爲剉散無灰酒二斗淨瓮器內浸密封

七日開開時不得對瓶口日進三服每服

一大盞溫服常令面有酒色甚者不過一

斗忌麵食并魚肉動風物○經驗秘方治

諸風前監察御史兼西京留守竇文炳染

風疾手足拘攣半身不遂累蒙恩醫不愈

奉先縣尉李能有此方極效名曰仙酒方

依法浸酒二斗瑞竹堂未服藥之先非人

不能起止飲酒二升能舒手三升能伸腰

四五升痊可用傅當世牛膝洗淨細切桔梗去

秦艽去列防風去羌活去晚蠶沙洗淨

二兩○牛蒡根一斤去柯杞二火麻

子一斤牛蒡子半蒼木二斤洗淨去粗皮

二方右為末糯酒二斗於大磁器內浸藥

封口第七日開封勿令面近器口恐藥氣

犯人眼目每服一盞空心服日三服溫服

之忌濕麵煎燻諸物堂方忌三個月奉

勅送御藥院附靈寶上方更加天麻半斤

洗淨枳殼二兩揀淨當歸三兩地黃二兩

同前藥浸酒

不內外因中風凡例

凡因不內不外而致風中者亦各從其類也

如新沐中風名曰首風飲酒中風名曰漏風  
又曰酒風入房中風名曰內風又曰勞風治  
之各有方

麋銜湯治因醉中風惡風多汗少氣口乾善  
渴近衣則身熱如火臨食則汗流如浴骨節  
懈惰不欲自勞名曰漏風

澤瀉 白朮 各一兩 麋銜 半兩

右為末每服二錢酒飲任調下食前服

附子湯治房室竟中風惡風多汗汗出沾衣

口乾上瀆不能勞事身體盡疼名曰內風

附子 生去皮 人參 各半兩 茴香 炒 茯苓 山藥

各一分 甘草 炙 乾姜 炮各三分

右為剉散每服四大錢水二盞姜三片鹽  
少許煎至七分去滓食前服

歷節治法

烏頭湯治病歷節痛不可屈伸

烏頭 五枚剉以蜜二升煎取一升去烏頭 甘草 麻黃 去節 芍藥 黃芪

右為剉散每服四錢水二盞得效方盞半

煎至七分去滓投前蜜煎一合空腹溫

服千金有老姜桂心大棗無黃芪麻黃白

寒疝腹中絞痛賊風入腹攻五藏拘急不

得轉側叫呼發作有時使人手足厥冷

附子八物湯治風歷節四肢疼痛永類鈐方

痛節身如槌鍛不可忍

附子炮去乾姜炮芍藥 茯苓 甘草炙

鈐方惡甜桂心各三兩。鈐方白木四

參三

六為剉散每服四大錢水二盞煎七分鈐方

水一去滓食前一方去桂心用乾地黄二

兩煎方又云一云治廢極氣虛遍身

獨活寄生湯最治歷節風近人用之甚效亦

治腰背痛及脚氣流注方見腰

瘥敘例治法破傷風

病者身熱足寒頭項強急惡寒時頭熱面赤

目脉赤獨頭動搖卒口噤背反張以發熱惡

寒不惡寒有汗無汗分剛柔者風寒瘧也脉  
沉細卽爲濕瘧瘡瘍未合風入爲破傷風濕  
入爲破傷濕二者害人最急倉卒不知其因  
其難忍癰疽瘰癧膿潰之後尤宜謹之產婦  
汗多或因怒厥皆成此病治之各有方  
括樓桂枝湯治柔瘧身體強兀兀然脉反沉  
遲自汗

括樓根二兩桂心 白芍藥各三兩甘草炙二兩

右爲剉散每服四大錢水盞半薑五片棗

二枚煎七分去滓溫服汗不透食頃啜熱  
粥發之

葛根麻黃湯治剛瘧無汗小便少氣上衝胃  
口噤不能語

葛根四兩麻黃三兩桂心 白芍藥 甘草

右剉散每服四大錢水盞半薑五片棗三  
枚煎七分去滓食前服

大承氣湯治剛瘧胃滿口噤卧不著席脚攣  
急斷齒

大黃四兩 厚朴八兩 枳殼二兩 姜製炒去穢

右剉散每服四大錢水盞半煎七分去滓入芒消二錢匕煎鎔服得利止後服此以陽明養宗筋陽明者胃也風濕寒入于胃則熱甚宗筋無以養故急直利陽明以治其能養也

參桂湯治卒半身不遂手足拘急不得屈伸身體冷或智或癡或身強直不語或生或死狂言不可名狀角弓反張或欲得食或不用

食或大小便不利悉上之

人參 桂心 當歸 獨活 黃芩 乾薑炮 甘草炙各一分 石膏一兩 杏仁一箇 麩炒去皮 皮尖

右剉散每服四大錢水一盞半煎七分去滓服無汗加麻黃去節三分

倉公當歸酒主賊風口噤角弓反張瘧者

當歸 防風各三分 獨活一兩 麻黃去節一分 細辛去苗兩 附子一箇 六錢重炮去皮臍

辨類二十  
十一

右為剉散每服四錢水酒各半盞同煎七分去滓口不開者抉開口內湯一服蘇二服少汗三服大汗愈

### 破傷風濕治法

防風散得效方名治風自諸瘡口入為破傷

風項強牙關緊欲死

防風去天南星湯各等分○澹寮方湯又泡七次玉機微義炮

右為末每服三錢童子小便一大盞煎至

七分熱服王氏集驗方每服二三匙童○便伍升煎取四升空心服

是齋醫方治破傷風及金刃傷打傷撲損

玉真散本事必用兩方皆有但人不知張

叔潛知府云此方極奇居官不可闕予宰

清流日以授直廳醫救欲死者數人奇甚

天南星防風石等分為細末破傷風以藥

敷貼瘡口然後以溫酒調下一錢如牙關

緊急角弓反張用藥二錢童子小便調下

或因鬪毆相打內有傷損以藥二錢溫酒

調下打傷至死但心頭微溫以童子小便

類聚二十一  
六



灌下二錢併進三服天南星為防風所製  
 脂之不麻瑞竹堂方袖珍方同經驗秘方  
 此下云續再有一方亦妙追出  
 黃水水盡為效一日一換其效如神又方  
 用黃蠟一塊熱酒化開服與前玉真散一  
 對連 ○管見大全良方胡氏奪命散治破  
 傷風及金刃傷打撲傷損風自瘡口入令  
 人項強牙關緊急角弓反張口噤強直防  
 風去又天南星洗各右為細末溫酒調二  
 錢服仍以此藥敷瘡口三因方以童子小  
 便煎服云云同上 ○澹軒方皮破傷風最

可驚防風為末等南星先將小許貼瘡口  
 溫酒童便服頓輕 ○神效名方治破傷風  
 天南星半生防風去蘆二味右為末清油  
 調塗瘡上追出黃水為驗

牡蠣散治破傷濕口噤強直牡蠣取末粉管  
大令良方煨付瘡口仍以末二錢煎甘草  
研令極細湯調下方得效

香膠散治破傷風口噤強直  
 魚膠燒七分留性

右研細入麝香少許每服二錢酒調下不  
 飲酒米湯下又一方以蘇木煎酒下方得效  
得效  
方玉機 ○衛生易簡方用魚膠燒灰存  
微義同 性為末酒調服仍封瘡口  
山居四 澹軒方  
要方同 魚膠能治破傷風先煮一錢瘡口封別取  
 燒灰為細末麝香酒散立成功

### 大風治法

凡治大風須推其所因凡因風寒濕熱勞逸  
 飲食與夫傳染不可混濫散寒濕風濕清熱

調和氣血類然不同若例以瀉風藥治之則  
 失其機要矣昔見一僧得病狀如白癩卒不  
 成瘡但每旦起白皮一升許如蛇蛻醫者謂  
 多啖炙博所致與局方解毒雄黃丸三四服  
 而愈豈非得其因邪治之  
 第一浴法

麻黃根 地骨皮 草烏頭 各二兩

右為剉散研朴消二兩勻和每用藥二兩  
 得效方水一桶椒一合葱三十莖艾葉一  
 一兩

兩同煎十沸入米醋一中盞打勻去滓坐  
溫室中且用手巾搭四肢候湯可浴卽浴  
令汗透面上如珠流更坐室中或睡片時  
尤佳候汗解方著衣避風而出五日再浴  
如此兩上浴便服換骨丹

換骨丹

九肋鱉甲去海蜈蚣細判各半兩○  
得效方各二兩  
右以塩泥固濟候乾火煨存二分性爲末  
巴豆半兩去皮膜順手研青州棗七介去

核入巴豆膏在棗中火燒令焦存巴豆五  
分性將棗巴豆爛研如泥入前二味末同  
研勻以醋煮糊爲丸如棗豆大每服七丸  
虛者四五丸用溫薑汁下候利惡物如膿  
血爛魚腸卽住卽此三兩服未利更加一  
二丸得効方更次服遇仙丹

遇仙丹

人參 紫參各一兩 苦參 白彊蠶去青各二兩  
右爲末白麪糊丸梧子大每服三十九溫

塩湯吞下食前日二次服踈風散得效方同

踈風散

山茱子仁一兩 大黃 白滑石 熟地黄

懸豆酥炙焦黃各二兩 ○得効方無

右爲末入朴消半兩令勻每服一錢食後

淡茶清調下次以佛手膏去瘡

佛手膏去黑紫瘡核

班猫七介去翅足 巴豆七粒去皮 杏仁二七介去皮 紅娘

子七介去翅足 砒霜一錢別研 盆硝一錢 ○得効方乙刃 眞娘

半韶粉半兩 瀝青研半兩 ○得 硫黃 黃丹

各三 膩粉炒十錢 ○得 菜豆一合 槐角三條 麻

油四兩 亂髮雞子大一兩

右用油煎令髮化次下紅娘子次下巴豆

槐角等逐味下焦者漉出方下硫黃盆硝

及丹粉等以簞子不佳手僂令勻滴水成

珠爲度用時先將針輕手刺瘡核用藥一

粟米大放針處次日擠瘡有黑臭膿血出

三兩日血漸少次服去毒丹

類聚 二十 十一

去毒丹

赤芍藥 甘草 滑石 各半兩○得效方白滑石 巴豆

去皮炒別研後入 黑牽牛 一兩半炒 朴消 大黃 一分

右為末麵糊丸紫豆大臨臥時服十五丸  
金銀薄苛湯下加至二十九 得效方三十圓 次服

甘草散

甘草散

甘草 滑石 各半兩○得效方白滑石 山豆根 一兩 大

黃 一分

右為末每服一錢蜜熟水調下日二服次

服解毒丸

解毒丸

芫蕒根 三兩 甘草 半兩 大黃 一分 朴消 一分

右為末麵糊丸如菉豆大每服二十九至  
三十丸白湯下次服福神丹 得效方同

福神丹

訶子 四介 巴戟 炒 黑牽牛 生各半兩 甘遂 三錢

赤小豆 四十九介

右為末麪糊丸如棗豆大每服十九至十五丸薄苛湯下次用水膏藥得效方同

水膏藥傅貼破處及面脚上瘡令生肉

陳皮去灰土半斤炒紫色陳麥米半升炒紫○得藿

香 馬蹄香各一兩麝香別研

右同為末入麝香用冷水調搗傅瘡上有

膿處如損破即煎槐枝湯洗再上藥此十

方乃俾處士秘傳曾用有驗大要病人須

能如法將息理會敬而信之

通天再造散治伏風惡疾

鬱金半兩生○得效方一錢 大黃一兩 白牽

牛六錢半 皂角刺 羊黑大者

右為末每服五錢日未出而東以無灰酒

下盡量為度晚利黑頭小虫病稍輕者止

利如魚腸王氏集驗 臭穢物忌毒半月得效

方作但食稠粥軟飯漸生眉毛得效方 皮

膚如常甚者不過三兩次須將理不可妄

有勞動及終身不得食牛馬騾驢等肉犯

類聚 二十 五

者死不救○直指方治大風諸癩川樽金  
半兩半生半炒兩微焙白率牛取仁半黑  
色大皂莢刺焙一兩右細末每服叁錢半月  
首五更面東好酒調下重者泄出黑頭小  
虫輕者泄如魚腸爛肉極臭服藥至無虫  
則瘥肆箇月絕口味但喫白粥白飯慳忿  
室慾永斷牛馬鵝鴨等物下藥條至勿令  
病人知恐虫匿也  
三濟丸治如前

當歸 熟地黄 川芎 荆芥穗各二兩 防  
風 細辛各一兩○得桂心一分

右爲剉散先以醋一升浸一宿漉出焙乾  
再以生地黃一斤搗汁浸一宿焙乾酒一  
升浸一宿焙乾旋入乳香半兩以餘酒醋  
地黃汁釋蒸餅爲丸如梧子大用好川烏  
頭一介炮裂剉荆芥穗半兩浸酒三升旋  
溫下藥五十九  
八葉湯淋瀝大風瘡

頁卷二十一 三

類聚  
二十

桑葉 荷葉 地黃葉 皂角葉 蒟葉

蒼耳葉 菖蒲葉 何首烏葉

右等分曬乾燒存性為末如面藥洗手面

身體得效方同

料簡

大風惡疾瘡癩茶毒膿汁淋漓眉鬢墮落手

足指盼頑痺痛痒顏色枯痒得效方枯痺鼻塌眼

爛齒豁唇揭病證之惡無越於斯負此病者

百無一生猶且愛戀妻孥復著名利不仁之

行仍欲更作死而無悔深可悲傷凡遇此疾

切須斷鹽及一切口味公私世務悉宜屏置

能不交俗事絕慶弔函隱林下依法治療非

但愈疾亦能因是而至神仙所謂因禍而得

福也

衛生十全方

治卒中風痰涎牙關緊急不省人章

南木香半兩生用

右碾為細末以生薑七片天南星七片瓜

類聚  
二十一



葶子拾肆粒濃煎取湯七分盞調木香木  
候溫灌之若牙關不開自有開牙關藥方  
在後近世人醫卒中風便以附子等藥與  
之往往多不救蓋緣卒中氣逆遽進以風  
藥甚不相投惟木香可以順其氣助以薑  
星瓜子以下其痰庶幾氣順而人醒然後  
可以用星附等藥若蒼猝未能辨上項藥  
材急以蘇合香圓一二圓木香湯調與服  
亦佳

治急中風或暴亡牙關不開不可進藥者

烏梅肉 細辛 麝香

各一錢

右爲細末和勻抄半錢許於牙關上搯之  
并以皂角末搐鼻中其口便開可以灌前  
藥

治中氣狀如中風者中氣而以風藥治之十  
無一愈中風而以氣藥治之則氣順而風散  
應中風中氣不辨者先服此

川芎 人參 枳殼 各一分 沉香 香附子

類聚 卷二十一 三十五

去皮毛 木香 各二錢

右為細末每服三錢以沸湯入塩少許點灌之

治中風四支不舉痰涎閉塞不通

猪牙皂角 肆挺不蚶者 晉礬 光明者秤如皂角之半

右二味為細末和勻每服抄半錢至三字

匕溫水調了灌之少頃微微吐出冷涎吐

得一升許便醒次緩緩用藥調治○簡易

方許學士方救急稀涎散治中風忽然昏

若辭形體昏悶四肢不收涎潮於上高氣

閉不通 肘後方治卒中風昏昏若醉形體

角似科微有涎出斯須不治便為大病或

傷人也此證風涎潮於上滿痺氣不通宜

用光明晉礬一猪牙皂角 四介肥實并不

右細末研勻輕者半錢匕重者三錢匕 管

大全良方得效方用後方澹寮方王氏集

驗方經驗良方醫林方衛主易簡方三字

上溫水調灌下不大嘔吐但微微冷涎出  
一二升便得醒醒次緩而調理不可太吐  
恐虛人 壽域神方同直指方云死者不可

頁卷二十一 三十六

類聚二十

三六

煎湯調下仍與南星附子諸痰  
歸心實榔亦能踈風順氣  
○醫方大

成治證與簡光明晉攀  
集二兩○醫方  
成一方

皂角四兩肥實不右為細末研勻每服一  
錢至二錢溫水調下  
方玉機微義同

治中風語澁痰盛四支不舉  
大附子一箇重別錢已上天南星一箇亦  
已上者生用去皮底

右貳味咬咀以水肆升生薑參片同煮候  
水乾過半即濾去滓分作兩處調後藥竭

梢三錢白殭蠶炒黃去絲並為細末分作  
三服以附子湯調下未省再服已省只服

星附湯

治中風手足戰掉口眼喎斜言語步履不正

大川烏五兩野水浸五靈脂五兩去沒藥

二兩常歸去蘆乳香透月者一天麻一真

麝肉半兩別研

右同為細末滴水為圓如彈子大每服一

圓生薑自然汁研化開了却煖好酒投服

類聚二十

三六

日貳空心午食前服數日便覺有效一月  
可以全安合時須重午日淨室內莫令猫  
犬婦人見此藥治得病三四月者的然效  
驗

治卒中顛倒傷損及治走注痛風

防風 白附子 羌活 天南星 川烏

去皮尖生用草烏 大者生熟乾地黄 半

已上各一兩夏 衰湯泡烏藥 白殭蠶 炒去絲

兩各半

右爲細末酒糊丸如梧子大每服拾餘粒  
用薑汁和酒灌之尋常只溫酒下

治痛風遍身走注疼痛

大草烏 五箇生用 太川烏 二箇生用 全蝎

一箇黑豆 二粒地龍 半兩洗去 荆芥

穗 虎脛骨 白花蛇 酒浸三日 去皮

天麻 沒藥 黃耆 各半 乳香 透明者

右爲細末入真麝香一錢重同研勻煮濃  
糯米飲爲圓如棗豆大每服貳拾圓空心

類聚二十

二十

食前與臨卧時溫酒下微出冷汗則差

治風氣走疰尋常有風疾者宜常服

羌活 獨活 各二兩 地龍 去土一兩 天麻 三分 烏頭

炮去皮尖半兩

右並為細末用生蜜為元如梧子大每服

二十元薄苛湯酒任下

治大風皮肉脫落衆藥不效者

萱草根 搗取汁一盞 冬瓜 取汁半盞

右將二汁和勻入號丹一兩輕粉半錢以

雞羽刷皮肉上即愈

治大風皮肉脫落

羌活 獨活 白蒺藜 炒去刺 人參 去蘆

仙靈脾 二兩 防風 二兩 又尾者不用 苦參 二兩

右並為細末食後片時荆芥伍穗煎湯調

二錢匕服若鼻梁不塌眼不斷瞳人一月

便愈

治男子婦人夾腦風暗風頭旋但是風疾皆

效

類聚二十  
三十九

荆芥穗 麻黃去根 川芎 菊花 白殭

蠶炒 桂心 防風 苦參 人參 天麻

羌活 獨活 烏蛇酒浸二宿去皮骨炙香熟 威靈仙

地龍去土各兩 川烏生一兩

右為細末煉蜜圓如梧子大每服十圓溫

酒下常服理一切風疾

治腎臟風攻疰腰脚生瘡

川烏皮一兩去尖 草烏一兩去皮尖二味以黑豆半升水煮透乾日乾

天麻 沙苑 蒺藜去刺 地龍去土 白附子各半兩

右同為細末酒糊為元如梧子大每服二

十元至三十元空心食前煆湯盪酒送下

壯心元榮養氣血治太過不及有偏榮衛氣

行不周燥藥過多枯耗津液雖無嗜慾飲注

經絡似風但服此藥不一月間功效神驗更

不盡述

生地黄汁斤一 枸杞子汁二兩 生薑汁半斤

先以慢火於銀石器內熬地黄汁去肆兩

次入枸杞子汁又慢火熬去二兩更入生

類聚二十  
三十一

薑汁再熬共留二斤肆兩復入藥末如後

人附子末六錢川烏頭末炒黃黃芪末 人

參末 肉蓯蓉末 五味子末 當歸末

百合末 杏仁去皮尖白茯苓末 兔

絲子末 九節菖蒲末 真阿膠末已上各半

兩

右十三味細末各秤別用白蜜半斤略略

熬入藥末和勻同入煎膏子中再用文武

火熬數沸不住手打令勻用磁石器內收

之每服壹匙麝香酒調下溫熱呷不拘時  
候

神巧萬全方

治急風諸方論

經有急風候又有卒中風候又有風癱候夫

急風與卒中理固無二指風言則謂之急風

指病而言則謂之卒中其風癱蓋出於急風

之候也何者經云奄然忽不知人咽中塞窒

窒然舌強不能言如此則是中急風而生其

類聚二十  
三十一

薑汁再熬共留二斤肆兩復入藥末如後

大附子末六錢川烏頭末炒黃黃芪末 人

參末 肉蓯蓉末 五味子末 當歸末

百合末 杏仁去皮尖白茯苓末 兔

絲子末 九節菖蒲末 真阿膠末已上

兩

右十三味細末各秤別用白蜜半斤略略

熬入藥末和勻同入煎膏子中再用文武

火熬數沸不住手打令勻用磁石器內收

之每服壹匙麝香酒調下溫熱呷不拘時  
候

神巧萬全方

治急風諸方論

經有急風候又有卒中風候又有風癩候夫

急風與卒中理固無二指風言則謂之急風

指病而言則謂之卒中其風癩蓋出於急風

之候也何者經云奄然忽不知人咽中塞窒

窒然舌強不能言如此則是中急風而生其



候也發汗身軟者生汗不出身直者死若痰涎壅盛者當吐之視其鼻人中左右上白者可治一黑一赤吐沫者死

治卒中欲死風攻身體及五藏言語謇澁神思冒昧大驅風散方

麻黃二兩芎藭一兩石膏一兩肉桂 白

芷 甘草炙乾薑炮當歸炒黃芩 杏仁

去皮尖炒黃  
已上各三分

右件搗為散每服四錢以水一中盞煎至

六分去滓不計時候稍熱服以汗出為度  
一法入荆瀝五合同煎大驗  
治風入藏身體緩急不遂及不能言小驅風散

人參 肉桂 大川烏頭炮麻黃去節各

甘草炙防風 漢防已 白朮 黃芩

芎藭 赤芍藥 白茯苓各三分

右作為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候稍熱服汗

出為度

治卒中風痰壅盛不記人事并中惡等疾四神散

乾蝎 瓜蒂 赤小豆 雄黃通明者各半兩

右件四味為末每服二錢溫水調下以吐為度

五藏中風方論

夫風邪中人皆緣虛而入猶須辨識形候是何藏中風肝藏中風關節不利筋脉拘急甚

者但踞坐不得低頭若繞兩目連額色微有青脣面黃者可治若大青黑面一黃一白者是肝已傷不可復治心藏中風精神離散悲樂不常面赤頭痛翕翕發熱甚則但得偃臥不得傾側汗出若脣赤汗流者可治若脣或青或黑或白或黃皆是心壞為水而目停停時悚動者皆不可治脾藏中風身體怠墮多汗惡風舌強語澁唇口嚙邪肌肉不仁甚者神思如醉手足不能動搖踞而腹滿身通黃

吐鹹汁出者可治若手足大青者不可復治  
肺藏中風者其脉浮數大腸不利皮膚不仁  
或生瘡毒甚者偃臥而胃滿短氣冒悶汗出  
視目下鼻上下兩邊下行至口色白可治若  
色黃爲肺已傷化爲血不可復治其人當妄  
搦空指地或自拈衣尋衣縫不可治腎藏中  
風兩脚冷痺緩弱不遂面鰲耳聾語聲渾濁  
四肢沉重流注生瘡甚則腰痛視脇左右未  
有黃色如餅粢大者可治若齒黃赤鬚髮直

而土色者不可治

治肝中風流注四肢攻頭面疼痛言語謇澁  
上膺風熱口眼喎斜脚膝疼痛無力宜服犀  
角散方

犀角屑

石膏

各一兩

羌活

羚羊角屑

各三

分人參

甘菊花

獨活

芎藭

白朮

酸棗人

防風

黃芩

天麻

枳殼

炒

當歸

黃耆

白芷

各半兩

甘草

一分

右件搗羅爲散每服三錢以水一中盞入

生薑半小同黃至六分不計時候溫服

治肝藏中風攻手足緩弱無力口眼喎斜精

神不定行步艱難宜服决明子丸方

决明子 天雄炮 犀角屑 天南星炮 白

花蛇肉酥拌 獨活 芎藭 白附子炮 川

升麻 白朮 白僵蠶微炒 防風 蔓荊子

當歸微炒 細辛 酸棗人微炒 草解已上各牛

黃 朱砂 麝香各一分

右件搗羅爲末入牛黃等勻分煉蜜爲丸

梧桐子大每服二十九以豆淋酒下

治心風狂言多驚迷悶恍惚宜服鎮心丸

牛黃 鈎霜各一分 天白黃 朱砂 龍

齒 遠志去心 生乾地黃 松脂研已上 鐵

粉三分 犀角屑 人參 茯神 麥門冬去心

兩各一 金薄五片

右件搗羅爲末和勻鍊蜜爲丸如小豆大

煎竹葉湯下七丸不計時候

治心風恍惚忘語有所見聞心悸志意不定

宜服茯神散

茯神 人參 龍骨 犀角屑各一兩 鐵粉

赤小豆各半兩 菖蒲三分 金薄三十片

右件搗羅為末入研末同和勻每服不計時以金銀湯放溫調下一錢

治脾藏中風肉熱肌皮淫淫如虫行或腠理

開汗大洩皮膚肉色不澤脣鼻黃色宜服細

辛散

細辛 白朮 獨活 附子炮 防風 肉

桂各一兩 麻黃去節 厚朴薑汁炙 枳實 甘草

炙各半兩

右件搗羅為末每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分不計時候服

治脾藏中風身體怠墮四肢緩弱惡風頭疼

舌本強直言語蹇澁皮膚頑痺宜服烏蛇丸

烏蛇用肉一兩酥炙黃 天麻 獨活 附子炮 肉

桂各一兩 人參 防風 細辛 當歸炒 白

朮 羚羊角屑 薏苡人 乾蠖炒 牛膝

芎藭 茯苓 天南星 白僵蠶炒各三分

黃一兩半節半兩 牛黃 龍腦 麝香各一分 朱砂半兩

研入

右件搗羅為末入研了藥和勻鍊蜜杵為

丸梧桐子大酒下十九加至十五丸

治脾藏風壅咽喉內涎唾如膠心胃妨悶語

聲不利宜服壞涎丸方

白礬火煨 天竹黃各半兩 半夏湯浸七遍洗朱

砂研水飛過 天南星炮各一兩 金薄片五十 皂莢子人

半兩 炒

右件藥先以半夏天南星皂莢子人搗羅

為末與諸藥同研令勻用爛粟米飯和為

丸如菉豆大每服七丸生薑湯嚥下

治肺藏中風冷頭疼項強背痛鼻乾心悶語

聲不出胃中少氣四肢無力疼痛宜服獨活

散

獨活 細辛 附子炮 甘菊花 麻黃去節

白芷 五味子 紫苑 赤茯苓 肉桂

朮白 芎藭 桑白皮 甘草炙 杏仁湯

去皮 防風 已上各

右件藥擣羅為散每服四錢以水一中盞煎六分去滓溫服

治積年肺藏風毒徧身生瘡大腸壅滯心神煩躁宜服皂莢煎丸

皂角 二斤不蚰者用一斤搥碎 梨 一十生

以水一斗浸一宿絞取汁 薄荷 一斤已上三味入在皂角

生絹絞 前皂莢 一斤刮去黑皮以醋二兩

取汁 塗之慢火炙令黃魚待酥

盡為 防風 葳靈仙 獨活 羌活 甘

菊花 各二兩

右件擣羅為末以一半入在前藥汁內於銀鍋中慢火熬看稀稠得所入後一半藥同為丸如梧桐子大一服二十九以溫漿水下不計時候

治腎藏氣虛風邪折中腰脚緩弱無力視聽不聰腰脊痠疼臍腹虛冷顏色不澤志意昏沉宜服天麻丸

天麻 肉蓯蓉 酒浸一宿 去皮炙 石斛 去根各 磁

石 二兩燒令赤醋淬 七通研水飛過 杜仲 去皮炙 當歸 炒丹

參 獨活 天雄 炮 牛膝 去苗 肉桂 去皮 草薺

蚘螂 炒 菖蒲 巴戟 去心 鹿茸 去毛酥 附子 炮

右擣羅為末鍊蜜和九梧桐子大每服三

十九空心酒下

治腎藏中風腰脊疼痛不得俛仰兩脚冷痺  
緩弱不遂頭昏耳聾語音渾濁四肢沉重宜

服獨活散

獨活 附子 炮 桂心 天麻 當歸 炒上各

一兩 甘草 炙 枳殼 炒 牛膝 去苗 甘菊花 白朮

山茱萸 細辛 黃耆 菖蒲 草薺

丹參 防風 芎藭 已上各半兩

右擣羅為末每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓溫服

癱瘓風方論

世傳左為癱右為瘓此說尤非何者經既有



偏中半身不遂之候卽癱瘓之候當以左右  
 俱中者名之又說以春夏得之難治秋冬得  
 之易療春夏者陽氣上騰火力方盛風火相  
 持而玉故難治也秋冬者陽氣降下漸微卽  
 易療也此說亦未可必惟其中之淺深爲難  
 易尔治法兼理肝腎爲得盖肝主筋腎主骨  
 風中肝腎則筋骨癱瘓也

治癱瘓風大鐵彈丸方

大烏頭四兩生用去皮臍別杵末五靈脂四兩淘澄沒

藥別研乳香別研朱砂研無名異研入血竭研入  
各三分牛黃麝香研龍腦各一分  
 右十味細研羅爲末滴水丸如小彈子大  
 每服一丸以生薑自然汁二分盞研化熱  
 酒浸溫服

治癱瘓風手足不遂肌肉頑痺筋脉拘急心  
 神不安言語蹇澁育膈痰涎不利宜服白朮  
 散

白朮 革薺 獨活 肉桂 五加皮

甘菊花 漢防己 葛根 羚羊角屑

赤芍藥 防風 芎藭 杏仁湯浸去皮尖炒令

黃側子炒去皮甘草炙黃已上各一兩礞石三兩碎

去赤麻黃去節薏苡人二兩

右件十八味擣為散每服四錢以水一中

盞入生薑半分煎六分去滓溫服

補肝腎久虛外中風毒肢節攣急腰間痠疼

漸覺羸瘦宜服鹿茸丸

鹿茸酥炙黃去毛石斛去苗草薺 檳榔 附子

炮已上天麻 巴戟去心熟乾也黃 山靈

脾 山茱萸 酸棗人微炒 蛇床子 杜仲

五加皮 肉桂 獨活 防風 茯神上已

各一兩牛膝半兩兔絲子三兩酒浸三日曬乾

右件為末鍊蜜和丸如梧桐子大食前以

溫酒下三十員

治中風半身不遂方論

經有偏風候又有半身不遂候又有風偏枯候此三者大要同而古人弱為之篇目蓋指

風則謂之偏風指疾則謂之半身不遂其肌  
 肉偏小者呼為偏枯皆由脾胃虛弱所致也  
 夫脾胃為水穀之海水穀之精化為血氣潤  
 養身體今脾胃虛弱則水穀之精養有所不  
 周血氣偏虛為邪所中故半身不遂或至肌  
 肉枯小今治法兼治脾胃為得如補脾丸之  
 類兼服之方在脾病方中  
 治偏風手足不遂筋骨疼痛宜服海桐皮丸  
 方

海桐皮 石斛去根 肉桂 側子炮去皮 仙  
 靈脾 芎藭 麻黃去根 莽草微炒 茺  
 白芷 牛膝已上各 防風 栢子人 羌  
 活 當歸已上各  
 右件搗羅為末鍊蜜和丸梧桐子大每服  
 三十丸溫酒下食前服

風痹方論

風痹者身無痛也病在藏四肢不收智不亂  
 一旦臂不隨者風痹也能言微有知則可治

不能言者不可治足如履霜時如入湯脛股淫鑠眩悶頭痛時嘔短氣汗出久則悲喜不常不出三年死凡欲治此病衣先後次第不得謾投湯藥以失機宜非但殺人因茲遂為痼疾當先服竹瀝飲子

竹瀝飲子方患熱風者必先用於此制其熱毒方  
竹瀝二升生葛汁一升薑汁三升  
右三味相和溫煖分為三服旦暮晚各一

服覺四體百具似好與麻黃散

麻黃 防風各三分 芍藥 防已 附子炮

人參 芍藥 黃芩 甘草炙 桂心已上各半

兩石膏三兩杏仁二十粒羚羊角屑一兩

右件搗羅為末每服四錢水一大盞生薑半分竹瀝一合半生葛汁一合同煎七分忌生冷酢滑猪牛馬驢肉蒜麥酒服前件湯散漸覺少損仍進後方

瘵卒暴風口面僻邪半身不遂語不轉竹瀝

湯方

竹瀝外防已入 升麻 桂心 芎藭 羚羊

羊角屑各二兩 麻黃三兩 防風二兩

右七味為麤散每服四錢水一大盞竹瀝

二合同煎七分濾去滓服如常服加獨活

三兩最佳若手足冷每一服入生薑三分

同煎藥服不除更進防風散

防風 麻黃 芍藥各三分 防已 桂心

黃芩 白朮 附子炮 羚羊角屑各一兩 甘

草 人參 芎藭 獨活 升麻各半兩 石

膏一兩

右件一十五味搗為麤散每服四大錢水

一大盞半竹瀝二合生薑一分同煎九分

盞去滓服若有氣者宜服芍藥散

芍藥 防風 麻黃各三分 黃芩 防已

桂心 白朮 人參 芎藭 獨活 升

麻 牛膝 石膏 橘皮 五加皮 羚羊

羊角屑各半兩 杏仁二十介 乾葛一兩

右件十八味為麤散每服四錢水一大盞入竹瀝二合生薑半分同煎八分濾去滓服

凡風痺服前湯得差訖常服除餘風獨活散  
獨活 防風 防已 秦膠 黃耆 芍藥 人參 白朮 茯神 芎藭 遠志 升麻 石斛 牛膝 丹參 羚羊角屑 甘草 厚朴 天門冬 五加皮 桂心 黃芩 地骨皮 各半兩 橘皮 麻黃 乾地

黃 各一兩半 檳榔 藁本 杜仲 烏犀 各一兩 薏苡仁 半兩 石膏 三兩

右件三十二味各細切和勻搗為麤散每服四錢水一盞半生薑半分同煎八分濾去滓日進二服若或覺心中熱煩以竹瀝代水煮之生薑一味臨煎藥斟酌用之  
治風痺方論

經有風痺候又有風角弓反張候痺者身體強直口噤如發癰狀角弓反張者腰背反折

不能俛仰二者皆曰風邪傷於陽之經而然也治法一同

治卒中風身如角弓反張口噤不語宜服石膏散

石膏 麻黃去根節 防風 羚羊角屑

獨活 五加皮 前胡 肉桂 附子炮

人參 芍藥 當歸 杏仁湯浸去皮尖麩炒 甘

草炙已上各半兩

右件擣羅為末每服四錢水一中盞入生

薑半分煎至六分去滓無時溫服

治中風角弓反張口噤不語四肢拘急并腎

藏風毒攻注手足頑麻一切急風並宜服之

南星丸

天南星炮 天麻 白附子炮 膩粉 牛膝

去白殭蠶微炒 羌活 槐膠 羚羊角屑

防風各半兩 乾蠍微炒 蟬殼各一分 白花蛇酒浸

去皮骨麝香一錢半 黑附子半兩

用肉炙入研了藥令勻鍊蜜和丸雞頭大

每服一丸以薄荷生薑汁和酒下

治賊風反折銅屑酒方

赤銅屑

四兩

右熬令極熱投酒中每服五合日三或無  
卽以赤銅五斤燒納酒中百遍服同前法  
○備預百要方治賊風肢節拘急赤銅五  
斤燒赤投二斗酒百遍服之

風寒熱候方論

經曰風之中人或爲寒熱寒者謂腠理開則

西然而寒寒則衰飲食在人裏則外泄而寒  
爲寒中一日使人面青心悶嘔逆吐沫四肢  
痛冷熱者謂腠理閉則熱而悶若人肥則風  
不得外洩爲熱中而目黃一日其狀使人惡  
風寒戰目欲脫涕唾出七八日微有青黃膿  
涕出如彈丸大從口鼻出爲善也不出則傷  
肺變欬嗽唾膿血  
治患風人多熱常宜服荆瀝湯方

荆瀝

竹瀝

生薑

各半斤



右三味相和溫溫服之每日相夾煮散服  
日午服此平復差乃止

風眩方論

夫風眩之病起於心氣不足胃上蓄熱實故  
有高風面熱之所爲也痰熱相感而動風風  
心相亂則悶瞢故謂之爲風眩瞢大人曰癩  
小兒則爲癩一說頭風目眩者云云次列於  
後詳見聖  
惠方  
治頭風神白散養生方云飽食仰卧久成氣

病頭風又云飽食沐髮作頭風

石膏 白附子炮 天南星炮 白芷 甘菊

花 京芎 天麻各等分

右件搗羅爲末每服一錢先嚼薄荷三五  
葉溫酒調下

又方茶煎散

麻黃去節 荆芥穗 白附子

右三味爲末各等分每服一錢如茶點  
又方右以白芥子研貼痛處立效

治頭風并諸般風疾白龍丸

石膏

半斤火煨過如麵分川烏頭皮甘草

天南星

各四兩肉桂甘菊花各二防風

白殭蠶

京芎各一牛膝各半海桐皮去皮水浸

麻黃

去節甘松洗川白芷一洗各藁本一洗各

右搗羅為散研和令勻用糯米擦淨煮

粥研爛旋旋入藥和勻杵為劑丸如大雞

頭大微乾上衣每服一丸空心夜卧用煨

葱煖酒嚼下如中急風用兩丸薄荷自然

汁半盞酒半盞磨化灌下衣被盖出汗如

人血風當歸酒下傷寒頭痛葱酒下常服

茶酒任下小兒急慢驚風量大小金銀湯

磨下

治偏頭疼旋復花散

旋復花

革薺

虎頭骨

酥塗炙黃各半兩

右件為末欲發時以溫酒調下二錢衣被

盖出汗立差

治夾腦風及洗頭後傷風頭偏痛甚者宜服

神聖散

麻黃

去根

細辛

乾蝎

半生炒

藿香

各半

右件為末每服一錢用荆芥湯或薄荷酒下

大風方論

經言大風五種皆以五色言之謂青黃赤白黑五者之風能生五虫五虫食人五藏此說疑未別白蓋五藏之經惟虛者風邪中之既中風邪始生虛熱虛熱既盛乃變生虫如肝

病生青虫心病生赤虫脾病生黃虫肺病上白虫腎病生黑虫猶蠹生於木反食於木故食肝則眉睫墮落食肺則鼻柱崩壞食脾則臥語聲變散食腎則耳鳴啾啾其曰蟋蟀麵癩者亦以虫所似言之蓋不越五色之證也古人謂之惡疾然亦多種不同所得偏體無異而眉髮已落有徧體已壞眉鬚儼然有諸處不異好人而四肢腹背有頑處重者手足十指已有墮落有患四體大寒而重衣不暖

者尋常患熱不能暫涼者百體枯槁者有津  
汁常不止者有身體乾痒徹骨搔之白皮如  
麩手下作瘡者有瘡痍茶毒乃疊而生晝夜  
苦痛不已者有直置頑鈍不知痛痒者此候  
雖種種狀兒不同而難療易療皆在病人不  
由醫者何則此語口慎心違不受醫教直希  
望藥力不求諸已百餘人差者十分有一神  
仙傳有數人皆因惡病而致何者由割棄塵  
累懷穎陽之風所以非止差病乃因禍而取

福也一遇斯疾即須斷葷一切公私物務釋  
然皆棄猶如脫履凡百口味特須斷除漸漸  
斷穀不交後事絕乎慶弔幽隱巖谷周年乃  
差差後終身慎房

服蒼耳法三月已後七月已前刈取蒼耳爲  
末夏水服冬酒服主大風日二服如丸用蜜  
每服二十九滿百日甲錯皮落脫如凝脂

風諸雜候方論

風病候多途而岐伯論風止於四種謂偏枯

風非風懿風痺而已後之人又多其條例至  
有一事數出如前急風與卒中各為方論其  
於繁簡俱不得中予今惟取人所難明者論  
之其疾候曉然易明者皆已之故曰風諸雜  
候用者但觀其方之所生者可也下去諸雜  
候者亦此例

治賊風面目口喎方

夫風邪入於足陽明手太陽之經過寒則  
筋急引頰故使口面喎僻其脉浮而遲者

可治又養生方云夜卧當耳勿得有竅風  
入耳中多令口喎也宜服小驅散方在急  
風部中

治賊風面目喎斜宜服附子散方  
附子 肉桂各二兩半 細辛 防風 人參

乾薑各三兩

右件六味為散酒下二錢

治一切風走疰肢節痛不可忍者神効小烏  
犀丸

烏犀 朱砂 天麻 羌活 芎藭 防

風 乾蠍 白殭蠶 甘菊花 地龍

蔓荆子 各一兩 乾薑 炮 牛黃 研入各

天南星 炮 敗龜 酥塗炙 白花蛇 酒浸去皮

肉桂 附子 炮 木香 人參 海桐皮

虎脛骨 酥炙令黃色 當歸 微炒各三分

右件搗羅為末鍊密和勻丸如小彈子大

每服一丸以煖酒或薄荷湯嚼下

治風痰壅盛胃膈不利大去諸般風疾四生

丸

半夏 半斤 天南星 五兩 白附子 四兩 大附子 二兩

右四味搗羅為末淨乳鉢內用水一斗半

浸逐日換水春夏三日秋冬七日頻嘗以

不麻人即去水於箆箕內以厚紙澄乾再

研細以糯米糊和勻丸如大雞頭大每服

一丸茶酒任下更入少龍麝尤佳

治大腸風熱結澁不通葳靈仙丸

葳靈仙 獨活 芎藭 檳榔 各一兩 川大

黃牽牛子 各一兩

右搗羅爲末鍊蜜丸如梧桐子大食前溫水下十五丸

治肺藏久積風毒皮膚生白瘰不止苦參散

苦參三兩露蜂房炙松脂炙附子炮梔子人

木蘭皮三兩酒浸烏蛇去皮骨炙

右件搗羅爲末每服二錢溫酒調下

助道方

治中風氣逆證

中風氣逆有痰涎蘇合薑調灌下咽次用省

風小續命多增木麝二香煎

往往中風之證多因喜怒不常或飲食停

滯或怒氣傷神思慮過多損於心藏用局

方蘇合香圓參圓生薑自然汁化開灌下

咽喉次用局方省風湯小續命湯各加麝

香木香依法煎服

治年深惡毒瘡

瘡毒年深變癩風眼圓鼻陷遍身紅風油要

使烏沉和兩月調停有大功

切詳大風或年深瘡疾或鼻梁崩倒頭面  
生瘡不能已者局方烏沉湯五貼真大風  
油壹兩半用微火化夫風油成汁和烏沉  
湯又用厚麵糊爲元如梧桐子大每服三  
十元至四十元食後茶清調下空心臨睡  
服之一月二月必見神效

治風中半身不遂病

風中須將氣飲詳薑調蘇合橘皮湯省風續  
命徐徐進二藥仍須入木香

往往中風之證多因心腎虧虛喜怒不常  
或強食停飲或怒氣傷神過慮損心之所  
致也先用局方蘇合香元薑汁調數元分  
爲三服却用橘皮湯點服之次服省風湯  
小續命湯加木香依法煎服之

治中風口眼喎斜證

口眼喎斜是中風筋疼煩熱遍身中急煎五  
七加芍藥蘇合香元速有功  
風寒濕氣留滯經絡忽然手足頑麻口眼



喎斜項強筋疼遍身煩熱未可使用風藥  
宜煎局方三五七散加芍藥三錢用水三  
盞生薑十片煎取一盞半去滓作三次調  
蘇合香元三粒服餌留滓再煎

昇齋醫方

中風

三建湯治中風風涎不省人事

附子 天雄 烏頭

右件等分生用去皮臍薄切每藥一兩生

薑一兩同水三大盞王氏集驗方二大盞煎至壹盞

半去滓溫服王氏易簡方云治寒中

治卒暴中風未可服宅藥先以麝香煎五積

散灌之事林廣記同甚妙候醒隨證治之項碎錄同

蘇訓直李元特即中皆云

新武義唐丞季潤名灌云切記風中人不可  
便服風藥氣中人不可便服氣藥或覺有  
此證候急用真好麝香肉三錢乳鉢內研  
令極細以真清麻油不拘多少調令稀薄

可飲爲度卽令患人壹服頓盡須辨菜子  
油不可用藥少卽見效遲如牙關緊卽擊  
開灌入候少甦省然後服紫湯其方用川  
獨活刷洗去沙土薄片切以豆淋酒煎濃  
汁服之累服至一二斤無害服此二藥永  
無手足偏廢語言蹇澁之患後見得是中  
風只服小續命湯之類見得是中氣只須  
服勻氣藥自然無事也渠作漢東教官得  
之太守張少衛名玠云屢試有效季潤亦

以治數人矣云麻油麝香又勝麝香煎五  
積散

治大人小兒虛風呵欠止吐化涎白附子散

白附子半兩 天南星半兩 黑附子炮去皮一分

右爲細末每服二錢水一盞薑五片慢火  
煎六分不拘時候服小兒一錢水一盞姜  
三片慢火煎不住手攪勻至小半盞分三  
服吳內翰宣和癸卯在真州李博士景開  
以治其孫甚効紹興辛亥康州陳侍郎彥

修病風虛極昏服三四服醒然遂安

治風濕及卒中

生料五積散二錢順元散一錢水一盞半  
生姜五片同煎至八分去滓稍熱服

順元散出良方沉在中叔祖錢氏時得此方  
賣於民間故吳中至今謂之沉家五積散大  
抵此藥能溫內外但內外感寒脉遲細沉伏  
手足冷毛髮恂慄傷寒裏證之類大啜三兩  
盃當手足溫或汗乃愈今世名醫多用此藥

治氣厥功和一切氣通包絡

王氏集驗無出方血絡

此藥良方所述如此○得效方治卒中昏不  
知人口眼喎斜半身不遂咽喉作聲痰氣上  
壅六脉沉伏或浮盛兼治痰厥飲厥及氣虛  
眩暈

烏頭二兩附子

天南星

各一兩三味皆炮

木香

半兩

右為麤末每服三大錢水一盞半薑七片

煎至八分稍熱服紹熙辛亥耿侍郎微中  
服此而愈後表弟唐仲舉因冒風濕手足

緩汗集驗方 略不能動伏枕已三日欲轉  
 側須三數人扶策甚以為慮予教令服此  
 只三服次日履地脫然并風濕證不必加  
 五積散○得效方又云風濕卒中五積  
 散合和服 不省人事細辛皂角少許為  
 末或只用半夏為末以蘆管吹入鼻中候  
 噴嚏少蘇然後進藥 痰涎壅盛每服加  
 全蝎五枚仍服養正丹每服三七粒鎮墜  
 之以其用硫黃黑錫皆有益則痰涎隨

去矣因氣中者以沸湯化蘇合香圓一粒  
 乘熱灌下仍用前藥汗濃磨沉香汁少許

同煎一沸服之 四體冷厥用靈砂丹歲  
 丹二七粒兼服方並見傷寒

三聖散大治手足風痺諸方手口眼喎斜左  
 癱右瘓骨節酸疼脚弱無力行步不平一切

風疾簡易方 又名舒筋散

當歸洗焙○諸肉桂去皮玄胡索灰炒○醫  
 成南北經驗方袖珍方承類  
 鈐方微炒衛生易簡方炒

右等分爲細末每服二錢溫酒調下空心

臨臥日進三服除孕婦外者悉皆可服朱氏

集驗方湘中黃槐卿父子三世用此藥功效甚多

醒風湯專治男子婦人左癱右瘓口眼喎斜

中風口噤全不能語及半身不遂手足頑麻

一切風疾並皆治之

天南星二兩大北扶甘草二兩防風兩

去蘆頭

爲麤末每服二大錢水二大盞煎至中盞

空心溫服

圓南仲顯治二十年前左癱右瘓口眼喎斜五種脚疼服龍虎丹又名火龍元

地龍四兩玄胡索四兩松節二兩核桃肉五十

介乳香三錢螻蛄四十蜈蚣二條沒藥三錢草烏頭

四兩生蝎酒十四介螻蛄蝎蜈蚣頭三味用好不去尖蝎酒一升同煎十數沸取出焙乾

右爲細末用煮肉藥酒打糊爲元如梧桐

子大每服十元左癱右瘓麝香酒下合時

就地對南寫火字一箇鋪紙一張在上朝

東望太陽取氣吹在藥上用蓋蓋道火龍  
真言參次吹在藥上真言唵勅老肥偃偃  
婆摩訶郭醫云廬州李副將得此疾以火  
龍元四生元相間而服不一年病去八九  
分四生元見和劑局方

大聖丹博濟方名烏龍丹修製不同

川烏

去皮尖臍切作片子五兩

五靈脂

生用新者五兩

右擣羅為細末入腦麝少許滴水搜和如  
彈子大每一元年五十以上者分作四分

有年紀人作六服取生薑自然汁隔宿浸  
軟就蓋內以手調開用薄苛酒化仍再入  
腦麝少許於酒內合此藥時以三月三日  
五月五日六月六日或辰日勿令孕婦雞  
犬見元就以米篩先鋪穰草將藥元攤在  
上有風處蔭令自然乾收之不得罨損以  
紗絹袋懸之拈此藥了不得以手擦眼服  
此藥須忌兩時熱物治男子婦人中風半  
身不遂言語蹇澁行步不正諸藥無効或

久遠鶴膝風暗風無不治之服至三十日  
除去根本小兒分作八服十五弟深患暗  
風十餘年得此藥遂安

治暗風

蛇黃 不拘多少米醋燒淬七次

右為末每服二錢溫酒下數服便愈年逐  
者亦效

治暗風百日內者禹錫姪乳媪親曾得効

天南星 二兩大者掘地坑深尺餘火煨令紅去火安頓南星在內隨手以米

醋沃之瓦盆蓋一伏待取琥珀 二錢通明出洗去灰土焙乾為細末

朱砂 半兩別研

右拌勻以獾猪心血為元如梧桐子大每  
服十五元人參或麥門冬湯下臨臥服

靈効元治男子婦人痛風錢教授聞禮

錫磷脂 甘通紅 白膠香 好明淨 五靈脂 如

青成 當歸洗淨 白附子 沒藥 香白芷

草烏頭 去尖糯米炒令黃色 桑柴灰 多是純桑下

雜各一兩

右為細末用糯米糊元如梧桐子大每服  
三四十元空心臨卧温酒下

錫磷脂元

錫磷脂兩一自然銅二兩同入甘銅內天雄

一對炮附子一對重六錢草烏頭二兩炮

去皮臍防風 沒藥 天南星炮赤小豆炒白殭

蠶 白附子 破故紙炒川草薺 五靈

脂 胡蘆巴 白膠香各二兩乳香半兩糯米

三合骨碎補四兩

右一十九味為細末好無灰酒糊為元如  
梧桐子大每服三二十元更量虛寒加減  
胡桃酒送下空心服大治諸風神效竺叅  
議操傳云得之江東路鈴韓宗愈叅議之  
子友仁苦癱瘓服藥踰年不効得此方初  
服便覺稍減服至一料遂能行履聞韓嘗  
以醫數人皆有效也

治痛風高監之子服

煎小續命湯下防風元



治手足十指疼痛麻木醫方大成集成南北經驗方袖珍方類

鈐方麻木不仁孫盈仲嘗患此其祖善鑿云有風而

非虛以此藥治之而愈得效方名香附湯

附子 木香

右二味等分剉為麤末用薑如常法煎木

香隨氣虛實加減如治足弱去附子用烏

頭甚妙簡易方同

除濕湯治一切中濕自汗漸漸惡風翁翁發

熱陽虛自汗呼吸少氣風濕風溫表實裏虛

表虛裏實腠理開疎氣道壅塞虛汗盜汗目

黃身腫小便不利胷膈溢滿腰疼體痛嘔吐

涎沫葛丞相云甚有效驗

白朮 白茯苓 蒼朮米泔浸 藿香葉去土

草 橘紅 厚朴 半夏各一兩 附子六錢炮

生薑二兩

右厚朴半夏生薑一處擣作餅子焙乾同

衆藥為麤末每服三錢水二盞姜錢十片

煎至一盞不拘時候

蠲痺湯葛丞相方○朱氏集驗方治風濕相搏身體煩疼項臂痛重舉步艱難及手足冷痺腰腿沉重筋脉無力

羌活去蘆 薑黃去土酒宿 當歸去土酒宿 黃耆蜜炙 赤芍

藥 防風去蘆已上 甘草炙 牛兩

右咬咀每服半兩水貳盞薑五片煎至一

盞去滓溫服集驗方不拘時候 ○簡易方治證與集驗方

同羌活赤芍藥姜黃當歸酒浸黃耆蜜炙 防風

去蘆各甘草炙 牛兩 右咬咀每三錢水一盞

生薑五片煎至半盞醫方大成集驗方南北

鈞方煎 去滓溫服經驗方袖珍方永類

治臂腿之間忽一兩點痛著骨不可忍

芫花根

右一味研為細末米醋調隨大小傅之立

止廬州郭鑿云此陶成一醫者方曾以治

一婦人產後而得此疾者良驗但敷貼不

住須以紙花覆其上用絹帛扎定也

回陽湯治丈夫婦人無問老幼卒暴風中氣

中左癱右瘓手足不遂語言蹇澁目眼喎斜  
筋脈攣縮半身不舉不省人事屢用果有神  
效漢陽卓教授名楫傳

乾姜炮裂益智仁 大川烏炮去皮臍已青

皮半附子一隻七錢重者生用去皮臍

右為咬咀每服秤半兩水二大盞生姜十

片棗子一枚入塩少許同煎七分去滓空

心食前温服併滓再煎簡易方醫方大成

補珍方永類鈞方同

治洗頭風

新通草於新尾上燒存性

右為灰每服二錢熱酒調下牙關緊者幹

開口灌瑣碎錄澹軒方同

治大病後虛頭痛瑣碎錄四桂散將煎熟時

入好鴈茶一錢服之良甚

治頭風葉椿

白殭蠶去絲良薑等分

右為細末每服半錢白梅茶清調下臨發

時服

又方川芎

二

附子

一兩

炮熟

地黃

半兩

須

酒

酒力弱力曝者宜賣者以綠繫搭色不中月或無即以好大川芎歸半兩代之

右咬咀每料分作五服水一大盞生薑三

片棗一枚同煎至六分去滓入細磨木屑

水一蚶殼再煖令熱服張裁衣得此方屢

以醫人皆立效

治頭風

大川烏

天南星

等分

右為細末每服半錢水一大盞白膠半箇

生薑五片煎至五分服久服可去根本

治偏正頭風墜痰涎散滯氣寬胷鬲久服清

頭目強腰膝十味如神充

晉礬

枯

半夏

四

升

天

門

冬

心

南

星

欬

一

分

大者

曹

五味子

各

兩

麥

門

冬

心

遠

志

各

一

分

兩

甘草

白朮

各

一

兩

人

參

各

一

分

兩

一

分

右為末生薑自然汁調飛羅麩煮糊元梧

桐子大朱砂十分為衣每服一元至十五

元食後臨臥生薑湯下峽州教授王執中  
 字叔權永嘉人其母患頭風臥病餘半年  
 徧服頭風藥雖少愈而未能去體偶何用  
 之來訪云祖母嘗因驚避戎馬奔走得頭  
 風疾數年有道人令服此而驗因傳其方  
 既服遂脫然王之母亦因風浪所驚自此  
 此疾故也或有因驚而患頭風者宜服此  
 藥王有針灸經刊行其自敘云余始本  
 香油療頭風白屑頭痒髮落頭旋妨悶等方

富次律云甚妙出四時纂要

蔓荆子三十介北附子零陵

香羊躑躅花早蓮子各一兩葶藶子兩

半以上七味細剉綿裹故  
 鏵鐵半斤碎用銼鐵亦可

右用生麻油一大升浸七日取以塗髮油

乾旋添藥氣盡即易之四時纂要

治紫白癜風石用生硫黃末以生薑蘸擦之

隨手去

又方生硫黃為末生薑自然汁數點調潤以

生附子或生烏頭截作兩段蘸藥擦之浴時先以生布之類擦動使藥

又方白礬硫黃等分右為細末以糟茄蒂蘸

藥擦患處須浴時使之○直指方治赤癩

白癩方硫黃明白礬並生右為末薑汁調茄

蒂蘸擦兩三次

治白癩風不拘遠近用烏雞卵一枚取清先

用硫黃碾為末以雞子清調勻用生布一

片將藥刷在布上日中曝反覆刷三四次

釘布子在板上令不皺候乾收起遇浴或或動作勞苦汗出之時將布子於患處擦之即愈

治紫白癩風四神散

雄黃 雌黃 硫黃 白礬並透明者

右等分研為末每用時先浴令通身汗出

次以生薑蘸藥擦患處良久以熱湯淋洗

當日色淡五日除根

治白癩風

草烏兩半 巴豆一分並細切

右用米醋和濕以布裏浴罷擦之頻浴為佳

治大風小四姪烏梢蛇三條事治令淨蒸煮熟去骨取肉焙乾為細末用宿蒸餅為元如米粒大以無烏雞食盡蛇三條然後烹雞取肉為末或元或散酒服之元時仍用宿蒸餅每服三五元甚者不過三雞即愈

治大風疾神仙退風丹華宮使方

知母 貝母 烏梅肉 海桐皮 金毛

狗脊去毛

右等分為細末煉蜜元如梧桐子大每日空腹日中臨睡各服三十元又每夜第一次睡覺時急於頭邊取三十元便服並用羊蹄根自然汁下大忌酒及房事一切發風之物只喫淡粥一百日皮肉漸皆復舊半年後無所忌服藥時須每夜專令一二

謹信人就病人睡處坐守才候第一次睡覺時便扶起喫藥一服妙處在此華宮使親見林承務名去疾服之取效治大風無如此神妙者若不能禁忌恐無益也

治紫白癩風

生砒霜 白礬 泥礬各一錢

右為極細末重羅用生茄子蒂擦患處先浴後擦

治皮風紫白癩風

赤芍藥 當歸 苦參各半兩 赤土一兩

右為細末生豬脂貳兩熬油去滓同蜜一兩作一處調藥隔一宿每服一大匙熱酒調下空心食後各一服二藥並忌雞鴨無鱗魚豆腐等刀鐮張仲友方

治大風漢陽水軍王統領方

苦參 地龍去土

右等分為細末看病淺深多小隨意服茶酒任下不拘時候皮膚有破處用五靈脂



細末以清麻油調塗之

治破傷風及金刃傷打撲傷損張彌明知府

家傳 御醫李子厚方黃臍一塊熱酒化

服立差 瑞竹堂方同 ○堂方又云與前治破傷

風玉真散一對連用 經驗秘方同玉真散因方陽風書

治緊急破傷風神應元華宮使方

半夏 一兩半 草烏頭 三兩 戟 一兩 去殼

右生用同為細末好棗四兩換水煮爛剝

去皮同藥擣成劑元如蓮子大緊者無灰

酒磨一元慢者半元吐涎或瀉勿疑輕者  
不須服更審量老幼歲數虛實加減之宮  
使名光祖向任統制官嘗重傷服此得效  
瑣碎錄

中風

中風涎潮昏塞不語者可先將通關散搐鼻

關竅一通即與大寶丹無或用牛黃清心

貞

中風口眼喎斜鱗魚血調草麻子肉拌勻左

患右塗以正爲度

凡卒中只灌生薑自然汁久自能醒絕妙

中風無藥備用急取頂心髮一撮毒掣之以

省人事爲度

事林廣記同

中風先服蘇合香元及小木香元

凡人初中風切不可先喫風藥及附子先喫

氣藥後喫附子不妨

事林廣記同

中風人醫得手過頭方是復舊

大風

大風疾以花蛇生者浸酒頓服大驗昔有監  
酒官患此一日詣釀酒處徧嘗有一銅酒  
氣味特勝以問酒工荅云昨浸死一蛇不  
敢申報其蛇只在銅後視之有香氣其人  
知其花蛇也盡飲此酒一月而愈○永類  
鈴方真花蛇散服之效太山老叟患此家  
人棄之土窖中得飲病安其飲瓮酒經兩  
月不知有蛇隨其中酒盡但存蛇骨在瓮  
中

患大風不拘久近用真麻油半鋼入坐其中浸七日無不差者

頭風

偏正頭疼夾腦風用地龍去土焙乾一分乳香半兩別研為細末每用半錢以紙一條摻藥在上撚作紙撚不蘸油香爐上燒煙熏鼻內

破傷風方以草烏頭生為末擦在傷處候覺痛以好醋擦之

又破傷風浮腫用蟬蛻不以多少為末葱涎調塗破處即時取去惡水立効

又破傷風有立殂者唯以鰾膠一錢七封之又酒服一錢七則立甦醒

又破傷風如瘡腫痛者急尋路行人糞下土調傅之立効

簡易方

家藏方清神散治風壅熱甚咽膈不利

荆芥穗 龍腦葉各二兩 甘草一兩 川芎炒

牛蒡子

炒各半兩

右細末每服二錢沸湯調食後服

本事方清氣散調榮衛順三焦治風壅消痰

涎退煩熱

前胡

柴胡

去蘆

川芎

枳殼

白朮

青

皮

羌活

獨活

甘草

炙茯苓

去皮人參

等分

右為末每服二錢水一盞荆芥一穗煎七

分服此方敗毒散中去桔梗加白朮青皮

增損亦有理用之良驗 家藏方治厚壅

熱盛涎潮氣急煩躁不寧身熱作渴恍惚

驚悸用牛黃石膏

各一兩半

南星麩

一大黃

煨

姜蠶

炒去絲粉草

炙各半兩

朱砂

三錢別研

腦子

三錢別研

右為末每服二錢食後新汲水調服亦名

清氣散

家藏方清涼丹治風熱壅實上攻頭面口眼

喎斜語言不正肌肉攣動面若蟲行一切風

熱 治傷寒熱甚狂言昏冒剛瘧並皆治之

天南星 四兩臘月用黃牛膽製者 牛黃 別研三兩 蝎梢 去毒炒

石膏 各一兩半 犀角屑 防風 去蘆 甘草 炙 真珠

末 白花蛇 酒浸取肉 朱砂 別研 大黃 各一兩 腦子

半兩別研

右細末研勻煉蜜元每兩作十元每服一

元薄苛湯化下食後臨臥服

和劑方人參順氣散 易名通氣驅風湯 治男子婦人

血氣虛弱虛風攻挂肌體顛掉肩背刺痛手

脚拳攣口眼喎斜半身不遂頭目旋暈痰涎

壅盛語言蹇澁行步艱難心忪氣短客風所

湊四肢拘急鼻塞頭疼 得效方鼻塞重 脾胃不和

心腹刺痛胃膈不快少力多困精神不爽不

管見大全良方作可 思飲食嘔吐惡心霍亂吐瀉 胎

前產後但是氣虛百病皆可服之 常服調

榮衛進食去風通滯氣

天台烏藥 五兩 桔梗 去蘆 川芷 川芎 甘草

炙 陳皮 去白 白朮 各二兩半 ○得麻黃 去根

枳殼 去穰麩炒 乾姜 炮七錢半 ○人參 去蘆

兩半

右細末每三錢水一盞姜三片良方棗一

介煎八分食前服 傷風鼻塞頭疼葱白

薄荷同煎 婦人血氣當歸煎 一方去

白朮人參加僵蠶炒去絲黃每乾姜半細

末生姜薄荷同煎 治風氣不順手足偏

枯流注經絡并濕毒進襲腿膝攣痺筋骨

疼痛大有功效若用治氣去薄荷增棗煎

名烏藥順氣散 血虛生風氣痺之狀亦

類中風世人呼曰中氣所謂執則生風蓋

大綱之論其實疼痛癱瘓縱掣攣痺之證

因於血虛氣不流行者為多間有起居不

節為賊風所中亦必因虛而得故治風以

暖散中通良方為先通則痰氣不薰蒸風

亦自得以攄散小續命湯古今治風良方

也但無通氣藥不可獨用復以此藥兼而

治之成功必矣○得效方右為末每服三

錢紫蘇木瓜煎湯調下去白朮加乾薑僵

蠶名烏藥順氣散卒中風氣不順手足偏  
 枯流注經絡四肢骨節疼痛或身如枚片  
 舉動不得筋脉拘攣先宜多服得手足間  
 微汗為妙又脚氣步履艱難脚膝軟弱婦  
 人血風老人冷氣上攻胸臆兩脅刺痛咳  
 嗽心腹膨脹為散每服四錢生薑三片紅  
 棗二枚煎服或閃挫身體不能屈伸温酒  
 調服遍身搔痒抓成瘡薄奇煎服常服踈  
 風通滯氣調榮衛進飲食大有神効一方

每料加天麻一兩沉香五錢亦効並不拘  
 時候直指方治諸風戰掉拳攣眩暈嘔邪

麻痺疼痛川芎桔梗白朮白芷陳皮枳殼

炒甘草各一兩麻黃去節天台烏藥去心各一兩半

參白薑煨各半兩右為末每二錢薑棗煎服簡

奇方加減順氣散治男子中風癱瘓手脚  
 拳攣口眼喎斜半身不遂頭目旋暈痰涎

壅盛語言蹇澁行步艱難等証天台烏藥

五兩桔梗去蘆川白芷川芎甘草炙陳皮去白

木

各二兩半

麻黃

去根節

枳殼

去穰麩炒

人參

木

香

各半兩

右

吹咀

每服

七錢

重水

二盞

半生

薑五片煎至八分去滓無時服

葉氏錄驗方通頂散初中風口噤不省人事者先用此藥搐鼻令醒方用別藥 傷風頭疼昏眩妙甚

黃躑躅

一分

雄黃

一分

細辛

半兩

右三味和停不省人事時挑少許搐入鼻中即醒涎出口開方可投藥 治卒中口

噤不省人事者用細辛皂角各少許為末

或止用半夏為末以蘆管吹入鼻中候噴

嚏甦後進藥 藥證病源云或失音不語

精神昏憤者如能言語牙關緊急者用細

辛末搐鼻又揩牙一法用白梅擦牙更以

薑蒲末著舌下牙關即開倉卒皆可選用

朱氏集驗方同

楊氏方天仙膏治男子女人卒暴中風口眼喎斜



天南星 草烏頭 各一 白僵蠶 七 白及 一

○袖珍方一介

右細末生鮮血調 得效方袖珍 付囑處覺

正便用溫水洗去 天南星末生姜汁調

攤紙上貼之左囑貼右右囑貼左纔正便

洗去名天南星膏

資壽方解語湯治中風客於心脾二經舌強

不能言半身不遂口眼喎斜神氣不清一切

風氣並皆治之

附子 炮 防風 去 天麻 酸棗仁 各一兩

各二 羚羊角屑 官桂 各七 甘草 炙 羌活

兩各半

右為麤末每半兩水二盞 醫方大成集成

方每服四盞 煎入分去滓入竹瀝兩匙再煎

錢水一盞 三兩沸溫服無時二滓併煎 取竹瀝法

見前治中風不能言四肢不收手足躄曳獨

活白芍藥桂心括樓根 各二 甘草 三 剉散

每四錢姜五片水二盞煎六分去滓入生

葛汁一合和服名獨活湯 脾脉絡胃俠  
咽連舌本散舌下心之別脉係舌本今心  
脾二臟受風邪故舌強不能語也

楊氏方神栢散治中風不省人事涎潮口噤  
語言不出手足躄曳得病之日便進此藥可  
使風退氣和不成廢人 得效方袖珍方經驗  
良方此下云卒有此

證無藥去處  
用之得力

栢葉 一握 去枝 葱白 一握 同根 ○  
右同研如泥用無灰酒一升同煎一二十

沸去滓溫服 朱氏集 驗方同 不拘時如不飲酒須

分作四五服服盡方進他藥

許學士方救急稀涎散治中風忽然昏若醉  
形體昏悶四肢不收涎潮於上鬲氣閉不通

方見衛生  
十全方

勝金圓治證如前 一名朱 砂圓

朱砂 半兩 別研 生薄荷 半斤 瓜蒂末 藜蘆末 各一

兩猪牙皂角 二兩 搥碎和薄荷 一處搗取

良方永類鈐方搥碎水一升與  
薄苛一處搗取汁慢火熬成膏

右將朱砂一分良方與二味研停用膏子  
搜和圓如龍眼大以餘朱砂爲衣溫酒化  
一圓甚者二圓以吐爲度得吐卽省不省  
不可治 必用方論中風無吐法引金虎  
碧霞爲戒且如卒暴涎生聲如引鋸牙關  
緊急氣閉不行湯藥不能入命在須臾執  
以無吐法可乎但不當用銀粉藥恐損脾  
壞人四肢爾許學士云予用此二方每每  
有驗其或基本素弱痰浮於上乃精液不

守却忌於吐吐甚痰脫則精竭而斃矣法  
當以好丹鎮墜以主氣用南星附子發痰  
歸經乃爲善治○醫林方治同前法如稀  
涎散不能涎出可用此藥薄荷錢猪牙皂  
角二錢搗水一升右右芡蒂一錢微錢藜蘆一  
爲硃砂半錢右將四味和皂角膏爲丸如  
櫻桃大每服三丸溫酒化下以嘔吐出涎  
爲度二藥涎吐不出其病難愈如吐不止  
以葱白湯止之

全生方虎骨散治半身不遂肌肉乾燥漸漸  
細瘦時或疼痛由血少氣勝風邪留於脉絡  
榮衛不得運行名曰偏枯謹勿用麻黃藥發  
汗重亡津液愈耗其血也當潤筋去風

當歸二兩赤芍藥 川續斷 白朮 藁本

虎骨各一兩烏蛇肉半兩

右為細末每二錢溫酒調下食後服 骨

中煩疼加生地黄一兩 臟寒自利者加

天雄半兩醫方大成集成南北經驗方袖珍方永類鈐方同

雞峯方活血丹治一邊足膝無力漸漸乾瘦  
上牽脇肋下連膝脛筋脉攣急妨於步履由  
病後重亡津液血少不能榮養於筋故也

乾地黄三兩白芍藥 當歸 川續斷 白

朮各一兩

右為末酒糊元梧桐子大每三十元溫酒  
下

太乙神精丹治風痲 尸厥 鬼疰 飛尸

雄黃油煎七日雌黃 丹砂光瑩者曾青 磁石

各一 金牙石六錢

右各研細將雌雄二黃丹砂醋浸三日曾  
青用好酒於銅器中浸紙封曝百日急用  
七日亦得如天陰以火焙乾六味同研勻  
用砂合盛令藥滿得三分許以此準合子  
大小先以赤石脂末固縫外用六乙泥固  
濟訖須候透乾以晴明六合吉日合別用  
泥作三介柱子高五寸令平穩如鼎足狀  
安合子下置火三斤逐旋添炭常令及五

斤只在合底不得過口五日為度放冷水  
中浸合子候泥透剝去泥將合子輕手取  
開其藥精英五色盡在蓋上亦有三色者  
純白為上研細棗肉圓如粟米大每一粒  
飲服如口噤牙緊去前兩齒灌下即甦合  
六乙泥法礬石黃泥裏火燒一伏時研細蚯蚓糞鹹土  
搵黃礬遠看如金絲色精明其色本綠以黃泥裏火燒通赤如血取研各用  
一黃泥斤右同為末以紙筋一處攪和成  
泥

葉氏方天香散專治久年頭風甚者只一二服永除病根

天南星 半夏湯洗令滑淨切川烏去皮白芷各等分

右咬咀每四錢水三盞煎去一半入姜汁

半盞煎至八分溫服忌房事

家藏方拒風圓治風虛痰厥頭疼旋暈如舟

車之上

半夏湯洗七次南星各二兩川芎 防風去蘆羌活

去蘆獨活去蘆藁本去土細辛去土各一兩

右細末姜汁糊丸梧桐子大每三十元食

後姜湯下朱氏集驗方同

本事方定風餅子治風客陽經邪傷膝理背

脊強直口眼喎斜醫方大成集成南北經驗方袖珍方承類鈔方作言

語寒濕體熱惡寒痰厥頭痛肉攣筋惕頰辛袖珍

方手顫鼻淵及飲酒過多嘔吐涎沫頭目暈眩

如坐車舩 常服解五邪傷寒辟霧露瘴氣

爽惠神志諸風不生

川烏 南星 川芎 乾姜 甘草 半

夏 天麻 白茯苓 等分生用

右細末姜汁元龍眼大作餅干生朱為衣  
每服一餅細嚼熱生姜湯下不拘時常  
服預防風疾

本事方玉真元治腎虛氣逆上行頭痛不可  
忍謂之腎厥

硫黃 二兩 硝石 一分 石膏 煨赤 半夏 湯洗七次

右末姜汁糊元如梧子大陰乾每二十元  
姜湯或米飲下 三因方治諸如前用硫

黃 石膏 南星 焰消等分為末糊圓

如梧子大每三十元溫酒下名天南星元

又一方治腎厥痰飲頭疼諸藥不效用硫

黃川烏 炮去皮尖 朱砂 水飛 南星 炮裂為

末姜汁糊圓梧子大每十五元生姜薄苛  
湯下名硫朱丹

本事方釣藤散清頭目治肝厥頭暈

釣藤 人參 茯苓 茯神 防風 陳  
皮 麥門冬 去心 甘菊花 半夏 各半 甘草

一石膏一兩

右粗末每四錢水盞半姜七片同煎八分

去滓溫服 素問云頭痛顛疾下虛上實

過在足少陰巨陽甚則入腎徇蒙招搖目

頰耳聾下實上虛過在足少陽厥陰甚則

入肝徇蒙者如以物蒙其首也招搖者不

定貌目眩耳聾皆暈之狀蓋下虛者腎虛

也腎厥則頭痛上虛者肝虛也肝虛則頭

暈腎厥宜玉真圓肝虛宜釣藤散證治皆

殊故用藥亦異不可不明辨也

回陽湯治卒暴風中氣中癱瘓手足不遂語

言寒澁口眼喎斜筋脉攣急半身不舉不省

人事屢有神效方見是齋醫方

桃溪回陽丹治證與回陽湯同

川烏洗草烏各三兩洗地龍洗靈脂洗南星洗

一腦子麝香各少

右日乾細末蜜元雞頭子大初服半元漸

加小圓至大圓姜汁磨化溫酒先嚼薄苛



日午夜附服癱瘓不能行服三十圓必愈  
如中風不軟只口眼喎斜服二三圓効  
是齋方載回陽湯桃溪方載回陽丹二方  
治證同而用藥異皆漢陽軍章教授楫家  
傳而編在兩處今集歸一門服之者可奏  
十全之効矣

許學蹇方星附散治中風雖能言口不喎斜  
而手足躡曳脉虛浮而數風中腑也風中脉  
則口眼喎風中府則肢體癱風中臟則性論

危凡風中腑宜汗而解

黑附子 白附子 川烏 白僵蠶 沒

藥 人參 白茯苓等分 天南星 半夏二

薄切片姜汁  
浸亦等分用

右為粗末每服二錢醫方大成集成南北  
經驗方神珍方永鑑

三錢方水酒各一盞同煎至八分去滓熱服

二三服汗出差 曾在桐廬有人患此證

三投此藥得汗手足能舉

葉氏方萬金散治風補虛順榮衛通血氣

腰膝沉重脚弱無力鑿官杜壬以此治手足  
風累驗其婚孔宣傳

續斷 杜仲去粗皮切 防風 牛膝酒浸

辛者華陰 白茯苓 人參 桂去粗皮取有

當歸焙切 甘草炙各 川芎 獨活 秦艽去

熟乾地黃各半兩○得效方無續 加桑

生芍藥 各一兩

右粗末五錢七水二盞集驗方煎至一盞

濾去滓不拘時但空心熱服文潛云予嘗

左臂不隨後已痊愈而手指不便無力試

諸藥不驗遂服此藥纔半劑而愈得效方又去血

虛體弱加鹿茸 本方有白芍藥一兩共

十五味前十味秤兩同後四味各三 細末

每服二錢水一盞生姜三片棗一介同煎

七分空心前稍熱服名續斷湯 錄驗方

治手足麻木不仁防風去 秦艽去 羌活附

子炮去 皮臍等分粗末每三大錢水一盞半姜

三片煎至七分去滓入生地黄汁兩合再

煎數沸空心服名小防風湯

葉氏方十味剉散治臂痛醫方大成集成治中風血弱臂痛連筋及骨舉動艱難此藥亦補心益血養筋生力

附子三兩炮去皮劑當歸去土洗切黃耆炙白芍藥各二

兩川芎不火防風白朮各一兩半肉桂去粗皮

兩茯苓熟地黃洗淨用少酒熬令乾焙之各七錢半

右修製了再秤攷咀每四錢水一大盞姜八片棗三個擘開煎七分去滓通口服食

後臨臥方類鈐日三服温覆厚衣將養

去黃耆熟地黃用當歸去蘆淨洗乾焙白芍藥川

芎白朮人參生附子大者剉作片白茯苓

桂心去粗皮川獨活就羗活中揀色黃節勁者是各一兩防風

去蘆炙七錢半甘草炙七錢半細剉每三錢姜八片水盞

半煎八分去滓食前服除寒邪益血氣名

川獨活湯

資壽方黑龍圓治諸風疾夫風之為病半身不遂口眼喎斜手足拘攣或生禪曳語言蹇

澁心多驚悸其狀多端各隨所中此由氣血  
俱虛廢理踈弱風邪外中真氣失守邪正相  
干而生焉

自然銅一斤好者杵碎用生鏝銚子內以  
炭火一秤漸漸二成三煇起聞腥氣  
又聞似硫黃氣其藥乃成放冷取出如藥  
有五成者即其妙也然後安向淨濕土  
上著帛先觀其藥用盆子合之不  
一宿出火毒乳其藥內研細以水淨淘黑汁  
濃者取出更細淘又取濃者三五度淘  
澄定去清水用新瓦盆內將帛觀著令自  
乾如黑粉一○御醫撮要鐵銚子內以炭  
藥了當却入○御醫撮要鐵銚子內以炭  
火一秤漸漸三二斤逼藥銚子內以炭  
徐添火可半日以來其藥有鬼焰起聞腥

氣云云餘川烏四兩麻黃三兩黑附子炮  
同本方烏蛇酒浸一夕厚朴去皮姜防風

○撮要烏蛇酒浸一夕厚朴去皮姜防風

撮要蒼術炒麩川芎陳皮撮要白芷白

木炒黃各二兩○撮要紫花白芍藥撮要

藥一吳茱萸各一兩半○撮要南星半兩

要生用加乾淨揀水淘一七遍

右並為末與自然銅粉相和勻擣細入煉

蜜圓梧子大葛月合甚妙男女中風癱

瘕半身不遂起止不能者空心服臨卧豆

淋酒下一粒六十日內必差 男女患筋  
骨腰膝疼痛走疰不定坐卽刺腰臥卽刺  
背行卽入脚跟亦用豆淋酒下須臾以葱  
粥一盞投之衣被蓋覆出汗然後更喫一  
粒必差如或患五七日閒未得汗亦如前  
法服纔入口汗卽出便安依法服二十日  
定愈 治破傷風頑麻風暗風偏風並用  
豆淋酒下一粒至二粒卽見功效 丈夫  
元臟氣痛得效方臍下撮痛不可忍者以

檳榔一介酒磨一半入生姜自然汁少許  
同煎五七沸研二粒服之須臾以小麥麩  
醋拌炒熨臍下便止 治疰癖氣發時有  
搐得兩頭相就者用檳榔一介中分破一  
半生用一半炙黃一處爲末酒一盞葱白  
一握同一處煎葱熟傾盞內候酒得所時  
先呷兩口檳榔酒將葱白和藥一粒爛嚼  
以煎酒嚙之但依法服立效須臾間下洩  
三二十介得效方卽便愈 凡些小風疾

類聚 二十一 九十二

卽一服差忌動風有毒物休食

家藏方大通圓治證如後

川烏炮去皮 甘草微炙各八兩 寒水石二斤用砂合盛

炭十斤煨 肉桂去粗皮 荆芥穗 藿香葉去土

薄苛葉去土 藁本洗去土焙乾 香白芷 麻黃去根

不去節密 沒藥研別 天麻去苗 牛膝洗切 南星炮 甘松

去土 烏藥 川芎各三兩焙 乳香二兩別研

右細末合和糯米糊為劑每兩作十五圓

男子女人一切風疾每服一圓磨化茶酒

任下不拘時 卒中不語口眼喎斜左癱

右癱煨葱酒下 傷風頭疼夾腦風生葱

茶下 四肢頭面虛腫炒豆淋酒下 風

熱腫痛生姜薄荷汁同調酒送下 胃膈

痰實旋暈昏悶臘茶清下 渾身癢疹蜜

湯下 下臟風攻耳內蟬鳴煨豬腰子細

嚼溫酒送下 腰疼腿痛乳香酒下 風

毒攻眼冷淚昏暗菊花茶下 乾濕脚氣

木瓜酒下 婦人血氣攻刺當歸酒下

類聚 二十一 九十二

血風疼痛醋湯下

葉氏方靈寶丹治一切諸風癱瘓傷風等疾

川烏去皮尖五靈脂各三兩沒藥一兩胡椒

兩木香乳香研朱砂研麝香各一分和

右將前五味為細末擇辰日辰時取東方

井花水入乳香末和前藥末為圓如豆大

將朱砂麝香為衣每服一粒生姜二片同

嚼茶酒任下不拘時傷風頭痛胎

風荆芥湯下

家傳方烏龍丹治癱瘓風手足躄曳口眼喎

斜語澁步艱

大川烏尖皮臍并好五靈脂五兩○直指

右為末入龍腦麝香以多為妙直指方腦

研和滴水圓如彈子大每一圓用生姜汁

研化次以暖酒調服一日兩服空心食前

纔服五七圓便覺擡得手移得步服十圓

可以梳頭服三十圓定醫一人衛生易比

初中風一月內未可用緊風湯散先且化

痰消滯和胃順氣蓋以風虛未定未有所歸多誤投湯劑却言無功此藥只治得半年內者必不相誤合時三月三日五月五日六月六日神在日或辰日合之 百一方云合時勿令孕婦雞犬見就以米篩先鋪穰草却將藥圓攤在上有風處蔭令自然乾收之不得罨損以紗絹袋懸之拈此藥時不得以手擦眼服此藥了兩時勿喫熱物久遠鶴膝風暗風皆治之服至三十

日除去根本年五十以上者一圓分作四分更年紀作六服小兒作八服有人患暗風十餘年得此遂安名大聖丹 本事方治一切癰瘰風用生草烏不去皮五靈脂等分爲末六月六日圓彈子大四十歲以下分六服病甚一圓分二服薄苛酒磨下覺微麻爲度名黑神圓 究源方治諸風癩不問久遠用草烏去皮五靈脂等分細末猪心血圓如雞頭子大每服一圓薄苛生姜



汗浸湯食後服名保安圓 治卒急中風  
 癱瘓口眼喎斜語言不正不省人事米切  
 風證用川烏五兩炮五靈脂取淨二兩半沒藥  
 五乳香錢一研為末煉蜜圓彈子大每一圓  
 如服藥先以酒一盞姜七片薄荷七葉同  
 煎七分去滓候溫入腦子一字細嚼藥一  
 粒嘗氣少時用前酒送下臨臥服鎮江劉  
 節使宅傳得此方名夢仙備成丹 博濟  
 方烏頭用河水浸一伏時 本事方治一

切癱瘓風用川烏一兩五靈脂四兩乳香沿  
 藥各一兩先將沒藥於陰涼處當風細研更  
 用研了麝香一錢將下二味為細末然後  
 同前二味再碾再研滴水圓如彈子大薺  
 合收每服一元薄荷酒磨下名鐵彈圓  
 究源方手足躄曳言語蹇澁行履不止用  
 大川烏五兩去皮五靈脂五兩揀沒藥半兩  
 研入麝香不拘多少研細拌和滴水圓彈  
 子大每服一圓生姜汁研化熱酒浸量力

服之名烏龍圓

本事方麝香圓治白虎瘧癘諸風疼痛遊走

無定直指方此下有狀如虫噬管見大全良

如鎚鍛四字晝靜夜劇一切手足不測疼痛效

及脚痛

川烏大八角者三个全蝎二十个黑豆二十

○直指方去皮臍一方加赤足蜈蚣一條以

草烏代川

右細末入麝半字良方王氏集驗糯糊為

圓如菜豆大每服七圓甚者十圓夜臥令

膈空得效方溫酒下微出冷汗一身便差

予得此方凡是瘧癘及不測疼痛一二服

便差在欽川時有貴家婦遍身走疰疼痛

至夜則發如虫噬其肌多作鬼邪治予曰

此真瘧癘也三服愈

本事方麻黃散治瘧癘宜發汗得效方無汗

先發汗

羌活一兩細辛華陰黃耆各半麻黃一兩一分

方黃今三分得效方無

右為粗末每服五錢水二盞煎至八分去

滓溫服接續三四服有汗慎風

本事方茵芋圓治瘰癧腫滿疼痛

牽牛子兩郁李仁兩茵芋兩朱砂研薏苡

仁各一分

右細末煉蜜杵圓如梧桐子大輕粉裹為

衣每服十元至十五元二十元五更初溫

水下到晚未利可二三服快利為度白粥

將息永類鈔方同

本事方芎附散治五種痺腿并臂間發作不

定此脾胃虛衛氣不溫分肉為風寒濕所著

川芎 附子 黃耆 白朮 防風 當

歸 桂心 柴胡 甘草 熟地黄各等分

右為粗末每服四錢水一盞半姜三片棗

一介同煎至七分去滓食前日三服 常

服不生壅熱兼消積冷

本事續斷圓治風濕四肢浮腫肌肉麻痺甚

類聚二十  
九十八

則手足無力筋脉緩急

川續斷 草薺 當歸切微炒 附子 防風

天麻各一兩 乳香 沒藥各半兩 川芎三分

右細末煉蜜圓梧桐子大每三四十圓或酒或飲空心服

本事增損續斷圓治榮衛澁少寒濕從之痺滯關節不利而痛者

人參 防風 鹿角膠 白朮炮各七兩 乾地黃三兩 黃耆 川續斷 薏苡仁 牡丹皮

桂心 山木萸 白茯苓 麥門冬 山

芋 石斛各一兩

右細末煉蜜圓梧子大每服三四十圓温酒空心下

本事方粥法治風寒濕麻痺不仁生川烏末

右用香熟白米作粥半碗藥末四錢同米用慢火熬熟稀薄不要稠下姜汁一茶脚許蜜三大匙攪勻空服啜之温為佳 中

類聚二十一  
九十九

濕入薏苡仁末二錢增木作一中碗服  
 此粥大治手足四肢不隨痛重不能舉者  
 有此證預服防之左氏云風淫末疾謂四  
 肢為四末也脾主四肢風邪客於肝則滯  
 脾脾為肝尅故疾在末穀氣引風濕之藥  
 徑入脾經故四肢得安此粥劑極有力予  
 嘗製此方以授人服者皆驗

聖惠方枳實酒治遍身白疹癢痒不止切不  
 可全用風藥治之蓋寒邪伏於肌膚相搏

凝滯而成瘡或天色冷則重或因患風中  
 若遇天晴日暖則輕宜用人參順氣散得  
方為藥為妙更與此酒服累用神効枳實  
順氣散不拘多少麵為粗末每服二大錢用酒浸  
炒黃切片少時去枳實但飲酒最妙用水煎枳實洗  
 患處尤佳

醫方類聚卷之三十