

醫方類聚卷之二百二十八

婦人門 二十三

坐月 二

婦人大全良方

產寶方周頊序



頊聞至靈者人最重者命人皆知命之所重而不知養命之方天年未終疾病攻奪嗟乎世無良醫著述則急難倉卒尋醫其舛誤多矣醫之中惟產難爲急子母性命懸在片時

類書卷之三十一
一
通勤志方書常思救療每覽名醫著述皆誌於心且夫男女構精陰陽分氣就中女弱疾狀頗多蓋其稟柔質以爲人有血藏而抱育妊娠之內導理有常至於飲食之間動靜之際尤多制忌以節性情及乎既產鮮保安者蓋是損觸藏府傷動筋骨將理稍失疾患便生更值盲醫取次下藥致其所苦積漸懸危日復一日亟至于死可不痛哉故易曰天地之大德曰生則知在天地之間以生育爲本

又豈因生產而反危人之命乎自惟攝理因循藥餌差謬致其產婦不保安全且婦人生產方二三次血氣未衰飲食易進但能節性則無病生縱或偶有微病不難醫治至於四五次迫乎七八次傷敗已深血氣衰微子藏虛弱穢敗內滯風邪外攻若有病生宜須審療醫若不予細疾便危殆此醫殺之理甚明矣且仕俗之家婦人產後復乳其子產旣損氣已甚乳又傷血至深蠹命耗神莫極於此

稍失常理便合急醫或以家貧不及厚賂醫者醫者怠慢須臾困篤吁人之生產非小事也而醫者圖財侮而致死此醫殺之理又明矣且夫產前產後血氣未寧一疾苟生百疾同作古人所以著方論於產乳者正在此也至若鯉魚阿膠能治胎動芎藭當歸善療胎痛祇如胎動胎非一理也有因母疾而胎動者痛亦如之此略舉大綱蓋須知醫者之功也降及地黃益血生薑助氣芍藥止痛黃

者補虛用之得門其効如聖用之失理不如不醫乃知醫人不可苟作題以此疾心常思著方以濟危急而學解不博未能自信所以偏採產術志在廣行復見各殷產寶答子深切入醫門乃大中歲相國向敏中傷茲婦人多患產難詢訪名醫思救人命或人舉殷相國迎召問其產乳殷乃撰方三卷贄於相國相國重其尚要命曰產寶此方雖存得者其少題志在愈疾常恨不家藏一本故輒敢序之

蓋欲開其衆聽凡五十二篇三百七十一方
兼拾咎氏之遺作小論三篇次於序末庶幾
姪娠之家自得覽斯爲家內明師爾時丁巳
歲秋八月序

將護孕婦論

凡婦人姪娠之後以至臨月藏府壅塞關節
不利切不可多睡須時時行步不宜食粘硬
難化之物不可多飲酒不可亂服湯藥亦不
可妄行鍼灸須竟神減思慮不得負重或登

高涉險若偶然胎不安腰痛者須服安胎藥
一二服得安卽止周顛論曰生產雖然觸穢
排北須要在先入月壹日貼產圖并日遊胎
殺所在并借地法於姪婦房內北壁上仍依
位設床帳厚鋪茵蓐周密使無孔竅夏月亦
鋪厚薦用好油單薄席紗帳以備之常焚香
令潔淨備辦湯藥器物旣覺欲產不得喧闐
人力雜亂大小愴惶驚動產婦宜預擇年高
歷練生婆壹人并穩當曾經慣婦人壹兩人

扶持不得揮霍恐產婦憂驚又忌閑雜外人
并喪孝穢觸之人看視切不得驚動傷早若
坐婆拙不能體候胎氣方轉動之際便爲欲
生多端下手驚動傷早則橫倒之憂從此而
致也

產寶方云妊娠欲產腹雖痛而腰不甚痛者
未產也且令扶行熟忍如行不得則凭物扶
立行得又行或衣漿先下然後作陣藥腹痛
眼中如火生此是胎離腎經兒逼產門也卽

服催生藥一二服卽扶上蓐草切不可坐草
早務要產婦用力存養調停亦令坐婆先說
諭之如覺心中煩悶可取白蜜一匙用新汲
水調下或覺飢卽喫軟飯或粥少許亦須預
備勿令飢渴恐產婦無力困乏也若不飢渴
亦不須強食大凡生產自有時候不可強服
催生滑胎等藥或因坐草早勢不獲已則服
之若無事強服恐變生他疾又須戒之

逐月安產藏衣忌向方位

凡安產藏衣方位並於卧閣內分布太平聖惠方云凡姪婦初入月便寫產圖一本以朱書某月某日空貼在某位如正月在丙壬可於壬位安產婦床帳丙位藏衣之類貼掛在產婦房內北壁上若值閏月只看節氣用之又云每月產圖有雷公招搖運鬼力士天狗軒轅大時咸池吳時豐隆白虎大夫天候狂虎凡十三神並從月建易其位所謂月空者按內經云月廓空無寫王冰注云論月輪中

空日也卽非十三神之數今太平聖惠方以六陽月在丙壬以六陰月在甲庚正如外臺所言正月在丁壬至十二月在甲庚之類其理一也但外臺言之詳聖惠言之簡耳今人多依聖惠方者特從其簡而已或云凡逐月安產藏衣並向月德月空方位所有十三神殺並從節氣更換若交次月節便作次月用書產圖者非也假如正月十四日立春若姪婦十三日乳卧豈可作去年十二月用也必

依月分用之乃是若依節氣更換則天德月
德所在差矣然月空與壬謂之中天空頗相
類議者以爲天空者非十三神之數蓋課中
有天乙貴人其位無可與對者故此空是謂
天空值此神百事不宜止宜安產婦床帳藏
衣之類耳集聖曆云天德正月在丁二月在
坤三月在壬四月在辛五月在乾六月在甲
七月在癸八月在艮九月在丙十月在乙十
一月在巽十二月在庚又堪輿曆有遊年白

虎殺神在大歲後一辰如太歲卯則白虎在
寅餘倣此推之若產及藏衣犯之則子母皆
不利也

王子亨云難產逆生論稱犯一切神殺固
有是理然亦有自然難產兒自逆生者及
有產腸胃俱下者產已則復如故此非疾
病所致氣血所主天下之理蓋有不可窮
詰者亦宜知之

推婦人行年法

生	方	反	支	方	禍	害	方	總	命	方	懸	尸	日	閉	財	方	入	壯	方	產	財	宜	宜	宜	喚
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

十三歲行年在庚申坤 月正七 離 巽 日辰戌在正

西偏在正東 黃色 西南 西南方黃 衣師看產

北辛偏北 甲衣 首 西南 西南方黃 衣師看產

十四歲行年在巳未離 月二八 坤 兌 日卯酉在正

北偏在正北 赤色 正南 正南方赤 衣師看產

西壬偏東 癸衣 首 正南 正南方赤 衣師看產

十五歲行年在戊午坎 月三九 乾 艮 日寅申在正

北偏在正北 黑色 正北 正北方黑 衣師看產

東癸偏西 壬衣 首 正北 正北方黑 衣師看產

十六歲行年在丁巳震 月四十 艮 乾 日丑未 在正

東偏在正西 青色 正東 正東方青 衣師看產

北甲偏北 辛衣 首 正東 正東方青 衣師看產

十七歲行年在丙辰艮 月五十 震 坎 日子午 在正

東偏在正西 黃色 東北 東北方黃 衣師看產

南乙偏南 庚衣 首 東北 東北方黃 衣師看產

十八歲行年在乙卯乾 月六十 坎 震 日巳亥 在正

南偏在正南 黑色 西北 西方黑 衣師看產

東丙偏西 丁衣 首 西北 西方黑 衣師看產

二十歲行年在癸丑巽 月二八 兌坤 日卯酉 正在

西偏在正東黃色 東南東南方黃 南庚偏南乙衣 首衣師看產

二十一歲行年在壬子坤 月三九 離巽 日寅申

在正西在正東黃色 西南西南方黃 偏北辛偏北甲衣 首衣師看產

二十二歲行年在辛亥離 月四十 坤兌 日丑未

在正北在正北赤色 正南正南方赤 偏西壬偏東癸衣 首衣師看產

二十三歲行年在庚戌坎 月五十 乾艮 日子午

在正北在正北黑色 正北正北方黑 偏東癸偏西壬衣 首衣師看產

二十四歲行年在巳酉震 月六十 艮乾 日巳亥

在正東在正西青色 正東正東方青 偏北甲偏北辛衣 首衣師看產

二十五歲行年在戌申艮 月正七 震坎 日辰戌

在正東在正西黃色 東北東北方黃 偏南乙偏南庚衣 首衣師看產

二十六歲行年在丁未乾 月二八 坎震 日卯酉

在正南在正南白色 西北西方白 偏東丙偏西丁衣 首衣師看產

二十七歲行年在丙午兌 月三九 巽離 日寅申

在正南在正南白色 正西正西方白 偏西丁偏東丙衣 首衣師看產

二十八歲行年在乙巳巽月四十兌坤日丑未

在正西在正東青色首東南東南方青
偏南庚偏北乙衣衣師看產

二十九歲行年在甲辰坤月十五離巽日子午

在正西在正東黃色首西南西南方黃
偏北辛偏南甲衣衣師看產

三十歲行年在辛卯離月四十坤兌日巳亥在正

北偏在正北赤色首正南正南方赤
西壬偏東癸衣衣師看產

三十一歲行年在壬寅坎月正七乾艮日辰戌

在正北在正北黑色首正北正北方黑
偏東癸偏西壬衣衣師看產

三十二歲行年在辛丑震月二艮乾日卯酉

在正東在正西青色首正東正東方青
偏北甲偏北辛衣衣師看產

三十三歲行年在庚子艮月三九震坎日寅甲

在正東在正西黃色首東北東北方黃
偏南乙偏南庚衣衣師看產

三十四歲行年在巳亥乾月四十坎震日丑未

在正南在正南白色首西北西北方白
偏東丙偏西丁衣衣師看產

三十五歲行年在戊戌兌月十五巽離日子午

在正南在正南白色首正西正西方白
偏西丁偏東丙衣衣師看產

三十六歲行年在丁酉巽 六月十兌坤 巳亥

在正西在正東青色 東南 東南方黃
偏南庚偏南乙衣 首 衣師看產

三十七歲行年在丙申坤 正月七離巽 辰戌

在正西在正東黃色 西南 西南方黃
偏北辛偏北甲衣 首 衣師看產

三十八歲行年在乙未離 二月八坤兌 卯酉

在正北在正北赤色 正南 正南方赤
偏西壬偏東癸衣 首 衣師看產

三十九歲行年在甲午坎 三月九乾艮 寅申

在正北在正北黑色 正北 正北方黑
偏東癸偏西壬衣 首 衣師看產

四十歲行年在癸巳震 四月十艮乾 丑未 在正

東偏在正西青色 正東 正東方青
北甲偏北辛衣 首 衣師看產

四十一歲行年在壬辰艮 五月十震坎 子午

在正東在正西黃色 東北 東北方黃
偏南乙偏南庚衣 首 衣師看產

四十二歲行年在辛卯乾 六月十坎震 巳亥

在正南在正南黃色 西北 西北方黃
偏東丙偏西丁衣 首 衣師看產

四十三歲行年在庚寅兌 正月七巽離 辰戌

在正南在正南白色 正西 正西方白
偏西丁偏東丙衣 首 衣師看產

幾聖重刊

廿七

四十四歲行年在巳丑巽月二八兌坤日卯酉

在正西在正東黃色首東南東南方黃
偏南庚偏南乙衣首衣師看產

四十五歲行年在戊子坤月三九離巽日寅申

在正西在正東黃色首西南西南方黃
偏北辛偏北甲衣首衣師看產

四十六歲行年在丁亥離月四十坤兌日丑未

在正北在正北赤色首正南正南方赤
偏西壬偏東癸衣首衣師看產

四十七歲行年在丙戌坎月五十乾艮日子午

在正北在正北黑色首正北正北方黑
偏東癸偏西壬衣首衣師看產

四十八歲行年在乙酉震月六十艮乾日巳亥

在正東在正西青色首正東正東方青
偏北甲偏北辛衣首衣師看產

四十九歲行年在甲申艮月正七震坎日辰戌

在正東在正西黃色首東北東北方黃
偏南乙偏南庚衣首衣師看產

催生靈符

書符時宜以水飛朱砂書之貼於房內北壁上遇坐蓐之時劄於針上就穢內以燈燒之庶免飛揚溫水調服

治產難橫生逆產胞衣不下靈符

麗出凶

麗

不安穩
朱書貼
產婦處
北壁上

麗

覺不安
朱書貼
枕上

麗

治橫生靈
符朱砂書
此符以順
水吞下

此衡衡

此四符入月一
日墨書鞋底上
仍密安產婦席
褥下勿令人知

扇肅麗麗

此三符遇產難
以墨書吞

麗麗麗麗

治胞衣不出靈
符四道急則以
朱砂書符吞下

聖惠方

妊娠預服滑胎令易產諸方

凡難月前服之入月兒生墮地不覺甘草散
方

甘草二兩炙黃芩三分大麻八分乾薑三分
改赤判

藥類彙編

十一

劉吳茱萸三分湯浸七肉桂三分去大豆

黃卷一兩濕地種豆令牙與

右件藥搗細羅為散每日空心以粥飲調

下壹錢

難月前預服此藥令易產方

冬葵子壹兩滑石壹兩蘧麥壹兩丹參壹兩

酥壹合蜜壹合

右件藥擣篩以水壹大盞煎取半大盞去

滓內酥蜜和調空心以粥飲下壹匙晚食

前再服

酥膏令易產入月便服兒不覺出或有難產

經數日或生不以理百方不計終不平安者

服此膏物在兒身上立生初服半匙漸加至

壹匙若太多恐嘔逆以意節量服之方

真牛酥壹斤秋葵子壹升白蜜半斤滑石二兩蘧

麥壹兩大豆黃卷二兩

右件藥擣籠羅為散先以清酒壹升細研

葵子內酥蜜中微火消即下諸藥緩火煎

藥類彙編

十一

養胎益氣保生丸方

下壹錢

常令如魚眼沸約煎去半即成膏以絲濾貯於瓷器中每於食前如上所脫服之

滑胎丹參膏方

丹參二兩芎藭兩當歸壹兩川椒三分去目及汗者微炒

右件藥細剉以酒拌令濕停壹宿即以鍊成猪脂半斤緩火煎看色赤如血即成絞去滓用瓷合盛每日空心取棗許大以煖酒服之

滑胎催生散方

葵子一兩滑石壹兩蒲黃半兩木通半兩

右件藥搗細羅為散每於食前以溫水調下壹錢

養胎益氣保生丸方

石斛三分貝母三分煨石膏叁分黃芩叁分

三肉桂叁分去甘草三分大麻人兩川椒一兩去目及汗乾薑裂剉蒲黃一大

豆黃卷三分當歸一兩糯米半兩

豆黃卷三分當歸一兩糯米半兩

類聚

十五

右件藥搗羅爲末煉蜜和搗五七百杵丸
如梧桐子大每於食前煎棗湯下二十九
研破服之亦得

妊娠令易產益氣滑胎丸方

赤茯苓壹兩赤芍藥壹兩枳殼半兩蘇訶梨

勒皮叁分厚朴一兩薑汁多香熟4川大黃兩壹

剉微炒檳榔兩二芎藭兩半麥門冬壹兩半

右件藥搗羅爲末鍊蜜和搗三五百杵丸
如梧桐子大每於食前以溫酒下二十九

滑胎令易產車前子散方

車前子壹兩滑石壹兩阿膠壹兩半搗碎

右件藥搗羅爲散每服食前以蜜湯調

下二錢

又方白蜜壹合猪脂二合酒半升

右件藥同於銀器中慢火熬令稍稍每服

空心以酒化一大匙服之

又方大麻根二兩

右件藥以水二中盞煎至壹盞去滓溫服

和劑局方

枳殼滑胎散

簡易方醫方集成南北經驗方

名枳殼散胎產救急方名枳殼散六壹散

治婦人胎氣不足能令

滑胎易產常服養胎益氣安和子藏治胎中

一切惡疾

集成經驗方袖珍方姪孕七八月常宜服之

甘草

方經驗良方一兩半三因方二兩枚

急方

枳殼去穢炒二十四兩○簡易方救

商州枳殼五兩去穢

右為細末每服壹錢空心沸湯點服集成一方

加香附子尤佳

入月日進三服

王氏集驗方同

○三因方

右為未每服二錢空心沸湯點服至七月

方可服臨月忌登高廁

肘後方徐氏胎產方同

簡易

方右細末大錢

良方一匙

空心白湯點服妊婦

得五月後日進壹服臨月日三令兒易生

無危惡諸證

良方同

胎初微少百日後肉漸

變白

元和紀用經枳殼

五兩

甘草阿膠各

兩半

同為細末每二錢空心湯點許學

士本事方云此雖孫真人方以滑胎易產

然抑陽降氣爲衆方之冠丈夫婦人寬中
下氣尤得其宜加香附子末壹兩尤妙良方
又云或云枳殼滑胎又云瘦胎切詳枳實
乃神農所嘗之藥也後人於本草內附添
枳殼壹味殼政枳木之實也枳實枳殼本
是一物皆味苦素問曰苦以堅之用枳殼
甘草以養胎氣亦堅固之義也且枳殼逐
水能消脹滿逆氣若臨月服之胎稟充實
當生之時既無脹滿又無逆氣則產道自

順而生夫何病之有所以湖陽公主服之
無恙後人倣倣服之誠有補於世者所謂
瘦胎滑胎皆後人所云不經無稽者也因
書于方後服者可以無惑永類鈴方綠色
厚枳殼去白以糯米同炒赤枳殼性涼粉
得糯米佐之去米取淨二兩粉
草膏右細末百沸湯調空心日三服一
方單用糯米洗淨炒爲末米飲調者一
方二味加香附子去毛同枳殼等分尤好易
簡方枳殼湯妊婦臨月服之縮胎易產能

類聚書
卷之
七

寬中下氣治腸中諸疾並得其宜枳殼五兩
甘草半 右咬咀每服四錢水壹盞煎至
六分去滓熱服或為細末更加香附子三
兩尤佳 丈夫婦人冷氣攻刺脇肋疼痛
加葱白二莖火煨入藥煎服能飲者細嚼
葱白熱酒調服 胃弱氣閉飲食不進葱
白湯調服 腎氣腫痛煨葱白二寸茴香
等撮同嚼熱酒嚥下若久久服之永不發
動 腰背氣痛葱白湯調服服訖即臥少

時旋能作效 脚氣發動空心熱酒或木
瓜煎湯調下 婦人因脾寒血閉或成塊
作痛熱酒調服 產後血氣不和熱酒調
服 心腹氣痛口吐清水飲食不進胃膈
膨脹搗湯調服 冷物傷脾發痛無時胡
椒煎湯調下 大小便不通白牽牛為末
煎湯調服 婦人血暈兩太陽疼頭旋欲
倒者艾葉煎湯調服 小兒面黃胃冷吐
食木瓜煎湯調服 婦人經血不行手足

發熱或身潮熱先用葱白湯次用苜蓿湯
調服 若經血不行脾胃稍壯者當用大
聖散服之數月特有神效 若經血不調
血藏冷痛者當用大聖散間以小溫經湯
仍以紅圓子佐之婦人大全良方滑胎枳
殼散瘦胎易產胡陽公主每產累日不下
南山道士進此方商州枳殼二錢粉草壹兩右
爲細末白沸湯點二錢服空心日三服凡
懷孕六七箇月已上服之令兒易生初生

胎小微黑百日已後肉漸變白此雖孫真
人滑胎易產方然抑陽降氣爲衆方之冠
此方分兩出必用方以此爲正 壹方枳
殼六兩甘草壹兩故加枳殼減甘草蓋未
產人甘草性寒故也未產前壹月日三服
忌登高廁 壹方有糯米半升淘洗控乾
同炒爲末米飲白湯調下壹二錢溫隱居
加當歸木香各等分 張氏方治姪娠胎
肥壅隘動止艱辛臨月服之縮胎易產兼

本草綱目卷之二十一
藥部
治腸中諸疾下氣寬鬲枳殼五兩甘草壹兩

治腸中諸疾下氣寬鬲枳殼五兩甘草壹兩

香附子二兩炒為末薑煎湯點亦可張氏方以

下玉機如丈夫婦人冷氣攻刺脇肋疼痛

者用葱白三寸同煎服 婦人脾寒血氣

成塊作痛熱酒調服 大小便不通白牽

牛為末煎湯調服選奇方香附子枳殼各

兩甘草半兩得效方枳殼散瘦胎易產抑陽

降氣兼治胎中一切惡疾枳殼小厚突弦

穰二粉草一兩右為末每服二錢沸湯調空

心日三服至七月方可服忌登高廁大便

秘澁加防風體弱加大當歸去尾木香各

等分胎肥壅溢動止艱難臨產難生加乳

香髮灰效枳殼能逐水消脹滿逆氣若臨

月多服則當產之時無脹滿逆氣產道順

而易生誠有補於世也又治腸中諸疾下

氣寬膈加炒去毛香附子壹兩為末薑湯

調下冷氣攻刺脅助疼痛葱白湯脾寒血

氣成塊作痛熱酒調大小便不通白牽牛

爲末加入熱湯調服微義枳殼散治妊娠
 胎肥壅隘難產臨月服之粉草壹兩 商州
 枳殼二兩 炒右爲細末百沸湯點二錢空心
 日三服 壹方枳殼六兩甘草壹兩 壹
 方有糯米半升淘控乾同炒爲末 温隱
 居加當歸木香各等分衛生易簡方治妊
 娠逆產用枳殼去白麩炒四兩甘草炙二
 兩爲末每服壹錢空心如茶點服自五月
 以後壹日壹服至臨月易產仍無胎中惡

病忌登高廁

王嶽產書

凡懷妊將欲臨月常宜涼加攝理切在體候
 不得令胎藏積熱若胎熱則難產欲令易產
 不覺分免無諸所苦壹月前宜預服此藥

甘草炮二分 大豆黃卷十銖黑豆以水生孽

取其黃用 乾薑炮 麻子人 大麥春取 桂心生用

吳茱萸洗已上 黃芩四銖

右件剉熬擣篩爲散空心酒下壹大錢匕

幾集三書
三十三

不飲酒用熟水下服後壹月內常須隄慎
是要

滑胎令易產方

投月可服

車前子壹兩阿膠八銖滑石壹分

右搗篩為散空心米飲調下壹錢匕日再

服

預修合青麻飲子方

青麻子枝和葉剉壹斗以中元節所宜收

土處頭壹尺棄之舊方小荷葉三片亦是

節收當歸半兩甘草煨陳橘皮生薑
拍破

各三分

右判作飲子分作四劑每劑以好無灰酒

壹盞小便壹盞煎取壹盞才產了得少時

便喫此飲子壹服若胞衣不下服之立下

但分免了無事事亦服此兩服保無運絕

諸患惡滯皆下也未入所投月宜預收貯藥料

預修合地黃煎方

生地黃搗取自然生薑汁四合白蜜四合

右以坩銅鍋內相袞慢火煎令稀稠得所
如錫以乾坩鉢內盛每服空腹熱酒調一
匙頭產後十日內喫三兩服甚良以臘月
脩合貯之極妙

預修合催產走馬散子方

出楊氏產乳中云
覺痛甚服不覺平

安且在
隄防也

馬齒莧嫩者常食者莧

右以重午日採曬曝乾等分擣羅爲散候
腹痛作陣來以井花水壹盞調兩錢匕衛生

易簡方立產新汲水亦得

三因方

滑胎例

凡懷妊已滿十月形體成就神識咸備分氣
趣產宜服滑胎湯藥

枳殼散方見和劑局方

胎產救急方

滑胎

沉氏方枳殼去穢同秫米浸三日逐日換米換

水漉出控乾炒微赤秤取枳殼皮五兩秫
米一兩却入甘草再微炒研末湯調服蓋
言枳殼性寒多服或令兒有胎寒之病令
加秫米同炒修製有理

元和紀用經

枳殼五兩阿膠炒甘草

右末湯調服

許學士方

枳殼五兩香附三兩甘草炒

右末湯調服

李氏家傳快氣湯自初妊娠惡阻便可服此
寬中快氣抑陽輔陰入月滑胎易產

枳殼五兩縮砂 香附 甘草

右各淨秤同炒爲末湯調服

溫真人方

枳殼五兩川當歸 木香各一兩甘草

右末湯調服

蘄州太守施少卿方神寢丸瘦胎滑利易產

枳殼炒壹兩 乳香半兩陸氏寤生丸只用二錢半 ○婦人大全良方別研

右末蜜丸梧子大空心日壹服入月服之神炒○良方右為細末鍊蜜負如梧子大空心温酒吞下三十負日一服懷孕九箇月以後方可服 陸氏方名寤生元乳香只一分酒糊元

大千方芡苕散滑胎易產婦人大全良方其藥性滑利小便 車前子

為末酒調方寸匕不能飲者湯調永類

同 ○良方又云詩云芡苕能令婦人樂有

子矣陸機注云治婦人產難愚詳孔子序詩云樂然而生易於生育後人注以為注喜誤矣

婦人大全良方

滑胎

內補元治姪婦衝姪脉虛補血安胎

熟地黄一兩 ○永類當歸壹兩 鈐方二兩微炒

右爲細末煉蜜員如梧子大溫酒下三四
十員鈐方三許學士云大率婦人妊娠唯
在抑陽助陰蓋抑陽助陰之藥甚多然胎
前藥唯惡群隊若陰陽交錯別生他病唯
是南山道士枳殼散所以抑陽四物湯所
以助陰故爾然枳殼散差寒若單服之恐
有胎寒腹痛之疾以內補元佐之則陽不
至強陰不致弱陰陽調停有益胎嗣此前
人未嘗論及也

榆白皮散治姪娠滑胎易生

榆白皮 甘草各二兩 葵子兩

右爲粗末每服二錢水壹錢煎至七分去
滓溫服一方無榆白皮名葵子散永類鈐方同

主孕九箇月將產消息肘後方名千金髓

猪肚一全具

依法用葱五味衛生易簡方煮熟食食如

不盡更食以盡爲度不得與別人食無效

保氣散安胎寬氣進食瘦胎易產設或居處

失宜偶然頓仆胎動胎漏胎下血兼服佛

手散見通治神寢元方見胎產救急方枳殼散方見和劑局方

此三藥入月內大宜常服

香附子四兩山藥二兩○承類縮砂仁壹兩木

香四錢粉草壹兩一分○玉益智仁紫蘇

葉各半兩

右為細末白湯點二錢服

承類鈴方

鄭氏無憂散治胎肥臨產難生者此由不預

服滑瘦胎藥入月詳審可服

當歸川芎白芍藥各三錢木香壹錢甘

草壹錢乳香三分硃砂細研髮餘燒

豈錢半以積豬心血和之

右細末每三錢水煎日二服濟生無硃

砂有制枳殼

玉機微義

滑胎易產藥

益元散入月服之滑胎易產方見大方科泄瀉門

衛生易簡方

滑胎

治產前滑胎用牽牛壹兩赤土少許研極細每覺轉痛頻煎榆白皮湯調一錢匕下

治姪娠臨月易產用榆白皮焙乾為末每服

方寸匕湯調下日三服產極易

大全本草產下見身上皆塗之信其驗也

治姪娠因病欲去胎用麥孽二兩水壹盞半煎壹盞分溫三服

治臨產催生用鐵器燒赤焯酒壹盞飲便令分解

又方用通明滴乳為末如覺腰腹痛急用壹匕沸湯或酒調服甚有益但不可過多恐見骨力傷軟

又方用蓖麻子細研傅產婦手足心產後速拭去亦治瘡疥

又方用猪脂壹兩葱白壹寸切熬成油通口服

治妖胎不出用半夏白斂生用等分爲末每服壹錢臨卧酒下小產壹服橫生二服倒生三服人行壹里進壹服

治姪娠令易產用大麻根三莖水壹升煎半升頓服立下胎必不下服之亦効

論

產難

附橫逆生子死腹中胎死腹中

目錄

千金方

子死腹中

眞珠湯

逆生

海上仙方

婦人產難

小兒倒生

產難

產寶

療難產方

難產死生方

難產令易產方

聖惠方

治產難子死腹中諸方

蘧麥散 牛膝散 牡丹散 水銀丸

治產難諸方

走馬散 滑胎散 葵子散 蘧麥散

抵聖散 催生丹 榆白皮散 滑胎散

催生散 木沉香湯 治難產符 難產符

文白丸散 難產符

治數日不產諸方

葵子散 催生防葵散

治逆產諸方

治橫產諸方

貝母丸

和劑局方

催生丹 催生如聖散

產難 二

王嶽產書

催產術并藥方

榆白皮湯 膠酒 蘇膏

大全本草

三因方

催生湯 鈎丹

產科

黑神散 催生湯 勝金散 神應黑散

是齋醫方

紫蘇飲 立聖鶴頂膏

瑣碎錄

救產難方

觀音救生散 催生乳香圓

產前疾方

簡易方

催生湯

胎產救急方

催生

君臣散 佛手散 桂香散 開骨膏

難產

紫蘇飲 三退散

橫生逆產

觀音救生散 桂香散

死胎

桂香飲 芎藭湯 乳朱丸 牛膝湯

朱氏集驗方

朱砂丸 二仙膏

下死胎

嚴氏濟生方

金液圓 麥甦散 無憂散 霹靂奪命

丹

管見大全良方

婦人大全良方

催生方論

柞木飲子 如神開骨膏 催生兔血散

催生如意散 催生神効七聖散 催生

神妙乳珠丹 產難子死腹中方論

產難子死腹中方論

錫粉圓 一字神散 至寶丹

得效方

補中湯 龜蛇散 加味芍歸湯 勝金

散 催生湯 烏金散 奪命圓 養正

丹 備急圓 蛇蛻散

澹軒方

難產

胞胎不下

橫生逆生

肘後方

治產難橫生逆生胎死胞不出

催生丹 聖砂寸金散

澹寮方

聖濟總錄

妊娠數日不產

立生酥葵膏 甘草散 大黃丸 瞿麥

湯 葵子湯 當歸散 大豆卷散 麥

門冬丸 如聖散

拔粹方

胎產證

半夏湯 增損柴胡湯 秦芫湯

王氏集驗方

瑞竹堂方

硃砂散

醫方集成

益母圓

永類鈴方

產難

黑神散

二經驗良方

枳殼散

施圓端效方

二聖散

神效名方

急救仙方

徐氏胎產方

難產諸疾

如聖散

仙傳濟陰方

大當歸湯 托珠丹 乳香湯

玉機微義

產間藥

佛手散 無憂散 至寶丹 花藥石散

黑龍丹

運化玄樞

壽域神方

衛生易簡方

難產

子死腹中

金匱鈞玄

難產

備預百要方

餘藥無名者散見本方

巢氏病源

產難候

產難

一附橫逆生子死
腹中胎死腹中

產難者或先因漏胎去血臟燥或子臟宿挾
疹病或觸禁忌或始覺腹痛產時未到便卽
驚動穢露早下致子道乾澀產婦力疲皆令
難也候其產婦舌青者兒死母活唇青口青
口兩邊沫出者子母俱死面青舌赤沫出者
母死子活故將產坐卧產處須順四時方面

并避五行禁忌若有犯觸多令產難腹痛而腰不痛者未產也若腹痛連腰甚者卽產所以然者腎候於腰胞繫於腎故也診其尺脉轉怠如切繩轉珠者卽產也

產子但趨後孔候

產子但趨後孔者內坐卧未安忽遽強嘔氣暴衝擊故兒失其道婦人產有坐有卧若坐產者須正坐傍人扶抱助腰持捉之勿使傾斜故兒得順其理卧產者亦待卧定背平着

席體不偃曲則兒不失其道若坐卧未安身體斜曲兒心轉動忿遽強嘔氣暴衝擊則令兒趨後孔或橫或逆皆由產時忿遽或觸犯禁忌坐臥不安審所爲故產坐臥須平正順四時方面避五行禁忌若有觸犯多致災禍也

產已死而子不出候

產婦已死而子不出或觸犯禁忌或產時未到驚動傷早或傍看產人抱腰持捉失理皆

令產難而致胎上掩心悶絕故死也候其婦將困之際面青舌赤口沫出者則母死兒活也故產處坐臥須順四時方面避五行禁忌若有觸犯多招灾禍也

千金方

產婦雖是穢惡然將痛之時及未產已產血不得令死喪污穢家人來視之則生難若已產者則傷兒也

婦人產乳忌反支月若值此月當在半皮上

若灰上勿令水血惡物著物則殺人及浣濯衣水皆以器盛過此忌月乃止

凡牛產不依產圖脫有犯觸於後母子皆死若不至死卽母子俱病庶事皆不稱心若能依圖無所犯觸母卽無病子亦易養

凡欲產時特忌多人瞻視惟得三二人在傍待總產訖乃可告語諸人也若人衆看視無不難產

凡產婦第一不得忽忽忙怕傍人極須穩審

皆不得預緩預急及憂悒憂悒則難產若腹痛眼中火生此兒回轉未卽生也 兒出訖一切人及母皆忌問是男是女兒始落地與新汲井水五咽忌與暖湯物勿令母看視穢污

凡產 慎食熱藥熱麵食常識此飲食常如人肌溫溫也

凡欲臨產時必先脫尋常所著衣以籠籠頭及籠口令至密卽易產也

凡產難及于死腹中并逆生與胞胎不出諸篇方可通檢用之
三因方

產難證治

婦人懷憂無踰姪產頃刻之間便至天害故以陣面健兒爲比不亦危矣凡欲生產切不可揮霍致令產婦憂恐如腹中痛甚且得暄鬧過一年高性善老娘并純謹家人扶持不可揮霍致令產婦憂恐如腹中痛甚且令扶行或痛多陣眼中出火方是兒轉至行

不得方好上薦產自有時痛不甚者名曰弄
痛須且熟忍時至自產莫忘費力定是難產
切忌喪孝穢污家人來產訖亦不可見恐傷
子須依產圖方位無致觸犯禁忌爲佳產圖
見大醫局方
朱氏集驗方

催生論

竊謂妊娠之要可慮而難治者三均不必慮
而不必治者一惑先入之言泥卜巫之說或

因夢想而無疑或因見聞而致危疑之念食
息不忘則心氣失所生矣夫心垂血而不調
則神傷神傷則臨產之時豈復寧謐此其可
慮難治者一也婦人女子性最執戀又多暗
損不知事體或畏產育之多私求毒藥欲爲
逐去之舉不思此等自有定數設逐而墮去
則固幸也逐而不動未免憂懼日增或至泣
涕蹙額朝暮以死自危夫和氣致祥乖氣致
異臨產之時豈復有美證者或去血而胞乾

或心虛而神亂此可慮而難治者二也臨在產時務在使人不覺切戒揮霍以生異變活血藥當進於腰腹疼未甚重之先催生丸散當進於腰腹趁痛不可忍之後勿久坐以傷胞勿驚恚以動血粥食頻進使飢飽適中扶護行立使筋力不疲勤用醋炭庶使產母鼻不絕醋氣勿進酒藥產母乘虛而易昏房戶周密無諸穢惡則產理安全無復他患偶然自惡經延三五日亦未見其爲害也惟不經

事之人及有人家久無產育壹時不能諳歷臨事之時又无老成人多成揮霍未痛甚而藥已交進稍痛增而喧闐倉皇致信看待人妄川手法驚觸元氣或奔心而不下或被膜而傷枕遂致子母俱斃繫誰之咎若此類者良醫束手藥石无功此其可慮而難治者三也凡產育之後兒身一下卽服小黑神散或用童子小便調七寶散又其次如琥珀散其衣卽下令人多於產後不暇喫藥只以本髮

令其咀嚼心惡嘔噦衣亦卽下此亦良法衣
或未來停寧稍久恐疲產母之力宜急且斷
臍帶以小物繫墜其子氣脉既不潮胞當自
痿縮而下縱雖淹延數日自壞產母心懷安
泰亦不害人此其不必慮而不必治者壹也
今之人每每視三可慮而難治者則蹈之以
不覺以產後衣不卽下不必慮而不必治者
往往倉皇無措看生者至於繆庸無知妄用
手取法則非惟衣斷不下而母亡者有之矣

豈不甚可痛也夫產經云母生子訖血流入
衣中爲血所脹治之稍緩脹滿腹中上衝心
胃疼痛喘急必致危困蓋爲不斷帶而言也
斷帶遲則有此證只宜進奪命丹活血丹及
黑神散亦自然縮下必不殺人產後母已虛
乏官戶傾損正恐藥食少入而陰冷下乘亦
自足以致血衝血暈之疾看生不知又欲用
手採取以損其腹家人設用虛言則未害也
愚庸者得於傳聞真謂手可採取令產母心

內驚縮百無一活可不爲之哀痛者請復以
余所親見者驗之慶元丙辰春本邑城上周
氏生女經一時而衣不下其姑爲斷帶洗兒
周氏貧且愚不暇他問卽汲水自洗越七日
績間忽墮下一拳大如破衣狀而血裏之前
後見效如此不一而足壬戌之夏先子捐館
適後妣張氏有遺腹數月哀摧大變已自耗
傷氣血及期產訖而衣偶未下予適在二百
里外壹日夜奔走抵本家輕信里嫗妄用手

取法已不可揀痛憤徹骨思不孝之咎無以
自贖因遍閱產科猶未載衣下不可以斷帶
而無必死之證願罄所見校勘諸方以告來
者然猶未敢自以爲是遂於是年十二月二
日默請于天地神祇如予有一慮之得則乞
明示夢響以決所疑是夕夢及亡妣居一室
如官府直舍據床臥病待者環側余經營藥
餌以進亡妣便覺甦醒傍有一人云可謂孝
子耳聞聞直舍外有數道士步虛聲而寤是

用殫心竭慮敷陣肺肝上以寓无窮之哀下以求無窮之失凡事之屢效敬縷數之使觀者之易信言之不文使觀之易悟有識之士幸無誚焉此論不知何人所作但見其說甚通

梁國佐傳

管見大全良方

難產論

夫難產之由有六所因各異故治療方法不同今具言之以開

世惑

凡婦人以血爲主惟氣順則血順胎氣安而

後生理和今富貴之家往往保惜產母惟恐運動故羞出入專坐卧曾不思氣閉而不舒暢則血凝而不流通胎不轉動以致生理失宜臨產必難甚至悶絕一也且如貧者日夕勞苦血氣舒暢生理甚易何俟平藥則孕婦貴於運動明矣次則婦人妊娠已經六七箇月胎形已具世人不知禁忌恣情交合嗜慾不節使敗精瘀血聚於胞中致令子大母小臨產必難二也何以知之生下孩子頭上有

白膜一片滯膩如膠俗強名曰戴白生兒身
有青有黑俗強名曰宿痣不知皆是入月交
合所致所以不特母病子亦生浸淫赤爛瘡
瘍俗乃謂之胎蛆動逾歲月不差可不戒乎
三則驚覺太早大小揮霍或信卜筮或說
鬼祟多方恐誤致令產母心驚神恐憂惱怖
懼或被閑婦及喪孝穢濁之人衝觸若不預
爲杜絕臨產必難三也何以知之如偷生之
女不正之屬旣無產厄于母均安其理可知

四則臨產初焉腹痛或作或止名曰弄痛坐
婆踈率不候時至便令試水試水頻併胞漿
先破風颯產門產通乾澁及其兒轉便坐
草坐草太早兒轉亦難致令難產四也直
候痛極眼中如火此是兒逼產門方可坐草
卽令易產如坐草稍久用力太過產母困睡
拘腰之人又不穩當致令坐立傾側胎死腹
中其爲難產五也六則時當盛暑宜居深
幽房室日色遠處開啓窓戶多貯清水以防

血暈血悶血溢妄行血虛發熱之證如冬木
春初天色凝寒宜密閉產室室塞罅隙內外
生火常令暖氣如春仍下部衣服不可去絛
方免胎寒血結母致難產六也 比孕婦入
月斷不可洗頭方免難產及橫生逆產也
婦人大全良方

楊子建十產論

凡人生產先知此十產證候則生產之婦永
無傷損性命生產之間性命最重幸而孩子

易生人不知福萬一有少艱難則須臾之間
子母之命懸於絲髮但世人所患者惟看生
產收生之人少有精良妙手緣此而多有傾
性命予因傷痛其事不為無補外有盤腸產
僕添方法在
後

一曰正產

正產者蓋婦人懷胎十月滿足陰陽氣足忽
然腰腹作陣疼痛相次胎氣頓陷至於臍腹
疼痛極甚乃至腰間重痛殺道挺逆繼之漿

破血下兒子遂生此名正產

二曰傷產

傷產者蓋婦人懷胎忽有七月八月而產忽至九月十月而產忽有經一年二年乃至四年五年而後產者今獨以十月滿足爲正產蓋一人之生陰注陽定各有時日不可改移今有未產一日已前忽然臍腹疼痛有如欲產仍却無事是名試月非正產也但一切產母未有前面正產證候卽不可令人抱腰產

母亦不可妄亂用力蓋欲產之婦臍腹疼痛兒身未順收生之人却教產母虛亂用力兒身纔方轉動却被產母用力一逼遂使兒子錯路忽橫忽倒不能正生皆緣產母未當用力之所致也凡產母用力須待兒子順身臨逼門戶方始用力一送令兒下生此方是產母之用力當也若未有正產之候而用力傷身并妄服藥餌令兒下生譬如掘苗而助之長非獨無益而又害之此名傷產

三曰催產

催產者言婦人欲產漿破血下臍腹作陣疼痛其痛極甚腰重穀道挺進已見是正產之候但兒却未生即可服藥以催之忽有經及數日產母困苦已分明見得是正產之候但兒子難生亦可服藥以助產母之正氣令兒速得下生此名催產

四曰凍產

凍產者蓋言三冬之月天氣寒冷產母經血

得冷則凝結而不散因其血之不散以至兒子不能生下此之一弊爲害最深然世人不知覺若冬月產婦下部不可脫去絛衣并不坐臥寒冷之處當滿房著火令遍房常有暖氣常令產母背身向火令臍下腿膝間常有暖氣若背上心前少聞寒冷須是暖炙絛衣以包之貴其血得熱則流散使兒子易生此名凍產若春秋之間天地少有陰濕寒冷之氣亦可就房中以微炭火暖之爲妙

五日熱產

熱產者蓋言盛暑之月欲產之婦當要其溫涼得所不可因熱恣意取涼反有傷損胎氣又生產之處不可多著人數易恐人多熱氣逼襲產母蓋人之血氣得熱則散熱過則損令當夏暑炎熱之盛而產母氣虛人氣一逼則其血沸溢而血得熱則上蒸能令產母發熱頭痛面赤昏昏如醉乃至不知人事世有名血暈者緣此而成也此名熱產若值夏月

少有清涼之氣陰雨之變產母亦不可任意取涼恐生大病

六日橫產

橫產者蓋兒子下生先露其手忽先露其臀此因未當用力而產母用力之過也臍腹疼痛兒身未順則是產母用力一逼遂致身橫而不能生下不幸而有此證候當令產母安然仰臥令看生之人推而入去凡推兒之法先推其兒身令直上漸漸通手以中指摩其

肩推其上而正之漸引指攀其耳而正之須是產母仰臥然後推兒直上徐徐正之候其身正門路皆順煎催生藥一盞令產母喫了方可令產母用力令兒下生此名橫產若看牛之人非精良妙手不可依川此法恐恣其愚以傷人命

七日倒產

倒產者蓋因其母胎氣不足關鍵不牢用力太早致令兒子不能回轉順生便只直下先

露其足也治之之法當令產母於床上仰臥令看牛之人推其足入去分毫不得令產母用力亦不得驚恐候兒自順若經久不生却令看生之人輕輕用手內人門中推其足令就一畔直上令兒頭一畔漸漸順下直待兒子身轉門路正當然後煎催生藥令產母服一盞後方始用力一送令兒生下此名倒產若看生之人非精良妙手不可依用此法恐恣其愚以傷人命

八日偏產

偏產者蓋因兒子回轉其身未順生路未正却被產母用力一逼致令兒頭偏挂左腿忽偏挂右腿致令兒雖近人門而不能生下但云兒已露頂然不知兒之所露卽非頂也忽左額角忽右額角而已謂兒頭偏挂一畔以此不能生收之之法當令產母於床上仰臥令看生之人輕輕推兒近上以手正其頭令兒頭頂端正向人門然後令產母用力一送

卽便兒子生下若是小兒頭之後骨偏柱穀道卽令兒却只露額當令看生之人以一件綿衣炙令溫暖用裹手急於穀道外旁輕輕推兒頭令正卽便令產母用力送兒生也此名偏產凡於穀道外旁推兒頭正須推其上而正之仍是小用輕力推些上兒而正之也若看生之人非精長妙手不可依用此法恐恣其愚以傷人命

九日礙產

礙產者蓋言兒身已順門路俱之兒子已露正頂而不能生下蓋因兒身回轉肚帶攀其肩以此露正頂而不能生此名礙產收之之法當令產母於床上仰卧令看生之人輕輕推兒近上徐徐引手以中指按兒肩下其肚帶也仍須候兒身正順方令產母用力一送使兒子下生此名礙產若看生之人非精良妙手不可依用此法恐恣其愚以傷人命

十日坐產

坐產者蓋言兒子之欲生當從高處牢繫壹條手巾令產母以手攀之輕輕屈足坐身令兒生下非令產母臨生兒時坐著一物此名坐產若是產母兒將欲生却令坐著一物卽抵著兒路不能生也

十一曰盤腸產續添

趙都運恭人每臨產則子腸先出然後產子產子之後其腸不收甚以爲苦名曰盤腸產醫不能療偶在建昌得壹坐婆施之壹法而

收之其法遇產後子腸不收之時以醋半盞
新汲冷水七分碗調停喫產婦面每喫壹縮
三喫收盡此良法也後學不可不知

難產生死訣

欲產之婦脉離經難經云一呼三至日離經此是陽加於陰二倍一呼
一卒亦日離經此是陰加於陽四倍也注云
經者常也謂脉離常經之處細而言之呼
脉再至一吸脉再至日平和之脉故一呼脉
行三寸一吸脉行三寸呼吸定息脉行六寸
青日壹夜壹萬三千五百息脉行八百一十
丈乃為一周復從始之經再行今壹呼脉三
至一吸脉三至呼吸定息脉行九寸壹日一
夜脉行通計壹千二百壹十五丈過於平脉

之數不在所起之經再起故曰離經若壹呼
壹至脉行寸半一吸壹至脉行寸半呼吸定
息脉行三寸壹日一夜通計脉行得四百單
五丈乃為壹周是夜通計脉行得四百單
亦不在所起之經沉細而滑也同名婦脉見
再起亦日離經也沉細而滑也同名婦脉見
胞胎見此脉者亦與離經之脉同名也夜半
覺痛應分誕來日午定知生若如婦夜半
定知來日午當分娩也聖惠方云夜半子
時覺腹痛來日午時必定生產謂子午相對
正半日身重體熱寒又頻舌下之脉黑復青
時數也反舌上冷子當死腹中須遣母歸冥凡妊婦
反舌上冷子當死腹中須遣母歸冥凡妊婦
重者胃氣絕也又體熱寒慄頻併者氣衰
陰氣盛也若舌根下脉見青黑者及舌反捲

上冰冷不溫者 面赤舌青細尋看母活子死

子母俱死之候 凡妊婦面色赤是榮氣流通母活之

定應難 候舌上青色是妊脈絡絕胎死之候

唇口俱青沫又出子母俱死總高判 若妊婦

青色者榮衛氣絕也又口中吐出痰沫者而

是脾胃之氣俱絕此是子母俱死之候也而

青舌青沫出頻母死了活定知真不信若能

看應驗尋之賢哲不虛陳 凡妊婦面與舌皆

者是產母榮衛俱絕胎氣衝上之候此是子

活母死之候產下子母必死也此古賢哲應

驗之文不虛 新產之脈緩活吉實大咳急死

妄陳其說也 凡婦人新產之後其脈來緩滑者為血

來親 氣通和是生活安吉之兆也若見實人

脈急之脈則 若得沉重小者吉忽若堅牢命

凶必死之脈 虛若產婦診得沉重微小者此是形虛脈

不停 虛相應故云吉兆之脈忽然診得堅硬

牢實之脈是永盛形衰相 寸口澁疾不調死

反性命不可停留必死也 寸口澁疾不調死

若產後診得寸口脈澁疾大小不調 沉細附

勻者此是血氣衰絕之脈故云死也 沉細附

骨不絕生 於骨不斷絕有力者此生活之兆

也 審看此候分明記長須念此向心經 凡為

治法雜論

凡婦人難產者皆因燥澁緊歛故產戶不得

宜詳審脈證分

明記於心曾也

開通宜先於降誕之月自月之日用長流水調益元散日三服產必易產後亦無一切虛熱氣血不和之疾如未入月則不宜服之以滑石滑胎故也

保產

收生法凡橫逆等證則當以手法爲活收生之人擇揀老成良善臨期須心平氣和施以妙手亦宜直言叮嚀詳盡其意乃可不可用

燥性之徒恣其麤愚因而傷命如橫產謂兒先露手或臂者治法當令產母安於仰臥收生之人徐徐先推兒下截令直上漸通手中指摩其肩推上而正之漸引手攀其耳令頭正候兒身正門路順却投催生藥安詳上草自然易產若逆產謂兒先露足者治法亦令產母仰臥分毫不得用力亦不得驚恐收生之人徐徐推其足就一邊直上候兒自順若良久不順又漸漸推兒頭就一邊令其順

下待兒身轉順門路正當却用催生之藥卽
產又如偏產謂兒頭偏挂一傍雖逼近產門
初非露正頂止露額角者治法亦令產母仰
卧收生之人輕輕推兒近上以手正其頭令
兒頭頂端正向產門又有兒頭后骨偏柱穀
道者當以絛衣炙焙令熱裏手急於穀道外
傍徐徐推之漸漸漸上然後上草至如礙產
謂兒頭雖正產門而不能生下者或因兒轉
臍帶攀掛其肩致不能生者治法令產母仰

卧收生之人輕手推兒近上徐徐通手引中
指按兒兩肩理脫臍帶兒正卽產又有坐產
謂兒將欲生產母疲倦不能行立久坐椅蓐
抵兒生路不能下生者治法當於高處懸弔
手巾或絹帛一條令產母手攀輕輕屈足良
久兒卽順生更有盤腸產者臨分娩產腸先
出兒卽隨產俗用冷水喫產母面其腸自收
此法虛弱之人切不可用恐驚怯成病或卽
脫絕舊法以革麻子肆拾九粒研爛塗腦頂

自然收上如收上卽以水洗去頂上草麻又有久而其腸爲風吹乾不能收者以磨刀水少許火上溫過以潤其腸煎好磁石湯一盃令產母服其腸自收矣
方產戒忌不可便飲酒及多以酒調藥服之酒散五臟四肢致成百病凡一切藥止用水煎爲上一兩服後方可

經驗良方

婦人胎前產後十論并手法用藥禁戒

食忌

婦人胎產重事也凡產婦入月切忌飲酒叫怒臨產時先脫尋常所着衣以籠竈頭及竈口則易產切不可令人喧擾及作倉忙之狀止令老成人在傍扶持看待產母惟當食軟飯糜粥之類初覺微痛而不甚名曰弄痛不可便行試水手探聽產母坐卧切須熟忍或服催生符藥却不可曲腰眠睡如連腰引痛眼中如見火色此是兒轉又須令人扶策徐

徐而行若行步艱卽凭物立須臾扶策再行
直至連腰相引陣痛頻頻又服催生符藥勉
強扶行痛陣轉甚難於行立認是產時將至
然後安詳坐草上草之時切勿太早恐子在
腹中難於轉側及胞漿先破子道乾澁皆致
難產務要產婦惜力若心中熱悶以蜜壹匙
新汲水調下若熱悶未解以生鷄子壹个打
破吞服直待兒迫產門頭面端正然後令人
抱腰其抱腰之人不得傾斜則兒順其理自

然易產新產下便以新汲水令產母徐啜三
二呷以凉心經不致敗血上行可省百病又
有臥產者須待臥定背平著席體不偃曲則
兒不夫道如能依此節度必無難產之理纔
得分免切忌問是男是女且服壓血藥仍令
人用手或物從心下按至臍腹惟宜避風房
內常淬醋煙以防運悶
妊娠難產則有五說

一凡有娠六七月胎已長成不行禁忌恣

情交合敗精瘀血穢聚胞中臨產必難
二臨產驚覺太早大小喧攪或妄信巫卜
談說神鬼使產婦駭於所聞心神驚怖憂
惱又忌閑雜婦人并喪家穢濁之人往來
衝觸若不預爲止絕臨產必難
三凡臨產必有弄痛生婆踈率頻令試水
及其兒轉坐草太早兒轉旣難陣痛斷續
胞漿先破或風颯產間使胎道乾澀臨產
必難

四產婦用力太過抱腰不穩產母困睡坐
立傾斜胎死腹中必致難下
五兒雖生下胞衣不來便卽用法取之敗
血脹滿胞中不惟難取又且血氣衝心悶
絕不醒必致死亡

右前五種爲治不同比產家必當預防及
准備湯藥爲療庶免倉忙失誤

楊子建所著產論如有收生婆娘有曉事識
字者詳細解讀與收生者聽知使不致造次

有損母子亦陰騭事也

一正產姪娠十月陰陽氣備脉已离經腰腹陣痛胎氣頓陷臍上皆空胎已墜下連腰引痛眼中火生穀道挺迸繼而漿破血下兒即隨生是也

二傷產姪娠七八月而早產或至一年之上而後產者皆非正產未滿十月已前臍腹疼痛如欲產者謂之試月及其臨月未
有正產證候切不可令人試水及妄服藥

餌坐草太早用力過當使兒錯路或橫或逆不得正生是也

三催產姪娠臨蓐漿破血下正產之候悉具兒却未生或經數日產母困篤徧服符藥兒亦不下但恐時日未正所以難生者是當以芎歸湯驗之如胎平穩不須倉忙
此隨證用藥治之芎歸湯即佛手散方見後
四凍產冬末春初天氣嚴寒產母感寒經血凝滯胎寒血凝所以難生者是也此害

最深入不知覺冬月產母下部不可無絛
及坐冷濕地蜜糊產室內外略燒火令溫
煖如春沃不可太熱恐生暈悶切須斟酌
得所爲好

五熱產盛暑之月天氣炎烈產母感熱經
血沸溢胎熱血溢乃至妄行血虛發熱面
赤心躁神志昏亂卒不知人者是也此害
亦深人多不慮遂至驚惶夏月產母宜居
深幽房室日色遠處亦勿太啓牕戶恐外

風傷人只用一二老成人看產而前左右
盆貯清水自然無血暈血悶之證

壽域神方

穩婆推兒橫逆手法

逆產兒先露足急令產婦仰臥不得用力不
得驚恐令守生之人微微以針刺兒足令縮
因兒足縮向何邊却以手推兒下截向上兒
身既轉續以手推兒肩向下須見兒頭然後
坐草用正產護生法則自然易產以下護生

做此法橫產兒先露手須當一依逆產手法
推兒護生偏產兒頭已轉向下但頭不正不
能降生但令守生之人以手推正其頭令端
正向產戶或兒頭頂住穀道須令一婦人用
絲裏手炙熱於穀道後及尾閭推按向前使
兒頭正却用正產法護生

碍產兒頭雖正已向產戶而久不下者何也
或因兒已出胞身轉爲臍帶縮住兒肩若有
此証須用手取脫臍帶却坐草護生

正產謂兒將生破水已下兒身轉已見頭向
下雖服催生藥亦有不卽下者當令一有力
婦人抱定產婦別令一婦人以手自背徐徐
按下使兒逼近產戶却用清油火上溫煖入
少滑石未用雞翎蘸油潤產戶內塗令周遍
却令產婦開腠用力送下守生之人捧接取
兒此良法也

千金方

治產難或半生或胎不下或子死腹中或著

吞及坐草數日不產血氣上搶心母面無顏色氣欲絕者方

淳酒二升白蜜各壹成煎猪膏升

右三味合煎取二升分再服不能再服可

隨所能服之婦人大全良方同治產後惡血不除

上搶心痛煩急者以地黃汁代醇酒○產

寶令易產方猪脂二合白蜜壹匙酒八合右相和

煎十沸分爲三服聖惠方治橫產或不下

或胎夭腹中或即在草不產血氣衝心面

無顏色氣欲絕方鍊成猪脂壹合白蜜壹合淳

酒壹中右件藥和煎五七沸分溫三服

治難產方

槐枝升切二榆白皮切大麻人各壹瞿麥升

通草各三兩牛膝五兩

右六味咬咀以水壹斗二升煮取三升半

分五服

又方吞皂莢子二枚肘後方徐氏胎產方備預石要方同

又方取廁前已用草二七枚燒作屑水調服

之○聖惠方取廁不中潔草七莖燒灰細
研以粥飲調服須臾卽生

又方產寶療產橫倒不出者令夫唾婦口中二七過立

出肘後方同

治產難三日不出方取鼠頭燒作屑并花水
服方寸匕聖惠方日三一錢

又方車軸脂吞大豆許兩九○聖惠方治難
產慮胎在腹已死服之卽下胎活服之卽
安方車軸脂酒吞一大豆許甚良

又方燒藥杵令赤內酒中飲之○聖惠方燒
鐵杵蘸酒中飲之立產肘後方鐵杵無毒
主婦人橫產無杵用斧並燒令赤投酒中
飲之自然順生杵擣藥者是也

又方燒大刀鑲聖惠方大以酒一杯沃之頓
服卽出救死不分免者

治產難累日氣力乏盡不能得生此是宿有

病者方得效方經驗良方徐氏胎產

阿膠二兩○聖惠方得效方簡奇方黃明

赤小豆二升○聖惠方備預百要方一合良方十一升胎產方壹斗

右二味以水九升煮豆令熟去滓內膠令

烱每服五合良方胎產方煮令熟去豆不

覺更服不過三服即出聖惠方百要方右

煮豆令熟去滓內膠令消濕頓服○產寶赤小豆二升膠三

右以水九升煎令熟去豆內膠洋令清服

之須更更一服王嶽產書赤小豆半清膠

分三右以水三升煮小豆冷熱取汁內膠於

汁中洋令膠化放溫壹服五合不過三服

則分免

又方槐子十四枚蒲黃壹合

右二味合內酒中溫服王嶽產書同須臾不生

再服之水服亦得

又方生薑汁各半生地黃汁各半

右二味合煎熟頓服之○聖惠方生地黃

汁壹中生薑汁合半右件藥合煎三五沸溫

溫頓服

治產難及日月未足而欲產者方簡易方名知母元

知母壹兩為末蜜丸如兔屎大每服壹丸
王嶽產書如痛不止更壹丸○簡易方右
東許大酒下為末鍊蜜為元如鷄頭子每服壹元溫酒
 嚼下再三服經驗良得效方知母二為末
 密圓鷄頭火溫酒化壹圓服徐氏胎產方
服二十九米飲下

子死腹中

凡婦人產難死生之候母面赤舌青者兒死
 母活母唇口青口兩邊沫出者母子俱死母

面青舌赤口中沫出者母死子活

治動胎及產難子死腹中并妊娠兩兒一死
 一生服之令死者出生者安神驗方

蟹爪壹升甘草二尺阿膠三兩

右三味以東流水一斗先煮蟹爪甘草得
 三升去滓次內膠令烊頓服之不能分再
 服若人困拗口內藥藥人即活煎藥作東
 向竈用葦薪煮之○聖惠方蟹爪壹斤甘
 草一尺炙阿膠三兩搗碎炒右件藥以東
微赤剉令黃燥為末

流水五升先煮二味取汁二升內膠泮之
每服溫喫壹小盞頻服之效人困格開口
內藥入卽活作東向竈用薪煮之良

真珠湯治胎死腹中方

熟真珠兩 榆白皮升 切壹

右二味以苦酒三升煮取一升頓服之死

胎立出

治子死腹中不出方以牛屎備預百要 塗母

腹上立出聖惠方婦人大全良方澹

軒方經驗良方簡奇方同

又方取竈下黃土三指撮以酒服澹軒方水

之立出聖惠方同 土當著兒頭上亦治逆生及

橫生不出手足先見者

又方服水銀三兩聖惠方壹分婦人大全良

以水煮三十 立出餘沸服之

又方取夫尿五升 煮令沸飲之婦人

良方備預

又方酢二升聖惠方 拗口開灌之

又方吞槐子二七枚聖惠方同備預 亦治逆

生經驗秘方新汲
井花水吞下

又方三家聖惠方婦人大全 鷄卵各一枚三

家搥各一撮聖惠方良 三家水各一升聖

方良方共 合煮令產婦東向飲之立出聖

壹大盞 方良方相和煮五七沸分温

二服令母面向東服之效 又方瞿麥一斤以水八升煮取二升壹服一

升不出再服○聖惠方蓬麥壹斤石以水

六大盞煎取二大盞去滓分三服瑣碎錄

瞿麥二兩用水八盞煮三盞服壹盞未出

再服經驗良方徐 產寶療產經數日不出

或子死腹中母氣欲絕方瞿麥以水煮取

濃汁服之佳時後

治胎死腹中乾燥著背方

葵子壹 阿膠五

右二味以水五升煮取二升頓服之未出

再煮服今豆

治姪娠未足月而胎卒死不出其母欲死方
以苦酒濃煮大豆每服一升死胎立出不

能頓服分再服壹方用醇酒煮大豆亦治積聚成瘕○聖惠方右以醋壹大盞煮黑豆壹合令豆熟去豆服其汁立效

治姙娠胎死腹中若子生胞衣不出腹中引腰背痛方

甘草壹尺筒桂四寸雞子壹枚蒲黃二合香豉二升

右以水六升煮取壹升婦人大全頓服之

胎胞穢惡盡去大良○聖惠方附草

赤蒲黃兩半桂心二分豉二合鷄子壹枚在件藥擣

碎以水壹大盞半煎至壹盞去滓打雞子入令勻分溫三服

逆生

凡產難或兒橫生側生或手足先出可以針錐刺兒手足入壹二分許兒得痛驚轉卽縮自當迴順也

治逆生方以塩塗兒足底備預百要方同又可急爪

搔之聖惠方神巧萬全方肘後方類鈴方經驗良方同并以塩摩

產婦腹上卽愈瑣碎錄管見大全良方婦人大全良方徐氏胎產方

玉鬱微義
簡奇方同

又方以塩和粉塗兒足下即順婦人大全于

母秘錄云以塩和胡粉

又方取梁上塵如彈丸許二枚治末三指撮

温酒服之
備預百要方寸七

治逆生及橫生不出手足先見者方燒蛇蛻

皮為末服壹刀圭亦云三指撮面向東酒服即

順王嶽產書仍以
其末塗手足○聖惠方右燒蛇蛻皮

末酒服之效神巧萬全方同
酒調二錢面東服備預百要

方為灰向東酒下
又以末塗兒足

又方取蟬殼二枚治為末三指撮備預百要
方一撮

許温酒服之崔氏外臺子母秘錄作蟬丸

二枚為末酒服

又方取夫陰毛二七輩燒以猪膏和丸如大

豆吞之備預百要方同
婦人大全良方水吞下兒手即持丸

川神驗

又方取蛇蛻皮燒灰猪膏和丸東向服

又方以手中指取釜底墨交畫兒足下即順

生 聖惠方時後方

又方取父名 備預百要 書兒足下即順生 聖惠

方得效方經驗良方徐氏胎產方同

治橫生及足先出者方取梁上塵竈突墨酒

服之

又方取車軛中脂書兒脚下 婦人大全良方腋下 及掌

中聖惠方同

治縱橫生不可出者方兔絲子末酒若米汁

服方寸匕 備預百要方同聖惠方衛生易簡方膏錢經驗良方二錢即

生車前子亦好服如上法 百要方同聖惠方易簡方良方

二錢 ○胎產救急方兔絲子末米飲調服徐

氏胎產方兔絲子為末酒調服一錢匕米

飲調亦得

又方以水苦酒服竈突黑塵 ○聖惠方治逆

生手足先見方右以酒調竈突塵二錢服

之效

治產時子但趨穀道者方熬揅熨之自正 王嶽

產書胎產救急方同

治產難胞衣不出橫倒者及兒死腹中母氣

欲絕方

半夏聖惠方湯洗七遍去滑焙乾白斂各二兩○聖惠方得効方經驗

良方各壹兩

右二味治下篩服方寸匕得効方良方小酒服一錢

難一眼橫生二服倒生三服兒死四服亦

可加代赭瞿麥各二兩為佳○聖惠方右

件藥擣細羅為散以炒生薑酒調下二錢

立效

治胎死腹中若母病欲下之方取榆白皮細

切煮汁三升服之即下難生者亦佳

又方生地黃汁一升苦酒三合令暖服之不

能頓服分再服亦得

又方牛膝三兩葵子三升

右二味以水七升煮取三升分三服

又方澤蘭葉三兩滑石五合生麻油二合

右三味以水一升半煮澤蘭取七合去滓

內滑石麻油頓服之

治逆生胎不出方竈屋上墨以酒煮一兩沸
 取汁服○婦人大全良方取竈屋黑塵研
 為細末酒調方寸匕簡奇方同壹方用梁上塵
 治子死腹中若衣不出欲上搶心方急取蟻
 蛭土三升熬令熱囊盛熨心下令胎不得
 上搶心良

又方末竈突中墨三指撮許以水苦酒調服
 立出當着兒頭生
 又方取夫內衣盥井上立出

又方取炊蔽當戶前燒服之
 海上仙方

婦人產難
 婦人產難生長難覓取真方似隔仙尋取路
 傍草鞋鼻燒灰酒下便安然

小兒倒生
 小兒倒生時渾家盡驚疑伏龍肝酒服頓下
 兔災危

產難

婦人緊產生日夕坐栖惶鐵捷淬酒下即報
產安康

產寶

易產方

飛生鳥一隻 槐子十四枚 故箭羽十四片 燒

右擣篩為散蜜丸梧桐子許覺痛服三十

丸未產須臾再服

療難產方

令易產方

白榆皮十四分 通草十二分 葵子二合 滑石 藎

麥各八分

右以水二升煎取八合分溫三服

又方羚羊角一枝燒刮取未以酒調方寸匕服

又方滑石八分 葵子一合 榆皮十二分 牛膝六分

右以水壹升八合煎取六合再服

又方含醋喫面悶即喫之

又方婦人太急良方云備急方療難產三日

治生出不急救仙方孕婦逆生衛生易簡方
手足先見不順 不槐子七枚良方山居四要

時後方即出壽域神方同良方又云廣濟
壹枚易簡方研細新
方有蒲黃壹合徐氏胎產方
汲順流水下

又方帶水馬壹枚立出聖惠方同○衛生易簡方

用水馬手中持之則易產

又方吞鷄子白二枚即產

又方兩手各把壹石鷲立出聖惠方澹寮方
衛生易簡方同

○經驗良方石燕壹對令產母在右手各
持一隻合手不問生死胎即下

又方兔皮和毛燒灰

右以酒調兩錢匕婦人方全良服即產并

衣不下者服之亦服即出

又方大麻根參莖○聖

右以水壹升煎取半升頓服立產并衣不

下立出○聖惠方右以水壹大盞煎至五

分去滓温服立出胎產救急方大麻根水

煎服

又方弓弩絃燒為末酒調方寸匕壽域神方

又方銅弩牙燒令赤投於醋三合內良久頓

服○胎產救急方弩牙燒赤淬酒服皆取其發放快速之意

又方酸漿皮和水少許頓服

又方麝香壹錢重研和水服聖惠方同○備預百

要方麝香末水調下

難產死生方

療胎死腹中不出母氣欲絕方水銀二兩頓

吞之兒立出

療產經數日不出或子死腹中母氣欲絕方

蘿麥六兩通草參兩牛膝四兩偷皮壹斤桂心三兩

右以水九升煎取三升婦人大全良方為

三服

療子死腹中不出方聖惠方治逆生手足先見方管見大伏龍肝三錢末○聖惠

效方治橫生逆產不順子死腹中伏龍肝方良方婦人大

全良方得效方簡奇方壹錢衛生易簡方二錢

右以酒調服之肘後方易簡上常兒頭上

戴出易簡方云治橫生逆產酒調三四錢

或月兔絲子末車前子末酒調服

又方朱砂兩壹

右以水煮數沸服之肘後方婦人大然後全良方未之

取和酒良方服之徐氏胎肘產衛生出易簡方與肘後方

同

滑胎易產方

白蜜 苦酒 猪脂各壹升

右和煎三四沸臨腹痛時以熱酒服三四

錢七五六服即出

又方取夫單衣覆井口即出

又方以弓弩絃縛心下胎產救急方立出○

衛生易簡方用弓弩弦縛腰及燒弩牙令

赤內酒中飲之

難產令易產方

夫產難者內宜藥外宜以法蓋出多門救療

以取其安

療產難方坐草數日困乏不能生此為母先

有病經絡拘閉所然

赤小豆二升膠三升○婦人大全良方了明黃膠壹兩

右以水九升煎令熱去豆內膠洋令清服之須叟更壹服良方同煎少時壹服五合未效再服不過三四服卽產

又方令夫從外含水吐着產婦口中卽出

療難產凝胎在腹已死方聖惠方慮胎在腹已死服之卽下胎

活服之卽安方

當歸四分芎藭六分

右以水六升煎取二升爲二服便安胎已死卽下酒煎亦得神驗○聖惠方當歸二兩

芎藭三兩右件藥搗羅爲散每服四錢以

水酒各半中盞煎至六分去滓溫服頻服

效

療產困乏腹痛有所見兒及衣不出方

蒺藜子四兩貝母四兩

右爲散酒調服一匙再服以出爲度熟水

下藥亦得○簡易方右爲末每三錢米湯

調下良久再服一方貝母七粒爲末溫酒

調下肘後方爲末米湯下一匙相去四五

里不下再服胎產救急方治死胎不出母
面青指甲青舌青口作屎臭服此胎下母
活貝母蒺藜炒為末飯湯下方寸匕效又
方貝母為末酒服

療難產方箭一隻燒末以水服之產

又方驚甲燒末服方寸匕立出胎產救急方
肘後方同

未生再服

療落胎腹痛方

桂心四分芍藥四分當歸四分牛膝四分蘘麥各五分

芎藭四分

右以水壹升七合煎取八合空腹溫服

療妊娠經五六月胎死腹中或胞衣不出方

生地黄五兩牛膝八分桂心八分芎藭六分大黃各六分

朴消八分蒲黃五分

右以水二升煎取八合空腹分為二服

療子死腹中不出方

雄鷄糞十一枚

右以水二升煎取五合下米作粥食胎即

婦科 產方 八十一

出

療姪娠經六七月子死腹中不出方

黑豆三合

右以醋一升煎取八合分爲三服空腹

療子死腹中母悶絕方

水銀分二

右拗口開灌之如口不開於鼻中灌下亦

得子立出

聖惠方

治產難子死腹中諸方

夫產難子死腹中者多因驚動過早或觸犯禁忌致令產難產難則穢沃下產時未到穢露已盡而胎枯燥故子死腹中候其產婦舌青黑及胎上冷者子已死也故產處坐臥須順四時方面并避五行禁忌若有觸犯多招灾禍也

治姪娠經三五箇月胎死在腹內不出蘧麥散方

蘧麥半兩滑石分當歸微炒赤芍藥兩

皮參兩大腹子兩葵子半兩甘草微赤

子芩兩赤茯苓兩

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水一中

盞煎至六分去滓不計時候溫服

治妊娠經五六箇月胎橫死在腹中不出牛

膝散方

牛膝一兩蒲黃兩當歸參分雄鼠糞兩

炒芎藭分生乾地黄分

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水酒各

半盞煎至五分去滓不計時候溫服

治死胎下後有敗血衝心悶絕上氣不停壯

丹散方

壯丹 赤芍藥 青橘皮湯浸去白瓢焙荷葉

當歸炒 蒲黃 薑黃 川大黃炒已上

各一兩

右件藥搗細羅為散不計時候以溫調下

二錢

治妊娠胎死腹中不出水銀丸方

水銀兩半硫黃壹分與水銀白礬灰兩半硃砂兩

兩半

右件藥搗研令細煮棗肉和丸如棗豆大
每服煎榆白皮酒下五丸以腹痛即胎下

又方水銀壹分以少棗朱砂壹分雄黃壹分

右件藥同研令細煮棗肉和如棗豆大不

計時候以槐子湯下五丸

治死胎腹中不出立效方

水銀 桂心 末

右用温酒調桂末二錢下水銀半兩粥飲

下亦得○婦人大全良方療死胎腹內不

出母已危殆不得已者立效方水銀兩半桂

末壹錢右只作壹服温酒調下粥飲亦可

治妊娠胎死在腹無計可為宜用此方

蓖麻子二枚鼠粘子壹分

右件藥搗細羅為散以醋麵糊調塗於心

上以紙貼之即生

治妊娠胎死腹內不下方

皂莢子黃

四兩 二升多 年為上

右用五升瓶盛文火煨令通熱用紙蓋瓶口將向婦人面前打破紙取氣熏少時即

下

又方

胎產救急方治欲產兒枕先破兒為敗血所裹故艱產但服此逐敗血即自生

橫產逆產皆主之

右取利斧頭燒令通赤置酒中

待微溫令飲之其子使下

婦人大全良方同

又方

雞子壹枚取黃用生薑汁壹合

右件藥將鷄子黃入薑汁調頓服得分晚

後喫芸臺粥良

管見大全良方婦人大全良方簡奇方同

又方

榆白皮二兩剉朱砂半兩細研

右件藥以酒壹大盞煎榆皮至六分去滓

分為二服每服調下朱砂一分

又方

蘇枋木搥細水銀壹兩

右件藥以水五大盞煎蘇木至壹大盞每

服取二分下水銀壹分如人行三五里再

服死胎當化為水下後三日須食暖物

若食冷物卽惡血不盡

又方當歸壹兩剉芎藭叁分蘧麥叁分

右件藥剉以水及米醋各壹中盞煎至一

盞三分分温三服

又方騏驎竭兩壹蒲黃叁分赤芍藥叁分

右件藥壽細羅為散每服以温酒調下二

錢半頻服卽效

治子死腹中不出方

塩半雞子壹枚

右件藥相和頓服立效

治產難諸方

夫難產者由先因漏胞去血藏燥或子藏宿
挾疾疹或觸犯禁忌或始覺腹痛產時來到
便卽驚動穢露早下致子道乾澀產婦力疲
皆令難也或觸犯禁忌所有證候看母舌青
兒死母活唇口青兩邊沫出者子母俱死而
青舌赤沫出者母死子活也故將產時坐卧
安定背平著蓆體不偃曲則兒不失其道若

坐卧未安身體斜曲兒正轉動忿遽強嘔氣
暴衝擊則令兒趨後孔或橫逆皆由產時忿
遽或觸犯禁忌坐臥不安審所為故產坐臥
須平安正順四時方面避五行禁忌若有觸
犯多致灾禍者也

治難產多時不下垂因宜服此方

蘧麥壹兩牛乳三兩滑石一兩冬葵子壹兩黑豆黃
貳兩白蜜貳兩酥貳兩
右件藥擣細羅為散以乳酥蜜調藥令勻

慢火熬成稀膏每服用熱酒調下一匙

治難產覺甚便服走馬散不覺平安方

嫩馬齒莧 嫩人莧 各半兩並五月五日採暴乾

右件藥擣細羅為散以井華水調下壹錢

立效

治痛楚難產滑胎散方

榆白皮切壹斤蘧麥叁分木通叁分牛膝壹兩
大麻人兩壹

右件藥擣瓮羅為散每服四錢以水壹中

蓋煎至六分去滓溫服頻服效

治難產胎不轉動者宜速服葵子散方

葵子壹兩合壹兩桂心壹兩甘草半兩滑石三分榆

白皮壹兩

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水一中

盞煎至六分去滓溫服神巧萬全方同

治難產煩悶不已宜速服蓬麥散方

蓬麥二兩榆白皮三兩甘草壹兩炙壹兩桂心壹兩

木通一兩牛膝一兩澤瀉壹兩

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水一中

盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候

溫服

治難產催生抵聖散方

紅藍花六月六日取蜀葵花五月五日採桃花三月三日採

凌霄花七月七日採大麥七月十五日採

右件藥搗細羅為散以熱酒調下一錢便

生

又方飛生皮壹枚燒壹條蛇蛻皮壹條燒壹條

右件藥搗細羅為散以熱酒調下口錢立生

又方虎頭骨燒為灰兔頭燒為灰已

右件藥細研為散以熱酒調下壹錢便生

治難產催牛丹方

金箔卷十片銀箔卷十片麝香錢一朱砂半兩細研

右件藥同細研如粉以臘月兔腦髓和丸如梧桐子大臨產時以茅香湯下五丸難產至七丸立效

治難產方

水銀壹分膩粉壹分兔腦十二月香

右件藥以兔腦研為丸如梧桐子大不計

時候以溫水下五丸神巧萬全方同

又方右取梁上塵三指撮酒調服之效

又方右取雞肝壹具切以酒壹大盞煎至六

分去肝分溫二服肘後方破雄雞脅以手採取肝酒漬之須臾出

肝但飲酒酒入口不覺生佳

治難產榆白皮散方

榆白皮壹兩 葵根壹兩 牛膝叁分 蓬麥兩 木

通半兩 大麻人叁分

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水壹中

盞煎至六分去滓不計時候溫服○和劑

局方滑胎易產治妊娠曾因漏胎去血或

臨產驚動太早產時未至穢露先下致使

胎胞乾燥臨產艱難醫方集成南北經驗

常宜瞿麥冬葵子諸方 榆白皮各壹 木通

兩半 牛膝去苗酒 大麻仁去殼各叁分 右為

麤末每服三錢衛生寶鑑 水盞半諸方 煎

八分去滓溫服簡易方同 不拘時

又方冬葵根叁分 蒲黃兩 桂心兩 羚羊角屑

叁分

右件藥搗細羅為散煮棗肉和丸如梧桐

子大不計時候以粥飲下三十丸

治難產慮胎在腹已死服之即下胎活服之

即安方

真珠兩 伏龍肝壹兩

右件藥搗細研為散不計時候以暖酒調下壹錢

治難產滑胎散方

榆白皮一兩 冬葵子一合 甘草半兩 炙桂心微赤

壹分 黃芩兩半

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水壹中盞煎至六分去滓不計時候溫服

又方蛇蛻皮

壹條全者取端午日置鈔羅中用紙一張

右以蛇皮用水浸於日煎之候乾收此紙

有難產者剪三小片子如蛇形新汲水吞之立產或每片紙子內拌牛糞中豆與吞亦神效此男左女右手內把出藥也

又方朱砂

一兩成顆者○婦人全良方隨多少

右從端午日晷至一百日不得雨着如滿壹百日取研如粉用臘月兔腦髓和丸如菜豆大欲覺動靜以粥飲下壹丸良久便生其藥男左女右手中把出

又方黃芩

壹兩 蘧麥兩壹 滑石兩壹 葵子兩壹 酥兩壹 蜜兩壹

兩叁

右件藥烏細羅為散先將酥蜜於銚子內
慢火煎三五沸下諸藥攪令勻更煎三兩
沸以熱酒調下一匙不過再服子母平安

又方金薄叁七片朱砂分

右件藥研令極細以臘月兔頭髓和丸如
菜豆大不計時候以溫酒下一丸

又方槐枝 蘧麥 木通 牛膝去苗榆白皮

已上各壹兩

右件藥細剉每服五錢水一中盞煎至六
分去滓溫服立效

治難產救急方右取蓖麻子四粒去殼水研

取汁少塗產婦脚心纔生便洗却并貼臍

中亦良○胎產救急方治難產及胎衣不

下草麻子四十九粒去殼研膏塗足心立

產隨即洗去遲則腸出却取此膏塗頂心

自收入澹軒方同瑣碎錄凡婦人生產不利或

橫生倒生至三四日不生者婦人大全良方治難產兼

治胞衣不下 如聖膏以草麻子七枚去殼

兼治死胎 研成膏塗脚心底子及胎衣便下纔下便

速洗去不尔腸出却用此膏塗頂上腸自

入良方又云壹方男用七粒女用十四粒

一方用草麻子百粒雄黃末壹錢同研並用如前法得效方治難產胎衣不下

奇方與良方同及生產數日併死胎不下者效右用草麻

子一兩經驗良方徐氏去殼雄黃二錢研

胎產方壹百粒細成膏塗良方胎產方母右脚心纔下即

速洗去良方胎產方先置冷水壹不洗則

碗才下急洗去未下再貼

腸出用此膏子塗頂上腸自入如聖之妙

又方臘月兔頭壹枚燒為灰

右件藥細研以葱白壹握煎取湯去滓調

下二錢立產婦人大全良方同

又方右取晚蠶蛾紙燒灰細研暖水調下壹

錢立效

又方蠶蛾紙燒桑樹上蛇蛻皮燒等分

右件藥相和細研用三家水調下二錢

治難產神驗方

臘月猪脂半斤葱白二匕葱細切爛研

右相和煎成膏不計時候以熱酒調下壹匙○山居四要催生用猪脂一兩葱白一寸切同熬成油去滓通口服

又方右取皂莢末少許吹鼻中令嚏其子便

下 經驗良方徐氏胎產方同

又方右搗羅滑石末温酒調下壹錢立效

治母欲死子不生者宜速服此方右取水銀

一彈子大格開口灌之扶起令下神巧萬全方同

一方用桂末二錢同粥飲調下 ○婦人大全良方療胎死

腹中不出母欲絕用水銀如彈子大以棗肉均研和如大豆許水吞下立出肘後方

若母已死而子不出者但以水銀如彈子

格口開內喉中捧起令坐不食須頃許又

捧令倚經驗良方徐氏胎產方扶子即落

又方右取桃人分破書一片作字可壹片作

出字依前還合令母吞之便下即此是天

真法神驗神巧萬全方同

又方右用土瓜根搗細羅為散以醋湯調下
二錢便生

又方右臨欲產又未產吞赤小豆二十壹粒
立效

又方右帶飛生鳥毛立效○肘後方鼯鼠皮
壹名飛生鳥若水馬帶之並佳壽域神方
用飛鼯皮令孕婦抱之隨落婦人有孕者
不可令見之衛生易簡方用鼯鼠即飛生
皮毛與產婦持之令易生

又方 母子 母子

右收五方氣飲氣書此符二道用茅香湯

吞之立效 神巧萬全方同

治難產催生散方

牽牛子 壹兩 禹餘糧 壹分 燒醋

右件藥搗細羅為散每服煎榆白皮湯調

下二錢宜頻服

又方臘月鬼腦髓 車脂 各少 蛇蛻皮灰 壹分

研細

右件藥合和丸如梧桐子大以熱酒下壹
凡兒手中把出

又方蛇蛻皮七寸 篋麻子七枚去皮研 朱砂半兩
香少

右件藥都研為末鍊蜜和丸如小豆大以
溫水下二九

又方烏牛糞錢 篋麻子三顆去皮
右件藥都搗塗布上貼於脚心下候產了
即去却急洗之勿令遲也

又方右取臘月兔腦髓塗於壹張薄紙上更
用壹張合搗象碾紙壹般婦人大令良方合搗以秤
槌三五十下每遇難生看大小書符子書
天生兩字以醋湯下極效

今產安穩沉香湯從心上洗即平安方

沉香一兩 水馬一兩 飛生鳥毛一分 零凌香壹分 麝

唐香壹分 蘇合香壹分 苜蓿香壹分 龍腦一分 蓬麥

右件藥以水壹斗五升煎取壹斗去滓待

類聚音義
加註

至臨欲平安時用湯如人體即從心上洗
三五遍其湯冷即平安亦無有痛苦處無
忌

治難產符

麤
函
𠄎
𠄎

朱書燒灰和冰令產婦服之此符累用有
効

𠄎
𠄎

覺不安穩白紙書此二符吞之

𠄎

覺不安穩白紙書貼枕上

類聚

類聚

弭養鬼

白紙書貼於產婦臥處北壁上

羅點珞
器開開
器開開

入月一日書於床四脚及房內四角吉

日日子
日日子
日日子

白紙書亦吞之

孛生女
孛生女
孛生女

白紙書亦吞之

𠄎𠄎𠄎𠄎

此四符八月壹日墨書鞋底上及密安產婦蓆褥下勿令知

扇扇
𠄎𠄎

此三符難產者即墨書吞之

難產符文

陰陽所育生氣十月日滿不停若男若女上
屬明星司命所催胞衣俱生急急如律令欲
產時書此文吞之

治數日不產諸方

夫難生產者緣胎氣已成子居胎中每食母
血食血有餘遂結成塊俗謂為兒枕子欲生
時血塊先破遂為敗血散裹其子胎中伏熱

故常難產更有少年未經生產驕倨富貴強
說異端月數將滿纔覺腹痛轉動便相告報
傍人擾擾產婦驚怖不安心氣畜結是故難
產要知十月滿足不得妄有驚憂或覺腹痛
之時但令老孀安存莫遣人多無使揮霍腹
痛稍頻衣破漿行須臾即生也
治數日不產胎上衝心欲悶絕方

酥一冬葵子壹滑石半

右件藥內二味搗為末用生絹袋子盛以

酒壹大盞煎十沸後下酥更煎一兩沸分
溫二服

又方榆白皮剉滑石 當歸 車前子 益

母草已上各半兩

右件藥搗細羅爲散煎生薑小便調下二
錢

治姪娠十一月不產自由體性宜服葵子散
方

冬葵子壹兩滑石壹兩蘧麥半兩丹參半兩

右件藥搗麤羅爲散每服三錢以水一中
盞入酥一茶匙煎至六分去滓溫服

治姪娠臨月數日不產覺不安服藥令兒干
持出方

照子鼻八枚燒令赤內醋中槐子十兩

右件藥和研令勻鍊蜜和丸如梧桐子大

取朱粉着銅器中搖動使丸令赤七月七
日午時合之每服以東流水下三丸神驗

又方神功萬全方治右燒龜甲成灰研以新

汲水調下一錢立效○胎產救急方治難產及胎衣不下龜甲燒末酒服方寸匕立效

又方右取門限裏土三指撮酒調服之

又方右取殺羊角屑燒研為末酒調服壹錢

治七八日不產至因方

黃明膠壹兩炙黃燻

右以好酒一大盞煎不佳手洋膠約壹二

十沸內新生雞子壹枚打破搥壹錢相和

頓服之立產如未產更壹服效

治難產三兩日產不得喘息不調腹內疴痛

催生防葵散方

防葵壹兩滑石叁分朱砂壹分細研冬葵子叁分木通

叁分蘧麥叁分榆白皮叁分飛生毛壹分燒灰

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水壹中

盞煎至六分去滓溫服

治難產二日氣力乏盡不能生者此有宿病

宜服此方右取東引槐枝手執之徐氏胎產方同

又方右取鷓鴣頭手執之

又方右取益母草搗汁三合服之立下如無
生者乾者一握以水一大盞煎取半盞去
滓溫服○衛生易簡方用益母草搗取汁
七合煎半盞頓服之立下乾者豈握水七
合煎服

治難產數日不生子死腹內方右取金州椒
二斤分爲二分蒸之以布裹更牙熱熨產
婦臍腹下死胎便出神巧萬
全方同

治難產宿夜不生方右取馬嚼一枚覺痛卽

令產婦左手把之甚效神巧萬
全方同

治難產或經三日五日不分娩兼子死腹中
方

歸當三分剉微
炒搗末 龜甲叁分塗酥炙
令黃搗末

右件藥先取產多者婦人髮半兩燒爲灰
細研入當歸末以水壹大盞半煎取八分
然後下龜甲末煎五七沸分爲三服服後
如人行四五里更服神巧萬
全方同

治逆產諸方

夫逆生者由初覺腹痛產時未至驚動傷早
兒轉未覺便用力產之則令逆也或觸犯禁
忌故產處及坐卧須順四時方面并避五行
禁忌若有觸犯多致灾禍故也

治生產不順手足冷口噤欲死方右以葵子

炒令黃擣羅為末温酒調下三錢王嶽產書神巧

萬全方同用後方補生易簡方二錢匕立效○備預百要方

葵子炒黃為末酒下

治逆生手足先見方右以小針刺之害痛驚

掣入則順出神巧萬全方同○婦人大全良方小

品療橫生倒產手足先出方並出外臺用粗針

刺兒手足入二分王嶽產書以針猛刺之許兒得痛

驚轉即縮自當回順王嶽微義同橫產逆產二

條其理雖別療法盖同可以意量逐善參

用也經驗秘方小絹針就兒足心三五刺

急用鹽塗刺處即順經驗良方用穀尖刺脚心尤妙急救仙方

徐氏胎產方衛生易簡方同

又方右取廬蠶子衛生易簡方燒灰熟水易

方米調服三錢效

又方右取夫十指爪甲各少許燒灰細研温

酒調服之備預百要方同

又方右以朱書兒左足下作千字右足下作

里字手出者亦效神巧萬全方同

又方右取車輞上土三指撮酒服之驗

又方右用當歸剉微炒持末酒調下二錢

又方艾葉原

右以酒一大盞煎至六分去滓分温二服

立效水煮亦得○肘後方治倒產子死腹

中艾葉半斤酒四升煮取一升服徐氏原方備

預百要方同

治橫產諸方

夫橫產者由初覺腹痛產時未至驚動傷早

轉動未覺使用力產之故令橫也或觸犯禁

忌所為將產坐卧處須順四時方面并避五

行禁忌若有觸犯多致灾禍也

治橫產或顛倒胞衣不出傷毀不下產後餘病汗出煩滿不止少氣逆滿貝母丸方

貝母煨微 甘草炙微 秦椒去目及閉口乾者微炒去汗乾

薯炮裂 桂心 粳米 石膏細研 黃芩 大

豆黃卷 石斛去根剉各壹分 當歸半兩剉微炒 大麻

人叁分

右件藥擣羅為末用棗肉和丸如彈子大
不計時候以溫酒研下一丸

治橫倒生手足先出法右以牛尿塗母腹上

卽便順生神巧萬全方同

又方蓬麥貳兩

右以水一大盞煎至六分去滓分溫三服

又方胎產救急方治難產及胎衣不下 葵子貳分 黃明膠壹兩

燋○承類鈴 滑石壹兩

右件藥以水壹大盞半救急方 煎至壹盞

救急方煎至七分 去滓分溫三服經驗良方鈴方分作二服

倒產法橫倒逆產條目雖分方藥之類可參酌相當隨意救之若見先出脚卽以湯和

搗塗之并塗母腹塗兒脚後急以手搔之
兒生手出取烏雞血塗於手掌上良天制
順此三字相連成一符應產不如常者朱
書腹上并書紙上水吞之神巧萬全方同

又方右燒錢二七文衛生易簡方參枚令赤投一杯

酒中候冷飲之婦人大全良方山居四要簡奇方燒錢令赤納酒中

飲之

屬馬 朱書此符吞之

治難產及不順生立効方婦人大全良方得效方簡奇方救產

難經日不生

雲母粉兩半

右以酒調服之入口當產不順者即順萬
不失一〇良方又云陸氏方云是何德揚
方云已救三五千人却用雲母粉澄過研
細取一團如雞子大臨時以無灰酒調下
隋碎錄仙傳濟陰方同衛生易簡方雲母粉半兩澄過研細以無灰酒下極效胎
產救急方雲母散雲母石按成粉每壹錢

酒調下此方已救人筭數神效

及方右乞取三家飯著手中即順生甚效
和劑局方

催生丹治產婦生理不順產育艱難或逆或

橫並宜服之大有神效婦人大全良方云宜天醫日合

母丁香取末一錢○拔粹方麝香別研膏字○拔

粹方微義兔腦髓臘月者去皮膜研如泥乳香別研極細

五分半膏分○拔粹方微義五分

右拌勻以兔腦和圓如鷄頭穰大陰乾用

油紙密封貼每服壹圓溫水下簡易方氏集驗方

醫方集成南北經驗方袖珍方卽時產下

得效方同隨男左女右手握藥圓出是驗衛牛寶鑑

承類鈐方簡奇方同經驗良方又云留藥洗淨再收可叁次催生如死見必嵌在頭

也

催生如聖散黃蜀葵花不拘多少右焙乾為末熟

湯調下鎖碎錄簡易方管見大全良方婦人大全良方承類鈐方簡奇方調

下二錢經驗秘方三錢 或有漏血胎藏乾澁難產痛

劇者并進三服良久腹中氣寬胎滑卽時

產下如無花時只用葵子爛研小半合以

酒調濾去滓溫過類服尤妙胎死不下見管

婦人良方鈴方簡奇方如煎紅花溫酒調

治打撲傷損胎死不下鈴方又云子用四十九粒酒下一方研墨或

紫蘇詩曰黃金內子叁十粒婦人良方云

飲佳細研酒調能備急命若懸絲在須臾

卽令眷屬不悲泣○嚴氏濟生方黃蜀葵

子不拘多少右爲細末每服二錢用熱酒調服

如不飲酒熱湯調服亦得濟生方醫方集

袖珍方

醫方類聚卷之二十八