中華古籍保護

原件短缺

巻1-3

丹溪心法附餘卷之四

休寧東山古庵方廣約之類集

風門

破傷風 十一

丹溪心法

○破傷風多死　防風全蝎之類　非全蝎不開十箇為末酒調日三次

破傷風血凝心鴉翎燒灰存性研細酒調一錢

入方　破傷風發熱

瓜蔞子九錢　滑石一錢半　南星　蒼朮　赤芍

陳皮一錢　黃連　炒栢　黃芩　白芷半錢

甘草此小

右姜一片煎服

附諸方

防風湯拔粹方　治破傷風同傷寒表証未傳入裏宜急服此藥

防風　羌活　獨活　川芎各等分

右㕮咀每服五七錢水二盞煎至一盞去渣通口服不拘時候服後宜調蜈蚣散大効

蜈蚣散拔粹方

蜈蚣一双　江鰾五錢　左盤龍五錢炒煙盡

右為末每服二錢用防風湯調下如前藥解不已覺轉入裏當服左龍丸服之漸漸看臟腑硬軟加巴豆霜

拔粹方　治直視在裏者

左盤龍炒　殭蚕炒　江鰾炒各五錢　雄黃一錢

右為末燒飯丸桐子大服十丸酒下如裏証不已當於左龍丸內一半末入巴豆霜半錢燒飯丸桐子大同左龍丸一處每服加一丸漸加服至利為度若利後更服後藥若搐痙不已亦宜服後藥羌活湯

羌活湯拔粹方

羌活　獨活　地榆　防風各一双

右㕮咀每服五七錢水二盞煎至一盞去渣通口服有熱加黃芩有涎加半夏若病日久氣血漸虛邪氣入胃全氣養血為度

養血當歸地黃湯拔粹方

當歸　地黃　芍藥　川芎　藁本

防風　白芷各二双　細辛五錢

右為麤末每服一兩水二盞煎至一盞通口服食前

○已上五方治破傷風自表入裏之劑

羌活防風湯 拔粹方 治破傷風邪初傷在表

羌活　防風　川芎　藁本　當歸
芍藥　甘草 各四叉　地榆　細辛 各二叉

右㕮咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓温服不拘時量緩慢加減用之熱加黄芩二兩大便秘加大黄一兩緩緩令過

白朮防風湯 拔粹方 若服前藥過多有自汗者

白朮　黄耆 各一叉　防風 二叉

右㕮咀每服五六錢水二盞煎至一盞去滓温服不拘時候破傷風臟腑秘小便赤用熟藥自汗不休故知無寒也宜速下之先用芍黄湯三二服後用大芍黄湯下之

大芍黄湯 拔粹方 下藥

川芎 半兩　羌活　黄芩　大黄 各一兩

右㕮咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓温服不拘時候

羌活湯 拔粹方 治半在表半在裏

羌活 去芦　菊花 去梗　麻黄 去根節　川芎　白茯苓 去皮
防風 去芦　石膏 研　前胡 去芦　黄芩　蔓荊子
細辛 去葉　甘草 炙　枳殼 各一兩　薄荷　香白芷 各半兩

右㕮咀每服一兩水二盞生姜五片煎至一盞去滓通口服食後

再前服

白朮湯 拔粹方 治破傷風大汗不止筋挛搐搦

白朮 葛根 芍藥 升麻 黃芩各五錢

甘草二錢半

右㕮咀每服一兩水二盞煎至一盞去渣溫服不拘時

江鰾丸 拔粹方 治破傷風驚而發搐臟腑秘澁知病在裏可用下藥

江鰾剉炒 野鴿糞炒 白姜蚕各五錢 雄黃一兩 吳公一對虫虫

天麻一兩

右為末作三分二分用燒飯丸桐子大硃砂為衣一分巴豆霜二錢半亦燒飯丸桐子大每服硃衣丸三十丸加巴豆霜丸一丸第二服加二丸加至利為度再服硃砂丸病愈止

○已上七方亦治破傷風邪表裏之劑

玉真散 瑞竹堂方 治破傷風及金刃傷打撲傷損

天南星 防風等分

右為末破傷風以藥敷貼瘡口然後以溫酒調一錢如牙關緊急角弓反張用藥二錢童子小便調下或因歐打內有傷損以藥一錢溫酒調下打傷欲死但心頭微溫以童便灌下二錢併進二服天南星為防風所製服之不麻衛生寶鑑名定風散治癲狗咬破先口噙漿水洗淨用綿乾貼藥更不再發無膿大有効

如聖散 聖惠方 治破傷風止血定疼

蒼朮六兩 川烏頭炮去皮四兩 防風 草烏頭炮去皮

細辛各二兩半 兩頭尖炮去皮四兩 天麻 川芎

白芷各兩半 蝎稍微炒 雄黃各半兩 損骨加乳香半兩

右為細末每服一錢酒調下不拘時服

一方 治破傷風手足顫掉不已者

人手足指甲炒絶烟六錢　硃砂另研　天南星姜製　獨活各二錢

右為末分作三服酒調下不拘時候

保命丹　治破傷風

辰砂　射香　川烏去皮尖　大半夏生各一錢　藜蘆去土三錢

雄黃半錢

右為末棗肉丸如雞頭實大每一丸嚼細温酒下若牙關急幹開灌下吐涎為効如吐不止生葱湯止之不吐更用半丸大効

一字散　如前

金頭蜈蚣一條去虫頭足炙　天麻半兩　草烏頭去芦半兩　全蝎十个

香白芷少許

右為末每服一字發熱茶清下發寒温酒或半夏茯苓湯下見温熱類

天麻丸　治破傷風神効

天麻　川烏生去皮各三錢　草烏生　雄黃各一錢

右為末酒糊丸梧子大每服十丸温酒下無時

元戎方治破傷風欲死者

川烏　南星　半夏並生　天麻去芦等分

右為細末每服一錢豆淋酒調下稍温服次以酒三盞投之

奪命散　治破傷風角弓反張牙關緊急

天麻　白芷　川烏去皮各二錢　草烏　雄黃各一錢

右為末酒糊丸梧子大每服十丸温酒送下不拘時

蜈蚣散　治破傷風搐搦角弓反張

蜈蚣去毒炒一條　全蝎一對炒去毒

右為細末如發時用一字或二字擦牙縫内或吹鼻中

烏稍散　治破傷風及洗頭風

烏稍蛇酒浸一宿去骨六錢　麻黃一兩　草烏　乾姜

附子炮　川芎　白附子　天麻各半兩　蝎稍二錢半

右為末每服一錢熱酒調下日三服重者三五日見効

治破傷風方　極有神効

初覺有風時急取熱糞堆內蠐螬虫一二箇用手捏住待虫口中吐

岁小水就抹在破傷處身穿稍厚衣裳待片時瘡口覺麻兩脇微汗

風出立効　如風緊急速取此虫三五箇剪去尾將肚內黃水塗瘡

口再滴岁小入熱酒內飲之汗出立効

○已上諸方攻散風毒之劑

胃風　十二

胃風小法

○此因初飲食訖乘風涼而致其証脹滿食飲不下形瘦腹大惡風頭

多汗隔塞不通胃風湯正始此然亦看挾證加減脉右關弦而緩帶浮

附諸方

胃風湯　拔粹方　治虛風証能食麻木牙關急搐目內蠕瞤胃風面腫

白芷一錢二分　升麻二錢　葛根一錢　蒼朮一錢　甘草炙一錢半

柴胡　藁本　羌活　黃柏　草豆蔻各三分

麻黃半錢不去節　蔓荊子一分　當歸身一錢

右㕮咀水二盞姜三片棗一枚煎至一盞去渣溫服

胃風湯　治風冷入於腸胃泄下鮮血或腸胃濕毒下如豆汁或瘀血

人參　茯苓　川芎　當歸　桂

白朮　白芍等分

右剉水煎入粟米百餘粒同煎腹痛加木香

痛風 十三

附肢節痛　肩背痛

丹溪心法

○四肢百節走痛是也他方謂之白虎歷節風証　大率有痰　風熱風濕　血虛　因於風者小續命湯　因於濕者蒼朮白朮之類佐以竹瀝　因於痰者二陳湯加酒炒黃芩羌活蒼朮　因於血虛者用芎歸之類佐以紅花桃仁　大法之方蒼朮川芎白芷南星當歸酒黃芩在上者加羌活威灵仙桂枝　在下者加牛膝防巳木通黃栢　血虛格致餘論詳言多用川芎當歸佐以桃仁紅花薄桂威灵仙　治痛風取薄桂味淡者獨此能橫行手臂領南星蒼朮等藥至痛處

入方

治上中下疼痛

南星 姜製　蒼朮 泔浸　黃栢 酒炒各二兩　川芎 一兩　白芷 半兩

神麯 炒一兩　桃仁 半兩　威靈仙 酒拌三錢　羌活 三錢走骨節　防巳 半兩下行

桂枝 三錢行臂　紅花 酒洗錢半　草龍膽 半錢月下行

右為末麯糊丸梧子大每服一百丸空心白湯下

張子元血氣虛有痰白濁陰火痛風

人參 一兩　白朮　熟芐　川黃栢 炒黑各二兩

山藥　海石　南星 各一兩　瑣陽 半兩　敗龜板 酒炙二兩

乾姜 燒灰半兩取其不走

右為末粥丸一云酒糊丸

臂痛方

蒼朮一錢半　半夏　南星　白朮　酒芩炒
香附各一錢　陳皮　茯苓各半錢　威靈仙三錢　甘草少許
別本加羌活一錢
右㕮咀作一服入生姜二三片
二妙散　治筋骨疼痛因濕熱者有氣加氣藥血虛者加補血藥痛甚者加生姜汁熱辣服之
黃栢炒　蒼朮米泔浸炒
右二味為末沸湯入姜汁調服二物皆有雄壯之氣表實氣實者加酒少許佐之　若痰帶熱者先以舟車丸或導水丸神芎丸下伐後以趁痛散服之
趁痛散
乳香　沒藥　桃仁　紅花　當歸
地龍酒炒　牛膝酒浸　羌活　甘草　五靈脂酒淘
香附童便浸　或加酒芩炒酒栢
右為末酒調二錢服
八珍丸　治痛風走注脚疾
乳香　沒藥　代赭石　穿山甲生用各三錢
羌活　草烏生用各五錢　全蝎二十一箇炒　川烏生用一兩不去皮尖
右為末醋糊丸如梧子大每服二十一丸溫酒送下
四炒散　痛風走注
威靈仙酒浸五錢　羊角灰二錢　白芥子一錢　蒼耳一錢半一云蒼朮
右為末每服一錢生姜一大片擂汁入湯調服　又二妙散同調服
又方　治酒濕痰痛風
黃栢酒炒　威靈仙酒炒各五錢　蒼朮　羌活

甘草三錢　陳皮一錢　芍藥一錢

右為末每服一錢或二錢沸湯入姜汁調下

治氣實表實骨節痛方

滑石六錢　甘草一錢　香附　片芩各三錢

右為末姜汁糊丸如梧子大每服五七十丸白湯吞下

又方

糯米一盞　黃躑躅根一握　黑豆半合

右用酒水各一椀煎徐徐服之大吐大瀉一服便能行動

治食積肩腿痛

龜板酒浸炙一兩　酒栢葉　香附半兩　辣芥子　凌霄花一錢半

右為末酒糊丸如梧子大煎四物湯加陳皮甘草湯下

附諸方

控涎丹　治一身及兩脇走痛痰挾死血者

甘遂面裹煨　大戟制　真白芥菜子炒各等分

右為末加桃仁泥糊丸如梧子大每服五七丸漸加至十丸臨臥姜湯下

龍虎丹　治走注疼痛或麻木不遂或半身痛

草烏　蒼朮　白芷各一兩碾粗末拌發熱盦過入後藥　乳香

沒藥各三錢另研　當歸　牛膝各五錢

右為末酒糊丸如彈子大每服一丸溫酒化下

乳香丸

白附子炮　南星　白芷　沒藥　赤小豆

荊芥　藿香去土　骨碎補去毛　乳香各一兩另研　五靈脂

川烏炮去皮臍尖　糯米炒各二兩　草烏炮去皮尖　京墨煅各五兩　松脂半兩研

右為末酒糊丸梧子大每服十丸至十五丸冷酒吞下茶亦得不拘時忌執物

二粒金丹　治一切風疾走注疼痛手足癱瘓麻木不仁及白虎歷節等風

射香二錢半　好真墨燒烟盡一錢半　乳香　當歸酒洗晒乾

沒藥各七錢半　白膠香另研　草烏去皮臍　地龍去土　木鱉子去油

五靈脂各一兩半

右為細末與前藥和勻用糯米糊為丸如雞頭實大每服一丸溫酒化下遠年近日寒濕脚氣臨發時空心服一丸脚面里汗出為効初中風不醒人事牙關不開研二丸酒調灌下立醒

天麻丹　治諸風癱瘓及白虎歷節風

烏頭八兩　蒼朮四兩　全蝎一兩　荊芥　防風

天麻各二兩

右為細末用豆腐和勻作餅入銅銚以水滿煮藥至半沉半浮存性為度收出待至乾為丸如梧桐子大以硃砂為衣臨臥時先嚼木瓜一片以好酒吞下二三十丸服後覺昏沉吐涎痰一二時為効

金棗丹　治一切風疾等証

川烏去皮臍生用　防風生用　兩頭尖　香白芷　獨活

荊芥　蔓荊子各四兩　白朮　羌活　細辛去土各半兩

全蝎　威靈仙　天麻　殭蚕各二兩　木香

雄黃各一兩　蒼朮八兩泔浸　川芎五兩　乳香一兩　何首烏一兩八錢

沒藥　草烏各一兩五錢　藁本二兩五錢　當歸三兩

右為細末以糯米糊丸如棗樣大金箔為衣每服一錠傷風流涕好酒調服　諸般頭風細茶調服薄荷湯亦可　中風不語生姜湯調

下　左癱右瘓好酒調下　白虎歷節風遍身走痛生姜湯或好酒調服　破傷風昏倒在地牙關緊急用好酒調服仍將敷患處　雷頭風并乾癬麻痺溫酒調服　洗頭風溫酒調服　偏正頭疼及夾腦風研為末吹鼻孔中吐涎再用生姜汁調藥塗兩太陽穴仍用茶清調服　風狗咬傷噙水洗淨敷之　蜈蚣傷口噙水洗過敷之　蛇傷入白礬少許敷患處以津唾調搽亦可　蝎傷唾調搽　痔漏口漱漿水洗過敷之　多年惡瘡口不合者口漱鹽水洗過敷徐合　嗽喘桑白皮湯調服　紅絲魚眼褌脚腦疽發背疔瘡裏外臁瘡用自己小便洗過井水調敷薄紙貼上再用裏外搽之　丹瘤井花水調藥毛翎掃三二次　不發灸瘡口噙水洗過貼三二次知大可方止

乳香黑虎膏　治諸風寒濕骨節渾身疼痛　見中溫類

虎骨散　和劑方　治風毒邪氣乘虛[illegible]注經絡之間痛無常處晝靜夜甚筋脉拘攣不得屈伸

蒼耳子微炒二兩　五加皮一兩　骨碎補三兩　虎脛骨酥炙二兩　沒藥三兩

當歸去苗三兩　天麻一兩　自然銅醋淬細研　防風去苗　肉桂去粗皮各三兩

敗龜板酥炙二兩　騏驎竭細研　白芷　赤芍藥　白附子炮各三兩

檳榔一兩　羌活去芦一兩　牛膝去苗二兩

右為末入研藥令勻每服一錢溫酒調下不拘時

趁痛丸　澹寮方　治走注歷節諸風軟痛卒中倒地跌蹼傷損

草烏頭三兩不去皮　熟地黃或用生者　南星　半夏麯

白殭蚕　烏藥各半兩普乾

右為末酒糊丸如梧桐子大晒乾每服五七丸空心溫酒下如跌撲傷損姜汁和酒研十數丸塗傷處如卒中倒地姜汁茶清研五七丸

灌下立醒

虎骨丸 御藥院方 治經絡凝滯骨節疼痛筋脉攣急遇陰寒愈痛

乳香 另研 沒藥 另研 赤芍藥 當歸 熟地黃

虎骨 酥炙各一兩 血竭 二錢半 立另研

右為末用木瓜一枚切破去子入乳香一錢末在內麻纏定毋令透氣好酒二升煮酒盡取木瓜去皮研入蜜杵和丸如梧桐子大每服三五十丸酒下

麒麟竭散 治寒濕搏於經絡以致氣血凝泣疼痛不可忍者 拔粹方

血竭 乳香 沒藥 白芍藥 當歸

水蛭 炒令烟盡 射香 各二錢 虎脛骨 酥炙黃半兩

右為末每三錢溫酒調下食前

透骨丹 治風濕腰腿筋骨疼痛

天麻散 秘方 治風濕疼痛黃腫

天麻 全蝎 各四兩 地黃 木瓜 各三兩 沒藥

乳香 川山甲 各一錢 川芎 烏頭 各二錢 牛膝 二錢酒浸一宿

當歸 三錢

右為末每服三錢空心溫酒調服

○廣按風寒濕入於經絡以致氣血凝泣津液稽留久則怫鬱堅牢阻礙榮衛難行正邪交戰故作痛也須氣味辛烈暴悍之藥開鬱行氣破血豁痰則怫鬱開榮衛行而病方已也又嘗論之成怫鬱乃有形之物不過痰與血也已上方中有偏於豁痰者有偏於破血者有均治痰血者在人對証施治不差可也

小續命湯 見中風類

二陳湯 見痰類

丹車丸 見中濕類

神芎導水丸 見濕熱類

○肢節痛

丹溪心法

肢節痛須用羌活去風濕亦宜用之 如肥人肢節痛多是風濕與痰飲流注經絡而痛宜南星半夏 如瘦人肢節痛是血虛宜四物湯加防風羌活 如瘦人性急燥而肢節痛發熱是血熱宜四物湯加黃芩酒炒黃柏 如肢節腫痛脉滑者當用燥濕宜蒼朮南星兼行氣藥木香枳殼檳榔在下者加漢防己 若肢節腫痛脉澁數者此是瘀血宜桃仁紅花當歸川芎及大黃微利之 如倦怠無力而肢節痛此是氣虛兼有痰飲流注宜參朮星半

丹溪無肢節痛條此文又絕似丹溪語姑書以俟知者

○肩背痛 新增

附諸方

通氣防風湯 拔粹方 肩背痛不可迴顧者此太陽氣鬱而不行以風藥散之脊痛項強腰似折項似拔者此足太陽經不通也

羌活 獨活各一錢 藁本 防風 甘草各半錢

川芎 荊子各三分 水煎服

當歸拈痛湯 拔粹方 治濕熱為病肢節煩痛肩背沉重胸膈不利及遍身疼痛下疰於足脛痛腫不可忍 見脚氣類

蒼朮復煎散 拔粹方 治寒濕相合腦痛惡寒煩悶脊骨胛眼痛膝臏痛脉沉洪

蒼朮四兩水二椀煎至一碗去渣入下項藥末再煎一沸溫服 羌活 升麻一方無此

澤瀉 柴胡 藁本 白朮各半錢 黃柏三錢

紅花少許

右為末先煎蒼朮三分之二後下衆藥同煎切忌酒麵

加減當歸飲子聖惠方治肩忽痛

防風　當歸　柴胡各一兩半　芍藥一兩　生地黃一兩半

黃芩　人參各一兩　黃連半兩　甘草兩三錢　滑石六兩

大黃一兩半

右㕮咀每服五錢水二盞煎至一盞去渣食後通口服

人參益肺散技粹方治肩背痛汗出小便數而少者風熱乘脾脾氣鬱長也當瀉風熱則愈

柴胡　升麻　黃耆各一錢　羌活　防風

人參　甘草　陳皮各半錢　藁本三分　青皮

黃芩　白豆蔻各二分

右㕮咀都作一服水二盞煎至一盞去渣通口服如面色白脫色氣短者不可服

舒經湯澹寮方治臂痛不能舉有人常苦左臂痛或以為飲或以為風為濕諸藥悉投繼以針艾俱不効得此方而愈蓋是氣血凝滯經絡不行所致非風非飲非濕腰以下食前服腰以上食後服一名通氣飲子

片子姜黃四兩無則用嫩莪朮代之　甘草炙　羌活各一兩　海桐皮去外皮

當歸　赤芍藥　白朮各二兩

右㕮咀每服三錢水一盞半生姜三片磨沉香水少許煎至一盞去滓通口服

治背痛

姜黃四兩　甘草炙　羌活一兩　白朮一兩

右㕮咀水二盞煎隨意至一盞去滓温服食後

痺 十四 新增

附諸賢論

袖珍方曰凡痺病目有五種皮痺脉痺肌痺骨痺筋痺是也多由體虛之人腠理空疎為風寒濕三氣侵入於皮脉肌筋骨不能隨時逼散留滯於內久而為痺其為病也寒多則掣痛風多則引注濕多則重著爾

附脉理

脉訣舉要曰風寒濕氣合而為痺浮濇而緊三脉乃備

防風湯 宣明方 風寒濕三氣合為痺風氣勝者行痺上下左右無留隨所至作防風湯主之 治行痺行走無定

防風 甘草 當歸 赤茯苓 去皮 杏仁 去皮炒熟 桂 各 兩 黃芪 秦艽 葛根 各二錢 麻黃 半兩去節

右為末每服五錢水各二盞棗三枚姜五片煎至一盞温服

茯苓湯 宣明方 寒氣勝者為痺宜宣通陰寒為痺宜通氣温經而愈茯苓湯加減主之 治痛痺四肢疼痛拘倦浮腫

赤茯苓 去皮 桑白皮 各二兩 防風 官桂 川芎 芍藥 麻黃 去節各一兩半

右為末每服五錢水一盞棗一枚煎至八分温服以薑粥投之汗泄為度效矣

茯苓川芎湯 宣明方 濕氣勝者為著痺濕地水氣甚重著而不去多汗

而濡者茯苓川芎湯主之　治著痺留注不去四肢麻木拘攣浮腫

赤茯苓　桑白皮　防風　官桂　川芎

麻黃　芍藥　當歸　甘草炙各五分

右為末每服四錢半水二盞棗三枚同煎至一盞去滓空心溫服如欲出汗以粥投之

仆麻湯宣明方　陽氣多陰氣少陽熱共陰寒故痺藏府熱熇然而悶也

仆麻湯主之　治熱痺肌肉熱極體上如鼠走唇口反縱皮色變兼諸風皆治

升麻三兩　茯神去皮　人參　防風　犀角鎊

羚羊角鎊　羌活各一兩　官桂半兩

右為末每服四錢水二盞生姜一塊碎竹瀝少許同煎至一盞溫服

五痺湯和劑方　治風寒濕之氣客留肌體手足緩弱麻頑不仁

片子姜黃一兩洗去灰土　羌活　白朮　防己各半兩

甘草微炙半兩

右㕮咀每服四錢水一盞半姜七片煎八分去柤病在上食後服病在下食前服

蜀益痺湯濟生方　治手足冷痺腰腿沉重及身體煩疼背項拘急

當歸去芦酒洗　赤芍藥　黃芪去芦　防風去芦　片子姜黃

羌活各一兩半　甘草炙半兩

右㕮咀每服四錢水一盞半姜五片棗一枚煎八分去柤溫服

防風湯濟生方　治血痺皮膚不仁

川當歸去芦洗　赤茯苓去皮　川獨活各一兩　甘草炙半兩　防風二兩

赤芍藥　黃芩各一兩　杏仁去皮尖半兩　秦艽去芦一兩　桂心不見火半兩

右㕮咀每服四錢水一盞姜五片煎七分去柤溫服不拘時

茯苓湯 濟寸方 治停蓄支飲手足麻痺多睡眩冒

半夏 湯洗七次 赤茯苓 去皮 陳皮 各一兩 枳實 去穰麩炒 桔梗 去芦

甘草 炙各半兩

右㕮咀每服四錢水一盞半姜七片煎七分溫服

羌活湯 濟生方 治白虎歷節風毒攻注骨節疼痛發作不定

羌活 去芦二兩 附子 炮皮臍 秦艽 去芦 桂心 木香 不見火

川芎 當歸 去芦 牛膝 川者去芦酒浸 甘草 炙各半兩 桃仁 去皮尖麩炒

骨碎補 防風 去叉各一兩

右㕮咀每服四錢水一盞半姜五片煎七分溫服

虎骨散 濟生方 治白虎風肢節疼痛發則不可忍

虎骨 酥炙二兩 甘草 炙 全蝎 去毒各半兩 射香 一分研 天麻

防風 去芦 川牛膝 去芦酒浸 白姜蚕 炒去絲嘴 川當歸 去芦酒浸 乳香 另研

桂心 不見火各二兩 白花蛇 酒浸取肉二兩

右為末每服三錢豆淋酒調服

○廣按已上二方治白虎歷節風骨節疼痛即宣明所謂痛痺也蓋風寒濕三氣客於經絡為病不一或為痛或為痒或為麻痺不仁或為手足緩弱所以然者有新久輕重之分有濕痰死血之異濟生防風湯茯苓湯所治已露端倪也學者宜細心求之丹溪不言痺病蓋已該於痛風腎著痿厥條內矣但丹溪所言病之見証古人所言病之原因即中庸費隱之義也

續斷丸 本事方 治風濕流注四肢浮腫肌肉麻痺

當歸 炒 川續斷 萆薢 各一兩 川芎 七錢半 乳香 半兩

天麻 防風 附子 各一兩 沒藥 半兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服四十丸溫酒米飲任下

○廣按用附子大黃之劑多有所嫌者殊不知寒濕充滿經絡四肢浮腫非附子性浮而不沉而能散之乎熱燥銷爍腸胃二便秘結非大黃性走而不守而能潤之乎故善用藥者天下無棄物善用兵者天下無棄人況大黃附子乃藥中之元首用其所當用何嫌之有哉

增損續斷丸 本事方 治寒濕之氣痺滯關節麻木疼痛

人參　防風　鹿角膠　白朮 炮各七兩　麥門冬

乾地黃　黃芪　續斷　薏苡仁　山芋

牡丹皮　桂心　山茱萸　白茯苓　石斛 各二兩

右為末蜜丸如梧桐子每服五十丸溫酒空心下

三痺湯 程氏方 治血氣澁滯手足拘攣風痺等疾皆療

川續斷　杜仲 去皮姜炒　防風　桂心　人參

白茯苓　當歸　白芍藥　甘草 各一兩　秦艽

生地黃　川芎　川獨活 各半兩　黃芪　川牛膝

細辛 各一兩

右㕮咀每服五錢水二盞生姜三片棗一枚煎一盞去滓熱服

黃耆酒 濟生方 治風濕痒痛筋脉攣急或身體頑麻

當歸 去芦　雲母粉　茵芋葉　白朮　虎骨

萆薢　木香 不見火　仙灵皮　川續斷　甘草 炙

白芍藥　黃芪 去芦　防風 去芦　官桂 不見火　天麻

石斛 去根各一兩

右㕮咀用絹袋盛以好酒一斗浸之春五夏三秋七冬十日每服一盞溫暖服之常令酒氣相續為佳

防風天麻散 宣明方 治風麻痺走注肢節疼痛 見中風類

丹溪心法

○大風病是受得天地間殺物之風古人謂之癘風者以其酷烈暴悍可畏耳人得之者須分在上在下夫在上者以醉仙散取臭涎惡血於齒縫中出在下者以通天再造散取惡物陳虫於穀道中出所出雖有上下道路之殊然皆不外乎陽明一經治此病者須知此意看其瘡瘡與瘡若上先見者上體多者在上也若下先見者下體多者在下也上下同得者在上復在下也陽明經胃與大腸也無物不受此風之入人也氣受之則在上多血受之則在下多氣血俱受者甚重自非醫者神手病者鐵心罕有免此夫從上或從下以漸而來者皆是可治之病人見病勢之緩多忽之雖按此法施治病已全然脫體若不能絶味絶色皆不免再發再發則終不救矣其曾治五人矣中間惟一婦人得免以其貧甚且寡無物可喫也餘四人三兩年後皆再發孫真人云吾嘗治四五百人終無一人免於死非孫真人不能治也蓋無一人能守禁忌耳此婦人本病外又是百餘貼加減四物湯半年之上方得月經行十分安愈

醉仙散

胡麻仁　牛旁子　蔓荊子　枸杞子 各半兩同炒黑色
防風　瓜蔞根　白蒺藜　苦參 各半兩

右為末每一兩半入輕粉二錢拌勻大人每用一錢空心日午臨卧各服茶湯調下喫後五七日間先於牙縫內出臭涎水渾身覺疼昏悶如醉利下臭穢為度量大小虛實加減與之証候重而急者須先

以再造散下之候補養得還復與此藥喫須斷鹽醬醋諸般肉魚腥椒料水果煨燒炙煿及茄子等物只宜淡粥煮熟時菜并烏稍菜花蛇用淡酒煮熟食之以助藥力也

再造散

錦紋大黃一兩　皂角刺一兩半獨生經年黑大者　鬱金半兩生

白牽牛頭末六錢半生半炒　一本無鬱金牽牛二味

右為細末每服二錢一云五錢臨卧冷酒調服一云日未出面東服以淨桶伺候泄出虫如虫黑色乃是多年赤色是為方近三四日又進一服直候無虫則絶根矣後用通聖散調理可用三稜針刺委中出血終身不得食牛馬驢騾等肉大忌房事犯者必不救

黃精丸

蒼耳葉　紫背浮萍　大力子各等分　烏蛇肉中半酒浸去皮骨

黃精倍前三味生搗汁和四味研細焙乾

右為末神麯糊丸如梧子大每服五七十丸温酒下

一方加炒栢生芐甘草節

又方

蒼耳葉　浮萍　鼠粘子　烏蛇肉等分

右用豆淋酒炒等分為末每服一二錢豆淋酒調下

治麻風脉大而虛者

苦參七錢半　蒼耳　牛旁子　酒蒸栢一作酒板各二兩

黃精　浮萍各一兩

右為末用烏蛇肉酒煮如無蛇以烏鯉魚亦可糊丸服之候脉實再用通天再造散取虫

治麻風

四物湯加羌活防風陳皮甘草一

又方

大黃　黃芩　桂黃三兩

右為末用樟樹葉濃煎湯入藥淬洗

附論

廣按大風証者所因不一或因色慾當風或因醉目濕地或乘熱脫衣或汗出入水或空心飢餓山行感山嵐瘴氣或勞後奔走途中冒寒雨陰霧皆由內傷形體不謹避忌外感風濕毒氣入於皮毛血脉肌肉筋骨之間當時罔覺久於驅散停積既久以致榮衛不行內外薰蒸內則生痰而臟腑經絡皆受患矣古人謂大風疾三因五死三因者一曰風毒二曰濕毒三曰傳染五死者一曰皮死麻木不仁二曰脉死血潰成膿三曰肉死割切不痛四曰筋死手足緩縱五曰骨死鼻梁崩塌輿夫眉落眼昏夜嗣聲嘻甚可畏也所以然者蓋由邪正交攻氣血沸騰而濕痰死血充滿於經絡之中故生虫生瘡痛痒麻木也治療大法內通臟腑外發經絡而虫瘡痛痒麻木自出矣亦須首尾斷酒戒色忌食發風動氣葷腥鹽醬炙煿生冷之物清心寡慾方保無虞也今將所用藥方次序開具于後

附諸方

消風散　第一日服

香白芷　全蝎

人參　各一兩

右為細末每服二錢先一日午間宜喫粥忌生姜胡椒葱蒜一切熱性之物晚間不可飲食次日空心温酒調下覺身痒燥為妙

追風散　第二日服瀉血追虫

大黃 錦紋者六兩 鬱金 小者一兩八錢 皂角刺 一兩半

右為末初服六錢或七錢大楓油一錢半淨朴硝少許入內好酒一碗調化五更空心溫服直待辰時又如前調藥一碗入熟蜜少許勿令患人知先以水與患人盥漱淨然後服藥必以蜜解口忌人與患者同坐卧良久腹中疼為妙候瀉十數次以薄粥補之凡老弱者難治五十歲以下者可治精壯者十日三服謂初一日服消風散初二日服追風散初三日服磨風丸損弱者十日內一服稍痊如壯健人十日內三服每月後二十日一服須要記其日數

磨風丸 第三日服日進二次

川當歸 羌活 獨活 川芎 天麻

細辛 防風 荊芥 葳靈仙 麻黃

何首烏 石京子 牛旁子 車前子 皮面草 即地松

蒼耳草 各一兩

右皆不見火晒乾為細末酒煮麪糊為丸如梧桐子大每服三十丸食前溫酒下服後煎藥薰洗

洗藥

地骨皮 荊芥 苦參 細辛 各等分

右剉片每用二兩以水煎薰洗遍身血出為効如洗務要湯寬浸洗良久方佳

敷藥 第四日治瘡大爛遍身塗之

黑狗脊 二兩如無以杜仲代之 蛇床子 一兩 寒水石 硫黃

白礬 枯各二兩 朴硝 少許

右為細末用臘猪油或香油調敷不爛不必敷

一方

蜜陀僧　白附子　蒼耳子　細辛　香白芷各等分

右為細末用生姜汁調搽患處

一方

蛇床子根燒灰存性　雄黃　硫黃　白礬

草烏各等分

右為細末用香油或蜜水調敷患處

○已上諸方治大風次第之劑

加減大造苦參丸　治大風瘡及諸風赤白癜風

苦參一斤　防風　荊芥　蒼耳子　胡麻子半生半熟

皂角刺各十兩　蔓荊子　牛蒡子　黃荊子　枸杞子

何首烏　禹餘粮　蛇床子各三兩　香白芷一兩半

右為細末用皂角搗爛熬膏前藥勻為丸丸如梧桐子大每服五十丸茶酒任下

一方　治大風肌頑麻木皮膚瘙痒遍身疥癩癮疹面上遊風或如虫行紫白癜風或賊風攻注腿脚生瘡者

川烏　白芷　苦參　胡麻炒　荊芥

防風各二兩　當歸　川芎　獨活　羌活

白蒺藜　赤芍藥　白附子　山梔子各一兩　蔓荊子一兩半

何首烏　大楓子去殼　葳靈仙各三兩　地龍二兩

右為細末先取烏蛇一條用好酒浸煮熟去骨取肉晒乾或焙同為末酒糊丸如梧桐子每服四十丸茶湯下

一方

葳靈仙　何首烏　地松即皺皮草　防風　蔓荊子

荊芥　車前子　細辛　牛蒡子酒浸　猪牙皂角

當歸　蒼耳草　天麻　甘草　羌活
獨活　麻黃　澤蘭　川芎　苦參各等分
右為末酒糊丸如梧桐子大每服四十丸茶酒任下

一方
用蒼耳草於五月五日或六月六日五更時帶露採搗絞取汁熬成膏作錠子取一斤半重鯉魚一箇剖開不去肚腸入藥一錠在內以線縫之用酒二碗慢火煮乾為度令患人喫盡魚不過四五箇即愈忌鹽百日

一方
用白花蛇一條先蒸糯米一斗缸底先用酒麯次將蛇以絹袋盛之頓於麯上然後以糯米飯和勻頓於蛇上用紙封缸口候三七日開取酒將蛇去皮骨焙乾為末每服溫酒一盞調蛇末少許服之仍以酒脚并糟做餅食之

一方
用蒼耳為末以大楓子油丸如梧桐子大每服三四十丸荊芥湯送下茶湯亦可

一方　治大風眼昏不辨人物眉髮自落鼻梁崩塌肌膚生瘡如癬
用皂角刺一二斤蒸晒為末食後煎大黃湯調服一錢服一旬後眉髮再生肌膚光潤眼目復明

一方　治大風瘡令眉髮再生
用栢葉九蒸九曝為末煉蜜為丸如梧桐子大日三服夜一服白湯下每服五六十丸百日後生眉髮

一方　治大風後生眉毛
皂角筴焙乾　鹿角燒存性各等分

右為細末生姜汁調塗眉上一日一次則生

一方　治大風眉毛脫落肌膚拆裂

用防風通聖散加苦參天麻蟬蛻早晚各一服至百貼必愈忌房事

蕃薯葷腥生冷油膩之物

一方　治大風後斷根

於脚大拇指觔骨縫間約半寸灸三壯以出毒氣

四物湯　見補損類

通聖散　見班疹類

防風通聖散　見中風類

○血風瘡　新增

附諸方

馬齒莧膏　治兩足血風瘡并兩脚背風濕瘡疼痒至骨

馬齒莧切碎焙乾淨五錢　黃丹飛　黃柏　古白礬

孩兒茶各三錢　輕粉一錢

右為細末和勻後入輕粉用生桐油調攤於厚桐油紙上用葱椒湯洗淨患處貼之

一方　治血風瘡

川椒　其母　白芷　蛇麻子炒　黃丹飛

枯白礬　黃連各三錢　輕粉五錢

右為細末生桐油調攤厚油紙上貼瘡紮定七日方開忌胡椒生姜葱蒜一切熱毒物

當歸拈痛湯　治兩足血風瘡痛痒等証　見脚氣類

○癮疹　新增

附諸方

胡麻散 和濟方 治脾肺風毒攻衝遍身皮膚瘙痒或生瘡疥或生癮疹用手搔時浸淫成瘡久而不差愈而復作面上遊風或如虫行紫白癜頑麻或腎臟風攻注脚膝生瘡宜服

胡麻一兩二錢 荊芥穗 苦參八錢各 何首烏炮焙一兩 甘草炙 威靈仙各一錢

右為末每服二錢薄荷茶或酒或蜜湯調服服藥後頻頻浴自得汗出立効

蒼耳丸 治諸風及諸風瘡癮疹白紫癜風

五月五日割取蒼耳草葉洗淨晒乾為末煉蜜丸如梧桐子大每服十丸日三服若身體有風處或如麻豆粒此為風毒出也可以針刺黃汁出盡乃止

靈草丹 治一切風疾及癮疹紫白癜風瘡 痒頑麻

休寧東山古庵方廣約之類集

寒門

咳嗽 十六 附肺痿 肺癰

丹溪心法

○咳嗽有風寒 痰飲 火鬱 勞嗽 肺脹 春作是春升之氣用清涼藥二陳加薄荊之類 夏是火氣炎上最重用芩連 秋是濕熱傷肺 冬是風寒外來以藥發散之後用半夏逐痰必不再來 風寒行痰開腠理用二陳湯加麻黃桔梗杏仁 逐痰飲降痰隨証加藥

火主清金化痰降火　勞嗽四物湯加竹瀝姜汁補陰為主　乾咳嗽難治此係火鬱之証乃痰鬱其火邪在中用苦梗開之下用補陰降火之劑四物加炒栢竹瀝之類不已則成勞此不得志者有之倒倉法好

肺虛嗽甚此好色腎虛者有之用參膏以陳皮生姜佐之大槩有痰加痰藥　上半月多嗽者此屬胃中有火用貝母石膏降胃火　午後嗽多者屬陰虛必用四物湯加炒栢知母降火　黃昏嗽者是火氣浮於肺不宜用涼藥宜五味子五倍子斂而降之　五更嗽多者此屬胃中有食積至此時火氣流入肺以知母地骨皮降肺火　肺脹而嗽或左或右不得眠此痰挾瘀血凝氣而病宜養血以流動乎氣降火疎肝以清痰四物湯加桃仁訶子青皮竹瀝姜汁之類　嗽而脇下痛宜疎肝氣以青皮挾痰藥實者白芥子之類在後以二陳湯加南星香附子黛青皮姜汁　血碍氣作嗽者桃仁去皮尖大黃酒炒姜汁丸服　治嗽多用生姜以其辛散故也　痰因火動逆上作嗽者先治火次治痰以知母止嗽清肺滋陰降火夜嗽用降陰分嗽　治嗽多用粟殼不必疑但要先去病根此乃收後藥也治痢亦同　勞嗽即火鬱嗽用訶子能治肺氣因火傷極遂成鬱遏脹滿不得眠一邊取其味酸苦有收斂降火之功佐以海石童便浸附瓜蔞青黛杏仁半夏麯之類姜蜜調噙化必以補陰為主　治嗽灸天突穴肺腧穴大瀉肺氣肺腧穴在三推骨下兩傍各一寸五分

○師云陰分嗽者多屬陰虛治之　有嗽而肺脹壅遏不得眠者難治

肺痿專主養肺氣養血清金　嗽而肺氣有餘者宜瀉之桑白皮為主半夏茯苓佐之瀉其有餘補其不足　肺燥者當潤之屬熱者桔梗大力知母鷄清　聲啞者屬寒宜細辛半夏生姜辛以散之肺虛者人參膏阿膠為主陰不足者六味地黃丸為要藥或知母茯苓湯為妙

陰虛氣喘四物湯加陳皮甘草少少以降其氣補其陰白芍藥須用酒浸晒乾　濕痰帶風喘嗽者不可一味苦寒折之如千緡湯墜痰丸更以皂角蘿蔔子杏仁百藥煎姜汁丸噙化　濕痰帶風以千緡湯墜痰丸固捷　痰積嗽非青黛瓜蔞不除有食積人面青白黃色不常面上有如蟹瓜路一黃一白者是　欬逆嗽非蛤粉青黛瓜蔞貝母不除口燥咽乾有痰者不用半夏南星用瓜蔞貝母飲水者不用瓜蔞恐泥膈不鬆快　知母止嗽清肺滋陰降火　杏仁瀉肺氣氣虛久嗽者一二服劫止　治酒嗽青黛瓜蔞蜜丸噙救肺　食積痰作嗽發熱者半夏南星為君瓜蔞蘿蔔子為臣青黛石減為使

戴云風寒者鼻塞聲重惡寒者是也火者有聲痰少面赤者是也勞者盜汗出兼痰者多作寒熱肺脹者動則喘滿氣急息重痰者嗽動便有痰聲痰出嗽止五者大槩耳亦當明其是否也

入方

杏仁去皮尖　蘿蔔子各半兩

右為末粥丸服

清化丸　治肺鬱痰喘嗽睡不安寧

貝母　杏仁　青黛

右為末沙糖入姜汁泡蒸餅丸如彈子大噙化

治久嗽風入肺

鵝管石　雄黃　鬱金　欵花

右為末和艾中以生姜一片安舌上炙之以烟入喉中為度

治飲酒傷肺痰嗽以竹瀝煎紫蘇入韮汁就吞瓜蔞杏連丸

治欬嗽劫藥

五味子五錢　甘草二錢半　五倍子　風化硝各一錢

右為末蜜丸噙化又云乾噙

治欬嗽聲嘶者此血虛火多

青黛　蛤粉

右為末蜜調噙化

治嗽喘去濕痰

白朮　半夏　蒼朮　香附各一兩　具母

杏仁去皮尖炒　黃芩各半兩

右為末姜汁打糊丸

治婦人形瘦有時夜熱痰嗽月經不調

青黛　瓜蔞仁　香附童便浸乾

右為末姜蜜調噙化

治一人風熱痰欬

南星　海粉各二兩半　夏一兩　青黛　黃連

瓜蔞子　石減　雜蔔子各半兩　防風　皂角炭各二錢

右為末神麯糊丸服

治勞嗽吐紅

人參　白朮　茯苓　百合　紅花

細辛　五味　官桂　阿膠　黃芪

半夏　杏仁　甘草　白芍　天門冬

右劑水煎若熟去桂芪用桑白皮麻黃不去節杏仁不去皮同煎

又方　治嗽血

紅花　杏仁去皮尖批把葉去毛　紫菀茸　麥門冬

木通　桑白皮

右為末炼蜜丸噙化

又云加大黃

嗽烟筒　治痰嗽久遠者

佛耳草　款花二兩　鵝管石　雄黃半兩

右為末鋪艾上捲起燒烟吸入口內細茶湯送下

定嗽劫藥

訶子　百藥煎　荊芥穗

右為末姜蜜丸噙化

又方　治心煩欬嗽等証

六一散加辰砂服

青金丸　治食積火鬱嗽劫藥

具母　知母各半兩為末　巴豆去油膜半錢

右為末姜泥丸辰砂為衣食後服每五丸白湯下一云青黛為衣

青金丸一名與點丸與清化丸同用瀉肺火降膈上熱痰

片子黃芩炒

右為末糊丸或蒸餅丸梧桐子大服五十丸

青化丸　與清金丸同用專治熱嗽及咽痛故苦能燥熱濕輕能治上

熔籠草炒

右為末蒸餅丸　又細末醋調敷咽喉間痛

又方　治痰嗽

礞石半兩煅　風化硝二錢石半　半夏二兩　白朮一兩　茯苓

陳皮各十錢半　黃芩半兩

右為末粥丸

又方　治欬嗽氣實無虛熱者可服汗多者亦用之

粟殼四兩蜜炒去蒂膜　烏梅　人參半兩　款花半兩

桔梗半兩　塊鈴一兩　南星姜制衣一兩

右為末蜜丸彈子大含化

蒼沙丸　調中散鬱

蒼朮　香附各四兩　黃芩二兩

右為末蒸餅丸梧子大每服五十丸食後姜湯下

人參清肺散　治痰嗽咽乾聲不出

人參一兩半　陳皮一兩半　半夏一兩　桔梗一兩　麥門冬半兩

五味子十箇　茯苓一兩　甘草半兩　桑白皮一兩　知母一兩

地骨皮半兩　枳殼一兩　貝母一兩半　杏仁一兩　款花七分

黃連一兩

右水煎生姜三片

四物湯　見補損

六味地黃丸　見補損

知母茯苓湯　見肺痿

千緡湯

墜痰丸

二陳湯　俱見痰類

附脉理

脉訣舉要曰欬嗽所因浮風緊寒數熱細濕房勞濇難右關濡者飲食傷脾左關弦短疲極肝衰浮短肺傷法當欬嗽五臟之嗽各視本部浮緊虛寒沉數實熱洪滑多痰弦濇少血形盛脉細不足以息沉少伏匿皆是死脉惟有浮大而嗽者生外證內脉參考稱停

附諸方

華蓋散　和劑方　治肺感寒邪咳嗽聲重胷膈煩悶頭目昏眩

紫蘇子炒　赤茯苓去皮　陳皮去白　桑白皮　杏仁去皮少炒

麻黃去根節各兩　甘草炙半兩

右為末每服二錢水一盞煎七分食後溫服

敗毒散　治傷寒發熱咳嗽頭疼

參蘇飲　治上膈有熱咳嗽聲重

金沸草散　治感冒寒邪鼻塞聲重咳嗽不已　並見傷風

小青龍湯和劑方　治感寒咳嗽喘息不得睡臥及治傷寒表證不解心下有水氣乾嘔發熱咳嗽氣喘　見溫熱

五拗湯澹寮方　治風寒咳嗽肺氣喘急

麻黃不去節　杏仁不去皮　甘草生用　荊芥穗　桔梗各等分

右㕮咀生姜三片同煎溫服咽痛甚者煎熱後加朴硝少許　一方去桔梗荊芥用半夏枳實等分

加味理中湯仁齋直指　治肺胃俱寒咳嗽不已

甘草炙　半夏湯泡　茯苓去皮　乾姜不炒　白朮

橘紅　細辛　北五味　人參各等分

右㕮咀每服三錢姜棗煎食前服

易簡杏子湯拔粹方　治咳嗽不問外感風寒內傷生冷痰飲停積悉治

人參去芦　半夏湯泡　茯苓去皮　甘草炙　芍藥

五味子各一兩　細辛　乾姜　官桂各五錢

右㕮咀每服四錢水一盞半用杏仁去皮尖五枚姜五片烏梅一箇煎至七分去滓服　若新感冒加麻黃等分

橘蘇散濟生方　治傷寒咳嗽身熱有汗惡風脉浮數有熱服杏子湯不得者

紫蘇葉　杏仁去皮各一兩　甘草炙半兩　白朮　橘紅

半夏洗七次　桑白皮炒　貝母去心　五味子各一兩

右㕮咀每服四錢水一盞姜五片煎七分温服不拘時

紫蘇飲子 拔粹方 治脾肺虛寒痰涎咳嗽

紫蘇葉 桑白皮 青皮去白 五味子 杏仁

麻黄 甘草 陳皮各五錢 人參 半夏湯泡各二錢

右㕮咀每服一兩生姜三片水二盞煎八分食後温服

人參荊芥散 濟生方 治肺感風邪上壅咳嗽頭目不清言語不出咽乾項強鼻流清涕

陳皮去白 荊芥穗 桔梗 半夏湯泡七次 細辛洗去土

甘草炙 人參 杏仁去皮尖 通草 麻黄去根節

右㕮咀每服四錢水盞半姜五片煎八分食後温服

人參潤肺湯 聖惠方 治肺氣不足喘咳嗽不已并傷寒壯熱頭疼身痛

人參 乾葛 桔梗 白芷 麻黄去節

乾姜五錢 白朮 甘草炙各一兩

右㕮咀每服八錢水一盞半生姜三片葱白二莖煎至八分温服

偏皮湯 聖惠方 療春冬傷寒秋夏冷濕咳嗽喉中有聲上氣頭痛

陳皮 紫菀 麻黄去根 杏仁炒 當歸

官桂 甘草炙 黄芩各等分

右㕮咀每服一兩水二盞煎八分去滓温服食後

蠟煎散 御藥院方 順肺氣利咽膈止咳嗽化痰涎

款冬花 茶花 甘草炙各七錢半 五味子半兩 桑白皮炒

桔梗 杏仁 紫蘇葉各一兩

右㕮咀每服四錢水二盞入黄蠟少許同煎臨卧服

柯子散 咳嗽聲音不出

柯子二錢去核半煨半生 甘草三錢半炒半生 桔梗五錢半炒半生 木通三錢

右每服水一盞半煎至八分入生地黃汁一小盞攪勻臨卧徐徐嚥

四聖散 聖惠方 治咳嗽有失聲音

晉塩　葛根　槐花子　山梔子 等分

右㕮咀水二盞加烏梅甘草少許煎一盞入蜜少許食後通口服

八味款東花散 御藥院方 治肺經寒熱不調涎嗽不已

款冬花 洗焙　紫菀茸　五味子　甘草 炙各七錢半

桑白皮 炒　麻黃 去節　杏仁 湯泡去皮炒　紫蘇葉 各一兩

右為粗末每服五錢水盞半入黃蠟皂角子大煎至一盞熱服

○已上數方治感冒風寒新咳嗽之劑

三拗湯　治感冒風邪鼻塞聲重語音不出咳嗽喘急 方見喘類

杏參散　治胷脇脹滿上氣喘急咳嗽不得睡卧

桃仁 去皮炒　人參　桑白皮 蜜炙米泔浸焙　杏仁 去皮炒各等分

右㕮咀每服四錢水一盞姜棗煎不拘時

蘇沉九寶湯 簡易方 治老幼素有喘急遇寒暄不常發則連綿不已咳嗽哮吼夜不得暄

桑白皮　甘草　大腹皮　官桂　麻黃

薄荷　陳皮　紫蘇　杏仁 各六分

右㕮咀每服三錢水盞半姜三片烏梅半箇煎六分服

平肺湯 簡易方 治肺氣上壅喘嗽痰實寒熱往來咽乾口燥

陳皮 一兩　半夏 洗七次　苦梗 炒　薄荷 各七錢半　紫蘇

烏梅 去核　紫菀　知母　桑白皮 蜜炒　杏仁 炒

五味子 各錢分半　甘草 半兩　罌粟殼 蜜炒七錢半

右㕮咀每服五錢水一盞姜三片煎六分食後溫服

瀉白散 濟生方 治肺臟氣實心胸壅悶咳嗽煩喘大便不利

桔梗去芦炒　地骨皮去木　甘草炙　瓜蒌子　升麻
半夏湯泡七次　杏仁去皮尖　桑白皮炙各等分

右㕮咀每服四錢水盞半姜五片煎八分食後温服

桑白皮一兩　地骨皮七錢　甘草　陳皮去白　青皮
五味子　人參各五錢　白茯苓三錢

右㕮咀每服一兩水二盞加粳米煎至一盞食後温服

加減瀉白散 按粹方治陰氣在下陽氣在上咳嗽嘔吐喘促

青龍散 御藥院方治咳嗽上氣不得臥

五味子　人參去芦　陳皮去白　甘草　紫蘇各一兩

右㕮咀每服一兩水二盞生姜三片煎至八分去滓食後温服

加減三奇湯 按粹方治咳嗽上氣痰涎喘促胸膈不利

桔梗五錢去　半夏洗七次　陳皮去白　甘草　青皮去白各半兩

人參潤肺散 直指方治嗽喘急痰雍壅塞

麻黄去根節二兩　杏仁去皮炒一兩半　桔梗半兩　甘草炙一兩　橘紅二錢半　貝母去心炒一兩半

右㕮咀每服八錢水二盞薑三片煎至八分去滓温服食後

杏仁煎丸 瑞竹堂方治老人久患肺喘咳嗽不已睡臥不安服之立効

杏仁去皮尖　胡桃肉湯泡去皮衣

右各等分研為膏入煉蜜少許和搜得宜丸如彈子大每服一二丸食後臨臥細嚼姜湯送下

紫蘇半夏湯 按粹方治喘嗽痰涎寒熱往來

桑白皮二兩半　陳皮去白　五味子各五錢　紫菀茸五錢　杏仁去皮尖一兩炒

杏仁二錢　五味子四錢　人參

右㕮咀每服八錢姜三片煎至八分去滓温服食後

桑白皮　蘇葉各五錢

右㕮咀每服八錢水二盞薑三片煎至八分去滓通口服食後

人參去芦二兩　阿膠炒半兩

半夏湯泡七次　紫蘇各五錢

右為粗末每服五錢生姜三片煎日進三服

清金湯聖惠方　治男婦遠年近日咳嗽上氣喘急喉中涎聲胸膈滿氣逆坐卧不安飲食不下

粟殼蜜炒半兩　甘草炙五錢　陳皮去白　茯苓去皮　杏仁去皮尖炒

阿膠炒　五味子　桑白皮炒　薏苡仁　紫蘇

貝母去心　半夏麯　加百合　款冬花各一兩　人參五錢

右㕮咀每服八錢水一盞半生姜三片烏梅一箇煎至八分食後服

潤肺膏　治咳嗽痰喘

紫菀　杏仁去皮尖　款冬花各一兩　麻黃　桔梗

細辛　柯子各五兩　枯礬一兩　生姜二兩取汁　清油半斤

蜜一斤　核桃肉一兩

右先將油煉香熟次入蜜又煉去沫却下末藥攪勻每服二三匙臨卧白湯調服

奪命丹　上氣喘急經歲咳嗽鼻鼽久不愈者

信石一兩　白凡二兩　白附子三兩　南星四兩生　半夏五兩洗

右先用信石與白礬一處於石器內火煆紅出火黃色為度切不可犯鉄器却和半夏南星白附子為細末生姜汁麪糊為丸如黍米大硃砂為衣每服七丸小兒三丸井花水吞下忌食諸惡毒熱物

○廣按此方治咳嗽痰喘劫劑也蓋肺受火邪氣從火化有升無降加以脾濕生痰則上壅而為喘嗽滿悶不得安卧矣病作之時固宜用此藥以劫痰然病安之後即當用知母茯苓湯或人參五味子散寧肺湯以補虛可也

一方　治咳嗽痰喘

南星炮　半夏湯泡各一双　甘草三兩炙　陳皮去白一双半　杏仁五兩去皮尖

款冬花二兩　五味子三兩　人參二兩

每服水一鍾半生姜五片煎臨卧溫服忌生冷油膩

○廣按此方治咳嗽痰喘攻補兼施也

烟筒喘嗽方

款冬花　佛耳草　凝水石　人參　白芷

金精石　銀精石等分　甘草少用

右為末不以多少用香爐燒烟蘆筒吸入肺管用米飲下

○已上數方治咳嗽喘急肺脹之劑

半夏丸濟生方治肺臟鬱熱痰嗽胸膈塞滿

瓜蔞子去殼另研　半夏湯泡七次焙取末各一双

右二件和勻姜汁打麯糊丸梧桐子大每服五十丸食後姜湯下

玉液丸和劑方治風壅化痰涎利咽膈清頭目除咳嗽止煩熱

寒水石燒令赤出火毒水飛過三十兩　半夏洗焙為末十兩　白礬枯十兩研細

右合研麪糊丸如梧子大每服三十丸食後淡姜湯下

玉芝丸和劑方治風壅痰實頭目昏眩咳嗽聲重咽喉不利

人參去芦　乾薄荷　白茯苓去皮　白礬枯　天南星米泔浸焙各一兩　半夏湯洗七次姜汁和作麯六十兩

右為末生姜汁煮麵糊丸如梧桐子每服三十丸食後姜湯下如痰盛燥熱薄荷湯下

祛痰丸瑞竹堂方治風痰喘嗽

人參去芦　木香　天麻各一兩　槐角子七錢半　陳皮去白

茯苓去皮　青皮去穰　白朮煨各一兩　半夏七錢半　牙皂角去皮弦酥炙九錢

右為細末生姜自然汁打糊為丸如梧桐子大每服五十丸食後臨卧温酒送下姜湯亦可

利膈丸 拔粹方 治風痰實喘滿咳嗽風氣上攻

牽牛 四兩生用 半夏 湯泡二兩 木香 半兩 青皮 去白二兩 槐角 一兩炒

皂角 去皮弦酥炙二兩 加檳榔 大黄 各五錢

右為細末生姜麵糊為丸如梧桐子大每服五十丸生姜湯下

生香丸 治諸氣嗽生痰

南星 半夏 各三兩 用白礬一兩研同氷浸二味一宿

陳皮 五兩泔浸一周時去白取三兩 香附子 三兩皂角水浸一周時晒

右四味不見火為末姜汁糊丸梧桐子大每服五十丸臨卧姜湯下

此方家傳秘方累驗

星羊丸 治諸般咳嗽

南星 姜製 半夏 麯 凝水石 枯礬 姜蚕 炒

乾生姜 各一兩

右為末生姜汁糊丸如梧子每服五十丸姜湯下食後

瓜蔞半夏丸 治咳嗽喘滿

瓜蔞 杏仁 去皮尖 枯礬 各一尺 半夏 湯泡二兩 款冬花 一兩半

麻黄 去根節一兩

右為末用瓜蔞汁生姜自然汁用水糊為丸如梧桐子大每服三十丸食後臨卧淡茶湯下忌生冷鹹酸酒

玉壺丸 治風痰吐逆咳嗽

南星 生用 半夏 生用各一兩 天麻 生用各一兩 白麵 三兩

右為細末同白麵和均滴水丸如梧桐子大晒乾每服三十丸以水一大鍾先煎令沸下之煮五七沸候藥浮起即漉出眼乾用姜湯下

透羅丹　治痰實咳嗽胸肺不利

皂角去皮弦酥炙　黑牽牛炒　半夏　大黃濕紙包炒焙一兩

巴豆一錢去油另研　杏仁去皮尖麸炒一兩

右為細末生姜自然汁丸如梧桐子大每服三十丸姜湯下咳嗽甚者三四服立効

一方　取痰

藜蘆　人參用芦各二錢　牙皂角去皮弦炮一錢　防風去皮一錢

細辛去土各一錢半

右用酸漿水一碗食後温服候吐痰覺胸中痰盡用冷葱湯特呷飲止為度

人參散　直指方　治咳嗽痰壅通用

人參去芦　桔梗　半夏麯　五味子　細辛去葉

枳殼制衣　赤茯苓去皮　杏仁不去皮各一分　甘草炙半分

右㕮咀每服一兩生姜五片烏梅半箇水二盞煎至八分服食後一方無杏仁烏梅不用痰嗽加紫菀添甘草

人參飲　治痰嗽

半夏湯泡七次　南星　寒水石　柴胡去芦　五味子

猪牙皂角　甘草炙　款冬花　熱加黃芩

右㕮咀每服八錢生姜五片水一盞半煎至八分臨卧通口服

人參飲子　百一選方　治痰嗽寒熱壅盛

人參去芦　桔梗　半夏　五味子　赤茯苓

白朮各一兩　枳殼　甘草炙各半兩

右㕮咀每服三錢水一盞姜五片煎七分空心服治寒壅者加杏仁不去皮紫蘇各半兩

辰砂半夏丸　治一切痰飲咳嗽

用大半夏一斤湯泡七次晒乾為末用生絹袋盛貯於磁盆內用淨水洗出去麄楂將洗出半夏末就於盆內日晒夜露每日換新水七日七夜澄去水將半夏粉晒乾每半夏粉一兩入飛過細硃砂末一錢用生姜汁糊為丸如梧桐子大每七十丸用淡生姜湯下食後服

黃芩半夏丸　治上焦有熱咳嗽生痰

黃芩末一錢　製過半夏粉一兩

右二味和勻用生姜汁為丸如梧桐子大每服七十丸用淡生姜湯送下食後服

天竺黃餅子　治一切痰嗽吐焦有熱心神不寧其効甚驗

牛膽南星三錢　薄荷葉二錢　天竺黃二錢　硃砂二錢　片腦二分

茯苓一錢　甘草一錢　天花粉一錢

右為末煉蜜入生地黃汁和藥作餅子每用一餅噙化下食後服

白朮湯濟生方　治五臟受濕咳嗽痰多氣喘身體重著脉來濡細

白朮二兩　五味子　半夏湯泡七次　白茯苓去皮　橘紅各二兩

甘草炙半兩

右㕮咀每服四錢水一盞姜五片煎八分溫服不拘時

○已上數方治痰飲咳嗽之劑

款冬花散和劑方　治肺感寒邪咳嗽喘滿胸脇煩悶痰涎壅盛喉中哮喘鼻塞流涕咽喉腫痛

杏仁　阿膠炒　麻黃去根節　半夏湯洗姜製　款冬花各一兩

桑葉　知母　甘草炙　貝母各二兩

右㕮咀每服二錢水一盞姜三片煎食前溫服

洗肺散　治咳嗽痰盛肺氣不利

黃芩二錢　半夏三錢　天門冬去心　麥門冬去心　五味子各一兩半

甘草半錢　杏仁去皮尖

右㕮咀作一服水二鍾生姜五片煎至七分食後服滓再煎服

百花膏濟生方治喘咳嗽不已或痰中有血

款冬花　百合蒸焙各等分

右為細末煉蜜為丸龍眼大每服一丸食後細嚼姜湯下噙化尤佳

具母散御藥院方治咳嗽多日不愈

具母去心　桑白皮　五味子　甘草半兩炙　知母一錢五分

款冬花二兩　杏仁三兩去皮尖麩炒

右㕮咀每服一兩水一盞半生姜三片煎至八分去滓溫服食後

人參散聖惠方治諸咳嗽喘急不出言語年久五服日近三服効

人參　知母　具母　半夏　杏仁

馬兜鈴去皮用肉　麻黃不去節各半兩　天仙藤二兩

右㕮咀每服八錢水二盞烏梅一箇蜜一匙煎至八分去渣溫服食後臨卧服忌酒醋雞麵鹹酸生冷

○廣按古方治火鬱乾咳嗽者甚少治風寒濕咳嗽者甚多蓋由不分內外所因新久之異故也夫形寒飲冷新咳嗽有痰固當以溫寒散濕為主如人參半夏之類可也若夫氣動火炎久咳嗽無痰又當以清熱潤燥為先然人參半夏之類又在所禁如天門麥門知母貝母石膏瓜蔞之類可也世人徒知肺主皮毛外感風寒為寒殊不知傳裏鬱久變為熱也況肺為華蓋而五臟六腑火自內起薰蒸焚灼作咳嗽者亦良多矣已上諸方頗合亦須加減可也

○已上數方治火鬱咳嗽之劑

鍾乳補肺湯和劑方治肺氣不足久年咳嗽以致皮毛焦枯唾血腥臭

喘乏不已

鍾乳碎如米　桑白皮各三兩　肉桂去皮　白石英如米　五味子揀

款冬花去梗　紫菀洗去土　人參去芦二兩　麥門冬去心三兩

右除鍾乳白石英外同為粗末後入鍾乳等同拌勻每服四錢水一盞半姜五片棗一枚粳米三十粒煎七分用綿濾去滓食後服

人參潤肺丸和劑方治肺氣不足咳嗽喘急久年不愈漸成虛勞及療風壅痰實頭目昏眩口舌乾燥涕唾稠粘

人參　款冬花去梗　細辛去葉　甘草炙各四兩　官桂去皮

桔梗各五兩　杏仁去皮炒四兩　知母六兩

右為末煉蜜丸如雞頭子大每服一丸食後細嚼淡姜湯下

人參養肺丸和劑方治肺胃俱傷氣奔於上客熱薰肺咳嗽喘急胸中煩悸涕唾稠粘或有勞傷肺胃吐血嘔血並皆治之

人參　黃芪去芦蜜炙各一兩八錢　瓜蔞根　白茯苓去皮各六兩

杏仁去皮炒二兩四錢　皂角子三百箇　半夏湯泡七次為末生姜和作麯四兩炒

右為末煉蜜丸如彈子大每服一丸食後細嚼用紫蘇湯下如喘急用桑白皮湯下

團參飲子濟生方治憂思喜怒飢飽失宜致傷脾肺咳嗽膿血增寒壯熱漸成勞瘵者

人參　紫菀茸洗　阿膠蛤粉炒　百合蒸　細辛洗去葉土

款冬花　杏仁炒去皮尖　天門冬湯泡去心　半夏湯泡七次　經霜桑葉

五味子各一兩　甘草炙半兩

右㕮咀每服四錢水盞半姜五片煎七分食後溫服　氣嗽加木香

唾血而熱加生地黃　唾血而寒加鍾乳粉　疲極咳嗽加黃芪

損肺唾血加沒藥藕節　嘔吐肢滿不食加白朮　咳而小便多

者加益智仁　咳而面浮氣逆加沉香橘皮煎　大便溏者去杏仁
加鍾乳粉
紫苑茸湯 濟生方 治飲食過度或食煎煿邪熱傷肺咳嗽咽痒痰多唾
血喘急脇痛不得安卧
紫苑茸 洗　經霜桑葉　款冬花　百合 蒸焙　杏仁 去皮尖
阿膠 蛤粉炒　具母 去心　蒲黃 炒　半夏 湯洗各一兩　犀角 鎊
甘草 炙　人參 各半兩
右㕮咀每服四錢水盞半姜五片煎八分食後温服
人參保肺湯　治五勞七傷喘氣不接涎痰稠粘骨蒸潮熱 見發熱類
補肺湯 拔粹方 治勞嗽
桑白皮　熟地黃 各三兩　人參　紫苑　黃芪
五味子 各一兩
右㕮咀每服一兩水一盞煎至八分入蜜少許温服食後
寧肺湯 楊氏家藏方 治榮衛俱虛發熱自汗肺氣喘急咳嗽痰唾
人參 去芦　當歸 去芦　白朮　熟地黃　川芎
白芍藥　甘草 炙　五味子　麥門冬　桑白皮
白茯苓 去皮各半兩　阿膠 蛤粉炒一兩
右㕮咀每服一兩生姜五片水二盞煎至一盞去滓通口服食後
五味黃芪散 拔粹方 治嗽咯血成勞眼睛疼痛四肢困倦脚膝無力
麥門冬 去心　熟地黃　黃芪　桔梗 各半兩　人參 二錢
甘草　芍藥　五味子 各二錢
右㕮咀每服八錢水二盞煎至八分去渣温服食後
温金散 大全良方 治勞嗽
甘草　黃芩　桑白皮　防風 各一兩　杏仁 一十七粒製

人參去芦　茯神各五錢　麥門冬去心二錢半

右以前五味用米泔水浸一宿晒乾次入人參茯神麥門冬三味同為末每服二錢水一盞蠟一豆大煎至八分食後溫服

人參潤肺丸

人參　山藥　蓮肉　款冬花　蛤粉

杏仁去皮尖各一兩　藕節五兩　紅棗煮去核半斤　大蘿蔔一箇煮熟

右為末棗肉丸梧子大每服五十丸白湯下食後

人參五味子散聖惠方治男女老稚諸虛百損氣血勞傷涎喘欬膿或嗽哈血寒熱往來夜有盜汗羸瘦困乏一切虛損

人參　五味子　桔梗　白朮　白茯苓

甘草炙　熟地黃　當歸焙半兩　地骨皮　前胡去苗

桑白皮炒　枳殼去穰炒　黃耆炙　陳皮去白　柴胡各三錢

右㕮咀每服八錢水一盞半生姜三片煎至八分去滓溫服食後日三煩渴加烏梅青蒿煎咳膿血加知母阿膠煎尤妙

大寧嗽湯直指方治勞嗽諸嗽通用如神効

北五味　茯苓去皮　桑白皮炒　紫蘇　細辛

橘皮　枳殼麩炒　杏仁麩炒去皮　甘草炙　阿膠炒

粟殼去穰蜜炒各二兩　半夏湯洗五兩　勞嗽加川芎

右㕮咀每服一兩水二盞棗二枚姜三片烏梅半箇煎至一盞溫服

加味人參紫菀散直指方治虛勞咳嗽

五味子　人參　紫菀茸　陳皮　貝母

紫蘇葉　桑白皮炒　白茯苓各一兩　杏仁炒去皮　甘草各七兩半

加川芎　半夏麴各一兩　阿膠蛤粉炒五兩

右㕮咀每服一兩水二盞姜七片棗二枚烏梅一箇煎至一盞溫服

人參蛤蚧散　治三年肺氣上喘咳嗽咯唾膿血滿面生瘡遍身黃腫

蛤蚧一對全者河水浸五宿日換水洗去腥酥炙黃　杏仁去皮尖　人參

甘草炙各五兩　知母　桑白皮　茯苓去皮　貝母各三兩

右為細末淨磁盒兒內盛每日用茶點服神効

○廣按治嗽方中多用人參以其肺虛故也然肺受火邪久嗽喘滿吐血與夫陰虛火動午後發熱兼嗽者切宜忌之然肺受寒邪喘嗽與夫陽虛火動晝夜發熱兼嗽者宜用亦須知母貝母天門麥門瓜蔞之類擇其一二味監制可也丹溪云予每治病以某藥為主治以某藥為引經以某藥為監制是也

○已上數方治勞嗽之劑

二母散　治嗽久不愈者常服除根累効

知母　貝母等分

右為細末老生姜切片蘸藥細嚼白湯下

人參紫菀湯百一選方　治肺氣不調咳嗽喘急久不愈者

五味子二兩半　杏仁半兩　人參　紫菀　甘草各二錢

縮砂一兩　桂枝二錢半　罌粟殼去穰姜炒制一兩　款冬花半兩

右㕮咀每服四錢水一盞姜五片烏梅二枚煎服

人參理肺散拔粹方　治喘嗽不止

麻黃去節炒黃一兩　米殼三兩炒　人參二兩去芦　當歸　木香各一兩

杏仁三兩麩炒

右為粗末每服四錢水煎服

人參款花膏和劑方　治肺受虛寒久嗽不已咽膈滿悶咳嗽痰涎嘔逆惡心腹脇脹滿腰背倦痛或勞虛冷嗽及遠年近日一切嗽病服諸藥不効者皆治

款冬花去梗　人參去芦　北五味去梗炒　紫菀洗去芦　桑白皮各一兩

右為末煉蜜丸雞頭實大每服一丸細嚼姜湯下臨卧食後服

人參款冬花散拔粹方治喘嗽久不已者

人參去芦　款冬花各五錢　知母　貝母　半夏各三錢

粟殼一兩炒黃

右㕮咀每服八錢水一盞半烏梅一箇煎至八分食後臨卧温服

補肺湯直指方治肺虛氣乏久嗽

阿膠炒　蘇子　桔梗　半夏制　甘草炙各半兩

款冬花　砂仁　紫菀　細辛　杏仁去皮炒

陳皮去白　桑白皮炒　青皮去白　五味子　石菖蒲

草果各二錢半

右㕮咀每服一兩水二盞生姜四片紫蘇三葉煎至八分温服

治多年喘嗽

人參　麻黃　甘草各二兩

右為末每服二錢杏子五箇擂碎無根水同煎和渣食後服

治遠年近日一切咳嗽

人參　五倍子　杏仁去皮尖各五錢　半夏七錢

右用蘿蔔去頂取空以草麻子去殼四十九粒明凡五錢為末二味入蘿蔔內以頂蓋紙裹煨研丸每服十丸臨卧烏梅湯下

人參湯經驗方治遠年嗽

麻黃去節　杏仁去皮尖炒各一兩　甘草炙四兩　桑白皮

五味子　粟殼製　陳皮各五錢　麥門冬三錢　紫菀兩

人參去芦四錢　阿膠七錢炒

右㕮咀每服一兩水二盞煎至八分去滓温服食後

治多年嗽 百一選方

杏仁去皮尖 半夏湯泡七次 南星生用 甘草生用各等分

右㕮咀每服八錢生姜七片棗一枚水一盞半煎至八分食後溫服

諸般嗽不已

粟殼製 烏梅去核 陳皮去白 人參去芦 木香

五味子 桔梗炒 杏仁去皮尖炒 石藁 甘草

右㕮咀每服八錢薤水二盞煎至八分去滓溫服食後

九仙散 治一切咳嗽

人參 款冬花 桔梗 五味子 阿膠

烏梅各一兩 貝母 罌粟殼各半兩 桑花一兩

右為細末每服三錢白沸湯點服

人參清肺湯和劑方治肺胃虛熱咳嗽喘急坐卧不安并治久年勞嗽

唾血腥臭

阿膠炒 杏仁去皮炒 桑白皮 地骨皮 人參

知母 烏梅去核 甘草炙 罌粟殼去蒂蓋蜜炙各等分

右㕮咀每服三錢水盞半生姜棗子各一枚煎至一盞食後溫服

○已上數方治咳嗽喘急久不愈之劑

○廣按肺主皮毛人之無病之時榮衛周流內氣自皮膚腠理普達於外一或風寒外束則內氣不得於外達便從中起所以氣升痰上故咳嗽宜用辛溫辛凉之劑以發散風寒則邪退正復而嗽止也又按肺為華蓋凡飢飽勞役喜怒憂恐與夫飲醇醪食厚味則火升痰上而傷於肺亦作咳嗽宜用降火豁痰之劑則火降痰消而咳止也又按肺主氣運行血液周流一身今也肺受火邪氣從火化有升無降為嗽為喘久而不治虛極至損則不能運行氣液

發為煩熱驚悸咳嗽粘涎膿血宜用補虛潤燥開鬱散火之劑則肺得清正而嗽止也故治咳嗽要知新久之異虛實之殊補瀉之宜也矣

欬嗽治例 出明醫雜著

王節齋曰欬謂有聲肺氣傷而不清嗽謂有痰脾濕動而生痰欬嗽者因傷肺氣而動脾濕也病本雖分六氣五臟之殊而其要皆主於肺蓋肺主氣而聲出也須分新久虛實新病風寒則散之火熱則清之濕熱則瀉之久病便屬虛屬鬱氣虛則補氣血虛則補血兼鬱則開鬱滋之潤之斂之降之則治虛之法也

主方

杏仁去皮尖 白茯苓各一錢 橘紅七分 五味子 桔梗 甘草各五分

春作多上升之氣宜潤肺抑肝加川芎芍藥半夏各一錢 麥門冬炒 黃芩知母各五分

春若傷風致欬鼻流清涕宜辛涼解散加防風薄荷紫蘇炒黃芩麥門冬各一錢

夏多火熱炎上最重宜清金降火加桑白皮知母炒黃芩麥門冬石膏各一錢

秋多濕熱傷肺宜清熱瀉濕加蒼朮桑白皮各一錢 防風黃芩山梔炒各五錢

冬多風寒外感宜解表行痰加麻黃桂枝半夏生乾姜防風各一錢 肺經素有熱者再加酒炒黃芩知母各五分 若發熱頭疼鼻塞聲重再加藁本川芎前胡柴胡各一錢

若有痰加半夏枳殼風痰再加南星姜汁炒 濕痰脾困少食加白朮

蒼朮　有痰而口燥咽乾勿用半夏南星宜加知母蜜水拌炒具
母瓜蔞仁黃芩炒
若夏日熱痰或素熱有痰加黃芩黃連知母石膏
上半日欬者胃中有火加具母石膏黃連　五更嗽者同治
黃昏欬者火浮於肺不宜正用寒涼藥宜加五味子訶子皮斂而降
之
若欬嗽久肺虛滋氣補血加人參黃耆阿膠當歸生姜天門冬款冬
花馬兜鈴酒芍藥之類肺熱咳喘去人參用沙參此兼補氣血也
若午後欬者屬陰虛即勞嗽也宜補陰降火加川芎當歸芍藥熟地
黃黃栢知母竹瀝姜汁天門冬瓜蔞仁具母此專補陰血也
若火鬱嗽謂痰鬱火邪在中宜開鬱消痰用訶子皮便香附瓜蔞仁
半夏麯海石青黛黃芩為末蜜調為丸噙化仍服前補陰降火湯
藥失治則成勞
若痰積食積作咳嗽者用香附瓜蔞仁具母海石青黛半夏麯軟石
膏山楂子枳實姜炒黃連為末蜜調噙化
若勞嗽見血加阿膠當歸芍藥天門冬知母具母桑白皮亦於前肺
虛陰虛二條擇用大抵咳嗽見血多是肺受熱邪氣得熱而變為
火火盛而陰虛不得安寧從火上升故治宜瀉火滋陰忌用人參
等甘溫補氣之藥然亦有氣虛而咳血者則宜用人參黃耆款冬
花之藥但此等證不多耳
因欬而有痰者欬為重主治在肺因痰而致欬者痰為重主治在脾
但是食積成痰痰氣上升以致欬嗽只治其痰消其積而欬自止
不必用肺藥以治嗽也

○肺痿

丹溪心法

肺痿治法在乎養血養肺養氣清金　曾治一婦人二十餘歲胸膺間一竅口中所咳膿血與竅相應而出以人參黃芪當歸補氣血之劑加退熱排膿等藥而愈

附脉理

脉訣舉要曰寸數虛濇肺痿之形

附諸方

人參養肺湯　治肺痿證咳嗽有痰午後熱并聲颯者

人參去芦　甘草　阿膠珠各一錢　茯苓一錢半　柴胡四錢

五味子　貝母　杏仁炒　桔梗炒各一錢半　桑白皮二錢

枳實一錢五分

右㕮咀每服八錢生姜三片棗一枚水一盞半煎至八分食後溫服

知母茯苓湯宣明方　治肺痿喘嗽不已往來寒熱自汗

茯苓　甘草炙各一双　知母　五味子　人參去芦

薄荷　半夏洗七次　柴胡去苗　白朮　款冬花

桔梗　麥門冬去心　黃芩各半双　川芎　阿膠炒各三錢

右㕮咀每服一兩水二盞生姜十片煎至一盞去渣通口服食後

人參平肺散拔粹方　治心火尅肺傳為肺痿咳嗽喘嘔痰涎壅盛胸膈痞滿咽嗌不利

桑白皮炒一双　知母七錢　甘草炙　地骨皮各半双　五味子三百个

茯苓　青皮　人參各四錢　陳皮去白半双　天門冬去心四錢

如熱加黃芩四錢紫蘇葉半夏各半双

右㕮咀每服五錢水二盞生姜三片煎至八分去滓溫服或為末姜汁丸彈子大噙化亦得食後

紫苑散 拔粹方 治咳嗽唾中有膿血虛勞證肺痿變癰

人參一兩 紫苑半兩 知母一兩半 貝母一兩半 桔梗一兩

甘草半兩 五味十五立 茯苓一兩 阿膠炒五分

右㕮咀水煎服一云各等分水二盞生姜三片煎至一盞食前服

劫勞散 拔粹方 治心腎俱虛勞嗽二三聲無痰遇夜發熱熱過即冷時有盜汗四肢倦怠體劣黃瘦飲食減少夜卧恍惚神氣不寧睡多異夢此藥能治微嗽唾中有紅線名曰肺痿若不治便成羸劣之疾

白芍藥六兩 黃耆 甘草 人參 半夏洗

白茯苓 熟地黃 當歸 五味子 阿膠炒各二兩

右㕮咀每服一兩水二盞生姜三片棗三枚煎至一盞服不拘時

○肺癰

丹溪心法

肺癰已破入風者不治 用醫壘元戎搜風湯吐之 或用太乙膏成丸食後服 收斂瘡口止有合歡樹皮白斂煎飲之合歡即槿樹皮也又名夜合

附論

廣按書云咳嗽有濁唾涎沫或咳嗽唾中有紅線膿血名曰肺痿熱在上焦故也如口中辟辟燥欬即胸中隱隱痛名曰肺癰欬傷肺葉成也

附脉理

脉訣舉要曰寸數而實肺癰已成寸數虛濇肺痿之形肺癰色白脉宜短濇死者浮大不白而赤

附諸方

桔梗湯 濟生方 治肺癰咳嗽膿血咽喉多渴大小便赤澁

桔梗去芦　貝母去心膜　當歸去芦酒浸　瓜蔞子　枳殼去穰麸炒
薏苡仁炒　桑白皮蜜水炙　防巳各二兩　黃芪去芦一兩半　甘草節生用
杏仁去皮尖麸炒　百合蒸各半兩

右㕮咀每服五錢水盞半生姜五片煎八分不拘時服如大便秘大
黃小便赤少加木通

消膿飲　治桔方　治肺癰膿腥氣上衝而嘔咳嗽

南星生一兩　貝母　白芷　生地黃
知母　桑白皮炒　白茯各半兩
阿膠炒　川芎　甘草炙
防風　射干
桔梗　紫蘇葉　天門冬去心
薄荷　杏仁不去皮尖半夏姜製各七錢半

右㕮咀每服一兩水二盞生姜七片烏梅一箇煎至八分食後溫服

黃芪散　治肺癰

用白蜜炙為細末每服二大匙食遠黃芪湯調服

一方　治肺癰吐膿

桔梗炒一兩
桔梗

右每服一兩水一鍾半煎八分空心服吐盡膿為効

甘草炙半兩

霍亂 十七

丹溪心法

○內有所積外有所感致成吐瀉仍用二陳湯加減作吐必提其氣此非鬼神皆屬飲食前人確論乃陽不升陰不降乖隔而成切莫與穀食雖未飲一呷入口即死必待吐瀉過二三時直至飢甚方可與稀粥食之脉多伏欲絕見成吐瀉不徹還用吐提其氣起或用橁木煎湯吐

之亦可　大法生姜理中湯最好不渴者可用如渴者用五苓散有吐者以二陳湯探吐亦有可下者　轉筋不住男子以手挽其陰女子以手牽乳近兩邊此千金妙法也　轉筋皆屬乎血熱四物湯加酒芩紅花蒼朮南星煎服　乾霍亂者最難治死在須更升降不通當以吐提其氣極是良法世多用鹽湯此係內有物所傷外有邪氣所遏有用吐者則兼發散之義有用溫藥解散者不可用涼藥宜二陳湯加解散藥

二陳湯加　川芎　蒼朮　防風　白芷又云白朮

右剉姜五片煎服

治霍亂方

蒼朮　厚朴　陳皮　葛根各一錢半　滑石三錢

白朮二錢　木通一錢　甘草炙

右剉入姜煎湯下保升丸四五十丸

戴云霍乱者吐也有聲有物凡有聲無物而躁乱者謂之乾霍乱也

二陳湯　見痰類

理中湯　見中寒

五苓散　見溫熱

四物湯　見補損

附論

廣按人於夏月多食生冷因脾虛不能運化加以外感風寒則揮霍亂上吐下瀉也人見倉卒躁擾痛悶似有鬼神然實非鬼神乃飲食痞隔上下不通將欲吐瀉故如是也

附脉理

脉訣舉要曰滑数為嘔代者霍亂微滑者生濇数凶断又曰滑而不勻必是吐瀉霍乱之候脉代勿訝

附諸方

姜附湯　治中寒霍乱轉筋手足厥冷

理中湯　治中寒霍乱吐瀉　並見中寒

通脉四逆湯 濟生方　治霍乱多寒内冷脉絶

吳茱萸 炒二兩　附子 炮一兩　桂心 去皮不見火　木通　細辛

白芍藥　甘草 炙各半兩　當歸 去芦三錢

右㕮咀每服四錢水一盞酒半盞姜七片棗一枚煎七分温服

七氣湯 三因方　治七氣欝結五臟之間互相刑尅陰陽不和揮霍變乱吐利交作

半夏 湯洗五兩　厚朴 姜製　桂心 各三兩　白芍藥　茯苓 去皮各四兩

紫蘇葉　橘皮 各二兩　人參 去芦一兩

每服四錢水一盞酒半盞生姜七片棗一枚煎七分温服

五苓散　治霍乱吐瀉煩渴引飲　見温熱

香朴飲子　治伏熱吐瀉虚煩作乱　見中暑

藿香正氣散　治中濕霍乱吐瀉

不換金正氣散　治霍乱轉筋嘔吐泄瀉頭疼　並見胃寒

二香散　治暑濕相搏霍乱轉筋煩渴悶乱

藿香 二兩　半夏　陳皮　桔梗　白朮

大腹皮　茯苓　厚朴　紫蘇　白芷 各一兩

甘草 二兩半　黄連 二兩　香薷 一斤　扁豆 半斤

每服用水一鍾半生姜三片葱白二根煎食後熱服此即藿香正氣散黄連香薷飲相合也

既濟湯 醫方集成　治霍乱後虚煩不得眠

人參 去芦　甘草 炙　淡竹葉 炙各半兩　麥門冬 去心一兩　附子 炮半兩

半夏湯洗五升

右㕮咀每服四錢水二盞姜五片粳米百餘粒煎空心温服

麥門冬湯濟生方　治霍亂已愈煩熱多渴小便不利

麥門冬去心　橘皮去白　半夏湯炮七次　白茯苓去皮　白朮各一兩

人參去芦　甘草炙各半兩　小麥半合

右㕮咀每服四錢水盞半姜五片烏梅少許煎八分温服

木瓜湯直指方　治霍亂吐瀉轉筋擾悶

酸木瓜二兩　茴香微炒二升半　甘草炙二升　吳茱萸洗炒七次二兩

右㕮咀每服四錢姜五片紫蘇十葉煎服空心

桂苓甘露散　治中暑霍亂吐瀉發渴引飲　見中暑

加減理中湯

人參　白朮　乾姜　甘草炙各等分

若為寒氣濕氣所干者加附子一兩名附子理中湯　若霍亂吐瀉加陳皮青皮各一兩名治中湯　若乾霍亂心腹作痛先以塩湯少許頓服候吐出令透即進此藥　若嘔吐者於治中湯內加丁香半夏一兩每服生姜十片同煎　若泄瀉者加橘紅茯苓各一兩名補中湯　若溏泄不已者於補中湯內加附子一兩　不喜飲米穀不化者再加縮砂仁一兩共成八味　若霍亂吐下心腹作痛手足逆冷於本方內去白朮加熟附名四順湯　若傷寒結胸先以桔梗枳殼等分煎服不愈者及諸吐利後胸痞欲絕心膈高起急痛手不可近者加枳實茯苓各一兩名枳實理中湯　若渴者再於枳實理中湯內加括蔞根一兩　若霍亂後轉筋者理中湯內加火煅石膏一兩　若臍上築者腎氣動也去朮加官桂一兩半腎惡燥故去朮恐作奔豚故加官桂　若悸多加茯苓一兩　若渴欲飲水者添加朮

半兩　若腹滿者去白朮加附子一兩　若飲酒過多及吹炙煿熱食發為鼻衄加川芎一兩

陽安定血脉只用本方

三因白朮散　治中暑嘔吐暈眩及大病後調理失宜勞復如初及脾胃虛損面色萎黃飲食不美口吐酸水滑泄腹鳴飲食所傷霍亂吐瀉並宜服之

白芷　甘草炙　青皮去白　白茯苓　桔梗　山藥　香附子各三兩　乾姜半兩　白朮　陳皮各一兩

每服水一鍾生姜三片棗一枚木瓜一片紫蘇葉三片皮煎食前服若吐瀉加白梅煎　喘加桑白皮杏仁　傷寒勞復加薄荷　膈氣加木通入麝香少許　中暑嘔逆加香薷霍亂加藿香　產後泄瀉加荊芥　氣脉入鹽煎服

調中白朮散　治大病後吐瀉煩渴霍亂虛損氣弱及酒毒嘔噦

白朮　茯苓去皮　藿香半兩　葛根一兩　甘草炙各一兩半

右為末白湯調服二錢煩渴加滑石二兩甚者加姜汁

人參散　經驗方　止吐逆及治瀉後煩渴常服調中和氣

茯苓去皮　人參洛半　甘草炙各一兩半　葛根一兩　藿香去土　木香

右㕮咀每用水二盞煎至一盞通口服瀉後渴甚者加滑石一錢

止渴湯　經驗方　治霍亂煩渴

甘草炙　人參去芦　麥門冬去心　茯苓去皮　桔梗　瓜姜根　葛根

右為末蜜湯調二錢下　澤瀉各半兩

回生散 百一選方 治霍亂吐瀉但一點胃氣存者服之回生

陳皮去白 藿香去上等分

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓溫服不拘時候

姜鹽飲 直指方 治霍亂欲吐不吐欲瀉不瀉

鹽一兩 生姜半斤切

右同炒令色變以水一椀煎熟溫服甚者加童子小便一盞

治絞腸沙證 經驗方 治手足厥冷腹痛不可忍者以手醮溫水於病者

膝脛內拍打有紫黑點處以針刺去惡血即愈 一法用麻弦小竹

弓醮香油或熟水括手足胸背額項即愈

備急大黃丸 療心腹者百病用此藥吐下即愈

方見傷食

○廣按乾霍亂者乃寒濕太甚脾被鬱而不能動氣被鬱而不能行所以卒痛而手足厥冷惡心嘔吐俗名攪腸沙者蓋言痛之甚也除用藥不言外北方刺書務以出氣血南方括胸背手足以行氣血俱能散病然出氣血不如行氣血之為愈也蓋霍亂乃氣病非血病也今刺青筋固能散氣而血因之以傷況人之一身氣常有餘血常不足今不足者又從而傷之是不足之中又不足也少壯之人庶或得免而衰老之人則不免於死也何以言之氣為血之先導血為氣之依附今陰血既已發越則陽氣失其依附必然發越不死何待書曰陽虛必惡寒陰虛必發熱蓋氣有餘便生火火動則發熱熱久而陰血愈消經曰陰虛則病陰竭則死此之謂也

暑門

瘧十八

絲集
休寧東山古菴方廣約之類集

丹溪心法

○瘧疾有風暑食痰老瘧瘧毋大法風暑當發汗夏月多在風涼處飲冷遂閉其汗而不泄故也惡飲食者必自飲食上得之無汗者要有汗散邪為主帶補有汗者要無汗正氣為主帶散

一日一發者受病一月一發者受病半年三月一發者受病

一年　二日連發住一日者氣血俱病　瘧病感虛者須以人參白朮一二貼托住其氣不使下陷後使他藥內傷挾外邪同發內必主痰外以汗解散二陳湯加柴胡黃芩常山草果煎服　久瘧不得汗者二陳湯加檳榔倍蒼朮　一方加柴胡葛根川芎一補一發不可直截　老瘧病此係風暑於陰分用血藥引出陽分則散入方宜

川芎　撫芎　紅花　當歸　炒柏
白朮　倉朮　甘草　白芷

右剉水煎露一宿次早服

○治瘧一日間一日發者補藥帶表藥後以截瘧丹截之若在陰分者用藥掣起陽分方可截即前藥之屬

充按瘧在陰分須徹起陽分者即格致論中云臟傳出至腑亂而失期也又當因其汗之多寡而為補養升發之術下陷謂陽氣下陷入陰血中無汗要有汗多用川芎蒼朮乾葛升麻柴胡之屬此丹溪治瘧之微旨學者所當知也

截藥常山飲

穿山甲炮　草果　知母　檳榔　烏梅
甘草炙　常山

右㕮咀水酒一大碗煎半碗露一宿臨發日早服得吐為順　一云加半夏柴胡去穿山甲如吐加厚朴又或加青皮陳皮

又方

柴胡　草果　常山　知母　具母
檳榔

右用酒水同煎露一宿臨發前二時服

又治瘧母此藥消導

青皮　桃仁　紅花　神麯　麥芽

鱉甲醋炙　三稜　莪朮　海粉　香附並用醋煮

右為末丸如梧子大每服五七十丸白湯下

又治瘧寒熱頭痛如破渴飲冰水外多汗出

人參　白朮　黃芪　黃芩　黃連

山梔炒　川芎　蒼朮　半夏　天花粉

右㕮咀水二鍾姜三片煎服

又治瘧疾發渴

生芐　麥門冬　天花粉　牛膝　知母

葛根　炒栢　生甘草

右㕮咀水煎

截瘧青蒿丸

青蒿半斤　冬瓜葉　官桂　馬鞭草

右焙乾為末水丸胡椒大每一兩分四服於當發之前一時服盡

又云青蒿一兩冬青葉二兩馬鞭草二兩桂二兩未知孰是姑兩存

之以俟知者

截瘧

檳榔　陳皮　白朮　常山各三錢　茯苓

烏梅　厚朴各一錢半

右㕮咀作二服水酒各一鍾煎至一鍾當發前一日一服臨發日早

一服服後少睡片時

又瘧疾後

白朮　半夏一兩　黃連半兩　白芍三錢　陳皮半兩

右為末粥丸梧子大每服六十丸姜湯下

心法附錄曰世用砒霜等毒未可輕用俗謂之脾寒此因名而迷其實也苟因飲食所傷而得亦未必全是寒況其他乎在其陽分者易治陰分者難治瘧毋必用毒藥消之行氣消堅為主東垣謂寒瘧屬太陽熱瘧屬陽明風瘧屬少陽在三陰經則不分總曰溫瘧此言是但二陰經說不明凡作於子午卯酉日者少陰瘧也寅申巳亥日者厥陰瘧也辰戌丑未日者太陰瘧也

脉訣規要曰瘧脉自弦弦遲多寒弦數多熱隨時變遷

心法附錄曰瘧脉多弦但熱則弦數寒則弦而帶遲亦有病久而脉極虛微而無力似乎不弦然而必於虛數之中見弦但不搏手耳細察可見也

黃連香薷飲　治伏暑發瘧煩渴者　見中暑

桂枝羌活湯　挨粹方　治瘧疾處暑前發頭痛項強脉浮惡寒有汗者

桂枝　羌活　防風　甘草　各半兩

右為粗末每服半兩水煎如吐者加半夏麴等分

麻黃羌活湯　挨粹方　治瘧疾頭痛項強脉沖惡風無汗者

麻黃去節　羌活　防風　甘草　各半兩

右為粗末每服五錢水一盞半煎至八分去滓如吐加半夏麴等分

麻黃桂枝湯　挨粹方　治瘧疾如前病而夜發者或惡風或惡寒

麻黃一兩去節　炙甘草　黃芩　五分　桂二分　桃仁二十箇去皮尖

右為末水煎服桃仁散血緩肝夜發乃陰經而有邪用此湯散邪中風寒也

桂枝黃芩湯 按粹方　治瘧服藥寒熱轉大者知太陽陽明少陽三陽合病也

甘草　人參　黃芩 各四兩半　半夏 四兩　柴胡 一兩半　石膏　知母 各五兩　桂枝 二兩

右為粗末每服五錢水煎服

柱枝石膏湯 按粹方　治瘧發寒後熱熱多寒少

桂枝 五兩　石膏　知母 各一兩半　黃芩 一兩

右為末二分服每水二盞煎服間日者邪氣所合故也

（）已上數方發散之劑

人參養胃湯　治瘧疾寒多熱少者必須先用此藥發散然後用四獸飲之類截之因食倍加草果

萬安散 濟生方　治一切瘧疾得病之初以其氣壯進此藥以取效氣虛胃弱及婦人不宜服之

蒼朮 泔浸去皮炒　厚朴 姜製炒　陳皮 去白　檳榔　常山 酒浸

甘草 炙 各一錢半

右㕮咀水二盞半煎至一盞露一宿當發向作二服忌熱性物片時

宋齋草果飲子 簡易方　快脾治瘧

草果　蒼朮 泔浸　厚朴　陳皮　半夏曲

甘草 炙　烏梅去核 各等分

右㕮咀每服半兩水二盞半姜五片棗二箇同煎七分不拘時服寒多者加乾姜附子熟多者只加柴胡瘴瘧加檳榔

柴胡桂姜湯 活人方　治瘧疾寒多微熱或但寒而不熱者并治勞瘧

柴胡 四兩　桂枝去皮 一兩半　黃芩 一兩半　瓜蔞根 一兩　牡蠣 炮研炒

甘草 炙　乾姜 各二兩炮

右咬咀每服五錢水一盞半煎至八分温服

柴胡加桂湯 活人方 治瘧先寒後熱兼治支結

柴胡八兩去苗　人參去蘆　甘草炙　半夏炒次七次　黄芩

肉桂去皮二兩　各

右咬咀每服五錢水一盞半姜七片棗二箇煎服若温者去半夏加人參瓜蔞根同煎服之

○已上數方治瘧寒多熱少發散之劑　無汗可用

小柴胡湯　治瘧疾熱多寒少但或單熱頭疼口乾胷滿者

方見温熱類

柴胡括蔞根湯　治瘧疾往來寒熱煩渴引飲

柴胡去苗一兩　天花粉一兩　黄芩去黑心　人參

右服一兩姜五片棗一枚水二盞煎一盞盡去滓通口服

白虎加桂枝湯 活人方　治瘧疾但熱不寒及有汗者

知母六兩　甘草炙三兩　桂枝三兩　粳米三兩　石膏一斤

右咬咀每服五錢水盞半煎至一盞半去滓温服

清脾飲 濟生方　治痺瘧脉来弦數但熱不寒或熱多寒少口苦咽乾小便赤澁

青皮去白　厚朴姜製　白朮　半夏湯洗七次　黄芩

草果仁　柴胡去苗　茯苓去皮　甘草炙各等分

右咬咀每服四錢水盞半姜五片煎七分温服不拘時

參蘇飲　治發瘧熱多寒少無咳嗽者　見傷風類

驅瘧飲　治發瘧熱多寒少者

前胡　柴胡各四錢　桂心　桔梗　厚朴

半夏各三刃　黃芪　乾姜炮　甘草炙各二刃

右剉水二盞生姜三片棗四箇煎

○已上數方治瘧熱多寒少發散之劑　有汗可用

大柴胡湯　治瘧熱多寒少目痛多汗脉大以此湯微利為度餘邪未盡以白芷石膏三物湯以盡其邪　方見溫熱

白芷石膏三物湯

白芷一刃　知母一刃七分　石膏四刃

右為粗末每半兩水一盞溫服清

○已上二方治瘧熱多寒少推逐調和之劑

四獸飲　簡易方　治五臟氣虛喜怒不節致陰陽相勝結聚涎飲與衛氣相搏發為瘧疾

人參去芦　白朮　茯苓去皮　橘紅　草果仁

半夏湯炮　棗子　生姜　烏梅去核各等分　甘草炙減半

右㕮咀以塩少許淹食頃用厚皮紙裹了以水濕之慢火炮令香熟焙乾每服半兩水二盞煎六分未發前併進數服

七寶飲　簡易方　治一切瘧疾無問寒熱多少及山嵐瘴氣寒熱如瘧

厚朴姜製　陳皮　甘草炙　草果仁　常山雞骨者

檳榔　青皮各等分

右㕮咀每服五錢水一盞半酒半盞煎取一盞露一宿空心向東溫服睡少頃時須忌熱性物寒多加酒服

清肺湯　三因方　治飲食傷脾停滯痰飲發為寒熱

厚朴四兩姜炒　烏梅去核　半夏湯去滑　青皮　良姜各二兩

草果去皮一兩　甘草炙半兩

右㕮咀每服四錢水一盞姜三片棗一枚煎七分未發前併三服忌

生冷油膩之物

○已上三方治瘧寒多熱少止截之劑

常山飲 和劑方 治瘧疾發散不愈漸成勞瘵

知母 川常山 烏梅去核各一兩六錢 草果各三兩二錢 良薑二兩 甘草

右咬咀每服五錢水一盞姜五片棗一枚煎七分温服

六和湯

參 知母 草果 具母 烏梅

皂莊 檳榔 柴胡各一錢用酒拌 常山二錢

右剉姜三片棗一枚酒水同煎露一宿臨發前二時服

○已上二方治瘧熱多寒少止截之劑

吳氏丹 治瘧二三日一發者

常山一斤醋浸春五夏三日秋七冬十五

右爲末用鷄子清麪糊爲丸如梧桐子大每服三十九隔夜臨睡冷酒吞服次日早再進一服

秘方清脾丸 治瘧三日一發或十日一發

姜黃三錢 白朮一兩半 人參 檳榔 草果

莪朮醋炒 厚朴各半兩 黃芩 半夏 青皮各一兩

甘草三錢

右爲末飲丸如梧子大每六十九食遠白湯下日二服

紅丸子 濟生方 專治食瘧

青皮炒二兩 阿魏醋化二錢五分 蓬朮醋煮 京三稜醋煮各二兩

胡椒一兩

右爲末別用陳倉米同阿魏醋煮糊丸如梧子大每服五十九至百

丸淡姜湯下或因食生果成瘧用麝香湯吞下

老瘧飲 三因方 治久瘧結成癥瘕痃癖在胷脇諸藥不愈者

蒼朮 泔浸　草果 去皮　桔梗　青皮　陳皮

良姜 各半兩　白芷　茯苓　半夏 湯洗去滑　甘草 炙

枳殼 麩炒　桂心　乾姜 炮各三錢　紫蘇葉　川芎 各二錢

右㕮咀每服四錢水一盞塩少許煎七分空心服

山甲湯　久瘧瘧母不治者宜服四獸飲間服此湯

川山甲　木鱉子 等分

右爲末每服二錢空心温酒調下

鼈甲飲子 濟生方 治瘧疾久不愈脇下痞滿腹中結塊名曰瘧母

草果仁　鼈甲 醋炙　黄耆 去蘆　白朮　白芍藥

厚朴 姜製炒　檳榔　橘紅　川芎　甘草 炙各等分

右㕮咀每服四錢水一鍾姜七片束一枚烏梅少許煎温服

十將軍丸　久瘧不瘥腹痛有瘧母

三稜 一双去毛土炮　莪朮 生　青皮 去白　陳皮 去白名一双　草果 去殼二双

川常山 二兩　砂仁　檳榔　烏梅　半夏 湯泡七次各一双

右先將常山草果二味剉用好酒醋各一碗入瓦器内先浸一宿後入八味藥同浸至晚用瓦銚内炭火煮乾取出晒如無日色用火焙乾爲末半酒半醋打糊爲丸如梧桐子大每服三四十丸白湯吞下日進三服忌生冷魚腥醎酸油膩麪諸死毒物服四兩至八兩即除根凡有積聚及行瘴湿地方宜服之

○已上諸方消導之劑

四將軍飲 良方　治寒熱瘧疾作而仆厥手足俱冷昏不知人此雖一時急救之方用之有驗

附子一箇炮去皮　訶子四箇去核　陳皮四箇全洗淨　甘草炙四子

右㕮咀爲四服每服水一鍾半生姜七片棗七枚煎取一半令熱灌病者立可甦省

○廣按瘧疾發作而僵仆不省人事者盖由頑痰老痰膠固於中榮衛不行故也所以中風中暑而卒倒不省人事者亦由痰之所致也附子性大熱走而不守本是治寒溫之藥今瘧疾發作僵仆而用之以其性大熱能開散頑痰使榮衛得行故耳乃是劫剤非正治之藥也

露薑飲澹寮方

用生薑四兩和皮搗汁一碗夜露至曉空心冷服大治脾胃聚痰發爲寒熱

○廣按生姜自然汁凡中風中暑中氣中毒乾霍乱一應卒暴之與童便同用立可解散盖生姜能開痰童便能降火故也

分利順元散澹寮方　治体虛之人患瘧疾寒多不可用截藥者

川芎　附子各一兩　南星二兩　木香五錢另剉臨時入

右除木香不見火外三味各將一半去皮生用一半炮熟合和㕮咀每服四錢棗七枚生姜十片水一鍾煎七分當發前一日及當發日早晨連進二三服半生半熟能分解陰陽也

一方　治久瘧

用青蒿桂枝各爲末若寒多用桂多蒿少熱多用蒿多桂少三七分互用各以生姜二兩連皮搗汁和熱酒調服以衣被盖卧即愈

雄黃散保命集　治久瘧不能食胷中兀兀欲吐而不吐此藥吐之必愈

雄黃　瓜蒂　赤小豆各等分

右爲細末每服半錢溫水調下以吐爲度

辰砂丸 宣明方 治一切脾胃虛瘧熱毒者

信砒　甘草各一錢　硃砂二錢　大豆四十九粒

右爲末滴水和丸勻分作四十丸服發日日欲出煎桃心湯下一丸忌熱性物

尅效餅子 和劑方 治一切瘧疾發作有時先覺伸欠乃作寒慄股振頭頷中外皆寒腰脊俱痛寒戰既已或內外皆熱頭痛如破渴飲冷水或痰聚胷中煩滿欲吐或先寒後熱或寒多熱少或熱多寒少或但熱不寒但寒不熱或一日或隔日或發後六七日再發皆治之

龍腦　麝香　定粉研各五錢　荷葉　菉豆

甘草炒各五兩　硃砂一兩二錢半研　信醋煮一兩半　金箔二十五箇爲衣

右爲末煉蜜搜和勻每兩作二十丸捏匾金箔爲衣每服一餅子以新汲水磨化日發者未發前服之間日發者頭夜服隔數日發者前一日夜服連日發凌晨服

不二散

人言一双爲末　飛麪四双與人言水和軟餅鍋內焙乾爲末用　白扁豆末二双　細茶末二双

右同和勻每服小半錢已前半日用溫茶調下再用茶盪淨忌食酒麪魚等物

雄硃丹

用雄黑豆四十九粒五月五日以冷水浸從早至巳時去皮眼乾研爲末入信末一錢再研勻細爲丸雄黃爲衣晒乾收貯少壯人如梧桐子大衰老人如小黃豆大小兒如菉豆大臨發時五更面東井水下一丸不止并服黑豆圓者是

一方　治久瘧

大南星二枚　好信三錢

右先將南星開孔用信三錢調為末裝入孔內兩星相對用泥固濟
炭火煅存性取出研為細末用蒸豆粉打糊為丸如豆大每服二
九臨發日五更溫茶清下白湯亦可

一方

人言二枚 雄黃 蒸豆各五枚

右為細末麪糊為丸如筋頭大每服一丸用桃柳條各七
寸煎湯露一宿臨發日空心服面向東忌食熱物魚腥油膩十日

瘧疾良方 百一選方 今人治瘧疾多用常山砒霜之類發吐取涎縱使
得愛脾胃不能不損不若此藥最為穩當

辰砂光明者 阿魏眞者各一分

右研勻和稀糊為丸如皇子大每服一丸空心人參湯下

○已上數方却奪之劑

灸法 濟生方 治瘧疾久不愈

不問男女於大椎中第一骨節盡處先針後灸三七壯立效或灸第
三骨節亦可

對金飲子 和劑方 治寒熱瘧疾飲食後理調脾胃

厚朴去皮姜汁炒 蒼朮泔浸去粗皮炒 甘草炙各二兩 陳皮去白二兩

右㕮咀每服四錢水一鍾姜三片棗一箇煎服一方加草果倍用蒼
朮名草果平胃散

正氣散 徐同知方 退寒瘧止胃寒進食

藿香四兩 草果四兩 半夏 陳皮 厚朴

砂仁 甘草各一兩

右剉為散生姜棗子煎溫服如瘧未至候發日早服
草果飲 和劑方 治寒熱瘧疾初愈服此進食理脾

紫蘇　草果仁　良姜炒　川芎　青皮去白
甘草炙　陳皮去白　白芷各等分

右㕮咀每服四錢水一鍾煎七分熱服

○已上數方治瘧初愈理脾進食之劑

○廣按瘧疾之源蓋由暑月中表氣虛而致中氣虛則水穀行聚而爲痰飲於胃脇矣表氣虛則風暑入內而使血液稽留於經絡經久則痰飲血液拂鬱相粘膠固痞塞不通人之榮衛晝行陽分二十五度宵與腹也榮衛行到病所不通乃作寒戰股掣頭額中外皆寒腰脊俱痛此正氣入於內也寒戰俱已內外皆熱頭痛如破渴欲飲水煩滿欲吐自汗此邪火發於外也或獨寒而無熱或寒多而熱少或無汗者宜開鬱散痰爲主用人參養胃湯草果飲子之類以發散之或熱多而寒少或獨熱而無寒或有汗者宜清熱補虛爲主用白虎加桂枝湯小柴胡湯之類以發散之用藥三五服後則用四獸飲六和湯之類以截之或瘧久在陰分亦須用藥徹起陽分然後截之可也

瘧疾治例 古明醫雜著

王節齋曰瘧是風暑之邪有一日一發有二日一發有三日一發有間一日連三日發有日與夜各發有有汗有無汗有上半日發有下半日發有發於夜者治法邪從外入宜發散之然以扶持胃氣爲本又須分別陽分陰分而用藥邪瘧及新發熱者可散可截虛瘧及久者宜補氣無若過服截藥致傷脾胃則必延綿不休

主方

柴胡去苗　白朮各一錢　蒼术泔浸

已上三味瘧疾必用之

陳皮七分　甘草炙五分　乾葛一錢二分

若一日一發及午前發者邪在陽分加枯黃芩茯苓半夏各一錢熱甚頭痛再加川芎軟石膏各一錢口渴加石膏知母麥門冬各一錢

若間日或三日發午後或夜發者邪在陰分加川芎當歸酒炒芍藥熟地黃酒炒知母各一錢酒洗紅花酒炒黃蘗各四分提起陽分可截之

若間一日連發二日或日夜各發者氣血俱病加人參黃芪白茯苓各一錢以補氣川芎當歸白芍藥熟地黃各一錢以補血

若陽瘧多汗用黃芪人參白朮以斂之無汗柴胡蒼朮白朮黃芩乾葛以發之

若陰瘧多汗用當歸白芍藥熟地黃黃耆黃蘗以斂之無汗柴胡蒼朮大川芎紅花升麻以發之故曰有汗者要無汗正氣為主無汗者要有汗散邪為主

若病人胃氣弱飲食少或服截藥傷脾胃而少食者加人參一錢半酒炒芍藥大麥芽各一錢

若傷食居悶或有食積者加神曲麥芽枳實炒各二錢炒黃連五分

若痰盛加姜製半夏南星枳實炒各一錢黃芩黃連各六分

若欲截之加檳榔黃芩青皮常山各一錢烏梅淨肉三箇肥者

若日久虛瘧寒熱不多或無寒而但微熱者邪氣已無只用四君子合四物湯加柴胡黃芩黃耆陳皮以滋補氣血

痢十九

○痢赤屬血　白屬氣　有身熱　後重　腹痛　下血　身熱挾外感小柴胡湯去人參　後重積與氣墜下之故兼升兼消宜木香檳榔丸之類不愈者用秦艽皂角子煨大黃當歸桃仁黃連枳殼若大腸風盛可作丸服　保和丸亦治因積作後重者五日後不可下蓋脾胃虛故也　後重窘迫者當和氣木香檳榔　腹痛者肺金之氣鬱在大腸之間如實者以劉氏之法下之虛則以苦梗開之然後用治痢藥氣用氣藥血用血藥有熱用黃芩芍藥之類無熱腹痛或用溫藥姜桂之屬　下血四物爲主　下血多主食積與熱或用朴硝者　青六丸治血痢效　痢疾初得一二日間以利爲法切不可便用止澁之劑若實者調胃承氣大小承氣三一承氣下之有熱先退熱然後看其氣病血病加減用藥不可便用參朮然氣虛者可用胃虛者亦用之　血痢久不愈者屬陰虛四物湯爲主涼血和血當歸桃仁之屬　下痢久不止發熱者屬陰虛用寒涼藥必兼升散藥併熱藥　下痢六孔痛者因熱流於下也以檳榔木香黃連黃芩炒乾姜噤口痢者胃口熱甚故也大虛大熱用香連丸蓮肉各一半共爲末米湯調下又方人參二分姜炒黃連一分爲末濃煎終日細細呷之如此則再服但一呷下咽便開人不知此多用溫熱藥甘味此以火濟火火滯益滯　封臍引熱下行用田螺肉搗碎入麝香少許盦臍內　下痢不治之証下如魚腦者半死半生下如塵腐色者死下純血者死下如屋漏水者死下如竹筒注者不治　赤痢乃自小腸來白痢乃自大腸來皆濕熱爲本赤白帶濁同法　下痢有風邪下陷宜升提之蓋風傷肝肝主木故也有濕傷血宜行濕清熱　內經所謂身熱則死寒則止此是大槩言必兼証詳之方可今豈無身熱而生寒而死者　脉沉　留連或微者易治洪大數者難治也脉宜滑大不宜弦急　仲景治痢可溫者五法可下者十法或

解表或利小便或待其自已還分易治難治不治之証至爲詳審但與瀉同立論不分學者當辨之　大孔痛一曰温之一曰清之按久病身冷脉沉小者宜温宜補暴病身熱脉浮洪者宜清有可吐者亦有可汗可下者　初得之時元氣未虛必雅蕩之此通因通用之法稍久氣虛則不可下壯實初病宜下虛弱衰老久病宜升之　先水瀉後膿血此脾傳腎賊邪難愈先膿血後水瀉此腎傳脾微邪易愈　下痢如豆汁者濕也盖脾胃爲水穀之海無物不受常兼四臟故五色之相雜當先通利此迎而奪之之義如虛者亦宜審之因熱而作不可用巴豆如傷冷物者或可用宜謹　又有時疫作痢一方一家之內上下傳染相似却宜明運氣之勝復以治之

戴云痢雖有赤白二色終無寒熱之分通作濕熱治但分新舊更量永氣用藥與赤白帶同

入方

黃連　滑石　甘草　白芍　蒼朮

白朮　當歸　青皮　條芩

右剉水煎裏急後重炒黃連滑石加桃仁檳郎甚者大黃嘔者用姜汁半夏

又方

乾姜一錢　當歸二錢半　烏梅三箇　栢一錢半　黃連

右剉作一服水煎食前若水瀉可等分用或加枳殼

又方　治熱與血

大黃　黃連　黃芩　黃栢　枳殼

當歸　芍藥　滑石　桃仁　甘草

白朮等分

右為末或湯調或作丸用麵糊或神麯糊丸服一本云誤服熱藥
澁藥毒犯胃者當明審以祛其毒

治白痢

蒼朮　白朮　神麯　茯苓　甘草　地榆　右剉水煎

治赤痢

地黃　芍藥　栢　地榆　白朮　右剉水煎　腹痛加枳殼厚朴後重加滑石木香檳郎有熱加黃芩
山梔

又治痢方

滑石一兩　蒼朮半兩　川芎三錢　桃仁　芍藥半兩

甘草

右為末姜一片擂細煎滾服

又方　孫郎中飲水過多腹脹瀉痢帶白

蒼朮　白朮　厚朴　茯苓　滑石

右咬咀水煎下保和丸　又云加炒麯甘草

又方

蒼朮　酒柏　白芍各二兩　酒柏炒半兩

右為末粥丸以四物湯加陳皮甘草水煎湯下

又方　痢後腰痛兩脚無力

陳皮　半夏　白芍各二錢　茯苓　蒼朮　當歸　酒柏各半錢　白朮　甘草各二錢

右咬咀作一服姜煎食前服

又方　治小兒八歲下痢純血作食積治

蒼朮　白朮　黄芩　滑石　白芍

茯苓　甘草　陳皮　神麯炒

右㕮咀水煎下保和丸

一老年七十面白脉弦数獨胃脉沉滑因飲白酒作痢下血淡膿水腹痛小便不利裏急後重參朮為君甘草滑石檳郎木香蒼朮為佐下保和丸二十五丸第二日前証俱減獨小便不利以益元散與之安

治痢十法

其或悪寒發熱身首俱痛此為表証宜微汗和解用蒼朮川芎陳皮芍藥甘草生姜三片煎　其或腹痛後重小水短下積此為裏証宜和中疏氣用炒枳殼製厚朴芍藥陳皮滑石甘草煎　其或下墜異常積中有紫黑血而又痛甚此為死血証法當用擂末桃仁滑石行之或口渴及大便口燥辣是名挾熱加黄芩或口不渴身不熱舌熱手熨湯是名挾寒加乾姜　其或下墜在血活之後此氣滯証宜於前藥加檳榔一枚　其或在下則纏住在上則嘔食此為毒積未化胃氣未平証當認其寒則温之熱則清之虚則用參朮補之毒解積下食自進　其或刀倦自覺氣少悪食此為挾虚証宜加白朮當歸身尾甚者加人參又十分重者止用此一條加陳皮補之虚回而利自正　其或氣行血和積少但虚坐努責此為無血証倍用當歸身尾却以生芍藥生芐生桃仁佐之復以陳皮和之血生自安　其或纏墜退減十之七八穢積已尽糟粕未實當炒芍藥炒白朮炙甘草陳皮茯苓煎湯下固腸丸三十粒然固腸丸性燥恐尚有滯氣未尽行者但當單飲此湯固腸丸未宜遽用盖固腸丸有去湿實腸之功　其或利後糟粕未實或食粥稍多或饑甚方食腹中作痛切不可驚恐當以陳皮白朮各半煎湯和之自安

其或久痢後体虚氣弱滑下不止又當以藥澁之可用訶子皮肉豆蔻白凡半夏甚者添牡蠣可擇用之然須用陳皮為佐恐大澁亦能作痛又甚者灸天樞氣海　右前方用厚朴專瀉滯凝之氣然厚朴性大温而散氣久服大能虚人滯氣稍行即去之餘滯未尽則用炒枳殼陳皮然枳殼亦能耗氣比之厚朴稍緩比陳皮稍重滯氣稍退當去之只用陳皮以和衆藥然陳皮去白有補瀉之兼若為參朮之佐亦純作補藥用　凡痢疾腸痛必以白芍藥甘草為君當歸白朮為佐惡寒者加桂惡熱痛者加黄栢達者更能參以歲氣時令用藥則萬卒萬全豈在乎執方而已哉

附脉理

脉訣舉要曰濇則無血厥寒為甚尺微無陰下痢逆冷又曰無積不痢脉宜滑大浮弦急死沉細無害

附諸方

五苓散　治伏熱下痢分利陰陽　見温熱

黄連香薷飲　治感暑下痢鮮血

清暑益氣湯　治暑病内傷下痢不思飲食發熱

六合湯　治伏熱煩悶或成痢疾　俱見中暑

○已上數方治因暑下痢之劑

敗毒散加石連肉　治下痢熱毒不進飲食

倉廩方仁存方　治下痢赤白或因先是寒邪中臟腑致發熱者敗毒散加陳米姜棗同煎　俱見傷風

防風芍藥湯拔粹方　治泄痢飧泄身熱脉弦腹痛而渴及頭痛微汗

防風　芍藥　黄芩各一兩

右㕮咀每服一兩水二鍾煎至一鍾去滓食前通口服

○已上数方治痢疾身熱者之劑

香連丸 和劑方 治冷熱不調下痢赤白膿血相雜裏急後重

黄連 去芦二十兩用吳茱萸十兩同浸炒令赤色去茱萸不用　木香 四兩八錢不見火

右爲細末醋糊爲丸如梧桐子大每服二十丸空心米飲下

導氣湯 拔粹方 治下痢膿血裏急後重日夜無度

芍藥 一兩　當歸 半兩　大黄 二錢半　黄連 一錢　黄芩 二錢半

木香　檳榔 各一錢

右㕮咀每一兩水二鍾煎至七分温服食前

木香枳殼丸 聖惠方 治痢疾裏急後重兼關胸膈進飲食破滯氣散内熱

木香　檳榔　陳皮 去白　黄連 去鬚　蓬朮 煨

[illegible] 去芦　枳殼 去穰炒　青皮 各五錢　香附子 去毛　黄栢 各一兩半

黑牽牛 頭末二兩

右爲末水丸如梧桐子大每服五十丸或七十丸姜湯下　如腫每加服至二百丸利五七行立消

戴人木香檳榔丸　治証同前

木香　檳榔　青皮　陳皮　廣朮

枳殼　黄連　黄栢　大黄 各半兩　丑末

香附 各二兩

右爲末水丸梧子大每五六十丸煎水下量虚實與之紺珠多三稜

黄芩當歸分兩不同 見鼓脹

保和丸　治脾虚因積作後重者不可下用此消導 方見積聚

和中丸　同前 方見調補脾胃

○已上数方治痢疾後重者之劑

黃連阿膠丸和劑方治冷熱不調下痢赤白裏急後重臍腹疼痛口燥煩渴小便不利

阿膠炒二兩　黃連去鬚三兩　茯苓去皮三兩

右黃連茯苓爲末水熬阿膠膏搜和丸如梧子大每三十丸米飲下

當歸丸濟生方治冷留腸胃下痢純白腹痛不止

當歸　芍藥　附子　白朮　乾姜

厚朴　阿膠蛤粉炒各一兩　烏梅肉二兩

右爲末醋糊丸梧子大每服五十丸空心米飲下

蒼朮芍藥湯拔粹方治痢疾痛甚者

蒼朮二兩　芍藥一兩　黃芩　官桂各五錢

右㕮咀每一兩水二鍾煎至一鍾溫服

四味阿膠丸仁存方治挾熱下痢色黃煩燥多渴臍腹疼痛小便不利

黃連淨四兩　茯苓去皮二兩　赤芍藥三兩　阿膠蛤粉炒一兩

右爲末醋糊丸梧子大每服五十丸米飲下

當歸導氣湯拔粹方治膿血痢無度腹中痛

當歸　芍藥各一錢　甘草一錢半　青皮七錢　槐花七分

生地黃酒洗陰乾二錢

右㕮咀水二鍾煎至一鍾去滓溫服食前如後重加木香檳榔末各三分澤瀉半錢如小便利去澤瀉

○已上數方治痢疾腹痛者之劑

烏梅丸　治熱留腸胃臍腹疞痛下痢純血或服熱藥過多毒蘊于內滲成血痢濟生方

烏梅肉二兩　黃連三兩　當歸　枳殼去穰麩炒各二兩

右爲末醋糊丸梧子大每服七十丸空心米飲下

茜根九 濟生方 治一切毒痢及蠱注下血如雞肝心煩腹痛

茜根洗 川升麻 犀角鎊 地榆洗 當歸去芦洗
黃連去須 枳殼去穰麩炒 白芍藥各等分

右爲末醋煮米糊九如梧桐子大每服七十丸空心米飲下

槐花散 拔粹方 治血痢久不止腹中不痛不裹急後重

青皮 槐花 荊芥穗各等分

右爲末水煎空心熱服

地榆散 百一選方 治中暑昏迷不省人事欲死并治血痢暑痢

地榆 赤芍藥 黃連 青皮去白

右等分爲末每服二錢漿水調如無只以新水亦得若血痢水煎

地榆散 治下血遠年不瘥及血痢

地榆 卷柏等分

右咬咀用水沙瓶煮數十沸通口服

蘗皮湯 經驗方 治傷寒下痢赤治久血熱痢

蘗皮三兩 黃芩二兩 黃連一兩

右咬咀每服一兩水二鍾煎至一鍾去滓通口服腹痛加山梔子小便不利加赤茯苓阿膠煎服

椿皮丸 經驗方 治下痢清血腹中刺痛

用椿根白皮不拘多少爲末醋糊丸如梧桐子大空心米飲下三四十九

四物湯 保命集 治下痢純血

川芎 當歸 白芍 生羊 槐花

黃連 御米殼等分

右剉水煎服

苦參丸　治血痢

用苦參不以多少炒焦爲末滴水丸如梧子大每服五十丸米飲下

治痢血方

昔曹魯公痢血百餘日國醫無能療者陳應之取鹽水梅除核研一枚合臘茶加醋湯沃服之一啜而瘥大丞相莊肅梁公亦痢血應之曰此挾水穀當用三物散亦數服而愈三物散用胡黃連烏梅肉竈心土等分爲末臘茶清調下食前服

治下痢純血 經驗方

黃栢 蜜炙令香黃色一兩

右爲末每服三錢空心溫漿水調下

一方　治血痢

用地錦草不以多少晒乾碾爲細末每服二錢空心米飲調下

一方　治腸風血痢

用鯽魚一枚固破開去腸膽釀白礬二錢燒灰存性爲末米飲調服

○已上數方治痢疾下血者之劑

地榆散 和劑方 治大人小兒脾胃氣虛冷熱不調下痢膿血赤多白少或下鮮血裏急後重小便不利

地榆炒　乾葛各半斤　乾姜炮二兩　當歸去苗三兩　茯苓去皮　赤芍藥各六兩　甘草炙四兩　罌粟殼蜜炒十二兩

右爲末每服一錢用溫熟水調下不拘時服若下痢純白及紫黑血并腸滑不禁者不可服之

地榆芍藥湯 拔粹方 治泄痢膿血乃至脫肛

蒼朮八兩　地榆二兩　卷栢　芍藥各三兩

右㕮咀每服一兩水二鍾煎至一鍾食前通口服

阿膠湯 拔粹方 治傷寒熱毒入胃下痢膿血

黃連 炒二兩 梔子 五錢 阿膠 蛤粉炒 黃蘗 去皮炙 各一兩

右㕮咀每服一兩水二鍾煎至一鍾溫服食前

大黃湯 拔粹方 治泄痢久不愈膿血稠粘裏急後重日夜無度久不愈者用此微利

大黃 一兩

右用好酒二鍾浸半日煎至一鍾去大黃將酒分二服如未止再服以利為度復服芍藥湯和之痢止再服芍藥黃芩湯以徹其毒也

芍藥湯 拔粹方 下血調氣溲而便膿血知氣行而血止行血則便自愈調氣則後重除

芍藥 一兩 當歸 黃連 黃芩 各半兩 肉桂 二錢半

檳榔 大黃 各三錢 甘草 炙 木香 名二錢

右㕮咀每服半兩水二鍾煎至一鍾去渣溫服如痢不減漸加大黃如汗後臟毒加黃栢半兩

芍藥黃芩湯 拔粹方 治泄痢腹痛或後重身熱久不愈脉洪疾者及下痢膿血稠粘

黃芩 芍藥 各一兩 甘草 炙半兩

右㕮咀每服一兩水二鍾煎至一鍾去渣通口服食前

芍藥蘗皮丸 拔粹方 治便膿血

芍藥 黃蘗皮 等分

右為末醋糊丸如梧桐子大米飲送下

專治赤痢 秘方

黃連 二兩 木香 甘草 各二錢

右㕮咀水二鍾煎至一鍾去滓溫服食前先一日服五苓散三貼次

日早服此藥即止如神

又方

用連白青韭一大握多研取汁和煮酒一盞温飲之極驗又治婦人心痛有效散氣行血故也

解毒金花散 經驗方 治下痢膿血熱毒

黃芩　白朮　赤茯苓　赤芍藥 各半兩　黃連

黃蘗 各一兩

右㕮咀每服一兩水二鍾煎至一鍾去滓温服食前如腹痛加梔子仁二枚同煎

一方　治熱痢不止

用車前葉搗爛取汁一鍾入蜜一合煎服

黃連烏梅丸 聖惠方 治諸熱痢不瘥

馬梅 炒　黃連 各四兩 淨

右爲末煉蜜丸梧子大每服二十丸米飲下食前

芍藥蘗皮丸 子和方 治一切濕熱惡痢頻併窘痛無問膿血

芍藥　黃蘗 各一兩　當歸 [illegible]　黃連 各半兩

右爲末水丸小豆大温水下三四十丸等服忌油膩生冷一切熱物

○已上數方治濕熱傷血赤痢之劑

戊巳丸 和劑方 治脾經受濕泄痢不止米穀不化臍腹刺痛

黃連 去鬚　吳茱萸 去梗　白芍藥 各三兩

右爲末麪糊丸梧子大每三十丸米飲空心下日三服

升陽除濕防風湯 拔粹方 如大便閉或裏急後重數至圊而不能便或少有白膿或少有血慎勿利之升舉其陽則陰氣自降矣

蒼朮 四兩米泔水治　防風 三錢　白朮 一錢　茯苓 一錢　白芍藥 一錢

右㕮咀每服一兩除蒼朮另作片子水一碗半煮至二盞納諸藥同煎至一盞去滓稍熱空心食前服

升陽益胃湯　治脾虛濕勝陽氣下陷作痢　見內傷類

胃風湯　治風入腸胃作痢或白或赤或豆汁　見胃風類

錢氏白朮散　治氣血俱虛神弱之人或瀉或痢或吐

人參　白茯苓　白朮　木香　甘草

藿香各一兩　乾姜半兩

右爲粗末每服五錢水一鍾煎七分食前溫服

一方　治白痢

酸石榴皮半箇　草果一箇　陳皮三片　烏梅一箇　甘草一寸

乾姜一塊

右㕮咀都作一服水二鍾煎至一鍾去滓食前溫服

一方　山藥剉如豆大一半瓦器內炒熟一半生用爲細末米飲調下

○已上數方治濕熱傷氣白痢之劑

噤口痢

石蓮肉日乾

右爲末每服二錢陳倉米調下便覺思食仍以日照東方壁土炒真橘皮爲末姜棗略煎佐之

一方　治噤口痢

用黃連半斤㕮咀生姜四兩切作片與黃連同炒待姜焦黃色去姜只取黃連爲細末同陳米飯一處搗爛丸如梧桐子大每服七八十丸赤者陳米飲下白者陳皮湯下赤白相參者陳米橘皮湯下

一方　用獨子肥皂一枚去核用鹽實其內火燒存性爲細末先煮白米粥用少許入在粥內食之立効

一方　梨一枚去心入好蜜一匙煨過食之

○已上数方治噤口痢之劑

麯藭丸　治食積作痢

川芎　神麯　白朮　附子炮等分

右爲細末麵糊丸梧子大每服三五十丸温米飲下此藥亦治飧泄

○廣按此治冷飲食作痢熱則開散之理

木香丸　治痢疾

木香三錢　豆豉一兩洗淨　巴豆四十九粒去殼針穿灯上燒存性另研

右爲末豆豉爲丸菉豆大每服三丸紅痢甘草湯下白痢乾姜湯下

木香不二丸　治痢疾或赤或白或赤白交雜

木香不見火　肉豆蔻麵裹煨　柯子煨過取肉各一錢　巴豆一兩去殼油另研

淡豆豉末一錢半一半入藥一半打糊

右爲末淡豆豉末同麵打糊爲丸如黄豆大小兒如菉豆大量大小虛實每服只許一丸切忌服二丸食前或臨卧冷湯下赤痢地榆湯下白痢乾姜湯下赤白交雜甘草湯下服此藥後多行二三次即住

○廣按此二方用巴豆即通因通用之理然於傷冷飲食暴痢用之庶乎可也殊不知痢本因水穀停積濕而生熱濕熱爲病但有傷氣傷血爲白爲赤之分終無寒冷之義經曰苦寒除濕熱用大黄以推蕩乃是正治也

聖餅子　治積滯作痢

黄丹二錢　定粉三錢　密佗僧二錢　船上硫黄三錢　輕粉少許

右爲細末入白麵四錢滴水和爲丸指尖大捻作餅子陰乾食前漿水磨化服之大便黑色爲妙

蘇感丸　治冷積作痢

以蘇合香丸與感應丸二藥和勻如栗大每五丸淡姜湯空心下

蘇合香丸　見中風

感應丸　見傷食

○已上數方治積滯伏痢之劑

治赤白痢

吳茱萸　揀淨　黃連　去須各等分

右爲一處以好酒浸透取出各自揀焙或晒乾爲末糊丸如梧桐子大赤痢用黃連丸三十粒甘草湯下白痢用茱萸丸三十粒乾姜湯下赤白痢各用十五粒相合併甘草乾姜湯下

駐車丸　和劑方　治一切下痢無問冷熱

阿膠　搗碎蛤粉炒如珠子爲末以酷四合熬成膏一兩半　黃連　去須二兩　當歸　去芦一兩半　乾姜　炮一兩

右爲末以阿膠膏丸如梧桐子每服三十丸食前米飲下

阿膠穆連丸　宣明方　治下痢無問久新赤白青黑疼痛諸証

金井阿膠　淨草灰炒透明白別研細　黃柏　劉炒　黃連　去須　赤茯苓　烏梅肉　去核炒　赤芍藥

右爲細末入阿膠研勻水丸梧子大溫水飲下十丸食前連夜五六服小兒丸如粟豆大忌油膩腥肥諸物

三味黃丸子　經驗方　止諸痢

黃連　八兩　枳殼　四兩　黃柏　四兩

右爲細末麵糊爲丸梧子大空心飯湯下二三十丸如裏急後重加

枳殼湯下　治一切痢

香連丸　治一切痢

黃連　五兩劉　粉草　二兩半炙　木香　一兩不見火

右先將草連用蜜水畧拌濕安在銚中重湯薰之良久取出晒乾再依上法薰之得九蒸九爆九炒再晒十分乾與木香一處爲末水糊

力梧子大每服五十丸食前酒下或米飲下

又方　治一切痢

黄連一兩　枳殼　甘草炙　烏梅各半兩

右咬咀每半兩水煎空心服忌魚猪肉油生冷菓子

遇仙立效散　治諸惡痢或赤或白或濃淡相雜裏急後重臍腹結痛或下五色或如魚腦日夜無度或口噤不食不問大人小兒虛弱老人產婦立宜服之

罌粟殼去蒂炙一炒黄　當歸洗各二兩　甘草　赤芍藥

地榆各一兩

酸石榴皮

右咬咀每服水一鍾半煎空心温服忌生冷油膩之物

神効參香散和劑方　治大人小兒臟氣虛怯冷熱不調積成痢或下鮮血或如魚腦或下瘀血或下紫黑或赤白相雜裏急後重日夜頻無問新久立能治之

白茯苓　木香各二兩　茯苓去皮　肉豆蔻煨各四兩

人參去芦　陳皮去白　罌粟殼去蒂炙黄各二兩

右爲末每服三大錢用温米飲下不拘時服

水煮木香丸和劑方　治一切下痢赤白膿血相雜裏急後重

罌粟殼去穰二兩八錢　青皮去白二兩四錢　甘草炙二兩　當歸去芦

訶子炮去核　木香不見火各六兩

右爲末煉蜜丸如彈子大每服一丸水一鍾煎化至六分空心或食前服

真人養臟湯和劑方　治大人小兒冷熱不調下痢赤白或如膿血魚腦髓裹急後重臍腹疼痛如脱腸墜下酒毒便血並治之

人參去芦　當歸去芦酒洗各六錢　肉桂去皮八錢

訶子去核一兩二錢　木香二兩四錢不見火　肉豆蔻面裹煨半兩　白朮焙六錢

白芍藥一兩六錢　甘草一兩八錢不見火

右㕮咀每服四錢水一鍾煎服臟寒者加附子

一方　治一切痢

罌粟殼蜜製　黃蘗炙　乾姜　當歸　枳殼去白

甘草炙各等分

右用韭菜十數根水二鍾煎不拘時服

固腸湯三因方　治冷熱不調下痢赤白

罌粟殼去蒂盖三兩醋炙　白芍藥各二兩　當歸　甘草各一兩

陳皮　訶子　白姜炮各半兩　人參　木香各三錢

右㕮咀每服四錢水一鍾煎七分空心温服

豆蔻固腸丸御藥方　治脾胃虛弱臟腑頻滑下痢赤白

木香　赤石脂　乾姜　縮砂　厚朴姜製

肉豆蔻麵裹煨各三兩

右爲末麵糊丸梧子大每服五十丸空心米飲下

勝金丹秘方

乾姜　黃蠟等分

右銀石器化蠟入姜末勻丸如茶子大每服七丸或二七丸白痢酒下赤井花水下

又方

烏梅　白梅陳久者各七箇

右件去梅核搗梅肉爛同乳香末少許丸梧子大以茶末爲衣每服二十丸茶湯下食前

石榴皮散經驗方　治暴瀉不止及痢赤白

用酸石榴皮燒存性不以多少空心米飲調下二錢

一方　治白膿痢

用白石脂爲末醋糊丸如小豆大每服十丸空心米飲送下日三服

秘方痢疾方

粟殼去穰蜜炒五錢　陳皮去白五錢　甘草炙五錢　乳香　没藥各二錢

右㕮咀水二鍾煎至一鍾去滓入乳没食前服如白痢熱服紅痢冷服如痢不止加青皮四錢煎

白朮安胃散枝粹方　治一切瀉痢無問膿血相雜裏急窘痛日夜無度又治男子小腸氣痛婦人臍下虛冷并産後兒枕塊痛亦治産後虛弱寒熱不止

茯苓去皮　白朮　車前子各一兩　五味子　烏梅各半兩

罌粟殼蜜製三兩

右㕮咀每服一兩水二鍾煎至一鍾去滓通口服食前

朴連湯經驗方　治下痢久不瘥

厚朴姜製　黃連等分

右㕮咀水二鍾煎至一鍾去滓食前温服

神効丸一名當歸丸　治休息痢膿血不止疼痛困弱

當歸　烏梅肉　黃連等分

右爲細末以生蒜汁和勿手丸如梧子大焙乾每服三十丸空心煎厚朴湯下加至五十丸一方加阿膠一方煉蜜丸甚者鎔蠟丸

一方　止休息痢

縮砂爲末空心米飲下一錢

木香散本事方　治隔年痢不止并治血痢尤佳

木香　黃連各半兩二味同炒　甘草炙一兩　罌粟殼　生姜各半兩同炒

右爲末入麝香少許每服二錢米飲下

固腸丸 見婦人帶下類 即椿皮丸

白朮黃芩湯 拔粹方 服前藥痢疾雖除更宜調和

白朮一兩 黃芩七錢 甘草三錢

右㕮咀每服一兩水二鍾煎一鍾去滓通口服食前

白朮黃耆湯 拔粹方 服前藥痢疾雖除更宜服此補養

白朮一兩 黃耆七錢半 甘草三錢

右㕮咀每服一兩水二鍾煎一鍾去滓通口服食前

機要白朮芍藥湯 服藥痢疾雖除宜用此補脾胃又治老人奉養太過飲食傷脾時或瀉痢

白朮 白芍藥各一兩其芍藥補脾炒用治後重生用腹痛炒用酒浸炒尤妙

甘草炙半兩

右剉每一兩水煎服

○已上數方治赤白諸痢虛痢久痢之劑

牛黃神金丸 宣明方 治大人小兒嘔吐瀉痢無問久新赤白諸色或沙否或小便澁不口并小兒驚疳積熱痃癖堅積腹滿硬痛作發往來亦能寬隔消食

輕粉 粉霜 硇砂以上另研 雄黃研 朱砂

信砒 芭豆去皮各一錢 黃丹 蠟三錢

右先研粉霜次旋入硇砂研細下雄黃朱砂信砒再研下丹粉研勻別研芭豆爛爲油與前藥研勻近火上炙控熱別研蠟軟入藥勻搓作劑旋丸小豆大新水下一丸小兒黍米麻子大或止吐瀉痢疾調桂苓甘露散或益丸散亦得 俱見中暑類

調胃承氣湯

小承氣湯

大承氣湯 俱見傷寒

三一承氣湯 見溫熱

玄青丸 宣明方 治下痢勢惡頻併窘痛或久愈諸藥不能止須可下之以開除濕熱痞悶積滯而使氣液宣行者宜以此逐之兼宣利積熱酒食積黃瘦中滿水腫腹脹療小兒驚疳積熱乳癖諸証泄瀉勿服

黃連　黃蘗　大黃　甘遂　芫花 醋拌炒

大戟 各五錢　牽牛 四兩取末二兩　青黛 一兩　輕粉 一錢

右爲末水丸小豆大初服十丸每服加十丸空心日午臨卧各一服以利爲度後常服十五二十丸數日後得食以病未全除者再加取利利後却常服以意消息病除爲度隨証止之小兒丸如黍米大

○已上數方通因通用之劑

○廣按痢疾所因有二或因暑月煩渴縱食瓜果不生冷內傷腸胃或因夜卧失被早起入水寒濕外襲肚腹二者皆令水穀不化鬱而生熱則爲濕熱濕熱傷氣則成白痢濕熱傷血則成赤痢氣血俱傷則成赤白痢其証腑腹疞痛或下鮮血或下瘀血或下紫黑血或下白膿或赤白相雜或如豆汁或如魚腦或如屋溜水裏急後重頻欲登厠日夜無度不可遽用罌粟殼龍骨肉豆蔻訶子赤石脂輩收澁病邪則淹纏而不已也其法痢疾初得一二日間元氣未虛以推逐爲美夫之於初五日以後脾胃已虛以消導升散爲佳所用之藥不過辛苦寒涼之劑以開除濕熱鬱積行氣和血使氣血宣行而已病久挾虛又當以滋補氣血收澁滑脫甘溫辛熱之藥兼之則萬舉萬全而無一失也矣　又嘗論之濕熱傷氣成白痢者宜調氣理濕爲主而兼清熱濕熱傷血成赤痢者宜涼血

清熱爲主而兼理濕至於氣血俱傷成赤白痢者則相兼而治觀丹溪節齋之用藥可見矣

痢疾治例　出明醫雜著

王節齋曰痢是濕熱食積三者別赤白青黃黑五色以屬五臟白者濕熱傷氣分赤者濕熱傷血分赤白相雜氣血俱傷黃者食積治法瀉腸胃之濕熱開鬱結之氣消化積滯通因通用其初只是下之下後未愈隨証調之痢稍久者不可下胃虛故也痢多屬熱亦有虛與寒者虛者宜補寒者宜溫年老及虛弱人不宜下

主方

黃芩炒二錢半　黃連炒一錢半　白芍藥炒二錢　已上三味痢疾必用之藥

木香　枳殼炒各一錢半　檳榔　炙甘草三分

若腹痛加當歸一錢半　縮砂一錢　再加木香芍藥各五分

若後重加滑石炒一錢半　再加枳殼檳榔各五分　芍藥生用再加五分

黃芩條實者亦加五分

若白痢加白朮白茯苓炒滑石陳皮各一錢　初欲下之再加大黃五錢

兼食積加山查子枳實各一錢

若紅痢加當歸川芎桃仁各一錢半　初欲下之再加大黃五錢

若紅白相雜加當歸川芎桃仁各一錢半　以理血滑石陳皮蒼朮各一錢半　以理氣有食積亦加山查枳實

若白痢久胃弱氣虛或下後未愈減芩連芍藥各七分　加白朮一錢半

黃耆茯苓陳皮各一錢　縮砂五分　去檳榔枳殼再加炙乾姜五分

若紅痢人胃弱血虛或下後未愈減芩連各五分　加當歸川芎熟地黃阿膠珠陳皮各一錢　白朮一錢半

若色赤黑相雜此濕勝也小便赤澁短少加木通澤瀉茯苓各一錢

山梔子炒五分以分利之

若血痢加當歸川芎生地黃桃仁炒槐花各一錢久不愈減芩連各七分去檳榔枳殼再加阿膠珠炒側栢葉各一錢半炒黑乾姜一錢白朮一錢半陳皮一錢

若痢已久而後重不去此大腸墜下去檳榔枳殼用脩實黃芩加升麻一錢以升提之

若嘔吐食不得下加軟石膏一錢半陳皮一錢山梔仁炒五分入生姜汁緩呷之以瀉胃口之熱

有一樣氣血虛而痢者用四物湯加人參白朮陳皮黃連黃芩阿膠之類以補之而痢自止

有一樣寒痢用黃連木香酒炒芍藥當歸炒乾姜縮砂厚朴肉桂之類

若得痢而誤服溫熱止澁之藥則雖稍久亦宜用前法以下之下後方調之

若得痢便用前正法下之而未愈又用前調理法治之而久不愈此屬虛寒而滑脫可於前虛補寒溫二條擇用更加龍骨赤石脂罌粟殼烏梅肉等收澁之藥

冊洗心法附餘卷之六 終

中華古籍保護