

古今良醫為用左方  
以治病然病為難生  
未必一之古方合符  
用之之術何如可為

蒼危表人所輯良

方集脈玉著重竅

民有將按疾病平乃

醫以去用平方多驗

活星階後刊布於系

師四方好學馳名

本區年以來黎來編

月空子學王君私樵

履操經驗者乃才若  
干於原編所未備恒  
朽名醫籍以補等  
之至希芥系捐賢付

利名良方集眩令璧  
古今之患病者甚苦  
醫藥之良方而  
用之按病調劑令毫

不棄即可於此而求

墜也集腋下者因合

履而愈彰其美益

可見行人臨在物

王心務在宦撫宦廢  
是切望淺鮮哉

咸豐五年冬十二月上

沈潘台墓書

良方集腋合璧全卷目錄

中風類中門

中風中氣辨

陽中陰中類中辨

中風卒倒

中風昏迷不省

方三

中風口噤不開

方二

中風口噤不語

方三

初中痰盛不省人事

中風口眼喎斜

方四

中風灸法

中風手足麻癢

中風拘攣

預防中風方

回春再造丸

菴發丸



浮萍一粒丹

大元湯

史國公藥酒方

中氣

中痰

中寒

中食

中陰毒

蘇合香丸

痛風方

欬嗽哮喘門

附痰病

虛人欬嗽

熱嗽

肺熱久軟

肺鬱痰嗽

痰嗽

方二

食積痰嗽

秋月肺燥欬嗽

痰喘欬嗽方

久嗽不愈方二

冷哮方

痰哮方

鹽哮方二

哮證應驗方

哮病神效方

勞證發熱喘嗽

口燥有痰喘嗽

老年痰喘方二

虛喘方

喘急欲絕

膈中老痰

痰暈方

血證癆怯門

血證論治

吐血不止方四

血熱妄行

鼻血不止方七

奪天造化丹

滋陰鴨方二

外治癆病仙方

頭面耳目

腎厥頭痛玉真丸

偏正頭風

半升頭痛

治頭疼方

腦漏方

頭上白禿瘡方二

面生黑點如疥

治面瘰方二

下頰脫落方

耳鳴方

耳閉方

耳爛流膿

大人小兒耳內膿水

瞽目重明神效方

努肉起星方

移星去障方

去眼中翳障

起倒睫拳毛

拳毛倒睫

飛絲入目

去內外障復明方

眼皮生瘤

傷眼突睛

夢靈丸

口鼻齒舌門

治口瘡 方二

口舌生瘡

治口臭

鼻淵

鼻流黃水不止

鼻中瘰肉 方二

赤鼻方

牙齒痛方

立止牙疼方

擦牙散方

靈藥方

擦牙方

牙床出血 方二

玉帶膏

齒齦疳爛

走馬牙疳 方三

唇裂生瘡

牙疳口瘡

打靈砂法

舌衄出血

舌腫

舌長過寸

舌忽脹大

喉風舌大如脗

咽喉骨鯁閉

咽喉急證異功散

急救喉證良方

喉痛方二

喉間乳鵝

急救乳鵝

喉閉急證

冰硼散

雄黃解毒丹

風熱喉痺腫痛及纏喉風證

急救鎖喉風症

仙露梅

咽喉痛 方二

玉雪救苦丹

爛喉疳痧易透法

神效散喉閉 方二

魚骨鯁 方二

雞骨鯁

諸獸骨鯁

一切骨鯁

暑痧瘧痢門

葉天士藥茶方

急救時疫方

預避不染疫痧方

白痧藥

火龍丹

細金丹

截疫保命丹

急救萬應丸

治瘧神效膏藥

雙單日瘧疾方

三陰瘧疾

截瘧方

白雪丹

斬鬼丹

痢疾方

紅白痢方

白痢方

久痢經驗良方

風濕氣痺門

丹溪定痛丸

四妙散

寒濕中瘋藥酒

痛風藥酒

良方集腋

目錄



肝胃氣熨方

閃挫腰痛

疝氣神方

蟠葱散

四聖散

三味散

椒艾囊

肝胃氣方

鼓脹噎膈

脹滿論治

脹滿實症方二

腹脹如鼓

水腫鼓脹

顧雨田鼓脹方

鼓脹及四肢發腫

噎食倒食

五噎散

韭汁牛乳飲

散解散

河間雄黃散

潤腸膏

膈症初起方 方三

內科雜病

玉壺丸

絳雪散

纒絲湯

約精丸

白龍丸

遠志丸

白濁 方二

赤白濁方

血淋痛不可忍 方三

砂石淋

膏淋

立效散

小便不通

一切秘結 方二

老年便閉

老年遺尿不知 方二

腎虛遺溺

縮泉丸

五更洩瀉

老年呃症

七巧湯

陽虛冷呃

肺胃熱呃

三聖丹

雄黃酒

嗅法神方

養元藕粉

聰明豆

黃疸病方方五

食積黃疸

女勞疸

黃汗

熊膽散

雙補湯

三靈散

海上方

槐黃丸

乾柿散

金蓮酒

尋常轉筋方三

陰症神方

沉香散

治腋氣

足疾方

筋寒濕氣末藥

箭風丹

玉蟾利風丹

風癩總論

癩病神方

心風痰迷顛癩

猪羊顛癩方

暗風癩症

失心瘋病方二

治鴉片烟癮方二

癩疽疔毒

背疽灸法

托裏護心丸

一切癩疽發背對口

發背腫硬痛深

陰疽平塌色黯

七厘散

腸癰

肺癰方二

丹癰生管

笋癰

乳巖方二

婦女乳患方四

對口瘡方三

茄腳首烏湯

七寶丹

無名腫毒方三

肚內無名腫毒

定痛方方二

替針散

透骨丹

透膿散

八將擒王散

六仙昇丹

陽和解凝膏

黎洞丸

黎洞膏

西域黃靈膏

巴豆油膏

一筆消

神燈照

觀音大士救苦膏

疔毒初起

初起疔瘡

內消疔毒神方

疔生唇口方二

疔毒走黃

拔疔散

治疔急救方

血疔

魚臍疔

水疔

手指羅疔

疔瘡要害圖

瘰癧諸瘡

瘰癧灸法 方三

萬應膏

治癧膏方

瘰癧腫痛久不瘥

珠珀膏

硃砂膏

項內三年癧痰 方二

瘤贅 方三

天泡瘡 方四

天蛇頭

漆瘡 方四

黃水瘡 方三

膿窠瘡 方二

疥瘡 方二

治乳癬方

陰癬方



癬酒方

癬膏藥

四平散

油灰髻量

汗癥方 方二

麻黃膏

楸葉膏

雨珠丹

臙瘡隔紙膏方二

爛腿神效方

濕毒瘡爛腿方

爛腳了方 方二

葱油膏

滋水淋漓洗痔方

痔痛方 方三

脫肛及痔漏方

痔瘡化管方

洗痔極效方

敷痔方方二

洗痔痛方方二

凍瘡方六

預治凍瘡方二

手足凍裂

白癩風方二

鵝掌風方二

兩手如風

骨槽風治法方二

癩風論治

再造散

醉仙散

換肌散

五枝萍水湯

楊梅瘡方二

楊梅瘡治法

楊梅瘡餘毒未盡

魚口方二

便毒

下疳瘡 方三

楊梅下疳

九龍丹

五寶丹

金蟾脫殼酒

護面散

下身八足虫方

婦人疾病

通經秘方

經閉方

痛經方

何德揚治難產方

產難危急

活人舉卿散

血餘散

少乳方 方二

產後血暈

止乳方

乳湧

月內唾紅仙方

逆經

血痕

白帶年久不愈

小兒諸疾

初生不乳

初生氣絕不啼

初生啼哭不出

赤白遊風

七竅穢癩疔

螳螂子方

口糜疔瘡螳螂子方

急驚風刺法

砂雪丸

疳膨食積

腹中有虫

益神散

牛黃八寶稀痘丹

保嬰出痘簡易良方

立發悶痘仙方

倒靨色黑唇白冰冷

癰瘡入眼

痘後餘毒攻眼

塗消痘毒

牙痛牙疳

治痘疳

跌撲諸傷

從高墜下

五仙丹

瘀血脹痛雞鳴散

跌撲疼痛方二

跌傷青腫方二

傷痕紫黑血不散

氣絕不言

墜跌吐血

跌打損傷方

渾身打傷方

宿傷立愈方

軍中第一方

金刃傷

刀斧傷方六

金瘡石灰散

續骨丹

接骨神方

破傷風方三

萬靈丹

硃砂膏

三黃寶蠟丸

滾水燙 方二

火燙 方七

湯火傷 方五

救苦散

石脂膏

猪膽散

惡刺入肉

竹木刺入肉

針刺入肉

腳底開裂 方二

磁器嵌腳方

箭傷入肉

中惡急救

灸法

中惡方三

灸法

還魂丹

經驗辟邪丹

救吞生鴉片烟方

救吞生鴉片烟三法

救吞生鴉片效方

北京鹽水錠

蛇狗咬點眼藥

猪馬咬傷

貓鼠咬傷

蛇咬傷

壁虎入耳

虫入耳

蜈蚣咬傷

蜂螫方

蠻螻蜈蚣傷

誤食木鱉子

誤食桐油

誤食銅物



誤吞金圈戒指

誤中輕粉毒

誤吞水銀

頭中砒毒 方三

誤吞...

...

誤吞...

...

誤吞...

...

誤吞...

...

誤吞...

...

誤吞...

...

良方集腋合璧全卷目錄終

中風之類以人吳中蕙庭謝元慶編集愈寒

漱水蘅香王慶霄校纂

中風類中門

風為百病之長而中風一證尤為卒暴頃刻間可

生可死之病集腋原編治療之法未備故今詳辨

證治列之于首云

中風中氣辨

凡病卒然仆倒昏不知人痰涎壅塞口眼喎斜四

肢不遂概名中風而中風證候與中氣相類然中  
氣乃得之忿怒忽然昏仆不可以中風一概治之  
其辨之有別中風身溫中氣身冷中風多痰涎中  
氣無痰涎中風之脈浮應左寸人迎中氣之脈沉  
應右寸氣口以氣藥治風則可以風藥治氣則不  
可也

陽中陰中類中辨

中風多痰勿驟以人參補之恐痰愈盛而氣愈塞  
矣慎之陽中者面赤牙關緊閉目上視身強直手

拳掉眩陰中者面青白痰喘手足冷多汗類中者  
蓋因元氣虛忽然昏仆似乎中風者手必撒口必  
開與真中風不同又宜溫補藥治之

凡中臟之證口開心絕手撒脾絕眼合肝絕遺  
尿腎絕鼻聲如鼾肺絕五證齊犯不治之證也  
如見一二證重再用參耆治之或灸法救之

更有氣血偏枯半身不遂者如在左血虛宜四物

湯 熟地黃 當歸 冬叁 川芎 壹 白芍 貳錢 酒炒 水煎

服如在右者氣虛宜四君子湯 人參 壹 茯苓 貳

白朮

土炒 貳錢

炙甘草

每

水煎服

二方中皆可加祛風

活絡之藥如防風

壹貳錢

桂枝

壹錢

鈎藤勾

叁伍錢

之類

如有痰加竹瀝薑汁佐之若類而推之則又有中

痰中寒中暑中食中惡等證分別證治切勿悞施

之今將一時卒倒醫藥迫不及備故節取古方之

效捷而易辦者列左庶幾對證處方以救急云

中風卒倒

中風不同又宜監斷藥宜之

治卒然倒仆痰涎壅盛難辨虛實扶病人於避風

室內用炭火一盆將米醋灑上使醋氣衝入口鼻

病輕者卽甦重者亦易治勿遽服補藥米湯之類  
恐痰涎永繫於心致成終身痼疾  
此法卽虛中亦可用

中風昏迷不省 方三

不論風寒食痰邪祟一時昏仆不省者用生薑

汁半鍾童便一鍾和勻盪溫灌下卽醒

牙皂莢 去皮莖 貳兩 生明礬 壹兩 二味全入水中煮化取

出曬乾爲末 北細辛 伍錢去葉土淨 共研細末用少許

吹入鼻中卽醒

人手足指甲 炒 黃酒煮服立醒

中風口噤不開 方二

白鹽梅揩齒即能開并不傷齒

不論男婦小兒中風口噤身直用乾雞屎或鴿糞

炒黃再以黑豆同炒酒煎去渣服即齒開能言

中風口噤不語 方三

白明礬 貳錢 研末 用生薑自然汁調化斡開口灌服其

涎或吐或化下即醒

馬料豆 壹升 煮濃汁如飴含汁在口即能言也

側柏葉一握 去枝 梗 葱白一握連根研如泥無灰酒

一觔煎十餘沸温服

按柏葉能行血消風葱白散氣祛痰酒能通經助藥力如

初中節服數杯能使風退氣和一切易治

初中痰盛不省人事

蘇合香丸一圓用竹瀝薑汁調藥灌下醒後用

白朮土炒當歸 天麻各貳錢 川芎 薄荷 桂枝

南星薑汁製 陳皮各壹錢 水煎臨服加竹瀝一酒杯薑

汁三茶匙和勻服

中風口眼喎斜方四

生瓜薑絞汁和大麥麵炙熱熨心頭一正便止勿



令過分

口喎用皂莢伍兩

去皮為末

三年老醋和糊左喎塗右

右喎塗左乾更上之以正為度

又用石灰一合醋炒調如泥於不患處塗之立便

牽正

灸法最妙

聽會穴

耳珠前陷中開口有空

頰車穴

目下八分曲頰

陷中用麥大艾丸灸三壯即效如不效再灸

中風灸法

一時昏仆氣塞涎流不語藥物難施之際灸法最

善...百會穴 中 風池穴 并治偏正頭風 大椎穴

項背第一節骨陷中 屈手 曲池穴 陷中 足三里穴 膝眼下三寸 絕

骨穴 一名懸中外踝上 間使穴 手掌上橫紋

以上七穴凡人心中昏亂或手足麻痺不拘是風

是氣用菉豆大艾丸各灸三五壯 并治卒死心頭尚熱不知何證

用此灸法即甦

中風手足麻癢

羌活煎湯洗如大腸燥閉不見虛證者用不枳

實厚樸 大黃 羌活 各貳 水煎服自解 即三

良方集腋 中風 五

中風拘攣

中風昏仆省後筋絡攣結肢節疼痛或半身不遂

者用鼠尾刺樹皮

俗名老鼠刺樹高三五尺冬季結紅子鮮者取皮肆兩

木蓮葉

似茶花葉而色老生於土墻頭上者多一歲一片

無灰酒二觔煎

至兩碗作二次服大有奇功三四服全效

預防中風方

凡人覺大指次指麻木或眉稜骨痛三年之內定

有風疾此方用蒼葢草

卷劬製法列後

製首烏

當歸

熟地黃

各捌兩

牛膝

續斷

秦芫

川芎

赤芫

五加皮各肆兩 俱為細末煉蜜丸桐子大空心淡酒下叁錢

### 回春再造丸

專治中風中寒痰迷氣厥左癱右瘓半身不遂口  
眼歪斜腰腿疼痛手足麻木筋骨拘攣步履艱難  
凡小兒急慢驚風諸般危急之證立見神效真有  
起死還生之功回春再造之力勿視為泛泛也

真蘄蛇 壹條 頭尾各去三寸酒浸三日去鱗皮骨桑柴火焙脆片研

山羊血 壹兩 要道地 上肉桂 貳兩 去皮片研

人黃參 貳兩 切片礮燥片研 西牛黃 貳錢 伍分

川黃連

貳兩

麝香

伍錢

丁香

壹兩

硃砂

壹兩

飛淨

暹犀角

茱錢伍分  
錫細另研

陳膽星

壹兩

梅片腦

貳錢伍分

乳香

壹兩

去油

沒藥

壹兩

去油

沉水香

壹兩

血金竭

柒錢伍分

以上十六味細料各藥秤准另研為末以後諸

藥製法安當總用烘脆磨末

大熟地

貳兩

炒

虎脛骨

壹對

重壹兩  
外酥炙

綿黃耆 貳兩 天竹黃 壹兩

骨碎補 壹兩 烘乾 何首烏 貳兩

粉甘草 貳兩 炙 地龍 伍錢 去土

元參 貳兩 川芎 貳兩 炒

明天麻 貳兩 白芷 貳兩

製附子 壹兩 威靈仙 貳兩 伍錢 酒浸炒

赤芍藥 壹兩 白朮 壹兩 炒

白蔻仁 壹兩 兩頭尖 貳兩

台烏藥 壹兩 青皮 壹兩

中風

粉葛根

貳兩伍錢

龜腹版

壹兩

炙

當歸

壹兩

酒炒

全蝎

貳兩伍錢

去毒

北細辛

壹兩

草薢仁

貳兩

大黃

貳兩

麻黃

貳兩

去節

川羌活

貳兩

白殭蠶

壹兩

藿香

壹兩

松香

伍錢

製透

青防風

貳兩

雲茯苓

壹兩

香附

壹兩

右藥精選道地諸品虔誠監視如法修合用蜜

爲丸金箔爲衣蠟殼固護

病在左部用四物湯爲引當歸白芍生地川芎  
各壹錢煎湯送下病在右部用四君子湯爲引  
人參白朮茯苓甘草各壹錢煎湯送下無力用  
參者黨參代之亦可其餘薑湯黃酒隨證酌用  
大人每服一丸重二錢小兒大者每服一錢小  
者每服五分孕婦忌服

蓄發丸

專治肝腎風氣四肢麻痺骨間疼痛腰膝無力亦



能行大腸氣治三十六種風或受寒濕而起癱瘓  
年久不愈服久神效

蒺藜草

法於五月五日六月六日  
九月九日採葉洗淨焙乾

用好酒白蜜和

勻洒在葉上鋪入甑中上鍋內蒸透取出晒燥再  
洒再蒸共晒九次碾末蜜丸如桐子大每服五十  
丸空心白酒下病五七年者服至二千丸病轉盛  
者乃藥勝於病服至四千丸仍如完人

浮萍一粒丹

治中風癱瘓三十六種無名風疾遍身癩癬腳氣

併治跌撲損傷胎孕筋搐攣結此藥性寒而散牛

風挾火者功效至靈服之百粒乃為完人

紫背浮萍

宜七月十五日採撿淨以竹篩攤晒下置水一盆映之易燥

研細末

煉蜜丸如彈子大每服一丸空心豆淋酒下

太元湯

治中風痰塞不語 染布活靛缸水一盞温灌下

即能言語

按藍汁解諸風熱毒散經絡結氣敗血染布活水平內有石灰能下痰水之義

史國公藥酒方

防風

秦艽

川萆薢

驚甲

虎脛骨炙酥

羌活

晚蠶沙炒黃

油松節

白朮土炒各貳兩

杜仲薑汁拌炒

當歸各叁兩

川牛膝壹兩

蒼耳子肆兩

乾茄根剝兩蒸

枸杞子伍兩

右藥切片盛夏布袋中投大罈內入好酒三十

五觔封口浸十四日將罈入湯鍋內煮三個時

辰取罈入土埋三日去火氣每日清晨午後各

服三五杯大有奇效愈於服他藥也

附類中風

中氣

前已詳辨用蘇合丸薑湯調灌醒後次用八味順

氣散以調養之

人參

白朮

茯苓

陳皮

青皮

白芷

烏藥

各壹錢

甘草

伍分

水煎溫服

或分作二次服

即是中風當去人參一味先進此方順氣次進治

風藥亦善法也

中痰

寒痰迷悶心胸僵仆卒倒口角流涎四肢厥冷脈

沉滑者 薑汁調白礬二錢灌下如不效再用

牙皂 去皮苳炙 藜蘆 伍分 俱為細末每服五分燈心

湯下吐去頑痰即醒次服導痰湯

陳皮 薑半夏 茯苓 枳殼 炒

南星 薑汁製 甘草 伍分 加生薑五七片水煎服

端午日取白鳳仙花浸於燒酒內封固無論年月

遇此中痰症溫服一杯其痰立時消化

中寒

身體僵直口噤不語四肢戰掉洒洒惡寒脈浮緊

無汗用 熱酒薑汁各半盞灌下即醒

或用生葱二觔截去根葉用繩縛作兩束先用一

束入空鍋內頓熱不可用水乘熱置病人臍上熨之再

將次束置鍋內候前束冷則易之如此數換病人

鼻中聞葱氣即醒此法最善

或用豆大艾丸隔大蒜片灸臍下一寸五分氣海

穴不拘壯數以手暖為度醒後次服

乾薑各壹附子各壹佐以麻黃伍分水煎服再或

以理中湯人參 甘草 白朮加味調養之

中食

飲食過傷之後或感冒風寒氣惱以致填塞胸中  
胃氣不行脈緊盛狀似中風或有半身不遂手足

抽搖等證

先以蘿蔔子搗碎以溫湯和攪取淡湯徐徐飲之

少頃即吐此法即吐不盡亦能下行

或用食鹽少許於熱鍋中炒紅色入水煮至將滾

之際攪勻淡鹽湯徐飲徐吐以去病為止次用

平胃散

厚樸

薑汁炒

陳皮

各壹錢

蒼朮

木泔水浸一宿切片炒壹

錢伍分 炙甘草陸或加減水煎服此證以風藥治之

則死

### 中陰毒

房勞後感中風寒一時沉重四肢逆冷腹痛冷汗

爪甲面色青黑六脈俱沉兩尺脈伏乃陰毒也用

豆大艾丸隔大蒜片灸 氣海臍下一寸五分關元臍下三寸

二穴各灸百壯以手足煖為度更服羌附湯

羌活 附子製 乾薑炮 茴香各壹錢 木香伍分 加黑棗

二枚水煎服



蘇合香丸

治卒暴中風厥逆中氣尸厥中氣痰涎壅盛口噤

者

沉香

木香

丁香

訶子

煨去核

麝香

另研

白檀香

薰陸香

龍腦

另研

香附子

白朮

安息

另研為末無灰酒煮為膏用

蘇合香

入安息膏內

以上各壹兩

犀角尖

硃砂

各伍錢另研

右為細末入安息香膏煉蜜和勻如龍眼大用

蠟封貯罈口用時開取半丸薑湯化下病重者  
用一丸

痛風方

上肉桂

全當歸

延胡索

明天麻

共爲細末每日溫酒調服隨量以醉爲度五服  
見效治驗多人

如遍體疼痛由氣血凝滯所致及四肢拘攣不  
仁者服之俱效

以善服之而效

故誠歸於誠由是血氣滋潤而性外四逆辟舉不

其效亦如冬入

其氣未至自當酌量以補為效正明

壬丙卦

全當論

其附錄

即天劫

麻風衣

服一衣

麻徒唯賴口用却開取半皮薑豈必不識重者

欬嗽哮喘門 附痰症

虛人欬嗽 葉天士先生方

叭嚙杏仁 叁錢 去皮尖 川貝母 貳錢 去心研

冬霜桑葉 捌分 南沙參 貳錢

右四味同煎頻服

熱嗽

有痰面赤煩熱午前更甚起於夏季者多

桑白皮 黑山梔 知母 桔梗 杏仁

黃芩 象貝 各壹錢伍分 生甘草 伍分 水煎服

肺熱久嗽

痰少有聲肌瘦將成肺癆者

杏仁

紫苑

欵冬花

枇杷葉

蜜炙去毛

木通

桑皮

各等分

製大黃

照分減半

右各為末蜜丸如櫻桃大食後夜卧含化一丸

肺鬱痰嗽胸膈疼痛夜卧不安者

貝母

杏仁

各等分

共搗研入薑汁白糖蒸餅為丸

夜卧含化

痰嗽

万二

胡桃肉叁枚生薑叁片卧時嚼服卽飲湯二三呷再食

胡桃叁枚生薑叁片緩緩嚼下數次卽效

氣壅痰盛者用雪梨一個開一竅入白礬一錢

用紙封固隔水蒸熟食二三次愈

### 食積痰嗽

蘿蔔子半筋焙燥研爲末以糖和丸如櫻桃大綿

裹含化汁下甚效

### 秋月肺燥欬嗽

嗽多痰少午後至夜更甚者

松子仁壹兩 胡桃肉貳兩 研膏加熟蜜伍錢 和勻每服二

錢食後沸湯點服 日久痰多者加北五味二錢

屢效

痰喘欬嗽 方二

藕汁 梨汁 白果汁 蘿蔔汁 各等分 銅鍋內

熬成膏隨意服之

白蜆殼 多年陳者 煨過存性 為極細末以米飲湯調服一錢

日三服 蓋蜆粉皆能清熱行濕 濕熱去則痰自消嗽自止

久嗽不愈 方二

枇杷葉

去毛淨  
切碎

杏仁

去皮  
尖研

等分泡湯多服即止若

無痰虛嗽止用枇杷葉去毛蜜汁泡湯飲

又方 以噓杏仁

去皮尖  
肆兩

胡桃肉

泡去衣  
肆兩

上白糖

陸兩

共搗如飴時時入口含化如痰未盡加川貝母伍

錢同搗能治一切久嗽及體虛午後面赤氣冲至

晚更盛者屢效如神

冷哮方

老生薑

連皮貳  
錢伍分

白糖

壹兩

二味共搗用白滾湯冲服

每日一服其薑糖逐漸加重要加至糖四兩薑一

欬嗽哮喘



兩爲度

痰哮方

苳麻根

性火燒存  
性研細

用生豆腐蘸食三五錢或以猪肉

二三片蘸食卽效

鹽哮方

豆腐漿每日早晚久服卽效

如小兒用 芝麻稽瓦上炙焦存性出火氣研細

以生豆腐蘸食卽效

哮證應驗方

萊菔子

兩

搗牙皂角

一枚

明礬

將清水漂淨

伍錢

研末

右三味同在飯上蒸三次又水漂再蒸三次研

末拌糖服

### 哮喘神效方

露蜂房壹個

能祛滌痰垢

枯礬貳錢

研細糝蜂房內同炙

天南星貳錢

製

白附子壹錢伍分

製半夏貳錢

製川烏壹錢伍分

右藥共研細末約一兩重均五十日連喫每日

清晨用水豆腐花或豆腐漿沖服末藥二分不

可多服至要至要

按此方竟用研細白明礬二錢入蜂房同炙已成枯礬矣而以枯礬再炙不亦失其礬性乎

勞證發熱喘嗽

鮮百部二觔切細用無灰酒浸罈內灰火煨熟每日五更溫服一杯以好爲止

口燥有痰喘嗽

瓜萇一個入明礬棗大一塊同燒存性研細以熟

蘿蔔蘸食一服卽效

老年痰喘

秋白梨一個去心入燕窩一錢先用滾水泡再入冰糖

一錢蒸熟每日早晨服勿間斷

如氣促坐卧不得者 胡桃肉連衣杏仁去皮老生

薑各壹兩同搗成膏入煉蜜少許丸如彈子大卧時

白湯含化一丸

虛喘方

喘無休歇呼吸不接續出多入少乃不足之證也

人參壹錢伍分胡桃肉伍個連衣加生薑三片棗一枚水煎

欬哮喘

温服

喘急欲絕者

韭菜汁服之可治

膈中老痰

不論男婦久積老痰或失音或發喘湯藥不效者

蜜陀僧一二錢砂糖調白湯送下痰與藥從大便

出無碍

不宜多服

痰暈方

明礬

火煨枯

研末薑湯調下吐之即愈

血證癆怯

血證有吐血唾血咳血衄血之別大抵多屬於熱蓋臟腑有熱火逼之然後血湧溢而出也吐血卽嘔血屬胃經肝經多因酒過

或食熱物太過或勞傷用力太過有紫黑色瘀血者吐之無妨若鮮紅者則火太盛若勞傷而吐者未盡屬火也

唾血咯血出於腎經兼脾經因色慾太過者多  
欬血嗽血出於肺經兼肝經乃酒色怒氣種種不

節欬嗽有痰痰中帶血也

衄血鼻中出血也屬肺經肝經治法須究其因若  
因飲食過飽負重傷胃而吐者調胃安血思慮傷  
心積熱而吐衄者須補益心志如積熱則清之氣  
鬱則順之吐而不欬易治唾中帶紅絲者難治爲  
有內損也

有因怒氣傷肝肝木火旺侵剋脾土致肝不能藏  
血脾不能統血忽然血暈不省人事吐血至升斗  
者一時切勿用寒涼之劑及驟用補藥宜先服

童便二三碗得血止神安臨卧時用廣西真山羊

血每服三分引血歸源不過三服血自止

吐血不止

四方

白茅根肉劬餘水煎服之

經霜敗荷葉燒存性研末新汲水調服二錢

千年運根搗汁去渣用福珍酒冲服

鮮馬糞三四個炭火上焙焦研末黃酒冲服卽

愈

血熱妄行



生荷葉 生艾葉 生側柏葉 鮮生地各等分

搗爛丸如雞子大每一丸水煎去渣服

鼻血不止七方

好陳酒燙熱自足浸至膝腕以出汗爲度

刀刮指甲細末吹入鼻中立止

本人頭髮燒灰吹入鼻中立止

人乳滴入鼻中立止

竈雞不拘多少炒研爲末加冰片少許吹鼻卽止

鮮嫩荷葉蒂菜個水煎服

乾天竹子三十粒研末滾水冲服一二次立愈

奪天造化丹

虛勞欬嗽吐血仙方

六月雪壹觔切片入瓦罐內河水井水各半同煎  
至無味去渣將不落水大雄猪肺一個煮至肺化  
擦去筋膜入藕汁八飯碗白蜜人乳梨汁童便各  
一飯碗煎成膏子早晚服一酒杯

滋陰鴨方二

治虛勞咳血吐血

老雄鴨二三斤者一隻去毛雜入大原生地

肆兩

大麥門冬

去心肆兩

縫好臆腹置磁器中加無灰酒一

觔半隔水煮熟任以食之其餘藥渣入六味地黃

一料同磨末蜜丸如桐子大每朝鹽湯送下三錢

又方

烏嘴鳳頭白鴨活者一對

雌一雄出嘉興治腸胃久虛葛可久白鳳膏

用之取金水相生之義

養之於家俟有鮮紫河車一具剪碎

與鴨食之待其食完又須一人將鴨東趕西走一

日鴨不住腳方能消化然後緝斃去毛去腸中之

垢連雜連骨煮極爛擦起骨渣收成自然鴨膏其  
骨渣配藥共磨末男病配入六味地黃加麥冬五  
味子一料女病配入八珍歸脾一料共為末入鴨  
膏杵和為丸每日早晚各服三錢淡鹽湯送下

此方男女虛勞損怯欬嗽失血羸瘦者服之起死  
回生大有奇功能救人一命故不以鮮河車活鴨  
為嫌也

外除癆病仙方

雄黃 壹錢

硃砂

壹錢

麝香

壹分

硫黃

壹錢

右四味各研細末磁瓶收貯至端午日午時將  
滴花燒酒調勻用獨囊大蒜一個去蒂蘸藥從  
背尾骨逐節擦上看青腫處卽知癆虫所在其  
處多擦數次其虫自滅不拘新舊一切癆病皆  
能除根如病重者須擇天醫吉日總以午時擦  
之爲妙此方能開背後三重關竅卽虛怯哮喘  
疰夏之人端午日擦之亦能神清氣爽筋絡流  
通大有裨益可廣傳濟衆以起沉疴

頭面耳目

腎厥頭痛玉真丸

硝石壹兩即硫黃貳兩半夏壹兩洗石膏壹兩煨  
焰硝製七次通赤研

右為細末研勻生薑汁糊丸如梧子大陰乾每

服二十丸薑湯或米飲湯下

頭以配天三陰三陽五臟六腑之氣皆會於此故

六淫七情之邪皆可以為頭痛惟頭痛巔疾下虛

上實過在足少陰巨陽則入腎一證最為危急以

濁陰上逆亂其清陽壅遏經隧頭痛如擘刻欲昏

憤豈容緩治圖功許白沙謂腎厥頭痛其脈舉之  
弦按之石堅以玉真丸治之硫黃硝石升陽至頂  
有迅雷風烈之勢石膏半夏達陰降逆有通元入  
冥之神白沙以補天手逃掃濁陰非深入聖域者  
不能此制方之妙也

偏正頭風

川芎

叁錢

紹酒炒

松蘿茶葉

叁錢

右二味煎湯服之卧半日即愈

半引頭痛

藁本

川芎

雄黃

艾葉

各等分

左痛熏右鼻立愈

治頭疼方

細辛

去葉

壹錢

雄黃

叁分研末左疼吹左鼻

右疼吹右鼻

腦漏方

玉蘭花藥塞鼻即愈

頭上白禿瘡方二

用大鱧魚搗爛敷之即愈



聖濟錄以雄黃末猪膽汁調敷卽愈

面生黑點如疥

鹿角燒灰猪油熬熟調搽

治面痣方

方二

水調石灰一盞如稠粥樣揀整糯米不破碎者半  
插灰中半出灰外經一宿米色變如水晶樣用簪  
挑少許置痣上半日痣自出不得着水三二日愈  
又方 用石灰桑柴炭二樣各等分取威靈仙煎湯  
取出汁熬膏點痣上其痣自落

下頰脫落方

口含烏梅一個即生無日復愈三手愈其水又調

耳鳴方

藥珠研末極細無聲為度置少許耳內即止言口

耳閉方

細辛 木通 石菖蒲

各壹分 麝香 貳厘

其為細末綿裹塞耳中即愈

耳爛流膿

陳皮 燈草俱燒灰

各壹錢 冰片 壹錢

研勻吹耳

大人小兒耳內膿水

海螵蛸 壹錢  
枯礬 壹錢  
麝香 壹分  
乾胭脂 伍分  
燒存性

其為末吹入耳內即愈

瞽目重明神效方

雄雞膽 柒個  
繡花針 柒隻

每膽用繡花針一隻插入膽管取絨線紮緊管口

用天泉水十六兩瓦瓶盛貯將膽針浸於水內蓋

好勿洩氣放在有風無日處俟三年後其水及膽

針俱化為濃汁每日蘸汁搽眼上約三個月能使

眼障消去瞽目重明此方一料能治兩人如能合送者福壽並增功德無量矣

努肉起星方

葶薺

壹觔

每一葶薺插入木賊草

肆段

煎透取熟

葶薺去皮去木賊草每日晚間食三兩或四兩再用象牙磨汁塗眼稍內更佳

移星去障方

麩仁

去油伍分

青鹽

壹分

猪脬子

捌分

加白蜜三匙共研勻點上二三日即明亮

去眼中翳障

熊膽少許用淨水畧潤開盡去筋膜塵土入冰腦

一二片如淚癢則加生薑粉些少以牙筋點眼能

去翳障及赤眼最效

起倒睫拳毛

土木鱉去殼搗爛帛裏塞鼻能起倒睫拳毛此二方

出王漁洋分甘餘話

拳毛倒睫

石燕一對考本經無雌雄之說用炭火燒紅童便淬七次再

用煎銀罐內燒紅乳汁淬七次爲細末入麝三四  
厘研勻再用羊毛筆蘸乳汁點眼弦上每日點十  
餘次

飛絲入目

用頭垢點入卽去入水內少時融中自會水離出

去內外障復明方

治眼內外障三五月不見物者

硝石 壹兩

銅器化開入黃丹

貳分 片腦

貳分

用銅

匙急入罐內收之每點少許去障復明其效如神

眼皮生瘤

櫻桃核磨水搽之其瘤漸漸自愈

傷眼突睛

眼睛被物碰傷或因薙髮捲傷突出目睛急用田

螺一個夾去屁股入冰片少許螺中自有水滴出

用羊毛筆蘸拭眼中即愈

夢靈丸

治眼內外障神水在者可復明

蔓荊子

真兩當歸

地黃

赤芍

防風

各壹兩伍錢

荆芥穗

甘菊

川芎

枸杞

蒺藜

各壹兩

十味其為末水麵糊丸桐子大空心溫水服二三

十九

蕪菁一名蔓荆子能明目千金方用之蔓荆子上行而散若血虛有火瞳神散大禁用



... 龍圖互目 ...

十次 干土谷而滑谷血虛育火郵輒精大禁服  
燕窩 各莫隕于海即日干金大用之莫隕

十和共為末水醃膠火酥于大空心盛水照二三

陳花蘇 甘藷 瓜蒌 酥酥 葵葵  
各壹兩

口鼻齒舌門

治口瘡

方二

陳白螺螄殼燒灰加兒茶少許為末吹患處一次  
即愈治諸疳悉愈

又方

礪砂

貳錢

兒茶

貳錢

薄荷

貳錢

青黛

壹錢水飛

冰片

伍分

其為末搽之

口舌生瘡

川連

石菖蒲

各伍分

水煎連服二三次即愈

治口臭方

兒茶 肆兩

礪砂

桂花

嫩薄荷葉

各伍錢

甘草 叁錢

熬膏作丸噙化

鼻淵

老刀豆文火焙乾為末酒服三錢重者不過三服

即愈

鼻流黃水不止

用絲瓜近根三五寸燒灰存性酒服

鼻中癭肉 方二

藕節壹節有根連鬚處 燒灰存性爲末吹患處自能脫落

立效

枯礬

猪脂油搗和丸以綿裹塞鼻中數日隨藥

脫去

赤鼻方

硫黃

入布袋內用豆腐水煮三次淨重貳錢

輕粉

蜜陀僧

白芷

各壹錢

白礬伍分

共爲細末以津唾搽之晚則搽日

則洗去

牙齒痛方

青鹽 焰硝 礬砂 樟腦 各壹錢 共為末以冷茶

和藥嗽口併搽痛處立效

立止牙疼方

細辛頭末 壹錢 片腦 貳分 生麝香 貳分

右藥三味研細加靈藥 貳分 擦患處即愈每日

再用擦牙散擦齒可以永固

擦牙散方

細辛頭末 青鹽 熟石膏 各壹兩

右三味研細加靈藥壹錢和勻擦齒

靈藥方

牙硝 壹兩

硼砂 伍錢

白礬 叁錢

其為細末裝在銀

罐內放在火上燒線香一炷俟香盡加熊膽 伍分

擦牙方

牙皂 棗錢炙

細辛 叁錢

五味子 叁錢

右研末每早擦牙用冷茶嗽口最能固齒

牙床出血

即牙癰症橄欖核炙炭研極細方一

松針熬汁一鍾入麥粉少許攪勻澄清飲之即愈

又方 苦參 壹兩

枯白礬 壹錢

為末日擦之

玉帶膏 治牙痛

生梔子仁

叁錢

龍骨

生黃柏

生黃芩

各伍錢

銅鍋內熬汁煮龍骨至乾取出為末再用鉛粉五錢麝香三分共研細末貯碗內加黃蠟一兩隔湯燉化拌勻用連四紙舖火爐蓋上將藥刷在紙上剪成碎條子臨卧貼在牙上次早取下有黑色可

驗

齒齲疳爛

胡黃連

伍分

膽礬

兒茶

各壹分

研細擦之立效

走馬牙疳 方三

人龍 即蚬 瓦上焙乾研極細末加青黛冰片各少

許研勻吹入即愈

又方 枯白礬

壹錢

冰片

叁分

珍珠

壹錢

鐵杓內炒

成灰存性銀硃

伍分

其合一處研細先將米泔水

洗去黑肉後將此藥吹入牙上瘡口

又方、人中白乳煨三次為末入冰片少許吹之

唇裂生瘡

瓦松 生薑同搗和入食鹽少許塗患處



牙疳口瘡方

爐甘石

壹兩火煨紅用黃連水淬七次

靈砂

壹錢

珍珠末

肆錢

以上其為細末磁瓶收貯

打靈砂法

用水銀

硃砂

焰硝

各伍錢

礪砂

陸錢

入鍋內用熟石膏研末鹽水調勻將口封固先文火後武火打二炷香為度上瘡靈砂去火硝添白

礬

伍錢

同升

舌衄出血

用槐花末敷之即止

舌腫

用蒲黃末摻之即愈

舌長過寸

冰片研細敷之即收

舌忽脹大

用雄雞冠血塗舌嚙下即縮

喉風舌大

治喉風舌大如脬卒時不救即死

冰片

壹分

火硝

叁分

膽礬

貳分

青黛

貳分

殭蠶

伍分

硼砂

叁分

石共為末吹之即愈

...

...

...

...

...

...

...

咽喉門

附骨鯁

咽喉急證異功散

斑蝥

肆錢

去翅足糯米炒黃去米淨末秤准

血竭

陸分

沒藥

陸分

乳香

陸分

全蝎

陸分

元參

陸分

麝香

叁分

冰片

叁分

右藥共為細末磁瓶收貯封口勿令走氣不論

爛喉痧喉風喉閉雙單喉鵝用尋常膏藥一張

取此散如黃豆大貼項間左貼左右貼右中貼  
 中貼至二三時即起泡用銀針挑破即愈險症  
 起泡更速此方乾隆丁未河南喉痧大疫全活  
 無算惟娠婦忌用

急救喉症良方

珍珠末 貳錢 青黛 叁錢

真西黃 壹錢 月石 叁錢

麝香 貳分  
伍厘 兒茶 貳錢

上梅片 叁錢 血竭 叁錢

熊膽 叁錢 山豆根 捌錢

乳香 叁錢 沒藥 叁錢

共研極細末磁瓶收貯勿令走氣如遇患喉證

者將藥吹入喉中立愈

喉痛方 用綠礬少許以好醋研汁點患處 又用

橄欖核摩汁冲服

喉間乳鵝

馬蘭頭菜打汁漱口嚥下冲服徐徐立效

急救乳鵝

用兩手從臂上抹至大拇指間四五十下以繩紮男左女右大指甲旁以針刺出血即愈

喉閉急證

見王漁洋分甘餘話

用鴨嘴膽礬研極細以醃醋調灌吐出膠痰立愈

冰硼散

片腦

壹錢

硼砂

壹錢半

研細磁瓶封貯勿令走氣吹

喉痛喉腐用

雄黃解毒丹

治一切咽喉腫痛危急之證

雄黃 伍錢

川鬱金 叁錢

巴豆霜 貳錢伍分

醋和丸菜豆大清茶下兩丸吐出痰涎而愈

風熱喉痺腫痛及纏喉風症

用生黃連 伍分

白鳳仙花子 伍分

共為細末吹之

急救鎖喉風症

其症先一二日胸膈氣緊呼吸短促忽然咽喉腫

痛手足厥冷氣閉不通危在頃刻者急用巴豆七

粒三生四熟生者去殼研熟者去殼炒去油存性

明雄黃五分鬱金一個共研末每用末半茶匙清



茶調下如口噤咽塞用小竹筒吹藥喉中須與吐

利即愈

仙露梅

治咽喉十八般證垂危者立愈

大青梅子

三觔

青鹽

肆兩研

食鹽

貳兩研

活蝸牛

肆拾個  
杵爛

共拌勻隔一宿以後日曬夜收鹽盡為度再將

磁瓶曬乾收貯遇咽喉疼痛者摘梅肉少許置

口內含之即愈

咽喉痛方 方二

山慈姑

礞砂

海巴

川連

入薑內煨熟

珍珠

煨

梅片腦

枯礬

辰砂

飛淨紅鐵皮

以有繡之鐵火煨醋淬刮下用

右等分其為細末磁瓶收貯勿令洩氣專治咽

喉腫痛雙單喉鵝喉痺喉纏等證用鵝毛管吹

三五厘患處立愈重者吹三五次取效

又方

巴豆

壓去油

蟾酥

麝香

冰片

右藥各五分研極細末用紅棗去核用藥一二

厘塞鼻孔男左女右

玉雪救苦丹

水安息

廉珠粉

真血珀

鵝管鍾乳

以上各參錢

真西黃

梅片腦

當門子

以上各參分

蘇合油

貳兩

製川樸

寒水石

川黃連

水炒各壹兩

白螺螄殼

壹錢

柴胡

淡豆豉

赤茯苓

辰砂片

水飛

茅朮

前胡

廣藿香

大豆黃卷

防風

生白朮

荆芥穗

白茯苓皮

秦艽

粗桂枝

生大黃

石膏

另研

天花粉 江枳殼 江枳實 麻 黃 去節

生甘草 苦桔梗 牛蒡子 貝母 麩

赤芍藥 大麥仁 小青皮 車前子

製半麩 連翹 六神麩 建神麩

廣陳皮 木通 廣木香 尖檳榔 以上各 捌錢

大腹絨 壹兩 陸錢 煎湯用

右方除香料細藥八味及腹絨外其粗藥用陰陽

水浸拌一宿明日曬乾共研為極細末後入細藥

再同研和勻乃將麝香西牛黃蘇合油水安息外

加六神麩四兩大腹絨湯打漿共搗和加入煉白  
蜜一觔糊丸每丸濕重一錢五分曬乾重一錢再  
入石灰壘內曬燥然後用蠟丸封固擇吉日虔禮  
大悲寶懺一永日務須誠敬供藥頂禮

此藥照引服之真有起死回生之功雖垂危莫救  
命在呼吸之間者亦立時奏效屢試屢驗百不失  
一誠千金不易之良方也又虛癆孕婦忌服

此方專治咽喉一切諸證及爛喉疳痧痰涎壅塞  
口噤身熱命在頃刻者急用開水化藥一丸徐徐

灌之立刻回生再進一丸卽愈或用荷葉三錢煎湯化服亦可

一治小兒悶痘細葉菖蒲打汁開水沖化服半丸

一治小兒時痧發不出用西河柳五錢煎湯化服

一丸如未透再進一丸凡痧痘輕半丸重一二丸

一治小兒急驚風身熱嘔乳驚悸抽搐便青用鈎

藤勾一錢煎數沸去渣量兒大小化服半丸或一

丸作四次服之立效

一治月內赤子胎驚不乳用藥一丸分作四塊之

一研極細末安在乳頭上與兒喫乳同下之立愈

一治痰厥不省人事用陳膽星五分開水化服一

丸一治...

一治肝氣厥逆不省人事用生石決明二兩煎湯

化服一丸一治...

一治傷寒時行瘟疫寒熱頭痛胸悶體痠一二候

身熱不解神昏譫語開水化服一丸如身熱不盡

再進一丸立有奇功

一治癰疽發背腦疽疔毒一切無名腫毒外用牛

膝一兩搗汁調藥半丸敷之又用開水或生甘草  
三錢煎湯化服大症一丸輕者半丸未成卽消已  
成卽潰  
爛喉疳痧易透法

用乾枯連根茄子藤梗在炭基火上徐煨令病者  
聞其氣從鼻而入鼻乃肺之竅聞此茄藤氣則痧  
子易透痧旣透則邪從皮毛外達而喉痛喉腐俱

減自愈

神效散 專治喉痧



川貝母 貳錢 去心

黑元參 壹錢 伍分

皂角 壹錢

射干 壹錢 伍分

西河柳 壹錢 嫩葉

以上五味另用生葶薺芽一兩煎湯收乾在藥上

研末服均作兩次即愈一服愈停後服

先用皂角七分研極細末吹入鼻孔令自嚏然後

服前末藥

喉閉 方一 一時喉閉飲食不能下咽危在旦夕者

膽礬 壹分 全蝎 壹個 去頭足 研末加麝香冰片 各壹厘 吹

入喉間吐出毒痰喉即通矣

又方喉痛甚劇以生白蘿蔔連皮打爛絞汁頻嚥  
卽愈

附製膽礬法以明礬數兩安置鉢中須擇風吹得  
着日曬不着之處每食青魚將魚膽汁瀝入礬中  
愈多愈妙日久汁多礬色翠綠漸如翡翠卽可用  
矣其蠍子藥肆中每以鹽水收入用時須置瓦上  
以炭火炙燥然後研末爲要

魚骨鯁

獨囊大蒜塞鼻孔中卽下

又方食橄欖汁卽下或食鹽橄欖徐嚙亦效

雞骨鯁

鮮苳蔴根搗汁飲之卽下

諸獸骨鯁

虎骨剉末水調徐徐嚙下自化

一切骨鯁

人指甲燒存性爲末吹入喉中立效

文次類載其備以去白蟻骨鯁因以雞骨鯁爲最

急效暑痧瘧痢門

葉天士藥茶方

專治傷風傷寒頭痛發熱停食肚腹膨脹霍亂吐

瀉伏暑赤白痢疾等證

羌活

獨活

荆芥

防風

柴胡

前胡

藿香

香薷

紫蘇

葛根

蒼朮

白朮

枳實

枳殼

藁本

滁菊

青皮

桔梗

甘草

半夏

製

白芥子

大腹皮

木通

萊菔子

研

杜蘇子

車前子

澤瀉

猪苓

薄荷

生薑

以上各貳兩

白朮

炒

川芎

白芷

秦艽

草果

各壹兩

陳麩

即神麩

南查炭

茯苓皮

麥芽

各肆兩

杏仁

厚樸

廣陳皮

各叁兩

右藥四十一味共煎濃汁以陳松蘿茶葉陸劬

葉天收之曬乾每服二三錢小兒減半煎服

急救時疫方治霍亂轉筋

天竹黃 貳兩 人中黃 貳兩 白殭蠶 壹兩去黑口入藥取直者為雄

全蠍 壹兩 荆芥 壹兩 防風 壹兩 當門子 壹錢

火鑽各研細末無聲為度水泛為丸如桐子大辰砂

為衣每服二十丸生薑湯送下小兒減半孕婦

水忌服

預避不染疫痧良方

萊菔子 叁錢 桔梗 貳錢 薄荷 肆分

白青黛 伍分 土貝 叁錢去心 戎鹽 叁分

每一劑照方預服可以作三人分飲服下一二三

次可以不染時痧

白痧藥

白胡椒

壹兩

北細辛

貳錢

檀香末

叁錢

牙皂

壹錢

焰硝

叁錢

明礬

叁錢

蟾酥

叁錢

丁香

叁錢

冰片

伍分

麝香

伍分

共為極細末或加金箔二張研勻收貯嗅之

火龍丹

西黃

壹錢

麝香

貳錢

片腦

壹錢

牙皂

壹錢

辰砂

貳兩

葶菱

壹錢

雄精

叁兩

焰硝

壹兩

月石 伍錢

金箔 壹百張

共為極細末磁瓶收貯勿令洩氣用時嗅之或

放舌尖上喫下亦可

細金丹 治炒脹腹痛

北細辛 叁錢 川鬱金 壹錢 降香末 叁錢 紫荊芥 陸錢

共為細末每服一茶匙放舌尖上以津唾送下

截疫保命丹

此丹藥味中正價料昂貴內有珍珠琥珀禦外邪而守內變能通正氣驅積穢復絕脉專治腹痛吐



瀉霍亂暈厥裏急後重等症

大劈砂

貳兩肆錢生研極細水飛淨研至無聲為度用以為衣

腰雄黃

貳兩肆錢生研極細水飛淨研至無聲為度

公丁香

貳兩肆錢生研極細

廣木香

貳兩肆錢生曬研極細

杜蟾酥

貳兩肆錢好燒酒浸化杵入

珍珠

貳錢生研極細研至無聲為度

真西珀

捌錢生研至極細無聲為度

嫩薄荷

壹兩入懷中煨脆研細

茅蒼木貳兩肆錢去粗皮生研極細

水飛滑石貳兩肆錢研至無聲為度

錦紋大黃肆兩別錢生曬研極細

當門子麝香陸錢俟諸藥末俱齊修合時研細和

雲母石肆錢煨研細

五靈脂陸錢研細酒飛去砂石曬乾再研

右藥各為極細末愈細愈佳然後秤准分兩拌

勻以好燒酒浸蟾酥杵和為丸如菝葜子大水

飛硃砂為衣碗合簣播摩盪令光堅曬乾磁瓶

收貯每服七丸重者多至三服無不立效此丹  
入口須含在舌心令其自化舌上發麻然後嚥  
下洞泄無度者藿香湯送下二十一丸  
修合須擇天德月德合天赦天醫吉日於靜室  
中虔誠潔淨慎重修合不可遭蹋乾隆二十一  
年大疫賴此方而定

急救萬應丸

治時疫頭痛項強一身盡痛大熱斑疹不透及陰  
陽自利暑濕紅白痢一切痧症心腹疼痛吐瀉交

作六脈皆閉四肢冰冷冷汗如水或欲吐不吐欲瀉不瀉但揮霍撩亂者謂之乾霍亂即俗說之吊腳痧雖重者兩目陷下大肉落盡服下不吐即生如吐再服及三服不吐亦生矣惟米湯切不可服大忌大忌至要至要

製茅朮

廣藿香

忌火

杭白芍

酒炒焦各肆兩

生甘草

檳榔

砂仁

去殼忌火各壹兩

赤芍

酒炒

廣陳皮

升麻

忌火

白扁豆殼

淨炒

大半夏

好醋煮透

黑玉金

忌火

川棟肉

各叁兩

柴胡

製香附

荆芥穗

葛根

北細辛

元胡索

乳香去油

沒藥

去油

紫降香

獨活

川厚樸

去皮薑汁炒  
各貳兩

廣木香

壹兩伍錢  
忌火

南滑石

陸兩

其藥二十六味均為細末神麩打和為丸如桐

子大以辰砂為衣每服三錢葱湯下開水送下

亦可心腹痛陰陽水服效如神孕婦忌

治瘧神效膏藥

常山

肆兩

獨活

甘草

各別錢

羌活

秦艽

中生地

天麻

防風

白芷

川烏

川芎各壹兩 陸錢 共藥十一味用大蘇油五觔浸三晝

夜與油同煎去渣另入淘淨緯丹二觔攪勻收至

滴水成珠為度貯瓦鉢冷水隔器養之用時開水

燉化以藍布攤作膏藥約一寸五分見方於瘡發

四五次後先一時貼天庭穴當日即止聽其自落

勿揭

雙單日瘡疾方

番木鱉壹兩炒至黑色 雄黃 硃砂 甘草各壹錢  
無殼者為真

右藥共為細末每服四分用酒開水各半調服

須要預先飲食喫飽臨發早一時服蓋被而卧

三陰瘧疾

名拔山頂方

製白砒

壹兩

雄黃

叁兩

乾麵

柒兩

共研細末白水為丸須均勻作三百三十三粒

同炒黃色每服一粒  
水送下小兒減半服後

忌酒肉三日

製砒法用白泥罐一個將砒裝入罐內用鹽泥

糊口再用針針破一眼再將炭火圍燒罐外看

針眼內黑烟盡為度取出共研

製砒時人立下  
風避其烟毒

截瘧方

用綠礬少許糝棉花上紮緊男左女右塞鼻內即

愈

白雪丹 專治瘧疾

真川貝

陸兩 去心研

生半夏

肆兩研

五月五日午時合和在銅鍋內微火炒嫩黃色

冷後入磁器收貯勿洩氣每服一分五厘生薑

汁二三匙調藥隔水燉熟未來時先服一服即

愈重者再服一服愈後忌食南瓜雞蛋芋芴及



解蟻蟻

斬鬼丹

治瘧神效

硃砂

肆錢 水飛

真菘豆粉

肆錢

雄精

壹錢 水飛

人言

壹錢 即製白砒

共為細末端陽日午時合粽尖為丸小菘豆大

每服三丸小兒一丸臨發時并花水送下

痢疾方

蒼朮

叁兩米泔水 浸陳土炒焦

杏仁

貳兩去 皮尖油

川烏

壹兩伍錢去 皮麵包煨透

羌活

貳兩 炒

生軍

壹兩 炒

製軍

壹兩 炒

生甘草

壹兩伍錢 炒

其為細末每服四分小兒減半孕婦忌服

赤痢用燈草三十寸煎湯調服白痢生薑三片

煎湯調服赤白痢燈草薑各半煎服

紅白痢方

苦參

陸錢

木香

肆錢

甘草

伍錢

右為末飯搗和丸每服一錢紅者甘草湯下紅

白兼者米飲湯下噤口者砂仁蓮肉湯下白痢

薑湯下如水瀉猪苓澤瀉煎湯下

白痢方

橘餅 壹個 切碎

白糖 叁錢

黃糖 叁錢

生薑 伍錢

普餌茶 壹兩

煎湯代茶徐服

久病經驗良方

用臭椿樹在土內之東引向陽根刮去粗皮取白皮四兩炒研細末用糯米一升炒磨細粉加紅糖調服甚效

風濕氣痺門

丹溪定痛丸 治諸風濕

乳香 木鱉子 地龍 去土

沒藥 金星草 五靈脂

右各等分爲細末煉蜜爲丸如彈子大每服一

丸温酒磨化服或作小丸温酒送下亦可

四妙散 治歷節痛風走注

葳靈仙 伍錢 酒浸 蒼耳 壹錢 伍分 羊角灰 白芥子 各貳錢

右爲末每服一錢生薑汁入白滾湯調下

風濕中瘋藥酒方

白花蛇

防己

赤芍

杜仲

杞子

老鶴草

葶藶草

千年健

葳靈仙

桑枝

川牛膝

懷牛膝

檳榔

秦艽

茄根

松節

川芎

木瓜

虎骨

以上各貳錢

紅花

壹錢伍分

桂枝

壹錢伍分

米仁

伍錢

全當歸

叁錢

右藥用陳福酒五觔浸半月可服服完如未愈

再加陳福酒三觔再浸再服如再未愈透將所

浸之藥曬乾為末泛丸再服無不全愈

痛風藥酒

風茄花

壹兩伍錢  
鮮者

紅棗子

貳拾肆個

蒼耳子

壹撮

馬料豆

壹撮

用滴花燒酒一觔隔水煮三炷香每服只可飲

小杯內半杯不可多服

肝胃氣熨方

治肝胃氣及胃腕腹中脹痛甚則吐逆

食鹽炒熱用布包之頻熨痛處

閃挫腰痛

真橙子核

壹錢伍分

製香附

壹錢

炒研為末温酒下

疝氣神方

治疝甚至氣迫上冲如有物築心臟欲死手足俱

冷宜進三服取效

硫黃

火中溶化即投水中去毒研細

荔枝核

炒焦黃為末

陳皮

各等分

右末飯搗為丸梧桐子大每服十五丸其痛立

止痛甚者加至二十九丸再不可多進所謂其進

銳者其退速

蟠葱散

治脾胃虛寒氣滯不行攻刺心腹連脇作痛及小

腸膀胱疝氣婦人血氣攻痛等症

丁皮 壹兩 砂仁 壹兩

莪朮 壹兩

檳榔 壹兩

三稜 壹兩

玄胡 柒錢

蒼朮 貳兩

青皮 壹兩

乾薑 伍錢

肉桂 伍錢

茯苓 壹兩

甘草 壹兩

右藥以十分之一切作一劑先以生薑五分棗

子一枚葱白五枚水煎滾入藥再熬濃熱服如

臍下極冷加吳茱萸木香小茴香各五分尤佳

四聖散 治疝氣外腎腫脹



小茴香 穿山甲炙 全蠍炒 南木香 各等分

右為末每服二錢酒調下一服痛止

三味散 治外腎大如斗

小茴香 青皮 荔枝核 各等分

右炒為末每服二錢用酒調下

椒艾囊

治腳氣冷痺兩足刺痛如針不能任地行走者神

效

蜀椒 壹升 蘄艾 壹升

法以粗布袋盛此二味於袋中置熱腳爐上烘  
熱病者赤腳踏在袋上得此椒艾辛香熱性以  
治寒濕溫筋舒絡勝于服藥

### 肝胃氣方

沉水香末

母丁香末

各叁錢

當門子末

壹分伍厘

五靈脂

水飛去砂漂淨曬乾壹兩再用好醋調勻

巴豆白仁

去膜去仁內之仁然後去油務淨如霜之白叁錢

右藥半月之前依法先為製備俟端午日午時  
用好醋和藥搗勻為丸如棗豆大曬乾勿經火

烘磁瓶收貯遇強壯者服五丸弱者三丸男病者置藥左手掌心中女病者置藥右手掌心中俱令以舌舐一丸入口含化嚥下再舐一丸如是服完之後卽飲熱燒酒一口不可多喫卽愈兼能治霍亂

鼓脹噎膈

脹滿論症

脹與滿不同脹者脹於皮膚之間非臟腑腸胃之內滿者滿在腸胃之內如飽滿一般脹多屬虛而滿則有虛實之別

實者屬熱中氣鬱滯不行也若大便結小便赤口乾體壯者宜下之

如虛者則吐食或食不下大小便清利以指按之陷者爲虛或朝寬而暮急或朝急而暮寬皆屬氣

虛治宜溫補

婦人滿脹兼血積者多治宜行血又若男婦四肢節痛而兼腫者則屬風濕又有週身四肢皆腫乃表病也有先脹滿而後腫者可治若先腫而後脹滿者難治男從腳下腫而上女從頭面腫而下爲順可治反此則難治也

四肢安而腹獨脹者爲鼓脹其治之法須審其氣鼓水鼓濕鼓食鼓之不同大抵氣與水者居多將手指按病人腹上有窩者可治脈壯者易治若脈

細臍腫突出者陰囊無縫者肚上青筋見瀉後腹  
腫者皆不治

脹滿實症 方二

土鱉

即接骨蟲

瓦上焙燥每用一二個以沉香一錢磨

水調服甚效

又方

皮硝入雞腹中煮食善能消痞除脹滿

見王漁洋集

腹脹如鼓

大田螺一個鹽半匕和殼生搗如泥置臍下一寸

參分用濶布緊繫之便洩一通其病立愈

水腫鼓脹方 兼治肚腹膨脹實症

沉香 壹兩 牙皂 壹兩 木香 叁錢 檳榔 貳兩

共為細末燒酒為丸每服三錢五更時溫酒送

下不飲酒者滾湯送下

水腫水鼓從小便出氣鼓頻得矢氣從大便出

若水腫甚者用葶藶三錢酒煎送下七日見效

顧雨田鼓脹方

西瓜 壹個 大蒜 病人年紀若干歲 即用蒜若干囊

以西瓜一個切去蓋將大蒜照年紀用若干囊  
插種在西瓜肉內仍將切下瓜蓋用竹釘插牢  
入甕內以糠火四面圍煨一晝夜取出去瓜但  
食蒜卽愈愈後食淡百日不再發

蘅受業於沈明山夫子夫子受業於顧雨田太  
夫子常見用此方神效無比

腹脹及四肢發腫

乾雞屎半觔酒一斗浸七日日飲三杯或炒燥爲  
末酒下二錢卽效按此方卽黃帝素問雞屎醴法



也治鼓脹所謂一劑知二劑已也勿忽視之

噎食倒食

見簷曝雜記

用真柿霜拌秫米蒸飯上食之八日不飲滴水效

五噎散

治五噎食不下嘔吐痰涎咽喉噎塞胸膈滿痛

人參

桔梗

葦澄茄

枇杷葉

乾生薑

木香

白豆蔻

杵頭糠

甘草

沉香

不見火

白朮

半夏

泡七次

以上各一錢

右切一劑水二鍾薑七片煎至一鍾食後服

韭汁牛乳飲

噎膈日久不愈用韭汁貳兩牛乳壹盞生薑伍錢鮮竹取汁

瀝半盞童便壹盞和勻溫服效

啟膈散 通噎膈開關之劑屢效

北沙參 叁錢 杵頭糠 伍分 荷葉蒂 貳個 丹參 叁錢

川貝母 壹錢 砂仁殼 肆分 茯苓 壹錢 鬱金 伍分

石入味水煎服加法列後

虛者加人參 前症若兼蟲積加胡連蕪荑

若兼血積加桃仁紅花或另以生韭汁飲之

若兼痰積加廣橘紅 若兼食積加葛子麥芽

山查

河間雄黃散

雄黃

瓜蒂

赤小豆

各壹錢

共爲細末每服五分溫水調滴入狗涎四匙服  
下以吐爲度吐去膈間小蟲然後調養正氣

潤腸膏

治噎膈大便燥結食進良久復出及朝食暮吐暮  
食朝吐者其效甚捷

威靈仙

肆兩搗汁四五月間取  
開花者佳方可取汁用

生薑

肆兩搗汁

真麻油

貳兩

白蜂蜜

肆兩煎滾掠去面沫

右四味同入銀石器中攪勻文火煎候如膏時

時用筋挑一匙食之一料不效宜再進一料未

有不效者也

按威靈仙如無鮮者之時即將乾者水浸一宿

絞汁用亦可

膈氣初起方

方二

以鮮佛手露和開水頻飲數日必效半月而愈

又方取黃牛涎唾拌入炒米粉內勿令病人知與  
 食下咽亦效 又方以酒燉熱然後殺鵝血冲入  
 飲之亦即愈

對奴靈山收無雜音之胡唱辨辨音木身一

音不焚音出

胡唱辨辨一然食去一林不效在再蓋一林未

亦四和同大幾可器中註巨文火加刻收膏

黃和部

友和 白和 靈

其兩煎刻法去面

對靈山

其兩煎刻法去面

其兩煎刻法去面

內科雜病 此藥中散熱白濁等症

玉壺丸 治消渴引飲無度

人參 瓜蒌根 各等分

右為末煉蜜丸梧桐子大每服三十九丸麥門冬

湯送下

絳雪散 治消渴飲水無度小便數者大有神效

黃芩 黃丹 漢防己 瓜蒌根 各等分

右為末每服二錢溫水調下臨卧並進三服即

止

繅絲湯 治三消渴飲如神

蠶繭繅絲湯大能瀉膀胱中伏火引陰水土潮於

口而不渴也如無繅絲湯用原蠶繭殼綿子煮湯

服亦可代之時時進飲取效

約精丸 治小便中洩精不止

白龍骨

貳兩 研細

新韭子

冬霜後採壹觔酒浸一宿次日曬乾搗細

人右末酒調糯米為丸桐子大每服三十丸空心

鹽湯下

白龍丸 治腎損虛勞夢中遺精白濁滑洩盜汗等

症不惟療遺精之疾且能壯陽固精

鹿角霜 貳兩

龍骨 壹兩 生用

牡蠣 貳兩 煨

右末酒打麵糊為丸梧桐子大每服三十丸鹽

湯送下

遠志丸 治赤濁如神

遠志 捌兩 去心

茯神

益智仁 各貳兩

右為末酒搗糊為丸梧桐子大每服五十丸空

心棗湯送下

白濁方 色白如泔漿濁在溺後不痛者濕熱所致



五爪龍藤

連根壹兩

土茯苓

杜牛膝

各捌錢

生白酒三

碗煎至一碗空心服三次愈并治下疳如神

又方用黃柏末猪脊筋

去衣

同搗和為丸如桐子大

早晚各服三十丸開水送下

赤白濁方

木通

伍錢

滑石

伍錢

甘草梢

貳錢

蔓荊子

壹錢

右四味水煎空心服

血淋痛不可忍方三

側柏葉

藕節

車前子

滑石

各叁錢

生草梢伍分 硃砂少許 煎濃温服即效

又方

旱蓮草 車前草 同取汁 每服一鍾 立效

髮灰貳錢 藕節湯調服 三次愈

砂石淋

石首魚腦骨伍對 滑石伍錢 俱研細末分作兩服

木通煎湯調下以好為度

膏淋

海金沙 飛滑石各壹兩 瞿麥 杏仁各叁錢

甘草梢貳錢右爲末每服二錢麥冬通草煎湯調服

立效散 治下焦結熱小便淋秘痛而尿血

甘草伍錢瞿麥壹兩山梔仁伍錢

右爲末每服五錢薑葱燈心煎湯調下

小便不通

蘇骨壹兩濃煎湯服之即通

一切秘結方二

生蜜一大杯滾水一碗調元明粉三錢温服即通

快不損脾胃

大小便五七日不通者

牙皂莢取不蛀者燒灰米飲調下二三錢卽通

老年便閉

松子仁去衣每日常服之勿間斷永無便閉之患

老年遺尿不知方二

薔薇根搗爛絞汁溫酒沖服

桑螵蛸不拘多少酒炒爲末薑湯調服二錢

腎虛遺溺

益智仁

肆拾玖粒

白茯苓

去皮貳錢

水二鍾煎八分入鹽一撮空心温服

縮泉丸 治腭氣不足小便頻數一日夜百餘次

益智仁 天台烏藥 大如臂者佳

右等分爲末酒煮山藥搗和爲丸如梧桐子大  
每服五六十丸臨卧用鹽湯送下

五更洩瀉 老年人

老黃米 叁合 炒 建蓮肉 貳錢 去心 木香 壹錢 煨 白朮 貳錢 炒

淡乾薑 貳錢 赤沙糖 壹兩

共爲末每服三錢空心開水送下

老年呃症

用燈心取噴嚏立愈

七巧湯 濕痰乘邪入胃既久邪去而胃虛氣上生

呃致兀兀不已

大棗

叁枚去核

桂圓

叁枚去殼核

甜杏仁

柒粒去皮尖

荔枝肉

叁枚

甜桔梗

叁片蜜餞店買

粳米

肆拾玖粒

淡薑渣叁分水煎服

陽虛冷呃

人參

丁香

柿蒂

乾薑

右四味煎服立愈

肺胃熱呃

枇杷葉 去毛 刀豆子 切片 各三錢煎服立止

三聖丹 治嘈雜神效

白朮 肆兩 黃連 伍錢 橘紅 壹兩

右為末神麩搗糊為丸梧桐子大每服五十丸

薑湯下

雄黃酒 治欬逆藥不能取效者用此法尤捷

雄黃一錢酒一盞煎七分即將煎藥罐急令患人

嗅其熱氣十數次欬逆之患即止神效

嗅法神方

乳香

硫黃

右二味各等分搗末用酒半壺入藥壺中文火

煮滾三次待壺中藥氣上升急令患人以兩鼻

嗅之使藥氣入鼻欬逆卽止不過三次全安

養元藕粉 治年老人健脾養胃日常服之極效

白蓮藕粉

建蓮肉去心

白茯苓 白蜜

白扁豆

炒

川貝母去心

懷山藥

右七味各等分共研磨爲細末用人乳拌成一

塊每用一兩開水沖服



聰明豆

破故紙

陸兩

杜仲

陸兩

兔絲子

陸兩

製首烏

陸兩

戎鹽

參兩

小茴香

參兩

右六味量用水煎汁煮馬料豆一斗煮透收乾

藥汁渣再煎汁去渣煮豆收盡藥汁曬乾收貯

每服叁錢淡鹽湯送下或乾嚼亦可老年人最

宜常服

黃疸病方

方

黃疸者多起於飲食勞倦脾土不能運

化濕熱內鬱所致通身面目悉黃如金

白朮 猪苓 澤瀉 茵陳 各壹兩 茯苓 壹兩伍錢

右為末白湯調下五錢日三服多飲

又方用生南瓜蒂研爛絹包塞鼻孔男左女右又須令病者以布圍其兩肩待黃水流盡即愈或以乾南瓜蒂炙灰為末以鼻嗅之黃水流盡亦愈

又方掘取鮮枸杞根上皮 即鮮地骨皮 洗去泥打爛絞汁

去渣臨卧以開水冲服每服一酒杯二三次即愈

冬日以生白酒冲服尤捷

又方以土牛膝四兩生白酒三碗煎六七沸空心連

服三日除根

凡患疽症者宜多喫葶薺不拘生熟自效

食積黃疽

老絲瓜連子燒存性爲末每服二錢因麵得病者  
麵湯下因酒得病者淡酒下連進數服卽愈

女勞疽

大勞大熱之後或房勞之後爲水濕所搏以致日  
晡發熱畏寒膀胱急少腹滿目黃額上黑腹脹如  
水大便黑色時溏故云黑疽

白朮

茯苓

白芍

黃耆

炙

白扁豆

炒各貳錢

甘草

炙壹錢

右六味加生薑五片棗二枚水煎服以好為度

黃汗 身體俱腫汗出不渴其汗能染衣如栢汁此

由脾胃有熱汗出為風所閉熱結於中之病也

生黃耆

赤芍

茵陳

各貳兩

石膏

肆兩

麥冬

去心

豆豉

各壹兩

甘草

炙伍錢

俱為末每服五錢淡薑湯調食遠服

熊膽散 治脫肛氣熱者神效痔瘡同法

熊膽 伍分

孩兒茶 貳分

冰片 壹分

右爲末用人乳調點患處熱汁自下而肛收矣

雙補湯 主治氣虛脫肛

人參 捌分

黃耆 捌分

當歸 捌分

川芎 捌分

升麻 伍分

右切一劑煎服

血虛加白芍熟地 血熱加黃柏 虛寒者加

炮乾薑外用五倍子末托而上之

二靈散 治久痢腸胃俱虛肛門自下

龍骨 煨伍錢

木賊草 燒存性貳錢伍分

右爲末糝肛自斂

海上方 治腸風下血痔漏脫肛

絲瓜根

已經霜一二次收之洗淨置露中十宿懸風處陰乾待用

右切每用五錢煎臨熟加入香油少許空心温

服一日一服神效 忌食雞燒酒

槐黃丸 治腸風臟毒便血痔漏下血神效

黃連

炒肆兩

槐花

炒肆兩

右爲末裝入猪大腸內長一尺兩頭紮住用韭

菜二觔同煮爛去菜用腸藥搗末爲丸梧桐子

大每服八十丸空心米湯下若嫌太濕加麵同

丸亦妙

乾柿散 治腸風臟毒腸澼下血

乾柿不拘多少焙乾燒存性爲末每用二錢米飲

湯下

金蓮酒

治大便下血如流水不止黃連五錢金華酒煎服

尋常轉筋 方三

不因霍亂而發者四時皆有因血虛而轉者多以

大蒜搗爛塗足心卽止

有筋動於足大指至腰而住者乃奉養過厚因風

寒濕而作者 葳靈仙一兩嘗酒每日服二杯濕

去自止

睡中伸欠而轉筋者男子以手挽其陰女子以手

牽其乳近兩邊卽止

### 陰症神方

芥菜子 柒錢

乾薑 叁錢

右爲末水調作一餅貼臍上手帕縛住置鹽其



上用火熨斗不離熨之汗出爲度又持病人陰  
莖直上扯至腹上盡頭處用艾炷灸七壯卽效

沉香散 治寒滯腹痛兼治穢濁痧氣

沉香 壹錢

烏藥 貳錢

廣木香 壹錢

降香 貳錢

細辛 伍錢

川鬱金 壹錢

右藥忌見火生研爲末每服三分砂仁冷湯送  
下

治腋氣

熱蒸餅一枚劈作兩片糝蜜陀僧末一錢許急挾

之腋下少睡片時俟冷棄之

足疾方

葳靈仙

牛膝

各等分

右二味共爲細末蜜丸空

心服或酒或滾水送下

東坡云此方有奇驗凡腫痛拘攣皆可愈久服有  
走及奔馬之效獨忌茶如犯之不復有效當收槐  
芽皂角芽之極嫩者如造茶法貯之以代茗飲此  
腋氣足疾二方見王漁洋分甘餘話

筋寒濕氣末藥

虎骨 壹兩 酥炙

紅花 叁錢

桂枝 壹錢

赤芍 貳錢

羌活 壹錢 伍分

桑白皮 壹兩

陳皮 壹錢 伍分

山查 叁錢

秦艽 壹錢 伍分

白蒺藜 叁錢

當歸 叁錢

蒼朮 柒錢

獨活 壹錢 伍分

厚樸 貳錢 薑汁炒

杜仲 叁錢 薑汁炒去絲

右磨細末收貯磁瓶每服五錢午時後陳酒送

下

箭風丹

狗骨 叁錢 煨研

山梔 柒個 研

飛麴 壹兩

陳糟 壹兩

右研和醋調敷

玉蟾利風丹 治遍身風濕筋骨疼痛

寒水石 壹兩 煨

麻黃 肆兩 去節炒

全蠍 伍錢 水洗焙

乳香 伍錢 去油

白芷 伍錢

甘草 伍錢

川芎 伍錢

當歸 伍錢

嬰粟殼 滾水泡去筋 淨末陸兩

開羊花 火酒拌曬 乾肆兩

草烏 伍錢 黑豆同煮去豆曬乾

自然銅 伍錢 煨壹兩

右為細末收貯勿洩氣每用量人虛實用陳酒送下三分或四分五分為率取汗避風三服必愈或用陳米糊搗為錠分數同上磨服亦可

風癩總論

癩病有五多屬痰迷心竅故一時病作或類猪羊  
六畜之聲者皆應乎臟腑之所屬亦有得之大驚  
恐者

癩病神方

牙皂

肆兩

蜜陀僧

壹兩

為末蜜丸硃砂為衣每服

三錢滾水下終身忌食一切諸血

心風痰迷顛癩

甘遂

貳錢

為末取猪心血和勻入心內紙裏煨熟

為末入硃砂一錢分作四丸每服一丸猪心煎湯

送下以瀉下惡物為效不瀉再服並治婦女心風

血邪

猪羊顛癩方

苦參 貳拾兩

川鬱金 捌兩

木香 肆兩

茶葉 貳拾兩

白明礬 捌兩

薄荷 壹兩

右藥共為細末水泛為丸硃砂為衣每晨茶湯

送下五錢須服兩料必愈

暗風癩症 治痰涎暈剛欲絕者

芭蕉油飲之得吐即愈取油如取漆法削竹筒插

蕉樹上其油自下流入竹筒

失心瘋症方二

開羊花根

竹刀掘取勿犯鉄器去梗用皮伍錢木杵搗碎

金首飾

重五七錢者

珍珠

伍分豆腐煮數滾布包槌碎同燈心碾末

將前二味用水二碗煎

八分投珍珠末服之服後吐痰即愈

狂邪發作無時披頭大叫不避水火惟苦參一味

為末蜜丸桐子大薄荷湯服

治鴉片煙癮方二

南瓜正開花時連葉與根藤一併取下用水洗淨

于石臼中合共搗之取汁常服不數日夙癰盡去  
若甫經結瓜者連瓜搗之亦可用  
見林少穆先生奏章內錄出

又方

生黃耆 壹兩  
生黨參 壹兩  
生甘草 壹兩  
鶴虱 壹兩

大麥芽 壹兩  
化橘紅 壹兩  
杜仲 陸錢  
炒

右藥煮汁去渣濾清加桂圓肉二兩另煮汁去

皮老薑二兩打汁共入藥再熬濃厚然後入黑

砂糖二筋煙灰二錢收膏磁碗收貯每日癰前

服一大匙開水冲服



即一大通開水車服

新論一頭熱方二燈外膏燭燄外視每日錄前

文符膏三兩北十共入藥再蒸燂思燂燂入黑

膏藥膏丹大藥藥藥藥藥藥藥藥藥藥藥藥藥

大藥藥 藥藥 藥藥 藥藥 藥藥 藥藥 藥藥 藥藥 藥藥 藥藥

大藥藥 藥藥 藥藥 藥藥 藥藥 藥藥 藥藥 藥藥 藥藥 藥藥

大藥藥 藥藥 藥藥 藥藥 藥藥 藥藥 藥藥 藥藥 藥藥 藥藥

大藥藥 藥藥 藥藥 藥藥 藥藥 藥藥 藥藥 藥藥 藥藥 藥藥

大藥藥 藥藥 藥藥 藥藥 藥藥 藥藥 藥藥 藥藥 藥藥 藥藥

癰疽疔毒門

背疽灸法

初起之時不拘日期陰陽腫痛卽用獨頭大蒜切片如二三錢之厚安於瘡頭上用大炷艾丸灸之每灸三炷一換蒜片不論數十百壯大痛者灸至不痛麻木不痛者灸至痛時方止最宜早覺早灸過七日則無效

如背疽赤熱腫痛莫辨其頭者但以濕紙覆於背上立候視之其紙上有先乾處卽是瘡頭如十數

頭作一處生者卽用大蒜搗成膏作餅鋪頭上聚艾於蒜餅上燒之亦能活也蓋艾火能使毒氣隨火而散灸後卽宜多服托裏護心丸

凡毒初起皆可灸惟頭頂以上屬陽明斷不可灸托裏護心丸 凡癰疽毒症多進數服已成者最能止痛未破者卽能內消不論陰陽老少皆可服神效仙方也

白明礬

壹兩 貳錢

黃蠟

壹兩

雄黃

壹兩 貳錢

硃砂

陸錢 水飛

琥珀

壹錢

右藥俱爲細末先將黃蠟化開入藥末和勻須  
艾衆手爲丸桐子大每服三十九丸白滾水下日三  
服可免口舌生瘡黑爛等症

一切癰疽發背對口 不論陰陽平腫無名腫毒皆

治

大蝦蟇

壹個毒大者貳叁個生於住屋簷下者  
住冬天在亂石下或河沿口石縫中

入

明礬二三錢連腸肚同搗爛厚塗四圍中留一孔  
毒重者一二時後卽臭再取搗換以好爲度至重  
昏沉不知疼痛者更換十餘次再無不效是能收

提散毒至穩妙方也

發背腫硬痛深

槐米五兩鮮者更佳炒微黃乘熱入酒二碗煎十餘沸

去渣熱服取汗即愈未成者二三服即消已成者

三四服即減輕渣搗敷患處神效惟胃寒者不宜

連服

陰疽平塌色黯

艾葉壹劬 硫黃 雄黃各伍錢

以水同煮半日搗爛候温敷上冷則再煮易十

餘次不痛者知痛如痛在肉裏者須腫痛出外  
可生

再以豬膽汁炒紫色研末醋調塗四圍中留一  
孔三五次即效

七厘散 治一切無名惡毒諸藥不效者

赤練蛇燒灰存性研細末米糊爲丸如芥菜子大  
每服七粒症重者加至十四粒好酒下四五服全  
消此方甚效 孕婦忌服

腸癰 小腹堅硬如掌而熱按之則痛肉色如故或

煖赤微腫小便如淋汗出憎寒脉氣緊實者

白明礬

肆兩

肥皂

拾伍個  
煨存性

雄黃

壹兩

大黃

壹兩酒  
拌蒸

共為末和勻每服三錢酒煎金銀花五錢下有

膿從大便中出無膿暗消不泄再服

若腹肚脹大轉側聞有水聲或繞臍生瘡或膿

從臍出或大便下膿血黑色者皆惡症不易治

如膿出收口白木耳淡煮猪大腸食之即效

肺癰

方二

魚腥草水煮不住口食之神效

又方以魚腥草三兩搗爛加陳紹酒兩中碗煎一碗

服之立愈

肛癰生瘡 不論年近年遠

黃牛牙齒

壹個

炙灰冷透研細以好福珍酒冲服

量高者不妨多飲如久年生管者服三次立愈

但水

牛牙切不可用慎之慎之

乳癰 紅腫發熱疼痛者是癰堅硬腐爛者是疽

大瓜萸

壹個打碎

當歸

伍錢

甘草

伍錢

沒藥

去油壹錢研末冲服

乳香

去油壹錢研末冲服



以上三味水酒各一碗煎一鍾去渣濾清調入  
乳香沒藥服

乳巖 此病先因乳中一粒大如豆漸漸大如雞蛋  
七八年後方破則不可治矣宜急服此藥

生蠟殼砂鍋內焙焦爲末每服二錢酒調下日日  
服之不可間斷

又方用大瓜萁一個半生半炒酒三鍾煎至一鍾食

後服

婦女乳患方四

乳上生癰在陰分者名乳巖肝鬱所致厥陰病也

因循日久不治之症初起之時卽以鮮蒲公英搗

汁陳紹酒或福珍酒冲服立愈

如無鮮者取根搗汁亦可

又方用橘核

壹兩

炙灰均三次服陳酒送下

又方用大瓜萋

壹個

薄荷

肆分

桔梗

伍分

木通

肆分

製半夏

叁分

花粉

叁分

生甘節

叁分

以水三杯煎

至一杯右痛側右睡左痛側左睡

又方外用鮮芙蓉花搗爛敷上泡起卽消如乾花瓣

用雞子清醋調敷

對口瘡

方三

大鯽魚一尾入磁鉢內搗爛入頭垢二三兩拌勻厚敷上中留一孔外以紙貼之一二日卽愈

又方用芭蕉根四兩洗淨搗爛熱酒沖服渣敷患處又方用鮮橄欖核數枚瓦上炙存性研極細末以生桐油調勻用雞毛蘸刷對口四圍露出頭勿令藥乾乾則再敷此症初起敷之卽散

茄腳首烏湯

治對口

鮮茄蒂

柒個

鮮首烏

伍錢

水煎服一服出膿二服

卽歛三服立愈或水酒各一碗煎服亦可

七寶丹 專治搭手發背歷有效驗

牛黃 壹分 淘丹 叁錢 銅綠 叁錢 陳石灰 壹兩

以上共研細末用雞子清香油調勻再用壞黑

油傘上黑紙縫成口袋納藥於中用線縫扁對

患處一面用針戳成小眼以線繫掛患處輕者

一袋可愈重者兩袋卽愈

無名腫毒 方三

山慈姑

金燈花根也九月開花朱色與葉不相見故又名無義草

水磨塗可消

或用生大黃磨濃塗效或用瓦花搗爛加鹽少許

塗亦效

又方用生肥皂去子及莖與筋搗爛好醋和塗即愈

不愈再敷神效

長者為皂莢  
短者為肥皂

專治一切無名腫毒

初起貧人僻地倉卒無藥用此最便毋忽視之

又方用雄鯽魚

壹個  
圖全用

鮮山藥

與鯽魚  
同重

兩樣搗爛如

泥始起者塗滿可消已成者塗於四邊當中留一

孔可輕併可治小兒四灣痘毒生在節骸之間恐

其有損手足即將此藥敷在一面使毒移脫骸所

不可四週圍敷滿則其毒不能移動矣

肚內無名腫毒

腹內生瘡在腸胃不可醫治者取皂角刺不拘多

少酒一碗煎至七分溫服其膿血俱從大便中出

定痛方方一切腫毒發背痛不可忍服之即止

白芷

未潰伍錢已潰貳錢伍分

貝母

未潰貳錢伍分已潰伍錢

水酒各半煎

濃服外用壁虎

壹貳個

焙乾為末香油調搽立止

平陷不高痛甚者用赤練蛇火煨存性研末

不犯鐵器

加薑黃藤黃各研細和勻米醋調敷即能止痛

替針散 一切腫毒不出頭不穿破者

蛾口繭

出過蠶蛾者  
壹枚燒灰

酒調服自出頭切不可多服

若服二三服即出二三頭

如痒腫無頭用皂角刺燒灰酒下三錢嚼黃蜀葵

花子三五粒即穿

透骨丹 治一切癰疽腫毒堅硬不潰此藥立能潰

膿

蟾酥

硼砂

輕粉

巴豆

各伍錢

蝸牛

貳個

麝香

壹分

先將巴豆研如泥次入蝸牛麝香再研後入各

藥研極細以磁瓶收藏每用少許以乳汁化開  
先用銀針輕輕撥破挑藥米粒許納於瘡口外  
用清涼膏貼之卽潰

凡瘡未破先濕熱膿水淋漓不得卧者用菖蒲  
曬乾爲末塗之鮮用亦可

透膿散 一切癰疽腫毒內膿已成不穿破者

生黃芪 肆錢

川芎 各貳錢

穿山甲 炙

皂角刺 各壹錢

水二碗煎一碗入酒一杯同服卽能出毒



八將擒王散

蜈蚣 去頭足

川山甲 土炒

全蝎 黃酒泡洗淨  
鹽土曬乾

蟬蛻 去頭足炒以  
上各肆錢

殭蠶 炒

蛇蛻 各貳錢  
炒

生五倍子 壹兩另研  
極細末

麝香 壹錢

雄黃 水飛淨  
伍錢

以上共研極細末和勻入磁瓶收貯黃蠟封口

用時取少許置膏藥上如上升藥法自初起至

收口俱可用如已成管以紙搓成條子照瘡深

淺蘸藥插入外用膏藥封貼修合須擇天醫成

日忌婦女雞犬見此藥惟疔毒切忌不可用

六仙昇丹

水銀 叁兩

焰硝 叁兩

明礬 伍兩

東丹 肆兩

輕粉 陸錢

綠礬 即皂礬壹兩伍錢

以上俱研細與水銀拌勻入鉄鍋內用厚磁碗覆之鹽泥封碗口曬乾不令些微透氣用石一塊壓之文武火燒三炷香常看泥乾有縫卽以濕鹽泥補之忌孝服月婦雞犬見候冷昇在碗上者取下收貯凡昇就一年後用入瘡不痛

陽和解凝膏

先用香油拾觔入鮮鮮大力子根葉梗全用三觔  
活白鳳仙梗四兩同煎煎枯去渣次日將後藥傾  
入再煎

當歸 肉桂 附子 桂枝 大黃 官桂

川烏 草烏 地龍 殭蠶 赤芍 白芷

白欵 白芨 以上各貳兩 川芎 肆兩

防風 荆芥 木香 陳皮 香櫟 續斷

五靈脂 各壹兩

俟藥煎枯瀘去渣隔一宿油冷見過觔兩每油

一觔加入炒透洵丹七兩攪和以文火慢熬熬  
至滴水成珠不粘指爲度卽以濕粗草紙罨火  
將油鍋移放冷竈上取乳香沒藥末各二兩蘇  
合油四兩麝香研細一兩人膏內攪和半月後  
卽可攤貼一應腐爛陰疽凍瘡貼一夜全消潰  
者三張全愈如瘰疾貼背心亦效

### 黎洞丸

西牛黃

梅片腦

麝香

各貳錢  
伍分

阿魏

壹兩

乳香去油

生大黃

天竺黃

沒藥

血竭

兒茶

參三七

藤黃

以上各貳兩此藤黃隔水煮十數次去沫用子

羊血拌曬如有真山羊血加伍錢不須用子羊血矣

雄黃 壹兩

以上十三味各為極細末合時將藤黃化開和

勻各藥為丸如乾量加煉蜜丸如芡實大每重

一錢外用蠟殼封固凡服此藥忌食冷水及水

果發物凡外敷此藥俱用黃酒調塗四圍中空

瘡頭

一無名腫毒昏困欲死癰疽發背瘰癧瘡疔蛇蝎

蜂螫蜈蚣瘋犬惡獸咬傷俱用黃酒化服調敷

一跌打損傷瘀血奔心昏暈不醒黃酒童便化服

外用黃酒調敷

一時行癩疫山嵐瘴癘用甘草節歸尾湯化服

一血積血瘦血瘀蠱脹黃酒化服

一肺癰甘草節枳殼桔梗湯化服

一腸癰內潰米仁丹皮湯化服

一河魴毒半夏湯化服

一食死馬牛羊肉及中一切飲食之毒黃豆湯化

服

一入傳屍癆病之家預用茶汁調抹少許於耳鼻

孔可免傳染

蠶洞膏 專治無名腫毒

番木鱉

叁拾個磁鋒刮去毛打碎

老鴨膽

壹兩

川黃連

伍錢

川黃蘗

陸錢

雄豬膽

捌個

生大黃

叁錢

五靈脂

壹兩

黃芩

叁錢

真麻油

貳拾兩

右藥熬枯濾去渣再熬至滴水成珠下炒黃丹

十兩黃蠟四兩白蠟三兩攪勻離火下後細藥

兒茶

貳兩

乳香

柒錢 去油

血竭

伍錢

沒藥

柒錢

片腦

貳錢

雄黃

叁錢

藤黃

貳錢

山羊血

貳錢 出於廣西者乃真

大共為極細末入膏內攪和攤貼

西域黃靈膏 治癰疽疔毒癩瘡血風瘡及跌打損

傷刀傷杖夾傷

藤黃末

叁錢

白蠟

陸錢

黃蠟

伍錢

用麻油五兩同二蠟化烊離火入藤黃末攪勻

冷定下冰片一錢再攪勻任用如敷夾杖傷加



銀硃末一錢五分青魚膽末五分

巴豆油膏 專治癰疽發背疔瘡等症

巴豆 叁兩

用麻油煎片時勿令枯再用棉料紙滾

盡外面油以搗盆打自然油用稀布絞出加入輕粉三分拌勻用磁瓶收貯勿令走氣用時看患處大小以油照樣塗抹膏藥上貼之每日換三次

此方石琢堂太史之侍夫人在四川隨任時患疔延醫用此得愈詢其方得之孫真人歸真洞摹本即孫思邈歸真之所土人凡有不治難症

肉具香楮虔求以煤水素紙入洞摹壁拓之虔者  
得之或可治者亦得之否則不應也彼醫之父  
以病發背虔求而得此方太史得其實不肯自秘  
遂傳於世

一筆消

天南星

生半夏

白芨 各壹兩

生大黃

肆兩

梅片腦

壹錢

右為末用雄猪膽汁丸成錠子

神燈照

治發背對口

血竭 雄黃 乳香 各貳錢 麝香 壹錢

右爲末每用四分以捲紙焯紙用二寸濶八寸

長捲成蘘伏油點火在患處旋轉照之點三枝

一回三回卽愈

觀音大士救苦膏 治一切外證併治肝胃氣痛

生大黃 荆三稜 生地黃 木鱉子

川烏 蓬莪茂 以上各壹兩 麻黃

羌活 白芷 大戟 巴豆

肉桂 枳實 黃檗 皂角 以上各捌錢

香附

芫花

桃仁

研

厚樸

栝榔

杏仁

細辛

穿山甲

草烏

獨活

防風

五倍子

元參

全蝎

天花粉

以上各  
柴錢

黃連

蛇蛻

各伍  
錢

甘遂

葶麻子

各貳兩

當歸

壹兩  
伍錢

蜜陀僧

肆兩

黃丹

飛過淨叁拾陸兩

擇吉熬膏先於五日前用麻油六觔浸藥磁器

內然後熬至藥枯去渣濾清入飛過黃丹攪勻

熬成膏忌婦人雞犬見

熬膏既成均作數團浸在清水內水宜常換則

膏不壞臨用時攤貼

疔毒初起

凡疔初起急用針刺中心至痛處出毒血并刺疔

四畔十餘針出惡血即以蟾酥丸一粒研碎摻入

上以拔毒膏蓋之

針刺之後宜用乳香一兩炙去油 象豆粉四兩和勻

每服三錢甘草濃湯下即護心散連下數服可免

毒氣攻心迷悶嘔吐

如針之不痛其人眼黑或見火光若嘔直視譫語  
如醉者皆不治

初起疔毒

不論面目口鼻唇頸四肢前後忽生一炮或紫或  
黃或黑或麻木疔也早發暮死立即用紫鞋底針  
將患處刺孔擠出紫黑惡血擠淨見紅血而止然  
後再醫遲則不救

疔初起將蜘蛛一個放在痛處必定齧住俟蜘蛛  
漸見腹飽取下貯在水中救其命任其自去又將

一個放在痛處又如前取下放去再貼膏藥疔毒

白解

內消疔毒神方 專治五色疔瘡初起或有小白頭

一粒或痒或麻木憎寒發熱及疔毒走黃黑陷昏

憤嘔惡等症

此藥兼治對口腦疽發背癰腫無名大毒屢試屢

驗勝於飛龍奪命丹也

猪牙皂莢

切碎去皮弦子炒研淨末叁錢

真乾蟾酥

切薄片壹兩

當門子麝香

去淨毛叁分

生明礬

叁錢研末

先將蟾酥用滴花燒酒浸軟加入礬皂麝三末  
和勻搗爲丸如棗豆大曬乾收貯每服一丸將  
葱白衣裏藥以好酒送下勢重者每日服二次  
此藥每服止可一丸在極急危之症必其人體  
壯實者服兩丸多服恐致嘔吐慎之慎之

疔生唇口

方二

唇口生疔並連七個頭腫如斗心神昏憤此名七星  
趕月急用蛔蟲搗爛塗之頃刻瘡流黃水腫消  
神清再看大腿灣有紫筋起者急用針刺破以手



擠出惡血無不應效如神而即愈

一法如無蛔蟲取活鬻蛆

數十條即五穀蟲也

白礬三分加

蟾酥少許同搗爛塗疔上亦即疔破瘡流毒水

### 疔毒走黃

生疔人誤食猪肉走黃者急搗芭蕉根汁多服之

### 立效

### 拔疔散

番礪砂

白丁香

輕粉

蜈蚣

各壹錢

全蠍

麝香

各貳錢

金頂砒

陸分

均製爲末取蟾酥一錢燒酒浸化同搗和丸如芥子大宜帶長以便插入疔孔

### 治疔急救方

家菊花葉搗汁一碗

冬間用根

生甘草四錢另煎濃汁

半鐘和入菊汁內服之重者二三次再無不效

如一時無鮮者以茶菊四兩甘草四錢煎濃服之肘後方云生疔垂死者菊汁入口卽活

### 血疔

刺破血出不止用真麻油一鍾服下卽止

魚臍疔

絲瓜葉

連根葱白

韭菜

三味同搗爛取汁

以熱酒和服渣貼腋下病在右手貼右腋左手貼左腋左腳貼左跨右腳貼右跨在中貼心臍用繯縛住候肉下紅線處皆白則散矣須令人抱佳惡其顛倒則難救矣

水疔

蝸牛同菊葉搗爛敷之如無菊葉以野苾麻頭代之

初生白頭痛而兼痒亦帶黑色不在部位不發寒熱者易治

手指羅疔

菊葉搗汁和酒服三次外以蒼耳子內蟲一枚搗敷瘡口上以膏藥蓋之數次效

夏秋取蒼耳子內或梗內蟲以麻油浸入磁瓶內如遇疔瘡腫毒將蟲敷瘡口并沖酒服其效神速也



癰癤諸瘡

按治癰癤之法方雖多莫妙乎蹲鴟丸爲最雖項  
腫大於頰頤首不能迴顧者服一二料可以內消  
頸如舊已列集腋原編其次又莫如灸癰灸穴法  
亦使之內消不令穿潰爲上治也

方見毛楓山先生養生任驗

癰癤灸法方三

初起未破者將麵捏成薄條照癰子大小畧離患  
處作圈圍之留癰子在內再取槐樹根在土內掘  
出者白皮數條放麵圈內皮上用小艾丸於癰子

肘

中心灸之肉上畧覺痛卽拂去艾丸更換白皮灸  
三次麵圈不動照法連灸三日卽消

又法取嫩苳根搗如泥照瘡大小作薄餅每瘡貼  
一個再用艾加入乳香末丸如黃豆大灸苳根餅  
上每日灸三五壯一月全愈

又法不問已成未成已潰未潰取肩尖肘尖骨縫  
交接處各一穴卽肩膊曲池二穴也艾丸各灸七

壯如止病在左灸左在右灸右內服益氣養營湯

數劑再無不效

卽四君子四物湯加黃芪川貝母  
香附陳皮柴胡桔梗甘草水煎服

萬應膏 治癰子筋風痰痰症

鮮鮮大薊 二十觔 畧搗 用豆腐泔水濃煎收成

膏以油紙攤膏貼患處即愈

治癰膏方

雄猪膽約百個取汁去皮入夏枯草三兩鍋內同熬去渣收至滴水成珠加入沉香末三錢砒霜三分和勻收入磁罐內攤貼患處如已破者塗四圍中留頭以好爲度屢效

癰癰腫痛久不瘥



狸頭蹄骨並塗酥炙黃為散每日空心米飲下一

錢外以狸頭燒灰頻敷之已破者更效

珠珀膏 專治頸項癩癧及腋下初結小核漸如連

珠不消不潰或潰而經久不愈或成漏症寒痰冷

症俱屬相宜

真西珀 研壹兩 上桂心 伍錢或加辰砂 水飛淨

香白芷 壹兩 生研 防風 生曬脆研取 當歸 生曬脆研

廣木香 伍錢 生曬 丁香 伍錢二味同研 丁香之油滲

木通 壹兩 生曬脆研 淨末 此味質最堅須加重分

右九味各爲極細末調和一處貯瓶聽用

木鱉子

壹兩去毛切厚片熬黑去渣用油

嫩松香

清水煮四五次晾乾篩細五錢

緯丹

水飛四五次曬乾或焙乾用

拾壹兩

如至冬令祇可用拾兩多則太老

右用芝蔴油三十二觔入銅鍋內用炭火先下

番木鱉子一味熬黑用絲濾渣淨盡再熬不必

過老俟其滴水將欲成珠之際卽下緯丹松香

兩味徐徐挑下隨下隨攪不得停手下完後畧

熬片刻卽離火待鍋內火氣少殺將前九味細

末一人徐徐而下一人隨下隨攪必須攪和旁

用扇煽看其膏將凝厚之象即傾入冷水內撈

起捏成餅子用其冷水須貯瓦器勿用木器

攤膏用小瓦鉢一個以藥餅入內隔水燉烱切

不可經火紙用油涇縣桑皮紙對糊攤貼

硃砂膏 治痰串瘡毒等症

乳香 去油研 壹兩

松香 水煮研 肆兩

草麻仁 搗爛取油 用壹兩

沒藥 去油研 壹兩

樟腦 壹兩研

硃砂 水飛漂 淨捌錢

麝香 叁錢研

冰片 叁錢研

右藥研極細末貯磁器內隔水燉化攪勻成膏

用時攤貼

項內三年癰痰

方二

淘淨緯丹

伍錢

煨石膏

伍錢

右二味研極細末加麻油塗上即能半月收功

又方南京皂莢子輕者半碗重者一飯碗炙灰存性

研細加入黃糖搗和為丸每日開水送服一次四

五十丸服完即愈

癰贅

方三

初生如蓮子大者取蛛絲撚成粗線纏紮其根數

日其絲漸緊瘤根漸細易絲再繞之即落其根  
血瘤已成大者用甘草濃煎膏以筆週圍塗之一  
日上三次又用莞花大戟甘遂各等分爲末醋調  
另以新筆塗甘草圈內勿近甘草頻塗即消  
項下瘤牛蒡子根爲末蜜丸常服即消

天泡瘡 方四

小麥炒黑爲末以生桐油調塗立效

鮮蠶豆莢殼炒黑研末麻油調塗立效

絲瓜葉搗汁塗之立愈

日久作爛疼痛不已濃水淋漓者用石膏火煨輕研

粉各壹兩青黛各叁錢黃柏各叁錢俱研細甘草湯洗淨以

藥糝之其痛立止

### 天蛇頭瘡

生於手指尖初起以猪膽一個入蜈蚣一條焙末

雄黃少許套上指頭立效

### 漆瘡方四

韭菜搗汁入燒酒少許塗之即效 麻油調鐵鏽

末塗之 蟹殼滑石研細末蜜和塗之俱效

畏漆之人口嚼川椒併塗口鼻可免

黃水瘡 方三

石膏

叁錢 火燉

龍骨

叁錢 火燉

松香

叁錢

枯礬

叁錢

共研細用煑熟雞蛋黃熬油和前藥敷上

頭面俱生者蒼朮

炒燥

糯米粉

炒燥

等分研勻糝上即

效久不愈者用真柏油熬稠搽上立效

膿窠瘡 方二

大楓子肉

壹百粒

蛇床子

伍錢

雄黃

貳錢

枯礬

花椒

各叁錢

俱為末燭油猪油

各伍錢

同搗爛鎔化調

搽

生瘡週身至重諸藥不效者用

穿山甲片

炒黃研末

每服一兩好酒調服至三四服後盡行發出連進

七服後即如完體甚效

疥瘡

方一兩酒調服大風土黃林患與針用和成膏

風化石灰和醋漿水調塗隨手而滅石灰淋汁洗

之甚效

枯礬

伍錢

滑石

伍錢

硫黃

叁錢

俱為細末猪油同

研糊搽極效



治乳癬方

冰片 壹分 雄黃 貳分 枯礬 柒分 大楓子 柒分

乳香 肆分 檳榔 肆分 紫蘇 叁分 石榴皮 壹錢

麝香 壹分 珍珠 壹分 高良薑 肆分

均研極細先用生薑擦患處後用麻油調敷

陰癬方

蛇床子 蒺藜草 川芎 川柏 銀花

其煎滾貯入乾淨便桶以身坐上薰其熱氣

癬酒方

槿樹皮 壹兩 生南星 一兩 檳榔 壹兩 樟腦 伍錢

香木鱉 伍錢 真蟾酥 叁錢 班蝥 叁拾個 須要

與右藥共浸滴花燒酒用一觔勿出氣浸七日用

川山甲片在癬上刮損些微以羊毛筆蘸酒搽

之

癬膏藥

番木鱉 壹兩 葱白頭 壹兩 鉛粉 壹兩 麻油 壹觔

右藥熬膏用桑枝頻攪收至滴水成珠傾在清

水中浸七日用布攤貼癬處三個即愈

四平散 專治髻鬢頭并耳內膿水等症

黃柏 血丹

胆礬

煙膠

在牛圈內買帶黑色者

右藥等分研極細末先剃頭髮後用麻油調和

末藥敷上三四次即愈百發百中瘡乾者用濕

藥瘡濕者用乾藥

油灰髻鬢

吳茱萸肆錢研極細末用陳蠟燭油入藥烘烱調

厚先剃頭後擦敷患處可愈愈後忌食海鮮一年

不忌必發

汗癩方 生黃瓜蘸礪砂末搽以汁出為度

姑礬 輕粉 硫黃 蜜陀僧各等分用浮萍取

汁調勻搽之即退或用花紅果蘸藥擦之不再發

麻黃膏 專治諸瘡神效

麻黃 伍錢 去節 班蝥 叁個去 頭足翅 大楓子 壹百粒去 殼研爛

蓖麻子 壹百粒去 殼研爛 雄猪油 肆兩

先將猪油熬熟去渣次下班蝥煎數沸隨去班

蝥再下麻黃煎枯去渣後將大楓子蓖麻子肉

和勻搽之



右藥十三味生研細末蟾酥熊膽拌和搗丸如

粟米大金箔為衣

癰疽發背疔瘡癩癧乳癰每服三丸酒下如七

歲小兒酒化服一丸如初起服之即散如爛者

不用敷藥膏藥自能生肌長肉收口孕婦忌服

廉瘡隔紙膏方二

松香 壹兩火上化開 乳香 血竭 各參 錢 共為末香

油調攤貼紙上用針刺數百孔反貼瘡上三日一

換貼時先用米泔水燉溫洗淨

年久不愈者用白蠟陳年猪脂油數年久者更佳各等分

乳香叁錢研末共入鍋內熬化用白棉紙裁成瘡大二

三十張每張在藥內提過候紙兩面蠟凝厚為度

將三十張疊成半寸厚用針刺數百孔以便通氣

貼於瘡上用絹縛住過一夜將貼瘡一張抽去又

復包上每日如此俟惡水消盡即生肌長肉矣

爛腿神效方 方二

爐甘石揀白色者約十四文用酒罈頭泥研細和水打爛如

做糰子樣將藥包裹泥中炭火上燒紅取出藥冷

透加入冰片七文同研極細末用熬熟猪油拌勻  
敷患處神效

松香

猪油

熬熟  
等分

同搗爛塗患處待油乾再塗上

約三四次必愈此方兼治髻蠶頭

濕毒瘡爛腿方

商陸

壹觔

用大蒜油煎收成膏加鉛粉熬厚用油

紙攤膏貼上患處即愈

爛腳了方

東丹 松香 二味等分入于龍爪葱內放磁器



盆中在飯鑊上蒸一次露七夜曬七日連葱打糊

加冰片少許先用冷茶洗足然後塗患處即愈

此方加入燈窩油花椒同搗兼治肥瘡亦效

葱油膏 治風濕臙瘡

黃芽葱 參拾陸根 麻油 壹觔半

先將麻油熬熟入葱一根煎枯取出葱渣再入

一根如法煎完三十六根瀝清再將油煎至滴

水成珠人炒杭粉十二兩收成膏聽用攤貼

滋水淋漓洗痔方

蓬大海 伍隻  
皮硝 壹兩  
五倍子 叁錢  
魚腥草 叁錢

生甘草 叁錢  
當歸 叁錢  
江枳殼 叁錢  
紅花 叁錢

威靈仙 伍錢  
右藥煎濃洗淨

痔痛方 方三

腳魚頭炙灰加入冰片少許麻油調敷肛即收

青蒿 川椒 蘄艾 膽礬 嫩槐樹條煎湯薰

洗有管亦可治

爛石榴 叁隻連皮帶子  
五倍子 伍錢  
烏梅 柒個  
槐米 伍錢

地骨皮 伍錢  
煎湯天天溫洗勿間斷大能化小小

必除根

脫肛及痔漏方

大松樹皮愈老愈佳半觔濃煎一大碗收至一小

碗乘熱服兩碗即愈

痔瘡化管方

田雞皮

炙灰

血餘

煨灰

黃明廣膠

牡礪拌炒

各等分右為末每朝服三錢管自消化而愈

洗痔極效方

威靈仙

槐米

防風

各壹兩

五倍子

伍錢

瓦松

柳鬚

即楊柳小紅根各貳兩

各剉碎水煎濃薰洗極效

敷痔方

方二

土木鱉去殼為末唾調貼痔痛七日即消一切癰

疔腫痛醋磨塗之皆效

臘月取羊膽一個入冰片分許置風處掛乾用時

凉水化開頻敷患處極效

洗痔漏方

方二

地骨皮

捌兩取新鮮者更佳

槐角

捌兩

共煎湯乘滾熱置小

浴桶中坐薰片時即以湯淋洗痔瘡一日薰洗三

次為妙或用甘露根煎洗三四次亦效

又方用枳殼

參兩

癩蝦蟆草

參兩一名荔枝草四季常有面青背白麻紋纍

纍者是也

二味煎湯薰洗洗後搽藥自然消去即以大

田螺一個用冰片五厘以刀挑開鑿入冰片平放

片時用雞毛蘸田螺水塗患上其腫痛自消

凍瘡方六

初起凝核冷則痛熱則痒乘其未破之先以生薑

搗汁熬濃搽患處候乾再搽二三次必消如在腳

跟用紅辣椒泡開水洗兩三次亦能自消

凍在手足白蘿蔔一個熟柴火內煨熟去皮擦患處效又蟹殼燒灰存性研末菜油調塗

凍在臉上用活雀腦塗之立效鴿子糞煎洗亦效

預治凍瘡方二

端午日用薑蔥汁於凍處揉散血結冬不再發

鮮櫻桃不拘筋數入磁瓶內封口放在涼處發過至冬月將櫻桃水塗凍瘡甚效數次則不凍矣

手足凍裂

蛇殼

亂髮

鮮猪板油

各貳兩

用清水十數碗鍋

置露天入藥同煮以棍頻攪熬至殼髮無形如不化再

加水五碗加入黃蠟四兩俟蠟化傾入極厚磁鉢內

待其自凝患裂者先以溫湯洗淨臨睡時用抵腳

挑入裂內立時定痛冬至日製更妙

白癩風方由於脾滯而生食後即睡者常有之

白蒺藜六兩炒黃去刺研為細末水泛為丸每服二錢

白湯下一月除根久服并能耳聰目明

又方用青布收稻露擦患處十餘次全愈

鷺掌風方

皂莢一條連殼帶子打爛浸好醋內每日洗面  
蘸醋擦兩手十餘日後全愈不復再發

又方

鷺掌瘋患於手足掌指皮上硬而癢燥烈者是

蘇油

壹兩

紅砒

壹錢散  
細如糶

入油煎至砒枯煙絕為度

去砒留油有瘋之處日以火烘油擦二三次至愈  
乃止

兩手如風

亦鷺掌瘋之類用角樹滋膏擦手上三四日愈



骨槽風治法

患在腮內牙根形同貼骨疽者是也其初往往有

悞認牙疼多服生地石膏以致成功爛至牙根延

爛咽喉不救當用二陳湯陽和丸同煎服或陽和

湯消之

二陳湯 半夏 陳皮 茯苓 甘草 加白芥子

陽和丸 桂枝 麻黃 薑炭

陽和湯 熟地壹兩 白芥子貳錢 鹿角膠叁錢 肉桂壹錢

薑炭伍分 麻黃伍分 生甘草壹錢

倘遇潰者以陽和湯犀黃丸每日早晚輪服如有  
多骨以推車散吹入隔一夜其骨不痛自行退出  
吹至次日無骨出以生肌散吹入內服保元湯加  
肉桂芎歸蓍草收功而止

犀黃丸

乳香

沒藥

各壹兩

麝香

壹錢五分

牛黃

伍分

右四味共研和取黃米飯一兩搗爛入末再搗  
爲丸如葡萄子大曬乾忌火每服三錢陳酒送下  
推車散 取推車蟲炙研細末每一錢入乾薑末  
五分研極細用吹孔內有骨次日不痛自出

保元湯

人參

黃耆

生

甘草

生

肉桂

又方治法

輕則破相重則致命以地骨皮洗淨一兩大麥冬  
一兩皂莢洗淨五錢青鹽一錢同炒研細每日早  
晚以鹽湯漱口後以此藥擦之數月必痊

癘風論治

癘風者大風也一惡疾名也此病因得天地間殺  
物之風及乎酷烈之氣以致遍身疙瘡而起癢而  
生蟲然血隨氣化氣既不施血爲之聚血聚則肉

爛生蟲皆是濕熱之所致也斯疾不外乎陽明一

經陽明者大腸與胃也無物不受風之入人也氣

受之則患在上者多若血受之則患在下者多氣

血俱受病則甚重寧能活斯人乎其風有五黑色

不治蟲食其肝眉落蟲食其肺鼻崩蟲食其脾聲

啞蟲食其心足底穿膝虛腫蟲食其身則皮癢如

蟲行自頭面而來是順風自足而來是逆風多因

感寒熱與穢濁雜氣而成治法先以再造散下之

以稀粥養半月勿妄動作勞後用醉仙散或吐或

利若腮喉面腫其嚙難入出惡涎水或齒縫出臭  
水血絲者只以竹管吸食稀粥或一旬或一月面  
漸白而愈病之重者則用換肌散治之

再造散 治癘風疥瘡瘡先見下體者

錦紋大黃 壹兩

皂角刺 壹兩伍錢  
黑者佳

鬱金 伍錢生用

白丑 頭末陸錢  
半生半熟

右爲末每服三錢臨卧冷酒送下或日未出面  
東調服用淨桶泄出其蟲黑色者是多年赤色  
者是近日三日後又進一服蟲盡止藥後宜調

理可用三稜針刺委中穴出血終身不可食牛馬騾驢等肉大忌房事再犯必不救矣

醉仙散 治癘風疙瘡先見上體者

胡麻仁

牛蒡子

蔓荊子

枸杞子

各伍錢四味同炒

瓜蒌根

白蒺藜

防風

苦參

各伍錢

右爲末每一兩伍錢用輕粉一錢拌和每用一錢晨午夕三次清茶調下服後五七日先於牙縫內出臭涎水渾身覺疼昏悶如醉利下穢汚之物爲度量人大小虛實加減之

忌食鹽醬醋諸般魚腥椒料瓜果燒煨油膩及  
茄子等物宜淡粥煑時菜以助之再宜者烏梢  
蛇白花蛇淡酒煮熟食之以助藥力則可也

換肌散 治癘風年深不愈眉毛脫落鼻梁崩壞不

踰月取效如神

白花蛇 黑花蛇 各酒浸一宿 地龍 去土以上各參兩 當歸

細辛 白芷 天麻 蔓荆子 荆芥

菊花 苦參 紫參 威靈仙 木賊

沙參 不灰木 甘草 天門冬 赤芍

天麻 何首烏 蒼朮 胡麻子 川芎

草烏頭 木鱉子 九節菖蒲 沙苑蒺藜 各壹兩

右為末每服五錢溫酒調下取醉尤妙病篤者  
用此按醫宗金鑑曰如無紫參不灰木亦可

五枝萍水湯 治癘風遍身生瘡

柳枝 桃枝 槐枝 桑枝 楮枝 浮萍

右等分取來濃煎湯用大缸盛之病人坐浸其  
中至頸為限一日俟湯如油其病如洗誠仙方  
也又以荆芥穗大黃梔子鬱金地黃杜仲防風



羗活獨活白蒺藜各等分爲末以大楓子油入  
熟蜜爲丸梧桐子大茶清下四五十九丸一日服  
三次守戒五年養心禁慾永不再發

楊梅瘡

凡人往來妓家駁雜淫火亂動觸其氣者蔓延染  
傳流毒無窮每成廢人甚至喪命絕嗣蓋毒氣熾  
盛有雖生不育欲求速效誤投昇丹輕粉等藥一  
時暫愈以致結喉爛頭無藥可救不可勝數殃及  
終身誠自作之孽又何惜哉

一用艾火灸先起第一個五壯每日空心服麻油一杯其瘡自愈永不結毒乃最妙簡便方也

又方

凡一切楊梅廣瘡週身紅塊廣粟不論初起已經

潰爛者先用茯苓

木通

防風

荆芥

各壹錢

當歸

貳錢

生黃耆

叁錢

麻黃

壹錢

大熟有汗時少用

用精羊肉二

觔水五碗煎至三碗去肉用湯煎藥至二碗先於

下午照常食飽至晚喫藥如寒冷時服生白酒一

杯蓋被出汗頭面亦須出汗發汗一處不透此一

處卽有後患至天明時自然汗止卽用熱湯沐浴  
另換新衣新被其有汗衣被換水自洗不可使他  
人聞之若觸其氣未有不傳染而生者慎之

次用生大黃研細一兩加入牙皂莢炒黃研淨末  
三錢水泛爲丸每早晨食薄飽卽服二錢白湯下  
瀉三五次後喫粥一碗卽止體厚者間日一服是  
後每日服土茯苓濃煎湯服三五碗每服一碗入  
五寶丹六厘病者不得另飲茶湯逐日照法服不  
拘日期以好爲止

楊梅瘡餘毒未盡

槐米搗淨微炒畧研去尖每服二錢不拘白湯好

酒空心下日二次服至一二升永無後患

魚口方二

生在左胯縫內名魚口者其瘡口潰犬身立則口必合身屈則口必張開合之狀形如魚口故名此毒係忍精不洩怒氣傷肝而成

五月五日採樹上青核桃筐內陰乾臨用火煨存性爲末好酒空心服少行一二次服三次未成者

卽消已成者減輕

又方用槐米炒黃色二兩好酒煎熟服飲酒蓋被出

汗未成者卽消已成者減輕

便毒

生在右腿縫間又名便癰又名血疔無論男女皆  
可以生發於少腹之下腿根之上摺紋縫中經屬  
肝腎由強力房勞忍精不洩或慾念不遂以致精  
搏血留聚於中途壅遏而成或爲暴怒傷肝氣滯  
血凝而發

白芷

殭蠶炒

黃川山甲炮各

貳錢

當歸

生大黃

各叁錢

乳香

沒藥

各壹錢

水煎服即消此惡毒初起之妙

方也

外用千年石灰入白礬一撮食鹽少許米湯調敷

即散

下疳瘡

陰頭皮縐處濕爛疼痛

生甘草及松煎湯洗淨拭乾用鳳凰衣

即出雞雛殼內衣炒

黃兒茶等分為末敷之

壁上蟻蛛錢逐個在燈上燒存性研細加冰片少

許搽之立能止痛

初起卽服大黃一兩皂莢二錢水泛爲丸照前每服二錢瀉去其毒日一服

### 楊梅下疳

若因地氣卑濕由受濕熱或觸臭氣生者所受不過皮毛肌肉之間生於前陰通腎囊筋上者多或身上紫紅色暈癬不在骨節穴道用前下疳症下米仁木瓜木通銀花防風甘草白蘚皮

皂角刺土茯苓煎服

若因淫毒傳染而生者蓋此淫穢之毒氣從精道

乘虛直透命門以貫衝脉無處不到發於頭頂四肢骨節穴道之間爲害最惡若治失其宜頭鼻爛穿者多矣明哲之人靜而思之何苦貪瞬息之歡娛輕則痛苦之災毒於別病重則終身殘疾毒延子女如此惡途不寒心知避者其愚亦甚矣

九龍丹 治懸癰毒魚口便毒橫痃初起未成膿者服之立效

木香 乳香 沒藥 兒茶 血竭 巴豆

不去油

等分爲末生蜜調成一塊磁盒收貯臨用時旋



丸豌豆大每服九丸空心熱酒一杯送下行四

五次方食稀粥腫甚者間日再用一服自消

五寶丹 治結毒筋骨疼痛腐爛口鼻諸藥不效服

之無不應驗

石鐘乳

肆錢如乳頭下垂敲破易碎以蜻蜓翅者方真

硃砂

壹錢

珍珠

貳錢豆腐內煮半炷香時取出

冰片

壹錢

琥珀

貳錢

各研極細和一處再研數百轉磁罐密收用藥

二錢加飛羅麵八錢再研和勻每用土茯苓一

觔水八碗煎至五碗濾去渣作五次每次加五

寶丹一分和勻量病上下服日用十碗如鼻子  
腐爛每日土茯苓內加辛夷三錢煎服引藥上  
行忌食海腥牛羊鷺肉火酒煎炒房事等件

金蟬脫殼酒

醇酒五觔大蝦蟆一個土茯苓五兩浸酒內瓶口  
封緊重湯煮二炷香時取出待次日飲之以醉爲  
度無論冬夏蓋煖出汗爲效餘存之酒次日隨量  
飲之酒盡瘡愈又治結毒筋骨疼痛諸藥不效者  
更妙服酒七日後禁見風爲效忌口及房慾

護面散 豫服之治楊梅瘡毒不攻頭面神效

女人頭髮

煨存性

明雄黃

各叁分 研

其研細香油半酒鍾調勻滾黃酒冲服一日三

服

下身生八足蟲方

生白果肉擦之蟲即死

婦科疾病

婦人一科古人稱之曰難者以其嗜慾多於丈夫感病倍於男子加以慈戀愛憎嫉妬憂患染着堅牢情不自釋致病根深故也其雜病與丈夫同而載諸書歷歷可究然經水胎妊生產崩傷則又險而至難者也集腋原編法云備矣茲再補其遺症耳

通經秘方

鄭虛菴萬金方用船上多年灰條炭火燒紅淬入

好燒酒內取出候乾爲末每服三錢好酒送下空  
心服第二服紅花酒下第三服大黃酒下三次見  
效如神此專通經用者審之

經閉方

蓬頭七個 陳福珍酒半觔 將蓬頭置酒中飯  
鑊上蒸熟臨臥服之連服三日卽通而愈

痛經方

新臘脂泡濃汁去渣拌喬麥麵爲丸服之數次卽

愈

何德揚難產方

雲母石粉温酒調服二錢入口卽下

產難危急

川寒水石四兩生用二兩煨赤二兩同研細末入  
硃砂五錢研勻如桃花色每用三分并花水調如  
薄糊以紙花剪如杏葉大攤上貼臍心候乾再易  
不過三上卽產橫生倒生死胎皆驗

凡有倒產兒足先下者因兒在腹中不能旋轉故  
足先出來謂之逆生須臾不救母子俱可以亡若

令產母仰臥令收生之婦將足推入一則恐產母  
驚嚇二則收生者非精良妙手反致傷人性命不  
若以小絹針於兒腳心刺三五次用鹽少許塗刺  
處兒腳縮進卽時旋轉順生又法兒手先出者以  
鹽塗手心卽時縮進順生諺云討鹽生者亦卽此  
法也并以鹽摩母腹上

活人舉卿散 治新產血虛發瘧

荆芥穗不拘多少炒研爲末每服三五錢外以大

豆黃卷以熱酒沃之去豆卷用汁調下效如神

血餘散 治婦人轉胞不尿最能取效

亂髮不拘多少燒灰入麝香少許共研為末每服  
米醋調滾湯入髮香末一錢調下如神

少乳方 方二

牛乳 壹兩 糖霜 叁錢 米粉 叁合  
調勻朝朝以白滾

湯下之其乳自多

芝蔴炒香搗爛入鹽少許食之即生乳

產後血暈

惡血上衝不知人事者須先以兩手提起產婦頭



髮勿放倒如放倒恐血攻心則不救急以韭菜一  
把切碎先放入有嘴壺瓶內再用米醋煮滾衝入  
瓶內上紮瓶口以壺嘴出醋氣薰病人口鼻間或  
以少許塗婦口鼻安定後然後放手以荆芥穗六  
分炒黑研細熱童便調灌下卽甦卽一時無藥單  
用熱童便灌下可救如去血過多時時發暈者用  
當歸五錢 川芎三錢水煎服

止乳方

立

產婦氣血壯盛乳房作脹或無兒飲因而

腫痛憎寒發熱者

老絲瓜近蒂連子燒灰存性爲末酒下蓋被出汗  
卽消

或用麥芽三兩炒熟水煎服立消外用長布束緊  
以手揉散自消

乳湧

勞役過度乳出如泉神昏痰塞者以獨參湯灌之  
卽甦再以十全大補湯服之

月內唾紅仙方 治婦人月水臨期欬痰吐紅神效

木耳壹兩 炙灰研末每日空心用陳福酒調服一

茶匙

逆經

久閉血從口鼻中出者用好陳墨水磨一杯服之其血即止次用當歸尾紅花各二錢水煎服或服韭菜汁甚效

血痕 經閉結成血痕腹脇脹痛欲死者

水紅花

馬鞭草

各壹觔洗淨

煎濃去渣熬成膏配入

當歸

生地

川芎

白芍

各貳兩酒炒

沒藥

去油

紅花

烏藥

木香

各壹兩

延胡

五靈脂

各壹兩伍錢

俱爲末和前膏少加米糊爲丸桐子大每日空心温酒送下五七十丸以好爲度

白帶年久不愈赤白帶下諸藥不能療治者

貫衆一個全用

揉去毛及花萼

以米醋蘸濕慢火炙熟爲

末空心米飲下每服二錢累試甚驗能不再發

末望心米增不耳則一氣果清甚細細不再發

而聲衆一團全風

以手

以水翻滿聲則火亦應

日帶羊八不愈衣白帶不潮寒不附熱即吞

膏酒盥醮差不正水干衣物乾為逆

野為末味前清少味米醋飲火附十大理日空

小兒諸疾

初生不乳

用葱管一寸長者三段即將產母乳一酒盃同葱  
放杓內熬滾與飲立刻吃乳

初生氣絕不啼

急用棉絮包裹抱在懷中不可斷臍帶將胞衣置  
爐炭中燒之撚大紙條蘸油點火於臍帶下往來  
薰之蓋臍帶連兒腹薰時有火氣由臍入腹更以  
熱醋湯燙洗臍帶須臾氣回啼哭方可洗浴斷臍

帶

初生啼哭不出

凡小兒初生啼哭不出者須看舌下若連舌如石  
榴子速以指甲摘斷之或用蘆葦削作刀割之微  
有血出卽愈若舌下血出多者將亂髮燒灰同豬  
脂熬熟油少許相和塗之若小兒齒根有黃筋兩  
條以蘆葦刀割斷豬乳點之爲妙如兒口難開先  
點豬乳小兒初生不小便者急用葱白四寸四破  
之乳汁半盞煎兩沸灌下

初生下地卽不啼哭奄奄如死者急看喉間之前  
上齶有一泡速用指甲摘破急以棉拭去惡血勿  
令嚙下卽能通聲啼哭

### 赤白遊風

小兒在月中忽然遍體紅腫名赤遊或白腫名白  
遊自下而上過心必死用乾木瓜陳久者良以麻  
油如研墨法在粗盆中磨下頻敷患處令人着胸  
抱之片刻後卽乾後又敷之以愈爲度此症總因  
着寒致胎毒與氣血凝滯不行所致



七竅猥瘡瘡

生石膏 叁錢

冰片 叁分

白蠟 壹錢

赤石脂 叁錢

滑石 叁錢

青黛 壹錢

右藥共為末以哺胎雞蛋調敷患處倘疔濕即  
以藥末乾敷之俱可

螻螂子方

細生地 伍錢

生大黃 叁錢

麝香 壹厘

右三味入好福珍酒浸爛不可太濕縛於腳心

男左女右一週時即消

口糜疳瘡螳螂子方

小兒口内生疳色白名口糜又名雪口及螳螂子  
俱胎火而成用新藍布蘸濃煎松蘿茶葉汁揩淨  
口內膩垢再用雞子清仍以藍布蘸少許用力揩  
擦患處以血出爲度重者二三次卽愈

急驚風刺法

凡小兒忽然沉迷不醒或聲氣俱變命在頃刻者  
速用針刺大指傍離指甲如韭葉濶名少商穴刺  
之出血隨時而愈屢試屢驗

砂雪丸

治急慢驚風

硃砂

壹錢

輕粉

壹錢

礪蠶

柒個

全蝎

叁個

右藥四味各為末秋間取青蒿節內蟲百餘條

搗和為丸如菜豆大每服一丸研細人乳調服

指膨食積

石燕

貳錢要雌雄者煨研細末

紫蛤蜊殼

貳錢醋煨研細末

穀精草

伍分

雞內軟硬肝

一具不落水者去內垢用乾布揩淨

右藥加水同煎待澄清均幾次服輕者二三服

雖重至脫髮者亦不過數服即愈愈後忌生冷

麵食 按此方必疳積生蟲 蟲毒上攻頭目以

致脫髮目盲者

腹中有蟲

小兒喜食茶葉石灰炭生米等類皆屬腹中有蟲

宜用史君子六個將三個灶內煨熟生者三個一

齊服逐日俱如此服月餘可愈或頻食榧子亦可

益神散 專治小兒肚大青筋已成疳積兼治婦人

經水不調等症

川棟子 炒麥芽 炒枳殼 史君子肉 醋製炒

炒烏藥 炒枳實 炒猪苓 炒山查

炒川樸 炒澤瀉 炒檳榔 以上各四兩

大黃 酒製 莪朮 醋製 三稜 醋製 胡黃連 炒

青皮 炒以上各壹兩貳錢伍分 青凡 隔紙 六麩 醋製炒 各捌兩

乾漆 炒絕 蒼朮 醋製炒各柒錢伍分 四製香附 拾貳兩

鍼砂 伍錢自往作針舖內去買用盂鉢 陳皮 壹錢 水飛淨另研極細如塵方為道地 伍分

右藥二十三味各製炒同磨為極細末每服一

錢清晨用黃砂糖拌和開水調服靈驗異常

牛黃八寶稀痘丹

小川連

生研淨末叁錢

明雄精

水飛淨伍錢

明琥珀

研極細貳錢

真西黃

研極細肆分

沒藥

去油叁錢

梅冰片

研貳分

真川貝

炒研極細叁錢

劈硃砂

水飛淨伍錢

乳香

去油叁錢

羌活

研極細叁錢

元參

曬乾研細伍錢

青黛

水飛叁錢

羚羊角

磨汁曬乾研細叁錢

真珍珠

飛淨肆分

犀角尖

磨汁曬乾研細叁錢

以上十五味各為極細末切忌烘炒另用

淨銀花

貳兩

淨地丁

貳兩

甘菊花

壹兩

生甘草

伍錢

紫核桃肉

貳兩

此五味用長流水五大碗入鍋內慢火煎至一

半取渣絞汁濾淨入煉白蜜盆許再用桑柴火  
慢熬至粘筋再入前十五味細末藥杵和爲丸  
加水飛淨硃砂五錢爲衣每丸約重一分五厘  
未出花者小兒每逢端午七夕除夕各服一粒  
期歲內小兒減半

保嬰出痘簡易良方

此方不妄

金銀花

當歸

紅花

赤芍

生地

桃仁

荆芥穗

以上各壹錢

甘草

伍分

右八味用水兩茶杯煎至一酒盃卽用小兒本

身臍帶約二三寸用清水漂淨木炭火瓦上焙  
乾研爲末入藥調勻儘一日之內與小兒服完  
第一日服藥次日出痘三日收功不灌漿亦不  
結痂在小兒初生十八日內服之有效過十八  
日則不驗矣十八日內或有臍帶未落者卽用  
收生時剪下者亦可見過石灰者忌用瓦上焙  
乾時煤火忌用

立發悶痘方

鰻魚頭

壹個

鯽魚勒結

兩條

蠟團腳爪

肆隻



蝦鬚鉗貳錢

右四味水煎服之立發

倒靨色黑唇白冰冷

用狗蠅七枚搗碎和醅酒調服移時卽紅潤如舊

癩瘡入眼

番木鱉半個同輕粉冰片麝香爲末左目吹右耳

右目吹左耳日二次癩瘡自退

痘後餘毒攻眼

痘後餘毒上攻眼成內障用蛇蛻一具洗淨焙乾

又天花粉等分爲細末以羊子肝破開入藥在內

麻皮縛定用泔水煮熟切食之良愈

### 塗消痘毒

百草霜

菜錢

乾豆腐

壹方

二味同搗爛塗可消

### 牙痛牙疳

大棗一枚去核將坑垢放滿棗子內用泥裹再將濕草紙包好在火灰內煨透去泥草紙單將棗子坑垢研細為末入麝香少許擦疳上即愈

### 治痘疔

名縣繭散

出蛾蠶繭

白明礬

搗碎

入繭內以炭火瓦上燒

小兒

壹

之令礬汁盡為末敷疔瘡患處

此藥能消腫止痛去腐生肌凡一切瘡毒疔毒無名腫毒疔瘡患處

此藥能消腫止痛去腐生肌凡一切瘡毒疔毒無名腫毒疔瘡患處

此藥能消腫止痛去腐生肌凡一切瘡毒疔毒無名腫毒疔瘡患處

此藥能消腫止痛去腐生肌凡一切瘡毒疔毒無名腫毒疔瘡患處

此藥能消腫止痛去腐生肌凡一切瘡毒疔毒無名腫毒疔瘡患處

此藥能消腫止痛去腐生肌凡一切瘡毒疔毒無名腫毒疔瘡患處

此藥能消腫止痛去腐生肌凡一切瘡毒疔毒無名腫毒疔瘡患處

此藥能消腫止痛去腐生肌凡一切瘡毒疔毒無名腫毒疔瘡患處

此藥能消腫止痛去腐生肌凡一切瘡毒疔毒無名腫毒疔瘡患處

此藥能消腫止痛去腐生肌凡一切瘡毒疔毒無名腫毒疔瘡患處

跌撲諸傷

凡折傷症如跌撲木石所傷或兵器或湯火傷爲  
症不一切不可飲冷水血見寒則凝多致不救慎  
之卽口渴以溫粥之物解之又不可食熱湯熱粥  
熱酒恐血沸而出則亦無救

從高墜下

或木石所壓或撲車落馬一切傷損瘀血凝滯氣  
絕欲死者一時無藥但擘開其口以熱小便灌之  
卽醒再取淨土五升蒸熱以舊布重裹作二包更

換慰之勿過熱恐傷破肉取痛止則已神效

如跌破血出不止傷處以穿舊絲絲照傷口畧大

剪下貼上或先將絲綿不拘新舊燒灰研末待冷

敷上立能止血

如無絲綿用乾麵和生薑汁  
搗勻貼傷處亦能止血止痛

如無預備金瘡藥敷口即用白蠟刮細末罨上傷

處不論大小皆宜包好勿見風七日後方愈

如出血過多昏沉不醒者以人參

叁 伍 錢煎湯灌

下醒後白米一合同參渣煮粥服之

血出多者脈沉細者生脈浮大者死

若傷處調理不謹五七日後成膿者又須用外科

五仙丹以收口法治之

五仙丹 御三仙丹

水銀 焰硝 明礬各一兩加入硃砂 水飛淨 叁錢

雄黃 水飛淨 叁錢 同昇利於收口

瘀血脹痛雞鳴散

一切跌打壓墜瘀血腹痛 大黃 酒炒 歸身 酒炒

等分爲末每服 貳叁伍錢 以瘀積之輕重增減早晨空

心酒調服大便中取下黑物自愈如痛不可忍者

加桃仁

去皮尖貳拾壹粒

大黃

用至柴捌錢

雞鳴時服

如體虛不能服大黃者用生地汁一碗好酒半碗

和勻溫服三次愈

跌撲疼痛

跌打未曾出血內傷疼痛者

延胡索鹽水炒研每服二錢日進二服陳酒調下

或用乳香沒藥俱在箬葉上炙去油研細每服

一二錢酒調下皆止痛之妙品也

外用葱白不拘多少搗爛炒熱罨傷處冷則易之

止痛如神不拘已傷出血連傷處罨上止痛止血

之第一品也

跌壞日久腫痛用生薑陳香糟各一觔同搗爛  
炒熱罨傷處如不愈治一年之後成東瓜串不救

跌傷青腫

新做熱豆腐切一指厚片貼傷處冷則易之數次  
卽消

鳳仙花葉搗如泥塗腫處乾則再上一夜血散效  
傷痕紫黑血不散

大黃末以生薑汁調塗一夜黑者轉紫二夜紫者



卽白矣兼治內傷久發疼痛欬噎吸氣塗之卽愈  
氣絕不言 跌打損傷氣絕不能言者

韭菜汁 童便各一盞溫服卽醒常用韭汁和酒  
少許服且能止痛

墜跌吐血

荷花曬燥爲末每服二三錢好酒調下

跌打損傷方 患者氣未絕服下卽醒

金燈草生於麥田內上有小葉葉下有子子中有  
蟲蟲生於小滿節氣取之曬乾磨粉每服三錢開

水送百發百中

立夏節蟲未生芒種節其蟲破子飛去必須在小滿節內如法取之

渾身打傷方

大生蟹一隻

小者二三隻

搗爛熱黃酒冲服極醉一夜即安

宿傷立愈方

芥菜子

研碎

飛麵

二味等分用調和敷傷處

覺痛則宿傷出而愈矣

軍中第一方

生狗頭一個

將肉刮盡露天火炙存性為未須屠戶去買否恐有殃

陳松香

伍錢

血餘灰

人指甲末灰

各壹錢

共研細末摻傷處斷者即續刀傷即愈即以四

味等分用陳酒冲服亦可

金刃傷

治金刃傷鐵扇散急不可得即用剃頭抹刀舊布

燒灰敷傷口立刻止血結痂其效如神

刀斧傷方

韭菜

石灰

二味搗爛貼在墻上曬乾研末收

貯被刀斧傷流血不止者摻上立愈

又方 乳香 去油 輕粉 龍骨 三七

沒藥 去油 兒茶 象皮 切片土炒成珠

右藥各三錢其為細末以大黃二兩白芷一兩

陳石灰一觔三味各炒粉紅色為度研細入前

藥和勻收貯磁瓶敷刀砍斧傷流血不止即愈

又方 生半夏末帶血敷之能收口生肌

又方 松香 壹觔水煮去苦味須換水數次至不苦為佳 銀炭 壹觔打斷燒紅用碗悶熄

二味為末收貯治刀傷人咬狗咬敷之立愈

又方 陳石灰用蟹血拌透曬乾研末搽患處立即止

血

又方龍眼核剝去光皮研極細收貯治一切金刃傷

敷之無不立愈止痛收口

同紫降香剉研為末和勻敷之血無後患

金瘡石灰散

陳石灰敷患處即止血合口凡瘡太深者不宜速

合加滑石其為末敷之

續骨丹

乳香

沒藥

孩兒茶

蠶殼

燒灰

右藥各等分為末每服二錢接骨用黃酒送下

欲下瘀血燒酒送下

接骨神丹

土木鱉

去殼壹合炒

半夏

叁錢

巴豆霜

去油叁錢

右為末每用二分黃酒送下

破傷風方三

表症未傳入裏

蜈蚣一對

鱉膠

叁錢炒焦

為末用

羌活 防風

川芎

各壹錢

煎湯調服脈氣浮緊者

速服即效

頭面身體因破傷風頃刻腫脹者 急用蒺藜草

二兩酒煎服少頃即可遲則不救

急用苦茶草

一切跌破出血及蛇犬傷不即藥護包紮以致感  
冒風寒或喫鮮發毒物或瘡久不收口因之寒熱  
並作身體強直甚則角弓反張口吐涎沫傳入陰  
分則身涼自汗傷處反平陷如故者乃毒氣內攻  
當用萬靈丹發汗令風邪外出 外用南星防風  
蚯蚓等分爲末用生薑薄荷汁調敷傷處得膿即

效

萬靈丹

治一切腫毒風氣四時感冒風寒頭疼身痛寒熱  
交作初病在表宜發散者葱白湯化服出汗即愈  
如諸病無表症相兼不必發散者只用熱酒化服

治病甚靈有力之家多備濟人美事也

孕婦勿服

茅朮

剝兩

全蝎

石斛

明天麻

當歸

甘草

炙

川芎

荆芥

北細辛

防風

麻黃

川烏

湯泡去皮

何首烏

草烏

湯泡去皮尖以上各壹兩

雄黃

陸錢

俱為細末煉蜜為丸硃砂為衣

以一兩分四丸或一兩分六丸或一兩分九丸



三等做下磁瓶收貯以備年歲老壯病勢緩急  
 取用治破傷風每用連鬚大蒜白九枚煎湯一  
 茶鍾將藥一丸乘熱化開通口服蓋被出汗愈

硃砂膏

煨熟雞蛋黃 壹個 麻油 半筋 共煎化盡再入頭髮

三錢 剪壹寸長 以筯順攪化盡文火煎方入水飛硃砂

雄黃各一錢再入黃蠟六錢攪勻掇鍋地上一夜

待用治跌打損傷燙火傷以翎毛搽土即愈

三黃寶蠟丸

此丸治風寒濕痺風寒濕痺風寒濕痺

專治跌打損傷藥箭棒毒蛇蟲咬傷及破傷風並  
 傷力成癆女人產後惡露不盡致生怪症瘀血奔  
 心竅危在旦夕重者服一錢輕者或三分或五分  
 用黃酒下立刻全生如被烏鎗打傷鉛子在內者  
 服一錢喫酒數杯睡下一時汗出即愈如外敷將

藥用香油熱化少許以雞翎掃藥患處忌食冷水  
生果發物

藤黃肆兩隔湯燉  
十數次去沫 天竹黃叁兩如無真者  
以陳膽星代之

雄黃貳兩水  
飛淨 當歸尾壹兩  
伍錢 紅牙大戟叁兩  
去骨

劉寄奴叁兩 琥珀叁錢 辰砂壹兩水  
飛淨

麝香 叁錢

兒茶 壹兩

乳香 叁錢 去油

鉛粉 叁錢

水銀 叁錢 二味同研則不見星

以上諸藥研為細末分兩稱足再用好黃蠟二

十四兩煉淨滾湯坐定將藥投入攪勻取出磁

罐收貯

滾水燙方 方二

龜版瓦上用炭火炙灰研細末加麻油調和將雞

毛蘸敷患處三日即愈不爛

生雞蛋去黃用白加好燒酒少許調敷乾後再敷

立刻止痛不爛

火燙方 方七

切不可以井泥冷水搨之蓋熱氣得冷深入至骨  
爛人筋脈後至手足攣縮之患且恐火毒攻心則

難治

凡火燒昏倒者急用蘿蔔搗汁兩碗飲之如無蘿  
蔔之時即用子和水搗濃汁飲之或童便一碗皆  
可服以護心即死者灌之可活外以冷柴灰不拘  
多少入鹽少許以水調和如稀糊嘗味微鹹為度

用以厚塗傷處覺熱則易之連易數次則火毒皆  
拔於灰中腫痛隨散而愈  
雞子清磨金墨塗患處上用雞子殼內濕衣蓋之  
則不起泡

陳年石灰 桐油各半杯調勻敷患處即生皮

井中蒼苔得至陰之氣而生火瘡傷爛脫皮者以  
苔炙末每錢冰片二分杵極細摻上痛即止不過  
三度愈

日常泡茶喫剩殘茶葉置罈中積之聽其臭爛愈

久愈妙遇火燙連汁敷之立即止痛火毒拔盡即

愈

秋葵花淡黃色紫心單瓣者用磁罐裝入加生麻  
油浸滿蓋好安泥地敷患處有起死回生之功且  
能敷治熱瘡之效

大黃一觔白芷一觔赤石脂四觔松香四觔共研  
末陳茶油調勻搽敷患處但松香先入尿中浸數  
月再入天泉水內浸數月漂淨穢氣陰乾研末入  
藥但不可以敷水燙

湯火傷方五

大麥不拘多少入淨鍋內炒至漆黑為度放地上

涼透研末爛者乾摻已潰者香油調敷

百草霜三錢研末香油調敷患處

無名異研細末調麻油敷傷處其驗如神

大黃為末蜜水調敷止痛立效

兒茶石膏大黃等分為末麻油調敷

救苦散 治火燒湯燙熱油烙傷脫肉者

寒水石 大黃 黃柏 各等分

右爲末香油調敷患處

石脂膏 治湯火傷赤爛熱痛不止

赤石脂 寒水石 煅石膏 各等分

右爲末用新汲水調敷患處如神

猪膽散

臘月猪膽數枚取汁浸透黃柏炙乾爲末燭油調敷湯火傷處取效如手探物

惡刺入肉

象牙屑研細水調塗或用栗子生嚼細敷之刺自



出... 水... 煎... 服... 之... 再... 將... 二...

竹木刺入肉

用葶麻子去殼搗爛罨上過夜即出或用鹿角燒

灰研末水調塗半日即出

針刺入肉

用雙仁杏仁搗爛以車脂調塗凡針斷入肉及箭

鏃在咽隔諸隱處救之即出

腳底開裂

紅辣虎蒂

拾肆個

冬瓜肉

去子

同煎服之再將二

煎洗淨腳裂處或以牛油燭油敷患處

磁器嵌腳方

三角白果

去殼  
衣

不拘多少浸菜油內用時搗爛成

餅貼之初患者即用生白果肉搗爛貼之亦效

箭傷入肉

巴頭仁畧炒取蜚螂蟲同搗爛厚塗四圍須臾痛

定微痒忍之待痒極便搖動拔出之針斷入肉如

法亦效



中惡急救

中惡

三方

多由暮夜登廁或行人所不到之處忽然眼見鬼物卒然僵仆四肢逆冷兩手拳掘甚者口鼻出血惟心腹俱暖凡遇此症切勿移動卽令衆人圍繞鳴鑼打鼓燒火或紫金錠蘇合香檀香樟木之類焚燒直候省知人事方可移動而歸用菖蒲根生搗絞汁灌口鼻中卽醒或用紫金錠磨汁灌下

或用犀角壹錢麝香分硃砂各伍分共研細末水調服

灸法

凡中鬼祟一時不醒用麥大艾丸灸人中穴一壯

即醒或於兩腳大拇指離指甲一韭葉處各灸

七壯亦效

有為鬼附昏迷哭笑或作鬼語者急將兩手大指

縛作一排用艾丸嵌中間爪中盡頭連肉處灸七

壯或十四壯鬼即去矣

若鬼去而人尚昏沉者用 麻黃伍錢杏仁貳叁錢

甘草肆伍分水煎濃徐徐灌之得醒卽止愈後宜服

四君子湯參朮苓草加炙黃耆多服以補正氣

還魂丹治中惡已死者

麻黃貳叁錢桂枝貳叁錢杏仁貳叁錢

右三味水煎灌下卽醒

經驗辟邪丹治衝惡怪疾及山間九尾狐精為患

人參 茯神 遠志 九節菖蒲

白朮 蒼朮 當歸 鬼箭羽 各壹兩

辰砂叁錢另研牛黃壹個另研金箔貳拾個桃奴伍錢焙冬月桃樹上乾桃

良方集腋 全卷 中惡 晨

麝香

每分雄黃 另研貳錢伍分

白右藥除另研外共為末再入雄辰牛三味末子

人和勻用酒調米粉搗糊為丸如龍眼大金箔為

絲總衣臨臥以木香湯化下一丸諸邪不敢近更用

絳紗囊裏五七丸懸於床帳之上尤妙

救吞生鴉片烟

用山黃泥半大碗以井水攪勻冲服其面上浮泥

水再以生大黃三錢泡湯服服後吐瀉而愈

救吞生鴉片烟三法

此法... 宜...

自鴉片烟之毒流行宇內遂於水火刀繩砒毒而  
外頓添一自盡之途且自盡於烟者較諸物爲尤  
衆不知其物只能迷人醉人實未能致人於必死  
也

其吞之而致死者惟大病後大勞後產後及虛怯  
人真元已離者則然然身未僵硬猶或可救慎勿  
輕殮若壯盛及無病人吞之不過沉醉三四日甚  
者七八日斷未有不蘇醒而起者此事見於粵東  
爲獨多而浙亦有之廣東三山縣人吞生烟死而



活轉計死去三日四夜潮州人一家七口俱吸烟  
至無以爲生合家盡吞之而七人均死至七日事  
已聞於官而死者則漸次全起浙省朱氏子吞烟  
死越三日而蘇州然其未聞與蘇何如也  
廣東老件作云凡吞生烟死者棺殮後因事開驗  
從無平正仰卧之屍非復則側蓋烟性既過其人  
醒轉則必翻騰求出而棺蓋已合遂至真斃豈不  
冤哉現載廣東新刻洗冤錄明著救治之方爲此  
吞烟輕者心中發躁但用活鴨血或糞汁或醬油

或涼水或明礬雄黃其所末或肥皂煎湯漸次灌  
之無弗愈者  
若服多毒重一時身冷氣絕似乎已死但其肢體  
柔軟則臟腑經絡之氣仍自流通實非真死速將  
屍安臥陰冷無太陽之地一經日照卽不可救擣  
開牙齒用箸橫在屍口將金汁或涼水頻頻灌之  
再以冷水不時摩胸脇更將頭髮解散浸入冷  
水盆內自然得活已目擊救活多人凡七日內身  
不僵硬者切勿殮棺云云

又江蘇閩廣浙省救吞生烟死者取活金魚五六  
尾每尾長三四寸搗和入真茶油碗許灌之令吐  
卽瘥全活甚衆是更歷驗不爽者伏望仁人君子  
思其未死活埋之慘將是說廣爲傳佈以救顛危  
以續嗣脈實爲今世活人第一快事語云救人一  
命勝造七級浮圖良不誣也

自洋烟入中國嗜此者耗氣傷財多患貧疾更  
有短見輕生用以自盡者夫生烟之殺人其死  
如也驟熟烟之殺人其死也漸驟死可救漸死不

可救子願吸烟者悟為酖毒勿自速其死期也

子尤願未吸烟者視若火坑勿自趨於死路也

救吞生鴉片烟方

淨銀花

伍錢

生軍

叁錢不可多用

膽礬

叁錢

生甘草

壹兩

藜蘆

叁錢

右藥五味濃煎去渣濾清加入生蜂白蜜五錢

冲服下咽即愈其效如神

北京鹽水錠

馬牙硝

壹觔入鉄鍋內烱之化水

次下皂礬末

壹兩

又次下

急救

黃丹

壹兩

硃砂

柒錢

雄黃

壹錢

末

壹兩

又

平

右藥須用烈火硝方化水煎成後傾于光平石

上凝硬收之

治一切腫毒疥癬蛇蠍蜘蛛蜈蚣咬傷夏月毒

虫 蚊風咬腫癢疼痛用醋或水磨搽

口舌生瘡乳蛾喉風喉痛用一塊噙化

心疼點眼角三次即愈牙痛含於患處

暴發火眼風眼老眼及眼邊赤爛以滾水化入

杯內洗之皆良

如牛馬眼有病亦點兩眼角效

此狗咬點眼藥

雄黃精

壹兩此味要辣道地火上照去鮮紅而帶紫色放水碗內淨者為更妙

當門子

叁錢

梅花冰片

壹錢

硝

水漂壹兩

此藥合法先將雄精研細篩淨然後再研四五

十天餘藥數十遍至端午日午時焚香齋戒沐

浴一人修合不與四眼見以上四味和勻亦要

多研為妙總以研至極細無聲為度忌婦人見

至要

百方集腋 全卷  
被蛇狗咬者點藥男左女右俱點在大眼角內  
一日只須兩次不宜多點

傷處不必另用別藥塗貼任他流出毒水只要  
淘米泔水洗之或乾燥用自已涎唾塗擦須要  
忌食赤豆百日至要至囑如食者非徒無益而  
白害之不能見效收功也

此藥修合成時貯瓶中用蠟封固不可出氣凡  
患者只可人來就藥點之立刻止痛見效不可  
以藥與人猶恐出冰麝之氣點而不靈故也

此方又名追毒丹治瘋狗咬男左女右點眼角  
俟小波內有紅絲解出卽無妨矣隨咬隨用更  
妙患處或用糯米飲洗之

猪馬咬傷

猪咬潰爛者用龜版炙研細麻油調搽卽愈

馬咬潰爛者用馬齒莧一把煎服以愈爲度瘡口  
用馬鞭子或籠頭索燒灰摻之

猫鼠咬傷

猫咬爪傷用薄荷汁或研末搽之卽愈



鼠咬傷用猫毛燒灰香油調敷

蛇咬傷

白芷貳錢

麥冬壹兩

煎濃汁調下頃刻流出黃水

待腫消皮合仍用此藥敷之

壁虎入耳

雞冠血滴入耳內即出

諸蟲入耳

麻油滴入耳中即出

蜈蚣咬傷

鮮桑葉搗爛和醋敷之莧菜葉擦患處可以止痛  
或用雞冠血敷燈煤灰敷

蜂螫方

生栗子急口嚼爛敷之

蠟蝮蜈蚣傷水中

鐵鏽和蒜塗之立愈

誤食木鱉子

肉桂

煎錢

煎濃服之即愈

誤食桐油

頁九集册 全卷  
熱酒飲之即能止嘔

誤食銅物

生葶薺三觔食之物從大便出

誤吞金圈金戒指

用長韭菜水中燒熟不可太爛如喫麵一般吞食

至次日從大便出韭菜裹金器而下出東醫寶鑑

試驗過甚效

誤中輕粉毒

人如角弓反張用生扁豆浸胖取汁弔地漿水飲

之卽愈

誤食水銀

水銀入腹法在不治以其體質沉重一入腸胃屈  
曲之處停留其間諸藥不能驅逐日久而腸胃潰  
爛矣有醫者法用黃蠟爲丸如桐子大金箔爲衣  
搗極厚每服二三錢服後視大便中有白星白亮  
如銀者則水銀出矣再服數日糞色如常方爲全  
愈切忌食雞

頭中砒毒 三方

凡人頭上生虱誤聽剃頭店內用砒搽頭毒虱或有搔傷之處砒毒乘隙而入以致頭腫無法可治以此三方治之卽愈

一方用皮蛋一個建旗茶葉一錢濃煎服三次

二方用紅布一方皂角一兩炒熱熨患處卽愈

三方用黃耆荔枝核各五錢研碎煎服三次

良方集腋合璧終

外科神效黑虎丹

此丹專治發背搭手對口一切癰疽乳巖疔毒惡瘡諸症潰後提毒之功神效無比及痛癢不知膿腐不化臭穢難聞至陰之症亦無不陰轉爲陽眞起死回生之妙藥也倘根盤散蔓不定卽用靈砂散四圍敷住永無惡症變幻之虞是丹秘方不求之數年往往大同小異茲特詳細采擇斟酌盡善奇險垂危之症現經屢試屢驗萬無一失幸勿輕視工費亦不甚鉅務望各發婆心修合濟世是

幸願工費亦不甚難

大蜘蛛

柒個

足要全備用白棉紙做成如竹管狀入蜘蛛兩頭拈緊礦脆半月後研細可用

真西牛黃

伍分

研細

當門子

壹錢

生研細

梅花冰片

伍分

生研細

靈磁石

壹錢

伍分

公丁香

壹錢伍分

曬乾研細

母丁香

壹錢

伍分

川山甲

柒片約重柒錢陸七分以大為佳砂研

全僵蚕

柒條微火焙燥研細

金頭蜈蚣

柒條要足全微火焙燥研細

全蝎

柒個微火焙燥研細

右藥先期揀選道地藥料照方法製各研極細末

宜夏秋之間

因蜘蛛易覓也

擇旺道吉日在潔淨處忌鷄

犬婦人須齊戒焚香禮經咒虔誠修合藏磁瓶內  
封固隔一月以退火氣用時將丹摻於膏藥上貼  
之未潰已潰皆效膏藥勿論好歹陳年者可貼不  
可悞入口中孕婦不忌

### 靈砂散

此散專敷陰陽發背對口一切癰疽疔瘡根盤散  
蔓不定屢經試驗其效如神幸勿以藥不貴重輕  
忽自悞

土硃

肆兩

要圓者佳  
研細

白芨

貳兩研細



右藥共研細末用時以冷井水調如厚漿狀敷

於四圍冷天稍溫熱用將黃表紙摘碎蓋貼藥面上待

乾為度此藥專療創毒皆性口一也職欲飛血淋繼精

此藥專療創毒皆性口一也職欲飛血淋繼精

此藥專療創毒皆性口一也職欲飛血淋繼精

此藥專療創毒皆性口一也職欲飛血淋繼精

此藥專療創毒皆性口一也職欲飛血淋繼精

此藥專療創毒皆性口一也職欲飛血淋繼精

良方集腋合璧終焚香蘇蘇眾患縮射合蘇蘇眾內

良方集腋合璧附錄

黑虎丹真方

當門子 壹錢

冰片 壹錢

公丁香 壹錢  
晒研

母丁香 壹錢  
晒研

靈磁石 壹錢伍分  
生研

川山甲 七片  
生研

真珠 伍分

西牛黃 伍分

蜈蚣 七條鬚腳全  
備微火焙研

僵蠶 七條微  
火焙研

大蜘蛛 柒箇腳  
全焙研

全蝎 柒箇  
焙研

右藥十二味共研細末收貯瓷瓶勿令出氣臨

用將藥放膏藥上貼於患處專治發背對口及

大小無名腫毒初起即消已成拔毒收功神效

無比凡已入陰分者貼一宿卽提至陽分幸勿  
忽視孕婦忌用

須擇天醫天德月德日虔誠修合忌雞犬婦人  
及孝服人見忌用鐵器

此方係晉省某君得異人傳授守戒弗洩歷試  
甚驗某君與洞庭席君某交甚至因席君有焚  
券之誼心感其惠臨別留此爲贈今聞川竹坪  
沈君傳抄見示特爲刊佈附於良方合璧之不  
閱者能修合施送功效不淺