


上醫本草 卷壹  
卷貳



上醫本草序

人知大病之不易愈而不  
知大病之不易得也方其  
邪萌於皮毛之間而不覺  
也至乎腠理則覺矣而以  
其無痛楚不為意以至入

於臟腑廩於腸胃而猶有  
強忍不以語人者是必致  
六病者也而病安能違之  
當此時而後用藥又欲達  
效必不可幾矣以藥之不  
致也同是不對病易之

效又易之數易而不交見  
其所易必有對者矣是以  
不對易對者也是以不愈  
用藥多不無損脾胃脾胃  
損則飲食不化安能用藥  
則有付之無可奈何者矣

余何以知之余自丙辰冬  
而病丁巳大病鱗連至於  
戊午之秋遂不能用藥而  
第取李氏時珍所著本草  
綱目中所載穀蔬肴核之  
類擇其有益者用之總宜

唐申春夏之間而大念吾  
知飲食之於養生大矣治  
之未病在乎節飲食余丈  
病之後猶能不病而况能  
早服乎語曰有病不治常

得中醫非吉醫可廢也養  
之不善以至於有病而後  
治之則不能無得失不若  
其仍養之也清心寡欲而  
復能節飲食苟非膏肓之  
患皆可浸平然則治於未

得豈惟中醫而已 即上  
首何力焉乃稍口此輯其  
要及方之易簡者名曰上  
醫本草其所引諸書亦間  
採之以資底玩味於患處

未暇後飾厥文也

三申陽月儕鶴居士書

雨水

露水

冬霜

臘雪

神水

流水

千里冰

東流水

甘露水

燒水

井泉水

節氣水

漿水

夏冰

穀部

胡麻

脂麻

小麥

大麥

蕷麥

蕷麥

稻

糯米

稷

黍

蜀秫

正蜀秫

黃粱

白梁

青粱

粟飯

蕷米

陳蕷米

菰

薏苡

黑大豆

貴大豆

赤小豆

綠豆

豌豆

江豆

扁豆

腰豆

江豆

扁豆

豆豉

甘草

草果仁

白芷壳仁

肉豆蔻

縮砂仁

薄荷

紫蘇

生薑

乾薑

大茴香

小茴香

杏仁

花椒

胡椒

陳皮

桂皮

甘草

綠豆

白芷

神造

薑

醋

米酒

老酒

社壇餘胙酒

薏苡酒

天門冬酒

菊花酒

桑椹酒

蜜酒

薑酒

縮砂酒

椒柏酒

神麃酒

鹿頭酒

鹿茸酒

羊羔酒

燒酒



本草 卷之二

趙南星夢白甫輯

門人梁志

梁維基

梁維樞

重甥王原熙

梁維本

梁維揆

梁士灝

梁維健

梁維京較

孫趙悅學重刊

水部

李時珍曰水者坎之象也其爻橫則爲三縱則爲出  
其體純陰其用純陽上則爲雨露霜雪下則爲海河  
泉井流止寒溫氣之所鍾既無甘淡鹹苦味之所入

不同是以昔人分別九州水土以辨人之美惡壽夭  
蓋水爲萬化之源土爲萬物之母飲資于水食資于  
土飲食者人之命脈也而營衛賴之故曰水去則營  
有穀去則食之無味尤慎疾衛生者之所  
當潛心也

雨水

咸平無毒

露雨冰立冬後十日

謂之液雨亦曰藥雨百藥飲此皆  
鳴起蟄乃出也

### 露水

甘平無毒主治秋露繁時以繫收取煎如膏  
延年不饑稟肅殺之氣宜煎潤肺散異之藥及  
疥癬蟲癩諸散

百草頭上秋露未晞時收取愈百疾止消渴令  
身輕不饑悅澤別有貨雲母作粉服法

本草  
百花上露令人好顏色

冬霜

甘寒無毒主治食之解酒熱傷寒鼻塞酒後諸證而赤者

附方

寒熱瘧疾秋後霜一錢半熟酒服之

臘雪冬至後第三戊爲臘臘前三雪大宜菜麥又幾

蠅臘雪密封陰處數十年亦不壞用水浸五穀

則蠅不生蟲酒凡席間則蠅自去淹藏一切

神水金門記

有神水灑取無事

甘寒無毒主治飲之清熱化痰定驚安神

流水○千里水○東流水○甘爛水一名勞水甘平

無毒千里水東流水二水皆堪蕩滌邪穢煎煮湯

藥禁呪神鬼漬汗行療尚可薦之王公况其靈長  
者哉勞水卽楊泛水張仲景謂之甘爛水用流水

二斗置大盆中以杓高揚之千萬遍有沸珠相逐  
乃取煎藥蓋水性本鹹而體重勞之則甘而輕取  
其不助腎氣而益脾胃也虞搏醫學正傳云甘爛  
水甘溫而性柔故烹傷寒陰證等藥用之順流水  
性順而下流故治下焦腰膝之證及通利大小便  
之藥用之急流水湍上峻急之水其性急速而下  
達故通二便風痺之藥用之昔有患小便閼者衆  
工不能治令取長川急流之水煎前藥一飲立瘳  
則冰可不澤乎

新汲水主治消渴反胃熱痢熱淋小便赤澀却邪  
調中下熱氣並宜飲之射癰腫令散洗漆瘡治墮  
損腸出冷噴其身面則腸自入也又解閉口椒毒  
酒醋令不腐

下魚骨哽

附方

中砒石毒多飲新汲井水得吐利佳

節氣水

立春清明二節貯冰謂之神水玉治宜浸造諸風  
解胃虛損諸丹丸散及藥酒久留不壞

重午日午時水王治宜造瘡藥瘡湯金瘡白蟲蠱  
毒諸丹丸

立秋日五更取水至晝未盡飲二盃能却暑

癰疽

小滿莖

水滿並有

醋一應食物皆易敗壞人飲之亦生脾胃疾

漿水漿酢也炊粟米熟投冷水中浸五六日味

白花色類漿故名若浸至敗者害人

甘酸微溫無毒主治調中引氣宣和強力通經

胃止渴霍亂洩利消宿食宜作粥薄暮啜之

去睡調理腑臟煎令酸止嘔噦白人膚體如繪

利小便

不可同李食令人霍亂吐利妊婦勿食令兒骨

水漿尤不可飲令絕產醉後飲之失意

附方

霍亂吐下酸漿水煎乾薑屑呷之

夏水

甘冷無毒主治解煩渴消暑毒

夏暑盛熱食冰應與氣候相反便作宜人誠恐  
腹冷熱相激却致諸疾也食譜云凡夏月用冰  
可隱映飲食令氣涼而不可食之雖當時解暑  
皆成藥也

草別穀以教民耕甿又嘗草別藥以救民疾天  
氏出教以烹任制爲方劑而後民始得遂養生之  
周官有五穀六穀九穀之名詩人有八穀百穀之  
穀之類可謂繁矣素問云五穀爲養麻麥稷黍豆  
配肝心脾肺腎職方氏辯九州之穀地官辯土宜  
種之種以教稼稽樹蘡皆所以重民天也五方之  
九州之產百穀各異其性豈可終日食之而不知  
氣味損益乎

**胡麻**一名巨勝生上黨川澤秋采之青囊巨勝苗也

或曰止是今人脂麻更無他義以其種來自大宛  
故名胡麻非也俗傳胡麻須夫婦同種卽茂盛故  
本事詩云胡麻好種無人種正是歸時又不歸

其平無毒主治傷中虛羸潤養五臟更養肺氣止  
心驚利大小腸益氣力長肌肉填髓堅筋骨明  
耳目耐寒暑饑渴逐風濕久服輕身不老療金瘡  
止痛及傷寒溫瘧大吐後虛熱及婦人產後

催生落胞細研塗髮令長白紫蘇散治百病

不生風病風人久食則

宜

附方

服胡麻法用上黨胡麻三斗淘淨醜蒸令氣逼日乾以水淘去沫再蒸如此九度以湯脫去皮簸淨炒香爲末白蜜或聚膏丸彈子大每溫酒化下一日三服忌毒魚狗肉生菜服至百日能除一切痼疾一年身面光澤不饑二年白髮返黑三年齒落更生四年水火不能害五年行及奔馬久服生若欲下之飲葵菜汁

中暑毒死用新胡麻一升微炒令黑攤冷爲末新汲水調服三錢或丸彈子大水下

牙齒痛腫用胡麻五升水一斗煮汁五升含漱吐之不過二劑神良

痔瘡風腫作痛胡麻煎湯洗之卽消

湯火傷灼胡麻生研如泥塗之

青襄音穰一名夢神巨勝苗也生中原山谷

其寒無毒主治與胡麻同功

胡麻

以脂麻搗爛去滓入

腸最益老人

附方

偶感風寒脂麻炒焦乘熟搗酒飲之煖卧取微汗  
出良

手脚酸痛微腫用脂麻熬研五升酒一升浸一宿  
隨意飲

頭面諸瘡脂麻生嚼傳之

乳瘡腫痛用脂麻炒焦研末以燈窩油調塗卽安

油

甘微寒無毒王治天行熱悶腸內結熱服一合取  
利爲度解熱毒食毒虫毒殺諸虫蠅蟻陳油煎膏  
生肌長肉止痛消癰腫補皮裂

附方

卒熱心痛生油一合服之良

鼻衄不止紙條蘸真油入鼻取嚏即愈有人一夕  
衄血盈盆用此而效

腫毒初起油煎慈黑色趁熱通手擦全

石毒用油一碗灌之

月唇裂用油頻頻抹之

髮長黑生油桑葉煎過去沐髮令長數尺  
見發熱不拘風寒飲食時痘疹並宜用之以  
入香油內手指蘸油摩小兒五心頭面  
諸處最能解毒涼肌

說文小麥謂之稷力尸切秋一冬長春秀夏實具  
中和之氣故爲五穀之母地暖處亦可春種  
是便收然比秋種者四氣不足故有毒時珍曰

麥性熱陳麥平和素問云麥屬火心之穀也養  
心氣肝氣

麥微寒無毒主治除客熱止煩渴咽燥利小便生  
血止血令女人易孕煎湯飲治暴淋熬末服殺  
蛇蛻虫陳者煎湯飲止虛汗燒存性油調塗諸  
瘍火傷灼

心煩用小麥作飯及粥食

水淘浮起者焙用

汗益汗用浮小麦文武火炒爲末每服二錢半  
水飲下日三服或煎湯代茶飲又方以豬脊唇  
煮熟切片蘸末食亦良

麥麸

主治時疾熱瘡湯火瘡爛撲指傷折瘀血醋炒晉  
貼之和麴作餅止洩痢調中去熱健人以醋拌蒸  
熱袋盛包慰人馬冷失腰脚僵折處止痛散血醋  
蒸慰手足風濕痺痛寒濕脚氣互易至汗出並良

本草 卷之二十一  
末服止虛汗

前方

達氣作痛用醕醋拌麸皮炒熟 箍盛熱之

人身體疼痛及瘡瘍腫爛沾漬或小兒暑月出  
痘瘡潰爛不能著席睡卧者 用來禱盛麸縫合  
藉卧性涼而軟誠妙法也

麵

溫無毒主治補虛養氣助五臟久食實人膚體  
豐滿胃強氣力生食利大腸 小調服治中暑止鼻

子死井中立大抄體之

血出自耳皆出者用白麵入鹽少許冷水  
三錢

嘔血不止醋和麵作彈丸二三十枚以沸湯煮  
澆出投漿水中待溫吞三兩枚噦定卽不用再  
未定至晚再吞

寒痢白色炒麵每以方寸七入粥中食之能瘳  
煩渴不行師不救者

傷米食積白麵一兩白酒麵二丸炒爲末每服二  
白湯調下如傷肉食山楂湯下

癰腫痛卒不下食白麵和醋塗瞼外腫處  
達行脚研成泡者水調生麵塗之

人吹奶水調麵煮糊欲熟卽投無灰酒一盞  
熱飲令人徐徐按之藥行卽瘳

癰不消白麵半斤炒黃醋煮爲糊塗之卽消

麩是麩麵麵洗筋澄出漿粉今人漿衣多

卷之三

瘡瘍發背無名腫毒初發時  
藥石取效如神用隔年小粉愈久者愈佳以鐵  
之初炒至暢久炒則乾成黃黑色冷定研末  
醋調成糊然如黑漆瓮罐收之用時攤紙上剪  
點之卽如冰冷疼痛卽止少頃覺痒乾亦不  
久則腫毒及自消藥力亦盡而脫落甚妙此方  
州紅水庵所傳屢用有驗藥易而功大濟生者  
收藏之

麵効乃大麩與水中揉洗而成者爲素食要物  
食甚良油炒則性熱矣

甘涼無毒主治解熱和中寬中益氣勞熱人宜  
食之

麥苗

辛寒無毒主治除煩悶解時疾狂熱退胸膈熱  
水腸作羹食甚益顏色搗爛絞汁日飲之消酒

痘目黃

本草綱目卷之二

中補虛勞，壯血脈，顏色實，五臟健。

動風氣，寬胸下氣，涼血消積。進食久食，令人輕滑肌膚，髮黑爲麵。勝于小麥無躁熱，平胃止渴，治食療，脹滿。

大麥初熟勿炒食。

附方

食飽煩脹，胆欲卧者，大麥麵熬微香，每白湯羹一寸七佳。

腫毒已破，青大麥去鬚炒暴，花爲末，傳之成疎。

去又傳數次卽愈

麥芽入目大麥者汁洗之卽出

湯火傷灼大麥炒黑研末細調搽之

卒患淋痛大麥三兩煎湯入薑汁蜂蜜代茶飲  
纏喉風食不能下用大麥麵作稀糊令吐以散  
氣

麥芽一名麥芽果蒸熟殼去豆諸種皆水  
芽曝乾去鬚取其中米炒研麯用其功皆主  
城溫無毒主治補脾胃虛開胃和中寬腸下氣  
癥結冷氣去心腹脹滿止霍亂除煩悶消痰飲  
化一切米麵諸果食積能催生落胎好古曰麥  
神麯二藥胃氣虛人宜服之

有積者能消化無積而久服則消人元氣也

附方

快膈進食麥蘖四兩神麴二兩白术橘各皮一  
兩爲末蒸餅丸梧子大每人參湯下三五十丸效

**蕎麥**一名荅麥音翹烏麥又名花蕎

甘平寒無毒主治鍊五臟溼穢降氣寬腸磨積  
消熱除風痛除白濁白帶脾積洩瀉

氣盛有濕熱者宜之若脾胃虛寒人食之則火  
元氣而落鬚眉非所宜矣

男子白濁用蕎麥炒焦爲末雞子白和丸每服五十九鹽湯下日三服

赤白帶下方同上

瘡頭黑凹蕎麥麵煮食之卽發起

湯火傷灼用蕎麥麵炒黃研末水和傅之如神  
肚腹微微作痛出卽瀉瀉亦不多日夜數行若  
蕎麥麵一味作飯連食三四次卽愈蕎麥作餅  
蒸使氣使氣餾烈日暴令開口吞取米仁作之  
謂一名枕與粳同音庚梗乃稻之總名粘者爲

粘者爲粳各處所產種類甚多氣味不能無少異而亦不大相遠也北粳涼南粳溫赤粳熱白粳晚白粳寒新粳熱陳粳涼北方氣寒八九月收方可入藥南方氣熱惟十月晚稻乃可入藥

米甘苦平無毒主治補中益氣溫中和胃氣

胃通血脉和五臟壯筋骨長肌肉好顏色止煩渴止洩合芡實作粥食益精強志聰耳明目者治心痛斷熱毒下痢常食乾粳米飯令人不

本草卷之二十一  
封白沉井底一夜平旦服之有效

卒心氣痛粳米二升水六升煮六七沸服

浙二泔 一名米瀋時珍曰浙音錫洗米也瀋泔  
泔甘汁也第二次者清而可用故曰浙二泔

甘寒無毒主治清熱止煩渴利小便涼血

附方

吐血不止陳紅米泔水溫服一鍾日三次

風熱赤眼以浙二泔時冷調洗肝散菊花散之

一類服之

禾秆

主治解砒毒燒灰新汲水淋汁漬清冷服

當下出

稻蘖一名穀芽用稻以水浸脹候生芽曝乾  
取其中米炒研麵用其功主消導

甘溫無毒主治快脾開胃下氣利中消食化

糯米

甘潤無毒脾之藥也主治止虛寒泄利

時珍曰糯米性溫釀酒則熟熱傷尤甚  
寒者宜之若素有痰熱風病及脾病不能  
之最能發病成積又粘滯難化久食令人身  
筋姪婦及小兒病人最宜忌之

附方

冷浸炒食糯米卽止

老人小便數者糯米作粢糕或丸子夜食亦止其  
溫肺暖脾可驗矣

霍亂煩渴不止糯米三合水五升蜜一合研汁分

服或煮汁服

消渴飲水方同上

三消渴病用糯米炒出白花桑根白皮等分每用一兩水二椀煎汁飲之

下痢禁口糯米一升炒出白花去殼用薑汁拌濕再炒爲末每服一匙湯下三服卽止

久洩食減糯米一升水浸一宿瀝乾慢炒熟研細入懷慶山藥一兩每日清晨用半盞水炒熟吃一錢胡椒末少許以極冰湯調食其效

久服令人清瘦

金匱要略

錢新汲水調下仍吹少許

天皇子

自汗不止糯米小麥麴同炒爲末每服二錢  
下或煮豬肉點食

### 米泔

甘涼無毒主治益氣止煩渴霍亂解毒食之  
消者頓飲一盞卽消

### 附方

煩渴不止糯米泔任意飲之卽定研汁亦可

稷一名穄音祭又名粢音咨黍穀稍梁禾麻菽麥此

一八穀也禮記祭宗廟曰明粢爾雅云黍稷也呂氏春秋云飯之美者有陽山之穄稷熟最早作饭穉爽香美或云后稷教稼穡首種之於稷山縣始名取此

稷米

甘寒無毒脾之穀也主治益氣補不足安中

宜脾涼血解暑

多食發冷病又勿與瓠子同食恐相克也

附方

其麻蕷麥今不相染以稷米爲來頓服之

赤黍曰穀

音門

曰糜

音糜

曰黍曰芑

音起

黑黍

曰秬

音距

一秤二米曰秬

音秬

說文云秬可爲酒

從禾入水爲意也書曰秬鬯

二百則秬之爲酒

已

黍米俗云造酒黃米

甘溫無毒肺之穀也主治益氣補中肺病宜食  
時珍曰黍最粘滯與糯米同性其氣溫暖故功能  
補肺而多食作煩熱緩筋骨絕血脉小兒多食令

文不能行

附方

心痛不瘥四十年者用黍米淘汁溫服隨意  
亦見鵝口瘡嚼黍米濃汁塗之有効

丹黍米卽赤黍米也

甘微寒無毒主治欬逆上氣下氣霍亂止洩痢除  
熱止煩渴止欬嗽

**蜀黍**一名蜀黍又名蘆穄蓋粟木稷穄梁高粱蓋文  
黍稷之類而高大如蘆蕎者種始自蜀故謂蜀黍

米同功

玉蜀黍 一名王高粱

米

芥平無毒主治調中開胃

穀粱

主治小便淋瀝沙石痛不可忍煎湯頻飲

黃粱 白粱 青粱 北之他穀最益脾胃又漢中有枲粱  
粒如粟而皮黑可釀酒

黃粱米

甘平無毒主治益氣和中止霍亂洩痢利小便除煩熱去客風頑痺

附方

霍亂大渴不止多飲則殺人用黃粱米五升水半煮清三升稍稍飲之

白粱米

甘微寒無毒主治益氣除胸膈中客熱移玉臟氣  
安筋骨炊飯食之和中止煩渴

合和服之佳

青梁米

甘微寒無毒主治胃痺熱中消渴健脾止瀉利溼  
洩精利小便益氣補中輕身長年煮粥食之夏月  
食之極爲清涼尤宜病人但味短色惡不如黃白  
粱故人少種之作餳清白勝於餘米

附方

補脾益胃羊肉湯入青梁米葱鹽煮粥食  
脾虛泄痢青梁米半升神麩一合日日煮粥食之

愈

東俗云穀

粟米卽小米

鹹微寒無毒腎之穀也主治養腎氣去脾胃中熱  
益氣治反胃熱痢煮粥食益丹田補虛損開腸胃  
水煮服治熱腹痛及鼻衄爲粉和水濾汁解諸毒  
治霍亂及轉筋入腹陳者苦寒治胃熱消渴利小  
便陳粟乃三五年者尤解煩悶

粟米同杏仁食令人吐

反胃吐食脾腫

半升杵粉水丸梧王大七被毒散人主之  
汁吞下或云納醋中吞之得下便止  
鼻衄不止粟米粉水煮服之

粟泔汁

主治霍亂卒熱心煩渴飲數升立瘥

春杵頭細糠時珍曰凡穀皆有糠此當用粳稻粟  
秫之糠也北方多用杵南方多用碓入藥並同丹  
家言糠火鍊物力倍于常也穀殼屬金糠之性則

熟也

辛甘熱主治卒噎刮取舍之煎湯呷之亦可

附方

膈氣噎寒飲食不下用確翁上細練蜜丸彈子大時時含嚥津液

婦人難產用杵頭糠燒研水服方寸匕卽易產

糓米粟糓也時珍曰有粟黍穀麥豆諸糓皆水浸脹候生芽曝乾去鬚取其半米炒研麵用其功皆主

消導

栗蘖一名栗芽

爲末和脂傅面令皮膚悅澤。靈神散中用之。豐  
溫於麥蘖

有積者能消化無積而久服則消人元氣也。

陳廩米。一名陳倉米。又名老米。時珍曰。有屋曰廩。無屋曰倉。皆官積也。方曰倉圓曰囷。皆私積也。老亦陳也。陳廩米卽粳米久入倉陳赤者。方中多用之。人以作醋。勝于新粳米也。廩米吳人以粟爲良。漢地以粳爲善。北人多用粟。南人多用粳。亦猶吳紵鄭縞貴近賤遠之意。確論其功。粟當居前。諸家註

說不言是粳是粟然二米陳者性皆冷煎煮亦無  
膏膩粉食令人自利其陳倉米煮汁不渾初時氣  
味俱盡故沖淡可以養胃古人多以煮汁煎藥亦  
取其調腸胃利小便去濕熱之功也

鹹酸溫無毒主治補五臟調胃寬中消食多食易  
饑下氣除煩渴澀腸胃止洩調腸胃利小便止渴  
除熱作湯食暖脾去憊氣炊飯食補中益氣堅筋  
骨通血脉起陽道止痢以飯和酢搗封毒腫惡瘡  
豆蔻北人以飯置甕中水浸令酸食之

升麥芽四兩黃連四兩

**菰**

一名茭草又名蔣草按許氏說文菰本作菰從瓜

諸聲也有米謂之雕菰葛洪西京雜記云漢太液

池邊皆是雕胡紫籜綠節蒲叢之類葢菰之有米

者長安人謂之雕胡菰之有首者謂之綠節葭蘆

之未解葉者謂之紫籜也菰生水中葉似蕪荻其

苗有莖梗者謂之菰蔣草又則根盤而厚夏月生

菌琪啖名菰筍三年者中心生白臺如藕狀似小

兒臂而白軟中有黑脈堪啖者名菰手也九月抽  
莖開花如葦結青子細若青麻黃長寸許名菰米  
霜後采之大如茅針皮黑褐色其米甚白而滑膩  
作飯香脆古人所貴故內則云魚宜菰皆水物也  
以爲五飯之一亦可作餅食曹子建七啓云芳菰  
精神謂二草之實可以爲飯也周禮供御乃六穀

九穀之

事

菰米一名茭米又名雕蓬亦名菰水唐韻作菰糊  
即足菰羽草本孫炎註云菰一丘節茭米

甘草根等主治利五臟邪氣。用散面亦白  
蕷亦可黃去煩熱止渴利大便止熱利  
魚爲羹食開胃口解酒毒壓丹石毒鹽  
醋煮食

蒸毒風氣卒心痛

菰之腫類皆極冷不可過食甚不益人惟服全  
人相宜耳

菰手一名茭粑又名蘧蔬音穀麌

甘冷滑無毒主治心胸中浮熱風氣滋人齒  
止渴及小兒水痘

禁食

蒜根

華大寒無毒主治腸胃痛熱消而止小便利  
飲之火燒瘡燒灰和雞子白塗之

五一名芒實者是芒實定半言久田堅今所

之八月採實採根無時煮者無味鹽水煮

本產於秦人酒若生食樂馬齒傳授在

本草中故有此名也

白蘿蔔

人能食之

蒸魚上湯湯

取仁搗先將于于無中無外  
矣亦可磨取之凡用每

去之而米用亦有更復  
亦添米爲末等分爲

毫可資談說耳

附方

言苡仁飯治冷氣腰痛  
答寒麥飯乃佳此處之良方也

壹剪一束治久寒腰痛

鷄半身不遂

朱砂散治久寒腰痛

肺損咳嗽

五補肺氣

喉卒癰腫吞薏苡仁二枚

根

甘微寒無毒主治卒心腹煩滿及胸脇痛者  
汁服三升乃定煮汁糜食甚香去蛇蟲大効  
和酒服治黃疸有効煮服墮胎

附方

經水不通薏苡根一兩水煎服之不過數服

葉

主治作飲氣香益中空膈暑月煎飲暖胃益氣

附方

初生小兒用薏苡葉水煮浴之無病

大豆一名赤俗作菽豆米皆莢穀之總稱也角曰棗葉曰藿莖曰萁廣雅云大豆菽也小豆荅也全處種之有黑白黃褐青斑數色黑者名烏豆藥緊小者爲雄用之尤佳餘者可作腐等生炒食極熟煮食甚寒作豉極冷造醬及生平一體之中用之數變修治末服之

古今良方稱大解  
加甘草其驗乃奇如此之事不可不重

### 黑大豆

甘平無毒主治調中下氣通關脉逐水脹除  
熱癰傷中淋露下瘀血散五臟結積內寒腎  
水下氣中風脚弱產後諸疾制諸風熱活血  
飲解百藥毒及蠱毒入藥治下痢腰痛衝漕治  
瘻及陰毒腹痛牛膽貯之止消渴同甘草煮浸  
去一切熱毒氣治風毒脚氣炒黑熟投酒中飲之

治風痺癱緩口噤產後頭風食罷生吞半兩去  
胸煩熱熱風恍惚明目鎮心溫補久服好顏色  
白不老生研塗癱腫煮和飯搗塗一切毒腫瘡  
女人陰腫以綿裹納之

服草麻子者忌炒豆犯之脹滿服厚朴者亦已  
之動氣也食大豆黃屑忌豬肉小兒以炒豆粉  
豬肉同食十歲已上不畏也

附方

火燒大豆黑豆飲之易愈無斑

牙齒癆瘍黑豆煮酒頻頻漱之良

豆蘖一名大豆黃卷黑大豆爲蘖芽生五寸叢  
乾之名爲黃卷用之熬過服食所須

甘平無毒主治濕痺筋攣膝痛五臟不足胃氣結  
績胃中積熱益氣止痛消水病脹滿宜腎去黑斷  
潤肌膚皮毛破婦人惡血

責大豆

甘溫無毒主治寬中下利大腸消水脹腫毒研末

熟水和塗豆後癰

多食壅氣生痰動嗽令人身重發面黃瘡疥

豆油

辛甘熱微毒主治塗瘡疥解髮腫

赤小豆

一名赤豆又名紅豆亦名荅案詩云黍稷之

梁禾麻菽麥此卽八穀也此豆以緊小而赤黓色者入藥其稍大而鮮紅淡紅色者並不治病皆可煮可炒可作粥飯餽餡並良也

酸平無毒主治熱毒散惡血除煩滿等症

風治產難下胞衣通乳汁解小麥熟毒煮雞  
病和鯉魚煮食甚治脚氣和鯉魚鱠魚鯽魚黃  
雞煮食並能利水消腫

久食令人肌瘦身重同魚鮮食成消渴作醬同  
食成口瘡

附方

辟禳瘟疫元旦以赤小豆煮熟入蜜和汁空心舉  
家食之一年無疾

纂要曰共工氏有不才子以冬至日死爲疫鬼而

畏赤小豆故于是日作赤小豆粥厭之

葉

主治去煩熱止小便數煮食明日

附方

小便頻數赤小豆葉一斤入豉汁中煮和作羹食之

芽

主治妊娠數月經水時來名曰漏胎或因房室多日傷胎用此爲末溫酒服方寸匕日三得効乃

品真濟世之良穀也時珍曰綠豆肉平皮寒療解  
似與小豆同功無久服枯人之忌按夷堅志云有  
人服附子酒多頭腫如斗唇裂血流急求綠豆黑  
豆各數合嚼食并煎湯飲之乃解也

甘寒無毒主治補益元氣和調五臟安精神行十二  
經脉去浮風潤皮膚厚腸胃治頭風頭痛寒熱  
熱中除吐逆止泄痢卒澼利小便脹滿腫脹及治  
痘毒煮食消腫下氣壓熱解毒宜常食之作枕明  
目煮汁止消渴生研連皮絞汁新汲水服解丹毒

煩熱風癆藥石發動熱氣奔豚金石砒霜草木牛  
馬一切諸毒用之宜連皮去皮則令人少壅氣合  
鯉魚鱗食久則令人肝黃成渴病作涼粉偏于冷  
耳

附方

心氣疼痛綠豆二十二粒胡椒十四粒同研白湯  
調服卽止

本平無毒主治解毒熱毒利三焦

時珍曰但受濕熱鬱浥之氣故頗發瘡動氣與豆之性稍有不同

豆葉

主治癰亂生下絞汁和醋少許溫服

豌豆一名胡豆又名回回豆亦名螺旋豆時珍曰胡豆豌豆也此豆屬土故其所主病多係脾胃元時飲

膳每用此豆擣去皮同羊肉治食云補中益氣今爲日用之物而唐宋本草見遺可謂缺典矣

甘平無毒主治寒熱熱中調營衛益中平氣除吐逆止泄痢澁下利小便腹脹滿煮食消渴下乳汁煮飲殺鬼毒心病解乳石毒發研末塗癰腫痘瘡作潔豆去黴令人面光澤

多食發氣病

豇豆

江絳二音一名躉  
譙音絳雙此豆有紅白二色

紫時充菜老則收子此豆可菜可果可穀可用最

鼠李子

不宜多食

扁豆

音扁一  
一名沿蕪豆又名蛾眉豆時珍曰扁豆者

扁莢形扁也

白扁豆其殼硬其子充實白而微黃其氣腥香  
性溫平得乎中和脾之穀也入太陰氣分通利三  
焦能化清降濁故專治中宮之病消暑除熱而無  
毒也其軟殼及黑鵲色赤斑者其性微涼可以  
食亦調脾胃

甘微溫無毒主治和中下氣補五臟暖脾胃主  
逆行風氣止瀉痢消暑除濕熱止消渴久服頭不  
白及治女子帶下解酒毒河豚魚毒研末和醋服  
治霍亂吐利生嚼及煮汁飲解一切草木毒取熟  
兒用取硬殼白扁豆子連皮炒熟入藥亦有水浸  
去皮及生用者各從本方

附方

霍亂轉筋白扁豆爲末醋和服

惡瘡癩并作痛以扁豆擣封瘡口

主治女人赤白帶下，乾末水飲服之。崩帶病，利之泄痢作餛飩食之中，一切藥毒垂死者，擣水浸之功同扁豆。

附方

一切泄痢白扁豆花正開者擇淨勿洗，以滾湯過和小猪脊脂肉一條，葱一根，胡椒七粒，醬汁一匙，就以滷豆花汁和麪包作小餛飩，炙熟食之。

葉

主治霍亂吐下不止，生擣一把，入少醋絞汁，吐利後轉筋立瘥，醋炙研服，治瘕疾。

造釀

大豆豉諸大豆皆可爲之許慎說文謂豉爲配鹽豉者調和五味可甘嗜也以黑豆者入藥出襄陽錢塘者香美而濃入藥取中心者佳有淡豉鹹豉治病多用淡豉汁及鹹者當隨方法其豉心乃合時取其中心者非剥皮取心也又有麸豉爪豉豉諸品皆可爲之粗充食品不入藥用也時珍陶說康伯豉法見博物志云原出升平國

庚伯亦傳此法之

則止血炒熟又能止渴之藥也方  
具于後

淡豆豉 用大黑豆二三斗六月內淘淨水浸一宿瀝乾蒸熟取出攤席上候微溫薄覆每三日一看候黃衣上遍不可太過取晒簸淨以水拌乾濕得所以汁出指間爲準安甕中築實桑葉蓋厚三寸密封泥於日中晒七日取出曝一時又以米拌入甕如此七次再蒸過攤去火氣甕收築封卽成矣

鹹豆豉 用大黑豆一斗煮熟白麵爲衣發七日

採去白麵用杏仁五升煮熟去皮水淘四五次花生  
椒半斤苦瓜晒去水氣每豆一升入瓜一斤鹽六  
兩蓋五斤切碎將後藥應爲末者爲末同拌勻貯  
于磁瓶中以泥封口按東南西北輪轉晒二十二

日

砂仁三兩

箇桂皮三兩

大茴香一兩

小茴香八兩

陳皮八兩

白豆蔻一兩五錢

之等量

草果四錢

獨活一錢

以上八味共

上用香薑掩蓋待生  
去蒿穰極乾去淨裁衣每豆一升川生甜瓜一  
斤切葵子大塊每瓜一斤用鹽三兩五錢醃二日  
醃出瓜水畱用復將瓜塊裝入布袋內用大石壓  
之大約一夜以乾爲度將瓜塊同後藥料用前  
瓜水酌量拌勻入蟬緊按離蟬口一尊許將藥料  
末量畱二三兩封口瓜水亦畱數茶鍾澆下封閉  
其蟬四面書東西南北四字每日輪晒至二三  
七倒過蟬底又晒至七七可食

甘草八兩

末

草豆蔻四兩

末

肉豆蔻三兩

末

砂仁六兩

末

薄荷一把

去梗切絲

乾薑八兩

半絲半末

大茴香二兩

小茴香二兩

橘皮六兩

絲

陳皮四兩

末

箇桂皮二兩

末

花椒揀淨去子八兩

半整

杏仁煮熟去皮水浸三四日晒乾六斤

稀豆豉 大青豆一斗煮熟用麥麵二斗拌勻裝  
紙袋內釣在陰處七日取下刮粹晒乾每服用鹽

勸使內無塊方將後藥俱入甕內照前晒過看有  
紅色點子磁瓶內用泥封口按東南西北輪轉器  
之

草豆蔻一兩 白豆蔻一兩 砂仁五錢

大茴香五錢 小茴香五錢 花椒一兩

胡椒一兩以上七味共爲末用

鮮薑一斤半切絲晒乾用

杏仁一升煮熟去皮用

豉汁 十月至正月用好豉三年清麻油熬令稠

斷以一升拌豉蒸過攤冷酒乾拌再蒸凡三遍以  
白鹽一升搗和以湯淋汁三四斗入淨金下椒薑  
葱同煎三分減一貯于不津器中香美絕勝也

陝州豉汁

甚勝常豉既潔淨且精也用大豆爲鹽

蒸每一斗加鹽四升椒四兩春三日夏二日卽成

半熟加生薑五兩

淡豉

苦寒無毒主治傷寒頭痛寒熱溫毒發斑嘔逆  
氣急心虛煩躁滿悶虛勞喘吸時疾熱病發汗

葛爲丸服治寒熱風胸中生瘡研塗陰莖生瘡  
諸疾應用藥料書後

草一一名國老

甘平無毒主治五臟六肺寒熱邪氣堅筋骨長  
肉倍氣力溫中下氣脹滿短氣傷臟嗽止渴  
中冷痛補益腎氣內傷安魂定魄補五勞七傷  
切虛損健忘通九竅利百脉益精養氣補脾胃潤  
肺吐肺痿之膿血消五發之瘡疽久服輕身延年  
治婦人血滯腰痛通經脉利血氣凡虛而多熱者

功用之及解小兒胎毒驚癇降火止痛生用瀉火  
熟用散表寒去咽痛除邪熱緩正氣解百藥毒  
爲九土之精安和七十二種石一千二百種草以  
其調和有功效故有國老之稱

草果仁卽草豆蔻仁

辛溫清無毒主治調中補胃健脾消食去客寒  
中下氣瘴癰霍亂寒瘞傷暑嘔吐瀉痢噎膈反胃  
痞滿吐酸痰飲積聚心腹胃痛一切冷氣及  
通經帶下除寒濕開鬱破氣去口臭

胃弱虛逆不食用草豆蔻仁二枚高良薑半兩  
一盞煮取汁入生薑汁半合和白麵作機刀以  
內臍汁煮熟空心食之

脾痛脹滿草果仁仁箇酒煎服之

自豆蔻仁

辛大溫無毒主治理元氣收脫氣益脾胃補肺氣  
散肺中滯氣及積冷氣寬膈進食噎膈反胃吐  
消穀下氣除癰疾寒熱去白睛翳膜解酒毒

附方

胃冷惡心凡食卽欲吐用白豆蔻子三枚擣細好酒一盞溫服併飲數服佳

脾虛反胃白豆蔻縮砂二各二兩丁香一兩陳廩米一升黃土炒焦去土研細薑汁和丸梧子大每服百丸薑湯下

人忽惡心多嚼白豆蔻子最佳

肉豆蔻一名肉果宋奭曰肉豆蔻對草豆蔻爲名去殼只用肉肉油色者佳枯而瘦虛者劣時珍曰蔻實皆似豆蔻而無核故名

酒毒消皮外絡下氣小兒乳霍暖脾胃腿大腸

附方

老人虛瀉肉豆蔻三錢麵裹煨熟去麵研乳香一  
兩爲末陳米粉糊丸梧子大每服五七十丸米飲  
下

冷痢腹痛不能食者肉豆蔻一兩去皮醋和麵  
煨擣末每服一錢粥飲調下

縮砂仁

辛溫清無毒主治脾胃補肺醒脾養胃益腎理二

氣通滯氣溫暖肝腎散寒飲脹痞噎膈嘔吐虛勞損歎嗽霍亂轉筋一切瀉痢宿食不消腹中痛冷氣痛和中行氣下氣上氣治婦女崩中止安胎除咽喉口齒浮熱奔豚鬼疰驚癇邪氣化鐵骨硬能起酒香味

附方

冷滑下痢不禁虛羸用縮砂仁熬爲末以羊子薄切摻之瓦上焙乾爲末入乾薑末等分飯

子大每服四十九白湯下日二服○又方

大便瀉血三代相傳者  
砂仁爲末  
錢以愈爲度

上氣欬逆砂仁洗淨炒研生薑連皮等分  
酒食遠泡服

魚骨入咽縮砂仁草等分爲末綿裹含之鹽引等  
隨痰出矣

誤吞諸物金銀銅錢等物不化者濃煎縮砂湯  
之卽下

一切食毒縮砂仁末水服一二錢

薄荷

一名荅蘭

音跋活

莖葉辛溫無毒主治賁風傷寒頭痛發汗惡氣心  
腹脹滿霍亂宿食不消下氣通利關節發毒汗舌  
憤氣破血止痢傷風頭腦風中風失音吐沫瘧癆  
目除風熱療陰陽毒利咽喉口齒諸病癰瘍瘻瘍  
風癩癰瘍及小兒風涎作菜久食却醫鼻  
邪毒除勞氣令人口氣香潔煮汁服之發汗大無  
勞乏亦堪生食杵汁服去心臟風熱含漱去舌瘍  
語澀按葉塞鼻止衄血塗蜂蟄蛇傷

大每粒一丸白沙糖和之亦可

眼弦赤爛薄荷以生薑片浸一宿晒乾爲末每

一錢沸湯炮洗

血痢不止薄荷葉煎湯常服

蜂蠍蟄傷薄荷葉搘貼之

紫蘇一名赤蘇又名桂荳

莖葉辛溫無毒主治補中益氣通心經益脾胃  
心腹脹滿霍亂轉筋開胃下食止脚氣通大小便  
除寒熱一切冷氣解肌發表散風寒行氣寬中消

痰利肺和血溫中止痛定喘安胎煮飲尤勝與橘皮相宜下氣除寒中其子尤良以茱生食作羹殺一切魚蟹肉毒治蛇犬傷

但氣香而辛其能散氣脾胃寒人多食恐致滑瀉

附方

感寒上氣蘇葉三兩橘皮四兩酒四升煮一過

分再服

霍亂脹滿未得吐下用生麻擣汁一盞

汁亦可

卷之二  
十七  
禁傷損紫蘇搗傅之瘡口自合

損血出不止以陳紫蘇葉蘸所出血授爛傅之  
血不作膿且愈後無瘢甚妙也

子與葉同功

辛溫無毒主治下氣除寒溫中上氣欬逆冷氣及  
腰腳中濕氣風結氣調中益五臟止霍亂嘔吐反  
胃補虛勞肥健人利大小便破癥結消五膈消瘀  
止嗽潤心肺治肺氣喘急治風順氣利膈寬腸解

魚蟹毒研汁煮粥長食令人肥白身香

附方

順氣利腸紫蘇子麻子仁等分研爛水濾取汁同米煮粥食之

治風順氣利腸寬中用紫蘇子一升微炒杵以生絹袋盛于三斗清酒中浸三宿少少飲之

夢中失精蘇子一升熬杵研末酒服方寸七日再服

上氣欬逆紫蘇子入水研濾汁同粳米煮粥食之

生蠶時珍曰蓋其性寒之藥也初生時諸疾皆可服

日故秋熱則無薑呂氏春秋云和之美者有楊柳  
之薑楊柳地名在西蜀生薑之川有四制半夏厚  
朴之毒一也發散風寒二也與棗同用辛溫益脾  
胃元氣溫中去濕三也與芍藥同用溫經散寒四  
也孫真人云薑爲嘔家聖藥蓋辛以散之嘔乃氣  
逆不散此藥行陽而散氣也案廣心法附餘云凡  
中風中暑中氣中毒中惡乾霍亂一切卒暴之病  
用薑汁與童尿服立可解散蓋薑能開痰下氣童  
尿降火也

辛微溫無毒要熱則去皮要冷則留皮主治益脾  
胃散煩悶開胃氣歸五臟除風邪寒熱傷寒頭痛  
鼻塞欬逆上氣止嘔吐去痰下氣驗壯熱治癰瘍  
脹滿冷痢腹痛轉筋破血去冷氣去冰氣滿身  
嗽時疾久服通神明去胸中臭氣狐臭殺腹痛  
蟲解菌蕈諸物毒和半夏主心下急痛和杏仁  
下急痛氣實心胸膈膚冷熱氣神

譜錄亦有秋葉大人天年之譜相感志  
內入蟬蛻雖之薑無筋亦物性有所伏耶

附方

救賜薑茶治痢方以生薑切細和好茶一兩五錢任  
意呷之便瘥若是熱痢畱薑皮治痢去薑皮崔元  
亮集驗方

冷痢不止生薑煨研爲末共乾薑末等分以醋和

麵作餛飩先以水煮又以清飲煮過停冷吞二七  
枚以粥送下日一度

瘧疾寒熱脾胃聚痰發爲寒熱生薑四兩擣自然  
汁一酒盃露一夜于發日五更面北立飲卽止未  
止再服

欬嗽不止生薑五兩傷半升火煎熟食盡痊假待  
御用之有効

小兒欬嗽生薑四兩煎湯浴之  
暴逆氣上嚼薑兩三斤屢効

溼呻之又殺腹內長蟲

心痞嘔噦心下痞堅生薑八兩水三升煮一升半  
夏五合洗水五升煮一升取汁同煮一升半分再  
服

反胃羸弱母薑二斤擣汁作粥食○又方生薑切  
片麻油煎過爲末軟棗蘸末嚼嚥

霍亂轉筋入腹欲死生薑三兩擣酒一升煮三兩  
沸服仍以薑擣貼痛處

霍亂腹脹不得吐下用生薑一斤水七升煮二升

分三服

胸脇滿痛凡心胸脇下有邪氣結實硬痛脹滿者  
生薑一斤擣渣留汁慢炒待潤以絹包于患處款  
款慰之冷再以汁炒再慰良久豁然寬快也

暴赤眼腫用古銅錢刮薑取汁于錢唇點之淚出  
余日點明日愈勿疑

風客熱目亦睛痛腫者臘月取生薑擣絞汁塗

不勞分每以少許沸湯泡溫

牙齦疼痛者老生薑瓦煆火燒  
夜坤吟用之即愈

喉瘡毒氣生薑二斤搗汁  
五令煎

日五服

跌撲傷損薑汁和酒調生麵貼之  
至熱入耳薑汁少許滴之

兩耳凍瘡生薑自然汁熬膏塗

瘡潰初起生薑一塊炭火灸一層爲之

鹽水

本草 卷之二  
花生薑

三治治嗽溫中治脹滿霍亂不止  
病人虛而冷宜加之肺經氣分之藥  
和酒服治偏風

薑皮

辛涼無毒主治消浮腫腹脹痞滿利

薑葉

辛溫無毒主治食繪成癥擣汁飲酒消

一名白薑莖莖今惟山陽海東有之

卷之二  
成頌曰造法參

乾薑以漢溫池州者爲良

法曲時珍曰乾薑以毋薑造之

素者造以白淨結實者爲良故人呼爲白

艾曰均薑凡入藥並宜炮用元素曰乾薑大辛

熱陽中之陽其用有四通心助陽一也去陰寒

寒痼冷二也發諸經之寒氣三也治感寒腹滿

也李杲曰乾薑生辛炮苦陽也生則逐寒邪而

表炮則除胃冷而守中多用則耗散元氣辛燥

之是壯火食氣故也須以生甘草緩之辛熱  
裏寒同五味子用以溫肺同人參用以溫胃  
辛溫無毒主治胸滿欬逆上氣溫中止血出  
氣滲癰腸澼下痢生者尤良寒冷腹痛中風  
寒溝風邪諸毒皮膚間結氣止唾血腰腎寒  
冷氣破血去風通四肢關節開五臟六腑宣  
肺去風毒冷瘻夜多小便消渴下氣治轉篩  
反胃乾嘔瘀血撲損止鼻紅解冷熱毒開胃  
食治心下寒痞目睛久亦

清外微言李編不可食乾薑置盆加冰酒

而辛散故也

### 附方

脾胃虛冷不下食傾久羸弱成瘵者用溫州白  
薑紫水煮透取出焙乾搗末陳廩米煮粥飲丸  
子大每服三五十丸白湯下其効如神

脾胃虛弱飲食減少易傷難化無力肌瘦用乾  
薑四兩以白餠切塊水浴過入鐵鉗溶化和  
梧子大每空心米飲下三十丸

心胸冷痛暖胃消痰一薑丸用乾薑高良薑等

炮研末糊丸梧子大每食後諸皮湯下三十丸  
心氣卒痛乾薑末米飲服一錢

中寒水瀉乾薑炮研末粥飲服二錢卽効

寒疝青色乾薑切大豆大每米飲服六七枚日

夜一累用得効

血痢不止乾薑燒黑存性放冷爲末每服一

粒下神妙

房寒癥疾乾薑高良薑等分爲末每服一

粒

○

乾薑爲末，每服一錢，水調服之。

牙痛，白薑末水調貼足心，甚妙。

目癰，小兒令人嚼母薑以舌日舐六七次，以

度

牙痛，止川薑炮川椒等分爲末，摻之。

蛇蠍，人乾薑雄黃等分爲末，袋盛佩之，遇螫，以傅之便定。

大商查節懷香時珍曰茴香宿根深冬生苗作叢  
莖絲葉五六月開花如蛇牀花而色黃結子大  
麥粒輕而有細稜俗呼爲大茴香今惟以寧夏  
者第一其他處小者謂之小茴香自番舶來者實  
大如柏實裂成八瓣一瓣一核大如豆黃褐色有  
仁味更甜俗呼舶茴香又曰八角茴香廣西左右  
江峒中亦有之形色與中國茴香迥別但氣味同  
爾北人得之咀嚼薦酒

吐乾濕脚氣督勞癩疝陰弦開冒下氣及治兒

傷

時珍曰小茴香性平理氣開胃夏月祛蠅辟臭食  
料宜之大茴香性熱多食傷目發瘡食料不宜過

用

附方

去餘丸用茴香二兩連皮生薑四兩同入培  
淹一伏時慢火炒之入鹽一兩爲末糊丸梧子大  
每服三五十丸空心鹽酒下此方本治脾胃虛寒

病茴香得鹽則引人腎經發出邪氣腎不受邪全不生也亦治小腸疝氣有効

羸弱進食茴香二兩生薑四兩同擣勻入淨器內  
濕紙蓋一宿次以銀石器中文武火炒黃焦爲末  
酒糊丸梧子大每服十丸至二十五丸溫酒下

大小便閉鼓脹氣促八角茴香七個大麻仁半兩  
爲末生葱白三七根同研煎湯調五苓散末服之  
四一服

後續數茴香不以多少淘淨入鹽少許炒

爲末每食前酒服二錢

疝氣入腎茴香炒作二包更換熨之

小腸氣墜用八角茴香小茴香各三錢乳香吳

木服取汗○又方治小腸疝氣痛不可忍用大茴

香荔枝核炒黑各等分研末每服一錢溫酒調下

○又方用大茴香一兩花椒五錢炒研每酒服一

錢

膀胱疝痛用舶茴香杏仁各一兩葱白焙乾五錢  
爲末每酒服二錢嚼胡桃送下○又方治疝氣

胱小腸痛用茴香鹽炒晚蠶沙鹽炒等分爲末  
蜜丸彈子大每服一丸溫酒嚼下

疝氣偏墜大茴香末一兩小茴香末一兩用牙着  
尿胞一個連尿入二末于內繫定罐內以酒煮爛  
連胞擣丸如梧子大每服五十丸白湯下仙方也

莖葉

辛平無毒主治卒惡心腹中不安煮食小腸氣卒  
腎氣衝脇如刀刺痛喘息不得生擣汁一合投熱  
酒一合和服

善滋食味多食無損

苗

辛溫無毒主治下氣利膈

子

辛溫無毒主治健脾開胃氣溫腸補水臟治曉寒  
腎氣壯筋骨滋食味殺魚肉毒及治小兒氣短  
亂嘔逆腹冷不下食兩肋痞滿

附方

脇下刺痛小茴香一兩炒熟殼五錢炒爲末

卷之二  
服二錢鹽酒調服神効

閃挫腰痛荳蘿作末酒服二錢七

牙齒疼痛舶上蔴蘿蕪臺子白芥子等分研末  
中含水隨左右噙鼻神効

杏實

酸熱有小毒生食多渴等證主治暑脯食止渴  
冷熱毒心之果心病宜久服之

扁鵲曰多食動宿食七八日眉頭眉落源曰

卷之二 氣管 痰氣 氣產乳金瘡寒心毒

瀉心下煩熱風氣往來時行頭痛解肌消心下  
溼痛治腹痺不通發汗主溫病肺氣嗽嗽端壅  
肺熱治上焦風燥利胸膈氣道潤大腸氣秘  
殺狗毒解錫毒治諸瘡疥消肺去頭面諸風  
炮入天門冬煎潤心肺和飴作湯潤聲氣

附方

欬逆上氣不拘大人小兒以杏仁三升去皮尖  
黃砂膏入蜜一升杵熟每食前含之嗽汁

卒不小便杏仁二七枚去皮尖炒黃研末米飲服之

花椒

爾雅云櫟大椒郭璞注云椒叢生實大者爲

也詩唐風云椒聊之實繁衍盈升陸機疏義云

樹似茱萸有針刺葉堅而滑澤味亦辛香蜀人

茶吳人作茗皆以其葉合煮爲香今成臯諸山

竹葉椒其木亦如蜀椒小毒熟不中合藥也可

飲食中及蒸雞豚用

辛溫有毒主治除風邪氣溫中去寒涼上氣參之

胡椒恭曰

## 辛辣

辛大溫無毒王治下氣溫中去痰除臟腑中風寒  
去胃口虛冷氣宿食不消霍亂氣逆心腹卒癥冷  
氣上衝調五臟壯腎氣治冷痢殺一切魚肉蟄蟲

## 毒

多食損肺令人吐血及走氣助火昏目發瘡熱

人尤宜忌之惟綠豆制蜜水

## 亂

## 附方

赤白下痢胡椒綠豆各一歲一粒爲漠糊丸  
大紅用生薑白用米湯下

**陳皮**一名黃橘皮又名紅皮弘景曰橘皮療氣大  
以東橘爲好西江者不如須陳久者爲良好古  
橘皮以色紅日久者爲佳故曰紅皮陳皮去白  
曰橘紅也

苦辛溫無毒主治胸中瘕熱逆氣利水穀清痰  
治上氣欬嗽開胃玉氣痢破癥瘕痃癖解魚蟹

久服去寒下氣通神

考用橘皮四兩生薑一兩水二升煎一升徐徐呷之卽止

痰胃吐食真橘皮以日照西壁土炒香爲末無鹽三錢生薑三片棗肉一枚水二鍾煎一鍾溫服卒然食噎橘皮一兩湯浸去瓢焙爲末以米一大盞煎半盞熱服

經年氣嗽橘皮神麴生薑燒乾等分爲末蒸餅和丸梧子大每服三五十丸食後夜卧各一服有人患此服之兼舊患膀胱氣皆愈也

化食消痰胸中熱氣用橘皮半兩微蒸爲末米

代茶細呷

大腸閟塞陳皮連白酒煮焙研末每溫酒服二錢  
小兒疳瘦久服消食和氣長肌肉用陳橘皮一錢  
貢蓮以米泔水浸一日一兩半研末入麝三分  
用猪膽盛藥以漿水煮取出用粟米飯和丸綠豆  
大每服一二十九米飲下

桂音奢筒桂又名小桂恭曰箇者竹名此桂嫩  
易卷如筒卽古所用箇往也箇侶箇字後人誤

卷三月七月采

辛溫無毒主治百病養精神和顏色爲諸藥先  
通使久服輕身不老而生光華媚好常如童子  
以上十六味俱是豆豉藥料

豆粉

甘涼平無毒主治解諸熱益氣酒食諸毒狐瘍  
毒治發背癰疽瘡腫及湯火傷灼新水調服治

亂轉筋

脾胃虛人不可多食

內方

霍亂吐利綠豆粉白糖各三兩新汲水調服卽愈  
暑氣嘔吐綠豆粉三錢胭脂半錢研勻新汲水調  
下一服立止

暑燒酒毒綠豆粉盜皮多食之卽解

解砒石毒綠豆粉蜜水石等分以藍根汁調服三  
五錢

諸藥毒死心頭尚溫者用綠豆粉新汲水調服  
瘧瘧濕爛不結痧死者用乾粉撲之

磑碎濾去滓煎成以鹽鹵汁或止瀉葉或酸漿  
澱就金收之又有入缸內以石膏末收大抵得  
苦酸辛之物皆可收斂耳其面上凝結者揭取要  
乾名豆腐皮入饌甚佳也按延壽書云有人好食  
豆腐中毒醫不能治作腐家言萊菔入湯中則腐  
不成遂以萊菔湯下藥而愈

甘鹹寒有小毒主治寃中益氣和脾胃消瘀滿下  
大腸濁氣清熱散血

寒而動氣發腎氣瘡疥頭風杏仁可解大抵有月

急有人汗尤宜慎之

附方

休息久痢白豆腐醋煎食之卽愈

燒酒醉死心頭熱者用熟豆腐細切片遍身貼之  
冷卽換之甦省乃止

神龜時珍曰昔人用麴多是造酒之麴後醫乃造神  
麴專以供藥力更勝之益取諸神聚會之日造之  
故得神名其麴陽中之也入足陽明經凡用

大黃以助土氣生用

真氣就用能

自然汁三升赤小豆末杏仁泥各三升蒼耳自然汁野蓼自然汁各三升以配白虎青龍朱雀玄武勾陳螣蛇六神用汁和麯豆杏仁作餅麻葉或楮葉包晉如造醬黃法待生黃衣晒收之

甘辛溫無毒主治健脾暖胃養胃氣化水穀宿食癥結積滯消食下氣除痰逆霍亂泄痢脹滿

附方

閃挫腰痛用神麴煅過淬酒溫服有効

婦人產後欲回乳者神麴炒研酒服二錢日二劑

止甚驗

食積心痛用陳神麴一塊燒紅淬酒三大碗服之  
**醬**時珍曰醬者將也麵醬有大麥小麥甜醬麴醬之屬豆醬有大豆小豆豌豆及豆油之屬醬多以豆作純麥者少當以豆醬入藥陳久者彌好也宗奭曰聖人不得醬不食意欲五味和五臟悅而受之此亦安樂之一端也

鹹冷痢無毒王治除熱止煩滿及百藥毒及

魚肉菜蔬蕈毒并治蛇蟲咬等

兒多食發生痰氣

附方

大便不通醬汁灌入下部効

中砒毒新汲水調醬服卽解

飛蟻蠅蟲入耳醬汁灌之卽出

湯火傷肉未成瘡者醬塗之効

一名酢又名醯酢音醋醯音兮時珍曰醋指之

諸鹽食毒也有米醋麥醋麴醋糠醋糱醋鷄醋

醋葡萄大棗蓼莢等諸雜果醋惟米醋比諸醋

驥二三年者入藥以穀氣全也故勝諸醋餘止  
蠅不可入藥也大麥醋良產婦房中常以火炭  
醋氣爲佳酸益血也大抵用醋無非取其發疾  
義而又有散瘀解毒之功或云醋能少飲辟寒

酒

米醋

酸苦溫無毒主治下氣除煩消癰腫散瘀血水  
治黃疸黃汗理諸藥消毒殺惡邪毒及一切魚肉  
癰毒治婦人心痛血氣并症後血運除癰塊多

口瘡調大黃末塗腫毒煎生大黃服治痃癖甚良  
多食損胃損筋骨肌臟令人無顏色傷脾肉脢而  
舌揭醋發諸藥不可同食服茯苓丹參人不可食  
王戰自幼不食醋年踰八十猶能傳神也

附方

霍亂吐利鹽醋煎服甚良

出汗不滴瘦却腰脚并耳聾者米醋浸荆三稜夏  
西日冬六日爲末醋湯調下二錢卽瘥

舌腫不消以醋和金底墨厚傅舌之上下脫則更

集解更節消

牙齒疼痛大醋煮枸杞子皮一升取半升含漱卽差

毒疽不潰醋和雀屎如小豆大傅瘡頭上卽穿  
毒蟲入耳凡百節蚰蜒蟻入耳以醋注入起

食雞子毒飲醋少許卽消

中虺至毒飲醋得吐卽愈不可飲水

惡火傷熱卽以酸醋淋洗并以醋潤之

燒熟服之不過三次勿食

元不下月未足者大豆煮醋服三

未下再服

腹衣不下腹滿則殺人以水入醋少許

戰國策云帝女儀狄造酒進之于禹說文二

造酒卽杜康也然本草已著消名素問亦有之

則酒自黃帝始非儀狄矣秫黍粳糯粟蜜葡萄

巴皆可造之凡好酒欲熟時皆能候風潮而轉此

是合陰陽也諸酒醇醨不同惟米酒清美者入藥

時珍曰酒天之美祿也又就也所以就人之善惡  
也少飲則和血行氣壯神禦寒消愁遣興邵堯夫  
詩云美酒飲教微醉後此得飲酒之妙所謂醉守  
趣壺中天者也好古曰酒能引諸經味之辛者散  
散苦者能下淡者則利小便甘者能居中而緩  
爲導引可以通行一身之表醇酒理宜冷飲有三  
益焉過于肺入于胃然後微溫肺得溫中之意可  
以補氣次得寒中之溫可以養胃冷酒行遲傳之  
以漸人不得恣飲也大寒凝海惟酒不冰明其性

人空腹空腹者死飽食者病飲酒者健此酒勢勝  
惡勝于作食之効也

米酒

苦甘辛大熱有毒主治通血脉厚腸胃潤皮膚養  
脾氣扶肝除風下氣散濕氣消憂發怒宣言暢意  
行藥勢殺百邪惡毒氣解馬肉桐油毒丹石發動  
諸病熱飲之甚良

不可過飲

附方

驚怖卒死溫酒灌之卽醒

鬼擊諸病卒然著力如刀刺狀胸腹內切痛不可抑按或吐血鼻血下血一名鬼排以醇酒吹兩鼻

內良

馬氣入瘡或馬汗馬毛入瘡皆致腫痛煩熱入瘡則殺人多飲醇酒至醉愈妙

老酒臘月釀造者可經數十年不壞

五倍和血酒  
治婦人癆寒

又飲之治聲時珍曰俗傳社酒治聲喉有之  
翁今日沒心情爲寄治聲酒一瓶之細

薏苡仁酒

主治去風濕強筋骨用絕好薏苡仁熟  
麴米釀酒或袋盛煮酒飲

天門冬酒

主治潤五臟和血脉久服除五勞七傷癩癰惡寒  
常令酒氣相接勿令大醉忌生冷十日當出風寒  
毒氣三十日乃已五十日不知風吹也冬月用天

門冬去心煮汁同麴米釀成初熟微酸久乃味濃

菊花酒

主治頭風明耳目去瘡痏消百病用甘菊花蓮子同麴米釀酒或加地黃當歸枸杞諸藥亦佳

桑椹酒

主治補五臟明眼目治水腫不下則滯下之症入腹中則十無一活用桑椹搗汁煎過同麴米常釀酒飲

桑椹酒

代之亦良

通串

主治偏風中惡症。忤心腹冷痛以薑浸酒暖服。  
燒節止。

炒酒

主治消食和中下氣。止心腹痛。砂仁炒研袋盛。浸  
酒煮飲。

細酒

元旦飲之辟一切疫癘不正之氣。除久以椒三七。

東向側柏葉七枝浸酒一瓶飲

通酒

主治閃肭腰痛神麴燒赤淬酒飲之

通酒

主治虛勞不足消渴夜夢鬼物補益精氣鹿頭煮  
鷄糞泥連汁和麴米釀酒飲少入葱椒

通酒

主治陽虛痿弱小便頻數勞損諸虛用鹿茸山藥

酒經

一石如常浸漿嫩肥羊肉七斤麴十四兩  
斤同煮爛連汁拌末入木香一兩同釀勿犯  
日熟亟甘滑○又法用羊肉五斤蒸爛酒浸  
入消梨七個同搗取汁和麴米釀酒飲之

燒酒一名火酒又名阿刺吉酒此酒純陽毒物也  
有細花者爲真與火同性得火卽燃同平焰硝北  
人四時飲之南人止暑月飲之其味辛甘升揚發  
散其氣燥熱勝濕祛寒辛先入肺和水飲之則抑  
使下行通調水道暑月飲之汗出而膈快身涼

卷之二  
六  
辛甘大熱有大毒鹽斧水綠豆粉解其毒主治消  
渴積寒氣燥濕痰開鬱結止水泄霍亂瘧疾噎膈  
心腹冷痛陰毒欲死殺蟲辟瘧利小便堅大便洗  
赤目腫痛有效或云有人病赤圓以燒酒入鹽飲  
之而痛止腫消葢燒酒性走引鹽通行經絡使鬱  
結開而邪熱散此亦反治劫劑也

過飲敗胃傷膽喪心損壽甚則黑腸腐胃殺人頭  
剝與薑蒜同食令人生痔善攝生者宜戒之

癰疽不止真火酒一盃新汲水一盃和服甚妙  
寒痰咳嗽燒酒四兩豬脂蜜香油茶末各四兩同  
浸酒內煮成一處每日挑食以茶下之取効

寒濕泄瀉小便清者以頭燒酒飲之卽止  
耳中有核如棗核大痛不可動者以火酒滴入仰  
之半時卽可箥出

風蟲牙痛燒酒浸花椒頻頻漱之

本草卷之

卷之

卷之

上醫本草卷之一終

果部

李時珍曰木實曰果草實曰蓏熟則可食乾則可脯  
豐儉可以濟時疾苦可以備藥輔助粒食以養民生  
故素問云五果爲助五果者以五味五色應五臟李  
杏桃栗棗是矣占書欲知五穀之收否但看五果之  
盛衰

李主小豆杏主大麥桃主小麥栗主稻棗主禾

禮記內則列果品棗枳榛瓜之類周官職方氏辨五  
地之物山林宜阜物柞栗之屬川澤宜膏物菱芡之  
屬丘陵宜核物梅李之屬甸師掌野果蓏場人樹果

蓏珍異之物以時藏之觀此則果蔬之土產常異性味良毒豈可縱嗜欲而不知物理乎

李 一名嘉慶子按王禎農書云北方一種御黃李形大而肉厚核小甘香而羨江南建寧一種均亭李紫而肥大味甘如蜜有擘李熟則自裂有糕李肥粘如糕皆李之嘉美者也

李 樹溫無毒主治曝食去癟熟調中止渴

主治僵仆踶折瘀血骨痛令人難忍  
治女子少腹腫滿利小腸下水氣除溼癰治面癰  
黑子

附方

女人面點用李核仁去皮細研以雞子白和如稀  
餳塗之至旦以漿水洗去後塗胡粉不過五六日  
效忌見風

蠍蠻螫痛苦李仁嚼塗之良

杏 西京雜記載蓬萊杏花五色蓋異種也按王禎農書云北方肉杏甚佳赤大而扁謂之金剛拳凡杏熟時榨濃汁塗盤中晒乾以手摩刮收之可和水調炒食亦五果爲助之義也

酸熟有小毒主治曝脯食止渴去冷熱毒心之果心病宜食之

宗奭曰凡杏性皆熱生食多傷筋骨小兒多食致瘡癰膿熱扁鵲曰多食動宿疾令人目盲鬚眉落源曰多食生痰熱昏精神產婦尤忌之

本草驗頤延年云是夏姬之藥能使人血  
溢少誤必出血不已或至委頓近人少有服者  
或云服至二三年往往或瀉或嘔中出物皆不可  
治也按醫餘云凡索麪豆粉近杏仁則爛頤一兵  
官食粉成積醫師以積氣丸杏仁相半研爲丸熟  
水下數服愈

甘苦溫冷利

有小毒兩仁者殺人可以毒狗

附方

補肺丸治咳嗽用杏仁二大升山中者不用去雙  
仁者以童子小便二斗浸之春夏七日秋冬二七  
日連皮尖於砂盆中研濾取汁煮令魚眼沸候軟  
如麪糊卽成以粗布攤曝之可丸卽丸服之食前  
後總須服三五十丸茶酒任下忌白水粥

卒不小便杏仁二七枚去皮尖砂黃研末米飲服  
之

血崩不止諸藥不效服此立止用翻杏仁上黃皮  
燒存性爲末每服三錢空心熱酒服

尖小而肉薄其核如梅核殼薄而不苦美食之味如榛子西人以充方物

甘平溫無毒主治止欬下氣消心腹逆悶時珍出

飲膳正要

梅

酸平無毒

大明日多食酸妨筋脈脾胃令人發脹

服黃精人忌食之食梅齒齦者嚼胡桃肉

桃楊維禎宋濂集中並載云朝御庫蟠桃核大

以爲神異按王子安

載漢明帝時常山獻

巨核桃霜下始茂

玄中記載積石之桃

大如斗斛器西陽雜錄

九疑有桃核半扇可容

米一升及蜀後主有桃

核杯半扇容水五升良久

如酒味可飲此皆桃之極大者昔人謂桃爲仙果

殆此顚歟生桃切片滷過曝乾爲脯可充果食又

桃酢法取爛熟桃納甕中蓋口七日漉去皮核密

封二七日酢成香美可食種樹書云柿接桃則爲

金桃李接桃則爲李桃柳接桃則脆桃樹生蟲

蔓

瑞頤甘露之御上皆物

之故也

宜食之

多食令人有熱訛曰能發丹石毒生者尤損人時  
珍曰生桃多食令人膨脹及生癰癧有損無益五  
果列桃爲下以此

核仁

苦甘平無毒主治血結血秘血燥通潤大便破瘀  
血殺三蟲又每夜嚼一枚和蜜塗手面良

附方

延年去風令人光潤用桃仁五合去皮用粳米飯

漿同研絞汁令盡溫溫沈面極妙

大便不快裏急後重用桃仁三兩去皮吳茱萸三  
兩食鹽一兩同炒熟去鹽茱萸每嚼桃仁五七粒  
花別錄曰三月三日采上擗淨以絹袋盛懸簷下今

乾用

苦平無毒主治殺疰惡心除水氣破石淋利大小  
便下三蟲令人好顏色

數曰勿用干葉者令人白丹齶不止目黃

用方

者等分作末以豬脂和先取灰汁洗去痂卽塗之  
葉按許叔微本事方云傷寒病醫者須顧表裏循  
次第昔范雲爲梁武帝屬官得時疫熱疾召徐文  
伯診之是時武帝有九錫之命期在旦夕雲恐不  
預求速愈文伯曰此甚易政恐二年後不坐起爾  
雲曰朝聞道夕死可矣况二年乎文伯乃以火煅  
地布桃柏葉於上令雲卧之少頃汗出粉之翌日  
遂愈後二年雲果卒取汗先期尚能促壽况不顧  
表裏時日便欲速愈者乎夫桃葉發汗妙法也猶

醫本草 卷之二  
有此戒可不慎與

### 附方

二便不通桃葉杵汁半升服冬用榆皮

卒得心痛東引桃枝一把切以酒一升煎半升頓服大效

栗銑曰吳栗雖大味短不如北栗凡栗日中曝乾食卽下氣補益不爾猶有木氣不補益也

鹹溫無毒

宗奭曰小兒不可多食生則難化熟則滯氣膔食

生棗甘辛熟無毒

多食令人寒熱凡羸瘦者不可食思邈曰多食令人熱渴膨脹動臟腑損脾元助濕熱

大棗一名乾棗別錄曰八月采曝乾瑞曰此卽晒乾大棗也味最良美故宜入藥今人亦有用膠棗之肥大者

甘平無毒主治心腹邪氣安中養脾氣平胃氣通九竅助十二經補少氣少津液身中不足思邈曰甘辛熟滑無毒

大明曰有齒病疳病蟲蠶人不宜啖棗小兒尤不宜食又忌與葱同食令人五臟不和與魚同食令人腰腹痛時珍曰今人蒸棗多用糖蜜拌過久食最損脾助濕熱也啖棗多令人齒黃生蠶故嵇康養生論云齒處晉而黃蠶處頭而黑

附方

調和胃氣以乾棗去核緩火逼燥爲末量多少少生薑末白湯點服調和胃氣甚良  
況棗治瘧執棗一枚呪曰吾有棗一枚一心歸

煩悶不眠大聚十四枚蕎心白七莖水三升煮一升  
頻服

卒急心疼海上方訣云一個烏梅二個棗七個杏  
仁一處搗男酒女醋送下之不害心疼直到老  
食椒閑氣涼棗食之卽解也

梨 一名快果 一名玉乳 亨曰 梨者利也 其性下行  
流利也 紫花梨療心熱 唐武宗有此疾 百藥不效  
青城山邢道人以此梨絞汁進之 帝疾遂愈 復求  
之不可得 常山郡忽有一株 因緘封以進 帝多食

之解煩燥殊效歲久木枯不復有種今人不得而  
用之矣魏文帝詔云真定御梨大如拳甘如蜜脆  
如菱可以解煩釋悞辛氏三秦記云含消梨大如  
五升墮墜地則破須以囊承取之漢武帝嘗種於  
上苑此又梨之奇品也物類相感志言梨與蘿蔔  
相間收藏或削梨蒂種於蘿蔔上藏之皆可經年  
不爛今北人每於樹上包裹過冬乃摘亦妙懷微  
曰孫光憲北夢瑣言云有一朝士見奉御梨新診  
之曰風疾已深請速歸去復見鄜州馬醫趙

若有疾厭厭無聊答謁楊吉老診之楊曰君執證  
已極氣血消鑠此去三年當以疽死土人不藥而  
去聞茅山有道士醫術通神而不欲自鳴乃衣僕  
衣詣山拜之願執薪水之役道士畱置弟子中久  
之以實白道士道士診之笑曰汝便下山但日日  
喫好梨一顆如生梨已盡則取乾者泡湯食滓飲  
汁疾自當平士人如其戒經一歲復見吉老見其  
顏貌腴澤脉息和平驚曰君必遇異人不然豈有  
痊理土人備告吉老吉老具衣冠望茅山設拜自

咎其學之未至此與瑣言之說彷彿觀夫二條則  
梨之功豈小補哉然惟乳梨鴛梨消梨可食餘梨  
則亦不能去病也

甘微酸寒無毒主治熱嗽止渴切片貼湯火傷止  
痛不爛

多食令人寒中萎困金瘡乳婦血虛者尤不可食  
志曰別本云梨甘寒多食成冷痢桑梨生食治中  
不益人

卒得欬嗽頌曰崔元亮海上方用好梨去核搗搣  
一椀入椒四十粒煎一沸去滓納黑鶴一大兩消  
訖細細含嚥立定訛曰用梨一顆刺五十孔每孔  
納椒一粒麪裹灰火煨熟停冷去椒食之

虛損風疾接命丹治男婦氣血衰弱痰火上升虛  
損之證又治中風不語左癱左緩手足疼痛動履  
不便飲食少進諸證用人乳二盃香甜白者爲佳  
以好梨汁一盃和勻銀石器內頓滾滾每日五更

一服能消痰補虛生血延壽此乃以人補人其妙無加

柿

音士

世傳柿有七絕一多壽二多陰三無鳥巢四

無虫蠹五霜葉可玩六嘉賓七落葉肥滑可以臨

書也

烘柿時珍曰烘柿非謂火烘也卽青綠之柿收置  
器中自然紅熟如烘成澀味盡去其甘如蜜

甘寒澀無毒

弘景曰生柿性冷麤心柿尤不可食令人腹痛案

汁灌之卽漸甦醒而愈也

白柿一名柿霜時珍曰白柿卽乾柿生霜者其法用大柿去皮捻扁日晒夜露至乾內瓮中待生白霜乃取出今人謂之柿餅亦曰柿花其霜謂之柿霜按方勺泊宅編云外兄劉掾云病臟毒下血凡半月自分必死得一方只以乾柿燒灰飲服二錢遂愈又王璆百一方云曾通判子病下血十年亦用此方一服而愈爲散爲丸皆可與本草治腸澼消宿血解熱毒之義相合則柿爲太陰血分之藥

醫本草 卷之二  
益可徵矣又經驗方云有人三世死于反胃病至孫得一方用乾柿餅同乾飯日日食之絕不用水飲如法食之其病遂愈此又一懲也

甘平清無毒主治補虛勞不足消腹中宿血清中厚腸健脾胃氣

弘景曰乾者性冷生柿彌冷火熟者性熱

附方

小便血淋葉氏用乾柿一枚研存性研末陳米飲  
經驗方用紅柿搗爛取汁入墨汁服之

游食之奶母亦食之

反胃吐食乾柿三枚連蒂擣爛酒服甚効切勿以  
它藥襍之

**安石榴**一名丹若二名金瞿博物志云漢張騫出使  
西域得塗林安石國榴種以歸故名安石榴又案  
齊民要術云凡植榴者須安僵石枯骨于根下卽  
花實繁茂則安石之名義或取此也若木乃扶桑  
之名榴花丹頰似之故亦有丹若之稱傳玄榴賦  
所謂灼若旭日栖扶桑者是矣筆衡云五代吳越

王錢鏐改榴爲金瞿西陽雜俎言榴甜者名天藥  
道家書謂榴爲三尸酒言三尸虫得此果則醉也  
故范成大詩云玉池咽清肥三彭跡如埽

甘石榴甘酸溫清無毒主治咽喉燥渴能理乳石  
毒

多食損人肺說曰多食損齒令黑凡服食藥物人  
忌食之震亨曰榴者留也其汁酸性滯戀成痰  
酸石榴酸溫清無毒主治赤白痢腹痛連子擣汁  
頻服一枚止漏病崩中帶下

一束研末仍以酸搗一塊煎湯服神効無比

父瀉不止方同上

病血五色或濃或水滌熱不調酸石橘五枚連子  
擣汁二升每服五合神妙

桑椹一名文武實主治單食止消渴利五臟關節痛  
血氣久服不饑安魂鎮神令人聰明變白不老多  
收暴乾爲末蜜丸日服搗汁飲解中酒毒釀酒服  
利水氣消腫宋東曰本經言桑甚詳然獨遺烏椹  
桑之精英盡在于此采摘微研以布濾汁石器熬

成稀膏量多少入蜜熬稠貯器中每抄一二錢  
食後夜卧以沸湯點服治服金石發熱口渴生精  
神及小腸熱其性微涼故也仙方日乾爲末密和  
爲丸酒服亦良四時月令云四月宜飲桑椹酒能  
理百種風熱其法用椹汁三斗重湯煮至一斗半  
入白蜜二合酥油一兩生薑一合煮令得所瓶收  
每服一合和酒飲之亦可以汁熬燒酒藏之經年  
味力愈厚

附方

癩瘧結核汎鍼膏劑散咸寶卿藥譜計仁丹黑糖

橘  
三服

實甘酸溫無毒主治甘者潤肺酸者聚痰止消渴開胃除胸中膈氣

弘景曰食之多痰恐非益也原曰多食戀膈生痰滯肺氣瑞曰同螃蟹食令人患軟癰

黃橘皮一名紅皮一名陳皮弘景曰橘皮療氣大勝以東橘爲好西江者不如須陳久者爲良好古曰橘皮以色紅日久者爲佳故曰紅皮陳皮去白

醫本草 卷之二  
者曰橘紅也

苦辛溫無毒主治胸中痰熱逆氣利水穀久服去  
臭下氣通神止嘔欬治氣衝胸中吐逆霍亂療  
不能消穀止洩除膀胱留熱停水起淋利小便土  
寸白蟲清痰涎治上氣欬嗽開胃解魚蠍毒主  
痢破癰瘕痃癖

附方

寬中丸治脾氣不和令氣客於中壅遏不通是  
張滿用橘皮四兩白朮二兩爲末酒糊丸梧子

者用橘皮四兩生薑一兩水二升煎一升徐徐呷之卽止

反胃吐食真橘皮以日照西壁上炒杏爲末每服二錢生薑三片棗肉一枚水二鍾煎一鍾溫服  
卒然食噎橘皮一兩湯浸去瓢焙爲末以水一大盞煎半盞熱服

卒然失聲橘皮半兩水煎徐呷

經年氣嗽橘皮神翹生薑焙乾等分爲末蒸餅和丸梧子大每服三五十丸食後夜卧各一服有人

患此服之兼舊患膀胱氣皆愈也

化食消痰胸中熱氣用橘皮半兩微煑爲末水煎  
代茶細呷

大腸閥塞陳皮連白酒煮焙研末每溫酒服二錢  
米飲下

櫻桃一名鴟桃二名含桃一名荊桃

甘熱清無毒主治調中益脾氣令人好顏色羨志  
止洩精水穀痢此果三月末四月初熟得正陽之  
氣先諸果熟故性熱也

筋骨敗血氣有寒熱病人不可食宗奭曰小兒食之過多無不作熱

銀杏一名白果一名鴨腳子

核仁

甘苦平濇無毒

時珍曰熟食小苦微其性溫有小毒多食令人臚  
脹瑞曰多食壅氣動風小兒食多昏霍發驚引癥  
同鰻鱺魚食患軟風

胡桃一名羌桃一名核桃時珍曰胡桃仁味甘氣熱

皮濤肉潤孫真人言其冷滑誤矣近世醫方用治痰氣喘嗽醋心及癘風諸病而酒家往往醉後嗜之則食多吐水吐食脫眉及酒同食咯血之說亦未必盡然也但胡桃性熱能入腎肺惟虛寒者宜之而痰火積熱者不宜多食耳

核仁

甘平溫無毒主治食之令人肥健潤肌黑鬚髮多食利小便去五痔

附方

薛末各四兩杵勻九榧子大每空心溫酒鹽湯

下五十九

榛一名梔

古榛子

仁

其平無毒主治益氣力實腸胃令人不肌健行調  
中開胃甚驗

荔枝

一名離枝又名丹荔洪邁堅夷志云莆田荔枝  
名品皆出天成雖以其核種之亦失本體形狀百  
出不可以理求也珣曰荔枝樹似青木香熟時人

未采則百蟲不敢近人纔采之鳥鳥蝙蝠之類無  
不傷殘之也故采荔枝者必日中而衆采之一日  
色變二日味變三日色味俱變故古詩云色味不  
踰三日變也

實

甘平無毒主治止渴益人顏色

珣曰甘酸熱多食令人發虛熱李廷飛曰生荔枝  
多食發熱煩渴口乾衄血

附方

藥不効仙方也 又方用大荔枝一箇剗開填鹽  
滿殼煅研搽之卽愈

呃逆不止荔枝七箇連皮核燒存性爲末白湯調  
下立止

核

甘溫濬無毒主治心痛小腸氣痛以一枚煨存性  
研末新酒調服

龍眼 一名圓眼又名益智亦名蜜脾志曰其味歸脾  
能益人智故名益智非今之益智子也

實

甘平無毒恭曰甘酸溫李廷飛曰生者飛湯淪過  
食不動脾主治五臟邪氣安志厭食開胃益脾補  
虛長智除蠱毒去三蟲久服強魂聰明輕身不老  
通神明

橄欖

一名青果又名忠果亦名諫果王禎云其味苦

澀久之方回甘味王元之作詩比之忠言逆耳世  
亂乃思之故人名爲諫果

實

俊士醫本草

卷之二

消酒毒及解鯷鮀魚即鯷鮀魚也

震亨曰味澀而甘醉飴宜之然性熱多食能致上壅

海松子一名新羅松子志曰海松子狀如小栗三角其中仁香羨東夷當果食之亦代麻腐食之與中國松子不同

仁

甘小溫無毒主治骨節風頭眩去死濁變白散水氣潤五臟不饑

附方

肺燥欬嗽蘇遊鳳髓湯用松子仁一兩胡桃仁二兩研膏和熟蜜半兩收之每服二錢食後沸湯點服

大便虛秘松子仁柏子仁麻子仁等分研泥溶白蠟和丸梧子大每服五十丸黃芪湯下

枳椇

音止

蜜棗椒

音止

蜜屈律

音矩

一名木蜜又名雞頭

子

頌曰此詩小雅

所謂南山有枸也

陸機疏義云

楂拘

樹高大如白楊所在皆有枝柯不直子著枝

震亨曰一男子年三十餘因飲酒發熱又兼房勞虛乏乃服補氣血之藥加葛根以解酒毒微汗出人反懈怠熱如故此乃氣血虛不禁葛根之散也必須雞距子解其毒遂煎藥中加而服之乃愈

實

甘平無毒

說曰多食發蛇蟲

**甜瓜**一名甘瓜又名果瓜按王禎云瓜類不同其用有二供果者爲果瓜甜瓜西瓜是也供菜者爲菜

瓜胡瓜越瓜是也時珍曰瓜性最寒曝而食之尤冷故稽聖賦云瓜寒于曝油冷于煎此物性之異也王冀洛都賦云瓜則消暑蕩怡解渴療饑又奇効良方云昔有男子病膿血惡痢痛不可忍以水浸甜瓜食數枚卽愈此亦消暑之驗也

瓜瓢

甘寒溫有小毒大明曰無毒主治止渴除煩熱利小便通三焦間壅塞氣治口鼻瘡暑月食之永不

瓜子無氣而性冷消損陽氣多食未有不下利者貧下多食深秋作痢最爲難治

瓜子仁數日凡收得曝乾杵細馬尾篩過成粉以紙三重裹壓去油用不去油其力短也西瓜子仁同

甘寒無毒主治腹內結聚破潰膿血最爲腸胃脾內壅要藥清肺潤腸和中止渴炒食補中宜人

附方

腰腿疼痛甜瓜子三兩酒浸十日爲末每服三錢

空心酒下目三

月經太過研末去油水調服炮炙論序曰血泛經過飲調瓜子

西爪一名寒爪

瓜瓢

此淡寒無毒主治消煩止渴解暑熱療喉癰寬中下氣利小水治血痢解酒毒含汁治口瘡

瑞曰有小毒多食作吐利胃弱者不可食同油餅  
食損脾顏曰西爪性寒解熱有天生白虎湯之號

傷脾助濕之害也真西山衛生歌云爪桃生冷宜少殮免致秋來成瘧痢是矣

**葡萄**一名蒲桃又名草龍珠漢書言張騫使西域還始得此種而神農本草已有葡萄則漢前隴西舊有但未入關耳頌曰按魏文帝詔群臣曰蒲桃當夏末涉秋尚有餘暑醉酒宿醒掩露而食甘而不飴酸而不酢冷而不寒味長汁多除煩解渴又釀爲酒甘于麴蘖善醉而易醒他方之果寧有匹之者乎震亨曰葡萄屬土有水與木火東南人食之

多病熱西北人食之無恙蓋能下走滲道西北人  
稟氣厚故耳

實

甘平清無毒主治筋骨濕痺益氣倍力強志令人  
肥健耐餓忍風寒逐水利小便除腸間水調中治  
淋久食輕身不老延年可作酒

說曰甘酸溫多食令人卒煩悶眼暗

附方

除煩止渴生蒲桃搗漬取汁以瓦器盛入熟蜜

甘蔗

音柘

竿蔗一名諸音遡時珍曰按野史云呂惠

卿言凡草皆正生嫡出惟蔗側種根上庶出故字從庶也稻舍作竿蔗謂其莖如竹竿也按王灼餧霜譜云蔗有四色曰杜蔗卽竹蔗也綠嫩薄皮味極醇厚專用作霜曰西蔗作霜色淺曰芳蔗亦名蠟蔗卽荻蔗也亦可作沙糖曰紅蔗亦名紫蔗卽崑崙蔗也止可生啖不可作餌凡蔗榨漿飲固佳又不若咀嚼之味雋永也相感志云同榧子食則

渣軟

卷之二  
三  
庚

甘平清無毒主治下氣和中助脾氣利大小腸消痰止渴止嘔噦反胃寬胸膈除心胸煩熱解酒毒大明曰冷說曰共酒食發痰瑞曰多食發虛熱動

衄血

沙糖時珍曰其性能和脾緩肝故治脾胃及瀉肝藥用爲先導本草言其性寒蘇恭謂其冷利皆昧此理

甘寒無毒主治心腹熱脹口乾渴和中助脾緩肝

食棗病齶同意非土水也時珍曰沙糖性溫殊  
于羨漿故不宜多食與魚筭之類同食皆不益人  
今人每用爲調和徒取其適口而不知陰受其害  
也

蓮藕按爾雅云荷芙蓉其莖茄其葉蕩其本蕊其華  
菌苔其實蓮其根藕其中菂菂中薏邢昺註云芙  
蕖總名也別名芙蓉江東人呼爲荷菌苔蓮花也  
菂菂實也薏菂中青心也郭璞註云蕊乃莖下白  
蒻在泥中者蓮乃房也菂菂子也薏乃中心苦薏

也

蓮實一名藕實一名菂一名敷音吸同上一名石

蓮子一名水芝一名澤芝時珍曰石蓮剗去黑殼謂之蓮肉以水浸去赤皮青心生食甚佳入藥須蒸熟去心或晒或焙乾用亦有每一斤用獮豬肚一箇盛貯煮熟搗焙用者今藥肆一種石蓮子狀如土石而味苦不知何物說曰諸鳥猿猴取得不食藏之石室內人得三年者食之永不老也又雁食之糞于田野山巖之中不逢冰雨經久

心止。別治腰痛及泄精交心腎厚腸胃固筋骨補虛損利耳目除寒濕止脾泄久痢  
安靖上下君相火邪多食令人歡喜久服  
無耐老不饑延年女人帶下崩中諸血病擣碎  
米作粥飯食輕身益氣令人強健

說曰生食過多微動冷氣脹人蒸食甚良大便燥  
者不可食

方

種中強志益耳目駒明用蓮實半兩去皮心研末

水煮熟以粳米三合作粥入末攪勻食

羸虛益損水芝丹用蓮實半升酒浸二宿以牙豬  
肚一箇洗淨入蓮在內縫定煮熟取出晒乾爲末  
酒煮米糊丸梧子大每服五十九食前溫酒送下  
久痢糞口石蓮肉炒爲末每服二錢陳倉米調下  
便覺思食甚妙加入香連丸尤妙

脾泄腸滑方同上

腰赤作痛蓮實去皮研末一盞粳米半升以水

兩味食

仙家宋時太官作血鰣音勘庖人削藕皮誤殺  
中遂散渙不凝故醫家用以破血多効也鰣者血  
羹也說曰忌生冷物獨藕不同生冷者爲能破血  
也

甘平無毒大明曰溫主治熱渴散留血生肌止怒  
止洩消食解酒毒及病後乾渴久服令人心懽生  
食治霍亂後虛渴蒸煮食之大能開胃蒸食甚補  
五臟實下焦同蜜食令人腹臟肥不生諸蟲亦可  
休糧擣汁服止悶除煩開胃治霍亂解射齒毒蟹

上醫本草 卷之二  
毒破產後血闊擣膏置金瘡并傷折止暴痛擣浸  
澄粉服食輕身益年

附方

時氣煩渴生藕汁一盞生蜜一合和勻細服

傷寒口乾生藕汁生地黃汁童子小便各半盞煎  
溫服之

霍亂煩渴藕汁一鍾薑汁半鍾和勻飲

霍亂吐利生藕擣汁服

上焦痰熱藕汁梨汁各半盞和服

分類要

氣節

溫平無毒主治吐血不止及口鼻出血  
大明曰希伏破癥

附方

卒暴吐血雙荷散用藕節荷蒂各七箇以蜜少許  
研爛用水二錘煎八分去滓服或爲末丸服亦

可

大便下血鴉節晒乾研末人參白蜜煎湯調服二

卷之三  
發日二服

遺精白濁心虛不寧金鎖玉門丸用蘿蔔節蓮花蕊  
蓮子肉芡食肉山藥白茯苓白伏神各二兩爲末  
用金櫻子二斤搗碎以水一斗煮八分去滓再搗  
膾膏入少廻和藥丸梧子大無數七十九粒飲  
連益環一名佛慈環元氣丹參各全丸亦可充之

去濁溫無事丸

蓮花一名芙蓉又名芙蓉亦名水華

苦甘溫無毒主治鎮心益色駐顏身輕弘景曰花入神仙家用入香尤妙

忌地黃葱蒜

附方

服食駐顏七月七日采蓮花七分八月八日采根八分九月九日采實九分陰乾搗篩每服方寸匕

溫酒調服

蓮房一名蓮蓬殼陳久者良時珍曰蓮房入厥陰血分消瘀散血與荷葉同功亦急則治標之意也

苦濤溫無毒主治破血血脹腹痛及止血崩下血  
溺血產後胎衣不下酒煮服之水煮服之解野菌  
毒

方

經血不止瑞蓮散用陳蓮蓬殼燒存性研末每服  
二錢熱酒下

荷葉釋名嫩者荷錢象形貼水者藕荷生藕者出  
水者芰荷生花者

蕃客荷草大明曰入藥並多用

一葉呼氣生冷止血以落胞破血治產後口乾心肺

時珍曰畏桐油伏白銀伏硫黃

附方

吐血咯血荷葉焙乾爲末米湯調服二錢一日二服以止爲度

吐血衄血陽乘于陰血熱妄行宜服四生丸陳曰  
華云屢用得効用生荷葉生艾葉生柏葉生地黃  
等分擣爛丸雞子大每服一丸水三盞煎一盞去  
滓服

血痢不止荷葉蒂水煮汁服之

下痢赤白荷葉燒研每服二錢紅痢蜜白痢沙糖

湯下

脫肛不收貼水荷葉焙研酒服二錢仍以荷葉盛  
末坐之

牙齒疼痛青荷葉剪取錢蒂七个以濃米醋一盞  
煎半盞去滓熬成膏時時抹之妙

菱實

音妓

一名菱又名水栗亦名沙角王安貧武陵

記以三角四角者爲菱兩角者爲菱左傳屈到嗜

菱卽此物也爾雅謂之厥攘首眉

甘平無毒

說曰生食性滑利多食傷人用加甘陽氣藥生  
燒空水族中此物最不可治病若過食腹脹者可  
暖薑酒服之卽消亦可含吳茱萸咽津

芡實

音僉

一名雞頭一名鴈喙

一名鴈頭

一名鴻頭

一名雞雍一名卯陵一名蕎子

音唯

一名水流黃

說曰凡用蒸熟列日晒乾取仁亦可春取粉用

其平滑無毒主治濕痺腰脊膝痛開胃助氣補中  
除暴疾益精氣強志令耳目聰明久服輕身不倦

耐老神仙

弘景曰小兒多食令不長說曰生食多動風益氣

宗奭曰食多不益脾胃兼難消化

附方

四精丸治思慮色慾過度損傷心氣小便數遺精  
用秋石白茯苓艾實蓮肉各二兩爲末蒸棗和丸  
梧子大每服三十丸空心鹽湯送下

雞頭菜卽筍菜莖也

鹹甘平無毒主治止煩渴除虛熱生熟皆宜

烏芋

一名鳧茈

音疵

一名鳧茨

音堯

一名勃臍

一名地栗

黑三棱一名芍音曉

根機曰烏芋善毀銅令銅錢嚼之則錢化可見甚

誤吞銅也

甘微寒滑無毒主治療五種膈氣消宿食飯後宜  
食之治誤吞銅物作粉食厚人腸胃不餓能解毒  
服金石人宜之

洗曰性冷先有冷氣人不可食令人腹脹氣滿小  
兒秋月食多臍下結痛也

附方

大便下血勃脾搗汁大半鍾好酒半鍾空心空服

三日見効

下痢赤白午日午時取完勒臍洗淨拭乾勿令損  
破放瓶內入好燒酒浸之黃泥密封收貯遇有患  
者取二枚細嚼空心用原酒送下

小兒口瘡用勒臍燒存性研末摻之

誤吞銅錢生癟此研汁細細呷之自然消化成水

**慈姑**一名藉姑一名水萍一名河鳧茈一名白地栗

苗名剪刀草一名箭搭草一名槎子草一名燕尾  
草時珍曰慈姑一根歲生十二子如慈姑之乳諸  
子故以名之

雞胞衣不出擣汁服一升又下石淋

大明曰肴有毒多食發虛熱及腸風痔漏崩中帶下瘡癥以生薑同煮佳懷孕人不可食說曰吳人常食之令人發脚氣癱緩風損齒失顏色皮肉乾燥卒食之使人乾嘔也

葉

主治諸惡瘡腫小兒遊癆丹毒擣爛塗之即使消退甚佳治蛇蟲咬擣爛封之調蚌粉塗瘡癩

**食鹽**一名鹹音堯爾雅云天生曰鹹人生曰鹽黃帝

之臣宿沙氏初煮海水爲鹽本經大鹽卽今解池  
顆鹽也方士呼鹽爲海砂恭曰大鹽卽河東印鹽  
也弘景曰有東海鹽北海鹽南海鹽河東鹽池梁  
益鹽井西羌山鹽胡中樹鹽色類不同以河東者  
爲勝藏器曰四海之內何處無之惟西南諸夷稍  
步人皆燒竹及木鹽當之俗曰并州末鹽乃剉鹽  
煎鍊者不甚佳所謂鹵鹹是也大鹽生河東施澤  
粗于末鹽卽今解鹽也解川安邑兩池取鹽于邊  
旁耕地沃以池水每得南風急則信夕成鹽至秋  
彼人謂之種鹽最爲精好

鹽文深尺平底寘于竈背謂之鹽盤周禮云鹽人掌鹽之政令祭祀供其苦鹽散鹽賓客供其形鹽王之膳羞供其飴鹽苦鹽卽顆鹽也出于池其鹽爲顆未鍊治其味鹹苦散鹽卽末鹽出于海及井并煮鹹而成者其鹽皆散末也形鹽卽印鹽或以鹽刻作虎形也或云積鹵所結其形如虎也飴鹽以飴拌成者或云生于戎地味甜而羨也此外又有崖鹽生于山崖戎鹽生于土中傘子鹽生于井石鹽生于石木鹽生于樹蓬鹽生于草造化生物

之妙誠難殫知也時珍曰鹽爲百病之主百病無不用之故服補腎藥用鹽湯者鹹歸腎引藥氣入本臟也補心藥用炒鹽者心苦虛以鹹補之也補脾藥用炒鹽者虛則補其母脾乃心之子也治積聚結核用之者鹽能更堅也諸癰疽痘眼目及血病用之者鹹走血也諸風熱病用之者寒勝熱也大小便病用之者鹹能閨下也骨病齒病用之者腎主骨鹹入骨也吐藥用之者鹹引水聚也能收豆腐與此同義諸藥及蟲傳用之者取其解毒也

亂及心腹卒痛吐冒中痰癥及一切時氣風熱癆  
飲關格諸病能明目止風淚殺鬼蠱邪疰毒氣下  
部瘡瘍金瘡一切蟲傷瘡腫火灼瘡解毒涼血潤  
燥定痛止痒長肉補皮膚通大小便療疝氣除風  
邪堅肌骨滋五味調和臟腑消宿物令人壯健  
多食傷肺喜欵令人失色膚黑損筋力病喘嗽人  
及水腫消渴者宜大忌

附方

空心揩齒吐水洗目夜見小字

明日堅齒去醫大利老眼海鹽以百沸湯泡散清  
升于銀石器內熬取雪白鹽花新瓦器盛每早揩  
牙漱水以大指甲點水洗目閉坐良久乃洗向名  
洞視千里法極神妙

目中淚出鹽點目中冷水洗數次瘥

處物昧目以少鹽并豉置水中視之立出  
亦見目瞖或來或去漸大侵睛雪白鹽少許燈心  
蘸點目三五次不痛不礙屢用有效

風熱牙痛槐枝煎濃湯一盃入鹽一斤煮乾炒研

日用揩牙以水洗目

齒齦宜露每旦噙鹽熱水含百遍五日後齒卽牢  
齒疼出血每夜鹽末厚封斷止有汁瀝盡乃卧其  
汁出時叩齒勿住不過十夜疼血皆止忌猪魚油  
菜等極驗

乾霍亂病唐柳州纂救三死方云元和十一年  
十月得霍亂上不可止下不可利出冷汗三大手  
許氣卽絕河南房偉傳此方入口卽吐絕氣復通  
一法用鹽一大匙熬令黃童子小便一升合和溫  
服少頃吐下卽愈也

霍亂腹痛炒鹽一包熨其心腹令氣透又以一包

熨其背

霍亂轉筋欲死氣絕腹有暖氣者以鹽填臍中灸  
鹽上七壯即甦

小便不通濕紙包鹽燒過吹少許入尿孔中立通  
二便不通鹽和苦酒傅臍中乾即易仍以鹽汁灌  
肛內并內用繩裹鹽投水中飲之

下痢肛痛不可忍者葵鹽包坐慰之

血痢不止白鹽紙包燒研調粥喫三四次即止也  
脚氣疼痛每夜用鹽擦腿膝至足甲淹少時以鹽

湯泡洗有一人病此曾用驗

妊娠心痛不可忍鹽燒赤酒服一撮

妊娠逆生鹽摩產婦腹并塗見足底仍急爪搔  
小兒疝氣并內弔腎氣以葛袋盛鹽于戶口懸之  
父母用手燃料盡卽愈

小兒不尿安鹽于臍中以艾灸之

酒肉過多脹滿不快用鹽花擦牙溫水漱下二三  
次卽如湯沃雪也

酒皁赤鼻白鹽常擦之妙

蚯蚓蛟毒形如大風眉鬚皆落惟濃煎鹽湯浸身  
數遍卽愈浙西軍將張韶病此每夕蚯蚓鳴于體

一僧用此方而安虧畏鹽也

金瘡血出甚多若血冷則殺人宜炒鹽三撮酒調服之

手足心毒風氣毒腫鹽末椒末等分酢和傅之立

瘥

瘡癬痛痒初生者嚼鹽頻擦之妙

臙瘡經年鹽中黑泥晒研搽之

潰癰作痒以鹽摩其四圍卽止

蜂蠻叮螫嚼鹽塗之

救溺水死以大糞臘之後以高用鹽燒熱

水出勿勿水提川水

**青鹽**一名戎鹽一名羌鹽大明曰西番所食者故號  
一戎鹽羌鹽時珍曰故西涼記云青鹽池出鹽正方  
半寸其形如石甚甜美今寧夏近涼州地鹽井所  
出青鹽四方皎潔如石山丹衛卽張掖地有池產  
紅鹽紅色此二鹽卽戎鹽之青赤二色者醫方但  
用青鹽而不用紅鹽不知二鹽皆名戎鹽也功同  
食鹽不經煎鍊而味鹹帶甘入藥似勝

鹹寒無毒主治明目目痛五臟癥結心腹積聚痛  
渴血吐血齒舌血出助水臟益精氣堅肌骨去毒

醫本草 卷之二  
鹽療瘡疥癬

附方

風熱牙痛青鹽一斤槐枝半斤水四盞煎汁二盞  
煮鹽至乾炒研日用揩牙洗目

牢牙明目青鹽二兩白鹽四兩川椒四兩煎汁拌  
鹽炒乾日用揩牙洗目永無齒疾目疾

秦椒

一名大椒 一名櫻音毀

一名花椒

爾雅云櫻大

椒郭璞注云椒叢生實大者爲櫻也詩唐風云椒  
之實繁衍盈升陸機疏義云根樹似茱萸有針  
葉而滑澤味亦辛香蜀人作茶吳人作茗皆

以其葉合葵爲君今成臘諸山有竹葉樹其木  
如蜀椒小毒熱不中合藥也可入飲食中及蒸雞

· 腺用

· 椒紅

辛溫有毒主治上氣欬嗽久風濕痺除風邪氣溫  
中去寒痺堅齒髮明目久服輕身好顏色耐老增  
年通神

別錄曰生溫熟寒有毒之才曰惡苦蔓防葵畏雖

黃

蜀椒一名漢椒一名川椒

醫本草 卷之二 三十六  
椒紅

辛溫有毒主治邪氣欬逆溫中逐骨節皮膚死幾  
寒熱癰痛下氣久服頭不白輕身增年

別錄曰大熱多食令人乏氣喘促口閉者殺人說  
曰五月食椒損氣傷心令人多忘李廷飛曰久食  
令人失明傷血脉

附方

補益心腎仙方椒茶丸補益心腎明目駐顏  
祛風延年直川椒一斤炒去汗白茯苓十兩

鐵器

蠍蟄作痛川椒骨細塗之微麻即止

胡椒恭曰胡椒生西戎形如鼠李子調食用之

辛辣

辛大溫無毒主治下氣溫中去痰除臟腑中風寒  
去胃口虛冷氣宿食不消霍亂氣逆心腹卒癰  
氣上衝調五臟壯腎氣治冷痢殺一切魚鱉鼈蟹  
毒

珣曰多食損肺令人吐血時珍曰辛熱耗陽走  
助火昏目發瘡

附方

赤白下痢胡椒綠豆各一歲一粒爲漠糊丸  
大紅用生薑白用米湯下

(茗)

一名苦檳

捺途二音

一名欖

一名設

音設

一名芝

音芝

一名莢

音莢

一名莧

音外 頌曰郭僕云早采爲茶晚采爲茗 一名莧

葉苦甘微寒無毒主治瘦瘡利小便去痰熱止渴

令人少睡有力悅志治傷暑合醋治泄痢甚効炒  
煎飲治熱毒亦白痴同芎菊葱白煎飲止頭痛

穀器曰苦寒久食令人瘦去人脂使人不睡飲之

利弊佳癥氣侵精終身之累斯大獲益則  
善方始惠則不謂茶災豈非福近易知禍遠  
矣宋學士蘇軾茶說云除煩去腻世故不  
無茶然暗中損人不少空心飲茶入鹽直入腎  
經且冷脾胃乃引賊入室也惟飲食後濃茶漱口  
既去須贓而脾胃不知且苦能堅齒消蠹深得飲  
茶之妙古人呼茗爲酪奴亦賤之地

附方

久年心痛十年五年者煎湖茶以頭醋和匀服之

良

赤白冷熱劑生薑細切與真茶等分新水濃煎服  
之甚効

