

亥 23

18-343

六科準繩

中醫 4
017-172



金壇王肯堂輯

瘦樵程永培校

合病併病汗下吐後等病

表裏合病必下利 太陽[汗] 與陽明合病必自下利葛根湯主之不下利但嘔者葛根加半夏湯主之 太陽

與少陽合病自下利者與黃芩湯若嘔者黃芩加半夏湯生薑湯主之 陽明與少陽合病必下利脈滑而數者有宿

食也當下之宜大承氣湯俱詳下利

併病 二陽[汗] 併病太陽出汗不微因轉屬陽明自汗不惡寒太陽證不罷面赤躁煩短氣者更發汗則愈 二

陽[下] 併病太陽證罷潮熱譫語者下之則愈論見 太陽[利] 少陽併病項強眩冒心下鞭如結胸者刺胸俞

俞論見

合併病

合併兩經俱病併則一經證罷而併歸於一經也太陽與陽明合病有三證其邪溲有淺深之殊故用藥有汗下和

解之異治見各條三陽合病有二證其一證用白虎湯其一證無治法後人用小柴胡白虎之類蓋此二證俱有三

陽之候故不可汗下二陽併病有二證表未解者汗之表已解有裏證者下之太陽與少陽併病有三證其一由誤

下以致心下鞭成結胸其一項強如柔痙狀心下鞭如結胸刺肺俞肝俞慎勿發汗汗則譫語不止宜刺期門其一

心下鞭項強而眩者刺大椎肺俞不宜下也

合病 太陽[汗] 與陽明合病胸滿而喘者不可下麻黃湯 太陽[解肌] 與陽明合病自下利葛根湯不下利但

嘔者葛根加半夏或曰由太陽表未罷而陽明裏又至兩陽合病熱甚於表乘虛漸攻於裏故下也其不下利而嘔

鼻乾也脈浮大太陽受病也長者陽者邪氣雖攻裏未入於胃但氣逆而嘔故加半夏以止嘔逆 龐氏曰外證必頭痛脈熱目赤

明也頭脹太陽也肌目鼻陽明也



太陽與少陽合病自下利者與黃芩湯若嘔者黃芩加半夏湯或曰此表實裏虛熱入攻裏改自下利若兼痰飲則嘔也

陽明少陽合病必下利脈長者為順脈弦者為負負者尅賊也脈滑而數者有宿食大承氣湯或曰陽明土少陽木其脈弦者木乘土也

不強者不負也負者必死若滑而數者有宿食非負也故宜下

三陽合病腹滿身重難以轉側口不仁面垢譫語遺尿不可汗下若自行者白虎湯 三陽合病脈浮大是關上也

欲眠目合則汗小柴胡白虎湯或曰此二證俱有三陽之證此不可汗下

併病二陽解肌併病太陽初得時汗之不徹轉屬陽明續自微汗不惡寒大柴胡湯 若太陽證不能不可下

可少發汗設面色緣緣正赤陽氣怫鬱在表汗之不徹其人煩躁短氣不知痛處宜更發汗則愈葛根湯 二陽併

併病太陽證罷潮熱手足汗大便難譫語者大承氣湯 太陽少陽併病反下之成結胸心下鞭下利不止水漿不

下心煩生薑瀉心湯小陷胸湯 太陽刺與少陽併項強痛或眩冒時如結胸心下痞鞭刺大椎第一間肺俞肝

俞不可汗汗則譫語不止刺期門 太陽少陽併病心下鞭項強而眩者刺大椎肺俞慎勿下

趙最嘗疑合病併病之難明也久矣姑釋之蓋合病者二陽經或三經同受病之病不傳者也併病者一陽經

先受病又過一經病之傳者也且如太陽陽明併病一證若併而未盡是傳未通尚有表證仲景所謂太陽證不

罷面色赤陽氣怫鬱在表不得越煩躁氣短是也猶當汗之以各半湯若併之已盡是謂傳過仲景所謂太陽證

罷潮熱手足汗出大便鞭而譫語者是也法當下之以承氣湯是知傳則入府不傳則不入府所以仲景論太陽

陽明合病止出三證如前太陽陽明併病則言其有傳變如此也又如陽經互相合病皆自下利仲景於太陽陽

明合病則主以葛根湯太陽少陽合病主以黃芩湯少陽陽明合病主以承氣湯至於太陽少陽併病其證頭項

強痛眩冒如結胸心下痞鞭當刺大椎肺俞肝俞不可汗下太陽陽明併病已見上論但三陽合病仲景無背惡

寒語句雖別有口燥渴心煩背微惡寒者乃屬太陽證而非三陽合病也活人言三陽合病背惡寒者非也三陽



若與三陰合病即是兩感所以三陰無合病例也

張夫併者乃惟併督併之義非吞併相就之理然惟併係去聲吞併之併乃上聲史記曰始皇初併天下即此理也夫併之理乃前病未解後病已至有逼相併之義故曰併病也經曰太陽與少陽併病頭項強痛或眩冒云云如果併作一家則仲景不具兩經之證而言也其非併字明矣

又曰或云三陽合病有大陽陽明有正陽陽明有少陽陽明似乎重出予曰各有所指不過表裏之分耳夫三陽合病在表三陽陽明病在裏事在兩途即非重出在表者宜解散以痊安在裏者非攻下則不可然表裏證治迥各不同惟編目有似字出

發汗後不解

傷寒初感始以太陽故以發汗為首汗行如雨散雲其病乃愈倘汗行不解者或表邪未盡或熱邪傳裏或邪氣怏乘虛內客故有汗後而不解者

發汗病不解反惡寒虛也芍藥甘草附子湯 太陽病發熱汗不解仍發熱心下悸振振欲墜地直武湯 發汗後身疼痛脈沉者桂枝加芍藥人參新加湯 太陽發汗遂漏不止其人惡風小便難四肢拘急難以屈伸桂枝加附子湯 大汗出熱不去內拘急四肢疼下利惡寒四逆湯 發汗過多冒心心下悸欲得按桂枝甘草湯 汗後腹

脹滿厚朴生薑人參湯 太陽病發汗後大汗出胃中乾燥不得眠欲飲水者少少與之則愈若脈浮小便不利微熱消渴者五苓散 發汗已脈浮數煩渴五苓散 服桂枝湯脈洪大與桂枝湯如前法若形如瘧日再發汗出必

解麻黃湯 發熱汗出不解心中痞鞭嘔吐不和大柴胡湯 服桂枝湯大汗出大煩渴不解脈洪大白虎加入參湯 發汗後臍下悸欲作奔豚茯苓桂枝甘草大棗湯 發汗後不惡寒但惡熱蒸蒸發熱者實也調胃承氣湯

發汗後不可更行桂枝汗出而喘無大熱者麻黃杏仁甘草湯



下後不解

去傷寒之邪不過汗吐下之三法也三法得當病勢易衰則愈矣三法失宜病勢危惡傳變不已誠可慮也况發汗吐下後邪氣乘虛而未散或壅塞而未盡則當量其虛實以治之先賢謂知邪氣之虛實發汗吐下之不差溫補針艾之過當則萬全之功可得矣若過經者以六日傳六經七日為一候若不愈十三日乃再傳經盡所以謂之過經也傷寒五六日大下後身熱不去心中結痛未欲解也梔子豉湯下後心煩腹滿卧起不安梔子厚朴湯 陽明病下之心下懊懣而煩梔子豉湯若有燥屎者大承氣湯 太陽病下後脈促胸滿桂枝去芍藥湯微惡寒者去芍藥方中加附子醫以丸藥下之身熱不去微煩梔子乾薑湯 太陽病桂枝證醫反下之利遂不止脈促者表未解喘而汗出者葛根黃連黃芩湯 服桂枝湯或下之仍頭痛項強無汗翕翕發熱心下滿微痛小便不利桂枝去桂加茯苓白朮湯 太陽病過經十餘日二三下之嘔不止心中微煩大柴胡湯下之 六七日大下後寸脈沉而遲手足厥逆下利脈不至咽喉不利吐膿血瀉利不止為難治麻黃升麻湯

汗吐下後不解

五六日已發汗復下胸脇滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩為未解柴胡桂薑湯 太陽汗吐下解後心下痞鞭噫氣不除者旋覆代赭石湯 太陽先發汗不解而復下之脈浮者則知病在外當須解外桂枝湯 發汗若下之病仍不解煩躁不得眠茯苓四逆湯 大汗若大利而厥者四逆湯 下後復發汗晝日煩躁不得眠夜而安靜不嘔不渴無表證脈沉微身無大熱乾薑附子湯 下後復發汗必振寒脈微細此內外俱虛也傷寒本寒後復吐下之食入口即吐乾薑黃連黃芩人參湯 發汗吐下後虛煩不得眠劇者反覆顛倒心中懊懣梔子豉湯 發汗若下之煩熱胸中窒梔子豉湯 吐下後不大便五六日至十餘日晡發潮熱不惡寒獨語如見鬼狀循衣摸牀脈弦者生瀋者死但發執識語者大承氣湯 吐下後腹脹滿邪熱入胃也調胃承氣湯 太陽

吐下後微煩小便數大便鞭小承氣湯 吐下後七八日不解結熱在裏表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾燥煩欲飲水白虎加入參湯 吐下後心下逆滿氣上衝胸頭眩脈沈緊發汗則動經身為振搖茯苓桂枝白朮甘草湯

喘

成 肺主氣形寒飲冷則傷肺故其氣逆而上行衝衝而氣急喘喘而息數張口擡肩搖身滾肚是為喘也亦有邪在表致氣不利而喘者麻黃湯桂枝加厚朴杏仁湯有水射肺而喘者小青龍湯發汗後飲水多必喘以水灌之亦喘及傷寒心下有水氣乾嘔發熱而欬或喘者小青龍去麻黃加杏仁是欲發散水寒也經曰喘而汗出者與葛根黃芩黃連湯以利之此邪氣內攻氣逆不利因喘而汗出見汗出而喘者與麻黃甘草石膏湯以發之此外邪壅或使喘不已見其邪氣在表也雖經汗下亦可發之若傷寒止於邪氣在表而喘者心腹必濡而不堅設或腹滿而喘則又為可下之證經曰短腹氣滿而喘有潮熱者此外欲解可攻裏也又汗出髮潤喘不休者為肺絕身汗如油喘而不休為命絕直視譫語喘滿者死是皆不治之喘也

太陽病 頭痛發熱身痛腰痛骨節痛惡風無汗而喘麻黃湯 太陽與陽明合病喘而胸滿者不可下麻黃湯

許 有人病傷寒脈浮而長喘而胸滿身熱頭痛腰脊強鼻乾不得卧予曰太陽陽明合病仲景云中有三證下利葛根湯不下利嘔逆者加半夏喘而胸滿者麻黃湯也治以麻黃湯得解

傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱而欬或喘者小青龍湯方見太發汗後飲水多必喘以水灌之亦喘喘肺病

而喘者欲冷傷肺也以冷水灌洗而喘者形傷寒心下有水氣欬而微喘發熱不渴服湯已渴者此寒去欲解也

小青龙湯 喘家有汗桂枝湯加厚朴杏仁佳太陽病為諸陽主氣風甚氣壅則生喘也太陽病下之微喘者表未

解故也桂枝加厚朴杏仁湯主之下後大喘則為裏氣太虛邪氣傳裏正氣將脫也下後微喘則為裏氣上逆邪不能傳裏猶在表也與桂枝湯以解外加厚朴杏仁以下逆氣

桂枝加厚朴杏仁湯方

桂枝 去皮 芍藥 生薑 切各 厚朴 炙去 甘草 炙各 杏仁 去皮尖 大棗 十二枚 厚朴 炙去 甘草 炙各 杏仁 去皮尖 大棗 十二枚

七味以水七升煮取三升去滓溫服一升

發汗後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱者可與麻黃杏仁甘草石膏湯主之（成）發汗後喘當作桂枝加厚朴

為邪氣壅其桂枝湯不能發散故不可更行桂枝湯汗出而喘有大熱者內熱氣甚也無大熱者表邪甚也與麻

黃杏仁甘草石膏湯以散其邪（張）予觀仲景常言發汗後乃表邪悉解止餘一證而已故言不可更行桂枝湯

汗出而喘無大熱乃上焦餘邪未解當用麻黃杏仁甘草石膏湯以散之夫桂枝加厚朴杏仁湯乃桂枝湯證具而

加喘者用之註言汗出而喘以為邪氣壅甚非桂枝所能發散此誤也況身無大熱更無證何故復言杏仁甘草

後章下後不可更行桂枝湯條下註曰汗下雖殊既不當損正氣故有一其言有至理存 下後不可更行桂枝湯若

馬可見汗後所註之誤矣原其理當時因事發後前後失於云發汗後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱者為與

汗出而喘無大熱者可與麻黃杏仁甘草石膏湯（成）此證治同汗下雖殊既不當損正氣則一邪氣所傳既同遂用一

法治之經所謂若發汗若下若吐後是矣

麻黃杏仁甘草石膏湯方 麻黃四兩 杏仁五十枚 甘草炙二 石膏半斤 碎 右四味以水七升先煮麻黃減二升去上


沫納諸藥者取二升去滓溫服一升肝苦急急食甘以緩之風氣通於肝風邪外甚故以甘劑發之

太陽病（不解）桂枝證醫反下之利遂不止脈促者表未解也喘而汗出者葛根黃芩黃連湯防見

陽明中風（汗）口苦咽乾腹滿微喘發熱惡寒脈浮而緊若下之則腹滿小便秘麻黃湯 陽明脈浮無汗而喘

者發汗則愈宜麻黃湯 陽明病（和）脈浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反惡熱身重白虎湯五苓散 傷寒四五日脈沉而喘滿沉為正裏而反發其汗津液越出胃中乾燥 陽明病脈遲雖汗出不惡寒者其身必重短氣腹滿而喘有潮

具也則當下之反發其汗令津液越出胃中乾燥 陽明病脈遲雖汗出不惡寒者其身必重短氣腹滿而喘有潮 大便必難及則燥燥必發讞語也 大承氣湯 熱者此外欲解可攻裏也手足濇然而汗出者此大便已鞭也大承氣湯主之 病人小便不利大便乍難乍易時 有微熱喘冒不能卧者有燥屎也宜大承氣湯



診傷寒吐下後不大便潮熱若劇則不識人循衣摸牀微喘直視脈弦者生瀉者死詳續衣濕家下後額汗微

喘大小便利者死論見體痛少陰病息高者死詳見厥利厥冷無脈灸之不還反微喘者死詳見厥利直視譫語喘滿

者死論見譫語脈浮洪汗出如油髮潤喘不休為命絕

附

活陰證喘促者返陰丹主之四肢逆冷喘促入口便佳方見陰毒病人小渴與水劇飲之致停飲心下滿結者喘促

甚不當以五苓散或陷胸丸主之方見渴及結胸

戴喘嗽有陰陽太陽經喘嗽略於前本經言之詳見嗽門少陽有嗽無喘有喘非少陽也其見少陽證而喘者宜

小柴胡湯加北五味子六分乾薑四分陽明有喘無嗽有嗽非正陽明也其陽明證喘有潮熱者宜大承氣湯陰證

喘惟少陰有之若四肢沉重痠痛小便如常大便自利而嗽者真武湯去芍藥加北五味乾薑各半錢細辛三錢此

陰中之陰若四肢厥逆腹中痛泄利下重而欬四逆湯加北五味乾薑各半錢下利嘔渴身煩不得眠而欬嗽者猪

苓湯此陰中之陽諸陰喘促最為危證宜用返陰丹

吳凡表有寒發喘者脈浮緊惡寒身疼無汗也宜麻黃湯汗之若表有風發喘者脈浮緩惡風自汗也宜桂枝湯

加厚朴杏仁主之凡陽明內實不大便腹滿短氣發潮熱而喘者大柴胡加厚朴杏仁湯或小承氣湯凡陰證厥逆

脈沉細而微氣促而喘無汗者宜四逆湯加五味杏仁凡虛人脈伏若手足逆冷而喘者五味子湯凡暴言風寒脈

浮無汗而喘蘇沈九寶湯凡熱盛有痰脈弦數而喘不可汗不可下以小柴胡湯加知母貝母瓜蒌仁胸滿者加枳

殼桔梗心下滿者加枳實黃連舌燥飲水而喘者加知母石膏主之古人云諸喘為惡故非輕也華陀曰感則為喘

蓋非肺氣盛也乃肺中之邪火盛也所以瀉白者瀉肺中之火也非瀉肺也又為瀉心湯乃瀉心下之痞滿者也衛

生膏鑑曰凡看文字有餘當認作不足者蓋受病為不足病氣為有餘也

六科雜覽 傷寒



五味子湯方見厥門

蘇沈九寶湯

桑白皮上

甘草下

大腹皮下

官桂下

麻黃中

薄荷下

陳皮上

紫蘇中

杏仁去皮尖炒中

生薑三片

烏梅半個

右用水二鍾煎至八分去滓通口服

加減瀉白散

治煩熱胸膈不利上氣喘促口乾或欬者

桑白皮二錢

知母

橘紅

瓜蒌仁去殼

細黃芩

貝母

甘草各一錢五分

地骨皮一錢

右煎服法同前

短氣

成短氣者氣急而短促似喘而非喘喘則張口擡肩短氣只是氣促不能相續似喘而不擡肩似呻吟而無痛也

有青為實者經曰短氣腹滿而喘有熱潮此外有青為虛者經曰跌陽脈微而緊緊則為寒微則為有在表者經曰

但坐以汗出不微故也更發汗則愈與其風濕相搏汗出有在表者經曰乾嘔短氣汗出不惡寒此表解裏未和十

短氣小便不利惡風者甘草附子湯此邪在表而短氣也有在表者經曰乾嘔短氣汗出不惡寒此表解裏未和十

硬成結胸大陷胃湯治各有異大抵短氣為實要略曰短氣不足以息者實也又水停心下亦令短氣要略曰食少

飲多水停心下微者短氣學考察諸

表證短氣骨節痛不得屈伸汗出小便不利惡風身腫者為風濕宜甘草附子湯方論見體痛短氣腹滿脇痛其人

若脈弦浮大外不解無汗嗜卧身黃小便難有潮熱者小柴胡湯論見胃實方往來寒熱若表解心下痞鞭乾嘔短氣者宜十棗湯方見

裏證若表未解手足濇然汗出或有潮熱者宜大承氣湯方論見潮熱若表解心下痞鞭乾嘔短氣者宜十棗湯方見

汗不徹短氣煩躁若發汗不徹續微汗出不惡寒表證不能面赤者為併病更發汗則愈論見面赤

見脇滿痛



下後 若下後心中懊憹心中鞭痛者用大陷胸湯論見

診 跌陽脈微而緊則為寒微則為虛微緊相搏則為短氣坐而伏者短氣也

附

陶 傷寒失於汗下或因汗下後虛令人氣逆不相接續者名短氣分虛實治之此與喘證不相類

吳 因汗吐下後元氣虛弱脈來微虛氣不能相接而短少者以人參益氣湯凡陰證脈弱沉而遲手足逆冷面

上惡寒如刀刮口鼻之氣難以布息而短者宜四逆湯加入參王之又食少飲多水停心下令人氣短胸悶以茯苓

甘草湯治之

身重

成 身重之由有風濕有風寒有風濕俱見有大逆有易病有三陽合病雖所得不一然悉屬三陽非若身及兼者

三陰裏寒也壞病有矣寒則無之識者鑒焉

太陽 傷寒脈浮緩身不反但重乍有輕時無少陰證者大青龍湯發之陽病 發汗已身猶灼熱名曰風濕脈浮

汗出身重多眠鼻息鼾詳風濕宜治人萎發湯 風濕脈浮身重汗出惡風者宜

防已黃耆湯

防已 一兩

甘草 半兩

白朮 七錢

黃耆 去蘆一兩一錢

右咬咀每服五錢生薑四片大棗一枚水一

盞半煎至八分溫服良久再服服後當如蟲行皮中從腰下如水後坐被上又以一被繞腰以下溫令微汗瘥

喘者加麻黃半兩 胃中不和者加芍藥三分氣上衝者加桂三分 下有沉寒者加細辛三分

脈浮宜以汗解用火灸之邪無從出因火而盛病從腰以下必重而瘳名火逆也 脈浮數者法當汗出而愈若下

之身重心悸者不可發汗當自汗出以解所以然者尺中脈微此裏虛須表裏實津液自和便自汗出愈 傷寒八

六十一

傷寒

傷寒

五



九日下之胸滿煩驚小便不利讖語一身盡重不可轉側者柴胡加龍骨牡蠣湯主之方見驚飛病有身重不能轉側下後血虛津液不榮於外也身重不能轉側者風濕相搏於經而裏無邪也經曰傷寒八九日風濕相搏身重體煩而不能自轉側不嘔不渴脈浮虛而澹者以桂枝附子湯主之此以柴胡加龍骨牡蠣湯主之以上二證言不能轉側頗相似論病與重俱不相侷各從本法為宜也

陽明 病脈遲汗出不惡寒身重短三腹滿而喘或潮熱或不潮熱承氣湯證詳腹滿 陽明病脈浮緊口苦咽乾腹

滿而喘發熱汗出不惡寒身重忌汗忌燒鍼忌下詳自汗註云此證宜和解之

三陽合病 腹滿身重難以轉側口不仁而面垢讖語遺尿發汗則讖語下之則額上生汗手足逆冷若有汗出者

白虎湯主之或腹滿身重難以轉側口不仁讖語者陽明也針經曰少陽病甚則面微塵此面垢者少陽也遺尿者太陽也

語若下之攻裏表熱乘虛內陷少額上汗出手足逆冷其中三陽合病為表裏有邪若發汗攻表則燥熱益甚必愈讖語熱甚也內經曰熱則腠理開榮衛通汗大泄與白虎湯以解內外之熱

少陰 病腹痛小便不利四肢沉重痠痛下利者真武湯

中暍 發熱惡寒身重而痛手足逆冷小有勞身即熱小便已洒洒然毛聳其脈弦細孔進口開前板齒燥此為太陽中暍忌汗下溫鍼宜白虎加人參湯詳暑病

陰陽易 身重少氣少腹裏急或引陰中熱上胸衝眼花者此為陰陽易宜燒視湯方論見陰陽易

難轉側

三陽合病腹滿身重難轉側汗出者白虎湯論見身重 下後胸滿煩驚小便不利讖語身重不可轉側者柴胡牡蠣湯


論見 風濕相搏身體煩痠不能自轉側不嘔不渴脈浮虛而澀者桂枝附子湯論詳身體痛

面赤 面垢 面青 眼赤

太陽病面反有熱色二陽併病面色緣緣正赤陽明面合赤色是皆表邪必發散解肌而愈少陽目赤和解而安少

陰面赤色厥陰面少赤帶陽二日必四逆而後可也面赤雖由陽熱而生然各經俱無可下之證在少陰厥陰者正

陰面赤色厥陰面少赤帶陽二日必四逆而後可也面赤雖由陽熱而生然各經俱無可下之證在少陰厥陰者正



證有下利厥逆脈微實為陰寒之病縱面赤似陽只是兼化而已

太陽病如瘧狀若脈微惡寒面反有熱色而身癢者桂枝麻黃各半湯小汗之方論見發熱脈浮而遲面熱赤而

惕者六七日當汗出而解反發熱者瘧連為無陽不能作汗其身必癢也

二陽併病太陽初得病時發其汗汗先出不徹因轉屬陽明續自微汗出不惡寒若太陽證不罷者不可下之

之為逆如此可小發汗設面色緣緣正赤者陽氣怫鬱在表當解之薰之若發汗不出不足或陽氣怫鬱不得越

當汗不汗其人躁煩不知痛處乍在腹中乍在四肢按之不可得其人短氣但坐以汗出不徹故也更發汗則愈何

以知汗出不徹以脈澀故知也因發不透徹而面赤躁煩短氣者不足言陽氣怫鬱止是當汗不汗也故更發汗則愈**陽明**病面合赤色不可攻陰

病下利清穀裏寒外熱手足厥逆脈微欲絕身反不惡寒其人面赤色或腹痛或乾嘔或咽痛或利止脈不出者通

脈四逆湯加蔥白詳下厥陰下利清穀脈沈而遲其人面少赤身有微熱者必鬱冒汗出而解病人必微厥所

以然者其面戴陽下虛故也詳下面赤而身熱足寒而口噤及背反張者瘧病也詳雜病面赤而斑斑如錦紋

咽喉痛唾膿血者陽毒也詳陽毒**面垢**三陽合病腹滿身重難轉側口不仁讞語面垢遺尿不可汗下

面青太陽病汗後遂發熱惡寒復加燒針因胸痞面青膚潤者難治色微黃身足溫者易愈

目赤少陽中風兩耳無聞目赤胸滿而煩者不可吐下小柴胡湯

面黃孫兆口訣云工部郎中鄭厚忠患傷寒胸腹滿面黃如金色諸翰林醫官商議略不定推讓曰胸滿可下恐

脈浮虛召孫至曰諸公雖疑不用下藥鄭之福也下之必死某有一二服藥服之必瘥遂下小陷胸湯尋利其病

遂良愈明日面色改白京師人稱服

壞病

仲 太陽病三日已發汗若吐若下若溫針仍不解者此為壞病桂枝不定與也觀其脈證知犯何逆隨證治之

按逆者謂不當汗而汗不當下而下或汗下過甚皆不順於理故云逆也隨證治之者如後云汗後病不解及發汗若下之病仍不解某湯主之之類是也隨證治之一句語活而義廣王韓諸家以壞病另作一證而以羊肉湯

主之誤矣

本 太陽病不解轉入少陽者胸下鞕滿乾嘔不能食往來寒熱尚未吐下脈沈緊者與小柴胡湯若以吐下發汗溫針讖語柴胡證罷此為壞病知犯何逆以法治之

趙 仲景論中所謂壞病者以太陽病誤汗吐下後虛煩結胸痞氣吐後內煩腹脹滿等證是也此正謂桂枝不

定與小柴胡湯證罷者曷嘗指異氣之病如活人所謂異氣為壞病之說仲景又云更感異氣變為他病者即索矩所為二氣三氣雜合為病是也以其未可定名而非有名四種溫病之比故以變病名之且四經溫病仲景以

為冬傷於寒至春發為溫病溫病未已重遇於邪變為溫瘧風溫溫毒溫疫病未嘗壞故以變證名之一曰壞病一曰變證名目自是不同可見異氣不為壞病也審矣假如溫瘧果為壞病則仲景不言小柴胡湯證罷也請三

思焉

是齋方 傷寒陰陽二證不明或投藥錯誤致患人困重垂死七日以後皆可服傳者云于不失一用好入參一兩

去蘆薄切水一大升於銀石器內煎至一盞以新水沈之取冷一服而盡汗不自他出只在鼻梁尖上涓涓如水是其應也妙其蘇軾光云侍郎方文嘗以救數十人王使君室清流日停車申屠行父之子婦產後病時疫一十餘日

已成壞病偶見問因觀其只服八參一味遂安是時未知有此方偶然暗合耳

海 陽證大汗大下後亡陽於外亡血於內上而津脫下而液脫津液兩亡宜以羊肉湯補之矧陰證者豈可不溫



補哉此與傷寒太陽證振搖與真武湯一例外之陽病至此尚溫况內之陰候豈得不補耶

韓產脫血虛者宜用羊肉湯傷寒汗下太過亡陽失血若只用救逆效必遲矣與羊肉湯為效神速病人面色

見陽是客熱上焦中下二焦陰氣已盛若調得下焦有陽則上焦陽氣下降丹田知所歸宿矣夫氣有高下病有遠

近證有中外治有輕重各適其所乃愈故病八九日汗下太過二脈沈細無力多踈是卧惡聽人聲皮有粟時戰如

瘧宜羊肉湯王之

羊肉湯方

當歸

白芍藥

牡蠣煨亦各一兩

生薑 二兩

桂枝 七錢

龍骨煨通赤半兩

黑附子炮去皮

右為麤末每服一兩羊肉四兩葱白五寸生薑心同剉爛以水五升熬減一半以來濾絞去滓分三服服之

此方陰證宜之

覽甲散 治傷寒八九日不瘥諸藥不效名壞傷寒

覽甲鱗文為末

升麻

前胡

烏梅肉

枳實

犀角 鎊

黃芩 二兩

甘草 二錢

生地黃 一兩

每服五錢水一盞半煎至八分去滓服 按此方陽證宜之

振戰慄

成振者聳動也戰者戰搖也慄者心戰也振輕而戰重也戰外而慄內也振者責其虛寒虛則不至於爭故止於

振聳且戰者為正與邪爭則股慄而戰矣戰雖重於振而慄重於戰也戰者正氣勝慄者邪氣勝也皆邪正之相

爭也

太陽傷寒若吐若下後心下逆滿氣上衝胸起則頭眩脈沈緊發汗則動經身為振振搖者茯苓桂枝白朮甘草

湯王之成吐下後裏虛氣上逆者心下逆滿氣上衝胸表虛陽不足起則頭眩脈浮緊為邪在表當發汗脈沉緊

為邪在裏則不可發汗則外動經絡損傷陽氣陽氣外虛則不能主持諸脈身為振振搖也與此湯以發汗



和經
益陽

茯苓桂枝白朮甘草湯方

桂枝去皮
三兩

茯苓四兩

白朮

甘草各二兩

右四味以水六升煮取三升去滓分溫三服

陽不足者補之

以甘茯苓白朮生津液而益陽也藜藜逆者散之以辛桂枝甘草行陽散氣

太陽病發汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身瞤動振振欲擗地真武湯主之方見下利

孫太乙宮道士周德真患傷寒發汗出多驚悸目眩身戰掉欲倒地眾醫有欲發汗者有作風治者有用冷藥解者病皆不除召孫至曰太陽經病得汗早欲解不解者因太陽經欲解復作汗腎氣不足汗不來所以心悸目眩

身轉遂作真武湯服之三服微汗自出遂解蓋真武湯附子白朮和且腎氣腎氣得行故汗得來也若但責太陽

者惟能乾涸血液爾仲景云尺脈不足禁氣不足不可以汗以此知腎氣怯則難得汗也明矣許學士云鄉里有

一姓高者子年三十初得病身微汗脈弱惡風醫以麻黃藥與之汗遂不止發熱心多驚悸夜不得眠讒語不識

人筋惕肉瞤振振動搖醫又進鎮心藥予曰強汗之過也仲景曰脈微汗出惡風不可服青龍湯服之則筋惕肉

瞤此為逆也惟真武湯可救進此三服佐以清心竹葉湯數日遂愈清心竹葉湯方未考

下後復發汗必振寒脈細微所以表者以內外俱虛故也亡血家不可發汗發汗則寒慄而振 太陽病大發其

背大汗出火熱入胃發譫語十餘日振慄自下利者此為解也詳語

脈沈緊按之芤當戰而汗出解脈芤為虛是以發戰脈浮為在表故當汗出解也論見首卷 太陽病脈陰陽俱停等證

必戰慄汗出而解論見發熱 凡柴胡證下之苟下之而仍不能者後與柴胡湯必蒸蒸而振發熱汗出而解論見往來寒熱

脈浮而遲面熱赤而戰惕者當汗出解也反發熱者脈遲不能作汗其身必瘡論見面赤 諸乘寒者則為厥鬱冒不仁

口急不能言戰而慄也陰中於邪必內慄也表氣微虛裏氣不守故邪中於陰也



宜炎之或用大建中湯仲景治尸厥戰而慄者刺期門巨關

〔吳〕凡振者大抵氣血俱氣不能榮養筋骨故為之振搖而不能主持也須大補氣血則可予曾用人參養榮湯得效又一人身搖不得眠者以十味溫膽湯倍加人參遂愈內經曰寒之傷人使人毫毛畢直鼓顛戰慄而無汗

按此表寒而戰慄也經言病有戰而汗出因得解其脈浮而緊按之反孔此為本虛故當戰而汗出也又曰脈陰陽俱停以三部浮沉遲數脈同等必先振慄汗出而解若脈浮數按之不孔其人本不虛者則汗出而解不發戰也若不發戰而心慄者此陰中於邪必內慄也凡正氣怯弱寒邪在內必為慄也學者宜詳究焉

加味人參養榮湯 治發汗過多氣血俱虛而筋惕肉瞤或身振搖者

人參二錢

茯苓

甘草

川芎各一錢

白朮

麥門冬 去心

當歸身各一錢半

五味子 粒十五

肉桂一錢有熱者減半

生地黃一錢半有熱者用此無汗用熟地黃

黃耆二錢半有自汗者用二錢

生薑三片

棗子二枚

水二鍾煎至一鍾去滓溫服如陰虛相火動者加知母黃芩各一錢酒炒用若

陽虛下寒脈微者加熟附子一錢肉桂倍之不得依加遠志酸棗仁各一錢

加味溫膽湯 治虛煩身振不得眠

人參二錢

橘紅

茯苓

黃連 酒炒

軟苗柴胡

當歸身

川芎

白芍藥

生地黃

酸棗仁 以上各一錢

半夏七分

甘草五分

竹如 一團

生薑三片

石煎服法前同

竹葉清心湯 火熱入心燥煩振慄

淡竹葉片二十

黃芩一錢

梔子一錢

甘草五分


川黃連 五分 薑炒

薄荷一錢

六斗 隼 電

卷五

傷寒



連翹一錢

石膏八分

水二鍾煎

筋惕肉瞤

成經云陽氣者精則養神柔則養筋發汗津液枯少陽氣大虛肌肉失養故惕惕而跳瞤瞤然而動也宜宜溫經益陽真武之類是矣又傷寒吐下後復發汗筋脈動惕者久而成痿及太陽病發汗復下之表裏俱虛後加燒針因唐瞤者難治二者逆之甚也又非若但發汗後可以發汗吐下庸可忍諸

太陽病脈微弱汗出惡風者不可服大青龍湯服之則厥逆筋惕肉瞤宜真武湯 太陽病已汗不解仍發熱頭

眩身瞤振振欲擗地者真武湯或以人參養榮湯倍人參當歸 傷寒吐下後復發汗虛煩脈甚微八九日心下痞脇下痛氣上衝

咽喉眩冒經脈動惕者久而成痿真武湯桂枝苓朮甘草湯

陽明傷寒吐下後不解不大便五六日至十餘日晡所發潮熱不惡寒獨語如見鬼狀循衣摸牀惕而不安喘

微直視脈弦者生澀者死但發熱譫語者大承氣湯 陽明脈浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反惡

熱身重若加燒針必怵惕躁煩不得眠 若動氣在左頭汗不止者活人用防風白朮牡蠣次服建中湯

診汗下吐溫鍼後若膚瞤動胸煩面色青黃者難治論見

活傷寒吐下後發汗脈微心下痞脇痛氣上衝筋脈動惕此為逆甚

吳夫此證者因發汗攻表太過邪熱未解血氣虛奪筋肉失養所致或不因此由素稟血少邪熱搏於血脈之

中火性動惕故也曾治一人傷寒不經發汗七八日筋脈動惕潮熱尤甚其肉不瞤大便秘結不行小便赤澀

以手按臍旁鞭痛此有燥屎也以加味大柴胡湯下之而愈又一八傷寒十餘日曾三四次發汗過多遂變肉瞤

身振搖筋脈動惕此汗多氣血俱虛故也以加味人參養榮湯二劑而愈又一八汗後虛煩不得眠筋惕肉瞤內

有熱以加味溫膽湯治之而愈凡治此證要察虛實也



又手膏心

發汗過多又手自冒心心下悸常欲按者桂枝甘草湯見

驚悸

驚悸之別雜病中辨之甚明傷寒中有單言驚者有單言悸者理不得治故兩分之其兼言驚悸者則陽明實也赤胸滿而煩者不可吐下吐下則悸而驚一條而已

〔海〕茯苓丸 治傷寒後或用心勞倦四肢羸弱心忪驚悸吸吸短氣

茯苓

麥門冬 去心

熟地 各一兩

牡丹皮

人參

黃耆 各五錢

桂枝

甘草 炙

牛膝

澤瀉 各半兩

右為細末煉蜜和搗三五百杵尤如梧桐

子大每服二十丸食前溫酒下

犀角湯

治傷寒後伏熱在心怔忡驚悸不得眠睡

犀角屑 半兩

茵陳蒿 七錢

茯苓 二兩

芍藥 二兩

生地黃 二兩

麥門冬 去心一兩半

山梔 半兩

右以咀每服五錢水一盞生薑二片竹葉三七片同煎至七分食後服

麥門冬 茯苓 飲子

治傷寒後心神恍惚不得卧

麥門冬 去心

赤茯苓 去皮

知母 焙

芍藥

炙甘草

酸棗仁 微炒

陳皮 去白

檳榔 各一兩

右以咀每服五錢水一盞半生薑五片煎溫服日三

驚

夫驚壞病也由誤下火逆溫針所致仲景之法不過隨其逆而調之

傷寒八九日下之胸滿煩驚小便不利讖語一身盡重不可轉側者柴胡加龍骨牡蠣湯主之

〔成〕傷寒八九日邪氣已成熱而復傳陽



經之時下之虛其裏而熱不除胸滿而煩者陽熱客於胸中也驚者心惡熱而神不守也小便不利者裏虛津液不行也譫語者胃熱也一身盡重不可轉側者陽氣內行於裏不營於表也與柴胡湯以除胸滿而煩如龍骨牡蠣湯丹收斂神氣而鎮驚加茯苓以行津液利小便加大黃以逐胃熱止譫語加桂枝以行陽氣而解身重雜錯之邪斯悉愈矣

柴胡加牡蠣龍骨湯方

半夏 湯洗 二合

柴胡 四兩

大黃 二兩

人參

桂枝 去麤 皮

茯苓

龍骨

鉛丹

牡蠣 熬

生薑 各一兩半

大棗 六枚

右十一味以水八升煮

反四升納大黃切如棋子更煮一二沸去滓溫服一升

傷寒脈浮醫以火迫劫之亡陽必驚狂起卧不安者桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯主之成傷寒脈浮者發汗汗大出者亡其陽汗者心之液亡陽則心氣虛心惡熱大邪內迫則心神浮越故驚狂起卧不安與桂枝湯解未盡表邪去芍藥以芍藥益陽非亡陰所宜也火邪錯逆加熱漆之辛以散之陽氣亡脫如龍骨牡蠣之澀以固之

本草云澀可去脫龍骨牡蠣之屬是也

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯方

桂枝 去麤 皮

生薑 切

蜀漆 洗去腥 各三兩

牡蠣 熬 五兩

龍骨 四兩

甘草 炙 二兩

大棗 十二枚

右為末以水一斗二升先煎蜀漆減二升納諸藥煎取三升去滓溫服一升

太陽傷寒者加溫針必驚也心屬火火先入心心主血而藏神血如水也神如魚也兩陽相熏灼水熱湯沸則魚驚躍不能安矣 風溫脈浮自汗身重多眠若被火

者微則發黃劇則如驚癇時瘵論見風溫

吳大抵傷寒汗吐下之後虛極之人或因事未決遂生驚悸者宜養血安神鎮心之劑或硃砂安神丸之類

悸

成 悸心忪也纂纂惕惕然動怔忡忪忪不能自安也有氣虛而悸有停飲而悸有汗下後而悸者汗為心液汗去心虛如魚無水

傷寒二三日心忪而煩者小建中湯少陰病四逆或悸者四逆散加桂是氣虛而悸也陽氣內弱心悸下空虛故悸飲水多心下



悸是停飲而悸也心為大而不惡水水既由太過病發汗過多又手自冒心心下悸者太陽病若下之身重心下悸者

不可發汗少陽病不可發汗汗則譫語此屬胃不和則煩而悸少陽病不可吐下吐則悸而驚是數

者皆汗下後挾邪而悸者也其治或鎮固之或化散之惟飲之為悸甚於他邪雖有餘邪必先治悸何者心水停心

下無所不入侵於肺為喘嗽傳於胃為噦噎溢於皮膚為腫清於腸者為利治不可緩也故經曰厥而心下悸宜先

治水與茯苓甘草湯後治其厥病甚重猶先治水况病之淺者乎

太陽傷寒二三日心中悸而煩者小建中湯方見傷寒脈結代心動悸炙甘草湯主之成結代之脈動而中

能自還者名曰代由血氣虛衰不能相續也心中悸動知真氣內虛也與炙甘草湯益虛補血氣而脈復

炙甘草湯方脈湯一名復

甘草炙四生薑切桂枝去麤皮各三兩人參

麥門冬去心麻子仁各半大棗十二枚擘石九味以清酒七升水八升先煮八味取三升去滓納膠烊

消盡溫服一升日三服補可以去弱人參甘草大棗之甘以補不足之氣桂枝生薑之辛以益正氣聖濟經曰

血復脈通心也津耗散為枯五臟痿弱榮衛涸流濕潤所以潤之麻仁膠阿麥門冬地黃之甘潤經益

太陽病小便利者以飲水多必心下悸小便利者必苦裏急也成飲水多而小便利者則水不內蓄但胸中水多

悸飲水多而小便利則水蓄於內而不行必苦成心下悸金匱要畧曰食少飲多水停心下甚者則

裏急也小便不利茯苓甘草湯裏急十裏湯脈浮數者法當汗出而愈若下之身重心悸者不可發汗當自

汗出乃解所以然者尺中脈微此裏虛須表裏實津液自和便自汗出愈詳自發汗過多其人又手自冒心心下

悸欲得按者桂枝甘草湯主之成發汗過多亡陽也陽受氣於胸中胸中陽氣不足故病又

桂枝甘草湯桂枝之平走肺而益氣桂枝去麤皮甘草炙二右二味以水三升煮取一升去滓頓服

桂枝去麤皮甘草炙二右二味以水三升煮取一升去滓頓服



發汗後其人臍下悸者欲作奔豚茯苓甘草大棗湯主之汗者心之液發汗後臍下悸者心氣虛而腎氣發動也腎之積名曰奔豚發則從少腹上至心下為腎氣

逆欲上凌心今臍下悸為腎氣發動故云欲作奔豚與茯苓桂枝甘草大棗湯以降腎氣

茯苓桂枝甘草大棗湯方

茯苓 半斤

桂枝 去麤皮 四兩

甘草 二兩

大棗 十五枚

右四味以甘爛水一斗先煮茯苓三升

納諸藥煮取三升去滓溫服一升日三服作甘爛水法取水二斗置大盆內以杓揚之水上有珠子五六顆相

逐取用之茯苓以伐腎邪桂枝能泄奔豚甘草大棗之甘滋助脾土以平腎氣煎用甘爛水者揚之無力取不助腎氣也

太陽病汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身動振振欲擗地真武湯

少陽中風兩耳無所聞目赤胸中滿而煩者不可吐下吐下則悸而驚救逆小柴胡去黃芩加茯苓

尚未吐下脈沉緊者小柴胡湯又云已吐下發汗溫針後謔語為壞病蓋不可吐下者禁止之解也未吐下者未經治但可和解而已汗下者先於誤治成壞病也活人於少陽經病證中云尚未可吐下今添一可字恐未總

傷寒五六日中風往來寒熱胸脇滿默默不欲飲食心煩喜嘔或心下悸或不渴身有微熱或欬者小柴胡湯

傷寒脈弦細頭痛發熱者屬少陽不可汗汗則謔語此屬胃胃不和則愈胃不和則煩而悸調胃承氣湯

少陰病四逆其人或欬或悸或小便利或腹中痛或泄利下重者四逆散主之悸者加桂五分

厥陰傷寒厥而心下悸者宜先治水當服茯苓甘草湯却治其厥不爾水漬入胃必作利也 手足厥冷而悸者

茯苓甘草湯手足逆而不溫者四逆散加桂枝 霍亂吐利心悸者理中丸加茯苓

藏結與結胸痞氣大同小異

問曰病有結胸有藏結其狀何如答曰按之痛寸脈浮關脈沈名曰結胸也何謂藏結答曰如結胸狀飲食如故時

時下利寸脈浮關脈細小沈緊名曰藏結舌上白胎滑者難治或結胸者邪結在胸藏結者邪結在藏二者皆下後邪氣乘虛入裏所致下後邪氣入裏與陽相結者

為結胸以陽氣受於胸中故與陰相結者為藏結以陰受之則入五藏故爾氣宜通而塞故痛邪結陽分則陰氣不得上通邪結陰分則陽氣不得下通是二者皆心下硬滿寸脈浮關脈沈知邪結在陽也寸脈浮關脈小細沉陰知



邪結在陰也陰結而陽不結雖心下結痛飲食亦自如故陰氣乘陽虛而下故時時自下利陰得陽則解藏結得熱證多則易治舌上白胎滑者邪氣結胸中亦寒故云難治按本文曰如結胸狀則與結胸當有分別矣註曰是二者皆心下硬痛久穩當如結胸狀飲食如故只是按之難治不痛耳既結於藏

上胎滑者不可攻也或一藏結於法當下無陽證為表無熱不往來寒熱為半表半裏無熱其人反靜為裏無熱經云舌上如胎者以丹田有熱胸中有寒以表裏者皆寒故不可攻王胡奉云可刺關元穴

小柴胡湯 病胸中素有痞連在臍旁引少腹八陰筋者此名藏結死 病發於陽而反下之熱入因作結胸病發於陰而反下之因作痞所以成結胸者下之太早故也非此之謂也病在表則當汗而反下之因作結胸病雖在裏尚未入府而輒下之因作痞所以成結胸者下之太早故也痞者下之太早故也經曰脈浮而緊浮則為風緊則為寒風則傷衛寒則傷榮又曰證浮而緊復下之緊反入裏則作痞由此推之風邪入裏則結胸寒邪入裏則為痞然此亦皆太陽病之所成非陰證之所為也又云病在陽應以汗解陽指表證而言也明矣况痞證諸條未有因無熱而惡寒下之而成者此成先

生之 傷寒五六日嘔而發熱柴胡證具而以他藥下之柴胡證仍在者復與柴胡湯此雖已下之不為逆必蒸蒸而振却發熱汗出而解若心下滿而鞭痛者此為結胸也大陷胸湯王之若滿而不痛者此為痞柴胡不中與也宜

半夏瀉心湯 活人云知是痞先用桔梗湯尤妙此方行氣下膈用無不效正氣未衰裏不受邪故蒸蒸而振發熱汗出然後則愈若下後邪傳裏甚心下痞而硬痛者為結胸宜大陷胸湯以下裏邪痞微但滿而不痛此為痞胡不可用半夏瀉心湯無已云下後陽邪傳裏者則結於胸中以胸中為陽受邪與陷胸湯仲景於心下滿而硬痛者與結胸在心之下乎無已巧言曲喻以陽受氣於胸中陽邪傳裏則結於胸為結胸者誤也

結胸

心下痞結按之鞭滿而痛者結胸也按之鞭滿不痛者痞氣也經曰病發於陽發熱而惡寒者反下之熱入因作結胸病發於陰惡寒者反下之因作痞所以成結胸者下之太早也蓋表當汗反下之裏之正氣為下所損則表之全熱乘虛

入裏結於心下為結胸也裏之陰分已受邪熱為病是謂發於陰也或微熱下證未全不任轉瀉而反下之則裏之微熱雖除而表之熱邪又至雖不結胸亦成痞也小結胸輕於大結胸而重於此也由誤之大小非以痞為寒也經

謂但結胸無大發熱證為寒實結胸誠非寒也但熱微甚爾及夫藏結者經謂熱結於藏則為病深故云難治若用涼劑而亦有生又陽結者執結於府則微而淺也又留飲不敗而成頭汗脈沉潛及附骨者積飲成水結胸也又有

六斗進電 傷寒 七

大結胸不
按而痛

不因誤下而成結胸與痞者此又失下及夫反汗而成者也經謂熱已入裏久不攻之亦至結實名曰三死一生是
失下也汗後熱氣傳入心下而痞者是失汗也結胸固知當下或脈浮大者又不可下下之則死是猶帶表邪未全
結實故也又結胸證悉具加之煩躁者亦不治也夫藥所以能逐邪者必待胃氣施布藥力始能溫汗吐下以逐其
邪邪氣勝胃氣絕者安可為之

太陽病脈浮而動數浮則為風數則為熱動則為痛數則為虛頭痛發熱微盜汗出而反惡寒者表未解也醫反
下之動數變遲膈內拒痛胃中空虛容氣動膈短氣躁煩心中懊懣陽氣內陷心下因鞅則為結胸大陷胸湯主之

(一)成動數皆陽脈也當責邪在表睡而汗出者謂之盜汗為邪氣在半裏半表則不惡寒此則頭痛發熱盜汗出又
惡寒者表未解也當發其汗醫反下之虛其胃氣表邪乘虛則陷邪在裏則見陽脈邪在表則見陰脈陰氣內陷又

膈中拒痛者容氣動膈也金匱要略曰短氣不足以息者實也短氣躁煩心中懊懣皆邪熱為實陽氣內陷氣不
得通於膈壅於心下為硬滿而痛成結胸也與大陷胸湯以下結熱(一)丹謹按太陽病在表未嘗解在表而攻裏

可謂虛矣而况所得之脈皆浮而動數乎今得誤下動數變遲矣而又曰胃中空虛又曰短氣躁煩虛之甚矣借曰
陽氣內陷心下因硬而又曰攻之證豈具煩躁者死力緩於承氣況已下者不可再下竄不畏其虛乎上文曰結胸脈

浮大者不可下下因硬而又曰攻之證豈具煩躁者死力緩於承氣況已下者不可再下竄不畏其虛乎上文曰結胸脈
空虛容氣動膈心中懊懣者以施子鼓湯傷寒六七日結胸實脈沉而緊心下痛按之石鞭者大陷胸湯主之

吐胸中之邪况太陽失下後明有虛證乎傷寒六七日結胸實脈沉而緊心下痛按之石鞭者大陷胸湯主之
上文既言病發於陽而反下後之熱入因作結胸六七日則不必贅矣上文但言所致結胸之由至此則又發明結胸之

脈與證也成註謂此不云下後之熱入因作結胸六七日則不必贅矣上文但言所致結胸之由至此則又發明結胸之
故也此不云下後則云陽寒六七下後則云結胸熱實此亦不因下早而結胸者何也夫下早結胸事之常數實結胸事之

變其熱實傳裏為結胸乃法之闕防不盡者故仲景述其證以註方於其下也於此可見古人用心之曲盡其妙且如
下章以水結胸膈但頭汗出者以大陷胸湯主之亦在常法之外故條例其證以彰其理也亦或其

入本虛或曾吐下而裏氣弱外邪因入故自為結胸者也然所入之因不同其證治則一理而已傷寒十餘日
熱結在裏復往來寒熱者與大柴胡湯但結胸無大熱者此為水結在胸膈也但頭微汗出者大陷胸湯主之(一)成

十餘日熱結在裏是可下之證復往來寒熱為正邪分爭未全欲結與大柴胡湯下之但結胸無大熱者非熱結也
是水餘結於胸膈謂之水結胸周身汗出者是水飲外散則愈若但頭微汗出餘處無汗是水飲不得外泄停蓄而

不行也與大陷胸湯以透其水活入云水結
胸小半夏加茯苓湯小柴胡去大棗加牡蠣湯
太陽病重發汗而復下之不大便五六日舌上燥而渴日晡時小

有潮熱從心下至少腹鞭滿而痛不可近者大陷胸湯主之詳潮

熱實有熱

大陷胸湯方

大黃 六兩
去皮

芒硝 一升

甘遂 一錢
為末

右三味以水六升先煮大黃取二升去滓納芒硝煮一二沸

納甘遂末溫服一升得快利止後服

結胸由邪在胸中處身之高分宜若何吐然所謂結者諸陽受氣於胸中邪氣與陽氣相結不能分解氣不通壅於心下為鞭為痛是邪正固結於胸中非虛煩胸實之所同是須攻下可也低者舉之高者陷之使平為正結胸為高邪陷下以平之故曰陷胸湯也陷胸破結非苦寒直達者不能是以甘遂為君內經曰鹹味薄泄為陰又曰鹹以軟之氣堅者以鹹軟熱勝者以寒消是以芒硝鹹寒為臣蕩滌邪寇除去不平將軍之功也陷胸滌熱是以大黃苦寒為使利藥之中此峻劑也傷寒錯綜結胸為甚非此不能通利劑大而數少須其迅速分解邪結也

〔丹〕此證經曰胃中空虛曰短氣躁煩曰脈浮此湯不可輕用

小結胸病正在心下按之則痛脈浮滑者小陷胸湯主之

上文云硬滿而痛不可近者是不待按而亦痛也此云按之則痛是手按之然後作痛兩上文云至少腹是通一腹

小陷胸湯方

半夏 湯洗
半升

黃連 一兩

栝蠆實 大者
一枚

右三味以水六升先煮栝蠆取三升去滓納諸藥煮取二

升去滓分溫三服

一服未效再微服解下黃涎便安也 若以泄之辛以散之黃連栝蠆實之苦寒以泄熱半夏之辛以散結

病在陽應以汗解之反以冷水噴之若權之其熱被却不得去彌更益煩肉上粟起意欲飲水反不瀉者服文蛤散若不瘥者與五苓散寒實結胸無熱證者與三物小陷胸湯白散亦可服

白散方

桔梗

貝母 各三

巴豆 一分去皮心
熬黑研如脂

右三味為末納巴豆更於臼中杵之以白飲和服強

小結胸按之而痛


寒者熱

六斗雀羅

傷寒

傷寒

一



者半錢贏者減之病在膈上必吐在膈下必利不利進熱粥一杯利過不止進冷粥一杯假令汗出已腹中痛與芍藥一兩如上法 右執實結胸及寒實結胸活人不拘寒熱但用陷胸湯不瘥者用枳實理中凡應手而愈

大陷胸丸方

大黃 半斤

芒硝 熬

芒硝

杏仁 去皮尖熬 黑各半升

右四味搗篩二味納杏仁芒硝合研

如脂和散取如彈丸一枚別搗甘遂末一錢乙白蜜二合水二升煮取一升溫頓服之一宿乃下如不下更服取下為效禁如藥法 海藏云大陷胸湯太陽入本藥也大陷胸丸陽明藥也小陷胸湯少陽藥也大陷胸右執實大陷胸丸兼喘小陷胸治痞滿甘遂取其直連白蜜取其潤利皆以下泄滿實物也


心下滿痛如結胸狀若頭下強痛眩暈者刺大椎肝俞若汗下後頭項強痛發熱小便不利者桂枝去桂加茯苓白木湯方論並見項強

太陽病二三日不能卧但欲起心下必結脈微弱者此本有寒也反下之若利止必作結胸未止者四日復下之此作協熱利也 太陽病下之脈浮者必結胸也 太陽少陽併病而反下之成結胸心下鞭下利不止水漿不下其

人心煩 結胸證悉具煩躁者亦死 結胸脈浮大不可下下之則死 用藥如兵用知可而進知難而退此理

今脈浮大心中雖結其表邪尚多未全結也若輒下之重虛其裏外邪復聚而必死矣仲景所以言此為嚴戒使無踵其弊也其脈既不可攻當以候其變而許其實假如小結胸證其脈浮滑按之則痛故知邪非深結亦不敢下無過解伸心下之熱耳小陷胸湯主之或又曰結胸備有外證大陷胸論遠可用否子曰結胸無外證或有微熱或有不煩熱仲景已明言之其餘別無表證其邪亦未結實不可以結胸論也經曰傷寒六七日已發汗而復下胸脇微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩者此未為解也柴胡桂枝乾薑湯主之以上之證雖云心下支結及言胸脇滿微結二條俱有外證所以柴胡加桂及加桂薑以和解之如無外證止有胸腹結實而痛者方為結胸病也

附



活 若誤下之初未成結胸者急頓與理中湯自然得解更不作結胸蓋理中湯治中焦故也此古人亦說不到後人因消息得之若大段轉損有厥證者兼與四逆湯使安胃中雖和傷寒未退者宜候日數足可下却以承氣再下之蓋前來下之未是故也

西晉崔功行云傷寒結胸欲絕心膈高起手不得近用大陷胸湯皆不瘥者此是下後虛逆氣已不釋而毒復上攻氣毒相搏結於胸者當用枳實理中丸先理其氣次療諸疾古今用之如神

枳實理中丸方

枳實十六片

茯苓

人參

白朮

乾薑炮

甘草炙以上各二兩

為末煉蜜丸如雞子黃大每服一丸熱湯化下連進二三服胸中豁然渴者加括薑根一兩自汗者加牡蠣二兩

嘔過下利亦加

海 增損理中丸王朝奉云大小陷胸湯凡不愈者宜與之

人參

白朮

括薑

牡蠣煨

甘草炙各二兩

乾薑炒白半兩

枳實剉炒二兩

黃芩去枯一兩

右為末煉蜜為丸如彈子大湯一羹前服一丸不解復與之不過五六丸

胸中豁然矣藥之神速未嘗見也渴者加瓜蒌根自汗加牡蠣

活 水結在胸脇間亦名結胸其證頭微汗出但結胸無熱者小半夏加茯苓湯小柴胡去棗加牡蠣

孫 俞伯道忽患微熱心下滿頭有汗不能解眾醫以為溫病用表藥有謂食仕膈者治之皆不愈召孫至乃用半

夏茯苓湯遂瘳眾問其故曰頭有汗心下滿非濕證乃水結胸脇也水既去其病乃愈且如濕氣心下滿自當偏

身汗若有食心滿頭豈得汗若言是表身又不痰不惡寒表證何在故凡水結胸脇頭必有汗耳

小半夏加茯苓湯方見

六斗進

傷寒

七



穿結散大實大滿心胸高起氣塞不通者為結也

蟾酥

麝香

輕粉

巴豆少許

右再研過至細以乳汁為丸如黍米大

服二丸用薑湯下不時服

[本] 婦人傷寒血結胸膈揉而痛不可撫

海蛤散

海蛤

滑石

甘草炙各二兩

芒硝半兩

右末每服二錢雞子清調下

小腸通利則胸膈血散臆中血聚則小腸壅小腸壅臆中血不流行宜此方若小便血散數行更宜桂枝紅花湯發其汗則愈活人書云此方疑非仲景然其言有理姑存之

[戴] 執實結胸如仲景法治之又有寒實結胸雖痛而無煩躁等證此因下後虛逆寒氣獨結宜理中湯加枳實半

錢茯苓一錢或枳實理中湯又有水結胸無大熱證頭微汗出宜小半夏茯苓湯又有血結胸乎不可近其人嗽水

不欲嚙喜忘如狂大便黑色小便自利宜犀角地黃湯

[陶] 結胸之證嘗見俗醫不問曾下與未下但見心胸滿悶便與桔梗湯使呼為結胸蓋本朱秦議之說也有頻頻

與之反成真結胸者殊不知結胸乃下早而成未經下者非結胸也乃表邪傳至胸中未入於府證雖滿悶尚為在

表正廣少陽部分為半表半裏之間宜用小柴胡湯加枳殼如未效則以本方對小陷胸湯一服證然其妙如神若

因下早而成者方用陷胸湯凡分淺深從緩而治之不宜太峻上焦乃清道至高之分若過下則傷元氣也故陷胸

湯丸宜從緩治之嘗謂仲景傷寒論結胸條云病發於陽而反下之熱入因作結胸病發於陰而反下之因作痞滿

所以成結胸者以下太早故也及成氏註釋曰發熱惡寒者發於陽也無熱惡寒發於陰也再三熟玩不能不致疑

於其間蓋無執惡寒者寒邪直中陰經之真寒證也非陽經傳至陰經之病也若誤下之不死則危矣豈可以瀉心



湯寒執相參之藥治之而愈乎豈反輕如結胸者乎詳此恐言榮衛陰陽也風屬陽陽邪傷衛頭痛發熱微汗出反惡寒者當服桂枝湯止汗散邪醫者不達而下之胃氣重傷胸中結鞭經又云結胸證脈浮大者不可下下之則死結胸證者具而煩躁者亦死蓋衛出上焦清道所傷不為不重也故用胸胸湯峻利之藥以下之寒為陰陰邪傷榮當服牡蠣發表誤下之而成痞滿宜瀉心湯以理痞蓋榮出中焦善運能瀉心下痞邪下於膈不犯清道則元不傷故輕於結胸耳若陰經自中之寒以瀉心湯理之而愈者未之有也又云脈來沉實有力方為結胸急用大陷胸湯加枳桔下之

治結胸灸法

已豆耐四

黃連七寸

右搗細津唾和成膏填入臍中以艾灸其上腹中有聲其病去矣不拘壯數病

去為度纒灸後便以溫湯浸手帕拭之恐生瘡也

摘傷寒結胸

先使人心絞骨下正痛處左畔揉之以毫針刺左畔支溝穴正坐側臂取之二分次刺左間使名曰雙關次

刺左行間

卧取之針入六分此支溝行間穴下針至分數內撚針令病人五吸次外撚針三呼又次內撚針五吸吃長呼一口氣出針即左畔一解結胸立效右畔依上刺之慢慢呼吸停針用針獲時而愈

雲傷寒結胸痞氣

胸中結痞薄泉 太溪 中衝 太陵

心中結痞隱白 太白 少衝 神門

胃中結痞少商 太淵 大敦 大衝并上下腕瀉之

通元 結胸身黃 湧泉

摘血結胸面赤大燥口乾消渴胸中絞痛不可忍

期門 太陵 關元 姊妹不得刺關元胎死不出子母俱亡慎之

六斗雞籠

傷寒

七



集傷寒胸膈痛 期門 太陵

活 近世治結胸多用金針并用硫黃陽起石若寒實結胸或有痞者而其實結胸必死也

痞

心下滿鞭而痛者為實為結胸鞭滿不痛者為虛為痞無不滿不鞭但煩悶者為支結保命集云脾不能行氣於四藏結而不散則為痞大抵諸痞皆熱也故攻痞之藥皆寒劑其有一加附子者是以辛熱佐其寒涼故今開發痞之之佛警結滯非攻寒也先發汗或下後陽氣虛故惡寒汗出太陽證云發汗後惡寒者虛也此加附子為大黃黃連損其陽也非補虛也

痞鞭 傷寒嘔而發熱者柴胡證具而以他藥下之若心滿而不痛者此為痞宜半夏瀉心湯論見結胸痞同異

半夏瀉心湯方此方藥味益本理中入參黃芩湯方也

半夏半升

黃芩

乾薑

人參

甘草炙以上各三兩

黃連一兩

大棗十二枚

右七味以水一斗煮取六斗去滓再煮取三升溫服一升日三服若加甘草即甘草瀉心湯治痞硬吐利若加生薑即生薑瀉心湯

湯治痞硬意氣辛入肺而散氣半夏之辛以散結氣苦入心而泄熱黃芩黃連之苦入心痞熱脾故緩急食甘以緩之入參甘草大棗之甘以緩解

痞鞭下利 傷寒汗出解之後胃中不和心下痞鞭乾噦食臭胸下有水氣腹中雷鳴下利者生薑瀉心湯主之成

為津液之主陽氣之根大汗出後外亡津液胃中空虛客氣上逆心下痞硬金匱要畧曰中焦氣未和不能消穀故令噦乾噦食臭者胃虛而不殺穀也胸下有水氣腹中雷鳴土弱不能勝水也胸滿心湯以文痞加生薑以益胃

生薑瀉心湯方

生薑四兩

半夏半升

甘草炙

人參

黃芩各三兩

黃連二兩

乾薑一兩

大棗十二枚

右八味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服

傷寒中風醫反下之其八下利日數十行穀不化腹中雷鳴心下痞鞭而滿乾嘔心煩不得安醫見心下痞謂病不



盡復下之其痞益甚此非結熱但以胃中虛寒氣上逆故使鞭也甘草瀉心湯王之傷寒中風是傷寒或中風也邪氣在表響反下之虛其腸
胃而氣內陷也下利日數十行穀不化腹中雷鳴者下後裏虛胃弱也心下痞鞭乾嘔心煩不得安者胃中空虛氣上逆也與瀉心湯以攻痞加甘草以補虛前以行後胃虛是外傷陽氣故如生薑此以下後胃虛裏瀉陰氣故如

甘草瀉心湯方

甘草 四兩

黃芩

乾薑 各三

半夏 湯洗

黃連

大棗 十二

以水一斗煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服

〔成〕氣結而不散壅而不通為結胸胸膈湯為直達之劑塞而不通否而不泰為痞瀉心湯為分解之劑瀉心者

謂瀉心下之邪也痞與結胸有上下焉邪結在胸中故曰胸膈湯痞者留邪在心下故曰瀉心湯內經曰苦先入

心以苦瀉之瀉心者必以苦為主是以黃連為君黃芩為臣以降陽而升陰也內經曰辛走氣辛以散之散痞者

必以辛為君故以半夏乾薑為佐以分陰而行陽也陰陽不交曰痞上下不通曰滿欲通上下交陰陽必和其中

所謂中者脾胃也脾不足者以甘補之故用人參甘草大棗為使以補脾而和中中氣得和上下得通陰陽得分

水升火降則痞消熱已而大汗解矣

〔痞瀉〕脈浮而緊而復下之緊反入裏則作痞按之自濡但氣痞耳濡與破反作痞恐當作結胸心下痞按之濡其脈關上浮者

大黃黃連瀉心湯王之結言胸痞言心下結言按之石硬痞言按之濡結言寸脈浮關脈沉痞不言寸而但曰關上

大黃黃連瀉心湯方

大黃 二兩

黃連 一兩

右二味以麻沸湯二升漬之須臾絞去滓分溫再服內經曰大熱交邪心病生焉苦入心寒除熱大黃黃

連之苦寒以導瀉心下之虛熱但以

心下痞而復惡寒汗出者附子瀉心湯王之因惡寒汗出故加附子以溫經同陽

附子瀉心湯方

六科雜覽

傷寒

三

大黃

黃連

黃芩各一

附子一枚炮去皮臍

右咬咀以麻沸湯二升執漬之

一時久絞去滓納附子汁分溫再服

傷寒大下後復發汗心下痞惡寒者表未解也不可攻痞當先解表表解乃可攻痞解表宜桂枝湯攻痞宜大黃

連瀉心湯活人云大抵結胸與痞皆應下然表未解者不可攻也表證未解心下妨悶者非痞也謂之支結柴胡桂枝湯主之胸脇滿微結小柴胡加乾薑牡蠣湯主之本以下之救心下痞與

瀉心湯痞不解其人渴而口燥煩小便不利者五苓湯主之其入渴而口燥煩小便不利者為水飲內蓄津液不行

非熱痞也與五苓散發汗散水則愈一方忌之一日乃愈者不飲水者外水不入所停之水得行而痞亦愈也

痞鞭吐利傷寒發熱汗出不解心中痞鞭嘔吐而下利者大柴胡湯主之心下痞鞭嘔逆下利若表解身涼腸

痛十棗湯主之方論並見腸痛

活人云十棗湯大柴胡湯皆治心下痞十棗尤難用須是表證罷不惡寒身涼其人熱熱汗出發作有時頭疫心

下痞滿引脇下痰乾嘔短氣者乃可用十棗湯表未解者慎不可用也

下利表裏未解太陽病外證未除而數下之遂挾熱而利利下不止心下痞鞭表裏不解者桂枝人參湯主之

戒外證未除而數下之為重虛其裏邪熱而入裏虛挾熱遂利不止而心下痞若表解而下利心下痞乘虛者可與瀉心湯若不下利表不解而心下痞者可先解表而後攻痞以表裏不解故與桂枝人參湯和裏解表

桂枝人參湯方

桂枝去蘼皮

甘草炙各四兩

白朮

人參

乾薑各三兩

右五味以水九升先煮

四味取五升納桂更煮取三升溫服一升日再夜一服表未解者辛以散之裏不足者甘以緩之此以裏氣大虛表裏不解故加桂枝甘草於理中湯也

張或問大柴胡湯瀉也桂枝人參湯補也何為皆治下利心下痞鞭子曰此非裏實乃下之早因作痞裏虛協

熱而利也不觀成氏註云若表解而下利心下痞者裏實也可與瀉心湯若不下利表不解而心下痞者可先

解表而後攻痞此以表裏不解故與桂枝人參和裏解表夫傷寒發熱汗出不解心下痞鞭嘔吐而下利者表和

而裏病也。以心中痞鞭為實當以大柴胡湯下之。二者心下痞鞭雖同而虛實之證有別。故用藥有攻補之異也。
[痞鞭噫氣] 傷寒發汗若吐若下解後心下痞鞭噫氣不除者旋覆代赭石湯主之。
噫氣即俗所謂噯氣也。活命云有旋覆代赭石證其人或欬逆。
氣虛者先服四逆湯胃寒者先服理中丸次服旋覆代赭湯為良。

旋覆代赭石湯方

旋覆花

甘草各三兩

人參二兩

代赭石一兩

生薑切五兩

半夏湯洗

大棗十二枚

右七味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服。
硬則氣堅鹹味可破之旋覆花之鹹以破痞硬在則氣平重

刺可以鎮之代赭石之重以鎮虛逆平者散也生薑半夏之平以散虛痞甘者緩也人參甘草大棗之甘以補胃弱

病解後心下痞鞭噫氣存下利者此方旋覆代赭石湯也。若下利者前方生薑瀉心湯也。

[痞鞭氣上衝]

胸中痞鞭氣上衝咽不得息者瓜蒂散若心下痞鞭腸痛氣上衝咽眩冒者成痿。
論見氣上衝心

活人云下利而心下痞服生薑瀉心湯甘草瀉心湯利不止者當治其下焦赤石脂禹餘糧湯主之。蓋生薑瀉心

甘草瀉心皆治中焦此利在下焦若治中焦則利益甚爾服赤石脂禹餘糧利復不止當利其小便五苓散主

之。又云凡痞服瀉心湯不愈然後可用陷胸丸下之。
不可用陷胸湯蓋太猛只用陷胸丸

發熱惡寒身痛表證未解若心下支結妨悶者柴胡桂枝湯也。
方見太陽病若心下痞而腹滿者即前條先以桂枝湯解後用大黃黃連瀉心也

痞而手足厥冷若脈乍結乍緊心煩飢不欲食者瓜蒂散若脈細沉頭汗惡寒大便鞭者小柴胡湯。
論見厥

太陽病醫發汗遂發熱惡寒因復下之心下痞表裏俱虛陰陽並竭無陽則陰獨復加燒針因胸煩面色青黃膚

者難治。今色微黃手足溫易愈。

脈浮而大心下反鞭有熱屬藏者攻之不令發汗屬府者不令洩數洩數則大便鞭汗多則熱愈其汗少則便難若

脈遲尚未可攻。陽明痞胃實心下鞭滿者不可攻之。
論見胃實

六斗雀

傷寒

傷寒

七



中醫藥大學圖書館藏

附

桔梗枳殼湯 治傷寒痞氣胸滿欲絕

枳殼越妙去穢

桔梗各二 右以咀以水二盞煎至一盞去滓分二服

[活] 傷寒本無痞應發汗醫反下之遂成痞枳實理中丸最良審知是痞先用桔梗枳殼湯尤妙終枳殼枳殼湯無下膈先用之無不驗也

[趙] 活人書第七十六間中云凡痞服瀉心湯不愈然後可用陷胸湯下之愚詳仲景論陷胸湯無痞痞之例恐太猛難用又况胸與心下處所不同痛與不痛陰陽邪亦是除結胸外今將痞證以傳經之邪與內陷之邪分為二種而下治焉一者病發於陰身無熱而反下之醫反入裏則作痞其脈關上沉為陰邪內陷也先宜枳殼枳殼湯次半夏瀉心諸湯隨證用之服瀉心湯後渴而口燥煩小便不利者五苓散二者身有熱不因下後而傳邪入裏亦作痞其脈關上浮為陽邪隨經入裏須先解表而不惡寒者宜三黃瀉心又有心下痞而汗出惡寒者以陽邪與表之正氣入裏故表虛汗出而惡寒因加附子以固表也既結胸證有寒實熱實之殊則痞證亦有陰陽邪不為異也外有痞而鞭者或桂枝人參湯溫之或大柴胡湯十裏湯下之亦自同一律也活人書又云關浮則結熱三黃以瀉肝蓋熱結則成結胸非痞也况心下正屬中焦關脈亦王中部故湯名瀉心豈可援雜病脈例以左關為肝部因謂之瀉肝乎

[張] 或謂痞證多有雜以別證而心下痞鞭者必非半夏瀉心之所宜也子曰證候不同宜從治療以上諸痞皆雜別證非特下早而成也仲景所以各從其宜用藥以治之若下早而作痞者但滿而不痛利無外證與半夏瀉心湯以攻痞宜也

[吳] 夫痞者氣鬱不通泰也若不因下早而為痞者或痰或食或氣為之結也保命集曰治病用瀉心主之各有



冷熱之不同要在辨而治之如熱實而為痞者大黃黃連瀉心湯之類也或寒多而熱少半夏瀉心等湯之類也
要之瀉心非瀉心火之熱乃瀉心下之痞滿也

心下滿

有不因汗下而心下滿者經曰邪結在胸心滿而煩飢不欲食當吐之又曰脈浮而大心下反鞭有熱屬藏者攻之
吳氏曰按此言屬藏者宿屎在藏也不令發汗二者一吐一下因其邪之高下也又有不可下者如陽明病若心下
鞭滿不可攻之攻之利不止者死利止者愈是邪在表裏之間留於心下未全入府故戒之不可下也若因汗下後
心下滿而微痛者及吐下後心下逆滿宜桂枝白朮茯苓湯者又有下後心下鞭滿成結胸與痞者宜詳審而攻之
太陽〔和〕服桂枝或下之仍頭項強痛翕翕發熱無汗心下滿微痛小便不利者桂枝去桂加茯苓白朮湯傷寒

寒吐下後心下逆滿氣上衝胸起則頭眩脈沈緊發汗則動經身為振振搖者茯苓桂枝白朮甘草湯傷寒亦見

日發熱微惡寒支節煩痠微嘔心下支結外證未去者柴胡加桂枝湯王謂活人云不滿不硬心下煩悶謂之支結又謂飲水過多成水結者小半夏茯苓湯

傷寒〔四〕五六日大便後身熱不去心中結痛者梔子豉湯傷寒發熱汗出不解心下痞鞭嘔吐而下利者大

柴胡湯太陽少陽併病〔五〕心下鞭項強而眩者當刺大椎肺俞慎勿下

〔對法〕若心胸脇下有邪氣結實滿悶鞭痛用生薑一片搗爛絞去汁以渣炒微燥帶潤絹包之於患處款款熨

之稍可又將渣用前汁和勻炒乾再熨許久豁然寬快此為良法


傷寒五六日頭汗出微惡寒手足冷心下滿不欲食大便鞭脈細者此為陽微結有表復有裏也脈沈亦在裏假令

純陰結不得復有外證脈雖沈緊不得為少陰病以頭汗出故知非少陰也宜小柴胡湯設不了了者得屎而解

陽明病心下鞭滿者不可攻之攻之利遂不止者死利止者愈或用瀉心湯陽明病腹滿者為邪氣入府可下之心下硬滿則邪氣尚淺未全入府不可使下之

得利止者為邪氣去正氣安則愈若因下利不止者為正氣脫而死得下病二三日脈弱無太陽柴胡證煩躁心下鞭至四五日雖能食以小承氣湯

傷寒



少少與微和之詳胃

〔厥陰〕病人手足厥冷脈乍緊者邪結在胸中心中滿而煩飢不欲食病在胸中須吐之瓜蒂散

〔吳〕凡心下滿者正在心之下胃之滿也此自滿而非下之所致若下早心下滿者此為痞氣另有治條凡心下滿者以手按之揉之則散而軟者此虛氣也不發熱者以木香和中湯若發熱者以小柴胡加枳實一錢去黃芩加薑炒黃連一錢減人參一半按之汨汨有聲者有停水也按之鞭痛者有宿食也不按而痛其人喜忘者蓄血也各有本條宜詳審而治之凡少陽脈弦口苦發熱心下滿者以小柴胡加枳實黃連各一錢

心痛心下痛

傷寒五六日大下之後身熱不去心中結痛者未欲解也梔子豉湯王之成傷寒五六日邪氣在裏之時若大下後身熱去而心結痛者結胸也身熱不去心中結痛者虛煩也結胸為熱結胸中為實是熱氣已收斂於內則外身熱去虛煩為熱客胸中未結為實散漫為煩是以身熱不去六七日為欲解之時以熱為虛煩故云未欲解也但梔子豉湯以吐除之身熱不去四字要玩結胸而身不熱知熱不在表故可用大小陷胸湯丸以逐下之令熱仍在表故宜越之也成註未透

陽明中風脈弦浮大短氣腹滿脇下心痛鼻乾無汗嗜臥身黃小便難有潮熱時時噦者小柴胡湯詳胃

少陰病自利清水色純青心下必痛口乾燥者急下之宜大承氣湯成少陰腎水也青色為肝邪心下痛口乾燥也與大承氣湯以下實邪

厥陰為病消渴氣上衝心中疼熱飢不欲食食則吐衄下之利不止桂枝茯苓白朮湯

附

〔灸〕傷寒飲水過多腹脹氣喘心下痛不可忍宜灸中腕氣海二穴 如小腹有氣上衝者宜灸天樞氣衝三里三

陰文如無此證只用前穴

百篇以煩痛亦類入之今詳煩疾者謂身體四大脈疼痛煩究與心煩不同不宜濫入故去之



煩者熱也。謂煩擾也。與發熱若同而異也。煩熱為熱所煩，無時而歇。非若發熱而時發時止也。經有煩有微煩有煩熱復煩，反煩煩滿煩痛煩渴，胸中煩，心中煩，內煩，虛煩，大煩，欲解皆以煩為熱也。然陰寒而煩者亦不少也。蓋在表而煩者，則有脈浮惡風寒體強痛之證。在裏而煩者，則有潮熱譫語不大便腹滿小便赤澀之證。在半表半裏而煩者，則有往來寒熱胸脇疼痛之證。其邪在胸膈以上而煩者，則有胸滿懊憹可吐之證。其陰寒而煩者，則有惡寒而踈及下利厥逆脈微與夫吐衄之證。大煩欲解者，其脈必和，但脈不應者為難治。若是足冷脈沉細而微者，此陰證之煩也。急用人參附子熱劑溫之。若內傷勞役陰虛火動而煩者，其人身倦無力自汗尺脈浮虛也。宜補中益氣湯加炒黃連生地黃麥門冬黃柏知母之類也。若不得睡而心煩者，兼服硃砂安神丸，納其浮溜之火而安神明也。此持其大概耳。善治病者當以諸證互考之可也。

虛煩胸中煩心中煩三者不因汗吐下而煩，則是傳經之邪不作膈實，但多和解而已。經用小柴胡湯黃連阿膠湯猪膚湯是也。若經汗吐下而煩，則是邪熱內陷以為虛煩，心中嗚嗚然欲吐憤憤然無奈者是也。但多湧吐而已。經用梔子豉湯梔子乾薑湯梔子厚朴湯是也。蓋有不因汗下吐邪結胸中則為膈實，與瓜蒂散及陽明心煩與調胃承氣湯此又煩之實者也。傷寒二三日悸而煩者虛也。建中湯少陽之邪入府煩而悸者熱也。大抵先煩而後悸是熱先悸而後煩是虛治病必求其本者此也。

太陽傷寒發汗解半日許復煩脈浮數者可更發汗宜桂枝湯。發汗身涼為已解至半日許身復熱者邪不盡也故當再汗。太陽病初服桂枝湯反煩不解者先刺風池風府却與桂枝湯則愈。風池是少陽之經陽維之會不針天柱而取風池者陽維維於諸陽巨陽與諸陽主氣故也。發汗已脈浮

數煩渴者五苓散。中風發熱六七日不解而煩有表裏證渴欲飲水入則吐曰水逆五苓散。病在陽應以汗

解反以冷水灌之若灌之其熱不得去彌更益煩肉上粟起意欲飲水反不渴者服文蛤散若不差者與五苓散。方見

渴傷寒吐下後七八日不解熱結在裏表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾燥而煩者白虎加入參湯。服桂枝湯大

汗出後大煩渴不解脈洪大者白虎加人參湯主之

〔垣〕治陰虛發熱煩渴引飢熱躁熱至夜尤甚其脈洪大按之無力者此血虛發躁當以當歸補血湯主之若以白虎湯與之則誤矣如輕手脈來浮大按之即無者乃無根蒂之脈為散脈也此虛極而元氣將脫也切不可發表攻熱如誤治之則死須用大劑人參生脈湯救之當歸補血湯方見雜病發熱門

太陽病發汗若下之而煩熱胸中窒者梔子豉湯 傷寒五六日大下之後身熱不去心中結痛者未欲解也梔子豉湯 發汗吐下後其人心煩不得眠若劇者必反覆顛倒心中懊憹梔子豉湯 若少氣者梔子甘草豉湯

嘔者梔子生薑豉湯

梔子豉湯方

梔子樹擘

香豉四合 綿裹

右二味以水四升先煮梔子得二升半納豉煮取一升半去滓分為二服溫進

一服得吐者止後服

經曰其高者因而越之其下者引而竭之中滿者瀉之於內其有邪者清形以為汗其在皮者汗而發之治傷寒之妙雖有變通終不越此數法也傷寒邪氣自表而傳裏留於胸中為邪在高分則可吐之所吐之證亦自不同如不經汗下邪氣滯營於膈則謂之實也應以瓜蒂吐之瓜蒂散吐胸中之實邪也若發汗吐下後邪氣乘虛留於胸中則謂之虛煩應以梔子豉湯吐之此吐胸中虛煩者也梔子味苦寒內經曰酸苦湧泄為陰湧者吐也湧吐虛煩必以苦為主是以梔子為君煩為熱勝也湧熱者必以苦勝熱者必以寒香豉苦寒助梔子以吐虛煩故以為臣內經曰氣有高下病有遠近證有中外治有輕重各適其所果能依而行之所謂良矣

梔子甘草豉湯

於梔子豉湯中加甘草一兩餘依前法得吐止後服

梔子生薑豉湯

於梔子豉湯中加生薑二兩餘依前法得吐止後服



傷寒下後心煩腹滿卧起不安者梔子厚朴湯主之

成下後但腹滿而不心煩即邪氣入裏為裏實但心煩而不腹滿即邪氣在胸中為虛煩既煩且滿則邪氣壅於心腹之間

也滿則不能坐煩則不能卧故卧起不安與梔子厚朴湯吐煩泄滿

梔子厚朴湯方

職若湯泄梔子之苦以湯虛煩厚朴枳實之苦以泄腹滿

梔子十四枚擘

厚朴四兩

枳實四枚水浸去醜炒

以上三味以水三升半煮取一升半去滓分二服溫送

一服得吐者止後服

傷寒醫以丸藥天下之身熱不去微煩者梔子乾薑湯主之

成凡無不能除熱但損正氣邪氣乘虛留於胸中而深者則身熱不去而微煩與梔子乾薑湯吐煩正

氣按丸藥所謂神月甘遂也或作巴豆

梔子乾薑湯方

苦以湯之梔子之苦以吐煩平以瀉之乾薑之平以益氣

梔子十四枚擘

乾薑二兩

右二味以水三升半煮取一升半去滓分二服溫進一服得吐者止後服

梔子湯病入舊微瀉者不可與服之

病入舊微瀉者裏虛而寒在下也雖煩則非蒸熱故不可與梔子湯越之內經曰光泄而後生他病者治其本必且調之後乃治其他病

太陽病若吐若下若發汗微煩小便數大便因鞭者與小承氣湯和之則愈

右發汗吐下後心中惛憊而煩若無燥屎大便軟者梔子等湯證也若有燥屎不大便者小承氣湯證也

痞結胸心煩詳二門心煩而渴詳渴

傷寒二三日心中悸而煩者小建中湯主之

成傷寒二三日邪氣在表未當傳裏之時心中悸而煩是非邪氣傳所致心悸者氣虛也煩者血虛也以氣血內虛與小建中湯先建其裏

太陽病脈浮緊無汗發熱身及八九日表證仍在此當發汗服藥已微除其人發煩目瞑劇者必斃乃解

病欲解者必當先煩乃有汗而解 太陽病過經十餘日心下噎噎欲吐而胸中痛大便反澀微滿鬱鬱微煩詳胸痛傷寒脈浮自汗小便數心煩微惡寒腳攣急反與桂枝湯欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者甘草乾薑湯

詳厥太陽病吐之但太陽當惡寒今反不惡寒不欲近衣此為吐之內煩也 微數之脈慎不可灸因火為邪則

傷寒

傷寒

傷寒

為煩逆這虛逐實血散脈中火氣雖微內攻有力焦骨傷筋血難復也 吐利汗後脈平小煩者以胃虛不勝穀氣也

〔陽明〕病下之其外有熱手足温不結胸心下懊懣飢不能食但頭汗出者梔子豉湯主之 陽明病脈浮緊者下

之則胃中空虛氣動膈心中懊懣舌上白胎者宜梔子豉湯論見 下利後煩按之心下濡者為虛煩也宜梔子

豉湯 陽明病脈遲食難用飽飽則微煩頭眩必小便難此欲作穀疸詳 陽明病下之心下懊懣者宜梔子豉湯

尿者可攻腹微滿初頭鞭後必澹不可攻之若有燥屎者宜大承氣湯 大下後六七日不大便煩渴者

本有宿食故也大承氣湯 陽明病不吐不下心煩者可與調胃承氣湯或吐後心煩謂之內煩下後心煩謂之

有鬱熱也與調胃承氣湯以下鬱熱 陽明病本自汗更重發汗病已瘥尚微煩不了了者以亡津液胃中乾燥故令大便難其小

便日幾行小便少津液當遂更出故知不久必大便也病人煩熱汗出則解又如瘧狀日晡發熱屬陽明也

右胃實不大便心煩若吐下後者大小承氣證也若不曾吐下者調胃承氣湯證也

〔許〕有人病傷寒八九日身熱無汗時時譫語時因下後大便不通三日矣非燥非煩非寒非痛終夜不得卧但

心中沒曉會處或時發一聲如歎息之狀醫者不知是何證予診之曰此懊懣怫鬱二證俱作也胃中有燥屎者

服承氣湯下燥屎二十餘得利而解仲景云陽明病下之心下懊懣微煩胃中有燥屎者可攻又云小便不利大

便乍難乍易時有微執怫鬱不卧者有燥屎也承氣湯主之素問云胃不和則卧不安此夜所以不得眠也仲景


云胃中燥大便鞭者必譫語此所以有時發譫語也非煩非燥非寒非痛所以心中懊懣也聲如歎息而發一聲

所謂外氣怫鬱也燥屎得除大便通利胃中安和故其病悉去也

〔少陽〕傷寒脈弦細頭癢發熱者屬少陽不可汗汗之則譫語此屬胃胃和則愈胃不和則煩而悸活人用調

滿而煩若不輕汗下兼往來寒熱者小柴胡湯詳往來寒熱 若汗下後往來寒熱者柴胡桂枝乾薑湯詳往來寒熱 兼驚

小便不利譫語身重不可轉側者柴胡桂枝龍骨牡蠣湯詳 嘔時鬱鬱微煩若與小柴胡湯嘔不止者大柴胡



湯證也若極吐下後胸滿便澹腹痛者調胃承氣湯證也

太陰傷寒脈浮而緩手足自溫者係在太陰當發身黃小便利者身不發黃至七八日雖暴煩下利十餘行必自

止以脾家實腐穢當去故也大成大陰病至七八日大便硬者為太陰入府傳陽明也今至七八日暴煩下利十餘

行而利必自止宜施子柏皮湯行者脾家實腐穢去也下利煩躁者死此以脾氣和遂邪下泄故雖暴煩下利十日

或利必自止宜施子柏皮湯或用平胃散加穿山甲以主之

少陰病但欲寐而煩若自利而渴小便白者活人用四逆湯論見若與白通湯後下利不止厥逆無脈乾嘔煩

者白通湯加豬膽汁或云明知陰證附子溫之乾嘔而煩格拒少陰病得之二三日心中煩不得臥黃連阿膠湯

若下利六七日欬而嘔心煩不得臥者猪苓湯下利咽痛胸滿心煩者猪膚湯若惡寒而踈時自煩欲去衣

被者可治脈緊至七八日自下利脈暴微手足反溫脈緊反去為欲解雖煩下利必自止

厥陰手足厥冷而煩若脈乍結乍緊及心中滿飢不欲食者宜瓜蒂散吐之既厥靜而復時煩詳吐病六七時

手足三部脈皆至大煩而嘔不能言其人躁擾者欲解也若脈和其人大煩目內際黃者欲解也

煩躁煩為煩擾之煩躁為憤躁之躁俗謂焦躁是也合而言之煩躁為熱也析而分之煩陽也為熱之輕躁陰也為熱之

甚先煩而漸至躁者謂之煩躁先躁而後復煩者謂之躁煩有不煩而躁者此為陰盛格陽也雖大躁欲於泥水中

者是也活人用霹靂散又有邪氣在表而躁煩者太陽中風脈浮而緊不汗出而煩躁大青龍湯是也

有邪氣在裏而煩躁者病人不大便六七日繞臍痛煩躁發有時此有躁

也屎是有因火劫而煩躁者太陽病以火熏之不得汗其人必躁太陽病二三日有陽虛而煩躁者陽微發汗不得

汗晝日煩躁不得眠夜而安靜不嘔不渴無表證脈沈微身無大熱有陰盛而煩躁者少陽病吐利手足厥冷煩此

皆證之常也又有諸不治證詳附於後不可不知

太陽中風汗脈浮發熱惡寒身痛無汗煩躁者大青龍湯發汗不徹太陽證不罷其人面赤躁煩不知痛

有表證宜

六

傷寒

二

汗下後且和解

無表證宜下宜溫

處更發汗則愈詳短大陽病和大發汗後胃中乾煩躁不得眠欲飲者少與之若脈浮小便不利微熱消渴者

五苓散 因下之心下痞與瀉心湯痞不解渴而口躁煩小便不利者五苓散

〔得病〕下二三日脈弱無太陽柴胡證煩躁心下鞭至四五日雖能食以小承氣湯少與微和之令小安至六

日與承氣湯一升若不大便六七日小便少者雖不能食但初次鞭後必溏未定成鞭攻之必溏須小便利後定鞭

乃可攻之宜大承氣湯王註云無太陽證為無表證也無柴胡證為無半表半裏證也煩躁不大便繞臍痛發作有時者有燥屎也下之投

復發汗晝日煩躁不得安眠夜而安靜不嘔不渴無表證脈沉微身無大熱者乾薑附子湯不嘔不渴無熱也身

又沈微故宜溫此當與梔子豉湯證參看蓋下後煩不得眠一也而藥有寒熱不同故爾

乾薑附子湯方

乾薑一兩

附子一枚去皮破八片生用

右二味以水三升煮取一升去滓頓服內經曰寒淫所勝平以辛熱虛寒大甚是以辛熱劑勝之也

〔海〕服薑附湯有二法一法當熱服手少陰心也水包火熱服以接心火身表寒感外火少也寒從外生熱從內消

譬如凍死寒在外也一法當寒服作少陰腎也寒邪入水冷服以類腎水身表微熱內水多也熱從外生寒從內消

譬如飲冷寒在內也

發汗若下之病仍不解煩躁者茯苓四逆湯主之發汗若下病宜解也若病仍不解則發汗外虛陽氣下之內虛陰氣陰陽俱虛邪獨不解故生煩燥與茯苓四逆湯以復陰陽之氣

茯苓四逆湯方四逆湯以補陽加茯苓入參以益陰

茯苓六兩

甘草二兩

乾薑一兩

人參一兩

附子一枚生用去皮破八片

右五味以水五

升煮取三升去滓溫服七合日三服

煩躁心下鞭若未曾下者即前除無太陽柴胡證以小承氣湯少微和之也若已曾下心下鞭痛短氣煩躁者大陷

胸也若結胸證悉具煩躁者死也方論見結胸



火逆下之因燒針煩躁者桂枝甘草龍骨牡蠣湯王之

桂枝甘草龍骨牡蠣湯方

桂枝去蘆皮 甘草炙

牡蠣熬

龍骨各二

右為末以水五升煮取二升半去滓服之

八合日三淫可去脫龍骨牡蠣之澀以收斂浮越之正氣

太陽病以火熏之不得汗其人必躁到不解必清血名為火邪不得汗則熱無從出陰虛被火必發也

盡至七日再到太陽經則熱氣當解若不解熱氣迫血下行必清血清血則熱解矣按到與倒通反也到不解者猶云反

不解而加甚也本文稱太陽病則不可使証為傳經盡也止言太陽病則不傳他經可知矣况於上下別無手按

照應之詞上文言二日及十餘日下文言一二日三四日亦是論日數不言傳經到此成火解到字不微

語十餘日振慄下利者欲解也論見 太陽病火熨其背大汗出火熱入胃胃中水竭躁煩必發譫

活人云大抵陰氣少陽氣勝則熱而煩故太陽經傷風多煩而躁也

陽明病人不大便五六日繞臍痛煩躁發作有時者此有燥屎也宜承氣湯 大抵得病二三日脈弱無大柴胡

證煩躁心下熱小便利心下鞕以小承氣湯少少微和之然有病已瘥高赤微煩必大便鞕當問其小便日幾行若

小便少津液當遠入胃不須攻也

少陽傷寒六七日無大熱其人躁煩者此為陽去入陰也

少陰病吐利手足厥冷煩躁欲死者吳茱萸湯方見 少陰病吐利煩躁四逆者死 少陰病四逆惡寒身踈脈

不至不煩而躁者死 少陰病脈微沉細但欲臥汗出不煩自欲吐至五六日自利復煩躁不得臥寐者死

厥陰傷寒熱少厥微指頭寒默默不欲食煩躁數日小便利色白者熱除也欲得食其病為愈若厥而嘔胸脇煩

滿者必便血 傷寒脈微而厥至七八日膚冷其人躁無暫安者為臟結死 蛇厥雖厥而煩吐蛇已則靜非若藏厥

躁無暫安時也 傷寒六七日脈微手足厥冷煩躁灸厥陰厥不遠者死 傷寒發熱下利厥逆躁不得臥者死

六斗雀籠

卷五

傷寒

三



傷寒得病無熱但狂者煩躁不安者五苓散服之二錢新汲水一升許則以指探喉去之隨手愈

〔成〕所謂煩躁者謂先煩漸至躁也所謂躁煩者謂先發躁而後遷復煩者也從煩至躁為熱未有不漸煩而躁者也先躁後煩謂怫怫然更作躁悶此為陰盛隔陽也雖大躁欲於泥水中卧但飲水不得入口是也此氣欲脫而爭譬如燈將滅而暴明也蓋內熱曰煩謂心中鬱煩也外熱曰躁謂氣外熱躁也內熱為有根之火故但煩不躁及先煩後躁者皆可治外熱為無根之火故但躁不煩及先躁後煩者皆不可治也

附

〔活〕病人身冷脈沈細疾煩躁而不飲水者陰盛隔陽也宜服霹靂散須臾躁止得睡汗出即瘥大談散丹砂丸並主之

霹靂散 大談散二方並見陰毒 丹砂丸方見活人書

〔海〕已寒丸此丸不僭上陽生於下治陰證服四逆輩胸中發躁而渴者或數日大便秘小便澀亦服此丸上不躁大小便自利

肉桂去麤皮

茯苓各五錢

皂薑

烏頭炮各七錢

附子炮

乾薑炮

芍藥

茴香炒各一兩

右為細末糊為丸如梧桐子大溫酒空心下五七十九八九十九亦得酒醋為

糊俱可

〔本〕破陰丹 治陰中伏陽煩躁六脈沈伏方論見陰毒

頃年鄉人李信道得疾六脈沈伏不見深按至骨則若有力頭疼身溫煩躁指末皆冷胸中滿惡心更兩醫矣皆不識止用調氣藥李診之曰此陰中伏陽也仲景法中無此證世人患此者多若用熱藥以助之則為陰所隔絕不能導引直陽反生客氣用冷藥則所伏真火愈見消燥非其治也須用破散陰氣導達真火之藥使水升火降



然後得汗而解矣乃授此藥二百粒作一服冷鹽湯下不時煩躁狂熱手足躁擾其家人驚予曰俗所謂換陽也須臾稍定略睡身已中汗自昏達旦方止身涼而病除矣

戴煩躁陰陽經皆有之陽明經胃有燥屎故煩此當下之太陽經已得汗而煩者五苓散少陽亦有煩宜小柴胡湯 陰煩少陰為多由陽氣傳入陰經陰得陽而煩自利而渴煩不眠者辰砂五苓散若非是陽氣傳陰陰氣犯

陰經吐利手足厥冷而煩經云陽虛陰乘之故煩又云陰盛發躁欲坐井中吳茱萸湯甚苦四逆湯加蔥白二莖外有虛煩一證乃是病愈後陰陽未復時發熱煩竹葉石膏湯痰多睡不寧者溫膽湯嘔者橘皮湯

懊憹 懣即慙字 古通用

成心中鬱鬱然不舒憤憤然無奈比之煩悶而甚者懊憹也由下後表之陽邪乘虛內陷結伏於心胸之間故如是也其治之法或吐之或下之苟或當下反吐瘵熱以寒則變證百出矣可不慎與

太陽病脈浮動數頭痛發熱微盜汗出而反惡寒者表未解也動數變胃中空虛客氣動膈短氣躁煩心中懊憹 枳子相皮湯 詳自汗 發汗吐下後虛煩不得眠反覆顛倒心中懊憹枳子豉湯 **陽明**病下之其外有熱手足溫不結

胸心中懊憹飢不能食但頭汗出者枳子豉湯 陽明病脈浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反惡熱身重若下之則胃中空虛客氣動膈心中懊憹舌上胎者枳豉湯 陽明病下之心中懊憹而煩有躁者大承氣

湯 陽明病無汗小便不利心中懊憹身必發黃 或用茵陳湯 枳子相皮湯

效 啞附

成效則有聲無痰嗽則有聲有痰也肺主氣形寒飲冷則傷之使氣逆而不散衝擊咽膈令喉中淫淫如蟬習習如梗而效嗽也其者連續不止坐卧不安言語不竟動引百骸聲聞四近矣效嗽有寒者有寒者有停飲者有在表

者有在裏者有在半表半裏者病各不同治亦有異如停飲與表寒相合而效者小青龍湯停飲與裡寒相合而效

六 傷寒



者真武湯邪熱在半表半裡而效者小柴胡湯效為肺疾必發散而可已然又有不可發者經曰欬而小便利不可發汗發汗則四肢厥冷又曰欬而發汗踈而苦滿腹中復堅此為逆也又脈數者為心刑肺金則死

太陽傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱而欬或渴或利或噎或小便利少腹滿或喘者小青龍湯主之

故乾嘔而噎水射肺故喘欬水停心下故渴入水腸間故利水蓄下焦故小便不利少腹滿與小青龍湯發汗散水水氣內清則所傳不一故有或為之證隨證消息治之喘發熱不渴服湯已渴者此寒去欲解也小青龍湯主之

小青龍湯方

麻黃去節

芍藥

乾薑

細辛

桂枝去蘖皮

五味子

半夏湯洗

甘草 右八味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫納諸藥煮取三升去滓溫服一升

加減法 若微利者去麻黃加薤花如雞子大熬令赤色下利者不可攻其表汗出必脹滿麻黃發其陽水漬入

胃必利作薤花下十二水水去利則止 若渴者去半夏加栝藎根三兩辛燥而苦潤半夏辛而燥津液非渴者

所宜故去之栝藎味苦而生津液故加之 若噎者去麻黃加附子一枚炮經曰水得寒氣冷必相搏其人即餒

加附子溫散水寒病人有寒復發汗胃中冷必吐衄去麻黃惡發汗 若小便利少腹滿去麻黃加茯苓四兩

水蓄下焦不行為小便利少腹滿麻黃發津液於外非所宜也茯苓泄蓄水於下加所當也 若喘者去麻黃

加杏仁半升去皮尖金匱要略曰其人形腫故不納麻黃納杏子以麻黃發其陽故也喘呼形腫水氣標本之疾

青龍象肝之兩岐而王兩傷之疾大青龍王榮衛之兩傷此則主表不解而又加之心下有水氣則非麻黃湯所

能解桂枝湯所能散方須小青龍始可祛除表裡之邪氣且表不解以麻黃發汗為君桂甘草佐麻黃發散為臣

欬逆而喘肺氣逆也內經曰肺欲收急食酸以收之故用芍藥酸寒五味子酸溫為佐以收氣逆心下有水津液

不行則腎氣燥急食辛以潤之是以乾薑細辛味辛熱半夏味辛溫微熱為使以散寒水逆氣收寒水散津液通



行汗出而解矣。心下水則所傳不一。故又有增損之證。水蓋則津液不行。氣燥而渴。去半夏則津液易復。括蕤根味苦微寒。潤枯燥者也。加之則津液通行。水氣下行。清入腸間。則利者不可攻。表麻黃專主發散。非下利所宜。故去之。薤花味苦寒。為瀉泄之劑。水去則利止。薤花下水。故加之。噎者去麻黃。加附子。經曰：水得寒氣必冷。水去相搏。其人則噎。噎為胃氣虛竭。麻黃發汗。非胃虛冷所宜。故去之。附子味辛熱。則溫其氣。辛則散其寒。寒散。故用為佐。以祛散冷寒之氣。凡邪客於體者。在外者可汗之。在內者可下之。在上者可瀉之。在下者可滲之。水畜下焦。小便不利。小腹滿。滲泄可也。非發汗所宜。故去麻黃。加茯苓。味甘淡。專行津液。內經曰：濕淫於內。以淡滲之。是也。若喘者去麻黃。喘為氣逆。麻黃發陽。故去之。杏仁味甘溫。加之。以泄逆氣。金匱要略曰：其形腫者不用麻黃。乃用杏仁。以麻黃發其陽。故逆形腫也。

少陽傷寒六日。中風往來寒熱。胸脇苦滿。默默不欲飲食。心煩喜嘔。身有微熱。或欬者。小柴胡湯去人參。加五味

子乾薑

陽明欬而表解。胃實。陽明病。若反無汗。小便利。而嘔。手足厥者。必頭痛。若但頭眩不惡寒。能食者。必咽痛。詳胃實

少陰病。欬而下利。譫語。小便難者。被火氣劫故也。詳下少陰病。四逆。其人欲者。四逆散。加五味子。乾薑。各五分。

少陰病。下利六七日。欬而嘔。渴。心煩不得眠者。猪苓散。少陰病。二三日不已。至四五日。腹痛。小便不利。四肢沈

重。痠痛。自下利者。此為有水氣。其人欬者。真武湯。加五味子。半升。細辛。乾薑。各一兩。傷寒欬逆。上氣。其脈散者。死。謂

其形損故也。欬而失小便者。不可發汗。汗出則四肢厥冷。論見遺溺

附

雲傷寒汗後。喘欬不止。或傳肺痿。補肺散。

人參一兩

五味子 五錢

桑白皮 二兩

款冬花

蛤蚧 一對

右為細末。每服五錢。沸

湯一盞調服

傷寒汗下後欬嗽肺虛聲音嘶敗者宜下方

阿膠散

薯蕷

阿膠炒

五味子

麥門冬去心

白木各一兩

乾薑一兩

桂枝各二錢

杏仁去皮尖

右剉細每服七錢水二盞入烏梅肉一錢同煎服

傷寒汗下後喘欬煩躁氣滯澀邪氣逆者用下方

桔梗湯

桔梗

桑白皮各一兩

甘草

貝母

訶黎勒各五錢

右為細末每服五錢

入五味子烏梅肉各一錢水二鍾同煎服

人參石膏湯 治傷寒欬嗽不已心煩及風熱頭疫精神不利昏憤宜服下方

人參去蘆半錢

石膏一兩

半夏湯泡

梔子仁

黃芩各一錢

川芎

白木

茯苓去皮

知母各半錢

甘草錢二

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不

拘時服

[吳] 凡表寒欬嗽者脈浮惡寒身疫拘急而無汗也麻黃湯或三拗湯汗之痰唾如膠者金沸草散汗之若有熱者參蘇飲去木香人參加桑白皮杏仁麻黃汗之亦佳但察天時與病情斟酌而用之也若虛弱人冒感風寒而欬嗽有痰或惡風頭疫乾嘔者宜人參杏仁湯凡傷寒二三日傳少陽經脈弦口苦發熱而欬嗽者小柴胡湯去人參太棗生薑加五味子乾薑主之若發熱胸中煩滿而欬者加炒瓜蒌若胸脇痞滿發熱而欬者加枳殼桔梗主之凡陰證手足冷脈沉細而欬嗽者四逆湯加五味大抵傷寒欬嗽非比雜證同也按仲景治例有嗽者不分陰陽二證俱



用五味子乾薑也蓋五味收肺氣而止嗽以乾薑之辛溫肺經散逆氣也

痘射干湯 治初秋暴雨冷及天行暴寒其執喜伏於內效嗽曲折不可得氣息喉啞失聲乾嗽無唾喉中如鏡

射干 紫苑 當歸 獨活 麻黃 甘草各兩

生薑炮 橘皮 肉桂去粗皮 枳實各二兩 半夏洗二兩半 杏仁去皮尖炒一兩半

右以咀每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服

直視目中不了

成直視者視物而睛不轉動也睛轉者非也水之精為志火之精為神目者心之使也神所寓焉肝之外候也精

神榮焉針經曰五藏六府之氣皆上注於目而為之精精為眼骨之精為瞳子筋之精為黑血之精為絡氣之精為白肌肉之精為拘束裏調五藏氣血調

和精氣充榮則目和而明矣邪氣壅盛冒其正氣則神識不慧藏精之氣不上榮於目則目為之直視傷寒直視邪

氣已極證多難治狂言直視為腎絕直視齒頭為心絕直視語語喘滿者死下利者亦死又劇者發經曰衄家不可

發汗汗則額陷脈緊急直視不能眴以肝受血而能視亡血家肝氣已虛木氣又虛又發汗亡陽則陰陽俱虛所致

也此雖逆未為甚又直視與目中不了了形證相近一可治一不可治也

太陽衄家不可發汗汗出則額上陷脈急直視不能瞬不得眠詳汗後身猶灼熱名風溫脈陰陽俱浮目汗身

重多眠語言難出若被下者小便不利直視失溲詳風

陽明傷寒吐下後不解不大便至十餘日晡所發潮熱不惡寒獨語如見鬼狀劇者發則不識人循衣摸床湯

而不安微喘直視脈弦者生瀉者死

直視語喘滿者死下利者亦死

傷寒六七日目中不了了睛不和無表裡證大便難身微熱者此為實也急下之宜大承氣湯

吳若戴眼反折者此為上視絕汗乃出大如貫珠不流此勝脫絕也其目中不了了能視物但見一半而不見一半有所譫妄而胡言者是也若內實不大便者宜下之內虛者多難治也

鬱言 昏憤 舊以又手 昏心蓋入今去之

成鬱為鬱結而氣不舒實為昏言而神不清俗謂之昏迷是也昏因虛乘寒所致經曰諸虛乘寒者則為厥鬱言不仁此寒氣乘虛中上也駱龍吉以附子湯倍人參川芎天麻乾薑之類王之又曰太陽病先下之不解因後發汗以此表裏俱虛其人因言言家汗出自愈由表和也若不得汗不解者以人參三白湯加川芎天麻如下虛脈微者加附子以溫腎經乃固本也經曰滋苗者必固本伐下者枯其上此之謂也要略曰新產婦人有三病一者言言大便難二血復汗寒多鬱言又曰產婦鬱言其脈微弱不能食大便堅者蓋由血虛而厥厥而必言言家欲解必大汗出觀此則鬱言為虛寒可知矣又少陰病下利止而頭眩時時自言者死以其虛極而脫也

太陽病先下之而不愈因復發汗以此表裏俱虛其人因致言言家汗出自愈所以然者汗出表和故也裏未和然後復下之 成氏以鬱訓言疑未瑩按說文言字從日從目即小兒及蠻夷頭衣也此致言者謂若物蒙蔽其目也是昏迷之義今以言為鬱不惟失六書之本旨且失病情及神景之意也裏未和時刻作得裏和或增未字而不去得字則非 諸乘寒者則為厥鬱言不仁口急不能言戰慄也 於文理合以宋本正之

太陽與少陽併病頭項強痛或眩暈時如結胸心下痞鞭者當刺大椎肺俞肝俞 詳項強

陽明病人小便不利大便乍難乍易時有微熱喘言不能卧有燥屎也宜大承氣湯

少陰病但欲寐下利止而頭眩時時自言者死

厥陰下利清穀脈沈遲其人面赤身有微熱必鬱言汗出而解 詳下利

傷寒吐下後虛煩脈其微八九日心下痞鞭脇下痛氣上衝咽喉眩暈經脈動惕者久而成痿

海傷寒傳至五六日間漸變神昏不語或睡中獨語一二句自亦昏焦舌乾不飲水稀粥與之則咽不與則不思



六脈細數而不洪大心下無痞腹中不滿大小便如常或傳至十日已來形貌如醉醫見神昏不已多用大承氣湯下之則誤矣蓋不知此執傳于少陰心經也然又未知其何經而來答曰本太陽經傷風風為陽邪傷陰血自燥熱結膀胱主病逆傳於丙丙丁光妹由是傳心心火自上迫重肺所以神昏也蓋肺為清肅之藏內有火邪故令神昏宜梔子黃連黃芩湯若脈在丙者導赤散脈在丁者瀉心湯若誤用涼膈散此乃氣中之血藥也如右手寸脈沉滑有力者則可用之或用犀角地黃湯近於是已本方所說若無犀角以升麻代之是陽明經藥也此解陽明經以中執藥若脈浮沉俱有力者是丙丁俱有熱可以導赤散瀉心湯各半服之則宜矣此證膀胱傳丙是傳于經者下傳上也丙傳丁者表傳裏也壬傳丁者良傳難也越經傳者又為府傳藏也活人云傷寒口傳足經不傳于經者此言不盡意也有從足經而傳手經者何以知之經云傷寒或止傳一經或間傳三經不可一途取之但視其脈與外證治之此治法也與食則咽者邪不在胃也不與則不思者以其神昏故也邪熱既不在裏誤用承氣下之其死也

必矣麻在丙者脈浮也脈在丁者脈沉也
肺丙丁俱在有熱者浮沉俱有力也

余重覆太史形氣充壯飲噉兼人辛卯夏六月患熱病肢體不其熱而間揚擲手足如躁擾狀昏憤不知人事時發一二語不可了而非謔也脈微細如欲絕有謂是陰證宜溫者有謂當下者時座師陸葵日先生與曾植齋馮珍菴二太史皆取決於余余謂是陽病見陰脈在法為不治矣蓋稟如此又值酷暑外燠酒災內矣宜狂熱如焚脈洪數有力而此何為者豈熱氣拂鬱不得伸而然耶且不大便七日矣姑以大柴胡湯下之時大黃止用二錢又孰煎而太醫王雷卷力爭以為太少不若用大承氣余曰如此脈證豈宜峻下待大柴胡不應而後用調胃承氣調胃承氣不應而後用小承氣以及大承氣未晚也已服藥大便即行脈已出手是溫矣余謂雷卷曰設用大承氣能免噬臍之悔哉繼以黃連解毒湯數服而平七月初遂與陸先生同典試南京不復發矣明年余請告歸里偶得劉河間傷寒直格讀之中有云蓋熱內其脈須疾數以其極熱蓄甚而脈道不利反致脈沉細而欲絕俗未明造化之理反謂

傳為寒極陰毒者或始得之陽熱甚而便有此證候者或兩感熱甚者通宜解毒加大承氣下之後熱稍退而未愈者當連解毒湯調之或微熱未除者涼膈散調之或失下熱極以至身冷脈微而昏冒將死若急下之則陰暴絕而死蓋陽氣後竭而然也不下亦死宜涼膈散或當連解毒湯養陰退陽積熱漸以宣散則心胸再暖而脈漸以生然後撫卷而嘆曰古人先得我心矣余太史所患正失下熱極以至身冷脈微而昏冒欲絕者也下與不下大下與微下死生在呼吸間不容髮嗚乎可不慎哉因表而出之以為世鑒

不能言

〔成〕不能言及語言難出有二證其一則太陽風溫其一則少陽咽中生瘡是皆傳經之邪熱氣壅閉所致非陰寒之證氣血通行則關節開張語言出矣

〔太陽〕發汗已身猶灼熱者風溫脈尺寸俱浮自汗身重多眠鼻鼾語言難出詳風溫

〔少陰〕病咽中傷生瘡不能言語聲不出者苦酒湯

〔吳〕凡瘡瘻不言有六一者少陰病咽中傷生瘡不能言語者以鷄子苦湯酒主之二者外感傷寒上唇有瘡咽乾聲啞者治見本條三者瘻證口喑不能言者亦見本條四者熱病音啞不言三四日不得汗出者死五者熱甚火傷肺金不能言者宜濕肺降火則愈六者風熱壅盛欬嗽聲啞者以消風降痰火治又有失於發散風邪伏於肺中者當發散之

鼻鼾鼻鳴

〔成〕風溫則鼻鼾太陽中風則鼻鳴由風氣壅塞衝氣不利所致陽明少陰三陽雖亦有中風然邪不在表故鼻不鳴而不鼾也

〔太陽〕中風陽浮陰弱陽浮熱自發陰弱汗自出宜當惡寒漸惡風翁翁發熱鼻鳴乾嘔者桂枝湯汗已身猶

灼熱脈浮自汗身重多眠鼻鼾語言難出不可下不可火

六十一

傷寒



南京中醫藥大學圖書館藏

本草綱目

三



南京中醫藥大學圖書館藏

小便不利 小便難

成 小便不利有數種被下而小便不利者津液耗於內也因汗而小便不利者津液亡於外也發熱無汗及夫熱病小便不利者執營所致風濕相搏與夫陽明風中其小便不利寒邪所乘其小便難者亦多由汗下而大宜詳辨之

太陽 傷寒表不解以下有水氣乾嘔發熱而欬或渴或利或嘔或小便不利少腹滿或喘者小青龍湯去麻黃加茯苓方見 太陽病大發汗後胃乾煩躁不得眠欲飲水小便不利者脈浮五苓散不浮者豬苓湯 本以下之心

下痞與瀉心湯痞不解渴而口燥煩小便不利者五苓散 服桂枝湯或汗或下之仍頭項強痛者發熱無汗心滿微痛小便不利者桂枝去桂加茯苓白朮湯 太陽病飲水多必心下悸小便少者茯苓甘草湯方見 若兼身黃而小腹鞭脈沈結者茵陳湯方見


陽明 病面合赤色不可攻之必發熱色黃小便不利也 陽明病小便不利若中寒不能食手足濇然汗出大便初硬後溏者此欲作固瘕 若能食大便自調其人骨節疼貧翁如有熱狀者發狂濇然汗出而解者此水不勝穀氣與汗共併脈緊則愈 或無汗心中懊憹或被大瀉上微汗出或頭汗出身無汗刺頸而還渴引水將欲發

黃之候 若脈浮發熱渴欲飲水小便不利者豬苓湯方見 此浮字誤也活人云脈浮者五苓散脈沈者豬苓湯則

豬苓澤瀉茯苓三味中加桂白朮也陽明高內豬苓湯乃豬苓澤瀉茯苓三味中加阿膠滑石也桂與白朮味甘辛

為陽主外阿膠滑石味甘寒為陰主內和陽之言亦可謂不失仲景之旨矣第阿膠與桂別二藥分曉不覺筆下以

沈對浮遂使後人致疑三陽證中不當言脈沉更不攬致疑經文之有闕也更詳太陽證固當脈浮而陽明為表之脈浮者五苓散不浮者豬苓湯則得仲景之意矣又詳少陰病下利六七日欲而嘔渴心煩不得眠者豬苓湯一條雖不言於沈然少陽之脈必沉也豈活人以少陰太陽一證而言與以此推之成氏隨文誤釋明矣



病人小便不利大便乍難乍易時有微熱喘冒不能卧者有躁屎也宜大承氣湯 得病二三日脈弱無太陽柴胡證煩躁心下鞭至四五日雖能食以小承氣湯少少與微和之若不大便六七日小便少者雖不能食但初頭鞭後必澹須小便利康定鞭乃可用大承氣攻之

少陽傷寒五六日中風往來寒熱胸脇痛不欲食心煩喜嘔或心下悸小便不利者小柴胡湯 傷寒五六日已汗復下胸脇滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗心煩往來寒熱為未解柴胡桂薑湯 傷寒八九日下之胸滿煩驚小便不利譫語身重不可轉側柴胡加龍骨牡蠣湯

少陰小便不利而大便自利腹痛為少陰病 兼四肢沉重有水氣者真武湯 兼便膿血者桃花湯 兼四逆者四逆散加茯苓

厥陰傷寒噦而腹滿視其前後知何部不利利之則愈前部為小便不利脈浮者五苓散不浮者豬苓湯 小便不利關節疼痛若痛不得屈伸汗出惡風身腫者屬風濕宜甘薑附子湯方見身痛 若脈沈緩大便反快者屬濕痺活人用五苓散方見

附

活陰證小便不利手足厥冷脈微細者不宜服利小便清滑藥但服返陰丹并取臍下石門穴灸之方論見陰毒

集傷寒小便不通取陰谷 陰陵泉

吳凡傷寒小便不通刺任脈二穴在臍下一寸用長針入八分又次支溝二穴在手腕後三寸膏骨之間陷中針

八二分凡傷寒小便不利當分六經治之太陰少陰詳見本條大陰腹滿自利小便不利無熱脈沈者理中湯合五

苓散更加厚朴木香分利其小便而大便自止厥陰寒閉厥冷脈伏囊縮入腹小便不利宜四逆湯通草茯苓或灸

氣海石門穴或以蔥熨法治之若陰虛火動小便赤澀不利者加木通生地知母黃柏丸內熱其大便不通小便赤



汗後小便難

下後小便難

脇痛身黃小便難

澀不利者八正散治之凡不渴小便不利者熱在血分也宜知母黃柏生地之類夫膀胱為津液之府氣化而能出也若汗多者津液外泄小便因少不可利之恐重亡津液待汗止小便自行又小便自利不可妄利之恐引熱入膀胱則變畜血又為害也

小便難汗後小便難若太陽發汗遂滿不止者則惡風小便難四肢難屈伸宜桂枝附子湯方論見若太陽發中風以火劫發汗則邪風被火熱血氣流溢身苦陽盛陰虛欲飲小便難也方論見若少陰以火劫發汗則效而不利謬語小便難也論見

下後小便難有二若脈遲浮弱惡風寒下之者則脇滿身黃項強小便難也見脇痛若陽明胃實發熱惡寒脈浮脈下之者則腹滿小便難也論見

脇痛身黃小便難若陽明胃實未下者宜小柴胡湯若下後不食項強者忌柴胡論見

趙傷寒小便難仲景論有發汗漏不止桂枝加附子湯者有陽明中風或脈弦浮大而潮熱噦者或脈浮而緊謬下而成腹滿者又有陽明脈浮遲飽則微煩頭眩者活人問中當以傳經邪熱與漏風亡陽分作兩條其桂枝加附子湯證乃亡陽經虛所致豈得均謂之陰虛陽痿為有熱耶要當以小柴胡證及誤下證穀疸證次於陽痿傳邪之下却別出一條云外有汗多亡陽津液不足亦有小便難者遂以桂枝加附子湯證屬之

小便自利小便數

成小便自利有在表者有在裏者有熱而利者有寒而利者六經俱有之證難以藥治宜考經條分之可也小便數者三陽有在表者有在裏者三陰並無小便數之證宜詳察之

太陽病六七日表證仍在脈微而沉反不結胸其人發狂以熱在下焦小腹當鞭滿小便自利者下血乃愈抵當

湯太陽病身黃脈沈結小腹鞭小便自利其人如狂血證也抵當湯傷寒有熱少腹滿應小便不利今反利者



為有血也當下之不可餘藥宜抵當丸 傷寒十三日不解過經譫語小便利而大便亦下利脈反和調胃承氣證

詳語 太陽中風火劫汗後發黃欲衄小便利難頭汗出腹滿微喘口乾咽爛或不大便久則譫語甚者至臧捻衣擦

牀小便利者可治詳語 太陽病小便利者以飲水多必心下悸小便利少者必苦裏急小便利不利甘草枝湯傷

寒八九日風濕相搏身體痠煩不能轉側不嘔不渴脈浮虛而滑者桂枝附子湯若其人小便利去桂枝加白朮

湯 傷寒發熱惡寒大渴欲飲水其腹必滿自汗小便利為欲解此肝乘肺名曰橫刺期門

陽明病反無汗而小便利二三日嘔而欬手足厥者必苦頭痛詳語 得病二三日脈弱無太陽榮氣煩燥心

下鞭以小承氣微和之不大便六七日小便利少者雖不能食但初鞭後澹未可攻小便利大承氣湯 傷寒脈浮而

緩手足自溫係在太陽當發身黃若小便利不能發黃至七八日大便鞭為陽明病也大承氣湯 陽明病自發

更發汗小便利為津液內竭屎雖鞭不可攻之宜蜜煎導而通之豬膽汁或土瓜根皆可為導

太陽傷寒脈浮而緩手足自溫係在太陰當發黃小便利不利不發黃至七八日雖暴煩下利者十餘行必自止

按以上數條皆以小便利為病蓋以驗病之下與不當下也若小便利而少腹鞭者尿也當溲泄之若小便利

自利而少腹鞭者非血則莫也當通利之且病之發黃與不發黃及病之死與不死皆可於此而驗之高

少陰病二三日至四五日腹滿小便利不利四肢沉重痠痛自下利者為有水氣或小便利直武湯詳語 既吐且

利小便復利而大汗下利清穀內寒外熱脈微欲絕者四逆湯

厥陰傷寒熱少厥微指頭寒默默不欲食煩躁數日小便利色白者此熱除也欲得食為病愈

小便數傷寒脈浮自汗小便利數心煩微惡寒腳攣手足者慎不可用桂枝湯甘草乾薑湯

趙太陽病自汗四肢拘急難以屈伸心煩微惡寒腳攣手足者慎不可用桂枝也宜與甘草乾薑湯芍藥甘草湯

藥甘草湯此虛寒所致與上文客熱等證全不相合又多四肢拘急難以屈伸八字即係痲痺小便難之證今却

添於此問小便數之下何耶又云傷寒脈浮使數者當中和不謔語者少與調胃承氣湯蓋仲景謂此論專主胃氣不和謔語未嘗兼治脈浮自汗小便數之證何不曰若服甘草乾薑湯後胃氣不和謔語者少與調胃承氣湯不亦宜乎

跌陽脈浮而濡浮則胃氣強濡則小便數浮澀相搏大便則難其脾為約麻仁丸 太陽病汗吐下後微煩小便數大便因鞭與小承氣湯和之則愈 太陽病寸緩關浮尺弱其人發熱汗出惡寒不嘔但心下痞者下之早也如其不下病人不惡寒而渴者此轉屬陽明小便數者大便必鞭

吳凡小便數者頻欲去而不多也太陽陽明治各有條凡腎虛有熱小便頻數者清心蓮子飲或八子白湯加知母黃柏麥門石蓮肉之類或服滋補丸亦佳或補中益氣加知母黃柏生地黃麥門冬主之

遺溺

三陽合病腹滿身重難轉側口中不仁面垢謔語遺尿自汗者不可汗不可下宜少與白虎湯詳身重

風濕病脈浮自汗出體重多眠者下之則小便不利直視失溲詳風溫

楊士瀛曰膀胱瀦水下焦不攝則亦遺溺經云邪中下焦陰氣為慄足膝逆冷使溺妄出合用四逆湯下焦畜血

小腹結急小便自利不禁輕者桃仁承氣湯重者抵當湯

寸口脈微而澀微者衛氣不行澹者榮氣不逮榮衛不能相將三焦無所仰身體痺不仁榮氣不足則煩疼口難言衛氣虛則惡寒數欠三焦不歸其部上焦不歸者噫而吞酸中焦不歸者不能消穀引食下焦不歸者則遺溺

效而小便利若失小便者不可發汗汗出則四肢厥冷 太陽病火熨其背大汗出謔語十餘日振慄下利欲小便

不得反嘔而失溲者此為欲解也詳謔語 遺溺狂言目反直視者此為腎絕

吳凡遺尿者小便自出而不知也其熱感風神昏遺尿者為可治若陰證下寒逆冷遺尿脈沉微者多難治宜附

子湯加乾薑益智子以溫其下也若厥陰囊縮厥冷脈微遺尿者四逆加吳茱萸湯溫之陽不迴者死凡傷寒汗下後熱不解陰虛火動而遺尿者以人參三白湯加知母黃柏或補中益氣湯加知母黃柏麥門冬生地黃五味子之類主之若狂言直視譫語遺尿者此為腎絕內經言膀胱不利為癃不約則遺溺又曰水泉不止者膀胱不藏也蓋腎與膀胱為表裏腎虛則膀胱之氣不約故遺尿也要在滋補膀胱之氣也東垣謂遺尿為肺金虛又當補肺氣也大抵肺虛腎虛熱甚者皆可治惟腎絕遺尿則不可治此下焦氣絕不歸其部故也

噫氣

說文云噫飽食息也於介切俗作噎傷寒有二證皆由誤汗吐下胃氣弱而不和虛氣上逆心下痞鞭故下利者生薑瀉心湯不下利者旋覆代赭石湯

傷寒汗出解之後胃中不和心下痞鞭乾噫食臭膈下有水氣腹滿雷鳴下利者生薑瀉心湯王之傷寒發汗若吐若下解後心下痞鞭噫氣不除者旋覆代赭石湯王之

附

雲三傷寒噫氣者何氣使然答曰胸中氣不交故也少陰經至胸中文於厥陰水火相搏而有聲故噫氣也宜如聖加枳實湯

加枳實湯

如聖加枳實湯方

甘草

桔梗

各五錢

枳實

妙三錢

右剉細每服五錢入五味子半錢水煎服

傷寒吐下後喘而噫氣者宜如聖加人參薑香杏仁湯

如聖加人參薑香杏仁湯方

甘草

桔梗

人參

薑香

杏仁各等分

右剉細每服五錢水煎服



噦即吃逆

噦即俗所謂吃逆雜病辨之其詳按說文噦氣格也於月切又乙劣切乙劣之訛遂為吃逆亦猶俗呼團為突鑿角為葛洛其故明矣名世如東垣亦謂噦是乾嘔之重者不知有聲無物皆為乾嘔豈有輕重分為二病哉至所云噦逆者即今之喘嗽是也乃與吃逆混而為一或以為噦皆不攻之過而得失利害係焉不可以不辨

胃寒 傷寒大吐大下之極虛復極汗出者以其人外氣怫鬱復與之水以發其汗因得噦所以然者胃中寒冷故也（藏）大吐大下胃氣極虛復極發汗又亡陽氣外邪怫鬱於表則身熱醫與之水以發其汗胃虛得也水虛寒相搏則噦也 吳茱萸湯理中湯 活人用橘皮乾薑湯羌活附子散半夏生薑湯退陰散

活人云若服藥不瘥者灸之必愈其法婦人屈乳頭向下畫處骨間灸三壯丈夫及乳小者以一指為準男左女右艾炷如小豆許與乳相直間陷中動脈起

胃熱 陽明中風脈弦浮大短氣腹滿脇下及心痛鼻乾不得汗嗜臥一身及面目悉黃小便難有潮熱時時噦脈續浮者與小柴胡湯若不尿腹滿加噦者不治（詳胃） 傷寒噦而腹滿視其前後知何部不利利之則愈 仲景無方 活人云前

部宜豬苓湯後部宜調胃承氣湯 胃中虛冷不能食者飲水則噦 與小承氣湯入腹中不轉矢氣者不可攻之攻之必脹滿不食與水則噦（詳潮熱）

本渴而飲水嘔者柴胡不中與也食穀則噦（詳脇痛） 陽明病胃實不能食者攻其熱必噦 濕家頭汗出背強惡寒欲覆被向火者下之早則噦（詳體痛）

太陽病以火劫發汗血氣流溢身黃欲衄頭汗腹滿譫語甚者至噦捻衣摸牀小便利者可治（論頭汗見）

橘皮乾湯

通草

乾薑炮

桂心

甘草炙各二兩

人參一兩

右剉

橘皮

通草

乾薑炮

桂心

甘草炙各二兩

人參一兩

右剉

六科集韻

傷寒

9

飲水而噦



如麻豆大每服四錢水一盞煎至六分去滓溫服日三

羌活附子散 治吃逆

羌活

附子炮

茴香微炒各半兩

木香

乾薑炮各如棗許大

右為細末每服二錢

水一盞鹽一捻同煎二十沸帶服一服止

半夏生薑湯 治噦欲死

生薑二兩切

半夏洗一兩二錢半

右以水二盞煎至八分去滓分二服溫服

失下

海藏云傷寒欬逆脈散死

仲景之言不虛偽

大抵因原失下生

欬逆喉中陰不內

便軟准宜用瀉

心

便硬尤宜大承氣

二藥神工作者誰

東垣潔古為良劑

潔

欬逆者大熱奔急上行而肺陰不內何其當哉故便秘者宜大承氣下之便軟者瀉心湯王之

海

少陰欬逆者此失下也陰消將盡陽逆上行使陰不納也然陰既盡陽亦將盡也吸入腎與肝陽逆上行陰入

不納故為陽極脈微將盡者不宜下宜服瀉心湯養陰退陽而已如不用瀉心湯涼膈散去硝黃清肺散亦可若脈

左浮右沉實非表也裏極則反出於表也何以然欬逆舌強右脈實者知少陰裏也飲水過多心下痞而渴逆者五

苓散王之別無惡證是也惡證生或兼以舌攣語言不正而反昏冒與咽痛者少陰也速下之宜大承氣湯也何以

脈浮為表浮之實大沉之損小是為表也浮之實大沉之亦然即非表也邪入已深矣內熱當沉反浮陽極復之表

也

陰證者內已伏陰陰氣太甚腎水擅權肝氣不生胃火已病丁火又消所以遊行相火寒邪迫而萃集於胸中亦

欲盡也故令人發熱大渴引飲欲去蓋覆病人獨覺熱他人按熱之身體肌肉骨髓血脈俱寒此火即無根之火也

故用丁香散薑三類執藥湯冒其人自下

呃之陽症

症



中醫藥大學圖書館藏

勻氣散

用川烏大者三枚炮裂去皮臍

右為細末每服三錢用黑豆二十一粒砂糖同泡湯調乘熱細細飲之

治陰毒吃逆方本

川烏頭

乾薑

附子以上俱炮

肉桂

芍藥

半夏

炙甘草

吳茱萸

陳皮

大黃各等分

右為細末每服一錢水一盞生薑三五片

煎至七分去滓服溫

肉豆蔻湯

治傷寒汗後吃逆噎氣

肉豆蔻一個

石蓮肉炒

茴香各一兩

人參

丁香各半兩

枇杷葉五片洗去毛炙

右剉細用水四盞生薑十片煎二盞去滓空心溫服分二服

良薑湯

橘皮

良薑

桂枝

當歸各一兩

杏仁二十

麻黃

甘草各半兩

檳榔三個另

右咬咀用水四盞薑十片棗三枚同煎至二盞去渣下檳榔末再煎三沸通

口服一盞未已再服龐老云傷寒吃逆不止是陰陽氣升降欲作汗升之不卡故胃氣上逆為吃逆無休止宜服

此方

扁鵲中藏經

治傷寒欬逆丁香散丁香柿蒂各一分甘草良薑各半錢沸湯點作一服乘熱猛喫極效右以上五

方陰證所宜

三因橘皮竹茹湯

見雜病吃逆門

右方陽證所宜

六斗

傷寒

五



治傷寒吃逆救急方

香附子

橘核炒各半兩

右細剉用酒半盞先將藥置銀石器內炒漸漸滴酒炒藥焦黃色研細末每

錢水一小盞煎至八分細細旋呷服一方單用香附子末

又方 大蒜頭二個煨爛研爆入白薑末

凡得慶研和如梧桐子大搗雞菜自然汗吞下二十九病退再服一十五丸

[吳]吃逆者氣上逆而為吃也醫方或以為欬逆者非也經曰欬逆上氣脈散者死謂其形損故也成無已注

引千金方云欬逆上氣乃咳嗽也言心火以刑肺金其氣噴逆而為嗽喘也若肺絕則脈散皮毛焦折而死故曰

形損也與吃逆何相干哉吃逆有因胃熱失下而作者且其氣皆從胃至胸噎之間而為逆吃易老治法天下胃

熱內實大便鞭者以承氣湯下之便軟者以瀉心湯主之胃虛有熱者橘皮竹茹湯有痰飲者半夏生薑湯或

苓半夏湯若胃冷者橘皮乾薑湯加味理中湯要略言其氣自臍下直衝於胸噎間吃逆者此陰證也其病不在

胃也且病下虛內以伏陰或設用寒涼遂致冷極於下迫其相火上衝萃集於胸中以為吃逆亦欲盡也病人煩

躁自覺其熱他人以手按其肌膚則冷此為無根失守之火散氣為熱非實熱也乃水極似火若不識此誤用涼

藥下咽則敗矣凡治須用活人羌活附子散或加味附子湯急溫其下直陽一回火降吃逆自止也如冷極吃逆

不上者或兼以硫黃乳香最隲法或交期門中脫關元氣海但要取手足溫暖脈生陽回陰退則生矣

瘧狀 [楊]瘧狀作止有時非若寒熱往來或疎或數而作止無定時也凡感冒之人忽覺毛寒股慄筋節拘攣手足鼓撼

嘔不欲食其寒不可禦未幾復轉而發熱者此即溫瘧不必謂瘧脈自弦或洪數或緊實或虛緩或刮澀皆為瘧

狀但以外證別之用藥固有本條小柴胡湯如前斟酌加減亦是活法雖然血虛能生寒熱敗血亦作寒熱陰陽相

勝一證雖各有一方皆當以川芎為佐 太陽病得之八九日如瘧狀發熱惡寒熱多寒少其人不嘔清便欲自可

一日二三度發脈微緩者為欲愈也脈微而惡寒者此陰陽俱虛不可更發汗更下更吐也面反有熱色者未能解

也以其不能得小汗出身必痒宜桂枝麻黃半各湯 服桂枝湯大汗出脈洪大者與桂枝湯如前法若形如瘧日

再發者汗出必解宜桂枝二麻黃一湯 成經曰如服一劑病證猶在者改當復作本湯服之桂枝湯汗出後論法大者病猶在也若別如瘧日再發邪氣客於榮衛之間也與桂枝二麻黃一

湯以解散榮衛之邪

桂枝二麻黃一湯方

桂枝三錢去粗皮

芍藥三錢

麻黃去節一分

生薑切三錢

甘草一分

杏仁去皮者四枚

大棗二枚

右七味以水二鐘先煮麻黃一二沸去上沫納諸藥煮取一鍾去渣分二服

病人頭執汗出則解又如瘧狀日晡所發執者屬陽明也脈實者宜下之脈虛浮者宜發汗下之與大承氣湯發汗

宜桂枝湯 雖得陽明證未可便為裏實審看脈候別內外有脈實者熱已入腑為實可與大承氣湯下之其脈浮虛者是熱未入府猶在表也可與桂枝湯發汗則愈

婦人中風七八日續得寒執發作有時經水適斷者此為熱入血室其血必結故為瘧狀發作有時小柴胡湯王之

詳婦人傷寒

舌胎

舌上白胎 陽明病脇下鞭滿不大便而嘔者小柴胡湯 詳胃 陽明病脈浮緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不

惡寒反惡熱身重若下之則胃中空虛愛氣動膈短氣躁煩心中懊惱者梔子豉湯 方見 濕家但頭汗出背強欲

得被覆向火若下之早則噦胸滿小便不利以丹田有執胸中有寒也

診 脈陰陽俱緊者口中氣出唇口乾燥蹇卧是冷鼻中涕出舌上胎滑勿妄治也到七日以來其人微發熱手足

溫者此為欲解或到八日以上反大執者此為難治設使惡寒者必欲嘔也腹內痛者必欲利也 海藏云惡寒必欲嘔者小柴胡湯腹

中痛者 藏結如結胸狀飲食如故時時下利寸脈浮關脈小細沈緊舌上白胎滑者難治也若無陽證不往來寒

理中湯

傷寒

下



熱其人反靜者不可攻也

論見藏結


〔成〕舌者心之官法應南方火本紅而澤傷寒三四日已後舌上有膜滑如胎甚者或燥澀黃黑是數者白熱氣深之故也邪氣在表者舌上即無胎及邪氣傳裏津液結搏則舌上生胎矣寒邪初傳未全成熱或在半表或在半裏或邪氣客於胸中者皆舌上白胎而滑也經曰舌上如胎者以丹田有熱胸上有寒邪初傳入裏也陽明病腸下鞭滿不大便而嘔舌上白胎者可與小柴胡湯是邪在半表半裏也太陽病若下之則胃中空虛客氣動膈心中懊憹舌上胎者梔子豉湯王之是邪客於胸中也若病在臟宜若可下如舌上胎滑者則不可攻是邪未全成熱猶帶表寒故也及其邪傳為熱則其舌上之胎不滑而澀也經曰傷寒七八日不解熱結在裏表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升者白虎加入參湯主之是熱耗津液而滑者已乾也 若熱聚於胃 宜下 則為惡苦黃是熱已深矣金匱要略曰舌黃未下者下之黃自去 若舌上黑色者 不治 又為熱之極也鍼經曰熱病口乾舌黑者死必心為君王之官開竅於舌黑為腎色見於心部心部者火也腎者水也水之邪熱已極鬼賊相刑故知必死也

垣下後病嗽加五味子麥門冬如舌上有胎滑者是胸中有寒勿用之胸有微寒加辛熱之劑立效 舌燥澀如楊梅刺者用生薑切厚片蘸蜜於舌上搯之其刺立消神效

無薄荷蜜治舌上白胎乾澀語不真先以生薑厚片蘸蜜搯洗次用薄荷自然汁與白蜜等分調勻傳之良陶傷寒舌上生胎不拘滑白黃黑用井華水浸青布片洗淨後用生薑切片子時時浸水刮擦之其胎自退凡見黑胎如芒刺者必死此熱毒入深十有九死蓋腎水尅心火也 又舌吐不收者用冰片少許搽舌上即收

附杜清碧驗證舌法


白胎舌



舌見白胎滑者邪初入裏也丹田有執胸中有寒乃

少陽半表半裏之證也宜小柴胡湯梔子豉湯治之

將瘟舌



舌見紅色熱蓄於內也不問

何經宜用透頂清神散治之

透頂清神散方

豬牙皂骨

細辛

白芷

當歸各等分

為細末和勻令病人先嚙水一口以藥少

許吹入鼻內吐去水取嚏為度未嚏仍用藥吹入凡瘟疫之家不拘已未患者皆宜用之



南京中醫藥大學圖書館藏

中焙舌



舌見紅色內有黑形如小舌者乃邪熱結於裏也

君火熾盛反兼水化宜涼膈散大柴胡湯下之

生癍舌



舌見紅色而有小黑星者熱毒乘虛入胃蓄熱則發斑矣

宜用元參升麻葛根湯即元參升麻湯加葛根化斑湯解之

紅星舌



舌見淡紅中有大紅星者乃少陰君火熱之盛也所不勝者

假火勢以侮脾土將欲發黃之候也宜用茵陳五苓散治之




舌尖黑

淡紅

舌見紅色尖見青黑色者水虛火實
腎軟所致宜用竹葉石膏湯治之

舌圈裏



舌見淡紅色而中有一紅暈乃是純黑乃餘毒遺於心胞絡
之間與林火鬱結二水亢極故有是證也以承氣湯下之

舌裂人



此亦有

舌見紅色更有裂紋如人字形者乃君火
燔灼熱毒炎上故發裂也宜用涼膈散




蟲碎色



舌見紅色更有紅點如蟲蝕之狀者乃熱毒熾甚大
 在上水在下不能相濟故也宜用小承氣湯下之

裏黑舌



舌見紅色內有乾鞭黑色形如小長舌而有刺者此熱毒熾甚
 堅結大腸金受火制不能平水故也急用譚胃承氣湯下之

厥陰舌



舌見紅色內有黑紋者乃陰毒厥於肝經肝主
 筋故舌見如絲形也用理中合四逆湯溫之



舌現死



舌見黑色水尅火明矣患

此者百無一治治者審之

〔薛〕余在留都時地官王事鄭汝東妹婿患傷寒得此舌院內醫士曾禮謂當用附子理中湯人咸驚駭遂止藥
 草能療因甚治棺曾與之鄰往視之謂用前藥猶有生理其家既待以死拚從之數劑而愈大抵舌黑之證有火
 極似水者即杜學士所謂薪為黑灰之意也宜涼膈散之類以瀉其陽有水來尅火者即曾醫士所療之人是也
 宜理中湯以消陰翳又須以老生薑切平搽其舌色稍退者可治堅不退者不可治 宏治辛酉金臺姜夢輝患
 傷寒此得此舌手足厥逆吃逆不止眾醫猶作火治幾致危殆院判吳仁齋用附子理中湯而愈夫醫之為道有
 是病必用是藥附子療寒其效可數奈為世皆以為必不可用之藥盍視人之死而不救不亦哀哉至於火極似
 水之證用藥得宜效應不異不可使謂百無一治而棄之也




北京中醫藥大學圖書館藏

六斗圭 電

傷寒

九

舌胎黃



舌見尖白根黃其表證未罷煩解表然
後乃可攻之如大便祕者用涼膈散加
硝黃泡服小便澀者用五苓散如木通
合益元散加薑汁少許以白滾湯調服

舌星黑



舌見弦白心黑而脈沈微者難治脈浮滑者奇汗沈實者奇
下始病即發此色乃危殆之甚也速進調胃承氣湯下之

舌五+



舌尖白胎二分根黑一分必有身痛惡寒如飲水不至甚
者五苓散自汗渴者白虎湯下利者解毒湯此亦危證也



舌六十



舌見白胎中有小黑點亂生者尚有表證其病來之雖

惡宜涼膈散微表之表退即當下之下用調胃承氣湯

舌七十



舌見如灰色中間更有黑暈兩條此熱乘腎與命門也宜急下

之服解毒湯下三五次遲則難治如初服量加大黃酒浸炮

舌八十



舌見微黃色者初病即得之發譫語者由失汗表邪入

裏也必用汗下兼行以雙解散加解毒湯兩停主之



南京中醫藥大學圖書館所有

變解毒散加解毒湯方

防風

川芎

當歸

芍藥

大黃

麻黃

連翹

芒硝

荆芥

白朮

梔子各半兩

石膏

黃芩

桔梗各一兩

甘草二兩

滑石三兩

右每服一兩水一鍾半生薑三片煎八分

服不拘時一二有桂枝二兩

舌九十

白胎

微黃

常見白胎外則微黃者必作

泄宜服解毒湯惡寒者五苓散

舌十二

微黃

舌見微黃色者表證未罷宜用小柴胡湯合天水散

主之可下者大柴胡湯下之表裏雙除臨證審用之



南京中醫藥大學圖書館藏書

舌一十二




舌見黃色者必初白胎而變黃色也皆表而傳裏熱已入胃宜急下之若下遲必變黑色為惡證為亢害鬼賊邪氣深也不治宜用調胃承氣湯下之

舌二十二



舌左白胎而自汗者不可下
宜白虎加入參三錢服之

舌三十二



舌右白胎滑者病在肌肉為邪在表
半裏必往來寒熱宜小柴胡湯和解之




南京中醫藥大學圖書館藏書

六斗... 龜

傷寒

上

舌四十二



舌左見白胎滑此臟結
之證邪併入臟難治

舌五十二



舌見四圍白而中黃者必作煩渴嘔吐之證兼有
表者五苓散益元散兼服須待黃盡方可下也

舌六十二



舌見黃而有小黑點者邪偏六腑將入五臟也急
服調胃承氣湯下之次進和緩散十救四五也



舌七十二

黃色
白色

舌見黃而尖白者表少裏多宜天水散一服

涼膈散二服合進之脈弦者宜防風通聖散

舌八十二

純黃



舌見黃而澀有隔礙者熱已入胃邪毒深矣
心火煩渴急以大承氣湯下之若身發黃者
用茵陳湯下血用抵當湯水在腸內十寒湯
結胸甚者大陷胸湯痞用大黃瀉心湯

舌九十二

微
黑灰色
紅

舌見四邊微紅中央灰黑色者此由失下而致用大承氣湯

下之熱退可愈必三四下方退五次下之而不退者不治



舌十三



舌見黃而黑點亂生者其證必渴譫語脈實者生脈濇者死

循衣摸牀者不治若下之見黑裏亦不治下宜大承氣湯

舌一十三



舌見黃中黑至尖者熱氣已深兩感見之十當九死惡

寒甚者亦死不惡寒而下利者可治調胃承氣湯主之

舌二十三



舌見外淡紅心淡黑者如惡風表未罷用雙解散加解毒湯相半

微汗之汗罷急下之如結胸煩躁目直視者不治非結胸者可治



舌三十三



舌見灰色尖黃不惡風寒脈浮者可下之若惡風惡寒

者用雙解散加解毒湯主之三四大下之見黃黑不治

舌四十三



舌見灰黑色而有黑紋者脈實急用大承氣湯下之

脈浮渴欲飲水者用涼膈散解之十可救其二三

舌五十三



舌根微黑尖黃脈滑者可下之脈浮者當養陰退陽若惡

風寒者微汗之用雙解散若下利用解毒湯十生七八也



三十六舌



舌根微黑火黃隱見或有一紋者脈實急用大承氣湯

下之脈浮渴飲水者用涼膈散解之十可救其一二也

以上三十六舌乃傷寒驗證之捷臨證用心處之百無一失

動氣

動氣者為暴暴然動跳於腹者是也

動氣在右不可發汗發汗則衄而渴心苦煩飲即吐水

活人云先服五苓散三服次服竹葉湯

動氣在左不可發汗發汗則頭眩汗

不止筋惕肉瞤

活人云先服防風白朮牡蠣汗止次服建中湯方見自汗

動氣在上不可發汗發汗則氣上衝正在心端

活人云宜服赤茯苓方見氣上衝心

動氣在下不可發汗發汗則無汗心中大煩骨節苦疲身暈惡寒食則反吐穀不能進

活人云先服大橘皮湯吐止後服小建中湯

動

氣在右不可下之下之則津液內竭咽燥鼻乾頭眩心悸也

動氣在左不可下之下之則腹內拘急食不下動氣

更劇雖身有熱卧則欲踈

動氣在上不可下下之則掌握熱煩身上浮冷熱汗自泄欲得水自濯

動氣在下不

可下下之則腹脹滿卒起頭眩食則下清穀心下痞也

附保命集方

傷寒汗下後臍左有動氣宜防葵散

防葵散方

防葵 一兩

木香 不見

柴胡

黃芩 各半

右剉為細末每服五錢水煎服



北京中醫藥大學圖書館藏

傷寒汗下後臍上有動氣者宜枳殼散

枳殼散方

枳殼剉炒 訶黎勒 木香不見火 各五錢

傷寒汗下後臍右有動氣者宜前胡散

前胡散方

前胡 赤茯苓 大腹皮

大黃各三錢 右為細末每服五錢沸湯點服

傷寒汗下後臍下有動氣者宜茯苓散

茯苓散方

赤茯苓一兩 桂心 大腹皮

細末每服五錢沸湯點服

如久不治傳為積熱治之難痊不可汗下也

漱水不欲嚥

此證屬陽明凡內有熱者欲飲水而不可飲是熱在經而裏無熱也陽明經氣血俱多經中熱甚逼血妄行故知必作衄也 楊仁齋曰唇燥口乾血證類有之必欲取水而灌漱也然漱水而不飲水何哉蓋渴者易為飲陽熱入裏胃中液乾患不與水耳惟夫上焦瘀血下焦畜血乘肺發燥渴證獨無是以漱水而不欲下咽也漱水條例惟血證有焉 陽明身熱頭疼口燥漱水不欲入咽必衄血脈微者犀角地黃湯 湯茅花湯無表證不寒孰胸腹滿脣燥口乾漱水不嚥小便多 此為瘀血必發狂輕者犀角地黃湯 桃仁承氣湯甚者抵當丸取盡黑物為度

赤茯苓 當歸 三稜地各一兩 右為末每服五錢沸湯點服

人參各五錢 木香

檳榔

川茴香 良薑各五錢 檳榔三錢 右為



吳凡少陰脈沈細手足冷或時煩躁作渴欲漱水不欲嚥者宜四逆湯溫之又下利厥逆無脈乾嘔煩渴欲漱水不欲嚥宜白通加豬膽汁人尿王之凡厥陰虺厥傷寒煩躁吐虺口躁舌乾但欲涼水浸舌及昏時不可離不欲食者宜理中湯加烏梅王之太抵陰證發躁煩渴不能飲水或有勉強飲下良久復吐或飲水而嘔或噦逆者宜寒也蓋無根失守之火遊於咽嗝之間假作燥煩則不能飲或有能飲水不吐復欲飲者熱也

衄

成衄者鼻中出血也雜病衄血在裏傷寒衄血在表病源曰心主血肝藏血肺主氣開竅于鼻血得熱隨氣上從鼻出為衄是雜病衄者責其裏熱也經曰傷寒脈浮緊不發汗因致衄者麻黃湯傷寒六七日不大便頭痛有熱者與小承氣湯小便清者知不在裏仍在表也當須發汗若頭痛者必衄宜桂枝湯是傷寒衄者責其表熱也衄雖為熱在經又有不可汗者經曰衄不可汗汗則額上陷脈緊急直視不能眴不得眠是也前云枝枝麻黃證者非治衄也蓋以發散經中邪氣使其不得擁盛于經迫上而妄行也衄為熱無寒是以三陰無衄經少陰病曰但厥無汗而強發之必動其血或從口鼻或從目出是名下厥上竭者死非衄也又衄但頭汗出身無汗及汗出不至足者亦死證也

太陽傷寒脈浮不發汗因致衄者麻黃湯主之活人云衄後脈浮者宜麻黃湯衄後脈已微者不可行麻黃湯宜黃芩芍藥湯 太陽病脈浮

證無汗發熱身疼痛八九日不解表證仍在此當發其汗服藥已微除其人發煩目瞑劇者必衄乃解所以然者陽氣重故也麻黃湯主之

張或謂經言衄家不可發汗汗出額上必陷今衄血之證皆督麻黃於其下何也夫太陽脈浮發熱無汗自衄者愈此一定之論也何故復用麻黃湯以汗之仲景豈有前後相反之理哉然則條麻黃湯主之五字合當用于當發其汗之下蓋以漢之文法用藥諸方皆贅於外條之末且如大青龍湯證既云脈微弱汗出惡風者不可服服之厥逆筋惕肉瞤此為逆也又以大青龍湯主之皆此例也

太陽中風以火劫發汗邪風被火兩陽相重身發黃陽盛欲衄陰虛小便難頭汗腹滿微喘口乾咽爛或不大便

讓語甚者至噦捻衣摸床小便利者可治詳身 太陽病脈浮發熱無汗而衄者愈也

陽明病口燥但欲飲水不欲嘔者此必衄或陽明之脈起於鼻絡於口陽明裏熱則渴欲飲水此口燥但欲漱

行必作衄也當黃熱脈浮發熱口乾鼻燥能食者則衄黃熱

少陰病但厥無汗而強發之必動其血或從口鼻或從目出名下厥上竭為難治 禁忌衄家不可發汗汗出

必額上陷脈急緊直視不能瞬不得眠衄忌發汗者為無脈若脈浮緊身發熱惡寒之證宜察之

海仲景言衄不可發汗者蓋為脈微也若浮脈者麻黃湯浮緩者桂枝湯脈已微二藥不可用犀角地黃湯王之

仲景云衄家不可發汗汗出必額上陷脈緊直視不能瞬不得眠又云亡血不可發其表汗出即寒慄而振此二說皆為脈微不可汗也若脈浮緊及浮緩者皆當發之是也

活傷寒衄血脈已微者黃芩芍藥湯犀角地黃湯王之犀角地黃湯治傷寒應發汗而不發汗內有瘀血鼻衄

血面黃大便黑此方主消化痰血

芍藥一兩 生地黃半兩 牡丹皮 犀角各二錢 右咬咀每服五錢水一盞半煎去一盞

有熱如狂者加黃芩一兩其人脈大來連腹不滿自言滿者為無熱不用黃芩

茅花湯治鼻衄不止用茅花尖一把以水三盞濃煎汁一盞分二服即瘥無花以根代之 若衄而渴者心煩飲則

吐水先服五苓散次服竹根湯

木 治傷寒衄血滑石丸 滑石末末以多少飯丸如桐子大每服十九微嚙破新水咽下立止用藥末一錢飯少

許同嚙下亦得老幼皆可服湯暈叔云鼻衄者當汗不汗所致其血青黑時不以多少乃止宜服溫和藥以調其

衛緩見鮮血急以此藥治之 戴古論鼻衄廣太陽經風寒宜有之既衄而表證仍在於寒當用麻黃湯於風當再用桂枝湯且謂發煩目眩極

傷寒 十五



北京中医药大学图书馆藏

者必衄既發煩目瞑豈純是太陽經兼陽明之脈循鼻是太陽侵入陽明汗下俱難若衄已而熱不退者惟升麻葛根湯敗毒散陽旦湯為穩衄而煩渴飲則吐水先服五苓散次服竹葉石膏湯大衄不止宜茅花湯或黃芩芍藥湯

加茅花一撮 若少陰初得病醫誤以止發汗之法致迫血動經妄行而衄其血非獨出於鼻或從口中或從耳目又有陽陷入陰四肢厥逆醫見其厥謂寒邪在表從而汗之當平反汗以致動血是謂下厥上逆為難治先哲云桂枝下咽陽盛則斃正以此也要之汗不出微為陽之衄誤發其汗為陰之衄二者大不同也又云陽氣陰虛汗之則

死 [陶]傷寒衄血或成流入不止者將山梔炒黑色為細末吹入鼻內外用水濕草紙搭於鼻中其血自止須分點滴成流者其邪在經不在此法 墨汁五倍子燒灰或服或吹隨用又或刺曲池合谷瀉之 [吳]凡吐血衄血

無表證脈不浮緊者不可發汗也東垣云脈微者宜黃芩芍藥湯脈滑數者犀角地黃湯如熱盛血不止者可開地黃散古方四生凡血虛者東垣麥門冬飲子三黃補血湯若不止者活人蒿根散茅花湯主之也以上皆治吐血衄

血之良方但在出入通變也大抵吐血衄血脈滑小者生脈實大者死或吐或衄後脈微者易治若熱反厥脈又數急者死也若衄而頭汗出或身上有汗不至足者乃難治也凡血得熱則行得冷則凝見黑則止所以犀角地黃湯中加

好京墨一二匙攪藥令黑與之最切也昔陶尚文治一人傷寒四五日吐血不止醫以犀角地黃湯茅花湯治之反劇陶公切其脈浮緊而數遂服麻黃湯一服汗出而愈也可謂得仲景之心法矣若脈不浮緊而數者此法豈可施乎

吐血

[成]雜病吐血咯血青為胃邪傷寒吐血咯血皆由誤汗下并火逆而致誠非寒病熱之微甚者也是為壞病宜隨其逆而調之惟少陰厥竭誤汗一證強動經血故云難治也 凡服桂枝湯吐者其後必吐膿血黃芩湯 麻脈

浮熱甚反灸之必咽燥唾血此大邪迫血而血上行者也 牙花湯 解毒湯 黃芩芍藥湯 少陰病但厥無汗強發之必動其血或從口鼻或從目出名下厥上竭為難治 少陰證惡寒發熱無頭汗誤大汗使血從且目口鼻出者名陰血多不語此與鼻衄

陽血不同 傷寒六七日大下後寸脈沉而遲手足厥逆下部脈不至咽喉不利唾膿血泄利不止者為難治
湯 咽痛吐血若面赤斑斑如錦紋者為陽毒且升麻鼈甲湯

附

〔垣〕治一貧士病脾胃虛與補劑藥愈後繼而居曠室卧熱炕咳而吐血數次予謂此文虛弱外有寒形而有火熱
在內上氣不足陽氣外虛當補表之陽氣瀉裏之虛熱蓋冬居曠室衣服單薄是重虛其陽表有大寒雖湯裏熱火
邪不得舒伸故血出於口因思仲景法治傷寒脈浮緊當以麻黃湯發汗而不與之遂成衄血却與麻黃湯立愈與此
甚同因與麻黃人參芍藥湯
麻黃人參芍藥湯方

麻黃一錢去外寒 桂枝半錢補表虛

白芍藥一錢

黃耆一錢定表益衛

炙甘草一錢補脾

五味子五粒女肺氣

麥門冬三錢保肺氣

人參三分益三焦元氣不足而定其表

當歸五分和血養血

右咬咀作一服水三盞煎麻黃令沸去沫至二盞入餘藥同煎

至一盞去滓熱服臨卧一服愈觀此一方足以為萬世模範也蓋取仲景麻黃湯與補劑各半服之但凡虛人合用仲景方者皆當以此為則也

〔活〕傷寒吐血諸陽受邪初熱在表應發汗熱毒入經結於五藏內有瘀積故吐血也瘀血甚者抵當湯也輕者桃仁承氣湯兼服犀角地黃湯二黃丸

便膿血

便膿血熱病也其在太陽者誤發淋家汗因使血循令湯此壞病也由小便淋瀝所致故利其小便而愈陽明病下血謔語此熱入血室刺期門以散其熱也無表裏證因下後協熱便膿血者熱勢下流故也其在少陰下利便膿血又有至四五日腹痛便膿血治以桃花湯成氏釋為裏寒非也桃花湯雖犯乾姜然分兩最微赤石脂粳米居多蓋

六科... 傷寒



北京中醫藥大學圖書館

調正氣滯滑脫佐用辛以散之之義又八丸日一身盡熱必使血也又使膿血者可刺厥陰又傷寒先厥後熱必使膿血又傷寒厥少熱微後必使血又下利脈數而渴必清膿血是數者皆傳經之熱邪也各隨其輕重或用微涼或用疏導無不愈者誤用辛熱罔或得痊世因為難療之疾殊不知仲景著使膿血別無死候學者宜究焉

太陽病以火熏之不得汗其人必躁再到太陽經不解必清血為火邪此火邪迫血而血下行者也太陽病下之其脈促不

結胸者為欲解脈沉滑者協熱利脈浮滑者必下血 淋家不可發汗發汗必使膿血 太陽病外已解但少腹急

結者桃仁承氣湯證也詳審

陽明病病人無表裏證發熱七八日雖脈浮數者可下之假令已下脈數不解下不止協熱而使膿血也陽明病下

血謔語此熱入血室但頭汗者刺期門 衝脈為血海即血室也男女均有之男子下血謔語婦人寒熱似瘧皆為熱入血室迫血下行則為協熱而利挾血之脈乍澀乍數或沉或伏血熱交併則脈洪盛大抵男多在左手女多在右手見之也又有陰寒為病下利膿血者乃下焦虛寒腸胃不固清濁不分而使下膿血也二者一為血熱一為血寒臨病且詳審之

少陰病八九日一身手足盡熱以熱在膀胱必使血也 少陰病下利使膿血者可刺 厥陰 傷寒先厥後發熱下利必自止若不止必使膿血 傷寒熱少厥微指頭寒默默不欲食煩躁小便利色白者此熱除也欲得食為欲愈若厥而嘔胸脇煩滿者其後必使膿血 傷寒厥少熱多其病當愈四日至七日熱不除者必使膿血 下利脈數而渴者令自愈設不差必清膿血 下利寸脈反浮數尺中自雷者必清膿血 吳

凡下血使膿血有陰陽冷熱之不同要詳辨之古人云見血無寒又言血得熱而行此大概之言也大抵屬熱者常八九屬寒者纔一二不可拘泥謂無寒也要略曰陽證內熱則下鮮血陰證內寒則下紫黑如豚肝也且夫陽

證脈數而有力者為是熱苦寒之藥可投若數而無力者虛熱當甘溫養血藥中少佐寒藥可也若陰證則脈遲

而有力者為有神可治無力者難治也凡下利膿血身熱脈大者為難治身熱脈小者為易治也

畜血

身黃如狂屎黑喜忘皆畜血之證也許學士云血在上則喜忘在下則發狂

成 血留下焦而瘀者畜血也大便

傷寒先看面目次觀口舌次觀心下至少腹以手揣之若少腹鞭滿若小便不利者是津液留結可利小便若小便

自利者是畜血證可下瘀血其陽明病有畜血而喜忘者證之甚也宜抵當湯太陽有熱結膀胱如狂者證之輕也

宜桃仁承氣湯經云病人無表裏證發熱七八日脈雖浮數可下之假令已下脈數不解胃熱則消穀善飢至六七

日不大便者此有瘀血抵當湯主之若脈數不解而下不止必協熱而便膿血也此證當不大便六七日之際又無

喜忘如狂并少腹鞭滿之候與承氣下者多矣何以知為畜血蓋脈浮而數浮則熱傷氣數則熱傷血因下之後浮

數俱去則已若下後數去而脈但浮者則榮血間熱去併於衛氣間熱心中則飢也邪熱不殺穀則有潮熱發渴之

證也及下之後浮去而數不解者則衛氣間熱去合於榮血間之熱熱氣合併逼血下行胃虛協熱消穀善飢血至

下焦若下不止則血得以去泄必便膿血也若不大便六七日則血不得出泄畜在下焦為瘀血須抵當湯下之此

寔證之奇異治法之元微也

太陽病六七日表證仍在脈微而沉反不結胸其人發狂者以熱在下焦少腹當鞭滿小便自利者下血乃愈所以

然者以太陽隨經瘀熱在裏故也抵當湯主之成 太陽經也膀胱府也此太陽熱隨經入府者也六七日者邪

淺當結於胸中若不結於胸中其人發狂者熱結在膀胱也經曰熱結膀胱其人如狂此發狂則熱又深也少腹鞭

滿小便不利者為無血也小便自利者血證諦也與抵當湯以下畜血案玩仍在字則邪氣為不傳於裏非猶淺

也膀胱為太陽本經曰熱在下焦曰少腹鞭滿曰小便自利皆膀胱之證故 **太陽病身黃脈沉結少腹鞭小便不利者**

利者為無血也小便自利其人如狂者血證諦也抵當湯主之成 身黃脈沉結少腹鞭小便不利者胃熱發黃也司與

非胃中瘀熱為熱結下焦而為畜血也與抵當湯以下畜血



抵當湯方

水蛭 三十個 熬

蠶蟲 三十個 去足翅熬

桃仁 二十個 去皮尖

大黃 酒浸 三兩

右四味為末以水五升煮取二升去滓溫服一升

不下再服 苦走血鹹勝血蠶蟲水蛭之鹹苦以除畜血 甘緩結苦泄熱桃仁大黃之甘苦以下結熱

人之所有者氣與血也氣為陽氣留而不行者則易散

以陽病易治故也血為陰血畜而不行者則難散陰病難治故也血畜於下非大毒駛劑則不能抵當故治畜血

曰抵當湯內經曰鹹勝血畜於下必以鹹為主故以水蛭鹹寒為君苦走血血結不行必以苦為助是以蠶蟲

苦寒為臣肝者血之源血聚則肝氣燥肝苦急食甘以緩之散血緩肝是以桃仁味甘平為佐大黃味苦寒濕

氣在下以苦泄之血亦濕類也湯血逐熱是以大黃為使四物相合雖奇毒重病亦獲全濟

傷寒有熱少腹滿應小便不利令反利者為有血也當下之不可餘藥且抵當丸 成傷寒有熱少腹滿是畜血於下焦若熱畜津液不通則小便不利其熱不畜津液而畜血不行小便自利者乃為畜血富與桃仁承氣湯抵當湯下之然此無身黃屎黑又無喜忘發狂是未至於甚故不可與其餘破峻之藥也可與抵當丸小可下之也素身黃屎黑喜忘發狂亦是推廣之詞若

依上文只是滿而不鞞耳

抵當丸方

水蛭 二十個

蠶蟲 二十個

桃仁 二十個 去皮尖

大黃 三兩

右四味杵分為四丸以水一升煮一丸取七合服

之暉時當下血苦不下者更服


太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下下者愈其外不解者尚末可攻當先解外外解已但少腹急結者乃可攻

之宜桃核承氣湯 按犀角地黃湯以治上血如吐血動血為上血也桃仁承氣湯治中血如畜血中焦下利膿血之類為中血也抵當湯丸治下焦血如血證如狂之類是下血也上中下三焦各有主治此條當作

三證看至下者愈是一證謂其血自下也疑有闕文至當先解外是一證蓋其人如狂是下焦血非桃仁承氣證也

自外解至末又是一證恐是自下只去得下焦血而中焦道遠未能盡去故尚留於少腹耳又抵當湯丸其中蠶蟲水蛭性為猛厲不若四物湯加酒浸大黃各半下之妙見湯液本草水蛭條下

桃核承氣湯方



桃仁五十個

桂枝皮去粗

芒硝

甘草炙各二兩

大黃四兩

右五味以水七升煮取二升半去

滓納之稍更上火微沸下火先食温服五合日三服當微利

二物於調胃承氣湯中也 按以上證玩之當是桂非桂枝也蓋桂枝輕揚治上桂厚重治下成氏隨文順釋未足據

陽明

陽明證其人喜忘者必有畜血所以然者本有久瘀血故令喜忘屎雖鞭大便反易其色必黑宜抵當湯下

之

成內經曰血并於下亂而喜忘此下焦本有久瘀血所以喜忘也津液少大便鞭以畜血在內屎雖鞭大便反易其色黑也與抵當湯以下瘀血

海

初便褐色者重再便深褐色者

愈重三便黑色者為尤重色變者以其火燥也如羊血在日色中須臾變褐色久則漸變而為黑色即此意也當

詳察之

病人無表裏證發熱七八日雖脈浮數者可下之假令已下脈不解胃熱則消穀善飢至六七日不大便者有瘀血

宜抵當湯若脈數不解血下不止必協熱而使膿血也

成當不大便六七日之際無喜忘如狂之證又無或腹

鞭滿之候何以知其有畜血蓋以其脈浮數故也浮則熱客於氣數則熱客於血下後浮數俱去則病已若下後

數去而浮仍在則榮血中熱去而衛氣中熱在為邪氣獨留心下善飢邪熱不殺穀潮熱及渴也若下後浮去而

數不解則衛氣中熱去而榮血中熱在血熱合併迫血下行胃虛協熱消穀善飢血至下焦若下不則止血得以

泄必膿血也若不大便六七日則血不得出泄必畜在下焦為瘀血故須以抵當湯下之

張或問攻下之法

須外無表證裏有下證然後可攻上言無表裏證况脈更浮數何故言可下之曰此非風寒之所病是由內傷而

致然也若外不惡寒裏無譫語但七八日發熱有燥津液乃陽盛陰虛之時苟不攻之其熱不已而變生焉故云

雖脈浮數可下不待沉寔而攻之夫內傷者經曰跌陽脈浮而數浮則傷胃數則傷脾此非本病醫持下之所為也仲景之意不外是理凡傷寒當下之證皆從太陽陽明在經之邪而入於府故下之今不言陽明病而止云病人無表裏證此非自表之裏而病也但為可下故編於陽明篇中學者且詳玩焉

病者胸滿痞痿于胃口渴但漱水不欲下咽無寒熱脈微大來遲腹不滿其人言我滿為有瘀血海云漱水不咽胸滿心下手不可近

者桃仁承氣湯主之病者如熱狀煩滿口乾燥而渴其脈反無熱此為陰伏是瘀血也當下之活前集云傷寒失汗熱

畜在裏熱化為血其人善忘而如狂血上逆則善忘血下畜則內急甚者抵當湯丸桃仁承氣湯犀角地黃湯取

盡黑物為效又云若用抵當湯丸更宜詳慎審其有無表證若有畜血而外不解亦未可使用宜先用桂枝湯以

解外緣熱客膀胱太陽經也吳凡畜血者瘀血留結於內蓋傷寒病在太陽當汗不汗則瘀血在裏必血結

也大抵看傷寒病人心下兩脇少腹但有鞭滿處以手按則痛者便當問其小便何如若小便不利乃水與氣也

若小便自利者為有血也陶以手按之小腹若痛而小水自利大便黑兼或身黃譫妄燥渴脈沉遲者為蓄

血桃仁承氣湯下盡黑物則愈若按之小腹脹滿不鞭痛小水不利則溺澀也五苓散加減利之不可大利恐耗

減津液也若按小腹遠臍鞭痛渴而小水短赤大便定者有燥屎也大承氣湯下之

附
海血證古人用藥雖有輕重之殊而無上下之別今分作上中下三等以衄血嘔血唾血吐血為上部血結胸中

為中部畜血下焦為下部夫既有三部之分故藥亦當隨其輕重也

汗多為衄血脈浮爻之咽燥為唾血當汗不汗熱入於裏者為嘔血吐血此在上也犀角地黃湯主之涼膈散加生

地黃亦可然衄唾嘔吐俱在上必當以輕重分之大凡血證皆不飲水惟氣證則飲之宜詳審此證乃足太陰所主

脾所不裹越而上行所以有吐血嘔血之候也實者犀角地黃湯虛者薑苓芍藥湯凡病嘔吐者以脾所主故咸用

芍藥王之是知太陰藥也
血結胸中頭痛身痛漱水不欲嚥者衄無熱胸滿漱水不欲嚥者善忘昏迷其人如狂心下手不可近者血在中也

桃仁承氣湯主之

血分上中下三部

上部血

中部血

畜血下焦其人發狂小腹滿鞭小便自利大便反黑及臍上疼者抵當湯丸主之如狂者在中發狂者在下

抵當湯丸藥味同劑如何是二法蓋喜忘發狂身黃屎黑者疾之甚也但小腹滿鞭小便利者輕也故有湯丸之別

桃仁大黃等分水蛭蠃蟲多者作湯之二者作丸丸之名取其數少而緩也故湯用煎服一升丸止服七合也

生地黃湯 病人七八日後兩手脈沉細微膚冷臍下滿或狂或躁大便是而色黑小便利者此畜血證也若老

幼氣虛弱者宜此丸主之

生地黃 取自然汁一升如無只用生乾地黃二兩

乾漆 半兩炒烟盡

生藕 自然汁半升如無藕用刺前汁一升半

藍葉 一握切細乾者用未詳

水蛭 二十個去翅足

水蛭 十個炒

大黃 一兩剉如豆大

桃仁 研碎半兩

右八味同一處入水二升慢

火熬及二升放冷分二服先投一服至半日許血未下再投之此湯比抵當湯丸其勢甚輕如無地黃蠃蟲汁照

升數添水同煎抵當丸恐用之太過不止損血故以此湯主之

腹中雷鳴

成 腹中雷鳴有二證壞病也其一由傷寒反下之而致者 甘草湯 以誤下損陰氣故耳其一由傷寒汗出解之而

生者 主姜瀉 以誤汗損陽氣而然蓋用此二湯以復陰陽之氣耳

傷寒中風醫反下之其人下利日數十行穀不化腹中雷鳴心下痞鞭乾嘔心煩不得安醫見心下痞復下之其痞

益甚此非結熱以胃虛客氣上逆故使鞭也甘草瀉心湯主之 詳下

傷寒汗出解之後胃中不和心下痞鞭乾嘔食臭脇下有水氣腹中雷鳴下利者生薑瀉心湯主之 詳痞

蹇

成 蹇者屈縮不伸是也皆陰寒之極雖在陽經見是證者然有表證亦且用溫經之劑桂枝附子是也況在三陰

裏寒下利厥逆者乎四逆之類其可缺諸右有陰無陽者為不治

四

少陰病下利若利自止惡寒而蹇手足溫者可治或云四逆湯真武湯少陰病惡寒而蹇時時自煩欲去衣被者可治法小

柴胡湯少陰病惡寒身蹇而利手足逆冷者不治少陰四逆惡寒而身蹇脈不至不煩而躁者死

四肢拘急

成拘急者拘強難以屈伸也不拘病證在何經凡見是證皆陰寒所致寒主收引故也仲景之法雖太陽蓋及風

濕相搏而具攣急者亦處以桂枝加附子湯甘草附子湯之類况陰經裏病霍亂之候四逆之劑其可缺諸

太陽病發汗漏不止其人惡風小便難四肢微急難以屈伸桂枝加附子湯方見風濕相搏骨節煩疼不得屈伸

汗出短氣小便不利惡風或身微腫甘草附子湯方見身傷寒脈浮自汗小便數心煩微惡寒腳攣急本桂枝加

附子湯反用桂枝湯攻表誤也作甘草乾姜湯以復其陽若愈足溫更作為藥甘草湯以伸脚大汗出熱不去兩

拘急四肢疼又下利厥逆惡寒者四逆湯陰陽易病身體重少氣少腹裏急膝脛拘急者燒視散

附

吳凡傷寒大汗已出因而露風則汗不流通風邪乘虛襲於經絡故手足攣搗不能屈伸筋脈拘急也且牛蒡根

散生之

牛蒡根散方

牛蒡根十段麻黃去根川牛膝各六右細剉於石器內入好酒一升同研細另用炭

火半秤燒一黃土地坑令通赤去火掃淨投藥於坑內再用炭火燒令黑色取出研為細末每服一錢以好酒溫

熱調下日三服效外以百草膏貼之良

瘰癧

成瘰者筋急而縮也癧者筋緩而伸也或伸縮而不上者瘰癧也俗謂之搗搗乃風熱甚之病且以祛風落熱之



涼劑或有可生若妄加灼火及發表之藥則禍不旋踵

太陽發汗已身猶灼熱名風溫脈陰陽俱浮自汗身重多眠鼻鼾語言難出不可下不可火若被火者微則發痲劇

則驚癇瘈瘲 防風通聖散

〔吳〕夫瘈瘲者一縮一伸手足相引搖擗不已大抵與嬰孩發搐相似古人以此證多屬於風蓋風主搖動也駱龍
吉言心主脈肝主筋心屬火肝屬木火主熱木主風風火相扇則為瘈瘲也若夫不因汗下後所生者當平肝木降
心火佐以和血脈之劑主之如羌活防風黃芩柴胡黃連芍藥生地黃當歸川芎天麻之類若兼有痰者又加竹瀝
天南星半夏如風邪急搖須加全蝎白僵蠶之類若傷寒曾經汗下後多日傳變而得此證者為病熱已過多難治
也蓋因虛極生風所致須用小續命湯或大建中湯增損一二味主之凡傷寒汗出露風則汗不通流遂致筋脈攣
急手足搖擗者宜牛蒡根散主之又風溫被火微發黃色劇如驚癇時發瘈瘲者宜萎蕤湯主之若瘈瘲戴眼反折
絕汗乃出大如貫珠著身不流者此太陽終也不可治又有四肢掣習動而不止似瘈瘲而無力抽搐者此為肝絕
蓋汗下後變主此證者多死凡用小續命湯有汗去麻黃無汗去黃芩要在通變而已

風濕相搏

〔成〕風濕相搏有二證其一則本是傷寒至八九日復遇風濕相搏者桂枝附子湯以散表中風濕其一則只是風
濕相搏骨節煩疼等證宜甘草附子湯以散濕固衛能認此證妙在脈浮虛而濇脈若沉是滑大數者非也

〔太陽〕傷寒八九日風濕相搏身體煩疼不能轉側不嘔不渴脈浮虛而濇者桂枝附子湯若大便鞭小便不利者

桂枝去桂加白朮湯 風濕相搏骨節煩疼掣痛不得屈伸近之則痛劇汗出短氣小便不利惡風不欲去衣或身

微腫者甘草附子湯

奔豚

奔豚有二皆壞病也一由誤汗所致一由誤加燒針所致

〔太陽〕發汗後其人臍下悸者欲作奔豚茯苓甘草大棗湯主之方見

燒針令其汗針處被寒核起而赤者

必發奔豚氣從少腹上衝心者灸其核上各一壯與桂枝加桂湯更加桂二兩

〔吳〕夫奔豚者如豚突之狀氣從少腹上衝心而痛也凡欲作奔豚者其氣在臍下築然而動也且茯苓大棗湯主之或理中湯去白朮加肉桂

之痛甚者更加吳茱萸亦佳凡燒針令其汗出者針處被寒核起而赤必發奔豚也且灸其核上各一壯與桂枝

加桂湯主之若痛甚手足厥逆者豈歸四逆湯加肉桂吳茱萸主之惟桂大能泄奔豚凡藥中不可缺也

茯苓桂枝甘草大棗湯方

茯苓半斤

甘草二兩

大棗十五枚

桂枝四兩

右四味以甘爛水一斗先煮茯苓減二升

納諸藥煮取三升去滓溫服一升日三服

腫

腫

腫有三證太陽風濕相搏身微腫者宜治濕陽明中風耳前後腫者宜刺大病差後腰以下腫者宜利小便

風濕相搏骨節煩疼掣痛不得屈伸近之則痛劇汗出短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫者甘草附子湯主之

陽明中風脈弦浮大而短氣腹都滿脇下及心痛久按之氣不通鼻乾不得汗嗜卧一身及面目悉黃小便難有潮

熱時時噦耳前後腫刺之小瘥

大病差後從腰以下有水氣者牡蠣澤瀉散主之

牡蠣澤瀉散方

牡蠣版

澤瀉

蜀膝

商陸

葶藶編紙

海藻



栝實根

各等分

右為末每服一錢或二錢米飲調下小便利為度 身虛胃弱食少者以五苓加蒼朮陳皮木

香砂仁之類主之若人不甚弱者以高陸一味煮粥食之亦佳凡病瘥後足腫者不妨俱即飲食胃氣強自消也

一方用金毛狗脊煎湯洗之亦效

身癢

太陽病有身癢陽明病有身如蟲行俱為榮衛氣虛微邪在表無從而出故有為癢如蟲行之狀也憲宜各半湯

太陽病得之八九日如瘧狀發熱惡寒熱多寒少其人不嘔清便欲自可一日二三度發脈微緩者為欲愈也脈微

而惡寒者此陰陽俱虛不可更發汗更下更吐也面色反有熱色者未欲解也以其不能得小汗出身又癢宜桂枝

麻黃各半湯

陽明病法多汗反無汗其身如蟲行皮中狀者此久虛故也

宜桂枝麻黃各半湯活人用米附湯黃耆建中湯

〔趙〕蟲行皮中狀者即經

言身癢是也久虛者以表氣不足津液不充於皮膚使腠理枯澀汗難出也若謂虛則宜補畢竟陽明受邪為病

邪可補于如用米附黃耆輩皆收汗藥則榮衛鬱閉邪無從出內熱發矣何況其病又無吐利胃虛等證病不在

裏但皮膚中表氣虛乏理宜和解可也豈右借用各半湯或有熱者柴胡桂枝湯庶乎甘辛之劑可以和其榮衛

通行津液而解未當當否

除中

〔成〕除中者藏寒應不能食今反能食者是也有二證一證屬厥陰藏寒其一證由誤服黃芩今湯涼藥而致期以必死

其一則熱少厥多胃氣在者必愈恐暴來出而復去者死其熱續在者生此不因藥故也

傷寒脈遲六七日而反與黃芩湯徹其熱脈遲為寒今與黃芩湯復除其熱腹中應冷當不能食今反能食此名除

中必死 眼睛不慧語言不出而穀食反多者此為除中口雖欲言舌不能言 凡手足厥冷而利不當食而食者



恐為除中試與索餅食之發熱者除中不發熱者非也

詳見殿門

下重

泄利下重若少陰證欲棘四逆者四逆湯加桂白散若熱者白頭翁湯

方論見下和

脈浮宜以汗解用火灸之邪無從出因火而盛病從腰以下必重而痺石火逆也

脈遲浮弱惡風寒者表證也醫反下之遂不食脇痛身黃項強小便難復與柴胡湯必下重

論見腸痛

下利脈沉弦者下重也

身熱惡寒身寒惡熱

病人身大熱反欲得近衣者熱在皮膚寒在骨髓也身大寒反不欲近衣者寒在皮膚熱在骨髓也

成皮膚寒熱骨髓言深淺膚

言外骨髓言內身熱欲得衣者表熱裏寒也身寒不欲衣者表寒裏熱也

〔丹〕謹按身大熱欲得衣蓋人之身不能自溫因表氣之定足以自溫雖遇

風寒無所畏憚大熱病表氣當是而喜冷今反欲得衣者表氣虛不足以自溫故欲近衣恐是病人陰弱陽無所

附飛越而出發為大熱爾當作陰虛治之身大寒反不欲近衣者恐是邪在表不能自發而為熱表雖無熱邪鬱

膚滕表氣大是故不欲近衣爾當作鬱病治之註言表熱裏寒者當是熱感得淺寒感得深而在內也言表寒裏

熱者當是寒感得淺而在外熱感得深而在內也表裏之寒熱為重感病耶重感之病必有其名如傷寒重感寒

為溫瘧傷寒更遇風為風溫傷寒更遇溫熱為溫毒傷寒遇溫氣為溫疫病濕更中暍為濕溫未嘗有所謂表裏

寒熱也然表熱裏寒表寒裏熱何病耶竊嘗求之論意矣恐為寒熱感之深者發也內經曰亢則害承乃利謂氣

感之極則受勝己之化而為病也熱感得深外必受寒故曰寒在皮膚非寒也熱也熱在骨髓此火極似水證仲

景曰人傷於寒則為病熱熱雖甚不死寒感得深外必發熱故曰熱在皮膚非熱也寒也此傷於寒而熱甚也內

經曰甚者反治又曰寒因熱用熱因寒用病氣深者正氣虛也非反治因用邪何由伏病何由安

〔趙〕詳仲景



論中止分皮膚骨髓而不曰表裏者蓋以皮肉脈筋骨五者素問以為五藏之合主於外而充於身者也惟曰藏曰府方可言表裏可見皮膚即骨髓之上外部浮淺之分骨髓即皮膚之下內部深沉之分與經絡屬表藏府屬裏之例不同况仲景出此證在太陽篇首其為表證明矣是知虛弱素寒之人感邪發熱熱邪浮淺又勝沉寒故外怯而欲得近衣此所以為熱在皮膚寒在骨髓樂且辛温至於壯盛素熱之人或酒客輩感邪之初其未變熱陰邪閉於伏熱陰凝於外熱鬱於內故內煩而不欲近衣此所以寒在皮膚熱在骨髓樂且辛涼必也下論之餘既散表邪又和正氣此仲景不言之妙若以皮膚為表骨髓為裏則麻黃證骨節皮膚痛其可名為有表證有裏之證耶

活熱在皮膚寒在骨髓一條仲景無治法且先與陽旦湯寒已次以小柴胡加桂温其裏又在表熱裏寒者脈須沉而遲手或微厥下利清穀也所以陰證亦有發熱者四逆湯通脈四逆湯王之寒在皮膚熱在骨髓一條仲景亦無治法宜先以白虎加人參湯熱除次以桂枝麻黃各半湯以解其外又云表寒裏熱者脈必滑而厥口燥舌乾所以少陰惡寒而踰時時自煩不欲厚衣用大柴胡下之不愈此皆仲景之遺意也

表熱裏寒裏熱表寒

傷寒脈浮此表有熱裏有寒白虎湯主之

少陰病下利清穀裏寒外熱手足厥逆脈微欲絕身反不惡寒其人面赤色或腹痛或乾嘔或咽痛或利止脈不出

者通脈四逆湯方見 既吐且利小便復利大汗出下利清穀內寒外熱脈微欲絕者四逆湯王之

液則小便當少

下利清穀裏寒外熱汗出而厥者通脈四

逆湯

表熱裏寒者脈雖沉而遲手足微厥下利清穀此裏寒也所以陰證亦有發熱者此表熱也

表寒裏熱者脈必滑身厥舌乾也所以少陰惡寒而蹇此表寒也時時自煩不欲近衣此裏熱也

大柴胡湯

熱多寒少寒多熱少

太陽病發熱惡寒熱多寒少脈微弱者此無陽也不可發汗宜桂枝二越婢一湯

劉氏云脈遲者小建中加黃者或溫中

太陽病八九日如瘧狀發熱惡寒熱多寒少其人不嘔清便欲自可一日二三度發脈微緩者為欲愈脈微急者

此陰陽俱虛不可更發汗更下更吐也面色反有熱色者未欲解也以其不得小汗出身必痒宜桂枝麻黃各半湯

主之 **趙** 愚詳仲景論中熱多寒少止有二證如上文一證仲景之意蓋以得病七八日如瘧狀發熱惡寒熱多

寒少十六字為自初至今之證以下文乃是已後擬病防變之辭當分作二截看若其人不嘔清便欲自可一日

二三度發脈微緩為欲愈此一節乃裏和無病而脈微緩微者邪氣微緩者陰陽同等脈證皆向安之兆不可

汗而欲自愈也若脈微而惡寒者此陰陽俱虛不可發汗更下更吐也此一節宜溫之若面色反有熱者未欲解

也以其不能得小汗出身必痒宜各半湯此一節必待汗而後愈也活人書不詳文意却將其人不嘔清便欲

自可九字本是欲愈之證反以他證各半湯汗之又將不可汗吐下及各半湯證語句並脫畧而不言反將其中

欲愈之證而用彼藥汗其所不當汗何也其第二證仲景云太陽病發熱惡寒熱多寒少脈微弱者止陽也不可

發汗宜桂枝二越婢一湯活人書于脈微弱上添都大二字豈以仲景論脈為未足而加之乎其第三證尺脈遲


者仲景論中無熱多寒少語句但云脈浮緊法當身疼痛宜以汗解之假令尺中遲者不可發汗以榮氣不足血

少故也活人書但舉尺中遲血少之語自添寒少熱多四字加于其上因而編入此問中何邪如一證尺遲者止

當收入不可汗門中 **劉** 仲景一書自有熱多寒少之條無寒多熱少之證又云不煩躁手足厥逆為傷寒脈

反浮緩為傷風大青龍湯或云各半湯

發斑 編增



〔趙〕活人云發斑有兩證有溫母有熱病又云表虛裏是熱毒乘虛出於皮膚所以發斑瘡癩疹如錦紋素問謂之

疹愚詳仲景論無此證治但畢陀云熱毒未入于胃而下之胃虛熱入爛胃又熱已入胃不以時下之熱不得泄亦

胃爛其斑如鷄頭大微隱起喜者兩脇王仲弓云下之太早熱氣乘虛入胃故也下之太遲熱留胃中亦發斑或服

熱藥多亦發斑微者赤五九一生劇者黑十死一生皆用白虎加人參湯一名化斑湯及阿膠大青湯又云入新書

云陽毒病人出斑皆如灸跡指面太青黑並不免于死者古人云胃爛如此可信矣世之人或謂斑有主者非斑也

皆疹耳其狀如蚊蟲咬小點而赤是也故其多主矣今此癘疹如錦紋者疹也非斑也以斑即是疹在表也謂表虛

裏實者亦非也如上所言豈持兩證而已乎〔海〕陽證發斑有四有溫毒發斑有熱病發斑有時氣發斑有傷寒

發斑 斑斑如錦紋或發之四肢或發之面部或發之胸背色紅赤者胃熱也紫黑者胃爛也一則下早一則下晚

乃外感熱病而發也宜用元參升麻湯白虎等藥王朝奉云赤斑出五死一生黑斑出十死一生皆用白虎人參湯阿膠大青湯兼與紫雪散大妙可下者調胃承氣湯

〔吳〕凡發斑有六一曰傷寒二曰時氣三曰溫毒四曰陽毒五曰內傷寒六曰陰證 一曰傷寒發斑者蓋因當汗

不汗當下不下熱毒蘊於胃中乃發斑也千金方曰紅赤者為胃熱紫赤者為熱甚紫黑者為胃爛也故赤斑出者

五死一生黑斑出者十死一生也大抵鮮紅起發者吉雖大亦不妨但忌稠密成片紫赤者為難治雜黑者為尤難

也凡斑既出須得脈洪數有力身溫足煖者易治若脈沉小足冷元氣弱者多難治凡斑欲出未出之際且與四味

升麻湯先透其毒若脈弱者倍加人參食少大便不實者倍用白朮主之若斑已出則不且再升發也又不可發汗

汗之更增斑爛又不且早下下之則斑毒內陷也如脈洪數熱盛煩渴者以人參化斑湯主之若消斑毒或以犀角

元參湯大青四物湯之類如熱毒內甚心煩不得眠錯語呻吟者以黃連解毒湯加元參升麻大青犀角用之類主之

熱甚煩渴喘咳者解毒合化斑湯主之若斑勢稍退內定不大便謔語有潮熱者大柴胡湯加芒硝或調胃承氣湯

下之曾治一人傷寒八九日發斑四肢強鞭昏沉謔語不知人大便四五日不通以調胃承氣湯一下而愈如未可

下有潮熱煩渴者且與小柴胡湯去半夏加黃連山梔黃藥括藎根主之或加大青亦佳如無以大藍葉代之或真
 青黛代之亦可大抵解胃熱胃爛之毒必以黃連大青犀角用元參升麻青黛石膏知母黃芩山梔黃藥之類也要在
 審察病情巨且而用之二曰時氣發斑者乃天疫時行之氣也人感之則憎寒壯熱身體拘急或嘔逆或喘嗽或
 胸中煩悶或躁熱起卧不安或頭痛鼻乾呻吟不得眠此皆斑候也先用紙燃燈照看病人面部胸室四肢骨心有
 紅點起者乃發斑也易老曰凡大紅點發于皮膚之上者謂之斑小紅點行於皮下不出起者謂之疹蓋疹較而斑
 重也大抵一發鮮紅稀明者吉若一發如針頭稠密紫赤者凶雜黑者難治自來欬急者發熱一二日便出斑來勢
 緩者發熱三四日而出也凡治例必察病人元氣虛實脈之有力無力為王若脈微弱元氣虛者必先以二白湯倍
 加人參以助真氣次察斑欲出未透者以升麻葛根湯王之如胃弱人虛者以四君子湯合而用之名曰升君湯也
 若斑不透者直指方加紫草茸亦佳若斑疹初出有表證憎寒壯熱頭痛骨節疼四肢拘急胸中滿悶者以三因加
 味羌活散王之或加紫草亦可若斑出稠密或咽喉不利者犀角消毒飲元參升麻湯之類王之凡斑出脈數大煩
 渴者人參化斑湯王之若發熱或潮熱不解者以小柴胡湯隨證增損用之或人參敗毒散皆可出入用之凡斑出
 而嘔逆者必用陳皮半夏生薑黃連之類若喘嗽不止者必用知母貝母瓜蒌仁黃芩石膏之類若咽痛者必用連
 翹牛蒡子黑元參升麻苦桔梗甘草之類若斑出而毒盛者必用犀角大青元參黃連黃芩黃蘗山梔石膏知母之
 類主之也北方謂之紅眼兜瘡氣等名色又多所避忌香臭蓋恐觸之也凡斑已出未出之時切不可便投寒涼之
 劑以攻其熱并飲涼水等物恐傷胃氣先作嘔吐也又不可發汗攻下虛其表裏之氣其言尤甚也若脈弱者必先
 有屏事要在審問之如有夾陰者必先助真氣為要也 二曰溫毒發斑者活人云初春病人肌肉發斑隱疹如錦
 紋或咳心悶但嘔者是也冬時觸冒寒毒至春始發初病在表或已汗吐下而表證未罷毒氣未散以此發斑宜用
 黑膏王之又有冬月溫暖人感乖戾之氣冬末即病至春或被積寒所折毒氣不得洩至天氣暄暖溫毒始發則肌

肉斑疹如錦紋而咳心悶但嘔有清汁宜用葛根橘皮湯主之

病者名曰冬溫也若發斑名曰溫毒也大抵治例與時氣同但溫毒發斑尤甚瀰活人書謂溫毒斑出如錦紋者以

黑膏王之或元參升麻湯犀角大青湯人參化斑湯首黛一物湯等方皆可選而用之凡溫病發於春熱病發於夏

若出斑者治與傷寒同法也此由佛鬱之熱自內而發于外亦非輕也 四曰陽毒發斑者其候狂妄干利咽痛面

赤斑出如錦紋者以陽毒升麻湯大青四物湯人參化斑湯梔子仁湯之類選而用之

暑月得之先因傷暑次食涼物并卧涼處內外皆寒逼其暑火浮遊於表而發斑也海藏治完顏小將軍病寒熱間

作有斑三五點鼻中微血出兩手脈沉瀆皮膚按之殊大無熱此內傷寒也與調中湯數服而愈凡夾暑者加香薷

扁豆主之 六曰陰證發斑畧例曰陰證發斑亦出胸背手足但稀少而淡紅也此人元氣素虛或先因陰事內損

腎氣或誤服涼藥太過遂成陰證伏寒于下逼其無根失守之火聚於胸中上獨熏肺傳於皮膚而發斑點但如蚊

蚋蚤虱咬痕然非大紅點也與調中溫胃加以茴香炒白芍藥王之寒甚脈微者以大建中湯主之則真陽自回陰

火自降而病乃愈此治本不治標也大抵發斑身溫足煖脈數大者為順身涼足冷脈微細者為逆也凡治斑不可

專以斑治必察脈之浮沉病之虛是而治之則為善治斑也若孟浪不察一際論之而曰不誤於人吾未之信也

侯國華病傷寒四五日身微斑渴欲飲診之沉弦欲絕厥陰脈也服溫藥數日不已又以姜附等藥覺陽微回脈生

因渴私飲水一杯脈復退又見頭不舉目不開問之則犯陽易若只與燒棍散則寒而不濟矣遂更用吳茱萸湯一

大服調燒棍散連進二服出大汗兩晝夜而愈

治陽證發斑之劑

升麻葛根湯 凡發斑欲出未出者以此湯升發之若斑已出者不可用也

升麻 三錢 葛根 白芍藥 錢各二 甘草 錢一

右作一服水二鍾煎至一鐘去滓通口服

六科準繩 卷六 傷寒 二

直指方加紫草^{半一錢}治斑不透出者右脈弱加人參^{二錢}胃虛食少加白朮^{二錢}如腹痛倍加炒白芍藥和之

三因加味羌活散 治斑疹初出增寒壯熱或頭痛身痛胸中不利者

羌活^上 獨活^中 柴胡^中 前胡^中 枳殼^中 桔梗^中

人參^中 茯苓^中 川芎^中 升麻^上 白芍藥^中 甘草^下

生姜^{伍片} 右煎法同前 若斑未透者如紫草^{半一錢}若脈虛者倍加人參胃弱食少者加白朮^{二錢}大便

自利者亦加白朮去枳殼若斑出或煩熱或咽痛者加荆芥薄荷防風牛蒡子連翹^{各一錢五分}主之若內熱口苦

心煩者加黃芩黃連^{各一錢}若熱甚舌燥煩渴者更加石膏^{二錢}知母^{一錢}若喘嗽者亦用之若有痰熱胸中煩悶

加括蕪仁^{半一錢}若斑毒盛出者須加元參犀角^{各一錢}以消其毒也

加味小柴胡湯 治發斑肌熱潮熱或往來寒熱口苦咽乾目眩耳聾脇痛胸滿心煩或乾嘔或煩渴或喘或咳嗽

不止者宜服之 柴胡^上 人參^中 黃芩^中 半夏^中 甘草^下 黃連^中

升麻^中 白芍藥^中 元參^中 生薑^{三片} 大棗^{二枚} 煎法同前 若口燥渴

去半夏加括蕪根^{半一錢}若咽痛加桔梗^{二錢}倍用甘草若嘔者暹用半夏去括蕪根加生薑減少甘草主之若斑


毒出或加犀角屑^{一錢}牛蒡子另炒^{一錢}毒甚者更加大青^{二錢}若胸中煩悶不利加瓜蕪仁^{半一錢}若痰火上

喘加桔梗^{一錢}知母貝母^{各一錢}瓜蕪仁^{一錢}桑白皮^{一錢}主之若喘而舌燥煩渴脈數大者更加石膏^{三錢}若脇

痛胸滿不利者加枳殼桔梗^{各一錢}若心下痞鞭加枳實^{半一錢}黃連倍之

消毒犀角飲 治發斑隱疹或咽喉腫痛或毒氣壅盛者

真犀角屑^上 牛蒡子^{新瓦上炒香} 荆芥穗^中 防風^中 甘草^中 右用水二鍾



煎至一鍾去渣溫服 若咽痛加苦桔梗二錢 甘草倍之元參二錢 主之或連翹薄荷皆可加之內熱者須用黃

於黃連各一錢 主之

解毒防風湯 治發斑隱疹痒痛者

防風上 地骨皮中 黃耆中 赤芍藥中 荆芥中 枳殼中

牛蒡子中炒如前 右煎法同前 一方加當歸黑元參各一錢

犀角元參湯 治發斑毒盛心煩狂言或咽痛者

犀角屑上 升麻中 射干中 黃芩中 人參中 黑元參上

甘草下 右煎法同前

大青四物湯

大青一錢半如無以真青黛代之 阿膠 甘草各一錢 淡豆豉一百粒 右煎法同前

犀角大青湯 治斑出已盛心煩大熱錯語呻吟不得眠或咽痛不利者

犀角屑上 大青上 元參中 甘草下 升麻中 黃連中

黃芩中 黃蘗中 山梔子中 右煎法同前

當歸丸 治發斑內是大便不通者

當歸五錢 甘草 黃連 大黃各一錢半 右將當歸用水一鍾煎成濃膏子以三味

為細末和勻為丸如梧桐子大每服五十九丸溫白湯下以利為度不利再服

黑膏 治溫毒時氣發斑如錦紋者

生地黃四兩 淡豆豉半升 右二味以猪脂一斤合煎之至濃汁入雄黃五分 麝香一分 攪勻丸如彈



南京中醫藥大學圖書館藏

子大白湯化下未效再服

葛根橘皮湯 療冬温未即病至春被積寒所折不得發至夏得熱其寒解冬温始發肌中斑爛癩疹如錦紋而發

心悶但嘔吐有清汁宜服此湯即止

葛根

橘皮

杏仁去皮

知母

黃芩

麻黃湯洗

甘草炙各半兩

右以咀母服五錢水一盞半煎至一盞去滓温服

漏蘆連翹湯 治熱毒發斑無汗大便寔者服之

漏蘆

連翹

黃芩

麻黃

白斂

升麻

甘草錢各一

枳實二錢

大黃三錢

若熱甚者加芒硝二錢

用水二鍾煎至一鍾下芒硝再煎

一二沸去滓温服如人行五里地不動者再服一次以利為度

猪胆雞子湯 治熱毒發斑或咽痛或聲音不清或心煩不眠

猪胆

米醋各三

雞子一枚

右三味合煎三四沸人壯者盡服之弱者須煎六七沸分為

三次服之汗出乃愈

黃連一物湯 治熱病發疏豆瘡者 以黃連一兩用水二鍾煎至一鍾去滓通口服

五物木香湯 治疏豆瘡煩疼者

青木香一錢

薰陸香

丁香

礬石錢各一

麝香半分

右用水二鍾煎至一鍾去

滓温服如熱毒甚者加犀角屑一錢如無以升麻半一錢代之若病輕者去礬石神驗

孫兆山梳散 治熱毒炎盛偏身發斑甚者發瘡如疏豆

牡丹皮

山梳仁

黃芩

大黃

麻黃各二錢半

木香五分

右水二



鍾煎至一鍾去渣溫服

治斑出既且瘡塗乃用芒硝為細末和豬胆汁塗瘡上勿動之待其脫落無痕仍卧黃土末上良若病小便澀有血者內壞瘡皆黑糜不出膿者死

犀角大青湯 治斑毒熱甚煩疾香

大青 五錢

犀角 屑二錢半

梔子 十枚

香豉 一握

右煎服法同前

黃連解毒湯 治發斑熱甚心煩下得眠

黃連 三錢

黃芩 中

黃蘗 中

山梔子 各二錢

右用水二鍾煎至一鍾去渣溫服若斑

毒盛者加大青二錢或真青黛一錢調入湯內服之亦妙凡脈弦數內外熱甚謔語者合小柴胡湯主之若脈洪數內外熱甚舌燥煩渴者合化斑湯主之

加減二黃石膏湯 治熱發斑紫赤煩渴脈洪數者

黃連 上

黃芩 中

黃蘗 中

山梔子 中

石膏 中

知母 中

升麻 中

赤芍藥 中

元參 中

甘草 下

梗米 二握

右煎法同前一方斑毒

甚者加大青二錢犀角屑一錢乃消熱毒斑瘡之藥也一方時行發斑瘡以好蜜塗上良又方用蜜煎升麻塗之

治內傷寒與陰證發斑之劑

通脈四逆湯 視下陰毒升麻湯 見陰毒

調中湯

蒼朮 半錢

陳皮

砂仁

藿香

白芍藥 炒

甘草 炙



桔梗

半夏

白芷

羌活

枳殼各一錢

川芎七分

麻黃

桂枝各五分

生薑三片

右作一服水二鍾煎至一鍾去滓溫服

大建中湯

當歸中

白芍藥中

白朮中

麥門冬上

黃耆上

甘草炙下

肉桂中

肉蓯蓉中

人參上

川芎中

附子中

半夏中

熟地黃中

茯苓中

生薑三片

大棗二枚

右煎法同前

人參二白湯

白朮中

白茯苓中

白芍藥中

人參上

生薑三片

大棗二枚

沉足冷加附子半枚

右煎法同前

治傷寒黑斑曾治一人傷寒七八日因服涼藥太過遂變身涼手足厥冷通身黑斑惟心頭溫煖乃伏火也診其六脈沉細昏沉不知人事亦不能語言狀似尸厥遂用人參二白湯加熟附子半枚乾姜二錢水二鍾煎一鍾與之服不待一時許斑色漸紅手足漸煖而甦醒後復有餘熱不清此伏火後作也以黃連解毒竹葉石膏湯調之而愈

狐惑 外證欲眠目不開聲啞

狐惑之為病狀如傷寒或因傷寒而變成斯病其狀默默欲眠目牽不得閉卧起不安蟲蝕於喉咽為惑蝕於陰肛為狐不欲食惡聞食臭其面目乍赤乍黑乍白蝕於上部則聲啞甘草瀉心湯主之 方見 蝕於下部則咽乾苦參湯洗之 蝕於肛者雄黃散熏之用雄黃一味為末取二瓦合之燒向肛熏之

脈經云病人或從呼吸後蝕其咽喉或從下焦蝕其肛陰蝕上為惑蝕下為狐狐惑病者循身散主之 方未 病者脈數無熱微煩默默但欲卧汗出初得之二四日目赤如鳩眼七八日目四眦皆黃字 黑若能食者膿已成也赤



豆當歸散主之

方見雜病下血門

附

一婦人狐惑聲啞多眠目不閉惡聞食臭不省人事半月後又手足拘強脈數而微細先與竹瀝姜汁一盞服之胸中有汗腹鳴即目閉省人事遂用參朮歸陳入竹瀝姜汁飲之五六貼而愈

活 狐惑傷寒與濕蘊皆證初得狀如傷寒或因傷寒變成此疾大抵傷寒腹內熱食少腸胃空虛三蟲行作食蝕人五藏及下部為蠱蝨病其候齒無色舌上盡白甚者唇黑有瘡四肢沉重忽喜眠蝨蝕其肌爛見五藏則死當數看其上下唇上唇有瘡蝨蝕其藏下部有瘡蝨蝕其肛殺人甚急多因下利而得治蠶桃仁湯當連犀角湯雄黃銳散主之

治蠶桃仁湯

生艾

桃仁去皮尖炒

槐花子碎各一兩

大棗十五個

右水二盞煎至一盞半分三服

黃連犀角湯

治傷寒及諸病之後有蠶出下部者

黃連半兩

犀角一兩

烏梅七個

沒藥二錢

右水二大盞半煎至一盞半分三服

雄黃丸

治傷寒狐惑微煩默默臥毒氣上攻咽乾聲啞下蝕濕蠶或便膿血

雄黃研

當歸炒各七錢半

蘆薈研

麝香研各二錢半

檳榔半兩

右搗研為末煮麵糊為

丸如梧桐子大每服十五丸至一十九丸食前溫粥飲下日三服

雄黃銳散 治下部蠶瘡

雄黃

芒麥

青箱子

黃連各半兩

桃仁去皮尖

右為散以生艾搗汁

為丸如棗核大糝裹納下部匾竹葉汁更佳冬月無艾只用散裹納亦得

六科集

傷寒

二七



百合病

百合病論曰百合病者謂無經絡百脈一宗悉致病也人常默默然意欲食不能食意欲卧不能卧意欲行不能行或有時聞食臭或時如寒無寒如熱無熱口苦小便赤諸藥不能治得藥即劇吐利如有神靈者身形雖似和甚入脈微數每溺時輒頭痛者六十日乃愈若溺時頭不痛漸漸然者四十日愈若溺時快然但頭眩者二十日愈體證或未病而預見或病四五日而出或病二十日或一月微見者各隨其證治之

活人云此名百合傷寒多因傷寒虛勞大病之後不平復變成奇疾也

百合知母湯方

百合七枚

知母三兩切

右先將百合水洗浸一宿當白沫出去其水更以井水二盞煎至一盞去滓又將井水二盞另煎知母取一盞去滓和百合汁一盞同煎取一盞半分溫再服

百合病下後者宜用滑石代赭湯

滑石代赭湯方

百合十枚

滑石三兩掇碎綿裹

代赭石彈子大碎綿裹

右先將百合水洗淨浸一宿當白沫出去水更以井水二升煎取一升去滓另用水二升煎二石取一升去滓後合和同煎取一升半分溫再服

百合病吐後宜用百合雞子湯

百合雞子湯方


百合七枚

雞子黃一枚

先將百合水洗浸如前法取一升去滓內雞子黃攪勻再煎至五分服

百合地黃湯

百合病不經吐下發汗病形如初者宜用百合地黃湯



百合七枚

生地黄汁一升

右水洗百合浸如前法煎取一升去滓納地黄汁同煎取一升半分温再服中

病勿更服大便當如漆黑

百合病一月不解變成渴者百合洗方主之

右用百合一升以水一斗漬之一宿以洗身洗已食者餅勿以鹽豉

也

百合豆病渴不瘥者且括婁牡蠣散

括婁牡蠣散方

括婁根

牡蠣煨各

右為末白飲服方寸匕日三服

百合散 治傷寒百合病一月不解變成渴疾

百合

括婁根各一

牡蠣煨成

麥門冬焙心

山梔仁炒各七

甘草炙半

藍

咀每服五錢水一盞入生姜一錢二分竹葉二七片煎至六分不拘時温服

治百合傷寒腹中滿痛宜服

右用百合一兩炒黃為細末每服二錢水飲下無時

百合病變發熱一作發者且用百合滑石散

百合滑石散方

百合一兩

滑石三兩

右為末飲服方寸匕日三服當微利止服熱則除

百合病見於陰者以陽法救之見於陽者以陰法救之見陽攻陰復發其汗此為逆見陰攻陽乃復下之此亦為逆

也

兩感

論 若兩感於寒者一日太陽受之即與少陰俱病則頭痛口乾煩滿而渴二日陽明受之即與太陰俱病則腹滿

六科集

傷寒

天



北京中醫藥大學圖書館

身熱不飲食讖語三日少陽受之即與厥陰俱病則耳聾囊縮而厥水漿不入不知人者六日死若三陰三陽五藏六府皆受病則榮衛不行藏府不通而死矣

活

龐參常云脈沉大者太陽少陰沉長者陽明大陰沉弦者少陽

厥陰也諸方書不載兩感脈失常持設以二後人素問熱論云兩感於寒而病者必不免於死法不過六日黃帝曰有三日而死者何也岐伯曰陽明者十二經脈之長也若三日而氣盡則死矣仲景亦無治法活人書卷序云傷

寒淮兩感不治仲景但一說云兩感病俱作治有先後證治論引張翼說與仲景同謂如下利清穀身雖疼痛急當

救裏宜四逆湯身體疼痛清便自調急當救表宜桂枝湯證治論并活人書解仲景治有先後之說皆云治有先後者宜先救

裏內纔溫則可賢矣然救表亦不可緩也以上所論並先救裏然後救表愚意當消息之謂如下利不身雖疼痛

則先救裏如不下利身體疼痛則先救表此亦謂之治有先後也然則兩感證亦有可治之理而不可必也

仲景論兩感為必死之證而復以治有先後發表攻裏之說繼之者蓋不忍坐視而欲覩其萬一之可活也活人書

云宜救裏以四逆湯後救表以桂枝湯殊不知仲景云太陽與少陰俱病則頭痛為太陽邪盛於表口乾而渴為少

陰邪盛於裏也陽明與太陰俱病則身熱譫語為陽明邪盛於表不欲食腹滿為太陰邪盛於裏也少陽與厥陰俱

病則耳聾為少陽邪盛於表囊縮而厥為厥陰邪盛於裏也二陽之裏頭痛身熱耳聾救表已不可緩三陰之腹滿

口乾渴囊縮而厥不下可乎活人書引下利身疼痛虛寒救之例而欲施於煩渴腹滿譫語囊縮熱定之證然平否

乎蓋仲景所謂發表者葛根麻黃是也所謂攻裏者調胃承氣是也活人書所謂救裏則是四逆救表則是桂枝今

以救為攻豈不相背若用四逆湯是以火濟火而腹滿譫語囊縮等證何由而除藏府何由而通榮衛何由而行而

六日死者可立而待也吁兩感雖為不治之證矣然用藥之法助正除邪虛是虛補不足損有餘之理學者不可

不素有一定之法於胸中也

垣問兩感從何道而入答曰經云兩感者死不治一日太陽與少陰俱病頭痛發熱惡寒口乾煩滿而渴太陽者府也自負俞而入人所共知之少陰者藏也自鼻息而入人所不知也鼻息通於天

故寒邪無形之氣從鼻而入腎為水也水流濕故腎又之經曰傷於濕者下先受之同氣相求耳又云天之邪氣感則害人五臟以是知內外兩感藏府俱病欲表之則有裏欲下之則有表表裏既不能一治故死矣故云兩感者不治然所裏有虛是所感有淺深虛而感之深者必死是而感之淺者猶或可治治之而不救者有矣未有不治而獲生者也予嘗用此間有生者十得二三故立此方以待好生君子用之

大羌活湯方

防風

羌活

獨活

防己

黃芩

黃連

蒼朮

白朮

甘草

細辛各三錢

知母

川芎

生地黃兩各一

右咬咀每服羊兩水二盞煎至一盞半去滓得清藥一大盞熱飲之不解再服三四盞解之亦可病愈則止若有餘證並依仲景隨經法治之

〔吳〕兩感必死不治者乃一日傳二經陰陽俱病也欲治陽急而有陰急欲治陰急而有陽急表裏不可並攻陰陽難同一法故不治也活人書有先後之法急救裏且四逆湯次救表桂枝湯者此表裏皆寒急救之法非日傳二經之法也保命集曰內傷於寒外傷於風或內傷於食外傷於風或先傷於濕而後傷於風或先傷於風而後傷於濕或先傷於寒而後傷於風之類此亦內外俱病表裏俱傷乃為可治故且大羌活湯間有可生者易老丹溪豈真賢於仲景哉

醫宗

