

LIBRARY OF
THE NEW YORK BOTANICAL GARDEN

PURCHASED 1923 FROM
GENEVA BOTANICAL GARDEN

September 1899

R. W. Gibson. Inv.



QK 315


H 328

atlas

v. 1



sta



pi



frll



p



p



Atragene alpina L. -- Alpenrebe.

Alpenkette, Gebüsch, 800—1400 M. Juni, Juli.





Thalictrum alpinum L. — Alpen-Wiesenraute.

Centralalpenkette, Schweiz bis Steiermark, feuchte Stellen. 1800–2300 M. Juli August.



Anemone narcissiflora L. — Narzissenblüthiges Windröschen.

Alpenkette, auf Triften, bes. auf Kalkboden, 1300—1900 M. Juni—Juli.






Anemone Baldensis L. -- Monte Baldo's Windröschen.
 Alpenkette auf Tuffen gerste 1800—2400 M. Juni—Juli.




Anemone trifolia L. — Dreiblättriges Windröschen.

Südliche Alpenkette, Süd-Tirol bis Krain, bis 1600 M. April—Juli.






Anemone vernalis L. — Frühlings-Windröschen.
 Alpenkette bis Steiermark, 1200—2300 M. Mai—Juli.





Anemone alpina L. — Alpen-Windröschen.

Nördliche und südliche Alpenkette, Wiesen, 1600—2200 M. Juni—August.






Anemone burseriana Scop. = *grandiflora* Hoppe. — Bursers
Windröschen.

Centralalpenkette, Wiesen, 1600–2300 M., Juni, August.



Anemone sulfurea L. — Schwefelgelbes Windröschen.

Alpenkette, auf Schiefer u. Kalkboden, bei 1000—2300 M. Juni—August.





Ranunculus rutaefolius L. — Rautenblättriger Hahnenfuss.

Alpenkette, auf Urgestein und Kalk, 1900—2500 M. Juli—August.





Ranunculus anemonoides Zahlb. — Windröschenartiger
Hahnenfuss.

Südtirol, Nied.-Oesterreich u. Steiermark, feuchte Stellen, 1500 – 2200 M., bes. auf Kalk, März—April.





Ranunculus Pyrenaeus L. — Pyrenäischer Hahnenfuss

Schweiz bis Kärnten, 1800—2400 M Juni—Juli





Ranunculus parnassifolius L. — Parnassienblättriger Hahnenfuss.

Alpenkette, trockenē Stellen, 2500—3100 M. Juli, August.






Ranunculus glacialis L. — Gletscher-Hahnenfuss.
Alpenkette, feuchte Stellen, auf Urgestein, 2200—2500 M. Juli, August.






Ranunculus Seguieri Vill. — Seguiet's Hahnenfuss.
Südtirol und Krain, auf Kalk, 1900—2300 M. Juli—August.





Ranunculus alpestris L. — Alpen-Hahnenfuss.

Alpenkette, auf Kieselstellen, 700—2000 M. Mai—August





Ranunculus Traunfellneri Hoppe. — Traunfellner's Hahnenfuss.


Ostalpen (Tirol bis Krain), auf Kalkboden, ca. 1500 M Juni, Juli





Ranunculus crenatus Waldst. & Kit. — Kerblättriger Hahnenfuss.


Alpentriften in Obersteiermark, auf Urgestein, 1100—2000 M. Juli, August





Ranunculus bilobus Bertol. = *Bertolonii* Hausm. — Zweilappiger Hahnenfuss.

Kalkfelsen in Südtirol, 1500–1800 M Juli, August






Ranunculus aconitifolius L. — Eisenhutblättriger Hahnenfuss.
Alpenkette, feuchte Stellen, 600—1800 M., auf Urgestein und Kalk. Juni—August.




Ranunculus Pythora Crntz (1769) = hybridus Bir (1811) —
Tödlicher Hahnenfuss.

Alpenkette, auf Gerölle, 1500—2200 M. Juni—Juli.





Ranunculus Thora L. — Giftiger Hahnenfuss.
Schweiz bis Krain, trockene Stellen, 1600–1900 M., Mai, Juni.





Ranunculus pygmaeus Wahlb. = Tappeineri Bamb. — Zwer-
giger Hahnenfuss.

Tirol, Salzburg u. Kärnten, feuchte Stellen, 2200–2500 M. auf Urgestein. Juli, August.





Ranunculus Breyninus Crntz. (1769) = *Villarsii* Koch et aut.
 germ. nec de Cand. — Breyn- (Rax) Alpen-Hahnenfuss.
 Alpenkette, trockene Stellen, bis 2500 M., Mai — Juli.





Ranunculus montanus, Willd. — Berg-Hahnenfuss.

Alpenkette, bes. auf Kalk, 1500—2500 M. Juni—August.



Ranunculus Carinthiacus Hoppe = *gracilis* Schleich. 1815. —

Kärntnerischer Hahnenfuss.


Östliche Alpenkette, trockene Stellen, bis 2300 M., Juni-August.





Trollius Europaeus L. — Europäische Trollblume


Alpenkette, feuchte Stellen bis 2400 M. Mai—August.





Eranthis hiemalis (L.) Salisb. — Gemeine Winterbrome.


Alpenkette, bis in die subalpine Region verbr., doch selten. Februar, März.





Helleborus niger L. — Schwarze Niesswurz

Alpenkette, bes. auf Kalkboden, 800—1800 M. März Mai.





Aquilegia atrata Koch. — Schwärzlicher Akelei.

Alpenkette, Gebüsch bis 1800 M. Juni, Juli.



Delphinium Tirolense Kern. i. Sch. — Tirolischer Rittersporn.
 Nordtirol, bei 1600 M. Juli, August.





Aconitum Anthora L. — Giftheil-Eisenhut.

Schweiz bis Oesterreich und Krain, trockene Stellen, bis 1800 M., Juli—August.





Papaver alpinum L. — Alpen-Mohn

Alpenkette, trockene Stellen, 1900—2500 M. Juli, August.





Papaver pyrenaicum (L.) Willd. — Pyrenäischer Mohn.

Alpenkette, bes. auf Kalkboden, 2100—2700 M. Juli, August.





Arabis alpina L. — Alpen-Gänsekresse.

Alpenkette, trockene Stellen, 1300—2200 M. bes. auf Kalk. Mai—August



Arabis coerulea (All.) Haenke. — Blaue Gänsekresse.

Alpenkette, bes. auf Kalkgerölle 1000—2500 M. Juli—August





Arabis alpestris Schleich. = *ciliata* Koch nec R. Br. — Vor-
alpen-Gänsekresse.

Alpenkette, trockene Stellen, 1300—1900 M., auf Kalk, Mai—Juli.






Arabis pumila Jacq. — Niedrige Gänsekresse.
Alpenkette, trockene Stellen, bes. auf Kalk, 1600—2000 M. Juni, Juli.





Arabis bellidifolia (L.) Jacq. — Massliebblättrige Gänsekresse.
Alpenkette, feuchte Stellen, 1600–2000 M. April–Juli.





Arabis Halleri L. — Haller's Gänsekresse.
Alpenkette, Wiesen, trockene Stellen, bis 2000 M. Juni, Juli.






Cardamine asarifolia L. — Haselwurzblättriges Schaumkraut.
Südl. Schweiz und Südtirol, feuchte Stellen, bis 1500 M., Juni, Juli.



Cardamine alpina L. — Alpen-Schaumkraut.

Alpenkette, feuchte und trockene Stellen, 1200–2500 M., bes. auf Urgestein. Juni, Juli.





Cardamine trifolia L. — Dreiblättriges Schaumkraut.

Tirol bis Kärnten, bes. auf Kalk, bis 1500 M. Mai—Juni.




Cardamine resedifolia L. — Resedenblättriges Schaumkraut.
Alpenkette, auf Urgestein, 1600—2300 M. Juni, Juli.



Dentaria enneaphyllos L. — Neunblättrige Zahnwurz.

Tirol bis Oesterreich, feuchte Stellen, bis 1800 M., April—Mai.



Braya alpina Sternb. & Hoppe. — Alpen-Braye, Knotenschötchen.
 Tirol und Kärnten, trockene Stellen, 1900—2300 M., Juli, August.



Braya dentata (All. 1785) = *pinnatifida*, Lam. (1789 sub *Sisymb.*)
 — Gezähnte Braye, Knotenschötchen.

Schweiz: Waadt, Wallis bis zum Umbrail, auf Urgestein. Juli. August.




Erysimum pumilum Gaud. = alpinum Hegetschw. — Niedrige Schottendotter.

Alpenkette, trockene Stellen, 1200–2000 M. Mai, Juni.



Alyssum Wulfenianum Bernh. = alpestre Wulf. nec L. —
Wulfen's Steinkraut.

Schweiz, Tirol bis Krain, trockene Stellen, um 1700 M., auf Urgestein, Juli–August.



Petrocallis Pyrenaica (L.) R. Brown. — Pyrenäisches Steinschmückel.


Alpenkette, auf Kalk, 2200—2800 M. Juni—Juli



Draba Hoppeana Reichb. (1828) nec Rud. = Zahlbruckneri

Host. 1831. — Hoppe's Hungerblümchen.

Centralalpenkette, Schweiz bis Steiermark, trockene Stellen, 2200—2500 M., auf Urgestein,
bes. Granit, Mai—Juli.



Draba aizoides L. — Immergrünes Hungerblümchen.

Alpenkette, bes. auf Kalkboden, 1600—1900 M. Mai—Juli.




Draba tomentosa Wahlb. — Filziges Hungerblümchen.

Alpenkette, trockene Stellen, 1900–2500 M., auf Kalk. Juni, Juli.



Draba dubia Sut. (1802) = *frigida* Saut. 1825. — Zweifelhaftes
Hungerblümchen.


Alpenkette, trockene Stellen, 1600–2200 M., Juni, Juli.





Draba stellata Jacq. — Sternhaariges Hungerblümchen.

Ostalpen bis zur Salza, trockene Stellen, über 1800 M. auf Kalk, Juni, Juli.





Draba nivea Saut. — Schneeweisses Hungerblümchen.
Tirol, Kärnten, trockene Stellen, um 1800 M., Juli, August.




Draba Traunsteineri Hoppe = *frigida* × *Johannis*. — Traunsteiner's
Hungerblümchen.

Schweiz? Tirol und Oberbaiern, trockene Stellen, 1600–2200 M., Juni, Juli.




Draba Johannis Host. — Johann's Hungerblümchen.
Alpenkette, Wiesen, trockene Stellen, 2200–2500 M. Juni–Juli.





Draba Fladnitzensis Wulf. = *Wahlenbergi* var. α *homotricha*
Lindb. — Fladnitz'sches Hungerblümchen.

Alpenkette, trockene Stellen, 1300–2500 M., besonders auf Schiefer. Juni–Juli.





Draba incana L. — Weissgraues Hungerblümchen.
Schweiz bis Krain, trockene Stellen, 1300–1700 M., Mai–Juli.



Draba Thomasii Koch — Thoma's Hungerblümchen.

Schweiz und Tirol, trockene Stellen, 1200—2000 M. Mai, Juni.



Cochlearia saxatilis L. = *Kerneria sax.* Reich. — Stein-Löffelkraut.

Alpenkette, trockene Stellen, 1300—2200 M., auf Kalk. Mai, Juni.



Cochlearia alpina (Tausch) = *brevicaulis* Facch. — Alpen-Löffelkraut.

Gerölle der Kalkalpen in Südtirol, bis 2000 M. Juli, August.





Thlaspi cepeae-folium (Wulf) Koch. — Fetthennenblättriges
Täschelkraut.

Kärnten, Raiblthal, auf Kalkgerölle bis 2000 M. Mai, Juni.



Thlaspi alpinum Crantz. — Alpen-Täschelkraut.
Alpenkette, Wiesen, 1900—2500 M. Juni, Juli.



Thlaspi rotundifolium (L.) Gaud. — Rundblättriges Täschelkraut.


Alpenkette, auf Kalkgerölle, 1900–2700 M. Juli–August.






Biscutella laevigata L. — Glattfrüchtiges Brillenschötchen.

Alpenkette, Triften, bes. auf Kalk. bis 2000 M. Juli, August





Hutchinsia alpina (L.) R. Br. — Alpen-Hutchinsie. Felsenkresse.

Alpenkette, bes. auf Kalkboden, 1700—2700 M. Juni—August.

1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900



Hutschinsia brevicaulis (Hoppe) R. Br. — Kurzstengelige Hutschinsie, Felsenkresse.

Alpenkette, feuchte Stellen, 2000–3000 M. auf Urgestein, Juli, August.





Aethionema saxatile (L.) R. Brown. — Steinkresse

Alpenkette, auf Kalkboden, 1000 - 1000 M. Mai - Juni





Helianthemum alpestre (Scop.) Reichb. = *Olandicum* Wahlb.
var. β *hirtum* Koch. — Voralpen-Sommerröschen.
Kalkalpenkette, trockene Stellen, 1300–2600 M. Juli–August.






Helianthemum serpyllitolium (Crntz.) Reichb. = vulg Gärtn.
 var. γ *glabrum* Koch. --- Thymianblättriges Sonnenröschen.
 Alpenkette trockene Stellen, 1600–2500 M Juni–August.





Viola pinnata L. — Fiederblättriges Veilchen.


Schweiz bis Krain, auf Triften, 1300—1800 M. Juni—Juli.





Viola Thomasiana Perr. & Song. = *ambigua* Koch et aut., nec
Waldst. & Kit. — Thomas-Veilchen.

Schweiz und Tirol: Pusterthal, trockene Stellen, 900–2500 M. Mai–Juni.





Viola biflora L. — Zweiblühiges Veilchen.


Alpenkette, Gebüsch, 1000—2100 M. Mai—August.





Viola alpina L. — Alpen-veilchen.

Oestliche Alpen bis zur Enns, Triften, 1600—1900 M. Juni, Juli.





Viola Cenisia L. — Mont Cenis' Veilchen.
Schweiz und Südtirol, trockene Stellen, über 1800 M., Juli, August.





Viola calcarata L. — Langsporniges Veilchen.

Kalkalpenkette, Wiesen, 1800–2700 M., Juni–August.



Viola heterophylla Bertol. = *Valderia*, aut. nec All. — Verschiedenblättriges Veilchen.

Südtirol, trockene Stellen, 1600—2200 M., auf Kalk, Juli, August.



Polygala Chamaebuxus L. — Immergrüne Kreuzblume.

Alpenkette, trockene Stellen, Gebüsch, bis 2000 M. Mai— August.





Polygala alpestris Reichenb. — amara L. var. aut. pl. — Voralpen-Kreuzblume.

Alpengette, bes. auf Kalkboden, bis 1700 M. April—Juli.





Gypsophila repens L. — Kriechendes Gypskraut.

Kalkalpenkette, auf Gerölle, 1300—2400 M. Juli—August.





Dianthus alpinus L. — Alpen-Nelke.

Ostalpen, auf Kalkboden, 1000—2000 M. Juni—August.

1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910



Dianthus glacialis Hænke. — Gletscher-Nelke.
Alpenkette, auf Urgestein, 1900—2500 M. Juli—August.



Dianthus speciosus Reichb. = *superbus* L. var. — Ansehnliche Nelke.

Süd-Schweiz und Südtirol, Wiesen, 1600—2400 M., Juli, August.



Dianthus alpestris, Sternb. & Hoppe = *Monspessulanus* L. var.
ζ alpicola Koch. — Voralpen-Nelke.
Südtirol bis Krain, Wiesen, 1600—2400 M., auf Kalk und Urgestein, Juli, August.




Saponaria ocymoides L. — Basilicumartiges Seifenkraut.

Schweiz bis Kärnten, trockene Stellen, bis 2300 M., besonders auf Kalk. Mai-August.





Silene Pumilio (L.) Wulf. — Zwergiges Leinkraut
Centralalpenkette, östlich vom Schlerer, 1900 - 2700 M. Juli - August






Silene quadrifida (L.) — Vierspaltiges Leimkraut.
Alpenkette, feuchte Stellen, 1000—2000 M. auf Kalk. Juli—August.



Silene saxifraga L. — Steinbrechendes Leimkraut.
Südl. Alpenkette. Schweiz bis Krain, Gebüsch bis 2000 M., Juli, August.



Silene acaulis L. — Stengelloses Leimkraut.


Alpenkette, bes. auf Kalkboden. 1600—3000 M. Juni—August.





Lychnis alpina L. — Alpen-Lichtnelke.


Schweiz bis Kärnten, bes. auf Granit, 2500—3000 M. Juli, August.





Sagina glabra (Willd.) Koch = *repens* Burn. --- Kahles Mastkraut.
Schweiz, Südtirol und Salzburg, feuchte Stellen, 1600—2000 M., Juli, August.





Sagina saginoides (L.) = Linnaei Presl. 1819; *saxatilis* Wimm.
1840. — Linné's Mastkraut.

Alpenkette, Wiesen, 1300—2000 M., Juni—August.





Alsine rupestris (Scop. 1772). = *lanceolata* All. 1785 sub Aren;
Mert. & Koch. — Felsen-Miere.

Alpenkette bis Krain, trockene Stellen, 1900—2500 M., Juli, August.






Alsine laricifolia (L.) Wahlenb. — Lärchenblättrige Miere.
Centralalpenkette, trockene Stellen, 1700–2100 M., Juli, August.






Alsine recurva (All.) Wahlenb. — Krummblättrige Miere.
Schweiz bis Kärnten, trockene Stellen, 1700—2700 M. Juli—August.





Alsine Austriaca (Jacq.) Mert. & Koch. — Oesterreich. Miere.
 Kalkalpenkette, trockene Stellen, 1700—2300 M. Juli—August.





Cherleria sedoides L. = *Alsine Cherleri* Fenzl. — Fettblatt-
artige Cherlerie, Zwergmiere.

Alpenkette, trockene Stellen, 1300–3000 M. bes. auf Kalk, Juli–September.



Möhringia glaucovirens Bert. (1844) = glauca Leyb. (1853)
— Blaigrüne Möhringie.


Südliches Tirol, feuchte Stellen, bis 1800 M., auf Dolomit, Juli—August.





Möhringia muscosa L. — Moosartige Möhringie, Moosmire.
 Alpenkette, feuchte Stellen, bis 2000 M. bes. auf Kalk, Juni—September.






Möhringia ciliata (Scop. 1772). = *polygonoides* Wulf. 1786 sub *Arenar.* = *obtusa* All. 1785 sub *Arenar.* — Wimperige Möhringie, Moosmiere.

Alpenkette, feuchte Stellen, 1700–2300 M., bes. auf Urgestein, Juni, August.



Arenaria biflora L. — Zweiblüthiges Sandkraut.
Alpenkette, feuchte Stellen, 2200—3200 M. auf Urgestein, Juli, August.





Arenaria ciliata L. — Gewimpertes Sandkraut

Alpenkette, auf Triften, bis 2700 M. Juli–August





Arenaria grandiflora L. — Grossblüthiges Sandkraut.

Westl. Schweiz, Tirol bis Oesterreich u. Krain, trockene Stellen, 1200—2000 M., Mai—Juli,



Stellaria cerastioides L. = *Cerastium trigonum* Vill. —
Hornkrautartige Sternmiere.

Centralalpenkette, feuchte Stellen, 1600—2200 M., Juli—August.





Cerastium latifolium L. — Breitblättriges Hornkraut.

Kalkalpenkette, trockene Stellen, 1900—2800 M. Juli, August.




Cerastium uniflorum Murr. (1810) = *latifolium* L. var. δ *glaciale*
 Koch — *glaciale* Gaud. 1824. — Einblüthiges Hornkraut.
 Alpenkette, trockene Stellen, 2100 - 3300 M., auf Urgestein, August, September.





Cerastium alpinum L. — Alpen-Hornkraut.
Alpenkette, trockene Stellen, 1600–2000 M., Mai–August.






Cerastium Carinthiacum Vest. (1810) = *ovatum* Hoppe 1818.

— Kärntnerisches Hornkraut.

Oestl. Alpenkette, Tirol bis Oesterreich, trockene Stellen, 1000–1900 M., Juni – August.





Linum alpinum Jacq. -- Alpen-Lein.


Oestliche Alpenkette, Wiesen. 1500—2000 M. Juni, Juli.





Geranium argenteum L. — Silberweisser Storchschnabel

Südtirol und Krain, auf Kalkfelsen, 1600–2000 M. Juli–August.





Geranium macrorrhizum L. — Grosswurzelliger Storchschnabel.

Südl. Alpenkette, Tirol bis Krain, Gebüsch bis 1600 M. Juli–August.





Rhamnus pumila L. — Niedriger Kreuzdorn.
Alpenkette, trockene Stellen, 1300—1900 M. auf Kalk. Juni—August.





Cytisus radiatus (L.) Koch. — Strahlblättriger Bohnenbaum.

Südtirol und Kärnten, trockene Stellen, bis 1600 M. Mai–Juni.





Ononis rotundifolia L. — Rundblättrige Hauhechel.

Schweiz bis Kärnten, trockene Stellen, bis 1600 M., Mai—Juli.





Anthyllis alpestris Hegetschw. — Voralpen-Wundklee.
Schweiz und Salzburg, Wiesen, 1300–2200 M., Mai–Juli.





Trifolium alpinum L. — Alpenklee.
Schweiz und Tirol, Wiesen, 1600—2200 M. Juni—August.





Trifolium pallescens Schreb. — Weisslicher Klee.

Schweiz bis Salzburg und Krain, Wiesen, 1900–2500 M. bes. auf Granit, Juli-September.





Trifolium Thalii Vill. (1786) = *caespitosum* aut. (false Reyn.
1787) — Thal's Klee.

Schweiz und Tirol, Wiesen, 1600—2200 M., Juli, August.





Trifolium saxatile All. — Felsenkiee.
Schweiz und Tirol, Gletscher, 1600–2500 M. Juli–August.





Trifolium Noricum Wulf. — Norischer Klee.

Südtirol bis Steiermark und Krain, trockene Stellen, 2000—2600 M., Juli, August.





Trifolium agrarium L. = *badium* Schreb. — Feldklee.
 Alpenkette, Wiesen, 1300–2300 M., besonders auf Kalk. Juli–August.





Phaca frigida L. — Kälteliebende Berglinse.
Alpenkette, Wiesen, 1700—2000 M. bes. auf Urgestein, Juli—August.





Phaca alpina Jacq. — Alpen-Berglinse.
 Schweiz bis Salzburg und Krain, 1300—1900 M. Juli—August.



Oxytropis Halleri Bunge. — Hallers Spitzkiel.

Schweiz, Tirol, Salzburg u. Kärnten, trockene Stellen, 1900—2400 M. Juli, August.





New York Botanical Garden Library

QK 315 .H328 v.1

Hartinger, Anton/Atlas der Alpenflora gen



3 5185 00108 4035



