

醫酉壘元戎

五

醫酉壘元戎
記

					漢書門
				一	
				二	
				三	
				四	
				五	
				六	
				七	
				八	
				九	
				十	
				十一	
				十二	
				十三	
				十四	
				十五	
				十六	
				十七	
				十八	
				十九	
				二十	
				二十一	
				二十二	
				二十三	
				二十四	
				二十五	
				二十六	
				二十七	
				二十八	
				二十九	
				三十	
				三十一	
				三十二	
				三十三	
				三十四	
				三十五	
				三十六	
				三十七	
				三十八	
				三十九	
				四十	
				四十一	
				四十二	
				四十三	
				四十四	
				四十五	
				四十六	
				四十七	
				四十八	
				四十九	
				五十	
				五十一	
				五十二	
				五十三	
				五十四	
				五十五	
				五十六	
				五十七	
				五十八	
				五十九	
				六十	
				六十一	
				六十二	
				六十三	
				六十四	
				六十五	
				六十六	
				六十七	
				六十八	
				六十九	
				七十	
				七十一	
				七十二	
				七十三	
				七十四	
				七十五	
				七十六	
				七十七	
				七十八	
				七十九	
				八十	
				八十一	
				八十二	
				八十三	
				八十四	
				八十五	
				八十六	
				八十七	
				八十八	
				八十九	
				九十	
				九十一	
				九十二	
				九十三	
				九十四	
				九十五	
				九十六	
				九十七	
				九十八	
				九十九	
				一百	
				一百一	
				一百二	
				一百三	
				一百四	
				一百五	
				一百六	
				一百七	
				一百八	
				一百九	
				二百	
				二百一	
				二百二	
				二百三	
				二百四	
				二百五	
				二百六	
				二百七	
				二百八	
				二百九	
				三百	
				三百一	
				三百二	
				三百三	
				三百四	
				三百五	
				三百六	
				三百七	
				三百八	
				三百九	
				四百	
				四百一	
				四百二	
				四百三	
				四百四	
				四百五	
				四百六	
				四百七	
				四百八	
				四百九	
				五百	
				五百一	
				五百二	
				五百三	
				五百四	
				五百五	
				五百六	
				五百七	
				五百八	
				五百九	
				六百	
				六百一	
				六百二	
				六百三	
				六百四	
				六百五	
				六百六	
				六百七	
				六百八	
				六百九	
				七百	
				七百一	
				七百二	
				七百三	
				七百四	
				七百五	
				七百六	
				七百七	
				七百八	
				七百九	
				八百	
				八百一	
				八百二	
				八百三	
				八百四	
				八百五	
				八百六	
				八百七	
				八百八	
				八百九	
				九百	
				九百一	
				九百二	
				九百三	
				九百四	
				九百五	
				九百六	
				九百七	
				九百八	
				九百九	
				一千	
				一千一	
				一千二	
				一千三	
				一千四	
				一千五	
				一千六	
				一千七	
				一千八	
				一千九	
				二千	
				二千一	
				二千二	
				二千三	
				二千四	
				二千五	
				二千六	
				二千七	
				二千八	
				二千九	
				三千	
				三千一	
				三千二	
				三千三	
				三千四	
				三千五	
				三千六	
				三千七	
				三千八	
				三千九	
				四千	
				四千一	
				四千二	
				四千三	
				四千四	
				四千五	
				四千六	
				四千七	
				四千八	
				四千九	
				五千	
				五千一	
				五千二	
				五千三	
				五千四	
				五千五	
				五千六	
				五千七	
				五千八	
				五千九	
				六千	
				六千一	
				六千二	
				六千三	
				六千四	
				六千五	
				六千六	
				六千七	
				六千八	
				六千九	
				七千	
				七千一	
				七千二	
				七千三	
				七千四	
				七千五	
				七千六	
				七千七	
				七千八	
				七千九	
				八千	
				八千一	
				八千二	
				八千三	
				八千四	
				八千五	
				八千六	
				八千七	
				八千八	
				八千九	
				九千	
				九千一	
				九千二	
				九千三	
				九千四	
				九千五	
				九千六	
				九千七	
				九千八	
				九千九	
				一萬	
				一萬一	
				一萬二	
				一萬三	
				一萬四	
				一萬五	
				一萬六	
				一萬七	
				一萬八	
				一萬九	
				二萬	
				二萬一	
				二萬二	
				二萬三	
				二萬四	
				二萬五	
				二萬六	
				二萬七	
				二萬八	
				二萬九	
				三萬	
				三萬一	
				三萬二	
				三萬三	
				三萬四	
				三萬五	
				三萬六	
				三萬七	
				三萬八	
				三萬九	
				四萬	
				四萬一	
				四萬二	
				四萬三	
				四萬四	
				四萬五	
				四萬六	
				四萬七	
				四萬八	
				四萬九	
				五萬	
				五萬一	
				五萬二	
				五萬三	
				五萬四	
				五萬五	
				五萬六	
				五萬七	
				五萬八	
				五萬九	
				六萬	
				六萬一	
				六萬二	
				六萬三	
				六萬四	
				六萬五	
				六萬六	
				六萬七	
				六萬八	
				六萬九	
				七萬	
				七萬一	
				七萬二	
				七萬三	
				七萬四	
				七萬五	
				七萬六	
				七萬七	
				七萬八	
				七萬九	
				八萬	
				八萬一	
				八萬二	
				八萬三	
				八萬四	
				八萬五	
				八萬六	
				八萬七	
				八萬八	
				八萬九	
				九萬	
				九萬一	
				九萬二	
				九萬三	
				九萬四	
				九萬五	
				九萬六	
				九萬七	
				九萬八	
				九萬九	
				十萬	
				十萬一	
				十萬二	
				十萬三	
				十萬四	
				十萬五	
				十萬六	
				十萬七	
				十萬八	
				十萬	

醫學館寄宿
寮書籍之記

大學東

卷第五

少陽證

海藏論男子婦人傷寒同一法

仲景小芫胡湯
易簡小芫胡湯

逍遙散
易簡逍遙散

錢氏地骨皮散
文潞公藥準注李琬方

四順飲子
芫胡桂枝乾薑湯

大芫胡湯
深師黃芩湯

易簡參蘇飲
易簡溫膽湯

易簡降氣湯
許學士地黃丸



醫學館寄宿寮書籍之記

金匱大薯蕷丸

外臺祕要仲景病源小品方

龍腦鷄蘓丸 黃耆膏子煎丸

地骨皮枳殼散 黃龍湯

茈胡鼈甲散 王氏秦芫散

生犀散

活人姪婦傷寒加減例

不老丹例

不老丹歌 又方

又方 逐風丹

治癰瘰方 消癰丸

治瘤氣癭起 五香連翹湯

治癭鷺鷥丸 孫尚藥方

青蒿散 鼈甲煎丸

白虎加桂枝湯 蜀漆散

牡礪湯

小茈胡去半夏加括蕷湯

茈胡桂薑湯 九轉靈砂丹

又方 海藏瘧論

通脉四逆散 小茈胡湯論議

舌胎滑例

三焦熱用藥大例

卷第六

三陽拾遺例

海藏通聖散評議

韓氏微旨論和解因時法

調脉湯

人參桔梗湯

防風湯

六物麻黃湯

小兒疳積散

三焦熱用藥

三陽拾遺

海藏通聖

韓氏微旨

葛根芩胡湯

薄荷湯

香芎湯

七物芫胡湯

發表湯

石膏湯

芍藥湯

韓氏十四藥定經

仲景瓜蒂散例

仲景瓜蒂散

宋氏仲景鈐法嗜藥瓜蒂散

勝金丸

三聖丸散

外臺肘後方

人參湯

解肌湯

知母湯

韓氏十四藥

仲景瓜蒂散

仲景瓜蒂散

宋氏仲景鈐法

瓜蒂散

經驗方

又方

又方

仲景治百合例

百合知母湯

百合滑石代赭石湯

百合鷄子湯

百合洗方

百合地黄湯

百合滑石湯

百合括萋牡礪湯

海藏百合四君子湯

病源小品菱絳湯

括萋實湯

千金翼五苓散

甘草瀉心湯

陽旦湯

海藏十餘證辯拜藥

牙齒例

陳希夷神仙刷牙藥

麝香間玉散

犀角升麻湯

梧桐淚散

升麻丸

白牙齒藥

又方升麻散

三聖散

治齒根宜露動搖方

治牙齒脫落不牢方

簡要方

二十八宿散

革撥散

擦牙藥

立効散

益神散

返老還童丹

古今巴豆例

仲景備急丸

仲景白散

仲景飛尸走馬湯方

黑神丸

狀元丸

酒癥丸

神應丸

青娥丸

紅粉丸

解毒雄黃丸

玉霜丸

活人黑神丸

錢氏紫霜丸

感應丸

神應丸

局方感應丸

簡易感應丸

五脂丸

木香五靈脂丸

三倍丸

解毒丸

軟紅丸

比金丸

青娥丸

柔金丸

導氣丸

安中丸

透羅丹

溫白丸

易老治五積

萬病感應丸

萬病紫苑丸全註

耆婆萬應丸

小麝香丸

神保丸

下則聖人已先據之矣何待世人明之乎聖人不言以其男女同診也後人不知湯液之源故立爲婦人法則異於男子常人所易聰明眼者肯以此爲是乎然以藥考之則可知也假令桂枝芍藥固榮而閉衛非血藥如何麻黃防風雖爲之發汗本治乳子餘疾非血藥如何白虎小芩胡中知母則治腎芩胡則調經皆氣中之血藥也當歸地黃不言可知故爲血藥白朮人參皆以爲氣劑本草言能利腰臍間血非血藥乎大抵用之在陽便是氣

藥用之在陰便是血藥若男子與女人傷寒皆榮衛受病其證一也何必云男先調氣女先調血也此二句雲岐子以爲治雜病法之常體非爲傷寒設也其所以異者以其任衝盛而有子月事行有期有熱入血室證不得不異也在妊孕不得不保在經血不得不調表裏汗下何嘗有異也無汗下藥中增損自有調保之義活人云妊娠不用桂枝半夏桃仁芩胡湯減半夏爲黃龍湯是則是矣必竟畜血極而隣於死須抵當湯丸則安得不用止

是減劑從輕可也故黃帝云身重毒之何如
歧伯曰有故無損亦無損也大積大聚可輕
犯也衰其大半乃止過者死此所以有從輕
之義活人注中舉似其言甚當仲景不言男
子婦人有異其意蓋由諸此以知桂枝半夏
桃仁可用處必用不可全無但當從輕則可
以保安丸中有桂附牛膝皆墮胎之劑以其
數多之中些少是亦從輕而無妨也又為引
用必須少而不可無也大意如此後之君子
更宜詳定保劑多破劑少破者從其保破劑

多安劑少安者從其破此理不可不知又
寒熱多少例寒者多熱者少熱不為之熱熱
者多寒者少寒不為之寒
此婦人之病多在經血不調故婦人傷寒一
條例少陽條下

仲景小茈胡湯

治往來寒熱胸脇痛而耳聾或咳或嘔尺寸
脈俱浮而弦

茈胡 三兩 人參 半夏 黃芩 甘草

右咬咀生薑棗煎本經加減之法 此方亦

治瘧與雜病中外不相及 雜病寒熱往來

經水不調加秦艽芍藥當歸知母地骨皮牡

丹皮川芎白朮茯苓去半夏 治婦人虛勞

發熱加蛤蚧赤茯苓 小茈胡湯與四物湯

各半一名調經湯 無孕嘔者加半夏亦可

無汗者加茈胡 惡寒者加桂 有汗者加

地骨皮 嗽者加紫苑 通經加三稜廣茂

勞者加鼈甲

又小茈胡後加法 著胸中煩不嘔者去半夏

人參加括蕞實二枚 若渴者去半夏加人

參合前成四兩半括蕞根四兩 若腹中痛

者去黃芩加芍藥三兩 若脇下痞鞭者去

大棗加牡礪四兩 若心下悸小便利去

黃芩加茯苓四兩 若不渴外有微熱去人

參加桂三兩溫覆取微汗愈 若嗽去人參

大棗生薑加五味子半兩乾薑二兩 血弱

氣盡腠理間邪氣因入與正氣相搏結於脇

下正邪分爭往來寒熱發作有時默然不欲

飲食臟腑相連其痛必下邪高痛下故使嘔

也小茈胡湯主之

易簡小芫胡湯

治傷寒溫病身熱惡風頭項強胸滿脇痛煩渴嘔噦小便不利大便秘鞭或過經未解潮熱不除非汗非下之證並宜服之及產後勞復發熱頭疼往來寒熱及婦人傷寒經水適來適斷發熱發寒晝則明了夜則譫語此為熱入血室則血必結故使寒熱如瘧狀此藥主之小兒溫熱悉能治療

芫胡二兩半夏二兩黃芩二兩人參二兩甘草各二兩

右咬咀每服五錢水鍾半生薑五片棗一枚

煎六分去滓食前服 若腹痛去黃芩加芍

藥半兩 心悸去黃芩加茯苓一兩 若不

渴外有熱者去人參加桂三分溫服令有汗

則解 若咳嗽去棗加五味子三分乾薑半

兩 胸中煩而嘔者去半夏人參加括萆實

半兩 渴者去半夏加括萆根一兩 胸中

痞鞭者加煨了牡蠣一兩 傷寒十三日不

解胸脇滿而嘔者晡則發熱已微利醫以丸

藥利之非其治也宜加芒硝一兩 傷寒十

餘日結熱在裏往來寒熱或心下急鬱鬱微

煩或口生白胎大便不通或發熱汗出或膈中滿痛或日晡發熱如瘧或六七日目中不了了睛不和無裏證大便難身發熱者實也去人參加枳實大黃一兩名大芫胡湯服之以利為度熱除不宜遽用補藥仍忌羊肉腰子并酒難化之物或有所傷是名食復難以治療切宜忌之

逍遙散 主治脩製並見局方

芫胡 二兩 當歸 芍藥 白朮 茯苓 不

甘草 炙各半兩 薄荷 少許

右咬咀生薑煎服勿謂云治婦人大人小

兒男女同法

易簡逍遙散

治血虛勞倦五心煩熱肢體疼痛頭目昏重心忪頰赤口燥咽乾發熱盜汗減食嗜臥及血熱相搏月水不調臍腹脹痛寒熱如瘧又療室女榮衛不和痰嗽潮熱肌體羸瘦漸成骨蒸

白茯苓 白朮 當歸 白芍藥

芫胡 各一兩 甘草 半兩

右吹咀每服四錢水一鍾煨生薑一塊切片煎至六分去滓熱服無時一方名人參飲治婦人血熱虛勞骨蒸兼治邪熱客於經絡肌熱痰嗽五心煩燥頭目昏疼夜多盜汗補正氣解勞倦用人參白朮茯苓芩胡半夏當歸赤芍藥乾葛甘草黃芩各等分右剉每服四錢水中半生薑四片棗二枚煎至六分不拘時服應有勞熱證者皆可服之熱退即止但婦人寒熱亦因有經血結閉者致令五心煩熱及骨節間熱或作虛勞治之反以為害

積日既久乃成真病法當行其經血若月事以時自然平治或以局方大聖散用紅花煎茶酒調服不能飲者以醋代之仍以紅丸子醋湯嚙下此二藥大治經事不調或腹有血塊若久無子息服之數月其効特異非可數服責其無功或因下血過多發為寒熱當用當歸地黃之類如大建中藥令養勞雙和輩是也然有痰飲停積之人則難用此蓋當歸地黃與痰飲不得其宜及傷胃氣因是不進飲食遂成真病至於不救者多矣痰飲

中積致生寒熱者宜以二陳湯參蘇飲等藥
療之應手其効不更是有服退熱冷藥太過
因而咳嗽下利發熱自汗皆不可用之惟真
武湯增損名固陽湯仍以震靈丹服之病輕
者可療重者當別求治法

錢氏地骨皮散

秦艽龍甲苳胡甘草湯

秦艽青蒿烏梅甘草湯

文潞公藥準注李琬方

苳胡 連翹 山梔子 防風 甘草

活人連翹梔子防風甘草湯 連翹飲子

四順飲子 一名清涼飲子治夜則在血熱而

不厥 加荊芥 白朮 麻黃 爲洗心散

守真苳胡飲子治便鞭氣血各半 苳胡煮散

錢氏黍粘子荊芥防風甘草湯

局方消毒散減防風餘三味

舉卿舉敗散 治婦人產後傷寒風痙角弓及張

苳胡桂枝湯 小苳胡湯加桂枝芍藥是也

苳胡桂枝乾薑湯

苳胡 黃芩 甘草 枳實根 桂枝

乾薑 牡蠣

芫胡龍骨牡蠣湯 小芫胡湯去甘草加鈔丹

桂枝龍骨牡蠣茯苓大黃

小芫胡加芒硝湯

治十三日過經不解大抵須看少陽證不退

而臧結宜用小芫胡加桂湯治瘧疾兼支結

大芫胡湯

主治數條並見本經並活人藥證

芫胡 黃芩 半夏 生薑 大棗

芍藥 枳實 大黃

活人舉伊尹湯液大芫胡湯八味今監本無黃

芩脫落之也

潔古老人云治表證仍在裏證已急不如此不

可用小芫胡去參草加枳實大黃如緩治不

減人參甘草

深師黃芩湯

治傷寒六七日發汗不解嘔逆下利小便不

利胸脇痞滿微熱而煩

茯苓 芫胡 半夏 桂心

黃芩 各三錢

右咬咀生薑水煎服

易簡參蘇飲

治感冒發熱頭疼或因痰飲凝積發以為熱
並宜服之若感冒發熱亦如服養胃湯法以
被蓋臥連進數服微汗即愈尚有餘熱更宜
徐徐飲食服之自然平治因痰食發熱但連
日頻進數服以熱退為期不可預止雖有前
胡乾葛但能解肌耳既以枳殼橘紅輩自能
寬中快膈不致傷脾兼大治中脘痞悶嘔逆
惡心開胃進食無以踰此母以性涼為疑一
切發熱皆能作効不必拘其所因也小兒室

女尤宜服耳

前胡加三分 橘紅 紫蘇 乾葛 半夏

茯苓 枳殼 陳皮 甘草 桔梗

木香 各半兩

右咬咀每服四錢水一鍾半生薑七片棗一
枚煎至六分去滓不拘時候服素有痰飲者
俟熱退以二陳湯或六君子湯間服本方
治痰飲停積中脘閉塞眩暈嘈煩忪悸嘔逆
及痰氣中人停留關節手脚躡曳口眼喎斜
半身不遂食已即嘔頭疼發熱狀如傷寒者

悉主之一方用此藥三兩加四物二兩合和
 名茯苓補心湯大治男子婦人虛勞發熱或
 五心煩熱並治吐血衄血便血並婦人下血
 過多致虛熱者並得其宜亦有用心過度
 發熱者用之亦有神効往來寒熱尤宜服之
 易簡溫膽湯
 治大病後虛煩不得睡兼治心膽虛怯觸事
 易驚或夢寐不祥或異象眩惑遂致心驚膽
 懾氣鬱生涎涎與氣搏變生諸證短氣悸之
 或復自汗或四肢浮腫飲食無味心虛煩悶

坐臥不安悉能主之

半夏一兩枳實二兩橘紅二兩半

甘草四錢半茯苓三錢

右以咀每服四錢水一鍾半生薑七片棗一
 枚竹茹一塊如錢大煎至六分去滓食前熱
 服竹茹即刮竹青也大治傷寒後虛煩若
 傷寒後尚有餘熱并熱在上焦兼汗下後表
 裏俱虛不可攻者宜用人參竹葉湯下利者
 於竹葉湯中去石膏加熟附名既濟湯嘔
 者二陳湯一法治傷寒壞證時或發熱消渴

煩躁用新羅參不拘多少煎湯浸令水冷候
 盛渴之時與之頓服熱則隨去矣大抵傷寒
 渴者不可多與水水多積胸中便為結胸矣
 然亦濡沫之可也傷寒之後有吃逆者此
 證最危其他證有此亦然當用半夏二兩生
 薑半兩白水煎服大一方向用丁香十粒柿帶
 十五枚煎湯半鍾乘熱無時頓服

易簡降氣湯

治虛陽上攻氣滯不快上盛下虛膈塞痰實
 咽乾不利咳嗽中滿喘急氣粗臍腹膨脹滿

悶虛煩微渴引飲頭目昏眩腰痛脚氣四肢
 倦怠此藥專治脚氣上攻中滿喘急下元虛
 冷服補藥不効者立効

前胡 厚朴 甘草 當歸各二兩

肉桂 陳皮各三兩 半夏五兩

右吹咀七味并紫蘇子五兩綠難得真者不
 治用紫蘓如前胡之數代之其為八味每服
 四錢水一鍾半生薑五片棗一枚煎至七分
 去粗食後服 凡人中風中氣臍滿及脚氣
 等患多是虛氣上攻胸膈不快不進飲食此

藥大能降氣真俞山人降氣湯後加參附五味大腹皮之類却非其真若素脚氣只是上氣喘急不得臥者宜用橘皮紫蘇人參五味子桔梗各等分名神祕湯甚用此調鍾乳粉下養正丹脚氣入腹大便秘不任冷藥者宜用養正丹以溫利之一方以八味丸加川芎細辛桔梗茯苓共十二味名大降氣湯治法一同若尊年人虛氣上壅當間以生附加生薑煎臨熟磨以沈香服之尤為穩當許學土地黃丸

此方當在大薯蕷後

生薑 秦艽 黃芩 芫胡 赤芍藥

各半兩

右細末蜜為丸烏梅湯下三十丸無時日二服學士云褚澄治寡婦僧尼室女別得其法診其脉左手關獨出寸口過魚際乃知女子思男而不可得也或云寡婦師尼不可言僧字然為當以經勞之二陽病發心脾不得隱曲故女子不月此一條本為女子而言王准內復云男子少精是經言女而証言男皆勞也言僧一字亦兼男之義倉公傳濟北王侍人女病腰膝疼熱倉公曰病得之欲男

不可得何以知之診其脉弦出寸口是知之
 婦人以血為本血盛所以思男褚澄云僧
 尼則異於妻妾學士改僧字為師字甚當經
 云女子不月條下王註云男子少精兼之意
 也又知僧字兼男之義易老云仲景治婦
 人經不調盡在小芘胡調治條下以此推之
 活人梔子烏梅甘草黃芩芘胡湯
 治懊懣煩燥不得眠
 右五味粗末生薑水煎加竹葉鹽豉三十粒
 仲景治少陰心悸不致水火調其中而治本也

仲景云少陰證四逆條下言或咳或悸或自
 便是假令一證並不是上下一條通為一證
 也或悸而反舉之言姑以四逆散主之若果
 四逆必不用於此也何以然下文云悸者加
 桂腹痛不利者加附子即知雲岐子於此正
 條內去或悸二字并散便用四逆湯下所主
 甚當

金匱大薯蕷丸 治虛勞諸不足風氣百病

薯蕷 分三十 甘草 炙二分 當歸 分 桂枝

熟地黄 大豆黃卷 麴 各十分

阿膠

蛤粉炒成珠

人參

各七分

芍藥

麥門冬

去心

芍藥

白朮

杏仁

去皮尖炒

防風

各六分

芫花

茯苓

桔梗

各五分

乾薑

三分

白欬

二分

大棗

百枚為膏

右二十一味細末煉蜜丸彈子大空心酒下

一丸一百丸劑

外臺祕要仲景病源小品方

大陽病過經十餘日及二三下之後四五日

芫胡湯證仍在者先與小芫胡嘔不止心下

急不安鬱鬱微煩者為未解也可與大芫

胡湯下之即愈

半夏

湯洗

芫胡

各半斤

黃芩

益去

芍藥

各三兩

大棗

二十個擘破

生薑

五兩

枳實

四箇炒

右七味切以水一斗二升煮取六升去滓更

煎取三升溫服一升日服一方加大黃二兩

今不加大黃恐不名為大芫胡湯也忌羊肉

湯兼治天行千金翼肘後同海藏云正經

嘔家雖多陽明證不可下大芫胡主治但言

嘔不止心下急大芫胡湯下之不可疑也及

點示正方即內無大黃却與本條相合入注

中小字亦作嘔止小安仍未解者即宜大黃也故注後有加大黃一句若全用有大黃却是易老法治表證仍在裏證已急者也古人用藥其精妙如此

龍腦鷄蘓丸

增損比之御藥院尤妙

除勞解熱下氣散鬱去肺熱咳血心熱驚悸脾胸熱口乾吐血肝膽熱氣出口苦腎熱神志不定上而酒毒膈熱消渴而血利五淋血崩此藥清神爽氣潤肺開心益志滋肝補胃令人身強體輕耳目聰明又能利膈化熱痰

去膀胱中積熱三焦永無滯塞

鷄蘇葉

即龍腦薄荷是

新蒲黃

黃耆

人參

木通

各二兩

麥門冬

去心四兩

甘草

一兩半

黃連

一兩

乾地黄

六兩

阿膠

炒焦二兩

苡胡

銀州鼠尾紅色者二兩到同木通用沸湯半升浸一日夜絞取汁

右為細末用西路好蜜二斤餘先煉一二沸然後下生地黃末不住手攪徐徐入絞下者木通苡胡汁慢火熬成膏勿令火緊焦了然後將其餘藥末和丸如豌豆大每服二十九白湯下 虛勞煩熱梔子湯下 肺熱黃芩

湯下 心熱悸動恍惚人參湯下 唾咯吐

衄血去心麥門冬湯下 脾胃熱赤芍藥生

甘草湯下 肝熱防風湯下 腎熱黃蘗湯

下以上諸證並食後臨臥 治五淋及婦人

血崩漏下車前子湯下 莖中痛蒲黃滑石

各一錢溫水調下 室女虛勞寒熱潮作煎

芫胡人參湯下 痰嗽生薑湯下 氣逆橘

皮湯下

黃耆膏子煎丸

人參 白朮各二兩半 甘草炙 白芷各五錢

芫胡揀淨 黃芩各一兩 鼈甲一箇半豐大者酥炙

右細末黃耆膏子丸如梧桐子每服三十丸

至五十九百沸湯食前服 製黃耆膏用黃

耆半斤粗末水二斗熬至一斗去滓再熬不

住手攪成膏至半斤入白蜜一兩再熬令蜜

錫熟得膏子十兩放冷丸藥此為下劑冬約

量用之

地骨皮枳殼散

治骨蒸勞熱肌肉消瘦少力困乏夜多盜汗

地骨皮 秦艽 芫胡 枳殼

當歸

鼈甲

醋炙黃

知母

右等分爲末水一鍾桃柳枝頭各七箇薑三片烏梅一箇每服三錢煎至七分去滓臨臥空心溫服

黃龍湯

治胎前產後寒熱

小芫胡去半夏加芍藥是也一方以四物

湯加蒲黃亦名黃龍湯

芫胡鼈甲散

大便硬者芫胡鼈甲散大便溼者半氣半

血逍遙散

芫胡

知母

貝母

地骨皮

鼈甲

醋炙黃

右爲細末蒿心七葉烏梅三箇同煎

王氏秦芫散

鼈甲

醋炙黃

秦芫

各一兩半

知母

炙甘草

各一兩

芫胡 二兩

右吹咀棗煎服

局方秦芫鼈甲散

局方沈香鼈甲散

局方人參荊芥散

以上三方主治脩製並見局方

孫用和小芫胡治瘴疫久瘧面黃肌瘦不以日
 月淺深悉皆治之 心胸痞不思飲食加陳
 皮渴者加括蕁根喘者如杏仁使祕加大黃
 胸痞鞭者加牡礪去皮三五劑 去半夏加
 人參括蕁根名曰黃龍湯 虛煩熱竹葉湯
 此溫熱證與濕熱證與傷寒稍別 療傷寒
 一桂枝二麻黃三青龍四白虎五芫胡精當
 不差立時見効不必須候轉泄其間變壞悔
 之晚矣 如色脉交亂須辯明白無疑 陽
 盛熱多則白虎竹葉陰盛寒濕則四逆理中

以此思之又豈有二百九十七法耶 雲岐
 子論正法與此同意 王朝奉舉杜士云凡
 春夏宜發汗秋冬不宜汗秋冬傷寒只用小
 芫胡頓服自愈無汗亦愈若未便傷寒疑是
 風氣痰壅等皆治之若渾身痛小芫胡加桂
 尤妙也
 生犀散
 治小產骨蒸日晚潮熱夜間盜汗能飲食無
 肌肉病後餘毒傷寒後服熱物發熱不除及
 食羊肉物

合羚羊角 地骨皮 秦艽 枳殼

大黃 麥門冬 赤芍藥 茯苓

芫胡 人參 桑白皮 黃耆

鼈甲 醋炙黃色 各等分

右咬咀青蒿水煎去粗溫服

活人妊婦傷寒加減例

妊婦傷寒仲景無治法非無治法也以其有
岐伯有故無損可犯衰其大半一條更不必
云謂紛紛也所以不言明者當識謂如瘧濕
喝一篇無藥仲景豈無治法而不知藥恐後

人有所遺耳 活人治婦人傷寒妊娠服藥

予謹考而詳之無論有胎無胎產前產後主
治藥味皆不出此聖人意詳云俗方可採者

與其間參用則知其間亦有達古人意者何
必云以法考之疑非古方也 發熱惡寒不離

桂枝芍藥 往來寒熱不離芫胡前胡 大
渴不離知母石膏五味子麥門冬 大便滑

者不離桂附白朮乾薑 大便燥結不離大
黃黃芩 經水適來適斷者小芫胡 安胎

不離人參阿膠白朮黃芩 發汗不離生薑

荳豉麻黃旋覆花 頭疼不離前胡石膏梔
 子 傷寒頭痛不離芷胡石膏甘草 滿悶
 不離枳實陳皮 胎氣不安不離黃芩麥門
 冬人參 發斑變黑不離黃芩梔子升麻
 觀此數條皆不出古人意豈可云仲景無治
 法不言婦人妊娠之的方也仲景一書婦人
 小兒兼之矣活人論婦人傷寒但云仲景不
 言其意已足不可云仲景無治法以治之藥
 求之皆仲景本意曷嘗出古人哉活人此言
 雖失亦急為後人不知湯液者言之也豈敢

云仲景不知也活人之言失之過而不甚的

當耳

不老丹例

不老丹

何首烏

蒼朮

桑椹

煎如法

並見活法

局方何首烏蒼朮地黃煎

右地黃膏子煎與蒼朮煎合點服全養氣血

無上神藥也

不老丹歌

皇甫敬之作爲德甫服此七十而無白髮

蒼朮四斤泔浸軟 竹刀刮皮切作片

不然一斤炒以四兩鹽 一斤椒炒黃色變

熟一斤各以酒醋浸 三味出之以日見

何首赤白各二斤 泔浸竹刮切來勻

棗豆五升同一甑 棗豆爛時曝乾成

地骨二斤通搗細 槩汁和之如麪劑

不然置在盆中手按平 仍澆槩汁高三指

不然夜取月精晝日萃 汲盡槩汁藥乃佳

其藥精乾摩作塊 亦用石曰搗無害

搗之細熟須細羅 煉蜜為丸桐子大

又然空心酒服一百丸 此是人間不老丹

又方

何首烏一斤赤棗一升入 了却以 入鍋內 用河水 煮乾

去核同用 牛膝酒浸 焙乾 一兩

防風用水洗淨 去芦 二兩

右為細末石臼杵棗肉丸梧桐子大空心溫

酒下五十粒

又方

何首烏一斤 牛膝兩 熟地黄兩

蒲黃一兩 乾桑椹兩

右細末蜜丸桐子大棗蜜各半丸亦得

逐風丹 治風痰通身疙瘡

又地骨皮 一兩 何首烏 一斤 荊芥穗

甘草 各四兩 黑豆 三升河水煮晒乾

右為細末調酒服三錢或蜜丸彈子大細嚼

一丸茶酒任下

治癰癧方 癰氣癭起結疔癰贅癰

右用黑熟桑椹二升新布絞汁砂鍋內熬不

又犯鐵釜後成膏子沸湯點服

又治癰癧經年久不差者以玄明粉末敷之日

二次

消癭丸 治結核癭氣

連翹 梔子 桔梗 甘草 乾柿

防風 牡礪 玄參 丹參 荊芥

續斷 鼠李 海藻 昆布 何首烏

白薑蠶 牛李子 白頭翁 各等分

右為末煉丸食後茶酒任下

治癰氣癭起

連翹 梔子 瞿麥 防風 乾柿

桔梗 甘草 各等分

右細末蜜丸桐子大服

五香連翹湯

治癰疽癩瘰風結腫氣惡瘡毒氣瘡氣入腹
嘔逆惡心并皆治之

木香 沈香 獨活 升麻 甘草

麝香 各半兩 連翹 乾葛 大黃

桑寄生 薰陸香 各二兩 淡竹茹

雞心香

右吹咀水煎終入竹茹

治癭驚驚丸

海鷲 海帶 海蛤 木通

青皮 昆布 訶子 去核 連翹 各等分

晚蠶砂 款冬花

右細末煉蜜丸鷄頭實大每服一丸食後臨
臥噙化津液嚥下

孫尚藥方 治小兒盜汗潮熱往來

南蕃胡黃連 此胡 各等分

右細末煉蜜丸鷄頭實大每服二丸至三丸

五丸銀石銚子內用酒少許化開更入水五

分重湯煮二三十沸放溫食和滓服

治傷寒勞復身熱大小便赤如血色者

胡黃連 去殼各一兩 山梔子 去殼各一兩 蜂蜜 半兩

右件和炒微焦二味為細末用豬膽汁和丸

桐子大每服生薑二片烏梅一箇童子小便

三合浸半日去粗食後煖小便令溫送下十

丸臨臥再服妙

青蒿散 治骨蒸便軟渴者

青蒿 烏梅 秦艽 甘草 各等分

右吹咀同小麥煎服

金匱要畧瘧病脉證并治證三條方六首

師曰瘧脉自弦弦數者多熱弦遲者多寒弦小

急者下之差弦遲者可溫之弦緊者可發汗

鍼灸也浮大可吐之弦數者風疾也以飲食

消息吐之 問曰瘧以月以日發當以十五

日愈設若不差當月盡解也如其不差當云

何 師云此結為癥瘕名曰瘧母急治之宜

鼈甲煎丸

鼈甲煎丸

鼈甲 十三分 烏犀 二分 黃芩 三分 菟胡 六分

石葦 二分 厚朴 三分 瞿麥 二分 紫葳 二分

半夏一分 人參一分 牡丹皮五分 鱗虫五分

阿膠三分 蜂窠四分 芒硝十二分 蜣螂六分

大黃二分 芍藥五分 桂枝三分 葶藶二分

桃仁三分 鼠一分

右二十二味為末取鍛竈下灰一斗清酒一斛五斗浸灰候酒盡一半著鼈甲於中煮取泛泛如膠漆絞取汁內諸藥煎為丸如桐子大空心服七丸日三服

師云陰氣孤絕陽氣獨發則熱而少氣煩滿手足熱而欲嘔名曰痺瘧若但熱不寒者邪氣

內藏於心外舍分肉之間令人消鑠肌肉溫瘡者其脉如平身無寒但熱骨節煩疼時嘔宜用

白虎加桂枝湯主之

知母六兩 甘草炙二兩 石膏碎一斤 桂枝三兩

粳米六合

右五味以水一斗二升煮米熟去滓煎至三升溫服一升日三汗出愈

蜀漆散 治瘧多寒者名曰牡瘧

右杵為細末未發前以漿水服三錢溫瘧

加蜀漆半分臨發時服錢七一方雲母

作雲實

牡礪湯治牡癰

麻黃去節牡礪熬各四兩蜀漆洗去甘草炙各二兩

右咬咀以水八升先煮蜀漆麻黃去上沫得

六升內諸藥取二升去粗溫服一升吐則勿

更服見外臺

小莖胡去半夏加括蕒湯見外臺經心錄治勞瘵

莖胡八兩黃芩炒二兩生薑三兩切片大棗十二枚

人參各四兩括蕒根各四兩

右七味咬咀以水一斗二升煮取六升去粗

又再煎取三升日三服

莖胡桂薑湯

治寒多微有熱或但寒不熱服一劑如神故

錄之

莖胡八兩桂枝去皮黃芩各三兩牡礪炒

甘草炙乾薑各二兩

右七味咬咀以水一斗二升煮取六升去粗

再煎取三升溫服一升日三初煩汗出愈出

大傷寒論

九轉靈砂丹

治瘡

紫河車

一錢八分研細和後二味

鈔一錢 信一錢

右用雄黑豆一百粒水浸一宿去皮透時研如泥和三味勻末丸桐子大棗豆大黍粒大三等量虛實老幼大小服之每服一二丸或三丸臨晨日未出面東無根水下不發日服經曰當其盛必毀因其衰也是必大昌此之謂也

又方治瘡久不愈

右用蒜不以多少杵和鈔丹丸鷄頭實大每

服一丸臨晨面東新水下

海藏瘡論

暑之為病以瘡舍於榮衛之間得秋之風寒所傷而後發亦有非暑感風寒而得之邪并於陽則發熱水水不能涼邪并於陰則發寒湯火不能溫并則病作離則病止故有時而伏在氣則發之早在血則發之晏淺則日作深則間之或在頭項或在背中或在腰脊雖上下遠近之不同在大陽則一也或在四肢者風搖之所及隨所傷而作不必盡當風火

也先寒而後瘧者爲之寒瘧先熱後寒者爲
之溫瘧二者不當治水火當從乎中治中治
者少陽也渴者燥盛也不渴者濕盛也瘧雖
傷暑遇秋而發其不應者秋病寒甚太陰多
也冬病寒不甚陽不爭春病則惡風夏病則
多汗二者手少陽虛也其病隨四時而作異
形如此又有得之於寒而發之於暑邪舍於
腎足少陰也有藏於心居之於內熱索於肺
少陰也至於少氣煩冤首足熱而不寒爲之
瘧瘧足陽明也治之奈何當其盛而必毀因

其衰也是必大昌矣治法易老瘧論備矣

問曰婦人經痛大人小兒內熱潮作并瘧寒熱
其法同否帝又問曰病中外何如岐伯曰從
內之外者調其內若盛於外者先治內而後
治外此言表裏而出之異也又云中外不相
及則治主病中外不相及者半表裏也自外
而入者有之自內而出者亦有之外入內出
雖異也在半表半裏則一矣此從外之內者
治其內若盛於內者先治外而後治內中外
不相及爲少陽也治主病者治少陽也帝問

大熱之病惡寒發熱如瘧或發一日或發間日岐伯對曰以勝復之氣會遇之時有多有少陰多陽少其發日遠陽多陰少其發日近此勝復相搏盛衰之節瘧亦同法瘧者少陽也少陽者東方之氣也逆之則發寒順行則發熱故分之氣異往來之不定也婦人經水適來適斷病作少陽治之傷寒雜病一體經云身有妊而脈有邪經閉也又云月事不來則者胞脈閉也經閉者尺中不至胞閉者生化絕源二者皆血病厥陰主之厥陰病則少陽

病矣累及其夫也小兒外感內傷若有潮作寒熱等證並同少陽治之男女同 已上男子婦人小兒閨女或大寒或大熱或虛變成勞脈有浮中沈之不同故藥有表裏和之一察其在氣在血定其行陽行陰使大小不失其宜輕重各得其所從緩從急逆順而舉則無不當乃可以萬全矣此少陽一治不可不知也

素問五臟藥證湯液

肝瘧令人色蒼蒼然大息其狀若死者通脈

四逆湯主之

胃瘧令人病已善飢而不能食食而支滿腹

大理中湯理中丸主之

心瘧令人煩心甚欲嘔清水及寒多不甚熱

桂枝加黃芩湯主之

脾瘧令人寒腹中痛熱則腸鳴鳴已汗出小

建中湯芍藥甘草湯主之

肺瘧令人心寒寒甚熱熱間善驚如有見者

桂枝加芍藥湯主之

腎瘧令人洒洒腰脊痛不能宛轉大便難目

眴眴然手足寒桂枝加當歸芍藥湯主之

素問六經藥候湯液

少陽令人身體解傷寒不甚熱不甚惡見人

見人心惕惕然熱多汗出甚小茈胡湯

厥陰令人腰痛小腹滿小便不利如瘧狀非

瘧也數噎意恐懼氣不足腸中悒悒四物玄

胡苦練附子湯

陽明令人先寒洒淅寒甚久乃熱熱去汗出

喜日月火光氣乃快然桂枝二白虎一黃芩

芍藥加桂湯

太陰令人不樂好太息不嗜食多寒熱汗出
 病至則善嘔病已乃衰小建中湯異功散
 太陽令人腰痛頭重寒從背起先寒後熱熇
 熇喝喝然熱止汗出難已羌活生地黃湯小
 芫胡加桂湯
 少陽令人悶嘔吐甚之寒熱熱多寒少欲閉
 戶牖而處其病難已小芫胡加半夏湯

小芫胡湯議論
 素小芫胡湯不汗不下不利小使故潔古名三
 奈湯也後人用六乙涼膈和解之不知何意

涼膈氣中之下藥六乙則雜病膀胱中和小
 使藥也而少陽證當陽明與太陰之間故云
 半表裏所以小芫胡不汗不下不利小使今
 六乙涼膈既利而復下之故有畜血心下痞
 證豈可輕用偽哉若以利下之劑為可用則
 古人麻黃承氣五苓合而用之也豈為有矣
 古人之意其害非輕明者當識半在表乃身
 後之表半在裏非下之半在裏乃身前之裏
 則藥不至於差惑也

舌胎滑例 王朝奉證治論臟結附

胎上胎滑此丹田有熱也脉陰陽俱緊者口中氣出唇口乾燥倦臥足冷鼻中涕出舌上胎滑勿妄語也到七八日以來微熱手足溫爲欲解或八日以上反大發熱爲難治設使惡寒者必欲嘔也可以芫胡湯去半夏加入參括萆湯出小芫胡湯加減法腹中痛者可理中丸臟結如結胸狀飲食如故時時下利脉浮關脉小沈細緊名曰臟結舌上胎滑者難治可刺關元穴臟結無陽證不往來寒熱一云寒而不熱其人反靜舌上胎滑

者難治也可刺關元穴服小芫胡湯佳陽明病脉浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反惡熱身重若下利則胃中虛客熱薰膈心中懊懣舌上胎滑者服小芫胡湯胃氣和汗出而解

三焦熱用藥大例

上焦熱

清神散

連翹防風湯

涼膈散

龍腦飲子犀角地黃湯

中焦熱

中小承氣湯 調胃承氣湯 洗心散

四順清涼飲 桃仁承氣湯

下焦熱 五苓散 立效散

大承氣湯 石葦散 四物湯

海藏云此內熱之大畧也有外熱者當求別

法兼此例有輕重氣血之分用者當擇其

可焉而已矣

醫壘元戎卷第五終

